


LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

PURCHASED 1923 FROM
GENEVA BOTANICAL GARDEN



501.1451
C69

HERBARIUM
PEDEMONTANUM

CURANTE

ALOYSIO COLLA

VOL. I.

TAURINI
EX REGIO TYPOGRAPHOE
1833

TURIN

Chez { LOUIS ET FRANÇOIS PIC, Libraires de l'Académie
Royale des Sciences, sous les Arcades de
la Foire.
JOSEPH POMBA, Libraire sous les Arcades de la
Foire, au coin de la rue du Po.

HERBARIUM PEDEMONTANUM

J U X T A

METHODUM· NATURALEM DISPOSITUM

ADDITIS NONNULLIS STIRPIBUS EXOTICIS

AD UNIVERSOS EJUSDEM METHODI ORDINES EXHIBENDOS

C U R A N T E

ALOYSIO COLLA

AMPLISS. JURISCONSULT. COLLEG. R. TAURIN. UNIVERSIT. COOPTATO -
R. SCIENTIAR. ACAD. ET R. SOCIET. AGRICULT. TAURINENS. SOCIO - SOCIET.
NAT. SCRUT. HELVET. - SOCIET. LINN. PARISIENS. - SOCIET. IMP. R.
PATRIOT. OECONOM. BOHEM. - ACAD. SCIENT. NAT. PHILADELPH. - R.
SOCIET. AGRAR. ET OECONOM. CALAR. - R. ACADEM. SCIENT. LITTER. ET
ART. LUGDUN. - I. ET R. ACADEM. OECONOM. AGRAR. FLORENT. - SOCIET.
MEDICO-BOTAN. LONDIN. - R. BOTANIC. SOCIET. RATISBON. - R. SOCIET.
BORBON. ACAD. SCIENT. NEAPOL. - ACADEM. SCIENT. BONON. SODALI
ETC. ETC.

VOL. I.

SISTENS THALAMIFLORAS

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

AUGUSTÆ TAURINORUM

EX TYPIS REGIIS

1833

+ QK352

C58

V. I

新民縣農業技術推廣站

MUSI C COMBINE

試驗報告

1958年春播玉米試驗報告

試驗地點：新民縣農業技術推廣站

試驗面積：0.05公頃

試驗內容

1958年春播玉米

試驗內容：玉米試驗

試驗內容：玉米試驗

試驗內容：玉米試驗

試驗內容：玉米試驗

試驗內容：玉米試驗

BOTANICES STUDIOSI!

LIBRARY
PLANT
BOTANICAL
COLLECTION

Garden
Botanic
Geneva

AUG 7 - 1923

En vobis, Botanices studiosi dilectissimi, elementa quibus uno tempore et universos naturalis methodi ordines, et fere omnes stirpes cismari- nas nostras regiones colentes dignoscere valeatis. Ite nunc, strenui studiosi; editiores montes, pro- fundas valles, amænas planities, paludosas pla- gas, densa nemora, incultas terras peragite, percurrite, scrutaminor: summas, quæ in Pede- montio multæ sunt, altitudines, mediasque et in- simas a Mediterranei superficie diligentissime di- metimini; loca præcisiora, quibus ejusdem stirpis varietates sœpe crescunt, atque Botanicos non raro in errorem ducunt, sedulo adnotate; humili

*substantiam, naturam atque compositionem ex-
pendite; omnia colligite. Sic menda nostra cor-
rigantur, mancis suppleatur, ac Floram tandem
Pedemontanam præsenti scientiæ conditioni om-
nino consonam laboribus studioque vestro Patria
nostra consequatur. Iter vobis aperui; sit vobis
firmitas corporis, mens sana, constans voluntas,
tenax propositum.*

Dabam Aug. Taurin. 15. novembr. 1833.

A. COLLA.

P R E F A T I O

Celeberrimi ALLIONII *Floram Pedemontanam* plurimis numeris esse absolvendam, nemo est inter Botanicos qui in dubium revocet.

Et 1.^o methodum ab ipso statutam non tantum obscuram esse et imperfectam, sed insuper a sexuali *Linnæana* inter artificiales suprema, æque ac a *naturali* valde recedere, palam est.

2.^o Si novas vel dubias stirpes a cl. Auctore determinatas excipias, ceteræ descriptione prorsus carent.

3.^o Postquam editum fuit egregium opus illud, permultæ stirpes in regionibus pedemontanis de-

pria herbaria votis meis aperuerunt (1), quibus omnibus ob tantam erga me munificentiam publicas hic gratias ago.

Stirpes pedemontanæ ita dispositæ quamquam plurimos naturales ordines a recentioribus Botanicis ac præsertim a cl: CANDOLLEO statutos comprehendebant, attamen universæ ejusdem methodi notiones studiosis neutiquam præberè poterant ob multas quæ necessario subsistunt lacunas inter ordines ipsos ex defectu stirpium ad certos ordines pertinentium.

Hocce vitium nemo vitare valet in quacumque Flora particulari; natura enim ita stirpes per orbem distribuit, ut nulla in regione aliquæ saltem uniuscujusque ordinis inveniantur; eidem defectui supplere igitur aliter datum non est, nisi omnium ordinum characteres essentiales exponantur, et aliquod exemplum ope exoticarum plantarum præbeatitur; tunc solum quamdam utilitatem tyronibus præsertim opus quodcumque particulare sensu meo afferre poterit.

(1) Typi plantarum ALLIONII jam penes BALBISIUM sistentes aliquot modo in H. R. Botanico, curante cl. Professore MORISIO, cum proprio ditissimoque ejusdem BALBISII herbario servantur; herbarium Birolianum ad R. Scientiarum Academiam ex dono Civitatis Novariæ pertinet; ALLIONII atque BELLARDII herbaria ab egregio Mattheo BONAFOUX de re agraria optime merito nunc possidentur.

Herbarium nostrum, præter stirpes pedemontanas, plures exoticas enumerat, inter quas non nullas novas vel rarissimas 25 circiter annorum spatio summa qua potui diligentia vel in horto ripulensi meo cultas, vel benignitate eximiorum Botanicorum colligere valui. Et, ut de aliis sileam, inter hujusmodi largitores primario loco sunt ell. TENORE, GUSSONE, BERTOLONI, SAVI, NACCARI, VISIONI pro plantis italicis et dalmaticis; FISCHER pro rossicis, caucasicis, armenis; MARTIUS pro brasiliensibus speciatim; SCHULTES pro germanicis præsertim; memoratus SAVI pro ægyptiacis, BERTERUS pro antillicis et chilensis; laudatus MORISIUS pro sardois (1), qui omnes plures etiam stirpes nondum determinatas cum innumeris satis cognitis nobis benevole communicarunt.

In hisce rerum adjunctis, quum nemo adhuc inter summos italicos Botanicos naturalem methodum ex professo amplexus fuerit in sagacissimis ceterum eorum operibus, si quasdam excipias generales notiones, vel particulares elencos (2), at-

(1) Stirpes sardoæ enumeratae in elencis cl. Auctoris proprie non comprehenduntur in *Flora Pedemontana* quæ cismarinæ tantum referre debet. Particularis *Flora Sardoa* mox lucem videbit cura memorati strenuissimi Professoris. Interea tamen species in elencis contentas hic non omisi.

(2) Consule inter alios cl. SAVI *Scielta di generi di piante ecc.* Pisa 1826; et cl. MORISIUM *Stirp. Sardoar. elenc. fasc. 2. Carali* 1827; et fasc. 3. Taurin. 1829.

que ne in posterum quorumdam insignium Scriptorum injustas forsan reprehensiones Botanici nostri strates mereantur (1), operæ pretium existimavi *plantis pedemontanis juxta methodum naturalem dispositis nonnullas exoticas addere, ut universi ejusdem methodi ordines innotescant.*

Hoc modo opus nostrum sequentes utilitates afferre posse videtur.

Et 1.^o Universa methodi naturalis elementa sat erunt comperta ex characterum uniuscujusque divisionis expositione, ut quisque ope comparationis cum methodis artificialibus de ejus pretio judicare facillime queat.

2.^o Stirpes omnes, vel fere omnes, si quæ omisæ fuerint, in regionibus PRINCIPIS nostri imperio modo subjectis sponte nascentes unusquisque dignoscere poterit, atque ex præfinita loci natalis indicatione easdem confestim invenire.

3.^o Rudimenta idonea opus præfefert quibus novam Floram Pedemontanam præsenti scientiæ statui accommodatam Botanici nostri tandem publici juris facere possint.

4.^o Denique permultas stirpes novas vel saltem valde dubias tum indigenas cum præsertim exo-

(1) » Les Botanistes italiens, tous occupés de l'histoire des plantes de leur propre pays, et qu'on peut regretter de ne pas compter parmi ceux qui étendent le champ de la Botanique générale etc. » *DC. Notices sur les progrès de la Botanique pendant l'année 1832. Bibliot. univ. Janv. 1833.*

ticas in amabilis scientiae incrementum lectores nostri quodammodo illustratas habebunt.

Ut haec omnia consequeremur, hanc rationem secuti sumus.

Distributionem methodicam, paucis mutatis resecatis vel adjectis, Candolleanæ conformavi, utpotequæ ob ejus pretium jure meritoque Botanicorum consensu ceteris excellat.

Characteres uniuscujusque divisionis compendioso modo exponam ad nimis fastidiosam prolixitudinem vitandam; quæ desunt quisque consulere potest in laudati Auctoris aliorumque Botanicorum scripturis a me apposito loco citatis.

Post characteres ordinum sistit brevis *observatio* præsertim circa habitum plantarum et numerum generum ad illos pertinentium juxta diversum recentiorum Auctorum judicium; ex hac enumera-tione tabellam generum in universa naturali me-thodo huc usque contentorum lectores haurire possunt.

Sequuntur *genera* quæ possideo in herbario meo ex unoquoque ordine, additis præcipuis *synonymis* cum *iconis* indicatione; eorum diagnoses paucis verbis complexus sum, omissis char-acteribus jam in ordine memoratis; et illas pari *observatione* insignivi qua etiam stirpium numerus innotescat.

Non omnes stirpes sub unoquoque genere enu-mcratas æquali ratione illustravi.

Species indigenas præcedit signum * ut primo intuitu oculis adpareant. Sequitur *nomen* cum indicatione trium auctorum; scilicet ejus qui plantam *primus* dato nomine insignivit; ejus cuius *phrasis* recentior est et facilius consulenda, speciatim SPRENGELII in systemate præ manibus omnium vertente; ejus demum qui meliorem *iconem* præbuit, indicata, quum adest, figura picta in magno opere *Iconum Taurinensium* in bibliotheca R. Universitatis servato quod quidem sub ALLIONIO incœptum, curantibus Professoribus posterioribus delecti pictores sunt prosecuti. Hinc *statio* indicatur, adjecto quo fieri potest *inventoris* nomine. Demum loco novæ phrasis sistunt brevissima *commentaria* præsertim circa differentias præcipuas inter stirpes affines etiam solo habitu inspecto, aliasque notas in citata phrasi omissas, ope quarum species promptius distinguantur. Hæc omnia generatim; nam si agatur de *stirpe nova* vel valde *dubia* vel *male* judicio meo definita, tunc diffusior sermo habetur, addita etiam ubi opus *descriptione* vel *icone*.

Ad *stirpes exoticas* quod spectat, si de plantis jam satis cognitis disseritur, solum *nomen* cum *auctore* et *patria* notabo, addita sæpe brevissima *observatione*; si vero de stirpibus *dubiis* vel *novis*, majorem *illustrationem* pro rerum adjunctis invenies.

Ad calcem cuiuscunque ordinis addidi *observatio-*

nem geographicam comparative inter plantas indigenas et exoticas, ex qua numerum stirpium hactenus cognitarum ad ordinem ipsum pertinentium proxime saltem habebis.

Index generum et ordinum in unoquoque volumine contentorum volumen ipsum absolvit.

Denique opus universum excipiunt index *generalis*, *addenda* et *corrigenda*, atque *icones lithographicæ*.

Omissis benevolos lectores ut suppleant et menda corrigant rogo obtestorque: benevola eorum monita in postremo volume (in 4.^o) collocabuntur.

ORDO I.

RANUNCULACEÆ

(Juss: gen. 231, I. S. Hill: 2 p. 484. t. 68. = DC. syst: I. 127. Prodr: I. 2.)

Char: essent:

» *Cal:* 3-6 sepalis vel multipartitus. *Pet:* definita
» aut indefinita (5-15), interdum o. *Stam:* libera
» saepius indefinita. *Ovar:* plurima 1-locularia. *Car-*
» *pella* sicca vel baccata. *Album:* corneum. *Embryo*
» rectus.

Obs: Ordo satis naturalis habitu, ac fructificatione;
plantæ fere omnes *polyandræ polygynæ*; charact: e
DC. optimi, sed stamina haud semper *indefinita*, nam
Myosuri, *Ceratocephali*, et *Xanthorizæ* genera pen-
tandra, *Isopyrum* dodecandrum etc. Herbæ vel suf-
frutices succo acri donatae; foliis variis.

RANUNCULACEÆ VERÆ (antheris extrorsis)

TRIB. I. *Clematideæ* (DC. syst: I. 131. = Prodr: I. 2.)

I. ATRAGENE Lin. gen. 615. = Schkuhr. hand. I. t. 150.

» *Calyx* corollinus 4-sepalus. *Pet:* 12. aut rarius
» plura linearia sepalis breviora. *Caryops:* plurimæ
» caudis barbatis. *Cotyled:* approximatæ.

Obs: Genus *Clematidi* conjunctum a DC. in sect:
IV. (Prodr: I. 9.), sed valde distinctum petalorum
præsentia, ac cotyledonibus approximatis. Frutices

sarmentosi scandentes, foliis fasciculatis trisectis, pedunculis 1-floris.

* 1. *A. Alpina* = L. sp: p: 964. = DC. prodr: I. 10. = Iacq: fl: austr: t. 241. Ic: Taurin: vol. 24. t. 36. (Alp: Eur: med: Abunde in alp: *Fenestrellæ*. ALL: n. 1082. Inveni in summis mont: *Cenisii*; in montib: *Moro*, *Semplonio*, et *Rosæ* legit BIROLI, in *Monteasinario RE*). Variat florib: cæruleis ad albos.

II. CLEMATIS Lin. gen: 616. = Lam: ill: t. 497.

» *Involucrum* o, aut calyciforme sub flore. *Cal:*
» *corollinus* 4-5 - sepalus. *Pet:* o. *Caryops:* plurimæ
» *caudis* sæpius barbato-plumosis. *Cotyled:* distantes.

Obs: Genus forsan dividendum ob maximum stirpium numerum (81. ex DC. exclusa *Atragene*; 79. ex SPR:), et tunc in tot genera, quot sectiones ex DC., quarum prima carpellorum caudas *longas barbato-plumosas* (*Flammula*); altera *breves ebarbatas* (*Viticella*); tertia (*Cheiropsis*) *barbatas* quidem, sed flores *involucro calyciformi* subtus instructos referunt. Herbæ aut frutices sæpius sarmentosi raro erecti, foliis ac inflorescentia variis.

Sect. I. *Flammula*

(DC. syst. I. 131. = Podr: I. 2.)

* 1. *C. erecta* = L. sp. 767. = Spr: syst: II. 667. = Iacq: fl: austr: t. 291. Ic: Taurin: vol. 4. t. 55. (Eur: med. Frequens in collib: agri *Nicæensis*. ALL: n. 1078. Inveni prope *Taurinum* secus flumen *Doræ*. In sylvis della *Mandria* secus *Sturam* legit RE). Pe-

renn: *Caulis eretiusculus striatus*. *C. corymbosa* POIR: sec: SPR: l. c.?

* 2. *C. Flammula* = L. sp: 766. = SPR: syst: II. 667. excl: syn: *C. maritima* = LOB: IC: 627. f. 1. IC: Taurin: vol. 4. t. 56. (*Eur: austr: Caucasi: Afric: hor: Ad sepes et dumeta in Pedem: et Sardinia ubique frequentissima* ALL: n. 1080. MORIS stirp: sard: I. p. 1.). Peren: *Caulis scandens, panicula magna. Variat foliolis ovatis s: oblongo-lanceolatis* (*C. vulgaris* B. DC. PR: I. 2.); *foliolis suborbiculatis* (*C. rotundifolia* a DC. l. c. *C. fragrans* TEN: fl: neap: prodr: 32. vol. I. t. 48. sec: DC. l. c. quam non vidi); *foliolis linearibus* (*C. maritima* γ DC. et SPR: II. cc.) quam speciem distinctam arbitror. Huc pertinere videntur *C. rubella* PERS: 2. p. 100; et *C. cæspitosa* SCOP: fl: carn: ed: 11. vol. I. p. 389. a SPR: omissa, auctoritate BAUH: L. et ALL:

* 3. *C. maritima* = L. sp: 767. = ALL: fl: pedem: n. 1081. = IC: Taur: vol. 4. t. 57. (in sylvis et locis incultis agri Nicæens: ALL: l. c. qui tamen postea censuit ad *C. Flammulam* pertinere (auctar: p. 20.); in maritimis prope *Monspelium* sec: DC. syst. I. 135. ubi etiam lecta a cl: PERRET qui eam nobis communicavit). Peren: *Caulis vix scandens, panicula laxa. Differt a priori foliolis saepius linearibus, caule fruticoso, panicula laxa, partibus omnibus longe minoribus.*

4. *C. orientalis* = L. sp: 765. (in *Oriente* TOURN: *Caucasi virgultis* BIEB:). Frutex scandens; culta in II. Taurin: , specim: ex MOLINERIO. = 5. *C. glauca* = W: sp: II. 1290. (*Sibir: austr:*) Frutex scandens;

specim: ex LABILL: in hb: BELLARDII quadrat cum diagnosis SPRENGELII: sed in illo pedunculi omnes solitarii 1 - flori non *bi - tri - fidi* uti in citata diagnosis , nec panicula *subcorymbosa* uti in obs: DC. ex RICHARD (syst: I. 136.).

* 6. *C. Vitalba* = L. sp: 766. = Spr: syst: II. 668. = Iacq: fl: austr: t. 308. Ic: Taurin: vol. 4. t. 58. vern: *Viorna* (Eur: med: et austr: *Asia minor*: in *Pedem*: et ubique in *Sardinia* ad sepes ALL: n. 1079. Moris stirp: sard: I. p. 1.). Frutex scandens varians foliolis integris vel dentatis.

7. *C. virginiana* = L. amæn: 4. 275. (*Amer: sept:*). Frutex scandens varians foliolis cordatis incisis , vel ovato-lanceolatis integris. Nostra pertinet ad posteriorem ac habitum refert *C. Vitalbæ*, sed foliola minora ac constanter ternata. = 8. *C. angustifolia* = Iacq: enum: 310. coll: 1. p. 137. (*Carniola, Sibir:, Dahuria*). Peren: caule eretiusculo : specimen communicatum a cl: FISCHERIO e *Dahuria* non omnino quadrat cum diagnosis DC. Prodr: I. 17.: pedunculi non 1 - sed 2 - 3 - flori ; foliola integra, saepius 2 - raro - 3 - fida. Cons: GMEL: sib: 4. p. 194. n. 32. = 9. *C. Viorna* = L. sp: 765. (*Amer: boreal:*). Suffrut: scandens: = 10. *C. integrifolia* = L. sp: 767. (*Eur: med: , Austr:, Caucas:, Sibir:*). Peren: Caule erecto : variat foliis glabris uti in meo specim: e BALBISIO, ac foliis ciliatis. = 11. *C. ochroleuca* = Ait H. Kew: ed: 2. vol. 3. p. 346. (*Amer: bor: sec: rivos*). Peren: Caule erecto v. v. in H. B. T.

Sect. II. *Viticella*

(DC. syst: I. 160. = Prodr: I. 8.)

12. *C. florida* = Thb: fl: jap: 240. (*Japonia*). Suffrut: vel peren: scandens; culta sæpius flore pleno occurrit ob mutationem staminum in petala, nec refert fructus. Cult: in H. Ripul:; specimen fl: sub-simplici possideo ex BONJEAN = 13. *C. Viticella* = L. sp: 762. (Ad sepes *Eur*: calidioris et *Asia minor*:). Frutex varians caule prostrato vel scandente, formia et magnitudine foliorum et florum; colitur in hort: præsertim var: fl: pl: (*C. pulchella* PERS: II. 99. ommissa a SPR:)

Sect. III. *Cheyropsis*

(DC. syst: I. 162. = Prodr: I. 9.)

14. *C. cirrosa* = L. sp: 766. (*Hispan*: , *Sicil*: , *Græcia*, *Asia minor*: , *Afric*: bor:). Frutex altissime scandens sempervirens, varians habitu minori. Cons: DC. syst: I. 163. in obs: = 15. *C. balearica* = Rich: journ: phys: 1779. fevr: p. 127. ic. * non Pers: (*Hispania*, *Corsica* sub *C. polymorpha* β Viv: In *Sardin*: sylvis, MORIS st: Sard: I. 1.). Frutex semper-virens scandens floribus elegantissimis.

TRIB. II. *Anemoneæ* (DC. syst. I. 168. = Podr: I. 10.)III. *THALICTRUM* LIN: gen: 697. = Lam: ill: t. 497.» *Cal*: corollinus 4 - 5 - sepalus. *Pet*: o. *Styl*: 4-15.

» breves. *Caryops*: nudæ triquetro-alatae, vel inflatae,
» vel striatae.

Obs: Genus constans speciebus 52 ex DC. et Spr: herbaceis perennibus, e fructuum structura optime divisum in tres sectiones; sc: fructibus triquetris angulis: alatis substipitatis (*Tripteria*); inflatis vesiculairibus stipitatis (*Physocarpa*); striatis sessilibus (*Euthalictra*): hæc modo floribus dioicis polygamisve (*heterogama*), saepius floribus hermaphroditis foliisque decompositis (*genuina*), raro foliis simplicibus (*indivisa*), vel radicibus crassis (*grumosa*) occurunt (DC. syst: I. 169.).

Sect. I. *Tripterium*

(DC. l. c. et Prodr: I. 11.)

* 1. *T. aquilegifolium* = L: sp: 770. = Spr: syst: II. 670. = Bot: mag: t. 1818. Ic: Taurin: vol. 13. t. 65. (Eur:, Sibir: Frequens in pratis subhumidis et sylvis Pedem: All: n. 1077.). Colitur in hortis; variat floribus pallidis ad atropurpureos. *T. atropurpureum* Iacq: h: vind: 3: t. 81. *T. formosum* bot. mag. t. 2025.

Sect. III. *Euthalictra* (DC. ll. cc.)

§. 1. *Heterogama*

2. *T. corynellum?* = DC. syst: I. 172. (Amer: bor:). Planta valde dubia, uti dubium *T. Cornuti* L., ad quod auctores illam referunt, quoque nomine illam habui: in specim: charact: occurunt descripti

a DC. l. c.; sed venæ foliorum subtus nudæ nec pilosæ; ceterum planta videtur dioica, nam stamina tantum extant et reapse clavata; ergo verum *T. corynellum*? = 3. *T. revolutum* = DC. syst: I. 173. (Amer: bor:, Mexico?). Species elegans ad quam STEUD: et DC. referunt *T. polygamum* MUHLLUB: diversum tamen ex diagnosi SPR: syst: II. 675. = 4. *T. purpurascens* = L. sp: 769. (Amer: bor.). Specim: ex hb. BIROLI masculum filamentis purpureis, antheris luteis Cons: DC. syst: I. 174. in obs.

§. 2. *Genuina*

5. *T. petaloideum* = L: sp: 770. (*Dahuriae* montibus). Planta pulchella, pumila, foliolis diametro vix 1-lin: in specim: perfecto misso a FISCHER.

*? 6. *T. alpinum* = L. sp: 767. = Spr: syst: II. 673. = Engl: bot: t. 262. (Alpib: tot: Eur:, Sibir:, Amer: bor: sec: SPR: *Sabaudia* monente BONJEAN; sed numquam inveni in alpib: nostris, nec enumeratur in Fl: pedem:). Planta humillima, cujus specimina a BONJEAN lecta, uti ipse asserit, in *Sabaudia*, optime quadrant cum descriptionibus auctorum.

* 7. *T. foetidum* = L. sp: 768. = Spr: syst: II. 673. = Lam: ill: t. 497. f. 3. bona. Ic: Taur: vol. 4. t. 61. 62. optimæ (in saxosis summ: *Alpium* ALL: n. 1073., in *Montblanc* legit BERTERO, in Alpib: *Sefitis CARESTIA*, ad cima *Mullera* BIROLI).

8. *T. acutilobum* = DC. syst: I. 177. (Sibir:). *T. foetido* simillimum exceptis foliorum lobis omnibus acutis monente DC. l. c. Specim: meum ex FISCHER differt etiam panieula simpliciori, pedicellis

distantibus, floribus *erectis* nec *nutantibus*, antheris demum *mucronatis*; hinc diagnosis emendanda ut sequitur. = *T. caule simplici basi nudo medio folioso apice sub-paniculato, foliolis parvis ovatis viscidulopubescentibus lobis 3-5. acutiusculis, floribus erectis, antheris mucronatis.* Nob. = 9. *T. sibiricum* = L. sp: 769. (*Sibir:*).

* 10. *T. minus* = L. sp: 769. = DC. Prodr: I. 13. = Iacq: fl: austr: V. t. 419. Ic: Taur: vol. 4. t. 63. (*Eur:* pascuis submontosis, *Sibir:* *Pedem:* in pratis sec: flumen *Duriam* satis frequens ALL: n. 1074. In valle *Ticini* BIROLI. In dumetis secus *Sturam* RE). Huc forsan pertinet planta, quam legit in sylvis *di Bardinetto* supra *Rocca Barbera* D. PROMIS cl: RE discipulus sub nomine *T. saxatilis* DC.? (RE app: I. p. 25.). Verum *T. saxatile* numquam repertum in *Pedem:* quod sciam.

11. *T. elatum* = Murr: syst: ed: 14. p. 513. (*Hungar:*). Differt a *T. ambiguo* SCHLEICH, cuius sola varietas existimatur a DC. syst: I. 179., foliis *utrinque viridibus* non *subtus glaucis*, foliolorum dentibus *obtusis*, nec *acutis*, panicula *diffusa* non *stricta*. = 12. *T. ambiguum* = Schleich plant: exsic: see: Spr: syst: II. 672. (*Helvet:*). Vix differt a priori characteribus supra notatis; cult: in H. B. T. = 13. *T. majus* = Murr: l. c. p. 513. (*Helvet:*, *Palatin:*, *Delphin:*, *Cebenn:*, *Anglia*). Stirps elegantissima caulis altitudine paniculæque magnitudine ceteras superans.

* 14. *T. nutans* = Desf: tabl: par: ed: I. p. 123. = DC. syst: I. 179. = Ico? (In Alpibus *sabaudis* sec: DC. l. c., ibique invenit etiam PERRET). Specim:

ex PERRET consonum cum alio ex BIROLI sub nomine *T. acuminati*. SPR: syst: II. 674.

15. *T. medium* = Murr: syst: 513. (Hungar:, Tauria, Sibir:). Species a SPR: (syst: II. 672.) confusa cum *T. diffuso* SCHRAD: , et *T. concinno* W.; prior nec memoratur a DC.; altera tamquam distincta admittitur (Prodr: I. 14.); de his ico non præstat, ut sciam; sed ex optimis speciminibus quæ possideo comparatis etiam cum iconē Iacquiniana *T. medii*, tres diversas stirpes constituere opinor quas ita definio.

» *T. medium* = MURR. l. c. Caule lævi, foliolis ova-
» to-oblongis glabris subtus pallidioribus basi cuneatis
» acute - 3 - 5 - fidis vel raro (summis) indivisis, pa-
» nicula subfoliosa laxa, floribus eretiusculis. NOB.
(v. v. et sicc: in specim: lecto a MOLINERIO in H.
B. T. foliola 4-5-lin: longa 3-4-lata).

16. *T. diffusum* = SCHRAD: sec: SPR: ? = « Caule
» striato, foliolis oblongis glabris subtus glaucis basi
» attenuatissimis omnibus acute-2-3-fidis, panicula
» nuda sub-crustata, floribus eretiusculis. » NOB: (v.
s. ex hb: BIROLI cum hac nota = ex Hort. monspe-
liensi = foliola 3-4-lin: longa 1-lata).

17. *T. concinnum* = W. en: 584. = « Caule stricto
» virgato, foliolis rotundatis glabris utrinque viridibus
» basi cuneatis apice trilobis lobo medio mucronulato
» vel 3-dentato, panicula subfoliosa patentissima, flo-
» ribus subcernuis. » NOB. (specim: ex hb: BIROLI
communicatum a W.) foliola parva sc: diam: lin: 1. 1/2,
valde approximata; habitus præcedentibus strictior;
flores dicuntur eretiusculi in diagnosi W.; in specim:

sunt potius *nutantes*, uti ex obs: DC. syst: I. 180. (patria?)

18. *T. glaucescens* = DC. syst. I. 180. (*Russia*). Planta tota subglaucia; v: s: ex hb: BIROLI; valde dubia. = 19. *T. angustifolium* = Bauh: pin: 227. non Vill: nec All: (*Germania* W., *Gallia* DC., *Olympos SIBTH*). Enumeratum primum ab ALL: n. 1075., sed postea in addend: n. 1074. amandatum ad *T. simplex* L. (*T. angustifolium* VILL:); descriptum sub nomine *T. Bauhini* CRANTZ a SPR: syst: II. 672., qui putat esse distinctum a *T. lucido* L. ceu censuerunt etiam W., DC. aliique celeberrimi auctores; at comparata icona IACQUINII cum descriptionibus eorumdem auctorum et speciminibus meis, non video differre nisi quandoque foliolo ultimo sessili vel petiolato, integro vel subinciso; habitus etiam simillimus.

* 20. *T. nigricans* = Murr: syst: 513. = DC. syst: I. 182. = Jacq: fl: austr: 5. t. 421. (Austr:, Ital: septent:, Gall: merid: In arenosis circa *Vercellas* fide BIROLII; circa *Taurinum* ad *Venariam* legit RE; in *Sabaudia* PERRET). Stirps media inter priorem et sequentem cum quibus affinis; at a *T. flavo*, cum quo confusum a SPR: syst: II. 672., valde differt habitu, ac praesertim caule stricto, foliolis *lineari-lanceolatis*, raro *divisis*, panicula *congesta*.

* 21. *T. simplex* = L. mant: 78. = Spr: syst: II. 673. = fl: dan: t. 244. Ie: Taur: vol. 25. t. 10. sub *T. angustifolio* (in pratis asperis et ad ripas flumin: Europ: sept: et med: In *Sabaudia* circa *Gege* frequens, nec non rarius in saxosis Alpium *Cottiarum*; in pratis

di Azelio et Moncrivello ALL: n. 1075.; alibique BALBISIUS, ex quo optima habeo specimina).

* 22. *T. flavum* = L. sp: 770. = Spr: syst: II. 672. = Engl: bot: t. 367. Ic: Taurin: vol. 4. t. 60. (in tota fere Eur: et Sibir: Secus fossas aquarum lente fluentium in Agro Pedemontano ALL: n. 1076. Re. Ad vias oryzetorum BIROLI). Foliola non semper 3-fida; saepius sub-integra vel integerrima, sed constanter plus minusve ovata, numquam linearia, uti in tribus stirpibus superioribus occurunt; variat etiam paniculis paucifloris (*T. pauperulum* DC. fl. fr.), vel vaginis foliorum auriculatis (*T. vaginatum* DESF.). Insuper possideo specimen ex hb. BIROLI missum a BERNH: sub nomine *T. nigrescentis*, quod vix differt a *T. flavo*; forsitan eadem planta ac *T. nigricans* a SPR: citatum tamquam synon: *flavi?* Tunc legendum *nigrescens* BERNH: non *nigricans* IACQ:

* 23. *T. glaucum* = Desf: cat: h. paris: ed: 2. p. 126. = Spr: syst: II. 673. = Moris: hist: I. s. 9. t. 20. f. 1. (*Hisp:*, *Lusit:*, *Pyren:*, *Helvét:* In Alpib: di *Frabosa* invenit RE ad fl: Pedem: app. I. p. 24.). Planta elegans, statione et cultura valde varians glaucedine et partium magnitudine: v. v. cultam et s. in plurib: specim: quorum alterum ex hb: BIROLI sub nomine *T. speciosi* folia inferiora refert superioribus triplo majora, foliola suborbiculata lobis rotundatis, magisque accedere videtur ad *T. flavum*; an hujus varietas speciosa? an plantæ a cl: RE lectæ illuc referendæ?

24. *T. rugosum* = Ait: H. Kew: ed: I. v. II. p. 262. (*Amer:* bor:). Diversum a *T. rugoso* PURSH:

(*T. carolinianum* Bosc: sec: DC. Prodr: I. 12.), et a
T. rugoso Poir: Dict: V. p. 317. n. 9. quod refe-
rendum ad *T. nigricans* ex ipso auctore supp. IV.
p. 411..

Species non satis notæ.

25. *T. divaricatum* = W. en: supp. I. p. 40. = (Pa-
tria?) Enumeratum a W. l. c. sine phrasi, admittitur
a DC. (Prödr: I. 16.) tamquam species dubia, et a
SPR: (syst: II. 672.) collocatur inter *T. gallioideum*,
et *rosmarinifolium*, quæ stirpes mihi ignotæ: at dia-
gnoses cl: auctorum nec convenient inter se, nec
quadrant cum specimine nostro ex hb: BIROLI ab H.
Berolinensi accepto, ex quo charact: sequentes desumo.
Caulis erectus, teres, substriatus, simplex: *folia* pe-
tiolata, basi vaginantia, ternatim decomposita, rami-
ficationibus distantibus; *foliola* oblonga, inferiora sub-
sessilia basi obliqua sub-integra, ultimum longe pe-
tiolatum cuneatum basi sub-cordatum apice 3-lobatum
lobis obtusiusculis medio longiore mucronulato, gla-
bra, superne intense viridia, inferne glaucescentia.
Panicula foliolosa, diffusa, pauciflora; *flores* cretius-
culi; *sepala* 4 ovato-oblonga staminibus 15. 20. cla-
vatis paullo breviora, luteola; *fructus* desunt. Phrasis
igitur hæc erit:

» *T. caule* erecto substriato simplici, foliis longe
» petiolatis basi vaginantibus, foliolis ternatis oblongis
» glabris subtus glaucescentibus inferioribus subses-
» silibus subintegris ultimo petiolato cuneato obtuse-
» tribolo, panicula foliolosa diffusa, floribus cretius-
» culis. Nob.

26. *T. obscurum* { H. B. T. (Patria?). Nullibi
 27. *T. rubens*

enumerata inveni: a *T. medio* n. 14. non videntur differre. == 28. *T. ruthenicum* == Schrad: sec: Steud: (Patria?). Specim: mancum ex hb: BIROLI; foliis valde affine videtur *T. glaucescenti* n. 17., sed in illo *utrinque viridia*, nec *sub-glaucia*.

IV. ANEMONE Lin: gen: n. 694. == Lam: ill: t. 496.

» *Involucrum* 3 - phyllum a flore distans, vel ei
 » proximum calyciforme. *Cal.* corollinus 5-15-sepalus.
 » *Pet:* o. *Caryops:* plurimæ plus minusve caudatæ,
 » vel nudæ.

Obs: Genus naturale, nunc divisum a *Pulsatillis*, et conjunctum cum *Hepaticis* a SPR: (syst: II. 566.); e contra ab his sejunctum, et *Pulsatillas* comprehensdens sec: DC. (syst: I. 189. Podr: I. 16.): at neque præsentia vel defectus caudæ in fructibus, neque proximitas vel distantia involuci a flore tanti esse arbitror, ut ex earum consideratione tot distincta genera constituantur: ceterum habitus in omnibus similimus. Stirpes 54. ex DC. cum *Hepaticis*; 48. cum *Pulsatillis* ex SPR:; herbaceæ perennes, foliis radicibus plus minusve pinnatisectis lobatisve, floribus variis facillime plenis. Divisio in tres solas sectiones valde naturalis et ea facilior a laudatis Auctoribus proposita.

Sect. I. *Pulsatilla*

(Caryopses caudata, involucrum a flore distans.)

* 1. *A. vernalis* = L. sp: 759. = Spr: syst: II. 664. sub *Pulsatilla* = Oed: fl: dan: t. 29. Ic: Taurin: vol. 10. t. 15. sub *A. sulphurea* (in montib: Eur: sept: et med: ad nivem deliquescentem; in summis *Alpium* scopolis ALL: fl: ped: n. 1921. sub *A. sulphurea*. In valle di *Strona* ad ferri fodinam supra *Luzogra* raram vidit BIROLI fl: acon: I. p. 184.) Plantula varians præsertim colore villorum involueri; sed hoc numquam glabrum ut in *A. sulphurea* L. eadem ac *alpina* sec: SPR: l. c. 663.

* 2. *A. Halleri* = All: fl: pedem: n. 1922. = Spr: syst: II. 664. sub *Pulsatilla* = All: l. c. t. 80. f. 2. (Alpib: Eur: austr: In pascuis vallis *Queiras* et supra *Fenestrella*s numquam ad nivem délique-
scen-
tem ALL: l. c. In pascuis subalpinis vulgarem ob-
servavit BIROLI fl: acon: I. p. 185. In monte *Musinè*
legit RE). Figura ALL: bona, exceptis sepalis, quæ
non *ovalia* uti in iconæ, sed constanter *lanceolata*
patentissima.

* 3. *A. Pulsatilla* = L. sp: 759. = Spr: syst:
II. 663. sub *Pulsatilla vulgari* = Clus: hist: I. p.
256. f. 6. (in pascuis sterilibus totius fere Europ:
et Sibir: In aridis collis *Superga* ALL: n. 1923. In
pascuis *Ticini* vulgarem dicit BIROLI fl: acon: I. p.
185. In locis siccis agri *Taurinensis* non raro ipse
inveni). Multimode variat statura, colore, et pleni-
tudine florum.

* 4. *A. pratensis* = L. sp: 760. = Spr: syst: II. 663. sub *Pulsatilla*. = Fl: dan: t. 611. (*Europ: pratis aridis. In pratis inter Caramaniolam et Cari-nianum* ALL: n. 1924.).

* 5. *A. alpina* = L. sp: 760. = Spr: syst: II. 663. sub *Pulsatilla* = Crantz: austr: 2. p. 105. t. 3. f. 2. Ic: Taurin: vol. 40. t. 90. f. 2. et vol. 15. t. 56. (*Alpib: Eur: med: frequentissima; in montibus Silvio, Rosa, Furlo, et Moro invenitur cum var: fl: lateo* ALL: n. 1925. BIROLI fl: acon: I. p. 185.). Varietates innumeræ naturales vel cultura ortæ: cons: DC. syst: I. 194. 195. ; a typo tamen ita aberrare videtur *A. millefoliata* BERTOL: (*A. alpina* β DC. Prodr: I. 17.), ut speciem distinctam merito constituere possit.

Sect. II. *Anemone*

(*Caryops: villosæ vel nudæ; involucrum a flore distans.*)

§ 1. *Stephanomala* Spr:

(*involuera foliacea multifida; pedunculi 1-flori;*
caryops: villosæ.)

† *Radice tuberosa.*

6. *A. palmata* = L. sp: 758. (*Eur: austr:, Afr: boreal: Sardinia ad montes Mara-calagonis* MORIS st: sard: I. p. 1.). Variat fl: pleno.

* 7. *A. stellata* = Lam: dict: I. 166. = DC. syst: I. 198. = Bot: mag: t. 123. sub *A. hortensi* (*German:, Gallia, Italia, Helvet:, Oriente. In agro*

Nicæensi ALL: n. 1926. sub *A. hortensi*. In *Sardin*: ad sepes et in arvis MORIS st: sard: I. p. 1.). Variat sepalis plus minusve latis, et florum colore.

* 8. *A. coronaria* = L. sp: 760. = DC. syst: I. 196. = Lam: ill: t. 496. f. 1. (Eur: austr: *Asia* min: Agro *Nicæensi* BELL: app: 26.; *Sardin*: in pascuis humidis MORIS st: sard: I. p. 1.). Ubique in hortis culta ornamenti gratia: variet: innumeræ florum colore et plenitudine.

* 9. *A. pavonina* = Lam: dict: I. p. 166. = DC: syst. I. 197. = Moris: oxon: 114. t. 25. f. 10. sub *A. latifolia chalcedonica* (*Aquitania*, *Gallo-provinc*; agro *Nicæensi* ex RISSO). Planta elegans raro fl: simplici; variat florib: amplioribus (*A. fulgens* GAY ined: sec: DC. Prodr: I. 18.): an *A. coronariæ* vel *stellatae* var: uti censuit L.? Differt ab utraque sepalis acutissimis.

10. *A. apennina* = L. sp: 762. (*Anglia*, *Italia*, *Græcia*, *Apenn*: etc.). In hac stirpe involucrum vix a foliis radicalibus distinguitur. Specim: ex h. Caen possideo, in quo foliolum ultimum involucri est triplo majus quam in aliis speciminibus.

†† *Radice sublignosa*.

11. *A. cærulea* = DC. syst: I. 203. (*Sibir*: *Altaica*). Cl: DC. l. c. et Prodr: I. 19. involucrum tantum ac fructificationem describit ex specim: in hb: DELESS: In Prodr: autem l. c. aliam addit stirpem sub nomine *A. uralensis* communicatam a FISCHER, quæ vix distinguitur sepalis 5-6 ovali-oblongis, non 4-5 ovalibus, et a SPR: prioris synonima consideratur

(syst: II. 661.). Iconem Deless: non vidi, sed ibi radices, et folia radicalia forsan desunt, nam a DC. indescripta. Duo specimina possideo humaniter missa a cl: FISCHERIO: in uno radices et folia radicalia de-siderantur, caulis autem est 2-florus. Alterum radicem refert perfectissimam, sed folia radicalia non ap- parent, nec cicatrix ulla aut aliud insertionis signum; in hoc caulis est 1-florus. An igitur stirps aphylla? vel involucrum potius pro veris foliis habendum? Ex sequenti descriptione lux aliqua erui potest circa spe- ciosam hanc stirpem.

Radix sublignosa superne truncō subcylindrico atro rugoso long: semipollic: diam: linear: instructa, in- ferne fibroso-ramosa fibrīs brevibus. Ab imo trunei exsurgit *scapus*, vel *caulis* (si foliola involucralia pro vero involucro habentur) erectus, linearis, glaber, striatus, inferne nudus superne involucratus, 3-4- poll: longus. *Involucrum* 3-phyllum. *Folia* brevissime petiolata, mollissima, palmata, 3-partita, ad marginem vix ciliata ceterum glaberrima, superne viridia, inferne pallidiora: *laciniæ* plus minusve lanceolatae, quandoque integrimæ, sæpius inæqualiter incisæ seg- mentis vel dentibus acutiusculis, fere 1-poll: longæ, 1-2-lin: latæ. Inter foliorum insertionem supra cau- lem eriguntur 1-2. *pedunculi* foliis paullulum brevio- res, lineares, erecti, teretes, villosiusculi, uniflori. *Flores* in speciminibus omnes 5-sepali; *sepala* ovalia, obtusa, 3-lin: longa, 1.1/2-2-lata, patentissima, supra glabra, subtus villis tenuissimis lente tantum cons- picuis adspersa, albido-slavescentia. *Stamina* sepalis

dimidio breviora, flava. *Ovaria villosissima.* *Caryops:*
maturas non vidi.

Differt ab *A. apennina* et *baldensi* quibus affinem
dixit DC., sc: a priori radice *sublignosa* nec *tuberosa*,
foliorum radicalium *absentia*, involuci foliolis *lan-*
ceolatis ac *brevissime petiolatis*, pedunculis *breviori-*
bus, sepalorum numero valde *minori*; ab *A. baldensi*
foliorum radicalium defectu, involuci *magnitudine*,
forma, et *distantia* a flore, demum *numero*, et *ma-*
gnitudine sepalorum.

* 12. *A. baldensis* = L. mant: 78.? = DC. syst:
I. 203. = All: n. 1928. c. descript: et t. 44. f. 3.
non 67. f. 2. Ic: Taurin: vol. 10. t. 90. f. 1.
(Alp: Eur: med: Non raram inveni in *Monte Cenisio*).
Cl: ALLIONIUS in auct: ad n. 1928. censuit nostram
A. baldensem non esse eam, quæ a L. memoratur,
sed veram *A. frugiferam* IACQ:, quæ tamen a recen-
tioribus botanicis tamquam synonyma admittitur; spe-
cimina nostra magis quadrant cum citata icono AL-
LIONII, quam cum t. 67. f. 2., quæ valde diversa
apparet.

* 13. *A. nemorosa* = L. sp: 762. = DC. syst:
I. 203. = Oed: fl: dan: t. 549. (Eur: et *Asiæ* ne-
moribus et sepibus umbrosis. In sylvis et pratis *pe-*
demontanis vulgatissima ALL: n. 1929., BIROLI, RE).
Multis variat modis a DC. enumeratis l. c. in obs.

14. *A. Fischeriana* = DC. Prodr: I. 20.
(Sibir: Altai:). An prioris var: sec: SPR: syst: II.
661.? At præter auctoritatem cl: CANDOLLEI l. c., in
specimin: mihi communicatis a FISCHERIO aliæ exsur-

gunt differentiæ, ex quibus diagnoses utriusque stirpis ita propono.

» *A. nemorosa* = foliis ternatis, foliolis 3-partitis lanceolatis laciniis inæqualiter inciso-dentatis acuminatis media productiore, involucralibus pedunculum subæquantibus longe petiolatis similibus, » sepalis 6. ellipticis acutis. » Nob:

» *A. Fischeriana* = foliis binternatis, foliolis 3-fidis ovatis laciniis inciso-dentatis subæqualibus acuminate, involucralibus ternatis pedunculo brevioribus brevissime petiolatis, sepalis 9-12. ovato-lanceolatis obtusis. » Nob:

* 15. *A. trifolia* = L. sp: 762. = DC. syst: I. 205. = Moris: oxon: 2. p. 424. s: 4. t. 25. f. 1. (*Europ: med: In Pedemonte primus invenit VIALE locis sylvaticis umbrosis inter Vernante et Limone teste BELLARDI; BALE: misc: bot: 25. In Pensylv: et Virgin: PURSH sub nomine A. lancifoliæ quæ non differt sec: SPR: syst: II. 661. Vid: tamen DC. Prodr: I. 20.*) Variat sepalis 5. ad 9.

* 16. *A. ranunculoides* = L. sp: 762. = Spr: syst: II. 662. = Fl: dan: t. 140. (*Europ: bor: et med: Sibir: In agro Taurinensi, sylvis Cherii etc. ALL: n. 1930. RE fl: torin: I. p. 285. Circa Segusium et speciatim in pratis delle Blaccie, et di Croale RE fl: segus: p. 46. Ad Verbanum et in valle Strona BIROLI fl: acon: I. p. 185.*).

+++ Radice fibroso-fasciculata.

* 17. *A. sylvestris* = L. sp: 761. = DC. syst: I. 207. = Bot: mag: t. 54. (*Eur: bor: et med: In*

montibus supra Coasse semel invenit ALL: n. 1927.
In Sabaudia sec: BONJEAN?). *A. alba* Iuss: (Ann:
mus: 3. p. 248. t. 20. f. 1.) quam possideo ex FIS-
CHER, et *A. ochotensis* FISCH: (h. gor: 47.) commu-
nicata a BIROLI ex h. vindeb: simillimæ, ac statura
minori tantum diversæ; ceterum etiam in nostra *syl-
vestri* sepala occurrunt 5-6. plus minusve ovata.

§. 2. *Diplocalyymata* SPR: *Anemonospermas* DC.

(Pedicelli 24. ex involucro universali; 1. aphyllus
uniflorus; ceteri involucrum bifolium gerentes:
caryopsides lanatæ vel glabræ.)

† *Caryops: lanatis.*

18. *A. virginiana* = L. sp: 761. (*Amer: bor:*).
= 19. *A. pensylvanica?* = L. mant: 247. (*Amer:
bor:*). Planta jam culta sub nomine *A. aconitifoliae*
(ead: ac *pensylvanica* sec: auctores) in H. B. T., e
quo MOLINERIUS legit specimen mihi communicatum
non quadrat omnino cum descriptione DC. l. c. et
SPR: syst: II. 662.; involucrum non sessile sed *petiolis
folia æquantibus* instructum; lobi foliorum vix *acu-
tiusculi* non *acuminati*; pedunculi ex involucro uni-
versali 2. non 3. Differt quoque a ceteris hujusce
divisionis stirpibus; an igitur species nova? asserere
non audeo: ludit inter *pensylvanicam* et *virginianam*, cui magis accedit foliis *petiolatis*; an ergo po-
tius pro speciosa ejus varietate habenda? Cons: HOOK
flor: bor: am: I. p. 7. t. IV. B. pro *A. virginiana*
et p. 8. t. III. B. pro *pensylvanica*. = 20. *A. dicho-*

toma = L. amæn: I. p. 155. (*Sibir: Canada*). Specim: ex FISCHER in *Dahuria* lectum valde differt a præcedenti; hinc majus dubium hoc ad veram *A. pensylvanicam* haud pertinere, quæ monente DC. *dichotomæ* valde similis. = 21. *A. helleborifolia* = DC. syst: I. 211. (*Chili*). Specimen mancum ex BERTERO lectum in *La guinta del Chili*.

§. 3. *Petasodes* SPR: *Omalocarpæ* DC.

(Pedunculi umbellati 1-flori; caryops: glaberrimæ)

* 22. *A. narcissiflora* = L. sp: 763. = DC. syst: I. 212. = Iacq: fl: austr: t. 159. Ic: Taurin: vol. 4. t. 54. (Alp: *Europ: Sibir: Amer: bor: In Alp: editorib: Pedemont: All: n. 1931. In montib: Iavenensisbus*, in pratis *M. Cenisii*, atque prope *Li Sonté* in montib: *di Bossolasco RE* fl: segus: p. 46. In uliginosis Alp: *di Anzasca*, et *Formazza BIROLI* fl: acon: I. p. 185. *A. dubia* BELL: app: 26. eadem ac *narcissiflora*). Variat miris modis sec: DC. l. c. in observ: Specimen tamen possideo ex FISCHER sub nomine *A. narcissifloræ altaicæ*, quod ita distinctum videtur, ut optimam speciem constituere valeat, quam ita definio.

» 23. *A. primulæflora* villosissima, foliis radicalibus palmato - 3 - partitis, laciniis 3 - sectis, lobulis inæqualiter inciso-dentatis mucronulato-acutis laciniis involucralibus linearis - lanceolatis subintegris, pedunculis 3-4. umbellatis brevissimis (flores patentissimi ampli flavi). » NOE:

Obs: Differt præsertim ab *A. narcissiflora* ac ejus varietatibus *statura* minori, villis *longissimis* quibus

tota planta est adspersa, lobulis *mucronulatis*, laciniis involucralibus *subintegris*, pedunculis vix involucellum *æquantibus*, ita ut inflorescentia *Primulam elatiorem* ludat; accedit ad var: ζ (*vilosissima*) villorum longitudine, et ad var: β (*fasciculata*) pedunculorum brevitate (DC. Prodr: I. 21.), sed in nostra nec flores *fasciculati* nec pedunculi *subsessiles*.

Sect. III. *Hepaticæ*

(*Caryops:* nudæ; involucrum 3-phyllum flor: proximum calyciforme.)

* 24. *A. Hepatica* = L. sp: 758. = Spr: syst: II. 660. = Oed: fl: dan: t. 612. Ic: Taurin: vol. 4. t. 34. et 44. (*Eur:* et *Amer:* bor: Frequentissima in sylvis *taurinensibus* et montanis ubique. ALL: n. 1920., BIROLI, RE etc.). Variat colore, et plenitudine florum; varr: fl: pleno coluntur in hortis ornamenti gratia.

Anemones dubiæ.

* 25. *A. latifolia* = Re reliq: Bellard: in act: Ac: Taur: vol. 33. t. 233. (*Agro Nicœensi* locis incultis). Pertinet ad sect: II. et forsitan *A. stellatæ* n. 7. vel *coronariæ* n. 8. var:

V. *ABONIS* Lin: gen: n. 698. = Lam: ill: t. 498. f. 1-2.

» *Cal:* 5-sepalus. *Pet:* 5-15. unguibus nudis. *Caryops:* plurimæ siccæ stylo recto vel uncinato acutæ. »

Obs: Genus naturale: species 14. ex DC., quarum plures *dubiæ*, 5. ex SPR: ; sectiones 2. ; prima stir-

pes annuas (*Adonia* DC.), altera perennes (*Consiligo* DC.) complectens. Herbae foliis multifidis, floribus terminalibus solitariis.

Sect. I. *Adonia* (DC. syst: I. 221. = Prodr: I. 23.).

Annuæ stylo recto, petalis 5-10.

*? 1. *A. œstivalis* = L. sp: 772. non MB. = DC. syst: I. 223. = Iacq: fl: austr: t. 354. sub *A. miniata*. (Eur: med: *Asia*, Afr: bor: ? *Vulgaris* inter segetes collum in *Pedem*: ALL: n. 1917. sub *A. miniata*. Speciatim a *Foresto* RE fl: segus: p. 46. *Sardin*: MORIS st: sard: I. p. 1.).

Obs: Planta ALLIONII valde dubia; cl: RE putat ad *A. autumnalem* esse referendam (Fl: torin: I. 288.), sed de hac nullam iconem præbuit IACQ:, et figura 354. ab ALLIONIO citata pertinet ad *A. œstivalem*; mihi videtur potius confusam fuisse cum *A. flammea* quæ caryopsides habet in *capitulum* dispositas, ac caulem ramosum. *A. œstivalis* eadem ac *miniata* caryopsides gerit in *spicam elongatam*, et caulem *subsimplicem*. Ceterum stirpes hæ ac aliæ ejusdem sectionis sic affines, ut cl: SPRENGELIUS duas tantum distinctas admittat sc: *A. œstivalem* et *autumnalem* (syst: II. 645.).

* 2. *A. flammea* = Murr: syst: 514. = DC. syst: I. 223. = Iacq: fl: austr: 355. (Austria. In collibus calidioribus *Montisferrati* et *Ligurice* ALL: n. 1918. In campis arenosis versus *Ticinum* BIROLI fl: acon: I. p. 188. In arvis supra *Le Tavernette* eundo versus *Chieri* sec: BALBIS).

* 3. *A. autumnalis* = L. sp: 771. = DC. syst: I. 221. = Engl: bot: t. 308. (*Gallia* austr: *Ital:* etc. Frequens in *Pedem:* inter segetes).

Sect. II. *Consiligo* (DC. syst: I. 224. = Prodr: I. 24.)

Perennes, stylo uncinato, petalis 8-15.

4. *A. vernalis* = L. sp: 771. (*Eur: Sibir: Asia med:*). Nullam differentiam invenio in specimin: meis inter *A. vernalem* L. et *apenninam* IACQ: *A. apennina* GMEL: pertinet ad sequentem. = 5. *A. pyrenaica* = DC. fl: fr: 5. p. 635. = (*Pyren: Hungar: Tauria*).

TRIB. III. RANUNCULEÆ (DC. syst: I. 228. = Prodr: I. 25.)

VII. MYOSURUS Dill: nov: gen: in fl: goess: p. 106. = Lam: ill: t. 221.

» *Cal:* 5-sepalus sepalis basi ultra insertionem pro-
» ductis. *Pet:* 5. ungue tubulos: *Stam:* 5-10. *Caryops:*
» plurimæ receptaculo longissimo spicatum dispositæ,
» stylo recto subacuminatæ. »

Obs: Genus pentandrum polygynum unicam spe-
ciem comprehendens, nam *M. Shortii* RAFIN: var: stir-
pis sequentis.

1. *M. minimus* = L. sp: 407. (*Eur: Amer: bor:*). Her-
bula annua foliis radicalibus linearibus, scapis 1-floris.

VIII. CERATOCEPHALUS Moench: meth: p. 218. = Iacq: fl:
austr: t. 48. sub *Ranunculo falcato*.

» *Cal:* 5-sepalus subpersistens. *Pet:* 5. unguiculata.
» *Stam:* 5-15. *Caryops:* plurimæ secus rachin longe

» spicatæ apice productæ in cornu semine tetragono
» multoties longius. »

Obs: Genus dodecandrum polygynum vix duas comprehendens species a *Ranunculo* divulsas præsertim calyce *sub-persistente*, et cornu fructus *longissimo*: characteres sectionis potius quam generis! Herbulæ annuæ habitu *Myosuri*.

* 1. *C. falcatus* = Pers: syn: I. 341. = Spr: syst: II. 469. = Iacq: fl: austr: tab: 48. sub *Ranunculo* (*Eur:* austr: In *Pedem:* invenit BALBIS misc: alt: 19.).

VIII. RANUNCULUS Lin: gen: n. 619. = Lam: ill: t. 498.

» *Cal:* 5-raro-3-sepalus deciduus. *Pet:* 5. raro 10.
» intus basi squama vel foveola instructa. *Stam:* po-
» lyandra. *Caryops:* plurimæ compressæ in mucronem
» vel cornu semine vix longius desinentes læves striatæ
» aut tuberculatæ. »

Obs: Genus valde naturale, nec dividendum in alia, etsi numerosissimas comprehendat stirpes (159. ex DC. 147. ex SPR:). Herbæ sæpius perennes rarius annuæ, radicibus fibrosis fasciculatis vel grumosis, foliis integris aut divisis, floribus luteis raro albis; sectiones et subdivisiones a DC. statutæ ex fructus ac radicis structura, foliorum forma, ac florum colore optimæ ad citius dignoscendam stirpem.

Sect. I. *Batrachium* DC. syst: I. 233. = Prodr: I. 26.

(Fructus transverse rugoso-striati;
petala alba foveata)

* 1. *R. aquatilis* = L. sp: 781. = Spr: syst: II.

646. = Engl: bot: t. 101. Icon: Taur: vol. 23. t. 67. (In aquis lente fluentibus, et stagnantibus totius fere Eur:, Asiae occid:, Afric: med:, Amer: boreal: Frequentissimus in aquosis Pedemont: ALL: n. 1468. RE, BIROLI. Sardin: MORIS st: sard: I. p. 1.). Peren: Cons: varr: in DC. Prodr: I. 26. 27.

* 2. *R. peucedanifolius* = All: fl: pedem: n. 1469. = Spr: syst: II. 646. = Oed: fl: dan: t. 376. sub *R. fluitante* sec: DC. (cum priori). Peren: A cl: CANDOLEO habetur pro sola varietate *R. aquatilis* (DC. Prodr: I. 27. var: ε); sed valde distinctus caule haud *radicante*; foliis *omnibus submersis*, diverso modo *longiusque dissectis*, petalis *longioribus*.

Sect. II. *Ranunculastrum* et *Thora*
DC. Prodr: I. 27-30.

(Fructus læves compressi subgloboso-spicati:
radix grumosa.)

† *Foliis inferioribus integris.*

3. *R. bullatus* = L. sp: 774. (Lusit:, Sicil:, Græc:, Afr: bor. In Sardin: ad vias et in pascuis collinis Cagliari MORIS st: sard: I. p. 2.). Peren: Variat fl: parvo foliisque parum bullatis (*parciflorus* α), et floribus magnis foliis magis bullatis (*grandiflorus* β): planta Sardoa pertinet ad priorem.

* 4. *R. Thora* = L. sp: 775. = Spr: syst: II. 646. = Iacq: fl: austr: 5. t. 442. Icon: Taur: vol. 19. t. 15. (In summis Alpib: ubique; abunde in pascuis alpinis *Valdensibus* ALL: n. 1447.; *della Rosa*

et *Tario* ubi varietatem pusillam legit **CARESTIA** sec:
BIROLI fl: acon: I. p. 189.). Peren:

* 5. *R. Ficaria* = L. sp: 774. = Spr: syst: II.
646. = Fl: dan: t. 479. (In *Eur:* humidis. Frequentissimus in pratis irriguis et ad sepes *Pedem:* ALL:
n. 1446., BIROLI, RE. In pratis humidis *Sardin:* MORIS
st: sard: I. p. 1. sub *Ficaria ranunculoidea*). Peren:
In hac stirpe calyx saepius 3-sepalus unde a cl: CAN-
DOLEO ad genus *Ficariæ* DILL: amandata ex MOENCH:
meth: 215. (*F. ranunculoides*); sed nota nimis laevis,
quum in ceteris, et habitu praesertim non differat:
insuper, fatente ipso DC., in *R. Ficaria* numerus par-
tium variabilis, sepala interdum 5, petala 8 - 12.
(DC. syst: I. 305. in obs: et Prodr: I. 44.).

6. *R. pedatus* = Kit: pl: rar: hung: 2. 112. (*Hun-
gar:*, *Tartar:* prope *Volgam*). Peren: = 7. *R. illyricus*
= L. sp: 776. (*Illyr:*, *Austr:*, *Hungar:*, *Tauria*, prope
Odessam etc.). Peren: Possideo specim: ex BALBISIO
in quo folia superiora non omnia 3-partita, sed plu-
rima integerrima; diagnosi igitur auctorum addendum
= foliis superioribus integerrimi 3-partitisve. = 8. *R.
creticus* = L. sp: 775. (Insul: *Archipel:* In *Barbar:*
var: β *macrophyllus* sec: DESF:). Peren: Fructus equi-
dem glabri, ut in descript: DC. syst: I. 264., sed
non laeves immo tuberculati; an ergo stirps ad sect. V.
(*Echinella*) amandanda? Folia caulina non sessilia,
melius brevi-petiolata. = 9. *R. asiaticus* = L. sp:
777. (*Oriente*, *Cypro*, *Afr:* bor:). Peren: Frequentis-
sime colitur ornamenti gratia ob innumeratas variet:
tum a natura cum praesertim e cultura ortas.

†† *Foliis omnibus divisis.*

10. *R. chaerophyllus* = L. sp: 780. (*Eur: austr: , Afr: bor: In pascuis collinis Sardin: frequens Moris st: sard: I. p. 2.*). Peren: *R. flabellatus* DESF: tamquam sola insignis varietas a recentioribus consideratur. Inter specimina Sardoa a MORISIO communicata unum adest pusillum etsi perfectissimum referens folia omnia ovalia apice tantum dentata glabra, caulem sub-villosum 1-florum; hinc varietatibus a DC. syst: I. 254. enumeratis hæc addi potest. = δ *R. pumilus* « foliis » omnibus ovalibus apice dentatis. » NOB: = 11. *R. millefoliatus* = VAHL symb: 2. 63. (*Sicil: , Græcia , Afr: bor:*). Peren. Nec optima FONTANESII figura, nec perfectissimum specim: ab ipso VAHL lectum in Regno Tunetano quod habui a BELLARBI, caulem referrunt *subaphyllum* uti in diagnosi DC. (syst: I. 257. Prodr: I. 27.), sed reapse *foliosum*; in specimine folia caulina minus incisa adparent quam radicalia. = 12. *R. gracilis* = DC. syst: I. 256. (*In Archipelagi insula Cois ex CLARK: sec: DC. l. c.*). Peren: Optima et pulchella stirps, quæ dicitur priori affinis, sed valde distincta radicibus vix *tuberosis*, lobis foliorum radicalium grosse dentatis nec *multifidis*, lacinii foliorum caulis *linearibus subintegris*, sepalis *reflexis*.

Sect. III. *Hecatonia* DC. Prodr. I. 30.(*Fructus laves subrotundi, radix fibrosa*)§. 1. *Foliis integris.*† *Floribus albis.*

* 13. *R. pyrenæus* = L. mant: 248. = Spr: syst: II. 648. = All: fl: pedem: t. 76. f. 1. sub *R. plantagineo*: (In *Alpib:* et *Pyrenæis.* Abunde provenit in *M. Cenisio* ALL: n. 1445. Re fl: segus: p. 27. *Vulgaris* ad pascua in summis *Alpib:* BIROLI fl: acon: I. p. 189.). Peren: *R. plantagineus* ALL: l. c. non differt a *R. pyrenæo* L. nisi scapo 2-3-floro foliisque latioribus; *R. bupleurifolius* LAPEYR: habet scapum 1-florum sec: DC. Prodr: I. 31.; ceterum in *Cenisio* saepius inveni hanc plantam modo 1-modo oo-floram, foliisque a linearibus ad late lanceolata, statura majori vel minori ratione altitudinis, et natura soli.

14. *R. angustifolius* = DC. syst: I. 243. (In montanis *Pyren:* orient:). Peren. A priori et sequenti vix diversus foliis *angustioribus*, nec basi *amplexicaulibus*. = 15. *R. amplexicaulis* = L. sp: 774. (In *Alpib:* *Eur:* austr:). Peren: Variat statura, pubes, florum magnitudine, sed folia caulina constanter *amplexicaulia*.

* 16. *R. parnassifolius* = L. sp: 774. = Spr: syst: II. 648. = Wulf: in Iacq: coll: I. t. 9. f. 3. (Summis *Alpib:* æternæ nivi contiguis BALBIS elen: stirp: rar: p. 7.). Peren: In specimin: nostris ex BEL-LARDI folia et caulis non suut *hirsuta*.

†† *Floribus flavis.*

* 17. *R. gramineus* = L. sp: ed: I. 549. ed: II: 773. = DC. syst: I. 245. = Moris: hist: 2. p. 444. s. 4. t. 30. f. 38. pro var: *linearis*. (Eur: austr: Primus in *Pedem*: invenit RE prope *Segusium* loco dicto *Le Blaccie* sec: BALBIS misc: bot: p. 26. Occurrit quoque in *M. Oliveto* prope *Meana* RE fl: *segus*: p. 46. 47. In pratis uliginosis lacus *Cusii* versus *Buscione* BIROL: fl: acon: I. p. 188. In *Sardin*: udis *Arcidano*. MORIS st: sard: I. p. 2.). Peren: Variat foliis linearibus (α *linearis*), ad quem pertinent specimina mea a BALBISIO et MORISIO communicata; foliis lanceolatis (β *phaenicifolius*); foliis demum linearis-lanceolatis fl: pleno (γ *hortensis*): an posterior var: ad *R. Linguam* referenda? Cons: DC. l. c.

* 18. *R. Lingua* = L. sp: 773. = Spr: syst: II. 648. = Weinm: phyt: t. 854. f. c. sec: DC. Icon: taur: vol. 10. t. 25. (In palustribus *Europ*:, *Sibir*:, Amer: bor: Ad fossas aquarum agri *Vercellensis*, *Taurinensis*, et *Eporediensis* ALL: n. 1442. BALBIS, RE. In paludosis oryzatorum et ad lacum *di Vinzalio* BIROLI fl: acon: I. p. 188.). Peren: Variat fl: simplici et pleno. Ef: n. 17. var: γ .

* 19. *R. Flammula* = L. sp: 772. = Spr: syst: II. 648. = Fl: dan: t. 575. (Ubique in *Emisphær*: bor: loc: udis. Ad oras lacuum *Canapiciensium* ALL: n. 1443. In pascuis humidis *della Mandria* et *Stupinixii* BALBIS. In pratis vallis *d'Arbogna* BIROLI var: β *serrata* fl: acon: I. p. 188. Frequentissimus in paludosis *Venarie*, *Druenti*, *Pianezza* sec: RE qui

putat verum *R. Flammulam* apud nos desiderari, et nostrum ad var: *serratam* esse referendum. Fl. torin: I. p. 289. In udis *Sardin:* MORIS st: sard: I. p. 2.). Peren: Circa varietates hujusce stirpis cons: DC. syst: I. 247. nec non ALL: I. c., qui refert varietatem a BELLARDIO repartam circa *Majon* caule erecto ac foliis omnibus *denticulatis*, quam frustra quæsivi in ejus hb:

* 20. *R. reptans* = L. sp: 773. = DC. syst: II. 248. = Fl: Lapp: 236. t. 3. f. 5. Ic: Taurin: vol. 17. t. 92. f. 1. (Secus ripas lacuum: *Europ:* bor: , *Sibir:*, *Pedemont:* ALL: n. 1444. In *Amer:* bor: var: β *filiformis*). Peren: Differt tantum a præcedenti caule *reptante*, foliis *filiformibus*, floribus *minoribus*; prior character constantior videtur; attamen a cl: SPR: pro eadem specie considerantur, quibus adjungitur *R. filiformis* Mx: tamquam varietas (Spr: syst: II. 648.).

21. *R. bonariensis* = Poir: dict: 6. p. 102. (*Buenos Ayres, Chili*). Valde dubito, an planta sub hoc nomine missa a cl: BERTERO et lecta in *Rancagna* pertineat ad stirpem POIRETII; nulla enim folia refert basi *cordata*, nec *crenata*, sed omnia prorsus *ovata* ac *integerrima*; ceterum quadrat cum descriptione, cui addendum pedunculos esse foliis multoties longiores: iconem DELESS: a DC. citatam (Prodr: I. 33.) non vidi.

§. 2. *Foliis dissectis.*

† *Floribus albis.*

* 22. *R. rutæfolius* = L. sp: 777. = Spr: syst: II. 649. = All: fl: pedem: t. 67. f. 1. (Summis *Alpib:* *Eur:* med: Montib: di *Fenestrelle* et utroque *Cenisio*

ad nivem deliquescentem ALL: n. 1451. RE fl: segus: p. 47. In summis jugis montis *Turlo* BIROLI fl: acon: I. p. 190.). Peren:

23. *R. isopyroides*? = DC. syst: I. 238. (*Sibir.*). Peren: Specimen meum perfectissimum missum a cl: FISCHER ex *Altai* sub nomine *R. isopyroidei* DC. non quadrat cum descriptione Candolleana: folium radicale late ovatum apice tantum profunde *dentatum* non *pinnatisectum* ceterum integerrimum: folia caulinæ 2-3. non *unicum* nec diversa a *summis* seu floralibus, omnia *sessilia* subcuneata basi angustata apice dilatata ibique irregulariter secta segmentis acutis vel obtusiusculis; sepala *virilia* nec *albida*; petala non *duplo* sed *vix* calyce longiora cuneata apice emarginata. An ergo varietas speciosa? an potius species distincta, vel specimen s. a DC. in hb: BANKSI ad aliam plantam referendum? Quidquid sit, *R. isopyroides* altaicus ex FISCHERIO ita definiendus.

» *R.* folio radicali unico longe petiolato ovato apice dentato, caulinis 2 - 3. sessilibus subcuneatis basi angustatis apice irregulariter sectis; sepalis ovato-oblongis glabris petala cuneata emarginata subæquantibus. » Nob:

* 24. *R. glacialis* = L. sp: 777. = Spr: syst: II. 649. = Fl: lapp: 233. t. 3. f. 1. et Icon: Taur: vol. 4. t. 76. (Alpib: *Eur.*, *Lapponia*; ubique in nostrorum Alpium frigidiorum cacuminibus ALL: n. 1452. RE fl: segus: p. 47. BIROLI: fl: acon: I. p. 190.). Plantula peren: varians modis indicatis a DC. syst: I. 238.

* 25. *R. Seguierii* = Vill: Dauph: 4. p. 737. = Spr: syst: II. 650. = All: fl: pedem: t. 67. f. 3. 4.

sub *R. Columnæ* n. 1453. (Alpib: *Galloprovinciæ*, *Delphinat*: etc.; in montibus *di Limone* loco dicto *Vermelina*, locis lapidosis apricis ex diffracto lapide calcareo invenit ALL: Supra *Carlin* legit DANA). Peren: varians foliis modo parcus (f. 3. supra cit.), modo profundius (f. 4.) sectis. Varietatem scapo 1-floro quam meminit DC. syst. I. 239. numquam reperi; pedunculus quidem 1-florus, sed scapus (melius *caulis*, folia enim gerit) semper in ramos vel pedunculos 1-floros divisus.

* 26. *R. alpestris* = L. sp: 778. = Spr: syst: II. 650. = Iacq: fl: austr: t. 110. (Alpib: Eur: med: Frequens in summis Alpib: nostris ALL: n. 1455. Circa lacum alpium *Iavenensium*, in alpib: *di Matthie*, in monte *Clot de Brun* prope *le Vallon*, ac in *M. Cenisio* RE fl: segus: p. 47. In subalpinis *di Allagra* collegit CARESTIA sec: BIROLI fl: acon: I. p. 190.). Planta pusilla varians præcipue foliorum radicalium lobis simpliciter *crenatis* (*R. mugellensis* TENOR:) vel 3-partitis.

* 27. *R. aconitifolius* = L. sp: 776. = Spr: syst: II. 450. = Moris: hist: 3. s. 22. t. 2. f. 5. pro var: α *humilis*. Fl: dan: t. 111. pro var: δ *platanifolius*; Icon: Taurin: vol. 4. t. 71. et vol. 26. t. 28. (Alpe-strib: Eur: med: In sylvis et pratis alpinis *Pedemont*: obvius ALL: n. 1450. RE fl: segus: p. 47. In monte *Musiné* RE fl: torin: I. p. 291. In *Sardinia* secus rivulos in editis montis *Genargentu* MORIS st: sard. I. p. 1.). Peren: Variat præsertim foliis radicalibus 3-5-7 plus minusve partitis, bracteis integris serratisve, caule humili, vel elatiōri. *R. platanifolius* L. mant: 79.

var: insignior folia gerit radicalia 5-7-loba, bracteas serratas, caulem 2-3-pedalem, ac cultura flores obtinentur magni saepius pleni; indigenam invenerunt BELLARDI, BIROLI, aliique.

* 28. *R. lacer* = Bellard: act: taurin: 5. p. 233. = Spr: syst: II. 650. = Bellard: I. c. t. 8. (*Alp: pennin:*; in pratis summarum alpium *Limonensium* locis humidiusculis invenit VIALE sec: BELLARDI.). Planta admodum rara, cuius specim: habeo ab hb: BELLARDI spontaneum et cultum; nec puto hybridam esse ex *R. aconitifolio* et *pyrenæo* juxta cl: CANDOLLEI opinionem (syst: I. 242), nam habitus omnino diversus, neque constat cultura mutasse, et, quod magis est, semina matura gerit, res difficillima in veris hybridibus.

†† *Floribus flavis.*

α foliis glabris.

*? 29. *R. nivalis* = L. sp: 778. non Scop: Iacq: et Vill: nec All: = Spr: syst: II. 651. = Fl: lapp: ed: I. t. 3. f. 2. (*Eur: arctica*; *alle Casere in valle Formazza* abundat sec: BIROLI?). Vid. infra obs. ad *R. montanum* n. 31.

30. *R. frigidus* = W. sp: II. 1312. non Schrank. (In frigidioribus *Eur:* et *Asiae*). Peren: Planta humillima varians floribus plus minusve flavis, ac foliis caulinis palmato-dissectis vel sub-integris. Habeo specim: altaicum ex FISCHER perfectissimum, digitale, folia caulina vix dentata, florem amplum, sepala villosiuscula non hirsutissima gerens. Ad hanc stirpem

pertinet præter *R. altaicus* LAXM: *R. sulphureus* PHIPPS: omissus a SPR: in synonymia; *R. frigidus* SCHRANK est var: *R. laceri* n. 27. sec: DC. Prodr: I. 31.

* 31. *R. montanus* = W. sp: II. 1321. = Spr: syst: II. 651. = Iacq: fl: austr: t. 325. 326. sub *R. nivali*. Icon: Taur: vol: 10. t. 68. f. 2. vol. 15. t. 59. f. 3. et vol. 18. t. 85. sub *R. nivali*. (In pratis asperis Alpium Eur: med:; in pascuis nostrarum *Alpium* ALL: n. 1454. sub *R. nivali*; in alpib: *d'Allagna* sec: BIROLI fl: acon: I. p. 190.). Peren: Stirps diutius confusa cum *R. nivali* L. (n. 29.) ab ipso ALLIONIO nostro, sed abunde diversa: Cons: W. l. c. nec non DC. syst: I. 276. An *R. nivalis* n. 29. spontaneus in locis a BIROLIO indicatis (fl: acon: I. 190.)? Valde dubito, nam in ejus hb: quod extat penes *R. Taurin*: Scient: Acad: unicum invenitur specimen cum hac indicatione = *in Lapponia* = Cons: etiam BALB: misc: bot: 26.

* 32. *R. auricomus* = L. sp: 775. = Spr: syst: II. 651. = Fl: dan: t. 665. All: fl: pedem: t. 82. f. 2. sub *R. polymorpho*? (Eur:, Amer: bor:, Pedem:, in valle *Ulciensi* ALL: n. 1448.; circa urbem *Casalensem* ALL: n. 1449.). Peren: Variat præcipue foliis radicalibus plus minusve dissectis, vel etiam indivisis ac simpliciter crenatis dentatis; ad hanc var: a SPR: omissam pertinere videtur *R. polymorphus* ALL: n. 1449. de quo dedit iconem supra citatam ex unico imperfecto exemplari, uti ipse fatetur. An *R. Casubicus* L.?

33. *R. abortivus* = L. sp: 776. (Amer: bor:). Peren: Ex descriptione DC. syst: I. 268. vix differre videtur

a priori. Specimen meum valde mancum; desunt figuræ; nil certi asserere possum.

* 34. *R. sceleratus* = L. sp: 776. = DC. syst. I. 268. = Oed: fl: dan: t. 371. (In palud: totius Eur:, Ægypt:, Asiæ, Amer: bor: Nil in Pedem: ad fossas frequentius ALL: n. 1461. BIROLI, RE etc.; in Sardin: palustribus MORIS st: sard: I. p. 2.) Ann: Cons: varr: in DC. l. c. *R. sardous* BELL: app: 30. est *scelerati* var: sec: BALB: cat: H. T.

β foliis pubescentibus.

* 35. *R. Villarsii* = DC. fl: fr: 4. p. 876. = Spr: syst: II. 652. = Crantz austr: 2. t. 4. f. 2. (*Alp: pennin:*, *Delphinat:*, *Caucas:* etc.; in alpibus *Augustæ Prætoriæ* reperit DANA sec: ALL: n. 1456. sub *R. breynino*; in Alpib: *di Murazzano* legit RE). Peren: Pertinent ad hanc stirpem *R. lapponicus* VILL: et *oreophilus* M. B.; sic de *R. breynino* GRANTZ censuit DC, l. c.; e contra distinctam speciem constituere putat SPR: syst: II. 654.; planta pedemontana caulem habet uni-vel-pauciflorum; ceterum quadrat cum diagnosi utriusq: stirpis.

36. *R. napellifolius?* = DC. syst: I. 282. (*Cappadoc:* et agro *Constantinop:*). Specim: unicum ex PERRET quadrat cum descriptione CANDOLLEI exceptis caule pedali et ultra, non 4-6-poll: lobulisque foliorum radicalium *cuneatis* nec *linearibus*, quibus notis magis accedit *R. anemonæfolio* ejusdem auctoris l. c..

* 37. *R. polyanthemos* = L. sp: 779. = Spr: syst: II. 654. = Lob: ic: 666. f. 1. (Eur: In sylvis cæduis *Taurini* non infrequens ALL: n. 1460.; in sylvis

collium *Taurinensium* reperit PIOTAZ sec: RE fl: torin: I. p. 293. sub *R. nemoroso*; ejusdem var: *paucifloram* legit ipse RE prope *Venariam*). Peren: Rite cl: SPR: l. c. *R. polyanthemum* L. et *nemorosum* var: α DC. ad unam stirpem pertinere cénsuit: planta a RE lecta non videtur differre a *R. Villarsii* n. 35.

38. *R. Gouani* = W. sp: II. 1322. (*Pyren: Delphin: Hungar:*). Peren: In specimin: meis ex BELLARDI folia caulina non reapse *palmata*, sed alia *lanceolata* 3-dentata, alia *tripartita laciniis integerrimis*, nec prorsus *sessilia* sed *brevi petiolata*; in ceteris quadrant.

* 39. *R. acris* = L. sp: 779. = Spr: syst: II. 654. = Engl: bot: t. 652. Icon: Taurin: vol. 4. t. 69. (*Eur: Asia, Amer: bor:* In pratis *Pedemontanis* ubique ALL: n. 1459. RE; BIROLI. *Sardinia* in pascuis *Arizzo* MORIS st: sard: I. p. 2.). Peren: multi-mode varians: var: fl: pleno colitur in hortis: var: β *sylvatica*, quam THUILL: fl: par: ed: 2. v. 1. p. 276. pro specie distincta habuit, differt reapse non tantum *villis* quibus tota planta est adspersa, sed etiam foliis radicalibus 3-non-5-partitis, laciniis minus incisis, floribus *subcorymbosis*; hanc numquam inveni in *Pedemonte*, sed optima specimina habeo ex PERRET.

40. *R. brutius* = Tenor: fl: neap: Prodr: suppl: I. p. 61. (In monte *Pollino* Regni Neapolitani). Peren: A *R. acri* et *polyanthemo*, quibus affinis, differt non tantum notis a cl: TENOREO indicatis, sed præsertim facie. = 41. *R. tuberosus* = Lapeyr: abr: pyr: 320. (*Pyrenæis*). Peren:

* 42. *R. lanuginosus* = L. sp: 779. = Spr: syst: II. 654. = Oed: fl: dan: t. 397. Icon: Taurin: vol.

17. t. 92. f. 2. et vol. 26. t. 82. (In sylvis montanis Eur: Locis lapidosis ad oras sylvarum frequens in Pedem: ALL: n. 1462. RE; BIROLI. In *Sardiniae* pratis MORIS st: sard: I. p. 2.). Peren: Huc pertinent *R. constantinopolitanus* d'URV: et *tuberous* SIEB: non LAPEYR:

43. *R. pensylvanicus* = L. suppl: 272. (*Amer: bor:*).
Peren:

* 44. *R. repens* = L. sp: 779. = SPR: syst: II.
125. = Oed: fl: dan: t. 795. Icon: Taurin: vol. 4.
t. 67. et 73. (*Eur: Asia, Amer: bor:* Frequentissimus penes nos in pratis subhumidis ALL: n. 1458.
RE; BIROL:). Peren: Variat præsertim caulibus *erectis*
(β *erectus*), foliis cauleque *glaberrimus* (γ *glabratus*),
flore *maculato* vel *immaculato*, *simplici* aut plus mi-
nusve *pleno*, quæ var: colitur in hortis et invenit
etiam spontanea.

45. *R. cymbalarifolius* = Balbis in litt: = Moris
stirp: sard: I. p. 2. (Juxta rivulos montis *Genar-*
gentu in *Sardinia* MORIS l. c.). Peren: Species optima
omissa a SPR: in c. p. et tentam: collocanda inter *R.*
palustrem L. cui affinis ex ipso cl: Auctore, et *R.*
bulbosum; differt autem a priori, præter notas a Mo-
RISIO indicatas, fructibus *uncinatis*, non *recte acumi-*
natis, cauleque vix *dichotomo* non *ramoso*: ab altero
radice *fibroso-fasciculata*, nec ad basim caulis *bulbo-*
sa, caule *1-non-multi-floro*, pedunculis *lævibus* nec
sulcatis, sepalis *adpressis* non *reflexis*; planta insuper
humilior vix *sub-hirsuta* non *villosa*. = 46. *R. rupe-*
stris = Guss: ind: sem: H. R. Bocc: an: 1826. (In *Si-*
cilie rupib: herbosis montanis). Plantula peren: valde

affinis *R. spicato* DESF: cum quo prius confusa, sed differt præsertim sepalis *patentibus* non *reflexis*, fructibusque *pubescenti-pilosis* nec *tuberculatis*.

* 47. *R. bulbosus* = L. sp: 778. = SPR: syst: II. 656. = Flor: dan: t. 551. Icon: Taur: vol. 4. t. 74. = Vern: *Pedoch, Bouton d'or.* (Eur:, Amer: bor: Ad semitas et secus prata in *Pedemont*: copiosus ALL: n. 1457; RE; BIROLI. In *Sardiniae* pratis di *Arizzo Moris* st: sard: I. p. 2.). Peren: varians magnitudine, hirsutie, numero ac profunditate divisionum foliorum, florum plenitudine.

Sect. IV. *Echinellæ*

Fructus tuberculati, muricati, vel aculeati.

† *Foliis dissectis.*

48. *R. trilobus* = Desf: fl: atl: I. 432. t. 113. (In humidis regionis mediterraneæ; in ins: *S. Pietro* et *Arcidano* MORIS st: sard: I. p. 2.). Ann: Accedit *R. parvifloro* L. confuso a SPR: cum *R. Philonotide*, sed ab illo videtur differre foliis *glabris* nec *villosis* aut *hirsutis*, superioribus *oblongis* profunde *sectis* nec *orbiculatis*, et simpliciter *dentatis lobatisve*. Specimen sardoum perfecte quadrat cum iconе DESF: l. c.

* 49. *R. parviflorus* = L. sp: 780. = DC. syst: I. 300. = Engl: bot: t. 120. Icon: Taur: vol. 24. t. 65. (Eur: occid: et austr: *Unelia* et agro *Nicœensi* in arvis subhumidis ALL: n. 1465. In Sard: udis MORIS st: sard: I. p. 2.). Ann: Plantæ lectæ in *Sardinia* perfecte quadrant cum descriptionibus auctorum;

nicæenses autem magis accedunt ad *R. Philonotidem*, ac folia gerunt minora ac minus villosa: an *R. sardous* CRANTZ a SPR: citatus tamquam *Philonotidis* var: eadem est planta ac *R. parviflorus* in Sardinia lectus? Valde dubito.

* 50. *R. Philonotis* = Retz obs: 6. p. 31. = SPR: syst: II. 657. = Moris: hist: 2. s. 4. t. 28. f. 17.? (*Eur:* med: et austr: In agris collinis circa *Taurinum*, et in comitatu *Nicæensi* ALL: auct: n. 1457.* sub *R. agrario*. In campis circa *Novariam* BIROLI fl: acon: I. p. 191. Prope *l'Ergastolo*, *la Molinetta*, et *Venariam* BALBIS miscel: In *Sardiniae* locis humentibus MORIS st: sard: I. p. 2.). Ann: Valde varians, unde confusio cum *hirsuto* AIT:, *sardoo* CRANTZ, *agrario* ALL:, *intermedio* POIR:, *pumilo* THUILL:, *parvulo* et *parvifloro* L., qui omnes *Philonotidis* var: habentur a SPR: l. c.

* 51. *R. muricatus* = L. sp: 780. = SPR: syst: II. 657. = Lam: ill: t. 498. f. 2. (*Eur:* austr:, *Afric:* bor:, *Amer:* bor:, et austr: *Chili*. In arvis subhumidis agri *Nicæensis* ALL: n. 1464. In pratis *di Cambio*, *Borgofranco*, et vallis *d'Antigorio* occurrit BIROLI fl: acon: I. p. 191. In *Sardiniae* fossis et pratis humidis MORIS st: sard. I. p. 2.). Ann: Varians quoque innumeris modis, numquam tamen structura fructuum qui constanter sunt *muricato-cornuti*; nec folia unquam vidi *basi truncata*, uti in phrasi SPR: l. c., sed plus minusve *cordata*: var: δ (*R. tucumanicus*) quam possideo ex BERTERO 2. in *Chili* lecta, carpella habet minus acuminata. Ceterum valde affinis præ-

cedentibus 48. 49. ita ut varietates unius cum typo alterutrius facillime confundantur.

* 52. *R. arvensis* = L. sp: 780. = Spr: syst: II. 657. = Oed: fl: dan: t. 219. Icon: Taurin: vol. 4. t. 75. (*Eur: med: et austr:* In agro *Pedemontano* frequens ALL: n. 1463., BIROLI, RE etc.; *Sardinia* inter segetes MORIS st: sard: I. p. 2.). Ann: *Vulgaris*, parum varians. Huc referendus *R. echinatus* GRANTZ; an idem dicendum de *R. tuberculato* KIT: fide SPR: l. c. ? in hoc tamen fructuum tubercula *obtusissima* sunt nec in *acumen* desinentia uti in *R. arvensi*: an character constans? examini subjiciendum.

†† *Foliis indivisis.*

* 53. *R. ophioglossifolius* = Vill: dauph: 4. 532. = Spr: syst: II. 656. = Vill: l. c. t. 49. (In udis pratis et fossis *Eur: austr:* In *Pedem:* BALBIS misc: alt: 53. sub *R. ophioglossoideo*; in palustribus *Sardin:* legit MORIS st: sard: I. p. 2.). Ann: Numquam inveni in *Pedemonte*; forsitan in agro *Nicæensi*, nam in aquosis inter *Cannes* et *Antibe* similibusque locis prope la *Rivière d'Argent* reperit BALBISIUS. Enumeratur quoque a cl: BRIGNOLI inter plantas rariores *Forojulii* sub nomine *R. fistulosi*.

54. *R. uliginosus* = W. en: 586. (*Teneriffa*). Ann: humiliis a BROUSSONET inventus in udis *Teneriffæ*, cultus sub nomine *R. cochlearifolii* HORN: in H. B. Taurin:, a quo proveniunt specimina nostra, affinis priori, sed valde differt statura *humiliori*, foliis inferioribus *subcordato-ovatis* nec *suborbiculatis*, omnibus plus minusve *dentatis*, nec *integerrimis*: fructus

sunt reapse *granulato-tuberculati* ut suspicaverat CANDOLLEUS qui immatuos tantum viderat (syst: I. 249. Prodr. I. 43.). = 55. *R. fontanus* = Gussone: ex Presl: del: Prag: p. 6. (In Siciliæ uliginosis montosis). Ann: præcedentibus accedit, sed differt præsertim fructibus lævibus sec: GUSSONI, qua nota ad sect. III. esset amandandus prope *R. Flammulam*: in specimin: missis a cl: Auctore desunt fructus, proinde ob affinitatem ex habitu hic collocandum existimavi.

* 56. *R. nodiflorus* = L. sp: 773. = Spr: syst: II. 656. = Kit: pl: rar: hung: 2. 192. t. 176. pro var: β *dentata* (Eur: austr:, in *Sabaudia* prope lacum du Bourget invenit sollertissimus HUGUENIN). Ann: Plantula 2-3-pollicaris, de qua nulla mentio penes ALLIONIUM aliosque insignes stirpium nostrarum detectores. Primus mihi attulit specimen D. PIOTTAZ lectum in locis uliginosis prope *Augustam Prætoriam*; in hoc folia radicalia sunt *ovata* apice *dentata*, cetera *oblongo-lanceolata integerrima*; nuper laudatus HUGUENIN aliud perfectissimum misit exemplar lectum ad lacum du Bourget in quo folia omnia sunt *oblongo-lanceolata integerrima*; cetera quadrant cum optima descriptione DC. syst: I. 251. Floræ igitur Pedemontanæ addenda hæc rarissima plantula cum varietate *dentata* eadem forsitan ac *R. sculus* Petiv: gaz: 39. t. 24. f. 9. a CANDOLLEO ibidem laudatus.

Ranunculi dubii.

* 57. *R. saxatilis* = Balb: misc: bot: p. 27. *R. monspeliacus* L. sec: Steud: et DC. syst: I. 260. (Eur: austr:; in aridis inter *Pellein* et *Brissogna* in Valle-

augustana; locis saxosis secus viam ad *Utellam*, *La Tourrette*, *Esterelle* etc. sec: BALE: l. c.). Peren: Stirps hæc prorsus omissa a SPR: affinis certe *R. monspeliacum* L. qui summopere variat; magis accedit var: β *cuneata*, folia enim gerit lobis *cuneiformibus*, nec *angustis elongatis* uti in var: α . Specim: quæ habeo ex BALBISIO et BIROLIO comparata cum ic: DC. (pl: gal: rar: t. 50.) perfecte quadrant: eorum folia non *rotundata* uti in var: γ ad quam CANDOLLEUS refert stirpem *Balbisianam*: ceterum valde dubito an distinctam speciem constituere possit.

58. *R. trifoliatus* = Zeyh? = Stirps distincta sec: STEUD: omissa a SPR: et DC. Specimina mea ex hb: BIROLI non differunt a *R. trilobo* n. 48. nisi partium magnitudine, quod forsan culturæ tribuendum, proveniunt enim ex H. B. Madr: = 59. *R. aggregatus* = H. Vindeb: ? Nullibi citatum invenio: specimina ex hb: BIROLI ita inscripta accedunt ad *R. apiifolium* PERS: non DESF: a DC. illustratum (syst: I. 242.), sed differunt caule vix pedali *villosum* ut tota planta nec *glabro*, foliis radicalibus reapse *ternatis* non *5-lobis*, foliolis 3-5-lobatis, mediis 3-sectis laciniis *cuneatis* plus minusve apice divisis, summis 3-partitis laciniis lanceolatis: flores parvi in corymbum pauciflorum subaggregati. Fructus non vidi.

TRIB. IV. *Helleboreæ*

(DC. syst: I. 130. et 306. = Prodr: I. 44.)

IX. CALTHA Lin: gen: 703. = Lam: ill: t. 500.

» *Cal:* corollinus 5-sepalus raro persistens saepius
 » deciduus. *Pet:* o. *Stam:* polyandra. *Capsulæ* (Fol-
 » liculi SPR:) 5-10. compressæ patentes 1-loculares
 » polyspermæ. »

Obs. Genus paucis constans speciebus (11 ex DC.
 13. ex SPR:), attamen in duas sectiones divisum sc:
sepalis deciduis (*Populago* DC.) et *sepalis persisten-
 tibus* (*Psychrophila* DC.). Herbæ perennes aquaticæ,
 foliis petiolatis cordatis vel sagittatis interdum basi
 appendiculatis, floribus terminalibus.

* 1. *C. palustris* = L. sp: 784. = Spr: syst: II.
 659. = Oed: fl: dan: t. 668. Ic: Taurin: vol. 4. t. 82.
 (Eur:, Asia occid:, Amer: bor:; ad fontium scaturi-
 gines et rivulos fluentium aquarum in Pedemont: ALL:
 n. 1525.; in aquosis ubi *Sangone* in *Padum* illabitur
 RE, BALBIS; ad *Ticini* focem et ad lacum *di Vinzalio*
 BIROLI fl: acon: I. p. 193.). Peren: Pertinet ad pri-
 main sectionem; facile variat fl: pleno.

X. TROLLIUS Lin: gen: 700. = Lam: ill: t. 499.

» *Cal:* corollinus 5-15-sepalus, deciduus. *Pet:* (ne-
 » ctaria SPR:) 5-20. parva basi tubulosa 1-labiata.
 » *Stam:* polyandra. *Capsulæ* (Folliculi SPR:) plurimæ
 » sessiles cylindraceæ polyspermæ. »

Obs. Genus ludens inter *Ranunculos* et *Helleboros*,
 modo solas quinque species comprehendens ex DC.

et Sp: in quibus non folia sed numerus sepolorum ac longitudo petalorum respectu staminum considerantur: herbæ perennes foliis multifidis floribus terminalibus.

● 1. *T. europæus* = L. sp: 782. = Spr: syst: I. 658. = Oed: fl: dan: t. 133. Ic: Taur: vol. 4. t. 79. (In pratis montanis subfrigidis Eur:, in nostris alpibus nil frequentius ALL: n. 1919. RE; BIROLI etc.). Peren: Variat statura prout in alpinis depresso vel exceltioribus crescit; flores conspicui.

2. *T. patulus* = Salisb: tr: lin: 8. p. 303. (*Sibir:*, *Cappadoc:*, *Asia min:*). Peren: Varians flore supra folium pedicellato (α *pedunculatus*), vel subsessili (β *subinvolucratus*). Pulcherrimum specim: possideo ex FISCHER in scheda notatum pro var: β lecto in *Dahuria*, in quo characteres utriusque varietatis concurrunt sc: caulis erectus pedalis, flos a folio superiori intervallo pollicari distans uti in α , sed petala 10-15. stamina superantia uti in β ; forsitan character varietatis ex caulis et pedunculi mensura desumptus nimis fallax et numerus ac mensura petalorum solummodo consideranda? = 3. *T. americanus* = Muhlen: in Donn: cat: h: cant: (*Amer: bor:*). Peren: varians sepalis 5. vel 10.; flores minores quam in aliis stirpibus, luteo-viridescentes.

XI. HELLEBORUS Lin: gen: n. 702. = Lam: ill: t. 499.
(*Helleborus* et *Eranthis* Salisb: = DC.)

- » *Involucr:* a flore distans vel rarius sub flore.
- » *Calyx* subcorollinus 5-8-sepalus saepius persistens.
- » *Pet:* (nectaria SPR:) 6-10. brevissima tubulosa 2-

» labiata. *Stam:* polyandra. *Capsulæ* (*Folliculi Sp.*)
 » 3-10. compressæ polyspermæ: semina duplice ra-
 » rius simplici serie disposita. »

Obs. Genus constans 10-12. speciebus inclusa *Eran-*
thide quæ nimis affinis ut distinctum genus consti-
 tuere valeat; hinc melius in duas sectiones dividendum sc: *Eranthides* (involucrum sub flore, calyx
 deciduus, semina 1-seriata), et *Helleboroides* (in-
 volucrum a flore distans vel nullum, calyx persistens,
 semina 2-seriata). Herbæ perennes subcoriaceæ, foliis
 digitatis vel pedatis palmatisve, caule sæpius ramoso
 multifloro rarius aphylo 1-floro.

Sect. I. *Eranthides.*

* 1. *H. hyemalis* = L. sp: 783. = Spr: syst: II.
 658. = Iacq: fl: austr: t. 202. (*Eur:* austr:, in collib:
Taurinensib: prope *Heremum*, et in vinetis *Monre-*
galensis provinciæ, et *Liguriæ* ALL: n. 1511.; montib:
del Margozzo BIROLI fl: acon: I. p. 192.).

Sect. II. *Helleboroides.*

* 2. *H. niger* = L. sp: 783. = Spr: syst: II. 658.
 = Iacq: fl: austr: t. 201. (*Eur:* med: et austr: In
 valle *Augustæ Prætoriæ* LOBEL:; in *Montisferrati* et
Nicææ collibus ALL: n. 1512.; in sylvis *di Varallo*
 et *Vogogna* BIROLI fl: acon: I. p. 193.). Variat fl:
 minori vel majori, foliisque diversimode divisus.

* 3. *H. viridis* = L. sp: 784. = Spr: syst: II.
 659: = Iacq: fl: austr: t. 106. Ic: Taur: vol. 4. t. 80.
 (*Eur:* med: Ad radices montium *Taurinens:* frequens
 ALL: n. 1513. In sylvis *del Margozzolo di Varallo*

BIROLI fl: acon: I. p. 193. In sylvis prope la *Mandria* invenit RE fl: torin: I. p. 294.). Variat foliis sanguineo-maculatis, et segmentis plus minusve incisis vel basi integerrimis.

* 4. *H. foetidus* = L. sp: 784. = Spr: syst: II. 659. = Engl: bot: t. 613. Ic: Taur: vol. 4. t. 81. (Eur: med: Abunde ad vias et lapidosa vallibus *Sturæ Cuneensis*, *Tanari*, *Augustæ Prætoriæ*, et aliis calidioribus *Pedemontii*, nec non in collibus *Taurinensib: All: n. 1514*. In tota *Exilliarum* valle RE fl: segus: p. 47. In sylvis di *Quarna* et *Pic di Mullera*, *Maggiora*, *Vegezzo* BIROLI fl: acon: I. p. 193.).

5. *H. lividus* = Ait: H. Kew: ed: I. v. 2. p. 272. (*Corsica; Sardinia* in umbrosis sylvarum *Ierza* MORIS st: sard: I. p. 1.). Admodum rarus varians segmentis foliorum serratis α , vel integerrimis β . Planta sardoa pertinet ad var: α . = 6. *H. Bocconi* = Ten: fl: nap: app: 4. p. 10. (*Calabria, Sicilia*). Satis ab *H. nigro* distinctus ex descriptione GUSSONII Prod: fl: sic: II. 62., nec inter *nigri* varr: memoratus a DC. syst: I. 319.; immo omissus, nam figura *Bocconi* ibi citata pertinet ad *nigrum sanguineo folio*, non ad *nigrum foliis dissectis* ejusdem auctoris, nec indicantur *Cupani* synonima. = 7. *H. styriacus*? Specim: habeo ex hb. BELLARDI hoc nomine insignitum cum indicatione ex PASCHAL, sed desunt flores: an *Veratrum nigrum styriacum* Tab: ic: 723. enumeratum a DC. syst: I. p. 316. tamquam synonymum *H. nigri*? iconem illam non nosco, nec video citatam a W. Forma foliorum non valde diversa, sed differunt segmentis *minoribus*, potius *mollibus* nec *coriaceis*, α equaliter *argute serra-*

tis serraturis minimis, nec apice tantum inæqualiter serratis.

XII. ISOPYRUM Lin. gen: n. 701. = Goertn: fr. I. t. 65.
f. 5. (*Hellebori* sp: Lam.).

» *Cal. corollinus* 5-sepalus deciduus. *Pet:* 5. tubu-
» losa 2-labiata labio exteriore 2-fido. *Stam:* dode-
» candra. *Capsulæ* (*Folliculi* SPR:) 2-20. 1-loculares
» compressæ polyspermæ. »

Obs. Genus vix ab *Helleboro* distinctum calyce
deciduo, staminibus *dodecandris*, capsulis *membrana-*
ceis, habitu *graciliōri*, 4. tantum speciebus nunc co-
gnitis constans; herbæ graciles perennes, foliis dis-
sectis, floribus parvulis,

* 1. *I. thalictroides* = L. sp: 783. = SPR: syst:
II. 469. = Iacq: fl: austr: t. 105. (*Eur:* austr: In
umbrosis *Sessitis* versus *Scopa* et *Allagna* vulgarem
dicit BIROLI fl: acon: I. p. 192. In *Sabaudia* legit
PERRET). Peren:

2. *I. grandiflorum?* = Fisch: in litt: DC. Prodr: I.
48. (in Alpib: *altaicis*). Peren: Planta admodum du-
bia; notatu dignum in scheda specim: humaniter missi
a cl: FISCHERIO ex *Altai* inscriptam esse tamquam syn-
non: *Aquilegiā anemonoideā* W., quam tamen
propria sede referunt DC. Prodr: I. 51. et SPR: syst:
II. 631. et FISCHERIO tribuunt, nullo adjecto synon:
nec loco ubi eam viderint; hæc mihi ignota: præsu-
mendum igitur ex memorata scheda unam eamdem-
que esse plantam *I. grandiflorum* et *Aquilegiā ane-*
monoideā ex eadem patria provenientes. = 3. *I. fu-*
marioides = L. sp: 783. (*Sibiria*). Ann:

XIII. GARIDELLA Lin: gen: n. 541. = Lam: ill: t. 379.

» *Cal:* subcorollinus parvus 5-sepalus deciduus.
 » *Pet:* 5. (nectaria SPR:) 2-labiata 2-fida. *Stam:* de-
 » candra vel polyandra; *styli* 3. brevissimi. *Capsulæ*
 » connatæ polyspermæ. »

Obs: Genus maxime affine sequenti duas tantum species annuas complectens.

* 1. *G. Nigellastrum* = L. sp: 753. = SPR: syst: II. 416. = Bot: mag: t. 1266. IC: Taurin: vol. 10. t. 67. (*Gallia austr:*, in agris *Nicæensib:* ALL: n. 1681.).

XIV. NIGELLA Lin: gen: n. 685. = Lam: ill: t. 488.

» *Cal:* corollinus magnus 5-sepalus deciduus. *Pet:*
 » parva 5-10. 2-labiata ungue foveolato nectarifero.
 » *Stam:* polyandra in unam vel plures series disposita:
 » *styli* 5-10. elongati. *Capsulæ* (Folliculi SPR:) ro-
 » stratæ plus minusve concretæ polyspermæ. *Sem:*
 » plana vel angularia. »

Obs: Genus vix a *Garidella* distinctum stylis *elongatis* fructibusque *rostratis*, constans 11. speciebus sec: DC., 9. sec: SPR: in duas sectiones naturales divisum, sc: *Nigellaria* staminibus multiplici serie dispositis, seminibus angulatis; *Nigellastrum* stamin: simplici serie, semin: planis. Sectio III. (*Erobatos* DC.) conjungenda cum prima. Herbæ annuæ, foliis capillaceo-multifidis, floribus solitariis quandoque involucratis, seminibus aromaticis.

Sect. I. *Nigellaria.*

* 1. *N. damascena* = L. sp: 753. = DC. syst: I. 331. = Bot: mag: t. 22. Ic: Taur: vol. 4. t: 27. vern: *Barbisa* (*Eur:* austr:; in agro *Nicæensi* familiaris ALL: n. 1509.; in *Sardinice* arvis et inter segetes MORIS st: sard: I. p. 1.). Variat sepalis albis vel cæruleis, simplici vel multiplici serie dispositis. Ubique colitur in hortis ornamenti gratia: pertinet ad *Erobatos* DC. floribus involucro capillaceo-multifido longissimo cinctis. Cl: BELLARDI reperit hanc stirpem in arvis collum *Taurinensium* uti nos cum BERTERO invenimus in locis cultis *della Saffarona*; sed spontaneam esse haud puto et potius enatam e seminibus accidentaliter causa repulsis ab hortis.

2. *N. coarctata* = Gmel: bad: 2. 502. in adn: (Patria?) Cl: SPR: habet hanc plantam pro sola var: *N. damascenæ* (syst: II. 631.): GMEL: l. c. observat tamen per plures annos ex seminibus cultam mutationi non succubuisse: differentiæ ex auctore et DC. l. c. sis-
tunt præsertim in statura *minori*, sepalis *erecto-con-*
niventibus nec *patentibus*: folia ipsi dicunt conformia,
sed in speciminib: meis valde differunt, uti etiam
involucrum. *N. damascena* folia omnia gerit ab in-
sertione ad apicem pinnatisecta segmentis multifidis
capillaribus longissimis, et *involucrum* foliis similli-
cum florem duplo superans, capsula's demum *longe*
rostratas: in *N. coarctata* folia sunt potius *alterna*
inferiora *longe petiolata*, superne tantum pinnatifida
segmentis sessilibus 3-5-fidis laciniis *lineari-lanceo-*

latis brevibus, superiora secta uti in *damascena*, sed segmentis multoties *brevioribus*; involucrum autem florem vix superat. Diagnoses igitur emendandæ ut sequitur.

» *N. damascena* foliis sparsis omnium segmentis
» involucroque capillaribus longissimis, sepalis pa-
» tentibus, antheris muticis, capsulis 5. ad apicem
» usque connexis longe rostratis (planta 1-2-pedalis). »

Nob:

» *N. coarctata* foliis alternis inferioribus superne
» pinnati-sectis petiolatis segmentis sessilibus 3-5-
» fidis laciniis linear-lanceolatis, superioribus invo-
» lucroque omnino pinnati-sectis segmentis linearibus
» brevibus, sepalis erecto-conniventibus, antheris mu-
» ticis, capsulis 5. ad apicem usque connexis brevi-
» rostratis (planta semipalmaris). » Nob:

3. *N. sativa* = L. sp: 753. (*Eur*: austr:; *Afr*: bor:; *Asia*). Variat summopere præsertim cultura; colitur in hortis ad usum seminum pro condimentis (*Gall*: *toute épice*).

* 4. *N. arvensis* = L. sp: 753. = DC. syst: I. 329. = Schkuhr: haudb: 2. t. 146. Ic: Taurin: vol. 27. t. 96. (*Eur*: med: et merid:; *Afr*: bor:; in agris sterilibus provinciæ *Alexandriæ*, *Dertonens*: *Taurinens*: *All*: n. 1510.; in arvis sabulosis *di Cerano* et *Lu-*
mellina *BIROLI* fl: acon: I. p. 184. In *Sardinia* inter segetes *MORIS* st: sard: I. p. 1.).

5. *N. fœniculacea* = DG. syst: I. 328. (Inter se-
getes *Tauriæ*). *N. segetalis* M. B. sec: SPR: syst: II.
631. = 6. *N. hispanica* = L. sp: 753. (*Hispan*:; *Afr*:
bor:). Specim: mea ex BALBISIO perfecte quadrant cum

figura DESF: Atl: I. t. 112., exceptis fructibus qui potius *ovati* quam *obconici* uti in iconē.

Sect. II. *Nigellastrum*.

7. *N. orientalis* = L. sp: 753. (*Syria*, *Caucas*:,
Iber: med:).

Nigellæ dubiæ.

8. *N. cinnamomea*? = Habeo hanc plantam ex hb:
BIROL: tamquam provenientem ab *H. Paris*: , quam
tamen in Catal: *Fontanesii* 1829. enumeratam non
video; sed a *N. sativa* n. 3. vix videtur differre caule
foliisque *glabris*; forsitan pertinet ad var: δ (*N. indica*)
ex ROXB: quam memorat CANDOLEUS syst: I. 331.

XV. *AQUILEGIA* Lin: gen: n. 275. = Lam: ill: t. 488.

» *Cal*: corollinus 5-sepalus deciduus. *Pet*: 5. su-
» perne hiantia 2-labiata basi in calcar corniculatum
» producta. *Stam*: polyandra in phalanges disposita
» interiora dilatata abortientia. *Capsul*: (Folliculi SPR:)
» 5. erectæ stylis acuminatæ polyspermæ. »

Obs: Genus valde naturale et ab affinibus distin-
ctissimum præsertim petalorum singulari forma, et
staminum interiorum abortu quæ diverso modo in
petala accessoria convertuntur. Species 13. ex DC.,
10. ex SPR: perennes, foliis 1-2-ternatis, floribus ter-
minalibus.

* 1. *A. vulgaris* = L. sp: 752. = DC. syst: I.
334. = Engl: bot: t. 297. Icon: Taur: vol. 4. t. 2.
26. et vol. 15 t. 15. (In umbrosis totius Eur: , in
Iaponia, in *Pedemont*: frequens præsertim in mon-

tanis ad sylvas ALL: n. 1507. In planitieb: *Stupinixii*,
BALEBIS, *Venariæ* RE. *Sardinia* in umbrosis montis
Spada Founi MORIS st: sard: I. p. 1.). In hortis culta
ornamenti gratia. Cons: DC. l. c. p. 335. circa var:

* 2. *A. viscosa* = Gouan: fl: Monspel: 267. =
DC. syst: I. 335. = Gouan: illustr: 33. t. 19. (In
apricis regionis *Mediterraneæ*; in umbrosis alpinis
Garexii DANA; alpib: *Tendæ* et *Vinadii* BELLARDI sec:
ALL: n. 1506.). A priore differt tantum caule *subnudo*,
superficie tota *pubescenti-viscosa*. *A. vulgaris* var: γ
et δ LAPEYR: abr: pyr: 306. SPR: syst: II. 630.

* 3. *A. alpina* = L. sp: 752. = DC. syst: I. 336.
= Deless: ic: sel: 1. t. 48. = All: fl: pedem: II. t. 66.
Ic: Taur: vol. 4. t. 1. et vol. 15. t. 15. (Alpib: Eur:
med: et *Sibir*:; in umbrosis et humidis montium *Ce-*
nisi, *Pralagnan*, *Lamie*, *Rosa*, *Fenestrelle* ALL: n.
1508., RE, BIROLI etc. In *Sabaudia* DC. syn: fl: gall:
p. 420.).

4. *A. pyrenaica* = DC. fl: fr: ed: 3. v. 5. p. 640.
(*Pyren*: et *Apennin*: mont:). Huc pertinet *A. alpina*
LAM: non L. = 5. *A. canadensis* = L. sp: 752. (*Amer*:
bor:). In hortis saepe occurrit ornamenti gratia. = 6.
A. viridiflora = Pall: act: petrop: 1779. p. 260. (*Sibir*:).
= 7. *A. atropurpurea* = W. en: 577. (*Sibir*:). Non
satis a priori distincta cuius var: putat esse SPR: syst:
I. 630. Inter differentias a cl: DG. notatas (syst: I.
338. n. 8. et 10.) unam tantum vidi in specimin:
a FISCHERIO communicatis sc: calcaria limbo *breviora*
quæ in *A. viridiflora* sunt *longiora*: ceterum FISCHE-
RIUS ipse in scheda inscripsit *A. viridiflora* var: β
atropurpurea W. = 8. *A. hybrida* = Sims bot: mag:

t. 1221. (*Sibir.*). Hæc etiam a SPR: syst: I. 630. habetur pro var: *A. viridifloræ*; sed præter differentias a DC. (syst: I. 339.) notatas observavi specimina mea ex FISCH: præbere folia omnia *radicalia* longe petiolata segmentis *rotundatis* vix superne obtuse-lobatis, scapum 1-florum, flores cernuos majores quam in præcedentibus.

XVI. DELPHINIUM Lin: gen: n. 681. = Lam: ill: t. 482.

» *Cal:* corollinus 5-sepalus deciduus sepalo superiore in calcar producto. *Pet:* 2-4. superiora basi calcarata inter calcar calycinum. *Stam:* polyandra. » *Capsule* (Folliculi SPR:) 1-5. saepius 3., distinctæ » 1-valves polyspermæ. »

Obs: Genus naturalissimum plurimis constans speciebus sc: 53. ex DC., 47. ex SPR: hinc in 4. sectiones divisum, *Consolida* (caps: 1. pet: in 1-coalita, species annuae); *Delphinellum* (caps: 3. pet: libera, calc: intern: 2-petalum, spec: annuae); *Delphinastrum* (caps: 3-5. pet: libera, inferiora saepius barbata 2-fida, cale: intern: 2-petalum, spec: perennes); *Staphysagria* (caps: 3-5. pet: libera, cale: breve, internum 2-petalum, spec: biennes). Herbæ soliis palmatim multifidis, floribus racemosis bracteatis.

Sect. I. *Consolida*.

* 1. *D. Ajacis* = L: sp: 748. = SPR: syst: II. 616. = Clus: hist: 2. p. 206. f. 1. Vern: *Spron Cavajer* (*Tauria*. In rupibus vallis *di Vedro* supra *Trasquera* sec: BIROL: fl: acon: I. p. 182.). Ex cultura in hortis variat multimode caulis altitudine, ac florum colore et plenitudine.

* 2. *D. Consolida* = L. sp: 748. = Spr: syst: II. 616. = Lam: ill: t. 482. f. 1. Ic: Taur: vol. 3. t. 112. (*Eur:*, *Amer:* bor: ; inter stipulas in agro *Pedemontano* frequentissimum ; in agris calidiorum collium *Taurinens: All:* n. 1502. In cerealibus sabulosis *Lumellinæ BIROLI* fl: acon: I. p. 182.). Variat uti prius.

Sect. II. *Delphinellum.*

* 3. *D. junceum* = DC. fl: fr: v. 5. p. 641. = Spr: syst: II. 617. = All: fl: pedem: n. 1503. t. 25. f. 3. sub *D. peregrino* Ic: Taurin: vol. 15. t. 92. (*Eur: austr:*, *Afr:* bor:, *Syria*; circa *Nicœam* invenit *All: In Sardinia* aridis maritimis *MORIS* st: sard: I. p. 1.). *D. peregrinum* L. non *LAM:* nec *DELIL.*

4. *D. virgatum?* = Poir: dict: suppl: II. 458. non Iacq: (*Syria*). Specim: missum a D. TAGLIABUE et lectum in H. *Breræ*, ubi colitur sub allato nomine perfecte quadrat cum descriptione POIR: l. c.; sed ibi planta dicitur *glaberrima*, nostra ramos habet valde *villosos* quod forsitan culturæ tribuendum.

Sect. III. *Delphinastrum.*

+ *Petalis inferioribus integris.*

5. *D. grandiflorum* = L. sp: 531. (*Sibir:*). Inter omnia pulcherrimum floribus magnis, varians caulis et racemorum altitudine; cultura interdum stamina nonnulla abortiva petaloidea evadunt et flores semi-pienos reddunt. = 6. *D. chinense?* = Fisch: *D. grandiflorum* var: β DC. syst: I. 351. (*Sibir:*). Ex specim: missis a cl: FISCHERIO stirps hæc mihi videtur distin-

cta a priori, cuius var. tantum consideratur a DC. I. c. et SPR: syst: II. 617.; nam, præter differentias ab auctoribus ibid: notatas, video folia differre segmentis subcuneatis *parum distantibus*, lobulis oblongis *brevioribus*; hinc, retenta diagnosi SPR: circa *D. grandiflorum*, ita comparative *D. chinense* censeo definiendum.

» *D. foliis palmatis multipartitis, laciniis subcuneatis approximatis, lobulis oblongis brevibus, rameo longissimo stricto cauleque rigido, pedicellis elongatis, petalis superioribus obtusis inferioribus integris, calcare sub-fisso.* » (Flores facile versicolores) Nob:

7. *D. cheilanthum* = Fisch: in litt: Spr: syst: II. 617. (*Dahuria*). In specim: meo desunt capsulæ; ceterum quadrat cum descriptione DC. syst: I. 353.

†† *Petalis inferioribus 2-fidis barbatis.*

8. *D. puniceum* = L. suppl: 267. (*Caucas: ad Volgam, Sibir:*). = 9. *D. amœnum* = DC. syst: I. 546. ex Stev: ined: (*Sibir:*). Longe differt a priori tum ex descriptione DC. et SPR: cum ex speciminibus meis cult: in H. Rip: = 10. *D. velutinum* = Bertol: Spr: c. p. 211. (In sylvis *Bononiensibus* BERTOL:). Optima stirps cuius perfectissima specim: habeo ex el: BERTOLONI: collocatur a SPR: inter *D. hybridum* et *pentagynum*; sed in diagnosi nonnulli characteres omissi, qui magis hanc plantam ab illis distinguunt; non solum caulis et folia sunt *villosa*, sed tota planta inclusis floribus; de *calcare* et *pedicellis* silet diagnosis; illud est *rectiusculum calyce duplo-longius*, hi *bre-*

ves florem vix æquantes; bracteæ autem subulatæ floræ omnes subæquant. = 11. *D. azureum* = Michx: fl: am: bor: I. 314. (*Amer: bor:*). Cult: in H. Rip: = 12. *D. exaltatum* = Ait: H. Kew: ed: I. v. 2. 244. (*Amer: bor:*). *D. tridactylum* Mischx: non differt nisi pedicellis bracteisque brevioribus. Utraque cult: in H. Ripul: = 13. *D. urceolatum* = Iacq: coll: I. 153. (*Amer: bor:*). Folia in specimin: meis non tantum subtus pubescentia, sed ad marginem et nervos patenter ciliata. Cult: in h. Ripul:

* 14. *D. intermedium* = Ait: h. Kew: ed: I. v. 2. 243.. = Spr: syst: II. 619. Ic: Taur: vol. 10. t. 63. et vol. 15. t. 55. sub *D. elato* L. (*Eur. med:* In Alpe Scæ, *Gros Caval*; in valle *Augustæ Pretoriæ*; ad thermas *Vinadienses*, secus viam *la Traversa* abunde ALL: n. 1504.; ad rupes montis *Mori* BIROL: fl: acon: I. p. 182.). Sub *D. elato* L. sp: 749. plures species coarctatæ fuerunt, hinc recentiores Botanici, sublato hoc nomine atque synonymia, proprias species retinuerunt (DC. syst: I. 352. nota 1.). SPR: tamen l. c. ad verum *D. elatum* L. refert *D. intermedium*, quod conjungit cum *D. alpino* Kit: et *revoluto* Desf:; quæ non possideo. Video tamen *D. intermedium* plurimas habere quoque varietates a DC. l. c. p. 358. 359. descriptas. *D. intermedium* cultum in h. Rip: perfecte quadrat cum icon: Taurin: supra citatis sub *D. elato*; sed alia specimina sub eodem nomine possideo, quæ differunt præsertim foliis basi non cordatis immo subtruncatis qua nota accedunt ad *D. palmatifidum*: exemplar quoque habeo nomine *D. americanus* ex hb: BIROLI ab H. Paris: quod nescio enumeratum nisi a

STEUD: tamquam var: *D. intermedii*: differt a ceteris *caule petiolisque glabris*, *foliis subtus tantum vix pubescentibus*, *lobis magis distantibus elongatis*; accedit valde var: ε (*laxum*) inspecto etiam *racemo laxo*: sed ex nomine videtur Americæ incola: an species distincta?

15. *D. palmatifidum* = DC. syst: I. 358. (*Sibir:*). Priori affine: in specim: *caulis pedicellique glabri*: ludit inter *hispidum* α et *glabellum* β . = 16. *D. cuneatum* = Stev: diss: ined: sec: DC. syst: I. 359. (Ad *Volgam*, *Podol:* austr.). Optime a SPR: *conunctum* cum *D. villoso* STEV: ex DC. l. c. p. 546., a quo in specim: meis hand differt nisi aliquando *caule et racemis* plus minusve *velutinis*, *interdum in plantis cultis glaberrimis*. Utraq: cult: in h. Rip: = 17. *D. dictyocarpon* = DC. syst: I. 360. (*Sibir:*). Bene etiam a SPR: *conunctum* cum *D. laxifloro* DC. l. c., a quo non videtur differre nisi *bracteolis pubescentibus*, quæ tamen in specim: nostro ex hb: BIROL: *glabræ omnino apparent*: an rite a priori *sejunctum*? valde dubito habitu præsertim inspecto. = 18. *D. speciosum* = M. B. fl: caucas: 2. p. 12. (*Caucas:*). Folia *peltata* non dicit M. B. uti SPR: in phrasi, nec talia sunt in specim: meis, sed basi *sub-cordata*: flores non tam ampli quam in *Aquilegia vulgari* ceu tradunt M. B. et DC. syst: I. 361. in descriptione; *bracteolæ binæ* sub flore non apparent. Ceterum perfecte quadrant. = 19. *D. flexuosum* = M. B. fl: caucas: 2. p. 12. *D. ciliatum* Spr: (*Caucas:*). Nomen *D. flexuosi* retinendum uti antiquius.

Sect. IV. *Staphysagria*.

20. *D. pictum* = W. en: 574. (*Eur: austr:*). Specim: ex H. B. Taur: ubi jam cultum a BALBISIO sub nomine *D. maritimi* CAV: idem ac *D. pictum* sec: DG. syst: I. 363.

* 21. *D. Staphysagria* = L. sp: 750. = Spr: syst: II. 617. (*Eur: austr:*, *Græcia*, *Tenerif:*; agro Nicæensi, et in sylva ad *Clavasii* conspectum ALL: n. 1505. In *Sardiniae* sylvis et pascuis montanis MORIS st: sard: I. p. 1.). Diutius confusum cum priori, a quo differt præsertim statura majori, caule petiolisque undique pilosis, pedunculis bracteas floresque valde superantibus, calcare demum brevissimo.

Delphinia dubia.

22. *D. sulcatum*? Missum sub hoc nomine a BURDINO, et cultum in h: Ripul: accedit ad *D. palmatifidum* n. 15. sed planta tota glabra. = 23. *D. spuriu*? = Fisch: Pertinet ad *D. speciosum* M. B. sec: STEUD: Specimina mea ex FISCH:, et plantæ cultæ magis affines *D. intermedio* n. 14. = 24. *D. discolor* = Fisch: Sic in schedis speciminum ex hb: BIROLI; nullibi inveni hoc nomen: folia fere ut in præcedentibus, sed lobi magis approximati; petioli et bracteolæ pilosiusculi calcaris longitudine; calcar valde incurvum calycem superans: racemi paniculati. = 25. *D. cyaneum* = Hortul:? Vix ab *intermedio* distinctum floribus saturate cyaneis. Cult: in h: Ripul: = 26. *D. crassifolium* = Schrad: sec: Steud: qui citat icon: Gmel: sib: 4. t. 79.; hæc refertur ad *D. palmatifidum*

var: α *hispidum* auctoritate DC. syst: I. 358. Planta nostra culta in h: Ripul: a *palmatifido* reapse non differt, sed magis accedit ad var: β *glabellum* pro qua DC. citat t. 75. non 79. laudati GMEL:, habet enim caulem prorsus *glabrum*, pedicellos *hispidulos*. = 27. *D. crassicaule* = Hortul: Gmel: H. C. sec: Steud: Valde affine videtur *D. specioso*; racemus in nostro specimine fere pedalis simplex; pedicelli flore duplo longiores; flores ampli; planta tota glabra. Cult: in h: Ripul: = 28. *D. anomalum* = SPR: sec: Steud: ? De hac specie silet SPR: in syst: neque illam memorat DC. Inter synonima *D. intermedii* var: β *hybrida* GOVAN: recenset STEUD: sed hanc varietatem non enumerat DC. sub *D. intermedio*: planta mea elegantissima ludit inter hoc et *D. cuneatum*: lobi foliorum sunt *cuneati*, sed folia basi *cordata*. Cult: in h. Rip:

XVII. ACONITUM Lin: gen: n. 682. = Lam: ill: t. 482.

» *Cal*: corollinus 5-sepalus saepius deciduus, sepalo superiore (*galea*) fornicato, lateralibus (*alæ*) orbiculatis, inferioribus oblongis. *Pet*: (nectaria SPR:) plura; 2. superiora (*cuculli*) longe unguiculata, sub galca incumbentia, apice calcarata, ore in labellum producta; inferiora squamiformia non raro in statmina conversa. *Stam*: polyandra. *Capsulæ* 3-5. erectæ polyspermæ. »

Obs: Genus naturalissimum pulcherrimumque, habitu et inflorescentia *Delphiniastris* simillimum, constans spec: 22. sec: DC. 39. sec: SPR: Herbæ perennes, foliis multifidis, floribus racemosis, pedicellis 1-floris 2. bracteatis. Diagnoses specierum et generis

divisiones difficillimæ ob maximam inter omnes affinitatem. Cons: inter alios REICHEMB: illustr: gener: *Aconiti* ac *Delphinii*. Divisio artificialis ex florum *persistentia* et *colore* ceteris facilior videtur; hanc sequimur.

Sect. I. *Floribus persistentibus flavidis.*

(*Anthora* DC. syst: I. 365. = Prodr: I. 56.)

* 1. *A. Anthora* = L. sp: 751. = Spr: syst: II. 619. = Iacq: fl: austr: t. 382. Ic: Taurin: vol. 23. t. 87. (Eur: med: *Sibir*: In alpib: *Sabaudiae*, et inter rupes locis apricis subalpinis *Pedemont*: frequentissimum ALL: n. 1501. In pratulis saxosis et alpinis ad meridiem supra *Les Ferrieres* RE fl: segus: p. 45. In vallibus di *Bugnano*, *Vedria*, et *Ameno* observavit BIROLI fl: acon: I. p. 183.). Octo distinctissimas var: enumerat DC. Prodr: I. 56. 57. quarum pars maxima pictæ a SER: in mus: helv: I. et nonnullæ ab aliis auctoribus pro distinctis speciebus consideratæ: nostra ad varietatem & videtur pertinere.

Sect. II. *Floribus deciduis subflavidis.*

(*Lycocionum* DC. ll. cc.)

† *Foliis palmatis.*

* 2. *A. Lycocionum* = L. sp: 750. = DC. Prodr: I. 57. = Iacq: fl: austr: t. 380. ? Ic: Taur: vol. 28. t. 29. (Eur: septent: et med: In sylvis montanis subalpinis, et collinis *Pedemont*: vulgare ALL: n. 1498.

RE fl: segus: p. 45. et fl: torin: I. p. 282. In montanis ad *Borgosesia* et *Varallo* frequens BIROLI fl: acon: I. p. 182.). Varr: plurimæ ex DC. et SER: II. cc. Præter var: γ *laxiflorum* ad quam DC. refert plantam ALLIONII, aliæ occurrunt penes nos sc: α *vulgare*; et ε *puberulum*; prius in umbrosis prope *la Mandria*, alterum in sylvis *taurinensis* RE fl: tor: I. c. Ex seminibus plures aliæ varr: obtinentur, sed flores constanter plus minusve lutei, vel albo-variegati, numquam cœrulei. Cult: in h: Ripul.

* 3. *A. Lamarckii* = Reich: ex Spr: syst: II. 620. = DC. syst: I. 368. sub *A. pyrenaico* Lam: non L.? = DC. Prodr: I. 57. sub *A. Lycocoton* var: β . (*Pyren:*, *Alpib: nor:* et *dinar*; in monte *Musiné* invenit RE app: I. p. 24. sub *A. pyrenaico* W. en:). Planta admodum dubia; admissa prius a DC. in syst: sub *A. pyrenaico* Lam: non L. demum in Prodr: ad var: *A. Lycocoton* amandata: *A. pyrenaicum* L. ad *A. squamosum* ejusdem auctoris refert DC. in syst:, hinc in Prodr: hoc vocat *A. barbatum* ex PATR: in PERS: enc: 2. p. 83. SPRENGELIUS autem *A. pyrenaicum* Lam: *A. Lamarckii* appellat ex REICHEME: et servat *A. pyrenaicum* L. cui tribuit synon: *A. squamosum* ejusdem auctoris. Quidquid sit, pro certo habeo, duas esse distinctas species quæ differunt præsertim foliis *palmatis* lobis *incumbentibus*, calcare *hamato* in *A. Lamarckii*; foliis *pedatis* lobis *divergentibus*, calcare *arcuato* in *A. pyrenaico*. Nostra sp̄cimina ab HUGUENIN missa, et planta a cl: RE detecta in *Musiné* pertinent ad priorem, quam sub allato nomine refero ne confundatur cum *A. pyrenaico* L.

4. *A. orientale* = Mill: ex Spr: syst: II. 620. *A. ochroleucum* DC. ex W. (*Caucaso, Persia*). Ab *A. lycoctono* vix diversum: nomen MILLERII antiquius, hinc præferendum eo magis quod ceteræ hujus sectionis species flores gerant plus minusve ochroleucos. = 5. *A. Thelyphonum* = Reichemb: sec: Spr: syst: II. 620. (*Eur: med:*). Stirps valde dubia; differentiæ inter hoc et *A. Lycoctonum* minimæ. Cult: in h: Rip:

†† *Foliis pedatis.*

6. *A. barbatum* = Patr: in Pers: enh: 2. p. 83. (*Sibir: orient:*). Descriptio DC. in syst: II. 367. præsertim foliorum non rite quadrat cum planta PATRINI; lobi enim *distantes dilatati* nec *subcohærentes lineares*, lobuli *oblongi arcuati* non *acuminati*, petioli *sub-glabri* nec *pilis longis instructi*; habitu magis accedit ad *A. ochroleucum* prope quod DC. ipse illud collocavit in Prodr: I. 58., quam ad *A. Anthoram*, quod inter et *A. Lycoctonum* medium dixerat in syst:; forsè alia planta? videtur, et magis probat synonimum *A. squamosi* L. in Prodr: citatum et in syst: prorsus distinctum; sed nec *A. squamosum* ad plantam PATR: pertinet. Vid: supra n. 3.

Sect. III. *Floribus deciduis cœrulecentibus.*

(*Cammarum* et *Napellus* DC. ll. cc.)

* 7. *A. Cammarum* = W. sp: II. 1238. ex L. sp: 751.? = Spr: syst: II. 621. = Iacq: fl: austr: 5. t. 424.? Ic: Taur: vol. 15. t. 78. (*Eur: med: Sibir: In sylvis*

umbrosis nostrarum *Alpium* frequentissimum ALL: n. 1500. In locis umbrosis ac frigidis *M. Cenisii* et *alla fabbrica del marmo* RE ll: segus: p. 45.; in montanis *Sabaudiae* legit PERRET). Dissentunt Botanici ad quam ex hujus sectionis stirpibus referendum sit *A. Cammarum* L. Cll: W. et SPR: ll. cc. plantam IACQUINII eamdem esse putant ac plantam Linnæanam. Cl: DC. in syst: I. 374., omissa nomine *A. Camma:i*, fere omnes hujus sectionis stirpes sub eodem nomine confusas fuisse tradit, et dubitat utrum sint unius speciei varietates; hanc *A. intermedium* appellat: refert tamen plantam L. et IACQ: ad *A. rostratum* BERNH: et *hebegynum* DC. quæ admittit. In Prodr: autem p. 59. plantam IACQUINII inter varr: *A. rostrati* enumera sub nomine *A. jacquiniani* SER: omissa synon: LIN: et ab *hebegyno* excludit syn: IACQ: Cl: SPR: demum et *Cammarum* et *rostratum* servat, omissis synon: DC., et aliis citatis, de quibus silet DC. Quid in tanta confusione statuendum? Speciminibus meis, nec non plantis cultis bene perpensis, arbitror *A. Cammarum* et *A. Napellum* duos esse distinctissimos typos, ex quibus ceteræ hujus et sequentis sectionis stirpes europeæ ortæ sunt, ideoque potius tamquam varietates vel hybrydes plus minusve speciosas esse considerandas: attamen in earum enumeratione sequor SPR: ne major oriatur confusio.

8. *A. nasutum* = Fischer sec: SPR: syst: II. 621. (Eur: med:, Caucas:, Sibir:). *A. nasuto* FISCH: et *A. gibboso* SER: idem synon: tribuunt DC. et SPR: scilicet *A. Cammarum* M. B. non L. Ergo eadem planta? Differt a n. 7., præter notas a SPR: foliorum lobis

magis distantibus, lobulisque paucioribus latioribus et obtusiusculis: cult: in h. Rip: et miss: a BURDINIO sub nomine *A. Berphardiani* WALLR: (*A. rostratum* var: & *Iudenbergense* sec: DC. Prodř: I. 59.). Cons: HOOK: fl: bor: am: I. p. 26. = 9. *A. variegatum* = L. sp: 751. (Alpib: Eur: med:). *A. glabrum* DC. syst: I. 379. omissum in Prodř: eamdem plantam esse tradit SPR: syst: II. 621. Cult: in h. Rip:

* 10. *A. paniculatum* = Lam: fl: fr: ed: I. suppl: 1224. = Spr: syst: II. 621. = Ser: mus: helv: I. t. 15. f. 20. 21. (Helvet:, Gallo-Prov: In Alpib: Pedemont: sec: DC. syst: I. 375. In *M. Cenisio* pro var: & *penninum* SER: l. c. p. 144.). Specimen meum ex PERRET lectum in *Sabaudia* perfecte quadrat cum descriptione DC. l. c. Huc pertinet *A. hebegynum* DC. sec: SPR: Vid: tamen supra n. 7. et infra n. 31.

11. *A. uncinatum* = L. sp: 750. (Amer: bor:, Japon:). Optima species habitu etiam distinctissima: folia constanter et exacte triloba, lobis grosse dentatis nec multifidis. = 12. *A. cernuum* = Wulff: sec: Spr: syst: II. 622. (Alpib: Salisburgiens:). Ab *A. paniculato* n. 10. mihi videtur differre tantum panicula simpliciori subnutante, foliorumque lobis strictioribus. Diagnoses W. sp: pl: 2. 1237. ceteris praefenda. Utrum *A. cernuum* WULFF: a SPR: relatum idem sit ac *A. cernuum* KOCL: valde dubito tum ex phrasi SPR: parum consona diagnosi W., cum ex comparatione synon: DC. cum synon: SPR: Sed tunc quid apud SPR: de *A. cernuo* KOCL: a W. probato? = 13. *A. Toxicum* = Reichenb: sec: Spr: syst: II. 622.

(*Transylv.*). Quid in DC.? *A. paniculato* simillimum.
Cult: in h. Rip:

* 14. *A. Napellus* = L. sp: 751. = Spr: syst: II.
622. = Ser: mus: helv: I. t. 15. f. 41. 42. 50.
Ic: Taur: vol. 13. t. 89. (*Eur:*, *Sibir:* *Pedemont:* ad
oras sylvar: locis umbrosis et alpinis frigidis ALL: n.
1499. In valle *Pitta della Sesia* BIROLI fl: acon: I. p.
183.). Quæ dixi circa species vel varietates *A. Cam-*
mari recte *A. Napello* accommodantur. Cons: DC.
syst: I. 371. ubi, mutato nomine Linnæano in *A. vulgare*, ditissimam tradit synonymiam; nec non
Prodr: I. 62. ubi reproducto *A. Napello* 29. varr:
ei tribuit! Nostrum ad var: γγ (*pubescens*) esse re-
ferendum censuit BIROLI in miss: ; attamen plantæ a
me lectæ fere omnes glabræ.

15. *A. Storkeanum* = Reichemb: sec: Spr: syst: II.
622. (*Germ:*, *Austri:*). Ab *A. Napello* L. diversum
etiam foliorum lobis *brevioribus* et potius *ovato-ob-*
longis, quam *linearibus*. Flores magni ex cœruleo et
albo versicolores in specim: meis ex HUGUENIN. Planta
elegans.

Aconiti species vel varr: magis dubiae.

+ *Lycoctona*.

16. *A. montanum* = Hortul: Nullibi enumeratum
invenio; flores mediocres lutei; panicula laxa brevis;
planta glaberrima. Specim: ex HUGUENIN.

* 17. *A. rectum* = Balb: *A. Theriophorum* Reichenb:
A. Lycoctonum var: γ *grandiflorum* sec: DC.
Prodr: I. 57.? (In *Alpib:*). STEUD: *A. recto* BALB: tri-

buit synonymum *A. Theriophorum* REICHENB: utraque omissa a SPR: Planta REICH: ad *A. Lycoctonum* var: *grandiflorum* refertur a DC. l. c. Sed de recto non loquitur in Prodr: ; illud tamen enumeraverat in Syst: I. 369. sub var: β *glabriflora*. An planta BALBISII eadem sit valde dubito; folia enim refert undique *gla-
berrima* nec *villosa*. Ceterum differt ab *A. Lycoctono* n. 2. statura humiliori, floribus paullo majoribus, et præsertim foliis ad petiolum usque partitis, laciniis lobulisque *profoundioribus ovato-oblongis* acutis.

18. *A. album* = Ait: ? Planta AITONII a DC. Prodr: I. 58. refertur ad *A. ochroleucum*; SPRENG: autem illam habet pro var: *A. rostrati* DC. quod pertinet ad *Cammara* et toto cœlo differt. Specimen ex hb: BIROLI sub nomine *A. albi* certe ad *Lycoctona* referendum, sed differt etiam ab *ochroleuco* statura humiliori, floribus parvis, foliis 3-partitis, laciniis *pro-
fundioribus*, lobulis 3-5-tantum ovatis subæqualibus obtusiusculis. = 19. *A. leucanthum* = Reich: ? Mis-
sum sub hoc nomine a BURDINIO: huic stirpi cl: STEU-
DELIUS tribuit synonymum *A. album* W.; hoc idem est ac *A. album* AIT: n. 18. At nostra planta longe diversa. *A. leucanthum* non enumerant nec DC. nec SPR: ; *album* autem sec: DC., uti vidimus, idem ac *ochroleucum*, cum quo reapse quadrant specimina mea ex h. Ripul: inspecta diagnosi et descriptione W. sp: II. 1235. Ergo *leucanthum* REICH: et *ochro-
leucum* W. eadem species; *album* AIT: diversa. = 20. *A. umbrosum* = Hortul: ? Cultum in h. Ripul: et nullibi citatum nisi in catal: hortulan: non vide-
tur differre ab *A. Lycoctono* n. 2., cuius certe va-

rietas parum spectabilis. = 21. *A. Zooctonum* = Reichemb: nomen omissum a DC. et SPR:; idem ac *Lycoctonum* sec: Steud:; videtur accedere ad *A. pyrenaicum* LAM: Vid: supra n. 3. Cult: in h. Ripul:

†† *Cammara et Napelli.*

22. *A. elatum* = Salisb: Prodr: 375. Omissum a SPR:, relatum a DC. syst: I. 372. pro var: *A. vulgaris* seu *A. Napelli*. Credo pertinere ad *A. tauricum* WULFF: non W. *A. Napelli* var: α ex DC. Prodr: I. 62., sed plantæ humiliores. Cult: in h. Ripul: = 23. *A. autumnale* = Reichemb: acon: I. t. 17. f. 2. Omissum a SPR:, admissum a DC. pro sola var: *Napelli* (ω *grossum* Prodr: I. 63.). *A. tauricum* W. non WULFF: Planta nana subcæspitosa; flores amplissimi cæruleo-purpurei. Cult: in h. Ripul: = 24. *A. canescens* = H. Burdin: *A. Napelli* var: speciosa quam enumeratam non invenio penes Botanicos: nomen improprium; planta enim tota glaberrima; folia ad petiolum usque 3-partita; laciniæ profunde 3-fidæ subcuneatæ; lobuli inæquales lanceolati; panicula pauciflora; flores ampli cæruleo-purpurei; caps: 3. Cult: in h. Ripul: = 25. *A. exaltatum* = Bernh: Omissum a SPR:, admissum a DC. Prodr: I. 61., pictum a SER: mus: helv. I. t. 15. f. 37. 38. Specim: meum ex HUGUENIN perfecte quadrat cum phras: DC. Caps: 3. glabrae. Pertinet ad *Cammara*. = 26. *A. Koehleri* = Reich: sec: Steud: Omissum a DC. et SPR:, ab *A. variegata* n. 9. non differt nisi floribus amplioribus; an ejusdem var: ζ *grandiflorum* DC. Prodr: I. 59.? Cult: in h. Ripul: = 27. *A. neomontanum*. Plures species

vel var: confusæ sunt sub hoc nomine; *neomontanum* WULFF: var: *Napelli*; *neomontanum* W. Storkeanum; *neomontanum* BAUMG. *Toxicum* sec: SPR: syst: II. 622.; *neomontanum* PANZ: *tortuosi* var: sec: DC. Prodr: I. 61.; *neomontanum* LAPEYR: *Napelli* var: altera; *neomontanum* KOEL: *neubergense* sec: DC. syst: I. 372. 373. Quid igitur sentiendum? Specimen meum ex PERRET ludit inter *A. Napellum* et *Storkeanum*; magis tamen accedit ad prius, cuius forsitan una ex innumeris ejus varietatibus. = 28. *A. pilosiusculum* = Ser: mus: helv: I. p. 142. *A. rostrati* var: γ sec: DC. Prodr: I. 59., sed valde recedit ab *A. albo* AIT: , quod SPR: confundit cum *rostrato*. Vid: supra n. 18. = 29. *A. plicatum* = Koel: sec: Steud: Videtur *A. Napelli* var: altera a SPR: et DC. omissa. = 30. *A. pyramidale* = Mill: sec: Steud: Elegans var: *A. Napelli* vel *Cammari*, quam non invenio enumeratam nisi a STEUD: Spica densa altissima sc: 1-2-pedalis, ramosa, foliosa; flores mediocres albo-cærulei; galea recta, limbo emarginata, sub 2-rostrata; alæ a galea distantes; folia 3-partita, lobi cuneati divergentes pinnatifido-secti, lobuli ovato-oblongi acutiusculi; capsulæ 3-5. in iisdem individuis glabræ. Cult: in h: Ripul: = 31. *A. venustum* = Reich: neb: p. 28. Omissum a SPR: *A. Napelli* var: ββ *tenuifolium* sec: DC. Prodr: I. 63. ex SER: Specim: meum ex HUGUENIN habet foliorum lobos divergentes arcuatos: ceterum quadrat cum diagnosi DC. = 32. *A. hebegynum* = DC. syst: I. 376. (In montibus Vallesicæ). Idem ac *A. paniculatum* n. 10. sec: SPR: Differt tamen ex specim: meis, præter characteres a DC. no-

tatos, statura *minori*, panicula *subsimplici* nec *ramosa*, floribus magis *congestis* *majoribusque*, foliorum lobis *multifido-laciniatis*. Cult: in h. Ripul: = 33. *A. Sprengelii* = Reich: *A. exaltatum* W. en: sec: STEUD: Ottisssum a DC. et SPR: non videtur reapse differre ab *A. exaltato* n. 25. Cult: in h. Ripul: = 34. *A. strictum* = Bernh: et DC. syst: I. 373. *A. Napelli* var: ζ *neubergense* sec: DC. Prodr: I. 62. cum diagnosis quæ convenit speciminiibus meis ex HUGUENIN (*Sibir:*). = 35. *A. tauricum* = Wulff: in Iacq: col: 2. p. 112. (*Germania*). Inter omnes harum sectionum stirpes vel varr: mihi cognitas elegantissimæ: non differt tamen ab *A. elato* n. 22., nisi statura undique majori. Cult: in h. Ripul.

RANUNCULACEÆ SPURIÆ (antheris introrsis)

TRIB: V. Pæoniaceæ (DC. Prodr: I. 64.)

XVIII. ACTÆA Lin: gen: 568. = Lam: ill: t. 448.

» *Cal*: 4-sepalus caducus. *Pet*: 4. *S.ám*: polyandra
» antheris introrsis. *Fructus* 1-12. polyspermi, sicci
» dehiscentes, vel baccati indehiscentes. »

Obs: Genus in ordine naturali recte conjunctum cum *Cimicifuga* L., LAM: ill: t. 487.; habitus idem; differt tantum fructibus in *Cimicifuga* 1-12. siccis dehiscentibus, in *Actæa* solitariis baccatis indehiscentibus; hinc in tres sectiones divisum, quamvis 9. species solummodo comprehendat. Herbæ peregrines, foliis simplicibus vel compositis, floribus racemosis.

* 1. *A. spicata* = L. sp: 722. non Michx: = SPR:

syst: II. 571. = Lam: ill: t. 448. f. 1. Ic: Taurin: vol. 24. t. 37. (*Eur:*, *Caucas:*, *Sibir:* In sylvis umbrosis *Taurinens:* et *Subalpinis* vulgatissima ALL: n. 1070., BIROLI, RE etc.). Pertinet ad Sect: III. *Christophoriana* fructibus solitariis baccatis indehiscentibus.

XIX. XANTHORRHIZA Herit: st: nov: 79. = Lam: ill: t. 854.

» *Cal:* corollinus 5-sepalus deciduus. *Pet:* 5. sub-
» 2-loba pedicellata (*nectaria* SPR:). *Stam:* saepius 5.
» antheris introrsis. *Capsulæ* totidem ac ovaria et sta-
» mina compressæ semibivalves monospermæ. »

Obs: Genus unicam habens speciem saepius (abortu?) unisexualem.

1. *X. apiifolia* = Herit: l. c. (*Virginia*). Cult: in h. Ripul:

XX. PÆONIA Lin: gen: 678. = Lam: ill: t. 481.

» *Cal:* 5-sepalus inæqualis persistens. *Pet:* 5. raro
» plura. *Stam:* polyandra antheris introrsis. *Discus*
» carnosus urceolatus ovaria 2. 5. cingens. *Capsulæ*
» folliculares tot quot ovaria stigmatibus bilamellatis
» crassis sessilibus instructæ. »

Obs: Genus ludens inter *Ranunculaceas* et *Papaveraceas*, inter quas, monente Iuss: (gen: plant: 235. in observat:), datur progressus naturalis, quamvis a cl: DC. octo alii ordines intermedii admittantur. Species ex DC. 16., ex SPR: 14. herbaceæ raro suffruticosæ, radicibus fasciculato-tuberosis, foliis 2-ternatim sectis, floribus terminalibus amplis purpureis albidisve facillime plenis.

Sect. I. *Fruticosæ*

(Moutan DC. Prodr: I. 65.)

1. *P. Moutan* = Sims bot: mag: t. 1154. (*Tartar:* orient: , *China*, *Japon:*). Ornamenti gratia in hortis culta sub nomine *P. arboreæ*. Flores amplissimi plus minusve pleni , attamen semina matura quandoque gerentes; individua floribus omnino simplicibus numquam vidi. Caulis utique fruticosus et ramosissimus, sed humilis. Plures varr: venditant hortulani nominibus specificis insignitas, inter quas tres tantum admittuntur a Botanicis, scilicet α *papaveracea* (DC. l. c. ex ANDR: bot: rep: t. 463.); β *Bancksii* (ib: t. 448.); γ *rosea* (ib: t. 373.). Cultæ in h. Rip: sub dio.

Sect. II. *Herbaceæ*

(Pæon DC. l. c.)

† *Foliis glabris.*

2. *P. albiflora* = Pall: fl: ros: 2. 90. (*Tartar:* , *China*). Var: floribus albis vel roseis, odoratis (*P. odorata* hortul:) vel inodoris. Fructus maturitate tantum *glabri* evadunt, ovaria sunt manifeste *villosa*. Cult: in h. Ripul: = 3. *P. anomala* = L. manu: 247. (*Sibir:*). Unum tantum specim: possideo ex H. BURDIN: sub nomine *P. hybridæ*; sed in hac laciniae foliorum *lineares* uti in *P. tenuifolia*: cum qua mixta a SPR: Specim: meum lacinias gerit *lanceolatas* et *quadrat*

in ceteris cum *anomala*. = 4. *P. tenuifolia* = L. sp:
748. (*Tauria*). Cult: in h. Ripul:

* 5. *P. officinalis* = L. sp: 747: = Spr: syst: II.
615. = Bot: mag: t. 1784. Ic: Taurin: vol. 3. t. 85.
(*Eur: med: Abunde circa montem S. Michaelis della Chiusa, et supra Piossasco* ALL: n. 1680. Re fl: segus: p. 45.). Undique in hortis culta variat plenitudine et colore florum petalisque integris vel inciso-dentatis, quæ varr: veniunt penes hortul: diversis nominibus a Botanicis haud admissis, sc: *blanda, hirsuta, Sabini, fragrans* etc. etc.

6. *P. corallina* = Retz: obs: 3. p. 34. (*Angl: German: Austr: Ins: Ion:*). Specim: unicum ex BALBIS:

†† *Foliis subtus pubescentibus.*

7. *P. Russi* = Biv: man: sic: 4. p. 12. (*Sicilia. In Sardiniae editis umbrosis montium MORIS st: sard: I. p. 1.*). Diagnoses SPR: bona, sed cons: insuper descriptionem ex Guss: Prodr: II. 29. = 8. *P. humilis* = Retz: obs: 3. p. 35. (*Hispan:*). Differt a priori, cui dicitur affinis a DC. Prodr: I. 66., foliolis 2-3-partito-compositis nec *integratis*, germinibus *rectis* nec *recurvatis*, in specim: meo evidenter *pilosis*, non *glabriusculis* uti in diagno: SPR: nec *subpilosis* tantum uti in phrasi DC., statura demum humiliori. = 9. *P. decora* = Andrs: Tr: Lin: soc: 12. 273. (*Thracia, Tauria*). Variat segmentis foliorum angusto-oblongis (α *Andersonii*), vel lato-oblongis (β *elatior*), ad quam pertinet specimi: meum valde mancum ex HUGUENIN.

* ? 10. *P. peregrina* = Mill: dict: n. 3. = Spr:

syst: II. 615. = Bot: mag: t. 1050. (*Græcia*. In summo monte *Musinē* qua parte provinciam Segusiensem spectat invenisse asserit RE in fl: tor: p. 281. et app: alt: p. 199.). Valde affinis mihi videtur *P: officinali* n. 5.

Obs: circa *Ranunculaceas*.

Ranunculaceæ per totum orbem sparsæ 546

Ranunculaceæ Pedemontanæ.

<i>Atragene</i>	1
<i>Clematis</i>	4
<i>Thalictrum</i>	8
<i>Anemone</i>	14
<i>Adonis</i>	3
<i>Ranunculus</i>	31
<i>Caltha</i>	1
<i>Trollius</i>	1
<i>Helleborus</i>	4
<i>Isopyrum</i>	1
<i>Garidella</i>	1
<i>Nigella</i>	2
<i>Aquilegia</i>	3
<i>Delphinium</i>	5
<i>Aconitum</i>	7
<i>Actæa</i>	1
<i>Pæonia</i>	2
								<hr/> 89

Sic *Ranunculaceæ* Pedemontanæ ita sese habent ad *Ranunculaceas* totius orbis uti 89. ad 546. et sextam partem + 12. constituunt.

ORDO II.

DILLENIACEÆ

(DC. syst: I. 395. Prodr: I. 67. = *Magnoliæ*
et *Rosaceæ* Juss: gen: 280. et 336.)

Char: essent:

» *Cal:* 5-sepalus persistens. *Pet:* 5. decidua. *Stam:*
» polyandra antheris adnatis introrsis aut lateralibus.
» *Ovar:* plurima 1-styla aut abortu vel coalitione
» solitaria. *Carpella* 1-locularia baccata. *Album:* car-
» nosum; *Embryo* rectus inferus. »

Obs: Ordo parum naturalis, et artificiali modo
Ranunculaceis affinis, sed numero organorum, ha-
bitu, facie, et herbæ characteribus toto cœlo distans.
Ranunculaceæ, perpaucis exceptis, herbaceæ, humiles,
foliis mollibus plus minusve sectis, acres, sæpius sub-
venenatæ vesicatoriæ, regiones boreales ac tempera-
tas colentes. *Dilleniaceæ* omnes fruticosæ, foliis plus
minusve coriaceis simplicibus, virtute certa parentes,
ab hemisphær: borealis regionibus temperatis alienæ.
Ceterum characteres ex DC. l. c. optimi; uti divisio
in binas tribus *Delimæas* nempe et *Dilleneas*. Genera
16. fere omnia rarissima, pauca in calidariis Euro-
peis culta, in herbariis parum communia.

TRIB: II. *Dilleneæ*

(DC. syst: I. 411. Prodr: I. 70. = *Dilleneæ* Salisb:
par: lond: n. 73.)

I. PLEURANDRA Labill: n. holl: 2. p. 5. t. 143. 144.

» *Cal:* 5-sepalus persistens. *Pet:* 5. decidua. *Stam:*
» 5-20. unilateralia omnia fertilia, filamentis liberis
» aut ima basi subcoalitis, antheris adnatis. *Styl:* 2.
» filiformes. *Carpella* (achenia SPR:) 2. membranacea
» 1-2-sperma. »

Obs: Genus constans 20. stirpibus ex DC. 18. ex
SPR: omnibus *N. Hollandiae* incolis, ac in 4. sectio-
nes divisum prout filamenta *libera* vel basi *mono-*
delpha, ac folia *glabra* vel plus minusve *pilosa* oc-
currunt. Suffrutices ramosissimi, foliis sparsis inte-
gris, floribus terminalibus solitariis.

1. *P. ovata* = Labill: l. c. t. 143. (Ins: *Van-*
Diemen). Perfectissimum specim: possideo ex hb: BEL-
LARDI a cl: LABILL: missum, quod optime quadrat
cum descriptione Auctor: Pertinet ad sect: III. (*Hib-*
bertianeæ DC. syst: I. 415.).

II. HIBBERTIA Salisb: par: lond: n. 73. = Andr: bot: rep:
t. 126. (*Dilleneæ* sp: W. LABILL:)

» *Cal:* 5-sepalus persistens fructum claudens. *Pet:*
» 5. decidua. *Stam:* polyandra æqualia, filamentis li-
» beris filiformibus. *Ovaria* 1-15, sæpius 2-5. *stylis*
» filiformibus inflexis. *Capsulæ* tot quot ovaria in
» carpella 1-2. sperma congestæ. »

Obs: Genus a *Dillenia* divulsum præsertim ratione calycis et formæ ac substantiæ fructus, nunc 19. stirpibus constans *N. Hollandiae* indigenis, in tres sectiones divisum ex numero et superficie carpellorum. Suffrutices erecti vel raro volubiles, foliis alternis sub-integris, floribus terminalibus solitariis.


1. *H. volubilis* = Andr: bot: rep: t. 126. (*Nov. Holl:* juxta *Port-Jackson*). Cult: in h. Ripul:, sed fructus numquam ad maturitatem pervenient. Pertinet ad II. sectionem carpellis 1-8-glabris.

III. DILLENTIA Lin: gen: 688. = Lam: ill: t. 492.

» *Cal:* 5-sepalus persistens in fructu valde ampliatus. *Pet:* 5. persistentia. *Stam:* Hibbertiæ. *Ovaria* » 10-20. totidemque *carpella* polysperma in fructum » carnosum stigmatibus radiantibus coronatum coa- » lita. »

Obs: Genus nunc constans 6. speciebus ex DC. et SPR:; arbores Indicæ, foliis coriaceis penninerviis, pedunculis solitariis 1 - multifloris, fructibus edulibus acidulis.

1. *D. speciosa* = Th: act: soc: Lin: I. 200. (*Malab:, Java, Ceylan:*). Cult: in h. Ripul: nondum floruit.



ORDO III.

MAGNOLIACEÆ

(DC. syst: I. 439. Prodr: I. 77. =
Magnoliae Juss: gen: 280.)

Char: essent:

» *Cal:* 3-6-sepalus deciduus. *Pet:* 3-27. uni-aut-
 » multi-serialia decidua. *Stam:* polyandra toro infra
 » ovaria inserta antheris adnatis. *Ovar:* plurima toro
 » supra stamina inserta saepius spicatum disposita 1-
 » styla. *Carpella* tot quot ovaria 1-locularia 1-multi-
 » sperma forma varia. *Album:* carnosum; *Embryo*
 » rectus iuferus. »

Obs: Ordo naturalis *Dillenaeis* valde affinis, habitu
 praesertim inspecto, arbores fruticesve elegantes com-
 prehendens, et modo in 9. genera divisus, quorum
 species fere omnes americanæ vel asiaticæ, nonnullæ
 Australasiam colentes, Europam nullæ. Ex disposi-
 tione fructuum circa axim binæ emergunt tribus sc:
Illicieæ carpellis verticillatim, *Magnolieæ* carpellis spi-
 catim dispositis.

TRIE: I. *Illicieæ* (DC. Prodr: I. 77.)

I. ILLICIUM Lin: gen: 711. = Lam: ill: t. 493.

» *Cal:* 3-6-sepalus sub-petaloideus. *Pet:* 9. vel plura
 » triplici ordine, interiora minora. *Carpella capsu-*
 » *laria* 9-18. 2-valvia monosperma stellatim disposita. »

Obs: Genus 3. tantum stirpibus constans ex *Japania* et *Amer:* boreali, fruticosis glaberrimis, foliis confertis integris subcoriaceis, floribus solitariis ternisve parvis, cortice carpellisque valde aromaticis.

1. *I. anisatum* = L. sp: 664. (*Japon:*, *China*). Cult: in h. Ripul: satis floret, sed fructus (qui proveniunt e *China* sub nomine *Anisi stellati*) maturos numquam obtinui. = 2. *I. parviflorum* = Michx: fl: bor: I. 326. (*Florida* occid:). Specim: mancum ex hb: BIROLI.

TRIB: II. *Magnolieæ* (DC. Prodr: 79.)

II. MAGNOLIA Lin: gen: 690. = Lam: ill: t. 490.

» *Cal:* 3-sepalus ante florescentiam bractea membranacea fugacissima cinctus. *Pet:* 6-12. pluribus ordinibus disposita. *Antheræ* laterales. *Carpella* numerosa 2-valvia extrorsum dehiscentia 1-2-sperma in conum spicatum disposita. *Semina* arillata funiculis umbilicalibus longissimis pendula (an in omnibus stirpibus ?) »

Obs: Genus constans stirpibus americanis et asiaticis; in primis characteres carpologici cogniti; non ita in alteris: attamen in duas sectiones satis naturales dividi possunt, nam americanæ *unicam* bracteam alabastrum cingentem ac antheras *extrorsas*, asiaticæ *binas* antherasque *introrsas* gerunt. Arbores fruticesve foliis integris stipulis 2. cito caducis instructis, floribus terminalibus solitariis elegantissimis.

Sect. I. *Americanæ*(*Magnoliastrum* DC. Prodr: I. 80.)

1. *M. grandiflora* = L. sp: 755. (*Amer: bor:*). Arbor excelsa ac pulcherrima foliis persistentibus, floribus odoratis, nunc in frigidariis europeis ubique culta ornamenti gratia; in locis subhumidis *Eur: med:* colitur etiam sub dio, et quandoque semina gerit matura *COLLA* h. Ripul: 83. not. 2. Variat foliis subtus ferrugineis vel viridibus, glabris villosisve, obovato-oblongis (*obovata* AIT: non TH:), oblongo-ellipticis (*elliptica* AIT:), vel oblongo-lanceolatis (*lanceolata* AIT:), floribus expansis vel subcontractis. = 2. *M. Umbrella* = Lam: dict: 3. 673. (*Amer: bor:*). Arbor mediocris foliis deciduis, floribus foetidis, petalis 9-12. non 3. uti indicat nomen linnæanum (*M. tripetala*) a LAM: mutatum ob foliorum dispositionem in umbrellam apice ramorum. Culta c. priori; variat foliis lanceolatis vel ellipticis. = 3. *M. acuminata* = L. sp: 756. (*Amer: bor:*). Arbor excelsa foliis deciduis, floribus vix odoratis. Variat floribus albidis, flavescensibus, aut subcerulescentibus sec: MISCHX: arb: am: 3. p. 82. An ad unam ex hisce varietatib: referenda *M. Decandolii* ex SAVI in bibl: ital: 1819. n. 47. p. 224. c. ic: ? In specim: meo desunt flores. = 4. *M. auriculata* = Lam: dict: 3. p. 673. (*Amer: bor:*). Arbor mediocris, foliis deciduis, floribus suave-olentibus albis. Huc pertinet sec: SPR: l. c. *M. pyramidata* BART: quam DC. admittit pro specie distincta (Syst: I. 454. Prodr: I. 80.). At revera in specim: meis sine flore, præter

differentias a cl: *Candoleo* notatas, folia *auriculatæ* sunt duplo longiora, basi profunde cordata, apice acutiuscula; *pyramidalis* folia habet prorsus spathulata basi vix cordata, sed subtus *glaucous* non *utrinque concoloria* uti in diagnosi DC. Flores non vidi. = 5. *M. cordata* = Michx: fl: bor: I. 328. (*Amer:* bor:). Arbor mediocris, foliis deciduis, floribus flavescensibus. Cult: in h. Ripul:

Sect: II. *Asiaticæ*

(*Gwillimia* DC. Prodr: I. 81. ex Rottler.)

6. *M. conspicua* = Salisb: Par: t. 38. *M. Yulan* DC. ex Desf: (*China*). Arbor mediocris, foliis deciduis, florib: odoratissimis ante folia nascentibus. Cult: in h. Ripul: = 7. *M. obovata* = Thb: in act: soc: Lin: 2. 336. (*Japon:*). Frutex 3-4-pedalis, foliis deciduis, floribus inodoris. Varietates uti in DC. syst: I. 457. Specim: mea pertinent ad var: β *discolor* cultam sub diu in h. Ripul: quæ perfecte quadrat cum descriptione Candolleana exceptis foliis *cum flore* non *ante florem* nascentibus.

III. LIRIODENDRON Lin: gen: 639. = Lam: ill: t. 491.

- » *Cal:* corollinus 3-sepalus deciduus 2-bracteatus.
- » *Pet:* 6. in campanam conniventia. *Stam:* polyandra
- » antheris longis lateralibus. *Ovaria* numerosa stig-
- » matibus globosis sessilibus. *Samaræ* tot quot ova-
- » ria in strobilum conicum super axim subulatum dense
- » aggregatae basi 1-2-spermæ indehiscentes. »

Obs: Genus habitu et fructificatione *Magnoliis* valde affine, a quibus differt præcipue fructu *indehiscente samaræformi*: forsitan huc pertinent *Magnoliæ asiaticæ* quarum fructus ignoti? dubium nascitur eo quod cl: SPR: *Liriodendro* unicum speciem habenti addat *Magnoliam pterocarpam* ROXE: sub nomine *L. indici* (syst: II. 652.). Plantam colo duobus abhinc annis missam ex hortibus Anglicis sub nomine *Magnoliæ?* Fructificationem adhuc non vidi, sed folia perfecte quadrant cum nimis brevi phrasi SPR:

1. *L. tulipifera* = Lin: sp: 755. (*Amer: bor:*). Arbor excelsa, foliis deciduis, nunc ubique culta in hortis europeis.

ORDO IV.

ANONACEÆ

(DC. syst: I. 563. Prodr: I. 83. = *Anonæ* Juss: gen: 283. = J. S. Hill: fam: II. p. 79. t. 85.)

Char: essent:

» *Cal:* 3-4-sepalus persistens, sepalis saepius coailitis. *Pet:* 6. dupli ordine. *Stam:* polyandra adpressa discum fere obtegentia antheris subsessilibus.
» *Carpella* plurima confertissima quandoque (abortu?) solitaria baccata vel capsularia. *Scrin:* 1-2-seriata

» lia angulo interiori adfixa. *Album*: carnosum sulco
» depresso sèpissime marginatum; *Embr*: minutus. »

Obs: Ordo optime collocatus post *Magnoliaceas*, a quibus differt tantum stipularum absentia, corolla constanter 6-petala, forma et substantia fructus. Arbores vel frutices 9. genera exotica constituentes.

TRIE: I.

Carpellis unilocularibus coalitis.

I. ANONA Lin: gen: 693. = Lam: ill: t. 494.

» *Cal*: 3-partitus vel 3-lobus. *Pet*: interiora minora
» vel (rarius) nulla. *Ovaria* numerosa in unum stig-
» matibus sessilibus tectum concreta. *Carpella* toti-
» dem in baccam unicam multilocularem pulposam
» cortice squamoso muricato reticulato, vel (rarius)
» laevi tectam coaliti; loculi 1-spermi. »

Obs: Genus prorsus singulare ob fructuum struc-
turam; veri fructus sunt plures baccæ partiales juxta
receptaculum commune centrale dispositæ, quæ om-
nes maturatione simul colliguntur et unam baccam
subglobosam constituunt tectam cortice crassiusculo
maturitate plus minusve tuberculoso, intus carne
pulposa repletam, in totidem loculos partiales divi-
sam quot erant ovaria, ita ut etiam bacca matura in
totidem baccas partiales seu lobulos carnosos divelli
possit. Semina sunt solitaria in unaquaque bacca par-
tiali; in universalis autem extant radiatim disposita
prope peripheriam. Constat autem genus hoc 36. spe-
ciebus ex DC., 30. ex SPR: in regionibus æquatoria-

libus utriusque orbis nascentibus, quæ dividi solent vel ex petalorum forma et consistentia sec: DC., vel ex foliorum superficie juxta SPR: Arbores fruticesve foliis integris exstipulatis, pedunculis axillaribus aut oppositifoliis 1-vel-pauci-floris. Pauci culti in calidariis europæis, nec communes in herbariis.

1. *A. muricata* = L. sp: 756. (Ins: *Caribæis*, Amer: calid:). Cult: in h. Ripul: nond: fl: Specim: possideo ex hb: BELLARDI communic: a PASCHAL cum flore sed sine fructu; quadrat cum descriptionibus auctorum, exceptis foliis non prorsus *glabris*, potius subtus *vilosiusculis*. = 2. *A. reticulata* = L. sp: 357. excl: syn: Rumph: (Ins: *Caribæis*). Cult: c. priori nond: flor: Specim: optimum ex BERTERO c. fl: sed s. fr. = 3. *A. palustris* = L. sp: 757. (In *Iamaicæ* paludosis). Cult: cum prioribus nondum flor: Specim: optimum lectum a BERTERO c. fl. s. fr. = 4. *A. squamosa* = L. sp: 757. (Ind: occid: et orient:). Specim: ex BERTERO c. fl: et fructu immaturo. = 5. *A. Cherimolia* = Mill: dict: n. 5. (Amer: merid:, Peru, Chili). Culta in h. Ripul: læte floret; in H. B. T. fructus maturos edulesque gessit 1829. magnitudine *Citri Aurantii* cortice glabro viridi vix subsquamoso.

TRIB: II.

Carpellis plurimis distinctis.

II. ASIMINA Adans: fam: 2. 365. = Dunal: monog: anon: t. 9. pro *A. parviflora*. = *Anonæ* sp: L. = *Orchidocarpi* sp: MICHX: = *Porceliæ* sp: PERS:
» *Cal: Pet: Stam: Anonæ. Ovaria plurima distin-*

» cta, plerumque 3. ovato-oblonga. *Carpella* totidem
» baccata polysperma. »

Obs: Genus vix distinctum ab *Anona* ex forma
fructuum, constans 5. stirpibus Amer: bor: incolis.
Fruticēs foliis deciduis, floribus axillaribus interdum
ante folia nascentibus.

1. *A. parviflora* = Dun: I. c. (*Carolin:*, Georg:
umbrosis). Spécim: ex hb: BIROLI s. fl: = 2. *A. trilobata* = Dun: I. c. p. 83. (*Amer:* bor: locis humidis).
Cult: in h. Ripul: et sicc: ex hb: BIROLI c. fl: s. fr.

ORDO V.

MENISPERMACEÆ

(DC. Prodr: I. 95. = *Menisperma* Juss: gen: 284.
= I. S. Hill: fam: II. p. 82. t. 86.)

Char: essent:

» Flores unisexuales. Cal: 3-6-sepalus. Pet: 3-6.
» interdum nulla. Masc: Stam: monadelpha vel rarius
» libera petalis aequalia vel triplā quadruplave. Fæm:
» Ovar: nunc plurima 1-styla basi coalita, nunc so-
» litaria stigmatibus plurimis coronata. Drupæ bac-
» catæ 1-spermæ. Semen conforme. Embr: curvus aut
» periphericus. Album: nullum vel parvum carno-
» sum. Radic: supera vel infera. »

Obs: Ordo longe distans ab *Anonaceis* et *Berberideis* inter quas collocatur habitu et fructificationis partibus. Plantæ omnes scandentes, floribus minimis constanter monoicis vel dioicis (abortu?), masculis quoad partium numerum symmetricis vel non symmetricis; hinc *Lardizabaleæ*, *Menispermeæ* et *Schizandreae* (DC. Prodr: I. 95. 96. 104.). Genera 12. sistentia species omnes exoticas, nec satis cognitas.

TRIB. II. *Menispermeæ.*

Flores saepissime dioici, masculi quoad partium numerum symmetrici.

I. CISSAMPELOS Lin: gen: 1138. = Lam: ill: t. 83o.

» Dioica. MASC: *Cal*: corollinus 4-sepalus. *Pet*: o.
 » STAM: monadelpha 2-4. FÆM: *Cal*: 1-sepalus lateralis semisuperus. *Pet*: 1. sepalo oppositum. *Ovarium* 1. maximum. *Stigm*: 3. subsessilia. *Drupa* baccata 1-spermia reniformis. »

Obs: Genus polymorphum in foliis et inflorescentia, constans 28. speciebus ex DC., 22. ex SPB: gerentibus modo flores femineos bracteatos, et folia utriusque vel unius sexus peltata, modo femineos bracteatos et folia non peltata, modo demum racemos femineos ebracteatos; hinc in tres sectiones divisum. Frutices scandentes, foliis simplicibus interdum dissimilibus.

1. *C. Pareira* = L. sp: 1473. var: α (*Ind: occid:*, *Amer: austr:*). Specim: mascul: ex BERTERO: folia non

sunt apice *aristato-mucronata* uti ex descript: DC.
syst: I. 533., sed *retusa* uti in diagnosi SPR:

II. *MENISPERMUM* Tourn: mem: Ac: par: 1705. p. 237. =
Lam: ill: t. 824.

» Dioicum. *Cal*: 3-6-sepalus sæpius 2. bracteatus.
» *Pet*: 3-6. MASC: *Stam*: 6. (JUSS: SPR:) 12-24. (DC.
» syst:) 16-20. (DC. Prodr:). FÆM: *Ovar*: 3-6. uno
» sæpe abortiente, stylis sub-bifidis. *Drupæ* totidem
» baccatæ reniformes. »

Obs: Genus *Cissampelo* valde affine et difficillime
determinandum propter tenuitatem partium floralium
uti jam observavit LINN:, et satis constat ex diversa
determinatione Auctorum, ita ut cl: DU-PETIT-THOU:
suspicatus sit flores esse quasi conflatos ex plurimis
Cissampeli flosculis coalitis! *Cocculus* BAUH: qui dif-
fert tantum floribus (constanter?) hexandris haud se-
jungendus; character enim incertissimus in hisce plan-
tis. Species 52. ex DC. inclusio *Cocculo*, 50. ex SPR:

1. *M. laurifolium* = Roxb: ined: in h. Lamb: sec:
DC. syst: I. 530. sub *Cocculo*. (*Ind*: orient:, *Nepal*:).
Cult: in h. Ripul: nondum flor: Herbæ descriptio a
DC. syst: l. c. optima. = 2. *M. canadense* = L.
sp: 1468. (*Amer*: bor:). Plantæ masculæ cultæ sub
dio in h. Ripul: læte florent. Folia tam in viventi-
bus quam in specimin: meis raro *peltata*, sæpius
petiolis ad *marginem* insertis. Figura LAM: ill: t.
824. à cl: CANDOLEO citata pro var: α (syst: II.
540.) videtur potius pertinere ad var: β *lobatum*
sc: *M. virginicum* L.; folia enim sunt *acute-angu-
losa*. = 3. *M. smilacinum* = DC. syst: I. 541.

(*Carolina*). Species omissa a SPR: distracta a DC. e *Cissampelis* ob similitudinem cum *M. canadensi*, sed non tanta in specim: meis quantam cl: Auctor dixit; differunt enim præterea foliis *cordato-oblongis* apicem versus attenuatis, nec *subrotundis*, nonnullis tantum vix *angulatis*, racemis masculis *brevissimis*; flores fœmineos non vidi.

ORDO VI.

BERBERIDEÆ

(DC. syst: II. 1. Prodr: I. 105. = Juss: gen: 286.
= J. S. Hill: fam: II. p. 85. t. 87.)

Char: essent:

» *Cal: 3-4-6-sepalus deciduus. Pet: totidem sepalis opposita rarius dupla sæpius basi glandulis vel squamis instructa. Stam: tot quot petala eisque opposita. Styl: 1. sublateralis brevissimus. Stigm: suborbiculatum. Fructus baccatus vel capsularis. Sem: imæ placentæ laterali adfixa 2-3. vel rarius solitaria. Album: carnosò-subcorneum. Embr: rectus. Radic: ad apicem incrassata.* »

*Obs: Ordo satis naturalis si in eo comprehendantur tantum genera nunc a cl: DC. admissa, exclusis tamen *Leontia* et *Diphylleja Podophylleis* magis affini-*

nibus; sed *Menispermeis* fructificatione solum, non habitu accedit. Fratices aut herbæ perennes.

I. BERBERIS Lin: gen: 442. = Lam: ill: t. 253.

» *Cal:* 6-sepalus extus basi 3-squamatus. *Pet:* 6.
 » ungue intus 2-glanduloso. *Filamenta* edentula vel
 » raro sub-bidentata antheris 2-locularibus. *Ovar:* ova-
 » tum stigmate subsessili orbiculato apice tectum.
 » *Bacca* 1-locularis 2-3-sperma. »

Obs: Genus constans 32. speciebus sec: DC., 33. sec: SPR: inclusio *Mahoniae* genere quod ob filamenta sub-bidentata, et folia pinnata distinctum admittitur a DC. ex NUTT: Fratices foliis alternis fasciculatisve, nonnullis saepe (primaria) in spinam mutatis, pendunculis axillaribus solitariis, corymbosis, vel racemosis. Inflorescentia simplex vel composita duas sectiones constituit.

Sect. I. Floribus racemosis.

† *Foliis simplicibus, spinis 3-partitis.*

* 1. *B. vulgaris* = L. sp: 472. = SPR: syst: II. 118. = Lam: ill: t. 253. f. 1. IC: Tatur: vol. 10. t. 47. vern: *Spinatit, Uva de la Levre, Epinuinette* (Eur:), *Asia* med: Ad sepes in *Pedem:* *vulgatissima* ALL: n. 1908. Copiose circa *les Ferrières* RE fl: segus: p. 31. In ericetis *Ticini* ubique BIROU fl: acor: I. p. 121. In editis saxosis montis *Genergentu* MORIS st: sard: I. p. 2.). Multimode variat praesertim colore baccae, nec non seminibus quandoque abortivis vel racemis ereticeulis. Cons: DC. syst: II. 6.

2. *B. canadensis* = Mill: dict: n. 2. (*Amer: bor:*). Vix a priori distincta foliis *remote serratis*: characteres sumpti a majore vel minore racemorum *inflexione*, et a petalorum *integritate* fallaces, uti in plantis cultis hujus stirpis, et in *B. vulgari* spontanea observavi. Hinc a cl: Hook: fl: bor: and: I. p. 28. pro sola varietate habetur. = 3. *B. Chitria* = Buchan: in hb: Lamb: sec: DC. (*Nepal:*). Valde affinis *B. canadensi* ob folia *remote serrata*, et petala *emarginata*, sed differt racemis *patulis*, floribus *majoribus*, foliorum serraturis *spinulosis*, spinis lateralibus *brevissimis*. Specim: cult: ex HUGUENIN quadrat cum descriptione DC. syst: II. 8. sub *B. aristata*, exceptis stylo *brevissimo* ex DC., *nullo* in specim:, et racemis foliis *paullo longioribus* ex DC., *duplo longioribus* in specim: An hic duæ stirpes, vel potius var: speciosæ? = 4. *B. cretica* = L. sp: 492. (*Creta, Asia min:*). Variat foliis *integerrimis* vel *serrato-ciliatis*. Specim: mea ex hb: BIROLI pertinent ad primam, et insuper spinam *unicam validissimam* gerunt; an laterales abortivæ? = 5. *B. asiatica* = Roxb: in DC. syst: II. p. 13. (*Ind: orient:, Nepal:*). Stirps sequenti affinis, sed satis distincta ex description: cl: DC. syst: II. 12. 13. Adde *B. asiaticam* in specim: meis ex HUGUENIN folia referre alia *subintegerrima*, alia *spinato-denticulata* uti in sequenti, alia *spinis distantibus basi ampliatis* uti in *Ilice aquifolio*. = 6. *B. ilicifolia* = Forst: comm: goett: 9. p. 28. (*Terra del Fuego*). Vid: observationem circa priorem.

†† *Foliis simplicibus, spinis simplicibus aut subnullis.*

7. *B. chinensis* = Desf: cat: ed: 1804. p. 150. (*China bor:*). In optimo specimine communicato ab HUGUENIN folia sunt omnia *integerrima*, nulla *subcordata*: ceterum perfecte quadrat cum descriptione Candolleana syst: II. 8.

Sect. II. Pedunculis 1-floris.

8. *B. sibirica* = Pall: fl: ross: 2. p. 42. t. 67. (*Sibiria*). In speciminib: ex hb: BIROLI s. fructu folia habent dentes numerosos (20-30. et ultra) non 3-7. tantum ut ex descript: DC. syst: II. p. 17.

II. *NANDINA* Thumb: nov: gen: I. p. 14. = Lam: ill: t. 26.

» *Cal:* 6-sepalus basi imbricatim multi-squamatus.
 » *Pet:* 6. intus eglandulosa. *Filamenta* brevissima,
 » antheris oblongis. *Ovar:* 1. ovatum, stylo brevi,
 » stigmate 3-gono. *Bacca* exsucca globosa stylo co-
 » ronata 1-locularis 2-sperma. »

Obs: Genus a cl: Juss: inter plantas incertæ sedis enumeratum, hinc ad *Berberideas* amandatum, quibus certe affine fructificationis organis, non habitu. Species unica.

1. *N. domestica* = Thb: diss: nov: gen: I. p. 14. (*Japon:*, *China*). Frutex elegans cult: in h. Ripul.

III. *EPIMEDIUM* Lin: gen: 148. = Lam: ill: t. 83.

» *Cal:* 4-sepalus basi 2-bracteolatus deciduus. *Pet:*
 » 4. intus basi squamosa. *Antheræ* longitudinaliter

» adnatæ basi dehiscentes. *Capsula* siliculosa 1-locu-
» laris 2-valvis polysperma. »

Obs: Genus ludens inter *Berberideas* et *Podophyleas*, quibus tamen habitu magis affine, duabus tantum constans speciebus herbaceis, foliis 2-3-ternatim sectis, floribus racemosis.

* 1. *E. alpinum* = L. sp: 171. = Spr: syst: I. 441.
= Lam: ill: t. 83. Ic: Taur: vol. I. t. 130. (Eur:
med: *Liguria*; mont: *Garrexii*, *Eporediensibus*, *Bu-
gellensibus*, et *valle Sessite* frequens ALL: n. 871. *Valle
Sessite*, præsertim *Valle piccola* BIROLI fl: acon: I. p.
50.). Var: petiolis pilosis (*E. pubigerum*) crescit in
Oriente. Cons: DC. syst: II. 29.

Obs: circa Berberideas.

Berberidearum species sec: DC. sistunt numero 47

Berberideæ Pedemontanæ.

<i>Berberis</i>	I
<i>Epimedium</i>	<hr/> 2

Sic *Berberideæ Pedemontanæ* ita sese habent ad *Berberideas* totius orbis uti 2: ad 47. et vix 23.^{am} partem constituunt.



ORDO VII.

PODOPHYLLEÆ

(DC. syst: II. 34. Prodr: I. 3. = *Ranunculacearum*,
Papaveracearum, *Juncorumq: genera Auctorum.*)

Char: essent:

» *Cal:* 3-4-sepalus deciduus vel persistens saepe pe-
 » taloideus. *Pet:* 1-2-3-serie disposita in singulis se-
 » riebus numero sepolorum æqualia. *Stam:* petalorum
 » numero æqualia aut multiplicita seriatim disposita.
 » *Styl:* subnullus. *Stigm:* crassum subpeltatum. *Car-*
 » *pella* plurima aut 2. vel solitaria 1-locularia de-
 » hiscentia aut indehiscentia polysperma, vel oligo-
 » aut-mono-sperma. *Album:* carnosum. *Embr:* parvus
 » basilaris. »

Obs: Ordo valde obscurus fatente ipso cl: CANDOLEO ejus creatore, sex tantum speciebus constans ad quinque diversa genera spectantibus, quorum primum polyandrum (*Podophyllum* L.) inter *Ranunculaceas* a Juss:; secundum octandrum (*Jeffersonia* BART:) inter *Papaveraceas* a SPR:; tertium (*Achlys*) non satis cognitum; quartum hexandrum (*Cabomba* AUBL:, *Nectris* SCHREB:, SPR:) inter *Juncos* a Juss:; quintum demum polyandrum inter *Hydrocharideas* a SPR: enumerantur. Herbæ fere omnes aquatice.

I. PODOPHYLLUM Lin. gen: 646. = Lam: ill: t. 449.

» *Cal:* 3-sepalus. *Pet:* 6-9. *Stam:* 12-20. *Ovar:* 1

» ovatum. *Bacca* subcarposa polysperma stigmate per-
» sistente coronata, placenta laterali unica. »

1. *P. peltatum* = L. sp: 723. (In umbrosis humi-
dis Amer: sept:). Descriptio ex DC. syst: II. 34. per-
fecte quadrat cum specimin: meis. Facies *Hellebori*.

ORDO VIII.

NYMPHÆACEÆ

(DC. syst: II. 39. Prodr: I. 113. =
Hydrocharides Juss: gen: 67.)

Char: essent:

» *Cal:* saepius 4-rarius-6-sepalus, sepalis toro ex-
» pando insertis. *Pet:* seriatim disposita totidem in
» unaquaque serie quot sepala. *Stam:* polyandra mul-
» tiserialia. *Styl:* 1. *Stigm:* simplex. *Carpella* 8-24.
» nunc toro semi-immersa, nunc intra torum inclusa
» coalita 1-2-aut-polysperma. *Sem:* parietibus car-
» pellorum lateraliter adfixa, saepius arillo subgela-
» tinoso cincta. *Album:* nullum vel farinaceum. *Embr:*
» parvus inversus. »

Obs: Ordo nunc naturalissimus dummodo in eo ge-
nera tantum a cl: DC. enumerata comprehendantur,
sed inter *Ranunculaceas* et *Papaveraceas* potius col-
locandum tum habitu, eum fructificatione: dubium

jam a cl: Juss: (l. c. p. 69. in obs:) elevatum, utrum in suis *Hydrocharidibus* semina essent uniloba vel 2-loba, modo sustulit primus CANDOLEUS, demum posteriores Phisiologi etiam ex caulis structura *exogenas* potius, quam *endogenas* referente. Constat ex generibus et stirpibus aquaticis fere omnibus exoticis 3o. circiter.

I. NELUMBIUM Iuss: gen: 68. = Lam: ill: t. 453.

» *Cal.* 4-5 - sepalus intus coloratus. *Ovaria* plurimæ rima in toro turbinato superne foveolato semi-immersa. *Carpella* totidem stylo coronata. *Sem:* in quoque carpello solitaria exarillata exalbuminosa » (Herbæ perennes, foliis integerrimis peltatis, floribus amplis supra aquam paullulum exsectis).

i. *N. speciosum* = W. sp: II. 1258. (*Asia* med: et austr:, *Ægypt:*, *Græcia*). Vidi v. et florens in H. *Littæ*, ex quo siccum possideo.

II. NYMPHÆA Lin: gen: 579. = Lam: ill: t. 453.

» *Cal:*, *pet:* et *stam:* ut in *Nelumbio*. *Ovaria* plurimæ rima in toro semiinfero ampliato inclusa, stigmatibus sessilibus. *Carpella* totidem intra receptaculum bacciforme medio glanduliferum stigmatibus persistenter in radios dispositis coronatum. *Sem:* in quoque carpello plurima ad parietes laterales adfixa arillata albuminosa. »

Obs: Genus a *Nelumbio* fructus structura diversum et ex hac magis accedens ad *Papaveraceas*. Species 2o. ex DC:; 17. ex SPR: dioicæ in duas sectiones juxta antherarum situm, *lateralium* sc: vel *terminalium*.

Sect. I. Antheris lateralibus.

1. *N. cœrulea* = Savign: dec: Ägypt: 3. p. 74. (Ägypt: infer:). Folia peltata integra; flores cœrulei. Specim: ex SAVI.

Sect. II. Antheris terminalibus.

† *Foliis peltatis.*

2. *N. Lotus* = L. sp: 729. (In Nilo et aquis lente fluentibus Ägypt:). Lotus Ägyptiorum. Optima specimina ex hb: BELLARDI communicata a VAHL: et nobis a SAVI.

‡ *Foliis cordatis.*

* 3. *N. alba* = L. sp: 729. = Spr: syst: II. 625. = Fl: dan: t. 602. Ic. Taur: vol: 20. t. 33. Vern: *Ninfea* (*Europa*. Ad lacus frequens in *Pedemont*: ALL: 1934. In *Sardinia* MORIS st: sard: I. p. 2.).

4. *N. pygmæa* = Ait: h. Kew: ed: 2. vol: 3. p. 293. (*China*, *Sibiria* orient:, *Dahuria* FISCH:). Specim: ex cl: FISCHERIO missum sub nomine *N. tetragonæ* GEORGI et in *Dahuria* lectum quadrat cum descript: SALISE: in DC. syst: II. 58. Certum igitur *N. pygmæam* AIT: *tetragonam* GEORGI et *Castalianam* pygmæam SALISE: ad eandem plantam pertinere.

III. NUPHAR Smith Prodr: fl: græc: I. 361. = *Nymphææ* species L.

Obs: Genus vix a *Nymphæa* distinctum cal: 5-6-sepalo, et fructu quasi supero ob insertionem peta-

lorum staminumque ad basim receptaculi. Spec: 6.
ex DC., 7. ex SPR:

* 1. *N. luteum* = Smith l. c. = Spr: syst: II. 606.
= Fl: dan: t. 603. sub *Nymphæa*. Ic: taur: vol. 20.
t. 22. Vern: *Ninfea giauna* (Eur:, Asia, Amer:
bor: In *Pedemont*: ad lacus, frequentius in fossis
majoribus ALL: n. 1933. In oryzetis BIROL: fl: acon:
I. p. 180. In aquis lente fluentibus rivuli *Mores*
Sardiniae MORIS st: sard: I. p. 2.).

Obs: circa *Nymphæaceas*.

Nymphæaceæ per totum orbem sparsæ ex DC. 32.

Nymphæaceæ pedemontanæ

<i>Nymphæa</i>	I.
<i>Nuphar</i>	I.
								—
								2.

Sic *Nymphæaceæ* pedemontanæ ita se se habent
ad *Nymphæaceas* totius orbis, ut n. 2. ad 32. et vix
quinquagesimam partem attingunt.

ORDO IX.

PAPAVERACEÆ

(Juss: gen: 235. = DC. syst: II. 65. Prodr: I. 117. = J. S. Hill: fam: I. 495. t. 69.).

Char: essent:

» *Cal:* 2-sepalus deciduus. *Pet.* saepius 4. crudiata, rarius dupli vel triplici serie 8-12., rarissime nulla. *Stam:* polyandra seriatim disposita, rarius 4. serie unica petalis opposita. *Stylus* brevis aut saepius nullus. *Stigm:* plurima patentia super ovarium stellatim disposita. *Caps:* ovata aut elongata constans carpellis plurimis coalitis. *Semina* in unoquoque carpello plurima rarissime solitaria exarillata. *Album:* carnoso-oleosum. *Embr:* minus ad basim albuminis rectus. »

Obs: Ordo valde naturalis habitu, fructificatione, et virtutibus, succo præcipue quo foetæ sunt plantæ in eo contentæ; recte affinitate collocatum a DC: inter *Nymphaeaceas* et *Fumariaceas*. Herbæ vel raro suffrutices 9 generibus constantes in ordine sexuali ad polyandriam spectantibus, excepto *Hypecoo*, quod tetrandrum et *Fumariaceas* contingens.

I. PAPAVER Lin: gen: 648. = Lam: ill: t. 451.

» *Pet:* 4. *Stam:* polyandra. *Ovarium* 1. ovatum stigmatibus 4-20. sessilibus coalitis radiatim coronatum. *Capsula* 1-locularis apice sub stigmatibus

» persistentibus in tot foraminibus quot stigmata
» hians, placentis valvaribus. »

Obs: Organæ fœmineæ valde dubia quoad numerum: LINNÆUS, quem adhuc secutus est SPRENGELIUS, unicum stigma radiatum *Papavero* tribuerat, et sic genus monogynum: idem dixerat Juss: qui tamen fructum definiens capsulam admiserat totidem instru-
ctam *receptaculis* quot radii stigmatis, hinc jam su-
spicatus erat *receptacula* fructus distinctos adesse,
quos Cl: DC. demum *Carpella* appellavit; hac hypothesi genus polygynum. Sed id paulo refert in me-
thodo naturali et in differentiis generum hujuscet
familiæ potius a forma stigmatis et fructus quam a
numero pistillorum excerptis. Herbae perenn: vel ann.
foliis plus minusve sectis, pedunculis axillaribus 1-
floris ante florescentiam apice inflexis. E capsularum
superficie *hispida* vel *glabra* duæ emergunt sectiones
26. species sec: DC., 23. sec: SPR: comprehendentes.

Sect: I. *Capsulis hispidis.*

* 1. *P. hybridum* = L. sp: 725. = Spr: syst: II.
569. = Engl: bot: t. 43. Ic: taur: vol: 27. t. 108.
(*Europa. Pedemont:* circa arcem *la Brunetta*: inter
segetes *Uneliæ* ALL: n. 1064. Ad foveas graniti *di*
Baveno abundans BIROLI fl: acon: I. p. 179. In arvis
Sardiniae MORIS st: sard: I: p. 3.). Ann: Pet: punicea
ungue nigricante.

* 2. *P. Argemone* = L. sp: 725. = Spr: syst:
II. 569. = Engl: bot: t. 643. Ic: taur: vol: 16.
t. 75. (*Europ: Pedem:* inter segetes montium non
infrequens ALL: n. 1066. Inter *Venariam* et *Lucengo*

prope ædem S. *Pancratii*, prope la *Molinetta* atque generatim in arvis calidioribus, RE fl: torin: I. p. 276. In arvis sabulosis *della Lumellina* et *di Cerano* BIROLI fl: acon: I. p. 179. Inter segetes *Sardiniae* mediæ MORIS st: sard: I. p. 3.). Ann: Pet: pallide coccinea, basi macula nigra notata.

3. *P. nudicaule* = L. sp: 725. (*Eur: septent:*, *Sibir:*). Peren. Pet: flava, rarius albida vel rubro-aurantiaca in var: δ ex FISCHERIO. Variat quoque foliis hirsutis vel glabris. Huc pertinet sec: SPR: *P. microcarpum* DC. syst: II. 71. mihi ignotum.

* 4. *P. pyrenaicum* = W. en: 563. in not: = SPR: syst. II. 569. = Baw: ic: t. 764. pro var: α sub *Argemone lutea* (*Pyren:*, *Gall:* austr: *Pedem:* ad diffractos scopulos in monte *Vermellina* supra *Limonc* ALL: n. 1067 sub *P. alpino*, in agris *Monregalensis* ALL: auct:). Peren: Variat pet: luteis, vel puniceis unguibusque concoloribus aut nigrantibus. Species confusa ab ALL. aliisque botanicis cum *P. alpino* L. sp: 725. quod in *Pedemontio* spontaneum esse valde dubito, quidquid dicat BIROLIUS illud invenisse in valle *d'Angasca* nec deesse in monte *della Rosa*. Specimina Biroliana cum nostris ex BALBISIO et MOLINERIO comparata non differunt: hæc autem pertinent ad *Argemonem pyrenaicam* L. sp: 728. (*Papaver* W.), non ad *P. alpinum* eiusdem auctoris, de quo iconem habemus in JACQ: fl: austr: t. 83.; folia enim non reapse 2-pinnatifida, sed tantum pinnati-loba, lobis inferioribus 3-partitis, lobulis ovato-oblongis obtusiusculis, nec linearibus aristatis. Circa allatam confusionem cons: DC. syst: II. 72.

Huc pertinet fortassis *P. aurantiacum* LOISL: juxta opinionem CANDOLEI l. c. non ad *P. orientale* sec: STEUD: , lobuli enim *obtusiusculi*, sed statura valde humilior. Specim: meum ex PERRET vix pollicare etsi perfectissimum.

Sect: II. *Capsulis glabris.*

* 5. *P. Rhæas* = L. sp: 726.. = Spr: syst: II. 569. = Engl: bot: t. 645. Ic: Taur: vol: 8. t. 33. (*Europ: In Pedem:* inter segetes ubique ALL: n. 1068. In *Sardinia* MORIS st: sard: I. p. 3.). Ann: Variat colore et plenitudine florum aliisque modis a DC. enumeratis in syst: II. 76. 77. Vid: infra n. 11. ; var: fl: albo in agris prope *Villafranca* ad Padum occurrit.

* 6. *P. dubium* = L. sp: 726.. = Spr: syst: II. 569. = Engl: bot: t. 644. (*Europ: Pedem:* in agris *Pineroliensibus* ALL: n. 1065. In agro *Pedemontano* non infrequens. In comitatu *Nicæensi*, ubi variat fl: albo ALL: auct: In campis sabulosis *Ticinum* versus, BIROL: fl: acon: I. p. 179. In pascuis prope *la Molinetta* RE fl: Torin: I. p. 276. In arvis *Sardiniae* MORIS st: sard: I. p. 3.) Ann: Variat uti prius.

7. *P. obtusifolium* = Desf: fl: atl. I. 407. (*Afr: bor: Sardinia* inter segetes MORIS st: sard: I. p. 3.). Ann: Specim: in *Ægypt:* lecta a BERT ex BELLAR: perfecte quadrant cum exemplaribus sardois ex MORISIO; flores rosei. = 8. *P. setigerum* = DC. fl: fr: 5. p. 585. (*Insulis Staechadum.* In *Sardinia* inter segetes MORIS st: sard: I. p. 3.) Ann: Flores violacei. = 9. *P. somniferum* = L. sp: 726. (*Græcia, Asia*

min: , *Ægypt:*). Ann: Variat quammaxime , præser-
tim colore et plenitudine florum. Cons: DC. syst:
II. 81. 83. Ubique cultum tam ornamenti gratia ,
quam ad oleum e seminibus eliciendum , pro quo
præfertur var: β seminib: petalisque albis. = 10. *P.*
orientale = L. sp: 727. (*Asia* min: , *Caucas:*). Pe-
ren: Flores magni elegantissimi sanguinei unguibus
petalorum nigrescentibus. Varr: fl: pleno majori vel
minori, petalis 3-6 coluntur in hortis ad ornamen-
tum. Huc pertinet sec: SPR: *P. bracteatum* LINDL:
coll: t. 23. Differentiæ a cl: auctore allatae et a DC.
Prodr: I. 119. probatæ non tanti mihi videntur ad
stirpem distinctam constituendam ; etiam in varr: *P.*
orientalis pili occurrunt *patentes* vel plus minusve
adpressi. *P. bracteati* inter alia exemplaria unum pos-
sideo ex HUGUENIN florem gerens diametro palmari.

Papavera dubia.

11. *P. sinense* ? = Thb: mss: Specimen habeo
ex hb: BELLARDI ita notatum in scheda = *Papaver*
sinense ex seminib: a D. THUMB: missis habui ex
PASCHAL: = Nullibi inveni enumeratam hanc stir-
pem quae herba et fructu valde accedere videtur *P.*
Rhaedii: petala et sepala desunt; ceterum planta spi-
thamea. *Caulis* simplex; *folia* inferiora sub-lyrata
lobis inciso-dentatis dentibus obtusiusculis, superiora
pinnatifida laciniis infernis profundis acute-dentatis ,
supernis brevibus subintegris, extrema longiora aeu-
minata , omnia pilis adpressis adspersa ; *pedunculus*
1-florus pilis patulis; *capsula* glabra obovata 3-lin:
longa 2-lata *stigmatibus* 10-12 coronata. *P. Rhaeas*

teste THB: fl: jap: 322. crescit in Japonia; nec varr: nec *P. sinense* memorat cl: auctor; hinc valde dubito plantam nostram insignem var: *Rhæadis* constitueret. Vid: sup: n. 5.

II. ARGEMONE: Lin: gen: n. 649 = Lam: ill. t. 452.

» *Cal*: 2-3-sepalus pilis aculeiformibus asperatus.
» *Pet*. 4-6. *Ovar*: 1. *stigmatibus* 4-7. subsessilibus
» liberis radiatim coronatum. *Capsula* 1-locularis val-
» vulis apice dehiscens, placentis linearibus. »

Obs: Genus vix a *Papavero* distinctum characteribus supra allatis, constans unica specie annua succo flavescente, foliis sessilibus sinuatis, pedunculis axillaribus semper erectis.

1. *A. mexicana* = L. sp: 727. (*Mexico, Carolina, Asia calidior:?*). Var: fl: flavis albidisve in hortis culta.

III. STYLOPHORUM = Nutt: gen: am: n. 361. = Vig: diss: p. 42. f. 3. sub *Meconopside*. = *Papaveri, Argemones, et Chelodonii* sp: auctorum.

» *Cal*: 2-sepalus. *Styl*: distinctus. *Stigmata* 4. libera.
» *Caps*: *Argemones* placentis in membranulas produ-
» ctis. »

Obs: Genus medium inter *Papaver* et *Argemonem* 4. speciebus constans a DC. relatis sub *Meconopside* et in duas sectiones divisus *Meconopsis* sc: et *Stylophorum*, a SPR: autem conjunctis sub solo *Stylophoro*. Genera haec tam affinia, ut melius fuisse omnia distinctis sectionibus ad *Papaver* amandare. Herbæ perennes, succo flavescente, foliis pinnatisectis, pedunculis ante florescentiam inflexis.

1. *St. cambricum* = Spr: syst: II. 570. (*Cambria,*

Pyreneis, Gallia merid:). Flores flavo-sulphurei: in hortis cultum.

IV. **SANGUINARIA** Lin: gen: n. 645. = Lam: ill: t. 449.

» *Cal.* 2-sepalus. *Pet:* 8. 12. *Stigmata* 2. sessilia basi connata. *Caps:* 1-locularis 2-valvis plan-centis 2. persistentibus. »

Obs: Genus præcedentibus valde affine, sed satis distinctum numero partium floralium, forma fructus, et habitu, quo solo inspecto magis accederet ad *Podophyllum*. Species unica, peren:, succo sanguineo, folio sub-unico radicali, scapo: 1-floro.

1. *S. canadensis* = L. sp: 723. (*Amer: bor: J.* Flores albi, quandoque pleni, interdum folia 2. Radix tuberosa sæpius horizontalis (*Truncus subterraneus* DC.).

V. **BOCCONIA** Lin: gen: n. 591. = Lam: ill: t. 394.

» *Cal:* 2-sepalus. *Pet:* o. *Stam:* 8. 24. ordine quaterno seriatim disposita. *Stylus* brevissimus. » *Stigm:* 2. revoluta. *Caps:* compressa 2-valvis basi dehiscens 1-sperma. *Sem:* imæ capsulæ adfixum. »

Obs: Genus herba *Papaver* æmulans, sed fructificationis partibus et inflorescentia praesertim valde diversum, constans 3. stirpibus hexoticis. Frutices vel raro herbæ perennes, succo flavescente, foliis glaucis sæpius incisis, floribus terminalibus paniculatis.

1. *B. frutescens* = L. sp: 634. (*Mexico, Peruvia, Cuba*). Panicula magna, flores herbacei parvi. Cult: in h. Ripul: calid: , ubi biennis potius quam perennis evadit, scilicet quo anno floret moritur.

VI. *Glaucium* Tourn: iust: 254. = Lam: ill: t: 450. f.
2. = *Chelidonii* sp: Lin:

» *Cal*: 2-sepalus. *Pet*: 4. *Stam*: polyandra. *Stig-*
» *ma* sessile capitato-2-sulcum. *Caps*: siliquæformis
» 2-3-4-valvis apice dehiscens 2-locularis polysper-
» ma. *Sem*: scrobiculata. »

Obs: Genus a præcedentibus valde distinctum præ-
sertim fructus structura; species 8. ex DC. inclusa
Roemeria, 6. ex Spr: a *Chelidonio* distractæ. Herbæ
annuæ vel bien:, succo croceo, foliis pinnatim inci-
sis, pedunculis axillaribus terminalibusque solitariis.

* 1. *Gl. luteum* = Scop: carn: I. 369. = Spr:
syst: II. 571. = Engl: bot: t. 8. Ic: taur: vol: 23.
t. 78. sub *Gl. flavo* (*Eur*: med: *Pedem*: in arenosis
et sterilibus locis maritimis; secus *Burmidam* in
Aquensi territorio; juxta *Scriviam* in agro *Dertoniensi* ALL: 1062. In arenis maritimis *Sardiniae* Mo-
RIS st: sard: I. p. 3. sub *Gl. flavo*). Bien:

* 2. *Gl. phœniceum* = Grantz austr: II. p. 141.
= Spr: syst: II. 571. = Engl: bot: t. 1433. (*Gallia*,
Anglia. In agro *Nicæensi* inter segetes ALL: n. 1063.
Sardinia in pascuis *S. Elia* Moris st: sard: I. p. 3.
sub *Gl. corniculato*). An: Variat fl: *phœnico* vel
flavo; hoc nunquam inveni: repertum fuit a STE-
VEN: in *Tauria* sec: DC. syst: II. 97. Plantæ cultæ
in h. Ripul: habent folia glabra amplexicaulia, et
brevi tantum sinuata sinubus apice mucronulatis,
nec pinnatifidis, ita ut magis accedant ad *Gl. luteum*.
An *Gl. fulvum* Sm: a SPR: tamquam sola var: *lutei*
consideratum? Cons: DC. syst: II: 95. 96. cuius de-

scriptio quadrat cum plantis meis. Ceterum allatæ tres species vix differunt inter se.

3. *G. violaceum* = Smith fl: brit: 565. (*Anglia*, *Eur:* austr:). Ann: Variat pube, et florum colore plus minusve violaceo. *Roemeriae* genus MEDIC: nec aliorum ad quod pertinet species hæc sec: DC. syst: II. 92. sub *R. hybrida* rite *Glaucio* fuit conjunctum a SPR: l. c.; differt enim tantum numero valvularum in capsula. Valde tamen dubito *Chelidonium hybridum* L. sp: 724. ad *Gl. violaceum* SMITH: cum quo ab auctoribus confusum fuit, pertinere. Specimen ex hb: BELLARDI nomine *Gl. violacei* prima facie distinguitur a specim: *Chelidonii hybridii* ex hb: BIROLI planta humiliori, foliorumque laciniis tenuioribus ac fere capillaribus. An var: *insignis* a DC. omissa l. c.?

VIII. *CHELIDONIUM*. C. Bauh: pin. 144. = Lam: ill: t. 450. f. 1. = *Chelidonii* sp: Lin:

» *Caps:* 2-valvis basi dehiscens 1-locularis. *Sem:*
» supra umbilicum cristata. Cetera ut in *Glaucio*. »

Obs: Genus allatis characteribus vix a *Glaucio* distinctum: habitu tamen etiam diversum, inflorescentia præsertim et statura inspectis. Spec: 5. ex DC., 2. ex SPR:

* 1. *Ch: maius* = Mill: dict: n. 1. = Spr: syst: II. 570. = Oed: fl: dan: t. 676. Ic: taur: vol: 3. t. 71. (Tota Eur: In Pedem: ad sepes et muros frequentissimum ALL: n. 1061. In Sardinia MORIS st: sard: I. p. 2.). Huc pertinet sec: SPR: *Ch: laciniatum* MILL: sc: *Ch: majus* var: β L., et *grandiflorum* FISCH: varr: speciosæ, quarum prima in Germania et

Austria, altera in *Dahuria* crescunt. Nostrum est
Ch: majus var: α L.

VIII. HYPECOUM Lin: gen: n. 171. = Lam: ill: t. 88.

Cal: 2-sepalus minimus. *Pet:* 4. inæqualia inter-
» riora sub-3-loba. *Stam:* tetrandra. *Ovar:* elonga-
» tum. *Styl:* 2. brevissimi. *Caps:* siliquæformis 2-
» valvis articulata articulis 2-spermis. »

Obs: Genus a ceteris *Papaveraceis* distinctum numero staminum; hinc ad *Chelidonia*, illinc ad *Fumariaceas* et *Cruciferas* accedens, 6. speciebus constans fere omnibus europeis, annuis, humilibus, succo flavo, foliis pinnatisectis, floribus terminalibus solitariis.

* 1. *H. procumbens* = L. sp: 181. = Spr: syst: I. 491. = Lam: ill: t. 88. (Eur: austr: In olivetis circa *Albengam* et in *Liguria* sec: BALBIS misc: bot: 13. In arvis *Sardiniae* MORIS st: sard: I. p. 3.). Siliquæ arcuatæ patentes articulatæ.

2. *H. erectum* = L. sp: 181. (Sibir:). Siliquæ erectæ vix articulatæ.

Obs. geographica circa Papaveraceas.

<i>Papaveracearum</i> species sec: DC: sistunt nu-	
mero	54.

Papaveraceæ pedemontanæ.

<i>Papaver</i>	5.
<i>Glaucium</i>	2.
<i>Chelidonium</i>	1.
<i>Hypecoum</i>	1.
	9.

Sic *Papaveraceæ* pedemontanæ ita se se habent ad *Papaveraceas* totius orbis uti 9. ad 54. et sextam partem constituunt.

ORDO X.

FUMARIACEÆ

(DC: syst: II. 105. Prodr: II. 125. =
Papaveracearum gen: Juss:).

Char: essent:

» *Cal:* 2-sepalus deciduus parvus. *Pet:* 4. cruciata
 » saepius irregularia sc: 1. 2. basi calcarata vel gib-
 » ba, libera vel varie coalita. *Stam:* 6. diadelpha.
 » *Styl:* 1. *Stigm:* 2-lamellatum. *Fructus* capsularis
 » 1-locularis 2-valvis 1-2-poly-spermus. *Sem:* pla-
 » centis lateralibus adfixa. *Album:* carnosum; *Embr:*
 » basilaris rectus vel subarcuatus. »

Obs: Ordo jam unicum genus comprehendens, *Fumariam* scilicet inter *Papaveraceas* a Juss: colloca-tam, ex qua transitus ad *Cruciferas*: nunc a cl: CAN-DOLEO divisus in 6. genera habitu conformia, in me-thodo sexuali ad Diadelpham hexandram pertinentia, et vix distincta petalorum et fructus structura (DC. syst. II. 107.). Herbæ annuæ vel perennes succo aqueo fœtæ.

I. *CORYDALIS*. Vent: Pers: Ench: II. 268. = Lam: ill:

t. 597. f. 3. = *Fumariæ* sp: L., = *Diclytræ*, *Adlumiæ*, et *Corydalis* sp: DC.

» *Cor:* ringens basi 1-2-calcarata constans pet:
» 4. plus minusve coalitis; *filamenta* in duas pha-
» langes distincta 3. antheras gerentes coalita. *Sili-*
» *qua* 2-valvis polysperma dehiscens. »

Obs: Genus a sequentibus satis distinctum structu-
ra, sed *Diclytræ* BORCKH et *Adlumiæ* RAF: nimis af-
fine, inde recte a SPR: conjunctum, et in duas se-
ctiones divisum inspecta corolla 1 - vel 2 - calcarata.
Herbæ radicibus fusiformibus tuberosis vel fibrosis,
caule simplici vel ramoso, foliis binis paucis vel
plurimis.

Sect. I. Corolla 1-calcarata (*Corydalis* DC.)

†† *Radice tuberosa, caule simplici, foliis paucis*
alternis (*Capnites* DC.).

1. *C. pauciflora* = Pers: enh: II. 269. (*Sibir:*,
mont: *altaicis*). Peren: Variat racemis paucis vel
multis sc: 7-8-floris (*C. aquilegiifolia* PATR: sec: DC.
l. c.). Specim: meum ex FISCHERIO ad hanc va-
rietatem a SPR: omissam spectat, et foliorum lobos
refert *muticos*, non *mucronatos* uti in diagnosi SPR:
An hac nota differt etiam a typo quem non vidi?

* 2. *C. bulbosa* = Pers: enh: II. 269. = SPR:
syst: III. 160 non DC. = Bot: Mag: t. 232. et 2340.
Ic: taur: vol: 5. t. 1015. sub *Fumaria* (*Eur:*, *Asia*
bor: Ad sépes arvorum in *Sabaudia*, in *Pedemontio*,
etiam similibus locis, et in sylvis, collibus et mon-
tibus primovere frequens ALL: n. 1083. Prope
l. *Idraulica* et il. *Parco RE* fl: torin. 2. p. 3. In ne-

moribus collium vulgaris BIROL: fl: acon: II. p. 23.).
Peren: Variat fl. purpurentibus vel albidis.

3. *C. fabacea* = Pers: enh: II. 269. (*Europ:*).
Peren:

* 4. *C. Halleri* = W. en: 740. = Spr: Syst: III.
160. = Fl: dan: t. 1224. sub *Fumaria* (*Eur:*, *Tauria*,
Sibir: In *Pedem:* BALBIS misc: bot: 35.; in Monte
Cenisio RE fl: segus: p. 59. Ad radices montium vallis
di Vegezzo non frequens BIROL: fl: acon: II. p. 23.).
Peren: Variat præsertim florib: purpureis vel viride-
scentibus (*Fumaria viridiflora* MORIS: hist: 2. s. 3.
p. 261. t. 12. f. 7.). Nostra pertinet ad primam,
ad quam forsitan referenda *C. densiflora* PRESL:, non
Fumaria densiflora DC. iuxta opinionem SPR: c. p.
264. Utique in exemplari meo ex GUSSONE seg-
menta foliorum potius *ovata* quam *oblonga* nec
glauca ut in *C. Halleri*, ceterum tamen omnino si-
millima etiam in forma racemi. Adde *C. Halleri*
cum præcedentibus n. 2. 3. a L. sub *Fumaria bul-*
bosa conjunctam fuisse sc: n. 2. var: α n. 3. var: β
n. 4. var: γ .

5. *C. bracteata* = Pers: enh: II. 269. (*Sibir:*).
Peren: Racemi 6-7-flori; flores ex sicco flavi. Spe-
cim: ex FISCHERIO in *Dahuria* lecta quadrant cum dia-
gnosi SPR: et descriptione DC: syst: II. 121., ex-
ceptis foliorum lobulis, qui potius *lanceolati* quam
lineares. = 6. *C. nobilis* = Pers: enh: II. 269. (*Sibir:*).
Peren: Racemi multiflori; flores albido-fla-
vescentes fauce nigra.

+++ *Radice fibrosa, foliis caulinis plurimis alternis (Capnoides DC.)*.

7. *C. glauca* = Pursh: fl: am: bor: II. 463. (*Canada*). Ann: Racemi laxi 7-8-flori; flores luteo-rubri. Cult. in hortis sub nomine *Fumariæ semper-viventis* L. = 8. *C. aurea* = W:en: 740. (*Amer: bor:*). Ann: vel bien: Racemi terminales et oppositifolii 8-12-flori; flores aurei.

* 9. *C. capnoides* = Pers: enh: II. 270. = Spr: syst: III. 161. = Pluk: alm: t. 90. f. 2. sub *Fumaria*. Ic: Taur: vol: 20. t. 91. (In fissuris rupium Eur: mediæ et australis. Visa est in montibus editioribus comitatus *Nicæensis* ALL: n. 1084.). Perenn: Racemi terminales et oppositifolii multiflori, flores parvi albi (*Fumaria capnoides* L. sp: 984), vel *lutei* (*F. lutea* Mant: 258.). Specim: mea ex MOLINERIO pertinent ad primam varietatem, alia ex BERTERO ad secundam, floresque habent duplo maiores.

10. *C. claviculata* = DC. fl: fr: IV. 638. (*Germany, Anglia, Dauria*). Ann: , tenerrima. Racemi terminales, pauciflori, flores parvi subflavescentes.

Sect. II. Corolla 2-calcarata (*Diclytra* et *Adlumia* DC.).

11. *C. formosa* = Pursh: fl: bor: am: II. 462. (*Amer: bor:*). Perenn: Racemi 5-7-flori; flores ampli rubicundi. Specim: ex HUGUENIN ex planta culta refert racemos floribus secundis subnutantibus 4-5-lin: longis, ex sicco roseis apice rubris: desunt fructus. = 12. *C. fungosa*. = Vent: choix p. et t. 19. (*Amer: bor:*). Bienn: tenerrima. Herba accedit ad *C. claviculatam* n. 10.: sed flores 2-calcarati, ampli,

pallide subrosei. Cult: in H. B. T., ex quo specimina mea sine fructu.

Corydales dubiæ.

13. *C. minima?* = Birol: hb: ex W. Herba tenella glaberrima glaucescens, habitu *Corydalis*, sed fructu *Hypecoi*. Specim: unicum ex BIROLI sine flore habet caulem simplicem exsquamatum vix 3-pollicarem 3-phyllum: folia alterna, petiolata, binternatim secta, petiolos sc: longos apice tantum divisos, segmenta petiolata 3-secta, segmentula 3-fida, lobulos ovato-oblongos obtusos; pedunculos oppositi-folios 2-floros ebracteatos; siliquas teretiusculas erectas articulatas, diam: 1/2 lin:, long: 3-4. lin: ut in *Hypecoo. erecto*, sed stylo unico persistenti acuminato. An genus medium inter *Hyecoum* et *Fumariam?* an alterutrius species nova?

II. CYSTICAPNOS Boerh: lugd: 391. = Gaertn: fruct: 2.
161. t. 115. = *Fumariæ* sp: LIN:

» *Caps:* vesicaria 2 - valvis polysperma delicens, » placentis reticulis membranaceis connexis. Cetera » ut in *Corydalide.* »

Obs: Genus vix à *Corydalide* distinctum, unicam sequentem speciem continens ad *Fumariam vesicariam* a L. relatam.

1. *C. africana* = Boerh: l. c. (*Afr: austr:*). Ann:
Flores racemosi, parvi, albidi.

III. FUMARIA Lin: gen: n. 760. == Gaertn: fruct: 2. 162.
t. 115.

» *Caps:* globosa vel compressa (*caryops:* SPR:; DC.)
» unilocularis evalvis monosperma indehiscens; cetera
» ut in *Corydalide.* »

Obs: Genus a præcedenti distinctum fructus struc-
tura externa et interna, constans 10. spec: ex DC.,
7. ex SPR:, in duas sect: divisum, inspecta capsula
globosa vel *compressa*.

Sect. I. .

Capsulis globosis (*Sphærocapnos* DC.)

* 1. *F. officinalis* = L. sp: 984. == Spr: syst: III.
159. == Engl: bot: t. 589. Ic: Taur: vol. 5. t. 111.
(In locis cultis totius fere orbis. Ad muros secus arva
locis præcipue siccis ubique in *Pedem:* vulgatissima
ALL: n. 1085. Re fl: segus: p. 58. et fl: torin: 2. p. 3.
In agro *Novariensi* hortos et cerealia inhabitat BI-
ROLI fl: acon: II. p. 23. *Sardiniae* arvis MORIS st: sard:
I. p. 3.). Ann: Flores rosei apice sanguinei.

* 2. *F. capreolata* == L. sp: 985. == Spr: syst:
III. 159. == DC. ic: rar: t. 34. (*Eur:* austr: In *Pedem:*
inter *la Prea* et *Rastello*, et prope *Ormeam* in *Li-*
guria ALL: auct. 1086. In *Sardinia* ad sepes MORIS
st: sard: I. p. 3.). Ann: Flores albidi apice atro-pur-
purei.

* 3. *F. parviflora* == Lam: dict: II. 567. == Spr:
syst: III. 159. == Engl: bot: t. 590. Ic: Taur: vol. 5.
t. 117. (*Angl:*; *Eur:* austr: Secus arva *Niceænsia* ex

ALL: n. 1086. sub *F. spicata*. In arvis pinguis et in hortis agri *Taurinensis* RE fl: torin: 2. p. 4. In *Sardiniae* arvis MORIS st: sard: I. p. 3.). Ann: Flores albidi; affinis admodum *F. officinali* n. 1. a qua distinguitur tantum laciniis foliorum angustioribus, omnibusque partibus paullo minoribus. Stirps jam-dudum confusa ab ipso eximio ALLIONIO cum *F. spicata* L. sp: 985., quam indigenam numquam vidi, quidquid dicat BIROLIUS vulgarem esse in arvis pinguis agri *Novariensis*. Omnes forsitan errore ducti fuerunt a mala icone BARREL: t. 41. in qua desunt fructus. Vera *F. spicata* capsulas habet compressas; in *F. parviflora* (*F. spicata* var: β L. syst: ed: 13. p. 470.), sicuti in nostris, sunt evidenter globosæ: habitu etiam diversæ. Primus errorem detexisse videtur cl: RE in Fl: Tor:

4. *F. media* = Loisl: not: p. 101. (In agris oleaceisque *Europæ*). Ann: Ludit inter *F. officinalem* et *capreolatam* ad quarum primam cl: SPR: illam refert (syst: III. 159.). Admittit tamen *F. Vaillantii* tamquam speciem distinctam etsi magis accedat ad *F. officinalem*, quam ad *F. medium* foliorum laciniis omnino linearibus et habitu: in hac laciniæ sunt constanter ovato-lanceolatae et petioli quandoque cirrhosæ. Cons: insuper observat: DC. l. c. = 5. *F. Vaillantii* = Loisl: not: p. 112. (*Silesia*, *Germ*: occid:, *Gallia* med: In arvis *Cagliari* MORIS st: sard: I. p. 3.). Ann: Media inter *F. officinalem* et *parvifloram*; flores intense purpurei.

Obs: geographica circa *Fumariaceas.*

Fumariaceæ per totum orbem sparsæ 53

Fumariaceæ pedemontanæ.

<i>Corydalis</i>	3
<i>Fumaria</i>	3
									<hr/> 6

Sic *Fumariaceæ* pedemontanæ ita sese habent ad *Fumariaceas* totius orbis uti n. 6, ad 53. et octayam partem + 4 constituunt.

ORDO XI.

CRUCIFERÆ

(Juss: gen: 237. = DC. syst: II. 139. Prodr: I. 131.
= J. S. Hill: fam: nat. I. 499. t: 70.)

Char: essent:

» *Cal:* 4-sepalus. *Pet:* 4. sepalis alterna in crucem
» disposita saepius unguiculata et æqualia, rarius 2.
» exteriora majora, rarissime abortu evanida. *Stam:*
» 6. tetradynama rarius (abortu?) 4. vel 2. *Torus*
» glandulas varias inter petala et genitalia gerens.
» *Styl:* 1. *Stigm:* 2. patentia vel approximata. *Fructus*
» siliquosus vel siliculosus 2-locularis 2-valvis, ra-
» rius 1-locularis evalvis. *Sem:* in quoque loculo ad
» utramque placentam adfixa exalbuminosa. *Embr:*
» curvus. *Cotyled:* super radiculam diversis modis
» pronæ. »

Obs: Ordo inter omnes naturalissimus integrum
LINNEI *Tetradynamicæ* classem comprehendens ac 1000,
circiter species sistens inter se maxima affinitate con-
nexas; hinc, Botanicis summis fatentibus, classificatio
methodica difficillima et summopere ambigua. Persu-
darunt GAERTNERIUS BROWNUSQUE in eruendis charac-
teribus e seminum structura interna ac præsertim e situ
radiculæ et cotyledonum, atque eadem secutus ele-
menta majus opus perfecit cl: CANDOLLEUS. Ingentissi-
mum, fateor, hunc esse laborem, sed tot tantisque

difficultatibus exceptionibusque subjectum (a), ut simpliciores divisiones, etsi forsan quandoque minus naturales, e fructus fabrica institutas præferre conatus fuerim, exemplo SPRENGELII, qui in nonnullis subdivisionibus tantum radiculam cotyledonesque consideravit; de his utar pro characteribus genericis.

TRIB: I.

Fructibus indehiscentibus (Synclistæ Spr:)
+ *Fructibus 1-spermis.*

I. *NESLIA* Desv: journ: 3. p. 162. 163. = Gaertn: fruct: II. 285. t. 141. sub *Rapistro*. = *Myagri* sp: L. (Inter *Camelineas* DC.).

» *Cal:* æqualis patens. *Pet:* integra æqualia. *Stam:* edentula. *Fructus* globosus intus membrana inter-
» stinctus. *Sem:* subglobosum pendulum. *Cotyl:* in-
» cumbentes. »

Obs: Genus ex unica specie ab Auctoribus inter *Myagra* (LIN:), *Cochlearias* (SCOP:), *Crambes* (ALL:), *Rapistra* (GAERTN:), *Alyssa* (W.) etc. relata.

* 1. *N. paniculata* = Desv: l. c. = Spr: syst: II. 850. = Oed: fl: dan: t. 204. sub *Myagro*. Ic: Taur: vol. 13. t. 102. sub *Crambe* (Eur:, Afr: bor:, Asia med: In agris collium calidiorum Pedemont: frequenter invenit ALL: n. 935. In collibus Taurinens: valle

(a) Cons: GAY observations sur quelques crucifères etc. in ann: sc: nat: 1826. avril p. 389. et bull: univ: 1828. mars p. 340.

di Sassi, et agris Provinceiæ *Segusiensis* RE fl: torin. I. p. 338. sub *Alyssum* et fl: *segus*: p. 53. sub *Myagrum*. In agro *Novariensi* secus vias præsertim *Mediolani* BIROL: fl: *acon*: II. p. 3. sub *Myagrum*. In *Sardiniae* arvis MORIS st: *sard*: I. p. 5.).

II. *CALEPINA* Adans: fam: II. 423. = Ic: generis? (Inter *Zilleas* DC.)

» *Cal*: *erectus*. *Pet*: 2. *exteriora* paullo *majora*.
 » *Stam*: *edentula*. *Glandulæ* 4. *cylindricæ* in *disco*.
 » *Fruct*: *subglobosus* *rugoso-muriculatus* *stylo bre-*
 » *vissimo coronatus*. *Sem*: *pendulum globosum*. *Cotyl*:
 » *incumbentes*. »

Obs: Genus unica specie constans ex DC., 2. ex SPR: , ad varia genera ab Auctoribus relatis, LINNÆO forsitan incognitis, cuius nomen non adest in eorum synonymis.

* 1. *C. Corvini* = Desv: *journ: bot*: 3. p. 158. = Spr: *syst*: II. 850. = Murr: *nov: comm: goert*: 8. 1777. t. 3. sub *Buniade cochlearioide*. Ic: Taur: vol. 22. t. 108. et vol. 13. t. 102. sub *Crambe* (Eur: austr: Passim in *Pedemont*: ad limites agrorum, in vineis, et pascuis collium ALL: n. 937. In vineis prope *Segusium* RE fl: *segus*: p. 57. Prope *Taurinum* in pratis *di Vanchia*, et prope pontem *Padi* RE fl: torin: I. p. 332. sub *Buniade cochlearioide*. Ad vias sabulosas *Lumellinæ* BIROL: fl: *acon*: II. p. 4. In *Sardiniae* are-nosis montanis MORIS st: *sard*: I. p. 4.). Ann:

III. MYAGRUM Tourn: inst: 211. t. 99. = Desv: journ: 3.
p. 160. t. 25. f. 1. (Inter *Isatideas* DC.)

» *Cal:* erectus. *Pet:* oblonga vix calyce majora.
» *Stam:* edentula. *Fruct:* coriaceo-suberosus in lacu-
nas 2. steriles dilatatus. *Sem:* pendulum oblongum.
» *Cotyl:* incumbentes. »

Obs: Genus jam pluribus speciebus constans, nunc
ad sequentem reductum, ceteris ad alia genera con-
junctis.

* 1. *M. perfoliatum* = L. sp: 893. = Spr: syst: II.
350. = Schkuhr handt: 2. t. 178. Ic: Taur: vol. 13.
t. 73. (*Eur:* med: et austr: In agro *Segusino*; inter
segetes collium *Taurinensium* All: n. 938. Re fl: se-
gus: p. 53.). Ann:

† *Fructibus 2-articulatis oligospermis.*

IV. CRAMBE Lin: gen: 825. = Lam: ill: t. 553. (Inter
Raphaneas DC.)

» *Cal:* patens subæqualis. *Pet:* æqualia apice pa-
tentia. *Stam:* majora subfurcata. *Discus* 2-glandu-
losus. *Fruct:* articulo superiori globoso 1-spermo,
» inferiori pidicelliformi abortiente. *Sem:* pendulum
» globosum. *Cotyl:* conduplicatæ. »

Obs: Genus nunc constans 14. speciebus ex DC.,
13. ex SPR: divisis in fruticosas. (*Dendrocrambe* DC.),
perennes (*Sarcocrambe* DC.) et annuas vel biennes
(*Leptocrambe* DC.); in unaquaque sectione conside-
ratur etiam fructus structura quoad formam articuli
inferioris et styli præsentiam vel defectum.

* 1. *C. maritima* = L. sp: 937. = Spr: syst: II. 851. = Oed: fl: dan: t. 316. (Ad litora marium Eur: Ad litus Nicœnse ALL: n. 936.). Perenn:

2. *C. Tataria* = Jacq: misc: 2. p. 274. (*Morav:*, *Hungar:*, *Transylv:*, *Tauria*). Perenn: Variat foliorum lobis oblongo-linearibus (*hungarica* α, *C. laciniata* LAM:), vel sinuatis lobatis (*taurica* β, *C. orientalis* REICH: non L.). Cult: in H. B. T. in quo lecta specim: mea, quæ folia superiora non referunt *decomposita* ut in diagn: Auctorum, sed tantum *pinnatifida* laci- niis inciso-dentatis, superiora non *integra*, sed potius *sublyrata*. An hic varietas altera, vel etiam species distincta? = 3. *C. hispanica* = L. sp: 937. (*Hispan:*, *Lusitan:* In *Sardiniae* maritimis *Bari*, *Tortoli* MORIS st: sard: I. p. 4.). Ann: = 4. *C. filiformis* = Jacq: coll: suppl: 120. (*Patagonia*). Bienn:

V. CAKILE Tourn: inst: 49. = Lam: ill: t. 554. = *Buniadis* sp: L. (Inter *Cakilineas* DC.)

» *Cal:* patens basi 2-gibbosus. *Pet:* æqualia limbo obovato. *Stam:* edentula. *Fruct:* articulo superiore producto semine erecto, inferiori suberoso sub-turbinato semine pendulo. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus constans 3. speciebus ex DC., nunc 7. aliis adiectum disjunctis a *Didesmo* DESV: et *Rapistro* C. BAUH, auctoritate SPRENGELII.

* 1. *C. maritima* = Scop: carn: n. 844. = Spr: syst: II. 852. = Lam: ill: t. 544. f. 1. (In arenosis maritimis *Europ:* In litore *Unelice* et *Nicœa* BALE: addit: sub *Buniade Cakile*. In *Sardiniae* maritimis MORIS st: sard: I. p. 4.). Ann: Var: foliis pinnatum par-

titis (*C. Serapionis* GAERTN.; *Isatis pinnata* FORSK:), vel dentato-sinuatis (β *sinuatifolia*, *C. ægyptiaca* W.).

2. *C. æqualis* = DC. syst: II. 430. (Insul: *Carib*:). Ann: Huc refero hanc stirpem, cuius specimen posse dico a BERTERO lectum in *Guadalupa* sub nomine *Raphani lanceolati* W. eo quod el: SPRENG: huic nec non *Sinapi integrifoliae* W. synon: tribuat *C. æqualis*. Valde tamen dubito, eximium auctorem errore ductum fuisse forsitan specimin: mancis, nam planta mea ex fructu cum genere *Sinapis* non *Cakile* quadrat: insuper DC. refert quidem *Raphanum lanceolatum* W. ad genus *Sinapis*, sed stirpem distinctam credit a *S. integrifolia* W. ceu ejus descriptiones evi-denter demonstrant (syst: II. 611. n. 7. 612. n. 10.).

* 3. *C. perennis* = DC. fl: fr: ed: 3. v. 4. p. 719. non Syst: nec Prodr: = Spr: syst: II. 852. = Jacq: fl: austr: t. 414. sub *Myagro* (*Eur*: med: et austr: In arenosis *Pedemont*: sec: *Sturæ* flumen ALL: n. 941. sub *Rapistro*). Perenn:

* 4. *C. rugosa* = DC. fl: fr: ed: 3. v. 4. p. 719. non Syst: nec Prodr: = Spr: syst: II. 852. = All: fl: pedem: t. 78. sub *Rapistro*. Ic: Taur: vol. 23. t. 11. et vol. 26. t. 60. (*Eur*: med: et austr: In agro *Pedemont*: frequens inter segetes ALL: n. 940. In arvis inter *Venariam* et *Duriam* RE fl: torin: I. p. 330. sub *Myagro*. In *Sardinia* ad sepes et inter segetes MORIS et: sard: I. p. 5. sub *Rapistro*). Ann: Variat fructib: longe stylosis articulo inferiore saepe abortivo (β *stylosa*, *Myagrum stylosum* GOEHNAT:), vel stylo brevi articulo inferiori saepius fertili (γ *venosa*, *Myagrum venosum* POIR:). Nostra pertinet ad primam var:

+++ *Fructibus 2-locularibus.*

VI. *CORONOPUS* Smith fl: brit: II. p. 591. = Lam: ill: t. 558. = *Lepidii et Cochleariae* sp: L. (Inter *Lepidineas* DC. sub *Sennebiera*.)

» *Cat:* patens æqualis. *Pet:* integra. *Stam:* edentula.
 » *Stigm:* sessile. *Fruct:* didymus, subcompressus, ru-
 » gosus vel raro glaber, loculis 1-spermis. *Sem:* pen-
 » dula. *Cotyl:* incumbentes. »

Obs: Genus admissum a DC. in fl: fr:, dein ademptum in Syst: et Prodr:, et species amandatae ad *Sennebieram*, modo restitutum a SPR:, constans 8. speciebus ex *Sennebieris* et *Brachicarpa*.

* 1. *C. Ruellii* = Dalech: lugd: 670. = SPR: syst: II. 853. = Lam: ill: t. 558. (*Europ:* Ad vias in agro *Pedemont:* ALL: n. 934. RE fl: segus: p. 54. et fl: torin: I. p. 336. sub *Cochlearia*. In irriguis *Sardin:* ad vias MORIS st: sard: I. p. 5. sub *Sennebiera Coronopus*). Ann:

2. *C. didymus* = Smith fl: brit: p. 691. (*Anglia, Eur:* austr:, *Amer:* bor:, *N. Holl:*). Ann: Huc pertinent sec: SPR: *Sennebiera pinnatifida*, et *pectinata* DC. Hic autem suspicatur plantas esse *Americæ* incolas in *Europæ* ruderatis migratas. Cons: DC. syst: II. 523. 524. In *Pedemont:* repertum suisce haud scio etsi in *Etruria* invenit SAVI. In speciminibus meis ex BELLARDI sub *Sennebiera didyma* origo omissa: aliud possideo e plantis cultis in H. B. T. in quo laciniæ foliorum sunt valde minores et subintegræ.

VII. *Succovia* Medik: gen: pl: I. p. 64. t. 1. f. 9. =
Buniadis species L. (Inter *Velleas* DC.)

» *Cal:* erectus basi subæqualis. *Pet:* integra. *Fruct:*
 » globosus echinatus stylo subulato coronatus loculis
 » 1-spermis. *Sem:* pendula. *Cotyl:* conduplicatae. »
Obs: Genus unica specie constans a *Buniade* distracta.

i. *S. balearica* = Medik: in ust: nev: ann: I. p. 41. (Ins: *Balear:*, *Tenerif:*, *Sicil:* Ad dumeta in maritimis *Sardiniae* MORIS st: sard: I. p. 5.). Ann: Specimina ex MORISIO perfecte quadrant descript: et ico-nib: Auctorum.

VIII. *Zilla* Forsk: descr: 121. = Gaertn: fruct: II. t. 142.
 f. 2. sub *Buniade spinosa* (Inter *Zilleas* DC.)

» *Cal:* erectus basi æqualis. *Pet:* integra. *Stam:*
 » edentula. *Fructus* sub-globosus suberoso-fungosus
 » stylo crasso conico coronatus, loculis 1-spermis.
 » *Sem:* pendula. *Cotyl:* conduplicatae. »

Obs: Genus vix a *Succovia* distinctum fructu non echinato, styloque conico nec subulato, constans e sola specie sequenti.

i. *Z. myagroides* = Forsk: l. c. n. 74. 75. c: ic: t. 17. A. = *Bunias spinosa* Spr: syst: II. 854. (*Ægypt:*). *Sussrutex varians* fructu majori lœvi (α *macrocarpa*), vel minori rugoso (β *microcarpa*); specimen meum ex hb: BELLARDI lectum in *Ægypto* a DELILE pertinet ad var: β ; planta fere tota aphylla spinis confertissimis.

IX. OCHTHODIUM DC. syst: II. 423. = Gaertn: fruct: II. t. 142. f. 3. = sub *Buniade ægyptiaca* L. (Inter *Euclidieas* DC.)

- » *Cal:* patens. *Pet:* obovata basi attenuata. *Stam:* edentula. *Fructus* coriaceus sub-globosus verrucosus
- » stigmate sessili subapiculatus, loculis 1 - spermis.
- » *Sem:* lateralia. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Species unica ex *Buniade* L.

1. *O. ægyptiacum* = DC. l. c. et Prodr: I. 184. (*Ægypt:*, *Siria*, *Pelopon:*). Ann: Huc pertinet *Myagrum verrucosum* LAM: omissum a SPR: cum quo quadrant specimina a PERRET lecta in *Ægypto*, nobisque humaniter communicata.

X. BUNIAS Lin: gen: n. 737. = Gaertn: fruct: II. t. 142. f. 3.
= pro *Buniade Erucagine* L. (Inter *Buniadeas* DC.)

- » *Cal:* erecto - patens basi æqualis. *Pet:* æqualia.
- » *Stam:* edentula. *Fruct:* nucamentaceus, subtetra-
- » gonus, stylo erecto coronatus, 2-4-locularis, locu-
- » lis 1-spermis. *Sem:* cochleata. *Cotyl:* incumbentes
- » circinnatim convolutæ. »

Obs: Genus jam pluribus, modo 3. tantum speciebus constans ex DC. et SPR:, quarum unam (*B. aspera*) ad *B. Erucaginem* refert SPR:, altera (*B. raphanifolia*) ad *Rapistri* genus amandatur a DC.!

* 1. *B. Erucago* = L. sp: 936. = SPR: syst: II. 854. = Jacq: fl: austr: t. 340. IC: Taur: vol. 10. t. 36. Vern: *Garzavele* (Eur: austr: In *Pedemont:* inter segetes uberrime crescit ALL: n. 939. RE fl: segus: p. 57. et fl: torin: p. 331. BIROL: fl: acon: II. p. 4. In *Sar-*

dinia MORIS st: sard: I. p. 4.). Ann: Fructibus 4-lo-
cularibus, stylo elongato filiformi. Variat foliis ūadi-
calibus *runcinatis* (*B. Erucago* DC.), vel omnibus
lanceolatis (*B. aspera* RETZ: et DC.); hæc dicitur *Lu-*
sitanicæ incola; vidi tamen in plantis pedemontanis
folia radicalia modo (sæpius) runcinata, modo vix
sinuata, modo etiam integerrima.

2. *B. orientalis* = L. sp: 936. (*Creta*, *Græcia*,
Transylv:, *Russia*). Perenn: Fructibus 2-loacularibus
stylo brevi crasso.

++++ *Fructibus siliquæformibus articulatis polyspermis.*

XI. CHORISPORA DC. syst: II. 435. = Pall: itin: 3. app:
n. 105. t. a. f. 3. sub *Raphano tenello* (Inter *Ca-*
kilineas DC.)

» *Cal:* clausus basi subæqualis. *Pet:* æqualia. *Stam:*
» edentula. *Fruct:* teres stylo longo coronatus 2-lo-
» cularis in segmenta 1-sperma discedens. *Sem:* pen-
» dula. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus constans 4. speciebus a *Raphano* se-
junctis.

1. *C. tenella* = DC. l. c. (*Podol:*, *Taur:*, *Sibir:*).
Ann:

XII. RAPHANUS Lin: gen: n. 1098. = Lam: ill: t. 566.
(Inter *Raphaneas* DC.)

» *Cal:* erectus basi subsaccatus. *Pet:* æqualia. *Stam:*
» edentula. *Fruct:* teres coriaceus vel fungosus ro-
» stratus multi-articulatus 1-2 - locularis. *Sem:* pen-
» dula. *Cotyl:* conduplicatae.

Obs: Genus modo stirpibus 9. tantum ex DC., 7. ex SPR: constans, ceteris ad diversa genera amanda-tis. Sectiones 2. ex fructu 2-loculari vel 1-loculari.

Sect. I. Fr: 2-locularis (*Raphanus* DC.)

1. *R. sativus* = L. sp: 935. (*China, Japon:, Asia* occid:). Ann: vel bienn: Ubique in hortis cultus ob radices oleraceas multimode variantes forma, consi-stentia, colore, sapore. Cons: DC. syst: II. 663. 664.

Sect. II. Fr: 1-locularis (*Raphanistum* DC.)

2. *R. caudatus* = L. mant: 95. (*Java*). Ann: Flores ex sicco violacei; fructus 8 - 10. articulati, hinc in rostrum longissimum apice arcuatum abeuntes.

* 3. *R. Raphanistrum* = L. sp: 953. = Spr: syst: II. 855. = Engl: bot: t. 856. Ic: Taur: vol. 10. t. 4. f. 1. et vol. 13. t. 81. sub *Rapistro arvensi* (Tot: *Europ:* In *Pedem:* inter segetes passim All: n. 942. BIROLI, RE. *Sard:* ad sepes *Bono Moris* st: sard: II. p. 1.). Ann: Var: fl: albo, purpurecente vel flavo.

* 4. *R. Landra* = Moretti fl: insubr: ined: = DC. syst: II. 668. = Deless: ic: sel: 2. t. 94. sec: DC. Prodr: I. 229. (*Italia, Insubria.* Inter segetes in pro-vincia *Taurinensi* invenit RE fl: torin: I. p. 349.). Pe-ren: Valde affinis *R. maritimo* cum quo conjunctum a SPR: (Syst: II. 855.); differt tamen floribus omnino *flavis*, fructibus *lævibus* rostro *subulato* articulis lon-giore. *R. maritimus* non invenitur penes nos quod sciam. *R. Landra* forsitan confusum a botanicis nostris cum *R. Raphanistro*; primus enim de eo mentionem fecit cl: RE I. c. etsi communis.

Raphani dubii.

5. *R. Raphanellus* (Schr: indesc:). Sic in scheda hujus plantæ ex hb: BIROLI. Ludere videtur inter *R. Raphanistrum* et *Landram*; sed planta valde *humilior*; folia radicalia lyrata vix *pollicaria* lobo terminali ovato nec *subrotundo* vel *orbiculato*, summa *lanceolata* dentata; racemi *pauciflori*; petala tota *albida*; fructus *dispermi* pedicellis duplo longiores, striati, rostro subulato longitudine articuli superioris. Radix fusiformis annua an perennis?

+++++ *Fructibus siliculæformibus valvatis.*

XIII. CLYPEOLA Lin: gen: n. 723. = Lam: ill: t. 560.
(Inter *Alyssineas* DC.)

» *Cal:* basi æqualis. *Pet:* æqualia integra. *Stam:*
» dentata. *Fruct:* orbicularis compressus subemarginatus 1-locularis 1-spermus. *Sem:* centrale. *Cotyl:* acumbentes. »

Obs: Genus ad sect: † potius referendum, sed hic a SPR: collocatum ob siliculam valvatam: species jam plures, nunc tres, ceteris ad *Alyssum* aliaque genera affinia amandatis.

* 1. *Cl. Jonthlaspi* = L. sp: 910. = Spr: syst: II. 855. = Lam: ill: t. 560. f. 1. (Eur: austr:, Asia med: In agro Nicaeensi ALL: n. 902. sub *Fosselinia*. In apricis collinis Sardiniae MORIS st: sard: I. p. 4.). Ann;

XIV. *ISATIS* Lin: gen: n. 824. = Lam: ill: t. 554. (Inter *Isatideas* DC.)

» *Cal:* patens æqualis. *Pet:* æqualia integra. *Stam:*
 » edentula. *Stigm:* sessile. *Fruct:* oblongus margine
 » alatus vel suberosus planus 1-locularis 1-spermus,
 » valvulis navicularibus sub-dehiscentibus. *Sem:* pen-
 » dulum. *Cotyl:* incumbentes. »

Obs: Genus cum sequentibus hujusce Tribus me-
 dium inter *Synclistas* et veras *Siliculosas* ex fructus
 forma et valvulis *vix dehiscentibus*, constans 18. spe-
 ciebus sec: DC., 14. sec: SPR: in duas sectiones divi-
 sis ratione marginis et dehiscentiæ fructus.

† *Fructibus marginato-alatis indehiscentibus*
 (*Sameraria* DC.)

1. *I. lusitanica* = Brot: fl: Lus: I. p. 560. (*Lusit:*).
 Ann: Planta cum aliis ejusdem nominis ab Auctori-
 bus confusa, hinc admodum dubia: in specim: meo
 ex hb: BIROLI fructus desiderantur.

†† *Fructibus margine suberosis subdehiscentibus*
 (*Glastrum* DC.)

* 2. *I. alpina* = All: fl: ped: n. 944. = Spr: syst:
 II. 856. = All: l. c. t. 86. f. 2. (*Alp:* *cott:*, *Apenn:*
 Locis saxosis in monte *Vesulo* ALL:). Perenn: Figura
 ALL: optima, sed fructus nimis latus, nam in plantis
 viventibus et siccis potius ellipticus quam ovatus ap-
 paret.

3. *I. litoralis* = DC. syst: II. 568. (*Tauria*). Ann: vel perennis? Specim: meum ex BIROLI a STEV: missum vix a sequenti diversum.

* 4. *I. tinctoria* = L. sp: 936. = SPR: syst: II. 856. = Lam: ill: t. 554. f. 1. IC: Taur: vol. 9. t. 45. Vern: *Pastel* (*Eur: austr: Circa Segusium, Vinadium; in valle Augustæ Prætoriæ; circa Pirossasco, monte Vesulo, S. Michele della Chiusa; in Sabaudia, in agro Nicæensi etc.* ALL: n. 943. Obvia in montib: *Javenensib:* et circa Templum S. Michaelis della Chiusa RE fl: segus: p. 57. In Monte *Musiné* RE fl: torin: I. p. 332.). Bienn: Variat foliis glabris vel hirsutis, latioribus vel angustioribus. Culta præsertim in agro *Cheriensi* ad cœruleum colorem Indigoi succedaneum parandum. *I. campestris* STEV: in DC. syst: II. 571. mera varietas *tinctoriæ* floribus minoribus, margineque fructus paullulum diversa, uti appareat etiam ex specim: meis.

5. *I. orientalis* = W. en: p. 663. (In *Oriente*). Ann: Ab *I. aleppica* vix distincta fructu breviori apice stigmate sub-apiculato. = 6. *I. aleppica* = Scop: del: Insubr: 2. p. 31. *I. lusitanica* L. non BROT: sec: SPR: (*Græcia, Asia min:, Syria*. In *Sardin*: arvis di *Terralba, Osici Moris* st: sard: II. p. 1.). Ann: Ico LAM: ill: t. 554. f. 2. differt a specimin: meis foliis latioribus.

XV. BISCUTELLA Lin: gen: n. 808. = Lam: ill: t. 560.
(Inter *Thlaspideas* DC.)

» *Cal:* basi 2-calcaratus vel æqualis. *Pet:* æqualia
» *integra.* *Stam:* edentula. *Fruct:* biscutatus planus

» scutis (loculis) compressis orbiculatis 1-spermis lateraliter axi in stylum longum persistentem distincte adnatis. Sem: compressa. Cotyl: accumbentes. »

Obs: Genus singulari fructus forma distinctissimum constans 25. speciebus ex DC., 21. ex SPR: in duas sectiones divisum ex calyce 2-calcarato vel æquali.

Sect. I.

Calycibus 2-calcaratis (*Joudraba* DC.)

*? 1. *B. hispida* = DC. diss: n. 3. et syst: II. 408. = SPR: syst: II. 857. = DC. diss: ib: t. 1. f. 1. (*Gallia* austr: In apricis montosis *Pedemont*: ex BALBISIO). Ann: Vidi cult: in H. B. T. nec spontaneam in *Pedemont*; differentiae a cl: DC. allatae inter hanc et sequentem non apparent in specimin: meis, si exceptias fructus in *hispida* scabros, in *auriculata* glabros, sed in utraque apice emarginatos nec confluentes; an ergo conjungendæ? Adde nec *ALLIONIUM* nec alios Botanicos nostros de *B. hispida* mentionem fecisse, nisi *BALBISIUM*; credendum ergo, illam comprehendisse sub *B. auriculata*.

* 2. *B. auriculata* = L. sp: 911. = SPR: syst: II. 857. = DC. diss: n. 1. t. 1. f. 2. Ic: Taur: vol. 13. t. 98. (*Eur*: med: et austr:, *Afric*: bor: *Segusii* et comitatu *Nicæensi* ALL: n. 95. In saxosis supra *Forestæ Re* fl: segus: p. 54. In provinciæ *Novariensis* apricis *d'Allagna*, *Scopa* etc. BIROLI fl: acon: II. p. 9.). Ann: *B. erigerifolia* DC. culta in H. Ripul: et *Hispania* incola sec: SPR:

Sect. II.

Calycibus basi æqualibus (Thlaspidium DC.)

* 3. *B. lœvigata* = L. mant: 225. = Spr: syst: II. 857. = Jacq: fl: austr: t. 339. Ic: Taur: vol. 9. tab. 58. sub *B. didyma* (*Eur:* austr: Alpium pratis et sylvarum oris in montanis frequentissima ALL: n. 906. sub *B. didyma*, In pratis macilentis Provinc: Segusianæ, nec non *della Mandria* et *di Druent* RE fl: segus: p. 55. et fl: torin: I. p. 338.). Peren: *B. didyma* Scop: et ALL: non aliorum; synonymum ALL: non citatur nec a DC. syst: II. 413.. nec a SPR:; sed planta nostra perfecte quadrat cum diagnosi Scop: Carn: n. 804. quæ est vera *B. lœvigata* L. l. c. non *B. didyma* ejusdem auctoris.

* 4. *B. coronopifolia* = L. mant: 255. non W. = Spr: syst: II. 857. = DC. diss: n. 22. t. 18. et n. 23. t. 11. f. 1. pro *B. ambigua* (*Eur:* austr: In valle *Bardonache* locis sterilibus siccissimis, et in valle *di Maira* ALL: n. 907. In alpib: editissimis *di Cesana* RE fl: segus: p. 54.). Perenn: *B. ambigua* DC, l. c. mihi non videtur diversa; immo utraque vix differt a *B. lœvigata* foliis magis incisis; ceterum characteres differentiales ab Auctoribus notati saepè occurunt in plantis cultis *B. lœvigatae*.

5. *B. lucida* = DC. diss: n. 20, et Syst: II. 414. (*Regno Neapol:*). Perenn: Tota glaberrima varians foliis *integerrimis* (*B. spathulata* LAM:, BARR: t. 254.) vel *dentatis* (*B. lucida* BALE: hort: Taur: ex quo lecta specimina mea); sed in hac folia potius *lanceolata*

quam *spathulata* uti apparent in ic: BARR:; insuper *glaberrima* et *lucida*, nec *scabra* leviterque *pilis hispida*, uti in observ: ejusdem auctoris p. 39. n. 379. An igitur species distincta?

* 6. *B. saxatilis* = DC. fl: fr: 4. p. 690. = Spr: syst: II. 857. = DC. diss: n. 24. t. 10. (Eur: austr: In *Pedem*: BALE: cl: p. 4.). Perenn: , varians foliis integris vel plus minusve dentatis; a priori vix differt foliis constanter *hispidis*, fructibusque in disco *scabris*.

7. *B. raphanifolia* = Poir: voy: barb: 2. p. 198. (Sicil:, Mauritan:). Ann: Culta in h. Ripul: = 8. *B. lejocarpa* = DC. diss: n. 16. et syst: II. 413. (In Orient:). Ann: Confusa a Spr: cum *B. raphanifolia* longe differt habitu, nec non foliis *subsessilibus*, non longe *petiolatis*, omnibus *lanceolatis* nec radicalibus *lyratis*, caule *hirsutiusculo*, fructibusque minoribus; multo magis accedit ad *B. apulam*. Cult: in h. Ripul:

* 9. *B. apula* = L. mant: 254. = Spr: syst: II. 858. = Lam: ill: t. 560. f. 1. ? (Italia, Sicilia, Græcia. In pratis *d'Intrasca* et *Canobbio* BIROLI fl: acon: II. p. 9.). Ann: Priori valde affinis a qua differt tantum fructu pube minuta *scabro*. Ceterum ico LAM: cum utraque quadrare videtur.

10. *B. lyrata* = L. mant: 354. (Eur: austr:, Afr: bor:). Ann: Ad *B. raphanifoliam* referendam putat cl: GUSSONE cum *laxisflora*, *maritima* et *marginata* (Plant: rar: I. p. 273.); si enim in loco natali observentur et comparentur, certi limites inter illas difficillime inveniri asserit. Specim: mea differunt tamen non solum *hirsutie*, sed *habitu* foliorumque forma. = 11. *B. depressa* = W. enum: 673. (Ægypto). Ann: An

B. maritimæ TENOR: var: juxta opinionem cl: SPR: ? At planta ex hb: BELLARDI a DELIL: lecta in loco natali humiliata, vix 2-pollicaris, foliis omnibus *lanceolatis*, nec radicalibus *lyratis*. Potius *B. pumila* BALE: cat: Taur: 4. = 12. *B. ciliata* = DC. diss: n. 9. sub *B. coronopifolia* W. non L. (Eur: austr: In *Sardinice* pascuis collinis frequens MORIS st: sard: I. p. 3.). Ann: Affinis priori et valde dubia; sub diversis nominibus venit in herbariis sec: DC. syst: II. 411.; specim: mea ex cl: TENORE lecta supra tecta urbis *Neapolis*.

Biscutellæ dubiæ.

* 13. *B. rupestris* = Raensch: sec: Steud: ? Specimina ex Risso lecta circa *Nicæam* et sub allato nomine communicata ludunt inter *B. lucidam* n. 5. et *apulam* n. 9.; ad primam magis accedunt habitu, sed planta tota *subhirsuta* nec *glaberrima*, ad secundam herba et fructificatione, sed planta *minor* foliis caulinis *subnullis*.

14. *B. hirsuta*? Enata in h. Ripul: e seminibus missis sub hoc nomine, nullibi enumerata inveni; a *B. lyrata* n. 10. non videtur differre nisi foliorum radicalium lóbis *subæqualibus* et sic non reapse *lyratis*. Sed recte observat cl: DC. syst: II. 410., *B. lyratam* esse polymorpham.

XVI. PELTARIA Lin: gen: n. 1083. = Gaetn: fruct: II. t. 141.

= *Clypeolæ* sp: Juss:, Lam: (Inter *Alyssineas* DC.)

» *Cal:* patens basi æqualis. *Pet:* æqualia integræ.
» *Stam:* edentula. *Fruct:* sub-orbiculatus compressus

» reticulatus septo evanido, r - locularis, stigmate
 » punctiformi superatus, oligospermus. Sem: pendula.
 » Cotyl: accumbentes. »

Obs: Genus facie a *Clypeola* vix distinctum filamentis *edentulis*, silicula stigmate superata quandoque 2 - 4 - sperma, saepius tamen abortu 1 - sperma. Spec: 3.

* 1. *P. alliacea* = L. sp: 910. = Spr: syst: II. 858. = Jacq: fl: austr: t. 123. Ic: Taur: vol. 20. tab: 36. sub *Boadschia* (*Austr:*, *Transylv:* *Pedem:* circa arcem *Fenestrellarum* All: n. 908.). Perenn:

TRIE: II.

Fructibus siliculosis (*Siliculosæ veræ*)

Cohors I.

Siliculis oligospermis.

XVII. LUNARIA Lin: gen: n. 809. = Lam: ill: t. 561.
 (Inter *Alyssineas* DC.)

» *Cal:* clausus basi subsaccatus. *Pet:* æqualia in-
 » tegra. *Stam:* edentula. *Silicula* pedicellata (scilicet
 » pedicellus supra pedunculum floris insertus), sub-
 » elliptica plana, 2-locularis, funiculis longis septo
 » membranaceo persistente adnatis. *Sem:* marginato-
 » alata. *Cotyl:* accumbentes. (Folia simplicia). »

Obs: Genus elegans, ob formam fructus facile ab affinibus distinguendum præsertim funiculis septo persistente argenteo adnatis, modo constans spec: 2., ceteris aliis generibus conjunctis.

* 1. *L. rediviva* = L. sp: 911. = Spr: syst: II. 859. = Lam: ill: t. 561. f. 1. Ic: Taur: vol. 10. t. 10. (Eur: austr: Pedemont: ad montes *S. Michaelis*, *Lamie*, *Vinadii*, *Giaveno*, *Cumianæ*, *Avilianæ*, *Lautosca* etc. ALL: n. 898. Re fl: segus: p. 55.). Perenn:, varians floribus plus minusve purpureis, ac silicula-rum longitudine.

2. *L. biennis* = Moench: meth: 261. (*Europ:*). Bienn:, numquam annua, unde recte nomen triviale *L. immutatum*. Passim in hortis culta sub nomine *L. annuæ* ornamenti gratia; variat floribus violaceis albidisve, siliculis plus minusve orbiculatis.

XVIII. RICOTIA Lin: gen: n. 810. = Lam: ill: t. 561. (Inter *Alyssineas* DC.)

» *Cal:* erectus basi sub-gibbosus. *Pet:* æqualia ob-
» cordata. *Stam:* edentula. *Silicula* sessilis (scilicet pe-
» dunculo floris non pedicello proprie inserta), ob-
» longa, plana, junior septo tenuissimo 2-locularis,
» adulta septo evanido 1-locularis (a) funiculis libe-
» ris. *Sem:* aptera abortu subsolitaria. *Cotyl:* accum-
» bentes. (Folia pinnati-secta). »

Obs: Genus *Lunariæ* valde affine funiculis in sili-
cula liberis præsertim distinctum, constans 3. spec:
ex DC., 2. ex SPR:, omissa penitus *R. cantoniensi*
Lour:

1. *R. Lunaria* = DC. syst: II. 284. (*Syria*). Ann:

(a) In iconibus GAERTN: et LAM: septum adparet persistens etiam in fructu maturo; sed constanter evanidum asserunt DC. et SPR: quod ipse vidi in speciminibus meis *R. Lunariæ*.

XIX. ALYSSUM Lin: gen: n. 805. = Lam: ill: t. 559.
 (Inter *Alyssineas* DC.)

» *Cal:* æqualis. *Pet:* æqualia integra vel subemarginata. *Stam:* dentata vel edentula. *Silicula* subrotunda, compressa, stylo tenui apiculata, 2-locularis loculis 1-2-spermis. *Sem:* compressa margine interdum membranacea. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus non satis adhuc determinatum, constans spec: 53. ex DC., 42. ex SPR:, inter quas aliæ floribus *flavis*, filamentis *appendiculatis* vel omnino *edentulis*, aliæ floribus *albis*, filamentis *edentulis*; in utraque sessione autem aliæ sunt *suffruticosæ*, aliæ *herbaceæ*; ex quibus divisiones et subdivisiones artificiales statutæ.

Sect. I. *Floribus flavis.*

† Filamentis appendiculatis (*Adyseton* DC.)

A. *Suffruticosa.*

1. *A. saxatile* = L. sp: 908. (*Podolia*). In hortis vulgatissimum. = 2. *A. gemonense* = L. mant: 92. (*Saxon:*, *Austr:*, *Transylv:*). Habitu a priori distinctum; ceterum valde affine.

* 3. *A. argenteum* = W. sp: III. 461. = Spr: syst: II. 859. = All: fl: pedem: t. 54. f. 3. sub *Lunaria* (*Pedemont:* in montibus *Plossaschi*, *S. Michaelis della Chiusa*, *Bobbii*, *Augustæ Prætoriæ* ALL: n. 901. In montibus di *Bossoleno* RE fl: segus: p. 55.;

ubertim in monte *Musine* RE fl: tor: I. p. 337. In montosis magnæ vallis *Opulæ di Vegezzo* et *Cannobio* BIROLI fl: acon: II. p. 8. In rupibus montanis *Sarzanæ* BERTOL: amæn: ital: 2. p. 34.). Ramos floriferos constanter foliosos observavi uti in optima ALLIONII figura, non *sub-aphyllos* uti in descriptione DC. syst: II. 304.

4. *A. serpyllifolium* = Desf: fl: atl: II. 90. non M. B. (*Afr*: bor:, *Hisp*:, *Altai*?). Specimina possideo ex cl: FISCHER: in *Altai* lecta, et in scheda inscripta nomine *A. serpyllifolii* DESF: cum dubitationis signo: hujusce stirpis figuram non habemus, quod sciam; sed comparatis plantis nostris cum descriptione FONTAINESII, perfecte quadrant, exceptis caulis humilioribus simplicibusque nec inferne ramosis: distinctam igitur varietatem constituere puto, quam β Fischerianam dico.

* 5. *A. alpestre* = L. mant: 92. = Spr: syst: II. 860. = All: fl: pedem: t. 18. f. 2. (*Eur*: med: et austr:; in edit: alpib: *Cotiis*, et in monte *Cenisio* potissimum e rupium fissuris uberrime exit All: n. 888. RE fl: segus: p. 54. Circa mont: *Rosa*, ad rupes valli^s *di Vedria* copiosum BIROLI fl: acon: II. p. 8. In rupestrib: *Sardiniae* montis *Oliena* MORIS st: sard: II. p. 1.). Folia sunt in petiolum attenuata, non sessilia uti apparent in iconе ALLIONII ceterum bona.

6. *A. tortuosum* = Kit: pl: rar: Hung: I. p. 94. (*Hungar*:, *Transylv*:, *Podol*:, *Tauria*). Cult: in H. B. T. ex quo specimina foliis potius oblongis quam spathulatis.

* 7. *A. montanum* = L. sp: 907. = Spr: syst: II. 860. = Bot: mag: t. 419. Ic: Taur: vol. 10. t. 43. f. 6. sub *Clypeola* (*Eur*: med: *Pedem*: frequens in are-
niosis et sterilibus montanis locis præsertim sole per-
cussis ALL: n. 904. In monte *Cenisio* RE fl: segus:
p. 54. In alpibus *Sessitis* BIROLI fl: acon: II. p. 9. In
alpib: *Tendæ* varietatem stylo longissimo reperit DC.).
Variat caulis elatioribus, foliis plus minusve ob-
longis. *A. arenarium* LOISL: var: sec: DC. foliis ro-
tundioribus. Specimina ex hb: BIROLI cum hoc nomine
caules referunt elatiiores, folia non *rotundiora* immo
magis oblonga quam in typo. Siliculas *emarginatas*
numquam vidi sed prorsus orbiculares. *A. cuneifo-
lium* TENOR: quod possideo ex cl: Auctore a nostro
montano non videtur differre nisi foliis brevioribus.

B. Herbacea.

8. *A. rostratum* = Stev: mem: acad: Petersb: 3.
p. 295. (*Bessarabia, Tauria*). Ann: Variat foliis li-
nearibus (β *A. vernale* KIR: sec: DC. syst: II. 313.).
Species altera extat sub nomine *A. vernalis* in Prodr:
II. 161. ex HORNM: quam possideo ex hb: BIROLI quam-
que omissam video a SPR: ; perennem dicit CANDOL-
LEUS, ac siliculas habere *inflatas*, quod quadrat cum
specim: meo ceterum non satis perfecto ut quid certi
asserere possim. = 9. *A. parviflorum* = M. B. suppl:
434. (*Caucas:*). Ann: Var: caulis *diffuso-procum-
bentibus*, foliisque multo brevioribus (*A. procumbens*
M. B. l. c.). Ad hoc pertinere videntur specimina mea
ex hb: BIROLI, quæ habitu ita diversa a typo, ut
speciem distinctam constituere valeant. = 10. *A. hir-*

sutum = M. B. fl: taur: 2. p. 106. (*Tauria, Iberia, Caucas:*). Ann: Ex BALBISIO sub nomine *A. Drabæ* W. = 11. *A. campestre* = L. sp: 909. (*Eur: austr:, Græcia.* In *Sardin:* saxosis aridis *Sarabus Moris* st: sard: I. p. 3.). Ann: Cult: in H. B. T. vix a priori distinguuntur stylo multo breviori.

* 12. *A. calycinum* = L. sp: 908. = Spr: syst: II. 861. = Jacq: fl: austr: t. 338. Ic: Taur: vol. 14. t. 45. sub *Clypeola* (*Eur: med: Pedemont:* in saxosis apricis montanis atque ad oras steriliorum agrorum ALL: n. 903. Prope *Segusium alle Blaccie* RE fl: segus: p. 54. Secus *Atison* et *Ticinum* in pascuis et ericetis non rarum BIROLI fl: acon: II. p. 9. In *Sardin:* editioribus pascuis montis *Oliena Moris* st: sard. II. p. 1.). Ann:

13. *A. minimum* = W. sp: III. 464. excl: syn: L. (*Austr:, Podol:, Tauria*). Ann: Specim: spontan: ex BALBISIO.

† Filamentis omnibus edentulis (*Anodontea* DC.)

14. *A. edentulum* = Kit: pl: rar: hung: p. 95. (*Hungar:, Transylv:*). Bienn: Specim: ex BALBISIO s. fruct:

Sect. II. *Floribus albis, filamentis edentulis*

(*Lobularia* DC.)

† *Suffruticosa.*

• 15. *A. maritimum* = Lam: dict: I. 98. = Spr: syst: II. 862. = Bot: mag: t. 101. sub *A. halimifolio*

L. non W. Ic: Taur: vol. 16. t. 108. et vol. 20. t. 34.
 (Ad oras maris *Mediterr*: In sterilibus agri *Nicæensis*
 mari proximis et arenosis maritimis *Uneliæ* ALL: n.
 890. In maritimis *Sardin*: frequens MORIS st: sard: I.
 p. 3.). Specim: spontan: a BERTERO lectum circa *Une-
 liam*.

* 16. *A. halimifolium* = W. sp: III. 460. non L.
 = Spr: syst: II. 862. = All: fl: pedem: t. 54. f. 1.
 bona et t. 86. f. 1. mala. Ic: Taur: vol: 21. t. 59.
 f. 2. sub *Lunaria* (*Ital*: super: In aridis calidioribus
 vallis *Macræ*; in comitatu *Nicæensi* prope *Sospello*;
 in collibus editioribus *Garexii* et *Uneliæ* ALL: n. 900.).
 Specim: spontan: ex MOLINERIO siliculas habet apice
sub-emarginatas, basi *attenuatas*, uti in icon: ALLIONII,
 et sic non *orbiculatas* uti ex diagn: DC. et SPR:

*? 17. *A. spinosum* = L. sp: 907. = Spr: syst: II.
 862. = Barr: ic: 808. (*Hispan*:, *Gallia* austr: Ex pro-
 vincia *Monregalensi* a D. BARUFFI accepisse affirmat
 RE app: 3. p. 12.). Folia tam in specimin: quam in
 icon: BARR: inferiora *conferta*, superiora *alterna*, nec
 opposita uti in phr: SPR:

Alyssa dubia.

18. *A. odoratum?* = Bellard: hb: ex Paschal. Nul-
 libi enumeratum inveni sub hoc nomine. Videtur suf-
 fruticosum; caulem refert erectum ramosum vix ut
 tota planta albo-pubescentem; folia lineari-lanceolata
 semipollicaria; ramos floriferos plurimos; racemos ante
 anthesim corymbosos, hinc elongatos; flores minimos
 flavos; siliculas parvas suborbiculatas stylo brevissi-
 mo apiculatas.

19. *A.* *Brughieri*. = Brein? Ita inscriptum in scheda speciminis ex hb: BIROLI. Fruticulus semipedalis, ramosissimus, *A. argenteo* n. 3. habitu accedens, sed valde distinctus foliis late ovatis basi in petiolum longum attenuatis, racemis longissimis, siliculis sub-emarginatis duplo majoribus. Flores desunt in specimine.

XX. *PETROCALLIS* R. Br: in H. Kew: ed: 2. vol. 4. p. 93.
= Jacq: fl: austr: t. 228. sub *Draba* ex Lin: (Inter *Alyssineas* DC.)

» *Cal:* æqualis. *Pet:* integra. *Stam:* edentula. *Silicul:*
» ovalis plana 2-locularis, loculis 2-spermis, funicu-
» lis septo adnatis. *Sem:* non emarginata. *Cotyl:* ac-
» cumbentes. »

Obs: Genus constans unica specie a *Drabis* L. dis-
juncta præsertim ob funiculos septo adnatos, qua-
nota ad *Lunariam* accedit.

* 1. *P. pyrenaica* = R. Br: l. c. = Spr: syst: II.
862. = Jacq: l. c. et All: fl: pedem: t. 8. f. 1. sub
Draba. (Alpib: Eur: austr: In summis scopolis mont:
Cenisii, *Assiette*, le *Vallon Fenestrallorum*, et la
Croix supra *Miraboc* All: n. 894. Re fl: segus: p. 53.
Ad montem *Rosa* BIROLI fl: acon: II. p. 5. sub *Draba*).
Perenn: , humillima, facie *Saxifragæ*.

XXI. *HUTCHINSIA* R. Br: in H. Kew: ed: 1812. vol. 4.
p. 82. = *Iberidis* et *Lepidii* spec: L. (Inter *Thlaspi-*
deas DC.)

» *Cal:* erectus æqualis. *Pet:* æqualia integra. *Stam:*
» edentula. *Silicul:* elliptica, stylo coronata, valvis

» navicularibus, loculis 2-4-spermis. Sem: pendula.
» Cotyled: accumbentes. »

Obs: Genus ludens inter *Iberidem*, *Lepidium*, *Thlaspidem* et *Drabam*, a primo distinctum petalis *æquatis*, a primo et secundo loculis *non 1-spermis*, a *Thlaspide* siliculis *immarginatis*, a *Draba* valvulis *navicularibus*; constans 11-12. speciebus foliis *indivisis*, vel *pinnatisectis*.

† Foliis indivisis (*Iberidella* DC.)

* 1. *H. rotundifolia* = R. Br: l. c. = Spr: syst: II. 863. = All: fl: pedem: t. 55. f. 2. sub *Lepidio* (Alpib: *Europ*: med: et austr: In summis Alpium jugis ad diffractos scopulos All: n. 925. Ad rupes editiores montis *Mori* sub *Iberide* BIROLI fl: acon: II. p. 8.). Perenn: Variat caulis erectis adscendentibus vel prostratis, foliis inferioribus alternis, oppositis, fasciculatisve; in *Cenisio* varietatem inveni vix 3-pollicarem foliis radicalibus prorsus fasciculatis. Ad montem *Rosa* alteram vix semipollicarem collegit CARENTEA sec: BIROLI.

2. *H. cepæfolia* = DC. syst: II. 386. (Carinth:, Apennin:). Perenn. A priori distincta foliis inferioribus *dentatis*, omnibus *oblongioribus*; specim: meum ex hb: BIROLI habet folia etiam *superiora* denticulata, racemos corymbosos floresque maiores quam in priori.

†† Foliis pinnatisectis (*Nasturtiolum* DC.)

3. *H. calycina* = Desv: journ: bot: 3. p. 168. (Alpib: Altaicis, Sibir:). Perenn: Stirps pulchella cuius specim: possideo sine fructu a cl: FISCHERIO in Altai

lectum, ceterum perfecte quadrans cum descriptione
DC. syst: II. 388., sed flores ex sicco flavescentes.

* 4. *H. alpina* = R. Br: in H. Kew: ed: 2. vol.
4. p. 82. = Spr: syst: II. 863. = Jacq: fl: austr: t.
137. Ic: Taur: vol. 15. t. 102. f. 4. sub *Lepidio*
(Alpib: Eur: med: In saxosis alpinis deliquescente
nive irriguis ubique copiose ALL: n. 927. Re fl: segus:
p. 54. BIROL: fl: acon: II. p. 5.). Perenn:

* 5. *H. petraea* = R. Br: in H. Kew: ed: 2. vol.
4. p. 82. = Spr: syst: II. 863. = Jacq: fl: austr: t. 131.
sub *Lepidio* (Eur: Ad rupes locis aridis in comit:
Nicæensi et circa *Segusium* etiam secus flumen *Doræ*
ALL: n. 928., segnatim loco dicto *il Canalone* Re fl:
segus: p. 54. Ad *Sessitem* et prope domum *Ossulæ*
BIROLI fl: acon: II. p. 6. *Sardin:* in asperis *Tonneri*
d'Irgini MORIS st: sard: I. p. 4.). Ann: vel bieñ:
Affinis priori a qua distinguitur praesertim siliculis
utrinque obtusis, stigmate sessili.

* 6. *H. procumbens* = Desv: journ: 3. p. 168. =
Spr: syst. II. 864. = Hill: veg: Syst: t. 42. f. 1.
mala (Eur: austr:, *Tauria*. In aridis agri *Nicæensis*;
ad viam ab *Ales* ad *Cavaglià* ALL: n. 926. sub *Le-
pidio*. In *Sardin:* maritimis frequens MORIS st: sard: I.
p. 4.). Ann:

XXII. IBERIS Liu: gen: n. 804. = Lam: ill: t. 557. (Inter
Thlaspideas DC.)

» *Cal:* æqualis. *Pet:* inæqualia 2. exteriora majora.
» *Stam:* edentula. *Silic:* depressissima valvis navicu-
laribus carinatis (sæpius) emarginata, loculis 1-
» *spermis.* *Sem:* pendula. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs. Genus constans 26. spec: ex DC., 21. ex SPR: omnibus europæis (excepta *I. linearifolia*) frutescentibus vel herbaceis.

† *Frutescentes.*

1. *I. semperflorens* = L. sp: 904. (*Sicilia, Persia?*). Culta ubique in hortis ornamenti gratia; folia sempervirentia.

* 2. *I. semperfurens* = L. sp: 905. = SPR: syst: II. 864. = Sib: et Smith: fl: græc: t. 620. (*Ital, Creta.* In sabulosis fluminis *Pallion Nicææ* ALL: n. 919. In valle *Macræ* et supra *Tendam* et *Frabosa* ALL: n. 920. sub *I. garrexiana*). Huc pertinere censeo *I. garrexianam* ALL:; differentia sumpta ex inflorescentia racemosa in *I. sempervirenti*, et corymbosa in *I. garrexiana* nimis fallax; immo comparatis iconibus ALL: t. 40. f. 3. et t. 54. f. 2. inflorescentia est valde diversa in eadem stirpe; specimen mea lecta in loco natali ab ALL: indicato quadrant cum secunda ex iconibus, et ab *I. sempervirente* non differunt nisi statura majori; an prima ico male picta? Valde dubito, nam parum consona cum descriptione celeberrimi Auctoris.

3. *I. gibraltarica* = L. sp: 905. (Ad *Gibraltariam*). Passim in hortis culta; habitus *I. semperflorentis* n. 1. sed corymbi floresque maiores albo-rubescentes; sili culas, quas DILLENIUS asserit profunde emarginatas, numquam obtinui in plantis cultis; spontaneas non vidi. = 4. *I. Tenoreana* = DC. syst: II. 404. (*Regno Neapolitano*). Species optima a cl: TENOREO allata in PR: fl: nap: p. 37. sub nomine *I. cepæfoliæ*, quod

rite mutatum a DC. ne confundatur cum *I. cepæfolia* L. (*Hutchintia* n. 2.), a qua toto cœlo differt caule frutescente, petalis inæqualibus, habitu. Specim: ab auctore lectum in *Castellamare.* = 5. *I. integerimæ* = Moris stirp: sard: fasc: I. p. 4. (In *Sardinia* ad fodinam *Monteporis* et *Manganai*. In asperis *Tonneri d'Irgini* carbon: calc: reperit MORIS l. c.). Priori affinis; differt tamen statura omnibus partibus majori, foliis *oblongo-spathulatis petiolatis integerimæ*, nec *ovato-oblongis subsessilibus dentato-crenatis*, siliculis demum pedicello *brevioribus*. Omissa a SPR: in c. p. et in tent:

* 6. *I. saxatilis* = L. amæn: 4. p. 321. = Spr: syst: II. 864. = Gou: fl: monsp: p. 177. t. 11. sec: All: n. 921. Ic: Taur: vol. 21. t. 59. f. 1. (Eur: austr: Secus torrentes circa *Segusium*, *Exilles*, et *Fenestrellas*. In monte *Cenisio* et inter saxa Alpium *Casotto* All: l. c. In rupibus *di Foresto Re* fl: segus: p. 54. Ad rupes vallis *Ossulæ* versus *Pallanzano* rara BIROLI fl: acon: II. p. 7.). Racemos (melius *corymbos*) numquam *axillares* vidi uti in descriptione DC. syst: II. 396. sed constanter *terminales*.

†† Herbaceæ.

7. *I. carnosæ* = W. sp: III. 455. (*Pyren:*). Ann: Planta nana 1 - 2 - pollicaris; flores purpurescentes. Desunt siliculae in specimine unico ex PERRET.

* 8. *I. nana* = All: auct: p. 15. = Spr: syst: II. 865. = All: l. c. t. 2. f. 1. (In alpib: *della Raschiera Montisregalis* All: l. c.). Ann: ; a priori vix distincta. Ico ALLIONII videtur valde adiecta; forsitan e planta

culta picta fuit: specimin: mea spontanea pollicem non superant.

* 9. *I. ciliata* = All: auct: p. 15. non W. = DC. syst: II. 402. = Ic:? (Inter *la Scarena* et *Nicæam* locis saxosis, et in pascuis ad oras sylvarum ALL: l. c.). Bienn: Omissa a SPR:; nam *I. ciliata* W. quam ipse enumerat syst: II. 865. pertinet ad *I. tauricam* DC. l. c. a qua differt præsertim stylo lobulis siliculæ duplo longiore; an tamen ejusdem varietas? asserere non ausim quin *I. tauricam* non possideam.

* 10. *I. linifolia* = L. sp: 905. = Spr: syst: II. 865. = Garid: Aix 459. t. 105. (*Eur: austr: In arenosis collibus agri Nicæensis versum flumen le Var* ALL: auct: p. 16; n. 921.). Ann:, bienn: Planta tota glabra varians floribus purpurescentibus albidisve.

* 11. *I. umbellata* = L. sp: 906. = Spr: syst: II. 865. = Bot: mag: t. 106. Ic: Taur: vol. 9. t. 55. (*Ital: Hispan: Græcia. In comitat: Nicæensi* ALL: n. 922. *In rupibus montanis loco dicto la Nuda di Ponzano BERTOLA.*). Ann: In hortis ad ornamentum ubique culta; flor: sæpius purpurescentes, rarius albidi.

*? 12. *I. amara* = L. sp: 906. = Spr: syst: II. 865. = Engl: bot: t. 52. Ic: Taur: vol. 9. t. 56. f. 1. (*Europ: Secus Duriam in arvis Taurinensib: abunde* ALL: n. 923.?). Ann: Omissa a cl: RE in fl: tor: In agro *Taurinensi* diligenter perquisitam numquam invenisse asserit BIROLI in ms. nec ego unquam reperi. Culta in hortis; flores constanter albi.

13. *I. odorata* = L. sp: 906. (*Creta*). Ann: Cult: in H. Ripul:

* 14. *I. pinnata* = L. amæn: 4. p. 278. = Spr:

syst: II. 865. = Lob: ic: t. 217. f. 2. Ic: Taur: vol. 9. t. 56. f. 2. (Eur: austr: In arvis macilentis *Canapiciensibus* et *Taurinensibus* secus Sturam All: n. 924. In arvis inter *Lucengo* et *la Venaria* BALB: RE fl: torin: I. p. 337. In provinciæ Segusiensis arvis RE fl: segus: p. 84.). Ann: Priori valde affinis, differt tamen praesertim foliis reapse *pinnatifidis* nec *dentatis* tantum.

XXIII. TEESDALIA R. Br: h. Kew: ed: 2. vol. 4. p. 83.

= *Iberidis* et *Lepidii* sp: L. (Inter *Thlaspideas* DC.)

» *Cal:* æqualis. *Pet:* integra æqualia vel inæqualia.
 » *Stam:* basi appendiculata. *Silicul.* emarginata valvis
 » navicularibus, loculis 2-spermis. *Sem:* pendula. *Co-*
 » *tyl:* accumbentes. »

Obs: Genus vix ab *Iberide* distinctum filamentis
 basi dentatis, loculis 2-spermis, constans speciebus
 2, annuis.

* 1. *T. Lepidium* = DC. syst: II. 392. = Spr:
 syst: II. 865. = Ic:? (Eur: austr:, Afr: bor: In Sardin:
 sterilib: montanis MORIS st: sard: I. p. 5. In ericetis
 di Romentino non frequens BIROLI fl: acon: II. p. 5.
 sub *Lepidio nudicauli* L. Ad latera viae publicæ ab
 Alice ad Cavaglià legit BELLARDI). Planta admodum
 dubia et facile confundenda cum *T. Iberide* (*Iberis*
nudicaulis L.) ob petalorum tenuitatem, ex quorum
 proportione tantum distinguitur. Specimina sardoa
 perfecte quadrant cum plantis pedemontanis, quas
 possideo ex BIROLI et BERTERO.

XXIV. ANASTATICA L. sp: 895. = Lam: ill: t. 555. (Inter *Anastaticæas* DC.)

- » *Cal:* erectiusculus. *Pet:* obovata. *Stam:* edentula.
- » *Silicul:* ventricosa stylo subuncinato superata, val-
- » vis ad apicem auriculatis loculis 2-spermis. *Sem:*
- » pendula. *Cotyl:* accumbentes. »
- 1. *A. hierochuntica* = L. sp: 895. (*Ægypt:*, *Palest:*).
Ann: Cult: in H. B. T. ex quo specimina mea.

XXV. LEPIDIUM R. Br: in h. Kew: ed: 2. vol. 4. p. 85.

= Gaertn: fruct: II. t. 141. = *Lepidii*, *Cochleariæ*, et *Thlaspeos* spec: L. (Inter *Lepidineas* DC.)

- » *Cal:* æqualis. *Pet:* integra. *Stam:* edentula. *Sili-*
- » *cul:* subovata quandoque emarginata valvis carinatis
- » ventricosis apteris vel alatis, loculis 1-spermis.
- » *Sem:* pendula. *Cotyl:* incumbentes. »

Obs: Genus cum affinibus, *Thlaspide* præsertim, sæpe confusum, modo satis distinctum siliculæ loculis 1-spermis, cotyledonibusque incumbentibus, constans specieb: 58. ex DC., 50. ex SPR: *fruticosis* vel *herbaceis*, his autem siliculis *integerrimis* vel *emarginatis*, ex quo divisiones faciliores quam illæ statutæ a DC. syst: II. 528.

† *Fruticosa.*

1. *L. subulatum* = L. sp: 899. (*Hispania*). Flores albi minimi; cult: in H. B. T. ex quo specim: mea. Spontaneum haud vidi. = 2. *L. divaricatum* = Ait: h. Kew: ed: I. vol. 2. p. 441. (*C. B. S.*). Flores

albi minimi; siliculae vix ac ne vix quidem emarginatæ. Spont: ex hb: BIROLI.

†† *Herbacea.*

α Siliculis integerrimis.

* 3. *L. Draba* = L. sp: ed: I. p. 645. = Spr: syst: II. 866. = Jacq: fl: austr: I. 315. sub *Cochlearia*. Ic: Taur: vol. 19. t. 67. (*Eur: med: et austr: Locis incultis et secus arva in agro Nicæensi; circa Moncastel Alexandrinorum ALL: n. 933.* Prope *Taurinum* inter portam *Padi* et *Palatii* legit Re fl: torin: I. 336. In *Sardin:* humidis *Orri* MORIS st: sard: I. p. 5.). Ann: , perenn:

* 4. *L. latifolium* = L. sp: 899. = Spr: syst: II. 867. = Engl: bot: t. 182. Ic: Taur: vol. 9. t. 66. (*Europ:, Sibir: Circa Segusium frequens ALL: n. 929.* Re fl: segus: p. 54. In *Sardin:* humidis *Ariola* MORIS st: sard: I. p. 5.). Perenn: Panicula racemosa ampla; flores parvi albi.

* 5. *L. lyratum* = L. sp: 899. (*Armenia*). Ann: Specim: mea ex hb: BIROLI nulla folia referunt reapse *lyrata*, sed potius ovato-oblonga inæqualiter *incisodentata*; ceterum quadrant cum descript: Auctorum; an var: vel spec: propria?

* 6. *L. Iberis* = L. sp: 900. sub *L. graminifolio* = Spr: syst: II. 867. = Moris: hist: 2. p. 311. s. 3. t. 21. f. 1. Ic: Taur: vol. 9. t. 65. (*Eur: med: et austr: Ad vias et muros locis siccis in Pedem: frequentissimum ALL: n. 930.* Re fl: segus: p. 54. et fl: torin: I. p. 334. Ad vias præsertim cretaceas ubique

BIROLI fl: acon: II. p. 6. In ruderatis *Sardinia* ad vias
MORIS st: sard: I. p. 5.). Perenn:

β Siliculis emarginatis.

* 7. *L. campestre* == R. Br: in h. Kew: ed: 2. vol.
4. p. 465. = Spr: syst: II. 867. = Engl: bot: t. 1385.
sub *Thlaspide* L. Ic: Taur: vol. 9. t. 48. (*Eur: Agro*
Pedemont: secus arva et vias ALL: n. 912. RE fl: se-
gus: p. 54. et fl: torin: I. p. 334. BIROLI fl: acon: II.
p. 7. omnes sub *Thlaspide*). Anu:, bienn: Var: foliis
pubescentibus vel glabris; hæc forsitan sp: distincta?
illam numquam reperi. Cons: DC. syst: II. 536. in
obs:

* 8. *L. hirtum* == Sm: comp: ed: 3. p. 98. ==
Spr: syst: II. 867. = Engl: bot: t. 1803. Ic: taur:
vol. 25. t. 5. sub *Thlaspide* L. (*Eur: med: et austr:*
Unel: et Nicæa ALL: n. 911.). Bienn: Priori affine,
sed folia villosoira, flores maiores, siliculæ hirtæ,
vix (non profunde ut in diagn: SPR:) emarginatæ val-
vularum ala maiores. Specim: perfecta ex SUFFRIN in
Gallo-Provincia lecta.

9. *L. virginicum* = L. sp: 900. (*Amer: bor:*). Ann:
Planta totâ glabra; flores minimi; siliculæ parvæ;
stylus nullus in specimin: spont: ex BALBISIO. == 10.
L. sativum = L. sp: 899. (*Persia, Syria, Ægypt: In*
arvis Sardiniae frequens MORIS st: sard: II. p. 1.).
Ann: In hortis cultum tamquam oleraceum; var: foliis
planis (α *vulgatum* MORIS: ox: 2. p. 300. s. 3. t. 19.
f. 1.); plus minusve *crispis* (β *crispum* ib: f. 2.); vel
latioribus subintegris (γ *latifolium* ib: f. 3.). == 11.
L. spinosum = L. mant: 253. (*Græcia, Oriente*).

Ann:, bienn: Herba humilis nullibi spinosa, flores minutissimi, albi. = 12. *L. bonariense* = L. sp: 901. (Ad fluviem *Plata*). Ann: In specimin: meis lectis in H. B. T. a MOLINERIO folia inferiora tantum sunt *pinnatifida*, media *linearis-lanceolata* argute *dentata* nullibi *ciliata*, tamen *linearia integerrima*; ceterum quadrant cum descriptionibus Auctorum. = 13. *L. incisum* = Roth: nov: cat: I. p. 224. (*Tauria, Caucas:, Bessarabia*). Ann: Huc videtur referendum, auctoritate etiam SPRENGELII, *L. Pollichii* ROTH: (fl: germ: II. 91.), quod DC. enumerat inter *Lepidia dubia* (syst: II. 554.), et ad *L. Iberidem* forsitan pertinere putat. *L. incisi*, et *Pollichii* optima possideo specimen ab auctore missa ad BIROLIUM, uti inscribitur in schedis: hæc evidenter spectant ad eamdem plantam et concinne quadrant cum diagnosi et observatione quam DC. tradit de *inciso* (syst: II. 541.). Flores minimi albidi; stylus subnullus.

* 14. *L. ruderale* = L. sp: 900. = Spr: syst: II. 869. = Engl: bot: t. 1595. (*Europ: omni vulgatissimum*. In *Pedem:* ad camporum et pratorum marginem ALL: n. 917. sub *Thlaspide*. Circa habitationes RE fl: segus: p. 54. Ad muros domuum inter *Portam novam* et *Padum* RE fl: torin: I. p. 334.). Ann: Priori affine dicit DC., sed valde differt tum notis ab eo allatis, cum præsertim habitu.

15. *L. bipinnatifidum* = Désv: journ: bot: 3. p. 165. et 177. (*Amer: austr:, Chili*). Specimen perfectum ex BERTERO in *Rancagua Chili* lectum habet siliculas potius *orbiculatas* quam *ovales* pedicellum *æquantes* non dimidio breviores: ceterum quadrat

cum descriptione DC. syst II. 544. = 16. *L. perso-*
liatum = *L. sp*: 897. (*Hispan*: , *Austria*, *Transylv*: ;
Persia, *Syria*). Ann: Siliculis non retusis sed vix
emarginatis.

XXVI. *AETHIONEMA* R. Br: in h. Kew: ed: 2. 4. p. 80;
= *Thlaspidis* spec: Lin: (Inter *Lepidinæas* DC.)

» *Cal*: inæqualis. *Pet*: æqualia integra. *Stam*: ma-
» jora connata aut dentata. *Silicul*: ovalis compressa
» subemarginata, valvis navicularibus dorso alatis,
» loculis 1-2-spermis. *Sem*: muriculata. *Cotyl*: in-
» cumbentes. »

Obs: Genus a *Thlaspide* ademptum ob filamenta
longiora connata vel dentata, et cotyledones *incum-*
bentes non *accumbentes*; ceterum habitu etiam di-
versum. Sp: 9. ex DC., 8. ex SPR: fruticosæ vel her-
baceæ.

* 1. *A. saxatile* = R. Br: in h. Kew: l. c. =
Spr: syst: II. 869. = Jacq: fl: austr: t. 236. sub *Thlas-*
pide. Ic: Taur: vol. 10. t. 45. f. 1. et vol. 22. t. 77.
(Eur: med: et austr: In saxosis et sabulosis *Segusii*,
la *Briga*, *Sospello*, *S. Martin Maurianencium*, *les*
Clavieres, *Fenestrelle*; *Ussey* ALL: n. 916. Re fl:
segus: p. 54. In pascuis *Ticini* ad *Viglebanum* unice,
et rarum asserit BIROL: fl: accon: II. p. 6.). Suffrut:;
annuum dicit BERTOL: amæn: ital: p. 385. Cons: opti-
mam descriptionem ALL: l. c. sub *Thlaspide*.

XXVII. *VELLA* Lin: gen: n. 1073. = Lam: ill: t. 555.
(Inter *Velleas* DC.)

» *Cal*: erectus æqualis. *Pet*: longe unguiculata

» æqualia. *Stam*: edentula libera vel majora geminata
» tim connata. *Silicul*: ovata compressa stylo piano
» foliaceo coronata, loculis 1-2-spermis. *Sem*: pen-
» dula. *Cotyl*: conduplicatae. »

Obs: Genus constans 2. stirpib: ex SPR: inclusa ge-
nere *Canictheræ* DC. non satis a *Vella* distincto.

1. *V. pseudocytisus* = L. sp: 895. (*Hispan*:). Fructex. Filamenta majora geminatim coronata: = 2. *V. annua* = L. sp: 895. (*Eur*: austr:). Ann: Filamenta omnia libera (*Canicthera Vellæ* DC. syst: II. 642.).

Cohors II.

Siliculis polyspermis.

XXVIII. FARSETIA Turr: fars: 1765. = Med: gen: I. p.
90. t. 2. f. 23. sub *Fibizia*. = *Cheiranthi*, et *Alyssi*
sp: Lin: (Inter *Alyssineas* DC.)

» *Cal*: erectus basi æqualis vel 2-saccatus. *Pet*: in-
» tegra vel subemarginata. *Stam*: edentula aut minora
» dentata. *Silicul*: sessilis elliptica stylo brevi apicu-
» lata, valvis planis. *Sem*: horizontalia compressa
» alata. *Cotyl*: accumbentes. »

Obs: Genus fructificatione et habitu satis distinctum ab affinibus; magis accedit ad *Lunariam*, sed *siliculæ polyspermæ sessiles* funicellique non *adnati*. Sp: 7. ex DC., 14. ex SPR: inclusis *Menoci* et *Berteroæ* generibus, quæ non admisit, ceu non satis distincta.

1. *F. aegyptiaca* = Turr: l. e. p. 1. t. 1. (*Ægypt*:,
Afr: bor:). Frutic: Septum argenteo-diaphanum ut in

Lunaria: semina late marginata; specim: ex hb: BEL-LARDI a DELILE lectum in Ægypto.

* 2. *F. incana* = R. Br: in h. Kew: ed: 2. vol. 4. p. 97. = Spr: syst: II. 871. = Homm: fl: dan: t. 1461. sub *Alyssso*. Ic: Taur: vol. 9. t. 52. (*Europ*: Abunde iu *Pedem*: et agro *Nicæensi* ALL: n. 889. In monto-sis di *Ameno* BIROL: fl: acon: II. p. 8. sub *Alyssso*). Bienn: ; perenn: ? Stam: 2. minora basi dentata; sili-cula parva acuminata; semina vix marginata.

* 3. *F. clypeata* = R. Br: l. c. p. 96. = Spr: syst: II. 871. = Schkuhr: haudb: 2. t. 181. sub *Alyssso* (*Sicil*:; *Græc*:; *Tauria*, *Asia min*: In agro *Ni-cæensi* ALL: n. 899. sub *Lunaria*). Bienn: Silicula fere ut in *F. ægyptiaca*, sed stigma capitatum. Specim: perfecta ex agro *Nicæensi* et H. B. T.

4. *F. linifolia* = Andr: cruc: ined: = Spr: syst: II. 871. sub *Menisco* Desv: et DC. (*Hispan*:; *Podol*:; *Caucas*:; *Syria*). Ann: Calyx æqualis; stam: majora dentata.

XXIX. VESICARIA Tourn: inst: 218. = Lam: ill: t. 559.
= *Alyssi* spec: Lin: (Inter *Alyssineas* DC.)

» *Cal*: clausus. *Pet*: subintegra. *Stam*: sæpius non-nulla dentata. *Silicul*: inflato-globosa stylo apiculata, valvis membranaceis inflatis vel rigidiusculis convexit. *Sem*: sæpius marginata. *Cotyl*: accum-bentes. »

Obs: Genus ex solo fructu *inflato* vel *globoso* determinatum; ceterum speciebus constans characteribus variis in fructificatione artificialiter divisus a DC. syst: II. 295. in duas sectiones valvis *membranaceis*

inflatis (*Vesicaria*), vel *rigidiusculis convexis* (*Alyssoides*). Spec: 12. ex DC., 10. ex SPR: fruticosæ vel herbaceæ.

* 1. *V. utriculata* = Poir: dict: 8. p. 571. = Spr: syst: II. 871. = Lam: ill: t. 559. f. 1. (*Gallia, Hungar:, Ital:* In arenosis circa *Segusium, Viù, Spigno, S. Jean de Maurienne* ALL: n. 821. sub *Alyso*. In apricis *Condoviarum* RE fl: segus: p.. 54.). Frutic: Flores flavi fere ut in *Cheirantho Cherii*; filamenta omnia edentula; valvis siliculæ membranaceis inflatis.

2. *V. cretica* = Poir: dict: 8. p. 570. (*Creta*). Suffrut: Flores flavescentes parvi; filamenta edentula; valvis siliculæ coriacéis concavis. Specim: ex hb: BIROL: = 3. *V. sinuata* = Poir: l. c. (*Hispan:, Ital: super:*). Herbacea. Flores parci flavi; filamenta edentula; valvis siliculæ membranaceis. Specim: perfectum ex MOLINERIO e plantis cultis in H. B. T.

XXX. DRABA Lin: gen: n. 1076. = Lam: ill: t. 556. (Inter *Alyssineas* DC.).

» *Cal:* æqualis suberectus. *Pet:* integra sub-emarginata vel 2-parita (in *Erophilis*). *Stam:* saepius edentula. *Silicul:* ovali-oblonga, valvis planiusculis, » stylo saepius brevissimo aut stigmate sessili apiculata. *Sem:* biserialia haud marginata. *Cotyl:* accum bentes: »

Obs: Genus nunc constans 60. circiter speciebus ex DC., 55. ex SPR: inclusis *Erophilæ* et *Schivereckiae* generibus, quæ vix distinguuntur prius petalis 2-partitis, posterius staminibus longioribus dentatis. Herbæ scapigeræ vel caulescentes, floribus flavis vel

utbis; stylosæ vel estylæ, petalis indivisis vel 2-partitis, perennes vel annuae aut biennæ, ex quibus plures divisiones diversæ ab Auctoribus statutæ. Primam utpote quasi naturalem habitu inspecto admittam; ceteræ ad characteres specificos amandandæ.

* Sect: I. *Scapigeræ.*

* 1. *Dr: aizoides* = Lin: mant: 91. = Spr: syst: II. 872. = Jacq: fl: austr: II. t. 192. Ic: taur: vol: 10. t. 43. f. 2. (In rupestribus apricis *Europ: mediae*. Ad rupes summarum Alpium *Pedem:* ubique ALL: n. 933. Re fl: segus: p. 53. BIROL: fl. acon: II. p. 4.). Peren: Cæspitosa, valde varians *magnitudo* partium, foliisque *nudis* vel margine *ciliatis* (*D. ciliaris* L. non SCHRANK, nec BAUMB:). Flores flavi.

2. *Dr: cuspidata* = Bieb. suppl: 424. (*Tauria, Transylv: Alpib: apuanis*). Peren: basi lignosa. Plurima specimina possideo ex cl: BERTOLONIO et GUSSONE lectis in Alpibus apuanis sub nomine *Dr: asperæ* (BERTOL: amœn: ital: p. 384. non ADAMS), quæ eadem est ac *Dr: cuspidata* BIEB: sec: DC. et SPR: Illa rite quadrant cum descriptione auctoris l. c., qui flores non viderat quum eam exaravit. Hi sunt fere ut in *Dr: aizoidea*, sed maiores; stylus tamen in omnibus siliculis harum latitudinem fere semper excedit, quod contrarium citatæ observationi. Ceterum species optima et satis a priori distincta; præsertim scapo pedunculisque *hirtis*. = 3. *Dr: repens* = Bieb: fl: taur: 2. p. 93. (*Caucas:, Altai*). Peren: Flores

flavi ; petala integra ; stylus subnullus. Specim: ex FISCHERIO lecta in montib: Altaic: = 4. Dr: *Vahlenbergii* = Hartm: ex Spr: syst: II. 874. (*Scandina-
via*, *Groenlandia*, *Alp: summ: Helvet:*). Peren: Flores albi ; petala integra ; stylus subnullus. Huc rite conjunctæ sunt a SPR: duæ species a DC. dis-
tinctæ, scilicet *Dr: lapponica* W. et *helvetica* SCHLE-
ICH, quæ differunt tantum siliculis *ovato-lanceolatis*
in prima , vel *ovalibus* in altera. Specim: meum ex
PERRET pertinet ad *helvetica* ; aliud ex hb: BIROLI
sub nomine *Dr: androsaceæ* , ad *lapponicam*.

* 5. *Dr: stellata* = Jacq: h. vind: 113. obs: n. 54. =
Spr: syst: II. 874. = Jacq: l. c. t. 4. f. 3. et fl: austr:
t. 432. sub *Dr: hirta*. Ic: taur: vol: 16. t. 108. f.
2. (Alpib: *Eur: med:* In saxosis summæ alpis *Al-
bergia* , et congestis lapidibus summi jugi *M. Cen-
sii* , et in alpib. *Fenestellarum* et *Grassonei* frequens
ALL: n. 896. sub *Dr: hirta*. RE fl: segus: p. 53. In
pascuis d'*Allagna* et circa *Crodon* BIROL: fl: acon: II.
p. 5.). Peren: Flores albi; petala integra; stylus bre-
vissimus. Sæpe confusa ab Auctoribus cum *Dr: hir-
ta* L.

6. *Dr: uralensis* = W. hb: ex Stev: obs: ined: sec:
DC. syst: II. 160. sub *Schivereckia* (*Podolia*, *Vol-
hinia* , montibus *Uralensisibus*). Peren: Flores albi ;
petala integra ; filamenta longiora dentata ; stylus
medioeris. Specim: optima ex hb: BIROL: sub *Alyso
podolico*.

* 7. *Dr: verna* = L. sp: 896. = Spr: syst: II.
875. = Oed: fl: dan: t. 983. Ic: taur: vol: 9. t.
2. f. 2. (*Eur: omni* , *Asia med:* , *Amer: bor:* In

locis aridis: Pedemont: ad vias primo vere ubique frequentissima ALL: n. 895. RE fl: segus: p. 53. et fl: torin. I. p. 333. BIROL: fl: acon: II. p. 5.). Ann: Flor: albi; petala 2-partita; stigma sessile. Huc coniunctæ sunt a SPR: tamquam varr: *Dr: caroliniana* BERT: et *præcox* STEV: Conf: tamen DC. syst. II. 356. 357. in observationibus.

Sect. II. *Caulescentes.*

* 8. *Dr: nemorosa* = L. sp: ed: I. 643. non ALL: = SPR: Syst: II. 876. = Houtt. pfl: syst: 4. t. 60. f. 1. sub *Dr: nemorali* (*Suecia*, *Transylv:*, *Tauria*, *Caucas:*, *Asia minori*, *Japon:*, *Amer:* bor: sec: SPR: In agro quodam secus viam *Lanslebourg* in *Sabaudia* reperit BALBIS: add: et misc: Supra *Bussolino* et *Balmaforte* invenit copiosam MOLINERIUS sec: BALBIS: misc: alt:) Ann: Fl: flavi; petala integra; stylus subnul-lus; var: siliculis *glabris* (*Dr: lutea* GILIB:, DC.) aut *velutinis* (*Dr: nemoralis* EHR:, DC.); char: fal-lax, nam in hisce plantis siliculæ juvenes pubescen-tes apparent, demum glabræ evadunt.

* 9. *Dr: muralis* = L. sp: ed: 1. p. 643. = SPR: syst: II. 876. = Lam: ill: 556. f. 2. Ic: taur: vol: 16. t. 108. f. 2. sub *Dr: nemorosa* (*Eur: om-ni*, *Afr:* bor: In montibus *Montisregalis* frequens, in colle taurinensi *di Superga*, similiterque circa ur-bem *Taurini* ALL. n. 897. RE fl: torin: I. p. 333. In declivibus *Ticini* BIROL: fl: acon: II. p. 5. In *Sar-din:* umbrosis montanis MORIS st: sard: I. p. 4.). Ann: Fl: albi minimi; pet: integra; stigma sessile.

10. *Dr: incana*, = L. sp: 897. (*Eur:*, *Asia*, et *Amer:* bor:) Ann: vel bien: Fl: albi; pet: obtuse emarginata; stylus brevis. Huc pertinent secus SPR: *Dr: confusa* et *contorta* EHR: a DC. admissæ tamquam species distinctæ; utrasque siccas possideo, nec video differre nisi magnitudine partium in *Dr: contorta* multoties majorum. = 11. *Dr: caroliniana* = Walt: fl: car: 174. (*Amer:* bor:). Ann: Fl: albi?; stigma sessile: in specimine flores videntur flavi, forsitan exsiccatione?

XXXI. COCHLEARIA Lin: gen: n. 803. = Lam: ill: t. 558.
(Inter *Alyssineas* DC.).

» *Cal:* æqualis sepalis concavis. *Pet:* integra. *Stam:* edentula. *Silicul:* ovato-globosa vel oblonga, valvis » ventricosis, crassiusculis, stylo brevi apiculata. » *Sem:* haud marginata. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus vix a *Draba* distinctum siliculæ valvis *ventricosis* nec *planis*, quod neque satis constans; figura siliculæ exterior etiam varia, nunc globosa, nunc ellipsoidea, oblonga etc.; ex quibus sectiones a DC. statutæ 32. spec: comprehendentes, ex SPR: 18. tantum, nonnullis penitus omissis (*C. alyssoides*, *heterophylla*, *longifolia*, *repanda*, *septentrionalis*), aliis ad alia genera amandatis. Nullam divisionem puto satis naturalem; differentia enim in forma silicularum occurrit penes in omnibus stirpibus, hinc melius characteres specificos constituens.

* 1. *C. sanatii* = Lam: fl: fr: II. 471. = Spr: syst: II. 877. = Jacq: fl: austr: t. 128. sub *Myagro* Ic: taur: vol: 14. t. 72. f. 3. sub *Alyso myagro-*

de (*Gall: Helvet: Ital: Austr: Transylv: Passim in summis rupibus circa locum le Vallon in valle Exiliarum, frequens in summis alpibus, præsertim Valdensibus, locis lapidosis et leviter irriguis; abunde in alpibus la Venseræ, Pralugnan, Pertus de Margon et in iugo la Tournette prope Annecy in Sabaud: All: n. 887. Ad rupes magnæ vallis Sessitis et sec: torrentem Mastallone BIROL: fl: ac: II. p. 3. sub Myagro.*). Peren:

* 2. *C. auriculata* = Lam: dict. II. 165. = Spr: syst: II. 877. = Berg: phylon: 3. p. 140. c. ic: (*Carinth: Gall: austr: Sabaud:*). Perenn: Vix a priori distincta foliis radicalibus sublyratis. In *Sabaudia* inveniri iam dixerat DC. syst: II. 360.; ibi reperit PERRET, ex quo optima specimina possideo.

3. *C. glastifolia* = L. sp: 904. (*German: austr: Gallia*). Ann: vel bien: Cult: in h. Ripul:

* 4. *C. officinalis* = L. sp: 903. = Spr: syst: II. 177. = Engl: bot: t. 551. Ic: taur: vol: 9. t. 70. (*Eur: bor: Carpath: Pyren: In pascuis lapidosis alpium di Lantosca All: 931.*). Bien: Huc tamquam var: referendæ *C. pyrenaica* DC. et *groenlandica* L. sec: SPR:

5. *C. danica* = L. sp: 903. (*Eur: bor: maritimis*). Ann: Variat foliis plus minusve integris vel dentatis. Specim: mea ex PERRET folia referunt vix *angulata*, immo superiora *sessilia sub-amplexicaulia*, nec *omnia petiolata*, ut in diagnosi Auctorum, ex quibus valde accedit priori, sed differt siliculis *ellipsoideis* potius quam *globosis*. = 6. *C. anglica* = L. sp: 903. (*Armoracia, Anglia, Dania, Norweg:, Groënsl: Sibir:*). Ann: Foliis accedit ad *C. officinalis*, siliculæ forma ad *danicam*; an species inter-

media, vel potius cum *danica*, solæ varr: *officinalis*? Characteres non satis distincti, nec constantes.

* 7. *C. Armoracia* = L. sp: 904. = Spr: syst: II. 877. = Engl: bot: 2223. Ic: Taur: vol. 9. t. 68. Vern: *Rafano* (*Europ*: In agro *Taurin*: forsitan ex hortorum rejectamentis ALL: BALB: RE. Ad vias circa *Menie* in provinc: *Aquensi* spontanea ALL: n. 932.). Perenn: Ubique culta in hortis sub nomine *Raphani* seu planta officinalis et scitaminea.

8. *C. macrocarpa* = Kit: pl: rar: hung: II. p. 101. (*Hungar*:; *Transylv*:). Perenn: Vix a priori distincta non siliculæ magnitudine uti nomen indicare videtur, sed foliorum radicalium dentibus *cartilagineis* (floscentia præcociore, et sapore minus acri ex Kit: l. c.).

XXXII. *THLASPI* Lin: gen: n. 719. = Lam: ill: t. 557.
(Inter *Thlaspideas* DC.)

» *Cal*: æqualis. *Pet*: integra. *Stam*: edentula. *Silicul*:
» compressa emarginata, valvis navicularibus subulatis
» plus minusve alatis vel apteris (in *Capsella* DC.),
» stylo filiformi vel brevissimo apiculata. *Sem*: haud
» marginata striata vel lævia; *Cotyl*: accumbentes. »

Obs: Genus satis distinctum siliculæ et valvarum structura vario modo artificialiter ab Auctoribus divisum ex alae valvarum forma, ac seminum numero et superficie, constans spec: 17. sec: DC. exclusa *Capsella*, 14. hac inclusa sec: SPR:

1. *Thl. cerotocarpon* = Murr: comm: goett: 1774. (*Sibir*:). Ann: Stylus subnullus; valvæ apice bicornes; semina 4. striata.

* 2. *Thl. montanum* = L. sp: 902. = Spr: syst:

II. 878. = Wulf: in Jacq: coll: 2. t. 9. var: β præcox. Jacq: fl: austr: 3. t. 238. var: γ alpinum. Ic: taur: vol. 9. t. 80. 90. (Eur: med: In pascuis saxosis montium subalpinorum occurrit ALL: n. 913. RE fl: segus: p. 54. Secus viam prope la Veneria BALB: RE fl: torin: I. p. 335. In montuosis di Varallo, Borgosesia, Cellio non frequens BIROL: fl: acon: II. p. 7.). Peren: Stylus brevis in var: β , longior in var: γ , valvarum alæ expansæ; semina 4. lævia. Nostrum Thl. præcox præter differentias a DC. notatas in syst: II. 380. differt etiam foliis caulinis multo majoribus et reapse sagittato-amplexicaulibus; in alpino ea vidi semper potius linearis-lanceolata; hoc variat etiam caule humillimo vix 2-pollicari ut mihi constat ex speciminib: lectis in monte Rosa in hb: BIROL: servatis.

* 3. *Thl. alpestre* = L. sp: 903. non Huds: = Spr: syst: II. 878. = Engl: bot: t. 81. (Eur: med: In alpibus Exiliarum ALL: n. 915. In montis Cenisii pratis RE fl: segus: p. 54. In Sardin: pascuis editis montanis Genargentu MORIS st: sard: I. p. 5.). Perenn: Stylus filiformis exsertus; valvarum alæ expansæ; semina 8-12. non striata.

* 4. *Thl. perfoliatum* = L. sp: 902. = Spr: syst: II. 878. = Engl: bot: t. 2354. Ic: Taur: vol. 9. t. 49. f. 1. (Eur: med: Asia med: In arvis Pedemont:, collinis præcipue, abunde ALL: n. 914., RE, BIROL: Sardin: in summo monte Calcario Oliena MORIS st: sard: II. p. 1.). Ann:, bien: Stylus sub-nullus; valvarum alæ basi subobsoletæ; semina 8. non striata.

* 5. *Thl. alliaceum* = L. sp: 901. = Spr: syst:

II. 878. = Jacq: ic: rar: I. t. 121. (*Eur:* med: et austr:, *Amer:* bor: sec: NUTT: In vinelis circa *Mondovì* et *Garexio* ALL: n. 910. Ad vias collium *Novariensium*, nec desideratur ad illam *della Biandrina* BIROL: fl: acon: II. p. 6.). Ann: Stylus sub-nullus; valvarum alæ angustæ deorsim obsoletæ; semina 8. *lævia*.

6. *Thl. cochleariforme* = DC. syst: II. 381. (*Sibir:*, *Dahuria*). Perenn: Stylus brevissimus; valvarum alæ sub-nullæ; semina 8. non striata. Specim: ex FISCHER: in *Altai* lectum perfecte quadrat cum descriptione DC. l. c. p. 382.

* 7. *Thl. Bursa-Pastoris* = L. sp: 903. = Spr: syst: II. 879. sub *Thl. Bursa* = Engl: bot: t. 1485. Ic: Taur: vol. 9. t. 1. f. 1. et 2. Vern: *Boursa d'pastor* (*Fere per omnem terram. In Pedom:* arvis, et ad vias vulgatissimum ALL: n. 918., RE, BIROL: Ubi-que in *Sardin:* MORIS st: sard: I. p. 4. sub *Capsella*.). Ann: Stylus brevissimus; valvæ apteræ; semina plurima. Variat summopere statura ac structura caulis foliorumque, numquam in fructificatione. Cons: DC. syst: II. 383-384.

* 8. *Thl. arvense* = L. sp: 901. = Spr: syst: II. 879. = Engl: bot: t. 1659. Ic: Taur: vol. 9. t. 47. (*Eur:* omni, et *Amer:* bor: In agris montium *sub-alpinorum* minime rarum ALL: n. 909. RE fl: segus: p. 54. Ad vias sabulosas *della Lumellina* præsertim a *Garlasco*, *Groppello* etc. BIROL: fl: acon: II. p. 6.). Bienn: Stylus brevissimus; siliculæ magnæ; valvarum alæ compressissimæ foliaceæ; semina plurima.

XXXIII. CAMELINA Crantz austr: I. p. 17. = Medik.
gen: pl: I. t. 1. f: 11. = *Myagri* sp: Lin: (Inter *Camelineas* DC.).

» *Cal:* aequalis. *Pet:* integra. *Stam:* edentula. *Silicula*
» obovata vel globosa integra, valvis ventricosis
» cum styli parte dehiscentibus. *Sem:* oblonga haud
» marginata. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus habitu *Myagro* valde affine cum quo
et cum *Alyssum* confusum fuerat ante observationes
CRANTZ; sed facile distinguendum ex silicula *dehiscente*
et cotyledonibus *incubentibus*. Sp. 6 ex DC.,
4 sec: SPR:

* 1. *C. sativa* = Crantz austr: p. 10. = Spr:
syst: II. 879. = Cav. ic: I. 66 sub *Myagro*. Vern:
Ravissone, *Smensette* (Eur: austr:), *Asia med:* In
Pedemont: arvis, in Comitatu *Nicæensi*, et collium
taurinensium agris ALL: n. 892 sub *Alyssum* RE fl:
segus: p. 53. Inter *Venariam* et *Duriam* RE fl:
torin: I. p. 331 sub *Myagro*. In campis *di Gaglian*
rara, seritur in provincia *Viglebanensi*, ubi vulgo
appellatur *semenzina* BIROL: fl: acon: II. p. 3. sub
Myagro. *Genuæ* in herbidis *all' Acquasola* BERTOL:
amœn: p. 162.). Ann: Variat foliis pilosis vel gla-
bris. Huc pertinent sec: SPR: *Myagrum dentatum* W.
et *pinnatifidum* EHRH: (*Camelina dentata* var: α et β
sec: DC. syst: II. 516); habitu tamen ex specimin:
meis haud parum diversa.

2. *C. austriaca* = R. Brown: in H. Kew: ed: 2.
IV. 93. (*Siles:*, *Austria*, *Transylv:*, *Tauria*, *Cau-*
caso, *Sibir:*). Perenn:

TRIB: III.

Fructibus siliquosis dehiscentibus.

Cohors I.

Siliquæ abbreviatæ (*Siliquosæ spuriae*)

XXXIV. NASTURTIUM R. Brown: in h. Kew: ed: 2. IV:
 p. 109. = *Sisymbrii* sp: Lin: (Inter *Arabideas* DC.).
 » *Cal:* patens æqualis. *Pet:* integra raro nulla.
 » *Stam:* edentula. *Siliq:* teretiuscula stylo brevi co-
 » ronata, valvis convexis. *Sem:* irregulariter 2-serialia
 » haud marginata. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus diu confusum cum *Sisymbrio*, sed
 distinctum siliqua *abbreviata*, et cotyledonibus *ac-
 cumbentibus*, in 3 sectiones artificialiter divisum
 a DC. e colore præsertim petalorum ac forma si-
 liquæ; melius habitu dividendum ex foliis *integris
 pinnatifidis*, vel *pinnatis*. Sp: 27 ex DC. et SPR:

* 1. *N. amphibium* = R. Brown: l. c. p. 110. =
 Spr: syst: II. 881. = Engl: bot: t. 1840 sub *Sisymbrio*.
 Ic: taur: vol: 9. tab: 41. f. 1. sub *Brachyolobo* (*Eur:*, *Asia*, *Amer:* hor: Locis inundatis secus
 flumina ubique in *Pedem:* copiose reperitur ALL: n.
 1011. Re fl: torin: I. p. 342. sub *Sisymbrio*. Secus
 aquæductus vulgare maxime varians foliorum forma
 BIROL: fl: acon: II. p. 12.). Perenn: Variat foliis lan-
 ceolatis, dentatis, aliis pinnatifidis, vel omnibus
 pinnati-partitis; huius varietatis specim: possideo ex

hb: BIROLI sub nomine *Sisymbrii riparii*: foliorum segmenta sunt omnia ovata irregulariter dentata.

* 2. *N. sylvestre* = R: Br: l. c. = Spr: syst. II. 881. = Engl: bot: t. 2324. All. pedem. t. 56. f. 2. sub *Brachyolobo*? Ic: taur: vol. 9. t. 43. f. 2.? (*Eur:*, *Asia*, *Amer:* bor: Locis humidis umbrosis, et ad fontium scaturigines in pratis humidis, atque in arenosis humidis frequens All: n. 1012. RE, BALBIS: In agri *Novariensis* pratis spongiosis di *Ornavasso* unice occurrit BIROL: fl: acon: II. p. 12. sub *Sisymbrio*). Perenn: Variat sec: DC. syst: II. 191. siliquis a 3 ad 9 lin: longis: possideo excelsam varietatem a cl: FISCHERIO in *Dahuria* lectam caule *humiliori*, foliis longius *petiolatis*, siliqua *longissima* (10-12-lin:); an sp: distincta et ad *Sisymbrium* referenda? Semina sat matura non vidi ut cotyledones examini subiicere potuerim.

* *N. palustre* = DC. Syst: II. 191. = Spr: syst: II. 881. = Engl: bot: t. 1747. sub *Sisymbrio*. All: Pedem: t: 56. f. 2. sub *Brachyolobo sylvestri*. Ic: Taur: vol: 9. t. 43. f. 2.? (*Eur:*, *Asia*, et *Amer:* bor: Circa lacum montis *Chamollet* in valle *Augustana* reperit PIOTTAZ sec: BALBIS: misc: bot: 32.). Ann: ? Planta valde dubia et admodum confusa ex multiplice synonymia Auctorum, diversa tamen a priori (*Sisymbrium sylvestre* L.). Ico ALLIONII magis ad hoc accedit, quam ad *N. palustre*, quod cl: BALBISIUS prima vice tamquam plantam indigenam citavit. Cons: tamen BERTOL: amœn: p. 35: sub *Sisymbrio terrestri*.

* 4. *N. pyrenaicum* = R. Br: in h. Kew: ed. 2.

vol: 4. 110. = Spr: syst: II. 882. = All: Pedem: t. 18. f. 1. sub *Brachyolobo*. Ic: taur: vol: 9. t. 57. (Eur: austr: Locis apricis macilentis sæpius occurrit in *Pedem*: copiose circa *Giaveno*; in alpib: etiam *Valdesii*, in pratis collinis *Bugellensibus* et *Eporediensibus* non infrequens; circa *Stupinigi* et secus flumen *Sangone* All: n. 1013. In pratis et pascuis macilentis *della Mandria*, *Veneria* et *Stupinigi* BALBIS:, RE fl: torin: I. p. 347. In pratis siccis *dell'Arbogna* et circa urbem *Novariæ* BIROL: fl: acon: II. p. 12. sub *Sisymbrio*). Perenn: Variat foliorum segmentis plus minusve linearibus; in quodam specim: lecto a BERTERO circa *Taurinum* laciniæ foliorum superiorum sunt filiformes.

* 5. *N. officinale* = R. Br: l. c. = Spr: syst: II. 882. = Engl: bot: 855. sub *Sisymbrio Nasturtio*. Ic: taur: vol: 9. t. 39. Vern: *Cresson*. (In fontibus et rivulis fere totius orbis. Ubique in *Pedem*: ad pure fluentes aquas All: n. 998. RE, BIROL: sub *Sisymbrio Nasturtio*. In palustribus *Sardiniae* MORIS et sard: I. p: 5. sub *N. officinali*). Perenn: Cult: ad usus culinares et medicos.

6. *N. clandestinum* = Spr: nov: prov: p. 29. n. 63. (Brasil:) Ann: Planta in speciminib: meis ex hb: BIROL: *palmaris* et ultra, non *digitalis* tantum, caule tenuissimo, pedunculis filiformibus axillaribus terminalibusque paucifloris; ceterum perfecte quadrans cum descript: DC. syst: II. 199.

Cohors II.

Siliquæ elongatæ (*Siliquosæ genuinæ*)

XXXV. DENTARIA Lin: gen: n. 811. = Lam: ill: t. 562.
(*Inter Arabideas DC.*).

» *Cal:* æqualis erectus. *Pet:* obovata. *Stam:* edentula. *Siliq:* compressa lanceolata, valvis planis e-nerviis elastice revoluto-dehiscentibus, funiculis dilatatis. *Sem:* uniserialia haud marginata. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus *Cardamini* valde affine, sed habitu et siliqua *compressa lanceolata* nec *linearis* satis distinctum, constans specieb: 16 ex DC. et SPR: , quarum plures parum notæ.

* 1. *D. digitata* = Lam: dict: II. p. 268. = SPR: syst: II. 884. = Clus: hist: II. p. 122. f. 1. Ic: taur: vol: 9. t. 6o. sub *D. pentaphylla* (*Eur: med: In collibus Taurinensib: All: n. 947.* In agro *Segusiano* supra *Bossoleno* abunde et in monte *Musiné RE* fl: segus: p. 55. et fl: torin: I. p. 340. In sylvis collium *Novariensi*: usque ad alpes BIROL: fl: acon: II. p. 10.). Perenn:

* 2. *D. pinnata* = Lam: dict: II: 268. = SPR: syst: II. 884. = Lam: ill: t. 562. f. 1. (*Gallia, Helvet:, Italia.* In sylvis collium *Taurinens: alla vigna Morozzo* frequentior BALBIS:, RE, BELLARD: app: 33 sub *D. heptaphyllum*. In sylvis collium frequens usque ad alpes BIROL: fl: acon: II. p. 10.). Perenn:

Priori valde affinis et vix distinguenda foliis potius *pinnati-* quam *palmati-sectis*.

* 3. *D. bulbifera* = L. sp: 912. = Spr: syst: II. 884. = Engl: bot: t. 309. Ic: taur: vol: 9. t. 60. (*Eur:* et *Asia* med: In maxime umbrosis sylvis collum *Taurinens:* non infrequens ALL: n. 946. Re fl: torin: I. p. 339. In sylvis subalpinis agri *Novariens:* BIROL: fl: acon: II. p. 10.). Perenn:

* 4. *D. enneaphylla* = L. sp: 912. = Spr: syst: II. 883. = Jac: fl: austr: t. 316. (*Eur:* med: In *Bugellensibus* montibus observavit TERRANEO sec: ALL: n. 945.). Perenn:

*? 5. *D. polyphylla* = Walst: et Kit: pl: rar: hung: 2. p. 154. t. 160. = Spr: syst: II. 883. (*Croatia*, Alp: *Rhaet*: *Pedem*: in valle *Stafora* ad limites Provinciæ *Bobbii* et ducatum *Parmæ* circa montes *Boglielio* non *Boglieglio* ut in DC. syst: II. p. 272.). Monuit cl: BALBISIUS in litt: *D. enneaphyllam* enumeratam in fl: ticin: II. p. 11. pertinere ad veram *D. polyphyllam*, nec in locis ibi indicatis *enneaphyllam* inveniri. Circa levissimas differentias inter hanc stirpem et priorem cons: DC. l. c.

6. *D. microphylla* = W. sp: III. 479. (*Caucas:*, *Sibir:*). Perenn: Exemplar perfectum possideo ex ck FISCHERIO in mont. *Altaï* lectum rite quadrans cum iconе Lam: ill: t. 562. f. 2. sub *D. trifida*; sed hic desunt radices in planta mea fibrosæ tuberculos subrotundos pisi magnitudine gerentes, quam notam DC. syst: II. 279. refert ad *D. tenuifoliam*: valde dubito tres hasce stirpes ad eandem pertinere.

XXXVI. PTERONEURUM DC. syst: II. 269. = *Cardaminis*
spec: Lin: (Inter *Arabideas* DC.).

» *Cal:* patens. *Siliq:* placentis extus alatis. *Cetera*
» *ut in Dentaria.* »

Obs: Genus nimis leviter statutum constans 2 spe-
cieb: a *Cardamine* divulsis.

1. *Pt: græcum* = DC. I. c. 270. (*Italia* merid:;
Græcia). Ann:

XXXVII. CARDAMINE Lin: gen: 727. = Lam: ill: t. 562.
(Inter *Arabideas* DC.).

» *Cal:* æqualis clausus vel subpatens. *Pet:* integra.
» *Stam:* edentula. *Siliq:* linearis, valvis planis ener-
» viis septo incrassato angustioribus elastice saepe de-
» hiscentibus, funiculis tenuibus. *Sem:* 1-serialia haud
» marginata. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus duobus praecedentibus valde affine et
a quibusdam Auctoribus eis conjunctum , constans
sp: 58 ex DC., 42 ex SPR:, qui plures alias pro va-
rietalibus tantum admisit.

* 1. *C. asarifolia* = L. sp: 913. = SPR: syst: II.
885. = BOT: mag: t. 1375. (*Gallo-Prævinc:*, *Ital:* Se-
cucus torrentium saxosa ad *M. Cenisii* radices infra la
Ferrière potissimum , et inter Alpes *Valdenses* fre-
quens ; *Vinadiensibus* et *Valderianis* Alpib: familia-
ris ; supra *Tendam* et in valle d' *Ussey* ALL: n. 948.
et auct: p. 16.). Perenn: Var: foliis radicalibus pin-
natim triseptis: lecta etiam dicitur a THOMAS in Pe-
demontii valle *Lanzo* (DC. syst: II. 248.).

* 2. *C. bellidifolia* = L. sp: 913. = SPR: syst:
II. 885. = OED: fl: dan: t. 20. pro var: a.; ALL:

Pedem: t. 18. f. 3: pro var: β . Ic: taur: vol: 10. t. 3. f. 1. et vol: 12. t. 47. f. 1. (Scandinav:, Ins: Melvill:, Amer: bor: , Sibir: , Eur: med: In saxosis umbrosis et irriguis summarum Alp: Pedem: ALL: n. 949. Repl: segus: p. 55. Ad montem Morum occurrit, sed rara BIROLI fl: acon: II. p. 10. *C. alpina* var: β . vulgaris est ad rupes umbrosas alpium sec: eundem BIROL: l. c: qui illam refert pro specie distincta). Perenn: humillima. Variat petiolis limbo longioribus (α . *petiolaris*), vel brevioribus (β . *alpina*).

3. *C. tuberosa* = DC: syst II. 254. (Chili). Perenn: In specimine spontaneo ex BERTERO desunt radices; ceterum perfectum et quadrat cum diagn: SPR: excepto racemo multi- non pauci-floro, post anthesim longissimo; folia media et superiora sunt reapse ternata, non tantum trisecta ut in descript: DC. l. c., immo foliola media longe petiolata, summa linear-lanceolata petiolis brevibus; pedicelli siliquis longiores; flores albi = 4. *C. chilensis* = DC. syst: II. 254. (In Chili pascuis montanis de la Leona BERTERUS). Añ: ex habitu? Specim: ex BERTERO habet folia radicalia pinnatim 5-secta, non simpliciter 3-secta, nonnulla floralia linear-lanceolata obtusa; nulla ciliata nec superne pilosiuscula, sed omnia prorsus glabra; in ceteris quadrat cum descript: DC. l. c.

* 5. *C. resedæfolia* = L. sp: 913. = Spr: syst: II. 886. = Jacq: fl: austr: app: t. 31. All: Pedem: t. 57. f. 2. Ic: Taur: vol: 10. t. 7. f. 3. 4. 5. (Alpib: Eur: med: In scopolosis ad nivem deliquescenti-

tem et summis frigidarum et editiorum Alpium *Pedem:* ALL: n. 950. RE fl: segus: p. 55. In Alpib: *Novariens:* usque ad *Crodo* descendit sec: BIROL: fl: acon: II. p. 11.). Ann: , bien: , perenn: Hue pertinet *C. heterophylla* LAPEYR: sec: SPR: a DC. inter species non satis notas relata.

* 6. *C. thalictroides* = All: Pedem: n. 951. = Spr: syst: II. 886. = All: l. c. t. 57. f: 1. Ic: taur: vol: 18. t. 56. (In Alpib: *Cott:* , *Grai:* , *Delphinatu.* In *Pedem:* ad rupes supra *Giaveno* prope *Mirabouc* , et montib: *S. Bernardi* et *Cenisii* ALL: l. c. RE fl: segus: p. 55. In saxosis secus *Cerundam* prope *il parco della Veneria* eundo versus caseale dictum *del Merlo* Re fl: torin: I. p. 340. In Alpib: *Sessitis* et in editioribus *di Guarna* et *Campello* BIROL: fl: acon: II. p. 11.). Bien: Variat foliis radicalibus integris vel pinnatifidis.

* 7. *C. granulosa* = All: auct: p. 16. n. 953. = Spr: syst: II. 886. = Ic: ? (In pratis collium *Taurinensis* detectam primus attulit Ign: MOLINERIUS ALL: l. c. In locis uidis summæ vallis *Salicum* Re fl: torin: I. 341.). Perenn:

* 8. *C. amara* = L. sp: 915. = Spr: syst: II. 886. = Engl: bot: t. 1000. All: Pedem: t. 56. f. 1. Ic: taur: vol: 10. t. 4. f. 2. (*Eur:* , *Sibir:* Ad fontium rivulos in montanis et subalpinis *Pedem:* ALL: n. 954. RE fl: segus: p. 55. Inter *la Molinetta* et *Moncalieri* loco dicto *Millefonti* et locis humidis sec: *Sangone* ac in sylvis *Stupinigi* ad rivulos BALBIS: Circa *Venariam* et versus *Caselle* RE fl: torin: I. p. 341.). Perenn: In icon: ALL: siliqua male pi-

cta.; ipsa est longior (semipollicaris et ultra), tenuior (diamet: vix 112 lin:), stylo brevi filiformi stigmate capitato apiculata. *C. nasturtiana* THUIL: a SPR: omissa , de qua specimen possideo ex PERRET , pertinet certe ad *amaram*.

* 9. *C. pratensis* = L. sp: 915. = Spr: syst: II. 886. = Lam: ill: t. 562. f. 1. Ic: taur: vol: 19. t. 106. (*Eur:* omni , *Asia* et *Amer:* bor: In pratis non pinguibus et pascuis agrosis in agr: *Pedemont:* ALL: n. 953. Prope il gerbido della *Veneria* et l'*Ergastolo* BALBIS: RE fl: torin: I. p. 341. In pratis et fossis aquosis in agr: *Novariensi* BIROL: fl: acon: II. p. 11.). Perenn:

* 10. *C. hirsuta* = L. sp: 915. = Spr: syst: II. 887. = Engl: bot: t. 492. (In montosis *Eur:* totius. In *Pedemont:* ex *Alagna*, *Garthusia di Casotto* , et *S. Ugon* in *Sabaudia* ALL: n. 955. et auct: p. 17. Ad fossas et in pascuis humidis agri *Taurinens:* RE fl: torin: p. 340. In pratis spongiosis *d' Isarno* et *Mosezzo* BIROL: fl: acon: II. p. 11. In *Sardiniae* umbrosis humidis MORIS st: sard: I. p. 4.). Ann: Variat multis modis a DC. notatis in syst: II. 260 ; præterea ad hanc pertinere puto *C. sylvaticam* LINK quam distinctam admiserunt DC. et SPR; characteres enim a cll: Auctoribus allati haud satis constantes ; habitu non minimum differt.

* 11. *C. parviflora* = L. sp: 919. = Spr: syst: II. 887. = Gmel: fl: sibir: III. n. 37. t. 64. Ic: taur: vol: 9. t. 38. f. 2. 3. (*Gall:*, *Transylv:*, *Sibir:*, *Amer:* bor: *Pedem:* ubique in pascuis et ad muros ALL: n. 952. RE fl: segus: p. 55. BIROL: fl: acon: II.

p. 11.). Priori valde affinis, sed gracilior et glabra.

* 12. *C. impatiens* = L. sp: 914. = Spr: syst: II. 887. = Engl: bot: t. 80. Ic: taur: vol: 9. t. 75. f. 1. (In montosis totius Eur: et Asiae med: Copiose in umbrosis sylvis Taurinensib: et locis humilioribus montium subalpinorum ALL: n. 956; RE. In umbrosis collium Novariensium ubique BIROL: fl: acon: II. p. 11.). Ann: Variat siliquis *glabris* vel *pilosiusculis*.

Species nova?

13. *C. Berteriana* = Nob:? (*Tagua-Tagua* in *Chili BERTERUS*). Scheda ita inscripta. = *Cardamine?* *Nasturtium officinale* var:?= Planta habitum et characteres *Cardaminis* refert; siliqua enim vere linearis, valvae planæ, semina 1-serialia: forsitan ob calycem coloratum et siliquam pedicellatam ad *Stanleiae* genus NUTTALLII pertinet; sed habitus diversus. Ceterum siliquas plus minusve *pedicellatas* plures *Cardamines* species gerunt, etsi sessiles dicat DC. in diagnosi generis (syst: II. 245.); cotyledones ob seminum tenuitatem et immaturitatem examini subiicie haud potui. Interea inter *Cardamines* illam retinco, et ita definio.

» *C. caule erecto striato ramoso*, foliis omnibus
 » pinnatis villosiusculis, foliolis subintegerrimis, ra-
 » dicalibus ovato-lanceolatis, mediis linear-lanceola-
 » tis, summis linearibus, petalis ovato-oblongis ca-
 » lycem coloratum duplo excedentibus, siliquis ere-
 » ctis tenuissimis pedicello duplo longioribus stylo
 » subulato apiculatis (fl: albo-flavescentes). Nob:»
 » *Obs:* Species optima satis a ceteris prima facie

distinguenda, præsertim foliis omnibus pinnatis, foliolis plus minusve linearibus sub-integerrimis. Aliam plantam exsiccatam et semina misit idem BERTERUS sub nomine *C. nasturtioideæ* cum dubitationis signo: sed mihi non videtur differre; certe non est *C. nasturtioides* DON a SPR: relata sub *C. Nasturtii* (c. p. p. 241.), in qua folia superiora dicuntur simplicia.

XXXVIII. ARABIS Lin: gen: n. 818. = Lam: ill: t. 563.
(Inter *Arabideas* DC.).

» *Cal:* erectus. *Pet:* integra. *Stam:* edentula. *Siliq:*
» linearis compressa valvis planis nervosis, septo li-
» neari, stigmate subsessili. *Sem:* uniserialia immar-
» ginata, vel alata. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus medium inter *Cardaminem* et *Turritidem*, a primo distinctum præsertim valvis *nervosis*, ab altero seminibus *uniserialibus*, constans speciebus 66 ex DC., 50 ex SPR:, facile dividendum in sectiones 2 e seminum margine, sed valde obscurum in stirpium determinatione.

Sect: I.

Seminibus immarginatis (*Alomatium* DC.)

+ *Foliis subamplexicaulibus.*

● 1. *A. brassicæformis* = Wall: sched: 359. = Spr: syst: II. 888. = Vill: dauph: III. p. 330. t. 36. sub *Brassica alpina* L. Ic: taur: vol: 28. t. 57. (Eur: med: Locis umbrosis et abruptis comitatus *Nicæensis* circa la *Giandola*, et inter *S. Michel* et

S. Martin, uti etiam inter *Susa* et *Bussolino* ALL: n. 968. Re fl: segus: p. 57. In alpib: *Novariensib:* frequens BIROLI fl: acon: II. p. 16. omnes sub *Brassica alpina*). Perenn: Planta ab Auctoribus ad plura genera relata ad *Brassicam* et *Erysimum* pertinere non potest ex cotyledonum forma; *Turritidi* potius congener, sed semina 1-serialia.

* 2. *A. ciliata* = R. Br: in h. Kew: ed: 2. vol: 4. p. 107. = Spr: syst: II. p. 889. = Engl: bot: t. 1746. sub *Turritide alpina* (*Austria*, *Helvet:*, *Hibernia*, *Pyren:* *Pedem:* in alpibus *della valle d'Ala* RE app: alt: in act: Acad: Taurin: vol: XXXI. p. 201. sub *Turritide*). Bien: Valde affinis dicitur a DC. *A. strictæ* Huds: , sed præter differentias a cl: auctore allatas, differt caule glaberrimo nec *hispido*, foliisque ciliatis et vix dentatis, nec *hispidiusculis serratis*.

* 3. *A. hirsuta* = Scop: carn: ed: 2. n. 835. = Spr: syst: II. 889. = Schrank fl: monac: III. t. 248. Ic: taur: vol: 9. t. 72. f. 2. et vol. 14. t. 18. sub *Turritide* L. (*Eur:* et *Amer:* bor: In *Pedem:* ad muros atque in locis aridis a sole non percussis, collinis potissimum ALL: n. 978. Re fl. segus: p. 56. Speciatim in nemoribus secus *Duriam* inter *Lusengo* et *Collegno* RE fl: torin: I. 347. In pascuis. *Stupinigi* legit BERTERUS. *Genuæ* in collib: cultis prope *il Lagazzo* pro *A. sagittata* BERTOL: amœn: ital: p. 165. *Sardin:* ad vias in montanis MORIS st: sard: I. p. 3. pro var: *sagittata*, omnes sub *Turritide*). Bienn: Huc refert SPR: tamquam varr: plures species Auctorum, inter quas *A. sagittatum* DC., quæ reapse in speciminib: meis non differt nisi foliis caulinis potius

ovatis quam *cordato-sagittatis*, et pilis *simplicioribus*. Var: hæc invenitur etiam in vineis et arvis agri *Nicæensis* ex DC.

4. *A. crispata* = W. en: 684. (*Carniola, Calabr:*). Perenn: In specimi: ex *BALEBISIO* desunt folia radicalia et fructus.

* 5. *A. saxatilis* = All: Pedem: n. 973. c. descript: = Spr: syst: II: 889. = Vill: dauph: III. p. 319. t. 37. sub *A. nova* (*Gall: austr:, Ital: super: Circa Segusium, la Novalesa, et Cesana* locis sterilibus et saxosis ALL: l. c. RE fl: segus: p. 56. In *Sabaudia* DC.). Bienn:

* 6. *A. auriculata* = Lam: dict: I. 219. = Spr: syst: II. 889. = All: auct: p. 18. t. 2. f. 2. sub *A. aspera* c. descript: (*Eur: med: et austr: Ad oras sylvarum cæduarum prope Segusium atque supra Tenda* ALL: l. c. RE fl: segus: p. 56. In pascuis et declivibus *Ticini* rara occurrit BIROL: fl: acon: II. p. 15.). Bienn: Variat pilis *rigidulis* vel *hispidis* (*A. aspera* ALL:), ramis patulis (*Turritis patula* EHR:), vel *rectis* (*Arabis recta* VILL:) etc.

7. *A. albida* = Stev: in cat: hort: ger: 1812. p. 51. (*Caucas:, Persia.* In rupib: calcaribus et ad muros vetustos in montosis elatioribus *Aprutii* reperit GUSSONE). Perenn: Sequenti affinis, sed differt præsertim floribus maioribus, foliisque cano-pubescentibus: *A. canescens* BROCCHI sec: GUSSON: pl: rar: p. 277.).

* 8. *A. alpina* = L. sp: 928. = Spr: syst: II. 890. = Bot: mag: t. 226. Ic: taur: vol: 9. t. 91. (*Fere tota Eur:, Atlant:, Madera.* In saxosis um-

brosis summarum alpium *Pedem*: ad torrentium convalles ubique ALL: n. 972. RE fl: segus: p. 56. In umbrosis inter montem *Rosa* et *Turlo* abundans BIROL: fl: acon: II. p. 14.). Perenn: Statura valde varians, prout in locis demissis vel exaltioribus invenitur.

* 9. *A. verna* = R. Br: in h. Kew: ed: 2. n. 4. p. 105. non Desf. = Spr: syst: II. 890. = Moris: hist: II. p. 241. s. 3. t. 8. f. 5. sub *Hesperide* (*Eur*: austr:, *Altai*. In agro *Nicæensi* ALL: n. 984. In asperis collinis *Sardiniae* MORIS st: sard: I. p. 3.). Ann: Spontanea humilis, culta pedalis et ultra evadit.

†† *Foliis subsessilibus.*

* 10. *A. Allionii* = DC. fl: fr: ed: III. vol: 4. p. 676. = Spr: syst: II. 890. = Ic: ? (In pratis et pascuis subhumidis *Pedemont*: supra *Casotto* et *Limone*, et prope thermas *Valdesii* ALL: auct: p. 18. n. 978. sub *Turritide stricta*). Perenn:

11. *A. procurrens* = Waldst: et Kit: pl: rar: Hung: II. p. 154. (*Bannat*:, *Servia*). Perenn: Specim: mea ex hb: BIROLI habent folia caulina non prorsus sessilia, sed leviter in *petiolum attenuata*; ceterum quadrant cum descr: DC. syst: II. 229.

* 12. *A. Halleri* = L. sp: 929. = Spr: syst: II. 891. = Waldst: et Kit: pl: rar: Hungar: II. p. 126. t. 120. (*German*: austr:, *Hungar*:, *Transylv*:, *Ital*: *Pedem*: in monte *Sylvio* ALL: n. 976. Frequens circa *Borgomanero*, *Stresa* et *Belgirate* BALBIS: sec: DC. syst: II: p. 233.). Bienn: Siliquæ sunt *stigmate sessili*.

sili ceu iam observaverat DC. l. c., non *stylo coronatæ* uti in diagn: SPR: Huc pertinet *A. multicaulis* BELLARD: sec: BALBIS:

13. *A. hispida* = L. fil: suppl: 298. non Ait: nec alior: (*Eur*: med: et bor:). Perenn: Sub hoc nomine plures species confusæ sunt : cons: synon: DC. syst: II. 229. 230. sub *A. petræa*. Cl: SPR: *A. crantzianam* EHR: huc referens varietatem dicit foliis radicibus minus lyratis; addendum plantam esse omnino *glabram* non *pube ramosa hirsutam*, unde nec nomen *A. hispidæ* nec diagnos: SPR: concinna, et præferendum nomen et phrasis DC. l. c.

* 14. *A. arenosa* = Scop: carn: ed: 2. n. 837. = Spr: syst: II. 891. = Scop. l. c. t. 40. (*Eur*: med: In *Pedem*: ex BALBIS: el: p. 7. sub *Sisymbrio*). Ann: Planta spontanea ubique hispida, culta subglabra evadit.

* 15. *A. stricta* = Huds: Angl. 292. = Spr: syst: II. 891. = Engl: bot. t: 614. (*Eur*: med: *Pedem*: in valle *Ulcensi*, monte *Vesulo* et circa *Ussey* ALL: n. 979. sub *Turritide* RAY. In pratis et pascuis subhumidis supra *Casotto* et *Limone* ALL: auct: p. 18. n. 978. sub *Turritide stricta*). Perenn: *Turritis Ray* VILL: et *T. stricta* ALL: auct: eadem planta.

* 16. *A. muralis* = Bertol: amœn: p. 79. = Spr: syst: II. 891. = Ic: ? (*Etrur*: , *Ligur*: BERTOL: l. c. *Sabaudia* DC. ? In *Sardiniae* pascuis collinis montanisque MORIS st: sard: I. p. 3.). Perenn: Specim: mea ex cl: MORISIO perfecte quadrant cum planta descripta a BERTOL: l. c. , et semina referunt non *marginata* , qua nota ab auctore omissa inter *Alo-*

matia eadem planta collocanda: an autem *A. collina* TENOR: (n. 25. infra) ad illam pertineat cœn indicavit MORISIUS , asserere non audeo; huius enim imperfecta semina in speciminib: meis examini subiicere non potui: revera habitu differre non videtur, sed DC. syst: II. 241. semina dicit *margine alata*, et ideo inter *Lomasporas* illam collocat; ejus exemplum secutus est SPR: ; si res ita se se habet, species distincta admittenda.

17. *A. incana* = Roth: cat: bot: I. p. 79. (*Helvet:*, *Gallia* circa *Nevers*). Bienn: Specim: quæ possideo ex hb: BIROLI habent folia radicalia in *petiolum decurrentia*, non *omnia sessilia* uti in diagn: Autorum, ceterum quadrant: an ejusdem varietas? Speciem distinctam non judico. Huc referenda *Turritis minor* VILL: a SPR: omissa etiam in synonymia? Specim: mea ex hb: BIROLI non differunt ab *A. incana*. = 18. *A. serpyllifolia* = Vill: dauph: III. p. 318. t. 37. (*Gall:* austr:, *Pyren:*). Bienn: In specimin: meis siliquæ sunt stigmate sessili capitato apiculatae.

* 19. *A. thaliana* = L. sp: 929. = Spr: syst: II. 34. = Engl: bot: t. 901. Ic: taur: vol: 9. t. 1. f. 2. et vol: 10. t. 44. f. 2. (*Eur:* fere omni, *Asia* med:, *Amer:* bor: In arvis et locis sterilibus circa urbem *Taurini* et pagos ubique copiosa ALL: n. 971. RE fl: torin: I. p. 346. Nil vulgatus in arvis macilentis provinciæ *Segusianæ* RE fl: segus: p. 56. In arvis ubique altitudine varians BIROL: fl. acon: III. p. 14. In *Sardiniae* pascuis et arvis fre-

quens MORIS st: sard: I. p. 3.). Ann: Siliquæ stylo brevi acutissimo terminatæ.

Sect: II.

Seminibus alatis (Lomaspora DC.)

* 20. *A. turrata* = L. sp: 930. = Spr: syst: II. 892. = Jacq: fl: austr: t. 11. Ic: taur: vol: 9. t. 36. f. 1. et vol: 10. t. 44. f. 1. (Eur: austr:, *Anglia*. In sylvis cæduis et umbrosis collium *Taurinens*: ALL: 975. In nemoribus secus *Duriam* eundo ad *Colegno*; ad portum *Sturæ* prope *Altessanum* RE fl: torin: I. 346.; communis circa *Segusium* RE fl: segus: p. 56. In sylvis collium *Novariens*: BIROLI fl: acon: II. p. 14.). Bienn: Variat siliquis longioribus foliisque latioribus (*A. ochroleuca* LAM:; *A. umbrosa* CRANTZ); foliorum dentes in hac var: ex specimin: meis acutiores mucronis ad instar.

* 21. *A. bellidifolia* = L. mant: 94. = Spr: syst: II. 893. = Jacq: fl: austr: III. p. 280. All: Pedem: t. 40. f. r. sub *Turritide* c. descript: [(Alpib: Eur: med: In saxosis alpium Pedem: non infre- quens ALL: n. 980. RE fl: segus: p. 56.). Perenn: Huc pertinent sec: SPR: *A. scabra* ALL: n. 974., *A. nutans* MOENCH et *A. pumila* VULF, quas coniungit quoque DC. syst: II. 238. sub *A. pumila*, sed *A. bellidifoliam* L. pro distincta specie admittit ibid: p. 239.: inter *bellidifoliam* quam legi in *M. Cen- sio*, et *pumilam* quam possideo ex PERRET nullam reapse video differentiam, et perfecte quadrant cum figura ALL:; at *A. scabra* ALL: valde differt foliis.

reapse *scabris*, racemis valde *elongatis*, siliquisque duplo *longioribus* quam in prioribus; insuper planta biennis. Hinc opinor *A. pumilam* VULF eandem esse ac *A. bellidifoliam* JACQ:; *A. scabram* ad *pumilam* referri non posse et optimam speciem constituere, quam ita definio:

* 22. *A. scabra* caule simplici erecto foliisque » scabris, radicalibus ovato-oblongis petiolatis, cau- » linis dentatis amplexicaulibus oblongis, summis » lanceolatis integris; racemo elongato; siliquis ere- » ctis pedicello multoties longioribus (petala albida » ovato-oblonga calyce duplo longiora). Nob: » *A. sca- bra* = All: Pedem: n. 974. (Pedem: in saxosis *Pra- lugnac* eundo versus *la Motta* ALL: l. c.; frequens in alpib: *di Mondovì*, *Tenda*, *la Raschiera* versus *Carlin* et supra *Cesano* ALL: auct: p. 18. In saxosis di *Mompantero* et delle *Blaccie* RE fl: segus: p. 56.). Bienn: An *A. nutans* MOENCH: et W: sp: III. 537. ? Sed in hac racemi *nutantes*, siliquæ secundæ.

* 23. *A. cærulea* = Vulf: in Jacq: coll: II. p. 56. = Spr: syst: II. 893. = All: Pedem: t. 40. f. 2. sub *Turritide*. Ic: taur: vol: 15. t. 102. f. 2. (Alpib: summis *Carinth*: , *Salysburg*: , *Transylv*: Ad fontium scaturigines aut rivulos nivis deliquescentis in editis alpib: Pedem: ALL: n. 984. RE fl: segus: p. 57. In cacuminibus montis *Mori* provinc: *Novariens*: unice observavit BIROL: fl: acon: II. p. 14.). Perenn: Siliquas maturas vidi constanter *cernuas* non *erectas* uti asse- ruit et pinxit ALL:

24. *A. stellulata* = Bertol: journ: de bot: IV. p. 76. n. 8. (In superiori *Tambura* Alpium *Apuana-*

rum a BERTOL: reperta.). Perenn: Specimina mea ex auctore optime quadrant cum eiusdem descript: in amoën: it: p. 101. = 25. *A. collina*= Tenor: prodr: fl: nap. p. 39. (*Neapol:*). Perenn: Specim: ex auctore lectum in *Castellamare* ab *A. murali* BERTOL: non videtur differre. Vide tamen supra n. 16.

Arabides dubiae.

26. *A. conserta*. = W. Omissa a SPR: enumerata a DC. sub *A. hirsuta* tamquam media inter hanc et *A. sagittatam*. Ex speciminib: hb: BIROLI ab H. Erf: missis sub allato nomine, mihi videtur ab *hirsuta* n. 3. reapse nec differre nisi statura omnibus partibus majore, foliisque confertioribus. = 27. *A. flexuosa* = H. Erf: . Plantam sub hoc nomine acceptam ab H. Erf: nullibique descriptam, distinctam speciem constituere puto *A. procurrenti* n. 11. valde proximam, a qua tamen differt foliis scabriusculis nec glabris, radicalibus subsessilibus; siliquis erectis nec patulis pedicellis brevioribus: diagnosis haec erit:

» *A. caule* brevi stolonifero adscendente scabriu-
» sculo ad apicem glabro, foliis omnibus sessilibus
» ovatis scabridis margine pilis 3-partitis ciliatis,
» racemis elongatis, siliquis erectis brevi pedicellatis
» (pet: albida calyce duplo longiora) Nob: » Perenn:?
Hab: ?

28. *A. reptans* = Fisch:? Specimen a cl. FISCHERIO sub hoc nomine communicatum et in *Dahuria* lectum toto cælo differt ab *A. reptante* LAM: dict: I. p. 222. quam refert DC. inter *Arabides dubias* syst: II. 242.; habet enim folia pinnati-secta sinuata glabra nec in-

tegerrima hirsuta; insuper in specim: caulis *erectus simplex* adparet, nec *surculis reptantibus* praeditus; habitu autem non ad *Hyeracium auriculam* sed potius ad *Nasturtium officinale* accedit, a quo tamen differt siliquis *linearibus* aliisque notis. Hinc non dubito distinctam *Arabid*is speciem constituere, cui nomen immutandum ne cum antiquiori *A. reptanti* LAM: confundatur: in qua sectione collocanda sit, asserere non ausim, semina enim in specimine ob immaturitatem tenuissima vix adparent: eam igitur ad *Arabides* dubias referens, et sollertissimo inventori dicans, ita definio:

» *A. Fischeriana* glaberrima, foliis omnibus 3-5-pinnati-sectis superne viridibus inferne violaceis, segmentis subrotundis sinuatis, inferioribus subsessilibus minimis, supremo basi subcordato petiolato multoties majore; racemo paucifloro; siliquis subrectis tenuissimis stigmate sessili sub-bifido apiculatis (petala ex sicco flavescentia calyce colorato duplo longiora). Nob. » Hab: in *Dahuria*. Perenn:?

29. *A. stenopetala* = Horn: h. hofn: 2. p. 619. Stirpem hanc quam possideo ex h. Berolin: sub nomine *Turritidis stenopetalae* W. (en: suppl: p. 46.), inter *Arabides dubias* recenseo eo quod nec cl: Auctor, nec Botanici recentiores seminum seriem meminerint, nec ego ob fructuum tenuitatem rite perpendere potuerim; oculis armatis mihi visa sunt i-serialia; ceterum specimina perfecte quadrantum descriptione W. l. c.; mirum hujus auctoris synonymum omissum fuisse a SPR:

XXXIX. TURRITIS Lin: gen: n. 733. = Gaertn: fruct: II. t. 143. (Inter *Arabideas* DC.)

» *Cal:* laxus. *Pet:* integra. *Stam:* edentula. *Siliq:* » elongata anceps vel teretuscula valvis planis ner- » vosis, stigmate obtuso subintegro coronata. *Sem:* » 2-serialia. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus nunc 4 tantum stirpibus constans in-cluso *Leptocarpææ* genere DC. ob solam siliculam *teretusculam* nec *ancipitem* a *Turritide* haud divel-lendum.

* 1. *T. glabra* = L. sp: 930. = Spr: syst: II. 893. = Engl: bot: t. 777. Ic: taur: vol. 9. t. 72. f. 1 (Eur: omni, Sibir: In sylvis apriis *Astensis* provinciæ et collium *Taurinens:*, nec non secus viam inter *Settimo* et *Brandizzo* et circa *Moncrivello* ALL: n. 977. Circa sylvas in Provinc: *Segusii* RE fl: segus: p. 56. Supra l' *Idraulica* BALBIS: Prope *Venariam* RE fl: torin: I. p. 346. In pascuis glareolis *Novariæ* fere ubique BIROL: fl: acon: II. p. 15.). Bienn: Huc pertinet *Arabis lucida* L. fil. sec: SPR: quam cl: DC. refert inter *Arabides* non satis notas (syst: II. 242.); observat tamen, specimina quae vidit esse *Turridis glabrae* varr:; in descriptione Linnæana de *seminum serie* nulla mentio; hujusce *Arabidis* specimina mea ex hb: BIROLI illa habent *biserialia*; ergo ad *Turrideni* spectant, et a *glabra* non differunt nisi foliis omnibus paullo latioribus; in utraque siliculæ sunt *ancipites*.

* 2. *T. Loeselii* = R. Br: in h Kew: ed. 2. v. 4: p. 109. = Spr: syst: II: 894. = Jacq: fl: austr: t. 324.

sub *Sisymbrio* (*German:*, *Boruss:*, *Tauria*, *Græcia*, *Ital:* Circa *Loano* abunde reperit *BALBIS*: misc: 33.). *Ann:* Siliquæ teretiusculæ. *Specim:* meum ex *Molinario* semina habet 2-serialia. *Cons:* DC. sub *Leptocarpæa* in observat: (*Syst:* II. 202.).

XL. *BARBAREA* R. Br: in h. *Kew:* ed. 2. v. 4. p. 109. non *Scop:* = *Erysini* et *Sisymbrii* spec: L. (*Inter Arabisideas* DC.).

» *Cal:* erectus basi æqualis. *Pet:* integra. *Stam:* » edentula. *Siliq:* tetragona anceps, valvis concavis. » *Sem:* 1-serialia. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus constans 5-6 stirpibus habitu et cotyledonibus accumbentibus, ab *Erysimo* et *Sisymbrio* disjunctum.

* 1. *B. vulgaris* = R. Br: l. c. = Spr: syst. II. 894. = OEd: fl: dan: t. 985. sub *Erysimo Barbarea* L. var: α . Ic: taur: vol: 9. t. 40. f. 1. et vol. 13. t. 60. (*Eur:* fere omni, *Sibir:* In *Pedem:* ad fossas et secus prata ubique ALL: n. 993. RE, BIROL:). Perenn: In hortis ornamenti gratia colitur var: fl: pleno.

* 2. *B. præcox* = R. Br: l. c. = Spr: syst: II. 894. = Engl: bot: t. 1129. sub *Erysimo* (*Anglia*, *Gallia*, *Etruria*. *Pedem:* in agro *Monregalensi* secus agros et locis siccis ALL: auct: p. 19. sub *Sisymbrio Barbarea*. In *Sardiniae* montibus juxta rivulos *Moris* st: sard: I. p. 3.). Perenn: Vix a priori distincta statura minori foliisque superioribus pinnatifidis, et a LINN: tamquam sola var: considerata sub *Erysimo Barbarea* β .

3. *B. rupicola* = Moris stirp: sard: I: p. 55. (*Sardiniae* montibus inter fissuras rupium MORIS l. c.). Perenn: Affinem esse *B. præcoci*, habitu vero diuersam dicit cl: Auctor; sed distinctissimam video etiam a ceteris stirpibus foliis inferioribus longissime petiolatis rarissime sublyratis, superioribus vix incisis, siliquisque longioribus. Omissa a SPR: in c. p. et tentam:

XLI. NOTOCERAS R. Br: in H. Kew: ed. 2. v. 4. p. 117. = *Erysimi* sp: W. (Inter *Arabideas* DC.).

» *Cal*: eretiusculus basi æqualis. *Pet*: oblonga vel
» raro nulla. *Stam*: edentula. *Siliq*: sub-tetragona val-
» vis subcarinatis apice encervis in coronam productis.
» *Sem*: pauca uniserialia? compressa. *Cotyl*: accum-
» bentes. »

Obs: Genus 4-5. stirpibus constans inter se etiam in fructificatione dissimilibus modo ad *Alyssum*, modo ad *Capsellam* accendentibus; semina in nonnullis ignota; hinc non satis definitum.

i. *N. canariense* = R. Br: l. c. (Insul: *Canar*:). Ann: Siliquæ cornu 2-subulati. Semina in quoque loculo 4.

XLII. CHEIRANTHUS Lin: gen: n. 733. = Lam: ill: t. 564. (Inter *Arabideas* DC.).

» *Cal*: clausus, sepalis 2 lateralibus basi saccatis.
» *Pet*: obovata aut emarginata. *Stam*. edentula. *Siliq*:
» teres, compressa vel anceps stigmate 2-lobo vel
» capitato coronata. *Sem*: 1-serialia compressa im-
» marginata vel marginata. *Cotyl*: accumbentes. »

Obs: Genus jam pluribus speciebus constans, nunc 12-14 tantum ob creationem *Mathiolæ* et *Malcomiae*, quæ differunt præsertim stigmatis structura, et insuper *Malcolmia* cotyledonibus incumbentibus, divisum ab Auctoribus in 2 sectiones seminib: inspectis.

Sect. I.

Seminibus immarginatis (Cheiri DC.)

1. *Ch. Cheiri* = L. sp: 924. = Spr: syst: II. 895. = Schk. handb: 2. t. 184. Ic: Taur: vol. 9. t. 16. f. 1. et t. 18. 26. 27, 34. (*Eur:* med: et austr: In muris præsertim collium *Taurinens:* valde frequens, an ex hortorum rejectamentis? All: n. 987. In *Sardinia* ad rupes *Arenventa*, S. Michele *Cagliari* MORIS st: sard. I. p. 4.). Bien: , perenn: vel etiam fruticul: . Speciem *polymorpham* rite appellat DC. (syst. II. 180), variat enim multimode tum spontanea cum culta, sed flores constanter plus minusve lutei; pluries observavi semina immatura esse levissima ala cincta quam maturitate ammittunt; in hortis ubique colitur ornamenti gratia. Cons: COLLA Antol: bot: V. 855.

2. *Ch. ochroleucus* = Hall: fil: ex schl: cat: 16. (Mont: *Jura*). Perenn: Siliquis compressis, stigmate capitato-trilobo. Specim: ex PERRET in *Jura* lectum perfecte quadrat cum descript: DC. syst: II. 181. Huc pertinet *Ch. decumbens* W. sec: DC. et SPR: ; differt tantum in specimine meo statura undique majori. Confer tamen *Erysimum cheiranthum* n. 9.

Sect. II.

Seminibus marginatis (Cheirodes DC.)

3. *Ch: mutabilis* = L'Herit: st: nov: I. p. 92. (Mader: , Teneriff:). Fruticul: Siliquis teretiusculis, stigmate 2-lobo, varians floribus nascentibus ochroleucis vel albis ; in specim: meo folia sunt potius *lanceolata* quam *linearia*. *Ch: longifolius* Vent: malm: t. 83. de quo nulla mentio penes SPR: pertinet ad *mutabilem* sec: DC. syst: II. t83.; at specimina mea folia integerrima referentia magis accedunt ad stirpeim sequentem = 4. *Ch: scoparius* = W: en: 681. (Tenerif:). Fruticul: Valde priori affinis a quo differt tantum habitu duriori foliisque *integerrimis* nec *serratis*. Cult: in H. SPINII ex quo excerpta specim: mea floribus armeniaceis (var: γ *chamælo* DC.); foliisque prorsus linearibus. = 5. *Ch: semperflorens* = Schorb. maroc: ed: germ: p. 181. (Mauritania). Fruticul: Siliquis compressiusculis, stigmate sessili capitato. Planta statura praecedentibus majori, tota scabra, foliis alternis distantibus reapse linearibus, floribus albis sec: Auctores, ex sicco in specim: meo flavis = 6. *Ch: linifolius* = Pers: enh: II. 201. (Hispania). Fruticul: Vix a priori diversus foliis paulo latioribus minus distantibus ; in specim: meo ex BALBISIO planta est glabriuscula.

Cheiranthi dubii.

7. *Ch: rostratus* = H. Vindeb: ? Ita inscriptus in

scheda speciminum ex hb: BIROLI; differt a ceteris hujusce generis stirpibus, immo habitu a genere ipso, ad quod tamen fructificatione pertinere videtur. Planta tota glabriuscula; caules ex caudice plurimi herbacei (perennes?) adscendentes graciles pedales et ultra; folia radicalia et caulina inferiora longe petiolata ovato-oblonga integra vel plus minusve dentata, superiora sessilia lanceolata inaequaliter sinuato-dentata; racemi ante authesim subcorymbosi, dein elongati multiflori; flores subsessiles ebracteati; calyx basi subgibbosus sepalis lanceolatis albescensibus; petalorum unguis calyces superantes, laminæ ovato-oblongæ patentibus flavæ; stylus filiformis 3-lin: longus; stigma capitato-subbilocum; siliquæ rectæ lineares compressæ semipollicares 1-lin: latæ apice obtusæ stylo rigido coronatæ; semina ovalia compressa immarginata, Diagnosis hæc erit:

» Ch: caule herbaceo cæspitoso adscidente gracioli foliisque scabriusculis, inferioribus longe petiolatis ovato-oblongis, superioribus sessilibus lanceolatis inaequaliter sinuato-dentatis; floribus subsessilibus; siliquis erectis linearibus compressis; stylo filiformi rigido apiculatis. Nob: » Habit: ?

XLIII. MATHIOLA R. Br: in h. Kew: ed. 2. vol. 4. p. 119. non L. = *Cheiranthi* sp: Lin: (Inter *Arabideas* DC.).

» Cal: clausus basi saccatus. Pet: obovata aut elongata. Stam: edentula. Siliq: teres vel compressa stigmatibus conniventibus dorso incrassatis vel cor-

» nigeris connata. Sem: i-serialia compressa sæpius
» marginata. Cotyl: accumbentes. »

Obs. Genus a *Cheiranthis* sola stigmatis structura
reapse distinctum, constans spec: 28. ex DC., 21. ex
Spr: facile dividendum in 2 sectiones ex dorso sti-
gmatis *incrassato* vel *cornigero*.

Sect. I. *Stigmate incrassato ecorni.*

(*Pachynotum et Lupetia DC:*)

* 1. *M. incana* = R. Br. l. c. = Spr: syst: II. 896.
= Weinm: plyt: t. 643. f. a c et 644. f. a b sub
Cheiranthe (*Angl:*, *Eur:* austr: Ad rupes mari pro-
ximas prope *Villafranca* ALL: auct: p. 19. n. 987.
Sardinia in pascuis maritimis ins: *S. Pietro* MORIS
st: sard: I. p. 5.). Suffrut: vel perennis. Polymorpha
præsertim cultura, varians plenitudine et colore flo-
rum qui tamen numquam lutei: an huc pertineat
Ch: fenestralis L. (ita dictus non a loco *Fenestrella*æ
ut nonnulli existimarunt, ibi enim non crescit, sed
a dorso stigmatum conniventium *fenestram* relin-
quente), valde dûbito; haec enim nota inconstans in
varr: *M. incanæ*: ita censem Spr:, contrarium DC.
distinctam speciem admittens (*Mathiola fenestralis*
syst: II. 166.); ubique in hortis culta ornamenti
gratia: cons: COLLA Antol: bot: V. 857.

* 2. *M. sinuata* = R. Br: l. c. p. 120. = Spr:
syst: II. 896. = Engl: bot: t. 462. (*Angl:*, *Eur:*
austr: , *Afr:* bor.. In agro *Nicæensi* ALL: n. 992.
sub *Cheiranthe*. *Sardin:* in arenis maritimis *Oristano*
MORIS st: sard: I. p. 5.). Bien: Prima facie a *M. in-*

cana distinguitur caule herbaceo erecto, foliisque et siliquis floccoso-tomentosis; in hortis colitur, et variat quoque, uti prior, colore florum.

3. *M. annua* = Sweet: hort: suburb: 147. (In maritimis Eur: austr:). Ann: Confusa a R. Br: et SPR: cum *M. incana*, differt notis a me indicatis in Antol: bot: V. 859. Cl. DC. eam admittit commendans tamen florum cultoribus ut caute observent an per quoddam culturæ artificium *M. incana* in *annuam*, aut *annua* in *incanam* converti possit: natura abhorruit ab hujusmodi conversione; licet experimenta multiplicaverim post ea quae scripsi l. c. eadem semper evasit. = 4. *M. glabra* = DC. syst: II. 165. = Colla Antol: bot: V. 861. sub *Cheirantho glaberrimo* (Orient:, Persia). Ann. nec suffrut: uti ex DC. l. c. Huc pertinet *Cheiranthus græcus* Pers: enh: II. 201. (*Mathiola græca* DC. l. c. 166.), nisi malis *M. glabram* juxta SPR: sententiam inter *M. incanæ* var: recensere, si reapse est suffruticosa; sed tunc synonymum nostrum a DC. tributum *M. glabræ* transferendum ad *M. græcam* quæ est absque dubio annua, et flores gerit constanter albos = 5. *M. odoratissima* = R. Br: in h. Kew: ed. 2. v. 4. p. 120. (Tauria, Caucaso). Perenn: Petalorum laminæ oblongæ, fusco-purpurascentes ex sicco.

* 6. *M. tristis* = R. Br: l. c. = Spr: syst: II. 896. = Barr: ic: t. 999. non 803? (Eur: austr:, Afr: bor: In aridis et saxosis Pedem: sec: BOCCONE. In saxosis apricis arcis *La Brunette* ALL: n. 991. Re fl: segus: p. 56.). Basi suffruticosa. A cl. AILLIONIO hic confusæ duæ distinctæ species scilicet *Cheiranthus*

tristis L. de quo agimus, et *Ch. tristis* SUFFR: (*M. varia* DC.) de quo infra, *Sabaudiae* incola non *Pedemontii*. Ico BARR: 803. a DC. citata pro *M. tristis* reddit potius *M. variam*, folia enim ibi sunt *integerrima* nec *dentata*: ico autem 999 ab ALLIONIO laudata quadrat cum descriptione huiusce auctoris, et cum plantis pedemontanis.

* 7. *M. varia* = DC. syst. II. 171. = Spr: syst: II. 896. = Barr: ic: 803. ? Bot: mag: t. 729. (*Ital:* super:, *Græcia*. In *Sabaudia* inter *Termignon* et *Modane* ad vias ALL: n. 991. excl: syn: pro planta *pedemontana*). Differt a priori caudice vix suffruticoso, caule humiliori simpliciuseculo, foliis omnibus linearibus integerrimis, siliquis compressis, nec *tertiusculis*, unguibus petalorum *latrioribus*. Specimina possideo ex SUFFR: et PERRET missa sub nomine *Cheiranthi tristis* et *Ch. arenarii* SUFFR: in agro *Foro-iuliensi* et *Sabaudia* lecta, quæ perfecte quadrant cum descript: DC. l. c.

Sect. II.

Stigmate cornigero (Pinaria et Acinotum DC.)

* 8. *M. tricuspidata* = R. Br: in h. Kew: ed: 2. v. 4. p. 120. = Spr: syst: II. 897. = Schk: hand: II. n. 1846. t. 184. (Ad litora maris *Mediter:* In sabulis ad maris *Nicæensis* litus ALL: auct: p. 19. sub *Cheirantho*. In arenis maritimis *Sardiniae* frequens MORIS st: sard: I. p. 5.). Ann: Petala obovata purpurea: variat sec: DC. floribus interdum maioribus, et herba plus minusve tomentosa. Specim: meum a

MOLINERIO *Nicææ* lectum est undique pube ramosa hirsuto-tomentosum.

9. *M. parviflora* = R. Br: l. c. p. 121. (*Hispan: austr:, Mauritan:*). Ann: Valde priori affinis, sed satis distincta praesertim foliis *repando-dentatis*, nec *sinuato-pinnatifidis*, et siliquarum cornubus inæquilibus sc: lateralibus *acutis longissimis*, medio *obtuso brevissimo*: flores insuper omnino sessiles, et minores: specim: ex BALBISIO.

XLIV. MALCOLMIA R. Br: in h. Kew: ed: 2. vol: 4. p. 121. = *Cheiranthi* et *Hesperidis* sp: Lin: (Inter *Sisymbreas* DC.).

» *Cal:* clausus basi gibbosus vel subæqualis. *Pet:*
» obovata aut emarginata. *Stam:* edentula. *Siliq:* teres
» stigmate acuminato coronata. *Sem:* 1-serialia immar-
» ginata. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus a *Mathiola* distinctum stigmatis struc-
tura et cotyledonum directione, *Hesperidi* valde af-
fine, constans 15 speciebus circiter.

1. *M. africana* = R. Br: l. c. (*Eur: austr:, Afr:*
bor:). Ann: Calyx basi subæqualis, stigma breve.

= 2. *M. laxa* = DC. syst: II. 240. (*Sibir:*). Ann:
Priori valde affinis, sed satis distincta, præsertim
foliis siliquisque *glabris*, nec *pubescentibus*. Specim:
meum perfectissimum folia radicalia habet lanceolata
caulinis simillima, nec *pinnatifida* uti ex descript:
PALLASII sub *Cheiranthe Chio.* = 3. *M. Chia* = DC.
syst: II. 440. (*Græcia*). Ann: Flores parvi; petala
purpurascentia.

* 4. *M. maritima* = R. Br: in h. Kew: ed: 2. vol:

4. p. 121. = Spr: syst: II. 898. = Bot: mag: t. 166.
sub *Cheiranthe*. Ic: taur: vol. 9. t. 54. f. 2. (*Eur:*
aust:, *Numidia*. In agro *Nicæensi* ALL: n. 989. sub
Cheiranthe maritimo, non sub *Ch: littoreo* uti dixit
DC. syst: II. 441.). Ann: Vix a priori distincta ra-
cemo post anthesim *non elongato*, floribus *duplo*
maioribus pallidioribusque, stylis longioribus; ad or-
namentum in hortis sæpe culta.

5. *M. arenaria* = DC. syst: II. 442. (*Afr:* bor:).
Ann: Flores fere *M. maritimæ*. Cult: in h. Ripul:
quadrat cum descript: et icona FONTAINESII Atl: II.
t. 162. sub *Hesperide*. = 6. *M. parviflora* = DC.
fl: fr: ed: 3. vol: 4. p. 654. (*Gallia* austr: , *Italia*,
Corsica. In arenis maritimis *Sardin:* MORIS st: sard:
I. p. 5.). Ann: Radix longissima caulem superans;
flores minimi violacei, stylus brevissimus. Specim: ex
Gallia et *Sardinia*.

* 7. *M. littorea* = R. Br: in h. Kew: ed: 2. vol:
4. p. 121. = Spr: syst: 898. = Clus: hist: I. p.
298. f. 2. Ic: taur: vol: 23. t. 65. sub *Cheiranthe*
(*Gall:* occid: , *Eur:* austr: , *Mauritania*. In littore
Nicæensi ALL: n. 990.). Bienn: Præcedentium hu-
milior; flores parvi, albido-flavescentes. Specim: ex
agro *Nicæensi*.

XLV. HESPERIS Lin: gen: n. 817. inclusis *Malcolmiae*
stirpibus (Inter *Sisymbreas* DC.).

» *Cal:* clausus basi saccatus. *Pet:* linearia vel obo-
» vata. *Stam:* edentula lateralia basi glandulosa. *Si-*
» *liq:* subtetragona vel compressa stigmatibus 2 con-

» niventeribus sub-obtusis crassiusculis coronata. Sem:
» 1-serialia. *Cotyl:* accumbentes. »

Obs: Genus vix a *Malcolmia* distinctum stigmatibus crassiusculis sub-obtusis nec acuminatis; habitu quoque paullo diversum, modo constans speciebus 20. circiter.

1. *H. tristis* = L. sp: 927. (*Austr:* , *Hungar:* , *Transylv:* , *Tauria* , *Ital:* med:). Bienn: Flores noctu odori, fusco-rubentes; petalorum laminæ oblongæ; siliquæ compressæ. Culta in H. B. T., ex quo specimen mea.

* 2. *H. laciniata* = All: ped: n. 985. = Spr: syst: II. 899. = All: l. c. t. 82. f. 1. Ic: taur: vol: 28. t. 95. (*Gall:* austr: et orient: , *Ucrania* , *Italia* . *Pedem:* ad rupes locis apricis et sole percussis circa *la Briga* et *Sospello* ALL: l. c.). Bienn: Flores noctu odori plus minusve purpurascentes; petalorum laminæ obovatæ; siliquæ teretiusculæ; folia radicalia in speciminiibus meis ex *MOLINERIO* longissime petiolata.

3. *H. runcinata* = Waldst: et Kit: pl: rar: hung: II. p. 220. (*Hungaria*). Bienn: Flores noctu odori; in sicco ex violaceo albidi; petalorum laminæ obovatæ; siliquæ subcompressæ erectæ, dein deflexæ.

* 4. *H. matronalis* = L. sp: 927. = Spr: syst: II. 899. = Lam: ill: t. 524. f. 1. Ic: taur: vol: 9. t. 15. 37. (*Europ:* , *Sibir:* , *Pedem:* In sylvis supra *Bobbio* copiosissima ALL: n. 982. In sylvis prope *Superga* et aliis locis collium *Taurinens:* invenerunt BES et BERTOLA sec: RE fl: tor: p. 345. An reapse spontanea?). Perenn: Multimode varians magnitudine, co-

lore, et plenitudine florum. Cons: DC. syst: II. 451.
In hortis ubique culta ornamenti gratia. Huc pertinere videtur *H. sylvestris* quam ALL: n. 983. *Limone* et *Uneliæ* incolam dicit, ex synonymia eadem ac *H. inodora* L. sp. 927. Specimina mea non differunt nisi habitu laxiori, petalis obtusioribus, foliisque minus hirsutis.

5. *H. ramosissima* = Desf: atl: II. p. 91. t. 161.
(*Ægypt:*, *Afr:* bor:). Ann: Divaricata, ramosissima;
folia oblonga subintegra, siliquæ scabriusculæ toru-
losæ = 6. *H. elata* = Horn: 4. hafn: suppl: 74.
(Hab:?). Bienn: Omissa a SPR:, inter dubias enu-
merata a DC., videtur ex specim: meis ab HORN:
missis ad BIROLIUM, optimam speciem distinctam
constituere. *Caulis* erectus teres 2-3-pedalis ramosis-
simus subhirsutus. *Folia* inferiora subamplexicaulia
basi cordata ovata acuta, superiora sessilia lanceolata
basim versus attenuata apice acuminata, omnia re-
mote lanceolata glabriuscula glaucescentia. *Racemi*
terminales et oppositifolii iuniores subcorymbosi dein
valde elongati multiflori, pedicellis calycibusque hir-
sutiussculis paullo longioribus. *Petala* ex sicco flave-
scientia (an alba?) unguibus patentibus longitudine
calycis obovati integerrimis (et apice emarginatis ex
HORN:?). *Siliquæ* subangulatæ compressæ erectæ gla-
bræ 2-pollicares stigmatibus brevissimis. Ex quibus
diagnosem ita propono:

- » *H.* caule herbaceo erecto ramosissimo subhirsuto;
- » foliis glabriusculis remote denticulatis, inferioribus
- » subamplexicaulibus ovatis acutis, superioribus ses-
- » silibus lanceolatis acuminatis; pedicellis calycibus-

» que hirsutiusculis paullo longioribus; petalis obovatis; siliquis compressis erectis glabris ». Nob:

XLVI. SISYMBRIUM Lin: gen: n. 728. = Lam: ill: t. 565: (Inter *Sisymbreas* DC.).

» *Cal*: subpatens basi æqualis. *Pet*: integra. *Stam*: edentula. *Siliq*: teretiuscula vel subangulata stylo subnullo. *Semina* 1-serialia. *Cotyl*: incumbentes. »

Obs: Genus constans 50 circiter stirpibus, valde obscurum, habitu diversum, vix ab *Hesperide* calyce basi æquali, stylo subnullo nec stigmatibus conniventibus distinctum, ita polymorphum, ut speciosas DC. divisiones respuat, facilius ex foliorum compositione artificialiter dividendum.

† *Foliis indivisis.*

1. *S. hispanicum* = Jacq: coll: I. p. 69. (*Hispania*). Bien: Flores minimi flavescentes; siliquæ brevissimæ teretiusculæ (in specim: meis erectæ demum arcuatæ); stigma sessile obtusum.

* 2. *S. strictissimum* = L. sp: 922. = Spr: syst: II. 901. = Jacq: fl: austr: t. 194. Ic: taur: vol. 9. t. 88. (*Eur*: med: Locis incultis agri *Nicæensis*, valle *Maurianensi*, circa *Moutiers*, valle *Augustæ Prætoriae* ALL: n. 1009.). Perenn: Flores parvi flavidi, siliquæ 2-pollicares teretiusculæ, stigma sessile truncato-2-fidum.

3. *S. subhastatum* = W. en: 679. (In insulis *Archipelagi*). Ann: Flores mediocres flavidi, siliquæ sub-teretes 2-3-pollicares patentissimæ, stigma sessile sub-globosum. In specim: meo ex hb: BIROLI folia omnia *integra* sunt ac *lanceolata*, nec ulla *hastata*.

†† *Foliis pinnatifidis.*

* 4. *S. polyceraton* = L: sp: 918. = Spr: syst: II. 901. = Jacq: h. vind: t. 79. Ic: taur: vol. 27. t. 82. (*Eur: austr: Ad muros ubique comitatus Astensis et Montisferrati* ALL: n. 1008. *Sardin:* in rude-ratis *S. Antioco* et *Carloforte* MORIS st: sard: I. p. 5.). Ann: Flores parvi flavi in axillis foliorum sessiles; siliquæ semipollicares teretiusculæ, stigma subsessile crassum.

5. *S. supinum* = L. sp: 917. (*Gallia, Hispan: , Gothland*). Ann: Flores parvi albi racemosi; siliquæ teretiusculæ in specim: meis ex *Hispania scabriuscum* nec *glabræ*; stylus brevis crassiusculus truncatus.

= 6. *S. pumilum* = Steph: in W. sp: III. 507. (*Persia, Caucaso, Iberia*). Ann: Specimen digitale, floribus parvis flavis, pedicellis fructiferis siliquas teretiusulas subæquantibus, stigmate subsessili capitato-truncato. = 7. *S. hirsutum* = Lag: ex Dufour in litt: sec: DC. syst: II. 478. (*Madriti*). Ann: Specimina mea 1 - 2 - pedalia nec *caulis humilis*; flores parvi albidi; siliquæ compressiusculæ; stigma sessile truncato 2-fidum.

* 8. *S. Columnæ* = Murr: syst: ed: 14. p. 596. = Spr: syst: II. 902. = Jacq: fl: austr: t. 323. (*Eur: austr: et orient: , Asia min: Pedemont: in pratis Burgimaneiri et Maggiate* sec: BIROLI fl: acon: II. p. 13. In *Sardin:* ad vias pro var: *orientali* MORIS st: sard: II. p. 1.). Ann: Summopere variat magnitudine partium, pube, foliorum lobis etc. Cons: DC. syst: II. 469. Flores mediocres albidi; siliquæ teretiusculæ; stigma sessile sub-2-fidum.

* 9. *S. officinale* = Scop: carn: ed: 2. n. 824. = Spr: syst: II. 902. = Engl: bot: t. 725. sub *Erysimo*. Ic: taur: vol. 9. t. 76. f. 2. (*Eur*: omni, *Afr*: bor:, *Amer*: bor: *Pedem*: in ruderatis ad vias et muros ubique non longe a domiciliis All: n. 1010. RE, BIROLI. In *Sardin*: ad vias MORIS st: sard: I. p. 5.). Ann: Flores minimi luteoli; siliquæ tereti-subulatæ breves; stylus mucronatus, sed oculis armatis stigmate obtuso terminatus.

*? 10. *S. obtusangulum* = Schleich: cat: p. 48. = Spr: syst: II. 902. = I. Bauh: hist: 2. p. 862. f. 3. sub *Eruca odorosa*. (*Hispan*:, *Gallia*, *Helvet*: In *Pedemont*: sec: DC. syst: II. 465?). Ann: , bienn: Flores mediocres slavi; siliquæ subtetragonæ pollicares; stigma sessile capitatum. Indigenum numquam inveni, nec nostri illud memorant quod sciam.

11. *S. pannonicum* = Jacq: coll: I. p. 70. (*Helvet*:, *Hungar*:, *Transylv*:, *Tauria*, *Caucas*:). Ann: Flores mediocres slavescentes; siliquæ teretiusculæ 2-3-pollicares; stigma sessile subglobosum.

* 12. *S. pinnatifidum* = DC. syst: II. 481. = Spr: syst: II. 903. = Lam: ill: t. 563. f. 3. sub *Arabide*. All: pedem: t. 57. f. 3. sub *S. dentato*. Ic: taur: vol. 15. t. 102. f. 3. (*Gallia*, *Helvet*:, *Italia*. *Pedem*: in pratis de *Saint Remis*, magni *S. Bernardi*, inter *Ceresole* et *Bonaval*, et in *M. Cenisio* abunde incolit pascua saxosa summarum *Alpium* All: n. 1001. RE fl: segus: p. 55. sub *S. bursifolio* GOUAN non L.). Perenn: Specimina ex *Cenisio digitalia* nec *palmaria* uti in iconе All: ceterum optima.

13. *S. gallicum* = W. en: 678. (*Gallia*). Ann:

Stirps inter *S. dubia* enumerata a DC. (syst: II. 487.) cum diagnosis W., tamquam *S. Irionis* var: considerata in Prodr: I. 192. n. 13. δ, mihi videtur satis distincta. *Caulis* erectus pedalis teretiusculus striatus inferne puberulus hinc glaber ramosus: *folia* omnia sublyrata pinnati-partita, lobis oppositis alternisve obtuse inæqualiter sinuatis, margine leviter sub-ciliata ceterum glaberrima: *racemi* terminales laxi elongati; *pedicelli* filiformes calyce longiores; *flores* albidi; *siliquæ* patentissimæ, compressiusculæ glabræ pollicares et ultra, 1 - lin: latæ, stylo 2 - lin: longo filiformi apiculatæ (nec *mucronatæ* ut in diagn: W.); *stigma* globosum; *semina* ad quamque placentam 15-20 ovata parva fusca. = 14. *S. bursifolium* = L. amæn: 4. p. 322. non Gouan: (*Sicil:*, *Pyren:*). Ann: Flores parvi albidi, *siliquæ* sesquipollicares teretiusculæ; stylus brevissimus incrassatus. = 15. *S. asperum* = L. sp: 920. (*Gall:* austr:, *Hispan:*, *Lusitan:*). Ann: Flores parvi flavi; *siliquæ* teretes semipollicares patentes; stylus brevissimus subincrassatus. = 16. *S. ramulosum* = Delil: eg: ill: 19. (*Ægypt:*). Ann: Glabrum; rami graciles virgati; *racemi* longissimi; flores minimi albidi; *siliquæ* filiformes pollicares et ultra.

* 17. *S. Irio* = L. amæn: 4. p. 270. = Spr: syst: II. 903. = Jacq: fl: austr: t. 322. Ic: taur: vol: 27. t. 89. (*Europ:*, *Arabia*, *Pedem:* in vallis inter saxa et præcipue ad ripas *Duriæ*, in valle *Exillarum* ubique frequens, secus muros et in ruderatis *Montisferrati* et *Dertonensis* provinciæ All: n. 1007. Prope *Segusium* ad muros RE fl: segus: p. 56. Sar-

din: ad muros et in ruderatis MORIS st: sard: I. p. 5.). Ann: Flores parvi flavi; siliquæ teretiusculæ pollicares; stigma sessile subglobosum. *S. glabrum* W. quod habeo ex hb: BIROLI a cl: OTTO missum ne minimum differt.

* 18. *S. acutangulum* = DC. syst: II. 465. = Spr: syst. II. 904. = Jacq: h. vind: 3. p. 50. t. 97. sub *Sinape pyrenaica*. All: pedem: t. 55. f. 1. Ic: taur: vol. 9. t. 93. (*Gallia*, *Pyren:*, *Italia*. Pedem: circa casas Alpium in *M. Cenisio* et *Valdensium* Alpib: uti etiam in Alpib: di *Vìù* ALL: n. 960. RE fl: segus: p. 57.). Bienn: Flores mediocres flavi; siliquæ teretes substriatae pollicares; stigma subsessile.

19. *S. taraxacifolium* = DC. fl: fr: ed: 3. vol. 4. p. 670. (*Gallo-provinc:*, *Hispan:*). Bienn: Flores parvi flavi; siliquæ teretiusculæ semipollicares confertæ potius rectæ in specim: meis quam *declinatæ* uti in diagn: Auctorum; stigma sessile oblongum. *S. contortum* LAG: quod possideo ex BALBISIO non differt a *S. fugaci* ejusdem auctoris, nec a *S. taraxacifolio*. = 20. *S. Zeæ* = Spr: syst: II. 904. *S. nitidum* Zeæ in Desf: cat: h. par: 1815. p. 153. et DC. syst: II. 468. (*Hispania*). Ann: Flores parvi flavi; siliquæ filiformes pollicares et ultra glabræ sessiles; stigma sessile capitato-truncatum. Valde dubito hic ab Auctoribus citatis duas plantas suisse confusas; cl: DC. pedicellos fructiferos describit 2-3-lin: *longos*, et siliquas *patentes*; SPRENGELIUS autem has dicit *sessiles incurvo-patulas*; ita sunt in specim: meis ex hb: BIROLI, culta ne, an spontanea, scheda non indicat.

* 21. *S. austriacum* = Jacq: austr: 3. t. 262. =

Spr: syst: II. 904. (*Germania* med: et austr:, *Helvet.*, *Gallia* austr: *Pedem:* pro var: δ *Tillieri* ex *BELLARDI* ined:). Bienn: Stirps admodum dubia, et polymorpha præsertim in foliis: specimina mea indigena ex *BELLARDI* sub nomine *S. Tillieri* habent flores mediocres albidos, siliquas filiformes vix pollicares sub-erecto-incurvas, pedicellos 3-lin: longos, stigma sessile capitatum. Huc referenda *Sinapis maritima* ALL: n. 961. ab Auctoribus omissa quæ nascitur circa *Uneliam*, *Col di Tenda* versus *Nicœam* et ad thermas *Vinadii*.

+++ *Foliis pinnatis.*

* 22. *S. tanacetifolium* = L. sp: 916. non Walt: = Spr: syst: II. 904. = Moris: hist: 2. p. 231. s. 3. t. 6. f. 19. Ic: taur: vol. 9. n. 89. (*Helvet.*, *Gallia* austr: *Pedem:* in *M. Cenisio*, in pascuis umbrosis circa thermas *Vinadii* et *Valderii*, in alpib: *Sabaudiae* et *Valdensium* ALL: n. 999. Ubertim in montibus *di Chaumont* RE fl: segus: p. 55.). Perenn: Flores mediocres flavi in corymbum confertissimi; siliquæ graciles 2-3-lin: longæ; stylus minimus.

++++ *Foliis decompositis.*

* 23. *S. Sophia* = L. sp: 922. = Spr: syst: II. 904. = Engl: bot: t. 963. Ic: taur: vol. 9. t. 75. f. 2. (*Europ:* omni. *Pedem:* in sabulosis hortorum ambulacris ad muros et vias locis siccis copiose ALL: n. 1006. Præsertim circa *Cavoretto* RE fl: torin: I. 343. In *Sabaudia* circa muros et ruderata GERNER: In agro *Novariensi* ad vias præsertim *Mediolani* et ruderatis *BIROLI* fl: acon: II. p. 13.). Ann: Flores parvi flavi;

siliquæ teretiusculæ semipollicares incurvo - erectæ ; stigma sessile crassiusculum minimum.

24. *S. persicum* = Spr: nov: prov: p. 39. n. 88. (*Persia*). Ann: Priori affine, sed prima facie distinctissimum habitu valde graciliori, racemisque paucifloris, insuper petalis calycem *excedentibus* nec eo *brevioribus*, siliquis prorsus *erectis* nec *incurvis*, foliorumque laciniis apice *dilatatis* nec *acutis*.

Sisymbria dubia.

25. *S. affine* = W. en: suppl: 44. (Patria?). Planta annua a DC. syst: II. 487. enumerata inter *Sisymbria dubia*, hinc in Prodr: I. 192. tamquam *S. taraxacifolii* var: relata, demum a SPR: ad *S. subhastatum* W. amanda; specimen meum ex hb: BIROLI differt a *S. taraxacifolio* n. 19., cui magis affine foliis *latiōribus*, racemis *paniculatis*, floribus *majoribus*, siliquis magis *distantib⁹*, stigmate *capitato*; a *S. subhastato* n. 3. habitu, foliis omnibus *runcinatis pinnatifidis*, siliquis *gracilib⁹* multoties *brevioribus*; nec phrasis W. l. c. videtur satis apta, hinc sequentem propono:

» *S. caule erecto foliisque runcinato - pinnatifidis*
 » *glabris, laciniis inæqualibus acutis dentatis, race-*
 » *mis paniculatis, pedicellis flores subæquantibus,*
 » *petalis calyce longioribus, siliquis gracillimis sub-*
 » *erectis glabris, stigmate sessili capitato (flores me-*
 » *diocres flavi).* » Nob.

26. *S. præcox* = Birol: hb: sine ulla indicatione. Hab....?

» *S. caule erecto foliisque glabris, inferioribus et*
 » *mediis lyratis, superioribus runcinatis, laciniis ob-*

» longis subæqualibus integris suprema ovata dentata;
 » racemis elongatis; pedicellis flore brevioribus; pe-
 » talis calycem superantibus, siliquis teretiusculis
 » erectis glabris, stigmate sessili subincrassato (flores
 » flavi parvi). » Nob:

27. *S. polystachyum* = H. Berol: Ex hb: BIROLI
 sine alia indicatione. Hab....?

» *S.* caule elato foliisque glabris, inferioribus sub-
 » lyratis, ceteris lanceolatis integris dentatisve; ra-
 » cemo terminali spicato folioso; pedicellis florem
 » subæquantibus; petalis calycis longitudine; siliquis
 » teretiusculis patentissimis brevibus approximatis gla-
 » bris; stylo brevi acuto (flores albidi minimi). » Nob:

28. *S. brachylobum* = H. Berol: ? *S. asperrimum*
 Ort: *S. asperum* Hortul: sic scheda inscripta in hb:
 BIROLI. In specimine deest plantæ pars inferior; folia
 superiora et fructificatio a *S. aspero* n. 15. non vi-
 dentur differre.

29. *S. Nuttallii* = Nob: *S. cinereum* Nutt: sec:
 BERTERUM in sched: semin: non DESF: Enatum e semi-
 nibus missis a BERTERO *Chili* lectis in arenosis secus
flumen Quilota a ceteris videtur distinctum, et no-
 men immutandum ne confundatur cum antiquiori *S.*
cinereo DESF: fl: atl: II. p. 83. t. 157. a quo toto
 cœlo aberrat; phrasis hæc erit:

» *S. erectum* villoso - cinerascens, foliis omnibus
 » pinnatis strictis, foliolis 2-pinnatifidis, lobis ro-
 » tundatis angustissimis; racemis terminalibus lon-
 » gissimis; pedicellis flore minimo longioribus; petalis
 » calycem subæquantibus; siliquis teretiusculis sub-
 » erectis glabris; stigmate sessili subcapitato. » Nob:

XLVII. ERYSUM Lin: gen: 729. = Goertn: fruct: II.
t. 143. (Inter *Sisymbreas* DC.)

» *Cal:* clausus vel raro patulus basi subæqualis.
» *Pet:* integra obovata. *Stam:* edentula. *Siliq:* plus
» minusve tetragona sessilis aut pediculata stylo elon-
» gato vel brevissimo et stigmate vario apiculata. *Sem:*
» 1-sericalia. *Cotyl:* incumbentes. »

Obs: Genus a *Sisymbrio* præsertim siliqua *tetra-*
gona distinctum , artificialiter a DC. divisum in 4.
sectiones præcipue e styli mensura et pedicelli præ-
sentia , constans 44. speciebus detracto *Alliariæ* ge-
nere , 36. tantum ex SPR: *Alliaria* inclusa solo calyce
patulo diversa , hinc rectius pro sectione admittenda.

† *Calyce clauso deciduo , siliquis exacte tetragonis*
(*Erysimastrum* DC. *Genuina* SPR:)

α Foliis integerrimis.

1. *E. suffruticosum* = Spr: nov: prov: p. 17. n. 36.
(*Hispania*). Basi suffruticosum. Habitus *Cheiranthi*
Cheiri; flores flavi; calyx subgibbosus; siliquæ polli-
caries erectæ; stylus brevissimus; stigma capitato -
truncatum.

* 2. *E. helvetica* = DC. fl: fr: ed: 3. v. 4. p.
658. = Spr: syst: II. 905. = Jacq: h: vindeb: t. 9.
sub *Cheiranthe*. All: pedem: t. 58. f. 2. sub *Chei-*
ranthe Boccone? (Alpib: *Cottiis*, *penninis*, *carpath:*
Comitatu Nicæensi inter *Villafranca* et *Menton*; circa
Augustam prætoriam ALL: n. 988. Prope *Segusium*
in apricis delle *Blaccie* RE fl: segus: p. 56.). Bienn:

Flores flavi; siliquæ rectæ 2-pollicares; stylus brevis; stigma capitatum. Specim: mea ex valle Augustiana parum consona cum icon: ALLIONII; forsitan bene suspicatus est cl: DC. plantam nicæensem confusam fuisse cum augustana de qua agimus, illam autem ad sequentem pertinere.

* 3. *E. canescens* = Roth: cat: bot: I. p. 76. = Spr: syst: II. 904. = Jacq: fl: austr: I. p. 75. sub *Cheiranthe alpino*. All: pedem: t. 58. f. 2. sub Ch: *Boccone*. Ic: taur: vol. 19. t. 50. (*Eur*: austr: Agro *Nicæensi*). Bienn: Calyx sub - gibbosus, flores mediocres flavi; siliquæ eretiusculæ 2 - pollicares; stigma sessile sub - bilobum. Vix a priori diversum foliis radicalibus potius *lanceolatis* quam *linearibus*, stigmatibusque sessilibus; huic magis quadrat ico All: supra citata.

β Foliis dentatis.

4. *E. odoratum* = Ehr: beitr: 7. p. 157. (*Hungar*:). Bienn: Planta dubia ob confusionem Auctorum; admissa a DC. syst: II. 496. tamquam species distincta ab *E. stricto* GOERTN: (*E. hieracifolium* JACQ:); enumerata in Prodr: I. 197. pro sola ejus varietate; descripta a SPR: pro specie distinctissima. Specimen meum ex BALBISIO differt ab *E. hieracifolio* caule vix ramoso, foliis subintegris, siliquis brevioribus, stigmate patentius 2-lobo. = 5. *E. virgatum* = Roth: cat: bot: 75. non Schleich: (*Germania med*:). Bienn: Vix a priori diversum racemis virgatis, petalis obolongis nec subrotundis, siliquis stylo brevi coronatis; insuper folia in specim: meo ex BALBISIO omnia inte-

gerrima: nec ulla denticulata. = 6. *E. longisiliquum* = Schleich: pl: exsic: = Spr: syst: II. 906. (*Helvet:*, *German:* med:). Bienn: Ab *E. virgato* ROTH: non differt nisi siliquis valde longioribus sc: 2 - pollicari- bus et ultra.

* 7. *E. hieracifolium* = L. sp: 923. non DC. ? = Spr: syst: II. 906. = Bauh: hist: 2. p. 873. f. 2. ? Ic: taur: vol. 23. t. 64. (*Eur: Pedem:* in montib: *Vinadiensibus* et vallis *Macræ* frequens locis apricis. In valle *Sturæ* circa *Berzè*; *Sabaud:* inter *Termignon* et *Lanslebourg* ALL: n. 997.). Bienn: Ex synonymia ALLIONII comparata cum synonymia DC. circa *E. strictum* (Syst: II. 495.) planta pedemontana ad hoc potius, quam ad *hieracifolium* ejusdem CANDOLLEI videtur referenda; ita existimat etiam SPR: qui hoc refert ad *E. crepidifolium* REICHENB: Ceterum stirpes hæ, sc: n. 3. 4. 5. 6. ita sunt affines, ut nec ex iconibus, nec e plantis siccis veris characteribus botanicis distingui queant.

* 8. *E. cheiranthoides* = L. sp: 923. non Crantz. = Spr: syst: II. 906. = Jacq: fl: austr: t. 23. Ic: taur: vol. 13. t. 40. (*Eur: omni, Sibir:, Amer: bor:* In agro *Nicæensi* ALL: n. 996.). Ann: Habitu facile a præcedentibus distinguitur, nec non floribus minoribus, pedicellis fructiferis siliquas fere æquantibus, stigmate parvo sessili; variat tamen caule subaphyllo (*Cheiranthus scapigerus* W.), et caule diffuso siliisque longioribus stylo brevi terminatis (*Cheiranthus aquaticus* LEJEUN:). Huc pertinet *E. ramiflorum* BERNH: ined: ex hb: BIROLI, quod non differt nisi caule ramosissimo ramisque fere omnibus fructiferis.

* 9. *E. repandum* = L. sp: 923. = Spr: syst: II. 906. = Jacq: austr: t. 22. Ic: taur: vol. 9. t. 76. f. 1. (*Eur:* et *Asia* med: *Pedem:* in agris vallis *di Fenestrelle* All: n. 995.). Ann: Flores mediocres flavi; petala oblonga; siliquæ sesqui-pollicares stigmate sessili vel quandoque stylo brevi coronatæ in eodem individuo; folia omnia etiam caulinæ runcinata in specim: meo spontaneo ex MOLINERIO.

* 10. *E. Cheiranthus* = Pers: Ench: II. p. 199. = Spr: syst: II. 907. = Jacq: austr: t. 74. sub *Cheiranthe erisymoide* L. All: pedem: t. 20. f. 2. sub *Cheiranthe alpino* (*Eur:* omni. *Pedem:* ubique in saxosis et rupestribus alpium All: n. 986. *All'As-siette* et *M. Cenisio* Re fl: segus: p. 56. In pascuis supra *Premosello* provinc: *Novariensis* unice et rarum sec: BIROLI fl: acon: II: p. 14. sub *Cheiranthe erisymoide*). Bienn: Stirps admodum dubia ex synonymorum confusione; recte observaverat celeberrimus AL-LIONIUS de suo *Cheiranthe alpino*, mirum esse quantum foliis ludat pro locorum diversitate, ceu indicat etiam ico ab eo prædita, quæ valde differt a descriptionibus et iconibus Auctorum, et a specimiñibus meis. Huc videtur quoque referendum *E. dubium* Hom: haud diversum ab *E. lanceolato* R. Br: sub quo nomine hanc plantam enumerat DC. syst: II. 502.

11. *E. ibericum* = DC. syst: II. 498. (*Caucaso, America*). Bienn: Calyx sub-gibbosus; flores parvi flavi; siliquæ patentes graciles semipollicares; stigma sessile sub-2-lobum.

†† *Siliquis non exacte tetragonis*
 (Descendentia SPR:)

α Calyce patulo (*Alliariæ genus DC.*)

* 12. *E. Alliaria* = L. sp: 922. = Spr: syst: II. 908. = Oed. fl: dan: t. 935. Ic: taur: vol 9. t. 54. f. 1. (*Eur: omni, Asia med: Pedem: in umbrosis et ad sepes præcipue in collibus frequens ALL: n. 994.* Prope *Segusium* abunde in pratis *della Bretagna* et *di Croale RE* fl: segus: p. 56. In agro *Novariensi* ad colles *BIROLI* fl: acon: II. p. 13.). Bienn: Flores albidæ parvi; siliquæ tetrahedræ brevi pedicellatæ semi-pollicares; stigma sessile depresso.

β Glaberrimæ calyce clauso (*Coringia DC.*)

* 13. *E. persoliatum* = Crantz: fl: austr: 27. = Spr: syst: II. 508. = Jacq: fl: austr: t. 282. sub *Brassica orientali*. Ic: taur: vol. 9. t. 36. f. 2. (*Eur: omni, Asia med: , Japon: In agro Nicæensi ALL: n. n. 964.*). Ann: Calyx sub-gibbosus; flores albi parvi; siliquæ subtetragonæ longe pedicellatæ 1-2-pollicares; stigma sessile subemarginatum.

γ Subsessiles stylo longo

(*Syreniæ sp: Andr:; Stylonema et Cuspidaria DC.*)

14. *E. sessiliflorum* = R. Br: in h: Kew: ed: 2. v. 4. p. 116. (*Tauria, Caucaso, Sibir:*). Perenn: vel bienn: Specimen sine flore ex BALBISIO sub nomine *Cheiranthi quadranguli* valde dubium, siliquæ enim non pedicellatæ nec sessiles stylo brevi nec longo api-

culatæ; in ceteris quadrat. = 15. *E. angustifolium* = Ehr: beitr: 7. p. 155. (*Hungar:*, *Transylv:*, *Podolia*). Bienn: Calyx sub-gibbosus; flores mediocres flavi sessiles, siliquæ brevissime pedicellatae tetragonæ semipollicares erectæ; stylus 3-lin: longus; stigma bifurcatum. = 16. *E. cuspidatum* = DC. syst: II. 493. (*Tauria*, *Caucaso*, *Asia min:*). Bienn: Calyx æqualis; flores parvi flavi sub-sessiles; siliquæ strictæ tetragono-ancipites vix semipollicares; stylus 3 - lin: longus; stygma compresso-sub-2-lobum. Huc pertinet absque dubio *Syrenia Biebersteiniana* ANDR: enumerata a DC. syst: II. 493., a ΤΕΝΟΡ: ind: sem: 1824. et a me in H. Ripul: app: III. p. 52. cum dubitatio-
nis signo, a SPR: omissa. An idem dicendum de *Sy-
renia Ehrbertiana* (COLLA l. c.)? Valde dubito ex
habitū elatiori, foliisque caulinis longioribus subcus-
pidatis; fructificatio tamen eadem; an ergo sola va-
rietas? Cultæ in H. Ripul:

Erysima dubia.

17. *E. Fischerianum* = Prescott? hab: *Altai*. = Ita in scheda speciminum a cl: FISCHERIO sine alia indica-
tione. *Herba* humilis; *caulis* angulatus adscendens sim-
plicissimus; *folia* radicalia fasciculata longe petio-
lata, caulina alterna in petiolum breve attenuata,
omnia lanceolata acuta subdentata pube adpressa sub-
canescentia; *racemus* terminalis ante anthesim subco-
rymbosus dēmum elongatus; *flores* brevi pedicellati;
calyx clausus flavescens basi subgibbosus subpersis-
tens; *ungues* petalorum calycem excedentes albidae,
lamineæ obovatæ patentæ flavæ; *siliquæ* tetragonæ ere-

ctæ glabriuscule semipollicares stigmate sessili profunde 2-lobo coronatæ.

XLVIII. BRASSICA Lin: gen: n. 820. = Lam: ill: t. 565.
(*Inter Brassiceas* DC.)

» *Cal:* erectus vel raro patens basi æqualis. *Pet:*
» integra obovata. *Stam:* edentula. *Siliq:* teretiæscula
» sessilis vel stipitata stylo distincto coronata vel ro-
» strata. *Sem:* 1-serialia. *Cotyl:* conduplicatæ. »

Obs: Genus artificialiter divisum in 2. sectiones ex præsentia *stylī distincti* vel *rostri* (*stylus* dilatatus in rostrum sæpius monospermum mutatus ex DC. male, *stylus* enim non gerit ovula, et mutari non potest in pericarpium: melius dixisset siliquam apice rostratam ibique sæpius monospermam), constans spec: 36. ex DC., 33. ex SPR: inclusō *Erucæ* genere ex sola *stylī* forma haud satis distincto.

† *Siliqua* *stylo distincto terminata.*

* 1. *Br. oleracea* = L. sp: 932. = SPR: syst: II. 909.
= *Icones plures pro varietatibus. Vern: Coi (Anglia, Græcia, Eur: austr: In agro Nicæensi inter Villafranca et Monaco in rupibus mari proximis ALL: auct: n. 967. p. 17.). Bienn: Varietates innumeræ tum spontaneæ cum præcipue ex cultura, pro quibus cons: DC. syst: II. 183. et seq: Ubique in hortis culta tamquam planta oleracea: hoc etiam pertinet sec: SPR: Br: *Napus* L. a DC. distincta.*

* 2. *Br: campestris* = L. sp: 931. = SPR: syst: II. 909. = Engl: bot: t. 2224. IC: taur: vol. 9. t. 84. (*Eur: omni. In agro Taurin: inter hortum regium*

et viam publicam *Moncalieri*: in arvis *Sabaudiae* frequens All: n. 965. In campis sabulosis *della Lomellina* BIROLI fl: acon: II. p. 15. In *Sardin*: arvis et ad sepes MORIS st: sard: I. p. 3.). Bienn: Vix a priori diversa foliis inferioribus *hispidis*; varietates plures inter quas ob usum præest *oleifera* (*Colsat*). Cons: DC. l. c. p. 588.

3. *Br: Rapa* = L. sp: 931. Vern: *Rava* (Patria incerta; invenitur passim in *Eur*: sed forsitan ex agris cultis migrata). Bienn: A præcedentibus distinguitur præsertim calyce *patenti*: variat etiam summopere, et ubique colitur in usum oleraceum = 4. *Br: cretica* = Lam: dict: I. 747. (*Creta*, *Græcia*; *Sardin*: inter rupium fessuras *Arcuentu*, *Castello di Medusa*, *Cartiera di Cagliari* MORIS st: sard: I. p. 3.). Suffrut: Calyx patens; fructus ignotos dicit DC. syst: II. 594. et Pr: I. 215. Specim: mea ex *Sardinia* referunt siliquas compressiusculas glabras sesquipollicares erecto-subpatentes stylo basi subdilatato 4-lin: longo apiculatas; stigma globoso-compressum; semina nigra orbiculata. = 5. *Br: chinensis* = L. am: ac: 4. p. 280. (*China*). Bienn: Planta gracilis; in specim: meis nulla adsunt folia *basi cordata* uti ex descriptione DC. syst: II. 594.; siliquæ autem sunt potius *longe quam brevi rostratae*, stylus enim est 3-4-lin: longus; in ceteris quadrant. = 6. *Br: incana* = Tenor: fl: nap: prodr: p. 39. et fl: nap. t. 165. (*Neap*., *Sicilia*). Suffrut: In specim: meis e plantis cultis in h. Ripul: enatis ex seminibus missis a cl: TENORE sepala sunt *subpatula* nec prorsus erecta, *viridescens*, non *flavescens*; petala *alba* nec *flava*; siliquæ

subangulatæ; in ceteris quadrant cum descript: DC. syst: II. 596.

* 7. Br: *Erucastrum* = L. sp: 932. = Spr: syst: II. 910. = Bull: herb: t. 331. Ic: taur: vol. 10. t. 29. et 46. (German: occid:, *Gallia*, *Helvet:*, *Italia*. Pedem: locis arenosis aridis collium calidiorum et in alveis torrentium et fluminum All: n. 969. Secus *Padum* et *Sturam* in arenosis, et prope *Venariam* ad fossas Re fl: torin: I. p. 347. In pascuis collium *Verbani* BIROLI fl: acon: II. p. 15. Sardin: in montib: *Macomer*, *Bollotana*, *Petada* MORIS st: sard: II. p. 1.). Ann: Species ex synonymia Auctorum valde obscura.

8. Br: *elongata* = Ehr: beitr: 7. p. 159. (Hungar: , Transylv: , Tauria , Caucaso). Bienn: Siliquæ supra torum stipitatæ stylo vix 2 - lin: longo apiculatae; in specim: meis ex BELLARDI folia caulina sunt omnia inæqualiter dentata nec subintegerrima uti in diagnosi SPR:

†† *Siliqua rostro dilatato terminata*.

9. Br: *Sabularia* = Brot: fl: lusit: I. p. 582. (*Lusitania*). Ann: Planta gracilis; flores flavi minimi; siliquæ substipitatæ rostro 3 - 4. longiores, uti in specim: ex BALBISIO e plantis cultis in H. B. T. enatisque e seminibus missis a W.

* 10. Br: *Cheiranthus* = Vill: dauph: 3. p. 332. = Spr: syst: II. 911. = Vill: l. c. t. 36. All: pedem: t. 82. f. 1. sub *Sinapi recurvata* sine fructu. Ic: taur: vol. 28. t. 98. sub *Sinapi Tournefortii* (*Gallia* med: et austr: , *Italia*. Pedem: scilicet locis rupestribus

prope la *Madonna delle Finestre* in comit: Nicæensi; et supra atque infra *Rochemelon* eundo versus *Segusium* pro *Sinapi Tourneforti* ALL: n. 962. Re. fl: segus: p. 57. Ad thermas *Vinadii* locis sterilibus pro *Sinapi recurvata* ALL: n. 963.). Bienn: Citaçæ AL-LIONII stirpes ad eandem plantam scilicet Br: *Cheiranthum* VILL: esse referendas recentiores Botanici haud dubitant, atque illas sub *Brassica* potius quam sub *Sinapi* descripserunt ob calycem erectum paten-tissimum; ceterum nota ex *siliqua recurvata* deprompta ab ALL: nimis levis et inconstans in specim: meis.

11. Br: *cheiranthiflora* = DC. syst: II. 601. (*Hispan:., Gallia*). Ann: Planta gracilis; folia in specimin: ex BALBISIO *hispida* pilis rarissimis nec *glabra* ut in diagn: SPR: = 12. Br: *Tournefortii* = Gouan: ill: p. 44. (*Hispan:., Ægypt:., Persia*). Ann: Valde affinem priori dicit DC. syst: II. 61., sed in omnibus parti-bus longe major, habitus toto cœlo diversus; insuper pedicelli longissimi scilicet siliquis dimidio breviores, rostra semipollucaria. = 13. Br: *fruticulosa* = Eyr: pl: rar: 2. p. 7. (*Neapol:., Sicil:., Hispan:., Afr: bor:.*). Basi suffruticosa. Calyx patens, unde melius forsitan ad *Sinapis* quam ad *Brassicæ* genus referenda; pe-dicelli siliquis paullo breviores.

* 14. Br: *Richerii* = Vill: fl: delph: 71. = Spr: syst: II. 911. = Vill: dauph: 3. p. 331. t. 36. All: pedem: t. 58. f. 1, et 76. f. 2. Ic: taur: vol. 19. t. 75. et vol. 26. t. 81. (*Gallia occid:., Austria. Pedem:* in valle *Queiras* in descentu *M. Vesuli* et in parvo *M. Cenisio* loco dicto *la Combe d'Ambin* ALL: n. 967. In editissimis jugis di *Fossimagna* et del-

Vania Re fl: segus: p. 57.). Perenn: Racemi elongati multiflori, pedicelli siliquis dimidio breviores, siliquæ pollicares et ultra torosæ nec superficie æquali uti indicant icones ALLIONII, stigma 2-lobum.

* 15. Br: *Eruca* = L. sp: 932. = Spr: syst: II. 912. = Lobel: ic: t. 204. f. 1. Ic: taur: vol. 9. t. 42. Vern: *Aruga* (*Eur*: austr:, *Afr*: bor:, *Græcia*, *Helvet*:, *Italia*. In ineultis agri *Nicæensis* ALL: n. 970. In *Sardin*: ad vias et inter segetes MORIS st: sard: I. p. 4. sub *Eruca sativa*). Ann: Variat multimode; in hortis ubique culta tamquam planta acetaria. Hæc et sequens ad *Erucæ* genùs relatæ a DC. cum *E. hispida* TENORE quæ mihi differre non videtur a Br: *Eruca* nisi caule hispidiori.

16. Br: *vesicaria* = L. sp: 933. (*Hispan*:). Ann: Priori affinis, sed foliis minus incisis, et calyce præsertim subinflato satis distincta. Specim: mea ex hb: BELLARDI ab ORTEGA missa per totum hispida exceptis petalis et siliquæ rostro.

Brassicæ dubiæ.

* ? 17. Br: *balearica* = Pers: enh: 2. p. 206. = DC. syst: II. 596. = Deless: ic: sel: 2. t. 86. et Schr: h. mon: t. 10. sub Br: *semperfiriensi* sec: DC. prodr: I. 215. (Insulis *Balearicis* et in rupe rubra *Nicææ* ex RISSO.). Basi suffruticosa. Omissa a SPR: Duo specim: possideo, unum perfectum ex hb: BIROLI ita inscriptum in scheda: Br: *semperfiriens* SCHR: ined: ex h. Vindeb:; alterum ex RISSO *Nicææ* lectum in quo desunt siliquæ, sed in ceteris perfectissime quadrant inter se. et cum descriptione DC. I. c.; ex

rostro aspermo vix distincto a siliqua, collocanda videtur stirps hæc in prima sectione prope *Br: Erucastrum*. Racemi sunt semipedales, flores ampli.

18. *Br: hispanica*? H. B. T. Nullibi invenio enumeratam: planta gracilis; folia radicalia longe petiolata runcinato-pinnatifida hispida, caulina subnulla; racemi erecti; pedicelli flores subæquantes; calyx erectus basi subinflatus; petalorum unguis calycem superantes; siliquæ subtetragonæ pollicares rostro 3-lin: longo basi vix dilatato 1-spermō terminatæ.

XLIX. SINAPIS Lin: gen: n. 821. = Lam: ill: t. 566.
(Inter *Brassiceas* DC.)

» *Cal:* patentissimus. Cetera ut in *Brassica*. »

Obs: Genus nunc *Sisymbrii*, nunc *Brassicæ* habitum referens, a priori distinctum cotyledonibus con-duplicatis, ab altero calyce patentissimo. Divisiones candelleanæ ex longitudine et structura styli artificiales, saepius fallaces, exhaustæ e characteribus interdum microscopicis: melius igitur dividendum in duas solas sectiones ex siliquæ superficie.

† *Siliqua glabra*.

1. *S. lœvigata* = L. amæn: ac: 4. p. 281. (*Hispan: Lusitan:*). Ann: Siliquæ pedicello 2-3-longiores; stylus 2-lin: longus rostratus. Totam *glaberrimam* dicunt Auctores; in specim: meis ex hb: BIROLI caulis est basi *hispidus*. = 2. *S. integrifolia* = W. h. berol: p. 14. (*Ind: orient: China*). Ann: Siliquæ pedicello 3 - 4. longiores eretæ stylo sub-conico apiculatæ. Culta in H. B. T. ex quo specim: mea. = 3. *S. bras-*

sicata = L. syst: III. p. 231. (*China*). Ann: Siliquæ pedicellis vix longiores sub-patentes stylo 2 - 3 - lin: longo terminatæ; stigma crassum capitatum. Culta in H. Ripul: sub nomine *Br: auriculatæ* DC. ad quam SPR: *brassicatam* refert. = 4. *S. juncea* = L. sp: 934. (*China*). Ann: Affinem *S. brassicatæ* dicit DC. syst: II. 612.; sed magis accedit ad *S. integrifoliam* a qua vix differt pedicellis brevioribus, siliqua evidentius torulosa ac majori; folia non sunt *amplexicaulia* uti in diagn: SPR:, sed *petiolata* ac *plana*.

* 5. *S. nigra* = L. sp: 933. = Spr: syst: II. 912. = Engl: bot: t. 969. Ic: taur: vol. 9. t. 63. 83. vol. 22. t. 79. Vern: *Seneyra* (*Eur:* fere tota, *Asia med:* *Pedem:* in locis ruderatis et collinis ALL: n. 959. RE fl: torin: I. 348. In arvis collium *Verbani* BIROLI fl: acon: II. p. 16. In *Sardin:* ad margines agrorum MORIS st: sard: I. p. 5.). Ann: Ubique culta ad usum officinarum et culinarem.

* 6. *S. arvensis* = L. sp: 935. = Spr: syst: II. 913. = Engl: bot: t. 1748. Ic: taur: vol. 9. t. 64. (*Eur:* fere omni. *Pedem:* in arvis vulgatissima ALL: n. 957. RE fl: segus: p. 57. et fl: torin: I. p. 348. In arvis *Lumellinæ* BIROLI fl: acon: II. p. 17. *Sardin:* ad vias et in arvis MORIS st: sard: I. p. 5. *Genuæ* in collibus supra *Oreggina* et *Lagazzo*, et in herbi- dis *all'Aquasola* BERTOL: am: ital: p. 166.). Ann: Pe- dicelli 2-lin: longi, siliquæ multiangulares pollicares brevi rostratæ; stigma capitato-sub-2-lobum.

7. *S. Allionii* = Jacq: h: vindeb: 2. t. 168. (*Egypt:*). Ann: Siliquæ pedicellis 2-3-longiores ovato-oblongæ

compressiusculæ ; stigma capitatum ; in specim: meis folia summa sunt *subintegra*.

* 8. *S. incana* = L. am: acad: 4. p. 281. = Spr: syst: II. 913. = Jacq: h. vindeb: t. 169. (*Eur*: austr: In rupibus mari proximis *del Lazaret*, *Villa-francæ Nicœensis* legit Risso sec: BALB: misc: bot: p. 34. In *Sardin*: ad vias frequens MORIS st: sard: I. p. 5.). Bienn: Pedicelli brevissimi ; siliquæ 2-3-lin: longæ , rostro 1-lin: longo ; stigma minimum sub-capitatum.

†† *Siliqua pubescente seu hispida*.

* 9. *S. alba* = L. sp: 933. = Spr: syst: II. 913. = Lam: ill: t. 566. (*Eur*: med: et austr: *Pedem*: aggeres et ruderata inhabitat locis pinguibus præser-tim in agro *Nicœensi* ALL: n. 958. *Sardin*: ad sepes *Iglesias*, *Sarrabus* MORIS st: sard: I. p. 5.). Aan: Pedicelli patentes siliquam subæquantes ; rostrum siliqua paullo longius *stigmate crassiusculo* termina-tum quod deest in icon: LAM: ceterum optima. Culta in hortis ad usum culinarem uti *S. nigra* n. 5. Huc pertinet juxta opinionem cl: SPR: *S. foliosa* W., quam CANDOLLEUS distinxit quin fructus vidisset (syst: II. 622.); specim: mea ex plantis cultis in H. B. T. enatisque e seminibus missis a W. non distinguuntur a *S. alba* nisi habitu humiliori. Huc pariter re-ferenda *S. chelidoniifolia* MART: a STEUD: enumerata cum dubitationis signo, et ab Auctoribus omissa, quam possideo ex hb: BELLARDI a PASQUAL missam, quamque non video differre nisi foliis profundius sectis.

10. *S. hispida* = Schoursb: maroc: p. 182. (*Mauritan:*, *Teneriffa*, *Hispan:*). Ann: Priori valde affinis; siliquæ angustiores; rostra breviora. Non confundenda cum *S. hispida* BALE: misc: quæ pertinet vel ad *S. arvensem* sec: eundem auctorem misc: alt:, vel ad *S. orientalem* sec: DC. syst: II. 616. = 11. *S. dissecta* = Lag: cat: h. madr: 1816. p. 20. (*Hispania*; *Sardin:* ad sepes et inter segetes MORIS st: sard: I. p. 5.). Ann: Pedicelli fructiferi patuli siliquam subæquantes; rostrum siliqua paullo longius; stigma subsimplex. Variat sec: DC. siliquis *glabris* vel *hispidulis*; in specim: meis ex plantis cultis in H. Ripul: siliquæ omnes sunt *hispidae*, rostrum *glabrum*; insuper foliorum laciniae potius *ovato-oblongæ* quam *linearæ* uti in descriptionibus Auctorum. = 12. *S. heterophylla* = Lag. l. c. (*Hispania circa Madritum*). Bienn: Pedicelli vix lin: longi cum siliquis teretibus semipollicaribus rachi adpressi; rostrum breve; stigma minimum sub-capitatum.

*? 13. *S. orientalis* = L. am: acad: 4. p. 280. = Spr: syst: II. 616. = Schkuhr: haudb: I. p. 264. t. 186. (*Oriente*, *Eur:* med: et austr: In *Pedem:* circa *Breglio* loco dicto *Mauriana* BALEBIS: misc: p. 33. sub *S. hispida* sec: DC.). Ann: Planta mihi admodum dubia; habitu ad *S. arvensem* n. 6. accedere videtur uti existimavit BALBISIUS ipse in misc: alt:, sed folia evidentius *pinnatisecta*; siliquæ *hispidulæ* nec *glabræ*, et *ampliores*. Nec perfecte quadrat cum characteribus *S. orientali* ab Auctoribus tributis; siliquæ enim in specim: meis non prorsus *erectæ* sed *subpatulæ*, folia superiora etiam *pinnatisecta*, nec simpliciter *incisa*,

vel ad lobum terminalem fere reducta ; ex rostro et stigmate nil certi statui potest , nam in diverso individuo eiusdem stirpis, immo quandoque in eodem variant longitudine et forma. Cons: GUSSONE pl: rar: p. 280. circa *S. arvensem*.

14. *S. pubescens* = L. mant: 95. (*Sicil:* et *Hispan:*). Perenn: Pedicelli 2-lin: longi ; siliquæ teretes vix pedicellos superantes ; rostrum siliqua paullo brevius stigmate evidenter capitato-bilobo terminatum.

Sinapes dubiæ.

15. *S. retrohirsuta* = Besser sec: Steud: ? Omissa a DC. et SPR: In specimine unico ex hb: BELLARDI sine ulla indicatione a BALBISIO inscripto sequentia observantur: *Caulis* pedalis parce ramosus glaber substriatus purpurascens. *Folia* glabra , inferiora petiolata sub - lyrata lobo supremo ovato sinuato dentato , superiora sessilia ovato-oblonga dentata. *Racemi* terminales erecti post anthesim fere palmares ; pedicelli inferiores bracteati , superiores nudi filiformes 1-2-lin: longi , glabri. *Sepala* patentia flavida. *Petala* flava unguibus calycem superantibus. *Siliquæ* erectæ teretiusculæ tenues sub - torulosæ hispidiusculæ vix pollicares ; rostrum 2-lin: longum , lineare, substriatum stigmate parvo capitato - compresso apiculatum. Patria ?

L. MORICANDIA DC. syst: II. 626. = *Brassicæ* sp: L. == Desf: atl: II. t. 164. pro *M. teretifolia* sub *Brassica* (Inter *Brassiceas* DC.)
» *Cal:* clausus basi saccatus. *Pet:* integra obovata.

- » *Stam:* edentula. *Siliq:* compresso - tetragona stylo
 » compresso-conico apiculata. *Sem:* 2-serialia subalata.
 » *Cotyl:* conduplicatæ. »

Obs: Genus hinc *Brassicæ* inde *Diplostachidi* affine,
 a priori diversum *seminibus* 2-*serialibus*, ab altero
calyce clauso saccato, floribusque *purpureoscentibus*,
 constans 3. speciebus ex DC. et SPR:

* 1. *M. arvensis* = DC. syst: II. 626. = Spr:
 syst: II. 914. = Bocc: sic: p. 49. t. 25. f. 3. et 4.
 sub *Brassica*. Ic: taur: vol. 25. t. 33. (*Eur: austr:*,
Afr: bor: *Pedem:* circa *Alassium* et *Nicæam* frequens
 sec: DC. Ad vias et muros hortorum circa *Ventimiglia* ALL: n. 966. sub *Brassica*). Bienn: vel perenn:
 basi suffruticosa. Flores violacei ampli; pedicelli fru-
 ctiferi 3-lin: longi; siliquæ erectæ tenues 2-pollicar-
 res; stylus brevis crassiusculus stigmate subsimplici.

LI. DIPLOTAXIS DC. syst: II. 628. = *Brassicæ*, *Sisymbrii*,
 et *Sinapis* sp: Auctor: (Inter *Brassiceas* DC.)

- » *Cal:* patens basi æqualis. *Pet:* ovalia. *Stam:* eden-
 tula. *Siliq:* compressa stylo conico apiculata. *Sem:*
 » 2-serialia ovata. *Cotyl:* conduplicatæ. »

Obs: Nomen generis ex duplii seminum ordine
 fallax; character enim communis cum aliis *Cruci-*
ferarum generibus; species 14 - 15. ex DC. et SPR:
 in 2. sectiones divisæ respectu fructus *penduli* vel
erecti.

* 1. *D. muralis* = DC. syst: II. 634. = Spr:
 syst: II. 914. = Engl: bot: t. 1090. sub *Sisymbrio*.
 Ic: taur: vol. 25. t. 58. sub *Sisymbrio* (*Anglia*, *Eur:*
 med: In agro *Nicæensi* secus arva frequens ALL: n.

1002. *Sardin*: in aridis apricis MORIS st: sard: I. p. 4.). Ann: vel bienn: Pedicelli subpatentes siliquam erectam subæquantes; stylus vix 1-lin: longus stigmate capitato coronatus. Huc ne pertinet *Sisymbrium Barrelieri* ALL: 1005? Non videtur ex synonymia, sed in planta nullum inveni discrimen nisi statura minori: patria ab ALLIONIO indicata eadem; ex quibus potius censeo speciem Auctoris nostri esse *S. Barrelieri* THUILL: non L. (*Diplotaxis muralis* var: γ minor).

* 2. *D. viminea* = DC. syst: II. 635. = Spr: syst: II. 915. = Bocc: sic: 19. t. 10. sub *Sisymbrio (Gallia, Italia)*. *Pedem*: circa *Sospitellum* ALL: 1004. sub *Sisymbrio*). Ann: Pedicelli erecti, inferiores siliquam subæquantes, hinc gradatim breviores; siliqua latior, stylus brevior quam in priori.

* 3. *D. tenuifolia* = DC. syst: II. 632. = Spr: syst: II. 915. = Engl: bot: t. 525. sub *Sisymbrio*. Vern: *Aruga gentil* (*Eur*: passim. In *Pedem*: nihil frequentius ad muros collinis locis ALL: n. 1000. Re fl: torin: I. p. 343. In *Sardin*: ruderatis et ad vias MORIS st: sard: I. p. 4.). Perenn: Pedicelli subpatentes 4-5-lin: longi, insuper siliquæ sæpius pedicellis propriis brevissimis instructæ, et cum iis erectæ, pollicares et ultra; stigma varium; planta polymorpha et facile cum aliis confundenda; habitus tamen proprius.

* 4. *D. erucoides* = DC. syst: II. 631. = Spr: syst: II. 915. = Jacq: h. vindéb: t. 170. sub *Sinapi* (*Eur*: austr:, *Afr*: bor:, *Mesopotamia*. In olivetis *Nicœensibus* primo vere frequens BALE: addit: p. 92. sub *Sinapi*. In *Sardin*: arvis et ad vias vulgatissima MORIS

st: sard: I. p. 4.). Ann: Pedicelli semipollicares; siliquæ vix pollicares latiusculæ maturæ patentissimæ juniores suberectæ; stigma 2-lobum.

5. *D. hispida* = DC. syst: II. 630. (*Ægypt:*). Ann: Undique hispida; siliquæ pedicellis longiores; sessiles dicit DC., breviter pedicellatas SPR: Specim: mea ex *Ægypto* pedicellos gerunt siliquis duplo breviores.

LII. ERUCARIA Gaertn: fr: II. p. 298. t. 143. f. 9. = *Bunniadis*, *Sinapis*, *Brassicæ* etc. sp: Auctor: (Inter *Erucarieas* DC.)

» *Cal:* erectus basi æqualis. *Pet:* obovata. *Stam:*
» edentula. *Siliq:* teres 2-articulata, articulo inferiori
» 2-valvi seminibus pendulis, superiori 2-valvi se-
» minibus erectis stylo filiformi vel stigmate sessili
» apiculata. *Cotyl:* spiratim convolutæ. »

Obs: Genus constans spec: 5. ex DC., 7. ex SPR:
a variis generibus ademptis; habitus tamen proprius.

1. *E. aleppica* = Gaertn: l. c. (Insul: maris *Ægei*,
Asia min:, *Syria*, *Ægypt:*). Ann: Siliquæ articulus
inferior 3-4-spermus, superior monospermus stylo fi-
liformi erecto 1-2-lin: longo terminatus; in ic: GAERTN:
stylus est arcuatus; ego erectum semper observavi.

LIII. MORISIA Colla H. Ripul: app: IV. p. 50. ex Gay
in litt: = *Sisymbrii*, *Rapistri*, et *Erucariæ* sp:
Auctor: (Inter *Anchonieas* DC. sec: GAY.)

» *Cal:* eretiusculus basi 2-gibbosus. *Pet:* spathulata
» emarginata. *Stam:* edentula. *Siliq:* (*Silicula* GAY)
» 2-articulata, articulo inferiori depresso polyspermò
» tardius dehiscente seminibus subpendulis; supe-

- » riore ovoideo 1-spermo indehiscente semine erecto.
- » *Stylus* subulatus. *Cotyl:* incumbentes ovato-oblongæ,
- » altera utrinque plana, altera crassior hinc plana,
- » illuc convexa. »

Obs: Genus a cl: GAY illustri MORISIO nostro dicatum, modo constans unica specie ab *Erucariis* rite adempta præsertim ob calycom 2-gibbosum nec æqualem, et *cotyledonum* formam: habitus etiam prima facie distinguitur a ceteris hujusce familiæ generibus.

- 1. *M. hypogaea* = Colla l. c. (*Corsic: circa Bonifacium SERAPHINO* in litt: sec: GAY. In pascuis *Sardin: med: MORIS st: sard: I. p. 4. sub Erucaria*). Ann: Cons: COLLA l. c.

LIV. HELIOPHILA Lin: gen: n. 816. = Lam: ill: t. 563.
(Inter *Heliophileas* DC.)

- » *Cal:* eretiusculus basi subæqualis. *Pet:* obovata.
- » *Stam:* sæpe dentata. *Siliq:* compressa linearis vel moniliformis.
- » *Sem:* 1-serialia pendula sub-alata.
- » *Cotyl:* bis transverse plicatæ. »

Obs: Genus multiforme constans 47. spec: ex DC. inter quas 34. tantummodo a SPR: admissæ, omnes *African* australem colentes et admodum raræ in calidariis europæis; herbæ annuæ vel suffrutices facile dividendæ ex forma siliquæ.

† *Siliquæ moniliformes.*

- 1. *H. amplexicaulis* = L. fil: supp: 296. (*C. B. S.*). Ann: pusilla. Flores parvi violacei; stamina edentula; desunt siliquæ in specim: meis. = 2. *H. pendula* = W. sp: III. 529. (*C. B. S.*). Ann:

Gracilis 2-pedalis; flores mediocreis flavescentes; stamina edentula; siliquæ sesquipedales, monilibus 10-12. monospermis. — 3. *H. lepidiooides* = Link: enum: 2. p. 174. (*C. B. S.*). Ann: Ramosissima; racemi terminaliæ vel oppositifolii 10-12-flori; flores minimi ex sicco albidi; pedicelli filiformes 1-lin: longi; siliquæ valde compressæ ovato-oblongæ (nec moniliformes) 2-3-lin: longæ, 1-latæ, subdiaphanæ 5-6-spermæ stylo brevissimo apiculatæ: semina minutissima orbiculata compressa haud marginata.

† Siliquæ lineares.

4. *H. crithmifolia* = W. en: II. p. 682. (*Afr: austr:*).
 Ann: Vix palmaris; flores minimi violacei; pedicelli
 filiformes siliquam semipollicarem stylo brevi termi-
 natam subæquantes: in specim: meis siliquæ non sunt
 revera nutantes sed vix subcernuæ.

Obs: *geographica* circa *Cruciferas.*

Cruciferarum species per orbem sparsæ sec: DC.
sistunt numero 1013

Cruciferæ pedemontanæ.

	N.	R.			
<i>Raphanus</i>	2
<i>Clypeola</i>	1
<i>Isatis</i>	2
<i>Biscutella</i>	7
<i>Peltaria</i>	1
<i>Lunaria</i>	1
<i>Alyssum</i>	6
<i>Petrocollis</i>	1
<i>Hutchinsia</i>	4
<i>Iberis</i>	8
<i>Tecsdalia</i>	1
<i>Lepidium</i>	6
<i>Æthionema</i>	1
<i>Farsetia</i>	2
<i>Vesicaria</i>	1
<i>Draba</i>	5
<i>Cochlearia</i>	4
<i>Thlaspis</i>	6
<i>Camelina</i>	1
<i>Nasturtium</i>	5
<i>Dentaria</i>	3
<i>Cardamine</i>	9
<i>Arabis</i>	2
<i>Turritis</i>	2
<i>Barbarea</i>	2
<i>Cheiranthus</i>	1
<i>Mathiola</i>	5
<i>Malcolmia</i>	2
<i>Hesperis</i>	2

Et sic *Cruciferæ* pedemontanæ decimam partem et ultra constituunt.

ORDO XII.

CAPPARIDEÆ

(Juss: gen: 242. = DC. Prodr: I. 237. = J. S. Hill:
fam: nat: II. p. 1. t. 71.)

Char: essent:

» *Cal*: 4 - sepalus vel rarius profunde 4 - partitus.
» *Pet*: 4. cruciata. *Stam*: imo calyci inserta definita
» aut indefinita sæpius ordine quaternario multiplici
» disposita. *Ovar*: supra thecaphorum e toro ortum
» rarius sessile. *Styl*: o. aut filiformis. *Fructus* sili-
» quosus vel baccatus 1-locularis rarissime 1-sæpius-
» polyspermus 2-valvis. *Sem*: intervalvaria exalbumi-
» nosa. *Embr*: incurvus. *Cotyl*: subincumbentes. »

Obs: Ordo hinc *Cruciferis* accedens staminum numero et fructu siliquæformi non tamen biloculari, inde *Rosaceis*, *Passifloræis* aliisque familiis, unde non admodum naturalis, exceptis *Cleomeis*, divisus in 2. Tribus sc: fructibus siliquæformibus valvis dehiscentibus (*Cleomæ DC.*), fructibus subcarnosis indehiscentibus (*Cappareæ DC.*). Cons: A. S. HILL: et A. MOQUIN TARIDON *Mém: sur la symétrie des Capparidæ* in bull: univ: 1831. mai p. 179.

TRIB: I. (*Cleomæ*)

I. CLEOME Lin: gen: n. 1099. = Lam: ill: t. 567.

» *Cal:* 4-sepalus patens deciduus. *Pet:* 4. subscan-
» dentia basi nectarifera. *Stam:* 6. rarius indetermi-
» nata submonadelpha subinæqualia. *Capsula* sili-
» quæformis 1-locularis 2-valvis stipitata vel sessilis. »

Obs: Genus constans 53. spec: ex DC., 59. ex SPR:, inclusis tamen *Gynandropsidis* et *Polanisiæ* generibus habitu haud dissimilibus: divisiones ab Auctori- bus statutæ ex staminum numero et insertione, forma tori, et stipitis præsentia, vel defectu in fructibus, nimis artificiales et sæpe fallaces. Plantæ omnes exoticæ, fruticosæ vel herbaceæ sæpe graveolentes, inter quas plures non satis determinatæ. Cons: tamen insigne opus SCHULTESII in R. et S. VII. p. 23. ad 51. ubi *Cleomes* species 88. definit. . .

+ *Hexandræ* fructibus stipitatis.
(*Gynandropsis* et *Pedicellaria* DC.)

1. *Cl: triphylla* = L. sp: 938. (Ind: occid:, Seneg:).

Ann: Sub *Gynandropside* DC. = 2. *Cl: pentaphylla* = L. sp: 938. (*Ægypt:*, *Arab:*, *Indiis*). Ann: Priori affinis, sed differt præsertim foliis inferioribus et mediis quinatis, siliquis latiusculis. = 3. *Cl. gigantea* = L. mant: 430. (*Amer:* austr:). Frutesc: In H. Ripul: flores constanter *albos* nec *virides* refert. = 4. *Cl: spinosa* = L. sp: 939. (*Ind:* occid., *Brasil:*). Ann: Flores albidi magni: = 5. *Cl: flexuosa* = Dictr: Gartr: lexic: sec: R. et S. VII. 27. (*Patria?*). Herbacea. Omissa a DC. et SPR: concinne descripta fuit a SCHULT: l. c.: addendum tantum ex specim: meis a cl: HORN: missis siliquam esse compressam tecophoro duplo longiore stylo 1-lin: longo et stigmate crassiusculo apiculatam.

†† *Hexandræ* siliquis subsessilibus.
(*Siliquaria* DC.)

6. *Cl: arabica* = L. sp: 939. (*Arabia*, *Afr:* bor:). Ann: Flores parvi albidi; siliqua compressa stylo 1-lin: longo apiculata. = 7. *Cl: violacea* = L. sp: 940. (*Lusitania*, *Amer:* austr: pro *Cl: deflexa* DC. sec: SPR:?). Ann: Flores parvi violacei; siliqua teres longissima. = 8. *Cl: aculeata* = L. syst: III. p. 232. (*Amer:* calid:). Ann: In specim: meis ex H. B. T. desunt flores; siliquæ maturæ sunt evidenter stipitatæ tecophoro 2-3-lin: longo, immaturæ autem subsessiles: ceterum quadrant cum descript: Auctorum.

††† *Staminibus* numero variis.
(*Cleomes*, et *Polanisiæ* sp: DC.)

9. *Cl: droseræfolia* = Delil: fl: ægypt: t. 36. f. 2.

(Ægypt:). Suffrut: Flores parvi tetrandri; siliquæ in specim: meis ex hb: BELLARDI a DELIL: missis sunt ovatæ 5-6-lin: longæ 2-3-latæ, hispidissimæ. = 10. *Cl: dodecandra* = L. sp: 932. excl: SLOAN: syn: (*Ind: orient:*). Ann: Flores mediocres albidi 8-12-andri; siliquæ prorsus sessiles; jam culta in H. B. T. ex quo specim: mea. = 11. *Cl: viscosa* = L. sp: 938. (*Ind: orient:*). Ann: Flores mediocres luteoli 8-16-andri; siliqua sessilis in specim: meis non exacte *striata hirsuta*, sed pilis mollissimis glanduloso-viscosis tecta: Huc pertinet *Cl: icosandra* L. quæ sola varietas floribus icosandris. = 12. *Cl: uniglandulosa* = Cav: ic: 4. t. 306. (*Nov: Hispan:*). Ann: Flores magni albi 8-16-andri in racemum terminalem laxum dispositi; desunt siliquæ in specimin: meis.

TRIE: II. (*Capparœ*)

II. CRATÆVA Lin: gen: n. 599. = Lam: ill: t. 395.

» *Cal:* 4-sepalus deciduus. *Pet:* 4. secunda rarius
» nulla. *Stam:* dodecandra germinis tecophoro vel
» toro inserta. *Bacca* stipitata corticata 1-loocularis
» polysperma. »

Obs: Genus constans 12. spec: ex DC., 10. ex SPR: inclusa *Niebularia* non satis distincta ob solum petalorum defectum. Frutices exotici foliis saepius trifoliatis.

1. *Cr: Tapia* = L. sp: 637. (*Utraque India*). In specim: meo ex MARTIO Rio d'oro in Brasilia lecto foliola sunt *ovata* nec tantum *acuta* sed *cuspidata*; stamina petala longe *superantia* nec iis *breviora*. ut

in diagn: DC. Pr: I. 243. = 2. *Cr: fragrans* = Sims: bot: mag: t. 596. (*Sierra Leona*). Planta scandens; flores sub-corymbosi; petala albo-viridia longissima apice crispa stamina subæquantia. Cult: in H. Ripul: ubi floret 8.bre, 9.bre in calid.

III. SODADA Forsk: descr: 81. = Delil: fl: eg: 74. t. 25.
= *Capparidis* spec: R. Br:

» *Cal: 4-sepalus*, sepalō superiore maximo conca-
» vo. *Pet: 4.* *Stam: 8.* *Bacca* stipitata 8-sperma. »

Obs: Genus vix a *Capparide* distinctum, immo cum ea nuper conjunctum a R. Br: et SPR: c. p. 147. 204., constans unica stirpe (*S. decidua* FORSK: l. c.) ægyptiaca, fruticosa, subaphylla, spinis stipularibus subuncinatis rubescentibus, pedicellis plurimis axilla-ribus nutantibus, floribus rubris. Specim: ex SAVI sine fructu.

IV. CAPPARIS Lin: gen: n. 567. = Lam: ill: t. 446.

» *Cal: 4-partitus* sepalis æqualibus vel inæqualibus
» aut basi gibbosis. *Pet: 4.* *Stam: polyandra.* *Siliq:*
» sub-baccata stipitata raro dehisceñs. »

Obs: Genus constans 116. spec: ex DC., 85. tan-
tum ex SPR: fere omnibus exoticis, forsitan in 2
genera, interim in 2 sectiones dividendum ex for-
ma fructus. Frutices spinosi vel inermes foliis sim-
plicibus integris.

† *Fructibus oblongis sub-baccatis*
indehiscentibus.

* 1. *C. spinosa* = L. sp: 720. = Spr: syst: II.

572. = Blackw: herb: t. 417. Ic: taur: vol. 8. t. 31. (*Eur*: austr:, *Afr*: bor: In *Pedem*: colitur; ad vetustos muros, et spontanea crescit *Nicææ* ALL: n. 1069. In insula *Matre ex Borromæis* sponte crescit sec: BIROLI fl: acon: I. p. 178. In rupestribus *Cagliari* MORIS st: sard: I. p. 6.). Variat stipulis abortivis, ex quo fit inermis: an varietas hæc quæ magis frequens penes nos eadem ac *C. rupestris* Sm: ? Ita opinor cum cl: SPR:; nam specim: mea sub hoc nomine accepta non differunt a nostra *C. inermi*; immo quadrant etiam cum planta nicæensi, quam cl: Risso pro *C. ovata* DESF: (*C. Fontainesii* DC.) habuit; folia enim non *cordato-ovata acutiuscula*, sed *subrotunda retusa*.

2. *C. ægyptia* = Lam: dict: I. p. 605. (*Ægypt*:; *Creta*). Spinae stipulares uncinatæ reflexæ rubescentes; folia subretusa saepius mucronata cinarescentia ut tota planta. = 3. *C. frondosa* = Spr: syst: II. 574. ex Jacq: (*Ind*: occid:; *Amer*: austr:). In specim: meo ex BALBISIO folia sunt potius *elliptica* quam *lanceolata* uti in diagnosi DC.; in ceteris quadrant.

†† *Fructibus siliquæformibus* sæpe dehiscentibus.

4. *C. cynophællophora* = L. sp: 721. (*Caribæis* et *Amer*: calid:). Specim: ex BERTERO habet caulem flexuosum, folia superne *lucida*, inferne *sub-rubiginosa*, apice evidenter *retusa*, quæ omissa in phras: DC. et SPR: = 5. *C. Breynia* = L. sp: 721. (*Ind*: occid:). Specim: ex H. Ripul:

Capparides dubiæ.

6. *C. Goo* = Mart: hb: ? (*Brasilia*). Specim: sub


hoc nomine communicatum a cl: MARTIO habet *cau-*
lem tetragonum glabrum; *folia* elliptica brevi petio-
lata, 2-3-poll: longa 1-lata, basi inæqualiter subcor-
data, apice mucronulo crassiusculo terminata, integer-
rima, coriacea, superne nitida, inferne ramosque ju-
niores albido-tomentosos, nervosa nervis subtus valde
prominulis, reticulato-venosa. *Inflorescentia* non ap-
paret, unicum enim extat alabastrum e planta dis-
junctum; hoc autem est brevi pedicellatum, undique
tomentosum, subquadratum, ac refert sepala 2-lin:
longa acutiuscula concava per æstivationem valvata
marginibus subrevolutis. An igitur collocanda in sect:
IV. (*Quadrella* DC. Pr: I. 251.) prope *C. furfura-*
cam R. et P. cui ex descriptione affinis videtur?

Obs: geographica circa *Capparideas.*

Capparidearum species per orbem sparsæ ex DC.
sistunt numero 231

Capparideæ pedemontanæ.

Capparis I



ORDO XIII.

FLACOURTIANÆ

(Rich: in mem: mus: I. p. 366. = DC. Prodr: I. 255.
 = *Tiliaceæ* Juss: pro *Flacourtia*,
Euphorbiaceæ pro *Kigellaria*, *incertæ sedis*
 pro *Melycitis* generibus.)

Char: essent:

» *Cal: 4-7-sepalus vel 4-7-profundè partitus. Pet: numero æquali sepalis alterna, rarius o. Stam: thalamo inserta petalis numero æqualia aut multiplicia quandoque in squamulas mutata. Ovar: liberum sessile vel substipitatum. Styl: o aut filiformes tot quot ovarii valvulae. Fructus 1-locularis carnosus indehiscens vel capsularis 4-5-valvis pulposus. Sem: fructus valvis adfixa. Album: carnosum. Embr: rectus. Flores hermaphroditi vel 1-sexuales.* »

Obs: Ordo parum naturalis constans generibus ad varias classes Linnæanas et varios JUSSIEUI ordines pertinentibus, pluribus novis, omnibus æquatorialibus et in calidariis europæis rarissimis; characteres incerti et fallaces, si excipias *semina areolatim parietalia*, qua nota, monente DC., ab omnibus dicotyledoneis distinguitur.

I. *FLACOURTIA* L'Herit: stirp: 59. = Lam: ill: t. 826.

» Flores dioici. **MASCULI.** *Cal: sub-5-partitus deciduus; cor: o; stam: plurima supra torum hemisphaericum dense congesta.* **FOEMINEI.** *Cal: et cor:*

» masculi; *stigm:* sessile radiatum; *bacca* multilocularis, loculis 2-spermis; *sem:* ossea. »

Obs: Genus modo constans 7. spec: omnibus fruticosis.

1. *Fl: Ramontshi* = L'Herit: stirp: 59. (*Madagascar*). Cult: in H. Ripul: ubi læte floret; sed sola individua mascula possideo; baccam non vidi, quæ dicitur rubro-violacea figura et sapore *Pruni domesticæ*.
 = 2. *Fl: rhamnoides* = Burch: cat: afr: austr: n. 4012. (*C. B. S.*). Cult: in H. LITTÆ; specim: ex TAGLIA-BUE sine fructu non videtur differre a priori nisi foliis subserratis, et floribus dimidio minoribus.

II. KIGGELARIA Lin: gen: n. 1128. = Lam: ill: t. 821.

» Flores dioici. MASCULI. *Cal:* 5-partitus; *pet:* 5.
 » ad unguem glandulas 3-lobas gerentia; *stam:* 10-20.
 » antheris apice perforatis. FOEMINEI. *Cal:* et *cor:* ma-
 » sculi; *styli* 2-5; *caps:* 1-loocularis, 5-valvis, po-
 » lysperma. »

Obs: Genus ad *Terebinthaceas* amandatum a SPR: , constans spec: 2. ex DC.

1. *K. africana*. = L. sp: 1466. (*Afr: austr:*). Cult: in H. Ripul: Huc refert cl: SPR: *K. integrifolium* Jacq: quam habet pro sola varietate; sed præsentia staminum 20. non 10., stylorum 2. tantum nec 5., demum margò foliorum *integerrima* nec *serrata*, characteres sat validi videntur, ut pro distincta specie admittatur.

Obs: geographica circa *Flacourtiæas*.

Flacourtiæarum species per orbem sparsæ sistunt
ex DC. numero 25

Flacourtiææ pedemontanæ 0

ORDO XIV.

BIXINEÆ

(Kunth: malv: p. 17. = DC. Prodr: I. 259.
= *Tiliacearum* et *Rosacearum* genera Juss:)

Char: essent:

» *Cal:* 4-7-sepalus vel 4-7-partitus. *Pet:* 5. vel o.
» *Stam:* polyandra. *Ovar:* superum sessile 1-loculare.
» *Styl:* 1. simplex aut 2-4-fidus. *Fructus* capsularis
» vel baccatus 1-locularis polyspermus. *Sem:* placen-
» tis parietalibus adfixa. *Album:* carnosum aut te-
» nuissimum. *Embr:* inclusus suberectus *radicula* hi-
» lum spectante. »

Obs: Ordo paucis generibus exoticis constans inter se valde dissimilibus fructificatione et habitu. Arbores aut frutices.

I. *Bixa* Lin: gen: n. 654. = Lam: ill: t. 469.

» *Cal:* 5-partitus coloratus laciniis extus basi glan-
» dulosis. *Pet:* 5. obovata. *Caps:* 1-locularis 2-valvis
» extus setoso-hispida. *Sem:* 8-10. farina colorata in-
» volutis. »

Obs: Genus *Tiliae* valde affine etiam habitu, a qua differt præsertim receptaculo in mediis valvis non prominulo, et fructu 1-loculari.

1. *B. Orellana* = L. sp: 830. (*Amer: calid.*). Cult: in H. Ripul:

II. AZARA R. et P. fl: per: prodr: 79. t. 36.

» *Cal:* 4-6-partitus. *Pet:* o. *Stam:* multa abortiva.
 » *Antheræ* 2-loculares. *Bacca* stylo apiculata 1-locu-
 » laris polysperma. »

Obs: Genus constans 3. spec: fruticosis in *Chili* detectis; folia in omnibus geminata inæqualia; flores fragrantes.

1. *A. dentata* — R. et P. syst: p. 138. (*Chili*).
 Specim: perfectum ex BERTERO in *Rancagua* lectum
 folia habet omnia elliptica interrupte dentata subtus
 tomentosa; flores in axillis umbellatos; umbellas multi-
 floratas; pedicellos 2-lin: longos, calycesque tomen-
 tosos; stamina numerosissima quorum nonnulla tan-
 tuni abortiva.

Obs: geographica circa Bixineas.

<i>Bixinearum</i> species per orbem sparsæ ex DC. sis-	
tunt numero	22
<i>Bixineæ</i> pedemontanae	0

ORDO XV.

CISTINÆ

(Juss: gen: 294. = DC. Prodr: I. 294.
= S. Hill: fam: nat: II. p. 98. t. 89.)

Char: essent:

» *Cal:* 5-sepalus sæpius inæqualis. *Pet:* 5. fugacia.
» *Stam:* polyandra. *Ovar:* liberum. *Styl:* 1. *Stigm:*
» simplex. *Caps:* 3-5-rarius 10-valvis 1-vel-multi-
» locularis. *Sem:* parietalia plurima. *Album:* farino-
» sum. *Embr:* spiralis vel curvus. »

Obs: Ordo *Tiliaceis* affinis pro *Cisto* et *Helian-*
themo ad *Polyandriam* monogyniam pertinentibus,
satis naturalis; pro aliis generibus valde artificialis.
Suffrutices aut herbæ foliis simplicibus.

I. *Cistus* Lin: gen: n. 913. = Lam: ill: t. 477. f. 2. 3.

» *Cal:* sepalis 2. externis inæqualibus vel nullis.
» *Pet:* æqualia. *Stam:* sæpe e disco glanduloso ex-
» serta. *Caps:* calyce obtecta 5-10-locularis, 5-10-
» valvis (embryo spiralis GAERT:). »

Obs: Genus constans 28. spec: ex DC., 26. ex
SPR: in 2 sectiones commode divisum inspecta ma-
gnitudine sepolorum exteriorum, colore petalorum,
et loculorum numero. Frutices vel suffrutices.

† *Sepala externa angustiora,*
petala plus minusve interne purpurea, capsulae
5-loculares (Erythrocistus DC.)

1. *C. heterophyllus* = Desf: fl: atl: I. p. 411. t. 104. (*Afr: bor:*). Sepala externa vix minora, omnia villosissima: petala magna; rosea sec: DESF: , ex sicco atropurpurea; folia rugoso-venosa venis subtus valde prominulis; quod non refert ico FONTAINESII ceterum optima.

*? 2. *C. parviflorus* = Lam: dict: II. p. 14. = Spr: syst: II. 584. = Ico? (*Creta. Agro Nicæensi?*). Sepala externa vix minora, ounnia villosa; petala calyce paullo longiora ovato-lanceolata rosea; in scheda specim: mei ex BALBISIO ita inscripsit cl: BELLARDI « similia specimina legi in monte *Albano* inter *Nicæam* et *Villafrancam*. »

3. *C. creticus* = L. sp: I. 738. (*Creta, Asia min;*, *Tauria*). Sepala externa vix minora, omnia villosiuscula acuminata; petala amplissima ex purpureo rosea. Variat foliis planis nec undulatis (*C. tauricus* γ DC.); specim: meum ad hunc pertinet.

* 4. *C. incanus* = L. sp: 737. = Spr: syst: II. 585. = Clus: hist: I. p. 69. c. icon: Ic: taur: vol. 7. t. 38. (*Eur: austr: In comit: Nicæensi* non infrequens ALL: n. 1656.). Sepala villoso-rugosa sub-cordata acuta subæqualia; petala ampla obcordata concava purpurea.

* 5. *C. crispus* = L. sp: 738. = Spr: syst: II. 585. = Cav: ic: 2. p. 57. t. 174. (*Eur: austr: In comit: Nicæensi* ALL: n. 1659.). Sepala lanuginosa

lanceolata subæqualia ; petala purpurea obovata caly-
cem paullum superantia.

* 6. *C. albidus* = L. sp: 737. = Spr: syst: II.
585. = Clus: hist: I. p. 68. c. icon: Ic: taur: vol. 16.
t. 105. (*Gallia narbonensi*, *Hispan:*, *Lusitan:* In agro
Nicæensi ad rupes aridas et in incultis maritimis
Uneliae ALL: n. 1658. Prope *Broglio* invenit RE. In
Sardin: sylvis MORIS st: sard: I. p. 6.). Sepala exte-
riora sub-tomentosa longiora (an ideo ad sectionem
sequentem referendus? sed petala haud albida), in-
teriora acuminata. Petala purpurea subcrenata ovata
calyce duplo ampliora.

7. *C. vaginatus* = Ait: h. Kew: 3. p. 304. (*Ten-
neriffa*). Sepala exteriora minora villosiuscula; petala
purpurea basi lutescentia amplissima apice sub-emar-
ginata.

†† *Sepala externa majora vel nulla, petala albida;*
capsulæ 5-10-loculares (*Ledonia DC.*)

8. *C. ladaniferus* = L. sp: 737. (*Hispan:*, *Lusitan:*).
Sepala 3.; corolla magnitudine *Papaveri somniferi*;
ovarium torulis 10.

* 9. *C. monspeliensis* = L. sp: 737. = Spr: syst:
II. 585. = Jacq: coll: 2. t. 8. Ic: taur: vol. 17. t. 90.
(Ad litor: maris *mediterranei*. Frequens in aridis in-
cultis et saxosis comitatus *Nicæensis* circa *Villafran-
cam* et *Berra* ALL: n. 1654. In *Sardinia* vulgatissi-
mus ubique MORIS st: sard: I. p. 6.). Sepala 5.

* 10. *C. laurifolius* = L. sp: 736. = Spr: syst:
II. 585. = Clus: hist: I. p. 78. f. 1. Ic: taur: vol.
16. t. 18. (*Gallia austr:*, *Hispan:* *Pedem:* in collibus

circa *Bistagno* unde in H. B. T. illatus est ALL: n. 1653.). Sepala 3.; capsulæ 5-loculares.

11. *C. laxus* = Ait: h. Kew: 3. p. 305. (*Hispan:*, *Lusitan:*). Sepala 5. Huc referunt DC. et SPR: *C. capensem* L. quem W. dixerat affinem, at floribus rubris; specim: possideo utriusque stirpis et nullum discrimen invenio, nisi in flore *C. capensis* paullo minori et ex sicco rubescenti; capsulas maturas non vidi.

* 12. *C. salvifolius* = L. sp: 738. = SPR: syst: II. 586. = Clus: hist: I. p. 70. c. icon: Ic: taur: vol. 28. t. 80. (*Eur:* austr: In agro *Nicæensi* ad rupes aridas, nec non in provincia *Aquensi* et *Astensi* circa *Canale* et *la Monta* ALL: n. 1655. Copiosissime in aridis rupibus di *Condove* RE fl: segus: p. 44. In sylvis et pascuis *Sardin:* frequens MORIS st: sard: I. p. 6.). Sepala 5.; capsulæ 5-loculares. Huc pertinere videtur *C. medius* ALL: fl: pedem: n. 1657. ex POURR:, in agro *Nicæensi* lectus ceu liquet ex synon: et floribus quos ALL: dicit ochroleucos. Plantam non vidi; an *C. salvifolius* var: γ DC. Prodr: I. 265. n. 16?

13. *C. hirsutus* = Lam: dict: II. p. 17. (*Armoria*, *Hispan:*). Sepala 5.; capsulæ desunt in specim: = 14. *C. populifolius* = L. sp: 736. (*Mauritania* var: α , *Gallia* austr: , *Hispan:*, *Lusitan:* var: β). Sepala 5.; petala alba margine purpurascentia; stamina lutea; folia juniora albido-tomentosa, dein viridia glabra; in var: α pedunculi et calyces sunt hirsuti, in β sub-glabri; specim: meum pertinet ad primam.

II. HELIANTHEMUM Tourn: instit: 248. = Gaertn: fruct: I.
 p. 371. t. 76. = Lam: ill: t. 477. f. 1. = *Cisti* sp: L.
 » *Cal:*, *pet:* et *stam:* *Cisti*. *Stylus* nunc rectus sub-
 » nullus vel stamina æquans vel iis longior, nunc
 » basi inflexus. *Caps:* 1-loocularis 3-valvis. *Sem:* val-
 » vis plerumque adfixa (*Embryo* uncinato - inflexus
 » GAERTN:). »

Obs: Habitus *Cisti*, a quo differt præsertim fructus
 structura; species numerosissimæ sc: 124. ex DC.,
 105. ex SPR: in plures sectiones haud naturales di-
 visæ; commodior videtur illa, quæ a longitudine et
 directione styli deprompta fuit. Herbæ, frutices, vel
 suffrutices.

† Stylo recto abbreviato

(*Halimum*, *Lecheoides* et *Tuberaria* DC.)

1. *H. umbellatum* = Mill: dict: n. 5. (*Sicil:*, *Gallia*
 austr:., *Hispan:*, *Lusitan:*). Suffrut: Flores parvi lu-
 teoli; calyx 3-sepalus; stylus staminibus dimidio bre-
 vior. = 2. *H. alyssoides* = Vent: choix t. 20. (*His-pan:*, *Gallia* occid:). Suffrut: Flores mediocres lutei;
 calyx 3-sepalus; stylus subnullus; stigma magnum.
 = 3. *H. halimifolium* = W. en: 569. (*Hispan:*, *Lu-*
sitan: *Sardin:* in arenosis maritimis *Sulcis* MORIS st:
 sard: I. p. 6.). Frutic: Flores mediocres lutei saepius
 atro-sanguineo maculati; calyx 5-sepalus, 2. exter-
 nis angustissimis; rami superni in specim: meis ex
 plantis in H. B. T. cultis *leproso-rubri*, non *leproso-*
albidi uti in diagn: DC.

* 4. *H. Tuberaria* = Mill: dict: 10. = Spr: syst:

II. 587. = Cav: ic: I. p. 65. t. 67. sub *Cisto* (*Eur: austr:* In comit: *Nicæensi* locis sterilibus et rupestribus quandoque occurrit; frequentius circa *Nicæam* All: n. 1666. *Sardin:* in collibus aridis *Oliastra* MORIS st: sard: I. p. 6.). Perenn: Flores mediocres lutei; calyx 5-sepalus, 2. externis majoribus nitidis; stylus subnullus.

* 5. *H. guttatum* = Mill: dict: n. 18. = Spr: syst: II. 587. = Cav: ic: 2. p. 57. t. 57. f. 1. pro var: β *serrato*. Viv: fragm: 13. t. 14. f. 1. pro var: *acuminato*. Ic: taur: vol. 20. t. 45. pro var: α *Colum næ* (*Eur: med:* In pascuis siccis sterilibus *Nicæensibus*, *Liguriæ*, *Montisferrati*, *Canapiciensibus*, similibusque locis secus flumen *Ticinum* copiosissime All: n. 1667., BIROLI fl: acon: I. p. 181. In aridis prope *la Molinetta*, *Venariam*, inter *Alpinianum* et *Ripulas RE* fl: torin: I. 279. In *Sardin:* pascuis et ad vias MORIS st: sard: I. p. 6.). Ann: Flores mediocres; calyx 5-sepalus 2. externis dimidio brevioribus; petala lutea sub-integra plus minusve basi maculata; stylus subnullus. Varr: plurimæ ex DC. Prodr: I. 271.

6. *H. punctatum* = W. en: 570. (*Gallia occid:*). Ann: Priori valde affine, et vix diversum foliis *stel-lato-pubescentibus*, nec reapse *hirsutis*. Ceteri characteres ab Auctoribus laudati occurrunt sæpe in var: *guttati*. = 7. *H. rosmarinifolium* = Pursh fl: bor: am: 2. p. 364. non *Cistus rosmarinifolius* All: (*Amer: bor:*). Herbac: tomentosum. Flores parvuli; calyx 5-sepalus 2. externis linearibus angustis; pétala diluto-lutea; stylus subnullus.

†† Stylo recto staminibus æquali vel longiore
(*Macularia*, et *Brachypetalum* DC.)

* 8. *H. lunulatum* = DC. fl: fr: 4. p. 816. = Spr: syst: II. 588. = All: auct: p. 30. t. 2. f. 3. sub *Cisto* (Abunde in montibus supra *Ormea*, in jugis *la Raschiera*, extrema valle *di Pesio*, uti etiam in montibus supra *Limone* ALL: l. c.). Suffrut: humile. Flores mediocres pulchelli; calyx 5-sepalus 2. externis linearibus; petala lutea lunata croceo versus unguem notata.

9. *H. niloticum* = Pers: enh: II. p. 78. (Eur: austr: , *Ægypt*: In *Sardin*: pascuis collinis MORIS st: sard: I. p. 6.). Ann: Flores parvi; calyx 5-sepalus 2. externis minutis; petala lutea calyce breviora.

* 10. *H. ledifolium* = W. en: 571. = Spr: syst: II. 589. = Lob: ic: 2. p. 118. Ic: taur: vol. 17. t. 91. f. 1. et vol. 18. t. 73. (*Gall*: austr:, *Lusitan*: In comit: *Nicæensi* ALL: n. 1668. sub *Cisto*). Ann: Priori valde affine.

* 11. *H. salicifolium* = Pers: enh: II. p. 78. = Spr: syst: II. 589. = Seg: ver: 3. t. 6. f. 3. (*Hispan*: , *Gall*: austr: In comit: *Nicæensi* ALL: n. 1669. sub *Cisto*. In ericetis *Ticini* BIROLI hb: non fl: acon: ? In *Sardin*: apricis collinis MORIS st: sard: I. p. 6.). Ann: Flores mediocres lutei; calyx 5-sepalus sepalis externis minutis.

12. *H. ægyptiacum* = Mill: dict: n. 23. (*Afr*: bor:, *Hispan*: In *Sardin*: mediae collinis aridis MORIS st: sard: I. p. 6.). Ann: Calyx 5 - sepalus sepalis externis angustissimis brevissimis, internis inflatis petala lutea lanceolata brevissima includentibus.

+++ Stylo basi infexo (*Heriocarpium*, *Fumana*,
Pseudocistus, et *Euchelianthemum* DC.)

13. *H. Lippii* = Pers: enc: II. p. 78. (*Ægypt:*).
Suffrut: Calyx 5-sepalus pubescens costatus, 2. ex-
ternis minutis linearibus; petala flava calycem vix
excedentia = 14. *H. cairicum* = Delil: fl: eg: 93.
t. 31. f. 2. (*Ægypt:*). Differt a priori, cui affine,
caule tortuoso ramosiore, foliis obovatis margine
revolutis, floribus pedicellatis. = 15. *H. canariense* = W.
en: 571. (Ins: *Canar:*). Suffrut: Calyx 5-sepalus glaber.

* 16. *H. ericoides* = Dunal ined: = Spr: syst:
II. 590. = Cav: ic: II. p. 56. t. 172. sub *Cisto*.
(*Hispan:*, *Neapol:* *Pedem:* in apricis montanis et col-
linis atque alveis fluminum locis sabulosis ALL: n.
1662 sub *Cisto calycinum*?). Frutic: Sepala 5 ante
anthesim apice torta, 2 extremis angustis; petala
lutea paria; pedunculi 1-flori. Huius vel sequentis
var: videtur esse *Cistus calycinus* ALL: ab Auctoribus
omissus in synonymia.

* 17. *H. Fumana* = Mill: dict: n. 6. = Spr:
syst: II. 590. = Desf: atl: I. p. 414. t. 105. pro
var: α *majori*. Barr: ic: 286. et 446. pro var:
 β *minori*. Ic: taur: vol: 23. t. 27. sub *Cisto*.
(Eur: In *Pedem:* aridis apricis collium calidiorum
ALL: n. 1661. Supra *Pecetto* et *Revigliasco* et in monte
Musiné RE fl: torin. I. p. 278. In apricis collibus
di *Invori superiore* et *Cercogno* non frequens BIROLI
fl: acon: I. p. 181. *Genuæ* in mæniis *Feritorem* ver-
sus et in collibus al *Lagazzo* BERTOL: am: ital: p.
155. 156. In rupestribus *Cagliari*, *Dorgali* MORIS

st: sard: II. p. 1.). Suffrut: Valde priori affine, sed folia *scabra*, petala *maiora*.

* 18. *H. origanifolium* = Pers. enh. II. p. 76. (*Hispania*). Suffrut: Calyx 5-sepalus 2 externis angustis: flores parvi; petala lutea vix calyce longiora.

* 19. *H. alpestre* = Dunal ined: = Spr: syst: II: 590. = Grantz austr: p. 103. t. 6. f. 1. sub *Cisto* (Alpib: Eur: med: Pedem: ubique in pascuis et ad rupes locis montanis et subalpinis, immo ad alpes ascendit All: n. 1663. Ad planitiem quoque descendit et ubertim ob viam venit ad orientem *della Brunetta* et in vineis *di Mompantero* RE fl: segus: p. 44. In *Cenisio* inveni cum BERTERO). Suffrut: Calyx 5-sepalus 2 externis minutis; petala lutea *integerrima* calycem *duplo* superantia, qua nota distinguitur ab *H. oelandico* DC. petala *emarginata* calycem *subæquantia* gerente; hoc non confundendum cum *Cisto oelandico* JACQ: eodem ac *H. alpestre*.

* 20. *H. canum* = Dunal ined: = Spr: syst: II. 590. = All: Pedem: t. 45. f. 3. sub *Cisto*. (Eur: med: et austr: In Comit: *Nicæensi* All: n. 1664. In glareosis calidioribus prope *Giambava* in valle *Augustæ Prætoriæ* BALBIS:). Suffrut: Calyx 5-sepalus 2 externis minoribus; petala lutea calycem longe superantia; plantula tota canescens.

* 21. *H. italicum* = Pers: enh: II. p. 76. = Spr: syst: II: 591. = Barr: ic: rar: 510. t. 366. (*Hispaniæ, Italia*. Pedem: in rupibus circa *Lacerame* All: n. 1665.). Suffrut: Priori valde affine, cuius forsitan var: ex observatione cl: ALLIONII l. c.

22. *H. marifolium* = DC. fl: fr: 4. p. 817. (Eur:

austr: , *Tauria*, *Caucaso*. In *Sardin*: editis jugis montis *Oliena* MORIS st: sard: II. p. 1.). Suffrut: humile, cæspitosum; ceterum præcedentibus n. 20 et 21. etiam valde affine, a quibus differt præcipue petalis calycem vix superantibus. = 23. *H. arabicum* = Pers: enh: II. p. 80. (*Arabia*, *Italia*, *Hispania*). Suffrut: Calyx ante anthesim apice tortus 5-sepalus, 2 extremis angustis. Missum sub nomine *Cisti Savi* a cl: BERTOL: qui consulendns in am: ital: p. 5.

* 24. *H. lœvipes* = W. en. 570. = Spr: syst: II. 591. = Jacq: h. vindeb: t. 158. sub *Cisto*. (*Eur*: austr: In agro *Nicæensi* ALL: n. 1660. In *Liguriæ* promontorio di *Portofino* Viv: fragm: fl: ital: In *Sardin*: apricis rupestribus MORIS st: sard: I. p. 6.). Frutic: Folia minima in fasciculos alternos disposita.

25. *H. viride* = Tenor: fl: nap. I. p. 299. t. 47. (In collibus aridis *Taranto*, *Avetrana*, *Sicilia*. In aridis *Sardin*: collinis MORIS st: sard: I. p. 6.). Suffrut: subcæspitosum. Calyx 5-sepalus 2 extremis paullo minoribus ovato-lanceolatis; petala lutea calice vix longiora; folia fere ut in priori, sed læte virentia. = 26. *H. Barrelieri* = Tenor: prodr: fl: neap: p. 31. (*Neapol*: , *Sicilia*). Suffrut: Calyx 5-sepalus 2 externis linearibus duplo minoribus; petala lutea calyce duplo longiora. Cl: GUSSONE affine dicit priori, et citat ic: BARRELIERI 443. (Guss. fl: sic: prodr: II. p. 21.): sane hoc valde quadrat cum *H. viridi*; sed specim: mea ex plantis in h. Ripul: cultis enatisque a seminibus missis a TENOREO toto cælo differunt foliis oppositis nec fasciculatis, lanceolatis, semipollica-

ribus nec linearibus minimis, stipulis subulatis brevissimis, petalis calyce valde longioribus, aliisque notis: has substantiales differentias culturæ tribendas esse non puto; forsitan planta mea pertinet ad var: β foliis elongatis a laudato auctore citatam, sed rami et pedunculi glabri adparent nec villosiusculi.

* 27. *H. thymifolium* = Pers: enh: II. p. 79.
= Spr: syst: II. 591. = Barr: ic: 416. Ic: taur: vol: 18. t. 73. f. 3. (*Hispania*. In collibus maritimis agri *Nicæensis* frequens ALL: n. 1671. In collinis apricis *Cagliari* MORIS st: sard: II. p. 1.). Suffrut: *H. lœvipedii* n. 24. valde affine; folia tamen paullo maiora, fasciculi magis distantes; pedunculi villoso-glutinosi.

* 28. *H. glutinosum* = Pers: enh: II. p. 79.
= Spr: syst: II. 591. = Barr: ic: t. 328. Ic: taur: vol: 28. t. 53. (*Hispania*, *Gallia* austr: In rupibus agri *Nicæensis* non infrequens ALL: n. 1677. In *Sardiniae* pascuis aridis MORIS st: sard: I. p. 6.). Suffrut: Totum villoso-glutinosum; racemi sub-umbellati pauciflori.

29. *H. lavandulæfolium* = DC. fl: fr: 4. p. 820. (*Gallia* austr: , *Barbaria*, *Syria*, *Hispania*). Suffrut: Totum canescens; calyx 5-sepalus 2 externis minutissimis; racemi confertissimi multiflori. = 30. *H. stoechadifolium* = Pers: enh: II. p. 79. (*Lusitan:*, *Corsica*). Suffrut: Priori affine, sed minus canescens, folia breviora, racemi laxi pauciflori = 31. *H. croceum* = Pers: enh. II. p. 79. (*Barbaria*, *Hispan:*, *Sicilia*. In *Sardin:* aridis di *Oliena*, *Galtellii*, *Baunei* MORIS st: sard: II. p. 1.). Frutic: Cæspi-

tosum; calyx subcoloratus; petala crocea. = 32. *H. glaucum* = Pers: enh: II. p. 78. (*Hispan: Italia*). Suffrut: Sepalis externis linearibus brevissimis, internis sub-hispidis, foliis acutiusculis in var: α , vel obtusiusculis in var: β , ad quam pertinent specim: mea ex plantis in H. Ripul: cultis.

* 33. *H. vulgare* = Gaertn: fruct: I. p. 371. t. 76. = Spr: syst: II. 592. = Fl: dan: t. 101. sub *Cisto Helianthemo*. Ic: taur: vol. 8. t. 40. 41. 42. (*Eur: fere omni. Pedem: ad vias in montanis, et sylvis apricis et pascuis; in montanis pascuis Taurinensibus invenitur var: fl: albo ALL: n. 1673. In pascuis collum Ticini maxime variat flore albo et rubro BIROLE fl: acon: I. p. 181. qui perperam citat icon: ALL: fl: pedem: t. 55. f. 4. ad *Cistum roseum* referendam. Vide infra n. 40. Circa Venariam occurrit var: α ramis tomentosiusculis, stipulis petiolis vix longioribus RE fl: torin: I. p. 280. Ligur: occid: in suminis montibus della Scaggia BERTOL: amæn: ital: p. 31. 32.): Suffrut: multimode varians. Huc pertinet sec: SPR: *Cistus barbatus* LAM: dict: n. 50. Exemplar quod possedeo sub hoc nomine ex hb: BELLARDI non quadrat omnino cum descriptione LAM: præsertim foliis quæ cl: Auctor dicit latiora quam in *C. Helianthemo*; in specimi: meo sunt dimidio angustiora, margine magis revoluta, pilisque longis setaceis, ut tota planta; adspersa. An *Helianthemi vulgaris* var: altera? An planta LAM: Gallicæ meridionalis incola eadem ac *H. obscurum* PERS: sec: DC. Prodr: I. 280., quod inventitur etiam in Pedemont: ad colles apricos Albæ (BERTER:), nec non nella Praglia di Pianezza, et in*

pascuo *Alpiniani* (RE fl: torin: I. p. 280.) ad stirpem diversam referenda? Idem dicendum de *H. grandiflоро DC.* quod frequens occurrit in *Pedemontii* pascuis saxosis montanis et subalpinis (ALL: n. 1674. sub *Cisto*), quodque non videtur differre nisi habitu omnium partium majore.

34. *H. nummularium* = Mill: dict: n. 11. (*Gallia austr:*, *Italia*). Suffrut: Planta admodum obscura, priori valde affinis, et cum aliis confusa. Cons: STEUD: et DC. Prodr: I. 281. Specim: mea quadrant cum diagnosi Candolleana, nec omnino cum descriptione DESF: fl: atl: I. p. 423.

* 35. *H. acuminatum* = Pers: enh: II. p. 79. non *Cistus acuminatus* Viv: = Spr: syst: II. 593. = IC.? (In agro *Nicæensi* BALB: el: st: rec: p. 5.). Suffrut: Planta valde dubia et diversa sec: DC. Prodr: I. 280. n. 83. a *C. acuminato* Viv:

* 36. *H. serpyllifolium* = Mill: dict: n. 8. = Spr: syst: II. 593. = Crantz fasc: 2. ed: 2. p. 101. t. 15. f. 3. sec: ALL: n. 1670. (Alpib: *Eur*: med: et austr: *Pedem*: circa thermas *Vinadii*, et prope *S. Vincent* in valle *Augustæ Prætorice* ALL: l. c.). Suffrut: Priori valde affine et forsitan ambo *H. vulgaris* varietates.

* 37. *H. hirtum* = Pers: enh: II. p. 79. = Spr: syst: II. 593. = Cav: ic: 2. p. 37. t. 146. (*Hispan:*, *Gallia austr:* In aridis circa *Villamfrancam Nicæensem* ALL: n. 1676. In monte *Musiné* atque inter *Venariam* et *Sturam* RE fl: torin: I. p. 281.). Suffrut: Enumeratum ab ALLIONIO sub *Cisto rosmarinifolio* synynomio ab Auctoribus omissio.

38. *H. racemosum* = Dunal ined: (*Hispania*,

Barbaria, Teneriffa). Frut: Affine potius *H. ladan-dulæfolio* n. 29. quam *H. hirto* n. 37.; sed planta in omnibus partibus angustior, nec tam canescens; petala *alba* non *flava*; folia fere ut in *Roremarino*; ico BARRELLIERI 293. quam W. citat, et DC. excludit perfecte quadrat cum specim: meis. = 39. *H. stri-ctum* = Pers: enh: II. p. 79. (*Hispania*). Suffrut: Priori affine, sed folia angustiora et ita reflexa ut subulata adpareant; racemi erecti subsecundi; petala alba calyce glabro longiora.

* 40. *H. pilosum* = Pers: enh: II. p. 79. = Spr: syst: II. 593. = All: pedem: t. 45. f. 1. 2. sub *Cisto*. Ic: taur: vol. 21. t. 94. f. 1. (*Hispaniæ, Gallia austr:* In *Pedem*: abunde circa *Segusium*, in valle *Macrœ*, in *Ligurum* montibus, inter *Garetium* et *Ormeam*, atque in comit: *Nicæensi* ALL: n. 1672. In collibus sole præustis *Segusii* usque ad *Borgone Re* fl: *segus*: p. 45.). Suffrut: Flores sæpius albi; ALLIONIUS ta-men asserit plantas nicæenses solere roseum colorem ostendere; in hortis cultas exhibere flores albos, sul-phureos et roseos.

41. *H. lineare* = Pers: enh: II. p. 78. (*Hispaniæ, Gallia austr:*). Suffrut: Sepala violaceo-striata; petala alba.

* 42. *H. appenninum* = DC. fl: fr: 4. p: 824. = Spr: syst: II. 594. = Tabern: icon: 1062. sec: W. All: pedem: t. 45. f. 4. sub *Cisto roseo* (*Eur: med:* In comit: *Nicæensi* et *Uneliæ* ALL: n. 1675.). Suffrut: varians floribus albis et roseis, foliisque latioribus vel angustioribus. Ico ALLIONII de suo *Cisto ro-seo* ita quadrat cum specim: meis *H. appennini* et

H. rosei, ut dubitari non possit, monente etiam SPRENGELIO, plantam ejusdem ALLIONII meram esse *H. appennini* varietatem floribus roseis: adde cl: Auctorem jam suspicatum fuisse an ad *Cistum Helianthemum* esset referenda, uti censuit etiam W. et dubitavit DC. Prodr: I. 283.: sed in hoc folia magis revoluta adparent: ceterum differentiæ tam leves sunt, ut credendum sit ipsum *H. appenninum* esse *vulgaris* var: Idem dicendum de *H. rhodantho* DUNAL quod *Albæ* secus *Tanarum* invenit BERTERUS, quodque ludere videtur inter *H. roseum* et *H. pulverulentum*.

* 43. *H. pulverulentum* = DC. fl: fr: 4. p. 823.
= Spr: syst: II. 594. = Ic: ? (In collibus sterilibus Galliae. In pascuis editioribus supra *Eza* inter *Sportorno* et *Finale BALE*: misc: alt: p. 18. sub *Cisto polystachys* LAM: non L.). Suffrut: Totum cinereo-canescens; racemi subsecundi; sepala externa brevissima subovata, interna vix striata; petala albida calyce paullo longiora.

* 44. *H. mutabile* = Pers: enh: II. p. 79. = Spr: syst: II. 594. = Jacq: ic: I. t. 99. sub *Cisto (Hispan: In pascuis Ticini inter Campolatum et Vigebanum non infrequens BIROLI* fl: acon: I. p. 181.). Suffrut: Priori proximum sec: DC. Prodr: I. p. 283. n. 106. Sepala lanceolata; flores albi, rosei vel rubri, minores vel maiores, quandoque pleni; in specim: meo petala sunt pallide-rosea calyce duplo longiora.

45. *H. ciliatum* = Pers: enh: II. p. 79. (*Hispan: Afr: hor: Italia. In Sardin: pascuis aridis di Arcidano MORIS* st: sard: I. p. 6.). Suffrut: Petala rosea

calyce 1/3 longiora; specim: sardoa habent folia dimidio breviora ac minus ciliata quam in ic: DESF: fl: atl: t. 109.; ceterum perfecte quadrant: his forsitan rationibus ductus speciem distinctam esse existimavit cl: BADARÒ quam *H. semiglabri* nomine salutavit.

Observatio geographica circa Cistineas.

Cistinæ per orbem sparsæ ex DC. sistunt numero 161

Cistineæ pedemontanæ.

Et sic sextam circiter partem constitunt.

ORDO XVI.

VIOLARIEÆ

(DC. Prodr: I. 287. = *Genera Cistis affinia*
Juss: gen: 294. = Jonidia Spr:).

Char: essent:

» *Cal:* 5-sepalus interdum basi coalitus, sepalis
 » sub-inæqualibus. *Pet:* 5 iis alterna modo æqualia,
 » modo inæqualia sc: inferius labelliforme aut basi
 » calcaratum vel cucullatum. *Stam.* totidem petalis
 » alterna vel opposita, interdum appendicibus inter-
 » mixtis. *Styl:* 1. persistens. *Caps:* 1-locularis, 3-
 » valvis polysperma aut raro (abortu?) monosperma,
 » quandoque elastice dehiscens. *Sem:* placentis parie-
 » talibus adfixa 3. integumentis instructa. *Album:* car-
 » nosum. *Embr:* rectus. »

Obs: Ordo divisus in 3. tribus, sc. *Violeas*, *Alsidi-*
neas et *Sauvageas*; valde naturalis pro *Violeis* quam-
 dam affinitatem cum *Cistineis* habentibus; habitus in-
 super et organa floralia propria, ac singulari modo
 disposita. *Herbæ*, suffrutices, aut frutices mediocres
 omnes *Pentandriæ monogyniæ*, foliis stipulaceis sim-
 plicibus.

TRIB. I. *Violaceæ.*

(Sepala et petala inæqualia. Stamina petalis alterna).

I. GLOSSARRIEN Martius ined:

» *Cal*: sepalis duobus interioribus angustissimis.
 » *Pet*: 2 superiora breviora, 2 lateralia longiora, in-
 » sumum maximum calcaratum basi 2-callosum. *Fi-*
 » *lam*: dilatata dorso antheras conniventes gerentia,
 » quorum 2 anteriora appendices nectariferas in cal-
 » car producunt. *Caps*: valvis medio placentiferis
 » elasticis. »

Obs: Genus prorsus novum medium inter *Noisetiam* et *Violam*, constans 2-3 fruticulis brasiliensi-
 bus a cl: MARTIO detectis. Capsula dicitur a SPR: 3-
 locularis: at mihi visa est non differre a capsula
Violæ quæ omnium Botanicorum consensu est 1-lo-
 cularis, 3-valvis. Huc pertinet *Schweiggeria* a DC.
 Prodr: III: 39. inter *Vochysias* dubias relata. Cf. SPR:
 c. p. 99.

1. *Gl: pauciflorus* = SPR: syst: I. 806. ex Mart:
 (*Brasilia*). Specim: meum a cl: MARTIO communica-
 tum sub allato nomine non quadrat cum diagn: SPR:,
 folia enim sunt *lanceolato-elliptica*, basi in petiolum
attenuata, apice *acuta*, nec *ovata obtusa*. Forsan
 planta a SPR: enumerata eadem est ac *Gl: parviflo-
 rus* a DC. citatus Prodr: I. 291, et nominis differen-
 tia provenit ab errore typographico? Forsan error
 in schedis, et planta mea ad *Gl: floribundum* perti-

net, cum quo convenient diagnoses SPR: et DC. Interim phrasis hæc erit :

» *Gl:* foliis subæqualibus lanceolato-ellipticis in
» petiolum longum attenuatis subserratis, pedunculis
» axillaribus flore longioribus (floribus mediocribus). »

Noe:

2. *Gl: parviflorus* = Mart: ined: DC: Prodr: I.
291 ? (*Brasilia*). Specim: e cl: MARTIO cum priori
communicatum sic definiendum :

» *Gl:* foliis inæqualibus, maioribus ovatis obtusis
» in petiolum breve attenuatis crenulatis, minoribus
» sub-orbiculatis, pedunculis axillaribus florem sub-
» æquantibus (floribus parvis). » Noe:

II. *VIOLA* Lin: gen: n. 1364. = Lam: ill: t. 725.

» *Cal:* 5-partitus, laciniis plus minūsve in appen-
» dices auriculæformes productis. *Pet:* inæqualia,
» altero majori calcarato. *Stigma* varium. Cetera ut
» in *Glossarrhene*. »

Obs: Genus modo constans spec: 105 ex DC., 95
ex SPR: a cl: DE-GINGIS in 5 sectiones divisum præ-
sertim ex stigmatis forma, scilicet *Nomimum* stig-
mate rostrato; *Dischidium* stigmate erostrato 2-lobo;
Chamælanium stigmate sphæroideo-capitato piloso;
Melanum stigmate urceolato piloso; *Leptidium* stig-
mate probosideo. Divisiones reapse speciosæ sed valde
fallaces ob organorum tenuitatem. Herbae acaules vel
caulescentes raro fruticulosæ, foliis stipulisque divisis
vel indivisis, ex quibus proniores fluunt generis se-
ctiones.

Sect. I. *Acaules.*

† Foliis divisis.

* 1. *V. pinnata* = L. sp: 1323. = Spr: syst: I. 796. = All: misc: 3. p. 181. t. 5. f. 2. Ic: taur: vol: 23. t. 16. f. 3. (In *Sibiria* pro var: α *sibirica*. Alpib: *Cottii penninis*, præsertim in iugo *Assietta*, inter montes *Ginevra* et *Cesana* ad rupes, et in valle di *Tigna*, supra *Termignon* et in *M. Cenisio* prope *l'Ospitaletto* All: n. 1636. Re fl: segus: p. 73. pro var: β *europæa*). Perenn: Stigma rostratum triangulare marginatum; flores parvi.

2. *V. palmata* = L. sp: 1323. (*Amer: bor:*). Perenn: Variat foliis plus minusve sectis sec: DC: Prodr: I. 292. ex ELLIOT. Specim: mea e plantis in H. Ripul: cultis pertinent ad var: β *fragrancem*; stigma rostratum triangulare marginatum; flores ampli.

†† Foliis indivisis.

* 3. *V. odorata* = L. sp: 1324. = Spr: syst: I. 797. = Lam: ill: t. 725. f. 1. Ic: taur: vol: 6. t. 90. 91. 92. 93. 94. Vern: *Violeta*, quo nomine veniunt ceteræ species indigenæ. (*Eur: fere tota, Sibir: , China, Afr: bor: In agro Pedemont: ubique* All: 1639. Re, BIROLI etc: *Sardin: umbrosis Iglesias Morris st: sard: I. p. 6.*). Perenn: Stigma rostratum uncinatum nudum; flores mediocre suaveolentes varian- tes ex intense-violaceo ad album, e simplicibus ad plenissimos. Colitur in hortis. Flores petaloidei sæpe

abortivi : alii serius succedunt apetali fere hypo-
gei constanter fæcundi et fructus perficientes ; idem
observasse in aliis stirpibus acaulibus affirmat cl:
MONNIER in Arch: bot: tom: I. p. 412.

* 4. *V. palustris* = L. sp: 1324. = Spr: syst: I.
797. = Moris: hist: II. p. 475. s. 5. t. 35. f. 5. (Eur:,
Sibir:, Amer: bor: pro var: β *pensylvanica* DC. In
Pedem: alpinis irriguis et humentibus non frequens,
copiose ad fontium scaturigines circa *Tendam*, in
pratis spongiosis *Canapiciensibus*, in monte *du grand*
S. Bernard ALL: n. 1638. Secus *Sturam* versus *la*
Madonna di campagna, prope *Venarium* ac in syl-
vis umbrosis *Stupinixii* ad arborum caudices RE fl:
tor: I. p. 146. Locis irriguis collium et sepium BIROLI
fl: acon: I. p. 80.) Perenn: Stigma rostratum marginatum,
flores mediocres.

* 5. *V. hirta* = L. sp: 1324. = Spr: syst: II.
797. = Engl: bot: t. 894. Ic: taur: vol: 6. t. 101.
102. 103. f. 1. (Eur:, *Caucaso.* *Pedem:* secus syl-
vas, sepes et ad vias, et secus pascua primo vere
non infrequens ALL. n. 1637. Frequens in pratis
macilentis RE fl: segus: p. 73. Speciatim in arenosis
sec: *Sturam* RE fl: torin: I. p. 145. Passim circa
Taurinum PIO. In collibus et alpibus provinciae *No-*
variensis BIROLI fl: acon: I. p. 80.). Perenn: Stigma
rostratum uncinatum nudum: flores mediocres a cæ-
ruleo ad album; variat etiam foliis plus minusve cor-
datis et eorum magnitudine. Cons: DC. Prodr: I.
295. Inter specim: mea unum habeo ex hb: BIROLI
foliis fere prorsus *glabris* inscriptum in scheda

var: glabriuscula, quam non memorat DC.

6. *V. cucullata* = Ait: h: Kew: III. p. 288. = Pio de *Viola* t. 3. f. 1. sub *V. obliqua* (*Amer: bor:*). Perenn: Stigma rostratum 3-angulare marginatum, flores fere ut in *V. odorata*; variat modis a DC. indicatis Prodr: I. 292. Specim: mea ex plantis cultis perfecte quadrant cum citata icone Pioi, quæ pertinet ad var: β *glaberrimam*. = 7. *V. patrinii* = DC. Prodr: I. 293. (*Asia med: et austr: , Dahuria*). Stigma 3-angulare marginatum, flores parvi, petala ex secco luteola. Specim: meum a cl: FISCHERIO communicatum refert plantam humillimam foliis longe petiolatis, petalis 2-barbatis, et quadrat cum typo DC. nec cum varr: β et γ .

Sect. II. *Caulescentes.*

† *Stipulis indivisis subserratis.*

8. *V. stipularis* = Swartz fl: ind: occid: III. p. 1956. (*Ins: Carib:*). Herbac: ex SPR: , suffrut: ex DC. Stigma proboscideum, flores parvi cærulescentes. = 9. *V. uniflora* = L. sp: 1327. (*Sibiria*). Perenn. Stigma sphæroideo-capitatum, flores magni lutei.

* 10. *V. biflora* = L. sp: 1326. = Spr: syst: I. 799. = Bauh: hist: III. p. 545. f. 1. pro var: *caule unifloro*. Pluck: t. 233. f. 7. et 234. f. 1. pro var: *caule bifloro*. Ic: taur: vol: 6. t. 105. 106. (*Alpib: Eur: et Asiæ. Alpib: Pedemontanis* ubique ad nivem deliquescentem et rivorum margines ALL: n. 1643.

RE fl: segus: p. 74. In saxosis irriguis montium *Novariensis* provinciae BIROLI fl: acon: I. p. 81.). Perenn: Stigma erostratum 2-lobum; flores parvi lutei; variat caulibus 1-floris, sed toto cælo diversa a *V. uniflora*.

* 11. *V. nummularifolia* = All: Pedem: n. 1640. = Spr: syst: II. 799. = All: I. c. t. g. f. 3. et spec: ped: t. 2. f. 2. Ic: taur: vol: 14. t. 99. f. 2. (Alpib: Pedem: inter diffractos lapides ad alpes *Valderianas* All: I. c.; nec non abunde locis summis ad alpes d' *Entraive*, *Lantosca*, *Tenda* et *Madonna delle finestre* All: auct: In alpib: siccis *della Balma* et al *Campello* BIROLI fl: acon: I. p. 81. In *Corsicæ* alpib: pro var: β *minima* Bocc:) Perenn: Stigma urceolatum; flores mediocres dilute cærulei vel subslavidi.

* 12. *V. arenaria* = DC. fl: fr: 4. p. 806. = Spr: syst: I. 799. = Pio de *Viola* t. 1. f. 2. sub *V. Allionii* (Eur: med: et austr:, *Tauria*, *Caucaso*. Pedem: in *M. Cenisio* prius inventa ab ALLIONIO auct: n. 1645.; hinc raram vidit RE eodem loco, et *V. Balbis* appellavit fl: segus: p. 73. c. descript: Reperta quoque in locis argilloso in valle *Augustæ Prætoriæ* et prope *Segusium* a PIOTTAZ. In locis sabulosis prope *Montaldo monregaleensem* abunde a MOLINERIO; alibi-que sat frequens Pio). Perenn: Stigma convexum nudum: flores mediocres cærulescentes.

* ? 13. *V. pumila* = Vill: dauph: II. p. 266. = Spr: syst: I. 800. = Vill: cat: strash: t. 5. (*Delphinatu*. In ericetis siccioribus Pedem: secus DC. Prodr: I. 299.). Perenn: nana. Stigma rostratum, papillosum, subreflexum; flores parvi dilute cærulei. Ped-

montii incolam non dicunt nostri , nec ego unquam inveni.

* 14. *V. canina* = L. sp: 1324. = Spr: syst: I. 800. = Engl. bot: t. 620. Ic: taur: vol: 6. t. 109. (*Eur:*, *Asia*, *Amer:* bor: *Pedem:* in *sylvis* *apricis* et cæduis *collium* et *montium* ALL: n. 1645. RE fl: *segus*: p. 73. et flor: torin: I. p. 147. In *collibus* et *alpibus* *provinciæ Novariensis* vulgatissima BIROLI fl: *acon*: I. p. 80. *Sardin:* ad *sepes* et in *sylvis* *locis montanis* MORIS st: *sard*: I. p. 6.). Pereunn: Stigma rostratum papillosum subreflexum ; variat colore et magnitudine florum, caulis altitudine, nec non foliorum lobis plus minusve acutis. Cons: PIO de *Viola* p. 18. et 19.

15. *V. lactea* = Sims: fl: brit: I. p. 247. (*Anglia*, *Helvet:*, *Gullia*). Perenn: Stigma papillosum subreflexum ; flores albi mediocres. Cl: DC. (Prodr: I. 299.) refert hanc stirpem ad *V. montanam* L., quam diversam existimo etiam SPRENGELII auctoritate ductus: non ita de *V. Ruppii* ALL: quæ non distinguitur a *V. lactea* nisi foliis *cordatis* lanceolatisque , in *lactea* omnibus lanceolatis, qua nota ad var: tantum illam refero.

* *V. lactea* var: β. *V. Ruppii* ALL: ped: n. 1646. = ALL: l. c. t. 26. = Spr: syst: I. 800. = Lodd: bot: cab: t. 686. Ic: taur: vol: 6. t. 105. et 106. f. 2. (*Pedem:* in argillosis prope *la Morra* similibusque locis inter *Pinerolium* et *Lucerna*; in montibus *Monregalensisibus* prope *Maioro* et *Moncrivello* in ericetorum spongiosis ALL: l. c. In *collibus Taurinensisibus* PIO. In *collibus* *provinciæ Novariensis* non rara BIROLI sub *V.*

montana fl: acon: I. 81. *Ubertim* in pratis *Planicieæ* prope ædem *S. Pancratii* atque in sterilibus *della Praglia* RE fl: torin: I. 148. *Genuæ* in monte *Ramagno* in alpib: *della Scappa* et in collibus *al Boschetto in Polcevera* BERTOL: am: ital: p. 133.).

* 16. *V. montana* = L. sp. 1325. = Spr: syst: I. 800. = Garid: Aix t. 97. (*Eur:* temperata, *Sibir:* *Pedem:* secus vias circa *Albam Pompeiam* ALL: n. 1647. In sylvis collium *Taurinensium* BALB:, P10; *della Mandria* RE fl: torin: I. p. 147.) Valde priori affinis cum qua confusa pro var: *Ruppii* a cl: DC., RE et BIROLI, neutiquam a BALBISIO et P10; sed differt caulibus simplicibus *erectis*, foliis modo *lanceolatis*, modo *ovatis*, modo *cordatis*, omnibus constanter minoribus et profundius serratis, floribus amplioribus albis demum cærulescentibus. Huc pertinere videtur sec: P10 l. c. p. 24. *V. persicifolia* ROTH: et SPR: syst: II. 800. a DC. omissa, cuius multa specim: possideo ex BELLARDI et BALBISIO, quæ perfecte quadrant cum aliis specimin: indigenis *V. montanæ*.

* 17. *V. mirabilis* = L. sp: 1326. = Spr: syst: I. 801. = Jacq: fl: austr: t. 19. Ic: taur: vol: 6. t. 104. (*Eur:*, *Caucaso*, *Sabaud:* prope *Martigny*, atque in sylvis proximorum collium *Taurinensium* ALL: n. 1648. In sylvis *Segusianis* RE fl: segus: p. 74. In nemoribus vineæ *d'Aigueblanche* et secus *Sturam* ac generatim in editioribus collibus RE fl: torin: I. p. 148.) Perenn: Stigma rostratum subreflexum nudum; flores mediocres cæruleo-violacei saepe apetali; variat pedunculis omnibus radicalibus.

* 18. *V. cenisia* = All: pedem: n. 1641. = Spr:

syst: I. 801. = All: l. c. t. 22. f. 6. et sp: pedem: p. 14. t. 3. f. 4. Ic: taur: vol: 14. t. 99. f. 3. (Alpib: Cott: pennin: Abunde oritur ad iugum *Rouche* dictum in *M. Cenisio* et in jugis *di Sestieres* et valli *Queiras* imminentibus All: l. c., RE fl: segus: p. 74. In summis alpib: *di Rima*, *Rimella*, ad montem *Morum*, *Crestesem* etc: abundat BIROLI fl: acon: I. p. 81.). Perenn: Stigma urceolatum, flores mediocres ('non magni ut ex W.), cœrulei; variat foliis omnibus *ovatis*, vel superioribus *oblongis*.

* 19. *V. valderia* = All: pedem: n. 1644. = Spr: syst: I. 801. = All: l. c. t. 24. f. 3. (Alpib: *Penninis*, *Grai*: , *Delphinatu* , *Pyren*: , *Corsica*. Circa *Valdesii* thermas in saxosis torrentis ad radices montis *S. Joannis*; copiose circa *la Madonna delle finestre* All: l. c.). Perenn: Priori valde affinis, cuius varietas tantum a DC. Prodr: I. 302. habetur, sed differt præsertim foliis omnibus *oblongis* nec *ovatis*, *hispidulo-ciliatis* nec *glabris*, petiolis folium *æquantibus* non *brevioribus*. Cl: BIROLI observavit numquam hanc invenisse in alpib: *Novariensibus* , ubi abundat *V. cenisia*. Ad hanc speciem refert cl: DC. fl: fr: sup: 617. *V. alpinam* All: n. 1642. ?

†† *Stipulis pinnatifidis.*

* 20. *V. tricolor* = L. sp. 1326. = Spr: syst: I. 802. = Fl: dan: t. 623. Ic: taur: vol: 6. t. 111. 113. Vern: Pensè (*Eur*: , *Sibir*: , *Amer*: bor. In montanis arvis nascitur var: *tricolor*, et in arvis *Pedemontanis* et *Sabaudia* abunde var: *bicolor* All: n. 1649. Re

fl: segus: p. 74. et fl: torin: p. 149. sub *V. arvensi*.
Sardin: inter segetes *Arizzo* MORIS st: sard: I. p. 6.).
 Ann: Stigma urceolatum; flores variantes magnitudine et colore. Cons: Pio de *Viola* p. 30. 31.

* 21. *V. rothomagensis* = Desf: cat: h. Paris: 153.
 (A *Rothomago* ad *Meldam*). Perenn: Priori valde affinis, cuius var: tantum consideratur a Spr: , sed differt præsertim foliis *hirtis* nec *glabris*, radicibus perennibus nec annuis.

* 22. *V. calcarata* = L. Sp: 1325. = Spr: Syst: I. 802. = Barr: ic: t. 691. Ic. taur: vol: 23. t. 16. f. 2. (Alpib: Eur: mediæ. In saxosis pascuis summarum alpium *Pedem*: ALL: n. 1650. Re fl: segus: p. 74. In *Sardin*: pascuis montanis MORIS st: sard: I. p. 6. In alpibus di *Vedro* BIROLI fl: acon: I. p. 81.). Perenn: varians fere ut *V. tricolor*. Huc inter alias pertinet *V. Zoysii* WULFF quæ caulem habet humilimum, flores autem luteos amplissimos; observavi tamen in hac aliisque stirpibus huiusc divisionis ad *tricolores* veterum Auctorum pertinentibus, quando occurrunt flores unicolores, in petalis quæ discoloria esse deberent, colorem esse magis minusque intensus.

* 23. *V. Bertolonii* = Pio de *Viola* p. 34. t. 3. f. 2. *V. heterophylla* Bertol: *V. gracilis* Smit: sec: Spr: *V. calcarata* var: ♂ DC. prodr: I. 302. (Summis alpib: *della Scaggia* in occidentali plaga *Liguriae* BERTOL: amœn: ital: p. 3.). Perenn: Speciem hanc differre a priori, præsertim foliis superioribus linearibus, jam probaverat cl: ejus inventor BERTOLONIUS in rar: ital: plant: dec: 3. p. 53. , et am: ital: I. c.,

nec cum *V. gracili* quadrare videtur comparatis Sm: , et BERTOL: descriptionibus, maxime si consulas GUSSONE Prodr: fl: sic: I. p. 255., ubi amplam hujuscem plantæ synonymiam tradens , *V. heterophyllam* satis ei notam haud memorat.

24. *V. cornuta* = L. sp: 1325. (*Pyrenæis* et monte *Atlante*). Perenn: Stigma urceolatum ; flores mediocres dilute cœrulei ; calcar longissimum ; petala oblonga.

*? 25. *V. lutea* = Huds: angl: ed: I. 331. = Spr: syst: I. 802. = Engl: bot: t. 721. (*Angl:*, *Eur:* med:). Perenn: Stigma urceolatum ; flores amplissimi lutei fere ut in *V. calcarata* , vel raro cœrulescentes in var: γ *nudia*. Sub *V. suderica* DC. prodr: I. 302. 303. Specim: possideo sub nomine *V. grandifloræ* a D. BONJEAN` communicata et lecta in *M. Cenisio* , quæ a *V. lutea* non videntur differre. Hic monendum nomen *V. grandifloræ* diversis stirpibus fuisse ab Auctoris tributum ; inter alios cl. PIO (de *Viola* p. 32.) indicat *V. grandifloram* L. tanquam plantam indigenam , et ei tribuit synonymum *V. calcarata* ALL: , quæ toto cœlo diversa. *V. grandiflora* L. crescit in montibus *Altaicis* et ad confusionem vitandam rite existimarunt recentiores Botanici sub *V. altaica* PALL: eam referre (DC. prodr: I. 302. , SPR: syst: I. 803.). Censeo igitur *V. grandifloram* PIO n. 51. esse *V. luteæ* n. 52. varietatem caule humilioi foliisque brevioribus , et veram *V. grandifloram* L. delendam a plantis pedemontanis. Vid. infra n. 28.

Violæ dubiæ.

26. *V. bicolor* = Pursh ex Spr: syst: I. 803. Spec: meum missum sub hoc nomine a PERRET differre non videtur a *V. tricolori* var: *bicolori*, sive *V. arvensi* x DC. prodr: I. 303. = 27. *V. anomala* = Kit: indescr: = Ita in scheda specim: unici ex hb: BIROLI; planta acaulis, foliis indivisis longe petiolatis sub-cordato-ovatis lanceolatisve minutissime serratis glabris; flores mediocres, sepala ovato-oblonga, petala ovata sepalis duplo majora, calcar abbreviatum obtusum. Affinis *V. campestris* M. B., et *hirtæ* L.; differt a prima foliis nonnullis *lanceolatis*, nec omnibus *cordatis*, lobis haud *cucullatis*; ab altera petalis *integris*, nec *emarginatis*, foliisque haud *profunde cordatis*; ab utraque foliis petiolisque *glabris*. = 28. *V. Pallasii* = Fisch: in litt: ? Perfecta specim: a cl: FISCHERIO lecta in *Altai*, et humaniter communicata sub allato nomine mihi differre non videntur a *V. altaica* Ker: bot: reg: t. 54. (DC. prodr: I. 302., Spr: syst: I. 803.), et sic ad veram *V. grandifloram* L. esse referenda. Variat floribus violaceis et ochroleucis: vid: supra observ: ad n. 25.

III. SOLEA Spr: pug: rar: I. p. 22. = *Violæ* et *Jonidii* sp: Auctorum.

» *Cal:* 5-sepalus inappendiculatus basi truncatus.
 » *Pet:* 4 subæqualia, quinto majori basi in formam
 » labelli plus minusve elongato saepius gibboso. *Anth:*
 » distinctæ. *Caps:* *Violæ.*»

Obs: Genus constans ex variis *Viola* speciebus et ab ipsa vix diversum calycis et petali majoris structura, comprehendens ex DC. unam stirpem sc: *S. concolor*, ex Spr: 37. circiter inclusis *Pombaliæ* VAND:, *Pigeæ* DC. et *Jonidii* VENT: generibus nimis leviter statutis characteribus e labelli forma depromptis. Herbæ vel rarius suffrutices exotici.

1. *S. verticillata* = Spr: in Schrad: journ: bot: 1800. p. 190. t. 6. et syst: I. 803. *Jonidium polygalæfolium* DC. prodr: I. 309. ex VENTN: (*Mexico*). Suffrut: Specim: ex BERTERO optime quadrat cum diagnosis DC. = 2. *S. parviflora* = Spr: syst: I. 804. Sub *Jonidio* VENT: H. et B. et DC. prodr: I. 310. (*Santa Fè di Bogota*). Suffrut: Specim: ex BERTERO convenit cum descript: W: sp: I. 2171. Species hæc radices habitu virtuteque *Ipecacuanhæ* simillimas habet ex W.

Species dubia.

3. *S. Martii.* » Caule herbaceo pubescente, foliis alternis ovato-ellipticis crenatis glabriusculis, stipulis linearibus petiolum æquantibus calycibusque glabris, pedunculis folio multoties brevioribus, labello elliptico basi 1-gibbo. » Nob.

Obs: Specimen missum a cl: MARTIO sub nomine *Jonidii* sine alia indicatione, atque in *Brasilia* lectum videtur optimam novam speciem constituere valde affinem *S. verbenaceæ* (*Jonidium* H. et B.), et *polygalæfoliæ* (*Jonidium* DC.). Differt autem a priori foliis glabriusculis nec utrinque pilosis, stipulis petiolum æquantibus, nec longioribus, labello

elliptico 1-gibboso, nec *subrotundo 2-gibbo*; a posteriori foliis *ellipticis concoloribus*, non *lanceolatis discoloribus*, calycibus *glabris non ciliatis*, atque labelli forma.

TRIB: III.

Sauvageæ DC.

I. SAUVAGESIA Jacq: pl: amer: p. 77. = Lam: ill: t: 140.

» *Cal:* 5-sepalus inæqualis. *Corona* ciliata inter » sepala et petala ciliis clavæformibus (*Nectaria* » SPR:). *Pet:* 10. sc: 5 exteriora sepalis alterna ma- » iora, 5 interna (*Squamula* Juss: , *stamina sterilia* » GAERTN: fil:) minora. *Antheræ* distinctæ subsessiles » lineares extus dehiscentes. *Ovarium* 1. sub-stipita- » tum, *stylo* et *stigmate* simplicibus. *Caps:* margi- » nibus valvarum involutis. »

Obs: Genus fructificationis organis prorsus singulare, hinc ad diversos ordines in methodo naturali ab Auctoribus relatum, sc: a Juss: inter plantas incertæ sedis, a GINGINS et DC. inter *Violarieas* 3. sectionis, a SPR: inter *Drosereas*; modo constans 5-7. stirpibus æquinozialibus herbaceis tenellis raro suffruticosis.

1. *S. Adyma* = Aubl: Guian: t. 100. f. A. DC. Prodri: I. 315. sub *S. erecta*. (*Caienna*, *Guyana*). Ann: Flores flavi. Communicata a cl: BALBISIO sub nomine *S. erectæ* L. perfecte quadrat cum iconे AUBLETII supra citata, quæ a DC. tamquam eius va-rietas tantum consideratur; convenit etiam cum dia-gnosti SPR: Hic tamen notandum *S. erectam* hujus

auctoris ex diagnosi ad aliam distinctissimam stirpem pertinere; refert enim flores habere *racemosos terminales*, qui in *S. Adyma* AUBL: et *S. erecta* L. sunt *axillares solitarii raro bini*. Nec planta SPR: quadrare videtur cum stirpibus racemosis a DC. in §. 2. enumeratis, sed potius cum sequenti, ad quam SPR: ipse suam plantam refert in c: p. pag. 95: = 2. *S. serpillifolia* = Mart: in litt: Habui sub hoc nomine a cl. MARTIO perfectissima specim: plantulæ, quæ videtur eadem ac *S. Sprengelii* S. HILL:, cui SPR: tribuit synonyma *S. serpillifolia* MART: et *S. erecta* SPR: non L. Nomen a MARTIO impositum præferendum censui ceu aptius ad indicandum stirpis habitum; diagnosis autem nimis brevis nec satis exacta, et forsitan ad aliam plantam referenda, mutanda ut sequitur.

» *S. caule suffruticoso ramoso glaberrimo*, foliis
 » ovato-oblongis sessilibus subserratis margine revo-
 » lutis sub-imbricatis, stipulis plumoso-ciliatis, flori-
 » bus axillaribus terminalibusque subracemosis, pe-
 » talis (rubescens) sepalis acutiusculis paullo
 » longioribus. » Nob:

Accedit ad *S. ericoideam* DC. Prodr: I. 316., sed differt caule *suffruticoso-ramoso*, nec *herbaceo-sim-
plici*, foliis *sub-serratis* non *integerrimis*, sepalis pe-
tala *subæquantibus* nec *triplo brevioribus*.

Obs: geographica circa *Violarieas*

Violarieæ ex DC. sistunt num: 181

Violarieæ pedemontanæ

Viola 18

et sic decimam circiter partem constituant.

ORDO XVII.

DROSERACEÆ

(DC. théor: 214. et Prodr: I. 317. = Genera ex Juss: partim *Capparideis* affinia, partim *incertæ sedis*.).

Char: essent:

» *Cal:* 5-sepalus vel 5-partitus. *Pet:* totidem.
 » *Stam:* petalorum numero æqualia vel dupla, tripla
 » aut quadrupla. *Styl:* 3-5. *Caps:* 1-3-locularis 3-5-
 » valvis, valvulis margine introsflexis ab apice dehi-
 » scensibus. *Sem:* biseriata, vel ad basim capsulæ
 » congesta. *Album:* cartilagineum vel carnosum. *Embr:*
 » *rectus.* »

Obs: Ordo satis naturalis plantarum habitu in-
 specto, ceterum ad diversas classes et ordines me-
 thodi sexualis pertinentium; herbæ parvulæ plerum-
 que glandulosæ foliis radicalibus vel alternis.

I. DROSERA Lin: gen: n. 391. = Lam: ill: t. 220.

» *Cal:* 5-partitus persistens. *Stam:* 5 petalis alterna
» antheris 2-locularibus loculis distantibus. *Styli* 5
» 4-partiti aut multifidi. *Caps:* 3-5-valvis, valvis pla-
» centiferis polyspermis. »

Obs: Genus sec: Juss: *Resedæ* affine, constans 32
speciebus ex DC., 28 ex SPR: *acaulibus* vel *caulescen-*
tibus stylum 2-partitum (*Rorella* DC.), vel multifidum
(*Ergalejum* DC.), omnibus folia piloso-glan-
dulosa gerentibus.

* 1. *Dr: rotundifolia* = L: sp: 402. = Spr: syst:
I. 955. = Drev: et Hayn: pl: cur: III. p. 40. t. 74. Ic:
taur: vol: 21. t. 8. sub *Rorella* (*Eur:*, *Amer:* bor:
pro var: β *distachya*. *Pedem:* in pratis spongiosis
alque ad fontium scaturigines, ad radices Alpium, ac
in montibus *Bugellensibus* ALL: n. 1601. In spongiosis
collium *Novariensium*, et ad lacum *Cusii vulgaris*
BIROLI fl: acon: I. p. 107.) Ann: Acaulis, stylis 2-fi-
dis sub-capitatis.

* 2. *Dr: longifolia* = L: sp: 403. non Hayn: =
Spr: syst: I. 955. = Engl: bot: t. 868. (*Eur:* *Amer:*
bor: pro var: γ *americana*. *Pedem:* cum priori
ALL: n. 1600. sub *Rorella*. BIROLI fl: acon: I. p. 107.).
Ann: Priori affinis, sed folia *orbiculata* nec *spathu-*
lata, petioli *glabri* non *pilosi*. Cl: RE (fl: torin: I.
p. 187.) asserit, uberrime in pratis humidis *di Valle*
della Torre invenisse *Dr: anglicam* Huds: , quæ est
Dr: longifolia HAYN: non L. , et vix differt petiolis
limbum subæquantibus; at specim: mea pèdemontana
omnia referunt petiolos longissimos, et sic ad veram

Dr: longifoliam sunt referenda: ceterum character desumptus a *scapi* longitudine variat in duabus hisce stirpibus, quæ forsan pro una tantum habendæ.

3. *Dr: indica* = L. sp: 403. (*Ind: orient:*). Cau-lescens. Styli 2-fidi sub-capitati; foliorum limbus apice circinatus petiolo glabro vix latior. Specim: optimum ex hb: BELLARDI a cl: LABILL: missum.

II. ALDROVANDA Lin: gen: 390. = Lam: ill: t. 220.

» *Styl:* 5 indivisi. *Stigmata* obtusa. *Caps:* 5-val-» vis 10-sperma. Cetera fere ut in *Drosera*. »

Obs: Genus *Droseræ* valde affine etiam sec: Juss:, qui illud refert inter plantas incertæ sedis, constans sola specie sequenti.

* 1. *A. vesiculosa* = L. sp: 402. = Spr: syst: I. 956. = Lam: l. c. (*Italiæ et Galliæ austr: aquis. Pedem:* aquis innatæ secus lacus *di Candia* et *Viverone*, in fossis profundioribus *di Viverone*, et si-gnatim loco dicto *Morigna* ALL. n. 1599. In *Sardin:* aquis stagnantibus MORIS st: sard: I. p. 6.). Perenn: Flores minimi; petala ovata sordide alba vix calyce majora.

III. PARNASSIA Lin: gen. n. 384. = Lam: ill: t. 216.

» *Cal:* 5-sepalus. *Pet:* 5 sepalis alterna. *Squamæ* » 5 unguibus petalorum oppositæ apice 3-vel multi-» setæ. *Stam:* 5. *Stigm:* 4. sessilia. *Caps:* 1-locula-» ris 4-valvis, valvis medio septiferis. »

Obs: Genus habitu *Violæ* valde accedens, inter *Capparideis* affinia a Juss: relatum, constans 6-7 stirpibus herbaceis humilibus.

* 1. *P. palustris* = L. sp: 391. = Spr: syst: I. 950. = Lam: ill: t. 216. Ic: taur: vol: 7. t. 107. f. 1. et vol. 19. t. 25. f. 7. (Eur: paludibus submontanis. In Pedem: ubique ad rivulos et fontium scaturigines atque etiam in pratis humectis locis montanis et subalpinis ALL: n. 1635. Prope Cerundam non procul a Druent, in pratis spongiosis Stupinixii, et prope S. Egidium BERTOLA sec: RE fl: torin: I. p. 182. In pratis spongiosis collium Novariensium BIROLI fl: acon: I. p. 106.). Perenn: Petala ampla; squamæ multisetæ.

Obs: geographica circa Droseraceas.

Droseraceæ ex DC.. sistunt num: 45

Droseraceæ pedemontanæ

<i>Drosera</i>	2
<i>Aldrovanda</i>	1
<i>Parnassia</i>	1
								—
								4

Et sic undecimam circiter partem constituunt.

ORDO XVIII.

POLYGALÆ

(Juss: ann: mūs: == DC. Prodr: I. 321.).

Char: essent:

» *Cal:* 5-sepalus, sépalis 2 interioribus sæpius pè-
 » taloideis, 3 exteriòribus minorib; quorum 2
 » anteriora interdum coalita. *Pet:* 3-5 libera vel basi
 » mediante tubo stamineo connata et tunc corollam
 » monopétalám irregularem æmulantia. *Stam:* basi
 » mono-apice di-adelpha. *Styl:* 1: incurvus. *Fructus*
 » capsularis vel drupaceus 1-2 locularis, valvis medio
 » septigeris. *Sem:* in loculis solitaria. *Embr:* rectus
 » in albumine carnosò axilis, rarius exalbuminosus. »

Obs: Ordo valde naturalis, habitu præsertim inspecto, ludens inter *Leguminosas* et *Fumariaceas*, constans 10-12 generibus, quorum typus (*Polygala*) male ad *Pediculares* a Juss: gen: 99 relatus, nonnulla (*Soulanea*, *Krameria*) ad incertam sedem amandata, unum (*Securidaca*) inter *Leguminosis* affinia enumeratum, cetera nova; fere omnia in systemate sexuali ad Diadelpham octandram pertinentia, excepta *Salomonia* quæ monadelpha tetandra, et *Krameria* quæ didynama angiosperma.

I. POLYGALA Lin: gen: 761. == Lam. ill: t. 598.

» *Cal:* persistens; sepala 2 interiora longe majora
 » alæformia sæpe colorata. *Pet:* 3-5 tubo stamineo

» connexa, superius vexillum, inferius carinam si-
» stentia. *Caps:* compressa. *Sem:* pubescentia. »

Obs: Genus constans 163 specieb: ex DC., inter
quas plurimæ dubiæ, 119 ex SPR:, in 2 sectio-
nes facile dividendum ex carina *cristata* vel *imberbe*.
Frutices aut herbæ.

Sect: I. Cristatæ.

(*Psychanthus*, *Polygalon*, *Blepheoridium*,
Clinelinia, *Timutua*, et *Chamæbuxus* DC.)

† Fruticosæ.

1. *P. myrtifolia* = L. am: II. p. 138. (*C. B. S.*).
Flores magni; alæ viridescentes, petala rosea. Culta
in H. Ripul: = 2. *P. virgata* = Thb: sec: Spr: syst:
III. 163. *P. speciosa* DC. Prodr: I. 323. (*C. B. S.*).
Flores maximi; alæ albo-roseæ; petala rubra. Culta
cum priori. = 3. *P. saxatilis* = Desf: fl: atl: II. p.
128. t. 175. (*Atlante*, *Hispan:*, *Gallia austr:*).
Flores parvi, petala albo-rosea. Specim: mea ex BAL-
BISIO et HUGUENIN lecta in agro *Marsiliensi* perfecte
quadrant cum iōne *FONTAINESII*. = 4. *P. supina*. =
Schreb: dec: t. 10. (*Asia min:*, *Armen:*, *Tauria*).
Flores minimi in specim: meo ex PERRET purpura-
scentes; folia subretusa non sunt, sed omnia ob-
tusa.

5. * *P. Chamæbuxus* = L. sp: 989. = Spr: syst:
III. 164. = Jacq: fl: austr: t. 233. Ic: taur: vol: 18.
t. 66. f. 2. (In montanis sylvaticis Eur: In Pedem:

frequens locis saxosis Alpium præsertim ad oras sylvarum ALL: n. 1090. Passim in sylvis circa Segusium, et in regione di Fossimagna RE fl: segus. p. 59. Copiose inter Borgosesia et Varallo BIROLI fl: acon: II. p. 24.). Flores mediocres sub-albidi, carina vix cristata.

6. *P. thesioides* = W. sp: III. 877. (*Chili, Peruvia, Brasil:*). Flores parvi, alæ albo-viridescentes petala cærulea subæquantes. Specim: ex BERTERO.

†† *Herbaceæ.*

* ? 7. *P. major* = Jacq: austr: t. 413. = Spr: syst: III. 105. (*Italia, Austria, Græcia, Orient:* sec: DC. *Liguria* orientali sec: BERTOLONIUM). Flores magni; alæ roseæ petala purpurea subæquantes; in scheda specim: missi a cl: BERTOLONIO spontanea dicitur *Liguriæ* orientalis etsi enumeratam non videam in insigni amæn: ital: eius opere.

8. *P. flavescens* = DC. cat: h. monsp: p. 134. (*Agro Romano*). Pumila, floribus parvis flavescen-tibus.

* 9. *P. vulgaris* = L. sp. 986. = Spr: syst: III. 166. = Oed: fl: dan: t. 516. Ic: taur: vol: 5. t. 119. 122. Vern: *Brouttairole rousse* (Eur: omni. Abunde in *Pedem:* pratis non pinguibus et montanis ALL: n. 1088. RE fl: segus: p. 59. et fl: torin: II. p. 4. BIROLI fl: acon: II: p. 24. In pascuis montanis, sylvisque *Sardin:* vulgatissima MORIS st: sard: I. p. 7. *Genuæ* in collibus supra *Oreggina* BERTOL: am: ital: p. 169.). Perenn: Flores mediocres, colore varii;

alæ ovatæ obtusæ corolla vix longiores. Huc pertinet sec: DC. Prodr: I. 325. *P. monspeliaca* ALL: n. 1089. non L. ceu existimavit cl: ALLIONIUS ipse , sed male appellata a DC. *grandiflora* , nam in specim: meis ex MOLINERIO Nicææ lectis flores sunt minores quam in nostra *vulgari*, immo tota planta humilior ; an potius *P. monspeliaca* VILL: dauph: III. p. 388. quæ folia habet angustiora ? *P. cæspitosa* PERS: ad *vulgarum* quoque pertinere arbitror sec: STEV: Specim: ex PERRET non differt nisi caulis humilioribus, et valde cæspitosis.

10. *P. monspeliaca* = L. sp: 987. non All: (*Gallicia* austr: in sterilibus circuitis maris *Mediterr*: In *Sardin*: collibus aridis MORIS st: sard. I. p. 6.). Priori affinis , sed differt præsertim radice *annua* , et alis oblongis striatis corolla sesquilonioribus, quod constanter observavi in omnibus specim: a MORISIO communicatis ex *Sardinia* = 11. *P. austriaca* = Crantz aust: t. 2. f. 4. *P. amara* var: a DC. Prodr: I. 325. (*Germania* , *Gallia* med: , *Volynia*). Flores parvi , alæ corollam subæquantes.

* 12. *P. amara* = L. sp: 987. = Spr: syst: III. 166. = Jacq: fl: austr: t. 412. (*Svecia* , *German*: med: , *Ital*: bor: *Pedem*: in valle *Ulcensi* , alpibus *di Fenestrelle* et *Exilles* ; in sterilibus alp: *Cottiarum* non tamen summarum non infrequens ALL: n. 1087. In monte *Cenisio* RE fl: segus: p. 59. In pascuis *di Scopello* , *Rima* , *Scopa* et *Allagna* sæpe observavit BIROLI fl: acon: II. p. 24.). Priori valde affinis , sed alæ corolla *longiores* , *latioresque* , folia superiora *latiora*.

13. *P. tenuifolia* = W: sp: III. 879. (*Sibiria*). Flores parvi; alæ oblongæ acutæ disco virides margine albidae petalis roseis breviores. Specimen optimum ex FISCHERIO in *Dahuria* lectum. = 14. *P. exilis* = DC. cat: h. monsp: p. 133. (*Gallia austr:*, *Hispania*). Ann: Nana, ramosissima; flores medios, alæ corolla latiores. Huc pertinet sec: SPR: *P. parviflora* LOISL: a DC. omissa; at specim: mea ex PERRET humiliora sunt, et flores gerunt dimidio minores alis *sub-orbiculatis* nec *oblongis* ut in *P. exili*. An igitur species distincta?

Sect: II. Imberbes.

(*Senega* et *Brachytropis* DC.).

15. *P. sanguinea* = L. sp: 991. (*Amer: bor:*). Ann: Pumila; flores minimi spicati rubescentes.

II. MURALTIA Neck: elem: n. 1382. = *Polygalæ* sp: L.

» *Cal:* 5-sepalus glumaceus sub-aqualis. *Pet:* 3.
» coalita, medio 2-lobo. *Capsula* 4-cornuta vel 4-
» tuberculata. Cetera ut in *Polygala*. »

Obs: Genus constans 37 speciebus ex DC., quorum multæ dubiæ, 19 ex SPR: omnibus *Africæ* australis incolis ac suffruticosis, habitum *Polygalæ* referentibus.

1. *M. alopecuroides* = DC. Prodr: I. 335. (*Afr: austr:* (*C. B. S.*)). Specimen optimum ex hb: BEL-LARDI a VAHL communicatum. = 2. *M. mixta* = DC. Prodr: I. 336. (*Cum priori*). Culta in H. Ripul:

Obs: geographica circa Polygaleas.

<i>Polygaleæ</i> ex DC. sistunt numero	115
<i>Polygaleæ pedemontanæ</i>	
<i>Polygala</i>	4
Et sic vigesimam nonam partem circiter constituunt.	

ORDO XIX.

TREMANDRÆ

(R. Brown: gen: rem: p. 12. = DC. Prodr: I. 343.)

Char: essentialis.

» *Cal: 4-5-sepalus inæqualis basi sub-coalitus de-*
 » *ciduus. Pet: totidem æqualia. Stam: petalorum nu-*
 » *mero dupla iisque opposita, antheris 2-4-locula-*
 » *ribus. Styl: 1. Caps: 2-locularis 2-valvis, valvis*
 » *medio septiferis. Sem: appendiculata. Embr: rectus*
 » *axilis in album: carnosæ. »*

Obs: Ordo parum naturalis hactenus 2 tantum
generibus constans sc: Tetratheca et Tremandra
quorum prius octandrum, alterum decandrum, sta-
minibus liberis; hinc ludentia inter Polygaleas et
Ericaceas quibus habitu magis accedunt. Fruticuli ex
N. Holl:

I. TETRATHECA Smith N. Holl: I. t. 2.

» *Cal: 5-sepalus. Antheræ 4-loculares.* »

Obs: Species 5 a SMITH et LABILL: detectæ.

1. *T. pilosa* = Labill: n. holl: I. p. 95. (*Terra Diemen*). Fruticulus totus piloso-glandulosus, ramis virgatis, floribus parvis axillaribus solitariis uti in ceteris congeneribus. Specim: optima ex hb: BELLARDI a cl: LABILL: missa. = 2. *T. glandulosa* = Labill: l. c. t. 123. non SMITH (*Terra-Diemen*). Priori valde affinis, sed differt foliis omnibus ovato-oblongis dentatis, linearibus nullis, calycibus ovato-lanceolatis, nec subor-biculatis, floribus paullo maioribus. *T. glandulosa* SMITH pertinet ad *pilosam*. Specim: ut supra.

Obs: geographica circa Tremandreas.

<i>Tremandreae</i> ex DC. sistunt numero	7
Pedemontanæ	0

ORDO XX.

PITTOPOREÆ

(R. Brown: gen: rem: terr: aust: p. 10. =
DC. Prodr: I. 345.).

Char: essentialis.

» *Cal:* 5-sepalus ad medium quandoque sub-coali-
» tus. *Pet:* totidem unguibus conniventibus vel coa-
» litis. *Stam:* totidem petala alternantia. *Ovar:* libe-
» rum placentis 2-5. *Styl:* 1. *Stigm:* tot quot placen-
» tæ. *Capsula* vel *bacca* loculis polyspermis quando-
» que abortivis. *Sem:* saepius pulpa glutinosa obdu-
» cta. *Embr:* minimus in *albumine* carnosus.

Obs: Ordo satis naturalis, excepto *Senaciæ* gene-
re, quod potius ad *Rhamneas* accedit, constans ar-
busculis africanis, asiaticis, plerisque australasicis,
foliis simplicibus sempervirentibus, floribus termina-
libus axillaribusve raro polygamis.

I. BILLARDIERA Smith exot: bot: t. I. non Vahl, nec
Moench:

» *Sepala* acuminata colorata decidua. *Pet:* ungui-
» bus approximatis. *Stigm:* 2-lobum. *Bacca* ellypsoi-
» dea stylo apiculata. *Sem:* pulpa glutinosa obdu-
» cta. »

Obs: Genus modo constans 8 stirpibus saepius scan-
dentibus omnibus australasicis fructus edules gerentibus.

1. *B. scandens* = Smith exot: bot: t. 1. (*N. Holland:*). Scandens, villosa, exceptis ramis adultis, floribus solitariis ochroleucis. Culta in H. Ripul: = 2. *B. fusiformis* = Labill: n. holl: t. 90. (*Insul: Van Diemen*). Vix scandens, subvillosa, floribus paniculatis. In specim: ceterum perfectis ex hb: BELLARDI a cl: BILLARDIERO missis, color floris non appetet.

II. PITTOSPORUM Bauks: in Gaertn: fr: I. p. 286. t. 59.
= Lam: ill: t. 143.

» *Sepala* non colorata. *Pet:* unguibus in tubum conniventibus. *Caps:* 2-3-valvis mucronata. *Sem:* pulpa resinosa obducta. » .

Obs: Genus constans 15 speciebus ex DC., quarum multæ valde dubiæ, 7 tantum ex SPR:, omnibus fruticosis exoticis folia integra plus minusve coriacea, ac flores umbellatos vel aggregatos raro solitarios sæpe suaveolentes gerentibus.

1. *P. coriaceum* = Ait: h. Kew: ed: 1. vol: 3. p. 488. (*Madera*). Pedunculi umbellati terminales, non pauciflori axillares ut in diagn: SPR:, flores noctu præsertim suaveolentes albi. Cult: in H. Ripul: ubi sub diu non periiit hyeme 1833. = 2. *P. Tobira* = Ait: h. Kew: ed. 2. vol: 2. p. 27. (*China, Japonia*). Priori valde affine, sed differt calycibus acumminatis glabriusculis; in specim: meo ex SPINIO folia sunt inferne sub-ferruginea. = 3. *P. undulatum* = Andr: bot: rep: t. 393. (*N. Holl:*). Flores albi suaveolentes; petala longiora quam in præcedentibus. Cult: in H: Ripul: = 4. *P. revolutum* = Ait: h: Kew: ed: 2. vol. 2.p. 27. (*N. Holl:*). Unicum posseideo specimen

ex hb: BIROLI s: fl: in quo folia adparent marginē *plana* nec *revoluta*, subtus ramique ferrugineo-tomentosi.

Pittospora dubia.

» 5. *P. Billardieri* = Foliis sparsis sub-fasciculatis lanceolatis utrinque acutis coriaceis superne nitidis subtus ferrugineo-tomentosis marginē revolutis, pedunculis solitariis unifloris, capsula sub-carnosa glabra. » Nob:

Obs: Specim: ex hb: BELLARDI missum a cl: BILARDIERIO cum scheda ita inscripta = *Pittosporum ... e capite Van-Diemen.* = Species optima a ceteris distincta præsertim dispositione, et figura foliorum, quæ in nostra prorsus *lanceolata*; in aliis plus minusve *ovata*; accedit ad *P. philliræoideum* DC. Prodr: I. 347: , eeterum dubium, sed differt foliis *revolutis* subtus ferrugineis, nec *planis* *glaberrimis*.

III. BURSARIA Cav: ic: IV. t. 350.

» *Cal:* 5-dentatus. *Pet:* basi distincta. *Caps:* ex coecis 2-coniatis compressa obcordata 2-loocularis polyspermia. *Sem:* resinosa. »

Obs: Genus *Pittosporo*-proximum, sed calyce monophyllo petalorum unguibitis liberis, et forma fructus ritè distinctum; constans hactenus sola specie sequenti.

1. *B: spinosa* = Cav: l. c. (N. Holl:). Arbor ramis spinosis (vel inermibus ex DG. Prodr: I. 347), foliis sparsis sub-confertis sub-emarginatis crenulatis

(non *integerrimis* uti in obs: DC. l. c.), racemis terminalibus; flores parvi ex sicco luteoli (albi DC.). Specimen perfectum ex hb: BELLARDI a BILLARDIERIO missum.

Obs: geographica circa *Pittosporeas*.

<i>Pittosporeæ</i> ex DC. sistunt num:	.	.	28
<i>Pittosporeæ</i> pedemontanæ	.	.	0

ORDO XXI.

FRANKENIACEÆ

(S. Hill: mem: plac: cent: n. 39. = DC. Prodr:
I. 349.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 5-sepalus basi coalitus æqualis persistens.
» *Pet:* 5 sessilia alterna unguiculata libera fauce squa-
» mulis sub-coronata. *Stam:* petalorum numero æquali
» vel duplo uno quandoque adsito. *Ovar:* liberum.
» *Style* 1-2-3-fidus. *Caps:* calyce persistente stipata
» 1-locularis 1-4-valvis, valvulis ad marginem pla-
» centiferis polyspermis. *Sem:* minuta. *Embr:* rectus
» in medio albuminis. »

Obs: Ordo *Caryophylleis* affinis 2 tantum ge-

neribus constans, *Frankenia* sc: et *Luxemburgia* (*Beatronia* enim ad *Frankeniam* amandanda).

I. FRANKENIA Lin: gen: n. 445. = Lam: ill: t. 262.

» *Stam:* 6, quorum 5 petalis alterna, 1 oppositum. *Stigm:* oblongum 3-fidum. *Caps:* 3-4-valvis. »

Obs: Genus constans speciebus 17 circiter, inclusa *Beatsonia*: herbæ vel suffrutices humiles ericoidei.

1. *Fr: laevis* = L. sp: 473. (Litorib: maris *Mediterr:* Ad vias in *Sardin:* maritimis MORIS st: sard. I. p. 7.). Suffrutex. = 2. *Fr: thymifolia* = Desf: fl: atl: I. 316. (*Barbariae desertis*, *Hispania* circa *Aranjuez.*). Suffrutex. = 3. *Fr: hirsuta* = W. sp: II. 242. (*Afr: bor:*, *Ægypt:*, *Calabria*. In maritimis *Cagliari* MORIS st: sard: I. p. 7. sub *Fr: intermedia*). Suffrutex.

* 4. *Fr: pulverulenta* = L. sp: 474. = Spr: syst: II. 134. = Lam: ill: t. 262. f. 3. Ic: taur: vol: 16. t. 103. (In arenosis maritimis *Eur:*, *Afr: bor:* In agris *Nicœensibus* arenosis ALL: n. 1609. *Genuæ inter saxa al Molo vecchio* BERTOL: am: ital: p. 146. In *Sardin:* maritimis MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann: 5. *Fr: corymbosa* = Desf: atl: I. p. 315. (*Barbariae maritimis, ins: Canariis*). Suffrutex. Accepta sub nomine *Fr: fruticosæ* perfecte quadrat cum descript: et ic: DESF: l. c. t. 93.

Obs: geographica circa Frankeniaceas.

Frankeniaceæ ex DC. sistunt num: 19

Frankeniaceæ pedemontanæ 1

ORDO XXII.

CARYOPHYLLEÆ

(Juss: gen: 299. = DC. Prodr: I. 351. =
J. S. Hill: II. p. 109. t. 91. 92.).

Char: essentialis.

» *Cal:* 4-5-sepalus sepalis liberis vel in tubum 4-
» 5-dentatum coalitis , quandoque basi squamis ca-
» lyculatus. *Pet:* tot quot sepala iisque alterna toro
» (*anthophorum*) inserta , unguiculata , ad faucem
» interdum squamulis petaloideis aucta. *Stam:* peta-
» lorum numero æqualia vel saepius dupla et tunc 5
» opposita basi petalorum coalita. *Styl:* 2-3-5. *Caps:*
» 1-2-3-5- locularis apice dentibus dehiscens , raro
» fructus baccatus indehiscens. *Sem:* saepius plurima
» secus placentam centralem seriatim disposita. *Album:*
» farinosum. *Embr:* periphæricus incurvus , rarissime
» rectus centralis. »

Obs: Ordo naturalissimus habitu præsertim inspe-
cto , etsi plurima comprehendens genera in syst: se-
xuali ad diversas classes pertinentia ; observandum
enim calycem semper esse 4-5-phylum , vel 4-5-
dentatum , petala numero æquali ; stamina autem ,
paucissimis casibus exceptis , forsitan per abortum ,
esse quoque constanter numero æquali vel duplo ;
ceteri præcipui characteres tum fructificationis , cum
herbæ conueniunt. Caules in singulis stirpibus nodosi

folia semper opposita integra, flores terminales. Divisio a JUSSIEU statuta in septem sectiones ex staminum et stylorum numero nimis systematica; simplicior et magis naturalis videtur illa a DC. excerpta ex sola calycis forma qui vel gamosepalus 4-5-dentatus (in *Sileneis*), vel distincte 4-5-sepalus (in *Alsineis*).

TRIB: I. (*Sileneæ*.)

1. GYPSOPHILA Lin: gen: n. 678. = Lam: ill: t. 375.

» *Cal:* campanulatus angulatus 5-fidus interdum
» basi 2-4 squamis instructus. *Pet:* 5 vix unguicu-
» lata. *Stam:* 10. *Styli* 2. *Caps:* 1-locularis 5-val-
» vis. »

- *Obs:* Genus constans 36 speciebus ex DC., 32 ex SPR: melius in 2. sectiones dividendum ex squamarum calycinarum defectu vel præsentia sec: DC: quam ex inflorescentia sec: SPR: Herbæ perennes vel annuae in *G. Struthio* basi fruticosæ, floribus plerumque paniculatis parvis hermaphroditis, in sola *G. paniculata* dioicis; paniculæ structura et florum magnitudo optimos præbent characteres specificos, qui plerumque omissi a SPR:

† Calyx squamis destitutus (*Struthium* SER:, DC.).

1. *G. Struthium* = L. sp: 582. (*Hispan:*, *Tauria*). Perenn: basi frutescens. Flores in paniculæ ramis confertim sub-umbellati mediocres. = 2. *G. fastigiata*

= L. amæn: III. p. 23. (*Gallia, Helvet: , German: med: , Borussia, Suecia*). Perenn: Flores corymbosi parvi, foliis obsolete triquetris vel planis in *G. arenaria* Kit: , quæ nonnisi varietas sec: SPR: ; admittitur tamen a DC. Prodr: II. 352. Specim: mea ex hb: BIROLI non differunt. = 3. *G. viscosa* = Murr: in comm: gott: 1783. p. 9. (*Asia minori*). Ann: Flores parvi in corymbum laxum. = 4. *G. altissima* = L. sp: 582. non Bieb: (*Sibiria*). Perenn: Flores numerosissimi minimi in paniculam maximam. = 5. *G. perfoliata* = L. sp: 583. (*Oriente, Hispan:*). Perenn: Flores minimi in paniculam magnam laxam; folia in specim: meo punctata. = 6. *G. acutifolia* = Fisch: cat: h. gor: 1812. p. 59. (*Caucaso*). Perenn: Flores parvi in paniculam trichotomam paucifloram; calyx in specim: meo ex hb: BIROLI 5-partitus laci-niis lanceolato-linearibus. = 7. *G. paniculata* = L. amæn: III. p. 23. (*Sicil: , Sibir:*). Perenn: Flores numerosissimi minimi in paniculam maximam: vix differt a *G. altissima* n. 4. floribus dioicis, et paullo maioribus. Cl: SPR: asserit ramos paniculæ esse 1-floros, quod silet DC., nec occurrit in specimin: meis, immo rami sub - corymbosi, ramuli 3-4-flori. = 8. *G. adscendens* = Jacq: h. vindeb: 2. t. 138. (*Oriente*). Perenn: Flores parvi in paniculam paucifloram. = 9. *G. glauca* = Stev: in litt: sec: DC. Prodr: I. 353. n. 17. (*Caucaso, Armenia, Asia min:*). Perenn: Flores mediocres in paniculam laxam vix ramosam, ramis paucifloris. Ex hb: BIROLI habeo sub nomine *G. Steveni* Fisch: quam *G. glauca* tradit synonymam cl: SPR: , etsi a DC. distincta;

observeo tamen in nostra folia esse graminea acuta, nec sub-carnosa obtusa, uti in diagn: Auctorum de *G. glauca*; an igitur species FISCH: et SCHRANK diversa a *G. glauca*? Adde cl: FISCHERIUM neutram enumerasse inter plantas caucasicas in recentissima scriptura, cui titulus *Enum: plant: in mont: caucasicis etc.* S. Petersb: 1831. = 10. *G. elegans* = Bieb: fl: taur: I. p. 319. (*Caucaso*): Ann: Flores mediocres in paniculam ramosissimam, rami 2-3-chotomi. = 11. *G. Rokeika* = Delil: fl: eg: 87. t. 29. f. 1. (*Ægypt:*). Ann: ? Erecta, ramosissima, divaricata; pedunculi capillares 1-flori, flores majusculi lineato-picti.

* 12. *G. repens* = L. amæn: III. p. 33. sp: 581. = Spr. syst: II. 372. = Lam: ill: 375. Ic: taur: vol: 3. t. 48. et vol: 13. t. 5. 6. sub *G. prostrata* (*Eur: med: et austr:*, *Sibir:* In *Pedem:* ubique ad semitas saxosas nostrarum *Alpium*; etiam circa *Taurinum* in sabulosis *Sturæ* ob viam venit semine ex *Alpibus* allato; in *M. Cenisio* multa est ALL: n. 1561. Secus *Duriam* prope *Lucengo*, alibique RE fl: torin: I. p. 229. Ad montem *Rosa*, ad rupes vallis *Sessitidis* supra *Scopa* BIROLI sub *G. prostrata* fl: acon: I. p. 142. 143.). Perenn: Flores mediocres in paniculam pauci-ramosam apice 3-chotomam. Possideo plura specim:, alia lecta in *M. Blanc* a BEETERO, alia passim in *Alpibus* sub nomine *G. prostratæ* ALL:, alia demum communicata a cl: BERTOLONIO sub nomine *G. repentis*; omnia conveniunt inter se, et cum ico-nib: supra citatis. Vera *G. prostrata* L. pistillos ha-bet petalis longiores, in *repenti* genitalia omnia in-

serta; illa crescit in *Asia* min: sec: SPR: ; hinc censeo errore ductum fuisse cl: BIROLIUM dum hanc speciem quoque inter indigenas enumeravit; nostra communis est in *Alpibus*. Ceterum hæ duæ stirpes sunt valde affines.

* 12. *G. muralis* = L. amoen: III. p. 24. sp: 583. = Spr: syst: II. 373. = Lam: ill: t. 375. f. 1, (Eur: fere tota. Pedem: secus arva, ad vias, inter stipulas autumno tempore in agro *Canapiciensi* et *Taurinensi* occurrit ALL: n. 1562. RE fl: segus: p. 36. et fl: torin: p. 229. In agri *Novariensis* cereali- bus locis argillosis BIROLI fl: acon: I. p. 143.). Ann: Flores parvi in axillis paniculæ laxæ ramosæ foliosæ sub-solitarii.

†† *Calyx squamosus* (*Petrorrhagia* SER:, DC.).

* 13. *G. Saxifraga* = L. sp: 584. = Spr: syst: II. 373. = Barr: ic: t. 998. Ic: taur: vol: 3. t. 24. sub *Diantho* (Eur: med: et aust: In Pedem: pascuis saxosis ubique ALL: n. 1554. sub *Diantho*; BALE:, RE, BIROLI sub *Gypsophila*; in Sardin: saxosis aridis MORIS st: sard: I. p. 7.). Perenn: Flores parvi in paniculam elongatam laxam terminales; squamæ calycinæ 4.; folia capillaria in var: β *capillacea*. Huc pertinet sec: DC. Prodr: I. 354. *G. rigida* L., quæ ad *repentem* refertur a SPR:, quamque non possideo.

Gypsophilæ dubiæ.

14. *G. scabra* = Schult: sec: Steud: Habui plan- tam hanc ex hb: BIROLI sub allato nomine, quod

enumeratum non vidi nisi a STEUDELIO cum sola indicatione auctoris; a *G. Saxifraga* mihi non videtur differre, nisi caule foliisque scabriusculis; an var: *γ hispidula* a DC. relata sub *G. Saxifraga*?

II. DIANTHUS Lin: gen: n. 770. = Lam: ill: t. 376.
Cons: Koch: observat: in *Bull: univ: 1831. Mars*
p. 337.

» *Cal:* tubulosus 5-dentatus basi squamis 2-4 raro
» pluribus cruciatim imbricatis, quandoque foliis in-
» volucralibus (*bracteæ* DC.) cinctus. *Pet:* 5. longe
» unguiculata apice secta. *Stam:* 10. *Styl:* 2. *Caps:*
» 1-locularis.

Obs: Pulcherrimum genus constans 113 speciebus ex DC., 77 ex SPR: qui plurimas vel omittit, vel tamquam solas varietates considerat, ab Auctoribus divisum ex inflorescentia et petalorum lamina plus minusve secta, sed stirpium determinatio intricata; unde recte cl: BERTOLONIUS clamabat: » quidnam inter Floræ delicias jucundius et familiarius *Rosa* et *Diantho*? At quid *Diantho* et *Rosa* difficilius in speciebus dirimendis? (BERTOL: am: ital: p. 364.). Sufrutices, aut herbæ, quarum nonnullæ multimode variantes magnitudine, plenitudine, et colore petalorum:

† *Floribus aggregatis.*

1. *D. arboreus* = L. sp: 590. (Creta). Frutescens. Facile confunditur cum *D. fruticoso* a quo tamen distinguitur præsertim unguibus petalorum calycem superantibus, ac foliis subulatis, nec lanceolatis

obtusis. Cult: in H. Ripul:; petala ex albo rubescen-
tia. = 2. *D. rupicola* = Bivon: Bern: cent: I. p. 31.
t. 1. *D. Bisignani* Tenor: fl: nap: I. p. 228. t. 37.
(*Calabr:*, *Lucan:* TENOR: ; *Sicilia* in rupium calca-
rearum fissuris Guß: Prodr: fl. sic: p. 494.). Frute-
scens: Flores 8-10 fasciculati sub-sessiles; petala ex
sicco rubescentia.

* 3. *D. collinus* = Waldst et Kit: pl: rar: I. p.
36. = Spr: syst: II. 375. = Waldst et Kit: l. c. t.
38. (*Eur:* austr: *Liguria* inter *Savona* et *Arbissola*
locis rupestribus BALBIS: misc: bot: p. 21.). Perenn:
Huc referuntur a cl: SPR: *D. scaber* SCHLEICH, *D. asper*
W., *D. umbellatus* DC., *D. patens* HORN:, et *D. dis-
color* SIMS quos omnes possideo: in ipsis sequentes
differentias observavi.

D. scaber SCHLEICH idem ac *D. asper* W. en: 466.
differt a *D. collino* floribus non reapse *fasciculatis*,
sed potius *laxe paniculatis*, squamis calycinis duplo
brevioribus, foliis *linearis-acutis*, nec *lanceolatis*.

D. umbellatus DC. fl: fr: est verus *D. collinus*,
quem cl: Auctor in Prodr: l. c. refert ad var: β *D.
asperi*: flores sunt reapse *fasciculati* sub-sessiles, squa-
mæ calycinæ tubum *subæquantes* acutissimæ fere *cu-
spidatæ*, folia prorsus *lanceolata*.

D. patens HORN: quem habeo ex hb: BIROLI, magis
accedit ad *D. collinum*, sed flores non prorsus *fa-
sciculati* sub-sessiles, sed potius *corymbosi* et *pedun-
culati*, squamæ calycinæ etiam *breviores*, folia *an-
gustiora*, ita ut medium teneat inter *D. collinum* et
D. scabrum.

D. discolor SIMS in H. B. T. cultus, ex quo spe-

cim: mea, ab omnibus supra enumeratis differt caule paucifloro, squamis calycinis tubo quadruplo brevioribus ovatis acuminatis, foliis linearibus strictis scabriusculis margine sub-revolutis.

An igitur species istæ a *D. collino* sejungendæ, excepto *D. umbellato*? Tunc phrases ita propono:

» *D. collinus* = Kit: floribus fasciculatis sub-sessilibus, calycis squamis ovato-lanceolatis cuspidatis » tubum subæquantibus, foliis lanceolatis acutis sub- » 5-nerviis cauleque sub-tetragono scabriusculis = » Nob: » *D. asper* var: β *collinus* DC. l. c.

» 4. *D. patens* = HORNM: floribus sub-corymbosis » pedunculatis, calycis squamis lanceolato-linearibus » acutis tubo paullo brevioribus, foliis lanceolato- » linearibus acutis 3-nerviis cauleque teretiuseculo » scabris. » Nob:

» 5. *D. asper* = W. floribus laxe paniculatis, ramis dichotomis, calycis squamis ovato-lanceolatis » acuminatis tubo duplo brevioribus, foliis linearie- » lanceolatis acutissimis sub-3-nerviis cauleque tereti » scabris. » Nob: *D. scaber* SCHLEICH non THB:, *D. asper* var: α *angustifolia* DC. Prodr: I. 357.

» 6. *D. discolor* = Sims caule paucifloro, calycis squamis ovatis acuminatis tubo quadruplo brevioribus, foliis linearibus strictis 1-nerviis margine sub-revolutis cauleque tereti glabris. » Nob:

* 7. *D. Armeria* = L. sp. 586. = Spr: syst: II. 375. = Oed: fl: dan: I. 230. Ic: taur: vol. 14. t. 7. f. 1. (Eur: med: *Pedem*: vulgatissimus in argillaceo-sabulosis sterilibusque torrentium stipis All: n.

1546. RE fl: segus: p. 36. Abunde in agro Novariensi ad vias collium et secus Padum BIROLI fl: acon: I. p. 145. In sylvis della Mandria sed rarus RE fl: torin: I. p. 232. In Sardin: sterilibus montanis Arizzo MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann: Flores sessiles; bracteæ lanceolatæ acutæ tubi calycini striati villosi longitudine.

8. *D. Pseudarmeria* = Bieb: fl: taur: I. p. 323. (*Tauria*). Perenn: Flores sub-sessiles; bracteæ subulatæ tubum calycinum striatum villosum superantes.

* 9. *D. barbatus* = L. sp: 586. = Spr: syst: II. 376. = Ic: taur: vol: 14. t. 5. et 6. (*German:*, *Gallia* austr: *Pedem:* in valle *Fenestrellarum* ALL: n. 1543.). Perenn: Flores sub-sessiles, bracteæ lanceolatæ calycem glabrum superantes; colitur in hortis ornamenti gratia; variat colore florum ex albo ad rubrum.

10. *D. chinensis* = L. sp: 588. (*China*). Ann: Flores potius paniculati, vix aggregati, pedunculati, variantes colore et plenitudine. Colitur in hortis ubique. Hunc hortulanii nostri *Mignardise* appellant, non *D. plumarium* uti de Hortulanis gallicis asserit DC. Prodri: I. 363. n. 97. = 11. *D. Fischerii* = Spr: cat: sem: h: hal: 1810. (*Russia* austr:). Perenn: Flores vix aggregati sc: 1-3-axillares et terminales, bracteæ lineares tubo calycis striato glabro apice colorato breviorés; cl: SPR: addit folia esse serrulata. Possideo specim: spontanea ex FISCHERIO, aliaque e plantis cultis in H. Ripul: enatisque a seminibus missis ab eodem; in omnibus folia sunt integerrima, in plantis cultis fere duplo angustiora.

* 12. *D. Carthusianorum* = L. sp: 586. = Spr: syst: II. 376. = Seg: veron: I. 434. t. 8. f. 2. Ic: taur: vol. 9. t. 67. et vol: 20. t. 21. (*Europ: In Pedem:* pascuis collium siccorum et in montibus sæpe obviam venit ALL: n. 1544. Prope *Segusium* in ru-
pibus *delle Blaccie* RE fl: segus: p. 36. Frequens in
sylvis *della Mandria* BALBIS:, RE fl: torin: I. p. 231.
In collinis *Novariensis* frequens BIROLI fl: acon: I.
p. 144.). Perenn: Flores sub-aggregati pedunculati:
involucrum aristatum capitulo brevius; folia 3-nervia.
Huc pertinet sec: STEUD: *D. Seguieri* queni cl: BEL-
LARDI non infrequentem dixit in ericetis *Ciliani*,
Moncrivelli, locisque sylvaticis agri *Canapiciensis*
(BELL: app: p. 22.).

* 13. *D. Allionii* = Nob: *D. atrorubens* All: n.
1545. non M. B. = W. sp: II. 672. = Seg: veron:
I. 434. t. 7. f. 2. (*Ital: Pedem:* locis aridis collinis
ad vias sylvarum ALL: l. c. RE fl: segus: p. 37. In
sylvis *di Campagnola* prope *Alpinianum*; ad oras
sylvarum *della Mandria* RE fl: torin: I. p. 281. In
Ticini ericetis BIROLI fl: acon: I. p. 144.). Perenn:
Priori valde affinis, cuius varietas tantum habetur
a DC. Prodr: I. 357. et SPR: syst: II. 376; sed dif-
fert præsertim floribus *dense capitatis sessilibus*, foliis
enerviis, aliisque levioribus notis. Cons: ALL: et W.
ll. cc. Nomen specificum mutavi ne confundatur cum
sequenti.

14. *D. atrorubens* = M. B. fl: taur: I. p. 324. non
All:, Fisch: en: pl: caucas: p. 215. excl: syn: All:
(*Tauria, Caucaso*). Perenn: Habitu priori affinis,
a quo differt statura in omnibus partibus valde *maiori*

involucro capitulum æquante, foliis 3-nerviis striatis patentibus, internodiis longioribus. Specim: mea exhib: BIROLI veniunt nomine *D. corymbosi* H. Paris: , quem non possideo, sed manu BALBISII scriptum in scheda » *D. capitatus DC.* idem ac *atrorubens M: B.* », cum quo perfecte quadrant. = 15. *D. polymorphus* = M. B. fl: taur: I. p. 324. (*Hungar:*, *Transylv:*, *Russia austr:*). Perenn: Flores in capitulum sessiles; calyx glaber vix striatus. Cult: in H. B. T.

* 16. *D. prolifer* = L. sp: 587. = Spr: syst: II. 376.= Oed: fl: dan: t. 221. (*Eur:*, *Asia med:* *Pedem:* frequens in saxosis declivibus, et pascuis siccis All: n. 1547. Re, BIROLI etc: In collibus montibusque *Sardin:* *Moris* st: *sard:* I. p. 7.). Ann:

17. *D. velutinus* = Guss: pl: rar: p. 166. t. 32. (*Regn: Neapolit:*). Ann: Priori affinis, sed differt caule *simplicissimo*, squamis calycinis exterioribus 2-mucronatis non muticis, floribus inter bracteas *peduncalatis*, seminibus *tuberculatis* non *lævibus*, florandi tempore *præcociore*. Specim: ex GUSSONE in collibus *Calabriæ* lecta.

†† *Floribus sparsis.*

α Petalis dentatis crenatis.

18. *D. Poiretianus* = DC. Prodr: I. 360. ex Ser: (*Patria?*). Planta elegantissima valde sequenti affinis, cuius forsitan varietas a SPR: omissa. Cultus sub nomine *D. corymbosi* in H. Paris: , ex quo selecta possideo specim: Nomen a cl: SERINGIO recte muta-

tum ne confundatur cum *D. corymboso* Sm: toto cœlo diverso.

* 19. *D. Caryophyllus* = L. sp: 587. = Spr: syst: II. 376. = Engl: bot: t. 214. Ic: taur: vol. 8. t. 16. f. 3. 4. Vern: Garofo (*Gallia* merid:, *Anglia*, *Italia*. Pedem: in sterilibus montanis ad oras sylvarum non rarus, frequentior in montibus *Alp*: *Cottiarum* All: n. 1548. In rupibus *della Brunetta* Re fl: segus: p. 36. In montanis provinc: *Novar*: BIROLI fl: acon: I. p. 145. In *Sardin*: pascuis collinis et montanis Moris st: sard: I. p. 7.). Perenn: Ex hoc innumeræ varr: hortenses. Planta admodum dubia pro *Pedemontio*. Cl: BALBISIUS putat *D. Caryophyllum* ab All: enumeratum spectare cum *D. virginico* ad *D. sylvestrem* VULFF: Cl: Re addidit in fl: Tor: I. p. 233. *D. Caryophyllum* forsitan deesse in *Pedem*: Demum DC. Prodr: I. 359. dubitavit *D. sylvestrem* esse typum *D. Caryophylli*. Specim: mea spontanea sub utroque nomine satis non differunt ut quid certi asseri possit, et magis ad *sylvestrem* quam ad *Caryophyllum* accedunt juxta descriptiones Auctorum.

* 20. *D. longiflorus* = Lam: dict: IV. p. 522. = Spr: syst: II. 377. = Brot: fl: lusit: II. p. 173. t. 73. sub *D. lusitanico* (*Gall*: austr:, Orient:, Hispan:, Lusitan: Pedem: in monte *Pessimalta* vulgo *Bessimauda* supra *Bovisium* locis sterilibus BELLARDI app: p. 22. sub *D. hirto* VILL:). Perenn: basi suffruticosus. Flores sub-solitarii; calycis squamæ sub-senæ.

* 21. *D. deltoides* = L. sp: 588. = Spr: syst: II. 377. = Dill: elth: 400. t. 298. f. 384. Ic: taur: vol. 22. t. 10. sub *D. glauco* (*Eur*: , *Japon*: In *Pedem*:

pratis *Montisregalis*, et in pascuis apricis et alpestribus *di Tenda* et *Madonna delle Finestre* ALL: n. 1550. et auctar: p. 28. sub *D. deltoideo* et *D. glauco*. In agro *Albensi* invenit BERTERUS). Perenn: Flores sub-solitarii; calycis squamæ sub-binæ. *D. glaucus* L. et ALL: est mera varietas.

22. *D. rigidus* = M. B. fl: taur: I. p. 325. (*Tauria ad Volgam*). Perenn: basi suffruticosus. Flores sub-solitarii; calycis squamæ brevissimæ: = 23. *D. campestris* = M. B. fl: taur: I. p. 326. (*Podolia, Tauria*). Perenn: Flores non semper solitarii in ramis paniculæ, sed saepius bini. Specim: optimum ex hb: BELLARDI. = 24. *D. caucasicus* = M. B. fl: taur: I. p. 327. (*Caucaso occid:*, et in monte *Beschtan* ex FISCH: en: pl: caucas: p. 211.). Perenn: Flores sub-solitarii; calycis squamæ in specim: meo tubo triplo breviores; petala inciso-serrata. Valde affinis *D. plurimario*, sed ab *iberico* W. cum quo cl: SPR: *caucasicum* junxit valde differt sec: diagn: DC. Prodr: I. 363. = 25. *D. versicolor* = Fisch: in Link en: I. p. 420. *D. pratensis* M. B. sec: SPR: non sec: DC. (Imp: Ruthenico, *Dahuria*). Perenn: Præter characteres a cl: DC. et SPR: allatos observavi in specim: communicatis a cl: FISCHERIO ex *Dahuria* caulem esse valde ramosum, ramos strictos saepius 1-floros, quandoque 2-3-floros et tunc flores aggregatos; squamas calycinas exteriore s equidem lanceolatas, sed tubo 1/4. breviores; folia linear-lanceolata sub-3-nervia. *D. pratensem* quem SPR: *versicolori* tribuit synonimum non vidi.

* 26. *D. furcatus* = Balb: act: Acad: Taur: vol. VII.

p. 12. non Hornm: = Spr: syst: II. 378. = Balb: l. c. f. 2. (*Pedem:* sec: arva in montibus *Tendæ BALBIS:*). Perenn:

27. *D. nitidus* = Waldst et Kit: pl: rar: 2. p. 209. (*Carpath:* alp: *Dinar:*). Perenn: Cult: in H. Ripul: = 28. *D. bicolor* = M. B. fl: taur: I. p. 329. non ADANS: nec HORNM: (*Thracia, Asia min:, Pelopones;*; in mont: *Talüsch* ex FISCH: l. c. n. 1836.). Perenn: Specim: mea perfectissima ex MARCHALL folia gerunt *linear-lanceolata acuta* non reapse *subulata*, uti in diagn: Auctorum, ceterum quadrant.

* ? 29. *D. virgineus* = L. sp: 590. = Spr: syst: II. 379. = Dill: elth: 401. t. 385. ? Jacq: fl: austr: app: t. 15. (*Eur:* austr: In *Pedem:* pascuis sterilibus et saxosis frequens ALL: n. 1549. Re fl: segus: p. 36. In pascuis *Sessitis* præsertim in valle del *Mastalone* non rarus BIROLI fl: acon: I. p. 145.). Perenn: Planta pro *Pedemontio* dubia, ut *D. Caryophyllus* n. 19.; in *D. virgineo* fide omnium Auctorum squamæ calycinæ sunt *obtusissimæ*; plantæ pedemontanæ illas gerunt *acutas*. Huc pertinet sec: DC. Prodri: I. 361. *D. sub-acaulis* VILL; et LOISL: not: p. 66. t. 6. f. 1. a SPR: omissus, varietas notabilis, *pygmæa*, ac valde cæspitosa; subvarietates possideo caulis subnullis, vel 1-2-pollicaribus.

β Petalis multifido-laciniatis.

* 30. *D. superbus* = L. amæn: IV. p. 272. = Spr: syst: II. 379. = Delaun: hb: amat: t. 21. (*Eur:* anstr: et arctica. *Pedem:* loco dicto *Col dl mul*; in pratis a Ronco ad *Cinam*; in sylvis *Sabaudiae* ALL: n. 1553.

In provincia *Novariensi* ad montem *Turlo* BIROLI fl: acon: I. p. 145.). Perenn: Variat petalis *albis* vel *purpureis* plus minusve fimbriatis. Cult: in H. Ripul: ubi luxuriat paniculis amplissimis, ramis multifloris.

31. *D. fimbriatus* = M. B. fl: taur: I. p. 332. (*Iberia*, *Sibiria*. In mont: *Talüsch* ex FISCH: l. c. n. 1838.). Suffrutic: Ungues petalorum tubo calycis valde longiores.

*? 32. *D. monspessulanus* = L. sp: 588. = Spr: syst: II. 379. = Ic: ? (*Gall*: austr:, *Pyrenæis*, *Alpib*: *Apuanis*. *Pedemont*: indigena planta est sec: ALL: n. 1551., sed quo loco crescat nec indicat, nec scio.). Perenn: Specim: possideo ex MOLINERIO et ex BERTOLONIO; hæc perfecte quadrant cum optima insignis Auctoris descriptione in am: ital: p. 364.; illa nullam præseferunt indicationem loci natalis, et folia gerunt duplo latiora et breviora; ceterum convenient inflorescentia et floralibus organis; an ad var: β *brevifolium* DC. Prodr: I. 365. referenda?

* 33. *D. plumarius* = L. sp: 589. = Spr: syst: II. 379. = Ic: taur: vol. 8. t. 17. 18. (*Helvet*:, *Hungar*:, *Transylv*:, *Podolia*. *Pedem*: in alpibus *Cenisii* ex quibus in hortum adductus. In montibus *Javenensi*bus et *Bugellensibus* frequens ALL: n. 1552. In alpibus *Mocchiarum* RE fl: segus: p. 36. In sylvis collium di *Maggiora*, *Ameno*, et *della Vesca* BIROLI fl: acon: I. p. 145.). Perenn: Variat plenitudine, colore et odore florum, nec non petalis plus minusve incisis. Cult: ubique ornamenti gratia.

††† *Caule 1-floro.*

α Petalis dentatis.

34. *D. sylvaticus* = Hopp: in W. en. 467. (German: med:). Perenn: Sub hac sectione relatus a SPR:; sed flores sunt potius sparsi sub-corymbosi: folia autem melius *linearis-lanceolata glabra* uti in diagn: DC. Prodr: I. 360., quam *linearia margine scabra* uti ex SPR: l. c.: saltem ita video in specim: meis ex BALBISIO.

* 35. *D. sylvestris* = Wulf: in Jacq: coll: I. p. 237. = Spr: syst: II. 380. = Jacq: ic: rar: I. t. 82. (Alpib: Noric:, Carn:, Dinar: In omnibus alpibus Pedemontanis BALB: misc: alt:). Perenn: Huc spectant *D. Caryophyllus* et *virgineus* ALL: sec: BALB: Vid: sup: n. 19. et 29.

36. *D. cæsius* = Sm: act: soc: linn: 2. p. 302. (Angl:, Germ: med:). Perenn: Squamæ calycinæ subrotundæ; unguis petalorum tubum calycis valde superantes; folia linearis-lanceolata obtusiuscula sub-erecta. = 37. *D. suavis* = W. en: suppl: p. 24. (Patria?). Perenn: Confusus a SPR: syst: II. 380. cum priori; sed differt squamis calycinis acutis; unguibus petalorum tubum calycinum æquantibus; foliis linearibus acutissimis patentibus. Cult: in H. Ripul: ex quo specim: mea; collata cum specimin: ad BIROLIUM missis ex h. Berolin: perfecte convenient, nec cultura variant: flores odoratissimi.

* 38. *D. alpinus* = L. sp: 590. = Spr: syst: II. 380. = Clus: hist: I. p. 283. f. 1. Ic: taur: vol. 8.

t. 19. 20. f. 2. 3. 4. vol. 14. t. 7. f. 2. (Alpib: *Europ*; *Sibiria. Pedem*: in pratis editioribus *Alpium*, et pascuis montanis, tum etiam ad rupes ALL: n. 1556. Re fl: segus: p. 36. Provincia *Novariensi* in cacuminibus del *Campello* unice observavit BIROLI fl: acon: I. p. 146.). Perenn: Huc pertinet sec: SPR: *D. glacialis* HAENK a DC. distinctus Prodr: I. 362., qui crescit etiam in alpibus *Pedemontanis* et idem est ac *D. neglectus* LOISL: a SPR: emissus in synonymia. Cons: BALBIS: misc: alt: et obs: sur les *Oeillettes*, nec non RE app: alt: p. 197.

* 39. *D. alpestris* = Balb: act: Acad: Taur: vol. VII. p. 11. t. 1. non Sternb: ? = DC. Prodr: I. 358. (In pascuis *Alpium* maritimarum et in illis de notre Dame des fenêtres frequens BALB: l. c.). Perenn: A *D. alpestri* STERNB: ex SPR: syst: II. 381. quem non posse video diversum puto ex diagn: SPR: ; in nostro enim petala emarginata vix dentata, in altero fimbriata: cl: SPR: *D. alpestri* STERNB: addidit synonymum *D. siculum* PRESL: ; hic autem habet squamas calycinæ senas non quaternas uti in nostro. Cons: Guss: fl: sic: Prodr: I. p. 494.

β Petalis fimbriatis.

40. *D. petræus* = Valdst: et Kit: pl: rar: 3. t. 222. (*Hungar*:, *Transylv*:). Perenn: Squamæ calycinæ tubo elongato glaberrimo quadruplo breviores; petala alba: habitus *D. plumarii*. = 41. *D. squarrosum* = M. B. fl: taur: I. p. 331. (Ad *Volgam*). Perenn: Caltus in H. B. T. ex quo specim: mea, a *D. plumario* vix differt soliis duplo latioribus nec glaucis: an cum priori

ei jungendum? = 42. *D. serotinus* = Waldst: et Kit:
pl: rar: 2. p. 188. (*Hungar.*, *Transylv.*). Perenn: Cau-
lis ramosus, rami 1-flori, folia ramea basi nodos
cingentia acuta vix 1-lin: longa, internodia brevissi-
ma. A vero *D. arenario* L. vix diversus. *D. hungaricus*
Towns sec: BIROLI sub quo nomine habui ex ejus hb:;
D. arenarius Towns it: hung: 3. t. 16. sec: DC.
Prodr: I. 364.

* 43. *D. arenarius* = L. sp: 589. = Spr: syst: II.
381. = Bot: mag: t. 2038. (*Eur:* med: et frigid: *Pedem:* abunde locis arenosis et siccis circa *Fenestrel-*
las et *Exilles* ALL: n. 1555.). Perenn: Huc pertinent
sec: SPR: *D. dubius* HORN:, *gallicus* PERS: et *præcox*
W., quos omnes possideo; in prioribus differentias
non vidi, sed *præcox* differt floribus *sub-aggregatis*,
squamis calycinis *acutiusculis*, foliis *lanceolatis* ner-
vosis *scabriusculis*. An igitur species hæc a DC. omissa
admittenda?

* 44. *D. tener* = Balb: act: Acad: Taur: vol. VII.
p. 13. t. 3. = DC. Prodr: II. 362. (*Pedem:* secus arva in
alpinis *di Tenda* BALB:). Perenn: Pumilus gracillimus;
folia linearis-lanceolata rigidiuscula. Omissus a SPR:

Dianthi dubii.

45. *D. hispanicus*? Enatus e seminibus missis sub
hoc nomine sine alia indicatione, differt a *D. hispa-*
nico Asso eodem ac *D. pungens* L. foliis *linearis-lan-*
ceolatis nervosis striatis internodiis longioribus, nec
cæspitosis subulatis; habitu accedit ad *D. Poiretianum*
n. 18., sed differt inflorescentia non in *corymbum*,
ac calyce gibbo nec elongato æquali. An *D. pungen-*

tis cum quo quadrat organis floralibus var: altera? Cult: in H. Ripul: = 46. *D. volgensis*? Easdem plantas possideo ex hb: BIROLI sub nomine *D. volgensis* h. Erfurt: ined: et *D. guttati* sine alia indicatione. Priorem enumerat DC. tamquam synonymum *D. deltoidei* (Prodr: I. 361.), sed nonnullis differt notis; at *D. guttatus* M. B. fl: taur: I. p. 328. toto cœlo diversus a nostra planta præsertim habitu, inflorescentia, squamis calycinis tubo *triplo brevioribus* nec illum *æquantibus*, foliis *linearis-lanceolatis obtusiusculis*, nec *linearibus subulatis*. Diagnosis ex sicco hæc est:

» *D. caule cæspitoso sub-paniculato lævi*, squamis
» calycinis 2 ovatis acuminatis tubo striato triplo bre-
» vioribus 2 sub-nullis, petalis dentatis, foliis linearis-
» lanceolatis obtusiusculis 1-nerviis striatis internodiis
» dimidio brevioribus (petala purpurea). » Nob:
Habit: ?

47. *D. glaucophyllus*? Semina accepi sub hoc nomine sine alia indicatione; differt a *D. glaucophyllo* HORN: eodem ac *D. Balbisii* SER: sec: DC. Prodr: I. 356. squamis calycinis *longe cuspidatis* tubum *superantibus*, nec *lanceolatis* tantum tubo *minoribus*; folia sunt potius *linearia nervosa*, quam *lanceolata-linearia*; in ceteris quadrat. Valde affinis mihi videtur *D. Armeriæ* n. 7. cuius forsitan var: Cult: in H. Ripul: = 48. *D. dentosus* = Goldb: (*Altai*). Ita in scheda specim: communicati a cl: FISCHERIO; nullibi descriptum vidi, et sic definiri potest:

» *D. caule angulato gracili glabro 1-floro*, squamis
» calycinis quaternis ovatis cuspidatis tubum sub-

» inflatum æquantibus, petalis dentatis, foliis linear-
 » lanceolatis acutis 1-nerviis margine denticulato-sca-
 » bris internodia subæquantibus. » *Nob:*

49. *D. Arbuscula* = Lindl: bot: reg: 1086. (*Pa-
 tria?*). *Fruticulosus erectiusculus glaber ramosus; fo-
 lia oblongo-lanceolata crassiuscula mollia internodiis
 parum longiora; flores sub-solitarii; bracteæ 2 linear-
 lanceolatæ erectæ tubo calycino paullo breviores;
 calyx vix striatus glabriusculus; petala longe ungu-
 culata lamina latissima sub-rotunda profunde inæqua-
 liter dentata rubra; flores in planta mea ex M. BUR-
 DIN odori, pleni atque abortivi. Stirps pulcherrima.*

III. SAPONARIA Lin: gen: n. 769. = Lam: ill: t. 376.

» *Cal:* tubulosus angulosus vel teres glaber vel
 » villosus 5-dentatus basi nudus. *Pet:* 5. unguicu-
 » lata apice integra vel 2-fida unguibus calycem æ-
 » quantibus. *Cetera ut in Diantho.* »

Obs: Genus *Diantho* valde affine constans specie-
 bus 17. ex DC., 11. ex SPR:, quibus 3. novissimæ
 nuper additæ fuerunt a FISCH: En: pl: caucas: p. 212.
 Ex inflorescentia paniculata vel simplici, nec non ex
 calycis forma divisum in plures sectiones. Herbæ an-
 nuæ vel perennes.

† *Calyx angulosus, flores paniculati.*

(*Vaccaria* DC. sub *Gypsophila* Spr:)

* 1. *S. Vaccaria* = L. sp: 585. = DC. Prodr: I.
 365. = Bauh: hist: 3. p. 357. f. 2. Ic: taur: vol. 3.
 t. 35. (Eur: med: et austr: Pedem: inter segetes circa
Segusium et prope *Avilianam*, nec non in comitatu

Nicæensi, *Astensi*, atque agris collium calidiorum ALL: n. 1558. Inter segetes prope *Revigliasco* in collibus *Taurinensibus* RE fl: torin: I. p. 230. In campus di *Pallanza* et *Tuna* frequens, et in valle *Formazza* BIROLI fl: acon: I. p. 144. *Sardin:* inter segetes MORIS st: sard: I. p. 8. *Genuæ* locis herbidis all'*Aquasola* BERTOL: am: ital: p. 149.). Ann:

†† Flores fasciculato-paniculati,
calyx teres saepius pilosus (*Bootia* DC.)

* 2. *S. officinalis* = L. sp: 584. = Spr: syst: II. 374. = Engl: bot: t. 1060. Ic: taur: vol. 3. t. 25. (Eur: omni. Ad vias tum in agro *Pedemontano* tum in sylvis collium *Taurinensium* non infrequens ALL: n. 1557. RE fl: segus. p. 36. et fl: torin: I. p. 230. In provincia *Novariensi* ad aqueductus ubique BIROLI fl: acon: I. p. 143. In *Sardin:* ad sepes MORIS st: sard: I. p. 8.). Perenn: Flores magni: tubus calycinus longissimus glaber nec *villosum* uti in diagn: DC. Prodri: I. 365. Colitur in hortis var: fl: *pleno*, *albo* vel *roseo*.

* 3. *S. ocimoides* = L. sp: 585. = Spr: syst: II. 374. = Cav: ic: 2. p. 29. t. 134. Ic: taur: vol. 3. t. 84. (Eur: austr: *Pedem:* in umbrosis saxosis abunde, seu in collibus *Taurinensibus*, montanis et subalpinis ALL: n. 1559. Secus *Duriam* in locis incultis RE fl: segus: p. 36. Secus *Sturam* RE fl: torin: I. p. 230. In rupibus collium *Novariensium* BIROLI fl: acon: I. p. 144. In rupibus ad marginem viæ publicæ supra *Gavi*; *Pegli* secus torrentem *Varennæ* BERTOL: am: ital: p. 150. *Sardin:* in pascuis editioribus *Genargentu*

MORIS st: sard: I. p. 8.). Perenn: Flores parvi in *fasciculos* terminales vel axillares, non *solitarii* uti ex SPR: diagnosi ; tubus calycinus glanduloso-villosus.

+++ Flores solitarii axillares, calyx teres
vel angulosus saepius pilosus (*Proteinia* DC.)

*? 4. *S. porrigens* = L. mant: 239. = Spr: syst: II. 374. = Jacq: h. vind: 2. p. 49. t. 109. (*Asia* min: In *Liguria* secus torrentem *la Sturla* non longe a littore prope *Genuam* invenit VIVIANI). Ann: Flores parvi, calyx teres villosus. An plantæ a VIVIANI lectæ initio ex cultura ortæ? Valde dubito, nam ceteri Scriptores etiam recentiores orientalem patriam exclusive ei tribuunt.

5. *S. orientalis* = L. sp: 585. (*Carniola*, *Asia* min:). Ann: Flores parvi; calyx teres hispidulus; folia in specim: meis ex *BALBISIO lanceolata* nec *spathulata* uti in diagn: DC. Prodr: I. 366. = 6. *S. calabrica* = Guss: ind: sem: H. R. Bocc: 1825. et pl: rar: p. 164. t. 31. (In aridissimis collibus *Calabriæ* orientalis). Ann: Flores mediocres rosei; calyx teres striatus villoso - glandulosus; folia ovato - spathulata. Species distinctissima.

++++ Caules foliaque cæspitosa; flores aggregati;
calyx teres villosus (*Bolanthus* DC.)

* 7. *S. lutea* = L. sp: 585. excl: syn: Bocc: =
Spr: syst: II. 374. = All: fl: pedem: n. 1560. t. 23.
f. 1. Ic: taur: vol. 11. t. 101. f. 1. (Abunde in al-
tissimo jugo *Assiette*, in parvo *M. Cenisio*, et ad
jugum *Col dla fnestra*, tum in summis Alpibus parvo

M. Cenisio proximis *Savine* et *Jaillon*, et in jugis *Col de Cogne* ALL: l. c. In provincia *Novariensi* ad montem *Turlo* BIROLI fl: acon: I. p. 144. In Alpibus di *Giaglione* RE fl: segus: p. 36.). Perenn: Planta valde cæspitosa pumila.

IV. *CUCUBALUS* Gaertn: fruct: I. p. 376. t. 77. f. 7.

- » *Cal:* campanulatus 5-dentatus basi nudus. *Pet:*
- » 5. unguiculata imberbia limbo 2 - fido. *Stam:* 10.
- » *Styl:* 3. *Caps:* carnosa (*bacca exsucca* GAERTN:)
- » 1-locularis. »

Obs: Genus valde *Silenis* affine, hinc plures species cum illis jam confusæ, modo constans sola sequenti.

* 1. *C. baccifer* = L. sp: 591. = Spr: syst: II. 404. = Mill: ic: t. 112. Ic: taur: vol. 25. t. 25. (*Eur: omni. Pedem:* ad sepes ubique vulgatissimus præsertim in collibus *Taurinensis* ALL: n. 1585., RE, BIROLI sub *Silene*). Perenn:

V. *SILENE* Lin: gen: n. 772. = Gaertn: fr: II. p. 233. t. 130. f. 8.

- » *Pet:* særissime barbata. *Caps:* basi 3 - locularis
- » apice in 6. dentes dehiscens. Cetera *Cucubali.* »

Obs: Genus a priore distinctum ex fructus structura, determinatione stirpium difficillimum, nunc constans 217. sec: DC., 146. tantum sec: SPR:, non nullis aliis additis a recentioribus Auctoribus, in plures sectiones obscure divisum, inflorescentia ac forma calycis præsertim inspectis. Herbæ, raro suffrutices.

† *Caule unifloro.*

α *Calycibus clavatis.*

* 1. *S. vallesia* = L. sp: 603. = Spr: syst: II. 404. = All: ped: n. 1574. t. 23. f. 2. (Locis sterilibus et editioribus Alpium *Valdensium* All: l. c. Passim in montanis RE fl: segus: p. 37.). Perenn: Caulis raro 2-vel-3-florus sec: All:

2. *S. corsica* = DC. fl: fr: IV. 756. (*Corsica*. In *Sardin*: arenis maritimis MORIS st: sard: I. p. 8.). Perenn: Specim: mea ex MORISIO habent folia ovata, sub-carnosa, viscido-farinosa, calyces 10-striatos, petala longissima unguiculata.

* 3. *S. Saxifraga* = L. sp: 602. = Spr: syst: II. 404. = Waldst: et Kit: pl: hungar: 2. t. 163. (*Eur*: med: *Pedem*: in rupibus Alpium frequens locis apri-
cis All: n. 1582. In rupibus Alpium *Mocchiarum* RE
fl: segus: p. 37. Frequens in rupibus *di Intra BIROLI*
fl: acon: I. p. 147.). Perenn:

4. *S. petræa* = Waldst: et Kit: pl: hung: 2. t. 164.
(*Hungar*:). Perenn: Cult: in H. B. T.

β *Calycibus campanulatis.*

* 5. *S. acaulis* = L. sp: 603. = Spr: syst: II. 405.
= Bot: mag: t. 1081. All: ped: n. 1583. t. 79. f.
1. (In *Eur*: Alpibus. Lapidès et lapidum intersti-
tia in pene summis Alpibus *Pedem*: ubique fere exor-
nat All: l. c. In pascuis omnium Alpium RE fl: se-
gus: p. 37. Præsertim ad montem *Morum BIROLI* fl:
acon: I. p. 148.). Perenn: Flores abortu sæpe dioici;

variat floribus minoribus fere sessilibus (*S. exscapa* ALL: n. 1584. t. 79. f. 2.); pedunculis elongatis, flore masculino (*S. elongata* BELL: app: p. 53.; var: β *elongata* DC. fl: fr: IV. p. 749.); alias varr: a DC. enumeratas in Prodr: I. 369. non vidi.

* 6. *S. Campanula* = Pers: enh: I. p. 500. = DC. Prodr: I. 377. = All: auct: p. 28. t. 1. f. 3. sub *Cucubalo alpestri* c. descript: (In rupibus *Pedemontanis* ALL: l. c.). Perenn: Omissa a SPR:?

γ Calycibus inflatis.

7. *S. Pumilio* = Sturm: deutschl: fl: I. fasc: 22. t. 11. (Alpib: *Germaniae*). Perenn: Priori affinis, sed caules minus densi, calyces inflati, flores multo maiores.

†† Caule paucifloro.

α Calycibus clavatis.

8. *S. linifolia* = W. en: 473. (*Hispan:*, *Afr:* bor:?). Ann: Cult: in H. B. T. ex quo specim: mea, quæ prorsus quadrant cum descript: DESF: fl: atl: I. p. 355. de sua *S. arenarioidea*, ad quam jam dubitavit SPR: esse referendam *S. linifoliam* etsi distincta a DC. Prodr: I. 378. = 9. *S. flavescens* = Waldst: et Kit: pl: hung: 2. p. 131. t. 175. (*Bannatu*). Perenn: Specim: ex BALBISIO calyces habent potius cylindricos quam clavatos, folia inferiora lanceolato-spathulata, superiora linearia, caules 1-3-floros nec paniculatos uti in diagn: DC. Prodr: I. 376.

β Calycibus cylindricis.

* 10. *S. cordifolia* = All: ped: n. 1581. c. de-
script: = Spr: syst: II. 406. = All: l. c. t. 23. f. 3.
Ic: taur: vol. 25. t. 67. (*Pedem: circa thermas Vina-
dii et Valdesii, in præruptis saxosis atque editiori-
bus montibus Nicæensibus* ALL: l. c.). Perenn:

γ Calycibus inflatis.

11. *S. fabaria* = Sm: sec: Spr: II. 406. (*Creta*).
Perenn: A *Cucubalo fabario* L. qui pertinet ad hanc
stirpem excludatur syn: Bocc: mus: 133. t. 92. a W.
census sp: II. 685.; spectat enim ex observationibus
cl: Guss: Prodr: fl: sic: I. p. 499. ad suam *S. com-
mutatam* toto cœlo diversam et forsitan a Flora sicula
excludendam. Vid: infra n. 88.

††† *Floribus sparsis sub-solitariis.*

α Calycibus clavatis.

12. *S. canopica* = Spr: syst: II. 406. ex Delil:
(*Ægypt: super:*). Herbacea procumbens ramosissima
undique piloso-viscosa; folia ovato-oblonga; pedun-
culi axillares solitarii folio breviores; flores mediocre. = 13. *S. chloræfolia* = Smith ic: ined: I. p. 13.
t. 13. (*Armenia, Caucaso*). Perenn: Cult: in H. B. T.;
flores magni. = 14. *S. pinguis* = Vahl ex Horn: h.
hafn: supp: 49. (*Corsica, Ægypt:*). Ann: Specim: mea
ex hb: BELLARDI accepta a DONAT: et in *Ægypto* lecta
referunt optimos characteres in phrasi DC. omissos,

qui speciem hanc enumeravit inter non satis notas ;
diagn: igitur emendanda ut sequitur :

» *S. tota albo-tomentosa pinguis*, foliis sessilibus
» inferioribus late ovatis obtusis superioribus oblon-
» gis acutiusculis, floribus sparsis vel sub-panicula-
» tis erectis, calycibus 10-striatis dentibus acutissi-
» mis, petalis longe unguiculatis 2-fidis, genitalibus
» inclusis (petala purpurea). » Nob:

β Floribus campanulatis.

* 15. *S. quadridentata* = DC. fl: fr: IV. p. 78. =
Spr: syst: II. 407. = Waldst: et Kit: pl: hung: p. 235.
t. 212. pro var: β *pusilla* (Alpib: Eur: med: Pedem:
in monte *Genèvre* All: n. 1579. sub *S. quadrifida*
L. In locis rupestribus ad fontes in alpib: *Monregale-*
lensibus frequens All: auct:). Ann: , perenn:

* 16. *S. rupestris* = L. sp: 602. = Spr: syst: II.
407. = Sturm: deutschl: fl: I. fasc: 22. t. 10. Ic:
taur: vol. 8. t. 12. f. 1. et vol. 12. t. 18. f. 3. (Al-
pib: Eur: med: et bor: Pedem: in montanis et sub-
alpinis umbrosis rupibus frequens All: n. 1580. Sec:
Sturam et inter *Venariam* et *Fiano* secus torrentes
RE fl: torin: I. p. 236. In montibus circa *Foresto* et
Mompantero RE fl: segus: p. 37. In rupibus montium
Novariensium della *Gandoja*, *Colma* etc. BIROLI fl:
acon: I. p. 147.). Perenn: Flores minimi: priori af-
finis, sed differt præsertim petalis *emarginatis* nec
4-dentatis.

17. *S. sedoides* = Jacq: coll: supp: p. 112. (*Creta*,
Sicilia). Ann: , pumila. A *S. ramosissima* SIBTH cum
qua confusa a SPR: differre testatur cl: GUSS: Prodr:

fl: sic: I. calyce non 10-angulari, et petalis emarginatis nec 2-fidis; variat caule sub-simplici vel ramosissimo.

γ Calycibus cylindricis.

* 18. *S. noctiflora* = L. sp: 599. = Spr: syst: II. 407. = Engl: bot: t. 291. Ic: taur: vol. 11. t. 65., vol. 20. t. 29., vol. 21. t. 15. (*Eur: med: In comit: Nicæensi ALL: n. 1575.*). Ann: Flores magni terminales vel axillares 2-3 sub-aggregati.

19. *S. ornata* = Ait: H. Kew: 2. p. 96. (*C. B. S.*). Perenn:? Folia lanceolata longissima; flores in specim: meo ex hb: BIROLI magni paniculati nec sparsi; paniculæ laxæ axillares et terminales paucifloræ. Species pulcherrima; flores ex sicco purpurei.

δ Calycibus conicis ventricosis.

* 20. *S. conica* = L. sp: 598. = Spr: syst: II. 407. = Jacq: fl: austr: t. 253. (*Eur: med: Inter segetes Sabaudiæ prope Termignon ALL: n. 1572.*). Ann:

* 21. *S. conoidea* = L. sp: 598. = DC. Prodr: I. 371. = Clus: hist: I. p. 288. f. 2. Ic: taur: vol. 3. t. 30. (*Eur: med: In agro Nicæensi ALL: n. 1571.*). Ann: Priori valde affinis cum qua confusa a SPR:, sed differt foliis fere glabris inferioribus linearispatulatis, calycibus longis, petalis integris, insuper ex DC. capsulis (quas non vidi) lageniformibus non ovatis.

22. *S. undulata* = Ait: h. Kew: 2. p. 96. (*C. B. S.*). Bienn: Omissa a SPR: In specim: meis ex hb: BIROLI

et BELLARDI folia caulina sunt linear-lanceolata sessilia, caulis dichotomus, non reapse paniculatus, rami 1-2-flori, calyces versicolores dentibus acutissimis; genitalia inserta.

ε Calycibus inflatis.

23. *S. pendula* = L. sp: 599. (*Eur: austr: Sicilia?*). Ann: In *Sicilia* patria hujus stirpis ex fere omnibus Auctoribus hactenus non vidisse testatur cl: Guss: Prodr: fl: sic: I. p. 507. Variat floribus erectis (*S. scabriflora* BROTER:) ad quam pertinet specim: meum ex BALBISIO.

+++ *Floribus racemosis secundis.*

α Calycibus clavatis.

* 24. *S. sericea* = All: pedem: n. 1573. c. descript: = Spr: syst: II. 407. = All: l. c. t. 79. f. 3. Ic: taur: vol. 28. t. 30. (*Eur: austr: Ad maris litus in sabulosis inter Oneglia et Porto Maurizio* All: l. c. In *Sardin:* arenosis maritimis frequens MORIS st: sard: I. p. 8.). Ann: Huc pertinent variae species Auctorum, quas videre est in BERTOL: amæn: it: p. 27. et 241. n. 45., nec non apud Guss: pr: fl: sic: I. p. 499., ubi in spontaneis plantis ab una ad alteram iri testatur, et ideo tamquam solas varr: considerat.

25. *S. villosa* = Forsk: descr: plant: cent: 3. p. 88. n. 71., non Moench: (*Ægypto*). Ann: ? Omissa a SPR: ; habui a BALBISIO sub hoc nomine et ex hb: BIROLI sub nomine *S. cuneifoliæ* GMEL: ad quam pertinet *S. villosa* FORSK: sec: STEUD: Medium tenere videtur inter

priorem et sequentem; differt ab illa foliis potius cuneiformibus quam spathulatis, ac unguibus petalorum calycom sub-aquantibus nec excedentibus; ab alia, cui magis accedit, calycibus villosis nec glabriusculis; forsan tres istæ stirpes conjungendæ cum aliis varietatibus *S. sericeæ.* = 26. *S. bellidifolia* = Jacq: h. vindeb: 3. t. 81.. (*Lusitan:*, *Afr:* bor: Ins: maris *Egæi*). Ann: *S. bipartitam* DESF:, *bifidam* ROTH:, et *vespertinam* RETZ, quas omnes possideo ex BALESIo ad eamdem stirpem tum SPR: auctoritate, cum ex observationibus meis spectare arbitror. = 27. *S. Pourretii* = SPR: syst: II. 408. ex Poir: (*Hispan:*, *Creta*). Perenn: Habui specim: a PERRET sub nomine *S. ciliatae mediæ*; racemi pauciflori; petala purpurea.

* 28. *S. nicæensis* = All: pedem: n. 1576. c. descript: = SPR: syst: II. 408. = All: l. c. t. 44. f. 2. Ic: taur: vol. 17. t. 96. (*Liguria*, *Corsica*, *Hispan:*, *Sicil:*, *Afr:* bor: In agro Nicæensi secus Varum frequens ALL: l. c. In *Sardin:* arenis maritimis MORIS st: sard: I. p. 8.). Ann:

29. *S. supina* = M. B. fl: taur: I. p. 336. (*Caucaso*). Peren: , basi suffruticosa. Culta in H. B. T. ex quo specim: sine fl: quæ in ceteris satis quadrant cum descriptionibus Auctorum. = 30. *S. obtusifolia* = W. en: p. 473. (*Nepal:*). Ann: Culta in H. Ripul: e semin: missis a cl: BALBISIO, rite convenit cum diagn: SPR:, sed flores erectiusculi nec cernui uti in phrasi DC. Prodr: I. 374. = 31. *S. hispida* = Desf: atl: I. p. 348. (*Agro Romano*, *Sicilia*, *Barbaria*. *Sardin:* inter segetes MORIS st: sard: I. p. 8.). Ann: Huc referenda sec: SPR: *S. disticha* W. a DG. Prodr: I. 372.

distincta; prioris possideo specim: ex cl: BALBISIO et MORISIO, alterius ex solo BALBISIO, nec ullum inter illa discriminem observo; forsitan error in schedis SPR: et BALB:, nam cl: DC. qui *S. disticham* asserit vidisse viventem ei tribuit folia *cuspidata*, in specim: meis *obtusiuscula*, uti in diagn: Guss: Prodr: fl: sic: I. 500., interdum vix ac ne vix quidem *acuminata*. = 32. *S. crassifolia* = L. sp: 597. (*C. B. S.*). Ann: Folia non *ovato-orbiculata* uti in diagn: SPR: syst: II. 508., sed melius *ovato-spathulata* uti ex DC. Prodr: I. 374.; in specim: meo ex BALBISIO inferiora sunt *ovato-spathulata* longeque *petiolata*, superiora *lanceolato-spathulata sub-sessilia*.

β Calycibus cylindricis
sc: ovato-cylindricis striatis.

* 33. *S. anglica* = L. sp: 594. = Spr: syst: II. 408. = Engl: bot: t. 1178. (*Anglia. Pedem:* secus arva *Nicæensia* ALL: n. 1564.). Ann:

* 34. *S. gallica* = L. sp: 595. = Spr: syst: II. 408. = Vaill: bot: par: t. 16. f. 12. Ic: taur: vol. 19. t. 79. (*Gallia. Pedem:* in agris prope *Casalborgone* inter segetes; inter *Caselle* et *Lombardore*, secus arva in agro *Taurinensi*, *Montisferrati*, di *Cigliano* ALL: n. 1567. In arvis prope *Colegno* et *Venariam* præsertim ad ædem *S. Pancratii* RE fl: torin: I. p. 234. In *Sardin:* pascuis et arvis frequens MORIS st: sard: I. p. 8.). Ann: Ramosissima; racemi, melius spicæ, valde elongatæ.

35. *S. lusitanica* = L. sp: 594. (*Lusitan:, Sicilia*).

Ann: *S. quinquevulnera* UERIA non L. sec: Guss: Prodr: fl: sic: p. 496.

* 36. *S. cerastoides* = L. sp: 596. = Spr: syst: II. 409. = Dill: elth: 416. t. 309. f. 307. (*Eur:* austr: In agro *Nicæensi* ALL: n. 1565.). Ann:

* 37. *S. quinquevulnera* = L. sp: 595. = Spr: syst: II. 409. = Engl: bot: t. 86. (*Anglia, Eur:* med: Secus arva *Nicæensia* ALL: n. 1566. Inter segetes *Sardin:* mediæ MORIS st: sard: I. p. 8.). Ann: Huc pertinet sec: SPR: *S. ocimooides* DESF: a DC. Prodr: I. 371. *distincta*; specim: mea ex BALEBISIO et BIROLI eundem habitum referunt, ac differunt tantum calyce evidentius *striato-hirsuto* in *quinquevulnera*, fere *lævi* et vix *villosumculo* in *ocimoidea*.

38. *S. tridentata* = Desf: fl: atl: I. 349. (*Afr:* bor:, *Hispan:*). Ann:

* 39. *S. nocturna* = L. sp: 595. = Spr: syst: II. 409. = Dill: elth: 420. t. 310. f. 400. Ic: taur: vol. 3. t. 39. Fl: tie: t. 210. f. 1. (*Eur:* austr: , *Amer:* bor: In agri *Nicæensis* olivetis occurrit ALL: n. 1568. *Sardin:* inter segetes *Laconi* MORIS st: sard: I. p. 8.). Ann: Huc pertinet *S. spicata* DC. fl: fr: a SPR: omissa in synon:

40. *S. neglecta* = Tenor: fl: nap: app. 6. p. 13. excl: var: β (Regno *Neapolit:*). Ann: Priori valde affinis cuius forsitan var: differens tantum capsula dentibus calycinis *obtusiusculis* æquali nec *acutis breviore*. Specim: ex Auctore. = 41. *S. mutabilis* = L. amæn: IV. p. 314. (*Eur:* austr: , *Hispan:*). Ann: Huc refert SPR: *S. micropetalam* DC. et *hirsutam* LAG: quas omnes possideo; inter hanc et *mutabilem* nullas rcapse

vidi differentias nisi in posteriori folia *lati*ora; sed *S. micropetala* DC. Prodr: I. 372. quam habeo ex H. B. T. enatam e seminibus ab Auctore missis valde differt habitu, statura minori, folijs inferioribus *ovato-spathulatis* nec omnibus *lineari-lanceolatis*, calycibus *sub-sessilibus* non *pedunculatis*, dentibus *acutioribus*. = 42. *S. clandestina* = Jaeq: coll: suppl: 111. (*Afr:* bor: et austr:). Ann: Inter hanc et *S. nyctantham* W. non appareat differentia ex specim: meis; an idem dicendum de *S. cinerea* Desf: juxta Spr: sententiam? Hanc non vidi, sed ex diagn: DC. Prodr: I. 373. videtur valde differre. = 43. *S. apetalata* = W. sp: II. 703. (*Hispania*). Ann: Folia inferiora in specim: meo *lanceolato-spathulata*.

γ Calycibus ovato-conicis sub-ventricosis striatis.

44. *S. dichotoma* = Ehr: beytr: 7. p. 144. (*Hungar:*, *Macedon:*, *Asia min:*). Ann:

+++++ *Floribus paniculatis erectis.*

α Calycibus clavatis.

* 45. *S. Armeria* = L. sp: 601. = Spr: syst: II. 410. = Engl: bot: t. 1398. Ic: taur: vol. 3. t. 33. (*Eur:* fere omni. *Pedem:* in saxosis *Sturæ* non longe ab urbe *Taurini* et prope pagum *Viù* loco dicto *'l mal pass*, et in collibus *Canapiciensibus* All: n. 1578. In saxosis acclivibus *Condoviarum*, delle *Blaccie*, et secus *Duriam* RE fl: segus: p. 37. Secus *l'Arbogna*, et in glareosis *Ticini* non rara BIROLI fl: acon: I. p. 147. In sylvis della *Mandria* locis a sole percussis,

secus Sturam atque alla sicca della Dora RE fl: torin: I. p. 235.). Ann: Variat fl: rubro et albo:

46. *S. compacta* = Fisch: in Hornem: hort: hafn: I. p. 417. et en: pl: cauc: p. 216. n. 1870. (*Caucas:, Transylv:, Russia*). Ann: Enata in H. Ripul: e seminibus communicatis a cl: MARTIO anno 1827., non nullos characteres præbuit cum diagn: Auctorum haud quadrantes; planta tota *viscoso-villosiuscula*, nec *glabra*, folia inferiora petiolata internodiis longiora *lanceolato-spathulata* nec *lanceolato-linearia*, media subsessilia *late lanceolata* internodio dimidio breviora, superiora *lineari-lanceolata* sessilia internodio 3:4 breviora; an discrimina hæc culturæ tribuenda? In ceteris quadrat. = 47. *S. Atocion* = Murr: syst: ed: 13. p. 421. (*Oriente*). Ann: In specim: meis ex plantis cultis in H. B. T. folia *ciliata* non adparent; apice sunt mucronulata. = 48. *S. Pseudatocion* = Desf: atl: I. p. 353. (*Afr: bor:*, in cultis *Siciliæ* ubique Guss:). Ann: Priori valde affinis, sed petala *integerrima* nec *2-loba*, insuper planta tota *glaberrima* excepto calyce *sub-viscoso villosiusculo*, nec foliis pubescentibus uti in diagn: SPR: syst: II. 410. = 49. *S. sibirica* = Pers: enc: p. 497. (*Sibiria*). Perenn: Specim: imperfectum s. fl: = 50. *S. fruticosa* = L. sp: 597. (*Sicilia* in fissuris rupium locis demissis). Perenn: basi fruticosa. Cult: in H. B. T. = 51. *S. bupleuroides* = L. sp: 598. (*Persia, Armenia*). Perenn: Bracteæ ovato-acutæ margine lato membranaceæ, calyces longe clavati. Specim: perfectissimum ex hb: BELLARDI. = 52. *S. mollissima* = Sm: non Kit: nec DC., Spr: syst: II. 411. (*Asia min: sec: SPR:, Italie maritimis sec: W.*):

Perenn: Cult: in H. B. T. = 53. *S. pauciflora* = DC. Prodr: I. 382. ex Salzmann. (*Corsicæ. Sardinæ*: inter fissuras rupium calcarium in montibus MORIS st: sard: I. p. 8.). Perenn: Folia in specim: ex cl: MORISIO non sunt omnia *spathulato-lanceolata*, sed superiora *linearia*; inflorescentia in veram *paniculam* ramis *simplicibus* 1-3-floris floribus erectis; hinc potius ad hanc sectionem, quam ad 2. SPRENGELII amandanda. = 54. *S. pilosa* = Spr: syst: II. 411. (*Italia. Hungar. Transylv.*). Bienn: Valde affinis priori cum qua confusa videtur a DC. Prodr: I. 382.; differentiae à W. en: 471. sub *Cucubalo* notatæ equidem levissimæ, sed differt etiam sec: SPR: petalis fauce *sub-coronatis* nec *nudis*; præterea ex specim: meis utriusque stirpis paniculae in *mollissima* multo majores adparent, calycesque longiores et magis clavati. = 55. *S. patula* = Desf: atl: I. p. 356. (*Afr: bor. Hungar.*). Perenn: Huc pertinet sec: SPR: *S. nemoralis* a DC. distincta in Prodr: I. 382. Specim: mea ex hb: BIROLI non differunt: etiam *nemoralis* habet caulem quandoque ramosum, ac petala plus minusve 2-fida. = 56. *S. longiflora* = Ehr: beytr: 7. p. 144. (*Hungar. Tauria. Transylv.*). Perenn: Calyces brevissimi: cult: in H. B. T.

* 57. *S. paradoxa* = L. sp: 1673. = Spr: syst: II. 412. = Jacq: h. vind: 3. t. 84. (*Delphinatu. Liguria* in rupibus montanis *Sarzanæ* loco dicto *La nuda e bruna di Ponzano* BERTOL: dec: 2. p. 34.). Perenn: Calyces longissimi; flores magni.

* 58. *S. italica* = DC. fl: fr: IV. p. 753. = Spr: syst: II. 412. = Jacq: obs: 4. p. 12. t. 79. sub *Cu-*

cubalo. Ic: taur: vol. 20. t. 8. (*Gallia, Italia. Pedem:* in dumetis et ad oras sylvarum in collibus *Taurinensisibus* prope *Superga* et *S. Rafaële?* Copiose ad sepes circa *Vico di Mondovì*; circa *Segusium* locis saxosis ALL: n. 1587. RE fl: segus: p. 37. sub *Cucubalo*. In collibus *Verbani* præsertim *di Mejna* non frequens BIROLI fl: acon: I. p. 146.). Perenn: Diligenter illam perquisivisse in collibus *Taurinensisibus* asserit BIROLI in mss: et numquam observare potuisse; cl: RE illam enumerans in fl: segus:, omisit in fl: torin:; ipse numquam inveni.

59. *S. catholica* = Otth: mss: sec: DC. Prodr: I. 378. (*Regno Neapolitano*). Perenn: Huc referunt DC. et SPR: *Cucubalum glutinosum* RETZ, *Silene PERS:*, et *Silenem Mussini* HORNEM: , quas omnes possideo; inter *catholicam* et *glutinosam* non video discrimen; et a cl: GUSSONE etiam conjunctæ fuerunt in plant: rar: p. 175.; immo conjungendam quoque arbitror *S. bassanensem* STERNE: a STEUD: enumeratam et a DG. et SPR: omissam, quæ non differt ex specim: meo nisi foliis magnis sericeis ac floribus *longioribus*; sed illic *S. Mussini* non memorat diligentissimus Auctor, et mihi valde differre videtur foliis *ovatis obtusiusculis* nec *lanceolatis acutis*, panicula majori et potius coarctata quam *laxa*, floribus 2-3-majoribus, calycibus *villosumculis* non *glabris*; hinc puto speciem esse servandam et ita definiendam:

» 60. *S. Mussini* = Caule erecto ramoso villoso, » foliis inferioribus longe petiolatis ovatis obtusius- » culis, mediis sub-sessilibus ovato-lanceolatis, sum- » mis linearibus sub-falcatis, panicula amplissima

» sub-coarctata, calycibus longe clavatis villosiusculis, petalis 2-fidis, genitalibus exsertis. » Nob:

61. *S. reticulata* = Desf: atl: I. p. 350. (*Afr: bor:*). Ann: Eadem ac *S. picta* PERS:, a DC. Prodr: I. 380. disjuncta, quam etiam possideo. = 62. *S. portensis* = L. sp: 600. (*Gallia occid: , Lusitania*). Ann: Huc pertinet sec: SPR: *S. bicolor* THOR: a DC. *picta* et a *portensi* sejuncta; in specim: meis *S. bicolor* folia habet prorsus *linearia*, *S. portensis linear-lanceolata*; in ceteris perfecte quadrant. = 63. *S. stricta* = L. sp: 599. (*Franconia , Gall: austr: , Hispan:*). Ann: Culta in H. Ripul:

*? 64. *S. Muscipula* = L. sp: 601. = SPR: syst: II. 412. = Clus: hist: I. p. 289. f. 1. (*Afr: bor: , Hispan: , Italia*. Inter segetes prope *Antibum* BALE: addit: p. 88.). Ann: Culta in H. B. T.

* 65. *S. inaperta* = L. sp: 600. = SPR: syst: II. 413. = Dill: elth: t. 314. f. 407. Ic: taur: vol. 25. t. 1. 2. (*Eur: austr: Agro Nicæensi* ALL: n. 1577.). Ann: Folia superiora omnia *linearia* nec *lanceolata*; huc spectat *S. polyphylla* DC. fl: fr: IV. p. 750. non L. a SPR: omissa in synon:

66. *S. undulatifolia* = Moris stirp: sard: I. p. 8. (In arvis *Cagliari , Quarto*). Ann: In specim: spontaneo a cl: Auctore communicato præter characteres in ejus diagnosi notatos observantur flores mediocre, calyces glabriusculi colorati 10-striati dentibus brevissimis obtusiusculis, petala brevia purpurea, genitalia inserta. Species optima habitu etiam a ceteris hujus sectionis facile distinguenda. = 67. *S. longicaulis* = Pourr: elenc: H. R. Madr: an: 1803. (*Hispan:*).

Ann: Omissa a SPR: ? Specim: ex BALBISIO quadrat cum phrasi DC. Prodr: I. 375., sed planta admodum dubia.

β Calycibus campanulatis (a).

68. *S. rubella* = L. sp: 600. (*Ægypt:*, *Lusitan:*). Ann: In specim: ex BALBISIO folia sunt vix serrulata nec ciliata uti in diagn: Auctorum. = 69. *S. succulenta* = Delil: fl. eg: t. 29. f. 2. (*Ægypto*). Perenn: Viscido-pubescentia carnosa; paniculæ paucifloræ; calyces longi costati; petala longissime unguiculata 3-partita. Specim: perfecta ex SAVI.

* 70. *S. Otites* = Pers: encb: I. p. 497. = Spr: syst: II. 413. = Engl: bot: t. 85. (*Eur:* fere omni. Pedem: circa Segusium in arenosis fluminis Durite, et in pascuis saxosis sterilibus præsertim collium ALL: n. 1588. RE fl: segus: p. 37. sub *Cucubalo*. Supra Revigliasco et Pecetto BALB: Ad sylvarum oras di Campagnola prope Alpinianum RE fl: torin: I. p. 234. In montuosis della Colma et secus la Tosa ad Domum Ossulæ BIROLI fl: acon: I. p. 146. In provincia Albensi invenit BERTERUS). Perenn: Planta dioica, sed occurrit quandoque hermaphrodita sec: W. sp: II. 689.; variat etiam inflorescentia DC. Prodr: I. 369.

71. *S. volgensis* = Spr: syst: II. 413. (Ad *Volgam*).

(a) Huc referenda esset primo loco *S. alpestris* JACQ: fl: austr: I. p. 60. t. 96. quæ vulgaris dicitur a BIROLI fl: ac: I. p. 147. in glareosis subalpinis uti ad *Intra*; sed neque specim: possideo, nec extat in ipso hb: BIROLI, nec plantam loco indicato inveni, nec eam memorant alii Botanici nostrates.

Perenn: Culta in H. B. T. caulem habet evidenter *pubescentem* (forsan ex cultura) non *glabriuscum* uti in diagn: SPR:; flores parvi. = 72. *S. parviflora* = Pers: enh: I. 497. (*Hungar:*, *Transylv:*). Perenn: Priori valde affinis habitu præsertim, sed folia *angustiora*, panicula *ramosior*, flores *minores*, calyces *sub-sphærici*, genitalia *longius exserta*. = 73. *S. multiflora* = Pers: enh: I. 497. (*Hungar:*, *Transylv:*, *Sibiria*). Ann: Calyces elongati potius *clavati* quam *campanulati*, genitalia longissime exserta.

γ Calycibus ovatis.

74. *S. antirrhina* = L. sp: 600. (*Virginia*). Ann: Panicula pauciflora; flores parvi; calyces striati glabri. = 75. *S. cretica* = L. syst: 421. n. 29. (*Creta*). Ann:

δ Calycibus inflatis.

76. *S. lanuginosa* = Bertol: amæn: it: p. 100. c. descript: et p. 364. (*Ital:*, *Alpib: Apuanis*). Suffrut: Calyx magnus inflato-globosus pubescens. In specim: meis ex BERTOLONIO et GUIDONE ceterum perfectissimis desunt radices quæ intra rupes marmoreas infixæ remanent nec divellendæ juxta observationes cl: BERTOL: l. c.

+++++ *Floribus paniculatis nutantibus.*

α Calycibus clavatis.

77. *S. saxatilis* = M. B. sec: Spr: syst: II. 414. Fisch: en: pl: caucas: p. 215. n. 1860. (*Caucaso*). Specim: mea ex H. B. T. perfecte quadrant cum

diagn: SPR: An eadem ac *S. saxatilis* bot: mag: t. 689.
a DC. enumerata sub *S. nutanti* var: β *glabra*?

* 78. *S. nutans* = L. sp: 596. = SPR: syst: II.
414. = Oed: fl: dan: t. 242. IC: taur: vol. 3. t. 31.
(Eur: fere tota. Pedem: secus prata ad semitas syl-
varum ad muros ubique tum in *Taurinensibus* col-
libus tum in *Subalpinis* ALL: n. 1569. RE fl: segus:
p. 37. et fl: torin: I. p. 235. In agri *Novariensis* pra-
tis siccis vulgaris BIROLI fl: acon: I. p. 147.). Perenn:
Variat statura, pube et florum colore: cons: DC.
Prodr: I. 377. Secus torrentem *Tertigi* dictum non
longe ab oppido *Sassello* in provincia *Aquensi* nasci
singularem hujusce *Silenes* varietatem, foliis ovatis
lucide-virentibus vix sinuatis minus hirsutis, petalis
intus roseis extus fuscis, testatur cl: ALL: in obs. I. c.

79. *S. livida* = W. en: 474. (*Carniola*). Perenn:
A priori, cuius var: habetur a DC. Prodr: I. 378.
mihi non videtur diversa ex specim: perfectissimis
communicatis a BIROLI. = 80. *S. infracta* = Waldst:
et Kit: pl: hung: 3. t. 213. (*Hungaria*). Perenn: A
S. nutanti vix differt caule *infracto*, calycibus lon-
gioribus ac versus apicem magis *clavatis*; an eadem
planta ex auctoritate DG. Prodr: I. 377?

β Calycibus cylindricis.

* 81. *S. viridiflora* = L. sp: 597. = SPR: syst: II.
415. = Herm: parad: 199. t. 199. Guss: fl: sic:
t. 214. (*Lusitania, Tauria, Sicilia*. Pedem: in provin-
cia *Aquensi* ad pagum *Montenotte* dictum ALL: n. 1590.
Circa *Segusium* RE fl: segus: p. 37.). Perenn:
82. *S. chlorantha* = SPR: syst: II. 415. ex Ehr:

(*Marchia Brandeb:*, *Silesia*). Perenn: = 83. *S. gigantea* = L. sp: 598. (*Africa*). Perenn: In specim: meo genitalia petala non superant uti ex diagn: DC. Prodr: I. 370. = 84. *S. viscosa* = Pers: enh: I. p. 497. (*Anglia, Dania, Svecia, Lithuania, Caucaso ad Volgam?*). Bienn: Flores in spicam verticillati magni; petala 2-fida; genitalia longe exserta. Inter plantas caucasicas illam non resert cl: FISCH: = 85. *S. tatarica* = Pers: enh: I. p. 497. (*Tartaria, Russia, Sibir:*). Perenn: Flores in spicam verticillati mediocres; verticilli approximati 4-6-flori, nec *pedunculi secundi* uti in diagn: SPR: syst: II. 415.; calyces glabriusculi; genitalia longe exserta.

γ Calycibus inflatis.

* 86. *S. inflata* = Sm: fl: brit: 467. = SPR: syst: II. 415. = Engl: bot: t. 164. sub *Cucubalo Behen* L. IC: taur: vol. 3. t. 44. (*Eur:* fere omni. *Pedem:* in pratis ubique vulgatissima ALL: n. 1586. RE, BIROLI sub *Cucubalo Behen*. In *Sardin:* pratis et arvis MORIS st: sard: I. p. 8.). Perenn: Huc pertinent species a SPR: in synon: l. c. enumeratæ, inclusa *S. maritima* quæ eadem est ac *Cucubalus alpinus* ALL: sp: pedem: p. 33. t. 5. f. 3. *C. Behen* var: β ALL: n. 1586., exclusa tamen a synon: SPR: *S. angustifolia* DC. quæ satis distincta videtur; an illuc referendus *Cucubalus glaucus* W. en: supp: p. 24. a posterioribus Botanicis omissus? Videtur ex specim: communicato a BIROLI. *S. glauca* ZEA est alia planta ex diagn: DC. Prodr: I. 379.

87. *S. Tenoreana* = Nob: *S. angustifolia* DC. fl:

fr: IV. p. 747. non M. B. Tenor: fl: nap: I. p. 233. Tenor: l. c. t. 38. *S. inflata* var: β DC. Prodr: I. 368. (Regno Neapolit:, Sicilia). Perenn: Optima possideo specim: a cl: TENORE communicata, quæ mihi videntur a priori differre non tantum foliis omnibus *lineari-lanceolatis*, sed etiam floribus *minoribus*, calycibus *ovato-oblongis* minus *inflatis*, genitalibus *brevioribus* ac vix exsertis. Nomen triviale mutavi ne confundatur cum *S. angustifolia* M. B. fl: taur: I. p. 337., quæ servanda tamquam antiquior. = 88. *S. commutata* = Guss: Prodr: fl: sic: I. 499. et fl: sic: t. 212. (In glareosis et rupibus montanis Siciliæ). Perenn: Flores et panicula fere prioris, sed *folia magis carnosa pollicem vel amplius lata apice rotundata*, et *semina omnino diversa* Guss: l. c. in obs: Specim: a cl: Auctore communicata habitum insuper referunt peculiarem.

* 89. *S. Behen* = L. sp: 599. = Spr: syst: II. 415. = Dill: elth: 427. t. 317. f. 409. (Græcia, Asia min: Pedem: in saxosis editissimarum Alpium Monregalensium reperit RE app: alt: p. 197.). Ann: secus RE, perenn: sec: Auctor:

90. *S. fimbriata* = Sims bot: mag: t. 980. (Caucaso, Creta, Sicilia?). Perenn: Culta in H. B. T. An in Sicilia spontanea uti asserit DC. Prodr: I. 367. valde dubito, nam in Prodr: fl: sic: cl: Guss: desideratur. = 91. *S. colorata* = Schousb: ex Horn: h. hafn: I. p. 412. (Marocco, ins: Scio). Ann: Culta in H. B. T.

Silenes dubiae.

92. *S. tinctoria*? Sub hoc nomine ex hb: BIROLI; a *S. sericea* n. 24., quæ multimode variat vix differt calycibus *villosis* nec *glabris*, unguibusque petalorum calycem non *excedentibus*. = 93. *S. retroflexa* = Ex hb: BIROLI sub *Cucubali* genere, sed non quadrat cum planta PERSOONII enh: I. p. 500. quæ est *S. aegyptiacæ* L. var: β a DC. enumerata in Prodr: I. 380., ac a SPR: omissa: an igitur species nova? Hoc casu ita definienda:

» *S. caule* flexuoso ramoso foliisque glabriusculis
 » linear-lanceolatis internodio longioribus, paniculis
 » terminalibus spicatis simplicibus, floribus pedicel-
 » latis erectis, calycibus cylindricis glabris dentibus
 » brevissimis acutiusculis, petalis retroflexis, geni-
 » talibus exsertis (petala ex sicco albida). » NOE:
 Habit:....

94. *S. purpurea* = Sp: nova? Missa sub hoc no-
 mine ex H. Paris: non video ab Auctoribus enumera-
 ratam; habitu valde accedit ad *S. bellidifoliam* n. 26.,
 sed differt inflorescentia in paniculam simplicem co-
 arctatam paucifloram; flores parvi; petala dilute-pur-
 purea. = 95. *S. marginata* = Schott: fil: = Ita in
 scheda ex hb: BIROLI; proxima *S. quinquevulneræ* n. 37.

* 96. *S. lutens* (*Pedemontio*). = Ita in scheda spe-
 cim: ex hb: MOLINERII; sed non indicat neque aucto-
 rem, neque locum ubi lecta fuit; videtur collocanda
 in sect: 6. β; diagnosis hæc erit:

» *S. caule* villoso-hispido angulato, foliis glabrius-
 » culis inferioribus longe petiolatis ovato - oblongis

» mediis lanceolatis summisque linearibus sessilibus,
 » paniculæ ramis brachiatis 2-3-chotomis, floribus
 » nutantibus, calycibus ovato-cylindricis basi viscoso-
 » ciliatis, petalis 2-fidis (petala ex sicco atropurpu-
 » rea). » Nob:

97. *S. dahurica* = Fisch: in litt: (*Dahuria*). Non invenio descriptam et mihi videtur distinctissimam constituere speciem collocandam in sect: 5. γ et ita definiendam:

» *S. glabra*, caule erecto simplici, foliis omnibus linear-i-lanceolatis erectis, panicula simplici spicæ-formi sub-verticillata foliolosa, floribus pedicellatis erectis, calycibus ovato-cylindricis coloratis striatis dentibus acuminatis, genitalibus vix exsertis (petala ex sicco luteola). » Nob: Videtur valde affinis *S. Jeuiscensi* W. ex diagn: SPR: syst: II. 410, sed ex inflorescentia et forma calycis pertinet ad aliam sectionem.

98. *S. coronata*? = Ex hb: BONJEAN sine alia indicatione; a *S. sericea* n. 24. non videtur differre nisi foliis omnibus late spathulatis obtusissimis. = 99. *S. clavæcarpa* = Hornm: indeter:? Ita in scheda specim: ex hb: BIROLI; species elegantissima collocanda in sect: 5. α. Diagnosis hæc erit:

» *S. caule angulato ramoso foliisque sericeo-tomentosis*, inferioribus longe petiolatis lanceolato-spathulatis acutis superioribus lanceolato-linearibus integris sinuatissimis, panicula laxa ramis 1-3-floris, bracteis reflexis pedicello brevioribus, floribus erectis, calycibus longe clavatis striatis glabris, petalis emarginatis, genitalibus longissime exsertis (petala

» ex sicco albescientia). » Nob: Habit:.... = 100. *S. aleppica* = Ex H. B. T.; ita in scheda specim: communicati a MOLINERIO; nullibi invenio enumeratam; proxima mihi videtur *S. Muscipulæ* n. 64. a qua differt tantum foliis *sub-undulatis*, calycibus evidentius *striatis*.

VI. LYCHNIS DC. fl: fr: IV. p. 761. = *Agrostemmae* et *Lychnidis* species Lin: gen: n. 795. 796. = Gaertn: fruct: II. p. 228. t. 130. f. 1. pro *Agrostemma*, p. 229. t. 130. f. 2. pro *Lychnide*.

» *Cal*: tubulosus 5-dentatus basi nudus. *Pet*: 5. un-
» guiculata, fauce nuda vel coronata, laminis indivi-
» sis aut 2-fidis. *Stam*: 10. *Styl*: 5. *Caps*: 1-2-locu-
» laris 5-valvis. »

Obs: Genus alias in 2. divisum præsertim ex laminiis petalorum *integris* in *Agrostemma*, saepius 2-fidis in *Lychnide*, et ex capsula 1-loculari in priori, 1-5-loculari in posteriore; nunc a recentioribus Botanicis conjunctum, et in plures sectiones artificiales divisum; melius antiqua genera pro sectionibus retinenda ad vitandas confusiones; sp: 21. ex DC:, 18. ex SPR: omnes herbaceæ.

† *Agrostemmae*.

α Floribus solitariis.

* 1. *L. coronaria* = Lam: dict: III. p. 643. = Spr: syst: II. 420. = Bot: mag: t. 24. Ic: taur: vol. 3. t. 27. et vol. 13. t. 104. sub *Agrostemma* (*Tauria*; *Eur*: med: *Pedem*: in sylvis cæduis et locis saxosis *Canapiciensium* et *Montisregalensium* ALL: n.

1595.). Perenn: Var: fl: *albo*, *rubro* et *pleno*; ubique culta.

* 2. *L. Githago* = Lam: dict: III. p. 643. = Spr: syst: II. 420. = Fuchs: hist: 127. c. icon: Ic: taur: vol. 3. t. 36. et vol. 22. t. 9. sub *Agrostemma*. Vern: *Cocco* (*Eur*: fere omni. *Pedem*: ubique inter segetes ALL: n. 1593. RE fl: segus: p. 39. et fl: torin: I. p. 244. BIROLI fl: acon: I. 154. *Sardin*: MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann: Dentes calycini lanceolati longissimi; variat floribus rubris vel pallidis DC. Prodr: I. 387. (var: β *nicaensis* W.), et caule quandoque 1-floro ALL: I. c. in obs:

* 3. *L. Cæli rosa* = Desrouss: in Lam: dict: III. p. 644. = Spr: syst: II. 420. = Moris: hist: 2. s. 5. t. 2. f. 32. Ic: taur: vol. 16. t. 9. sub *Agrostemma* (*Eur*: austr:, *Barbaria*, *Oriente*. In comitatu *Nicæensi* ALL: n. 1594. In *Sardin*: pascuis maritimis MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann: Variat præcipue caulis directione et superficie sec: DC. Prodr: I. 386.

* 4. *L. Flos Jovis* = Desrouss: = Spr: syst: II. 421. = Moris: hist: 2. s. 5. t. 36. f. 2. Ic: taur: vol. 15. t. 63. sub *Agrostemma* (*Helvet*., *Germania* occid:, *Ital*: super: *Pedem*: in Alpibus ad rupes frequens locis apricis ALL: n. 1596. *M. Cenisio* RE fl: segus: p. 39. Valle di *Vedro* BIROLI fl: acon: I. p. 154.). Perenn: Folia late lanceolata non lanceolato-linearia ut in diagn: DC. et SPR: ; variat floribus umbellato-capitatis vel paniculato-corymbosis.

†† *Lychnideæ.*

α Floribus solitariis.

5. *L. lœta* = Ait: h. Kew: 2. p. 118. (*Lusitan:*, *Hispan:*, *Corsica*. *Sardin:* in humidis maritimis MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann: Flores valde minores quam in ceteris congeneribus. Huc pertinet *L. corsica* LOISL: quam DC. Prodr: I. 387. distinxit. Specim: mea utriusque stirpis ex cl: BALBISIO et MORISIO non differunt nisi statura majori in *corsica*.

β Floribus aggregatis.

6. *L. grandiflora* = Jacq: coll: I. p. 149. (*China*, *Japon:*). Perenn: Flores elegantissimi ampliores quam in ceteris congeneribus. Culta in hortis ornamenti gratia. = 7. *L. sibirica* = L. sp: 626. (*Sibiria*, *Dahuria*). Perenn: Flores parvi; folia non prorsus *linearia* sed *lineari-lanceolata*: specim: ex cl: FISCHERIO.

* 8. *L. dioica* = L. sp: 626. = Spr: syst: II. 421. = Engl: bot: t. 1579. pro var: *fl: rubrō*, t. 1580. pro var: *fl: albo*. Ic: taur: vol. 3. t. 38. Vern: *Orie d' gat* (*Eur:* fere omni. In *Pedem:* var: α ad radices Alpium in irriguis umbrosis ad fontium scaturigines præcipue frequens est; var: β ubique obviam venit in agro *Pedemontano* ad sepes, fossas et semitas ALL: n. 1592. RE *fl: segus*: p. 39. et *fl: torin:* I. p. 245. In *sylvis della Mandria*, prope *Monastero* in valle *Lancei*, et in regione dicta *le Crosie*, neque rara in pratis alpinis *della valle d' Ala* RE app: alt: p. 198. sub *L. sylvestri*. In pratis pinguibus agri *Novariensis* BIROLI

fl: acon: I. p. 155. *Sardin*: ad sepes MORIS st: sard: I. p. 7.). Perenn: Variat statura, colore et plenitudine florum, nec non raro floribus hermaphroditis: var: β fl: *albo* quam cl: DC. Prodr: I. 386. habet pro *annua* et pro stirpe distincta a *L. sylvestri* Hor: (*L. vespertina* SIBTH, *alba* MILL:). est reapse perennis uti saepius observavi in plantis tum spontaneis cum cultis; ceteri characteres nimis fallaces ad speciem constituendam.

* 9. *L. Flos Cuculi* = L. sp: 625, = Spr: syst: II. 421. = Lam: ill: t. 391. Ic: taur: vol. 3. t. 45. Mill: ic: 169. f. 2. pro var: fl: *pleno* (Eur: fere omni. Pedem: in pratis irriguis frequens ALL: n. 1589. RE, BIROLI ll. cc. In *Sardin*: pratis humidis MORIS st: sard: I. p. 7.). Perenn: Varr: fl: *rubro*, *albo*, et *pleno*; hæc colitur in hortis.

10. *L. fulgens* = Fisch: in Sims bot: mag: t. 2104. (Sibir:). Perenn: Planta elegans floribus amplis atropurpureis. Culta in H. Ripul: = 11. *L. chalcedonica* = L. sp: 625. (Asia min:, Japon:). Perenn: Variat colore et plenitudine florum; ubique culta ad ornamentum.

* 12. *L. alpina* = L. sp: 626. = Spr: syst: II. 422. = Hall: helvet: n. 922. t. 17. f. 4. Ic: taur: vol. 13. t. 101. f. 1. (Helvet:, German: occid:, Pyrenæis. Pedem: in pratis alpinis della Vanvesa, Alpre, Courmajour, atque in editis jugis inter Ceresole et Augustam Prætoriam, in catena Alpium di Grassonet, valle di Tigna, et M. Cenisio ALL: n. 1592. RE fl: segus: p. 39. In summis pratis M. Rosæ BIROLI fl: acon: I. p. 154.). Perenn: Variat statura minori, cau-

libusque minus cæspitosis prout in locis editioribus crescit; in *M. Cenisio* legi ad nivem deliquescentem plantulas vix digitales caulibus solitariis læte florentibus.

* 13. *L. Viscaria* = L. sp: 625. = Spr: syst: II. 422. = Clus: hist: I. p. 289. f. 2. (Eur: fere tota. Pedem: in collibus locis aridis soli expositis ad oras sylvarum ALL: n. 1590. RE fl: segus: p. 39. In sylvis della Mandria, et prope Supergam RE fl: torin: p. 244.). Perenn: Flores potius racemosi quam fasciculati; colo in H. Ripul: var: fl: pleno valde raram ab Auctoribus haud enumieratam.

Lychnides dubiae.

14. *L. parciflora*? Ita in scheda specim: missi a cl: BALBISIO: optime quadrat cum *L. pauciflora* quæ est *L. apetalæ* var: β DC. Prodr: I. 386. = 15. *L. incarnata*? Enata e seminibus missis a cl: BALBISIO sub hoc nomine mihi non videtur differre a *L. Cæli rosa* n. 3. nisi caule ramosissimo, statura majori, floribus pallidioribus; an ejusdem varietas altera ex cultura? = 16. *L. capensis* sp: nova ex horto Parisiensi olim accepta. = Ita in scheda ex hb: BELLARDI. Comparata cum ceteris hujusce generis stirpibus videtur differre, et ad sect: 2. α referenda; diagnosis hæc erit:

» *L.* caule erecto sub-1-floro glanduloso-villoso,
» foliis lanceolato-spathulatis obtusiusculis ciliatis, flo-
» ribus erectiusculis, calycibus ovato-cylindricis vis-
» coso-glandulosis 10-striatis brevi-dentatis, petalis
» sub-integris fauce coronatis (ex sicco atropurpu-

» reis). » Nob: Habit:... An *Silene capensis* DC. Prodr: I. 379. ? Sed perfecte non quadrat.

VII. VELEZIA Lin: gen: n. 448. = Gaertn: fr: II. t. 129.

» *Cal:* tubulosus cylindricus 5-dentatus basi nudus.
 » *Pet:* 5. parva unguiculata unguibus barbatis. *Stam:*
 » 5-6. *Styl:* 2. *Caps:* 1-locularis apice 4-valvis pla-
 » centa filiformi centrali seminibus subalternis tecta. »

Obs: Genus 2. constans stirpibus ab affinibus satis
 distinctum numero staminum et seminum situ; herbæ
 humiles.

* 1. *V. rigida* = L. sp: 474. = Spr: syst: I. 866.
 = Lam: ill: t. 186. (*Eur: austr:, Cretæ, Afr: bor: In*
sterilibus ad limites agrorum Nicææ All: n. 1563.).
Ann:

VIII. DRYPIST Lin: gen: n. 519. = Gaertn. fruct: II. t. 128.

» *Cal:* tubulosus ovatus 5 - dentatus basi nudus.
 » *Pet:* 5. unguiculata fauce 2-dentata limbo 2-par-
 » tito. *Stam:* 5. *Styli* 3. (*stylus 1-3-partitus GAERTN:*).
 » *Caps:* 1 - locularis supra medium dehiscens sub-1-
 » sperma. »

Obs: Genus habitu proprio constans sola specie se-
 quenti.

1. *Dr: spinosa* = L. sp: 390. (*Istria, Ital:, Mau-
 ritania*). Bienn:

TRIB: II. *Alsineæ*
 (DC. Prodr: I. 388.)

IX. ORTEGIA Lin: gen: n. 33. = Gaertn: fr: II. t. 129.

» *Cal:* 5 - sepalus sepalis basi coalitis. *Corolla* o.
 » *Stam:* 3. *Styl:* 1. *Caps:* 1-locularis ovata apice 3-
 » valvis polysperma. *Sem:* fundo capsule adfixa. »

Obs: Genus constans tantum 2. sequentibus stirpibus herbaceis.

1. *O. hispanica* = L. sp: 49. (*Hispan:*, *Mauritania*). Perenn:

* 2. *O. dichotoma* = All: misc: taur: 3. p. 176.
 = Spr: syst: I. 180. = Ic: taur: vol. 19. t. 54. (*Hispan:*? *Pedem:* circa *Giaveno* All: n. 261. Re fl: segus: p. 9.). Perenn: Priori valde affinis adeo ut cl: DC. dubitet an sit distincta (Prodr: I. 388.); videtur tamen admittenda præsertim ex inflorescentia in paniculas 2-3-chotomas elongatas laxas floribus distantibus.

X. BUFFONIA Lin: gen: 225. = Gaertn: fruct: II. t. 129.
 f. 1. = Lam: ill: t. 87.

» *Cal:* 4-partitus. *Cor:* 4-petala. *Stam:* 4. *Styl:* 2.
 » *Caps:* 1-locularis 2-valvis 2-sperma. »

Obs: Genus constans 4. stirpibus herbaceis humilibus floribus interdum 2-3-andris ex GAERTN:

* 1. *B. annua*. = DC. fl: fr: IV. p. 768. = Spr: syst: I. 490. = Lam: ill: t. 87. f. 1. sub *B. tenuifolia* (*Gall:* austr:, *Anglia*, *Tauria*. *Pedem:* in pascuis sterilibus comitatus *Nicæensis* frequens est; nascitur

etiam circa *Oulx* atque in valle *Queiras* ALL: n. 867.
sub *B. tenuifolia*). Ann:

XI. SAGINA Lin: gen: n. 236. = Gaertn: fruct: II. t. 129.
= Lam: ill: t. 90.

» *Cal*: 4-partitus. *Pet*: 4., rarius o. *Stam*: 4. *Styl*:
» 4. *Caps*: 1-locularis 4-valvis (evalvis in *S. erecta*
» et *cerastoidea*) polysperma. »

Obs: Genus constans 6. speciebus ex SPR: excluso
Moenchiæ genere EHR: , 10. ex DC. inclusa *Moen-*
chia, cuius habitus idem, differens tantum capsula
evalvi, ex quo optima sectio constitui potest. Divi-
siones organorum floralium quandoque 5. ex DC. Her-
bulæ floribus sub-solitariis.

† *Capsula 4-valvi*.

* 1. *S. procumbens* = L. sp: 185. = Spr: syst: I.
497. = Engl: bot: t. 880. (*Eur*:, *Asia*, *Amer*:, *Afr*:
bor: *Pedem*: in umbrosis ad vias muscosis locis sub-
humidis ALL: n. 868. Prope *Supergam*, *Montemcale-*
rium, et *Planiciam* RE fl: torin: I. p. 110. et fl: segus:
p. 17. In umbrosis *di Intra* et circa *Novariam* BIROLI
fl: acon: I. p. 54. In arvis *Sardin*: MORIS st: sard: I.
p. 8.). Ann:

* 2. *S. apetala* = L. mant: p. 559. = Spr: syst:
I. 497. = Arduin: p. 22. t. 8. f. 1. (*Eur*: *Pedem*:
in glareosis secus flumina in agro *Taurinensi* ALL: n.
870. Prope *la Cittadella* ac in pascuis prope *Sturam*
RE fl: torin: I. p. 110. In aridis circa muros RE fl:
segus: p. 17. In glarcosis *Ticini* et ad rupes collium
præsertim *di Maggiora* BIROLI fl: acon: I. p. 110. In

Sardin: pascuis humidis MORIS st: sard: I. p. 7. *Genuæ* ubique in moeniis maritimis BERTOL: am: ital: p. 130.). Ann: Petala non semper desunt, saepius obsoleta.

3. *S. filiformis* = Pourr: chlor: hisp: n. 593. (*Pyrenæis, Calabr:*). Ann: Differt a *S. procumbente* cum qua saepè confunditur sec: R. et S. syst: III. p. 499; caulinis pedunculisque *erectis*, statura *minori*, laci- niis calycinis *acutis*.

†† *Capsula evalvi.*

* 4. *S. erecta* = L. sp: 185. = Spr: syst: I. 497. sub *Moenchia quaternella* = Engl: bot: t. 609. (*Eur: med:, Anglia. Pedem:* in pascuis collium *Taurinens: ALL:* 869. Prope la *Cittadella* BALBIS: In arvis ma- cilenitis prope *Caselette* RE fl: segus: p. 17. In pascuis glareosis *Aconitæ* abundat BIROLI fl: acon: I. p. 55.). Ann:

XII. MOEHRINGIA Lin: gen: n. 264. = Gaertn: fruct: II. t. 129. = Lam: ill: t. 314.

» *Cal:* 4-partitus. *Pet:* 4. *Stam:* 8. *Styl:* 2. *Caps:* » 1-locularis 4-valvis polysperma. »

Obs: Genus constans 3. stirpibus ex DC., 1. tan- tum ex SPR: , habitu *Saginæ.*

* 1. *M. muscosa* = L. sp: 515. = Spr: syst: II. 246. = Lam: ill: t. 314. Ic: taur: vol. 19. t. 4. f. 1. (*Eur: med: et austr: Pedem:* in umbrosis sub-humi- dis vel ad umbrosas rupes locis montanis et subal- pinis ALL: n. 1026., RE fl: segus: p. 33. In monte *Musiné*, prope *Venariam*, et sec: *Sturam* RE fl: torin:

I. p. 220. In campis cretaceis *della Bicocca* prope Novariam BIROLI fl: acon: I. p. 133.). Perenn:

* 2. *M. sedoides* = Balb: misc: bot: p. 20. = DC. Prodr: I. 390. sub *M. sedifolia*. = Balb: l. c. t. 5. f. 2. (*Pedem*: in alpib: *Tendæ* BALB: l. c.). Perenn: Omissa a SPR:; differt a priori foliis lanceolatis acutis non linearibus, inferioribus sub-imbricatis, omnibus margine sub-revolutis, laciniis calycinis striatis acutissimis; figuram W. a DC. citatam non vidi; characteres supra allati constanter observantur in specim: meis loco natali lectis; hinc diagnoses amandanda ut sequitur:

» *M. muscosa* = foliis linearibus enervibus planis,
» laciniis calycinis lanceolatis laevibus acutiusculis. »

Nob:

» *M. sedoides* = foliis lanceolatis acutis 1-nervibus marginé sub-revolutis inferioribus sub-imbricatis, laciniis calycinis ovato-oblongis striatis acutissimis. » Nob:

XIII. ELATINE Lin: gen: n. 685. = Gaertn: fr: II. t. 112. = Lam: ill: t. 320.

» *Cal*: 3-4-partitus. *Pet*: 3-4. inunguiculata. *Stam*: petalorum numero æquali vel duplo. *Styl*: 4. *Caps*: 4-locularis 4-valvis polysperma. »

Obs: Genus constans 3-4 stirpibus herbaceis aquaticis humillimis.

* 1. *E. hexandra* = DC. ic: pl: rar: I. p. 14. = Spr: syst: II. 261. sub *E. tripetala*. = Bellard: act: Ac: Taur: 1808. c. ic: sub *Birolia paludosa* (Eur: inundatis. *Pedem*: in locis paludosis agri Vercellensis

et *Novariensis*, speciatim in oryzariis vetustis et permanentibus BELLARDI l. c.). Perenn: Characteres a cl: BELLARDIO desumpti ex numero staminum ad novum genus constituendum levissimi; aliæ enim *Elatines* species variant staminibus juxta petalorum numerum.

* 2. *E. Alsinastrum* = L. sp: 527. = Spr: syst: II. 261. = Vaill: bot: par: 6. t. 1. f. 6. (Eur: aquis. Pedem: circa lacus Eporediensis provinciæ, uberioris circa lacum di S. Michele et di Magon ALL: n. 1027.). Perenn:

XIV. PHARNACEUM *Mollugo* et *Pharnaceum* Lin: gen: n. 139. 517. = Gaertn: fr: II. t. 130.. = Lam: ill: t. 52. *Mollugo*, t. 214. *Pharnaceum*.

» *Cal*: 5-partitus. *Pet*: o. *Stam*: 5. abortu sæpe 3.
» *Styl*: 3. *Caps*: 3-locularis 3-valvis polysperma. »
Obs: Genus constans stirpibus 33. ex DC., 27. ex SPR: nunc divisum in 2. sectiones pro antiquis generibus *Molluginis* et *Pharnacei*, quorum habitus identicus, numero tantum staminum forsitan abortu diversis; herbae annuae raro suffruticosæ.

† *Floribus pentandris* (*Pharnaceum*).

1. *Ph: Mollugo* = L. mant: p. 561. (Ind: orient:). Ann: *Mollugo Spergula* L. sp: et DC. = 2. *Ph: Cerriana* = L. sp: ed: I. p. 272. (Eur: austr: , Afr: , Asia med:). Ann:

†† *Floribus triandris* (*Mollugo*).

3. *Ph: verticillatum* = Spr: syst: I. 949. L. sp: 131. sub *Mollagine* (Ind: occid:). Ann:

XV. HOLOSTEUM Lin: gen: n. 136. = Gaertn: fr: t. 130.
excl: specie.

» *Cal*: 5-sepalus. *Pet*: 5. denticulata. *Stam*: 2-5.
» *Styl*: 3. *Caps*: 1-locularis apice in 6. dentes de-
» hiscens polysperma. *Embryo* intra albumen repli-
» catus. »

Obs: Genus constans stirpibus 4-5. saepius trian-
dris, interdum (in *H. diandro*) diandris, quandoque
(in *H. umbellato*) 4-5-andris.

1. *H. diandrum* = Swartz prodr: 27. (*Jamaica*).
Ann:

* 2. *H. umbellatum* = L. sp: 130. = Spr: syst:
I. 363. = Lam: ill: t. 51. f. 1. (*Eur: Pedem*: in ar-
vis collinis vulgare ALL: n. 1697. In vineis vallis
di Sassi tum etiam ad muros vinearum meridiem spe-
ctantes versus *Pecetto*, ad muros *del parco della*
Veneria RE fl: torin: I. p. 89. In declivibus collium
Verbani frequens BIROLI fl: acon: I. p. 39. In colli-
bus *Albensibus* legit BERTERUS). Ann: Variat flor: al-
bidis vel roseis.

XVI. SPERGULA Lin: gen: n. 798. = Gaertn: fr: II: t.
130. = Lam: ill: t. 392.

» *Cal*: 5 - partitus. *Pet*: 5. *integra*. *Stam*: 5 - 10.
» *Styl*: 5. *Caps*: 1-locularis apice dentibus profundis
» dehiscens polysperma. *Sem*: marginata. »

Obs: Genus constans 14. stirpibus ex DC., 9. tan-
tum ex SPR: ceteris vel omissis vel cum aliis conjunctis.

* 1. *Sp: arvensis* = L. sp: 630. = Spr: syst: II.
422. = Lam: ill: t. 392. f. 1. Ic: taur: vol. 10. t. 88.

(*Eur.*, *Amer.* bor: et austr: *Pedem:* in arvis omnino vulgatissima ALL: n. 1734., RE, BIROLI. In *Sardin:* arvis MORIS st: sard: I. p. 8.). Ann:

* 2. *Sp: pentandra* = L. sp: 630. = Spr: syst: II. 422. = Lam: ill: t. 392. f. 2. (*Eur:* *Pedem:* BALBIS: el: stirp: rar: p. 7. In *Sardin:* arenosis MORIS st: sard: I. p. 8.). Ann:

* 3. *Sp: nodosa* = L. sp: 630. = Spr: syst: II. 422. = Engl: bot: t. 694. (*Eur:* paludosis. *Pedem:* in campis *di Mosezzo* et *Proh* rarissime occurrit inter segetes BIROLI fl: acon: I. p. 156.). Perenn: Specim: mea ex BALBISIO omnia glabra nec *pubescens-glandulosa* ut in *Sp: glandulosa* BESS: quam cl: SPR: cum *nodosa* confundit. Cons: DC. Prodr: I. 394. n. 12.

* 4. *Sp: glabra* = W. sp: II. p. 821. = Spr: syst: II. 422. = All: pedem: t. 64. f. 1. sub *Sp: saginoides*. Ic: taur: vol. 19. t. 4. f. 2. (*Eur:* *Pedem:* in herbidis umbrosis pascuis Alpium sæpe occurrit; copiosissime supra thermas *Valdesii* ALL: n. 1735. In pascuis *d'Allagna* et *Magnæ vallis Ossulæ* frequenter observavit BIROLI fl: acon: I. p. 157.). Perenn: *Sp: saginoides* L. sp: 631., quam cl: ALLIONIUS hic refert, differt radice *annua* et petalis sepala vix *æquantibus* nec *superantibus*; hanc quoque dicit BIROLIUS spontaneam in glareosis apricis vallis *di Vedro* et in illis *di Cerano* versus *Ticinum* (fl: acon: I. p. 156.); et in *M. Cenisio* aliisque sterilibus locis nostrarum Alpium inventam etiam fuisse a BELLARDIO tradit RE reliq: Bellard: p. 3.

5. *Sp: pilifera* = DC. fl: fr: IV. n. 4391. (In montibus editioribus *Corsicæ*; in editioribus pascuis mon-

tium *Sardin*: mediæ MORIS st: sard: I. p. 8.). Perenn: ? Specim: mea ex MORISIO perfecte non quadrant cum diagnosi Auctorum; folia recte dici non possunt *opposita* sed prorsus *fasciculata*, nonnulla tantum *aristata*, cetera *subulata*; planta tota valde *cæspitosa*, vix *digitalis*; petala calycem *subæquantia*, nec duplo majora. An igitur species distincta? Judicent Botanici utrum admittenda, quo casu illam sollertissimo detectori dico, et ita definio:

» *Sp: Morisii* = Caulibus cæspitosis repentinibus humilimis, foliis fasciculatis rigidiusculis glabris aristatis. vel saepius subulatis, pedunculis erectis filiformibus nudis 1-floris, petalis calycem subæquantibus. » NOB:

Obs: Ludit inter *Sp: subulatum* SWARTZ et *piliferam* DC.; differt autem præcipue a prima statura minori, foliis glabris nec *sub-pilosis*, pedunculis *nudis* nec *foliosis*; ab altera characteribus supra allatis.

6. *Sp: subulata* = Swartz act: holm: 1789. p. 45. (In sabulosis humidis Eur: In pascuis montanis *Sardin*: MORIS st: sard: I. p. 8.). Perenn: ? Specim: ex MORISIO e quibus depromptæ differentiæ a prioribus.

XVII. DRYMARIA W. hb: ex R. et S. syst: V. p. 31.

» *Cal:* 5-partitus. *Pet:* 5. 2-fida. *Stam:* 5. *Styl:* 3. » *Caps:* 1-locularis 3-valvis sub-polysperma. *Embryo* » periphericus sub-annularis. »

Obs: Genus vix ab *Holosteo* diversum constanti staminum numero, et embryonis forma; herbæ diffusæ ramosæ habitu proprio; species 5. ex DC. et SPR:

i. *Dr: cordata* = W. hb: ex R. et S. syst: V. p.

406. (*Amer: tropic:.*) Ann: Specim: mea ex hb: BIROLI folia gerunt a medio ad apicem æqualiter *acuto-denticulata*, nec simpliciter *mucronata* ut in iconē LAM: ill: t. 51. f. 2. et diagnosi Auctorum; ceterum quadrant.

XVIII. STELLARIA Lin: gen: n. 773. = Gaertn: fruct: II. t. 130. = Lam: ill: t. 378.

» *Cal:* 5 - partitus. *Pet:* 5. 2-fida raro 5-partita.
» *Stam:* 10. vel abortu pauciora. *Styl:* 3. *Caps:* 1 -
» locularis apice 6-valvis polysperma. »

Obs: Genus constans 56. specieb: ex DC., 40. ex SPR: determinatione et divisione difficillimis ob analogiam inter se et cum *Arenariis*.

* 1. *St: nemorum* = L. sp: 603. = Spr: syst: II. 396. = Engl: bot: t. 92. Ic: taur: vol. 12. t. 19. (*Eur: Pedem:* locis umbrosis et rupestribus ad radices montium et alpium ALL: n. 1719. In *M. Cenisio* RE fl: segus: p. 37. In sylvis *della Vesca* prope *Novariam* BIROLI fl: acon: I. p. 148.). Perenn: Panicula pubescens sec: SPR: ? glabram semper vidi.

* 2. *St: media* = Smith fl: brit: p. 473. = Spr: syst: II. 392. = Engl: bot: t. 537. Lam: ill: t. 214. sub *Alsine*. Ic: taur: vol. 23. t. 98. Vern: *Paperonia* (*Eur:*, *Amer:* bor: *Pedem:* ubique in hortis et arvis ALL: n. 1698., RE, BIROLI sub *Alsine*. In *Sardin:* ad vias MORIS st: sard: I. p. 8.). Ann: Huc pertinet *St: latifolia* PERS: quam in nemoribus *della Mandria* speciatim invenit cl: RE.

* 3. *St: Bertolæ* = Caule erecto simpliciusculo,
» foliis ovatis denticulatis acuminatis sub - amplexi-

» caulis, floribus 5-andris, seminibus rugoso-aculeatis. » Not: (Primovero in pratis pinguibus prope *Taurinum* reperit cl: BERTOLA). Ann: Priori valde affinis, cuius forsitan var: differt tamen caule erecto simpliciusculo nec procumbente ramoso, foliis angustioribus omnibus sessilibus sub-amplexicaulibus denticulatis, seminibus aculeatis nec rugosis tantum.

* 4. *St: cerastoides* = L. sp: 604. = Spr: syst: II. 393. = Engl: bot: t. 911. Vill: delph: 3. p. 645. t. 46. sub *Cerastio trigyno* (Alpib: Eur: med:, Anglia. Pedem: locis humidis summarum Alpium editiorum et frigidarum; copiose in monte *Magni S. Bernardi* prope cænobium ALL: n. 1728. sub *Cerastio refracto* c. descriptione. In summis jugis Alpium di *Formazza* et ad *Turlum* versus vallem *Anzasca* BIROLI fl: acon: I. p. 149.). Perenn: Ad *Cerastium trigynum* pertinere hanc stirpem jam dubitaverat cl: ALLIONIUS (auct: n. 1728.), ac confirmarunt DC. et SPR:

* 5. *St: uliginosa* = Smith engl: bot: t. 1074. = Spr: syst: II. 393. = Curt: lond: t. 28. (Eur: palud: Pedem: ad rivulos aquarum lente fluentium in collinis et montanis non infrequens, copiosissime circa thermas *Valdesii* ALL: n. 1720. sub *St: hypericifolia*; in rivulo inter *Cerundam* et caseale dictuni dei Merlo RE fl: torin: I. p. 237. sub *St: Alsine*. In fossis oryzarum BIROLI fl: acon: I. p. 148. sub *St: Alsine*). Ann: Sub *St: aquatica* DC. Prodr: I. 398.: variat caule simpliciusculo vel ramosissimo, foliisque plus minusve angustis. Vid: infra n. 12.

* 6. *St: holostea* = L. sp: 711. = Spr: syst: II. 393. = Engl: bot: t. 511. (Eur: Pedem: circa la-

Perosa, supra *Giaveno*, ad oras sylvarum in collibus *Taurinensibus*, supra *Riaje* et in comitatu *Astensi* ALL: n. 1721. Supra *Javenum* eundo al *Col della Rossa* RE fl: segus: p. 37. In nemoribus *della Mandria* et *del Parco* prope *Venariam* atque secus *il rio di Sassi* RE fl: torin: I. p. 236. In nemoribus et sepibus provinciae *Novariensis* BIROLI fl: acon: I. p. 148. Prope *Albam Pompejam* BERTERUS). Perenn: *Variát* foliis pendunculisque *glabris* vel *scabriusculis*.

7. *St: bulbosa* = Wulf: in Jacq: coll: 3. p. 21. (Alpib: *Carinthiæ*). Perenn:

* 8. *St: graminea* = L. sp: 604. = Spr: syst: II. 394. = Engl: bot: t. 803. Ic: taur: vol. 19. t. 13. f. 1. (*Eur:*, *Amer:* bor: *Pedem:* in pascuis humidis inundatis frequens ALL: n. 1722. Secus *il Sangone* RE fl: segus: p. 37. Ad rivulum prope *l'Ergastolo*, ad fossas secus viam *Ripularum*, in sylvis *Stupinixii* et *della Mandria* RE fl: torin: I. p. 236. Ad arvorum margines *della Bicocca* prope *Novariam* ubique BIROLI fl: acon: I. p. 148.). Perenn:

* 9. *St: glauca* = With: bot: arrang: I. p. 420. = Spr: syst: II. 394. = Engl: bot: t. 825. (*Eur:* humidis. *Pedem:* in sylvis *della Mandria* BALB: , RE fl: torin: I. p. 237. sub *St: palustri* RETZ, W.). Perenn: Vix a priori diversa foliis glaucescentibus angustioribus et longioribus, petalis calycem paullo superantibus.

* 10. *St: viscosa* = M. B. fl: taur: I. p. 342. = Spr: syst: II. 394. = Waldst: et Kit: pl: hung: I. t. 22. (*Tauria*, *Caucaso*, *Persia*. *Pedem:* in sylvis *di Collengo* prope *Duriam* reperit RE app: 3. p. 9.) Ann: Valde dubia.

11. *St: saxifraga* = Bertol: amæn: ital: p. 88. (Al-pib: *Apuanis*. *Sardin*: in rupestribus *Tonneri d'Irgini* MORIS st: sard: I. p. 8.). Perenn: Specim: sardoa ex MORISIO fere glabra, pedunculi solitarii, quod obser-vavit etiam cl: BERTOLONIUS in macrioribus plantis.

Stellariæ dubiæ.

* 12. *St: tenella* = Bellard: hb: sine alia indica-tione. Plantula digitalis habitu *St: uliginosæ* cuius forsitan var:, sed statura valde minor, pedunculi con-stanter *axillares solitarii* numquam *terminales* vel *co-rymbosi*, capsulæ calycem æquantes nec superantes.

» *St: caule humili erecto filiformi simplicissimo;*
 » *foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, pedunculis*
 » *axillaribus solitariis folio brevioribus, petalis calyce*
 » *brevioribus, capsulis calycem æquantibus.* » Nob:
 (Agro *Vercellensi* ex *BELLARDI*).

XIX. ARENARIA Lin: gen: n. 774. = Gaertn: fr: II. t. 130.
 = Lam: ill: t. 378.

» *Cal: 5 - sepalus. Pet: 5. integra. Stam: 10. vel*
 » *abortu pauciora. Styl: 3. Caps: 1-locularis apice*
 » *3-5-6-valvis, polysperma.* »

Obs: Genus vix a *Stellaria* distinctum præsertim la-mina petalorum *integra* nec *2-fida*, ac loculorum nu-mero vario, constans 140. stirpibus ex DC., 116. ex SPR:, hinc difficillime determinandum quod ad præ-cisos tum generis, cum stirpium characteres. Usque dum de novo elaboretur, divisiones SPR: admitti pos-sunt.

* *Foliis planis exstipulatis.*

† *Latioribus, subrotundis, oblongis.*

α *Oppositis vel sparsis.*

1. *Pedunculis solitariis.*

* 1. *A. trinervia* = L. sp: 605. = Spr: syst: II. 895. = Oed: fl: dan: t. 429. (Eur: Pedem: in umbrosis ad oras sylvarum All: n. 1700., RE fl: segus: p. 37. Prope Venariam secus Cerundam RE fl: torin: I. p. 238. Ad radices montium præsertim di Vogogna BIROLI fl: acon: I. p. 149. In Sardin: sylvis montium MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann: Folia opposita ciliata.

2. *A. peploides* = L. sp: 605. (In sabulosis maritimis Ocean: boreal:). Perenn: Folia opposita crassiuscula.

* 3. *A. biflora* = L. mant: 71. = Spr: syst: II. 895. = All: pedem: t. 44. f. 1. et t. 64. f. 3. Ic: taur: vol. 15. t. 91. f. 4. (Alpib: Eur: med: Pedem: abunde inter *M. Cenisium* et *S. Bernardi*, ac Sabaudiae Alpibus in summis jugis ad nivem deliquescentem All: n. 1699. In *M. Cenisio* loco dicto l'Eau blanche et in parvo *M. Cenisio* RE fl: segus: p. 37. In alpib: provinciae Novariensis BIROLI fl: acon: I. p. 149.). Perenn: Folia opposita, sub-imbricata, sessilia, nummulariformia, parva.

4. *A. balearica* = L. syst: ed: 12. app: 230. (Ins: Balear:, Corsica. In Sardin: umbrosis montanis MORIS st: sard: I. p. 7.). Perenn: Priori affinis, sed humi-

lior, valde cæspitosa, folia brevi petiolata, pedunculi longissimi constanter 1-flori.

* 5. *A. ciliata* = L. sp: 608. = Spr: syst: II. 369. = Jacq: coll: I. p. 245. t. 16. f. 1. Ic: taur: vol. 18. t. 31. (Alpib: Eur: med: , *Hibernia, Islandia, Ægypto? Pedem:* ad saxosa summarum Alpium præcipue *Fenestrellarum*, *M. Cenisii* et vallis *di Viù* nec non alibi frequens ALL: n. 1701., Re fl: segus: p. 37. In Alpib: supra *Limone* reperit BELLARDI). Perenn: Folia opposita, ciliata vel glabra in var: β (*A. multicaulis* DC. Prodr: I. 411.): possideo specim: lecta a BELLARDI supra *Limone* et in *Ægypto* a DONAT: sub nomine *A. multicaulis* quæ a specim: pedemontanis non differunt nisi foliis glabris nec ciliatis, paullo remotioribus ac angustioribus.

6. *A. hispanica* = Spr: syst: II. 396. (*Hispania*). Specim: ex BALBISIO pedunculos referunt non prorsus lanatos sed puberulos tantum uti sepala, petala vix calycem superantia; ceterum quadrant cum diagn: Auctorum.

* 7. *A. serpyllifolia* = L. sp: 606. = Spr: syst: II. 396. = Engl: bot: t. 923. (Eur: , Amer: hor: Pedem: ad muros circa urbem et pagos locis aridis ubique ALL: n. 1702. Prope Segusium alle Blaccie RE fl: segus: p. 37. Ad muros etiam urbis Novariæ BIROLI fl: acon: I. p. 149. In Sardin: montanis MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann:

β Foliis imbricatis.

* 8. *A. tetraquetra* = L. sp: 605. = Spr: syst: II. 397. = All: pedem: t. 89. f. 1. (Gallia austr: ;

Hispan: Pedem: in montibus Tendæ locis siccis All: n. 1718. c. descript:). Perenn: Caules et folia equidem *aspera* sed non *pilosa* uti adparent ex iconæ All: ceterum optima. Cons: insuper GAY in ann: sc: nat: t. 3. p. 27. et icon: t. 3. et 4.

†† Foliis angustis.

9. *A. procumbens* = Vahl: symb. I. p. 50. (*Afr: bor:, Ægypt:, Hispan: austr: In Sardin: arenis maritimis MORIS st: sard: I. p. 7.*). Perenn: Specim: sardoa ex MORISIO optime quadrant cum descriptionibus Auctorum et pertinent ad var: β *floribus albis* (*A. Bartolotti Tin:*): *huc spectat quoque A. rosea* PRESL: sec: SPR: c. p. 181. quam possideo ex hb: BELLARDII a BALBISIO communicatam. Cons: tamen GUSSONI Prodri: fl: sic: I. p. 510. ubi synon: PRESL: non refert.

*? 10. *A. montana* = L. amæn: IV. 272. non All: = SPR: syst: II. 398. = Vent: h. Cels: t. 34. (*Gal: occid:, Hispan: Monte Cenisio?* In monte *Turlo* BIROLI fl: acon: I. p. 149. *A. montana* All: n. 1705. pertinet ad *capillaceam*. Vid: infr: n. 32.). Perenn: Possideo sub hoc nomine specim: lecta in *M. Cenisio* a BERTERO quæ perfecte quadrare videntur cum description: Auctorum. Notavi tamen hanc stirpem tamquam indigenam cum dubitationis signo eo quod illam haud videam enumeratam in operibus nostrorum Botanico-rum, excepto BIROLIO qui tradit illam ex *M. Turlo* retulisse cl: CARESTIAM.

* 11. *A. lanceolata* = All: pedem: n. 1715. c. descript: = SPR: syst: II. 398. = All: I. c. t. 26. f. 5. (*Pedem: in pascuis saxosis vallis Queiras et Alpium*

Valdensium non infrequens uti etiam in Alpib: *Augustæ Prætoriæ* et *M. Cenisii* ALL: l. c. Versus *la Novalesa* RE fl: segus: p. 39. Secus *la Tosa* in valle di *Antigorio* et in rupibus di *Ameno* BIROLI fl: acon: I. p. 150.). Perenn:

12. *A. purpurascens* = Spr: syst: II. 398. (*Pyrenæis*). Perenn: In specim: meo ex BALBISIO folia sunt fasciculata.

* 13. *A. laricifolia* = L. sp: 607. = Spr: syst: II. 398. = Vill: dauph: 4. p. 629. t. 47. f. 5. 6. (Alpib: Eur: med; Caucaso. In Pedem: nil frequentius secus torrentes et vias locis aridis et subalpinis ALL: n. 1710. Locis saxosis trans *Supergam* secus vias BALBIS: In saxosis supra *M. Musiné*, in nemoribus *della Mandria* et secus *Sturam* prope *Venariam* RE fl: torin: I. p. 240. In pascuis *Ticini* vulgaris, nec deest in collibus, rara in Alpib: del *Sempione* BIROLI fl: acon: I. p. 150.). Perenn: Variat caulis *multifloris* foliis *arcuatis* (α *multiflora* VILL: l. c. f. 5.), vel caulis *paucifloris* foliis *erectis* (β *striata* VILL: l. c. f. 6.): primam inveni cum BERTERO in *M. Ceniso*.

14. *A. davurica* = Spr: syst: II. 398. (*Sibiria*). Perenn:, ann:? Cl: SPRENG: putat *A. Cherleriæ* FISCH: eandem esse ac *A. davuricam* a DC. distinctas. Specim: mea a cl: FISCH: communicata sub nomine *A. Cherleriæ* nonnullis notis differunt a diagnosi SPR: et DC.; folia sunt *fasciculata*, superiora *opposita* tantum *recta* vel apice *recurva*, sepala linear-lanceolata *acutissima* nec *obtusiuscula* petalis valde breviora.

* 15. *A. polygonoides* = Wulf: in Jacq: coll: I. p. 241. = Spr: syst: II. 399. = Jacq: l. c. t. 15.

All: pedem: t. 64. f. 4. sub *A. obtusa*. Ic: taur: vol. 15. t. 91. f. 4. (*Helvet: Pedem:* in pascuis saxosis umbrosis Alpium *di Fenestrelle* et *Ceresole*, et circa cœnobium *S. Bernardi*, et *Col di Cogne* All: n. 1714. c. descript:). Perenn:

16. *A. pendula* = Waldst: et Kit: pl: rar: I. p. 90. (*Hungaria*). Perenn:

* 17. *A. uliginosa* = Schleich: cent: exs: I. n. 47. = Spr: syst: II. 399. = DC. ic: pl: gall: p. 14. t. 16. (In paludosis *Jurassi* et *Lapponiae*. *Pedem:* in Alpib: *Monregalensibus di Ceresole* invenit Victorius PROMIS sec: RE app: I. p. 21.). Perenn: Variat caulis ca-lycibusque purpureis sec: SERINGE in DC. Prodr: I. 407. Nostra habet caules et calyces virides, petala alba. Vid: infra n. 25.

* 18. *A. grandiflora* = L. sp: 608. = Spr: syst: II. 399. = All: pedem: t. 10. f. 1. Ic: taur: vol. 14. t. 73. f. 7. (*Helvet: Gallia, Ital: Pedem:* in editio-ribus Alpibus *M. Cenisii* et vall: *Valdensium* All: n. 1711. In Alpib: *di Chianoc* RE fl: segus: p. 38.) Pe- ren: Planta polymorpha, hinc magna confusio in syn-onymia Auctorum: huc pertinet certe *A. trifolia* L., cuius exemplar possideo ex BELLARDI in Alpib: *Limoni* lectum. Ico All: pedem: t. 26. f. 5. a DC. citata pro *A. grandiflora* var: β *multiflora* pertinet ad *A. lanceolatam* n. 11. a *multiflora* valde diversam; huc quoque referenda *A. elongata* BALB: sec: SPR:

* 19. *A. austriaca* = Jacq: fl: austr: III. p. 39. = Spr: syst: II. 400. = Jacq: l. c. t. 270. All: pedem: t. 64. f. 2. (*Austriæ* et *Ital: Alpib: Pedem:* locis saxosis et umbrosis ad rupes Alp: *Valdensium*

ALL: n. 1708. In Alpib: *di Chianoc et M. Cenisii* RE fl: segus: p. 38. Ex Alpib: *Sessitis* retulit CARESTIA sec: BIROLI fl: acon: I. p. 150.). Perenn: Priori affinis, et valde etiam varians: *huc pertinere putat* cl: DC. Prodr: I. 404. *A. Villarsii* BALBISH a SPR: omis-
sam, exclusa tamen var: *hirsuta* ad *Cerastium stri-
ctum* referenda; specim: mea reapse non differunt nisi statura humiliori; cons: tamen eundem BALBIS: misc: alt: p. 21. Alia habeo specim: ex hb: BELLARDI sub *A. pubescenti* ab *austriaca* vix diversa foliis *sub-
pubescentibus*; certe ad *pubescentem* Urv: haud spe-
ctant, folia enim *linearia* non *ovata*.

* * Foliis succulentis plerumque stipulatis,
floribus sub - 5 - andris, capsulis 3 - valvibus
(*Spergularia* PERS:)

* 20. *A. rubra* = L. sp: 606. = Spr: syst: II.
400. = Engl: bot: t. 852. pro var: *campestri* (*Eur:*,
Afr: bor:, *Chili* ex BERTERO. *Pedem:* in sabulosis tor-
rentium atque in arvis collinis montanisque sicciori-
bus frequens est ALL: n. 1716. sub *A. campestri*. In
arvis *Stupinixii*, *Venarie*, et secus *Sturam* RE fl:
torin: I. p. 238. In arenosis circa *Segusium* RE fl:
segus: p. 37. Prope portum *Villafrancæ Nicæensis*
aliisque locis arenosis et maxime exsiccis ALL: n. 1717.
sub *A. marina* L. non Sm: Ad vias in *Sardin:* vulga-
tissima MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann: *A. rubra* et
A. marina L. ab ALL: distinctæ sub eadem specie
enumerantur a DC. Prodr: I. 401.; equidem in spe-
cim: meis nullum fere discriminem video. Cl: SPR: *A.*

marinam L. omittit. Specim: insuper possideo a cl: BERTERO missa e *Chili* sine nomine specifico quæ non differunt ab *A. rubra* nisi glandulis in tota plantæ evidentioribus.

* 21. *A. marina* = Sm: fl: brit: 480. non L. = Spr: syst: II. 400. = Engl: bot: t. 958. DC. ic: rar: t. 48. sub *A. media marginata* (In pratis et sabulosis maritimis Eur: *Genuæ* in mæniis *alla Darsena*; a *Cornigliano* secus viam publicam prope rus *Duratianum* BERTOL: am: ital: p. 151.). Ann: Vix a priori diversa stipulis abbreviatis.

22. *A. radicans* = Spr: syst: II. 400. (*Sicilia* in herbidis humentibus montosis et arenosis *Madonu*, *Etna*). Perenn: Omissa a DC.; specim: mea ex cl: GUSSONE perfecte quadrant cum ejus diagnosi in fl: sic: Prodr: I. 515.

* * * Foliis filiformi-subulatis.

† Elongatis; caule elato.

23. *A. juniperina* = L. mant: 72. (*Oriente*). Perenn: Specim: mancum ex BONJEAN. = 24. *A. graminifolia* = Schrad: hort: goëtt: et new journ: 1810: 2. p. 139. (*Sibir:*, *Ucran:*, *Transylv:*, *Caucaso*). Perenn: Variat foliis longissimis sub-integerrimis, panicula glabra ad quam spectat specim: meum.

†† Foliis filiformi-setaceis abbreviatis.

25. *A. lapponica* = Spr: syst: II. 402. (*Alpib: Lappon:*). Perenn: ? *Spergula stricta* Sw: sec: SPR: l. c.; hoc tamen synonymum *A. uliginosæ* SCHLEICH: tribuit

cl: DC. Prodr: I. 407. Specim: mea sub nomine *Spergulae strictæ* ex hb: BIROLI valde differunt ab *A. uliginosa* n. 17.; sed neque perfecte quadrant cum diagnosis SPR: , scapus enim non 1 - sed 2 - 3 - florus , pedunculi basi 2 - bracteati.

* 26. *A. fasciculata* = Gouan: ill: 30. = Spr: syst: II. 402. = Jacq: fl: austr: t. 182. ? (Eur: med: Pedem: in sabulosis et sterilibus præsertim fluminum, torrentium; locis apricis et sole percussis ALL: n. 1709. In provincia Segusiana supra Foresto RE fl: segus: p. 38. Sardin: in pascuis aridis Ura MORIS st: sard: II. p. 2.). Ann: Variat caulis prostratis, foliis basi non ciliatis (*A. mucronata* DC. Prodr: I. 407. Conf: tamen *A. saxatilem* inf: n. 33.). Huc pertinet *A. fastigiata* SMITH sec: DC. et SPR: ; an idem dicendum de *A. fastigiata* VAHL quam STEUDELII diversam putat a planta SMITHII? Specim: mea de planta VAHLII ex hb: BIROLI differunt quidem facie ab *A. fasciculata*, sed non characteribus botanicis.

* 27. *A. tenuifolia* = L. sp: 607. = Spr: syst: II. 403. = Vill: dauph: IV. p. 634. t. 47. sub *A. hybrida* et prosp: p. 48. t. 30. f. 3. Ic: taur: vol. 22. t. 21. (Eur: , Amer: bor: Pedem: muros vetustos et saxosa loca præcipue incolit secus Padum; in acclivibus aridis saxosis non infrequens ALL: n. 1707. c. descript: RE fl: torin: I. p. 239. ubi 3. varr: distinctæ enumerantur. Vulgatissima ad rupes circa Segusium et ad muros vinearum RE fl: segus: p. 31. In aridis collum provinciæ Novariensis pusilla crescit, circa urbem uberior et ramosissima BIROLI fl: acon: I. p. 150. In Sardin: pascuis aridis montanis MORIS st:

sard: II. p. 2.). Ann: Variat summopere statura et numero staminum minori ob abortum; huc pertinet *A. dubia* SUTER: eadem ac *A. viscidula* THUILL: in synon: SPR: omissa; haec reperitur in *Albensi* provincia sec: *Tanarum* ex BERTERO.

28. *A. setacea* = Thuill: fl: par: ed: 2. p. 220. (*Gallia, Tauria*). Perenn:

* 29. *A. recurva* = All: pedem: n. 1713. c. de-
script: = DC. Prodr: I. 406. = All: l. c. t. 89. f. 3.
Ic: taur: vol. 14. t. 73. f. 5. (Alpib: Eur: med: Pedem:
in pascuis saxosis editiorum Alpium *Valdensium* et
in summitatibus vallis *di Bellino* ALL: l. c.). Perenn:
Ico All: mala; folia ibi sunt potius *lanceolata* quam
linearis-subulata, fasciculi nimis distantes, pedicello-
rum trichotomia non redditur uti constanter in plan-
tis et in optima ipsius ALLIONII descriptione; huc
puto referendam *A. subrecurvam* BELLARDI hb: hu-
maniter mihi ab Auctore communicatam, in qua
nullam cerno differentiam nisi in sepalis angustiori-
bus acutioribusque.

* 30. *A. verna* = L. mant: 72. = Spr: syst: II.
403. = Engl: bot: t. 512. (Eur: submontanis. *Sabau-
dia* inter *Modane* et *Col de la Rocce* ALL: n. 1706.). Perenn:
Variat caulis plus minusve foliosis, sub-
paniculatis vel 1-floris. Huc referunt recentiores Bo-
tanici *A. cæspitosam* EHR: quam cl: BALBIS: locis sa-
xosis nostrarum Alpium incolam esse tradit (misc:
alt: p. 17.), quæque non videtur differre ab *A. flac-
cida* SCHLEICH a cl: BELLARDI mihi communicata.

* 31. *A. striata* = L. sp: 608. = Spr: syst: II.
403. = All: pedem: t. 26. f. 4. (Eur: med: Pedem:

in pascuis saxosis Alpium ALL: n. 1712. RE fl: segus: p. 38. In pascuis vallis *Sessitis* et *Ossulæ* ad torrentem *Tosa* non rara BIROLI fl: acon: I. p. 150.). Perenn: Planta admodum dubia a SPR: confusa cum *liniflora* JACQ: , *rostrata* KIR: , *saxatili* L. , et *capillacea* ALL: ; duas priorēs ad *laricifoliam* refert cl: DC. tamquani varr: distinctas (Prodr: I. 404. n. 35.), alteras diversas putat (ib: n. 40.). Icones ALL: de *striata* et *capillacea* valde differunt; *capillaceam* primo sub *montana* n. 1705. p. 112.; hinc sub *capillacea* p. 365. enumeravit, et hic observavit distinctam plantam esse a *montana* quæ delenda a plantis pedemontanis. An hoc quoque referenda sit *A. Gerardi* W. eadem ac *A. liniflora* JACQ: fl: austr: non L. nec JACQ: coll: , dubito ex synonymia DC. de *A. Gerardi* et SPR: de *A. striata*; affirmari tamen id potest ex synonym: ALLIONII auct: n. 1712. p. 30. ubi *A. linifoliam* JACQ: fl: austr: enumerat tamquam plantam spontaneam jugi *del Col de la Rocce*.

* 32. *A. capillacea* = ALL: pedem: n. 1705. p. 112. c. descript: sub *A. montana* et p. 365. sub *A. capillacea* = DC. Prodr: I. 404. = All: l. c. t. 89. f. 2. (In summo jugo *Tendæ la Cola* dicto ALL: l. c.). Ann: Differt a priori radice annua, caulis basi repentibus cæspitosis, foliis inferioribus prorsus setaceis, floribus valde majoribus; habitus quoqué diversus.

* 33. *A. saxatilis* = L. sp: 607. = DC. Prodr: I. 405. = Barr: ic: t. 580. Ic: taur: vol. 14. t. 73. f. 3. (German: , Helvet: , Gallia , Sibir: Pedem: in valle Ulcensi ALL: n. 1704. Ad viam *del Sempione* inter

Riceno et Varzo BIROLI fl: acon: I. p. 149.). Perenn: Medium tenere videtur inter *A. strictam* et *capillaceam* cui tamen magis affinis; ico *BARR*: perfecte quadrat cum specim: meis lectis a *BERTERO* in *Montblanc*; *huc* forsitan pertinet *Alsine mucronata* *BALE*: misc: alt: p. 12. enumerata a DC. sub *Arenaria* (Prodr: I. 407. n. 68.); an ad *fasciculatam* *GOUAN*: referenda sec: *SPR*: syst: II. 402? illam legit DC. ad basim montis *Vesuli*.

34. *A. ramosissima* = W. en: suppl: p. 24. (*Hungaria*). Perenn:

Arenariæ dubiæ.

35. *A. macrorhiza* = *Loisl*: ex *Requier* in bull: univ: 1828. mars p. 329. (*Corsica*. In *Sardin*: maritimis insulæ *Tavolare*, *Terranova* invenit *MORIS* st: sard: III. p. 5.). Perenn: Pulcherrima species radice crassissima sub-lignosa, caulis pluribus cæspitosis decumbentibus ut tota planta viscosa - villosa, foliis fasciculato-verticillatis linearis-lanceolatis obtusiusculis, pedunculis sub-paniculatis, sepalis oblongis petala sub-æquantibus capsula brevioribus: flores albi. Specim: perfecta ex *MORISIO*. = 36. *A. nardifolia* = *Ledeb*: sec: *SPR*: c. p. 182. (*Dahuria*). Cl: *SPR*: arbitratur plantam hanc esse var: *A. cucubaloideæ* *SM*: quam enumerat in syst: II. 401. Optima possideo specim: a *FISCHERIO* lecta in *Dahuria* et missa sub nomine *A. nardifoliae* quæ cum diagnosib: *A. cucubaloideæ* satis quadrant, exceptis sepalis prorsus glabris et nitidis nec viscosis, potius ovatis acutis quam lanceolatis, insuper margine scariosis.

* 37. *A. Scopolii* = Caule cæspitoso, foliis li-
 » nearibus trinerviis rigidiusculis inferioribus fascicu-
 » latis caulinis oppositis, pedunculis 1-floris glabrius-
 » culis, sepalis lanceolatis striatis, petalis ovatis ob-
 » tusiusculis calyce brevioribus. » Nob: *Stellaria ru-*
pestris Scop: carniol: I. p. 317. t. 18. f. 540. Plu-
 rima possideo specim: hujusce stirpis in Alpibus no-
 stris *M. Cenisio* præsertim lecta a cl: BELLARDIO,
 quæ procul dubio pertinent ad *Stellariam rupestrem*
 Scop: male a SPR: confusam cum *A. lanceolata* ALL:;
 nec ico nec descriptio ALLIONII quadrant cum planta
 SCOPOLII; illa refert folia *lanceolata*, flores majores,
 sepala foliis omnino similia ac petalis breviora; dis-
 crimen a reliquis constituit ALLIONIUS e *foliorum forma*
similibusque calycinis foliolis (All: pedem: n. 1715.).
 Planta igitur diversa, quam cl: SCOPOLIO dicavi suppresso
 etiam nomine triviali ab eo imposito ne confundatur
 cum *A. rupestri* LABILL: a recentioribus Botanicis
 probata (DC. Prodr: I. 407., SPR: syst: II. 403.).

XX. CERASTIUM Lin: gen: 797. = Gaertn: fruct: t. 130.
 f. 6. = Lam: ill: t. 392.

» *Cal:* 5-partitus. *Pet:* 5. 2-fida. *Stam:* 10. vel
 » abortu 5. *Styl:* 5. *Caps:* 1-locularis ovato-globosa,
 » vel oblongo-cylindrica apice dentibus 10. dehiscens. »

Obs: Genus *Arenariæ* proximum sed distinctum ha-
 bitu, petalis 2-fidis nec integris, capsula constanter
 10-dentata excepto *C. aquatico*; stirpes 69. ex DC.,
 53. ex SPR: artificialiter divisæ e *forma* fructus, et
 petalorum *longitudine* respectu calycis.

† *Capsulis ovato-globosis.*

* 1. *C. aquaticum* = L. sp: 629. = Spr: syst: II. 416. = Engl: bot: t. 538. (In aquosis Eur: vulgare. In agro Pedemontano ad fossas præsertim aquarum ALL: n. 1730. Re fl: segus: p. 39. et fl: torin: I. p. 248. BIROLI fl: acon: I. p. 156.). Perenn: Capsula 5-6. tantum dentata, ex quo præsertim ad aliud genus (*Larbrea*) unica hæc specie constans fuit translatum a DC. Prodr: I. 395. ex S. HILL:

* 2. *C. manticum* = L. sp: 629. = Spr: syst: II. 417. = Waldst: et Kit: pl: rar: hung: I. p. 96. t. 96. Ic: taur: vol. 15. t. 91. f. 5. (*Ital:; Helvet:; Hungar: Pedem:* in agris subhumidis et pratis collinis et submontanis non infrequens ALL: n. 1731. Re fl: segus: p. 39. In arvis prope la Molinetta ac in pratis macilentis prope *Eremum* et alla *Mandria* BALE: Copiosissimum in arvis trans *Druent* versus ædem S. *Pancratii* Re fl: torin: I. p. 248. In campis sabulosis della *Lomellina* BIROLI fl: acon: I. p. 156. In *Sardin:* pascuis collinis MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann: Caulis 2-3-chotomus; bracteæ ad dichotomiam calyci similimæ.

†† *Capsulis oblongo-cylindricis.*

α Petalis calycem superantibus.

3. *C. tomentosum* = L. sp: 629. var: β (Gallo-provinc: , Neapol: , Sicilia). Perenn: Planta foliorum forma latitudine et pubescentia admodum variabilis,

idcirco in plures species forsitan nullo jure distincta (Guss: prodr: fl: sic: I. p. 530. in obs:).

* 4. *C. arvense* = L. sp: 628. = Spr: syst: II. 417. = Engl: bot: t. 93. (*Eur:*, *Asia*, *Africa*, *Amer:* bor: *Pedem:* ad vias et in montanis secus arva frequens All: n. 1726. In apricis collib: *Taurinensibus* circa *Eremum* et prope *Supergam*; in arvis ad caeuse dictum *di Merlo* prope *il Parco della Veneria*, atque non procul ab *Altessano* ad agrorum margines prope portum *Sturæ RE* fl: torin: I. p. 247. In pascuis collinis *Verbani* præsertim *di Pallanza* et *Suna* BIROLI fl: acon: I. p. 155. In *Sardin:* pascuis et arvis collinis Moris st: sard: I. p. 7.). Perenn: Caules dichotomo-paniculati vel simplices, folia plus minusve glanduloso - pilosa. Huc pertinet sec: DC. et SPR: *C. repens* L. quod habemus spontaneum in valle *Ulcensi* et *Valdensium di S. Martino* ex All: n. 1733. et secus *Ticinum* loco dicto *alla Costa di Gambolò* ex BIROLI l. c.

5. *C. hirsutum* = Tenor: Prodr: p. 27. cat: 1819. p. 45. (Regno Neapol: in montibus *Samnii*). Perenn: Species propria male confusa a SPR: cum priori, a qua differt habitu, foliis angustioribus et longioribus, bracteis calycibusque triplo majoribus striatis cuspidatis. Optimum possideo specim: a cl: Auctore communicatum et *Castellamare* lectum. = 6. *C. lanatum* = Lam: dict: I. p. 680. (*Pyren:* et *Alpib:* *Eur: austr:*). Perenn: Pedunculi brévissimi sub-3-chotomi sæpe a bracteis tecti; variat caule, foliis calycibusque glabris sec: DC. Prodr: I. 418. Specim: meum per totum densissime lanatum.

* 7. *C. latifolium* = L. sp: 629. = Spr: syst: II. 418. = Engl: bot: t. 473. Ic: taur: vol. 15. t. 91. f. 2. (Alpib: Eur: med: In Alpib: *Pedemontanis* inter diffractos lapides ALL: n. 1732. In *M. Cenisio* Re fl: segus: p. 39. Inter rupes Alpium *Novariensium* BIROLI fl: acon: I. p. 156.). Perenn: Planta potius *villoso-viscosa* quam *hirsuta*; pedunculi flore duplo et ultra longiores non æquantes uti in diagn: DC. Prodr: I. 419.

* 8. *C. alpinum* = L. sp: 628. = Spr: syst: II. 418. = Engl: bot: t. 472. (Alpib: Eur: *Pedem:* in rupibus et Alpium scopolis frequens ALL: n. 1727., BIROLI fl: acon: I. p. 155. In *M. Cenisio* Re fl: segus: p. 39.). Perenn: Huc pertinet sec: STEUD: *C. laguniosum* quod possideo ex hb: BIROLI sub hoc nomine; omissum a DC. et SPR: non differt a nostro *alpino* nisi caulis magis *prostratis*: notandum tamen, diagnoses DC. et SPR: de *alpino* differre in characteribus caulis, quem primus dicit *prostratum*, alter *erectum*!

* 9. *C. glaciale* = Gaud: in litt: sec: DC. Prodr: I. 419. (In Alpib: *Helvetiae*. *Pedem:* in altioribus Alpibus *Prarajer* ad rupes glaciales reperit PIOTTAZ sec: BIROLI ined:). Perenn:

10. *C. davuricum* = Fisch: in Spr: pl: min: cogn: 2. p. 65. (*Dahuria*). Perenn: Flores magni; specim: ex hb: BIROLI sub nomine *C. connati* W. a *davurico* haud differt.

* 11. *C. campanulatum* = Viv: ann: bot: I. p. 2. = Spr: syst: II. 418. = Viv: l. c. p. 171. t. 1. (*Ital:*, *Hungar:* Frequens in collibus apricis maritimis prope

Genuam Viv: l. c.). Ann: Stipulæ linear-i-lanceolatæ, sepala albo-marginata.

* 12. *C. strictum* = L. sp: 629. = Spr: syst: II, 418. = All: pedem: II. p. 365. t. 88. f. 4. sub *C. linearis*. Ic: taur: vol. 12. t. 18. f. 1. et vol. 27. t. 46. (In Alpib: Eur: med: Pedem: in rupibus sub-humidis Alp: *Valdensium* et *M. Cenisii*, *di Lanzo* et *di Gia-veno* All: n. 1729. c. descript: Abunde in rupibus circa *Segusium* præsertim *alle Blaccie* et *a Croale* Re fl: segus: p. 39. In pascuis alpinis præsertim vallis *di Vegezzo* BIROLI fl: acon: I. p. 155.). Perenn: Variat foliis angustissimis arcuatis fasciculatis (*C. laricifolium* VILL:, *suffruticosum* L.), foliis linear-i-lanceolatis longissimis acuminatis (*C. lineare* ALL: l. c.), foliis oblongis obtusiusculis (*C. strictum* L. var: *com-mune*). Specim: mea de *C. laricifolio* ex hb: BELLARDI a VILLARSIO communicata et in monte *Ventoux* lecta ita habitu differunt a *linearis* et *communi*, ut species distincta videatur admittenda. Cons: BALBIS: misc: alt: p. 17.

13. *C. pensylvanicum* = Hornem: h. hafn: p. 435. (*Pensylv:*). Perenn: Huc pertinet sec: SPR: *C. tenuifo- lium* PURSH a DC. distinctum (Prodr: I. 417. n. 32. et 420. n. 51.); binas species possideo, et nullas cernere est differentias, si excipias folia in *tenuifolio* acutiora.

β Petalis calycem æquantibus vel minoribus.

* 14. *C. vulgatum* = L. sp: 627. = Spr: syst: II.

419. = Engl: bot: t. 789. (*Eur:*, *Asia*, *Africa*, *Amer:* bor: In *Pedem:* ad vias, secus arva et ubique copiose ALL: n. 1723. RE fl: segus: p. 39. et fl: torin: I. p. 246. BIROLI fl: acon: I. p. 155. In *Sardin:* ad vias MORIS st: sard: I. p. 7.). ANN: Variat foliis acutis vel obtusis (*C. rotundifolium* STERNB: sec: DG. Prodr: I. 416.), floribus laxis vel glomeratis (var: β *glomeratum* DC., *C. ovale* PERS:); hoc invenitur in pratis graminosis agri *Pedemontani* ex PIOTTAZ. *C. rotundifolium* a SPR: omissum possideo ex hb: BELLARDI a cl: BALBISIO communicatum, et non differt a *vulgato* nisi foliis *obtusioribus*.

* 15. *C. viscosum* = L. sp: 627. = SPR: syst: II: 416. = Engl: bot: t. 790. IC: taur: vol. 10. t. 24. (*Eur:* *Pedem:* secus arva macilenta abunde ALL: n. 1724. Passim in locis arenosis secus *Duriam* RE fl: segus: p. 39. Ubertim secus *Sturam*, *Cerundam*, *Padum* ac prope *Druent* RE fl: torin: I. p. 246. In *Sardin:* ruderatis humidis MORIS st: sard: I. p. 7.). ANN: Priori valde affine a quo differt præsertim foliis *angustioribus*, pedunculis *longioribus*, seminibus *lineatis*. CONS: GUSS: Prodr: fl: sic: I. p. 527. in obs:

* 16. *C. semidecandrum* = L. sp: 627. = SPR: syst: II. 419. = Engl: bot: t. 1630. (*Eur:*, *Amer:* bor: *Pedem:* in sterilibus pascuis et ad vias abunde ALL: n. 1725. RE fl: segus: p. 39. et fl: torin: I. p. 246. BIROLI fl: acon: I. p. 155. In *Sardin:* pascuis montanis frequens MORIS st: sard: I. p. 7.). ANN: Varietas calycibus *scariosis* (*C. alsinoides* PERS:) crescit prope il Parco della Veneria et prope Taurinum inter Va-

lentinum et pontem *Padi* loco dicto *la fabbrica dei mattoni* RE fl: torin: I. c.

* 17. *C. brachypetalum* = Desp: in Pers: enh: I. p. 520. = Spr: syst: II. 419. = Reich: pl: cr: cent: 3. t. 234. f. 388. sec: Guss: Prodr: fl: sic: I. 528. (*Gallia, Alsatia, Sicilia*. In arvis prope *Taurinum* invenit PIOTTAZ. Ad agrorum margines inter *Taurinum* et *Ripulas*, et circa *Venariam* frequens vidit RE fl: torin: I. p. 247. In *Sardin:* pasquis MORIS st: sard: I. p. 7.). Ann:

18. *C. diffusum* = Pers: enh: I. p. 520, (Patria?). Perenn: = 19. *C. dichotomum* = L. sp: 628. (*Hispan:, Afr: bor:*). Ann: = 20. *C. perfoliatum* = L. sp: 627. (*Græcia, Sibir:, Barbar:*). Ann:

Cerastia dubia.

21. *C. ambiguum* = Cl: Fisch: misit ex *Altai* sine alia indicatione, et sic definiri potest: « *C. caule erectiusculo foliisque linear-lanceolatis viscidulis, bracteis ovato-oblongis, pedunculis 3-chotonis paucifloris, petalis sub-simbriatis calycibus ovatis duplo longioribus.* » Nob: Ann: *C. simbriatum* Ledeb: men: acad: sc: Petersb: 5. p. 516. n. 27. ?; sed caulis in specimin: meis nec *diffusus* nec *angulatus*. A *C. stricto* var: δ *communi* ad quem el: DC. refert plantam FISCHERI valde differt habitu ac petalis multifidis. = 22. *C. spurium* = Birol: hb: ? Valde affine *C. mantico* n. 2. si non eadem planta. = 23. *C. stellatum* = H. Paris: Ita in scheda specim: ex hb: BIROLI; enumeratam non video speciem hanc in cat: H. Paris: 1829.; at mihi

non videtur differre a *C. lanuginoso* quod vidimus spectare ad *C. alpinum* n. 8.

24. *C. Berterianum*. = Caule erectiusculo sub-sim-
 » plici foliisque lanceolatis fasciculatis sessilibus vil-
 » losis, bracteis calycibusque ovato-oblongis acutis
 » margine scariosis, floribus terminalibus sub-capi-
 » tatis pedunculos sub-aequantibus, petalis ovatis
 » emarginatis calyce duplo longioribus. » Nob:

Obs: Specim: missa a BERTERO e Chili ibique *Ran-*
cagua lecta tamquam novam *Cerastii* speciem consti-
 tuentia, a ceteris mihi reapse differre videntur cha-
 racteribus allatis.

XXI. CHERLERIA Lin: gen: 775. = Lam: ill: t. 379.

» *Cal:* 5-sepalus. *Pet:* 5. minima emarginata. *Stam:*
 » 10. *Styl:* 3. *Caps:* 3-locularis 3-valvis oligosperma. »

Obs: Genus habitu distinctissimum constans herbis
 muscoideis cæspitosis; species 2. ex DC., 3. ex SPR:
 quarum una octandra floribus 4-partitis (*Ch: octan-*
dra SIEB:).

* 1. *Ch: sedoides* = L. sp: 608. = Spr: syst: II.
 416. = Engl: bot: t. 1212. Ic: taur: vol: 14. t. 73.
 f. 1. (Alpib: Eur: med: et Scotiæ. Pedem: ubique in
 pascuis saxosis summarum Alpium ALL: n. 1736., RE
 fl: segus: p. 38., BIROLI fl: acon: I. p. 151.). Perenn:

Obs: geographica circa Caryophylleas.

Caryophyllea ex DC. sistunt numero

768

Caryophylleæ pedemontanæ.

<i>Gypsophyla</i>	3
<i>Dianthus</i>	19
<i>Saponaria</i>	5
<i>Cucubalus</i>	1
<i>Silene</i>	27
<i>Lychnis</i>	8
<i>Velezia</i>	1
<i>Ortegia</i>	1
<i>Buffonia</i>	1
<i>Sagina</i>	3
<i>Moheringia</i>	2
<i>Elatine</i>	2
<i>Holosteum</i>	1
<i>Spergula</i>	4
<i>Stellaria</i>	9
<i>Arenaria</i>	22
<i>Cerastium</i>	12
<i>Cherleria</i>	1
								122

Et sic fere sextam partem constituunt.

ORDO XXIII.

(DC. Théor: ed: I. p. 217. et Prodr: I. 423. =
Caryophylleis affines Juss: gen: p. 303.)

Obs: Ordo *Caryophylleis* valde affinis, distinctus tamen habitu, staminibus basi monadelphis, defectu receptaculi fructus centralis et albuminis in semine, foliisque saepius alternis, constans 1-2. generibus tantum.

I. LINUM Lin: gen: n. 528. = Gaertn: fr: II. t. 112.
f. 11. = Lam: ill: t. 219.

» *Cal:* 3 - 4. aut saepius 5 - sepalus. *Pet:* numero æquali unguiculata cum staminibus annulo perigyno inserta. *Stam:* numero dupla basi monadelpha, alia petalis alterna fertilia, alia opposita sterilia. *Styl:* 5. » raro pauciores. *Caps:* 10-locularis, loculis 1-spermis introflexis. »

Obs: Genus constans 54. speciebus ex DC., 48. ex SPR: Herbæ vel suffrutices foliis integris exstipulatis, petalis caducissimis, divisum ex florum colore. Cons: monographiam hujusce generis cl: SCHIEDE in Bull: univ: 1826. Juillet p. 362.

† Floribus cœruleis aut carneis.

a Herbacea.

1. *L. usitatissimum* = L. sp: 397. (*Eur:* In *Sardin:* pascuis MORIS st: sard: I. p. 9.). *Ann:* Cultum in *Pedem:* præsertim in arvis *Pojrini* et provinc: *Nova-riensis* ubi nunc spontaneum invenitur præcipue in campis *di Gaglia* teste BIROLI mss: = 2. *L. angu-stifolium* = Huds: angl: 134. (*Anglia*, *Eur:* austr: In pascuis et arvis *Sardin:* frequens MORIS st: sard: I. p. 8.). *Perenn:* = 3. *L. diffusum* = Schult: obs: 63. (*Patria?*). *Perenn:* Cultum in H. *Ripul:* e semi-nibus missis a cl: SCHULT:, pedunculos habet non tan-tum *axillares* uti ex diagn: SPR: sed etiam *terminales*.

* 4. *L. narbonense* = L. sp: 398. = SPR: syst: I. 962. = Barr: ic: t. 1007. non 107. uti in ALL: ex errore typographicico (*Gall:* austr:, *Hispan:*, *Transylv:* *Pedem:* frequens in saxosis circa *Lucerame* et *Touet*, in montibus a *Castiglion* ad *Menton* et a *l'Escarène* ad *Breglio* ALL: n. 1685.). *Perenn:* Flores magni ele-gantissimi.

* 5. *L. hirsutum* = L. sp: 398. = SPR: syst: I. 962. = JACQ: fl: austr: t. 31. IC: taur: vol. 15. t. 106. f. 1. (*Eur:* austr: *Pedem:* in dumetis et ad sepes circa *Marentinum*, *la Morra*, *Vernone*, in *Monteferrato*, et comitatu *Nicæensi* passim occurrit, neque rarum in *Liguria* ALL: n. 1684. Ad oras sylvarum vinea-rumque *di Mongrano* versus *Supergam* BALBIS:). *Pe-renn:* Folia superiora et sepala glanduloso - ciliata; flores ampli. Cl: RE dubitat plantam lectam a BAL-

BISIO versus *Supergam* pertinere potius ad *L. viscosum* L. eo quod stylos gerat staminibus breviores (fl: torin: I. p. 184.); hic character depromptus est ex DC. Prodr: I. 425., at de eo nulla mentio in diagn: SPR: qui differentias desumpsit a præsentia glandularum in foliis summis et calycibus *L. viscosi*. Specim: mea omnia hanc notam præseferunt; hinc dubito has duas stirpes ad unam tantum forsitan esse referendas. Cons: tamen BERTOL: am: ital: p. 139-140.

6. *L. decumbens* = Desf: atl: I. p. 278. (*Afr: bor: Sicilia*. In *Sardin*: pascuis *di Orvi* MORIS st: sard: I. p. 8.) Perenn: Flores mediocres rosei; cult: in H. Ripul: luxuriat magnitudine partium, sed omnino quadrat cum iconе Fontainesiana l. c. t. 59. = 7. *L. squamulosum* = Rud: in W. en: 338. (*Tauria*). Perenn: Flores parvi cærulei. = 8. *L. sibiricum* = DC. Prodr: I. 427. (*Sibiria*). Perenn: Flores mediocres pulchri cærulei; petala integerrima; folia in specim: meo ex FISCHERIO in *Dahuria* lecto *erecta non patula*.

*? 9. *L. anglicum* = Mill: dict: n. 5. = Spr: syst: I. 963. = Engl: bot: t. 40. sub *L. perenni* (*Anglia*. In montibus circa *Sospello* et *Lucerame* ALL: n. 1683. sub *L. perenni*?). Perenn: Flores mediocres pallide cærulei, sepala exteriora mucronata, interiora obtusa; petala emarginata ex quo solum distinguitur a priori. Cult: in H. B. T. sub nomine *L. perennis*.

*? 10. *L. austriacum* = L. mant: 359. = Spr: syst: I. 963. = Jacq: fl: austr: t. 418. (*Austria*, *Transylv*: In monte *Rosa* BIROLI fl: acon: I. p. 107.). Perenn: Priori valde affine; flores parvi cæruleo-purpurascentes, sepala omnia obtusa. An huc perti-

neat planta sub hoc nomine enumerata a cl: RE app: ad fl: pedem: p. 18., et ab eo lecta in Alpibus *di Monastero*, valde dubito; asserit enim referre foliola calycina exteriora *sub-acuta*, interiora *obtusissima*, qua nota accedit potius ad *L. anglicum*; ceterum inter *L. austriacum*, *anglicum*, *perenne*, *sibiricum* et *alpinum* tantæ adsunt affinitates, ut forsitan ad unam tantum speciem referri possint.

* 11. *L. alpinum* = L. sp: 1672. = Spr: syst: I. 963. = Jacq: fl: austr: t. 321. (Alpib: Eur: med: *Pedem*: abunde secus arva et in pascuis nec non ad vias in montanis atque subalpinis ALL: n. 1688. c. descript: In *M. Cenisio* RE fl: segus: p. 28. In saxosis Alpium *di Vegezzo* non rarum BIROLI fl: acon: I. p. 107.). Perenn: Flores parvi dilute purpurascens; sepala obtusa sed brevissime aristata; petala *integerima* nec *retusa*, qua nota præcipue differt a priori cui tamen valde affine. Cons: insuper BERTOL: amæn: ital: p. 352. de *L. perenni*.

β *Suffruticosa*.

* 12. *L. tenuifolium* = L. sp: 398. = Spr: syst: I. 963. = Jacq: fl: austr: t. 215. Ic: taur: vol 17. t. 30. f. 2. (Eur: med: *Pedem*: in apricis saxosis collinis montanis et subalpinis abunde ALL: n. 1686. RE fl: segus: p. 28. In collibus *Taurinensis* et *M. Musiné* RE fl: tòrin: I. p. 185. In pascuis collium præsertim *di Boca* et *Maggiora* BIROLI fl: acon: I. p. 106.). Perenn: Flores parvi albo-rosei.

†† Floribus albis.

α Herbacea.

* 13. *L. catharticum* = L. sp: 401. = Spr: syst: I. 963. = Schkuhr: handb: I. t. 87. (*Eur: Pedem:* in pascuis sub-humidis præcipue montanis etiam in *Taurinensibus* minime rarum ALL: n. 1693. RE fl: segus: p. 28. et fl: torin: I. p. 186. In pascuis *di Borgosesia* et *Varallo* frequens BIROLI fl: acon: I. p. 107.). Ann: Flores minimi.

β Suffruticosa.

15. *L. monogynum* = Forst: prodr: n. 145. (*Nov: Zeeland:*). Suffrut: Flores ampli ex albo rosei; sepala in specim: meis ex hb: BIROLI potius *ovata* quam *lanceolata* uti in diagnosi SPR:

††† Floribus flavis, luteis.

α Herbacea.

* 15. *L. gallicum* = L. sp: 401. = Spr: syst: I. 964. = Ger: Gallo-prov: t. 16. f. 1. (*Eur: austr: Pedem:* locis saxosis et declivibus collium calidiorum frequens ALL: n. 1687. Copiosissimum in aridis sterilibus *di Condove* in regione dicta *la Roccia* et in *M. Musiné* RE fl: segus: p. 28. In pascuis supra *Revigliasco*, *Pecetto* et *della Mandria* RE fl: torin: I. p. 185. In *Sardin:* pascuis collinis aridis MORIS st: sard: I. p. 9.). Ann: Flores minimi.

* 16. *L. strictum* = L. sp: 400. = Spr: syst: I. 964. = Lob: ic: t. 411, f. 2. Ic: taur: vol. 17. t. 30,

f. 1. (*Italia, Græcia. Pedem: locis aridis agri Ni-*
cæensis uberrime, nec infrequens in Monteserrato et
valle Segusii ALL: n. 1689. Supra Foresto et circa
vineas di Mompantero RE fl: segus: p. 28. In M. Mu-
sinè qua parte Duriam respicit RE fl: torin: I. p. 186.
In Sardin: sterilibus aridis Moris st: sard: I. p. 9.).
Ann: Flores minimi; variat inflorescentia plus mi-
nusve corymbosa vel in capitulum congestum. Cons:
Guss: Prodr: fl: sic: I. p. 388. 389. ubi varr: descri-
bit. Specim: possideo lecta a BERTERO in agro Albensi
quæ pertinent ad var: δ (capitatum); alia ex hb: BEL-
*LARDI sub nomine *L. alterniflori* a BERT: in Ægypto*
lecta spectant ad var: β DC. Prodr: I. 424., SPR: c. p.
p. 127.

17. *L. virginianum* = *L. sp: 398.* (*Amer: bor:).*
*Ann: Flores lutei ampli, non vix *L. gallici* majores*
*uti in observ: DC. Prodr: I. 424. = 18. *L. aquili-**

num = Molin: Chil: ed: germ: 126. (*Chili*). Perenn:

Flores aurantiaci mediocres; pedunculi non semper

2-fidi sed quandoque sub-corymbosi, uti ex specim:

missis a BERTERO e Chili.

* 19. *L. maritimum* = *L. sp: 400.* = Spr: syst:
 I. 965. = Lob: ic: t. 412. f. 2. Ic: taur: vol. 3. t. 2.
 et vol. 16. t. 8. (*Eur: austr: Pedem: in humidis et*
stagnantibus agri Nicaensis et præcipue secus flumen
le Var ALL: n. 1692.). Perenn: Flores luteoli me-
 diocres.

β Fruticosa.

* 20. *L. arboreum* = *L. sp: 400.* = Spr: syst: I.
 965. = Sibth: fl: græc: t. 305. (*Creta. Pedem: in agro*

Nicæensi inter *l'Escarène* et *Drap* pro var: β *campanulato* ALL: n. 1690. sub *L. campanulato*). Cau-
lis basi lignosus; flores magni lutei; var: β indigena
differt a planta *cretensi* sepalis potius *lineari-lanceo-
latis* quam *ovato-lanceolatis*.

* 21. *L. flavum* = L. sp: 399. = Spr: syst: I.
965. = Jacq: fl: austr: t. 214. (Eur: austr:, *Tauria*.
Pedem: in collibus maritimis *Nicæensibus* ALL: n.
1691.). Basi suffrutic: Flores ut in priori, sed pe-
tala croceo-lineata et basi unguibus connata. Cl: DC.
Prodr: I. 425. speciem hanc considerat tamquam so-
lam var: *L. arborei* quod refert sub *L. glanduloso*
MOENCH: cum aliis varr: inter quas *L. tauricum* W.
Cons: tamen R. et S. syst: VI. p. 750. et seq:

22. *L. trigynum* = Roxb: asiat: rec: 6. p. 357.
(*Ind:* orient:). Fruticosum. Flores flavi amplissimi
solitarii axillares et terminales. Cult: in H. Ripul: ubi
in F. floret Febr: - Aprili. = 23. *L. africanum* = L.
mant: 360. (*Afr:* austr:). Basi fruticosum. Flores lu-
teoli mediocres.

Lina dubia.

24. *L. fasciculatum* = Mart: sec: Steud:; omissum
a DC. et Spr: Specim: meum ex hb: BIROLI præsefert
caulem erectum glabrum, folia alterna approximata
lineari - lanceolata acuta, pedunculos terminales tri-
chotomos sub-unifloros, sepala ovato-lanceolata acu-
ta, petala (ex sicco alba) calyce parum longiora.

II. RADIOLA Gmel: syst: I. p. 289. = *Lini* spec: L.

» *Cal:* 4-partitus laciniiis inciso-dentatis. *Cor:* 4 -
» petala. *Stam:* 4. *Styl:* 4. *Caps:* 8-loocularis 8-valvis
» 8-sperma. »

Obs: Genus constans unica specie e *Lino* dirempta
ob proportionem partium floralium quaternariam et
sepala ad medium fere coalita.

* 1. *R. Millegrana* = Sm: Brit: I. p. 202. = Spr:
syst: I. 498. = Sm: Engl: bot: t. 895. *R. linoides*
DC: Prodr: I. 428. ex Gmel: (*Eur: Pedem: Epo-
redia* ad lacum, in sylvis castanearum provinc: *Aquen-
sis* All: n. 1694. sub *Lino Radiola*. Secus *Sturam*
in locis declivibus humidis RE fl: torin: I. p. 187. In
Sardin: sabulosis humidis MORIS st: sard: I. p. 9. sub
R. linoidea). Ann: Flores minimi albi.

Obs: geographica circa Lineas.

Lineæ ex DC. sistunt numero 55

Lineæ pedemontanæ..

<i>Linum</i>	12
<i>Radiola</i>	<u>1</u>
	<u>13</u>

Et sic fere quartam partem constituunt.

ORDO XXIV.

M A L V A C E A E

(Juss: gen: 271. excl: sess: V. et poster: = DC.
Prodr: I. 429. = J. S. Hill: t. II. p. 59. t. 82.).

Char: essentialis.

» *Cal:* 1-sepalus 5-rarissime 3-4-partitus æstivatione
» valvata, sæpe bracteis seu calyce anteriore instru-
» ctus. *Pet:* tot quot calycis divisiones vel multipli-
» cia libera, vel basi coalita. *Stam:* indefinite mo-
» nadelpha. *Ovarium* carpellis plurimis fere semper
» coalitis. *Syl:* tot quot carpella distincti vel in unum
» coaliti. *Carpella* 1-2-polysperma sub-libera vel in
» capsulam multilocularem aut in baccam anomalam
» connata. *Sem:* albuminosa. *Embr:* rectus. *Cotyl:*
» contortuplicatæ. »

Obs: Ordo naturalissimus sistens plantas fere omnes
monadelphas polyandras habitum proprium referentes
ac inter *Lineas* et *Bombaceas* fructificatione inspe-
cta medium reapse tenens, sed facie *Bombaceis*
magis affinis, tum etiam albuminis præsentia quam
negabat DC. quæque recognita fuit ab A. S. HILL:
(Cons: Bull: univ: 1824. majo p. 76.). Herbæ, frutices
aut arbores foliis alternis stipulatis, pedunculis sæpius
axillaribus 1-aut multi-floris, in 2. sectiones divi-
sæ, calycibus scilicet *involucratis*, et nudis.

Sect: I.

Calyx duplex seu involucro cinctus.

I. MALOPE Lin: gen: n: 843. = Lam: ill: t. 583.

» *Cal:* 5-partitus involucro 3-phyllo. *Pet:* 5. *Styli*
» coaliti stigmatibus distinctis. *Carpella* plurima 1-
» sperma in capitulum aggregata. »

Obs: Genus constans speciebus 4 herbaceis, floribus purpurascentibus aut albidis.

1. *M. multiflora* = Trig: in Cav: diss: II. p. 85.
(*Hispan:* austr:). Ann: Flores ex sicco albi, parvi;
folia in specim: meis non *crenata* tantum sed *sinuata*.
= 2. *M. malacoides* = L. sp: 974. (*Eur:* austr:, *Afr:*
bor:). Ann: Flores magni purpurascentes. = 3. *M. trifida* = Cav: diss: II. p. 85. (*Hispan:* austr:, *Afr:*
bor:). Ann: Flores paullo minores quam in priori,
purpurascentes.

II. MALVA Lin: gen: n. 841. = Lam: ill: t. 582.

» *Involucr:* raro 5-6-phylum. *Carpella* capsularia
» vel rarius pleiosperma in orbem disposita. Cetera
» ut in *Malope*. »

Obs: Genus vix distinctum a priori, constans stirpibus 82 ex DC., 67 ex SPR: herbaceis vel fruticosis, foliis indivisis angulatis lobatisve vel partitis, ex quibus in plures sectiones commode etsi artificialiter dividi solet. Cons: tamen A. S. HILL: flor: Bras: in Bull: univ: 1828. Jan: p. 73.

† Foliis indivisis.

α Fruticosæ.

1. *M. angustifolia* = Cav: diss: II. p. 64. (*Mexico*). Flores mediocres violacei; carpella 1-valvia 2-sperma. = 2. *M. cyrrosa* = Ort: dec: 8. p. 95. (*Cuba*). Flores mediocres ex sicco superne luteoli, inferne violacei. = 3. *M. spicata* = L. sp: 967. (*Ind. occid:*). Flores parvi ex sicco rubescentes; var: foliis ovatis vel sub-cordatis. = 4. *M. polystachya* = Cav. diss: V. (*Peruvia*). Flores parvi flavi spicati fere ut in sequenti. = 5. *M. scoparia* = L' Herit: stirp: t. 27. non Jacq: (*Peruvia*). Flores parvi, pedunculi in specim: meo ex H. B. T. *solitarii* non *conferti* uti in diagn: DC. Prodr: I. 430. = 6. *M. scabra* = Cav: diss: V. t. 138. f. 1. *M. scoparia* Jacq: (*Gum priori*). Flores mediocres flavi; pedunculi in specim: meo ex hb: BIROLI non *axillares* tantum sed etiam *terminales*.

β Herbaceæ.

7. *M. americana* = L. sp: 968. non Cav: (*Ind: occid:*). Ann: Flores minimi capitato-spicati confer-tissimi. = 8. *M. tricuspidata* = Ait: h. Kew: ed: 2. vol: 4. p. 210. *M. americana* Cav: (*Ind: occid:*). Biénin: Flores parvi slavescentes. = 9. *M. gangatica* = L. sp: 697. (*Ind: orient:*). Ann: Flores ut in priori, a qua differt tantum carpellis muticis non 3-cuspidatis = 10. *M. Sherardiana* = L. sp: 1675. (*Palestin:*, *Asia min:*). Perenn: Flores parvi rubri.

= 11. *M. mareotica* = Spr: syst: III. 88. ex Delil: ined: (*Ægypto*). Ann: Flores parvi rubri non tantum *terminales* in specim: meis ex plantis cultis in H. Ripul: , verum etiam *axillares*.

†† Foliis angulatis lobatis.

α *Fruticosæ*.

12. *M. umbellata* = Cav: ic: I. p. 64. (*Mexico*). Flores magni elegantissimi igneo - violacei ; carpella 1-valvia 2-sperma. Cult: in H. Ripul: = 13. *M. abutiloides* = L. sp: 971. (*Floridæ*, ins: *Bahamensib*:). Flores mediocres violacei; carpella 1-valvia 2-sperma. = 14. *M. miniata* = Cav: ic: III. p. 40. (*Patria?*). Pedunculi 1-5-flori axillares et terminales; flores mediocres lâste miniati. Cult: in H. Ripul: = 15. *M. lactea* = Ait: h. Kew: II. p. 448. *M. vitifolia* Cav: (*Mexico*). Flores parvi glomerato-spicati axillares et terminales albi. Cult: in H. Ripul: = 16. *M. asperrima* = Jacq: h. Schoembr: II. p. 7. (*C. B. S.*). Flores mediocres ex sicco rosei. = 17. *M. grossulariæfolia* = Cav: diss: II. p. 71. *M. stricta* Jacq: (*C. B. S.*). Flores mediocres rubicundi. Variat foliis sub-trilobis vel sinuato - lobatis ; prima pertinet ad *M. strictam* JACQ: a DC. distinctam ; differentia desumpta ex pedunculis fallax, in utraque enim sunt 1 - vel 2-3-flori. = 18. *M. fragrans* = Jacq: h. vindeb: 3. t. 35. (*C. B. S.*). Flores ut in priori cui valde affinis ; specim: mea referunt etiam pedunculos terminales sub-spicatos. = 19. *M. capensis* = Cav: diss: II. p. 71. (*C. B. S.*). A *M. grossulariæfolia* n. 17.

vix differt. = 20. *M. balsamica* = Jacq: misc: II. p. 321. (*C. B. S.*). Hæc etiam non videtur differre nisi floribus paullo majoribus ac foliorum lobis productioribus. Recte observabat W. *M. grossulariæfoliam*, *fragrantem*, *capensem* et *balsamicam* ab eadem planta forsan ortas esse (W. sp: III, 782.).

β Herbaceæ.

* 21. *M. sylvestris* = L. sp: 969. = Spr: syst: III. 89. = Cav: diss: II. t. 26. f. 2. (*Eur: Pedem:* ad hortorum sepes et loca ruderata ubique ALL: n. 1417. Re fl: segus: p. 58. èt fl: torin: p. 387. BIROLI fl: acon: II. p. 22. In *Sardin:* secus vias MORIS st: sard: I. p. 9.). Bienn: Flores cœrulei mediocres: huc forsan referenda *M. glabra* LAM: (Dict: III. 720. n. 40.) a DC. et SPR: omissa quam possideo ex lib: BIROLI; herba accedit magis ad *M. sylvestrem*, floribus ad *rotundifoliam* n. 26.

22. *M. verticillata* = L. sp: 970. (*China*). Perenn: Flores parvi sub-sessiles. Huc pertinet sec: SPR: *M. flexuosa* HORNM a DC. distincta; specim: mea e BALBISIO de hac planta ab ipso notantur tamquam synonyma *M. parviflora*. Revera inter illas et sequentem vix differentiæ adparent statura et directione caulis, ac carpellorum majori vel minori hirsutie.

* 23. *M. parviflora* = L. am: III. p. 416. non Huds: = Spr: syst: III. 90. = Cav: diss: II. t. 26. f. 1. (*Afr: bor:*, *Gallia austr:* In comitatu Nicæensi ALL: n. 1415. In *Sardin:* pascuis et ad vias MORIS st: sard: I. p. 9.). Perenn:

24. *M. brasiliensis* = Desr: in dict: enc: III. p. 344.

(*Brasil:*). Ann: ? Flores minimi; media videtur inter priorem et *M. nicæensem*.

* 25. *M. nicæensis* = All: pedem: n. 1416. c. descript: = Spr: syst: III. 90. = Cav: diss: II. t. 25. f. 1. (*Ital:* super:, *Bætia*. Primus reperit cl: BELLARDI in agro Nicæensi prope portum *di Limpia* All: l. c. In *Sardin:* secus vias *Cagliari*, *Oristano* MORIS st: sard: I. p. 9.). Ann: Flores parvi dilute rubri.

* 26. *M. rotundifolia* = L. sp: 969. = Spr: syst: III. 90. = Cav: diss: II. t. 26. f. 3. Ic: taur: vol. 5. t. 102. 107. Vern: *Riondela* (*Eur:*, *Amer:* bor: *Pedem:* nil ad semitas frequentius All: n. 1414. Re fl: segus: p. 58. et fl: torin: I. p. 356. BIROLI fl: acon: II. p. 21. In *Sardin:* secus vias et in campis MORIS st: sard: I. p. 9.). Ann: , perenn: Flores mediocres violacei vel albidi.

27. *M. crispa* = L. sp: 970. (*Macedon:*, *German:*, *Boruss:*). Ann: Flores parvi violacei. Culta in H. Ripul: ob habitum et foliorum magnitudinem scere ut in viti vinifera sed eleganter undulato-crisporum. =

28. *M. peruviana* = L. sp: 968. (*Peruvia*). Ann: Flores minimi purpurei. = 29. *M. limensis* = L. sp: 968. (*Peruvia*). Ann: Priori valde affinis, sed differt pedunculis longissimis, floribus cœruleis, carpellis laevibus.

* 30. *M. Morenii* = Pollin: veron: 1816. = Spr: syst: III. 91. = Ic: ? (Agro Veron: *Pedem:* prope *Casselette* et etiam inter *Venarium* et ædem *S. Pancratii* Re fl: torin: I. p. 358. In pascuis aridis secus viam quæ a *Roburento* dicit ad oppidum *Montaldi* in provincia *Monregalensi* invenit Victorius PROMIS sec: Re

app: I. p. 28.). Perenn: Vix differt a *M. Alcæa* n. 32. foliis profundius partitis; hinc a DC. Prodr: I. 432. et RE l. c. tamquam sola ejus varietas consideratur.

††† Foliis partitis.

α Fruticosæ.

31. *M. virgata* = Cav: diss: II. p. 70. (*C. B. S.*). Flores mediocres purpurei. Culta in H. Ripul: ubi variat foliis plus minusve incisis, pedicellis solitariis vel binis; forsitan ab hac ortæ plures aliæ species capenses? Conf: n. 20.

β Herbaceæ.

* 32. *M. Alcæa* = L. sp: 971. = Spr: syst: III. 91. = Cav: diss: II. t. 17. f. 2. Ic: taur: vol. 5. t. 68. (*Eur: Pedem:* ad fossas et semitas viarum et dumeta frequens ALL: n. 1418. RE fl: segus: p. 58. et fl: torrin: p. 357. In provincia *Novariensi* secus aquæductus vulgaris BIROLI fl: acon: II. p. 22. *Sardin:* ad sepes in montanis *Desulo* MORIS st: sard: I. p. 9.). Perenn: Flores magni purpurascentes.

* 33. *M. moschata* = L. sp: 971. = Spr: syst: III. 91. n. 59. et 92. n. 60. pro var: *laciniata*. = Cav: diss: II. t. 18. f. 1. Bot: mag: t. 2298. pro var: *laciniata* sub *M. moschata undulata*. Ic: taur: vol. 16. t. 106. (*Eur: Pedem:* in apricis sylvis *Garexii*; in montibus *Nicæensibus*, circa thermas *Vinadii*, in *Sabaudia* circa *S. Ugo* ALL: n. 1419.). Perenn: Flores mediocres purpurascentes vel albi; va-

riat foliis inferioribus lobatis tantum vel 5-partitis ut superiora. *M. laciniata* DESROUS: a SPR: distincta.

34. *M. aegyptia* = L. sp: 971. (*Ægypto, Mauritaniæ, Hispaniæ*). Ann: Flores minimi albidi. = 35. *M. althæoides* = Cav: diss: II. p. 30. (*Hispaniæ, Sicilia. Sardinia*: ad dumeta circa rupes maritimæ *Bari* MORIS st: sard: I. p. 9.). Ann: Flores parvi purpurascentes. = 36. *M. caroliniana* = L. sp: 969. (*Carolina, Amer: austr:*). Ann: Flores parvi; carpella 2-valvia 2-sperma. Huc pertinent sec: SPR: *M. decumbens* W. et *eriocarpa* DC.; hanc non vidi: primam possideo ex hb: BIROLI, *carolinianam* autem ex BALBISIO, et nullas inter ipsas differentias agnosco.

Malvæ dubiæ.

37. *M. veneta?* E seminibus cl: BIROLIO communicatis a DC., videtur *M. Alcea* var:; an eadem ac *M. italica* POLL: a SPR: enūmerata sub *M. Alcea* et a DC. distincta (Prodr: I. 436.), vel *M. Morenii* n. 30.? primam non possideo; ab altera vix differt foliorum lobis brevioribus.

38. *M. pulchella?* Culta in H. Ripul: e seminibus missis a cl: BALBISIO sic definiri potest: «Herbacea, caule erectiusculo simplici, pedunculis brevissimis aggregatis sub-corymbosis petiolisque longissimis glabris, foliis cordato-orbiculatis 5-7-lobis lobis rotundatis dentatis. » Nob: Accedit ad *M. sylvestrem* n. 21. sed differt petiolis *brevioribus* pedunculisque *glabris*, foliis basi *cordatis*, lobis *rotundatis* nec *acutiusculis*. Patria?

39. *M. ononidifolia* = Mart: hb: Missa sub hoc nomine a cl: MARTIO et in *Brasilia* lecta, optimam novam speciem constituere videtur, quam ita definitio:
 » Fruticulosa, caule tortuoso ramisque diffusis de-
 » pendentibus glabris, foliis sub-fasciculatis ovato-
 » lanceolatis serrulatis pube stellata adspersis, pedun-
 » culis terminalibus sub-corymbosis (flores minimi): »
 Nob: Pertinet ad 1. sectionem, sed habitus ab omnibus longe diversus. Carpella desunt in specim:

40. *M. aspera*. = Missa cum priori a cl: MARTIO, pertinet ad eandem sectionem, et definienda ut sequitur:
 » Fruticulosa, caule erecto simpliciusculo lævi, foliis
 » cordatis cuspidatis dentatis utrinque hirsutiusculis
 » subtus pallidioribus et punctis albidis exasperatis,
 » pedunculis 1 - 2. brevissimis calycibusque villosis
 » (flores minimi). » Nob: Crescit in *Brasilia* ad cap:
Frio.

41. *M. glomerata* = W. et K: sec: Steud: non Hortul: Culta in H: Ripul: e seminibus missis a BAL-
 BISIO, omissa a DC. et SPR: *M. glomerata* Hortul: pertinet ad *verticillatam* sec: DC. Prodr: I. 433., a-
 qua nostra toto cœlo differt; phrasis hæc erit: « Her-
 » bacea, caule erecto simpliciusculo canaliculato gla-
 » bro, foliis oblongis basi dilatatis inæqualiter 3-5-
 » lobis lobis ovatis dentatis nervis petiolisque vil-
 » losiusculis, floribus sessilibus pedunculatis glo-
 » meratis calycibus ciliatis petalis duplo brevioribus
 » (flores parvi violacei). » Nob:

III. KITAIBELIA W. act: soc: n: scrut: ber: II. p. 107. t. 4. f. 4.

» *Involucr:* 6-9-fidum. *Carpella capsularia* i-sperma in capitulum 5-lobum congesta. Cetera ut in præcedentibus. »

Obs: Genus ex unica sequenti specie.

1. *K. vitifolia* = W. l. c. (*Syrmia, Illyria*). Perenn:

IV. ALTHÆA Lin: gen: n. 839. 840. = Lam: ill: t. 581.

» *Involucr:* 5-9-fidum. *Carpella capsularia* i-sperma in orbem disposita margine membranacea vel nuda. Cetera ut in præcedentibus. »

Obs: Genus constans 20. circiter stirpibus inclusa *Alcea* L. merito a Cav: huc relata, divisum in 3. sectiones ex numero laciniarum involucri, et carpellorum margine; herbæ vel raro suffrutices.

† *Carpella* margine membranaceo destituta
(*Althæa* DC.)

* 1. *A. officinalis* = L. sp: 966. = Spr: syst: III. 107. = Cav: diss: II. p. 93. t. 30. f. 2. Ic: taur: vol. 5. t. 70. Vern: *Altea*, *Avisch* (Eur: præsertim maritimis. Pedem: in pratis sub-humidis et ad fossas non rara, in comitatu *Astensi* et *Montisferrati* frequentior ALL: n. 1426. Circa *Venariam* invenitur quoque var: β *taurinensis* RE fl: torin: I. p. 354. In valle *Ticini* abundat, nec rara in valle *d'Arbogna* et secus aqueductus *BIROLI* fl: acon: II. p. 21. In *Sardin:* humidis palustribusque *MORIS* st: sard: I. p. 9.).

Perenn: Flores mediocres albo-rosei. Huc pertinet *A. taurinensis* DC. Prodr: I. 436. quæ vix differt pedunculis longioribus.

2. *A. narbonensis* = Pourr: in Cav: diss: II. p. 94. (*Gallia austr:*, *Hispan:*). Perenn: Priori affinis, a qua differt præsertim pedunculis elongatis sub-racemosis, petalis brevioribus.

* 3. *A. Bertolæ?* « Foliis molliter sub-pubescentibus cordatis indivisis vel obsolete 3-5-lobis inæqualiter dentatis, pedunculis axillaribus solitariis 1-floris petiolum brevem sub-æquantibus (floribus violaceis). » Nob:

Obs: Inventa a cl: M. D. BERTOLA oppido *Giavolotto* in area casealis D. BAUDINO septembr: 1832. et nobis humaniter communicata, media videtur inter *A. officinale* L. et *narbonensem* POURR:; priori tamen, cuius forsitan var: , magis accedit foliis cordatis ac vix lobatis, pedunculis folio multo brevioribus, nec non proprietatibus ab incolis ei tributis, ceu nobis asseruit memoratus cl: Vir. At ab utraque differt foliis latioribus sæpius indivisis supra viridibus inferne tantum pallidioribus sub-pubescentibus nec tomentosis, et præsertim pedunculis constanter solitariis 1-floris ac petalorum colore; quibus notis magis recedit a memoratis stirpibus quam ab *A. taurinensi* a cl: DC. admissa. Si speciem distinctam constituit, merito sollertissimo inventori dicendam duco.

* 4. *A. cannabina* = L. sp: 966. = Spr: syst: III. 108. = Cav: diss: II. t. 30. f. 1. Ic: taur: vol. 5. t. 69. (*Eur: med:* In agro *Pedemontano* passim oritur ad fossas, sepes et dumeta ALL: n. 1427. In collib:

Taurinens: circa castrum *Cabureti* et alle *Tavernette* reperit BALBISIUS sec: RE fl: torin: I. p. 355. *Sardin*: ad sepes collinas circa *Cagliari* MORIS st: sard: II. p. 2.). Perenn: Flores mediocre, pedunculi elongati inferiores solitarii superiores sub-racemosi.

* 5. *A. hirsuta* = L. sp: 965. = Spr: syst: III. 108. = Cav: diss: II. t. 29. f. 1. Ic: taur: vol. 24. t. 16. (Eur: austr: *Pedem*: rara in collibus apricis *Taurinensis* et *Astensis*; in aridis *Montiferrati* et Provinciae *Dertonensis* frequentior; ad rupes et colles Comitatus *Nicæensis* ALL: n. 1428. Prope *Supergam* secus agros RE fl: torin: I. p. 355. In Provincia *Albensi* BERTERUS. In *Sardin*: ad sepes frequens MORIS st: sard: I. p. 9.). Ann: Pedunculi solitarii; flores mediocre albo-rosei.

6. *A. Ludwigii* = L. mant: 98. (*Sicilia, Ægypto*. *Sardin*: in pascuis *Cagliari* MORIS st: sard: I. p. 9.). Ann: Pedunculi brevissimi solitarii vel congesti; flores parvi.

†† *Carpella* margine membranaceo
(*Alcea* DC.)

7. *A. pallida* = Waldst: et Kit: in W. sp: III. p. 773. (*Hungar*:). Bienn: Pedunculi abbreviati axillares demum spicati; flores ampli; petala purpurea 2-loba.

* 8. *A. rosea* = Cav: diss: II. p. 91. = Spr: syst: III. 108. = Cav. l. c. t. 29. f. 1. Ic: taur: vol. 14. t. 8. et vol. 5. t. 102. 103. 105. Vern: *Rosa trama* (*Orient*: In Comit: *Nicæensi* ALL: n. 1420. sub *Alcea*). Bienn: perenn: Vix a priori diversa foliis magis sectis et petalis sub-

integris, quæ notæ valde variant cultura; variat quoque multimode colore et plenitudine florum: ubique ad ornamentum culta. Huc pertinet forsitan *A. grandiflora* RAENSCH a STEUD: enumerata et a SPR: omissa; an var: *B. biloba* DC. Prodr: I. 437.? Specim: meum quadrat in flore, sed folia vix *subrotundo-cordata* ut in *A. pallida*, nec *secta* ut in *rosea*.

9. *A. chinensis* = Cav: diss: II. p. 92. t. 29. f. 3. (*China*). Ann: Hæc etiam parum differt a priori foliis vix lobatis et radice annua; specim: mea referunt tamen calyces et involucra *obtusa* non *acuta* ut in *A. pallida* et *rosea*. = 10. *A. ficifolia* = Cav: diss: II. p. 92. (*Podolia*, *Græcia*, *Sibir:*). Bienn: vel perenn: Flores ampli; petala emarginata rosea ad unguem purpurea.

V. LAVATERA Lin: gen: n. 842. = Lam: ill: t. 582.

» *Involucr:* 1-phylum 3-raro 6-lobum. *Carpella*
» capsularia 1-sperma in orbem disposita. Cetera ut
» in præcedentibus. »

Obs: Genus vix ab *Althæa* distinctum involucri laciniis, constans 26. stirpibus e DC., 20. ex SPR:, a primo divisum in 4. sectiones artificiales e forma receptaculi fructus. Frutices vel herbæ.

† *Fruticosæ.*

* 1. *L. arborea* = L. sp: 972. = SPR: syst: III. 92. = Cav: diss: II. t. 139. f. 2. (*Angl:*, *Ital:*, *Hispan:*, *Afr:* bor: Reperitur ad rupes littoris *Nicæensis* ALL: n. 1421. In *Sardin:* maritimis insulæ *S. Petri*, *Pula*, *Bosa* MORIS st: sard: I. p. 9.). Bienn: frutic:

Flores ampli albi; culta in H. Ripul: ubi in Frigid: perennat.

2. *L. acerifolia* = Cav: el: h. Madr: p. 20. (Ins: *Canarii*s). Flores ampli pallide lilacini. Culta in H. B. T., ex quo specim: mea.

* 3. *L. maritima* = Gouan: ill: p. 46. = Spr: syst: III. 93. = Cav: diss: II. t. 32. f. 3. Ic: taur: vol. 16. t. 19. (*Gall*: austr:, *Hispan*: Ad rupes littoris agri *Nicæensis* abunde ALL: n. 1425. *Sardin*: ad rupes *Castello di Medusa*, *Bosa* MORIS st: sard: I. p. 9.). Flores mediocres albidi: culta in H. Ripul:

* 4. *L. triloba* = L. sp: 972. = Spr: syst: III. 93. = Cav: diss: II. t. 31. f. 1. (*Hispan*: *Sardin*: ad sepes in pascuis maritimis ips: *S. Pietro* MORIS st: sard: III. p. 5. In rupibus maritimis *Nicææ* reperit BELLARD: sec: RE reliq: Bellard: p. 4.). Flores magni pallide purpurascentes. An hoc pertineat *L. moschata* MORISII valde dubito ceu dubitavit idem cl: Auctor l. c.

* 5. *L. Olbia* = L. sp: 972. non Steph: = Spr: syst: III. 93. = Lob: ic: t. 653. f. 2. optima. Cav: diss: II. p. 86. t. 32. f. 2.? (*Hieres* in *Gallo-Prov*: In agro *Nicæensi* ALL: n. 1422. In *Sardin*: ad sepes frequens MORIS st: sard: I. p. 9.). Flores mediocres purpurci sessiles solitarii demum (ex cultura?) spicati. Culta in H. Ripul:

6. *L. unguiculata* = Desf: arbr: I. p. 471. (Ins: *Samo*). A priori non differt nisi floribus brevi *pedunculatis* non prorsus *sessilibus*; an ejusdem varietas? = 7. *L. undulata* = Desf: arbr: I. p. 471. (Patria?). Flores magni, petala purpurascentia lamina profunde 2-loba. = 8. *L. hispida* = Desf: atl: II. p. 118.

(*Hispan: Afr: bor:*). Flores magni, petala purpura-scentia, lamina vix emarginata. = 9. *L. micans* = L. sp: 972. (*Hispan:*). Flores magni purpurei. Huc pertinet sec: SPR: *L. lusitanica* L. sp: 973. quam distinguit cl: DC. Prodr: I. 439., ubi tamen observat omnes quæ sub nomine *L. lusitanicæ* occurruunt in hortis a descriptione Linnæana valde recedere; at ex hac differentiæ specificæ vix patent, qua forsan ratione cl: SPR: *L. micantem* et *lusitanicam* conjungere existimavit. Quæstionem dirimere non audeo; observo tamen in specim: meis hasce plantas valde differre foliis; in *micante* sunt 5-7-angularia lobis vix productis, in *lusitanica* evidenter 3-loba lobis valde productis sagittatis medio 3-4-longiore. = 10. *L. plebeja* = Sims bot: mag: t. 2269. Colla H. Ripul: app: II. p. 396. c. descript: et ic: t. 14. (*Nov: Holland:*). Suffrut: vel perenn: *L. australis* SCHRAD:; *Althæa plebeja* SCHULT: sec: COLLA l. c.; *L. Weinmanniana* BESS: sec: SPR: l. c.? Vide tamen infra n. 17. Culta in H. Ripul:

†† *Herbaceæ.*

* 11. *L. thuringiana* = L. sp: 973. = Spr: syst: III. 93. = Jacq: fl: austr: t. 311. Ic: taur: vol. 21. t. 87. (*Eur: med: et Oriente. In Comitatu Nicœensi All: n. 1423.*). Bienn:, perenn:

* 12. *L. punctata* = All: auct: n. 1424. c. descript: = SPR: syst: III. 94. = IC: ? (*Ital: , Gallo-Provinc: In agro Nicœensi frequens All: l. c.*). Ann: Flores magni; petala dilute purpurea saturatius lineata fere triangularia.

13. *L. sylvestris* = Brot: fl: lusit: II. p. 277. non Tenor: (*Lusitan:*, *Neap:*, *Sicil:* *Sardin:* ad vias et ad sepes MORIS st: sard: I. p. 9.). Ann: Flores medios, petala purpurascens. Huc refert cl: SPR: *L. neapolitanam* TENOR: quam DC. Prodri: I. 437. distinguit. Conf: etiam GUSSON: pl: rar: p. 288. = 14. *L. ambigua* = DG. Prodri: I. 440. (Agro *Neapolitano*). Perenn: A *L. trimestri* L. cum qua conjuncta a SPR: syst: III. 94. valde differt radice *perenni*, foliis evidenter 3-5-lobis *ovato-oblongis* nec *sub-rotundis*, lobis valde *productis*, pedicellis folio *brevioribus*, floribus *minoribus*, herbæ superficie *puberula* nec *glabriuscula*, uti constat tam ex descript: GUSSONEI pl: rar: p. 286., quam ex specim: meis a cl: TENOERO communicatis sub nomine *L. sylvestris* CYR: = 15. *L. cretica* = L. sp: 973. (*Creta*, *Sicilia*). Ann: Flores medios; petala purpurascens lineata ad unguem atrata.

* 16. *L. trimestris* = L. sp: 974. = Spr: syst: III. 94. excl: synon: = Cav: diss: II. p. 90. t. 31. f. 1. Ic: taur: vol. 14. t. 67. et vol. 17. t. 87. (*Gallia austr:*, *Syria*, *Hispan:* Comit: *Nicæensi* in olivetis *Villafrancæ* ALL: n. 1424. *Sardin:* ad margines agrorum *Iglesias*, *Morgongiori* MORIS st: sard: I. p. 9.). Ann: Flores ampli, petala alba vel rosea sub-integra; ubique in hortis culta ad ornamentum.

Lavateræ dubiae.

17. *L. Weinmanniana* = Bess: sec: SPR: syst: III. 94. sub *L. plebeja*. Plurima sub hoc nomine possideo specim: ex hb: BIROLI ab h. Erf: provenientia, quæ

valde recedunt a *L. plebeja* n. 10. habitu, foliis, inflorescentia; nec ad *L. sylvestrem* pertinere videntur, sub qua cl: DC. Prodr: I. 23. enumerat *L. Weinmannianam* TREV: cum dubitationis signo; an hæc eadem sic ac *Weinmanniana* Bess: ignoro, nam DC. hunc Auctorem non citat neque sub *L. plebeja*; interim plantæ nostræ diagnosis hæc erit: « *L. caule*
» herbaceo humili simplici glabro, foliis longe petio-
» latis cordato-orbiculatis glabris 5 - 7 - lobis lobis
» sub-æqualibus rotundatis dentatis, floribus axilla-
» ribus sub-sessilibus solitariis glomeratisve calycibus
» oyatis acutis margine sub-ciliatis petatis paullo bre-
» vioribus (petala cærulescentia). » Nob: Hab:?...

VI. MALACHRA Lin: gen: n. 1131. = Lam: ill: t. 580.

» *Involucr:* duplex; universale 3-5-phyllum florum
» capitula cingens; partiale 8-12-phyllum foliolis li-
» nearibus. *Stigmata* 10. *Carpella capsularia* 5. 1 -
» sperma in orbem disposita. Cetera ut in præce-
» dentibus. »

Obs: Genus distinctissimum ob duplicitis involucri præsentiam, constans 14. stirpibus ex DC., 12. ex SPR: fere omnibus herbaceis *Ind:* occident: colentibus.

1. *M. fasciata* = Jacq: ic: rar: III. t. 548. (*Caracas*). Ann: Flores mediocres rosei. = 2. *M. capitata* = L. syst: 518. (*Caribæis*). Ann: Flores parvi lutei. = 3. *M. alceæfolia* = Jacq: ic: rar: III. t. 549. (*Caracas, Brasilia*). Ann: Flores parvi flavi.

VII. URENA Lin: gen: n. 844. = Lam: ill: t. 583.

» *Involucr:* 5-fidum. *Antheræ* in apice tubi. *Car-*

» *pella* capsularia 5. 1-sperma conniventia echinata,
» Cetera ut in præcedentibus. »

Obs: Genus constans stirpibus 21. ex DC., 18. ex
SPR: omnibus exoticis folia sæpius in nervis subtus
glandulosa gerentibus.

1. *U. lobata* = L. sp: 974. (*China*). Ann: Folia
interdum sub-integra. = 2. *U. viminea* = Cav: diss:
VI. p. 335. (*Brasilia, Portorico*). Frutesc: = 3. *U.
sinuata* = L. sp: 974. non Swartz (*India orient:*).
Frutesc: Folia in specim: meis ex H. B. T. inferiora
3-loba, superiora 5-loba. = 4. *U. Sieberi* = Colla
H. Ripul: p. 142. t. 39. (Ins: *Mascaren:*). Frutesc:

VIII. PAVONIA Cav: diss: III. p. 132. = Lam: ill: t. 585.

(*Hibisci* et *Urenæ* sp: Lin:)

» *Involucr:* 5-15-phylum. *Stigmata* 10. *Carpella*
» capsularia 5. 1-sperma 2-valvia inermia vel rarius
» echinata. Cetera ut in præcedentibus. »

Obs: Genus constans stirpibus 24. ex DC., 37. ex
SPR: fere omnibus ab *Hibisco* L. ademptis vel novis,
a quo differt præsertim numero stigmatum et forma
fructus: frutices vel rarius herbæ asiaticæ, africanæ
vel americanæ excepta tantum *P. veneta*, facile divi-
dendæ in 2. sectiones ex carpellorum superficie:

† *Carpella echinata* (*Typhalea* DG.)

1. *P. spinifex* = W. sp: III. 834. (*Amer: calidior:*).
Arbor, frutex. Petala in var: α *ovalifolia* magna sc:
calyce 3-4-longiora, in var: β *aristata* vix calycem
æquantia; planta etiam ex specim: meis statuta mi-

nori vix frutescens folia refert basi rotundata nec cordata.

†† *Carpella inermia*.

α *Involucr: calyce brevius* (*Malacha* DC. ex Trew:)

2. *P. prœmorsa* = W. sp: III. 833. (*C. B. S.*). Frutex. Flores mediocres pulchri rubescentes exsiccatione virides evadunt. Cult: in H. Ripul: = 3. *P. Columella* = Cav: diss: III. p. 138. t. 48. f. 3. (*Ins: Mascar:*). Suffrutex in specim: meis ex BALB: pilosiusculus nec foliis *glabriusculis* uti in diagn: SPR:; pedunculi saepius petiolos subæquant vel etiam superant, nec sunt multo *breviores* uti in phrasi DC. Prodr: I. 443. Flores mediocres ex albo flavescentes. = 4. *P. veneta* = SPR: syst: III. 98. ex Zannich: venet: 155. t. 91. (*In paludosis ad oram maris Adriatici*). Perenn: Planta elegans: petala amplissima dilute rubra; habitu potius ad *Hibiscum* quam ad *Pavoniam* accedit; stigmata 5. tantum, sed carpella 5-divisa; ludit igitur inter utrumque genus. = 5. *P. racemosa* = Sw: fl: ind: occ: II. p. 1215. (*In paludosis Jamaicæ et Guadal:*). Frutex. Involuci foliola potius *linearia* quam *lanceolata* in optimo specim: meo ex BERTERO: flores parvi ex albo lutei.

β *Involucr: calyce longius* (*Cacellaria* DC.)

6. *P. zeylanica* = W. sp: III. 838. excl: synon: Seb: sec: DC. (*Ind: orient:*). Ann: Pedicelli in specim: meis foliis partitis longiores; hinc pertinent ad var: β *Carallinesii* (DC. Prodr: I. 444); involucrum

setaceum ciliatum calycem longe superat et corollam subæquat; petala incarnata parva.

Pavoniæ dubiæ vel novæ.

7. *P. pilosa* = W. en: suppl: Specim: ex hb: BIROLI s. fl: Stirpem non invenio apud DC. et SPR: ; tota planta valde pilosa setis simplicibus; felia 5-fida laciniis ovato-lanceolatis inæqualiter sinuatis dentatisve media longiore superne glabriuscula rubro-marginata; petioli discum subæquant.

8. *P. Martii*. « Foliis sub-cordatis elongatis cre-nato-serratis subtus pallidioribus ac pube stellata adspersis, pedunculis terminalibus sub-aggregatis corolla longioribus, involucro 10-12-phyllo corollâ triplo breviori, carpellis 2-aristatis aristis elongatis retrorsum hirsutis, caule piloso. » NOB: Crescit in *Brasilia*. Missa a cl: MARTIO sine nomine specifico, distinctam stirpem constituere credimus ad 1. sectionem amandandam. *Caulis* fruticulosus, suberectus, compressiusculus, ad angulos villis crebris ac undique pilis raris adspersus, ramosus. *Folia* sub-cordata, elongata, acutiuscula, crenato-serrata, superne glabra viridia ad costam tantum pilis raris ornata, inferne pallidiora pubeque stellata conspersa; *petioli* filiformes villosiusculi folium æquantes; *stipulæ* 2-3-suprafoliaceæ structura foliorum. *Flores* 2-5. versus et ad apicem ramorum sub-aggregati; *pedunculi* corolla longiores; *involucrum* 10-12-phylum, foliolis linearibus pilosis corolla triplo brevioribus; *petala* semipollicaria ex sicco violacea; *carpella* 3-aristata aristis elongatis

retrorsum hirsutis. Accedit ad *P. spinifidem* Cav: , sed differt foliis valde minoribus elongatis, pedunculis terminalibus : an var: δ *grandiflora* (DC. Prodr: I. 443.) quæ folia refert cordata , corollásque calyce 2-3-longiores ?

9. *P. lanceolata*. « Foliis lanceolatis glabris crenulatis cuspidatis 1 - nerviis bullatis petiolo dimidio longioribus , pedunculis brevibus axillaribus ? solitariis 1-floris involucrisque foliolis 15 - 20. calyce longioribus villoso - rubiginosis , carpellis inermibus. » Nob: Crescit in *Brasilia Barra de Tuna*. Accepta cum priori etiam sine nomine specifico , pertinet certe ad *Cacellariam* , sed valde differt a ceteris ejusdem sectionis stirpibus. *Caulis* sub-fistulosus (hinc herbaceus ?) erectus , teres , lævis , glaber , simplicissimus. *Folia* patentia , lanceolata , crenulato-serrata , cuspidata , 1-nervia , reticulato-venosa , bullata , 4-5-poll: longa 1-lata ; *petioli* lineares , semi-teretes , villosumculi , folio dimidio breviores. *Pedunculi* 1-flori villoso-rubiginosi involucro breviores (terminales an axillares ignoro , nam in specim: ceciderunt ; at ex cicatricibus adparent axillares solitarii). *Involucr:* 15-20-phyllum foliolis linearis - lanceolatis , arcuatis , rubiginosis , calyce longioribus. *Corolla* non extat in specim: *Carpella* inermia. *Stirps* admodum distincta præsertim foliorum longitudine ac figura quæ in ceteris plus minusve cordata vel lobata ; hic reapse *lanceolata* indivisa.

IX. ACHANIA Swartz Prodr: II. = *Hibisci* sp: L. = *Malvavisci* sp: Dill: , Cav: , DC.

» *Involucr:* polyphyllum. *Petala* erecta convoluta
» basi saepius auriculata. *Stigmata* 10. *Carpella* 5.
» baccata connata 1 - sperma. Cetera ut in praece-
» dentibus. »

Obs: Genus ab *Hibisco* vix distinctum petalis *con-*
volutis, numero stigmatum, et fructibus baccatis, a
DC. sub *Malvaviso* relatum ac in 2. sectiones dis-
tinctum, quarum prima *Achanias* veras continet, al-
tera *Anoteas* a SPR: omissas, nec satis notas. Species
plures valde dubiae etiam inter *Achanias*.

1. *A. Malvaviscus* = Sw: fl: ind: occid: II. p. 1222.
(Amer: calid:). Arbor elegans; flores coccinei ut in
sequentibus, cum quibus culta in H. Ripul: = 2. *A. pilosa*. = Sw: fl: ind: occid: II. p. 1224. (Jamaica,
Mexico). Vix differt a priori caule foliisque pilosiu-
sculis, involucro foliolis sub-patentibus. = 3. *A. mollis*
= Ait: h. Kew: ed: 1. vol. II. p. 459. (Mexico). Ma-
gis priori quam *A. Malvaviso* accedit foliis molliter
pilosis involucro patulo. Ceterum tres istae stirpes
habitu tam similes ut vix pro varietatibus haberent
possint.

X. HIBISCUS Lin: gen: n. 846. = Lam: ill: t. 584.

» *Involucr:* saepius polyphyllum. *Petala* expansa raro
» convoluta non auriculata. *Stigmata* 5. *Carpella* 5.
» in capsulam 5-locularem coalita pleiosperma. Cetera
» ut in precedentibus. »

Obs: Difficillimum genus quoad stirpium deter-

minationem, ac divisionem, quarum nonnullæ ad *Achaniam* accedunt ratione corollæ *involutæ*; aliæ corollam utique expansam gerunt, sed differunt calycis forma vel involueri divisione tum etiam fructus stru-
ctura et seminum superficie; hinc confusio penes Au-
ctores in synonymia et sectionibus: numerus stirpium ex DC. 117., ex SPR: (quem hic sequor) 85. Arbo-
res, frutices vel herbæ sæpius elegantissimæ fere om-
nes exoticæ.

† Corolla convoluta

(*Cremonia* DC. ex Comm:)

1. *H. pedunculatus* = Thb: Prodr: 118. (*C. B. S.*). Suffr: Flores mediocres; petala ex sicco rosea; pedun-
culi in specim: folio triplo longiora. = 2. *H. tubu-
losus* = Cav: diss: III. p. 161. t. 68. f. 2. (*Ind:*
orient:). Ann: Flores mediocres; petala flavescentia,
ad unguem purpurea. = 3. *H. urens* = L. supp: 309.
(*C. B. S.*). Perenn: jam cultus in H. B. T.

†† Corolla expansa.

α *Calyce spathaceo longitudinaliter fisso.*

4. *H. Manihot* = L. sp: 980. (*Ind: orient: et occid:*). Frutex elegantissimus. Flores ampli ex luteo
virides; in var: β (*H. palmatus* Cav:) lobi foliorum
inferiorum breves sub-rotundi, superiorum lato-lan-
ceolati profundiores, summorum usque ad basim par-
titi lineari-lanceolati. Cult: in H. Ripul: Inter *Ma-*
nihot DC. = 5. *H. esculentus* = L. sp: 980. (*Ind:*

orient: et occid:) Ann: Folia inferiora indivisa, superiore 3-5-loba; flores parvi: ex H. B. T. Inter *Abelmoschos* DC. Huc pertinere videtur *H. Bamia* TAR-
GIONI quem mancum possideo ex hb: BIROLI.

β Involucr: foliolis appendiculatis.

6. *H. radiatus* = Cav: diss: III. p. 150. t. 54. f. 2. (*Ind:* orient:). Suffrut: Flores in specim: desunt. Inter *Furcarias* DC. ; omissis a SPR: = 7. *H. scaber* = Michx: fl: bor: am: II. p. 45. (*Carolin:*, *Florid:* paludosis). Perenn: Flores ampli sulphurei. Inter *Furcarius* DC.

γ Involucr: 5-poly-phyllo æquali.

1. Calycibus sub-foliaceis.

8. *H. diversifolius* = Jacq: ic: rar: III. t. 551. *H. ficalneus* Cav: non L. (*Ind:* orient:). Frutex aculeatus. Flores mediocres; petala flava ad unguem atrata. Inter *Abelmoschos* DC. = 9. *H. heterophyllus* = Vent: malm: t. 103. (*Nov: Holl:*). Frutex aculeatus. Flores amplissimi; petala albo - rosea ad unguem purpurea: cult: in H. Ripul: Inter *Abelmoschos* DC. = 10. *H. cannabinus* = L. sp: 979. (*Ind:* orient:). Ann: Aculeatus; flores magni; petala luteola ad unguem fusca: ex H. B. T. Inter *Abelmoschos* DC. = 11. *H. vitifolius* = L. mant: 569. (*Ind:* orient:). Ann: Flores ampli; petala flava ad basim atrata: jam cult: in H. B. T. ex quo specim: mea. Inter *Abelmoschos* DC. = 12. *H. Rosa-sinensis* = L. sp: 977. (*Ind:* orient:). Frutex inter omnes elegantissimus; flores amplissimi

sæpius pleni; petala rosea, rubra, alba vel flava. Cult: in H. Ripul: c. varr: Inter *Ketmias* DC. = 13. *H. syriacus* = L. sp: 978. (*Syria, Carniola*). Frutex elegans. Flores ampli valde variantes colore et plenitudine. Ubique cult: sub dio nomine vern: *Malva arborea*. Inter *Ketmias* DC. = 14. *H. Abelmoschus* = L. sp: 980. (*Ind: orient: et occid:, Ægypto*). Arbor hirsutissima. Flores mediocres flavi; semina moschata. Inter *Abelmoschos* DC. = 15. *H. mutabilis* = L. sp: 977. (*Ind: orient:*). Arbor elegans. Flores ampli, dum aperiuntur albi, hinc rosei, demum rubri. Cult: in H. Ripul: ubi raro floret. Inter *Abelmoschos* DC. = 16. *H. Moscheutos* = L. sp: 975. (*Amer: bor:*). Perenn: Flores amplissimi in pedunculis petiolo coalitis; petala alba vel rosea ad unguem purpurea. Inter *Moscheutos* DC. = 17. *H. palustris* = L. sp: 976. non Savi (*Amer: bor: paludib:*). Perenn: Flores ampli in pedunculis liberis; petala alba, rosea, aut flavida. *H. palustris* SAVI (*aquaticus* DC. et SPR:) *Etruriæ* incola differt pedunculis prope basim articulatis, in nostro *supra medium*. Colo tamen plantam enatam e semi-nibus missis a cl: BALEISIO sub nomine *H. aquatici* quæ facie a *palustri* L. et *aquatico* DC. non differt, sed folia nunquam 3-loba vidi, ac pedicellos constanter supra medium articulatos; an igitur planta L. et SAVI eadem vel varietates? Huc forsitan pertinet etiam *H. roseus* THOR: Inter *Moscheutos* DC. = 18. *H. speciosus* = Ait: h. Kew: II. p. 456. (*Carolin: , Florid:*). Perenn: Flores amplissimi fere ut in *H. Rosa-sinensi* n. 12. coccinei. Inter *Moscheutos* DC. = 19. *H. phœniceus* = L. suppl: 310. (*Ind: orient:*

et occid:). Suffrutex pulchellus. Flores ruberrimi parvuli; in specim: meis quæ pertinent ad var: β involuci foliola calycem superant. Inter *Bombicellas* DC. = 20. *H. militaris* = Cav: diss: VI. p. 352. t. 198. f. 2. (*Amer: bor:*). Perenn: Specim: mea ludunt inter *H. palustrem* et *aquaticum*; forsitan ad verum *militarem* non pertinent, folia enim subtus *tomentosa* non *glabra*.

2. Calycibus membranaceis inflatis.

* 21. *H. Trionum* = L. sp: 981. non Thb: = Spr: syst: III. 453. = Cav: diss: III. p. 171. t. 64. f. 1. et p. 172. t. 64. f. 3. pro var: β *ternato*. Ic: taur: vol. 25. t. 40. (*Italia, Carniola. Pedem:* in arvis *Novarice* et flumini *Ticini* interjectis ALL: n. 1413: Non enumeratur tamen a BIROLIO fl: acon: *C. B. S.* pro var: β). Ann: Flores mediocres; petala flavescen-
tia basi atrata; variat statura et foliorum segmentis:
Cult: in H. Ripul: Inter *Triona* DC. Huc forsitan per-
tinet *H. Humboldtii* MART: ined: et STEUD: Vid: COLLA
H. Ripul: app: II. p. 349. et 350. not. 3.

22. *H. vesicarius* = Cav: diss: III. p. 571. t. 64.
f. 2. (*Afr: austr:*). Ann: Priori valde affinis sed foliis
superioribus 5-lobis, lobis sub-æqualibus distinctus.

δ Involucr: 1-phylllo multidentato.

23. *H. tiliaceus* = L. sp: 976. (*Ind: orient:*). Suf-
frut: Flores parvi ex albo lutei. Inter *Azanzas* DC.
= 24. *H. Sabdariffa* = L. sp: 978. (*Ind: orient: et*
occid:). Ann: Flores desunt in specim:

Hibisci dubii.

25. *H. Jacquinii* = Colla H. Ripul: app: IV. p. 168. t. 12. « *H. sub-lignosus piloso-pruriens*, foliis longe petiolatis cordatis sub-7-lobis inæqualiter dentatis, pedicellis brevibus, involucello 5-phyllo calyceque 5-lobo petalis expansis triplo brevioribus (flores luteoli basi atrati). »

26. *H. pungens*. = Enatus e seminibus missis a cl: SCHULTESIO sub hoc nomine, nondum floruit; folia amplissima palmato-7-loba, lobis profundis acuminatis inæqualiter sinuatis dentatisve, pilis urentibus præsertim ad nervos conspersa. = 27. *H. pruriens* = Roxb: Specim: meum ex hb: BIROLI communicatum a cl: BALBISIO non quadrat nec cum diagnosi SPR: et DC., nec cum nostro *H. Jacquinii* n. 25. Plantula quidem herbacea, pilosa uti ex diagnosi DC. Prodr: I. 448.; sed folia *tomentosa* nec *glabriuscula*, evidenter *tri-loba*, lobis lanceolatis, medio productiore; involucellum et calyx uti in citata diagnosi; petala ex sicco flava. = 28. *H. arenarius* = Scop: Ita in scheda ex hb: BELLARDI a PASCHAL communicata. STEUDEL: hanc plantam enumerat, quam non inveni apud SCOP: fl: Carn:; de ipsa silent DC. et SPR:; an sub alia stirpe relata absque synonymo? Diagnosis hæc erit: « *H.* » caule erecto simpliciuscule piloso, foliis longe petiolatis pilis raris adspersis 3-partitis laciniis inferioribus 2-lobis media productiori lanceolata sub-serrata, pedicellis axillaribus solitariis petiolo longioribus 1-floris, involucris foliolis ro-linearibus petalis flavescentibus paullo brevioribus. »

29. *H. anonimus* = Mart: hb: Missus a cl: MARTIO sub hoc nomine, species distincta videtur et sic definienda: « *H. caule* (fruticoso ?) erecto ramoso foliis glanduloso-viscosis, foliis 3-lobis serratis subtus albidiusculis lobis divaricatis basi dilatatis acutis, pedicellis axillaribus terminalibusque subbinis petiolo sub-longioribus 1-floris, involuci foliolis 10 - 15. linearibus calyce inflato longioribus (petala desiderantur in specim:). »

XI. THESPESIA Corr: ann: mus: IX. p. 290. t. 135. = *Hibisci* spec: L.

» *Involucr:* 3 - phylum deciduum. *Calyx* truncatus. *Capsula* 5-locularis loculis basi 4 - spermis. » Cetera ut in *Hibisco*. »

Obs: Genus constans 2 - 3. stirpibus, quarum sequens ab *Hibisco* adempta.

1. *Th: populnea* = Corr: l. c. (*Ind: orient: et occid:*). Arborea. Flores magni, petala ex albo flavescentia. Cult: in H. Ripul:

XII. GLOSSYPIUM Lin: gen: n. 845. = Lam: ill: t. 586.

» *Involucr:* 3-partitum segmentis inciso-dentatis. » *Calyx* 5-dentatus. *Stigmata* 3-5. *Capsula* 3-5-locularis polysperma. *Semina* lanigera. Cetera ut in præcedentibus. »

Obs: Genus, monente DC., incertis speciebus constans 13. et ultra, nunc a SPR: ad 8. redactis. Herbæ vel frutices *Indiarum*.

† *Frutescentia.*

1. *G. arboreum* = L. sp. 975. (*Ind: orient:*). Arborescens. Jam diu cultum in H. Ripul: numquam floruit. = 2. *G. religiosum* = L. sp. 975. (*Ind: orient:*). Frutescens, perenn: ? In calid: H. Ripul: frutescens evadit, floret, sed fructus non emitit. = 3. *G. barbadense* = L. sp. 975. (*Ins: Carib:*). Frutescens. In optimo specim: a BERTERO lecto in *Guadalupe* folia non semper subtus 3. sed aliqua 1-2-glandulosa.

†† *Herbacea.*

4. *G. herbaceum* = L. sp. 975. (*Ind: orient:*). Ann:, perenn: Cult: in H. Ripul: sub dio ubi floret in anno, et quandoque fructum maturum refert. Huc forsitan variæ species referendæ seminibus albis vel nigris, lana alba, sub-flavida etc. = 5. *G. hirsutum* = L. sp. 975. (*Ind: occid:*). Ann:, bienn: In specim: meo ramuli foliorum, nervi petiolique tantum hirsuti; ceteræ partes glabræ.

XIII. REDOUTEA Vent: h. Cels: t. 11. = *Fugosia* A. S. Hill:

» *Involuer:* 10-12-phyllum brevissimum. *Cal:* 5-
» partitus. *Stygm:* 3. *Caps:* 3-locularis 3-valvis po-
» lysperma. Cetera ut in *Gossypio*. »

Obs: Genus constans 2. stirpibus novis a *Gossypio*
valde distinctis praesertim involucri foliolis linearibus
brevissimis.

1. *R. heterophylla* = Vent: l. c. (Ad fl: *Orinocum*).
Ann: Specim: optimum ex hb: BELLARDI missum a

VENT: ; laciniæ calycinæ ovato-oblongæ ; petala duplo longiora pallide purpurea (sulphurea ex VENT:).

Sect. II.

Calyx basi nudus.

XIV. PALAVIA Cav: diss: I. p. 40. non Poir: = Lam: ill: t. 577.

» *Calyx nudus* 5-fidus. *Carpella* 1-sperma plurima » sine ordine glomerata. »

Obs: Species 2 herbaceæ floribus axillaribus solitariis.

1. *P. malvæfolia* = Cav: l. c. (*Peruv:*) = 2. *P. moschata* = Cav: l. c. p. 41. (*Peruv:*). Differt a priori foliis obtusis, et pedunculis folio longioribus.

XV. SIDA Lin: gen: ed: Schreb: n. 1129. inclusa *Napæa* = Lam: ill: t. 578. pro *Sida*, 579. pro *Napæa*.

» *Cal:* nudus 5-fidus. *Stylus* apice multifidus. *Carpella* capsularia tot quot styli divisiones in orbem » globosum vel plus minusve depresso disposita 1- » locularia 1- vel oligosperma, mutica aut aristata, » quandoque bialata. »

Obs: Genus valde polymorphum, hinc difficillimum, ab Auctoribus saepe in plura divisum præsertim ex forma fructus, modo in unum a cl: SPR: redactum comprehendens *Cristaria* et *Anoda* Cav: ; *Periptera* DC: ; *Napæam* L: ; *Sidam*, *Bastardiam*, *Gayam* et *Abutilon* KUNTH. Spec: ex DC. (exclusis *Cristaria*, *Anoda* et *Periptera*) 195., quarum 30. non

satis notæ, ex SPR: 176., omnibus allatis generibus inclusis. Frutices aut herbæ, raro arbores commodius artificialiter dividendæ in 4. sectiones ex carpellorum structura.

† *Carpellis 2-alatis (Cristaria Cav: et DC.).*

Ex hac sectione nullam speciem possideo.

†† *Carpellis rostratis seu 2-cuspidatis.*

1. *S. angustifolia* = Lam: dict: I. p. 4. non Mill: (Ins: *Mascaren:*). Perenn: Pedunculi 1-flori folio breviores; flores minimi; petala ex sicco luteola. =
2. *S. spinosa* = L. sp: 960. (Intra *Tropicos* totius orbis.). Ann: Vix differt a priori radice *annua*, foliis ovato-non *linearis-lanceolatis*, stipulis pedunculo *longioribus*. = 3. *S. spiciflora* = W. en: suppl: 49. (*Brasil:* sec: SPR:, patria incerta sec: DC.). Frutescens. Pedunculi axillares 2-5 petiolum sub-æquantes; flores minimi; petala flava calyce acuminato paullo longiora. Cult: in H. Ripul: e seminibus missis sub nomine *S. ulmifoliæ*. Huc arbitror pertinere *S. patulam* PERS: euch: II. p. 243. quam siccam possideo ex MOLINERIO, omissam a SPR: et inter dubias enumeratam a DC. Prodr: I. 472. n. 175.; inter hanc et plantam a me cultam nullam nec minimam video differentiam. = 4. *S. rhombifolia* = L. sp: 961. (*Ind:* orient: et occid:). Frutesc: Pedunculi 1-flori stricti folio longiores; flores minimi; petala lutea. =
5. *S. triangularis*. = W. en: 725. ex H. et B. (*Mexico*). Ann: Pedunculi 1-flori folio valde longiores; flores mediocres, laciniæ calycinæ acuminatæ, petala

rosea; stipulæ setaceæ in specim: meis ex BALBISIO petiolum excedunt. = 6. *S. carpinifolia*. = L. fil: suppl: 307. (Ins: *Canariis*; ins: *Mauritianis* var: β *betulina* JACQ:). Suffrut: Pedunculi 3-4-flori brevisimi; flores parvi; petala lutea; foliorum serraturæ seta rigida terminatæ; in var: β folia paullo latiora, serraturæ magis distantes nudæ. Cult: in H. Ripul: = 7. *S. alba*. = L. sp: 960. non Cav: (*Ind. orient:*). Ann: In specim: meis ex BALBISIO pedunculi 1-flori, inferiores petiolum subæquant, sed superiores ipsum valde superant; flores minimi; petala alba. = 8. *S. tiliæfolia* = Fisch: cat: h. gor: 1808. (*China, Thibet*). Ann: Pedunculi petiolis breviores axillares 1-flori, terminalesve pauciflori; flores mediocres; petala lutea.

* 9. *S. Abutilon* = L. sp: 963. = Spr: syst: III. 112. = Houtt: syst: VIII. p. 436. t. 61. (*Eur: austr:*, *Asia med: Pedem:* circa pagos et urbes frequens; in vineis di *Borgomasino* ALL: n. 1412. Circa urbem *Taurini* RE fl: torin: I. p. 354.). Ann: Pedunculi ut in priore cui valde affinis; flores paullo majores.

10. *S. mollissima* = Cav: diss: II. p. 49. (*Peruvia*). Frutic: Pedunculi petiolum sub-æquantes; flores mediocres; petala albo-rosea. = 11. *S. mauritiana* = Jacq: ic: rar: I. misc: 2. p. 352. (Ins: *Maurit:*). Frutic: Pedunculi sub-2-flori petiolo longiores; flores parvi; petala in specim: meo ex H. B. T. calyce triplo longiora flavescentia. = 12. *S. virgata* = Cav: ic: p. 53. t. 73. (*Peruvia*). Frutic: Pedunculi 1-flori superne geniculati petiolo longiores; flores parvi; petala flava calyce breviora. = 13. *S. borbonica* = Cav: diss: I. p. 9. (Ins: *Mascar:*). Frutic: Pedunculi 1-

flori petiolo valde longiores; flores mediocres; petala albo-rosea. = 14. *S. crassifolia* = Herit: stirp: I. p. 125. t. 60. (*Hispaniola*): Frutic: Pedunculi 1-flori sub-bini petiolorum longitudine; flores parvi, petala flava. Culta in H. Ripul: e seminibus missis sub hoc nomine, numquam folia 3-cuspidata gessit ut in *S. tricuspidata* Cav: quam W., DC., et SPR: eamdem esse putant ac *S. crassifoliam* HERIT:; ceterum quadrat cum diagnosi hujus auctoris. = 15. *S. rotundifolia* = Cav: diss: I. p. 20. et diss: VI. p. 522. t. 3. f. 6. et 194. f. 2. (Ins: *Mascar:*). Herbacea. Pedunculi 1-flori sub-solitarii petiolo longiores (nonnulli in specim: meo breviores); flores parvi, petala flava. = 16. *S. althæifolia* = Sw. Prodr: 101.; Fl: ind: occid: II. p. 1207. (*Jamaica*, *Guadalupa*). Suffrutic: Pedunculi in specim: meo a BERTERO *Guadalupa* lecto axillares et terminales constanter 1-flori solitarii vel 1-5 ad apicem ramulorum; flores mediocres; calyx valde tomentosus; petala flavescentia. = 17. *S. pyramidata* = Cav: diss: I. p. 11. et VI. p. 549. t. 1. f. 10. et t. 194. f. 1. (*Hispaniola*). Frutic: Paniculæ laxæ magnæ foliolosæ; flores parvi, petala alba. Cult: in H. Ripul: = 18. *S. atrosanguinea* = Jacq: ic: rar: I. t. 136. et collect. I. p. 49. (*Amer: austr:*). Frutic: Pedunculi axillares vel ad apicem ramulorum solitarii vel sub-corymbosi (non paniculati) petiolo longiores; flores parvi, petala rubra. Confusa a DC. Prodr: I. 465. cum *S. paniculata* L., differt pluribus notis ex SPR: syst: III. n. 66. 67. et ex specim: meo de *S. atrosanguinea* collato cum iconibus a DC. citatis. = 19. *S. nudiflora* = Herit: stirp: I. p. 123. t. 59.

bis (*Hispaniola*, *Peruvia*). Frutic: Panicula longissima sub - racemosa aphylla; flores mediocres, petala flava. Cult. in H. B. T. Hic forsitan a SPP: confusæ variæ species. = 20. *S. periplocæfolia* var: β *cariæa* = DC. Prodr: I. 468. Colla H. Ripul: app: I. p. 137. not. 1. (*Jamaica*). Suffrut: Culta in H. Ripul: valde differt a var: γ *peruviana*, quam siccam possidco ex BERTERO, foliis brevius petiolatis sere sagittatis glabriusculis, pedunculis sub-corymbosis axillaribus terminalibusque nec constanter axillaribus solitariis, floribus minoribus; habitus quoque diversus: an igitur species distincta ceu dubitavit cl: DC.? Tunc *S. Candoleana* appellanda et sic definienda:

» *S. caule* fruticuloso, foliis brevi petiolatis cor-
» datis acuminatis s. sub-sagittatis superne glabris in-
» ferne albido-tomentosis, pedunculis axillaribus
» terminalibusve sub-corymbosis, carpellis 5 ovato-
» acuminatis (flores minimi, petala flava). » Nob:
= 21. *S. umbellata* = L. sp: 962. (*Jamaica*, *His-paniola*). Ann: Pedunculi axillares et terminales petiolis longiores 1-4-flori sub-umbellati; flores parvi, petala flava. Specim: optimum ex BERTERO. = 22. *S. hastata* = W. sp: III. 763. (Nov: *Hispania*, *Cuba*, Amer: austr:). Ann: Pedunculi axillares solitarii folium æquantes; flores mediocres: variat foliorum forma et petalorum colore sec: DC. Prodr: I. 458. sub *Anoda*. Specim: ex BERTERO cum sequenti.
= 23. *S. cristata* = W. sp: III. 763. (*Mexico*). Ann: Pedunculi ut in priori sed folium longe superantes; flores magni, calyces villosissimi acuminati, petala purpurea sub-emarginata. = 24. *S. Dilleniana* = W.

sp: III. 764. (*Mexico*). Ann: Specim: meum ex hb: BIROLI perfecte non quadrat cum descriptionibus Auctorum; folia inferiora sunt cordato-orbiculata, media triangulo-sub-hastata, summa hastato-lanceolata, pedunculi folio longiores, petioli et calyces villosissimi: an sp: distincta? an prioris, cui magis accedere videtur, var: ? = 25. *S. acerifolia* = Lag: nov: gen: p. 21. (*Nova Hispania*). Frutic: Pedunculi axillares solitarii 1-flori folio longiores; flores mediocres, petala purpurascentia. Specim: meum *sub-villosum*, non totum *hispidum* uti in observation: DC. Prodr: I. 572.

+++ *Carpellis muticis.*

26. *S. orientalis* = Cav: diss: I. p. 21. (*Ind: orient:*). Suffrut: Pedunculi axillares solitarii brevissimi; flores mediocres, petala alba fimbriata. = 27. *S. rhomboidea* = Roxb: ex journ: bot: 1814. v. 4. p. 207. (*Ind: orient:*). Frutic: Culta in H. Ripul: nondum floruit. = 28. *S. foetida* = Cav: diss: VI. p. 349. (*Peruvia*). Suffrutic: ex SPR: , ann: ex W. et DC. Pedunculi axillares vel secus caulem 1-flori petiolo dimidio breviores; flores mediocres, petala flava ad basim atrata integra. = 29. *S. hernandioides* = Herit: stirp: I. p. 121. t. 58. (*Hispaniola*). Suffrutic: Pedunculi axillares terminalesve sub-racemosi 1-flori petiolis breviores; flores minimi. Specim: ex hb. BIROLI subferrugineo-tomentosum. = 30. *S. mutica* = Delil. ill: æg: n. 633. (*Ægypt: super:*). Suffrutic: Pedunculi axillares stricti pauciflori sub apice geniculati petiolis sub-breviores; flores mediocres, petala ex

siccо lutea basi rubro-fusca. = 31. *S. triquetra* = L. sp: 962. (*Amer: tropic:*). Frutesc: Pedunculi axillares solitarii 1-2-flori folium sub-aequantes; flores parvi, petala lutea basi purpurea. = 32. *S. vesicaria* = Cav: diss: II. p. 58. t. 14. f. 3. (*Mexico*). Frutic: Pedunculi axillares solitarii 1-flori folio longiores; flores medios, petala flava. = 33. *S. indica* = L. sp: 964. (*Ind: orient:*). Ann: Pedunculi axillares terminalesve sub-racemosi petiolo longiores; flores ut in priori, a qua differt praesertim radice *annua* et pedunculis *racemosis*: facies tamen fere eadem. = 34. *S. hirta* = Lam: dict: I. p. 7. (*Ind: orient:*). Ann: Pilosissima; pedunculi axillares solitarii 1-flori petiolum subaequantes; flores medios, petala flava calycem cuspidatum vix excedentia. = 35. *S. populifolia* = Lam: dict: I. p. 7. (*Ind: orient:*). Ann: Priori affinis, sed folia ovata non sub-rotunda, vix tomentosa; pedunculi petiolos valde superantes. = 36. *S. asiatica* = L. sp: 964. (*Ind: orient:*). Ann: Medium tenere videtur inter *S. hirtam* et *populifoliam*. = 37. *S. arborea* = L. fil: suppl: 397. (*Peruvia*). Arborescens. Pedunculi axillares gemini petiolo longiores; flores amplissimi campanulati, petala alba vel flavida. Cult: in H. Ripul: = 38. *S. crispa* = L. sp: 964. (*Carolina, Amer: tropic:*). Ann: Pedunculi axillares solitarii 1-flori petiolo longiores; flores parvi, petala alba. In specim: ex BALBISIO folia summa sunt etiam *petiolata*, nec *sessilia*. = 39. *S. humilis* = Cav: diss: V. p. 177. t. 134. f. 2. (*Ind: orient:*). Ann: Pedunculi axillares terminalesve solitarii, bini vel sub-corymbosi petiolo longiores ex specim: a-

BALBISIO; flores minimi, petala flava. Huc pertinent variæ species Auctorum, quæ tamquam varietates a W. sp: III. 744. et DC. Prodr: I. 463. considerantur; merito tamen speciem propriam constituit *S. veronicæfolia* Cav: et Spr: quæ pertinet ad 2. sectionem; habet enim carpella 2-aristata nec multica. = 40. *S. urens* = L. sp: 963. (*Jamaic:*, *Guanadup:*). Suffrut: Specim: ex BERTERÓ referunt pedunculos axillares binos, quorum alter brevissimus 2-florus, alter petiolo longior 5 - 7 flores glomeratos gerens; flores minimi, petala flavidæ. = 41. *S. mollis* = Ort: dec: p. 65. (*Peruvia*). Arborea. Folia in junioribus semi-pedalia, in adultis 4-pollicaria ex W: en: 724. sub *S. grandifolia*. = 42. *S. aurita* = Wall: in Link en: h. ber: II. p. 206. (*Bengal:*). Frutic: Pedunculi axillares terminalesve sub-corymbosi; flores mediocres, petala ochracea calyce duplo longiora. Cult: in H. Ripul: e seminibus missis a cl: MARTIO. = 43. *S. coccinea* = DC. Prodr: I. 465. (Ad flumen *Missouri*). Herbacea. Racemi terminales; pedicelli 2-3 secundi; flores mediocres, petala coccinea. Specim: ex PERRETIO sub *Malva*. = 44. *S. crenatiflora* = Spr: syst: III. 121. ex Pers: (Nov: *Hispan:*). Ann: Pedunculi axillares 1-3-flori folio breviores; flores parvi, petala flava. = 45. *S. triloba* = Cav: diss: I. p. 11. et V. p. 274. t. 1. f. 11. et t. 131. f. 1. (*C. B. S.*). Suffrut: Pedunculi axillares solitarii folio sub-longiores 1-flori; flores parvi, petala albida. = 46. *S. Napœa* = Cav: diss: V. p. 277. t. 132. f. 1. (*Amer: hor:*). Perenn: Corymbi terminales, et pedunculi axillares folio longiores sub-corymbosi; flores medio-

cres, petala alba. Specim: optima sub *Napæa hermaphrodita* L. eadem ac *N. lœvis*. = 47. *S. dioica* = Cav: diss: V. p. 278. t. 132. f. 2. (*Virginia*). Perehn: Differt a priori, cui valde affinis, foliis 7-9-lobis scabris, floribus dioicis seu fœmineis staminibus castratis. = 48. *S. jatrophoides* = Herit: stirp: I. p. 117. t. 56. (*Peruvia*). Ann: Pedunculi sub-corymbosi; flores minimi, petala violacea calyces acutissimos villosissimos vix excedentia.

++++ *Carpellis 3-valvibus 1-spermis.*

49. *S. occidentalis* = L. sp: 964. (*Nova Granata*). Ann: Pedunculi solitarii erecti petiolum subæquant ante anthesim, denum longiores et deflexi evadunt. = 50. *S. disticha* = Cav: ic: V. p. 12. t. 432. (*N. Hispan:*). Suffrut: Flores parvi, petala flava.

Sidæ novæ vel dubiæ.

51. *S. elegans* = Berter: ined: Colla H. Ripul: app: IV. p. 154. c. descript: et ic: t. 4. (*S. Martha*). Frutex sic definitus: « *S. tomentosa*, foliis cordatis » acuminatis sub-denticulatis subtus albidiорibus, pe- » dunculis 1-3-floris petiolo multoties brevioribus, » carpellis 8-10 acutis calyce brevioribus (flores pa- » niculati mediocres flavi). » COLLA l. c. p. 155.

52. *S. pulchra* = Colla H. Ripul: p. 129. c. de- script: et ic: t. 34. (*Guadalup: ex BERTERO*). « *S.* » caule erecto petiolisque villosissimis, foliis orbi- » culato-cordatis inæqualiter dentatis apice sub-trilobis » villosis, pedunculis solitariis 1-floris petiolo bre- » vioribus, carpellis 10-12 globoso-aggregatis trun-

» catis muticis 3-spermis (flores mediocres, petala flava basi lineis afro-violaceis picta). » COLLA l. c. not. 2. Possideo specimen mancum ex hb. BELLARDII cum scheda ita inscripta: « *S. pulcherrima* HERIT: quacumque exsiccatione flos colorem amittit. » Folii et floris forma a mea non videtur differre; reapse flos unicus in hoc specim: colorem amisit; in mea non mutatur: nil tamen certi asserere possum de hac planta quam nullibi sub eo nomine enumeratam vidi.

53. *S. nemorensis* = Mart. hb: (*Brasil: al Rio del Monte*). Communicata cum sequentibus usque ad n. 60. a cl. MARTIÖ. Planta pilosiuscula foliis cordatis ovatis serratis acuminatis petiolatis, pedunculis brevissimis axillaribus terminalibus binis 1-floris; flores minimi, petala ex sicco rosea calycem ovato-acutum parum excedentia. Carpella desunt in specim: = 54. *S. obsita* = Mart: hb: (*Brasil: , Almeida, Vela*). Densissime tomentosa, foliis late ovatis sub-cordatis dupliciter serratis acutis sub-sessilibus subtus albidiорibus; flores versus apicem caulis et ramorum racemosi sub-sessiles mediocres; petala ex sicco flavida calyce late ovato acutiusculo 2-3-longiora; carpella 5 mutica 1-sperma. = 55. *S. setosa* = Mart: hb: (*Brasil: , Rio Belmonte*). Glabriuscula, foliis lanceolatis superne acute serratis acuminatis subtus albidiорibus; pedunculi 1-5 axillares petiolo longiores ad medium geniculati 1-flori; flores parvi, petala flava calycem acutum vix excedentia; carpella 2-rostrata rostris seta longa terminatis. = 56. *S. tomentosa* = Mart: hb: non Cav: (*Brasilia, Cap: Frio*). Differt a *S. tomentosa* Cav: (*S. crassifolia* HERIT: n. 14.)

foliis membranaceis non crassis nec tomentoso-velutinis, subtus albidoribus, profundius et inæqualiter dentatis, pedunculis valde longioribus versus apicem geniculatis: flores parvi, petala lutea.

57. *S. capituliflora*. « Frutescens, foliis sub-cordato-ovatis acutiusculis serratis superne scabridis subtus albido-subtomentosis, pedunculis terminalibus petiolum sub-æquantibus capitulifloris, carpellis 5. 1-rostratis calycibusque hispidulis (petala lutea calycem acuminatum superantia) » NOE: Missa sine nomine specifico e *Brasilia Cap: Frio*, collocanda videtur pone *S. dumosam* Sw: (SPR: syst: III. 109.), a qua differt foliis acutiusculis tantum nec acuminatis, sub-tomentosis nec glabris, pedunculis non paniculatis sed reapse capitatis ex quo nomen nostrum specificum.

58. *S. subspicata*. « Frutescens undique tomentosa, foliis subcordato-oblongis acutiusculis obtuse-dentatis, pedunculis axillaribus petiolo brevioribus sub-spicatis, floribus congestis, carpellis 10-12 longe 2-aristatis scabridis (petala ochroleuca basi flava calyce duplo longiora) » NOE: Missa cum priori sine nomine specifico, medium tenere videtur inter *S. althæifoliam* Sw: et *maculatam* CAV: a quibus differt inflorescentia in prima pedunculis sub-3-floris, in altera racemoso-corymbosis; in nostra evidenter sub-spicati ex quo nomen specificum.

59. *S. subsessilis*. « Herbacea, foliis sub-sessilibus sub-amplexicaulibus cordato-lanceolatis acuminatis integerrimis subtus incano-tomentosis, pedunculis villosis axillaribus terminalibusve sub-corymbosis ad medium geniculatis, carpellis 5 acuminatis glabris

» calyce duplo longioribus (petala desunt in specimen) » Nob: Missa ut supra, valde affinis videtur *S. periplocæfoliæ* n. 20., a qua differt tantum foliis *sub-sessilibus*, pedunculis *villoſis* non glabris; an var: altera insignis foliis *sub-sessilibus*? Hab: in *Brasilia* ad *Portum Securum*.

60. *S. sericea*? Possideo sub hoc nomine duo specim: alterum ex cl: PERRETIO, alterum ex hb: BIROLI, quæ non videntur prorsus quadrare cum *S. sericea* Cav: a cl: DC. cum dubitationis signo relata ad *S. mollicomam* W. Planta PERRETII nulla refert folia 3-cuspidata, pedicelli autem petiolum superant; in planta BIROLII unum adest folium 3-cuspidatum a specim: evulsum (forsitan ex inferioribus?), cetera sunt ovato-oblonga indivisa. Conf: obs: DC. Prodr: I. p. 471. n. 162. circa specim: BALBISII.

61. *S. mexicana*? Sub hoc nomine quod citatum non video penes Auctores jamdudum accepi a MOLINERIO perfectissimum specim: a ceteris stirpibus forsitan recedens; an species non descripta? Tunc sic definienda: « *S. caule sub-tetragono pilosiusculo, foliis sub-hastato-cordatis lanceolatis sub-crenulatis acutis glabriusculis, stipulis linearis-lanceolatis erectis petiolum sub-æquantibus, pedunculis axillaribus solitariis 1-floris folio longioribus, carpellis 15-20 1-rostratis villosissimis (petala flava calyce villosissimo cuspidato duplo longiora)* » Nob: Hab:...?

XVI. LAGUNEA Cav: diss: III. p. 171. = Lam: ill: t. 580.
= Sub *Solandra* Murr: non Swartz:
» *Cal:* nudus 5-fidus. *Stigmata* 5. *Capsula* 5-lo-

» cularis 5-valvis, valvulis medio septiferis solubili-
» libus. »

Obs: Genus *Hibisco* valde affine sed involucro distinctum et fructum vere capsularem gerens, constans 4-5 stirpibus exoticis, quarum sequens elegantissima.

1. *L. squamea* = Vent: malm: t. 42. (Ins: *Norfolk*). Frutex. Flores ampli, calyx bractea caduca suffultus, ex quo ad *Hibiscum* relata a DC. in sect. XI. (*Lagunaria*); petala obtusa lâete violacea, capsula intus pilis urentibus adspersa. Cult: in H. Ripul: ubi modo abunde floret Aprili-Majo; sed semina rarissime ad maturitatem perveniunt. = 2. *L. lobata* = W. sp: III. 733. (Ins: *Mascar:*) Ann: Flores mediocres, petala acuta ex sicco flavescentia. Huc pertinet *L. angulata* LINK sec: SPR: a DC. omissa, cuius specim: possideo ex hb: BIROLI ab H. Berolinensi; foliorum lobi sunt valde breviores et obtusiores quam in *L. lobata*.

Obs: geographica circa *Malvaceas*.

Malvaceæ per orbem sparsæ enumerantur ex DC. 559

Malvaceæ pedemontanæ.

<i>Malva</i>	7
<i>Althæa</i>	4
<i>Lavatera</i>	6
<i>Hibiscus</i>	1
<i>Sida</i>	1
									<hr/>
									19

Et sic vix vigesimam octavam partem constituant.

ORDO XXV.

BOMBACEÆ

(Kunth diss: malv: p. 5. = DC. Prodr: I. 475. =
Sterculiaceæ Bombaceæ Schott et Endlich
 maletem: botan: in Arch: bot: Paris tom. I. p. 424.)

Obs: Ordo tam dubius, ut certos characteres essentiales constantes nec ei, nec sequenti (*Bytneriacæ*) proponere nou audeam. Sistit autem 15. circiter genera ex DC. vel nova, vel sejuncta a *Malvaceis* Juss: a quibus proprie differt tantum calyce non veré valvato et staminibus sæpius apice pentadelphis. Cons: tamen SCHOTT et ENDLICH l. c. ubi *Bytneriacæ* et *Bombaceæ* sub nomine *Sterculiacearum* conjunctis, ordinem subdiviserunt in *Helicteræas*, *Sterculiæas* et *Bombaceas*, 17. novis generibus additis vel ex plantis novis, vel in præcedentium detrimentum creatis. Arbores aut frutices intratropicales, habitu vario.

I. HELICTERES Lin: gen: n. 1024. = Lam: ill: t. 735.
 (Inter *Sterculiaceas Helictereas* Schott et Endlich).

» *Cal:* tubulosus sub - 5 - fidus. *Pet:* 5. ligulata.
 » *Stam:* 5 sæpius 10 raro poly-andra longe monodelpha basi in urceolum germini arcte circumpositum et cum ipso stipitatum connata. *Ovarium* longe stipitatum. *Styli* 5. basi concreti. *Carpella* 5. arcte conniventia 1-locularia polysperma sæpius spiratim contorta. »

Obs: Genus polymorphum et forsitan in posterum dividendum ex staminum numero et forma fructus, nunc ad Gynandriam decandram vel dodecandram ab Auctoribus relatum, constans stirpibus 17. ex DC., 14. ex SPR:, ad 2. a SCHOTT et ENDLICH reductum, ceteris ad alia genera amandatis.

1. *H. Isora* = L. sp: 1366. Sub *Isora* Schott et Endlich l. c. p. 425. (*Malabar, Moluccis*). Frutex. Stamina 10-andra; fructus contortus apice subulatus. Cult: in H. Ripul: = 2. *H. jamaicensis* = Jacq: amer: 235. t. 179. f. 99. (*Jamaica*). Arbor. Stamina 10-andra, fructus contortus apice obtusus. = 3. *H. semitriloba* = Colla H. Ripul: p. 65. ex Bertero c. descript: (In sylvaticis et fruticosis secus torrentem *S. Domingo Bany*). Frutex. Stamina 10-andra; fructus rectus oblongus. Male a SPR: syst: III. 81. relata inter species *fructibus nondum notis*, nam hi concinne descripti a BERTERO in COLLA l. c.

Helicteres dubiæ.

4. *H. Martiana*. « Decandra, foliis ovatis basi subcordatis apice acutis inæqualiter duplicato-serratis supra hispidulis subtus albo-tomentosis, pedunculis sub-aggregatis 1-floris, petalis longe unguiculatis oblongis, fructibus longissime stipitatis contortis velutinis subulatis. » NOB: Humaniter communicata sine nomine specifico a cl: MARTIO et ab ipso in *Brasilia* lecta, media videtur inter *H. althæifoliam* LAM: et *greviæfoliam* DC.; differt autem a prima foliis *duplicato-serratis*, pedunculis

1-floris aggregatis, ab altera, cui forsitan magis affinis,
foliis superne *hispidulis* nec *tomentosis*.

II. ADANSONIA Lin: gen: n. 836. = Lam: ill: t. 588.
(*Inter Sterculiaceas Bombaceas* Schott et Endlich
l. c.).

» *Cal*: 5-partitus deciduus. *Pet*: 5. ad basim coa-
lita. *Urceolus* staminum superne dilatatus polyan-
drus. *Stylus* ab urceolo longe exsertus in stigmata
numerosa stellatim disposita divisus. *Capsula* li-
gnosa 10-locularis indehiscens, loculis polyspermis.
» *Semina* pulpa farinacea immersa. »

Obs: Genus 1-2 species modo comprehendens, inter quas sequens admiranda utpote arbor diametro ceteras modo cognitas valde excedens.

1. *A. digitata* = L. sp: 960. (*Senegal, Agypt*):
Culta in H. Ripul: nondum floruit.

III. BOMBAX Lin: gen: n. 835. = Lam: ill: t. 587. (*Inter Sterculiaceas Bombaceas* Schott et Endlich l. c.).

» *Cal*: sub-5-fidus. *Pet*: 5 basi vix connexa. *Stam*:
» plurima monadelpha vel apice pentadelpha. *Stylus*
» vix exsertus; *stigma* capitatum vel 5-fidum. *Capsula*
» lignosa 5-locularis loculis polyspermis. *Semina* la-
» nugiae densa involuta. »

Obs: Genus valde obscurum, *Adansonia* L. et
Eriodendro DC. affine, constans stirpibus 11. ex
DC., 9. tantum ex Spr: incluso *Eriodendro* DC.
(*Erione* SCHOTT et ENDLICH l. c.). Arboreæ elegantissimæ trunco inermi vel aculeato.

1. *B. occidentale* = Spr: syst: III. 124. Sub *Gos-*

campino Schott et Endlich l. c. p. 428. (*Ind: occid:*). Huc videntur confusæ plures species a W. sp: III. 731. sub *B. pentandro*. Cl: SPR: distinguit *B. pentandrum* L. quod crescit in *Oriente* a planta JACQUINII *Americæ* incola; utraque enumeratur a DC. sub *Eriodendro anfractuoso*, synonymo a SPR: omissio. Specim: meum e BERTERO pertinet evidenter ad *B. pentandrum* JACQ: (*Eriodendrum anfractuosum* var: *B caribæum* DC. Prodr: I. 479.); habet enim folia serrulata unicoloria, ac petala intus *rosea* nec *flavescens*. = 2. *B. Ceiba* = L. sp: 959. (*Amer: calidior:*). Cult: in H. Ripul: nondum floruit.

IV. CAROLINEA Lin: fil: suppl: 314. = Lam: ill: t. 589: sub *Paquira* (Inter *Sterculiaceas* *Bombaceas* Schott et Endlich l. c. sub *Carolinea* et *Chorisia*).

» *Cal:* sub-truncatus persistens. *Pet:* 5. longissima
» basi conniventia. *Stam:* basi monadelpha, hinc in
» adelphias plures apice partitas fasciculata. *Stylus*
» stamina vix excedens: *stigma* 5-partitum. *Capsula*
» coriacea 1-locularis multivalvis polysperma interne
» nec farina nec lana repleta. »

Obs: Genus habitu *Adansoniæ* et *Bombæi* affine, sed præsertim staminum adelphiis ac capsula intus nuda satis distinctum, constans 4-5 stirpibus elegantissimis.

1. *C. princeps* = L. fil: suppl: 314. (In *Gujanæ* locis aqua submersis). Flores maxiuni, petala flava, filamenta rubra, antheræ purpureæ, semina amygdalina esculenta. Culta in H. Ripul: c. sequenti a quibus flores nondum obtinui. = *C. insignis* = Swartz

fl: ind: occid: II. p. 1202. Sub *Chorisia* Schott et Endlich l. c. ex Kunth (*Martinicæ* et *Brasilicæ* locis arenosis). Vix a priori distincta foliolis *obovato-oblongis* non *oblongo-lanceolatis*, ac corolla extus *pubescente*.

V. OCHROMA Sw: act: Holm: 1792. p. 143. t. 6. (Inter *Sterculiaceas* *Bombaceas* Schott et Endlich l. c.).

» *Cal:* infundibuliformis inæqualiter 5-fidus. *Pet:* 5.

» *Urceolus* staminum elongatus pentandrus; *antheræ*

» spiratim tortæ anfractuosæ. *Stigmata* 5. *Capsula*

» elongata 10-angulata 5-locularis 5-valvis polysperma

» valvis intus lanatis. »

Obs: Genus *Bombaci* proximum constans 2. stirpibus vix distinctis.

1. *O. Lagopus* = Sw: fl: ind: occid: II. p. 1144. t. 23. (*Jamaica*, *Hispaniola*). Arbor 20-40-pedalis foliis amplissimis; flores pallide rufi. Cult: in H. Ripul: nondum floruit.

Obs: geographica circa Bombaceas.

Bombaceæ per orbem sparsæ enumerantur a DC. 559. omnes intratropicales.

ORDO XXVI.

BYTTNERIACEÆ

(Brown cong: = Kuntk diss: Malvac: p. 6. = DC. Prodr: I. 481. = *Sterculiaceæ*, *Hermanniaeæ* alior: = *Sterculiaceæ* *Sterculieæ* Schott et Endlich l. c. pro sola I. trib: *Candoleana*.)

Obs: Ordo uti præcedens adhuc obscurus sistens 35. genera ex DC. quorum plura ad *Malvaceas*, nonnulla ad *Tiliaceas* Juss: spectantia, alia incertæ sedis, vel alterius familiæ juxta variam Auctorum taxonomiam sc: *Sterculiacearum*, *Hermanniaeарum*, *Pentapetearum*, *Lasiopetalearum* etc., pleraque monadelpha sed numero staminum varia, aliqua staminibus liberis. Nonne satius fuissest ad confusionem tollendam omnia ad *Malvaceas* referre et certas ac determinatas divisiones indicare? Interim retineo Tribus a DC. statutas.

TRIB: I. *Sterculieæ*.

I. STERCULIA Lin: gen: n. 1086. = Lam: ill: t. 736.
(Inter *Malvaceas* Juss:; *Sterculiaceas* Kunth, Spr:;
Gynandr: dodecandr: L.; *Monadelph: dodecandr:*
Spr:).

» *Cal:* coriaceus 5-partitus. *Pet:* o. *Urceolus* sta-
» minum stipitatus vel sessilis 5-dentatus dentibus sin-
» gulis 2-3-antheriferis. *Styl:* 1. subulatus. *Carpella*

» follicularia 5 (vel abortu pauciora) 1-locularia oili-
» gosperma superne dehiscentia. »

Obs: Genus constans ex DC. 27. stirpibus calidaram regionum incolis plerisque non satis notis.

1. *St: Helicteres* = Pers: enc̄h: II. p. 240. (*Nov: Granata*). Arbor: = 2. *St: platanifolia* = L. suppl: 423. (*Japon: , China, Arabia*). Arbor: Culta in H. Ripul: sub dio floret sed fructus non refert.

II. HERITIERA Ait: h. Kew: III. p. 546. non alior: = Gærtn: fr: II. p. 94. t. 99. sub *Balanopteride* *Tothila* (Inter *Sterculiaceas* *Sterculieas* Schott et Endlich l. c.; *Monadelph: decand:* Spr:).

» *Flores polygami. Cal:* 5 - dentatus. *MASC:* *Stam:* 5-10. monadelpha. *HERMAPHR:* *Antheræ* 10. sessiles,
» 2. intra singula germina. *Styl:* 5. *Carpella* 5. (nuces
» GAERTN:) demum drupaceo-coriacea in fructum in-
» dehiscentem abortu 1-spermum conversa. »

Obs: Genus constans 2-3. stirpibus vix distinctis, arboreis, *Ind:* orient: incolis, folia simplicia alterna lepidota gerentibus.

1. *H. litoralis* = Ait: l. c. (*Ceylan: , Molucc: , Philipp:*). Cult: in H. Ripul: nondum floruit.

TRIB: II. *Byttneriæ.*

III. AEROMA Lin: fil: suppl: 341. = Lam: ill: t. 636. 637. (Inter *Malvaceas* Juss:).

» *Cal:* 5-sepalus persistens. *Pet:* 5. unguibus fornicate laminis ciliatis. *Ureeolus* staminum polyadelphus fasciculis 5. triantheriferis, 5. alternis pe-

» taloideis. *Styl:* 5. *Carpella* 5. coalita in capsulam
» oblongam truncatam mucronatam 5-alatam 5-locu-
» larem superne dehiscentem polysperma. »

Obs: Genus constans 2 - 3. stirpibus fruticosis vix
distinctis foliis mollissimis cordatis plus minusve lo-
batis.

1. *A. augustum* = L. suppl: 341. (*Ind: orient:*).
Cult: in H. Ripul: = 2. *A. fastuosum* = Brown in
H. Kew: ed: 2. v. IV. p. 409. non Jacq: (*Ins: Molucc:*,
N. Holland:). Vix differt a priori ramis *muricatis*,
foliis evidentius *pubescentibus*, et capsulae angulis ex-
terioribus magis *elongatis*.

IV. BUTTNERA Lin: gen: n. 268. = Lam: ill: t. 140.
(Inter *Malvaceas* Juss:; *Pentandr: monog:* L., Spr:).

» *Cal:* 5-fidus caducus. *Pet:* 5. basi saccata apice
» 3-loba lobo medio in ligulam (*mucronem* DC., se-
» *tam* SPR:) producto. *Stam:* 10. filamentis basi con-
» natis 5. sterilibus petaloideis, 5. fertilibus 2-an-
» theriferis subulatis. *Styl:* 1. *Stigm:* sub - simplex.
» *Capsula* 3-5-valvis sub-echinata loculis 1-spermis. »

Obs: Genus satis naturale præsertim forma petalo-
rum et fructus, qui tamen in nonnullis stirpibus
inermis (*Rubingia* R. BRWN), constans 18 - 20. spe-
ciebus exoticis fruticosis (exceptis *B. herbacea* et
grandifolia) in calidariis europeis rarissimis. Cons:
A. S. HILL: in ann: sc: nat: 1825. Octobr: p. 134.

1. *B. ovata* = Lam: dict: I. p. 522.; ill: t. 140.
f. 1. (*Peruvia*). Specim: communicatum a el: PERRETIO
sub nomine *Ayeniae spinosæ* H. Paris:

V. AYENIA Lin: gen: n. 1020. = Lam: ill: t. 732. (Inter *Malvaceas* Juss:; *Gynandr: pentandr: L.*; *Pent: monog: Spr:*).

» *Cal:* 5 - fidus. *Pet:* 5. unguiculata apice laminis
» stellam glanduliferam efformantibus. *Stam:* ut in *But-*
» *tnera* sed fertilia monantherifera. *Styl:* 1.; *stigm:* 5 -
» lobum. *Fructus* ex carpellis 5. arcte conniventibus
» 2-valvibus 1-spermis. »

Obs: Genus *Buttneræ* valde affine constans 5 - 6.
stirpibus *Americæ* calidioris incolis suffruticosis vel
herbaceis.

1. *A. pusilla* = L. sp: 1354. (Ins: *Caribæis, Pe-*
ruvia). Herbacea.

TRIB: III. *Lasiopetaleæ.*

VI. THOMASIA Gay diss: 20. = *Lasiopetalii* spec: Sm:
et aliorum.

» *Cal:* corollinus 5 - partitus persistens bracteis 3.
» suffultus. *Pet:* 5. minima vel o. *Stam:* 5. aut 10.
» quorum 5. alternatim sterilia basi plerumque con-
» nata antheris rima laterali dehiscentibus. *Styl:* 1.
» *Capsula* 3 - valvis 3 - sperma. *Sem:* strophiolato -
» crenata. »

Obs: Genus habitum proprium præseferens, a *Byt-*
nieriaceis ceterisque affinibus valde diversum, con-
stantis 5. stirpibus cum ceteris *Lasiopetaleis* N. Holl:
incolis. Frutices elegantissimi stipulis foliaceis per-
sistibus, foliis tomentosis, floribus racemosis.

1. *Th: solanacea* = Gay diss: p. 26. t. 6. (N. Holl:

ora australi-occidentali). Filamenta 10.; flores corollati; folia margine et subtus ferrugineo-tomentosa. Cult: in H. Ripul:

TRIB: IV. *Hermannieæ*.

VII. MELOCHIA Lin: gen: n. 829. = Lam: ill: t. 571.

(*Malvaceæ* Juss:; *Hermanniaeæ* Kunth; *Mondelph: pent: L.*).

» *Cal:* 5 - fidus nudus vel bracteatus persistens.
» *Pet:* 5. patentia. *Stam:* 5. basi connata. *Styl:* 5.
» *Carpella* 5. in fructum capsularem 5 - locularem
» connata, valvis medio septiferis, loculis sub - i -
» spermis (*inflorescentia constanter oppositifolia*). »

Obs: Genus *Malvaceis* magis quam *Byttneriaceis* affine, habitu proprio et cum ceteris *Hermannieis* communi, jam *Visenæ* plures sistens species, modo 5. tantum fruticosas et *Indiarum* incolas.

1. *M. pyramidata* = L. syst: 510. (*Ind: occid:*).
Cult: in H. B. T. Specim: ex *Brasilia* communicata a cl: MARTIO staturam referunt duplo majorem; flores ex sicco flavi. = 2. *M. tomentosa* = L. sp: 932. (*Ind: occid: Amer: austr:*). Huc pertinent sec: SPR: *M. frutescens* JACQ:, *Turpiniana* et *macrophylla* H. et B. Specim: meum ex BALBISIO sub nomine *M. tomentosæ* evidentius pertinet ad *macrophyllam*, sed a sequentibus non differt nisi foliis majoribus, ac umbellis axillaribus multifloris glomeratis; specim: aliud sine nomine triviali e cl: MARTIO in *Brasilia* lectum pertinet ad *M. frutescentem* JACQ: obs: II. p. 22. t. 24., et differt tantum foliis minoribus ac umbellis laxio-

ribus paucifloris; demum specim: ex cl: SPINIO *M. Turpiniana* inscriptum differt foliis sub-inæquilateris ac inflorescentia terminali paniculata: an igitur hæc admittenda tamquam species distincta? Tunc diagnosis DC. Prodr: I. 490. emandanda ut sequitur: « *M.* » foliis sub-inæquilateris ovatis acutis basi sub-cor- » datis inæqualiter crenato-serratis supra puberulis » subtus tenuiter canescenti-tomentosis, panicula ter- » minali foliolosa ramis umbellatis multifloris (flores » ex sicco flavi). » Nob:

Melochia dubia.

3. *M. lilacina* = Mart: hb: ? Missa sub hoc no- minie a cl: MARTIO distinctam speciem constituere vi- detur quam ita definio: « *M.* foliis sub-orbiculatis » sub-undulatis duplicato-argute serratis utrimque » canescenti-tomentosis, pedunculis axillaribus umbel- » liferis 8-10-floris petiolæ longioribus. » Nob: Differt a ceteris præsertim caule arboreo rigidissimo, et foliis orbiculatis. Hab: in *Brasilia*.

VIII. *Visenia* Houtt: pfl: syst: VI. p. 287. = *Riedlejæ* Vent: et DC.; *Mongeotia* Kunth; et *Melochiæ* species Auctorum (*Monad: pent:; Hermanniaceæ* Spr:).

» *Capsula* 5-cocca, coccis sub-1-spermis. Cetera » ut in *Melochia* (inflorescentia varia). »

Obs: Genus habitum *Melochiæ* referens et vix ab ea distinctum forma fructus, constans 23. stirpibus ex DC. sub *Riedleja*, 18. ex SPR: sub *Visenia*.

1. *V. nodiflora* = SPR: syst: III. 30. (*Ind: occid:; ins: Mascaren:;*). Suffrutex varians foliis glabris vel

sub-villosis (*Melochia borbonica* CAV.). Cult: in H. Ripul: c. sequenti. = 2. *V. corchorifolia* = Spr: syst: III. 3o. (*Ind: orient:*). Ann:

Viseniae dubiae.

3. *V. spicata* « Foliis ovatis inæqualiter serratis
» scabris subtus canescenti-tomentosis, capitulis ter-
» minalibus spiciformibus coarctatis calycibusque bra-
» cteatis hispidis. » NOB:

Obs: Missa cum duabus sequentibus a cl: MARTIO
e Brasilia sub *Melochia* sine nomine specifico, di-
stinctas species constituere puto ad *Viseniam* potius
referendas tum ex structura fructus, cum ob inflo-
rescentiam terminalem nec *oppositifoliam*. *Caulis* her-
baceus? erectus, teres, hispidulus, ramosus. *Folia*
patentia, petiolata, ovata, inæqualiter serrata, utrin-
que scabra subtus pallidiora; *petioli* lineares, teretes,
hispiduli. *Flores* sessiles in capitulum terminale spi-
ciforme coarctatum dispositi. *Calyses* bracteati; laci-
niæ calycinæ longe setosæ. *Corolla* parva ex sicco
flava. Inflorescentia accedere videtur ad *V. hirsutam*
(Spr: syst: III. 3o.), sed differt præsertim foliis reapse
ovatis scabris, nec *ovato-oblongis acutis villosissimis*.

4. *V. scabra*. « Foliis sub-rotundis crenatis scabris
» obsolete ciliatis, stipulis sub - nullis, umbellis pe-
» dunculatis axillaribus terminalibusque paucifloris. »
NOB:

Obs: Tota planta scabra. *Caulis* suffruticosus, ere-
ctus, rigidus, teres, ramosus. *Folia* patentia, rigi-
diuscula, petiolata, sub-rotunda, crenata, quandoque
ciliis rarissimis ad nervos præsertim adspersa; *petioli*

folio 1-2-breviores; *stipulæ* superfoliaceæ brevissimæ vel nullæ. *Flores* in umbellas pedunculatas axillares terminalesve dispositi. *Corolla* mediocris ex sicco flava. Accedit ad *V. crenatam* (Spr: syst: III. 30. n. 13), sed differt præcipue foliis *scabris* rarissimeque *ciliatis*, non *tomentosis* nec *lineatis*.

5. *V. ferruginea*. « Foliis subrotundo - ovatis inæqualiter serratis utrinque scabro-ferrugineis, stipulis sub-nullis, umbellis pedunculatis terminalibus coarctatis paucifloris. » Nob:

Obs: Priori valde affinis, sed distinguitur foliis potius *ovatis* quam *sub-rotundis*, inæqualiter *dentatis* non reapse *crenatis*, ac præsertim colore ferrugineo, umbellis valde coarctatis, ut capitulum potius consti-tuant, corolla demum minori.

IX. WALTHERIA Lin: gen: n. 827. = Lam: ill: t. 570.

(Inter *Tiliaceas* dubias Juss: ; *Monad: pentand:*, *Hermanniaeæ* Spr:).

» *Cal:* 5 - fidus bracteis 3. deciduis semicinctus.
» *Capsula* 1-cocca 1-sperma 2-valvis. Cetera ut in
» *Melochia*. »

Obs: Genus a duobus præcedentibus vix distinctum, constans 12. stirpibus ex DC., 9. ex SPR:, *Malvaceis* affine juxta JUSSIEUI observationem, sed distinctum *corculo* non *corrugato*, fructu 1-spermo et tubo staminum non *columnari*, ex quibus *Tiliaceis* magis accedere existimavit. Sed quoad fructum monuit DC. rectius esse compositum ex carpellis 5., quorum 4. abortiva, 1. superstes!

1. *W. americana* = L. sp: 941. (*Ind: occid;*, *Amer:*

aestr:). Frutex. Variat capitulis pedunculatis, sessilibusque secus observ: DC. Prodr: I. 492., quæ ultima varietas vix a *W. indica* distinguitur dentibus foliorum acutis, in *indica* obtusis. Specim: tamen meum ex planta culta in H. B. T. capitula refert sessilia, dentes in aliquibus foliis obtusiusculos, in aliis acutos, quod observatur etiam in icono LAM: ill: t. 570. f. 2. An igitur *W. americana* et *indica* tamquam solæ varr: habendæ uti observavit cl: BROWN?

Waltheriæ dubiæ.

2. *W. urticæfolia* = Mart: hb: « Foliis cordatis late ovatis argute et inæqualiter serratis acutis supra punctato - scabriusculis subtus albido - tomentosis, capitulis axillaribus terminalibusve pedunculatis paucifloris (flores magni ex sicco flavi). » Nob: Hab: in *Brasilia* ad cap: *Frio*.

3. *W. Martii*. « Foliis sub-cordatis ovatis obtuse- crenatis sub-plicatis utrinque petiolisque folio paullo brevioribus velutinis subtus albidioribus, capitulis axillaribus breviter pedunculatis paucifloris, caly- cibus villosis (flores parvi ex sicco flavi). » Nob: Communicata a cl: MARTIO sine nomine specifico ex *Brasilia*.

K. HERMANNIA Lin: gen: n. 628. = Lam: ill: t. 570. (Inter *Tiliaceas dubias* Juss:; *Monandr: pent:*, *Hermanniacæ Spr:*).

» *Cal:* campanulatus 5-fidus plus minusve inflatus ebracteatus. *Pet:* 5. sub-obliqua unguibus convolutis. *Stamina* 5. filamentis dilatatis basi coalitis.

» *Styli* 5. in unum approximati. *Caps:* 5 - locularis
» 5-valvis polysperma. »

Obs: Genus *Melochiæ* valde proximum sistens 42. stirpes ex DC., 36. ex SPR: fruticulosas, omnes *C. B.* *S. incolas*, flores sæpius flavos axillares terminales gerentes, divisum in 2. sectiones prout calyx est valde inflatus et filamenta ample dilatata (*Trionna* DC.), vel calyx vix inflatus ac filamenta non sensim dilatata (*Hermanella* DC.).

1. *H. micans* = Schr: et Wendt: sert: Hann: p. 11. t. 5. Calyx manifeste inflatus, hinc male inter *Hermanellas* a DC. enumerata Prodr: I. 494.; folia sunt dense tomentosa ac subtus præsertim splendide slave-scentia; pedunculi fasciculati nutantes. = 2. *H. angularis* = Jacq: h. Schoenbr: I. p. 68. t. 126. In hac pariter calyx valde inflatus etsi a DC. ad *Hermanellas* amandata; folia non sunt mucronata ut in diagn: SPR: nec omnia truncata, sed sæpius apice rotundata; pedunculi terminales sub-fasciculati 2-flori. = 3. *H. hyssopifolia* = L. sp: 942. Vix differt a priori calycibus non angulatis. = 4. *H. scabra* = Cav: diss: VI. p. 331. t. 182. f. 2. Calyx non inflatus; racemi terminales, pedicelli cernui 1-2-flori, flores minimi. = 5. *H. hirsuta* = Schr: et Wendt: sert: Hann: p. 10. t. 4. Valde præcedenti affinis; rami potius *hirsuti* quam *scabri*; stipulæ et racemi breviores. Cult: in H. Ripul: c. sequenti. = 6. *H. denudata* = L. fil: suppl: 301. Tota glabra; folia floralia integerrima; racemi terminales foliolosi sub-secundi sub-nutantes.

XI. MAHERNIA Lin: mant: 59. = Lam: ill: t. 218. (Inter *Tiliaceas dubias* Juss:; *Monad: pent:* Spr:).

» *Pet:* limbo non ungue convoluta. *Filamenta* me-
» dio in tuberculum cordatum aut in cupulam (*ne-*
» *ctarium* W.) dilatata. Cetera ut in *Hermannia.* »

Obs: Genus a L. et W. ad *Pentandr:* monog: male
relatum, filamenta enim basi evidenter monadelpha,
ab *Hermannia* præsertim distinctum staminum struc-
tura; habitus etiam fere proprius in stirpibus folia
pinnatifida gerentibus. Species 18-20. fruticulosæ ex
C. B. S. Flores sæpius flavi, quandoque rubri, raro
albi.

1. *M. glabrata* = Cav: diss: VI. p. 326. Pedunculi
2-flori longissimi sec: Cav: et DC.; in specim: meis
flores sunt in racemos terminales dispositi; pedicelli
breves 1-flori; flores flavi nutantes. Cult: in H. Ripul:
c. seq: = 2. *M. pinnata* = L. syst: 253. Pedunculi
capillares elongati 2-flori; flores flavi.

TRIB: V. *Dombeyaceæ.*

XII. PENTAPETES Lin: gen: n. 834. = Lam: ill: t. 576.
(Inter *Malvaceas* Juss:; *Monad: dodec:*, *Penta-*
peteæ Spr:).

» *Cal:* 5-partitus caducus involucro 3-phyllo cinctus.
» *Pet:* 5. *Stam:* monadelpha 20. quorum 5.
» sterilia petaliformia. *Styl:* 5-fidus. *Caps:* 5-locularis
» 5-valvis polysperma. »

Obs: Genus modo constans unica specie sequenti.

1. *P. phœnica* = L. sp: 958. (*Ind: orient:.*). Ann: forsana suffruticosa in loco natali. Flores elegantissimi punicei. Cult: in H. Ripul:

XIII. DOMBEYA Cav: diss: III. p. 121. = Gærtn: fruct: II. p. 259. t. 137. non Lam: (*Inter Malvaceas Juss:; Monad: dodec:; Pentapeteæ Spr:.*)

» *Cal: persistens. Carpella 5. 2-valvia in capsulam coalita. Cetera ut in Pentapete.* »

Obs: Genus priori valde affine cum quo saepius confusum, modo sistens 10. species ins: *Mascaren: incolas*, nec confundendum cum *Dombeya* LAM: (*Colymbea* SALISB:) vel cum *Dombeya* HERIT: (*Tourretia* DOME:).

1. *D. ferruginea* = Cav: diss: III. p. 128. Cult: in H. Ripul:; folia adulta subtus tomentosa sed non amplius ferruginea.

XIV. MELHANIA Forsk: descr: 64. (*Inter Malvaceas Juss:; Monad: pent:; Pentapeteæ Spr:.*)

» *Stam: 10. quorum 5. alterna fertilia 1-2-anthe- rifera, 5. sterilia longiora. Cetera Dombeyæ.* »

Obs: Genus a duobus precedentibus et a sequenti vix distinctum (satius omnia conjungenda sub *Pentapete* uti antiquiori), modo sistens 6 - 7. species intratropicales.

1. *M. ovata* = Spr: syst: III. 32. Sub *Pentapete* DC. Prodr: I. 498. (*Nov: Hispania*). Ann: Cult: in H. Ripul: Stylus 5-partitus, non styl: 5. uti in DG.

XV. PTEROSPERMUM Schreb: gen: n. 2124. = Lam: ill: t. 576. (*Monad: dodec:*, *Pentapeteæ Spr:*).

» *Cal:* sæpius nudus. *Capsula* lignosa. *Sem:* alata,
» Cetera ut in *Pentapete.* »

Obs: Genus nunc constans 2-4. stirpibus fruticosis
ex *India* orientali.

1. *Pt: acerifolium* = W. sp: III. 729. Frutex ele-
gantissimus; flores magui, petala oblonga flava. = 2.
Pt: suberifolium = W. sp: III. 728. Flores valde
minores quam in priori. Cult: in H. Ripul:

TRIB: VI. *Vallichieæ.*

XVI. ASTRAPÆA Lindl: coll: bot: t. 14. (*Monad: icos:*,
Pentapeteæ Spr:).

» *Flores* umbellati involucro communi polyphyllo
» cincti foliolis 2. exterioribus oppositis. *Cal:* 5-se-
» palus 1-bracteatus. *Pet:* 5. convoluta. *Stam:* mo-
» nadelpha 25. quorum 5. sterilia. *Styl:* 1. *Stigni:* 5-
» ovatum 5-loculare. *Fructus?* »

Obs: Genus novum elegantissimum præcipue ob in-
florescentiam in umbellam maximam terminalem.

1. *A. Wallichii* = Lindl: coll: bot: t. 14. non Ker:
(*Ind: orient:*, *Madagasc:*). Specim: optimum communi-
catum a cl: SCHULTESIO ex *Calcutta* = 2. *A. pen-
duliflora* = DC. not: sur quelque plante etc. 1828. p.
8. Colla H. Ripul: app: IV. p. 35. (*Ind: orient:*).
Differt a priori præsertim foliis regulariter serratis,
stipulis evidenter undulatis nec planis. Cult: in H.
Ripul: sub nomine *A. Wallichii*, nondum floruit. Ve-

ram *A. Wallichii* LINDL: cultam haud esse in hortis europæis putat cl: DC. l. c. = 3. *A. viscosa* = Sweet: h. Brit: p. 58. Colla h. Ripul: app: IV. p. 35. sub *A. triloba* (*Madagasc:*). Differt a præcedentibus statura undique minori, caule foliisque viscosis, foliis reapse 3-lobis lobis valde acuminatis. Cult: in H. Ripul: ubi nondum floruit.

Obs: geographica circa *Byttneriaceas*.

Byttneriaceæ per orbem sparsæ enumerantur a DC. 219. omnes exoticæ.

ORDO XXVII.

T I L I A C E Æ

(Juss: gen: p. 289. excl: §. 1. = DC. Prodr: I. 503.
= I. S. Hill: I. p. 90. t. 88. excl: I. sect:)

Char: essent:

- » *Cal:* 4-5-sepalus per aestivationem valvatus. *Pet:*
- » totidem sepalis alterna ad unguem saepius foveolata
- » rarissime o. *Stam:* libera saepius indefinita. *Ovar:*
- » stipitatum stipite glandulifero carpellis 4-10. coa-
- » litis constans totidemque stylis coalitis terminatum.
- » *Capsula* multilocularis loculis 2-poly-spermis. *Album:*
- » carnosum. *Embr:* rectus. »

Obs: Ordo satis naturalis *Malvaceis*, *Bombaceis*, et *Byttneriaceis* valde affinis, distinctus tamen præsertim staminibus liberis saepius polyandris nec *adelpheis*, ex quo recte cl: DC. exclusit sectionem I. Juss: sistentem plantas monadelphas; nec inter *Berberideas* et *Rutaceas* collocandus, a quibus habitu præcipue toto cœlo differt, sed medium tenere debet inter *Byttneriaceas* et *Elæocarpeas*, nisi malis (quod satius esset) de *Tiliaceis* et *Elæocarpeis* unum tantum ordinem constituere. Genera 23. ex DC. fere omnia exotica; arbores, frutices, rarius herbae foliis simplibus 2-stipulatis floribus axillaribus.

I. SPARMANNIA Thunb: nov: gen: 88. = Lam: ill: t. 468.
manca pro genere.

» *Cal:* 4-sepalus. *Pet:* 4. longiora. *Stam:* polyantha exteriora abortientia. *Caps:* echinata 5-angularis 5-locularis loculis 2-spermis. »

Obs: Genus modo constans unica specie sequenti.

1. *Sp: africana* = L. fil: suppl: 265. (*Afr:* austr:). Frutex elegantissimus; flores in umbellas maximas terminales vel axillares dispositi; petala alba, filamenta sterilia flavo et fusco mixta. Cult: in H. Ripul:

II. HELIOCARPUS Lin: gen: n. 606. = Lam: ill: t. 409.

» *Cal:* 4-sepalus coloratus. *Pet:* 4. breviora. *Stam:* dodecandra omnia fertilia. *Caps:* stipitata sub-compressa 2-locularis 2-sperma margine utringue ciliis radiato-plumosis ornata. »

Obs: Genus sistens species 2. americanas fruticosas.

1. *H. americanus* = L. sp: 643. (*N. Hispan:*).
Cult: in H. Ripul:

III. CORCHORUS Lin: gen: n. 675. = Lam: ill: t. 478.

» *Cal:* 5-sepalus deciduus. *Stam:* polyandra. *Styl:*
» sub-nullus. *Stigm:* 1 - 5. *Caps:* siliquæformis vel
» sub-globosa apice nuda vel rarius in cornua desi-
» nens 2-5-locularis 2 - 5 - valvis valvulis medio se-
» ptiferis. »

Obs: Genus polymorphum, in plures sectiones di-
visum ex fructus structura, constans 25. stirpibus
circiter quarum plures non satis notæ; herbæ vel
rarius suffrutices floribus axillaribus luteis.

1. *C. siliquosus* = L. sp: 746. (*Amer:* merid:).
Perenn: basi fruticulosus. Capsula 2 - valvis linearis
ecornis stigmatibus 3. coronata. = 2. *C. hirtus* =
L. sp: 747. (*Amer:* merid:, *Japon:*). Perenn: ? Differt
a priori foliis latioribus capsulisque piloso-hirtis sub-
falcatis muticis. = 3. *C. trilocularis* = L. mant: 77.
(*Arabia*). Ann: Capsula 3-valvis ecornis; flores mi-
nimi = 4. *C. olitorius* = L. sp: 746. (Inter *Tropicos*).
Ann: Flores mediocres sub-sessiles; capsula 5-valvis
ecornis stigmat: 5. coronata. = 5. *C. æstuans* = L.
sp: 746. non Forsk: (*Amer:* calidior:) Ann: Capsula
3-valvis ecornis; styli 3. brevissimi 2-fidi.

Corchori dubii.

6. *C. brasiliensis* = Marth: hb: Missus sub hoc
nomine a cl: MARTIO, optimam novam speciem con-
stituere videtur faciem *Turneræ ulmifoliæ* præsefe-
rentem. Pertinet ad I. sectionem (*Coreta* DC.) et sic

definiri potest: « *C.* foliis sub-fasciculatis lanceolatis
 » acutis æqualiter argute serratis molliter sub-tomen-
 » tosis subtus albidiuseculis, pedunculis 1-floris, cap-
 » sulis oblongis compressiusculis angulatis 2-valvibus
 » scabriusculis. » Nob: (*Brasilia, Campos novos*).

IV. TRIUMFETTA Lin: gen: n. 600. = Lam: ill: t. 400.
 (*Triumfettæ et Bartramiae* sp: Auctor:).

» *Cal:* 5-petalus deciduus. *Pet:* 5. vel raro nulla.
 » *Stam:* dodecandra. *Styl:* 1. apice 2-fidus. *Capsula*
 » 4-locularis loculis 1-2-spermis setis apice uncina-
 » tis echinata. »

Obs: Genus constans 29. stirpibus ex DC., quarum
 5. non satis notæ, 22. ex SPR:, facile in 2. sectiones
 dividendum floribus corollatis (*Bartamea* DC., *Bar-
 tramia* GAERTN:), et apetalis (*Lappula* DC.); frutices
 vel rarius herbæ habitu proprio regiones calidiores
 incolentes et pedunculos axillares 1-5-floros gerentes.

1. *Tr: angulata* = Lam: dict: III. p. 421. ; ill: t.
 400. f. 2. sub *Bartramia* (Ind: orient:). Fruticulosa.
 Flores corollati minimi glomerati non tantum in axil-
 lis foliorum sec: Auctores, sed etiam in spicam ter-
 minalem; ita adparent in specim: meo ex hb: BIROLI
 misso a cl: VAHL sub nomine *Tr: Bartramia*, nec
 non in citata icone LAM: cum qua perfecte quadrat.
Tr: Bartramia L. planta adhuc obscura. = 2. *Tr:*
semitriloba = L. mant: 73. (Ind: occid:). Fruticosa.
 Flores corollati sub - glomerati minimi. Cult: in H.
 Ripul: = 3. *Tr: rhomboidea* = Jacq: amer: 147. t. 90.
 (Ind: occid:). Fruticosa. Flores corollati. = 4. *Tr:*
trichoclada = Linck en: h. Ber: II. p. 5. (Nepal:).

Ann: Flores corollati. Huc pertinet *Tr: oblongata* LINK sec: SPR:; hoc nomine possideo specim: ex H. Ripul: flores terminales gerentia, qua nota distinguitur præsertim a *Tr: trichoclada*; an igitur tamquam distincta species admittenda? = 5. *Tr: Lappula* = L. sp: 637. (*Ind: occid:*). Fruticosa. Flores apetali glomerati vel racemosi.

V. GREWIA Lin: gen: n. 896. = Lam: ill: t. 467.

» *Cal:* 5-sepalus intus coloratus deciduus. *Pet:* 5.
» basi intus glandulosa vel squamulosa (nulla in *Gr:*
» *apetala*). *Stam:* polyandra ex apice tori orta. *Styl:* 1.
» *Stigm:* 4-fidum. *Drupa* 4-loba nucibus 2-loculari-
» bus loculis 1-2-spermis. »

Obs: Genus, inclusio *Micrococos* L., nunc constans 53. stirpibus ex DC., quarum nonnullæ non satis notæ, 45. ex SPR:; frutices vel arbores *Ind:* orient: vel *Africæ* incolæ, foliis integris 3-7-nerviis, ex quo divisiones artificiales statutæ.

1. *Gr: nitida* = Juss: ann: II. p. 90. (*China*). Jam culta in H. B. T. sub nomine *Gr: orientalis*, pertinet reapse ad *Gr: nitidam*, folia enim *nitida* nec *subaspera*, sepala petala *æquantia* nec *triplo superantia*. Cult: in H. Ripul:; species pulcherrima. = 2. *Gr: occidentalis* = L. sp: ed: 1. p. 964. (*Afr: austr:*). Culta in H. Ripul: = 3. *Gr: flava* = DC. cat: h. monsp: p. 113. (*Afr: austr:*). Flores parvi flavi. Cult: in H. Ripul: = 4. *Gr: orientalis* = L. sp: ed: 1. p. 964. (*Ind: orient:*). Specim: ex BONJEAN valde dubium.

VI. TILIA Lin: gen: n. 660. = Lam: ill: t. 467.

» *Cal*: 5-partitus deciduus. *Pet*: 5. basi squamu-
 » losa vel nuda. *Stam*: polyandra aut sub-polyadel-
 » pha. *Styl*: 1. *Stigm*: sub-5-fidum. *Capsula* coriacea
 » 5-locularis 5-sperma (abortu sæpius 1-locularis 1-
 » 2-sperma). »

Obs: Genus inflorescentia prorsus singulari; ex foliorum axillis exsurgit ligula (*ala floralis Auctorum*) solitaria cuius nervo medio adnatus est pedunculus plus minusve longus in pedicellos plures corymbosos 1-floros sub-divisus. Species 8-10. arboreæ europææ vel americanæ. Petala in europæis nuda, in americanis basi squamulosa; folia indivisa plus minusve cordata.

+ *Species europææ.*

* 1. *T. parvifolia* = Ehr: ex Sut: fl: helv: I. p. 317. = Spr: syst: II. 577. = Vent: diss: p. 4. t. 1. f. 1. sub *T. microphylla* (*Eur*: *Pedem*: in montanis sylvis sponte provenit ALL: n. 1627. sub *T. europæa*? Raram prope la Mandria nec alibi dicit RE fl: torin: I. p. 278.). Hic monendum, a D. LINNÆO duas tantum fuisse constitutas *Tiliæ* species sc: *europæam* et *americanam*, at plures varietates de priori admisisse. Recentiores Botanici varietates istas, immo sub-varietates nonnullas tamquam distinctas species considerarunt, unde confusio maxima in hac polymorpha specie. *T. parvifolia* EHR: pertinet ad *T. europæam* var: γ L. sp: 733.

* 2. *T. grandifolia* = Ehr: ex Sut: fl: helv: I.

p. 317. = Spr: syst: II. 578. = Vent: diss: p. 6.
t. 1. f. 2. sub *T. platyphylla* (Eur: In collinis sylvis
prope *Augustam Taurinorum* reperitur ALL: n. 1626.
sub *T. europaea* var: β. In sylvis provinciæ *Albensis*
invenit BERTERUS). Folia duplo majora quam in priori,
et longe acuminata.

3. *T. rubra* = DC. cat: h. Monsp: p. 150. (*Tauria*).
A priori vix diversa ramis petiolis venisque foliorum
rubescensibus, fructibus globosis lœvibus. An eadem
ac *T. corallina* AIT: ? Tunc crescit etiam in sylvis
orientalibus *Galliae* sec: BOSCH: dict: agr: 13. p. 139.;
illam possideo sine fructu ex hb: BIROLI sub nomine
T. hollandicæ et tamquam var: *T. platyphyllæ* VENT:

†† *Species americanæ.*

4. *T. glabra* = Vent: diss: p. 9. t. 2. (*Amer: hor:*).
Hæc est vera *T. americana* L.; folia sunt basi oblique cordata. Cetera ut in diagnosi Auctorum. = 5.
T. pubescens = AIT: h. Kew: II. p. 219. (*Amer: hor:*).
Differt a priori præsertim foliis basi sub-truncatis,
stylo petalis longiore, fructu lœvi. = 6. *T. heterophylla* = Vent: diss: p. 16. (*Amer: hor:*). Distinguitur
prima facie a præcedentibus foliis subtus albo-tomentosis, hinc a cl: AIT: *T. alba* dicta fuit. Cl: W. dubitavit stirpem non esse americanam quum KITAIBEL
in sylvis *Hungariæ* simillimam speciem invenisset;
sed hæc a cl: DC. appellata fuit *T. argentea* ad tollendam confusionem, et differt ab *heterophylla* VENT:
eadem ac *alba* AIT: foliorum venis concoloribus nec
ferrugineis, stylis petala æquantibus non superanibus,
fructibus lœvibus nec costatis.

Tiliæ dubiæ.

7. *T. ferruginea* = H. Modoet: ? Possideo sub hoc nomine specimen sine flore *T. glabræ* habitum referens, sed folia gerit majora, longius acuminata, magis oblique cordata ac subtus venisque et petiolis ferrugineo-punctata; an ejusdem var: speciosa? Ex eodem H. Modoetiæ habeo alia specim: sub nomine *T. spec: nov:* forsitan ad *T. heterophyllum* referenda, quæ valde polymorpha.

Obs: geographica circa *Tiliaceas.*

Tiliaceæ per totum orbem sparsæ sistunt ex DC. numero 149

Tiliaceæ pedemontanæ.

Tilia 2

ORDO XXVIII.

ELÆOCARPEÆ

(Juss: ann: mus: II. p. 223. = DC. Prodr: I. 519.)

Obs: Ordo artificialis a *Tiliaceis* vix distinctus petalis lobatis et antheris apice 2-porosis, constans 7. generibus, quorum nonnulla valde obscura. Frutices arborescens exotici foliis alternis simplicibus.

I. ELÆOCARPUS Lin: gen: n. 663. = Lam: ill: t. 459.
(Inter *Guttiferas* Juss: gen: 258.).

» *Cal:* 5-sepalus. *Pet:* 5. apice fimbriato-laciniata
» vel lobata. *Stam:* dodecandra antheris 1-2. setige-
» ris. *Styl:* 1. *Drupa* nucleo plus minusve sulcato -
» rugoso intus 5 + locularis vel abortu sæpius 1-lo-
» cularis. »

Obs: Species 10. sec: DC. et SPR:

1. *E. reticulatus* = Smith in Rees: cycl: ex Ker:
bot: reg: t. 657. (*N. Holland:*). Cult: in H. Ripul:
et missus sub falso nomine *Eriostemi dentati* sub quo
sistit in nonnullis catalogis.

II. TRICUSPIS Pers: enh: II. p. 9. = R. et P. syst: p.
112. et Prodr: t. 36. sub *Tricuspidaria*.

» *Cal:* 5-dentatus. *Pet:* 5. tricuspidata. *Glandula*
» tori annularis 10-gona. *Stam:* dodecandra antheris
» muticis apice dehiscentibus. *Caps:* 3 - locularis 3 -
» valvis valvulis septiferis. »

Obs: Species unica.

1. *Tr: dependens* = Pers: l. c. (*Chili*). In specim:
meo ex BERTERO lecto in *Chili* prope *J. Fernandez*
folia superiora tantum opposita adparent, inferiora
evidenter alterna.

Obs: geographica circa *Elæocarpeas*.

Elæocarpeæ ex DC. sistunt numero 18., inter quas
nullæ europeæ.

ORDO XXIX.

C H L E N A C E Æ

(Pet: Thou: syst: veg: afr: austr: p. 46. =
DC. Prodr: I. 521.)

Char: essent:

» *Involucr:* 1-2-florum persistens. *Cal:* 3-sepalus.
 » *Cor:* 5-6-petala basi sub-coalita. *Stam:* indefinita
 » basi in tubulum sub-coalita. *Ovar:* liberum. *Styl:* 1.
 » *Stigm:* 3-lobum. *Caps:* 3-locularis loculis mono-po-
 » lyspermis. *Album:* carnosum ? »

Obs: Ordo novus a PET: THOU: statutus *Malvaceis*
 affinis, constans 8-10. stirpibus madagascariensibus in
 4. genera divisis, quarum nullas possideo.



ORDO XXX.

TERNSTROEMIACEÆ

(DC. mém: soc: h. nat: Gen: vol. I. et Prodr: I. 523. =
Ternstroemieæ Mirb: , Spr:)

Char: essent:

» *Cal:* 5-sepalus persistens sæpe bracteolatus. *Pet:*
 » totidem disco hypogyno inserta libera vel basi sub-
 » coalita. *Stam:* indefinita petalis sub-adnata. *Ovar:*
 » liberum. *Styl:* 2-5. *Fructus* sicco-baccatus indehi-
 » scens vel capsularis dehiscens loculis polyspermis
 » tot quot styli. *Semin:* in veris *Ternstroemiaceis*
 » (Trib: I. *Ternstroemieæ* DC.) ad placentam cen-
 » traalem adfixa parce carnoso-albuminosa. *Embr:* teres.
 » *Plumula* inconspicua. *Radicula* hilo adversa. »

Obs: Ordo sub-incertus ob fructus non satis notos
 fatente DC., accedens ad *Camelliæas* et *Ebenaceas*,
 sistens 13. genera exotica altera ad *Malvaceas*, *Tiliaceas*,
Aurantias vel *incertæ sedis* a Juss: relata,
 altera postea detecta, fere omnia *polyandra*, nonnulla
adelpha, unum (*Eurya*) *dodecandrum*. Arbores vel
 frutices exotici foliis alternis exstipulatis coriaceis in-
 divisis; flores axillares vel terminales.

I. TERNSTROEMIA Lin: fil: suppl: 39. = Lam: ill: t. 456.
 (Inter *Aurantiis* affines Juss:).

» *Cal:* 2 - bracteolatus. *Pet:* polyandra biserialia.
 » *Styl:* 2. in 1. coaliti. *Bacca* exsuccha 2-locularis lo-
 » culis 3-4-spermis. »

Obs: Genus constans speciebus 24. ex DC. quarum multæ valde dubiae, 9. ex SPR: fere omnibus americanis.

I. *T. brevipes* = DC. Mém: soc: h. nat: et Prodr: I. 523. Colla h. Ripul: t. 38. (*Amer:* calidior:). Arbor elegantissima cult: in H. Ripul: ubi modo abunde floret Jun: - August:

II. *MALACHODENDRON* Cav: diss: V. p. 303. f. 2. = Lam: ill: t. 593. (Inter *Malvaceas* Juss:).

» *Cal:* 1 - bracteatus. *Pet:* crenulato - lacera. *Stam:* » polyandra basi in urceolum sessilem connata. *Styl:* » 5. *Stigm:* capitata. *Carpella* 5. 1-sperma in capsula » lam connexa. *Semina* triquetra. »

Obs: Genus confusum a L. cum *Stewartia* a qua differt staminibus basi monadelphis, stylis 5. non 1., fructu multi-capsulari, modo constans sola specie sequenti.

I. *M. ovatum* = Cav: l. c. (*Virginia*). Frutex elegans floribus solitariis sub-sessilibus magnis.

III. *GORDONIA* Lin: gen: ed: Schreb: n. 1144. = Lam: ill: t. 594. (Inter *Malvaceas* Juss:).

» *Cal:* coriaceus nudus vel raro bracteatus. *Pet:* » basi et staminum urceolo coalita. *Stam:* polyandra » basi in urceolum sessilem connata vel raro libera. » *Styl:* 1. rarius 5. *Caps:* 5-locularis 5-valvis loculis » 2-spermis. *Sem:* alata. »

Obs: Genus sistens 4 - 5. species facie affines sed diversas stylorum numero et staminibus quandoque liberis, ex quibus divisum a DC. in 3. sectiones.

1. *G. Lasianthus* = L. mant: 570. (*Carolina, Florida*). Frutex elegans. Pertinet ad I. sectionem (*Lasianthus* DC.). Cult: in H. Ripul: = 2. *G. pubescens* = Pursh: fl: bor: amer: 451. (*Carolin: merid:, Georgia*). Variat foliis subtus glabriusculis (*G. Franklini* HERIT: stirp: I. p. 156.). Pertinet ad III. sectionem (*Lachatea* DC.). Cult: in H. Ripul: sub nomine *Lachateæ floridæ* SALISE: ; flores non obtinui. = 3. *G. anomala* = Spr: syst: III: 126. (Ins: freti *Malacc:*). Ad *Camelliae* genus relata a DC. Prodr: I. 529.; calyx bracteatus, styl: 1.; capsula tamen 5-locularis loculis plejospermis: an igitur genus medium inter *Lasianthum* et *Camelliam*? Cult: in H. Ripul: sub nomine *Camelliae axillaris*.

Obs: geographica circa *Ternstroemiaceas*.

Ternstroemiaceæ ex DC. sistunt numero 54., inter quas nullæ europææ.

ORDO XXXI.

CAMELLIEÆ

(DC. Th: élém: et Prodr: I. 529. = *Theaceæ* Mirb: = *Aurantiis et Meliis* affines Juss:)

Obs: Ordo habitu haud differens a *Ternstroemiae*-
ceis, a quibus distinguitur tantum semine *exalbuni-*
noso, sistens 2. genera vix distincta. Frutices vel ar-
 bores sempervirentes *Ind:* orient: incolæ.

I. CAMELLIA Lin: gen: n. 848. = Lam: ill: t. 594.

» *Cal:* imbricatus. *Pet:* 5-9. *Stam:* basi sub-poly-
 » adelpha. *Styl:* 3-6. plus minusve coaliti. *Caps:* 3-
 » locularis 3-valvis 3-sperma. *Semina* axi demum li-
 » bero adfixa. »

Obs: Genus elegantissimum constans 3-5. stirpibus.
 Cons: tamen Booth: in bull: un: 1831. p. 221.

1. *C. japonica* = L. sp: 982. (*Japon:*, *China*). Variat multimode colore, magnitudine et plenitudine florum. Frutex inter omnes elegantissimus et nunc ubique cultus; Ripulis sub dio hyeme quandoque perdurat. = 2. *C. Sesangua* = Thb: fl: Jap: p. 273. t. 3o. (*Japon:*, *China*). Variat uti prior, a qua differt præsertim statura undique minori ac petalis emarginatis. Cult: in H. Ripul:; typum flore simplici num- quam vidi. = 3. *C. Kissi* = Wall: asiat: res: 13. (*Nepal:*). Accedit magis ad *C. Sasanguam* quam ad *japonicam*; ab utraque differt præcipue floribus 3 -

stylis; an variet ignoro. Specim: meum ab HUGUENIN communicatum ex planta culta in H. BURDINII flores habet simplices paullo minores quam in priori, petala spathulato-oblonga sub-emarginata albo-rosea, stamina petalis parum breviora vix basi monadelpha, ovarium lanuginosum.

II. THEA Lin: gen: n. 668. = Lam: ill: t. 474.

» *Cal:* 5-6-partitus. *Pet:* 5-9. imæ basi sub-cohæ-rentia 1-2-serialia. *Stam:* polyandra vel basi vix » monadelpha. *Styl:* 3. coaliti. *Caps:* dehiscens vel » indehiscens 3-locularis 3-valvis 3-sperma septis e » valvularum marginibus introflexis formatis. »

Obs: Genus constans 3. stirpibus præsertim distinctis ex numero petalorum, et fructus dehiscentia vel indehiscentia.

1. *Th. chinensis* = Sims bot: mag: t. 998. (*China austr: et med: Japon:*). Huc pertinent duæ species Linnæanæ *Th: viridis* et *Th: Bohea*, quæ differunt tantum floribus enneapetalis et foliis longioribus in priori, floribus hexapetalis et foliis brevioribus in altera. Cult: in H. Ripul: ubi florent, sed fructus non ferunt.

Obs: geographica circa Camellieas.

Camellieæ ex DG. sistunt num: 8.. omnes asiaticæ.

ORDO XXXII.

OLACINEÆ

(Mirb: bull: philom: 1813. n. 75. p. 377. =
DC. Prodr: I. 531.)

Char: essent:

» *Cal:* 1-sepalus. *Pet:* 4-6. libera vel sub-coalita
» pilis appendiculata. *Stam:* 3 - 10. *Ovar:* liberum.
» *Styl:* 1. *Fructus* sub - drupaceus indehiscens sæpe
» calyce ampliato cinctus abortu 1-locularis 1-sper-
» mus. *Sem:* pendulum. *Album:* carnosum. *Embr:*
» basilaris. *Radicula* ad umbilicum directa. »

Obs: Ordo distinctissimus, sed valde incertus ob
affinitatem cum *Aurantiis*, *Sapoteis* et *Santolaceis*,
sistens 17. species ex DC. in 8. genera, quorum non-
nulla dubia ad *triandriam*, *pentandriam*, *octandriam*
et *decandriam* in systemate sexuali collocanda. Arbo-
res vel frutices exotici foliis simplicibus alternis in-
tegris, floribus parvulis axillaribus, inter quos nullos
possideo.

ORDO XXXIII.

A U R A N T I A C E Æ

(Corr: ann: mus: VI. p. 376. = DC. Prodr: I. 535. =
Aurantia Juss: gen: 259. =
 J. S. Hill: fam: nat: t. 77. = *Hesperideæ* alior:)

Char: essentialis.

» *Cal:* sub-urceolatus 3-5-dentatus. *Pet:* 3-5. li-
 » bera vel sub-coalita disco hypogyno inserta. *Stam:*
 » indeterminata nunc libera, nunc inter se varie ad-
 » nexa et sic monadelpha vel polyadelphia, semper
 » tamen apice libera. *Ovar:* liberum. *Styl:* 1. *Fructus*
 » (*Aurantium* DC.) constans indusio evalvi indehi-
 » scente, intus carpellis plurimis circa axim verticil-
 » latis nunc siccis, nunc pulposis. *Semin:* ad angu-
 » lum interiorem carpellorum adfixa, exalbuminosa,
 » plurima vel solitaria. *Embr:* rectus. *Radicula* re-
 » tracta supera ad hilum versa. *Cotyl:* basi 2-auri-
 » culatæ. »

Obs: Ordo satis naturalis præsertim habitu et fru-
 ctus structura et proprietatibus, sistens ex DC. 12.
 genera, quorum nonnulla haud satis distincta. Arbo-
 res aut frutices glaberrimi oleo volatili in pluribus
 organis fructus indusio præcipue fæti; foliis alternis
 sempervirentibus compositis vel abortu simplicibus,
 spinis axillaribus.

I. TRIPHASIA Lour: coch: I. p. 189.

» *Cal:* 3-dentatus. *Pet:* 3. basi sub-coalita. *Stam:*
 » 6. libera quorum 1. quandoque abortivum. *Bacca*
 » 3-locularis 3-sperma. *Semina* embryonibus pluribus
 » instructa. »

Obs: Genus constans 2. stirpibus, quarum una (*Tr: monophylla*) incerta ob fructum ignotum, altera (*Tr: trifoliata*) a genere *Limoniae* divulsa.

1. *Tr: trifoliata* = DC. Prodr: I. 536. (*Ind: orient:, China, Cochinch:.*). Frutex floribus axillaribus terminalibusque parvis odoratis. Variat spinis solitariis, geminis vel nullis. Specim: ex Vahl sine fructu.

II. COOKIA Souner: voy: II. p. 130. t. 131.

» *Cal:* 5 - partitus. *Pet:* 5. navicularia. *Stam:* de-
 » candra. *Pomum* 5-loculare vel abortu 1-2-loculare
 » loculis 1-spermis. »

Obs: Genus constans 2. stirpibus foliis pinnatis, foliolis alternis basi inæqualibus.

1. *C. punctata* = Souner: l. c. (*China austr:, ins: Molucc:.*). Panicula ampla terminalis; flores parvi albi. Cult: in H. Ripul:

III. MURRAYA Lin: gen: ed: Schreb: n. 717. = Lam: ill: t. 352.

» *Cal:* 5-partitus minimus. *Pet:* 5. corollam cam-
 » panulatam ludentia. *Stam:* decandra. *Bacca* 2-lo-
 » cularis saepius abortu 1-locularis loculis 1-spermis. »

Obs: Genus vix a priori distinctum petalorum dis-

positione et fructus structura, sistens 2. stirpes ex DC., 4. ex SPR: inclusis *Claucena* et *Bergera*.

1. *M. exotica* = L. mant: 563. (*Ind: orient:, China*). Frutex elegans; flores albi odoratissimi mediocre in corymbos terminales. Cult: in H. Ripul:

IV. *CITRUS* Lin: gen: n. 1218. = Lam: ill: t. 639.

» *Cal*: urceolatus 3 - 5 - fidus. *Pet*: 5. *Stam*: varie » coalita. *Stigm*: crassum capitatum. *Fructus* baccatus » multilocularis loculis polyspermis. *Semina* in pulpa » vesiculosa nidulantia. »

Obs: Genus polymorphum præsertim forma fructus, pulpæ sapore, numero staminum, ex quibus plures species inductæ quæ vix varietatis nomen forsitan merentur, constans 11. stirpibus ex DC., 12. ex SPR:, innumeris ex Risso et GALLESIO. Arbores fruticesve spinis axillaribus quandoque abortivis, foliis apice petioli 1-foliatis, petiolo saepe alato.

1. *C. Decumana?* = L. sp: 1100. (*China, Cochinch:*). Stirps valde obscura, quam cl: GALLESIUS in hortis italicis cultam haud esse existimat. Attamen ex diagnosis Linnaeana, synonymia et icone RUMPHII amb: II. t. 24. f. 2. erui potest *C. Decumanam* pertinere ad speciem cultam sub nomine *Pomi Adami* quæ e seminibus non variat præsertim petiolis constanter late alatis, foliis obtusis emarginatis, racemis sub-tomentosis multifloris coarctatis, fructibus maximis. Cult: in H. Ripul: cum sequentibus. = 2. *C. Aurantium* = Thb: jap: 293. (*Numidia, Mauritania, China*). Ubi-que in hortis culta, ab hortulanis nostris *Portugal*

dicta. Variat petiolis plus minusve alatis (numquam nudis), fructum semper globosorum cortice, pulpæ sapore, aliisque notis. Huc pertinet certe *C. chinensis* PERS: et forsitan *C. Hystrix* DC., cuius fructum nondum obtinui. = 3. *C. medica* = W. sp: III. 1426. (*Numidia*, *Mauritania*, *Persia*). Culta cum priore sub nomine vernaculo *Limon*, variat etiam multimode, sed petioli constanter nudi, fructus plus minusve oblongi: ad hanc pertinent *C. Limetta* et *Limonum* Risso a DC. probatæ. = 4. *C. buxifolia* = Poir: dict: V. p. 681. (*China*, ins: *Mascaren:*). Species obscura. Frutex priorum statura valde minor; habitus *Buxi sempervirentis*; flores nondum obtinui.

Obs: geographica circa Aurantiaceas.

Aurantiaceæ ex DC. sistunt numero 43:, quarum nullæ europææ.

ORDO XXXIV.

HYPERICINEÆ

(DC. Th: élém: et Prodr: I. 541. =
 Chois: Prodr: hyp: = *Hyperica* Juss: gen: =
 J. S. Hill: fam: nat: II. p. 23. t. 75.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 4-5-partitus. *Pet:* 4 - 5. *hypogyna contorte*
 » *aestivata.* *Stam:* sæpius polyadelpha raro monadel-
 » pha vel libera. *Ovar:* simplex. *Styl:* plures. *Caps:*
 » vel *bacca* loculis stylorum numero. *Sem:* placentæ
 » centrali adfixa. *Embryo* rectus. *Radicula* infera.
 » *Album:* nullum. »

Obs: Ordo facie facile distinguendus: *flores* sæpius lutei. Genera ex DC. 8.: herbæ, frutices, suffrutices et arbores, sæpius resinoso-glandulosæ, foliis plerumque oppositis sessilibus punctatis.

I. ANDROSÆMUM All: ped: n. 1440. = *Hypericum* L.

» *Cal:* 5-partitus lobis inæqualibus. *Pet:* 5. *Siam:*
 » plurima varie coalita. *Styl:* 3. *Caps:* baccata vel 1-
 » locularis. »

Obs: Genus constans sola stirpe sequenti ab *Hyperico* divulsa ratione fructus *baccati* non vere *capsularis*.

* 1. *A. officinale* = All: l. c. = Spr: syst: III. 351. = Blackw: t. 94. Ic: taur: vol. 15. t. 105. f. 2.

Vern: *Erba dla tajura, Erba dl feu* (In humidis *Eur: bor:*, *Caucasi* et *Græcicæ*. *Pedem:* *vulgare secus fossas et rivulos in agro Nicæensi, in Comitatu Astensi, Monteferrato*, imo etiam in collibus calidioribus *Taurinensis* *All: l. c.* Circa oppidum *Barge eundo versus Mombrac DANA*. Circa *Pinerolium, Pirossasco et Cumiana BELLARDI*. In sylvis inter *S. Mauro* et *Supergam RE fl: torin: II. p. 36. sub Hyperico Androsæmo*). Perenn: basi suffruticosum.

II. HYPERICUM Lin: gen: n. 902. = Lam: ill: t. 643.

» *Staminum phalanges 5. Styl: 3 - 5. Caps: membranacea 3-5-valvis valvis introflexis duplia dissimilatae* » *sepimenta formantibus. Cetera Androsæmi.* »

Obs: Genus facie ab *Androsæmo* haud distinctum, constans ex DC. stirpibus 133., quarum multæ valde dubiae vel vix notæ, ex SPR: 110., artificialiter a cl: CHOISY divisum in plures sectiones ratione calycis laciniarum plus minusve basi adhaerentium plus minusve æqualium, staminum adelphiis, stylorum numero, aliisque levibus notis; facilior SPRENGELII divisio in *pentagyna* et *trigyna*, ac subdivisio in *fruticosa* et *herbacea*.

† *Pentagyna.*

α *Fruticosa.*

1. *H. chinense* = L. amæn: VIII. p. 323. (*C. B. S.*, *Ind: orient:, China, Japon:*). Flores magni terminales corymbosi. Cult: in H. Ripul: = 2. *H. calycinum* = L. mant: 106. (*Oriente, Hibernia, Thracia*). Flores

maximi solitarii; caules humifusi. Cult: in H. Ripul: sub dio; caules hyeme quandoque pereunt, sed turrones subterranei servantur, et tunc planta perennis evadit. = 3. *H. Kalmianum* = Lam: dict: IV. 148. (*Virginia*). Flores parvi terminales sub-corymbosi; folia in specim: meo ex BONJEAN mucronulata. = 4. *H. balearicum* = L. sp: 1101. (Ins: *Balear:*). Flores mediocres terminales solitarii. Cult: in H. Ripul:

β *Herbacea.*

5. *H. pyramidatum* = Ait: h. Kew: ed: 1. vol. III. p. 103. (*Amer: bor:*). Perenn: Flores magni terminales in pedunculis trichotomis incrassatis; petala oblonga staminibus duplo longiora. Specim: optimum ex hb: BIROLI. = 6. *H. Ascyon* = L. sp: 1102. non Mill: (*Sibir:*) Perenn: Flores magni terminales solitarii. Cult: in H. B. T. = 7. *H. macrocarpon* = Michx: sec: Spr: syst: III. 342. (*Amer: bor:*). Perenn: Priori valde affine cum quo forsan confusum a L. quum etiam *Amer: bor:* incolam dixerit; distinguitur præsertim stylis staminibus brevioribus vel ipsa æquantibus numquam superantibus, ac calycibus ovato-lanceolatis, nec obtusis. In specim: meo ex H. B. T. sub nomine *H. ascyroidei* W. sub quo retinetur a cl: DC., petala sunt oblongo-lanceolata, non ovata.

†† *Trigyna.*

α *Fruticosa.*

8. *H. canariense* = L. syst: p. 575. (Ins: *Canar:*, *Amer: bor:?*). Flores mediocres terminales corymbosi.

Huc pertinent sec: SPR: *H. elatum* AIT: et *grandiflorum* CHOIIS: a cl: DG. distincta; posterius non possideo, sed *H. elatum* cui falsa patria tribuitur ab AIT: sec: SPR: vix differt in specim: meis a *canariensi* foliis angustioribus. = 9. *H. hircinum* = L. sp: 1103. (*Græcia, Ital:* regionib: mediter: In *Sardiniae* sylvis frequens MORIS st: sard: I. p. 10.). Flores mediocres terminales in pedunculos 2-brakteatos 3-fidos dispositi. Cult: in H. B. T. = 10. *H. prolificum* = L. mant: 106. (*Amer:* bor:). Huc pertinet sec: DG. *H. foliosum* JACQ: h. Schoëmbr: III. p. 27. t. 299. quod W. syst: III. 1448. refert ad *foliosum* AIT:; hoc non possideo: *H. prolifici* specim: meum ex hb: BELLARDI floribus caret.

* 11. *H. Coris* = L. sp: 1107. = SPR: syst: III. 345. = Curt: bot: mag: t. 178. Ic: taur: vol. 10. t. 1. (*Eur: austr:, Oriente.* In aridis et siccis collib: *Nicæensibus* vulgare, neque desideratur in agro *Pedemontano* locis subalpinis aut alpinis maxime apricis et saxosis meridiano sole percussis ALL: n. 1439. Frequentissimum in rupibus apricis circa *Segusium* RE fl: segus: p. 63.). Flores mediocres terminales corymbosi. Dissentiunt Auctores circa foliorum dispositionem: *opposita* dicit W. et duabus stipulis cincta; *quaterna* appellat SPR: et de stipulis silet; *verticillata* definit DC.; melius *sub-verticillata* ex L., verticilli enim non constantes respectu foliorum numeri et proportionis; saepius exteriora quaterna interioribus (*stipulæ* W.) duplo longiora, quandoque illa opposita cum vel sine foliis interioribus; haec, quum adsunt, constanter breviora sed exterioribus simillima.

β Herbacea.

* 12. *H. perforatum* = L. sp: 1105. = Spr: syst: III. 345. = Turp: in dict: sc: nat: ic: optima sec: DC. Vern: *Ipericon* (*Eur:* omni, *Amer:* bor: Ubique frequens in agro *Pedemontano*: ALL: n. 1429. RE fl: segus: p. 63. et fl: torin: II. p. 36. BIROLI fl: acon: II. p. 47. In *Sardiniae* collibus aridis MORIS st: sard: I. p. 10.). Perenn: Flores parvi in paniculas terminales foliosas; variat floribus albidis vel nigro - punctatis, magnitudine partium, aliisque notis ex DC. Prodr: I. 550. Varietas *angustifolia* crescit secus *Cerundam* prope *Venariam* sec: RE l. c. et app: alt: p. 202.

* 13. *H. quadrangulare* = L. sp: 1104. = Spr: syst: III. 345. = Fl: dan: t. 640. Ic: taur: vol. 23. t. 37. et fl: pedem: t. 83. f. 1. sub *H. maculato* (*Eur:* humidis. *Pedem:* in dumetis et umbrosis sylvaticis montium et collium, tum etiam secus fossas et puras fluentes aquas ALL: n. 1431. RE fl: segus: p. 63. et fl: torin: II: p. 36. BIROLI fl: acon: II. p. 47. In *Sardiniae* pascuis montanis humidis MORIS st: sard: I. p. 10.). Perenn: Flores parvi in paniculas terminales multifloras plus minusve confertas. Variat modis a DC. Prodr: I. 548. indicatis, et hoc pertinet *H. maculatum* ALL: n. 1433. c. descript: quod crescit in pratis Alpium et præsertim in *M. Cenisio* ALL: l. c. et *di Chianoc* RE fl: segus: p. 63.

* 14. *H. crispum* = L. mant: 106. = Spr: syst: III. 347. = Bocc: mus: II. p. 31. t. 12. (In regionibus mediterraneis. In *M. Cenisio* sec: ALL: n. 1437. et RE fl: segus: p. 63. quod denegat DC. fl: fr: sup:

630. nec ego unquam inveni). Perenn: Flores parvi in paniculas terminales laxas.

* 15. *H. humifusum* = L. sp: 1103. = Spr: syst: III. 347. = Fl: dan: t. 141. Ic: taur: vol. 25. t. 27. (*Eur:*, *Caucaso*. *Pedem*: in collibus *Taurinensibus* ad vias. In agro *Nicæensi* ad rupes; copiose circa *Gavino*; in agri *Canapiciensis* locis uliginosis ALL: n. 1436. Prope *la Molinetta*, in sylvis *della Mandria*, atque ad fossas *nella praglia di Pianezza* RE fl: torin: II. p. 37. In pascuis subalpinis collinis, et ericetis *Ticini* ubique BIROLI fl: acon: II. p. 47.). Perenn: Flores minimi cymosi.

* 16. *H. montanum* = L. sp: 1105. = Spr: syst: III. 348. = Fl: dan: t. 173. Ic: taur: vol. 15. t. 105. f. 1. (In montanis *Eur:* *Pedem*: ad oras sylvarum locis montanis et collinis, nec non sylvis minime opacis vulgare ALL: n. 1430. BIROLI fl: acon: II. p. 47. In sylvis *della Mandria*, nec non in sylvis editioribus *Taurinensibus* RE fl: torin: II. p. 37.). Perenn: Flores mediocres terminales corymbosi. Variat foliorum margine lineis maculisque rubris obducto; inventitur in Alpibus *Monregalensibus* sec: RE app: alt: p. 202.

17. *H. dentatum* = Loisl: fl: gall: p. 499. (In insulis *Stæchadum*). Perenn: Flores mediocres terminales trichotomo - corymbosi. = 18. *H. ciliatum* = Lam: dict: IV. p. 170. (*Calabria*, *Sicilia*, *Græcia*. In pascuis collinis *Sardiniae* MORIS st: sard: I. p. 10.). Perenn: Flores parvi terminales paniculato - corymbosi. Priori valde affine et forsitan ejus tantum varietas monente cl: MORISIO l. c. Specim: meum ex amico

refert folia omnia *integerrima*, nec superiora *denta*.

* 19. *H. barbatum* = L. amæn: VIII. p. 323.
 = Spr: syst: III. 348. = Jacq: austri: III. p. 33. t.
 259. (*Austria, Italia. Pedem:* in pratis alpinis humi-
 dis præsertim *M. Cenisii* sec: ALL: n. 1435.). Perenn:
 Flores mediocres terminales sub - corymbosi. Valde
 dubito an planta ALLIONII sit verum *H. barbatum* L.
 tum ex synonymo (*H. Richerii*) quod pertinet ad *H. fimbriatum* LAM: sec: SPR: et DC., cum ex calycibus
 qui in plantis a me cultis vix ciliati adparent nec
barbato-fimbriati.

* 20. *H. fimbriatum* = Lam: = Spr: syst: III. 348.
 = Vill: delph: III. p. 501. t. 44: sub *H. Richeri* (Al-
 pib: Eur: med: et austri:). Perenn: Priori valde affine
 sed differt præsertim sepalis ciliatis tantum non bar-
 bato-fimbriatis; variat tamen sepalis plus minusve ci-
 liatis, floribus 3-5-gynis.

21. *H. elegans* = Steph: in W. sp: III. p. 1469.
 (*Sibiria, litor: maris Mediterranei?*). Perenn: Flores
 parvi terminales sub-corymbosi. Possideo specim: ex
 cl: BELLARDIO quæ lecta scripsit in locis sabulosis ad
 littora maris prope Cannes; quadrant reapse cum de-
 scriptione W. sp: III. 1469., sed plantæ omnibus par-
 tibus duplo minores quam in specim: ex hb: BELLARDI
 sub nomine *H. Kotolianii*. = 22. *H. pulchrum* = L.
 sp: 1106. (*German: Gallia, Anglia*). Perenn: Desunt
 flores in specim: meo.

* 23. *H. nummularium* = L. sp: 1106. = Spr:
 syst: III. 349. = Lám: ill: t. 643: f. 3. Ic: taur: vol.
 19: t. 95: f. 2. (*Gallia austri:, Italia. Sabaudia in*

montibus *Carthusiæ majoris* et prope les Echelles in monte de la Grotte ALL: n. 1438. Ipse legi in montibus trans lacum de Bourget. In montibus Pedem: sec: DC. Prodr: I. 551.; sed ego numquam vidi.). Perenn: Flores mediocres terminales solitarii vel subcorymbosi. Cult: in H. B. T. primo illatum a Petro MOLINERIO monente ALL: l. c.

24. *H. hyssopifolium* = Vill: delph: III. p. 505. (*Gallia austr:*, *Caucaso*). Perenn: Flores parvi in paniculam strictam foliolosam verticillati; specim: optima ex BALBISIO in *Delphinatu* lecta. = 25. *H. linearifolium* = Vahl symb: I. p. 65. (*Aquitania*, *Gallia austr:*, *Lusitania*. In arenosis *Sardiniae* MORIS st: sard: I. p. 10.). Perenn: Flores terminales parvi sub-corymbosi.

* 26. *H. hirsutum* = L. sp: 1105. = Spr: syst: III. 349. = Fl: dan: t. 802. Ic: taur: vol. 23. t. 36. (*Eur: Pedem:* ad sepes et dumeta et ad oras sylvarum tum in *Taurinensibus* tum in *Subalpinis* montibus abunde ALL: n. 1432. RE fl: segus: p. 63. In agri *Taurinensis* sylvis RE fl: torin: II. p. 38. In sylvis collium di *Briona*, *Ghemme* etc. BIROLI fl: acon: II. p. 48. In sylvis collinis *Albensis* provinciæ BERTERUS). Perenn: Flores parvi in paniculam terminalem.

* 27. *H. tomentosum* = L. sp: 1106. = Spr: syst: III. 349. = Moris: hist: II. p. 470. s: 5. t. 6. n. 5. (*Hispan:*, *Gallia austr:*, *Ital:* austr: Ad fontes, rivulos et aqueductus in agro *Nicæensi* ALL: n. 1434. In apricis collinis *Sardiniae* MORIS st: sard: I. p. 10.). Perenn: Flores parvi in paniculam terminalem dichotomam.

28. *H. elodes* = L. sp: 1106. (*German:*, *Anglia*, *Gallia*, *Sibir:*). Perenn: Flores parvi terminales subcorymbosi; nimium affine priori dicit cl: W. sp: pl: III. 1466.; sed facie, inflorescentia ac sepalis glabris valde distinctum. = 29. *H. annulatum* = Moris st: sard: I. p. 9. Spr: fil: tentam: p. 21. (In *Sardinia* inter rupium schistosarum fissuras in summo monte *S. Vittoria Esterzili*). Perenn: Flores mediocres terminales in corymbos trichotomos. Species optima a ceteris distinctissima præsertim bracteolis in trichotomiam annulatim glanduliferis. = 30. *H. australe* = Tenor: app: V. Spr: fil: tentam: p. 21. (*Neapol:*; *Sardinia* in arenosis *Muravera*, *Bari* MORIS st: sard: I. p. 10.). Perenn: *H. dubium* MAURI sec: SPR: Flores parvi in paniculam terminalem amplam laxam dispositi.

Hyperica dubia.

31. *H. veronense* = Pollin: Schrank sec: Steud: nomencl: (*Agro Veronensi*). Perenn: An *H. perforati* var: monente STEUD: l. c.? Omissum a DC. et SPR: = 32. *H. spicatum* = Bellardi hb: ex Bert cum sequenti nota: « *Species singularis ex Aegypto floribus in spicam dispositis alternis pedunculatis.* » Optimam mihi videtur speciem constituere, quam ita definio: » *H. caule* herbaceo sub-tetragono demum tereti hirsutiusculo ramoso, foliis cordato-amplexicaulibus sub-pandureformibus hirsuto-punctatis, floribus spicatis pedicellatis 2. bracteatis, sepalis lanceolatis integrerrimis ciliatis corolla dimidio brevioribus, stylis 3. arcte coalitis, antheris nigro punctatis. » NOB: Crescit in *Aegypto*.

33. *H. marylandicum* = Biroli hb: sine alia indicatione; ita definiendum: « *H.* caule herbaceo sub-
 » ancipiæ lœvi ramosissimo, foliis ovato-oblongis ob-
 » tusissimis mucronulatis glabris subpellucido-margine
 » nigro-punctatis, pedunculis 1-3 terminalibus, se-
 » palis ovato-lanceolatis integris glabris corolla triplo
 » brevioribus, petalis oblongis nigro-punctatis, stylis 3.
 » basi coalitis. » Nob: Patria?

34. *H. patentissimum*. « Caule herbaceo tereti ra-
 » misque patentissimis glabris, foliis lanceolatis acu-
 » tis glabris margine undulato - revolutis nigro sub-
 » punctatis, pedunculis terminalibus solitariis, sepalis
 » ovatis acutis integris glabris brevissimis, petalis li-
 » neari-lanceolatis impunctatis, stylis 3. ad medium
 » coalitis. » Nob: (*Amer:* bor?). Planta ex hb: BIROLI
 ita inscripta « *Hypericum ex America septentrio-*
nali in horto Parisiensi cultum. »

II. MARTIA Spr: syst: III. 330. non Leandr: = *Hypericum* alior:

» *Staminum* phalanges 3. singulæ 4-5. staminiferæ.
 » *Glandulæ* 3. nectariferæ inter basim phalagium et
 » petalorum. *Styl:* 3. *Caps:* 3 - locularis. Cetera *Hy-*
perici. »

Obs: Genus a SPR: nuper statutum constans 4. stir-
 pibus ab *Hyperico* ademptis.

1. *M. polyandra* = Spr: syst: III. 833. DC. Prodr:
 I. 549. sub *Hyperico ægyptiaco* ex L. (*Ægypto*). Fru-
 tex. Flores parvi sæpius bini in ramulis. Cult: in H.
 Ripul:

Obs: geographica circa *Hypericineas*.
Hypericineæ ex DC. sistunt numero 165

Hypericineæ pedemontanæ.

<i>Androsænum</i>	1
<i>Hypericum</i>	<u>11</u>
											<u>12</u>

Et sic 15.am partem vix excedunt.

ORDO XXXV.

G U T T I F E R Æ

(Juss: gen: p. 255. = J. S. Hill: fam: nat: II,
 p. 26. t. 76. = Choisy mém: hist: nat: par: vol: I.
 part: 2. = DC. Prodr: I. 557.)

Char: essent:

» *Cal:* 2-6-sepalus. *Pet:* 4-10. hypogyna. *Stam:* in-
 » definita sæpius polyandra raro monadelpha vel
 » polyadelpha. *Stylus* nullus aut unicus. *Caps:* bac-
 » cata aut *bacca* vel *drupa* 1-locularis oligosperma
 » aut multilocularis loculis 1 - aut polyspermis. *Em-*
 » *bryo* rectus. *Album:* nullum. *Cotyl:* crassæ quan-
 » doque in unam coadunatæ. »

Obs: Ordo *Hypericineis* valde affinis numero situ-
que partium, et succo sæpe resinoso; differt tamen
præsertim habitu et fructus structura: constat 21. ge-
neribus ex DC., quorum nonnulla incertiora vel non
satis nota. Frutices arboresve sæpe parasiticæ, foliis
sæpius oppositis coriaceis, *Indiarum* incolæ ibique
plerumque suavissimos fructus gerentes, in calidariis
europæis rarissimæ.

I. MAMMEA Lin: gen: 1156. = Lam: ill: t. 458.

» *Cal:* 2-sepalus coloratus. *Pet:* 4. *coriacea.* *Stam:*
» polyandra. *Stylus* persistens. *Bacca* carnosa 1-locu-
» laris 4 - vel sæpius abortu 2-3 - sperma.

Obs: Genus constans 2-3. stirpibus americanis. Ar-
bores foliis magnis, floribus solitariis aut geminis in-
terdum divisis, fructibus edilibus.

1. *M. americana* = L. sp: 731. (Ins: *Caribæis*).
Fructus maximi suavissimi. Specim: optimum ex
BERTERO.

II. CALOPHYLLUM Lin: gen: n. 658. = Lam: ill: t. 459.

» *Cal:* 0-2-4-sepalus coloratus. *Pet:* 4. *Stam:* sub-
» polyadelpha. *Stylus* crassus. *Drupa* 1 - sperma vel
» raro 2-sperma. »

Obs: Genus valde obscurum constans 9. stirpibus
ex DC., 8. ex SPR: Arbores a *Mammea* habitu vix
distinctæ.

1. *C. Calaba* = L. sp: 732. (Ins: *Caribæis*). Flo-
res parvi quandoque dioici. Cult: in h. Ripul: nondum
floruit. Specim: optimum ex BERTERO.

III. *CANELLA* Brown Jam: 215. = Sub *Winterana* L. gen: 598. = Lam: ill: t. 399. = Inter *Meliaes* Juss: gen: p. 263.

» *Cal:* 3 - 5 - sepalus. *Pet:* 5. coriacea æstivatione
» contorta. *Stam:* sub - polyadelpha antheris sulcum
» simulantibus. *Stigm:* 3. *Bacca* sub-3-locularis lo-
» culis 1-2-spermis. »

Obs: Genus haud satis determinatum constans 1-2.
stirpibus americanis.

1. *C. alba* = Murr: syst: p. 443. (*Ind: occid:*). Arbor. Calyx in specim: meo ex BERTERO *Guadalupæ* lecto 3-sepalus. = 2. *C. axillaris* = Mart: sec: Spr: syst: III. 84. (*Brasil:*). Arbor. Differt a priori præ-
sertim pedunculis *axillaribus paucifloris*, nec *termi-
nalibus corymbosis*; folia in specim: meo communicato
a cl: MARTIO et *Brasilia* (cap: *Frio*) lecto, sunt pror-
sus *elliptica* nec *spathulata*, nitidissima.

Obs: geographica circa Guttiferas.

Guttiferæ ex DC. sistunt numero 60., quarum nullæ europææ.

ORDO XXXVI.

M A R C G R A V I A C E Æ

(Juss: ann: mus: XIV. p. 397. = DC. Prodr: I. 565.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 2-7-sepalus. *Cor:* hypogyna mono-vel- 5-
 » petala. *Stam:* saepius polyandra raro pentandra
 » nunc réceptaculo nunc membranæ hypogynæ in-
 » serta. *Styl:* 1. *Caps:* coriacea multivalvis vix de-
 » hiscens. *Sem:* minutissima numerosissima in pulpa
 » nidulantia. »

Obs: Ordo valde obscurus 4. tantum constans generibus, quorum 1. (*Antholoma*) *N. Caledoniam*, cetera *American* calidorem incolentia, et a Juss: gen: inter *Capparideis* affinia, et incertæ sedis relata.

I. MARCGRAVIA Lin: gen: 640. = Lam: ill: t. 447.

» *Cal:* 6-sepalus persistens imbricatus inæqualis.
 » *Cor:* calyptræformis integra. *Stam:* polyandra mem-
 » branæ ovarium circumdanti inserta. *Styl:* sub-nullus.
 » *Stigm:* crassum persistens. *Caps:* baccata. »

Obs: Genus constans 4. stirpibus fruticosis.

1. *M. umbellata.* = L. sp: 503. (*Amer:* trop:). Specim: ex BERTERO e *Guadalupa*; folia non prorsus sessilia ut in diagn: DC. Prodr: I. 566. sed *brevi petiolata*; desunt rami steriles folia ovato-obtusa gerentes.

Obs: geographica circa *Marcgraviaceas.*

Marcgraviaceæ ex DC. sistunt n. q. quarum nullæ europææ.

ORDO XXXVII.

H I P P O C R A T E A C E Æ

(H. et B. nov: gen: am: V. p. 135. = DC,
Prodr: I. 567.)

Char: essentialis.

- » *Cal:* 5-rarius 4-6-sepalus ad medium coalitus.
- » *Cor:* 5 - rarius 4 - 6 - petala aestivatione imbricata.
- » *Stam:* 3. rarius 4 - 5 basi in tubum hypogynum connexa.
- » *Ovar:* intra tubum immersum. *Styl:* 1.
- » *Fructus* nunc carpellis 3. samaroideis constans
- » nunc baccatus 1-3-locularis. *Semin:* in quoque loculo 4 axi geminatim adfixa exalbuminosa. »

Obs: Ordo non satis distinctus maxime circa species baccatas, ab Auctoribus modo *Acerineis*, modo *Malpighiaceis* conjunctus, constans ex DC. 7. generibus quorum nonnulla valde dubia, et ab aliis Botanicis, SPRENGELIO præsertim, variis nominibus indicata. Frutices saepius scandentes, foliis oppositis

simplicibus, fere omnes regiones calidiores *Indiarum* incolentes.

I. HIPPOCRATEA Lin: gen: 54. = Lam: ill: t. 28.

» *Cal:* 5-sepalus. *Pet:* 5 cucullata. *Stam:* 3. *Anther:*
» transversim apice dehiscentes. *Carpel:* 3 samaroidea
» 2-valvia. *Semin:* basi deorsum alata. »

Obs: Genus habitu proprio constans 23 stirpibus ex DC., 17 ex SPR: fere omnibus scandentibus.

✓ 1. *H. ovata* = Lam: ill: t. 28. f. 1. (*Ind:* occid:). Specim: ex BERTERO. = 2. *H. divaricata* = Mart: hb:?
(*Brasil:*). Communicata a cl: MARTIO in *Brasilia* cap: *Frio* lecta, a priori valde differre non videtur nisi paniculis magis divaricatis; desunt fructus in specim:, forsitan characterem differentiæ præbentes.

Obs: geographica circa Hippocrateaceas.

Hippocrateaceæ ex DC. sistunt n. 50, quarum nullæ europææ.

ORDO XXXVIII.

ERYTHROXYLEÆ

(H. B. et Kunth nov: gen: am: V. p. 175. =
DC. Prodr: I. 573. = *Malpighieæ* Juss:)

Char: essentialis.

» *Cal:* 5-sepalus vel 5-partitus persistens. *Pet:* 5
» hypogyna intus squama aucta. *Stam:* 10 basi in
» urceolum concreta. *Styl:* 3 distincti vel basi coaliti.
» *Drupa* 1-locularis vel 3-locularis loculis lateralibus
» abortivis. *Semen* angulatum. *Album:* corneum. »

Obs: Ordo a *Malpighiaceis* vix distinctus petalis
appendiculatis, semine *albuminoso*, fructu sæpius 1-
loculari, constans ex DC. 2. generibus. Frutices
aut arbores intratropicales stipulis axillaribus, foliis
alternis raro oppositis, floribus parvis bracteatis.

I. ERYTHROXYLON Lin: gen: 575. = Lam: ill: t. 783.

» *Cal:* 5-partitus. *Styl:* distincti. »

Obs: Genus constans 24-26 stirpibus in 2. se-
ctiones divisum foliis *penninerviis* (*Penninervia* DC.)
vel *areolatis* (*Areolata* DC.).

1. *E. squatum* = Vahl symb: III. p. 60. t. 63.
(*Cayenn:*, *Guiana*). Folia penninervia, in specim:
meo denticulata; pedunculi 2 florem minimum longe
superantes.

Obs: geographica circa Erythroxyleas.

Erythroxyleæ ex DC. sistunt n. 26. quarum nullæ europææ.

ORDO XXXIX.

M A L P I G H I A C E Æ

(Juss: gen: 252. = DC. Prodr: I. 577. = J. S. Hill: fam: II. p. 19. t. 74. = Adr: Juss: mém: sur la famille des *Malpighieæ* in Bull: univ: 1831. août p. 187.).

Char: essentialis.

» *Cal: 5-partitus sæpius persistens. Pet: 5 disco*
 » *hypogyno inserta. Stam: 10 rarius pauciora libera*
 » *vel interdum 1-2-adelpha. Styl: 3. distincti aut in*
 » *1. coaliti. Fructus 3-capsularis aut 1-carpus 3-*
 » *locularis capsulis loculisve 1-spermis. Sem: exal-*
 » *buminosa. »*

*Obs: Ordo naturalissimus habitu præsertim inspe-
 cto, constans ex DC. 17. generibus, quorum plu-
 rima nova ac nonnulla valde dubia, in 2. Tribus
 divisum sc: *Malpighieas* (styl: 3. distincti aut in 1.
 coaliti, fructus carnosus indehiscens), et *Hiptageas**

(styl: 1., capsulæ 3. indehiscentes sœpe in alas varie expansæ). Frutices aut arbusculæ foliis plerumque oppositis simplicibus sœpe stipulatis, floribus sœpius racemosis vel corymbosis, pedicellis plerumque medio articulatis aut 2-squamulosis.

I. MALPIGHIA Lin: gen: n. 572. = Lam: ill: t. 381.

» *Cal*: basi extus 8-10-glandulosus. *Pet*: unguiculata. *Stam*: basi sub-connata. *Styl*: distincti. *Drupa* » 3-pyrena. »

Obs: Genus constans 19. speciebus ex DC., 36. ex SPR: qui stirpes *Byrsonimæ* ad *Malpighiam* et *Galphimiam* amandavit; in 2. sectiones divisum sc: *foliis glabris* vel pilis non urentibus donatae (*Apyræ* DC.), et *foliis urentibus* (*Urentes* DC.). Fruticæ elegantissimi.

a *Apyræ*.

1. *M. coccifera* = L. ed: Reich: II. p. 371. (*Amer*: calid:). Pedunculi 1-2-flori longissimi; flores mediocre purpurascentes. Cult: in H. Ripul: = 2. *M. punicifolia* = L. sp: 609. non Cav: (*Cayenna*). Specim: ex BELLARDIO s. fl: = 3. *M. glabra* = L. sp: 609. (*Amer*: calid:). Priori valde affinis sed pedunculi *umbellati* nec 1-2-flori. Cult: in H. Ripul: = 4. *M. spicata* = Cav: diss: VIII. p. 409. t. 237. (*Ins*: *Carib*:). Sub *Byrsonima* DC. Prodr: I. 580. Specim: optimum ex BERTERO; flores in spicam terminalem conferti parvi brevi pedicellati. = 5. *M. volubilis* = Sims bot: mag: t. 809. (*Ind*: occid:). Cult: in H. Ripul: sub nomine *M. reclinatae*? est vera *M. volu-*

bilis (Cons: COLLA H. Rip: p. 85. n. 5. et app: I. p. 135.), nam prior (*Hiræa reclinata* Jacq:) folia gerit basi *sub-cordata*, pedunculos *congestos abbreviatos* 4-*floros*; in nostra folia sunt basi *integerrima*, pedunculi *racemoso-corymbosi*, pedicelli longissimi, flores lutei mediocres; fructus ignoti monente DC. qui stirpem refert sub *Byrsonima* dubitans an ad *Banisteriam* forsan pertineat (Prodr: I. 581.).

β *Urentes:*

I. 6. *M. urens* = L. sp: 610. (*Amer: calid:*). = 7. *M. macrophylla* = W. en: supp: 24. Colla H. Ripul: p. 84. n. 4. et t. 11. (*Brasil:*). Cult: in H. Ripul:

II. **GALPHIMIA** Cav: ic: V. p. 61. = *Malpighia* et *Byrsonima* alior:

» *Cal: eglandulosus. Caps: 3-coeca coccis dorso de-*
» *hiscentibus. Cetera Malpighiæ.* »

Obs: Genus constans perpaucis stirpibus a *Byrsonima* Rich: et *Malpighia* L. evulsis ratione calycis *eglandulosi*, et fructus *structuræ*: habitus idem.

1. *G. chrysophylla* = Spr: syst: II. 385. Sub *Byrsonima* DC. Prodr: I. 579. (Ad *Orynuc*). Specim: optimum ex cl: MARTIO *Brasilia* lectum 1827.

III. **HIRÆA** Jacq: am: 137.

» *Cal: glandulosus vel eglandulosus. Carpella (Achenia SPR:)* 3. samaræformia dorso cristata ala mem-
» branacea cincta. Cetera *Malpighiæ.* »

Obs: *Hirææ* glandulosæ novum *Mascagniæ* genus

constituunt a cl: BERTERO statutum ob characteres satis distinctos , et a COLLA H. Ripul: p. 86. allatos ; attamen cl: DC. et SPRENG: genus hoc ex eorum sapientia haudquaquam probare existimaverunt !

1. *H. macradena* = DC. Prodr: I. 585. *H. oblongifolia* Spr: syst: II. 389. *Mascagnia americana* Berter: in Colla l. c. (Ad S. Martham). Cult: in H. Ripul:

IV. TRIOPTERIS Lin: gen: 574. = Lam: ill: t. 382.

» Cal: basi extus 2-glandulosus. *Carpella* (*Samaræ* SPR:) 3-4 basi sub-coalita expansa in alas saepius » inaequales. Cetera *Malpighiæ*. »

Obs: *Triopterides* 4-alatae genus *Tetrapteridis* Cav: constituunt , quod a DC. probatum fuit , neutiquam a SPR: Spec: 14. ex DC. , 9. ex SPR:

1. *Tr. jamaicensis* = L. sp: 612. (*Hispaniola* , *Brasil:*).

V. BANISTERIA Lin: gen: 573. = Lam: ill: t. 381.

» Cal: basi extus 8-10-glandulosus. *Styli* apice » explanati. *Carpella* (*Samaræ* SPR:) 3. basi distin- » eta expansa in alam simplicem. Cetera *Malpi- ghiæ*. »

Obs: Genus vix ab *Hiræa* , *Triopteride* , *Tetra- pteride* et *Heteropteride* distinctum forma et numero alarum in fructu. Species 47. ex DC. , 38. ex SPR: plerumque scandentes Amer: tropicalis incolæ.

1. *B. argentea* SPR: = 2. *B. fulgens* L. non LAM: = 3. *B. splendens* DC. = 4. *B. laurifolia* L. = 5. *B. periplocæfolia* DESF: = 6. *B. purpurea* L. = 7. *B.*

tomentosa DESF: omissa a SPR: quæ lâte floruit majo
1833. in H. Ripul:

Banisteriæ dubiæ.

8. *B. velutina* = Mart: hb: « *B. foliis sub-rotundo-*
» *ovatis reticulatis supra velutinis subtus ferrugineo-*
» *tomentosis, petiolis brevissimis eglandulosis, racemis*
» *paniculatis terminalibus. (Flores parvi numerosissi-*
» *mi ex sicco albidi; desunt fructus).* » Nob: Lecta
in *Brasil*: et communicata a cl: MARTIO.

9. *B. macrophylla*. « *Foliis late ovatis sub-coriaceis*
» *supra nitidis subtus pubescentibus nervosis oblique*
» *venosis, petiolis brevibus eglandulosis, floribus*
» *axillaribus sub-corymbosis corymbis folio 2-3-*
» *brevioribus (Flores 5-8 longe pedicellati mediocres*
» *ex sicco purpurei; desunt fructus).* » Nob: (*Brasil*).
Communicata cum priori a cl: MARTIO sine nomine
specifico, magis accedere videtur ad *B. laurifoliam* L.,
sed in nostra folia sunt longiora, fere duplo latiora,
subtus vix pubescentia nec ferruginea, evidentius
nervosa, oblique nec reticulato-venosa, inflorescentia
axillaris, flores demum majores.

Obs: geographica circa *Malpighiaceas*.

Malpighiaceæ ex DC. sistunt numero 170. quarum
nullæ europææ.

ORDO LX.

ACERINEÆ.

(Juss: gen: p. 250. sect: 2. = DC. Prodr: I. 593. = J. S. Hill: fam: II. p. 15. t. 73. sect: 2.)

Char: essentialis.

» *Flores polygami vel dioici. Cal: sæpius 5-par-*
 » *titus. Pet: totidem disco hypogyno inserta rarius*
 » *nulla. Stam: 8. quandoque 5-12 libera. Styl: 1.*
 » *Stigm: 2. Fructus constans carpellis 2. raro 3.*
 » *samaroideis indehiscentibus 1-2-spermis in alam*
 » *desinentibus. Sem: basi loculamentorum adfixa ex-*
 » *albuminosa. »*

Obs: Ordo vix a 2. sectione *Malpighiacearum* (*Hippageæ* DC.) distinctus, constans generibus 2. inclusò *Negundio* MOENCH: quod ad *Acerum* potius referendum. Arbores foliis oppositis simplicibus aut raro compositis, floribus racemosis aut corymbosis, axillaribus polygamis vel dioicis.

I. ACER Lin: gen: n. 1590. = Lam: ill: t. 844.

Characteres ordinis. Species circiter 30. quarum variae europææ vel exoticæ cultæ sub dio ornamenti gratia.

Species pedemontanæ.

* 1. *A. campestre* = L. sp: 1497. = Spr: syst:
 II. 225. = Tratt: arch: I. n. 6. var: *austriaca* c. ic:

et n. 7. var: *hebecarpa* c. ic: Vern: *Obi* (*Eur.*, *Tauria*. *Pedem*: ad sépes agri *Pedemontani* frequentissimum, potissimum locis submontanis vel etiam collinis *Taurinensibus* ALL: n. 1629. Ubique vulgare in Provinc: *Segus*: RE fl: *segus*: p. 83. In vineis *Planicieæ* ac *Alpiniani* præsertim colitur ad vites fulciendas RE fl: tor: II. p. 158. In Provinc: *Novariensis* sylvis et ad sepes montium vulgare BIROLI fl: acon: II. p. 143.). Flores racemosi parvi polygami; variat statura, fructibus pubescentibus vel glabris, foliorum lobis plus minusve obtusis, acuminatis in var: γ *austriaco*.

* 2. *A. Pseudoplatanus* = L. sp: 1496. = Spr: syst: II. 225. = Duham: arb: I. t. 36. f. 1. Ic: taur: vol. 14. t. 102. (*Eur:* sylvis. *Pedem*: in montanis et collinis sylvis vulgaris arbor ALL: n. 1628. In locis montanis et alpestribus Provincie *Segusianæ*, et præsertim frequens in regione di *Fossimagna* RE fl: *segus*: II. p. 83. In monte *Musine* RE fl: torin: II. p. 158. In Provinc: *Novariensis* alpibus et collibus BIROLI fl: acon: II. p. 143.). Flores racemosi parvi polygami; racemi sub-compositi penduli; variat foliis variegatis ac etiam foliorum lobis obtusioribus (*A. opulifolium* THUILL: non VILL:); possideo var: fructibus rubris ex H. LITTÆ.

* 3. *A. platanoides* = L. sp: 1496. = Spr: syst: II. 225. = Duham: arb: I. t. 10. f. 1. (*Eur:* sylvaticis. *Pedem*: sylvis editioribus vallis *Bross* et *Segusii* frequens ALL: n. 1627. Prope la *Fabbrica del marmo* RE fl: *segus*: p. 83.). Flores corymbosi parvi polygami. Variat foliorum lobis inciso-laceris (*A. laciniatum* AIT:), crispisve (*A. crispum* LAUTH:); hæc

ultima var: eximia. An inter has varietates recentendum *A. Lobelii* TENOR: ? Videtur cum ex diagnosi, cum ex obs: Auctoris in syll: fl: neapol: p. 193., nec non ex specim: ab ipso humaniter communicato.

* 4. *A. opulifolium* = Vill: dauph: IV. p. 802. non Thuill: = Spr: syst: II. 224. = Tratt: arch: I. n. 13. c. ic: Vern: *Plaje* (*Gallia* occid:, *Ital:* sup: , *Pyreneis*. Provinciæ *Segusianæ* locis montanis calidisque supra *Chianoc* eundo *alle Combe*; frequens in montibus *di Bossoleno* et ad templum *S. Michaëlis* tum quoque *alla Losa Re* fl: segus: p. 83. In Comit: *Nicœensi* in rupibus a *Fontan* ad *Saurgium*. BELL: app: p. 46. In *Sabaudia* DUFRESN: sec: BELL:). Flores corymbosi mediocres polygami.

* 5. *A. monspessulanum* = L. sp: 1497. = Spr: syst: II. 224. = Duham: arb: I. p. 28. t. 10. f. 8. sub *A. trifolio* (*Eur:* med: et austr: *Sabaud:* locis apricis et vinetis vallis *Mauraniensis* circa *S. Michel*, *S. Martin*, *S. Julien* ALL: n. 1630. In sylvis *Sardin:* med: MORIS st: sard: I. p. 10.). Flores corymbosi polygami; corymbi pauciflori.

Species exoticæ.

6. *A. creticum* L. = 7. *A. dasycarpon* EHR: = 8. *A. heterophyllum* W. = 9. *A. montanum* AIT: = 10. *A. Negundo* L. (*Negundo aceroides* MOENCH: , *Negundo fraxinifolium* DC. ex NUTT:). = 11. *A. palmatum* THEB: = 12. *A. pensylvanicum* L. (*A. canadense* DUHAM: omissum a SPR: in synonymia). = 13. *A. rubrum* EHR: = 14. *A. saccharinum* L. = 15. *A. tataricum* L.

Obs: geographica circa *Acerineas.*

Acerineæ ex DC. sistunt numero 32.

Acerineæ pedemontanæ numero 5., et sic sextam fere partem constituant.

ORDO XLI.

H I P P O C A S T A N E A

(DC. Théor: ed: 2. p. 244. et Prodr: I. 597. =
Acera Juss: gen: 251. sect: 1. = J. S. Hill: Famil: II.
 p. 15. t. 73. sect: 1.)

Char: essentialis.

» *Caps:* junior 3-locularis 3-valvis, loculis bi-ovu-
 » latis, valvis medio septiferis; adulta coriacea sub-
 » globosa abortu 2-3-valvis, 2-3-locularis, 2-4-
 » sperma echinata vel inermis. *Sem:* sub-globosa varie
 » compressa et angulata, hilo lato basilari. *Embr:*
 » curvatus inversus, cotyledonibus carnosis gibbis,
 » *plumula* grandiuscula 2 - phylla. Cetera sicut in
 » *Acerineis.* »

Obs: Ordo a priori distinctus fructus structura,
 constans 1. tantum genere (*Æsculus*), ex DC. in
 2. divisus præsertim respectu capsulæ *echinatæ* vel

inermis. Arbores vel frutices foliis compositis, ramis terminalibus.

I. *Æsculus* Lin: gen: n. 462. = Lam: ill: t. 273.
(*Æsculus* et *Pavia* DC.).

» *Cal:* campanulatus vel tubulosus. *Pet:* 4-5. ex-
» pansa vel 4. erecta. *Stam:* 7-8. introrsum recurva
» vel recta. *Caps:* echinata vel inermis. »

Obs: Spec: 4-5. *Indias* boreales colentes ac in fere
tota *Europa* sub dio cultæ, in binas sectiones (*Æsculus*
et *Pavia*) divisæ.

1. *Æsculus.*

1. *Æ. Hippocastanum* = L. Vern: *Castagna d'India*. = 2. *Æ. rubicunda* = DC. (*Æ. caruca* Hortul:). = 3. *Æ. glabra* = W. Huc pertinet sec: SPR: *Æ. ohioensis* Michx;

2. *Pavia.*

4. *Æ. macrostachya* = Mich: = 5. *Æ. Pavia* = L. *Pavia rubra*, LAM: = 6. *Æ. discolor* = Pursh: *Æ. hybrida* DC: = 7. *Æ. flava* = Ait:

Species dubiæ.

8. *Æ. pubescens* = H. Loddig: Missa sub hoc no-
mine ab HUGUENIN et culta in H. BURDINII, ad *Æ.*
Pavia valde accedere videtur, sed differt foliolis
concoloribus utrinque sub-pubescentibus, axillis ner-
vorum haud pilosis, lobis calycinis obtusissimis, pe-
talibus amplioribus, demum colore florum; hinc sequen-
tem diagnosim propono: « *Æ. foliis quinato-digitatis,*

» foliolis ovato-oblongis serratis utrinque acutis petiolisque sub-pubescentibus, unguibus petalorum calycem obtusissimum sub-aquantibus, staminibus rectis corolla 4-petala brevioribus, capsula inermi » (flores rubicundi ampli). » Nob:

Obs: geographica circa *Hippocastaneas*.

Hippocastaneæ ex DC. sistunt numero 9., quarum nullæ pedemontanæ.

ORDO XLII.

R H I Z O B O L E Æ

(DC. Prodr: I. 599. = Gærtn: fruct: II. p. 93.
t. 98. = Lam: ill: t. 486. sub *Pekea* = *Sapindis* affines pro genere *Pekea* Juss: gen: 249., *incertæ sedis* pro genere *Caryocar* Juss: ib: p. 435.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 5-sidus. *Pet:* 5.. alterna disco hypogyno cum staminibus inserta. *Stam:* numerosissima duplice ordine, interiora saepe breviora et castrata, basi subconnata. *Ovar:* liberum 4 - loculare 4 - ovulatum. *Styl:* 4. *Fructus* constans nucibus 4. vel (abortu) paucioribus adglutinatis; *nux* quæque semilunata

» hinc gibba et globose turgida, inde compressiuscula,
» indehiscens, 1 - locularis, dupli putamine exte-
» riore lignoso, interiore cartilagineo - membranaceo
» extus tuberculato vel setoso intus glaberrimo. Sem:
» reniforme exalbuminosum. Embr: radicula maxima
» adscendente totam nuclei substantiam amygdalinam
» efficiente, *plumula* (*scapus* GÆRTN:, *tigella* RICH: ,
» *cauliculus* DC.) ancipiti cotyledones foliaceas ge-
» rente. »

Obs: Ordo ob fructus structuram prorsus distin-
ctus ludens inter *Hippocastaneas* et *Sapindaceas*, ac
constans 6. stirpibus *Americanam* calidiorem colenti-
bus, in calidariis europæis rarissimis, nunc ad unicum
genus (*Caryocar* L., *Rhizobolus* GÆRTN:, *Pekea* et
Saonari AUBL:) spectantibus. Arbores excelsæ foliis
oppositis 3-5-foliolatis, floribus racemosis ebracteatis
(Cons: AUBL: Gujan: I. p. 594 - 599. et t. 238 - 241.).
Nulla specim: in hb:

ORDO XLIII.

S A P I N D A C E Æ

(DC. Prodr: I. 601. = *Sapindi* Juss: gen: 246.
= J. S. Hill: fam: II. p. 8. t. 72.)

Char: essentialis.

» *Cal:* plus minusve 4-5-divisus. *Pet:* sæpius tot
» quot calycis divisiones interdum 1. deficiente, raro
» nulla, cum staminibus disco hypogyno inserta,
» nuda, vel intus villosa aut appendice petaliformi
» (*nectaricymata* SPR:) interiore aucta. *Stam:* sæpius
» numero petalorum dupla. *Ovar:* sub - rotundum.
» *Styl:* 3. vel rarius 1. *Fructus* drupaceus vel cap-
» sularis 3-locularis vel (abortu?) 1-2-locularis. *Sem:*
» in loculis solitaria, angulo interiori adfixa, exalbu-
» minosa: *Radicula* incurva, cotyledonibus replicatis
» raro rectis. »

Obs: Ordo satis distinctus, et habitu valde natu-
ralis, constans ex DC. generibus 29., quorum non-
nulla forsitan sejungi debent et ordinem distinctum
constituere (*Dodoneaceæ* H. et B.), alia valde dubia.
Arbores vel frutices erecti aut scandentes, rarius
herbæ scandentes, foliis alternis plerumque compo-
sitis; plantæ omnes exoticæ pleræque intratropicales,
nonnullæ cultæ in calidariis europæis, paucæ (annuæ)
sub dio.

I. CARDIOSPERMUM Lin: gen: 498. = Lam: ill: t. 317.

» *Cal:* 4-sepalus. *Pet:* 4. intus appendiculata; glandulæ 2. hypogynæ inter petala et stamina. *Stam:* 8. » *Styl:* 3. *Caps:* inflata membranacea 3-locularis. *Sem:* » globosa hilo lato cordato. »

Obs: Genus constans 12. speciebus ex DC., 8. ex SPR: Herbæ vel raro frutices sub-scandentes, pedunculis racemosis, pedicellis inferioribus 2. abortivis cirrhosis.

1. *C. Halicacabum* = L. (*Indiis*). = 2. *C. Corindum* = L. (*Brasil*:). = 3. *C. corymbosum* = H. paris: A *Corindo* non videtur differre.

II. SERIANA Plum: gen: 34. t. 35. = Lam: ill: t. 318. f. 1.

» *Cal:* 5 - sepalus. *Pet:* 4. intus appendiculata, » quinti deficientis sede vacua. *Samaræ* 3. connexæ » inferne in alam membranaceam dilatatae. *Sem:* ob- » ovata. »

Obs: Genus constans 20. circiter stirpibus. Frutices scandentes sarmentosi, foliis 1-2-3-ternatis aut impari-pinnatis; inflorescentia *Cardiospermi*.

1. *S. triternata* = W.. *Paullinia* L. (*Ind: occid:*). Specim: ex BERTERO lectum in *Guadalupa* refert petiolos vix sub-marginatos uti ex SPR: syst: II. 248., nec reapse alatos uti ex diagn: DC. Prodr: I. 604.: an species diuersa? Sed in ceteris perfecte quadrat.

2. *S....* Specimen possideo ex cl: MARTIO ex *Brasilia* sine nomine specifico, et sine fructu, ceterum perfectissimum. Spectat ad II. sectionem (foliis 2-ternatis), sed differt ab aliis stirpibus Auctorum. *Caulis* arbo-

reus, volubilis, teres, glaber, cortice griseo, ramosus, ad ramos raro ad racemos cirrhosus. *Folia* modo ternata saepius 2-ternata; foliola in 2-ternatis inferiora petiolata superiora sub-sessilia, omnia ovata 1-poll: longa 1/2 lata, terminale saepius rhombeum, crenulata, superne lucida subtus ferruginea; *petioli* nudi, canaliculati, sub-ferruginei. *Racemi* axillares, simplices, saepius ad apicem rachidis paniculati foliorum longitudine; *pedicelli* setiformes; *flores* ex sicco albidi parvuli.

Obs: Valde affinis videtur *S. lupulinæ* SCHUM: (DC. Prodr: I. 604., SPR: syst: III. 247.) a qua differt petiolis nudis nec sub-alatis ac in nostra ferrugineis uti foliorum pagina inferior, insuper racemis saepius, praesertim superioribus, ad apicem paniculatis; alæ fructus desunt in specim: Si distinctam speciem constituit, ceu cl: MARTIUS dubitavit, *ferrugineam* appello et ita definio:

» *S. ferruginea* foliis ternatis 2-ternatisve; foliolis crenulatis supra lucidis subtus petalisque ferrugineis, terminali sub-rhombeo, lateralibus ovatis; petiolis nudis; racemis sub-paniculatis. » NOB:

III. PAULLINIA Lin: gen: n. 679. = Plum: gen: 34. t. 35.
sub *Curura* = Lam: ill: t. 318. f. 4.

» *Cal:* inæqualis. *Caps:* coriacea 3-locularis 3-valvis.
» *Sem:* semi-arillata. Cetera *Serianæ.* »

Obs: Genus vix a priori distinctum fructus structura; habitus idem. Spec: 39. ex DC., quarum plurimæ valde dubiæ ob fructus ignotos.

1. *P. carthagagenensis* = Jacq: (*Ind: occid:*) = 2.

P. triquetra. Sub hoc nomine ex hb: BELLARDII cum sequenti indicatione: « *Ex h. Matrit: PASCH: dedit.* » Videtur accedere ad *P. connatifoliam* RICH: juxta diagnosim SPR: syst: II. 249.; caulis triquierter villosissimus, folia 2-ternata vel pinnata; foliola membranacea nec coriacea uti in *P. connatifolia*, superne villosiuscula nec glabra, subtus petiolique nudi ferruginea, pedunculi cirrhosi villosi, racemi elongati; desunt fructus.

IV. SAPINDUS Lin: gen: n. 499. = Lam: ill: t. 307.

» *Cal:* 4-5-sepalus coloratus. *Pet:* 4-5. intus glandulosa vel barbata. *Styl:* 3. *Stigm:* 3. (*styl:* 1., *stigm:* 1. ex BROWN; *styl:* 1., *stigm:* 3. ex DC.).
 » *Caps:* 3-cocca, sc: carpella 3. globosa connata 2.
 » saepe abortiva. *Sem:* sphærica. »

Obs: Genus constans 18. stirpibus satis determinatis, 3-4. valde dubiis. Arbores regionum calidiorum incolæ, nonnullæ cultæ in calidariis europæis ubi rarissime florent, foliis abrupte aut sub-impari-pinnatis, petiolo communi alato vel nudo, floribus paniculatis terminalibus.

1. *S. marginatus* = W. (*Georgia*). Cultus in H. Ripul: ac saepe confusus cum *S. Saponaria* L. valde diverso foliis 3-jugis nec 5-6-jugis, petiolo late-ovato, non superie tantum anguste marginato. = 2. *S. inæqualis* = DC. (*Guadalupa*): Specim: communicatum a BERTERO sub nomine *S. Saponariæ?*, BALBISIUS credidit esse *S. rigidum* AIT:; at in planta BERTERI folia petiolique glabri, foliola 4-5-juga coriacea, eviden-

tius acuminata, paniculæ valde divaricatæ; hinc species cl: DC. (Prodr: I. 608.) admittenda.

V. CUPANIA Lin: gen: n. 645. = Plum: gen: 49. t. 19.
et Lam: ill: t. 305. sub *Molinæa*.

» *Cal*: 5-sepalus. *Pet*: 5. intus glabra cucullata vel
» planiuscula. *Stam*: 8. *Styl*: 1. 3-sidus. *Caps*: 3-lo-
» cularis 3-valvis, valvis medio septiferis, loculis 1-
» 2-spermis. *Sem*: arillata. »

Obs: Genus nunc conjunctum cum *Molinæa* COM-
MERS: et Juss: a qua distinguitur tantum petalis *pla-*
niusculis, filamentis *villoso*s. Arbores intratropicales
americanæ (*Cupaniæ*), *mauritianæ* aut *indicæ* (*Moli-*
neæ), rarissimæ in calidariis, foliis abrupte pinnatis,
floribus sæpe abortu masculis.

1. *C. tomentosa* = Sw: Optimum specim: ex BER-
TERO lectum in *Guadalupa* = 2. *C. Poiretii* = Kunth
sec: Spr: c. p. pag. 149. *Robinia rubiginosa* Poir:
(Ins: *Trinit*:; *Guadal*:). Specim: ex BERTERO ut supra
sub nomine *Robiniae rubiginosæ*.

VI. MELICOCCA Lin: gen: n. 648. = Lam: ill: t. 306.

» *Cal*: 4-5-partitus persistens. *Pet*: 4 - 5. reflexa
» quandoque o. *Stam*: 8. *Styl*: 1. *Stigm*: sub-pelta-
» tum. *Bacca* corticosa sæpius abortu 1-locularis 1-
» sperma. »

Obs: Genus constans ex DC. 7. stirpibus, quarum
tres ultimas SPR: ad *Stadmanniam* amandat utpote
flores apetalos, fructusque 2-3-spermhos gerentes; cur
igitur idem cl: Auctor *Melicocco* petala tribuit quan-

doque nulla in charactere generico? Arbores intra-tropicales, floribus saepe polygamis; habitus *Sapindi*.

i. *M. bijuga* = L. Specimen perfectum a BERTERO lectum in *Guadalupa*; rachis *compressa* non *sub-alata* uti in diagnosi DC. Prodr: I. 615.

VII. KOELREUTERIA Laxm: nov: comm: petr: XVI. p. 561.
= Lam: ill: t. 308.

- » *Cal*: 5-sepalus. *Pet*: 4. basi squamosa. *Stam*: 8.
- » *Styl*: 1. incrassatus. *Caps*: 3-locularis inflata loculis
- » 2-spermis. »

Obs: Genus constans unica specie a *Sapindo* (*Sapindus chinensis* L. fil:) vix distincta, habitu tamen diversa, et pertinente juxta SPRENGELII opinionem ad *Meliaceas* (syst: II. 173. n. 1428.). Frutex foliis impari-pinnatis grosse dentatis, floribus paniculatis.

i. *K. paniculata* = Laxm: (*China*). Cult: in H. Ripul:

VIII. LLAGUNOA R. et P. fl: per: prodr: 126. t. 28. (*Amirola* Pers: et DC.).

- » *Cal*: 4 - 5 - fidus latere fissus. *Pet*: 0. *Stam*: 8.
- » *Styl*: 3-sulcus. *Caps*: inflata 3-locularis 3-valvis,
- » valvis membranaceis medio septiferis monospermis. »

Obs: Genus a prioribus habitu valde distinctum et forsitan ab ordine sejungendum cum aliis *Dodonaeaceis*, constans 3. stirpibus. Frutices peruviani, erecti, foliis simplicibus vel basi sub-3-sectis, floribus saepe (abortu) monoico-polygamis sub-racemosis.

i. *L. nitida* = R. et P. Cult: in H. Ripul: sub *Amirola*.

[X.] DODONÆA Lin: gen: ed: 1. n. 855. non Plum: =
Lam: ill: t. 304.

» *Cal:* 4-partitus deciduus. *Caps:* 2-3-locularis 2-
» 3-valvis 2-3-alata, valvis angulo centrali in facie-
» bus seminiferis 2-spermis. *Sem:* sub-globosa. Cetera
» *Llaguncæ.* »

Obs: Genus priori valde affine, distinctum fructus
præsertim structura, constans 12-18. stirpibus, qua-
rum 5-6. non satis notæ. Frutices ex *Indiis* vel *Au-*
stralasia, foliis oblongis saepius viscosis, floribus quan-
doque (abortu) polygamis aut dioicis, sub-racemosis.

1. *D. viscosa* = L. (*Ind:* occid: , *Afr:* occid:). =
2. *D. jamaicensis* = DC., *angustifolia* Savi (*Jamaica*,
Hispaniola). Possideo insuper sine nomine triviali
specim: ex hb: BELLARDII cum scheda: cl: BILLARDIERII
ita inscripta: « *Dodonæa* e cap: *Van-Diemen*. »
Videtur valde affinis *D. salicifoliae* DC. Prodr: I. 617:
quam SPR: cum *D. jamaicensi* conjunxit; sed desunt
fructus uti in specim: ex quo cl: CANDOLLEUS diagno-
sim exaravit.

Obs: geographica circa *Sapindaceas*.

Sapindaceæ ex DC. sistunt numero 193., quarum
nullæ europææ.

ORDO XLIV.

MELIACEÆ

(DC. Prodr: I. 619. = *Meliæ* Juss: gen: 263. = J. S. Hill: fam: II. p. 40. t. 78. = *Meliaceæ* et *Cedrelaceæ* Adr: Juss: mém: sur le groupe des *Meliacées*
extr: du mus: d'hist: natur: 1830.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 3-4-5. (in *Cedrelaceis* 4-5.) divisus. *Pet:*
» totidem ungue lato sæpius basi conniventia. *Stam:*
» numero petalorum dupla in tubum coalita rarissime
» (in *Cedrelaceis* *Cedreleis*) distincta, disco hypogyno
» inserta. *Ovar:* 1. loculis numero petalorum æqua-
» libus aut paucioribus 1-2 - rarissime 4-ovulatis in
» *Meliaceis*, 4 - vel pluri - ovulatis in *Cedrelaceis*, et
» tunc ovula 2 - seriata imbricata. *Fructus* carnosus
» indehiscens aut sæpius capsularis valvis medio se-
» ptiferis in *Meliaceis*, capsularis valvis a septis so-
» lubilibus in *Cedrelaceis*. *Semin:* arillata vel exaril-
» lata, in *Cedrelaceis* plana alata. *Album:* carnosum
» in *Meliæis*, nullum in *Trichilieis*, tenue vel nul-
» lum in *Cedrelaceis*. »

Obs: Ordo valde adhuc obscurus etsi recentius a
cl: Adr: Juss: 1. c. optime illustratus atque in 2.
distinctus ex notis supra allatis, quorum primus (*Meliaceæ*) in *Melias* et *Trichilieas*, alter in *Swietenieas*
et *Cedreleas* subdivisus, constans ex DC. 16. gene-
ribus, nunc ex Adr: Juss: 26. pro *Meliaceis*, 7. pro

Cedrelaceis. Arbores vel frutices ex regionibus calidioribus, foliis exstipulatis plerumque pinnatis raro simplicibus, inflorescentia valde composita, floribus pseudo-hermaphroditis.

I. *MELIA* Lin: gen: 576. = Lam: ill: t. 352. = Adr: Juss: l. c. p. 67. t. 2. n. 4.

» *Cal:* 5-sidus minimus. *Pet:* 5. patentia. *Stam:* 10.
 » in tubum apice denticulatum intus ad faucem an-
 » theriferum coalita. *Styl:* filiformis. *Stigma* capitato-
 » 5-angulum. *Drupa* ovata, nucleo 5-loculari, locu-
 » lis 1-spermis. *Semina* ala destituta albuminosa.
 » *Embr:* inversus. »

Obs: Genus nunc constans 10. stirpibus, quarum nonnullæ cultæ in hortis europæis.

1. *M. Azedarach* = L. (*Eur:* austr:, *Afr:*, *India*).
 = 2. *M. sempervirens* = Sw: (*Jamaica*). Statura mi-
 nori a priori, cuius forsitan sola var:, distinguitur.

II. *TRICHILIA* Lin: gen: n. 528. = Adr: Juss: l. c. p. 83.
 t. 7. n. 18.

» *Cal:* 4-5-dentatus. *Pet:* 4-5. *Stam:* 10. vel sub-
 » distincta, vel in tubum 10-sidum intus antherife-
 » rum coalita. *Stigma* capitato-sub-3-lobum. *Caps:*
 » 3-locularis loculis 1-2-spermis. *Sem:* ala destituta
 » exalbuminosa. *Embr:* inversus. »

Obs: Genus constans 18-20. stirpibus. Unicam pos-
 sideo, scilicet *Tr: spinosam* (W. sp: II. 554.) ex hb:
 BELLARDII missam a W. cum flore, sed sine fructu,
 nunc exclusam et ad *Turraea* amandatam (Adr: Juss:
 l. c. p. 85.).

III. CEDRELA Lin: gen: n. 277. = Lam: ill: t. 137. =
Adr: Juss: l. c. p. 102. t. 12. n. 29.

» *Cal:* 5-dentatus minimus. *Pet:* 5. antherifera 5.
» sterilia vel nulla conniventia, cum toro staminifero
» pedicello ovarii inserta. *Stam:* 5. libera. *Stigma ca-*
» *pitatum* 5-gonum. *Caps:* lignosa 5-locularis 5-valvis.
» *Sem:* numerosa compressa imbricata infra alata al-
» buminosa. »

Obs: Genus constans ex DC. 5. stirpibus, ex Adr:
Juss: 10. Arbores ligno odorato coloratoque, foliis
pinnatis foliolis inaequilateris, paniculis terminalibus
amplis pyramidatis. Colo in H. Ripul: *C. odoratam* L.
quæ nondum floruit.

IV. SWIETENIA Lin: gen: n. 575. = Gærtn: fruct: II, p.
89. t. 96. = Adr: Juss: l. c. p. 96. t. 11. n. 25.

» *Cal:* minimus 5-dentatus deciduus. *Pet:* 5. *Stam:*
» 10. in tubum apice dentatum intus antheriferum
» coalita. *Stigm:* capitatum 5-radiatum. *Caps:* lignosa
» 5-locularis 5-valvis polysperma. *Sem:* deorsum im-
» bricata apice alata albuminosa. »

Obs: Genus habitu *Cedrelæ*, sed distinctum præ-
sertim staminibus monadelphis, seminibus apice non
infra alatis, embryone erecto, nunc constans sola *S.*
Mahagoni L. culta in H. Ripul:

Obs: geographica circa Meliaceas.

Meliaceæ ex DC. sistunt num: 65., ex Adr: Juss:
numero 150., quarum nullæ europææ excepta forsitan
Melia Azedarach.

ORDO XLV.

A M P E L I D E Æ

(H. B. et DC. Prodr: I. 627. = *Vites* Juss: gen: 267.
 = J. S. Hill: fam: II. p. 48. t. 79. =
Sarmentaceæ Vent: = *Viniferæ* Juss: mém: mus:
 et Spr: pro solo genere *Vitis*.

Char: essentialis.

» *Cal:* monosepalus sub-integer. *Pet:* 4-5. distincta
 » rarius coalita, disco ovarium ambiente extus cum
 » staminibus inserta. *Stam:* tot quot petala eisque
 » opposita. *Ovar:* simplex. *Styl:* 1. brevissimus aut
 » sub-nullus. *Stigm:* simplex. *Bacca* 2-locularis lo-
 » culis dispermis, sëpe maturitate dissepimentis eva-
 » nidis 1-locularis. *Sem:* ossea, superficie inæqualia,
 » albuminosa. *Embr:* erectus. »

Obs: Ordo satis naturalis pro veris *Ampelideis* seu
Viniferis, quæ primam sistunt sectionem ex DC.; obscu-
 rous circa *Leeaceas* secundam sectionem constituentes; in
 illis petala distincta, pedunculi sëpe cirrhosí; in hisce
 corolla gamopetala, pedunculi absque cirrho; fructus et
 semina vix nota. Frutices sarmentosi scandentes, fo-
 liis stipulatis simplicibus compositisve, floribus mini-
 mis virescentibus.

Cissus Lin: gen: n. 147. = *Lam:* ill: t. 84.

» *Cal:* minimus integer. *Pet:* 4. persistentia ab
 32

» apice ad basim abscedentia. *Stam:* 4. *Bacca* 2-lo-
» cularis loculis 1-2-spermis. »

Obs: Genus constans 66. stirpibus ex SPR., 80. ex DC. juxta foliorum compositionem in plures sectiones divisis; nullæ europææ; nonnullæ in hortis cultæ.

1. *C. antartica* = Vent: choix t. 21. (*N. Holland*). Culta in H. Ripul: ubi parce floret. = 2. *C. sicyoides* = L. sp: 170. (*Jamaica*). = 3. *C. virginaea* = L. sp: 170. (*India*). Undique ferruginea, folia quandoque retusa. = 4. *C. acida* = L. sp: 170. (*Amer: calid*:). Umbellæ in specim: haud sub-sessiles uti in diagnosi SPR:, immo longe pedunculatæ. = 5. *C. trifoliata* = Jacq: am: 73. (*Indiis*). Species obscura. Cl: DC. dubitat eandem esse ac *C. acida*; specim: meum valde differt foliolis multoties majoribus, dentibus distantibus; nec omnino quadrat cum diagnosi SPR: circa *C. trifoliata* L.; foliola enim potius ovato-cuneata quam sub-rotunda, glabriuscula non hirsuta: huc refert idem SPR: *C. alata* et *obtusifoliam* LAM:; primam ad *C. trifoliata* L. non JACQ: dubitat pertinere cl: CANDOLLEUS, alteram ad *C. crenatam* VAHL. = 6. *C. digitata* = Lam: ill: n. 1627. (*Arabia*). Folia inferiora tantum digitata, superiora ternata. = 7. *C. striata* = R. et P. fl: per: I. p. 64. t. 100. (*Peruv:, Chili*). Specim: optimum ex BERTERO lectum in *Chili* loco dicto *Monte la Leonæ*; foliola male dicuntur *oblongo-lanceolata*, melius *oblongo-spathulata*, media duplo fere majora; cimæ seu potius racemi axillares et terminales longissimi multiflori, flores valde coarctati. = 8. *C. orientalis* = Lam: ill: p. 322. t. 84. f. 2. (*Orient*):. = 9. *C....* Ex hb: cl: MARTII specim:

habeo sine nomine triviali, in *Brasilia* loco dicto *Parreiles* lectum, novam forsitan stirpem constituens; folia sunt pinnata; foliola 3-5-ovato-lanceolata denticulata acuta subtus ferrugineo-subtomentosa; rami tetragonii grisei; racemi axillares foliorum longitudine: desunt fructus. Si pro nova specie habenda, *C. brasiliensem* appello.

II. AMPELOPSIS Michx: fl: bor: am: I. p. 159. = Sub *Vite* SPR:

» Pet: 5. Stam: 5. Cetera *Cissi*. »

Obs: Genus medium inter *Cissum* et *Vitem*, cui magis affine numero petalorum et staminum, constans 5-6. stirpibus. Undique culta invenitur *A. hederacea* Michx: I. c. p. 160., *Hedera quinquefolia* L.; *Virginiae* incola, modo fere indigena et sub nomine vernaculo *Brassabosch* notissima.

III. VITIS Lin: gen: n. 284. = Lam: ill: t. 145.

» Cal: sub - 5 - dentatus. Styl: o. Cetera *Ampelopsis*. »

Obs: Genus constans 20. circiter stirpibus exclusa *Ampelopside*, quarum nonnullæ valde dubiæ.

*? 1. *V. vinifera* = L. sp: 293. = Spr: syst: I. 777. = Lam: ill: t. 145. f. 1. Ic: taur: vol. 8. t. 84. et vol. 21. t. 109. (*Asiae austr:* indigena, nunc ubique fere culta). Cl: ALLIONUS tradidit *Vitem viniferam* non modo coli, sed *Labruscam* sive *V. sylvestrem* ad sepes et dumeta sponte nasci; addit insuper *V. Labruscam* matrem esse plurimum *V. viniferæ* differentiarum (ALL: pedem: n. 1759.); hinc forsitan cre-

dedit esse spontaneam : valde tamen dubito errore ductum fuisse cl: Virum ex quo in *Pedemontio* vernaculo sermone *Lambrusca* appelleatur *Vitis* illa quæ inculta crescit ad sepes , quamque puto esse veram *V. vinifera* in statu naturali ex seminibus initio ortam et hinc spontaneam factam ; nam vera *V. Lambrusca* L. *Americæ borealis* incola a nostra *Lambrusca* valde differt , et hæc jam erat spontanea quum borealis *America* detecta fuit ; in *Lambrusca* L. folia subtus petioli sunt prorsus ferrugineo-tomentosi , dentes distantes breves acutissimi ; flores polygami : non loquor de foliorum sinubus lobisve qui multimode variant in *V. vinifera* ; sed priores characteres in hac et in nostra *Lambrusca* frustra quæsivi.

2. *V. laciniosa* = L. sp: 293. Stirps hæc cuius patria incerta traditur ab Auctoribus , varietatem forsan prioris esse dubitat DC. se se referens ad R. et S. syst: V. p. 314. pro var: 24. (*Walsche*) ; observandum tamen, hanc varietatem ex R. et S. habere folia ad costas usque 5 - partita , dum in *laciniosa* apud eosdem Auctores p. 319. n. 16. illa sunt *quinata* , foliolis *multifidis* uti in specim: meis. = 3. *V. riparia* = Michx: fl: am: bor: II. p. 231. (*Amer: bor:*). Huc pertinet *V. odoratissima* DONN: sec: R. et S. et DC. ; at hæc culta in H. BURDINII quam habeo ex HUGUENIN videtur a *V. riparia* differre petiolis nervisque foliorum *glabris* nec *pubescentibus*; insuper in *V. riparia* lobi foliorum evidenteriores , dentes breviores. = 4. *V. vulpina*? Valde dubia , ab Auctribus confusa cum *V. æstivali* et *cordifolia* Michx:

Specim: meum vix differt a *V. Labrusca*. Cons: R. et S.
l. c. p. 317. n. 8. 9.

Obs: geographica circa *Ampelideas*.

Ampelideæ ex DC. sistunt numero 115., quarum
una tantum scilicet *Vitis vinifera* spontanea in Pe-
demontio evasit.

ORDO XLVI.

GERANIACEÆ

(DC. Prodr: I. 637. = *Gerania* Juss: gen: 268.
= J. S. Hill: fam: II. p. 51. t. 80.)

Char: essentialis.

» *Cal:* persistens 5 - partitus vel saepius sepala 5.
» uno interdum basi in calcar cum pedunculo con-
» natum producto. *Pet:* 5. (rarius 4., in *Rhyncotheca-*
» *ca* o.) sepalis alterna, æqualia vel inæqualia. *Stam:*
» fere semper basi monadelpha numero et mensura
» inæquali, rarissime libera (in *Rhyncotheca*). *Ovar:*
» torus elongatus in axim pentagonum gracilem, desi-
» nens prima fronte in stylum unicum crassum lon-
» gum stigmatibus 5. coronatum, sed revera styli 5.
» juxta torum sessiles et arcte connati persistentes.

» *Fructus* constans arillis seu carpellis 5. 1-2-sper-
 » mis indehiscentibus, maturitate ab apice ad me-
 » dium tori e fundo calycis elastice secedentibus in
 » vim stylorum (*aristæ Auctorum*). *Semin:* exalbu-
 » minosa. *Embr:* curvus. »

Obs: Ordo valde naturalis habitu, organis florali-
 bus, et præsertim singulari fructus structura, con-
 stans generibus 5. rite determinatis. Herbæ aut suf-
 frutices caulis articulato-nodosis, foliis oppositis vel
 alternis, et tunc pedunculi folio oppositi, floribus so-
 litariis vel umbellatis.

I. MONSONIA Lin: supp: p. 342. = Lam: ill: t. 678.

» *Cal:* 5-sepalus æqualis aristatus. *Pet:* 5. æqualia
 » sub-dentata. *Stam:* 15. basi monadelpha vel penta-
 » delpha. *Carpellorum* aristæ contortæ barbatæ. »

Obs: Genus elegantissimum ob magnitudinem ac
 colorem florum, constans 7 - 8. stirpibus fruticulosis
 spinosis, floribus monadelphis (*Sarcocaulon* DC.) vel
 herbaceis inermibus, floribus pentadelphis (*Olopeta-
 lum* et *Odontopetalum* DC.); omnes incolæ *C. B. S.*

1. *M. lobata* = Mont: act: goth: II. p. 1. t. 1. =
 2. *M. ovata* = Cav: diss: IV. p. 193. t. 113. f. 1.
 = 3. *M. pilosa*, var: *suffruticosa* = Colla H. Ripul:
 p. 93. n. 1. tab: II.

II. GERANIUM L'Herit: ger: = Lam: ill: t. 573.

» *Cal:* 5 - partitus laciniis aristatis raro muticis.
 » *Pet:* 5. æqualia. *Stam:* 10. basi monadelpha alter-
 » natim inæqualia. *Glandula* nectarifera ad basim sta-
 » minum majorum. *Carpellorum* aristæ rectæ nudæ. »

Obs: Genus jam a D. LINNÆO cum *Pelargonio* confusum, modo proprium et ipso habitu facile dignoscendum, constans stirpibus 66. ex DC., 62. ex SPR: Herbae perennes vel annuae, rarissime suffruticosæ, foliis diverse lobatis, pedunculis 1-2-floris.

1. *Perennia*, pedunculis 1-floris.

1. *G. sibiricum* = L. sp: 957. (*Sibir:*, *Caucaso*, *China*). Rami haud *villoosi* uti ex SPR: sed *glabri* subangulati.

* 2. *G. sanguineum* = L. sp: 958. = SPR: syst: III. 71. = Cav: diss: IV. t. 76. f. 1. IC: tauc: vol. 5. t. 67. (*Eur: sylvaticis. In sylvis collium Taurinensium et ad rupes diffractas in subalpinis et montanis Pedemont: frequens ALL: n. 1411. Passim in pascuis aridis atque saxosis provinciae Segusianæ RE fl: segus: p. 58. Copiose in sylvis della Mandria RE fl: torin: I. 350. In sylvis collinis provinciae Novariensis: BIROLI fl: acon: II. 18.*). Flores ampli plus minusve purpurei: variat caule prostrato (*G. prostratum* Cav:); foliis plus minusve sectis, quandoque *vilosissimis* (*G. villosissimum* GAUD:).

2. *Perennia*, pedunculis 2-floris.

3. *G. anemonæfolium* = L'Herit: ger: t. 36. (*Ins: Canar:.*) Suffrutic: Flores ampli purpurascentes.

* 4. *G. macrorrhizone* = L. mant: 343. = SPR: syst: III. 71. = Cav: diss: IV. p. 212. t. 25. IC: taur: vol. 5. t. 61. (*Carinthia, Græcia, Italia. Pedem: in M. Cenisio et supra Tendam* ALL: n. 1398. In *M. Turlo* prov: *Novariensis*: BIROLI fl: acon: II. 18.). Basi suffrut:

5. *G. Wallichianum* = Sweet: ger: t. 90. (*Nepal:*). Ex nervorum dispositione folia sunt rectius 3 - loba quam 5-fida sec: SPR: vel 5-loba sec: DC.; lobi inferiores sunt sub - 2 - lobati, omnes lobato - dentati; herba pulchella sericeo - villosa petalis amplis emarginatis lâte purpureis; ita in specim: plantæ cultæ, ab humanissimo HUGUENIN communicatæ. = 6. *G. Vlassovianum* = Fisch: ex DC. Prodr: I. 641. (*Sibir:*). = 7. *G. striatum* = L. am: IV. p. 282. (*Ital:, Græcia*).

* 8. *G. nodosum* = L. sp: 953. = SPR: syst: III. 72. = Cav: diss: IV. t. 80. f. 1. IC: taur: vol. 5. t. 58. (*Anglia, Gallia, Italia. Pedem:* in umbrosis sylvis *Taurinensibus*; in montanis et subalpinis frequens ALL: n. 1401. RE fl: tor: I. 351. In omnibus sylvis provinciæ *Segusianæ* RE fl: segus: 57. In sylvis collinis provinciæ *Novariensis* BIROLI fl: acon: II. 19.). Folia ampla 3-5-loba, non prorsus glabra sed superne pilis brevissimis mollibus pellucidis adspersa, inferne glaberrima albescentia; laciniæ calycinæ longissime aristatæ; flores mediocres; petala purpurascentia striata.

* 9. *G. reflexum* = L. mant: 257. = DC. Prodr: I. 641. = Cav: diss: IV. t. 81. f. 1. (*Italia, Græcia.* In provincia *Novariensi* ad sepes inter la *Bicocca* et *Oleno* observatur sec: BIROLI fl: acon: II. p. 18.). Pedunculi et calyces villosissimi.

10. *G. ibericum* = Cav: diss: IV. p. 209. t. 124. f. 1. (*Iberia*). Folia radicalia amplissima.

* 11. *G. phœnum* = L. sp: 933. = SPR: syst: III. 72. = Cav: diss: IV. t. 89. f. 2. IC: taur: vol. 10.

t. 56. 69. (*Eur: Pedem:* in lapidosis umbrosis alpinis et subalpinis. In *Sabaudia* frequentius, secus viam ab *Exilles* ad *Chaumont* ALL: n. 1399. *Alle Combe supra Chianoc* crescit var: β , *G. fuscum* L. mant: 97., RE fl: segus: 57.). Variat colore et forma petalorum, scilicet petalis rubro-fuscis albo-maculatis (*G. phæum* L.); petalis atro-fuscis (*G. fuscum* L.); petalis roseis emarginatis (*G. lividum* L'HER: , *G. patulum* VILL: , *G. subcæruleum* SCHLEICH:).

* 12. *G. sylvaticum* = L. sp: 954. = Spr: syst: III. 73. = Engl: bot: t. 121. (*Eur: sylvis et pascuis montosis. Pedem:* saxosis umbrosis *Alpium* præcipue ad earum radices; in sylvis umbrosis alpinis et pascuis editiorum *Alpium*, uti circa thermas *Vinadiennes*, in pratis *Fenestellarum* frequens ALL: n. 1402. Prope *Segusium* in regione dicta *delle Gorgie* RE fl: segus: 57. In monte *Musiné* RE fl: torin: I. 351. In provincia *Novariensi* præsertim ad radices montium *d'Intrasca* et *Canobbio* BIROLI fl: acon: II. p. 19.). Flores magni cærulei: variat petalis emarginatis (*G. sylvaticum* L.), et floribus majoribus petalis integris (*G. batrachoides* CAV: diss: IV. p. 211. t. 85. f. 1.).

* 13. *G. pratense* = L. syst: XII. p. 455. = Spr: syst: III. 73. = Cav: diss: IV. t. 87. f. 1. (*Eur: dumétis. Pedem:* abunde in montanis et subalpinis ALL: n. 1403.). Flores ampli cærulei. Variat statura minori excepto flore undique albido-sub-tomentoso, foliorum segmentis linearibus pinnatifidis: var: hæc crescit in *Dahuria* et communicata fuit a cl: FISCHERIO sub nomine *G. pratensis laciniati*.

* 14. *G. aconitifolium* = L'Her: ger: t. 40. = Spr:

syst: III: 73. (*Alpibus Delphinatus et Helvet: ad rivulos. Pedem: in cavis gypseis ultra la Posta in M. Cenisio BALBIS: misc: p. 34. Re fl: segus: p. 58. In alpibus Sessitis BIROLI fl: acon: II. p. 19.*). Flores parvi albidi lineati. Huc pertinet sec: DC. et SPR: *G. rivulare* VILL: dauph: III. t. 40.

15. *G. cæruleum* = DC. Prodr: I. 642. ex Patr: (*Dahuria*). Cult: in H. Ripul: ex seminibus missis a cl: FISCHERIO. Flores non *parvi* uti in diagnosi DC., immo *ampli*; ceterum quadrat: an satis a *G. pratensi* distinctum? an potius var: altera glabra? = 16. *G. collinum* = Bieb: fl: taur: II. p. 137. (*Tauria, Caucaso*). Planta valde dubia.

* 17. *G. palustre* = L. amæn: IV. p. 323. = SPR: syst: III. 73. = Oed: fl: dan. t. 596. IC: taur: vol. 5. t. 57. (In pratis paludosis sub-sylvaticis a *Gallia* ad *Dahuriam* DC. *Pedem:* ad lacum *M. Cen-*
nisi ALL: n. 1400. RE fl: segus: p. 57.). Penes nos rarissima species, quam frustra loco ab ALL: indicato quæsivi; folia in specim: misso ab HUGUENIN in *Cen-*
nisi lecto 1828., uti ex scheda, sunt albidiusculo-
sub-tomentosa; calyces striati; petala integra ampla
ex sicco purpurea: ceterum quadrat cum descriptio-
nibus Auctorum.

* 18. *G. pyrenaicum* = L. mant: 97. = SPR: syst:
III. 73. = Cav: diss: IV. t. 99. f. 2. IC: taur: vol. 23.
t. 32. (In submontosis ab *Hispania* et *Anglia* ad
Iberiam. *Pedem:* in alpibus *di Tenda* et circa *Segu-*
sium ALL: n. 1408. RE fl: segus: 58. Alpibus *Sabau-*
diae BOCCONE sec: ALL: l. c. In pratis *del Campello*
versus *Rimella* provinc: *Novariensis* frequens BIROLI

fl: acon: II. 59.). Calyces sub-mutici; petala parva alba vel purpurascentia. Variat caule flaccidiore sub-nudo (*G. umbrosum* Kit:), et foliis profundius lobatis, petalis integerrimis (*G. nemorosum* TENOR:).

19. *G. nepalense* = Sweet: ger: t. 12. (*Nepal:*). Specim: optimum ex planta culta ab HUGUENIN. = 20. *G. parviflorum* = W. en: 716. (*Nov: Holland:*). Communicatum a BALBISIO; flores parvi. = 21. *G. tuberosum* = L. sp: 953. *G. radicatum* M. B. non Lapeyr: (*Eur:*, a *Marsilia ad Tauriam*). = 22. *G. Berterianum* = Colla pl: rar: Chil: I. p. 7. *G. tuberoso proximum* Berter: in Merc: chil: n. XIV. p. 643. (*Valparaiso* in pascuis declivibus collium). Differt a priori statura undique minori, foliorum lobis cuneatis nec linearibus, calycibus non coloratis, radice napi-formi. = 23. *G. incanum* = L. sp: 957. (*C. B. S.*).

*? 24. *G. argenteum* = L. amæn: IV. p. 324. = Spr: syst: III. 74. (In Alpib: *Gallo-provinciæ*, *Carinthiæ*, *Pedemontii?* ex DC.). Sola fide cl: DC. re-fero hanc pumilam herbam tamquam *Pedemontii* spontaneam, nam Auctores nostri de ea silent; specim: meum communicatum fuit a cl: PERRETIO strenuo sabaudo Botaniphilo, qui plantam in *Gallia* legit.

25. *G. cinereum* = Cav: diss: IV. p. 204. t. 89. f. 1. (*Pyren:*).

3. *Herbacea, annua.*

26. *G. lanuginosum* = Lam: dict: II. p. 655. non Jacq: (*Amer: bor:*). = 27. *G. carolinianum* = L. sp: 956. *G. lanuginosum* Jacq: non Lam: (*Amer: bor:*).

Vix a priore diversum foliorum laciniis magis sectis nec prorsus lanuginosis.

* 28. *G. molle* = L. sp: 955. = Spr: syst: III. 54. = Oed: fl: dan: t. 679. Ic: taur: vol. 5. t. 65. 66. (*Eur:* fere tota. *Pedem:* ad vias et præcipue locis ruderatis ALL: n. 1406. RE fl: torin: I. 351. BIROLI fl: acon: II. 20. *Sardinia* in ruderatis MORIS st: sard: I. 10. In agro *Genuensi* BERTOL: pl: gen: ed: 1. p. 81.). Flores parvi; calyces mutici sec: Auctores, in specim: meis brevissime aristati.

* 29. *G. rotundifolium* = L. sp: 957. = Spr: syst: III. 75. = Cav: diss: IV. t. 93. f. 2. (*Eur:* fere tota. *Pedem:* ubique ad vias BALBIS: misc: bot: p. 35. RE fl: torin: I. 253. In pascuis provinciæ Segusianæ RE fl: segus: 58. In provinciæ Novariensis campis et pratis vulgare BIROLI fl: acon: II. 20. In *Sardiniae* arvis MORIS st: sard: I. p. 10. In agro *Genuensi* cum priore BERTOL: pl: gen: ed: 1. p. 82. n. 190. et amæn: ital: p. 168. c. descript: pro var: *petalis emarginatis*). Planta hæc facillime confunditur cum priori a qua vix differt calyce aristato, et carpellis pubescentibus, seminibus reticulatis; ceterum in segmentis foliorum valde variat, immo quandoque in calycinis aristis. Var: a cl: BERTOLONIO descripta eximia; in ea calyces dicit *setula brevissima* terminatos, non reapse *aristatos*; specim: possideo in quibus *sub-mutici* adparent.

30. *G. intermedium* = Colla pl: rar: chil: I. p. 8. (*Chili* pascuis et sepibus *Rancagua*). Ex BERTERO sub nomine *G. rotundifolii* cum dubitationis signo. Ludit reapse inter *G. molle* et *rotundifolium*, sed differt foliis *longissime petiolatis* omnibus plus minusve basi

truncatis, earumque laciniis constanter rotundatis mucronulatis; a primo autem præsertim calyce aristato nec mutico, ab altero carpellis glabris non hirsutis.
 » *G.* caule erecto ramoso striato villosiusculo, foliis
 » longissime petiolatis basi sub-truncatis glabriusculis
 » 5-lobis, lobis 3-fidis laciniis rotundatis mucronu-
 » latis, petalis integris calycem villosum brevi ari-
 » statum æquantibus, carpellis glabris, seminibus ...
 » (flores parvi, petala purpurea). » Nob:

* 31. *G. pusillum* = L. sp: 957. = Spr: syst: III.
 75. = Vaill: bot: t. 15. f. 1. (*Eur:* ruderatis. *Pedem:*
 in macilentis ad vias *All:* n. 1410. Speciatim inter
Taurinum et *la Madonna di Campagna RE* fl: torin:
I. 353. In provinc: *Novariensis* pratis sterilibus, pa-
scuis et declivis *Ticini* *BIROLI* fl: acon: II. p. 20. In
Chili pratis et ad vias frequens vedit *BERTERUS Merc:*
chil: n. XIV. p. 643.). Flores minimi. Variat caule hu-
miliiori, foliis tenuius incisis (*G. humile* *Cav:* diss: IV.
t. 83. f. 2.). *G. malvæfolium* *LAM:* a SPR: omissum
pertinet ad hanc speciem sec: DC. Prodr: I. 643.

32. *G. bohemicum* = L. amæn: IV. 323. (*Bohem:*,
Silesia).

* 33. *G. divaricatum* = Ehr: bestr: VII. p. 164.
= Spr: syst: III. 75. = Vint: ic: t. 2. sub *G. novo*
(*Hungar:*, *Valesia*, *Caucaso*). In *Pedem:* secus viam
inter *Pollein* et *Brissonne* prope *Augustam Prætoriam*
BALE: misc: p. 34.). Folia 3 - 5 - loba, sed lobo uno
laterali versus ramos constanter longiore: flores parvi,
petala albida.

* 34. *G. lucidum* = L. sp: 955. = Spr: syst: III.
75. = Oed: fl: dan: t. 218. (*Eur:* rupibus umbrosis.

Pedem: in agro Nicæensi ALL: n. 1405. Provinc: Novariensi ad rupes d'Intragua BIROLI fl: acon: II. 19. In Sardin: umbrosis montanis MORIS st: sard: I. 10.). Flores parvi; calyces vix mucronati.

* 35. *G. columbinum* = L. sp: 956. = Spr: syst: III. 75. = Oed: fl: dan: t. 1222. Ic: taur: vol. 5. t. 64. (*Eur:* arvis. In agris et ad semitas in agro Pedemontano uberrime ALL: n. 1407. RE fl: tor: II. 352. Provinc: Segusiana ad viarum ripas locis umbrosis RE fl: segus: 58. Provinc: Novariensi ad vias, muros et pascua BIROLI fl: acon: II. 20. In Sardinie sylvis MORIS st: sard: I. 10.). Flores parvi; calyces basi sub-inflati.

* 36. *G. dissectum* = L. sp: 956. = Spr: syst: III. 75. = Oed: fl: dan: t. 936. (*Eur:* et Iberiæ arvis. *Pedem:* in umbrosis præsertim ad sepes et vias ALL: n. 1409. RE fl: segus: 58. Speciatim ad fossas secus viam prope la Madonna di Campagna RE fl: tor: I. 352. Ad sepes in Provinc: Novariensi BIROLI fl: acon: II. 20. In Sardin: sylvis MORIS st: sard: I. 10.). Priori valde affine; differt foliorum lobis 3-non-multi-fidis, carpellis villosis nec glabris.

* 37. *G. Robertianum* = L. sp: 955. = Spr: syst: III. 75. = Vill: dauph: III. t. 40. pro var: *purpurea*. Ic: taur: vol. 5. t. 60. (*Eur:* rupibus et in Amer: bor:; etiam in Chili locis umbrosis et lapidosis collum reperit BERTERUS Merc: chil: n. XIV. p. 643. *Pedem:* ad sepes et semitas in umbrosis collinis et montanis ubique ALL: n. 1404. RE fl: torin: I. 353. In provinc: Segusiana frequens ad muros locis umbrosis RE fl: segus: 58. In Provinc: Novariensi ad

vias collium et circa urbem BIROLI fl: acon: II. 21. *Sardiniae* sylvis et ad vias umbrosas MORIS st: sard: I. 10. In agro Nicæensi locis saxosis et olivetis pro var: *purpurea* BALDIS: misc: alt: p. 20.). Flores medios; petala calyce duplo majora; planta odore the-rebinthinaceo. Variat petalis calycem vix superantibus, foliis minoribus (*G. purpureum* VILL: l. c.); caule erectiore paniculato (*G. mosquense* GOLDBACH); floribus pallidioribus odore subnullo (*G. inodorum* PURSH).

III. ERODIUM L'Herit: ger: icon: et text: ined: = *Geranii* spec: L.

» *Stam:* 10. basi monadelpha, 5. alterna sterilia.
 » *Glandula* nectarifera ad basim staminum sterilium.
 » *Carpellorum* aristæ spiraliter tortæ barbatæ. Cetera
 » *Geranii.* »

Obs: Genus artificiale a *Geranio* habitu haud distinctum, constans stirpibus 45. ex DC., 42. ex SPR: Herbæ, rarissime suffrutices foliis variis, pendunculis saepius multifloris.

i. *Foliis indivisis.*

1. *E. chamædryoides* = L'Her: ger: t. 6. (*Majorca*). Perenn: Huc pertinent sec: SPR: *E. Bocconi* SALZ: et *E. Reichardi* DC.; hic putat, *E. Bocconi* esse var: *E. maritimi* SMITH et ad suum *E. Reichardi* refert *E. chamædryoideum* L'HER: Quæstio intricata, quam solvere non ausim. Cons: VIVIANI fl: cors: app: p. 5. = 2. *E. malapoides* = W. sp: III. p. 640. (*Ægypt;*, *Barbaria*, *Sicilia*. Ad rupes maritimas ins: *Asinara*,

Tavolara, et *Lingo-Sardo* MORIS st: sard: II. p. 6.). Perenn: Huc pertinet sec: DC. *E. corsicum* LEMEN. Consule tamen *MORISIUM* l. c. ex cuius descriptione adparet *E. corsicum* speciem distinctam constituere. = 3. *E. maritimum* = Smith fl: brit: II. p. 748. var: *Bocconi* (*Corsica*, *Sardinia* in montanis MORIS st: sard: I. p. 10.). Specim: sardoum ex *MORISIO*.

* 4. *E. litoreum* = DC. fl: fr: IV. p. 842. = Spr: syst: III. 32. sub *E. maritimo* = Pluck: phyt: 31. f. 4. (*Naibonæ* et *Liguriæ* arenosis maritimis DC. l. c. Secus vias *Nicææ* ad loca mari proxima ALL: n. 1397. sub *Geranio*). Species hæc pertinere videtur ad verum *Geranium maritimum* L.

2. *Foliis lobatis.*

5. *E. glaucophyllum* = Ait: h. Kew: ed: 1. v. II. p. 416. (*Ægypto*). Ann: Aristæ longissimæ a medio ad apicem aureo-plumosæ. = 6. *E. Gussoni* = Tenor: Prodr: 39. (*Neapoli*). Perenn: Pedunculi umbellati; flores mediocres, petala albo-rosea.

* 7. *E. malachoides* = W. sp: III. p. 639. = Spr: syst: III. 33. = Cav: diss: IV. t. 91. f. 1. Ic: taur: vol. 14. t. 100. sub *Geranio* (*Eur: austr:*, *Afr: bor: et austr: Pedem:* in Comitatu *Nicæensi* frequens ALL: n. 1396. Circa vineas di *Mompantero* RE fl: segus: 57. *Genuæ* sub *la Lanterna* BERTOL: pl: gen: ed: 1. p. 81. n. 187. In *Sardiniae* arvis et ad vias MORIS st: sard: I. 10.). Ann: Flores parvi, petala cœrulea calycis longitudine. Variat statura minori, petalis calycem paullo superantibus; hujus var: possedeo specim: missa a BERTERO et lecta in pascuis

declivibus collium *Valparaiso*. Vid: merc: chil: n.
XIII. p. 615.

8. *E. incarnatum* = L'Her: ger: t. 5. (*C. B. S.*).
Suffrut: Flores medios; petala pallide coccinea.
= 9. *E. Chium* = W. sp: III. 634. (*Arcipel: insulis, Neapoli*). Ann: Flores minimi, calyces submutici.

3. *Foliis ternatis.*

10. *E. hymenodes* = L'Her: ger: t. 4. (*Atlant:*).
Perenn: Flores parvi, calyces mutici. = 11. *E. gruineum* = W. sp: II. 633. (*Creta, Afr: bor:, Hispan:*).
Ann: Flores ampli; calyces striato-nervosi longe aristati; carpellorum aristæ longissimæ.

4. *Foliis pinnatifidis vel pinnatis.*

12. *E. Botrys* = Bertol: am: ital: p. 35. (*Ital: austr:, Corsica, Mauritan:* In *Sardiniae* arvis MORIS st: sard: I. p. 10.). Ann: Folia radicalia in specim: sardoo communicato a cl: MORISIO sunt simpliciter lyrato-sinuata, caulinæ tantum pinnatifida, flores medios; calyces brevissime aristati. Crescit etiam in *Chili?* Vid: infc: n. 17. in fine.

* 13. *E. moschatum* = W. sp: III. 631. = Spr: syst: III. 34. = Cav: diss: t. 94. f. 1. Ic: taur: vol. 5. t. 63. sub *Geranio* (*Eur: austr:, Afr: bor: et austr:, Amer: austr: Pedem: in agro Nicæensi ALL: n. 1395*). In provinciæ *Novariensis* pascuis apricis collium, præsertim secus *Verbani* et *Custi* lacus BIROLI fl: acon: II. 18. In *Sardin:* ad: vias frequens MORIS st: sard: I. 10. In *Chili* pratis montanis invenit BERTER:

merc: chil: n. XIII. p. 615.). Folia pinnata; flores parvi, calyces vix aristati. Tota planta moschum re-dolet.

5. *Foliis bi-pinnatifidis vel bi-pinnatis.*

14. *E. petræum* = W. sp: III. 625. (In *Occitania*). Perenn: Planta pygmæa sub-acaulis; pedunculi in specim: meo ex *Pyreneis* 1-2-nec multi-flori; flores minimi; calyces striati brevi aristati.

* 15. *E. ciconium* = W. sp: III. 629. = Spr: syst: III. 34. = Cav: diss: IV. t. 95. f. 2. Ic: taur: vol. 5. t. 59. sub *Geranio* (*Eur:* austr: *Nicææ* ad semitas et quandoque etiam in collibus calidioribus agri *Pedemontani* ALL: n. 1393. In provincia Seguensis locis incultis circa vineas RE fl: segus: 57. *Taurini* inter pontem *Padi* et portam *Palatii*, et prope montem *Capucinorum* RE fl: tor: I. 350. Ad rupes apricas collum di *Maggiora*, *Gozzano* et *Bavino* BIROLI fl: acon: II. p. 17. *Sardinia* in arvis *Callari* MORIS st: sard: I. 10.). Ann: Flores mediores; calyces striati longe aristati; carpellorum aristæ longissimæ.

16. *E. laciniatum* = Cav: diss: IV. p. 228. t. 113. f. 3. (*Afr:* bor: *Sardin:* in pascuis maritimis di *S. Antioco* MORIS st: sard: I. p. 10.). Ann: Flores mediocres; calyces lanceolati longe aristati, carpellorum aristæ longissimæ.

* 17. *E. cicutarium* = DC. fl: fr: IV. p. 840. = Spr: syst: III. 34. = Ic: taur: vol. 5. t. 62. sub *Geranio* (*Eur:* totius, *Afr:* bor:, et *Orientis* ruderatis. *Pedem:* in pascuis et ad vias locis macilentis vulga-

tissimum ALL: n. 1394. Re fl: segus: 57., fl: tor: I. 350. BIROLI fl: acon: II. 17. In *Sardinia* MORIS st: sard: I. 10.). Variat α caule sub-nullo, foliorum segmentis sub-incisis, petalis calyce majoribus (*E. præcox* CAV: diss: V. t. 126. f. 2.; invenitur prope Novariam ad viam della Bicocca BIROLI fl: acon: II. p. 18.). β Caule sub-erecto, foliis longe petiolatis, petalis calycem sub-æquantibus (*E. pimpinellæfolium* CAV: diss: IV. t. 126. f. 1.). γ Caulibus pluribus sub-prostratis, segmentis tenuiter pinnato-partitis, floribus pallidis aut albis (*E. chærophillum* CAV: diss: IV. t. 95. f. 1.). δ Undique pilosum, floribus intense purpureis (*E. pilosum* THUIL: fl: par: ed: 2. p. 347.). ε Sub-caulescens, segmentis oblongis obtusis, floribus pallidis vel roseis (*E. cicutæfolium* THUIL: l. c.). ξ Diffusum, segmentis in lobos lineares pinnati-partitis (*E. bipinnatum* CAV: diss: V. t. 126. f. 3.). Habui a BERTERO nostro e Chili semina sub nomine *E. cicutarii* cum dubitationis signo, sed plantæ enatae potius ad *E. Botrys* quam ad *cicutarium* accedunt. Cons: COLLA pl: rar: chil: I. p. 8. n. IV.

18. *E. romanum* = W. sp: III. 630. (*Occitania, Italia*). Perenn: Calyces vix aristati; petala purpurea calyce duplo majora: variat statura undique majori, foliorum laciis dentatis (*E. caucalifolium* SWEET ger: t. 6.). = 19. *E. glandulosum* = W. sp: III. 628. (*Hispania, Pyreneis*). Perenn: Planta pygmæa, radice tuberosa; calyces vix aristati.

IV. PELARGONIUM L'Her: ger: ic: et text: ined: = Sub
Geranio L.

» *Cal:* 5-sepalus acutus raro aristatus, sepalo su-
 » premo basi producto in calcar nectariferum pedun-
 » culo connatum. *Pet:* 5. rarius 4. irregularia, ra-
 » rissime (in *Isopetalis* SWEET) æqualia, sæpius 2.
 » superiora lineis ramosis discoloribus striata. *Stam:*
 » 10. basi monadelpha inæqualia 4-7 tantum fertilia.
 » *Carpellorum* aristæ ut in *Erodio*. »

Obs: Pulcherrimum genus a *Geranio* notis indi-
 catis rite distinctum, exhibens typos fere omnes
 promontorii Bonæ Spei incolas, satis diversos, sed
 ob proles hybridas loco natali forsan, et præsertim
 ex horticultura facillime nascentes ita confusos, ut
 ab hortulanis nec non ab Auctoribus in infinitum
 quasi stirpes hodie producantur. Tentamen equidem
 præstantissimum a cl: SWEET inchoatum (*Pelargonieæ*
 in ger: I.) atque a DC. (Prodr: I. 649. et seq:) se-
 cutum! At qui genuinas species ab hybridibus ac
 varietatibus modo extricaverit, magnus erit Apollo.
 Ego ipse in H. Ripul: 130. species enumeratas habeo,
 quas inter plures illlustratæ et pictæ, omnes cultæ;
 fateor tamen apicis tactum vires nostras excedere.
 Hinc ne major oriatur confusio plantas in hb: meo
 existentes ordine alphabeticò tantum indicare sufficiat
 cum auctoris nomine, addito signo † pro stirpibus
 quas hybridas existimo.

1. *P. abrotanifolium* = Jacq: h. schoenbr: II. t.
136. = 2. *P. acerifolium* = L'Herit: ger: t. 21. cum
 2. varr: = 3. *P. acetosum* = Ait: h. Kew: II. 430.

= 4. *P. acutangulum* = Birol: hb: † = 5. *P. acutilobum* = Spin: supp: 1823. not: 6. † = 6. *P. adulterinum* = L'Herit: ger: t. 34. = 7. *P. althæoides* = L'Herit: ger: t. 10. = 8. *P. amplissimum* = W. en: et Mart: act: ac: Monac: V. p. 187. = 9. *P. anceps* = Ait: h. Kew: II. p. 40. = 10. *P. angulosum* = Ait: h. Kew. II. p. 426. = 11. *P. angelina* = Hortul: † = 12. *P. anomalum* = Spin: † = 13. *P. ardens* = Sweet ger: t. 45. = 14. *P. asperum* = W. sp: III. 678. † = 15. *P. augustum* = DC. Prodr: I. 311. † = 16. *P. australe* = W. sp: III. 675. = 17. *P. balsameum* = Jacq: ic: rar: III. p. 543. = 18. *P. Baringtonii* = W. en: 706. † = 19. *P. Beaufortianum* = Pers: enh: II. 231. † = 20. *P. Bentinkianum* = DC. Prodr: I. 664. † = 21. *P. Bellardii* = Spin: † = 22. *P. bellulum* = DC. Prodr: I. 675. † = 23. *P. bellum* = H. Travers: † = 24. *P. Berterianum* = Spin: l. c. n. 8. et Colla h. Ripul: app: III. p. 8. t. IV. † = 25. *P. betulinum* = Ait: h. Kew: II. p. 429. = 26. *P. bicolor* = Ait: h. Kew: II. p. 425. c. variet: = 27. *P. bicolorum* = Spin: ? = 28. *P. Blucher* = Hortul: † = 29. *P. Buffonianum* = Spin: l. c. not: 10. † = 30. *P. Burdinii* = Colla h. Ripul: app: III. p. 6. t. III. † = 31. *P. canaliculatum* = Zucc: ? = 32. *P. canariense* = W. h. berol: t. 17. = 33. *P. capitatum* = Ait: h. Kew: II. p. 425. c. variet: *Rosæ.* = 34. *P. carneum* = Jacq: ic: rar: III. 512. = 35. *P. carnosum* = Ait: h. Kew: II. p. 421. = 36. *P. cinnabrinum* = Spin: l. c. not: 13. † = 37. *P. citriodorum* = Hortul: † = 38. *P. clandestinum* = Spin: l. c. n. 20. † = 39. *P. cochleatum*

= W. en: supp: 48. † = 40. *P. Collæ* = Spin: I. c. n. 21. † = 41. *P. columbinum* = Jacq: h. Schoënb: II. p. 4. t. 133. = 42. *P. conduplicatum* = W. en: 705. = 43. *P. cordatum* = W. sp: III. 670. c. var: speciosa foliis 3-4-minoribus = 44. *P. coriandrisfolium* = Jacq: ic: rar: t. 528. = 45. *P. coronopifolium* = Jacq: ic: rar: t. 526. = 46. *P. cortusæfolium* = L'Herit: ger: t. 25. = 47. *P. crassicaule* = L'Herit: ger: t. 26. = 48. *P. crispum* = L'Herit: ger: t. 32. 33. = 49. *P. crithmifolium* = Sm: ic: pict: 13. = 50. *P. cucullatum* = Ait: h. Kew: II. p. 426. = 51. *P. cuneatum* = Spin: l. c. n. 22. † = 52. *P. Curtisianum* = DC. Prodr: I. 667. ex Balbis: non Spr: † = 53. *P. cuspidatum* = W. en: supp: 47. = 54. *P. Daveyanum* = Sweet ger: t. 32. = 55. *P. denticulatum* = Jacq: h. Schoënb: II. t. 135. = 56. *P. divaricatum* = Breit: ? = 57. *P. echinatum* = Curt: bot: mag: 309. = 58. *P. elatum* = DC. Prodr: I. 657. et Colla h. Ripul: p. 103. t. 5. = 59. *P. Emelianum* = Hortul: ? = 60. *P. erubescens* = Spin: ? = 61. *P. extipulatum* = Ait: h. Kew: II. p. 431. = 62. *P. fastuosum* = H. Travers: † = 63. *P. formosissimum* = Desf: ? = 64. *P. formosum* = Bälb: ? = 65. *P. fragrans* = W. en: 701. = 66. *P. fulgidum* = Ait: h. Kew: II. 422. = 67. *P. Ghilini* = Spin: cat: 1818. p. 31. † = 68. *P. gibbosum* = W. sp: III. 684. = 69. *P. glaucum* = L'Herit: ger: t. 29. = 70. *P. glomeratum* = Jacq: coll: I. p. 146. t. 98. = 71. *P. glutinosum* = Ait: h. Kew: II. 426. = 72. *P. grandiflorum* = W. sp: III. 674. = 73. *P. gratum* = W. en: 710. = 74. *P. graveolens* = Ait: h.

Kew: II. p. 423. = 75. *P. grossularioides* = Ait: h.
 Kew: II. p. 42. = 76. *P. hederæfolium* = Dumonc:
 bot: cult: IV. n. 62. *P. saniculæfolium* W. sec: DC.
 pr: I. 668.? = 77. *P. hepaticæfolium* = Spr: nov:
 prov: p. 31. sed omissum in syst: = 78. *P. Heritieri*
 = Jacq: sec: Spr: syst: III. 61. = 79. *P. hermanni-
 folium* = Jacq: ic: rar: III. t. 545. = 80. *P. hetero-
 gamum* = L'Herit: ger: t. 18. = 81. *P. heterophyl-
 lum* = Jacq: ic: rar: III. t. 516. = 82. *P. hibiscifolium*
 = Sweet h. britan: p. 79. n. 168.? = 83. *P. hirsutum*
 = Ait: h. Kew: II. p. 417. = 84. *P. hu-
 mifusum* = W. en: supp: p. 47. = 85. *P. hybridum*
 = Ait: h. Kew: II. 424. = 86. *P. ignescens* = Sweet
 ger: n. 2. t. 55. † = 87. *P. jatrophælium* = DC.
 cat: h. monsp: 1813. † = 88. *P. incarnatum* = Bot:
 mag: t. 761., an idem ac *incrassatum*? = 89. *P. inci-
 sum* = W. sp: III. 686. = 90. *P. inodorum* = W.
 en: 709. = 91. *P. inquinans* = Ait: h. Kew: II. p.
 424. var: fl: alb: = 92. *P. lacerum* = Jacq: ic: III.
 t. 532. = 93. *P. lævigatum* = W. sp: III. 685. Omis-
 sum a SPR: ? = 94. *P. laxum* = Hortul: ? = 95. *P.
 lateripes* = L'Herit: ger: t. 24. = 96. *P. Lecchianum*
 = Spin: cat: 1818. p. 32. † = 97. *P. Leopoldianum*
 = Hortul: ? = 98. *P. lobatum* = W. sp: III. 650.
 = 99. *P. macranthum* = Sweet ger: t. 83. † =
 100. *P. magnificum* = Spin: suppl: n. 16. † = 101.
P. majestuosum = Hortul: ? = 102. *P. molle* = Birol:
 hb: ? = 103. *P. monstrum* = Ait: h. Kew: II. 425. †
 = 104. *P. mucronatum* = Dumonc: ? = 105. *P.
 multicaule* = Jacq: ic: rar: III. t. 534. = 106. *P. mul-
 tifidum* = Hortul: ? = 107. *P. multiflorum* = Sweet

h. brit: p. 78. et Colla h. Ripul: app: p. 54. n. 1. † = 108. *P. Murrayanum* = H. Burdin: et Colla h. Ripul: app: II. p. 354., app: III. p. 5. t. II. † = 109. *P. myrrhifolium* = Ait: h. Kew: II. p. 421. = 110. *P. nobile* = DC. h. bot: Genev: et Prodr: I. 668. † Omissum a SPR: = 111. *P. N. Angliæ* = H. Littæ? = 112. *P. nothum* = W. en: 710. ? Omissum a SPR: = 113. *P. obtusilobum* = W. en: p. 711. = 114. *P. odoratissimum* = Ait: h. Kew: II. p. 419. = 115. *P. ornatum* = Sweet ger: t. 39. Omissum a SPR: † = 116. *P. oxoniense* = Dumone: bot: cult: V. 28. ? = 117. *P. parvifolium* = Spin: hb: ? = 118. *P. patulum* = Jacq: ic: rar: III. t. 541. = 119. *P. pavoninum* = Hortul: ? = 120. *P. peltatum* = Ait: h. Kew: II. p. 427. = 121. *P. penicillatum* = W. sp: III. 669. = 122. *P. pinnatifidum* = Gusson: non Cav: ? Cons: COLLA h. Ripul: app: III. p. 46. n. 3. = 123. *P. piperatum* = Spin: cat: 1818. p. 32. *P. verbenaefolium* Sweet sec: DC. Prodr: I. 679. Omissum a SPR: ? = 124. *P. Principissæ* = Sweet ger: t. 139. † = 125. *P. pseudocrispum* = Birol: hb: ? = 126. *P. pubescens* = Spin: cat: 1818. p. 32. *P. gratum* sec: Spr: syst: III. 60. ? = 127. *P. pulsatillum* = Hortul: ? = 128. *P. pumilum* = W. en: 704. et Mart: pl: monac: t. 5. *P. stanopetali* var: sec: Spr: syst: III. 59. = 129. *P. quercifolium* = Ait: h. Kew: II. p. 420. = 130. *P. quinquelobum* = Lam: dict: II. 663. sub *Geranio*. Cons: COLLA h. Ripul: p. 105. not. 1. t. 23. *P. heterogamum* L'HER: sec: DC. et SPR: sed meo sensu diversum. = 131. *P. quinquevulnerum* = W. en: 703. = 132. *P. Radula* = Ait: h. Kew: II.

p. 423. cum var: β roseo et γ bicolore H. LITTE = 133. *P. reclinatum* = Hortul: ? = 134. *P. reniforme* = W. en: 776. = 135. *P. ribifolium* = Jacq: ic: rar: III. t. 538. = 136. *P. Royal-George* = Hortul: ? Cons: COLLA h. Ripul: app: IV. p. 54. not: 3. = 137. *P. rubescens* = Sweet ger: t. 30. † = 138. *P. sanguineum* = Wendl: coll: II. t. 53. non W. = 139. *P. saniculæfolium* = W. sp: III. 673. = 140. *P. scabrum* = Ait: h. Kew: II. p. 430. = 141. *P. scandens* = Ehrh: beitr: VII. p. 161. = 142. *P. scintillans* = Sweet ger: t. 28. † = 143. *P. semitrilobum* = Jacq: h. Schoën: II. t. 139. = 144. *P. solubile* = Sweet ger: t. 24. † = 145. *P. speciosum* = W. en: 706. = 146. *P. Spinii* = Colla h. Ripul: p. 105. not: 3. t. 7. † = 147. *P. splendens* = W. h. Berol: t. 76. †. *P. ignescens* var: β sterile Sweet sec: DC. Prodr: I. 663. = 148. *P. squarrosum* = Dumonc: bot: cult: V. p. 20. ? = 149. *P. stenopetalum* = Ehrh: beitr: VII. p. 161. = 150. *P. suaveolens* = Desf: arbr: II. p. 465. ? Cons: COLLA h. Ripul: app: III. p. 46. not. 5. = 151. *P. superbum* = Ventn: sec: Steud: ? = 152. *P. tabulare* = L'Her: ger: t. 9. = 153. *P. tenuifolium* = L'Her: ger: t. 12. = 154. *P. ternatum* = Jacq: ic: rar: III. t. 544. = 155. *P. tetragonum* = L'Her: ger: t. 23. c. var: ramis variegatis. = 156. *P. tomentosum* = Jacq: ic: rar: III. t. 537. = 157. *P. tricolor* = Curt: bot: mag: 240. = 158. *P. tripartitum* = W. sp: III. 683. = 159. *P. triste* = Ait: h. Kew: II. p. 418. = 160. *P. unicolorum* = W. en: suppl: 48. ? *P. Willdenowii* Link sec: Spr:, diversum sec: DC. Prodr: I. 681. = 161. *P. variegatum* = W.

sp: III. 674. = 162. *P. villosum* = Sweet ger: t.
 100. † = 163. *P. vitifolium* = Ait: h. Kew: II. p.
 425. = 164. *P. Willdenowii* = Link en: II. p. 190.
 = 165. *P. zonale* = W. sp: III. 667.; varr: multæ.

Obs: geographica circa *Geraniaceas.*

Geraniaceæ ex DC. sistunt numero 490

Geraniaceæ pedemontanae.

<i>Geranium</i>	17
<i>Erodium</i>	5
												<hr/> 22

Et sic 20.^{am} partem excedunt.

ORDO XLVII.

T R O P Æ O L E Æ

(Juss: mém: mus: III. p. 447. = DC. Prodr: I. 683.
= *Geraniis* affines Juss: gen: 269.

Char: essentialis.

» *Cal:* 5-partitus coloratus , lacinia superiore basi
» in calcar liberum producta. *Pet:* 5. calyci inserta
» ejus laciniæ alternantia , inæqualia , irregularia.
» *Stam:* 8. libera vel basi tantum sub - coalita (in
» *Magallana*) ovarium arcte cingentia ac disco peri-
» gyno inserta. *Ovar:* trigonum. *Styl:* 3. in 1. fili-
» forme connexi dénum liberi. *Fructus* constans car-
» pellis 3. (*bacca* SPR:) coalitis 1-locularibus 1-sper-
» mis. *Sem:* exalbuminosa. *Embryo* magnus. »

Obs: Ordo *Geraniaceis* et præsertim *Pelargoniis*
valde affinis , a quibus tamen differt habitu , calycis
calcare libero , staminum ac stylorum numero , et
præcipue fructus seminumque structura , constans ge-
neribus 2. americanis, herbaceis, caule diffuso vel vo-
lubili , foliis alternis exstipulatis , pedunculis axilla-
ribus 1-floris.

TROPÆOLUM Lin: gen: n. 466. = Lam: ill: t. 277.

» *Pet:* 3. inferiora minora aut evanida. *Stam:* pror-
» sus libera. *Carpella* suberosa reniformia sulcata in-
» dehiscentia. Cetera ordinis. »

Obs: Genus ob florum structuram et colorem per-elegans, constans stirpibus 12. circiter foliis simplicibus vel compositis: ubique in hortis colitur *Tr: majus* ad ornamentum, vern: *Capussine* dictum.

1. *Foliis simplicibus peltatis.*

1. *Tr: minus* = L. sp: 490. Ann: = 2. *Tr: majus* = L. l. c. Cult: c. priori in H. Ripul:; utrumque variat floribus plenis, et tunc suffruticosa in calidariis evadunt. = 3. *Tr: peregrinum* = L. l. c. non Jacq: *Tr: Smithii* DC. Prodr: I. 684.? Flores mediocre flavi. = 4. *Tr: aduncum* = Smith tour: I. p. 158. Specim: Berterianum e Chili perfecte quadrat cum descriptio-nibus Auctorum. Flores lutei mediocre.

2. *Foliis compositis (Peltatisectis DC.).*

5. *Tr: pentaphyllum* = Lam: dict: I. 605. ; ill: t. 277. f. 2. Perenn: Calyx ex flavo purpurascens apice atro-purpureus; petala luteola calycem sub-aequantia. Missum a BERTERO nomine *Tr: tuberosi* cum dubitationis signo et lectum in sylvaticis collium *Valparaiso*, pertinet certe ad *pentaphyllum* ex descriptione Auctorum et icone Lamarkiana.

Species novæ.

6. *Tr: azureum* = Miers ex Berter: ined: Pertinet ad II. sectionem. Planta pumila sub-scandens; flores parvi; calyx e luteo viridis, petala azurea (Lectum in Chili prope *Quillota* in fruticetis secus flumen *Acoucagua* loco dicto *de la Cavalera*). Cons: COLLA pl: rar: chil: I. p. 9. n. V. t. II. = 7. *Tr: chilense*

= Berter: ined: Pertinet ad eandem sectionem, et medium tenere videtur inter *Tr: azureum* et *polyphyllum* cui magis tamen accedit petalis calyce *longioribus*. Planta scandens valde diffusa; flores ut in priori, sed calyx fere prorsus viridis, petala patentia lutea (Lectum in sylvaticis collibus Valparaiso). Cons: COLLA l. c. n. VI.

Obs: geographica circa *Tropæoleas*.

Tropæoleæ ex DC. sistunt numero 14., quibus additis *Tropæolis* a BERTERO detectis, ad 16. adscendunt, omnes *Americæ meridionalis* incolæ.

ORDO XLVIII.

B A L S A M I N E Æ

(Rich: dict: class: II. p. 173. = DC. Prodr: I. 685.
= *Geraniis affines* Juss: gen: 270.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 2 - sepalus minimus. *Pet:* 4. hypogyna ir-
» regularia inæqualia, superius fornicatum, inferius
» basi calcaratum, lateralia fissa. *Stam:* 5. hypogyna,
» antheris sub-connatis. *Ovar:* 1. *Styl:* o. *Stigm:* 5.
» distincta aut in 1. coalita. *Capsula* 5-valvis, val-
» vulis spiraliter tortis elastice dissilientibus, poly-
» sperma. *Semina* placentæ adfixa exaluminosa. *Em-*
» *bryo* rectus. »

Obs: Ordo jam cum *Geraniaceis* confusus, sed
habitu proprio (*Violarieis* potius proximus), et organis
floralibus, fructu præsertim satis distinctus, con-
stans 2. generibus ex DC., quorum alterum (*Balsami-*
na) ab *Impatiente* L. male disjunctum levibus
notis, præcipue stigmatibus *distinctis* nec *coalitis*.
Herbæ teneræ, foliis alternis rarius oppositis exti-
pulatis, pedunculis axillaribus 1 - aut multi - floris.

I. IMPATIENS Lin: gen: 1008. = Lam: ill: t. 725. (*Bal-*
samina et *Impatiens* DC. Prodr: I. 685 - 687.).

» *Characteres ordinis.* » Species ex DC. 17. excluso
Balsaminæ genere, ex SPR: 23. inclusa *Balsamina*,

fere omnes ex *Indiis* orientalibus, una tantum europaea. Herbae annuae.

1. *I. Balsamina* = L. sp: 1328. *Balsamina hortensis* DC. Prodr: I. 685. ex Despr: Ubique culta in hortis sub nomine vernaculo *Beioimo*, multimode variat plenitudine et colore florum = 2. *I. latifolia* = L. sp: 1328. *Balsamina* DC. l. c. p. 686.

* 3. *I. noli-tangere* = L. sp: 1328. = Spr: syst: I. 808. = Fl: dan: t. 582. Ic: taur: vol. 6. t. 128. (*Eur:*, *Amer:* bor:, *Asia* med: *Pedem:* ubique locis umbrosis et sub-humidis ad radices montium ALL: n. 1651. Re fl: segus: p. 74. Versus *Villaretto* trans *Sturam* Re fl: torin: I. 149. In umbrosis collium provinc: *Nova-riensis* BIROLI fl: acon: I. 82.).

Obs: geographica circa *Balsamineas*.

Balsamineæ ex DC. numero 31., quarum una tantum pedemontana.

ORDO XLIX.

OXALIDÆ

(DC. Prodr: I. 689. = *Geraniis* affines
Juss: gen: 270.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 5 - sepalus raro 5-partitus (in *Ledocarpo*),
» persistens. *Pet:* 5. hypogyna æqualia. *Stam:* 10. fila-
» mentis basi sub - monadelphis, quorum 5. petalis
» opposita longiora, antheris liberis. *Ovar:* 1. *Styl:* 5.
» *Capsula* vel *bacca* 5-gona 5-locularis ad angulos
» longitudinaliter sæpius elastice dehiscens, oligosper-
» ma. *Semina* angulo loculorum fixa, albuminosa.
» *Embryo* inversus. »

Obs: Ordo olim *Geraniaceis* adnexus ad quas magis
accedit quam ad *Tropæoleas* et *Balsamineas*. *Zygophylleis* quoque affinem esse censuit cl: JUSSIEUS
(l. c.), sed habitu ad omnibus valde recedit. *Herbæ*,
raro suffrutices, foliis sæpius alternis vel rarius op-
positis aut sub-verticillatis.

I. AVERRHOA Lin: gen: n. 576. = Lam: ill: t. 385.

» *Cal:* 5-sepalus. *Stam:* basi annulo juncta. *Bacca*
» magna 5-sulcata. Cetera ordinis. »

Obs: Genus elegans constans 2. stirpibus indicis,
fruticosis, foliis alternis impari-pinnatis, floribus ra-
cemoso-paniculatis, fructu eduli.

1. *A. Bilimbi* = L. sp: 613. = 2. *A. Carambolæ* = L. l. c. Foliola in priori ex specim: meis ovato-oblonga acuminata, in altero late ovata acuta. Cultæ in H. Ripul: ubi nondum floruerunt.

I. *Oxalis* Lin: gen: n. 582. = Lam: ill: t. 391.

: » *Cal:* 5-sepalus. *Stam:* sub-libera. *Syl:* apice penicilliformes aut capitati. *Capsula* oblonga vel cylindracea. Cetera ordinis. »

Obs: Genus constans stirpibus 154. ex DG. excluso genere *Biophytæ*, 139. ex SPR: *Biophyto* inclusò, difficillime dividendum nisi artificialiter ex foliorum compositione. Herbæ perennes rarissime suffrutices, acaules vel caulescentes, foliis raro simplicibus plerumque varie compositis, pedunculis 1 - vel multi - floris, radicibus sèpe bulbosis.

1. *Foliis binatis, Acaules, Scapo unifloro.*

1. *O. asinina* = Jacq: ox: n. 38. t. 24. (*C. B. S.*). Perenn: Flores flavi magni. Cult: in h. Ripul:

2. *Foliis ternatis.*

α *Acaules.*

* *Scapo 1-floro folia superante.*

2. *O. variabilis* = Jacq: ox: n. 67. (*C. B. S.*). Perenn: Variat longitudine scapi et colore florum. Cult: in H. Ripul: = 3. *O. purpurea* = Jacq: ox: n. 70. t. 56. (*C. B. S.*). Perenn: Flores purpurei magni. Cult: in H. Ripul:

* 4. *O. Acetosella* = L. sp: 620. = SPR: syst: II.

424. = Fl: dan: t. 980. Ic: taur: vol. 3. t. 52. 53. Vern: *Alleluja*, *Erba dl Coucou* (*Eur:*, *Japon:*, *Amer: bor:* pro var: *americana*. Pedem: abunde in umbrosis sylvis primovere ubique ALL: n. 1602. RE fl: segus: 38. In *M. Musiné* RE fl: torin: I. 243. Provinc: *Novariens*: umbrosis collinis et montanis BIROLI fl: acon: I. 153.). Flores mediocres albi, cærulescetes (var: β *cærulea* Tourn:) vel purpurescetes (var: γ *sub-purpurascens* DC.). Huc pertinet sec: SPR: *O. americana* RIGEL a DC. admissa tamquam species distincta.

5. *O. Piottæ* = Colla H. Ripul: p. 98. n. VII. not. 1. tab: I. (Patria?). Perenn: *O. punctata* L. sec: SPR: c. p. p. 184.; sed differt meo sensu foliolis valde minoribus nec prorsus glabris sed margine ciliatis, quod omissum in descriptione nostra, sed iterum iterumque recognitum in plantis viventibus et in specim: Culta in H. Ripul;

*** *Scapo 1-floro folia æquante vel breviori.*

6. *O. speciosa* = W. sp: II. p. 779. (*C. B. S.*). Perenn: Flores nigri, roseo-purpurei in var: α *purea* (JACQ: ox: n. 74. t. 60.), albi extus sub-incarnati in var: β *sugillata* (JACQ: l. c. n. 75. t. 61.), albi fundo flavi in var: γ *rigidula* (JACQ: l. c. n. 73. t. 59.).

*** *Scapo multifloro.*

7. *O. violacea* = L. sp: 621. (*Amer: bor:*). Perenn: Flores parvi violacei. = 8. *O. caprina* = L. sp: 622. (*C. B. S.*). Perenn: Flores magni lutei; var: fl: pleno. Culta in H. Ripul: = 9. *O. cernua* = Thb: diss: ox:

n. 12. t. 2. f. 2. (*C. B. S.*). Perenn: Flores ut in priori, sed cernui, ceterum simillima, unde facile confunditur ab Hortulanis. = 10. *O. livida* = Jacq: ox: n. 18. t. 8. (*C. B. S.*). Perenn: Flores medios res purpurascentes.

β Caulescentes.

* *Pedunculis 1-floris.*

11. *O. bifida* = Jacq: ox: n. 89. t. 79. f. 4. (*C. B. S.*). Perenn: Foliola parva profunde 2-loba; flores magni-violacei. = 12. *O. versicolor* = L. sp: 622. (*C. B. S.*). Perenn: Flores medios res intus albi extus coccinei. Culta in H. Ripul: = 13. *O. polyphylla* = Jacq: ox: n. 59. t. 39. (*C. B. S.*). Perenn: Flores medios res pallide purpurascentes. Culta in H. Ripul: = 14. *O. hirta* = L. sp: 623. (*C. B. S.*). Perenn: Flores magni violacei fundo flavo. Huc pertinent sec: SPR: *O. hirtella* JACQ: quæ est *O. sessifolia* L., et *O. venosa* SAV: a cl: DG. distinctæ; planta mea valde dubia; foliola *integra* nec apice *retusa*. = 15. *O. tubiflora* = Jacq: ox: n. 23. t. 10. (*C. B. S.*). Perenn: Flores magni purpurei extus pallidiores. Ex hb: BIROLI sub nomine *O. canescens* JACQ: quæ est *tubifloræ* sola varietas sec: W. et SPR: = 16. *O. multiflora* = Jacq: ox: n. 28. t. 15. (*C. B. S.*). Perenn: Flores maximi violacei fundo flavo. = 17. *O. rubella* = Jacq: ox: n. 29. t. 16. (*C. B. S.*). Perenn: = 18. *O. rosacea* = Jacq: ox: n. 30. t. 17. (*C. B. S.*): Perenn: Flores magni violacei subtus discolores. = 19. *O. reptatrix* = Jacq: ox: n. 33. t. 20. (*C. B. S.*):

Perenn: Flores maximi incarnati; pulcherrima species.
 = 20. *O. incarnata* = L. sp: 622. (*C. B. S.*). Perenn: Foliola parva; flores mediocreis incarnati. Cult: in H. Ripul:

*** *Pedunculi multiflori.*

* 21. *O. stricta* = L. sp. 614. = Spr: syst: II. 429. = Jacq: ox: n. 9. t. 4. Ic: taur: vol. 3.. t. 50. Vern: *Erba givola* (*Eur:*, *Amer:* bor: *Pedem:* in pa-scuis umbrosis collium *Taurinensium*, et ad sepes minime rara ita ut indigena videatur; aliis etiam similibusque locis sponte oriri animadvertisit cl: BEL-LARDI ALL: n. 1604. sub *Oxyde*. In saxosis sterilibus *Condoviarum* RE fl: segus: 38. Ad fossas inter *Venariam* et *Taurinum* tum etiam secus viam *Stupinixii* RE fl: torin: I. 243. In *Sardiniae* sylvis et arvis MORIS st: sard: I. p. 11.). Flores minimi slavi.

* 22. *O. corniculata* = L. sp: 624. = Spr: syst: II. 429. = Jacq: ox: n. 10. t. 5. Ic: taur: vol. 3. t. 51. (*Eur:*, *Asia*, *Amer:* bor: et tropic:, *Teneriffa*. *Pedem:* in montibus *Liguriæ* ad irrigua frequentem esse TERRANEUS adnotavit; addidit etiam sibi occurrisse hanc stirpem in agro *Taurinensi*. Passim na-scitur ad macerias et in vineis locis collinis ALL: n. 1603. sub *Oxyde*. Secus viam a *Druent* eundo ver-sus ædem *S. Pancratii* RE fl: torin: I. p. 243. In provinc: *Novariensis* campis et oleraceis ubique BI-ROLI fl: acon: I. p. 153. In *Chili* BERTER: merc: chil: n. XVI. p. 739.). Valde priori affinis, a qua differt caule decumbente radicante, foliolis dimidio mino-ribus, pedunculis petiolo multo minoribus; variat plus

minusve pilosa (*O. villosa* BIEB., *O. pilosiuscula* KUNTH a cl: DC. admissæ tamquam species distinctæ).

23. *O. pubescens* = Kunth n. gen: V. p. 239. Missa sub hoc nomine a cl: BERTERO cum dubitatis signo, et lecta in pascuis sylvaticis collium *Valparaiso*, mihi non videtur differre a vera *O. pubescens*; flores mediocrem flavi. = 24. *O. pentantha* = Jacq: ox: n. 1. t. 1. (*Caracas*). Suffrut: Flores parvi flavi. In planta mea ex BALBISIO foliola *integra* nec *emarginata*, pedunculi petiolo longiores; an species propria? An *O. Neaci* DC. quam cl: SPR: cum *pentantha* confusit? = 25. *O. Dillenii* = Jacq: ox: n. 8. (*Carolina, Guadalupa*). Ann: Flores minimi flavi; habitus omnino *O. strictæ*.

3. *Foliis quaternatis.*

26. *O. tetraphylla* = Cav: ic: III. t. 237. (*Mexico*). Perenn: Flores parvi violacei. Cult: in H. Ripul:

4. *Foliis digitatis.*

27. *O. flabellifolia* = Jacq: ox: n. 94. t. 74. (*C. B. S.*). Perenn: Flores magni, flavi. = 28. *O. flava* = L. sp: 621. (*C. B. S.*). Perenn: Vix a priori distincta foliolis acutis nec emarginatis.

Species dubiæ vel novæ.

29. *O. maculata* = Desf: sec: Steud: Ab *O. stricta* vix videtur differre caule flexuoso simplici; flores minimi flavi. = 30. *O. vigita* = Specim: ex BALBISIO sub hoc nomine quod nullibi enumeratum inveni. *Caulis* erectus striatus. *Folia* ad apicem ramulorum

et caulis conferta, ternata, minima; *foliola* ovato-lanceolata, sessilia, integerrima. *Pedunculi* versus apicem caulis 1 - flori petiolis longiores circa medium 2 - bracteati; *flores* mediocres, *petala* integra violacea; *styli* stamina longiora æquantes. = 31. *O. perdicaria* = Berter: in Merc: chil: n. XVI. p. 739. sine descriptione. Colla pl: rar: chil: I. p. 10. n. VII. c. descript: (In pascuis arenosis *Valparaiso*). Perenn: = 32. *O. arenaria* = Berter: l. c. sine descriptione. Colla l. c. n. VIII. c. descript: et ic: t. III. (Cum priori). Perenn: = 33. *O. gyrorhiza* = Berter: l. c. sine descriptione. Colla l. c. p. 11. n. IX. c. descript: (Secus vias et ad fossas in pratis planitiei *Rancagua*). Perenn: = 34. *O. Bridgesii* = Berter: ined: Colla l. c. n. X. c. descript: et ic: t. IV. (In fruticetis herbidis petrosis maritimis *Valparaiso*). Perenn: Elegantissima. = 35. *O. micrantha* = Berter: l. c. sine descriptione. Colla l. c. p. 12. n. XI. c. descript: (In sylvaticis Chili præsertim in nemoribus *de la Punta de Cortes*). Ann: Omnia minima.

Obs: geographica circa *Oxalideas*.

<i>Oxalideæ</i> per orbem sparsæ ex DC.	159
<i>Oxalideæ</i> pedemontanæ	3

ORDO L.

Z Y G O P H Y L L E Æ

(Brown gen: rem: p. 13. = DC. Prodr: I. 703. = *Rutaceæ* vel *Rutaceis* affines Juss: gen: 296.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 5 - sepalus vel rarius 5 - partitus rarissime
 » (in *Porliera*) 4-sepalus. *Pet:* 5. hypogyna. *Stam:*
 » 10. libera æqualia (8. in *Porliera*, 4. in *Meliantho*).
 » *Ovar:* 1. *Styl:* 1. (5. in 1. coaliti DC.) vel rarissime o. *Stigma* 1. simplex aut raro 5-fidum. *Fruitus* constans carpellis 5. plus minusve coalitis,
 » loculis poly - aut raro. 1-spermis. *Sem:* albuminosa
 » vel exalbuminosa. *Embryo* rectus. »

Obs: Ordo jam *Rutaceis* adnexus, *Oxalideis* affinis, sed satis distinctus a prioribus fructus structura, ab alteris stylo unico aliisque levibus notis, habitu tamen haud naturali, constans ex DC. 10. generibus, quorum 6. prima tantum (*Zygophylleæ veræ*) quamdam analogiam præferunt etiam habitu inspecto, cetera ad incertam sedem potius amandanda.

TRIEULUS Lin: gen: n. 532. = Juss: ill: t. 346.

» *Cal:* 5-sepalus deciduus. *Styl:* o. *Stigma* 5-fidum.
 » *Carpella* 5. (10. in *Tr: maximo*) axi adnexa indehiscentia tuberculato - spinosa 4 - locularia, loculis 1 - spermis. *Sem:* exalbuminosa. »

Obs: Genus constans 7. stirpibus, una tantum europæa. Herbæ diffusæ foliis abrupte pinnatis, pedunculis axillaribus 1-floris.

1. *Tr: cistoides* = L. sp: 554. (*Amer: austr:*). Perenn: Flores mediocres; petala patentissima oblonga luteola. = 2. *Tr: maximus* = L. sp: 554. (*Jamaica, S. Thom:*): Ann: Foliola superiora majora oblique ovata; flores parvi; petala albida.

* 3. *Tr: terrestris* = L. sp: 554. = Spr: syst: II. 325. = Lam: ill: t. 346. f. 1. (*Eur: austr: , Asia med: , Africa. Pedem:* abundans *Nicææ* secus arva, circa *Segusium*, comitatu *Astensi*, in valle *Augustæ Prætoriae*, *Liguria*, *Monteferrato* All: n. 1624. In provincia *Segusiana* secus viam prope *S. Julianum* et *Durbiano* eundo versus *Matthie* atque speciatim copiose in arvis ad orientem *Sacelli della Madonna della Coà* RE fl: segus: 34. In sabulosis *Lumellinæ* versus *Ticinum* secus viam ubique crescere observavit BIROLI mss: In *Sardin:* ad vias et in arvis frequens MORIS st: sard: I. II. *Ripulis* ego ipse frequentem vidi secus viam eundo ad *S. Martinum* ad murum meridiem prospiciens nec alibi). Ann: Variat foliolis plus minusve villosis; flores minimi; petala ovata lutea.

II. FAGONIA Lin: gen: n: 531. = Lam: ill: t. 346.

» *Stigma* 1. *integrum. Carpella* arcte coalita in » capsulam sub-rotundam acuminatam 5-angulatam » 5-locularem, loculis 1-spermis. *Sem:* albuminosa. » *Cetera Tribuli.* »

Obs: Genus *Tribulo* valde affine a quo differt præ-

sertim fructus structura, constans stirpibus i. o. ex DC., 7. ex SPR: Herbæ foliis ternatis vel simplicibus; stipulis saepius geminis spinosis, pedunculis uti in *Tribulo*.

1. *F. cretica* = L. sp: 553. (*Eur: austr: Afr: bor:*). Ann: Folia ternata; stipulae geminæ recurvæ; flores parvi, fructus glabri. = 2. *F. mollis* = Delil: fl: eg: 76. t. 27. f. 2. (*Ægypto*). Suffrut: Folia ternata inferiora interdum simplicia; stipulae spinosæ folium sub-aequantes inferiores geminæ superiores quandoque 3-4-næ; fructus hispidi.

III. ZYGOPHYLLUM Lin: gen: 530. = Lam: ill: t. 345.

» *Cal:* 5-partitus. *Filamenta* basi squamosa. *Discus* glandulosus hypogynus. *Caps:* oblonga 5-gona 5-lo-
» cularis 5 - valvis, valvis medio septiferis, loculis
» polyspermis. *Sem:* exalbuminosa. »

Obs: Genus a priori satis distinctum præsentia squamarum et disci, ac forma fructus, constans stirpibus 19. ex DC., 17. ex SPR: fere omnibus africanis. Herbæ aut frutices foliis plerumque pinnatis raro simplicibus sub-carnosis stipulatis, pedunculis uti in præcedentibus.

1. *Z. coccineum* = L. sp: 551. (*Ægypto, Afr: bor:*). Suffrut: Carnosum; folia 2-foliolata teretia; pedunculi sub-solitarii; capsulae cylindraceæ. Specim: ex SAVI.
= 2. *Z. decumbens* = Delil: fl: eg: 77. t. 27. f. 3. (*Ægypto*). Differt a priori foliis planis brevioribus et latioribus, capsulis turbinato-sphæricis, caulis de-cumbentibus. Specim: ex SAVI. = 3. *Z. Fabago* = L. sp: 551. (*Syria, Tauria, Afr: bor:*). Pedunculi

gemini, flores mediocres luteoli. Cult: in H. Ripul: = 4. *Z. Morgsana* = L. sp: 551. (*C. B. S.*). Flores paulo maiores quam in priori; stipulæ lineares reflexæ. Cult: in H. SPIN: = 5. *Z. simplex* = L. mant: 68. (*Ægypt: Arabia*). Ann: Ramosum divaricatum; folia simplicia clavato-cylindrica parum carnosa.

IV. GUAJACUM Lin: gen: n. 518. = Lam: ill: t. 342.

» *Cal:* 5 - partitus. *Filamenta* sub-nuda. *Styl:* et
» *stigm:* 1. simplex. *Caps:* sub-stipitata angulata 2-5-
» locularis loculis 1-spermis. *Sem:* pendula albumi-
» nosa. »

Obs: Genus *Zygophyllo* valde affine, sed habitu, forma fructus, et præsertim seminibus corneis solitariis albuminosis, diversum. Arbores ligno duro ex *America* calidiore, foliis abrupte-pinnatis, pedunculis axillaribus 1-floris sæpe pluribus nutantibus.

1. *G. officinale* = L. sp: 546. Pedunculi gemini ex SPR:, in icon: LAM: 6-8., in specim: ex BERTERO 1-2. Capsula sæpe (abortu?) 2-locularis, loculis abortivis in alam expansis.

V. PORLIERA R. et P. Prodr: p. 55. t. 9.

» *Cal:* 4-sepalus. *Pet:* 4. *Stam:* 8. squamis peri-
» gynis inserta. *Discus* squamosus. *Fructus* constans
» carpellis 4. drupaceis connatis. »

Obs: Genus a *Guajaco* vix distinctum numero organorum fructificationis. Species unica peruviana; semina, quod sciam, non descripta: an potius ad veras *Rutaceas* amandanda?

1. *P. hygrometrica* = R. et P. Cult: in H. Ripul:, nondum floruit.

VI. MELIANTHUS Lin: gen: n. 795. = Lam: ill: t. 552.

» *Cal:* 5 - fidus persistens coloratus inæqualis basi
 » nectariferus. *Pet:* 5. ligulata quorum 4. medio co-
 » hærentia nectario inserta , quintum minus. *Stam:* 4.
 » hypogyna sub-æqualia , 2. superiora filamentis di-
 » stinctis, 2. inferiora paullo breviora filamentis basi
 » connatis. *Styl:* et *stigm:* 1. *Caps:* membranacea 4-
 » loba 4-locularis , loculis compresso-alatis 2-ovu-
 » latis, abortu 1-spermis. *Sem:* albuminosa. »

Obs: Ex his characteribus patet genus hoc male
Zygophylleis fuisse conjunctum, nec ad *Rutaceas veras* pertinere posse ; magis affine videtur *Personatis* corollæ forma apparenti et staminibus sub-didynamis : sed differt petalis distinctis, capsula 4 - non 2 - loculari ; forsitan ordo proprius? Constat autem 3. stipibus ex *Africa* austr: , fruticosis , foliis alternis impari-pinnatis stipulatis , floribus racemosis.

1. *M. major* = L. sp: 892. Racemi longissimi terminales. = 2. *M. minor* = L. sp: 892. Racemi breves infrasoliacei. Uterque cultus in hortis ; forsitan posterior pertinet ad *M. comosum* Vahl ob inflorescentiam *infrasoliaceam* , sed folia non sunt superne *villosa*.

VII. BALANITES Delil: fl: eg: 77. t. 28. f. 1.

» *Cal:* 5-partitus. *Pet:* 5. *Discus* glandulosus ova-
 » rium cingens. *Drupa* ovoidea 1-locularis 1-sperma
 » nucleo lignoso pentagono. »

Obs: Genus a veris *Zygophylleis* recedens præsertim fructus structura, et constans unica specie (*B. oegyptiaca* DELIL: l. c.) arborescente puberula, ramis spinosis ad foliorum axillas, foliis alternis oblongis subconjugatis, pedicellis axillaribus 1 - floris, floribus parvis albidis. Specim: optimum ex SAVI.

Obs: geographica circa Zygophylleas.

Zygophylleæ ex DC. constant stirpibus num: 52., quarum 1. tantum pedemontana.

ORDO LI.

RUTACEÆ

(Juss: gen: 296. = DC. Prodri: I. 709. =
Adr: Juss: mémoire sur les *Rutacées*.)

Circa *Rutacearum* familiam quæ adhuc obscura mihi visa fuit etiam post eximum Adr: JUSSIEUI opus, nonnullas observationes ineditas exaravi, quas cl: CANDOLLEO communicavi, ut de illis ad libitum disponeret (1). *Rutaceas* ibi in tres ordines distinxii, quos

(1) Observations sur la famille des *Rutacées*, sur le genre *Correa* et formation du nouveau genre *Antommarchia* avec 3. tableaux et 2. figures.

hic tamquam solas *Rutacearum* sectiones referto ne distributio Candolleana mutetur.

I.

Z A N T H O X Y L E Æ

(Colla I. c. tabel; I. = *Rutacearum* trib: I.
ex DC. Prodř: I. 709. exclusis generibus disco
hypogyno instructis.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 1-sepalus (in *Chosya* 5-sepalus) plus minusve 4-5-divisus, raro (in *Zanthoxylo*) 3-9-lobus.
» *Cor:* polypetala (in *Empleuro* et nonnullis *Zanthoxyli* speciebus o.). *Petala* tot quot calycis divisiones.
» *Stam:* quandoque petalorum numero æquali,
» saepius dupla et tunc nonnulla sterilia, rarissime
» tripla, reapse hypogyna uti petala, seu non disco
» (quo destituuntur plantæ hujus ordinis), sed ovarii
» basi vel stipiti inserta. *Ovar:* plerumque stipitatum.
» *Styl:* 1. vel aliquando tot quot calycis divisiones,
» liberi aut rarius connati, interdum stigmatibus
» tantum cohærentes. *Carpella* tot quot calycis divisiones, vel (abortu?) pauciora, aut in capsulam
» coalita. *Sem:* albuminosa. *Embryo* rectus (inversus
» in *Dictamno?*); *radicula* supera; *cotyl:* foliaceæ.

Obs: Ordo *Zygophylleis* magis quam *Rutaceis* affinis ob stamina reapse hypogyna, varius tamen præsertim numero partium fructificationis, constans generibus 9. Arbores vel frutices, raro herbæ perennes,

foliis plerumque oppositis, interdum alternis, compositis vel simplicibus, glandulosis aromaticis, vel eglandulosis inodoris.

I. *ZANTHOXYLUM* Lin: gen: n. 150. = Lam: ill: t. 811.

» *Flores* sub-dioici. *Cal:* 3-9-lobus. *Pet:* tot quot » calycis lobi, raro o. *Stam:* tot quot calycis lobi » iisque opposita, filamentis liberis, antheris 2-lo- » cularibus. *Ovar:* stipitatum 2-9-coccum, in floribus » masculis minutum, interdum obliteratum. *Styli* tot » quot cocci quandoque connati aut apice cohæren- » tes. *Carpella* 2-valvia 1-3-sperma. »

Obs: Genus fructificatione varium, adhuc obscurum, forsan dividendum, constans stirpibus 43. ex DC., 38. ex SPR:, quarum nonnullæ non satis notæ. Arbores vel frutices fere omnes ex *Indiis*, saepè aculeati, foliis plerumque alternis punctato-glandulosis, compositis, raro simplicibus.

1. *Z. punctatum* = West: st: cr: 236. In specim: meo ex BERTERO *Guadalupa* lecto folia omnia trifoliolata, spinæ in ramis rarissimæ. = 2. *Z. fraxineum* = W. sp: II. 757. Umbellæ paucifloræ axillares; flores apetali. = 3. *Z. Clava Herculis* = L. sp: 1455. excl: syn: Vix a priori diversum foliolis basi sub- inæqualibus, petiolis aculeatis, paniculis terminalibus. Cult: in H. Ripul: = 4. *Z. juglandifolium* = W. sp: II. 756. Foliola magna coriacea punctata; desunt flores in specim: meo ex BALBISIO. = 5. *Z. Mayu* = Colla pl: rar: chil: fasc: I. p. 13. t. V. (In sylvis montanis insulæ Juan Fernandez ex BERTERO). Arbor procera vulgo *Mayu*. Petiolus communis seu ra-

chis leviter alata adparet, superne canaliculata ibi-
que punctis nigrantibus ac confluentibus conspersa.

II. DICTAMNUS Lin: gen: n. 522. = Lam: ill: t. 344.

» *Cal*: 5-partitus deciduus. *Pet*: 5. sub-inæqualia.
» *Stam*: 10. omnia fertilia declinata sub - inæqualia
» apice glandulosa. *Ovar*: stipitatum 5-lobum 5-lo-
» culare, loculis 8-ovulatis. *Styl*: 1. declinatus. *Car-*
» *pella* 5. in capsulam interne connexam coalita abortu
» 1-2-spermā. »

Obs: Genus modo constans sola specie sequenti.

* 1. *D. albus* = L. sp: 548. = Spr: syst: I. 321.
= Lam: ill: t. 344. f. 1. Ic: taur: vol. 3. t. 22,
23. Vern: *Frassinella* (*Eur*: austr: *Pedem*: in apricis
collibus *Taurinensibus* di *Superga*, in montibus supra
Giaveno et *Piossasco*, inter *Castiglione* et *Bardas-*
sano, in Alpibus *Vinadiensibus*, in pascuis alpinis
Augustæ Prætoriæ et vallis *Pellina* frequens ALL: n.
1679. In apricis collibus circa *Segusium* RE fl: segus:
34. et fl: torin: I. p. 225.). Herba elegans, racemis
terminalibus longissimis, floribus magnis, petalis pur-
pureis (*D. Fraxinella* LINK enum: I. 398., α *purpu-*
rea DC. Prodr: I. 712.), vel albis (*D. albus* LINK l. c.,
D. Fraxinella var: β *alba* DC. l. c.), odorem gra-
veolenti-aromaticum spirantibus.

III. PEGANUM Lin: gen: n. 601. = Lam: ill: t. 401.

» *Cal*: 5-partitus persistens. *Pet*: 5. æqualia. *Stam*:
» 15. basi dilatato-glandulosa. *Ovar*: sub-sessile 3 -
» gonum. *Styl*: 1. erectus. *Stigma* 3-quetrum. *Cap-*

- » *sula* sub - sphærica 3 - gona 3 - locularis 3 - valvis
 » *polysperma*. »

Obs: Genus pariter constans sola specie sequenti.

*? 1. *P. Harmala* = L. sp: 638. = Spr: syst: II: 452. = Lam: ill: t. 401. (Ad mare *Mediterraneum*, pontum *Euxinum*, et mare *Caspium*. In agro *Nicæensi* nascitur ALL: n. 1652. sub *Harmala multifida*). Planta herbacea vel suffruticosa, foliis sub-pinnatifidis linearibus, floribus solitariis, laciniis calycinis linearibus, petalis ovato-oblongis albis calyce brevioribus. Variat caule herbaceo calyce basi dentate, vel caule suffruticoso calyce edentulo (*P. crithmifolium*, RETZ. obs: II. p. 84.). Cl: DC. in: fl: fr: suppl: 600. hanc stirpem a Flora Pedemontana rejicit; ipse numquam inveni in agro *Nicæensi*.

II.

RUTACEÆ VERÆ

(Colla l. c. tabel: II. = DC. Prodr: exclusa Trib: II. et generibus 2. 3. 4. 6. 9. 12. 18. 20. 21. Trib: I.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 1-sepalus plus minusve 3-4-5-divisus (in » *Cyminosma* 4-sepalus). *Cor:* polypetala, rarissime » (in *Antommarchia*) gamopetala. *Pet:* tot quot calycis divisiones (in *Diplolæna* o.). *Stam:* petalorum numero saepius duplo, rarius æquali, quorum nonnulla frequentius sterilia evadunt. *Discus car-*

» nosus polymorphus ovarium plus minusve cingens,
 » petala et stamina gerens. *Styl:* 1. vel raro tot quot
 » ovaria et tunc coaliti. *Carpella* tot quot calycis di-
 » visiones, interdum abortu pauciora, distincta vel
 » basi coalita, vel omnino connata, saepius cocculosa
 » 2-valvia elastice dehiscentia. *Sem:* albuminosa; *em-*
 » *bryo* rectus; *radicula* supera (excepta *Boronia*);
 » *cotyl:* foliaceæ. »

Obs: Ordo satis a *Zanthoxyleis* distinctus maxime
 præsentia disci ovarium cingentis, constans generi-
 bus 15., quorum nonnulla adhuc obscura et forsitan
 ordinis proprii. Frutices, raro in *Rutæ* variis stirpi-
 bus herbæ perennes, fere omnes glandulis scatentes
 et aromatico odore pollentes, foliis alternis aut op-
 positis simplicibus vel compositis constanter exstipu-
 latis.

RUTA Lin: gen: 523. = Lam: ill: t. 345.

» *Cal:* 4 - rarius 3-5-partitus persistens. *Pet:* tot
 » quot calycis divisiones disci lateribus inserta. *Stam:*
 » petalorum numero saepius dupla disco superne in-
 » serta. *Discus*, pori nectariferi tot quot stamina.
 » *Carpella* in capsulam sub-globosam connata poly-
 » sperma. *Sem:* reniformia scabra. »

Obs: Genus constans stirpibus 24. ex DC., 22. ex
 SPR: Herbæ aut suffrutices graveolentes, glaucescen-
 tes, foliis alternis simplicibus vel varie compositis,
 floribus corymbosis lutescentibus.

* 1. *R. graveolens* = L. sp: 548. = Spr: syst: II.
 320. = Duham: arb: II. t. 61. Ic: taur: vol. 10. t. 65.
 (Eur: austr: In Comit: Nicæensi et Uneliae; circa Se-

gusium var: *minor* frequentior est ALL: n. 1024. In rupibus circa vineas di *Mompantero*, RE fl: segus: 34.). Planta officinalis suffruticosa, ubique in hortis culta.

2. *R. corsica* = DC. Prodr: I. 710. = 3. *R. macrophylla* = Bot: mag: t. 2018. *R. chaleensis* a L. (Utraque crescit etiam in *Sardinia* ex MORISIO st: sard: I. 11.)

* 4. *R. angustifolia* = Pers: enc: I. 464. = Spr: syst: II. 320. = Bot: mag: t. 2311. sub *R. chaleensis* β L. (Eur: austr: *Liguria* promontorio *Por-tofino* locis siccis apricis sterilibus Viv: anu: bot: I. par: 2. p. 170. Frequens in ora *Liguriæ* ubi num-quam occurrit *R. graveolens* BERTOL: am: ital: p. 356. In *Asia* min: occurrit var: *crithmifolia* a cl: DC. Prodr: I. 710. admissa tamquam species distincta). Suffrut: foliis tenuiter supra-decompositis, petalis ciliatis. In hortis culta adquirit folia lata, et tunc non distinguitur a *R. graveolente* nisi ciliis petalarum, et iisdem culinæ usibus præstat sec: BERTOL: l. c.

5. *R. fernandezia* = Colla pl: rar: chil: p. 14. (In pascuis petrosis collium ins: *Juan Fernandez* ex BERTERO). Media inter *R. graveolentem* et *angustifoliam*.

* 6. *R. montana* = Clus: hist: II. p. 136. = Spr: syst: II. 320. = Jacq: ic: rar: I. t. 76. sub *R. legitima* (Eur: austr:, Afr: bor: *Pedem*: in sterilibus circa *Cusano*, in valle *Staforæ* ALL: n. 1023. sub *R. legitima*). Valde dubito, *R. legitimam* a cl: ALL: descriptam ad *R. montanam* Clus: pertinere. Specim: mea ex MOLINERIO, quem ALLIONIUS dicit stirpem suam invenisse in locis supra indicatis, præbent folia inferiora valde diversa, scilicet minus decomposita, foliolis non

reapse linearibus sed ovato - oblongis ; insuper petala in *R. montana* sunt lutea , in specim: et ex descriptione ALLIONII fere viridia.

7. *R. pinnata* = L. fil: suppl: 232. (*Canariis*). Suf- fruticulosa. Folia impari-pinnata ; pedunculi sub-co- rymbosi ; fructus indehiscentes. = 8. *R. patavina* = L. sp: 549. (Prope *Pataviam*). Folia ternata ; corymbi conferti. = 9. *R. tuberculata* = Forsk: descr: 86. (*Ægypto, Nubia*). Perenn: Folia simplicia integra tuberculosa oblonga ; corymbi dichotomi ; capsula pilosiuscula.

II. ANTOMMARCHIA Colla mém: sur la fam: des *Rutacées* c. ic: ined: (*Correæ* sp: Smith).

» *Cal:* sub-integerrimus persistens. *Cor:* gamopetala » cylindracea limbo 4-fido erecto. *Stam:* 8. inæqualia » erecta , quorum 4. vix exserta filamentis basi di- » latatis disco inferne insertis. *Discus* glandulis ne- » ctariferis 8. ovarium ad basim cingentibus. *Styl:* 1. » persistens. *Caps:* 4-cocca coccis 2-3-spermis. *Semi:* » nitida (flores penduli). »

Obs: Frutices pulcherrimi ex *N. Holland*: foliis op- positis integris , pedunculis axillaribus 1-floris.

1. *A. rubra* = Colla l. c. c. ic: Sub *Correa* Smith. *Correa speciosa* DC. Prodri: I. 719. = 2. *A.. vi- ren*s = Colla l. c. Sub *Correa* Smith et DC. l. c. Cultæ in h. Ripul:

III. CORREA Smith tr: Lin: soc: IV. = Andr: bot: rep: t. 18.

» *Cal:* 4-dentatus persistens. *Pet:* 4. patentia ca-

» duca. *Stam:* 8. sub-æqualia patentia. Cetera *An-*
» *tommarchiæ* (flores erecti). »

1. *C. alba* = Andr: bot: rep: p. et t. 18. = 2.
C. rufa = Gærtn: fr: III. p. 155. t. 210. Cultæ in h.
Ripul: ex *N. Holland:*

IV. *BORONIA* Smith tr: Lin: soc: p. 285. = Gærtn: fr:
III. p. 156. t. 211.

» *Cal:* 4-fidus persistens. *Pet:* 4. persistentia. *Stam:*
» 8. quorum sæpius 4. abortiva, filamentis basi sub-
» planis superius glandulosis. *Discus* glandulosus. *Styl:*
» 4. breves in 1. coaliti. *Carpella* 4. 2-valvia intror-
» sum connata in capsulam 4-locularem loculis sub-
» monospermis. *Sem:* ovato-compressa. »

Obs: Genus constans 13-14. speciebus ex *N. Hollandia*. Frutices foliis oppositis simplicibus vel impari-pinnatis, floribus axillaribus sæpius purpurescentibus.

1. *B. pilosa* = Labill: N. Holl: I. p. 97. t. 124.
Specim: ex hb: BELLARDI a LABILL: missum; foliola ita
approximata ut folia verticillata quasi referant.

V. *ZIERIA* Smith tr: Lin: soc: IV. p. 216. = Lam: ill:
supp: cent: 10.

» *Cal:* 4-fidus. *Pet:* 4. *Stam:* glabra glandulis superne
» inserta. *Discus*, glandulæ 8. ovarium cingentes. *Styl:*
» 1. *Stigma* 4-lobum. *Fructus* et *semina Boroniæ.* »

Obs: Genus constans 9. stirpibus ex *N. Hollandia*. Frutices arboresve foliis oppositis ternatis summis simplicibus, floribus axillaribus parvis albidis.

1. *Z. lanceolata* = Brown in Sm: cycl: n. 1. Spe-

cim: ex planta jam culta in H. Taurinensi sub nomine *Z. trifoliatae* perfecte quadrat cum descriptione *Z. lanceolatae* BROWN seu *Z. Smithii* ANDR:

VII. EVODIA Font: gen: XIV. t. 7. non Gærtn:

» *Cal*: 4-5-partitus persistens. *Pet*: 4-5. membranacea. *Stam*: totidem glandulis superne inserta. *Discus*, glandulæ 4-5. ovarium cingentes. *Styl*: 1. brevissimus. *Stigm*: sub-capitatum. *Caps*: 4-cocca coccis basi connexis 2-valvibus 1-2-spermis, vel drupæ 4. exsuccæ in *E. drupacea* LABILL: »

Obs: Genus constans 5-6. stirpibus exoticis fruticosis, foliis oppositis ternatis, floribus axillaribus corymbosis.

1. *E. hortensis* = Font: gen: XIV. t. 7. (*N. Holland*:). Specim: optimum ex LABILL:; paniculæ elongatae folia superantes.

VIII. ERIOSTEMON Smith in tr: Lin: soc: IV. p. 221. =
Labill: n. holl: I. t. 141.

» *Cal*: 5-partitus. *Pet*: 5. patentia. *Stam*: 10. hispida, ciliata, aut nuda. *Discus* glandulosus ovarium cingens. *Styl*: 1. brevissimus. *Stigm*: obtusum. *Carpellæ* 5. basi coalita 2-sperma aut (abortu) monosperma. *Semi*: reniformia. »

Obs: Frutices 5-7. ex *N. Hollandia* quorum nonnulli valde dubii, foliis alternis simplicibus, floribus axillaribus.

1. *E. squammeum* = Labill: n. holl: I. p. 111. t. 141. Specim: ex LABILL: habitu *Phebalii* cui coniunctum a cl: A. JUSSIEU sub nomine *Ph: Billardieri*,

VIII. DIOSMA Lin: gen: n. 272. = Lam: ill: t. 127.

» *Cal*: 5-partitus persistens. *Pet*: 5. sessilia. *Stam*:
 » 10. quorum 5. petalis alterna antherifera, 5. ste-
 » rilia polymorpha. *Discus* varius basi ovarium cin-
 » gens. *Styl*: 1. brevis. *Carpella* 5. vel abortu pau-
 » ciora intus conniventia 1-2-sperma. *Sem*: nitida
 » arillata. »

Obs: Genus jam a W. en: 256., hinc a WENDL:
 coll: I. in plura divisum ratione staminum sterilium
 et disci structuræ, nunc a cl: DC. et SPR: demum
 in unum rite restauratum, habitus enim in omnibus
 idem. Species 75. circiter in tot sectiones quot ge-
 nera WENDL: dividendæ. Frutices capenses sæpius eri-
 coidei, foliis punctato-glandulosis aromaticis integris
 aut sub-crenatis, inflorescentia varia.

Sect: I.

Filamenta sterilia staminiformia cum rudimento
 antherarum (*Adenandra* W., *Glandulifolia* Wendl:)

1. *D. uniflora* = Schrad: sert: hann: I. t. 8. Flores
 terminales solitarii magni. = 2. *D. speciosa* = Sims
 bot: mag: t. 1291. Flores terminales solitarii vel um-
 bellati majores quam in priori; species adhuc obscura
 culta in H. Ripul: sub *Adenandra umbellata*. = 3.
D. fragrans = Sims bot: mag: t. 1519. Flores ter-
 minales aggregati longe pedunculati rosei.

Sect: III.

Filamenta sterilia petaliformia
(*Agathosma* W., *Bucco* Wendl:)

4. *D. pulchella* = L. sp: 288. Pedunculi axillares vel terminales 1-2-flori; flores parvi albidi. = 5. *D. ciliata* = L. sp: 287. Flores terminales capitato-umbellati parvi albi; staminia fertilia longe exserta. Cult: in H. Ripul: = 6. *D. rugosa* = Thb: fl: cap: II. p: 138. Priori valde affinis, sed folia rugosa, pedunculi glanduloso-pilos. Cult: in H. SPINII. = 7. *D. imbricata* = Thb: fl: cap. II. p. 145: Huc pertinet sec: SPR: *Agathosma acuminatum* W., *Bucco* WENDL: a cl: DC. distinctum sub *D. acuminata*. Umbellæ terminales aggregatæ multifloræ; flores minimi purpu-rascentes. An huc referenda *D. capitata* L. mant: 210. a SPR: omissa et a DC. distincta in Prödr: I. 717.? Ita censem STEUD: quoad *D. imbricatam* DUMONC: non THB: Specim: mea ex plantis cultis sub utroque nomine minime differunt.

Sect: V. *Eudiosma*.

Stam: sterilia evanida aut sub-squamiformia
(*Diosma* W. et Wendl:)

8. *D. oppositifolia* = Thb: fl: cap: II. p. 132. Fo-lia non semper opposita, quandoque alterna et ad apicem ramorum sub-imbricata; flores terminales sub-corymbosi parvi albi. = 9. *D. hirsuta* = Thb: fl: cap: II. p. 128. Flores terminales sub - corymbosi

mediocres, petala sub-emarginata ex sicco albida. = 10. *D. ericoides* = Thb: fl: cap: II. p. 130. Flores in specim: meis sub-bini, non terminales tantum sed nonnulli axillares: folia leviter *mucronata* nec *obtusa* uti in diagnosi Auctorum. Culta ubique in hortis sub allato nomine, an ad aliam speciem pertinet?

Species dubiæ.

11. *D. fætidissima* = SPR: syst: I. 785. Flores in specim: terminales aggregati erecti pedunculique glaberrimi parvi; calyx coloratus; petala albida calycis longitudine. *Barosma* BERTOL: sec: SPR: l. c.; omissa a DC.; sub *Barosma* W. = 12. *D. filiformis* = Hortul: ? Rami filiformes, folia alterna vel sparse cordata acuta punctata ciliata; desunt flores in specim: = 13. *D. cordata* = H. Berzetti. Non invenitur sub hoc nomine penes SPR: syst:; STEUD: citat GMEL: H. C., cl: DC. inter species non satis notas refert *D. cordatam* MART: en: IV. col: 67., sed inflorescentiam silet. In planta mea rami sunt rubescentes verticillati; folia alternatim approximata sub-cordata punctata sub-revoluta ciliis rarissimis glandulosis margine instructa; flores minutissimi viridescentes in umbellam terminalem valde coarctatam dispositi. = 14. *D. purpurea* = Hortul: ? Videtur *D. rubra* L. Specim: meum quadrat cum diagnosi DC. Prodri: I. 717. = 15. *D. plumosa*? Specim: ex PERRET sine flore; folia linearia cuspidata glabriuscula sub-imbricata. = 16. *D. lanceolata*? Culta in H. Ripul: sub hoc nomine, videtur pertinere ad *D. thymifoliam* W. (*obtusa* R. et S. sub *Bucco*), cuius varr: enumerantur a cl: DC.

Prodr: I. 18.: magis accedit ad var: γ *lanceolata* (*Hartogea* L.), sed folia in planta mea vix non longe ciliata: flores terminales capitato-umbellati; calyx coloratus petalis ovatis albidis duplo brevior.

III.

CUSPARIEÆ

(Colla l. c. tabel: III. = DC. mem: mus: IX. p. 141.
= *Rutacearum* Trib: II. DC. Prodr: I. 729.)

Char: essentialis.

» *Cal:* 1 - sepalus raro 4 - saepius 5 - dentatus vel
» 5-fidus. *Cor:* gamopetala regularis tubulosa, limbo
» in tot lacinias quot calycis divisiones. *Stam:* varia,
» saepius 5., quorum 2. antherifera majora, 3. ste-
» rilia minora. *Discus* carnosus ovarii basim cingens
» plerumque stamina, raro corollam gerens. *Styl:* 1.
» vel raro 5. in unum coaliti. *Carpella* 1-5. saepius
» (abortu?) monosperma. *Sem:* (ex S. HILL:) exal-
» buminosa. »

Obs: Ordo constans ex DC. 7. generibus, quorum
2. (*Barraldeja* PET: TII: et *Hortia* WENDL:) adhuc
obscura; 2. affinia quidem, sed propter absentiam
disci ad veras *Cusparieas* haud pertinentia (*Erythro-
chiton* NEES et MART:, et *Monnieria* L.); 3. reapse
naturalia (*Galipea* AUBL:, *Ticorea* AUBL:, *Diglottis*
NEES et MART:): omnia intratropicalia et rarissima in
calidariis europæis. Unum tantum possideo in her-
bario.

I. ERYTHROCHITON Nees et Mart: nov: act: bonn: XI. p.
165. t. 18. f. 1.

» *Cal:* 2-labiatus, labio superiore 2-inferiore 3-
» dentato. *Cor:* sub-hypocrateriformis, limbo 5-fido
» patente. *Stam:* 5. omnia fertilia basi monadelpha.
» *Styl:* 5. in 1. coaliti. *Stigm:* 5-sulcatum. *Carpella*
» 5. aggregata 2-valvia 2-sperma. »

Obs: Genus constans unica specie ex NEES et MART:
a SPR: ad *Bomplandiam* W. relata sub *B. Erythro-*
chiton (SPR: syst: I. 780.), a quo genere differt ca-
lycis 2-labiati structura, nec non absentia disci quem
in *Bomplandia* ipse SPR: admittit nomine *nectariorum*
10. *squamæformium* (ib: p. 518. n. 856.).

1. *E. brasiliensis* = Nees et Mart: l. c. Specim:
a cl: MARTIO communicatum sine nomine specifico
nimis mancum ut asseri possit an diversam speciem
constituat.

Obs: geographica circa *Rutaceas.*

<i>Rutaceæ</i> per totum orbem sparsæ sec: DC.	134
<i>Rutaceæ</i> pedemontanæ	5
Unde vix 26.am partem constituunt.	

ORDO LII.

S I M A R U B E Æ

(Rich: ann: fr: p. 21. = DC. Prodr: I. 733.)

Char: essentialis.

- » *Cal:* 4-5-partitus persistens. *Pet:* 4-5. hypogyna.
- » *Stam:* petalis numero æqualia aut dupla disco hy-
- » pogyno inserta. *Styl:* 1. filiformis basi ampliatus.
- » *Carpella* tot quot petala axi inserta 2-valvia intus
- » dehiscentia 1-sperma. *Sem:* exalbuminosa pendula.
- » *Radic:* supera. *Flores* quandoque abortu monoici. »

Obs: Ordo parum naturalis, *Cusparieis veris* valde affinis ob disci hypogyni præsentiam, et semina exalbuminosa, constans generibus 4. vix distinctis. Arbores aut frutices e *Tropicis*, cortice amarissimo, succo lacteo, foliis alternis pinnatis exstipulatis.

QUASSIA Lin: gen: n. 728. = Lam: ill: t. 343.

- » *Flores* hermaphroditi. *Cal:* 5 - partitus. *Pet:* 5.
- » *Stam:* 10. filamentis basi squamis (disco) suffultis.
- » *Styl:* simplex. Cetera ordinis. »

Obs: Genus jam cum *Simaruba* conjunctum, nunc distinctum et unicam speciem sequentem continens,

1. *Q. amara* = L. fil: suppl: 235. Arbor glabra, foliis impari-pinnatis, rachide alata, racemis terminalibus, floribus magnis rubicundis; cortex officinalis. In specim: perfectissimo a cl: BERTERO misso ex

Antillis folia nonnulla sunt simplicia magnitudine folioli imparis sc: elliptica acuta, in illis petiolus nudus; quandoque petiolus alatus unum tantum refert foliolum ceteris fere duplo majus, forsitan abortu laterali; cetera sunt 1-2-juga.

II. SIMARUBA Aubl: guyan: II. p. 856. = Swartz act: holm: 1788. p. 302. t. 8. sub *Quassia*. Cons: A. Juss: Rutac: p. 131. t. 27. n. 44.

» *Flores* monoici aut polygami. *Stam:* 5-10. *Styl:* » apice partitus. Cetera *Quassiæ*. »

Obs: Genus a *Quassia* vix distinctum notis allatis, constans ex DC. 3. stirpibus a SPR: sub *Quassia* enumeratis. Arbores fruticesve *Antillas* colentes, foliis pinnatis, floribus paniculatis.

i. *S. excelsa* = DC. diss: ochn: ann: mus: XVII. p. 324. n. 3. Folia impari-pinnata 8-10-juga, rachide nuda; flores polygami 5-andri, stylus apice 3-fidus. Specim: ex BERTERO.

III. ZWINGEREA Schreb: gen: n. 1752. = *Simaba* et *Aruba* Aubl: = *Simaba* S. Hill: et DC.

» *Flores* hermaphroditæ. *Cal:* 4-5-fidus. *Pet:* 4-5. » basi lata. *Stam:* 10. rarius 8. filamentis apice gla- » bris basi dilatato-squamatis. *Styl:* 5. coaliti. Cetera » ordinis. »

Obs: Genus constans 7-8. stirpibus americanis.

i. *Zw: floribunda* = SPR: syst: II. 319. Specim: ex cl: MARTIO e Brasilia sub *Simaba*. = 2. *Zw: discolor*. « Foliis impari-pinnatis, foliolis 2-3-jugis el- » lipticis basi attenuatis apice obtusis emarginatis dis-

» coloribus, racemis axillaribus compositis, pedunculis partialibus ad basim nudis 8-10-floris. » NOE: (Habit: *Brasil: secus Rio Doro*).

Obs: Stirps hæc communicata a cl: MARTIO sub nomine generico *Simabæ*, ac sine nomine specifico, affinis valde videtur *Zw: amaræ* W. (*Simaba gujanensis* AUBL: et DC.); differt tamen foliolis potius *ellipticis* quam *oblongis*, haud *acuminatis* uti in descriptione et figura AUBL: (guy: I. p. 400. t. 153.), immo *obtusis*, discoloribus sc: superne viridibus inferne violaceis, quod silet AUBLETIUS. Pedunculi in specim: non 3-flori uti in observatione W. sp: II. 569. et figura AUBLETHI, sed racemosi compositi, partiales multiflori ad basim *nudi* nec *squamula* muniti; demum frutex brasiliensis nec gujanensis.

Obs: geographica circa *Simarubeas*.

Simarubeæ ex DC. sistunt numero 13., quarum nullæ europææ.

ORDO LIII.

O C H N A C E Æ

(DC. ann: mus: XVII. p. 398. et Prædr: I. 735. =
Lam: ill: t. 472.

Char: essentialis.

» *Cal:* 5-sepalus persistens æstivatione imbricatus.
» *Pet:* 5-10. hypogyna. *Stam:* 5-10. aut indefinita
» æstivatione imbricata disco hypogyno inserta. *An-*
» *theræ* 2-loculares varie dehiscentes. *Styl:* 1. basi
» ampliatus in discum carnosum sub-globosum (*gy-*
» *nobasis*). *Carpella* tot quot petala gynobasi inserta,
» circa stylum verticillata, indehiscentia, sub-dru-
» pacea, 1-sperma. *Sem:* exalbuminosa. »

Obs: Ordo parum naturalis forsitan *Cusparieis* cum *Simarubeis* conjungendus inspecta fructificatione et præsentia disci hypogyni; sed discus hic valde ampliatus, et forma diversa; habitus quoque distinctus. Constat ex DC. 5. generibus, quorum 3. (*Ochna*, *Gomphia* et *Walkera*) vix inter se distincta, alia obscura. Arbores vel frutices intratropicales, foliis alternis simplicibus, floribus racemosis, pedicellis articulatis raro solitariis.

I. *GOMPHIA* Schreb: gen: p. 291. = Lam: ill: t. 472.

» *Pet:* 5. *Stam:* 10. filamentis sub-nullis, antheris
» pyramidatis erectis apice poro dupli dehiscentibus. »

Obs: Genus constans stirpibus 24.

1. *G. Jabatapita* = Swartz fl: ind: occid: II, p. 740.

Specim: c. fructu ex BERTERO perfecte quadrat cum iconе LAM: ill: t. 472. f. 2.

Obs: geographica circa *Ochnaceas*.

Ochnaceæ ex DC, constant numero 40., quarum nullæ europææ.

ORDO LIV.

C O R I A R I E Æ

(DC. Prodr: I. 739. = Lam: ill: t. 822. =
Inter genera *incertæ sedis* Juss: gen: p. 441.)

Char: essentialis.

» *Flores hermaphroditæ vel diclini. Cal:* 10 - fidus
» lobis 5. exterioribus majoribus, 5. interioribus mi-
» noribus callosis. *Pet:* o. *Stam:* 10. toro (*disco*) hy-
» pogyno inserta. *Ovar:* toro crassiusculo insidens,
» terminans stigmatibus (*styli* Juss:) 5. subulatis.
» *Fructus* constans carpellis 5. (*nuculæ* SPR:) conni-
» ventibus indehiscentibus 1 - spermis a basi ad me-
» dium glandulosis. *Sem:* pendulum exalbuminosum;
» *embryo* rectus. »

Obs: Ordo constans unico genere in serie naturali
valde dubio.

I. CORIARIA Niss: act: par: 1711. t. 12.

Charact: ordinis. Frutices ramis oppositis 4-gonis,
foliis oppositis simplicibus, floribus racemosis terminalibus,
pedicellis bracteatis: habitus in omnibus stirpibus proprius. Species 6 - 7., quarum una tantum europaea.

* 1. *C. myrtifolia* = L. sp: 1467. = Spr: syst:
II. 440. = Lam: ill: t. 822. (*Eur: austr: , Afr: bor:*
Ad sepes in Comitatu Nicæensi vulgaris ALL: n. 1758.).

Obs: geographicā circa Coriarieas.

<i>Coriarieæ ex DC. per orbem sparsæ</i>	.	.	.	7
<i>Coriarieæ pedemontanæ</i>	.	.	.	1
<i>Et sic 7.^{am} partem constituunt.</i>				

INDEX

ORDINUM ET GENERUM

IN I. VOLUMINE CONTENTORUM

A

Abrroma	426	Anona	84
Acer	480	ANONACEÆ	83
ACERINEÆ	480	Antommarchia	547
Achania	399	Aquilegia	53
Aconitum	61	Arabis	176
Actæa	71	Arenaria	349
Adansonia	422	Argemone	104
Adenandra	550	Aruba	556
Adonis	23	Asimia	85
Æsculus	484	Astrapæa	437
Æthionema	153	Atragene	2
Aldrovanda	274	AURANTIACEÆ	454
ALSINEÆ	338	Averrhoa	528
Althæa	387	Ayenia	428
Alyssum	137	Azara	239
Amirola	492		B
AMPELIDEÆ	497	Balanites	539
Ampelopsis	499	Bælsamina	526
Anastatica	149	BALSAMINEÆ	526
Androsænum	458	Banisteria	478
Anenione	14	Barbarea	187
ANEMONEÆ	6	Bartramia	441

BERBERIDEÆ	.	.	89	Ceratocephalus	.	.	25				
Berberis	.	.	90	Cheiranthus	.	.	188				
Billardiera	.	.	283	Chelidonium	.	.	107				
Biscutella	.	.	130	Cherleria	.	.	368				
Bixa	.	.	238	CHLENACEÆ	.	.	447				
BIXINEÆ	.	.	238	Chorisia	.	.	425				
Bocconia	.	.	105	Chorispora	.	.	126				
BOMBACEÆ	.	.	420	Cissampelos	.	.	87				
Bombax	.	.	422	Cissus	.	.	499				
Boronia	.	.	548	CISTINEÆ	.	.	240				
Brassica	.	.	213	Cistus	.	.	240				
Bucco	.	.	551	Citrus	.	.	456				
Buffonia	.	.	338	CLEMATIDEÆ	.	.	2				
Bunias	.	.	125	Clematis	.	.	3				
Bursaria	.	.	285	Cleome	.	.	230				
Byttnera	.	.	427	Clypeola	.	.	128				
BYTTNERIACEÆ	.	.	425	Cochlearia	.	.	160				
BYTTNERIEÆ	.	.	426	Cookia	.	.	455				
Byrsonima	.	.	477	Corchorus	.	.	440				
C											
Cakile	.	.	121	CORIARIEÆ	.	.	559				
Calepina	.	.	119	Coronopus	.	.	123				
Calophyllum	.	.	469	Correa	.	.	547				
Caltha	.	.	45	Corydalis	.	.	109				
Camelina	.	.	165	COTYLEDONEÆ (plantæ)	.	.	1				
Camellia	.	.	451	Crambe	.	.	120				
CAMELLIEÆ	.	.	451	Cratæva	.	.	232				
Canella	.	.	470	CRUCIFERÆ	.	.	117				
CAPPARIDEÆ	.	.	229	Cucubalus	.	.	310				
Capparis	.	.	233	Cupania	.	.	491				
Cardamine	.	.	171	CUSPARIEÆ	.	.	553				
Cardiospermum	.	.	488	Cysticapnos	.	.	113				
Carolinea	.	.	423	D							
Caryocal	.	.	486	Delphinium	.	.	55				
CARYOPHYLLEÆ	.	.	288	Dentaria	.	.	169				
Cedrela	.	.	496	Dianthus	.	.	293				
CEDRELACEÆ	.	.	494	DICOTYLEDONEÆ	.	.					
Cerastium	.	.	361	(plantæ)	.	.	1				

Dictamnus	.	.	543	Fumaria	.	.	114
DILLENEÆ	.	.	77	FUMARIACEÆ	.	.	109
Dillenia	.	.	78			G	
DILLENIACEÆ	.	.	76				
Diosma	.	.	550	Galphimia	.	.	477
Diplotaxis	.	.	223	Garidella	.	.	50
Dodonæa	.	.	493	GERANIACEÆ	.	.	501
Dombeya	.	.	436	Geranium	.	.	502
DOMBEYACEÆ	.	.	435	Glandulifolia	.	.	550
Draba	.	.	156	Glaucium	.	.	196
Drosera	.	.	273	Glossarhen	.	.	257
DROSERACEÆ	.	.	272	Gomphia	.	.	558
Drymaria	.	.	345	Gordonia	.	.	449
Drypis	.	.	337	Gossypium	.	.	405
	E			Grewia	.	.	442
ELÆOCARPEÆ	.	.	445	Guajacum	.	.	538
Elæocarpus	.	.	446	GUTTIFERÆ	.	.	468
Elatine	.	.	341	Gypsophila	.	.	289
Epimedium	.	.	92		H		
Erodium	.	.	511	Helianthemum	.	.	244
Eriostemon	.	.	549	Helicteres	.	.	420
Erucaria	.	.	225	Heliocarpus	.	.	439
Erysimum	.	.	207	Heliophila	.	.	226
Erythrociton	.	.	554	HELLEBOREÆ	.	.	45
ERYTHROXYLEÆ	.	.	474	Helleborus	.	.	46
Erythroxylum	.	.	474	Hepatica	.	.	14-23
Evodia	.	.	549	Heritiera	.	.	426
EXOGENÆ (plantæ)	.	i		Hermannia	.	.	433
	F			HERMANNIEÆ	.	.	429
Fagonia	.	.	536	HESPERIDEÆ	.	.	454
Farsetia	.	.	154	Hesperis	.	.	196
Flacourzia	.	.	236	Hibbertia	.	.	77
FLACOURTIANEÆ	.	.	236	Hibiscus	.	.	399
Frankenia	.	.	287	HIPPOCASTANEÆ	.	.	483
FRANKENIACEÆ	.	.	286	Hippocratea	.	.	478
Fugosia	.	.	406	HIPPOCRATEACEÆ	.	.	472
				Hiræa	.	.	477

Holosteum	343	Mahernia	435	
Hutchinsia	142	Malachodendron	449	
Hypecoum	108	Malachra	394	
HYPERICINEÆ	458	Malcolmia	195	
Hypericum	459	Malpighia	476	
I				
Iberis	144	MALVACEÆ	378	
ILLICIEÆ	79	Mammea	469	
Illicium	79	Marcgravia	471	
Impatiens	526	MARCGRAVIACEÆ	471	
Isatis	129	Martia	467	
Isopyrum	49	Mathiola	191	
K				
Kiggelaria	237	Melia	495	
Kitaibelia	387	MELIACEÆ	494	
Koelreuteria	492	Melianthus	539	
L				
Lagunea	418	Melicocca	491	
LASIOPETALEÆ	428	Melochia	429	
<i>Lasiopetalum</i>	428	MENISPERMACEÆ	86	
Lavatera	390	MEKISPERMEÆ	87	
Lepidium	149	Menispermum	88	
LINEÆ	370	Moehringia	340	
Lihum	370	<i>Molinea</i>	491	
Liriodendron	82	<i>Mollugo</i>	342	
Llagonoa	492	<i>Mongeotia</i>	430	
Lunaria	135	Monsonia	502	
Lychnis	332	Moricandia	222	
M				
Magnolia	80	Morisia	225	
MAGNOLIACEÆ	79	Muraltia	280	
MAGNOLIEÆ	80	Murraya	455	
N				
Nandina	92	Myagrum	120	
<i>Napæa</i>	407	Myosurus	25	
Nasturtium	166			

Nelumbium	96	PODOPHYLLEÆ	94
Neslia	118	Podophyllum	94
Nigella	50	Polygala	276
Notoceras	188	POLIGALEÆ	276
Nuphar	97	Porliera	538
Nymphaea	96	Pteroneurum	171
NYMPHÆACEÆ	95	Pterospermum	437
		Pulsatilla	14-15

O

OCHNACEÆ	558
Ochroma	424
Ochthodium	125
OLACINEÆ	453
Ortegia	338
OXALIDEÆ	528
Oxalis	529

P

Pachira	423
Pæonia	72
PÆONIACEÆ	71
Palavia	407
Papaver	99
PAPAVERACEÆ	99
Parnassia	274
Paullinia	489
Pavia	484
Pavonia	395
Peganum	543
Pekea	486
Pelargonium	516
Peltaria	134
Pentapetes	435
Petrocallis	142
Pharnaceum	342
PITTOSPOREÆ	283
Pittosporum	284
Pleurandra	77

Q

Quassia	555
-------------------	-----

R

Radiola	377
RANUNCULEÆ	25
RANUNCULACEÆ	2
Ranunculus	26
Raphanus	126
Redoutea	406
RHIZOBOLEÆ	485
Rhizobolus	486
Ricotia	136
Riedleja	430
Ruta	545
RUTACEÆ	540
RUTACEÆ VERÆ	544

S

Sagina	339
Sanguinaria	105
Saonari	486
SAPINDACEÆ	487
Sapindus	490
Saponaria	307
SARMENTACEÆ	497
SAUVAGEÆ	270
Sauvagesia	270

Seriana	488	Trichilia	495
Sida	407	Tricuspis	446
Silene	310	Triopteris	478
SILENEÆ	289	Triphasia	455
SILICULOSÆ VERÆ	135	Triumfetta	441
SILIQUOSÆ GENUINÆ	169	Trollius	45
SILIQUOSÆ SPURÆ	166	TROPÆOLEÆ	523
Simaba	556	Tropæolum	523
Simaruba	556	Turritis	186
SIMARUBEÆ	555		
Sinapis	218		U V
Sisymbrium	199		
Sodada	233	Urena	394
Solea	268	VASCULARES (plantæ)	1
Sparmannia	439	Velezia	337
Spergula	343	Vella	153
Stellaria	346	Vesicaria	155
Sterculia	425	VINIFERÆ	497
STERCULIEÆ	425	Viola	258
Stylophorum	104	VIOLARIEÆ	256
Succovia	124	VIOLEÆ	257
Swietenia	496	Visenia	430
SYNCLISTÆ	118	Vitis	499
		VALLICHIEÆ	437
		Waltheria	432
T			
Teesdalia	148	X	
Ternstroemia	448		
TERNSTROEMIACEÆ	448	Xanthorrhiza	72
Tetratheca	282		
THALAMIFLORÆ (plantæ)	1	Z	
Thalictrum	6		
Thea	452	ZANTHOXYLÆ	541
Thespisia	405	Zanthoxylum	542
Thlaspi	162	Zieria	548
Thomasia	428	Zilla	124
Tilia	443	Zwingera	556
TILIACEÆ	438	Zygophylleæ	535
TREMANDREÆ	281	Zygophyllum	537
Tribulus	535		

V. SCIOLLA R. A.

V. Imprimatur :
VACHINO pro Magna Cancellaria.

Augustae Taurinorum die 29 novembris 1833.

aff 224

New York Botanical Garden Library

QK 332 .C58 v.1

Colla, Luigi/Herbarium Pedemontanum; jux

gen



3 5185 00110 4965

