Linn QK41
.L117
1791
t.2
pt.2

CAROLI A LINNÉ

SYSTEMA NATURAE.

TOM. II. PARS II.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN

CLASSIS XIII.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

† *calicibus superis.*

DISPERMA. *Sem.* 2. calice coronata.

†† *inferis.*

* *subquinquefidis.*

1236. PERILLA. *Stili* 2. *Stamina* distantia.
722. LEONURUS. *Antherae* punctis osseis adspersae.
714. GLECOMA. *Antherarum* paria cruciata.
709. HYSSOPUS. *Filamenta* distantia, recta. *Corolla* ringens.
713. MENTHA. *Filamenta* distantiâ, recta. *Corolla* subaequalis.
712. SIDERITIS. *Stigma* alterum vaginans alterum.
711. LAVANDULA. *Corolla* resupinata.
706. TEUCRIUM. *Corollae* labium superius o. 2partitum.
705 AJUGA. *Corollae* labium superius staminibus brevius.
723. PHLOMIS. *Corollae* labium superius hirtum.
718. BETONICA. *Corollae* labium superius planum, adscendens, tubo cylindrico. *Stamina* longitudine faucis.
716. LAMIUM. *Corollae* labium inferius utrinque dente setaceo.
717. GALEOPSIS. *Corollae* labium inferius supra bidentatum.
POLLICHIA. *Corollae* labium superius integrum, inferius sine dentibus ad faucem.
719. STACHYS. *Corollae* labium inferius lateribus deflexum. *Stamina* deflorata ad latera deflexa.
710. NEPETA. *Corollae* labium inferius crenatum. *Faux* margine reflexo.
707. SATUREJA. *Corolla* laciniis subaequalibus. *Stamina* remota.
720. BALLOTA. *Cal.* rostriatus. *Corollae* labium superius fornicatum.
721. MARRUBIUM. *Cal.* rostriatus. *Corollae* labium superius rectum.
724. MOLUCCELLA. *Cal.* campanulatus, corolla amplior: dentibus spinosis.

HYPTIS. *Cal.* turbinatus. *Cor.* labium inferius semibifidum.

* *Verbenae multae.*

** *calicibus bilabiatis.*

734. SCUTELLARIA. *Calix* fructiferus operculatus.
727. THYMUS. *Calix* fauce villis clausus.
732. OCYMUM. *Corolla* resupinata. *Filamenta* bina basi processu.

GLANDULARIA. *Germen* 4partitum. *Stil.* 2fidus: glandula inter utramque laciniam media.

735. PRUNELLA. *Filamenta* omnia apice bifurca.
736. CLEONIA. *Stigmata* 4.
733. TRICHOSTEMA. *Filamenta* longissima.
729. DRACOCEPHALUM. *Corollae* faux inflato-dilatata.
726. ORIGANUM. *Strobilus* calices colligens.
725. CLINOPODIUM. *Involucrum* calices colligens.
708. THYMBRA. *Calix* utrinque linea ciliata carinatus. *Stilus* semibifidus. *Corollae* labia plana.

731. MELITTIS. *Cal.* tubo corollae amplior. *Corollae* labium superius planum integrum. *Antherae* cruciatae.

728. MELISSA. *Cal.* angulatus, scariosus: labio superiore adscendente.

730. HORMINUM. *Cor.* laciniae 4 subaequales: quinta majore emarginata.

737. PRASIUM. *Semina* baccata.
738. PHRYMA. *Semen* 1.

ANGIOSPERMIA.

* *corollis monopetalis.*

† *calicibus monophyllis.*

‡ *calicibus integris.*

408. CASTILLEJA. *Capsl.* 2locularis. *Cor.* ringens. *Labium* inferius glandulis tubulosis. *Cal.* tubulosus longitudinaliter hians.

CONOBEA. *Capsl.* 1locularis, 4valvis, polysperma. *Cor.* ringens. *Stigma* 2lobum. *Cal.* 5dentatus.

TANAECIUM. *Bacca* corticosa maxima. *Cor.* tubulosa, subaequalis, 5fidus. *Cal.* cylindricus, truncatus. *Rudimentum* filamenti 5ti.

260. BRUNSFELSIA. *Bacca* 1locularis, polyſperma: conceptaculo maximo. *Cor.* tubo longiſſimo. *Cal.* 5dentatus.

TALIGALEA. *Bacca* 1locularis, 2pyrena: officulis 1ſpermis. *Cor.* infundibuliformis: tubo longo. *Cal.* 4-5dentatus.

GALIPEA. *Peric.* - - - *Cor.* 4-5fida: tubo brevi. *Cal.* 4-5angulatus, 4-5dentatus. *Germen* 4-5gonum.

AMBULIA. *Capſ.* 5gona, 1locularis polyſperma. *Cor.* tubuloſa, 4fida. *Cal.* 5dentatus.

† † *calicibus bifidis.*

778. OBOLARIA. *Capſ.* 1locularis. *Cor.* campanulata, 4fida. *Filamenta* ex diviſuris corollae.

779. OROBANCHE. *Capſ.* 1locularis. *Cor.* ſubaequalis, 4fida. *Glandula* ſub baſi germinis.

770. HEBENSTREITIA. *Capſ.* 2ſperma. *Cor.* 1labiata, 4fida. *Stamina* margini laterali corollae inſerta.

754. TORENIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Filamenta* 2 2fida.

793. ACANTHUS. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* 1labiata, 3fida. *Antherae* villoſae.

DOMBEYA. *Capſ.* 4locularis. *Cor.* 1labiata: labio concamerato. *Cal.* 2labiatus.

1316. PREMNA. *Bacca* 4ſperma. *Cor.* 4fida, inaequalis.

162. CRESCENTIA. *Bacca* 1locularis. *Sem.* 2locularia. *Cor.* tubo campanulato. *Germen* pedicellatum.

† † † *calicibus trifidis.*

761. HALLERIA. *Bacca* 2locularis. *Cor.* 4fida: labio ſuperiore longiore.

† † † † *calicibus quadrifidis.*

769. SELAGO. *Sem.* 1. involutum, corollae inaequali.

781. LIPPIA. *Sem.* 1. 2loculare. *Cor.* hypocrateriformis. *Cal.* compreſſus.

743. LATHRAEA. *Capſ.* 1locularis. *Cor.* perſonata. *Glandula* ſub germine.

MATUREA. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, polyſperma. *Cor.* 2labiata. *Stigma* 2lamellatum.

739. BARTSIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Cal.* coloratior.

741. EUPHRASIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Antherae* inferiores hinc ſpinoſae.

740. RHINANTHUS. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Cal.* compreſſus.

742. MELAMPYRUM. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* bina, gibboſa. *Cor.* perſonata.

749. SCHWALBEA. *Capſ.* 2locularis? *Cor.* perſonata. *Cal.* laciniae ſuperiores ſenſim minores.

PATTERSONIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* infundibuliformis. *Sem.* 4.

785. BARLERIA. *Capſ.* 2locularis, elaſtica: *Semina* bina. *Cor.* infundibuliformis.

PIRIPEA. *Capſ.* 2locularis, 2valvis, polyſperma. *Cor.* hypocrateriformis.

767. LOESELIA. *Capſ.* 3locularis. *Cor.* laciniis ſecundis. *Stamina* petalo adverſa.

763. GMELINA. *Drupa* nucleo 2loculari. *Cor.* 2labiata. *Antherae* binae craſſiores 2partitae.

NEPHRANDRA. *Drupa* nuce 2loculari: *loculis* 1ſpermis. *Cor.* galea 3fida: media involuta: labium 2fidum.

765. LANTANA. *Drupa* nucleo 2loculari. *Cor.* hypocrateriformis. *Stigma* uncinatum.

rrrrr *calicibus quinquefidis.*

1237. AVICENNIA. *Capſ.* 1locularis, coriacea, 1ſperma. *Cor.* labio ſuperiore quadrato.

745. TOZZIA. *Capſ.* 1locularis, 1ſperma. *Cor.* hypocrateriformis.

776. LIMOSELLA. *Capſ.* 1locularis, polyſperma. *Cor.* campanulata, regularis.

773. BROWALLIA. *Capſ.* 1locularis, polyſperma. *Cor.* hypocrateriformis.

1315. LINDERNIA. *Capſ.* 1locularis. *Cor.* ringens. *Stamina* inferiora dente terminali.

1265. VANDELLIA. *Capſ.* 1locularis. *Cor.* ringens. *Stamina* inferiora e diſco labii enata.

749 GESNERIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* ſupera.

GALVESIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* tubuloſa, baſi ſubventricoſa.

NEMIA. *Capſ.* 2locularis, 2valvis. *Cor.* infundibuliformis: limbo ſubaequali 5partito.

756 SCROPHULARIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* reſupinata. *Labium* ſegmento intermedio interno.

777. STEMODIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* inaequalis. *Stam.* 2fida. *Antherae* geminae.

MONTIRA. *Capſ.* 2locularis, 4valvis, polyſperma. *Cor.* tubus ventricoſus, incurvus.

757. CELSIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* rotata. *Filamenta* lanata.

1405. HEMIMERIS. *Capſ.* 2locularis: loculo altero magis gibboſo. *Cor.* rotata: lacinia una majore obcordata, *foſſula* laciniarum nectarifera.

775. SIBTHORPIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* rotata. *Staminа* 2 et 2 approximata.

768. CAPRARIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Stigma* cordatum 2valve.

758. DIGITALIS. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata ſubtus ventricoſa. *Stamina* declinata.

759. BIGNONIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Sem.* alata, imbricata.

TOURRETIA. *Capſ.* 4locularis. *Sem.* alata, imbricata. *Cor.* 2labiata.

784. RUELLIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Stamina* per paria approximata.

772. BUCHNERIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* hypocrateriformis: limbi laciniis obcordatis æqualibus.

771. ERINUS. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* 2labiata: labio ſuperiori breviſſimo reflexo.

764. PETRAEA. *Capſ.* 2locularis: ſeminibus ſolitariis. *Cor.* rotata calice colorato minor.

1264. MANULEA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* limbus 5partitus: lacinia infima profundiore reflexa.

750. ANTIRRHINUM. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata ſubtus nectario prominente.

792. COLUMNEA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* ringens ſupra baſin gibba. *Antherae* connexae.

747. GERARDIA. *Capſ.* 2locularis, 1ſperma, baſi dehiſcens. *Cor.* hypocrateriformis, inaequalis.

AFZELIA. *Capſ.* 2locularis, polyſperma: receptaculis hemiſphaericis. *Cor.* campanulata.

746. PEDICULARIS. *Capſ.* 2locularis: ſeminibus tunicatis. *Cor.* perſonata.

783. MIMULUS. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Cal.* prismaticus.

780. DODARTIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata: labio ſuperiore brevi, adſcendente.

748. CHELONE. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata, inflata, clauſa. *Rudimentum* filamenti quinti.

782. SESAMUM. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata inaequalis. *Rudimentum* filamenti quinti.

753. MARTYNIA. *Capſ.* 5locularis. *Cor.* campanulata. *Rudimentum* filamenti quinti.

752. CRANIOLARIA. *Capſ.* 5locularis. *Cor.* hypocrateriformis: tubo filiformi longiſſimo.

TAMONEA. *Nux* carnoſa, 4locularis: *ſeminibus* ſolitariis. *Cor.* ringens: limbo 5fido. *Cal.* 5ariſtatus.

794. PEDALIUM. *Nux* 2locularis.

1409. AMASONIA. *Nux* ovata, 1locularis.

774. LINNAEA. *Bacca* 3locularis, ſicca. *Cor.* campanulata. *Cal.* ſuperus.

791. BONTIA. *Bacca* 1ſperma: ſemine plicato. *Cor.* labium inferius revolutum.

766. CORNUTIA. *Bacca* 1ſperma. *Cor.* ringens. *Stilus* longiſſimus.

789. CLERODENDRON. *Bacca* 1ſperma. *Cor.* ringens: tubo anguſto. *Stamina* longiſſima.

MYOPORUM. *Bacca* 1-2ſperma: *ſeminibus* 2locularibus. *Cor.* campanulata: limbo 5partito.

788. VOLKAMERIA. *Bacca* 2ſperma: *ſeminibus* 2locularibus. *Cor.* laciniis ſecundis.

760. CITHAREXYLON. *Bacca* 2ſperma: *ſeminibus* 2locularibus. *Cor.* ſubaequalis.

787. OVIEDA. *Bacca* 2ſperma. *Cor.* longiſſima: limbo 3fido. *Cal.* fructificus campanulatus.

1406. MILLINGTONIA. *Siliqua?* *Cor.* longiſſima: limbo 4fido. *Calicis* margo reflexus. *Antherae* 2-partitae, vaginantes.

790. VITEX. *Bacca* 4ſperma. *Cor.* ringens: labio ſuperiori 3fido.

786. DURANTA. *Bacca* 4ſperma: ſeminibus 2locularibus. *Cor.* ſubringens, tubo curvo.

755. BESLERIA. *Bacca* polyſperma 1locularis. *Cor.* inaequalis.

111111 *calicibus multifidis.*

751. CYMBARIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* ringens. *Cal.* 10-dentatus.

1407. THUNBERGIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Cal.* duplex: *exterior* 2phyllus; *interior* multipartitus.

†† *calicibus non monophyllis.*

1317. HYOBANCHE. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* 1labiata. *Cal.* 5-phyllus.

** *corollis tetrapetalis.*

795. MELIANTHUS. *Capſ.* 4ocularis, 4loba. *Corollae* labium ſuperius 0.

GEVUINA. *Capſ.* 1locularis, coriacea. *Cal.* 0.

GYMNOSPERMIA.

DISPERMA. *Cor.* tubulosa: limbo 4fido. *Cal.* 2-phyllus. *Sem.* 2 calice coronata hinc marginata plana inde convexa.

repens. 1. DISPERMA. *Walt. flor. carol. p.* 160.

705. AJUGA. *Cor.* labium superius minimum. *Stamina* labio superiori longiora.

orientalis. 1. A. foliis ovatis, corollis obliquis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 100. *β) Dill. h. Elth. t.* 53. *f.* 61.

pyramidalis. 2. A. tetragono-pyramidalis villosa, foliis oblongis dentatis: radicalibus maximis. *Flor. dan. t.* 185.

alpina. 3. A. caule simplici, foliis dentatis: caulinis radicalia aequantibus, bracteis integris. *Mant. p.* 80. *Pluckn. phyt. t.* 18. *f.* 3. *an mera pyramidalis varietas?*

geneven-sis. 4. A. foliis tomentosis lineatis dentatis, bracteis plurimis trilobis, calicibus hirsutis. *Riv. monop. t.* 140. *f.* 2. *an mera pyramidalis reptantisve varietas?*

reptans. 5. A. glabra, stolonibus reptantibus, foliis ovatis crenatis. *Blackw. herb. t.* 64. *f.* 1.

decumbens. 6. A. decumbens villosa, foliis obovatis dentatis. *Thunb. flor. jap. p.* 243.

706. TEUCRIUM. *Cor.* labium superius erectum, ultra basin profunde 2partitum; inter ejus divisuram stamina.

campanulatum. 1. T. foliis multifidis, floribus lateralibus solitariis, caulibus repentibus. *Riv. monop. t.* 24. *β) Till. h. pis. t.* 49. *f.* 1. *Flos centralis interdum pentandrus, corolla campanulata.*

parviflorum. 2. T. foliis multifidis linearibus, racemo decomposito: pedicellis elongatis divaricatis. *Schreb. vertic. unilab. gen. et sp. p.* 31. *n.* 18. *ic.*

orientale. 3. T. foliis multifidis linearibus, racemo composito: pedicellis brevibus. *Riv. monop. t.* 19.

4. T.

Botrys. 4. T. foliis multifidis, floribus lateralibus ternis pedunculatis. *Hoffmann bot. Taſchenb. f.* 1791. *t.* 9.

mauritanum. 5. T. foliis multifidis linearibus: floralibus mucronatis, racemo ſimplici. *Shaw it.* 2. *app. p.* 121. *n.* 575. *ic.*

laevigatum. 68. T. foliis inferioribus multifidis: ſummis tripartitis, pedunculis ſolitariis longitudine foliorum. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 40.

niſſolianum. 6. T. foliis quinquefidis trifidisque linearibus muticis, pedunculis ſolitariis breviſſimis, caule decumbente.

chium. 7. T. foliis trifidis, floribus axillaribus ſolitariis folio longioribus, caule diffuſo. *Schreb. vert. unilab. gen. et ſp. p.* 25. *n.* 5.

Chamaepitys. 8. T. foliis trifidis, floribus axillaribus ſolitariis folio brevioribus, caule diffuſo. *Flor. dan. t.* 733.

Pſeudochamaepitys. 9. T. foliis trifidis integrisque linearibus mucronatis, pedunculis ſolitariis elongatis, caule diffuſo. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 95.

Iva. 10. T. foliis ſubtricuſpidatis linearibus, floribus ſeſſilibus axillaribus ſolitariis. *Lob. ic.* 384.

moſchatum. 11. T. foliis linearibus integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. *Schreb. vert. unilab. gen. et ſp. p.* 26. *n.* 7.

Libanitis. 12. T. foliis linearibus integerrimis revolutis confertis caulequetomentoſis, ſpicis ſubrotundis. *Barr. pl. rar. ic.* 1090.

Supinum. 13. T. foliis linearibus integerrimis margine revolutis, corymbo terminali. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 417. *an mera montani varietas?*

pumilum. 14. T. foliis linearibus integerrimis planis quadrifariis confertis, capitulis ſeſſilibus terminalibus, caule procumbente tomentoſo. *Barr. pl. rar. ic.* 1092. *β) Barr. pl. rar. ic.* 1093.

anguſtiſſimum. 15. T. foliis linearibus integerrimis ſubnudis, capitulis terminalibus piloſis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic.* 1080.

caeleſte. 16. T. foliis linearibus integerrimis incanis, capitulis terminalibus tomentoſis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic.* 1081.

creticum. 17. T. foliis linearibus integerrimis acuminatis ſubtus niveis, racemo floribus ternatis ſolitariisque, calicibus ſpinoſis. *Alpin. exot. t.* 102.

brevifolium. 18. T. foliis lanceolatis revolutis integerrimis obtusis incanis, floribus solitariis: calicibus muticis. *Rivin. monop. t.* 20.

fruticans. 19. T. foliis lanceolatis integerrimis subtus niveis, floribus solitariis. *Jungh. plant. ic. cent.* 1. *t.* 20.

salicifolium. 20. T. foliis lanceolato-ellipticis obtusiusculis integerrimis, calicibus solitariis quadrifidis. *Mant. p.* 80. *Schreb. dec. pl.* 1. *t.* 9.

latifolium. 21. T. foliis integerrimis rhombeis acutis villosis subtus tomentosis. *Dill. h. Elth. t.* 284. *f.* 368.

trifoliatum. 69. T. foliis oblongis ternis tomentosis revolutis anterius crenatis, capitulis subrotundis laxis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 40.

Marum. 22. T. foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis, floribus racemosis secundis. *Mant. p.* 409. *Blackw. herb. t.* 47. *Regn. bot. t.* 164.

Laxmanni. 23. T. foliis ovato-oblongis integerrimis sessilibus, floribus solitariis sessilibus.

montanum. 24. T. foliis petiolatis ellipticis margine revolutis subtus tomentosis, corymbis terminalibus glabris, caule procumbente. *Riv. monop. t.* 25. *f. inf.* 6.

multiflorum. 25. T. foliis ovatis: superne glabris serrato-dentatis, floribus racemosis: verticillis sexfloris. *Bocc. mus. t.* 117.

thymifolium. 26. T. foliis ovatis obtusis petiolatis subtus tomentosis, capitulis terminalibus paucifloris, caule procumbente. *Barr. pl. rar. ic.* 1062.

japonicum. 66. T. foliis ovatis acuminatis serratis petiolatis, racemis nudiusculis verticillato-spicatis. *Pluken. amalth. t.* 441. *f.* 2.

sibiricum. 27. T. foliis ovatis serratis, pedunculis solitariis trifloris: intermedio sessili bracteis lineari-lanceolatis.

Arduini. 28. T. foliis ovatis serratis, racemo spicato tereti sessili terminali. *Mant. p.* 81. *Arduin. spec.* 1. *t.* 3.

virginicum. 29. T. foliis ovatis inaequaliter serratis, racemis terminalibus. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 30.

massilienſe. 30. T. foliis ovatis rugosis inciso-crenatis incanis, caulibus rectis, racemis rectis secundis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 94.

lucidum. 31. T. foliis ovatis inciso-serratis glabris, verticillis dimidiatis, caulibus erectis laevibus. *Medic. act. Palat.* 3. *phys. t.* 12. *f.* 7-9.

32. T.

flavum. 32. T. foliis ovatis crenatis: floralibus integerrimis, verticillis dimidiatis in racemos digestis, caule fruticoso pubescente. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 5.

nitidum. 33. T. foliis ovatis crenatis: floralibus integerrimis, verticillis dimidiatis racemosis, caule bifariam barbato. *Schreb. vertic. unilab. gen. et sp. p.* 35. *n.* 24.

regium. 34. T. foliis ovatis anterius dentatis: floralibus integerrimis sessilibus, verticillis racemosis, caule ramoso. *Pluckn. alm. t.* 365. *f.* 2.

aureum. 35. T. foliis ovatis serratis, caulibusque dense lanatis: summitatibus luteis nitidis, corymbis terminalibus pilosis. *Rivin. monop. t.* 25.

villosum. 36. T. foliis elliptico-ovatis acuminatis serratis petiolatis villosis, racemo spicato terminali, calicibus inflatis. *Forst. fl. austr. p.* 43.

heterophyllum. 37. T. foliis ellipticis crenatis, floribus lateralibus solitariis: corollae labio exterius lanato, ramis heterophyllis. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 84.

Chamaedrys. 38. T. foliis cuneiformi-ovatis incisis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus subpilosis. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 88. *β) Blackw. herb. t.* 80.

betonicaefolium. 39. T. foliis rhombeo-ovatis obtuse serratis incanis, racemis terminalibus: bracteis oppositis lanceolatis acutis integerrimis, caule fruticoso. *Jacq. collect.* 1. *p.* 145. *t.* 17. *f.* 2.

quadratulum. 40. T. foliis ovato-rhombeis dentatis subtus niveis, verticillis racemosis. *Schreb. vert. unilab. gen. et sp. p.* 36. *n.* 27.

canadense. 41. T. foliis ovato-lanceolatis serratis, caule erecto, racemo tereti terminali: verticillis hexaphyllis.

cubense. 42. T. foliis obovatis inciso-serratis glabris in petiolum attenuatis, floribus solitariis pedunculatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 164.

pyrenaicum. 43. T. foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis pilosis, corymbis terminalibus.

rotundifolium. 44. T. foliis subrotundis crenatis villosis, corymbis terminalibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1095.

Salviastrum. 45. T. foliis ovalibus crenulatis rugosis subtus tomentosis petiolatis, racemo secundo. *Schreb. vertic. unilab. gen. et sp. p.* 38. *n.* 33.

46. T.

buxifolium. 46. T. foliis ovalibus rugosis villosis apice crenatis, corymbis terminalibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1086.

abutiloides. 47. T. foliis cordatis dentatis acuminatis, racemis lateralibus nutantibus. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 84.

Scorodonia. 48. T. foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Flor. dan. t.* 485. *β*) *Gesn. op.* 1. *t.* 85. b.

hircanicum. 49. T. foliis cordatis oblongis obtusis, caule brachiato dichotomo, spicis longissimis terminalibus sessilibus spiralibus. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 19.

scordioides. 50. T. foliis cordatis oblongis amplexicaulibus crenatis lanuginosis, floribus axillaribus pedunculatis geminis. *Schreb. vertic. unilab. gen. et sp. p.* 37. *n.* 30.

Scordium. 51. T. foliis oblongis sessilibus dentatis nudiusculis, floribus axillaribus pedunculatis geminis, caule diffuso pubescente. *Flor. dan. t.* 593.

arenarium. 52. T. foliis oblongis obtusis inciso-crenatis sessilibus, floribus axillaribus pedunculatis subternis. *S. G. Gmelin it.* 1. *p.* 149. *t.* 26. *f.* 2.

inflatum. 53. T. foliis oblongis acuminatis inaequaliter serratis pubescentibus, spicis sessilibus terminalibus, calicibus inflatis villosis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 88. *an forte idem cum villoso?*

Pseudhyssopus. 54. T. foliis oblongis anterius crenatis tomentosis incanis, capitulis rotundatis laxis, caule lanato corymbifero. *Col. ecphr.* 1. *t.* 67.

betonicum. 55. T. foliis lanceolatis serratis utrinque acutis, racemis terminalibus, caule florifero brachiato. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 82. *t.* 40.

capitatum. 56. T. foliis lanceolatis crenatis tomentosis niveis, capitulis subrotundis breviter pedunculatis, caule erecto. *Barrel. ic.* 1047.

Polium. 57. T. foliis lanceolatis crenatis tomentosis incanis, capitulis subrotundis breviter pedunculatis, caule decumbente. *Regn. bot. t.* 161. *β*) *Barr. pl. rar. ic.* 1078.

asiaticum. 58. T. foliis lanceolatis repande-serratis basi rectangulis, floribus solitariis. *Mant. p.* 80. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 41.

trifidum. 59. T. foliis lanceolatis trifidis, pedunculis axillaribus trifloris. *Retz. obs. bot.* 1. *p.* 21.

60. T.

Achaemenis. 60. T. foliis inverse lanceolatis anterius crenatis tomentosis incanis: floralibus flore longioribus, corymbis densis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 2. *f.* 12.

flavescens. 61. T. foliis lineari-lanceolatis anterius crenatis capitulisque subrotundis tomentosis: summitatibus flavis. *Barr. pl. rar. ic.* 1073.

valentinum. 62. T. foliis linearibus crenatis, capitulis subrotundis breviter pedunculatis, caule erecto incano. *Barr. pl. rar. ic.* 1048.

lusitanicum. 63. T. foliis linearibus obtusis crenulatis incanis, capitulis laxis, caule pubescente corymbifero. *Schreb. vertic. unilab. p.* 47. *n.* 50.

pycnophyllum. 64. T. foliis linearibus revolutis anterius crenatis confertis caulesque dense tomentosis, capitulis subrotundis. *Barr. pl. rar. ic.* 1091. 1096.

gnaphaloides. 65. T. foliis linearibus revolutis crenatis calicibusque lanatis, floribus solitariis confertis. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 84. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1083.

spinosum. 67. T. spinosum, pedunculis geminis, calicum labio superiore ovato, corollis resupinatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 389. Teucrium mucronatum. *Barr. pl. rar. ic.* 202.

707. SATUREJA. *Corollae* laciniae subaequales. *Stamina* distantia.

Thymbra. 1. S. floribus verticillatis hispidis, foliis oblongis acutis. *Blackw. herb. t.* 318.

juliana. 2. S. verticillis fastigiatis, foliis lineari-lanceolatis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 17. *f.* 4.

capitata. 3. S. floribus spicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Barr. pl. rar. ic.* 897.

montana. 4. S. pedunculis lateralibus solitariis, floribus fasciculatis fastigiatis, foliis mucronatis lineari-lanceolatis integerrimis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 64.

rupestris. 5. S. pedunculis lateralibus solitariis secundis, foliis ovato-lanceolatis serrulatis. *Wulf ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 130.

viminea. 6. S. pedunculis axillaribus trifloris, involucris linearibus, foliis lanceolato-ovatis integerrimis.

graeca. 7. S. pedunculis subtrifloris lateralibus, involucellis calice brevioribus. *Pluckn. alm. t.* 84. *f.* 8.

hortenſis. 8. S. pedunculis biflоris. *Blackw. herb. t.* 419.

thymifo- 10. S. pedunculis ramoſis corymboſis, foliis ovatis ſubdenta-
lia. tis. *Scop. fl. carn. ed.* 2. *t.* 29.

ſpinoſa. 9. S. ramis ſpinoſis, foliis hiſpidis.

708. THYMBRA. *Cal.* ſubcylindricus, 2labiatus, utrinque linea villoſa exaratus. *Stilus* ſemibifidus.

ſpicata. 1. Th. floribus ſpicatis. *Pluckn. alm. t.* 116. *f.* 5.

verticil- 2. Th. floribus verticillatis. *β*) Thymbra caroliniana. *Walt.*
lata. *flor. carol. p.* 162.

709. HYSSOPUS. *Corollae* labium inferius lacinula intermedia crenata. *Stamina* erecta, diſtantia.

officina- 1. H. ſpicis ſecundis, foliis lanceolatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3.
lis. *t.* 254.

Lophan- 2. H. corollis reſupinatis, ſtaminibus inferioribus corolla bre-
thes. vioribus, foliis cordatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 182.

nepetoi- 3. H. caule acuto quadrangulo. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 69.
des.

HYPTIS. *Cal.* turbinatus. *Corollae* limbus patentiſſimus; labium inferius ſemibifidum. *Antherae* dependentes.

capitata. 1. Hyptis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 102. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 109. *f.* 2. *an forſan clinopodii generi adjungenda?*

710. NEPETA. *Corollae* labium inferius lacinula intermedia crenata: faux margine reflexo. *Stamina* approximata.

hidaefolia. 1. N. paniculis laxiſſimis: pedunculis verticillatis filiformibus, foliis cordatis. *Herit. ſert. angl. p.* 19.

pectinata. 2. paniculis compactis: floribus ſecundis; corollis minimis, foliis cordato-ovatis nudis, caule fruteſcente.

3. N.

lavandula-cea. 3. N. ſpica compacta, foliis ovatis inciſo-ſerratis lineatis. *Suppl. p.* 272. *Pallas act. Petrop.* 1779. 2. *t.* 12.

ſcordotis. 4. N. ſpicis terminalibus ſeſſilibus: bracteis ſubcordatis villoſis, foliis cordatis obtuſis. *Alp. exot. t.* 283.

tuberoſa. 5. N. ſpicis terminalibus: bracteis oblongis acuminatis nervoſo-lineatis coloratis, foliis cordatis pubeſcentibus, corollae lobis lateralibus reflexis. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 72. *β) Sabb. h. rom.* 3. *t.* 81.

lanata. 22. N. ſpicis terminalibus: bracteis ovatis nervoſo-rugoſis ſubſcarioſis, foliis oblongis cordatis villoſis, corollae lobis lateralibus patentibus. *Jacq. obſ. bot.* 3. *p.* 21. *t.* 75.

multifida. 6. N. floribus ſpicatis, corollae lobis lateralibus ſubpatulis, foliis pinnatifidis: laciniis ſubaequalibus linearibus. *Suppl. p.* 273. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 55.

americana. 23. N. ſpicis imbricatis acuminatis, foliis ovatis acutis ſerratis. *Pluckn. amer. t.* 162. *f.* 2.

tomentoſa. 24. N. tomentoſa, ſpicis verticillatis, foliis ellipticis acute ſerratis. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv.*

Cataria. 7. N. floribus ſpicatis: verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Flor. dan. t.* 580.

malabarica. 8. N. ſpica verticillata: bracteis filiformibus, foliis lanceolatis inferne integerrimis. *Mant. p.* 566.

italica. 9. N. floribus ſeſſilibus verticillato-ſpicatis: bracteis lanceolatis longitudine calicis, foliis petiolatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 112.

hirſuta. 10. N. floribus ſeſſilibus verticillato-ſpicatis: verticillis tomento obvolutis. *Bocc. ſic. t.* 25. *f.* 2.

caerulea. 20. N. cymis pedunculatis multifloris hirtis, foliis oblongis cordatis villoſis ſubſeſſilibus, corollae lobis lateralibus reflexis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 285.

violacea. 11. N. cymis pedunculatis multifloris, foliis ſubpetiolatis cordatis nudiuſculis, corollae lobis lateralibus patentibus. *Barr. pl. rar. ic.* 601.

amboinica. 12. N. floribus ſubverticillatis: bracteis ovatis, foliis cordatis obtuſis crenatis. *Suppl. p.* 273. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 90.

nuda. 13. N. florum racemis verticillatis nudis, foliis cordato-oblongis ſeſſilibus ſerratis. *Mant. p.* 410. *Jacq. ſ. auſtr.* 2. *t.* 129.

caneſcens. 21. N. cymis pedunculatis multifloris, foliis petiolatis oblongis ſubcordatis crenatis tomentoſis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 285.

Nepetella. 14. N. cymis pedunculatis, foliis cordatis oblongo-lanceolatis tomentoſis profunde ſerratis.

ucranica. 15. N. floribus paniculatis, foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus nudis.

pannonica. 16. N. cymis pedunculatis multifloris, foliis cordatis lanceolato-oblongis nudis petiolatis obſolete crenatis, corollae lobis lateralibus reflexis. *Jacq. fl. auſtr.* 1. *t.* 24.

incana. 17. N. florum paniculis axillaribus, foliis petiolatis ovatis ſerratis tomentoſis. *Thunb. flor. jap. p.* 244.

anguſtifolia. 25. N. corymbis pedicellatis ſpicatis, foliis lanceolatis rugoſis tomentoſis obtuſe ſerratis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 41.

virginica. 18. N. capitulis terminalibus, ſtaminibus flore longioribus, foliis lanceolatis. *Pluckn. alm. t.* 85. *f.* 2.

indica. 19. N. corollarum labio ſuperiore integerrimo breviſſimo.

711. LAVANDULA.

Cal. ventricoſus, ſubdentatus, ſtriatus, bractea ſuffultus. *Cor.* reſupinata. *Stamina* intra tubum. *Sem.* baſi late deroſa.

Spica. 1. L. foliis ſeſſilibus lanceolato-linearibus margine revolutis, ſpica interrupta nuda. *α*) *Blackw. herb. t.* 294. *β*) *Blackw. herb. t.* 295.

Stoechas. 2. L. foliis ſeſſilibus linearibus margine revolutis, ſpica coarctata comoſa. *Blackw. herb. t.* 241.

viridis. 3. L. foliis ſeſſilibus linearibus rugoſis villoſis margine revolutis, ſpica comoſa: bracteis indiviſis. *Herit. ſert. angl. p.* 19. *t.* 21.

dentata. 4. L. foliis ſeſſilibus linearibus pectinato-pinnatis, ſpica coarctata comoſa. *Kniph. bot. orig. cent.* 2. *n.* 38.

pinnata. 5. L. foliis petiolatis pinnatis: foliolis cuneiformibus, ſpica imbricata. *Jacq. pl. rar ic. cent.* 1. *t.* 9.

multifida. 6. L. foliis petiolatis pinnatis: foliolis decurſive pinnatifidis, ſpica quadrangulari: angulis ſpiralibus. *Burm. ind. t.* 38. *f.* 1.

f. 1. β) *Commel. rar. t.* 27. γ) *Pluckn. alm. t.* 303. *f.* 5. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 11.

carnosa. 7. L. foliis petiolatis ovato-cordatis serratis carnosis, spica tetragona: calicibus recurvatis. *Suppl. p.* 273. *Diss. de lavandula t.* 2.

712. SIDERITIS. *Stamina* intra tubum corollae. *Stigma* brevius involvens alterum.

* *ebracteatae.*

canariensis. 1. S. fruticosa villosa, foliis cordato-oblongis, acutis petiolatis, spicis verticillatis ante florescentiam nutantibus, ramis divaricatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 30.

candicans. 2. S. fruticosa tomentosa, foliis ovato-lanceolatis cordatis apice attenuatis subtus niveis, verticillis suboctofloris remotis. *Commel. hort. amst.* 2. *p.* 197. *t.* 99.

cretica. 3. S. fruticosa tomentosa, foliis cordato-oblongis obtusis petiolatis, ramis divaricatis, spicis verticillatis.

syriaca. 4. S. fruticosa tomentoso-lanata, foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 40.

perfoliata. 5. S. herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus amplexicaulibus. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 86.

montana. 6. S. herbacea, calicibus corolla majoribus spinosis: labio superiori trifido. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 434.

elegans. 7. S. herbacea villosa, caule diffuse, calicum laciniis subaequalibus spinulosis. *Murray comm. Goett.* 1778. *p.* 92. *t.* 4.

romana. 8. S. herbacea decumbens, calicibus spinosis: labio superiori ovato. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 12. *f.* 5.

** *bracteatae.*

incana. 9. S. suffruticosa tomentosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis: floralibus bracteisque dentatis. *Bocc. mus.* 2. *t.* 67. *f.* 2.

hyssopifolia. 10. S. foliis lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calicibus aequalibus.

scordioides. 11. S. foliis laneeolatis subdentatis supra glabris, bracteis ovatis dentato-spinosis, calicibus aequalibus. *Lob. ic.* 528.

hirſuta. 12. S. foliis lanceolatis obtuſis dentatis piloſis, bracteis dentato-ſpinoſis, caulibus hirtis decumbentibus. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 58.

ſpinoſa. 15. S. hirſuta, foliis lanceolatis bracteisque cordatis dentato-ſpinoſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 41.

ciliata. 13. S. herbacea, foliis ovatis ſerratis, bracteis ciliatis. *Thunb. flor. jap. p.* 245.

lanata. 14. S. erecta, foliis cordatis obtuſis villoſis, ſpica oblonga, calicibus muticis lanatis.

713. MENTHA. *Cor.* ſubaequalis, 4fida: lacinia latiore emarginata. *Stamina* erecta, diſtantia.

* *floribus paniculatis.*

plumoſa. 1. M. paniculis dichotomis terminalibus: calicibus plumoſis, foliis ovatis petiolatis ſerratis ſubtus albo-tomentoſis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 273. *Herit. ſert. angl. p.* 20. *t.* 22.

origanifolia. 2. M. paniculis dichotomis: calicibus plumoſis, foliis ovatis integerrimis ſubtus candidiſſimis. *Herit. ſert. angl. p.* 20.

** *floribus racemoſis.*

perilloides. 3. M. racemis ſecundis lateralibus. *Sp. pl. p.* 833. Ocymum fruteſcens. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 77.

*** *floribus ſpicatis.*

Auricularia. 4. M. ſpicis oblongis, foliis oblongis ſerratis piloſis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Mant. p.* 81. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 16.

niliaca. 5. M. ſpicis oblongis, foliis ovatis ſerratis villoſis ſeſſilibus. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 87.

ſylveſtris. 6. M. ſpicis oblongis, foliis oblongis ſerratis tomentoſis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Flor. dan. t.* 484.

viridis. 7. M. ſpicis oblongis, foliis lanceolatis nudis ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Regn. bot. t.* 166.

rotundifolia. 8. M. ſpicis oblongis, foliis ſubrotundis rugoſis crenatis ſeſſilibus.

9. M.

dubia. 9. M. floribus ſpicato-capitatis: ſtaminibus corolla brevioribus, foliis hirſutis acuminatis ſerratis ovato-lanceolatis. *Villars pl. Delph.* 2. *p.* 358. *n.* 4.

**** *floribus capitatis.*

criſpa. 10. M. foliis cordatis dentatis undulatis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla duplo longioribus. *Rivin. monop. t.* 50.

hirſuta. 11. M. foliis ovatis ſerratis ſubſeſſilibus pubeſcentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Mant. p.* 81. *β) Raj. ſt. angl.* 3. *t.* 10. *f.* 1.

aquatica. 12. M. foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Flor. dan. t.* 673.

piperita. 13. M. foliis ovatis petiolatis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Knigge de menth. piper. diſſ. ic. Jungh. pl. off ic. t.* 10.

punctata. 14. M. pedunculis dichotomis, foliis ovatis dentatis glabris punctulatis. *Herit. ſert. angl. p.* 20. *t.* 23.

canarienſis. 15. M. pedunculis dichotomis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis ovatis crenatis ſubtus villoſis, caule arboreſcente. *Pluckn. alm. t.* 317. *f.* 2.

***** *floribus verticillatis.*

ſativa. 16. M. foliis ovatis acutiuſculis ſerratis, ſtaminibus corolla longioribus. *Flor. dan. t.* 794.

gentilis. 17. M. foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Flor. dan. t.* 736.

arvenſis. 18. M. foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam aequantibus. *Flor. dan. t.* 512.

Pulegium. 19. M. foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Blackw. herb. t.* 302.

auſtriaca. 20. M. foliis ſubovatis villoſis, corollae laciniis omnibus obtuſis ſtamina ſuperantibus. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 430.

exigua. 21. M. foliis lanceolato-ovatis glabris acutis integerrimis. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 38.

cahirina. 22. M. foliis ovato-lanceolatis acutis ſerratis: ſerraturis deſcendentibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 213.

canadenſis. 23. M. foliis lanceolatis ſerratis petiolatis piloſis, ſtaminibus corollam aequantibus.

cervina. 24. M. foliis linearibus, bracteis palmatis, staminibus corollæ longioribus. *Blackw. herb. t.* 304.

1236. PERILLA. *Calicis* lacinia suprema brevissima. *Stamina* distantia. *Stili* 2 connexi.

ocymoides. 1. PERILLA. *Arduin. spec.* 2. *t.* 13.

714. GLECOMA. *Cal.* 5fidus. *Antherarum* singula paria in formam crucis conniventia.

hederaceum. 1. GLECOMA. *Flor. dan. t.* 789.

716. LAMIUM. *Cor.* labium superius integrum, fornicatum: *labium* inferius obcordatum; faux utrinque dente setaceo.

Orvala. 1. L. foliis cordatis inaequaliter arguteque serratis, corollis fauce inflata, caulibus coloratis. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *t.* 27. *β*) Orvala garganica. *Sp. pl. p.* 807. *Michel. n. pl. gen. t.* 17.

laevigatum. 2. L. foliis cordatis rugosis, caule laevi, calicibus glabris longitudine tubi corollae. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 34.

rugosum. 3. L. foliis cordatis acutis rugosis caulibusque pilosis, verticillis multifloris: faucis dente unico setaceo. *Bocc. mus. p.* 35. *t.* 23.

garganicum. 4. L. foliis cordatis pubescentibus, corollis fauce inflata: tubo recto dente utrinque gemino. *Till. h. pis t.* 34. *f.* 2.

maculatum. 5. L. foliis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. *Col. ecphr.* 1. *t.* 192.

album. 6. L. foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, verticillis viginti floris. *Flor. dan. t.* 594.

bifidum. 10. L. foliis cordatis acuminatis, corollae galea bifida: laciniis divaricatis. *Cyrill. pl. rar. Neap. fasc.* 1. *t.* 7. *an hujus generis?*

7. L.

purpureum. 7. L. foliis cordatis obtusis petiolatis. *Flor. dan. t.* 523.

molle. 8. L. foliis petiolatis subdentatis: inferioribus cordatis; superioribus ovatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 297.

multifidum. 9. L. foliis multipartitis. *Commel. rar. t.* 26.

717. GALEOPSIS. *Cor.* labium superius subcrenatum, fornicatum, inferius trifidum: faux utrinque dente obtusiusculo concavo acuta.

Ladanum. 1. G. verticillis omnibus remotis, calicibus campanulatis pubescentibus: dentibus lineari-setaceis divergentibus longioribus. *Mant. p.* 411.

grandiflora. 2. G. verticillis omnibus remotis, calicibus tubulosis hirsutissimis: dentibus lanceolato-acuminatis brevioribus rectis. *Riv. monop. t.* 24.

Tetrahit. 3. G. verticillis summis subcontiguis, calicibus ventricosis: dentibus longissimis setaceis aequalibus. *Mant. p.* 411. *Riv. monop. t.* 44.

cannabina. 4. G. verticillis summis subcontiguis, calicibus tubulosis: dentibus brevioribus linearibus inaequalibus; tribus majoribus. *Rivin. monop. t.* 45.

POLLICHIA. *Corollae* labium superius integrum, fornicatum; faux absque dentibus.

Galeobdolon. 1. P. calicibus pungentibus, corollae labio inferiore trifido, foliis omnibus cordatis dentatis petiolatis. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 394. Galeopsis Galeobdolon. *Knorr del. hort.* 1. *t.* N. 9. *n.* 1.

amplexicaulis. 2. P. calicibus inermibus, corollae labio inferiore bifido, foliis caulinis sessilibus rotundatis incisis: radicalibus petiolatis cordato-lobatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 393. Lamium amplexicaule. *Flor. dan. t.* 752.

718. BETONICA. *Cal.* aristatus. *Corollae* labium superius erectum planum: tubus cylindricus.

officinalis. 1. B. spica interrupta: corollae galea integra; labii lacinia intermedia emarginata, calicibus glabriusculis. *Flor. dan. t.* 726.

incana. 2. B. spica interrupta: corollae galea bifida; labii lacinia intermedia crenata, tubo tomentoso incurvo. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 299.

stricta. 3. B. spica oblonga: corollae galea integra; labii lacinia intermedia crenato-undulata calicibus pilosis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 299.

orientalis. 4. B. spica integra: corollae labii lacinia intermedia integerrima.

alopecuros. 5. B. spica basi foliosa: corollae galea bifida. *Jacq. stor. austr.* 1. *t.* 78.

hirsuta. 6. B. spica basi foliosa: corollis galea integra. *Mant. p.* 248. *Murr. comm. Goett.* 1779. 2. *p.* 13. *t.* 3.

heraclea. 7. B. calicibus lanatis: dentibus filiformibus, foliis lanceolatis nudis. *Mant. p.* 83.

719. STACHYS. *Corollae* labium superius fornicatum; inferius lateribus reflexum: lacinia intermedia majore emarginata. *Stamina* deflorata versus latera reflexa.

spinosa. 1. St. ramulis spina terminatis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 10. *f.* 9.

glutinosa. 2. St. ramis ramosissimis, foliis lanceolatis glabris.

patens. 3. St. ramosissima, ramis filiformibus patentibus, foliis lanceolatis serratis glabris, floribus subverticillatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 88.

maritima. 4. St. foliis cordatis obtusis tomentosis crenatis, bracteis oblongis integerrimis. *Mant. p.* 82. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 70.

palaestina. 5. St. floribus subspicatis, foliis lanceolatis sessilibus tomentosis rugosis integerrimis, calicibus muticis. *Sp. pl. p.* 1674. *Bocc. mus.* 2. *t.* 109. 112.

6. St.

orientalis. 6. St. foliis tomentosis ovato-lanceolatis: floralibus verticillo brevioribus.

recta. 7. St. verticillis subspicatis, foliis cordato-ellipticis crenatis scabris, caulibus adscendentibus. *Mant. p.* 82. *Jacq. fl. austr.* 4. *t.* 359.

aethiopica. 8. St. verticillis bifloris. *Mant. p.* 82. *Pluckn. alm. t.* 315. *f.* 3.

palustris. 9. St. verticillis subsexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus sessilibus. *Curt. flor. Lond. t.* 208.

lavandulifolia. 24. St. verticillis sexfloris hirsutissimis, foliis lanceolatis integerrimis lineatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 42.

sylvatica. 10. St. verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Curt. flor. Lond. t.* 283.

arvensis. 11. St. verticillis sexfloris, foliis obtusis nudiusculis, corollis longitudine calicis, caule debili. *Curt. flor. Lond. t.* 246.

rugosa. 12. St. verticillis sexfloris, foliis lanceolatis basi attenuatis tomentosis rugosis serratis, calicibus muticis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 303.

annua. 13. St. verticillis sexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis laevibus petiolatis, caule erecto. *Mant. p.* 411. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 360.

hirta. 14. St. verticillis sexfloris, caulibus prostratis, corollae labio superiori bifido divaricato reflexo.

canariensis. 15. St. verticillis sexfloris, foliis cordatis villosis crenatis, caulibus suberectis, calicibus fructiferis campanulato-patentissimis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 48.

circinata. 16. St. verticillis sexfloris, foliis cordato-rotundatis crenatis. *Herit. stirp. nov.* 3. *p.* 51. *t.* 26.

heraclea. 23. St. hirsuta, verticillis decemfloris, foliis atro-virentibus elliptico-lanceolatis. *Allion. flor. pedem. t.* 84. *f.* 1.

cretica. 17. St. verticillis triginta floris, calicibus pungentibus, caule hirto. *Walth. hort. t.* 19.

lanata. 18. St. verticillis multifloris, foliis lanatis suberenulatis, caulibus basi procumbentibus radicantibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 59.

intermedia. 19. St. verticillis multifloris, calicibus subpungentibus, foliis oblongis subcordatis crenatis, caule sublanato. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 301.

germanica. 20. St. verticillis multifloris, foliorum ſerraturis imbricatis, caule lanato. *Flor. dan. t.* 684. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 319.

alpina. 21. St. verticillis multifloris, foliorum ſerraturis apice cartilagineis, corollis labio plano. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 41.

latifolia. 22. St. verticillis multifloris ſubſpicatis: galea bifida; laciniis acutis, foliis latis cordatis rugoſis piloſis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 303.

720. BALLOTA. *Cal.* hypocrateriformis, 5dentatus, 10ſtriatus. *Cor.* labium ſuperius crenatum, concavum.

nigra. 1. B. foliis cordatis indiviſis ſerratis, calicibus acuminatis. *Blackw. herb. t.* 136.

alba. 2. B. foliis cordatis indiviſis ſerratis, calicibus ſubtruncatis; *an vere diſtincta a nigra?*

ſuaveolens. 3. B. foliis cordatis, pedunculis axillaribus ſolitariis, calicibus truncatis: ariſtis linearibus. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 42.

lanata. 4. B. foliis palmatis dentatis, caule lanato. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 42.

diſticha. 5. B. verticillis dimidiatis bipartitis ſemiſpicatis. *Mant. p.* 83. *Burm. zeyl. t.* 71. *f.* 1.

721. MARRUBIUM. *Cal.* hypocrateriformis, rigidus, 10ſtriatus. *Cor.* labium ſuperius 2fidum, lineare, rectum.

* *calicibus* 5*dentatis.*

Alyſſon. 1. M. foliis cuneiformibus quinquedentatis plicatis, verticillis involucro deſtitutis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 10. *f.* 12.

plicatum. 2. M. foliis ſemiorbiculatis tomentoſis rugoſis plicato-lobatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 213.

peregrinum. 3. M. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, calicum denticulis ſetaceis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 160.

candidiſſimum. 4. M. foliis ſubovatis lanatis ſuperne emarginato-crenatis, calicum denticulis ſubulatis. *Dill. h. Elth. t.* 174. *f.* 214.

5. M.

astracanicum. 5. M. foliis ovatis crenatis tomentosis rugosissimis, calicum dentibus subulatis, corollae laciniis superioribus acutis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 7.

indicum. 13. M. foliis cordatis serratis, calicibus villosis: dentibus subulatis. *Burm. th. zeyl. t.* 71. *f.* 1.

supinum. 6. M. calicum dentibus setaceis rectis villosis. *Barr. pl. rar. ic.* 685. 686.

** *calicibus* 10*dentatis.*

africanum. 7. M. foliis cordatis subrotundis emarginato-crenatis. *Pluckn. alm. t.* 306. *f.* 2.

crispum. 8. M. foliis cordatis subrotundis crenato-subdentatis, calicibus muticis. *Sp. pl. p.* 1674. *Herm. par. Lugdb. t.* 200.

vulgare. 9. M. calicum dentibus setaceis uncinatis. *Blackw. herb. t.* 479.

hispanicum. 10. M. calicum limbis patentibus: denticulis acutis. *Herm. par. Lugdb. t.* 201.

Pseudodictamnus. 11. M. calicum limbis planis villosis, foliis cordatis concavis, caule fruticoso. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 47.

acetabulosum. 12. M. calicum limbis tubo longioribus membranaceis: angulis majoribus rotundatis. *Barr. pl. rar. ic.* 129.

722. LEONURUS. *Antherae* punctis nitidis adspersae.

crispus. 1. L. foliis omnibus acute serratis rugosissimis margine inaequaliter reflexis: caulinis quinquelobis. *Murray comm. Goett.* 1777. *p.* 44. *t.* 4.

Cardiaca. 2. L. foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Flor. dan. t.* 727.

sibiricus. 3. L. foliis tripartitis multifidis linearibus obtusiusculis. *Amm. ruth. t.* 8. *an varietas tatarici?*

tataricus. 4. L. foliis tripartitis laciniatis, calicibus villosis. *Mill. h. angl. t.* 80.

Marrubiastrum. 5. L. foliis ovatis lanceolatisque serratis, calicibus sessilibus spinosis. *Mant. p.* 412. *Jacq. flor. austr.* 5., *t.* 405.

723. PHLOMIS. *Cal.* angulatus. *Cor.* labium superius incumbens, compressum, villosum.

* *floribus nudis.*

Nissolii. 1. Phl. foliis radicalibus cordato-sagittatis utrinque tomentosis villosis. *Mill. h. angl. t.* 204.

sinensis. 2. Phl. foliis ovatis serratis tomentoso-sericeis, calicibus verticillatis decemdentatis. *Bladh. apud Retz. obs. bot.* 2. *p.* 19.

laciniata. 3. Phl. foliis alternatim pinnatis: foliolis lanceolatis, calicibus lanatis.

** *floribus involucratis.*

Lychnitis. 4. Phl. foliis lanceolatis tomentosis: floralibus ovatis, involucris setaceis lanatis. *Mill. h. angl. t.* 203.

zeylanica. 5. Phl. foliis lanceolatis subserratis, capitulis terminalibus, calicibus octodentatis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 16. *f.* 1. *β)* Leonurus indicus. *Sp. pl. p.* 817.

Leonurus. 6. Phl. foliis lanceolatis serratis, calicibus decagonis decemdentatis muticis, caule fruticoso. *Mant. p.* 412. *Knorr del. hort.* 2. *t.* L.

caribaea. 7. Phl. foliis ovato-lanceolatis oppositis serratis petiolatis villosis, verticillis axillaribus multifloris, involucris hirsutis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 154.

alba. 8. Phl. ovatis serratis villosis, calicibus quinquedentatis obliquis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 107.

glabrata. 19. Phl. foliis ovatis serratis, calicibus labio inferiore producto tridentato, ramis reverse pilosis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 42.

moluccoides. 20. Phl. foliis ovatis, involucris setaceis, calicis labio inferiore magno rotundato membranaceo. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 107. Clinopodium fruticosum.

Leonotis. 9. Phl. foliis ovatis obtusis subtomentosis crenatis, calicibus septemdentatis aristatis, caule fruticoso. *Mant. p.* 83. *Mill. h. angl. t.* 162.

indica. 10. Phl. foliis ovatis pilosis, involucris linearibus, calicibus unilabiatis obliquis.

11. Phl.

Samia. 11. Phl. foliis ovatis ſubtus tomentoſis, involucris ſubulatis ſtrictis tripartitis.

Herbaventi. 12. Phl. foliis ovato-oblongis ſcabris, involucris ſetaceis hiſpidis, caule herbaceo. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 17.

martinicenſis. 13. Phl. foliis ovato-oblongis villoſis, involucris ſetaceis, verticillis ſubgloboſis, calicibus recurvis: laciniis ſuperioribus ſubulatis longiſſimis. *Jacq. ſtirp. amer. p.* 160. *t.* 177. *f.* 75.

alpina. 14. Phl. foliis cordatis ſerratis: floralibus lanceolatis trinerviis, involucris ſetaceis villoſis. *Pallas nov. comm. Petrop.* 1779. 2. *p.* 265. *t.* 13.

nepetifolia. 15. Phl. foliis cordatis acutis ſerratis ſubtomentoſis, calicibus ſex-vel octodentatis: dente ſupremo infimoque majori, caule herbaceo. *Suppl. p.* 274. *Herm. par. Lugdb. t.* 117.

tuberoſa. 16. Phl. foliis cordatis ſcabris, involucris hiſpidis ſubulatis, caule herbaceo. *Buxb. cent.* 1. *t.* 6. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 9.

purpurea. 17. Phl. foliis cordatis oblongis tomentoſis, involucris linearibus obtuſis calice brevioribus, caule ſuffruticoſo. *Pluckn. alm. t.* 57. *f.* 6.

fruticoſa. 18. Phl. foliis ſubrotundis tomentoſis crenatis, involucris lanceolatis, caule fruticoſo. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 15. *β) Dill. h. Elth. t.* 237. *f.* 306.

724. MOLUCCELLA. *Cal.* ampliatus, corolla latior, ſpinoſus. *Sem.* 3quetra.

laevis. 1. M. calicibus campanulatis ſubquinquedentatis: denticulis aequalibus. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 45. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 10.

ſpinoſa. 2. M. calicibus ringentibus octodentatis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 46.

frutescens. 3. M. calicibus infundibuliformibus quinquefidis, corollis calice longioribus. *Burm. ind. t.* 38. *f.* 2.

tuberoſa. 4. M. calicibus infundibuliformibus patentiſſimis ſexdentatis corolla duplo brevioribus. *Pallas it.* 3. *p.* 738. *t.* T. *f.* 1-3.

725. CLINOPODIUM. *Stamina* curvata: *antheris* conniventibus.

vulgare. 1. Cl. capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 65. *β*) *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 66. *γ*) *Mill. ic. t.* 95.

rugoſum. 2. Cl. capitulis axillaribus pedunculatis explanatis radiatis, foliis rugoſis. *Pluckn. phyt. t.* 222. *f.* 7.

incanum. 3. Cl. foliis ſubtus tomentoſis, verticillis explanatis, bracteis lanceolatis. *Pluckn. mant. t.* 344. *f.* 7.

martinicenſe. 4. Cl. foliis ovato-oblongis baſi attenuatis, verticillis globoſis: bracteis ſetaceis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 45.

726. ORIGANUM. *Strobilus* 4gonus, ſpicatus, calices colligens.

aegyptiacum. 1. O. foliis carnoſis tomentoſis, ſpicis nudis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f. ult.*

Dictamnus. 2. O. foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus. *Blackw. herb. t.* 462.

ſipyleum. 3. O. foliis omnibus glabris, ſpicis nutantibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 4. *f.* 2.

creticum. 4. O. ſpicis aggregatis longis prismaticis rectis: bracteis membranaceis calice duplo longioribus.

bengalenſe. 15. O. foliis ovatis dentatis, ſpicis imbricatis lanuginoſis: bracteis ovatis. *Burm. ind. t.* 38. *f.* 3.

ſmyrnaeum. 5. O. foliis ovatis acutis ſerratis, ſpicis congeſtis umbellatim faſtigiatis.

Tournefortii. 6. O. ſpicis tetragonis: bracteis ſubrotundis maximis. *Tournef. it.* 1. *p.* 240. *ic.*

heracleoticum. 7. O. ſpicis longis pedunculatis aggregatis: bracteis longitudine calicum. *Lob. ic.* 492.

vulgare. 8. O. ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis: bracteis calice longioribus ovatis. *Flor. dan. t.* 638.

Onites. 9. O. ſpicis oblongis aggregatis hirſutis, foliis cordatis tomentoſis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 38.

ſyriacum. 10. O. ſpicis longis ternatis pedunculatis villoſis, foliis ovatis villoſis. *Lob. ic.* 499.

11. O.

Maru. 11. O. ſpicis hirſutis, foliis ovatis tomentoſis ſeſſilibus. *Alp. exot. t.* 288.

Majorana. 12. O. foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. *Zorn pl. med. ic. t.* 41. *β) Sabb. h. rom.* 3. *t.* 78.

clinopodioides. 13. O. capitulis rotundatis verticillatis terminalibusque, floribus ſeſſilibus, foliis cordato-ovatis ſubpetiolatis glabris. *Walt. flor. carol. p.* 165.

flexuoſum. 14. O. capitulis axillaribus: floribus ſeſſilibus, caule flexuoſo, foliis ſublinearibus. *Walt. flor. carol. p.* 165. *an diſtincta hujus generis ſpecies?*

727. THYMUS. *Cal* 2labiatus: faux villis clauſa.

Serpyllum. 1. Th. floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Zorn pl. med. ic. t.* 17. *β) Sabb. h. rom.* 3. *t.* 69.

cephalotus. 2. Th. capitulis imbricatis magnis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis. *Barr. pl. rar. ic.* 787.

villoſus. 3. Th. capitulis imbricatis magnis, bracteis dentatis, foliis ſetaceis piloſis.

virginicus. 4. Th. capitulis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 389. Satureja virginiana. *Pluckn. alm. t.* 54. *f.* 2.

numidicus. 5. Th. floribus capitato-ſpicatis hirſutis, foliis linearibus glabris integerrimis, bracteis baſi latiuſculis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 187.

vulgaris. 6. Th. erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-ſpicatis. *Blackw. herb. t.* 211. *β) Sabb. h. rom.* 3. *t.* 68.

Zygis. 7. Th. floribus verticillato-ſpicatis, caule ſuffruticoſo erecto, foliis linearibus baſi ciliatis. *Barr. pl. rar. ic.* 777.

Acinos. 8. Th. floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. *Balliard herb. Franc. t.* 318.

Maſtichina. 9. Th. floribus verticillatis: calicibus lanuginoſis; dentibus ſetaceis villoſis. *Mant. p.* 413. *Blackw. herb. t.* 134.

Tragoriganum. 10. Th. floribus verticillatis, caule fruticoſo erecto, foliis hiſpidis acuminatis. *Mant. p.* 84. *Alp. exot. t.* 78.

16. Th.

indicus. 16. Th. ſpicis verticillato-interruptis, caulibus erectis. *Burm. ind.*

pannonicus. 17. Th. verticillis ad apicem ramorum congeſtis, foliis ovatis cauleque hirſutis. *Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 267.

alpinus. 11. Th. verticillis ſexfloris, foliis obtuſiuſculis concavis ſubſerratis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 97.

Piperella. 12. Th. pedunculis multifloris lateralibus, foliis ovatis obtuſis glabris nervoſis integerrimis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 694.

Brownei. 13. Th. floribus pedunculatis axillaribus, foliis orbiculatis crenatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 89.

imbricatus. 14. Th. floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus, caulibus decumbentibus imbricatis, foliis ovatis acutis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 108.

filiformis. 15. Th. floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis, foliis cordatis acutis integerrimis petiolatis, caulibus filiformibus decumbentibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 313.

728. MELISSA. *Cal.* aridus, angulatus: labio ſuperiori reflexo-patente. *Cor.* labium ſuperius ſubfornicatum, 2fidum; inferius lobo medio cordato.

Nepeta. 1. M. pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule adſcendente hirſuto. *Giſeck. ic. faſc.* 1. *n.* 14. *β*) *Riv. monop. t.* 47. *Faux villis clauſa; an thymus?*

grandiflora. 2. M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. *Beſl. h. Eyſt. aeſt.* 7. *t.* 7. *f.* 1.

Calamintha. 3. M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Blackw. herb. t.* 166.

officinalis. 4. M. racemis axillaribus verticillatis: pedicellis ſimplicibus. *Blackw. herb. t.* 27.

cretica. 5. M. racemis terminalibus: pedunculis ſolitariis breviſſimis. *Barr. rar. pl. ic.* 1166.

fruticoſa. 6. M. ramis attenuatis virgatis, foliis ſubtus tomentoſis, caule fruticoſo.

729. DRACOCEPHALUM. *Cor.* faux inflata: labium ſuperius fornicatum.

* *floribus ſpicatis.*

virginianum. 1. Dr. foliis lineari-lanceolatis ſerratis, floribus confertis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 26.

denticulatum. 2. Dr. foliis obovato-lanceolatis ſuperne denticulatis, floribus remotis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 317.

canarienſe. 3. Dr. foliis compoſitis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 27.

pinnatum. 4. Dr. foliis cordatis pinnato-ſinuatis. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 52.

Ruyſchiana. 5. Dr. foliis bracteisque lanceolatis indiviſis muticis. *Flor. dan. t.* 121.

auſtriacum. 6. Dr. foliis bracteisque linearibus partitis ſpinoſis.

peregrinum. 7. Dr. floribus ſubſpicatis, foliis caulinis ovato-oblongis inciſis, bracteis lineari-lanceolatis denticulato-ſpinoſis.

** *floribus verticillatis.*

ſibiricum. 8. Dr. floribus ſubverticillatis: peduncuſis bifidis ſecundis, foliis cordato-oblongis acuminatis nudis. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 51.

Moldavica. 9. Dr. bracteis lanceolatis: ſerraturis capillaceis. *Blackw. herb. t.* 551.

caneſcens. 10. Dr. bracteis oblongis: ſerraturis ſpinoſis, foliis ſubtomentoſis. *Mill. h. angl. t.* 129.

peltatum. 11. Dr. bracteis orbiculatis ſerrato-ciliatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 38.

grandiflorum. 12. Dr. foliis crenatis: radicalibus cordatis; caulinis orbiculatis ſeſſilibus, bracteis acuminato-dentatis. *Suppl. p.* 274. *Laxmann act. Petrop.* 1770. *t.* 29. *f.* 3.

nutans. 13. Dr. bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis majuſculis nutantibus. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 49.

thymiflorum. 14. Dr. bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calice majoribus. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 50. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 8.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN.

730. HORMINUM. *Cal.* campanulatus: laciniis 4 subaequalibus; 5ta majore emarginata. *Corollae* labium superius concavum.

pyrenaicum. 1. HORMINUM. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 183.

731. MELITTIS. *Cal.* tubo corollae amplior. *Cor.* labium superius erectum integrum; inferius trifidum. *Antherae* cruciatae.

Melissophyllum. 1. MELITTIS. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 26.

732. OCYMUM. *Cal.* labio superiore rotundato, inferiore 4fido. *Cor.* resupinatae alterum labium 4fidum, alterum indivisum. *Filamenta* exteriora basi processum emittentia.

thyrsiflorum. 1. O. floribus paniculato-fasciculatis, caule ramosissimo. *Mant. p.* 84. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 72.

inflexum. 2. O. panicula terminali racemosa, caule ramisque flexuosis. *Thunb. flor. jap. p.* 249.

inodorum. 33. O. racemis paniculatis, foliis ovalibus denticulatis. *Burm. th. zeyl. t.* 80. *f.* 2.

rugosum. 3. O. racemis terminalibus, foliis ovatis acutis serratis subtus rugosis. *Thunb. flor. jap. p.* 249.

crispum. 4. O. racemis terminalibus, foliis ovatis serratis crispis, calicibus hispidis. *Thunb. flor. jap. p.* 248.

serpyllifolium. 5. O. racemis terminalibus, foliis oblongo-cuneatis acutiusculis complicatis subtus scabris. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 110.

acutum. 6. O. racemis filiformibus, foliis ovatis acuminatis serratis, bracteis hirtis. *Thunb. flor. jap. p.* 248.

34. O.

Plectanthrus. 34. O. racemis erectis: pedicellis ramosis; nectario gibbo, foliis cordato-ovatis acuminatis serratis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 43.

satellarioides. 7. O. racemis erectis, pedicellis ramosis, corollis falcatis. *Mant. p.* 84. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 101.

polystachyon. 8. O. racemis aphyllis apice nutantibus: corollis quadrifidis. *Mant. p.* 567. *Murray comm. Goett.* 1772. *t.* 3.

punctulatum. 9. O. racemis simplicibus erectis, foliis ovatis subtus punctatis. *Thunb. flor. jap. p.* 249.

gratissimum. 10. O. racemis teretibus, caule suffruticoso, foliis lanceolato-ovatis. *Mant. p.* 414. *Burm. zeyl. t.* 80. *f.* 1.

americanum. 11. O. racemis teretibus, caule subherbaceo, foliis sublanceolatis acuminatis subserratis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 86.

hadiense. 12. O. racemis aphyllis: nectario gibbo, caule aequali. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 109.

virgatum. 13. O. racemis verticillatis virgatis, foliis oblongis serratis. *Thunb. flor. jap. p.* 250.

verticillatum. 14. O. racemo elongato nudo: floribus verticillato-quaternis pedunculatis, foliis ovatis obtusis. *Suppl. p.* 276.

album. 15. O. racemorum verticillis approximatis: nubilibus tetragonis, corollis crenatis, foliis ovatis obtusis. *Mant. p.* 85.

Zatarhendi. 16. O. racemis bracteatis, nectario gibboso, foliis ovatis carnosis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 109. *an cum Plectanthro et hadiensi distincti generis?*

filamentosum. 17. O. foliis ovatis serratis, genitalibus longissimis, caule fruticoso. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 108. *Herit. stirp. nov.* 4. *t.* 43.

prostratum. 18. O. caulibus prostratis, foliis ellipticis lineatis. *Mant. p.* 566.

punctatum. 19. O. caule herbaceo hirto, floribus spicatis, nectario gibboso. *Suppl. p.* 275. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 87. *t.* 42.

fruticosum. 20. O. caule fruticoso laevigato, racemis compositis, pedunculis tripartitis, nectario calcarato. *Herit. stirp. nov.* 4. *p.* 85. *t.* 41. *an cum punctato distinctum genus constituit?*

tenuiflorum. 21. O. spicis filiformibus, bracteis cordatis reflexis concavis, foliis ovato-oblongis serratis. *Burm. zeyl. t.* 70. *f.* 2.

capitella- tum. 22. O. floribus aggregatis, foliis ovatis; petiolis lateralibus. *Suppl. p.* 276.

monacho- rum. 23. O. ſtaminibus edentulis: alternis baſi barbatis. *Mant. p.* 85.

Baſilicum. 24. O. foliis ovatis glabris, calicibus ciliatis. *Blackw. herb. t.* 104.

ſalinum. 25. O. foliis ovatis glabris, caule geniculato. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 116.

minimum. 26. O. foliis ovatis integerrimis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 85.

menthoi- des. 27. O. foliis lineari-lanceolatis ſerratis.

ſanctum. 28. O. foliis oblongiuſculis obtuſis ſerratis undulatis, caule hirto, bracteis cordatis. *Mant. p.* 85.

Vaalae. 29. O. caule tetragono brachiato, calicibus piloſis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 111.

holoſeri- ceum. 30. O. foliis ovato-acuminatis tomentoſis undulatis mollibus, calicis labio inferiore quinquedentato ſemina tegente, bracteis perſiſtentibus. *Medic. act. palat.* 4. *phyſ. p.* 199. *t.* 7.

molle. 31. O. foliis ovatis cordatis acutis ſerratis rugoſis: ſinubus clauſis, bracteis ſubrotundo-cuneiformibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 322.

zeylani- cum. 32. O. foliis ellipticis planis nudis nitidis duris, calicis labio inferiore quinquedentato ſemina tegente, bracteis deciduis. *Medic. act. palat.* 4. *phyſ. p.* 197. *t.* 6.

733. TRICHOSTEMA. *Cor.* labium ſuperius falcatum. *Stamina* longiſſima.

dichoto- mum. 1. Tr. ſtaminibus longiſſimis exſertis, foliis lanceolatis.

lineare. 2. Tr. ſtaminibus exſertis, foliis linearibus. *Walt. flor. Carol. p.* 164.

brachia- tum. 3. Tr. ſtaminibus brevibus incluſis. *Dill. h. Elth. t.* 285. *f.* 369.

734. SCUTELLARIA. *Calix* ore subintegro: post floreſcentiam clauſo, operculato.

orientalis. 1. Sc. foliis inciſis ſubtus tomentoſis, ſpicis rotundato-tetragonis. *Tournef. it.* 3. *t.* 306.

albida. 2. Sc. foliis ſubcordatis ſerratis rugoſis opacis, ſpicis ſecundis: bracteis ovatis. *Mant. p.* 248. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 29.

peregrina. 3. Sc. foliis ſubcordatis ſerratis, ſpicis elongatis ſecundis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 189.

Columnae. 18. Sc. villoſa, foliis cordatis, caule erecto brachiato, floribus racemoſis internodio longioribus. *Allion. flor. pedem. t.* 84. *f.* 2.

lupulina. 4. Sc. foliis cordatis inciſo-ſerratis acutis glabris, ſpicis imbricatis rotundato-tetragonis.

alpina. 5. Sc. foliis cordatis inciſo-ſerratis crenatis, ſpicis imbricatis rotundato-tetragonis. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 87.

cretica. 6. Sc. villoſa, foliis cordatis obtuſis obtuſeque ſerratis, ſpicis imbricatis: bracteis ſetaceis.

altiſſima. 7. Sc. foliis cordato-oblongis acuminatis ſerratis, ſpicis ſubnudis.

purpuraſcens. 8. Sc. foliis cordato-ovatis dentatis petiolatis, racemis nudis terminalibus, corollae labio utroque trifido. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 89.

havanenſis. 9. Sc. foliis cordato-ovatis crenatis, floribus ſolitariis axillaribus, corollae labio utroque trifido. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 165.

minor. 10. Sc. foliis cordato-ovatis ſubintegerrimis, floribus axillaribus. *Curt. flor. Lond. t.* 283.

carolinia-na. 11. Sc. foliis cordato-ovatis obtuſe ſerratis, ſpicis terminalibus ſubhirſutis. *Walt. flor. carol. p.* 163.

galericulata. 12. Sc. foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Flor. dan. t.* 637.

lateriflora. 13. Sc. foliis cordato-lanceolatis laevibus carina ſcabris, racemis lateralibus foliоſis.

hyſſopifolia. 14. Sc. foliis lanceolatis. *Mant. p.* 414.

ovata. 19. Sc. foliis ovatis, floribus axillaribus. *Hill. hort. Kew. t.* 8.

haſtifolia. 15. Sc. foliis integerrimis: inferioribus haſtatis; ſuperioribus ſagittatis. *Riv. monop. t.* 77.

integrifolia. 16. Sc. foliis ſeſſilibus ovatis: inferioribus obſolete ſerratis; ſuperioribus integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 313. *f* 4.

indica. 17. Sc. foliis ſubovatis crenatis petiolatis, racemis nudiuſculis. *Pluckn. amalth. t.* 441. *f.* 1.

GLANDULARIA. *Cal.* tubulatus: ore obliquo 5fido, ſeraceo. *Germ.* 4partitum. *Stigma* 2fidum: glandula inter binas lacinias.

carolinienſis. 1. GLANDULARIA. *Walt. flor. carol. p.* 164.

735. PRUNELLA. *Filamenta* 2furca: altero apice antherifera. *Stigma* 2fidum.

indica. 7. Pr. foliis oblongis ſuperne crenatis, ſpicis capitatis: bracteis ciliatis. *Burm. ind.*

vulgaris. 1. Pr. foliis omnibus ovato-oblongis ſerratis petiolatis, calicibus labio ſuperiore truncato ſubtridentato. *Blackw. herb. t.* 24.

grandiflora. 2. Pr. foliis omnibus ovato-oblongis ſubſerratis, calicis labio ſuperiore profunde trilobo. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 377.

intermedia. 3. Pr. foliis inferioribus ſinuato-dentatis: ſuperioribus integris dentatis, calicibus ſummis coloratis. *Linck. Ann. Naturg.* 1. *p.* 32.

laciniata. 4. Pr. foliis ovato-oblongis petiolatis: inferioribus ſinuato-dentatis: ſupremis laciniatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 378.

hyſſopifolia. 5. Pr. foliis lanceolatis integerrimis ſeſſilibus, caule erecto baſi procumbente. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 7.

parviflora. 6. Pr. foliis petiolatis ovato-lanceolatis ſubdentatis, ſpica ſeſſili: floribus vix bracteas ſuperantibus. *Poir. voy. en Barbar.* 2. *p.* 188.

736. CLEONIA. *Filamenta* 2furca: apice altero antherifera. *Stigmata* 4.

lusitanica. 1. CLEONIA. *Mant. p.* 414. *Mill. h. angl. t.* 70. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 7.

737. PRASIUM. *Sem.* epidermide molli baccata.

majus. 1. Pr. foliis ovato-oblongis serratis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 37. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 12.

minus. 2. Pr. foliis ovatis: crena utrinque duplici.

coccineum. 3. Pr. foliis subovatis. *Walt. flor. carol. p.* 166.

purpureum. 4. Pr. foliis lanceolatis sessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 166.

incarnatum. 5. Pr. foliis subamplexicaulibus lanceolato-oblongis *Walt. flor. carol. p.* 165.

738. PHRYMA. *Semen* 1, calice tectum.

Leptostachyon. 1. Phr. foliis ovatis serratis petiolatis, calice monophyllo quinquefido. *Suppl. p.* 277. *Pluckn. amalth. t.* 380. *f.* 5. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. *t.* 75. *f.* 10.

carolinicnle. 2. Phr. foliis sessilibus obovato-oblongis serratis. *Walt. flor. carol. p.* 166.

ANGIOSPERMIA.

1408. CASTILLEJA. *Cal.* 1phyllus tubulosus; anterius longitudinaliter fissus. *Cor.* ringens: Labium inferius glandulis 2. *Capsl.* 2locularis: dissepimento contrario.

fissifolia. 1. C. foliis apice pinnato-incisis. *Suppl. p.* 293. *Mutis amer.* 1. *t.* 11. *Smith plant. ic. ined. fasc.* 2. *t.* 40.

integrifolia. 2. C. foliis lineari-lanceolatis integris. *Mutis amer.* 1. *t.* 12. *Smith plant. ic. ined. fasc.* 2. *t.* 39.

TALIGALEA. *Cal.* 1phyllus, 4-5dentatus. *Cor.* infundibuliformis: tubo longo 5angulari. *Antherae* basi 2fidae. *Stigm.* 2. *Bacca* 1locularis, 2-pyrena: officulis 1spermis.

campestris. 1. TALIGALEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 625. *t.* 252. *utrum distincti generis, an Amasoniae species?*

739. BARTSIA. *Cal.* 2lobus, emarginatus, apice coloratus. *Cor.* calice minus colorata; labio superiore longiore. *Caps.* 2locularis.

coccinea. 1. B. foliis alternis linearibus utrinque bidentatis. *Pluckn. alm. t.* 102. *f.* 5.

pallida. 2. B. foliis alternis lanceolatis integerrimis: floralibus ovatis dentatis. *Gmel. flor. sib.* 3. *t.* 42.

viscosa. 3. B. foliis superioribus alternis serratis, floribus distantibus lateralibus. *Pluckn. alm. t.* 27. *f.* 5.

alpina. 4. B. foliis oppositis cordatis obtuse serratis. *Flor. dan. t.* 43.

Gymnandra. 5. B. diandra, foliis radicalibus binis petiolatis, caule subdiphyllo unispicato: spica lineari obtusa, verticillis bracteatis coarctatis. *Suppl. p.* 278. *Pall. it.* 3. *t.* 4. *f.* 1.

740. RHINANTHUS. *Cal.* 4fidus, inflatus. *Caps.* 2locularis, obtusa, compressa. *Semina* pauca.

orientalis. 1. Rh. corollis labio superiori subulato incurvo. *Tournef. it.* 2. *p.* 299. *ic.*

Elephas. 2. Rh. corollis labio superiori subulato recto. *Col. ecphr.* 1. *t.* 188.

Crista galli. 3. Rh. corollis labio superiori compresso breviori, calicibus glabris. *Bulliard herb. Franc. t.* 125. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 1.

4. Rh.

Alectoro-lophus. 4. Rh. corollarum labio superiore compresso breviori: auriculis truncatis, calicibus villosis. *Hall. hist. stirp. helv.* 1. *p.* 137. *n.* 314.

virginicus. 5. Rh. corollis fauce patentibus, foliis sinuato-dentatis.

trifidus. 11. Rh. corollis fauce patentibus, foliis trifidis. *Buxb. cent.* 1. *p.* 5. *t.* 8.

capensis. 6. Rh. calicibus tomentosis bracteis ovatis, foliis lanceolatis dentatis. *Sp. pl. p.* 879. Buchnera africana. *Pluckn. alm. t.* 310. *f.* 3.

Trixago. 7. Rh. calicibus hirsuto-tomentosis, foliis oppositis obtuse serratis, caule simpliciſſimo. *Col. ecphr.* 1. *t.* 197.

indicus. 8. Rh. foliis sublanceolatis pilosis integerrimis. *Burm. ind. t.* 39. *f.* 1. *β*) *Pluckn. alm. t.* 113. *f.* 2.

maximus. 9. Rh. foliis ovato-lanceolatis serratis sessilibus: superioribus alternis, calicibus tubulosis acutis. *La Mark dict. bot. n.* 10.

versicolor. 10. Rh. foliis subcompositis lanceolato-linearibus serratis, serraturis distantibus, calicibus brevibus oppositis. *La Mark dict. bot. n.* 11.

741. EUPHRASIA.

Cal. 4fidus, cylindricus. *Antherae* inferiores altero lobo basi spinosae. *Capſ.* 2locularis, ovato-oblonga. *Semina* pauca deorsum incumbentia.

latifolia. 1. Eu. foliis dentato-palmatis, floribus subcapitatis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 7.

officinalis. 2. Eu. foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Zorn pl. med. ic. t.* 39. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 8.

rubra. 9. Eu. foliis cordato-ovatis acute serratis, calice obtuse dentato, caule ramoso. *Hoffm. bot. Taschenb.* 1791. *p.* 215.

tricuspidata. 3. Eu. foliis linearibus tridentatis. *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 1.

Odontites. 4. Eu. foliis linearibus: omnibus serratis. *Flor. dan. t.* 655.

lutea. 5. Eu. foliis linearibus serratis: superioribus integerrimis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 398.

linifolia. 6. Eu. foliis linearibus: omnibus integerrimis, calicibus glabris. *Col. ecphr.* 2. *t.* 69.

viſcoſa. 7. Eu. foliis linearibus, calicibus glutinoſo-hiſpidis. *Mant. p.* 86. *Garid. aix. t.* 78.

cuneata. 8. Eu. foliis ſubcuneiformibus inciſis. *Forſt. flor. auſtr. p* 43.

742. MELAMPYRUM. *Cal.* 4fidus. *Cor.* labium ſuperius compreſſum: margine replicato. *Capſ.* 2locularis, compreſſa, obliqua, hinc dehiſcens. *Sem.* ſolitaria gibba.

criſtatum. 1. M. ſpicis quadrangularibus: bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis. *Pluckn. alm. t.* 99. *f.* 2.

arvenſe. 2. M. ſpicis conicis laxis: bracteis dentato-ſetaceis coloratis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 8. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 1.

nemoroſum. 3. M. floribus ſecundis lateralibus: bracteis dentatis; ſummis coloratis ſterilibus, calicibus lanatis. *Flor. dan. t.* 305.

pratenſe. 4. M. floribus ſecundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis clauſis. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 1.

ſilvaticum. 5. M. floribus ſecundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Flor. dan. t.* 145.

743. LATHRAEA. *Cal.* 4-5partitus. *Glandula* depreſſa ad angulum alterum germinis. *Capſula* 1locularis: receptaculis fungoſis lateralibus.

Clandeſtina. 1. L. caule ramoſo ſubterreſtri, floribus erectis ſolitariis. *Mona. rif. biſt. pl.* 3. *t.* 16. *f.* 15.

Phelypaea. 2. L. corollis campanulato-patentibus.

Anblatum. 3. L. corollarum labiis indiviſis.

quinquefida. 4. L. caule ſimplici, ſpica undique imbricata, calice corollaque quinquefidis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 111.

5. L.

Squamaria. 5. L. caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiori trifido. *Flor. dan. t.* 136. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 3. *t.* 52. *f.* 3.

744. SCHWALBEA. *Cal.* 4fidus: lacinia superiore minima; infima maxima apice bifida. *Caps.* 2locularis: dissepimento duplicato. *Semina* paleacea.

americana. 1. Schwalbea. *Mant. p.* 414. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 3.

PATTERSONIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* infundibuliformis. *Caps.* 2locularis. *Sem.* in utrisque loculis 4 imbricata.

carolinienfis. 1. Pattersonia. *Walt. flor. carol. p.* 167.

745. TOZZIA. *Cal.* 5dentatus. *Caps.* 1locularis, globosa, 1sperma.

alpina. 1. Tozzia. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 165.

746. PEDICULARIS. *Cal.* 5fidus. *Caps.* 2locularis, mucronata, obliqua. *Semina* tunicata, pauca.

palustris. 1. P. caule ramoso, calicibus cristatis calloso-punctatis, corollis labio obliquis. *Flor. dan. t.* 225.

silvatica. 2. P. caule ramoso, calicibus oblongis angulatis laevibus, corollis labio cordato. *Flor. dan. t.* 225.

rostrata. 3. P. caule declinato subramoso, corollis galea rostrato-acuminatis, calicibus cristatis subhirsutis *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 205.

myriophylla. 4. P. caule subsimplici, foliis quaternis verticillatis pinnatifidis: laciniis crenulatis, calicibus truncato-bilobis. *Pallas it.* 3. *p.* 738. *t.* S. *f.* 2. B.

5. P.

Sceptrum Caroli-num. 5. P. caule ſimplici, floribus terno-verticillatis, corollis clauſis, calicibus criſtatis, capſulis regularibus. *Flor. dan. t.* 26.

verticillata. 6. P. caule ſimplici, foliis quaternis pinnatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 206. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 5.

reſupinata. 7. P. caule ſimplici, foliis lanceolatis ſerratis crenulatis, floribus reſupinatis. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 44.

recutita. 8. P. caule ſimplici, foliis pinnatifidis ſerratis, ſpica folioſa; calicibus coloratis, corollis obtuſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 258.

flava. 9. P. caule ſimplici angulato, foliis bipinnatifidis dentatis, ſpica folioſa, calicibus pentandris quinquedentatis, galeae mucrone truncato-emarginato. *Pall. it.* 3. *p.* 736. *t.* R. *f.* 1. A. B.

triſtis. 10. P. caule ſimplici, corollarum galeis margine villoſis.

flammea. 11. P. caule ſimplici, foliis pinnatis retro imbricatis. *Flor. lapp. t.* 11. *f.* 2.

hirſuta. 12. P. caule ſimplici, foliis dentato-pinnatis linearibus, calicibus hirſutis. *Flor. lapp. t.* 4. *f.* 3.

roſea. 13. P. caule ſimplici, foliis pinnatis: pinnis oblongis pinnatifidis, calicibus hirſutis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 40.

incarnata. 14. P. caule ſimplici, foliis pinnatis ſerratis, calicibus rotundatis glabris, corollis galea uncinata acuta. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 140.

criſtata. 23. P. caule ſimplici, foliis pinnatis obtuſe dentatis, galea roſtrata. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 324.

lapponica. 15. P. caule ſimplici, foliis pinnatifidis ſerratis, calicibus bifidis obtuſis. *Flor. dan. t.* 2.

comoſa. 16. P. caule ſimplici, ſpica folioſa, corollis galea acuta emarginata, calicibus quinquedentatis. *Allion. fl. pedem. t.* 12. *f.* 1.

folioſa. 17. P. caule ſimplici, ſpica folioſa, corollis galea obtuſiſſima integra. *Mant. p.* 80. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 139.

canadenſis. 18. P. caule ſimplici, ſpica ſubfolioſa, corollis galea ſetaceo-bidentata, calicibus deorſum truncatis. *Mant. p.* 86.

tuberoſa. 19. P. caule ſimplici, calicibus criſtatis, corollis galea roſtrato-adunca. *Bocc. muſ. t.* 8.

20. P.

striata. 20. P. caule simplicissimo, foliis pinnatifidis: laciniis linearibus serrulatis, calicibus cylindricis quinquedentatis corolla triplo brevioribus, galea obtuse bidentata. *Pall. it.* 3. *p.* 737. *t.* R. *f.* 2. C.

spicata. 21. P. caule simplicissimo rectissimo, foliis ternis verticillatis pinnatifidis: laciniis crenulatis, calicibus truncato-bilobis. *Pall. it.* 3. *p.* 738. *t.* S. *f.* 2. B.

acaulis. 22. P. pedunculis radicalibus unifloris flore brevioribus, labii tripartiti lobo intermedio basi bicarinato. *Wulfen apud Jacquin coll.* 1. *p.* 207. *t.* 14.

AFZELIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata. *Caps.* rotundata, acuminata, 2locularis, apice dehiscens polysperma: receptaculis hemisphaericis.

cassioides. 1. Afzelia. *Walt. flor. carol. p.* 171.

747. GERARDIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 2labiata: labio inferiore 3partito; laciniis emarginatis, medio 2partito. *Caps.* 2locularis, basi dehiscens.

tuberosa. 1. G. foliis subovatis tomentosis repandis longitudine caulis. *Plum. ic.* 75. *f.* 2.

glutinosa. 2. G. foliis ovatis serratis, bracteis linearibus hispidis. *Osb. it. t.* 9.

japonica. 3. G. foliis ovatis inciso-pinnatifidis petiolatis, caule simplici. *Thunb. flor. jap. p.* 251.

scabra. 4. G. hispida scabra, foliis oblongis pinnatifidis. *Suppl. p.* 279.

pedicularia. 5. G. foliis oblongis duplicato-serratis, caule paniculato, calicibus crenatis.

nigrina. 6. G. scabra, foliis lanceolatis inferne serratis, caule tetragono. *Suppl. p.* 278. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 154. Nigrina viicosa. *Berg. fl. cap. t.* 3. *f.* 4. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 4.

flava. 7. G. foliis lanceolatis pinnato-dentatis, caule simplicissimo. *Pluckn. mant. t.* 368.

8. G.

delphinifolia. 8. G. foliis linearibus pinnatifidis, caule ſubramoſo.

tubuloſa. 9. G. laevis, foliis linearibus integris acutis, tubo calice longiore. *Suppl. p.* 279.

purpurea. 10. G. foliis linearibus integerrimis, floribus oppoſitis. *Pluckn. phyt.* 12. *f.* 2.

erecta. 11. G. foliis linearibus pedunculo brevioribus, floribus axillaribus. *Walt. flor. carol. p.* 170.

ſetacea. 12. G. foliis ſetaceis, caule ramoſiſſimo, floribus terminalibus. *Walt. flor. carol. p.* 170.

748. CHELONE.

Cal. 5partitus. *Rudimentum* filamenti quinti inter ſuprema ſtamina. *Capſ.* 2locularis: diſſepimento duplicato. *Sem.* bracteata, membranaceo-marginata.

glabra. 1. Ch. foliis petiolatis lanceolatis ſerratis: ſummis oppoſitis. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 6.

obliqua. 2. Ch. foliis petiolatis lanceolatis ſerratis oppoſitis. *Mill. h. angl. t.* 93. *an ſatis diſtincta a glabra?*

hirſuta. 3. Ch. caule foliisque hirſutis. *Mill. h. angl. t.* 252. *an varietas pentſtamonis?*

Pentſtamon. 4. Ch. foliis amplexicaulibus, panicula dichotoma. *Mant. p.* 415. *Arduin. ſpec. t.* 5. *β) Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 21. *f.* 3. *an cum praecedente diſtincti generis?*

ruellioides. 5. Ch. foliis radicalibus petiolatis ovatis ſerratis: caulinis oppoſitis amplexicaulibus, pedunculis elongatis, calicibus ciliatis. *Suppl. p.* 279. *nonne diſtincti generis planta, rudimento filamenti quinti deſtituta?*

260. BRUNSFELSIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* tubo longissimo. *Filamentum* 5tum sterile. *Capsula* exterius baccata, 1locularis, polysperma: conceptaculo maximo.

americana. 1. Br. foliis ellipticis acuminatis: petiolis longioribus, corollae tubo erecto, limbo integro. *Plum. ic.* 65.

undulata. 2. Br. foliis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis: petiolis brevissimis, corollae tubo curvo, limbo undulato. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 90.

749. GESNERIA. *Cal.* 5fidus, germini insidens. *Cor.* incurva, recurvaque. *Capsf.* infera; subbilocularis.

ventricosa. 1. G. foliis ellipticis acuminatis crenatis glabris, pedunculis subquadrifloris, calicis laciniis subulatis elongatis, corollis ventricosis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 90.

pulchella. 2. G. herbacea, foliis ternatis ovatis acutis serratis villosis, pedunculis axillaribus unifloris. *Browu. jam. p.* 270. *t.* 30. *f.* 1.

corymbosa. 3. G. foliis ovatis acutis serratis scariosis asperis, pedunculis multipartitis, floribus corymbosis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 89.

pumila. 4. G. acaulis, foliis ovato-cuneiformibus crenatis subsessilibus, pedunculis subunifloris, folio brevioribus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 90.

scabra. 5. G. foliis ovato-lanceolatis serratis scabris, pedunculis axillaribus, corollis cylindricis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 89.

exserta. 6. G. foliis ovato-lanceolatis crenatis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla duplo longioribus, capsulis ovatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 89.

tomentosa. 7. G. foliis ovato-lanceolatis crenatis hirsutis, pedunculis lateralibus longissimis corymbiferis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 47.

8. G.

acaulis. 8. G. foliis lanceolato-ovatis ſerratis ſubpetiolatis terminali-confertis, pedunculis trifloris, folio brevioribus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 102. *f.* 1.

calicina. 9. G. foliis lanceolato-ovatis acuminatis ſerratis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla longioribus, calice campanulato, capſula cylindrica. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 90.

grandis. 10. G. foliis lato-lanceolatis longiſſimis denticulatis ſuperne hirtis ſubtus ſcabris, pedunculis terminalibus, caule arboreſcente. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 89.

humilis. 11. G. foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus, pedunculis ramoſis multifloris. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 104. *f.* 2.

√ 750. ANTIRRHINUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* baſi gibba aut calcarata. *Capſ.* 2locularis, polyſperma, apice in laciniulas reflexas dehiſcens.

* *corollis calcaratis.*

⊥ *clauſis.*

⊤ *aphylla.*

aphyllum. 1. A. ſcapo aphyllo capillari. *Suppl. p.* 280.

⊤⊤ *folioſa.*

⊦ *foliis alternis.*

Cymbalaria. 2. A. foliis cordatis quinquelobis, caulibus procumbentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 55.

dalmaticum. 3. A. foliis cordatis amplexicaulibus. *Buxb. cent.* 1. *t.* 24.

piloſum. 4. A. foliis reniformibus piloſiſſimis, caulibus procumbentibus. *Mant. p.* 149. *Jacq. obſ. bot.* 2. *t.* 48.

reflexum. 5. A. foliis ovatis glabris, pedunculis axillaribus: fructiferis elongatis recurvis, caule procumbente. *Allion. corſ.* 205. *f.* 1.

ſpurium. 6. A. foliis ovatis villoſis, caulibus procumbentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 205.

7. A.

Elatine. 7. A. foliis haſtatis, caulibus procumbentibus. *Flor. dan. t.* 426. *Siliqua breviſſima ſpuria.*

cirrhoſum. 8. A. foliis haſtatis: petiolis paſſim cirrheſcentibus, caulibus patulis. *Mant. p.* 249. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 82.

aegyptiacum. 9. A. foliis haſtatis, caule erecto ramoſiſſimo, pedunculis rigeſcentibus.

hirtum. 10. A. foliis lanceolatis hirtis, floribus ſpicatis: foliolo calicino ſupremo maximo. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 30.

geniſtifolium. 11. A. foliis lanceolatis acuminatis, panicula virgata flexuoſa. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 244.

linifolium. 12. A. foliis lanceolatis trinerviis, floribus racemoſis: pedunculis diſtantibus bractea brevioribus. *Buxb. cent.* 1. *t.* 25. *f.* 2.

Linaria. 13. A. foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *) *Knorr del. hort.* 2. *t.* L. 6. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7.

chalepenſe. 14. A. foliis lineari-lanceolatis, floribus racemoſis, calicibus corolla longioribus, caule erecto. *Riv. monop. t.* 80. *f.* 2.

junceum. 15. A. foliis linearibus, caule paniculato virgato, floribus racemoſis.

pedunculatum. 16. A. foliis linearibus remotis, floribus paniculatis: pedunculis folio longioribus ſtrictis.

minus. 17. A. foliis plurimis alternis lanceolatis obtuſis, caule ramoſiſſimo diffuſo. *Flor. dan. t.* 502. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* I.

†† *foliis oppoſitis.*

peliſſeriaum. 18. A. foliis caulinis linearibus alternis: radicalibus lanceolatis ternis, floribus corymboſis. *Mant. p.* 416. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 4.

19. A.

*) PELORIA *Amoen. acad.* 1. *p.* 55. *t.* 3. LINARIAE *proles hybrida, ejusdemque qualitatis et conſtans, radicibus infinite ſeſe multiplicans charactere fructificationis diverſiſſima corolla regulari, quinquecornicula pentandra, ut genus proprium abſolute conſtituret et diſtinctiſſimum, niſi fructus frequentiſſime aborziret. Naturae prodigium. Ita quidem a Linnê. Veriſimilior autem videtur ea opinio, quae peloriam pro peculiari degeneratione monſtroſa floris habet, in quam inclinare hoc genus prae aliis, ſimilis a forma deflexio in aliis ſpeciebus e. g. ſpurio, Elatine, Cymbalaria, obſervata, teſtatur. Merk Gesett. gel. Anz.* 1774. *n.* 121. *Linck Annal. Naturg.* 1. *p.* 32.

Haelava. 19. A. foliis linearibus alternis: infimis ternis, floribus racemoso-capitatis: galea bifida, labio tridentato. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 111.

viscosum. 20. A. foliis caulinis linearibus alternis: radicalibus lanceolatis quaternis, calicibus villosis cauli approximatis.

saxatile. 21. A. foliis lanceolato-linearibus sparsis villosis: inferioribus quaternis, caule decumbente, floribus spicatis. *Mant. p.* 416.

origanifolium. 22. A. foliis (plurimis) oppositis oblongis, floribus alternis. *Barr. pl. rar. ic.* 598.

triste. 23. A. foliis linearibus sparsis: inferioribus oppositis, nectariis subulatis, floribus subsessilibus. *Mill. h. angl. t.* 166.

villosum. 24. A. foliis ovatis villosis, caulibus simplicibus, floribus oppositis lateralibus. *Barr. pl. rar. ic.* 597.

macrocarpon. 53. A. foliis ovatis serratis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris, capsulis compressis carinatis truncatis. *Ait. hort. Kew. 2. p.* 335.

bicorne. 25. A. foliis ovato-oblongis serratis, caule erecto, floribus racemosis, capsulis bicornibus. *Burm. afr. t.* 75. *f.* 3.

hexandrum. 26. A. foliis cordato-ovatis serratis, pedunculis axillaribus unifloris. *Forst. flor. austr. p.* 43.

pinnatum. 27. A. foliis pinnatifidis, caule erecto, floribus racemosis. *Suppl. p.* 280.

versicolor. 28. A. foliis lineari-lanceolatis: inferioribus ternis, caule erecto spicato. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 31.

sparteum. 29. A. foliis subulatis canaliculatis carnosis: inferioribus ternis, caule paniculato corollisque glaberrimis.

triphyllum. 30. A. foliis ternis ovatis. *Bocc. sic. t.* 22. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. H.

viscosum. 31. A. foliis radicalibus quaternis lanceolatis: caulinis linearibus alternis, calicibus villosis cauli approximatis.

arvense. 32. A. foliis sublinearibus: inferioribus quaternis, calicibus piloso-viscidis, floribus spicatis, caule erecto. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 5.

bipunctatum. 33. A. foliis linearibus glabris: inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus spicato-capitatis.

34. A.

repens. 34. A. foliis linearibus confertis: inferne quaternis, calicibus capſulam aequantibus. *Dill. h. Elth. t.* 163. *f.* 197.

aeragineum. 54. A. foliis linearibus inferioribus quaternis, floribus racemoſis: calicis lacinia ſuprema ceteris duplo longiori. *Gouan. illuſtr.*

ſupinum. 35. A. foliis ſubquaternis linearibus, caule diffuſo, floribus racemoſis: calcari recto.

purpureum. 36. A. foliis quaternis linearibus, caule erecto ſpicato. *Mant. p.* 416. *Rivin. monop. t.* 85. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. k.

alpinum. 37. A. foliis quaternis lineari-lanceolatis glaucis, caule diffuſo, floribus racemoſis: calcari recto. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 58.

triornithophorum. 38. A. foliis quaternis lanceolatis, caule erecto ramoſo, floribus pedunculatis. *Herm. par. Lugdb. t.* 377.

glaucum. 39. A. foliis quaternis ſubulatis carnoſis, caulibus erectis, floribus ſpicatis. *Buxb. cent.* 4. *t.* 37.

multicaule. 40. A. foliis quinis linearibus carnoſis, floribus capitatis. *Bocc. ſic. t.* 19. *f.* 1.

monſpeſſulanum. 41. A. foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis ſpicatis nitidis.

flavum. 42. A. foliis inferioribus ternis ſubovatis: ſuperioribus ſparſis linearibus. *Poir. voy. en Barbar.* 2. *p.* 191. *Corollae intenſe flavae.*

virgatum. 43. A. foliis ovato-lanceolatis ſparſis: inferioribus ternis, caule ſimpliciſſimo. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 192.

††† *foliis ſparſis.*

lagopodioides. 44. A. foliis mollibus apice recurvis, ſpicis ovatis villoſis. *Suppl. p.* 279.

piniforlium. 45. A. foliis filiformibus, floribus ſpicatis: pedunculis calicibusque hirſutis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 193.

‖ *corollis hiantibus.*

bellidifolium. 46. A. foliis radicalibus lingulatis dentatis lineatis, caulinis partitis integerrimis. *Mant. p.* 417.

canadenſe. 47. A. foliis linearibus alternis, corollae labio inferiore explanato.

** *corollis ecaudatis.*

unilabiatum. 48. A. caule paniculato, foliis alternis pinnatis, corollae calycis duobus. *Suppl. p.* 279.

molle. 49. A. caulibus procumbentibus, foliis oppositis ovatis tomentosis. *Barr. pl. rar. ic.* 598.

Asarina. 50. A. caulibus procumbentibus, foliis oppositis cordatis crenatis. *Lob. ic.* 601.

papilionaceum. 51. A. foliis carnosis, floribus axillaribus: calicibus papilionaceis. *Mant. p.* 86.

Orontium. 52. A. floribus subspicatis: calicibus corolla longioribus. *Curt. flor. Lond. t.* 234. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. H.

majus. 53. A. floribus spicatis: calicibus rotundatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* L. 12. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. G.

751. CYMBARIA. *Cal.* 10dentatus. *Capf.* ovata, 2locularis.

daurica. 1. Cymbaria. *Amm. ruth.* 47. *t.* 1. *f.* 2. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 12.

1407. THUNBERGIA. *Cal.* duplex: exterior 2phyllus; interior multipartitus. *Capf.* globosa, rostrata, 2locularis.

capensis. 1. Thunbergia. *Suppl. p.* 292. *Retzius act. Lund.* 1. *p.* 163. *ic.*

752. CRANIOLARIA. *Cal.* duplex: *perianth.* 4phyllum; *spatha* 1phylla. *Cor.* tubus longissimus. *Capf.* lignosa, corticata: rostro hamato, 3locularis, 2valvis.

fruticosa. 1. Cr. foliis lanceolatis dentatis. *Plum. gen. t.* 137. *an Gesneriae jungenda?*

2. Cr.

annua. 2. Cr. foliis cordatis angulatis, calice exteriore diphyllo. *Mant. p.* 417. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 166. *an Martyniae potius ſpecies?*

753. MARTYNIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* campanulata. *Rudimentum* filamenti 5ti. *Capſ.* lignoſa, corticata; roſtro hamato, 2valvis.

perennis. 1. M. caule ſimplici, foliis ſerratis: *Ehret pl. ſel. t.* 9. *f.* 1.

longiflora. 2. M. caule ſimplici, foliis orbiculatis repandis. *Meerburgh Afbeeld. t.* 7.

annua. 3. M. caule ramoſo, foliis cordato-orbiculatis dentatis. *Ehret pl. ſel. t.* 1. *f.* 5.

proboſcidea. 4. M. caule ramoſo, foliis cordato-ovatis integerrimis, capſulae roſtro longiſſimo. *Schmidel icon pl. et anal. t.* 12. 13. *Gaertn. de fr. et ſem. faſc.* 7. *t.* 110. *f.* 1.

754. TORENIA. *Cal.* 2labiatus: labio ſuperiori 3cuſpide. *Filamenta* inferiora ramulo ſterili. *Capſ.* 2locularis.

aſiatica. 1. TORENIA. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 53.

755. BESLERIA. *Cal.* 5partitus. *Bacca* ſupera, 1locularis, ſubgloboſa, polyſperma.

melittifolia. 1. B. pedunculis ramoſis, foliis ovatis. *Plum. ic.* 48.

lutea. 2. B. pedunculis ſimplicibus confertis, foliis lanceolatis. *Plum. ic.* 49. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 2. *t.* 52. *f.* 2.

criſtata. 3. B. pedunculis ſimplicibus ſolitariis, calicibus ſerrato-criſtatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 180.

bivalvis. 4. B. calicibus bivalvibus laceris. *Suppl. p.* 280.

violacea. 5. B. caule ſcandente, foliis ovatis acutis integerrimis, floribus ſpicatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 630. *t.* 254. *β)* Besleria caerulea. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 631.

coccinea. 6. B. caule scandente, foliis ovato-acuminatis involucro diphyllo, calicibus coccineis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 632. *t.* 255.

incarnata. 7. B. foliis ovatis crenatis utrinque tomentosis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 635. *t.* 256.

MONTIRA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* tubo ventricoso, incurvo; limbo 5lobo. *Germen* 2-dymum. *Caps.* 2ventricosa, 2locularis, 4valvis, polyspermа.

gujanensis. 1. MONTIRA. *Aubl. pl. guj.* 1. *p.* 637. *t.* 257.

CONOBEA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* ringens, 2labiata: labio 3fido. *Stigma* 2lobum. *Caps.* 1locularis, 4valvis, polyspermа.

aquatica. 1. CONOBEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 639. *t.* 257.

MYOPORUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata: limbo patente subaequali 5partito. *Bacca* 1-2sperma: seminibus 2locularibus.

laetum. 1. M. foliis oblongis apice subserratis laevibus glabris nitidis, corollis hirsutis. *Forst. flor. austr. p.* 44.

crassifolium. 2. M. foliis oblongis subserratis carnosis. *Forst. flor. austr. p.* 44.

pubescens. 3. M. foliis oblongo-ellipticis serratis pubescentibus. *Forst. flor. austr. p.* 44.

tenuifolium. 4. M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, corollis brevibus. *Forst. flor. austr. p.* 44.

NEMIA. *Cal.* 5partitus, superus. *Cor.* infundibuliformis: limbo subaequali, 5partito. *Caps.* 2locularis, 2valvis.

capensis. 1. NEMIA. *Berg. fl. cap. p.* 160.

GAL-

GALVESIA. *Cal.* 5fidus, parvus. *Cor.* tubulosa, basi subventricosa: galea 2loba; labio 3partito. *Capf.* globosa, 2locularis.

fruticosa. 1. GALVESIA. *Jussieu gen. plant. p.* 119.

756. SCROPHULARIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5partita: tubo globoso; lacinia infima reflexa. *Capf.* 2locularis: dissepimento duplicato.

marilandica. 1. Scr. foliis cordatis serratis acutis basi rotundatis, caule obtusangulo. *Kniph. bot. orig. cent.* 2. *n.* 80.

Scorodonia. 2. Scr. foliis cordatis duplicato-serratis, racemo composito foliis interstincto. *Pluckn. alm. t.* 59. *f.* 5.

glabrata. 20. Scr. foliis oblongo-lanceolatis cordatis duplicato-serratis glabris, paniculis racemosis terminalibus trichotomis, caule suffruticoso. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 341.

arguta. 21. Scr. foliis cordatis glabris duplicato-serratis, paniculis axillaribus dichotomis, capsulis acuminatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 342.

altaica. 3. Scr. foliis cordatis duplicate serrato-dentatis ovatis: dentibus basin respicientibus, racemo composito aphyllo. *Murray comm. Goett.* 1781. *p.* 35. *t.* 2.

betonicifolia. 4. Scr. foliis cordatis oblongis dentatis: dentibus integerrimis, baseos profundioribus. *Mant. p.* 87. *Barr. pl. rar. ic.* 274.

nodosa. 5. Scr. foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Blackw. herb. t.* 87.

aquatica. 6. Scr. foliis cordatis obtusis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Flor. dan. t.* 507. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 8.

auriculata. 7. Scr. foliis cordatis subtus tomentosis basi appendiculatis, racemis terminalibus. *Lob. ic.* 533.

vernalis. 8. Scr. foliis cordatis: caulinis ternis, pedunculis axillaribus solitariis bifidis. *Flor. dan. t.* 411.

peregrina. 9. Scr. foliis cordatis lineatis lucidis, pedunculis axillaribus bifloris, caule sexangulari. *Mant. p.* 418. *Cam. hort. t.* 43.

orientalis. 10. Scr. foliis lanceolatis serratis petiolatis: caulinis ternis, ramis oppositis. *Kniph. bot. orig. cent.* 5. *n.* 80.

finensis. 11. Scr. foliis ovato-oblongis serratis pubescentibus. *Mant. p.* 250.

meridionalis. 12. Scr. foliis oblongo-ovatis serratis glabris, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 280.

coccinea. 13. Scr. foliis quaternis ovatis, floribus verticillatis spicatis.

frutescens. 14. Scr. foliis subcarnosis sessilibus laevibus apice recurvis. *Mant. p.* 418. *Herm. par. Lugdb. t.* 547.

trifoliata. 15. Scr. foliis glabris: inferioribus ternato-pinnatis obtusis; superioribus simplicibus, pedunculis subtrifloris axillaribus. *Pluckn. alm. t.* 313. *f.* 6.

sambucifolia. 16. Scr. foliis interrupte pinnatis cordatis inaequalibus, racemo terminali: pedunculis axillaribus geminis dichotomis. *Mill. h. angl. t.* 231.

viridiflora. 17. Scr. foliis glabris interrupte pinnatis: pinnis ovato-oblongis serratis, racemo terminali subnudo longissimo. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 194.

lucida. 18. Scr. foliis inferioribus bipinnatis subramosis glaberrimis, racemis bipartitis. *Tournef. it.* 1. *t.* 85.

canina. 19. Scr. foliis pinnatifidis, racemo terminali nudo: pedunculis bifidis. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 90.

757. CELSIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata, semiquinquefida. *Filamenta* extrorsum lanata. *Caps.* 2locularis.

orientalis. 1. C. foliis bipinnatis. *H. Upsal. t.* 1. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 7.

Arcturus. 2. C. foliis radicalibus lyrato-pinnatis, pedunculis flore longioribus. *Mant. p.* 339. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 170. Verbascum Arcturus. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 117.

cretica. 3. C. foliis radicalibus lyratis: caulinis subcordatis amplexicaulibus, floribus subsessilibus. *Suppl. p.* 281. *Mill. ic. t.* 273.

linearis. 4. C. foliis lineari-lanceolatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 270. *pl. rar. ic. cent.* 2. *fasc.* 1. *t.* 13.

1405. HEMIMERIS. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata: *lacinia* una majore obcordata. *Foſſula* laciniarum nectarifera.

montana. 1. H. diandra, foliis oppoſitis ovatis ſerratis, caule erecto. *Suppl. p.* 280.

fabuloſa. 2. H. diandra, foliis oppoſitis pinnatifidis, caule proſtrato. *Suppl. p.* 280.

diffuſa. 3. H. foliis alternis oppoſitisque pinnatifidis, caule patulo. *Suppl. p.* 280.

MATUREA. *Cal.* 4partitus. *Cor.* 2labiata: labio ſuperiori 2fido; inferiori 3fido. *Stigm.* 2lamellatum *Capſ.* 1locularis, 2valvis, polyſperma.

pratenſis. 1. MATUREA. *Aubl. pl. guj. 2. p. 642. t 259. an diſtincti generis?*

758. DIGITALIS. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata: 5fida, ventricoſa. *Capſ.* ovata, 2locularis, polyſperma.

purpurea. 1. D. calicis foliolis ovatis acutis, corollis obtuſis: labio ſuperiori integro. *Flor. dan. t.* 74. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 6.

minor. 2. D. calicis foliolis ovatis acutis, corolis obtuſis: labio ſuperiori ſubbilobo, foliis laevibus. *Mant. p.* 567.

Thapſi. 3. D. calicis foliolis ovatis acutis, foliis decurrentibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1185.

obſcura. 4. D. calicis foliolis ovatis acutiuſculis, ſdiis lineari-lanceolatis integerrimis baſi adnatis. *Mant. p.* 418. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 91.

ferruginea. 5. D. calicis foliolis ovatis obtuſis patentibus, corollarum labio inferiori barbato. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 86.

lutea. 6. D. calicis foliolis lanceolatis, corollis acutis; labio ſuperiori biſido. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 105.

ambigua. 7. D. calicis foliolis lanceolatis, corollis galea emarginata, foliis subtus pubescentibus. *Suppl. p.* 282. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 57.

canarien- sis. 8. D. calicis foliolis lanceolatis, corollis bilabiatis acutis, caule fruticoso. *Mill. h. angl. t.* 120.

Sceptrum. 9. D. calicis foliolis subulatis, corollis quadrifidis, foliis oblongis spatulatis serratis, spicis terminalibus ovatis pedunculatis coma bracteārum terminatis, caule fruticoso. *Suppl. p.* 282. *Herit. sert. angl. t.* 24.

TOURRETTIA. *Cal.* 2labiatus. *Cor.* 2labiata: tubo inaequali, ventricoso. *Rudimentum* saepe filamenti 5ti. *Capſ.* 4locularis, hispida, ungue elastico terminata. *Semina* alata, imbricata.

volubilis. 1. Tourrettia. *Fougeroux de Bonderoy act. Paris. ann.* 1784. *p.* 200. *t.* 1.

759. BIGNONIA. *Cal.* 5fidus, cyathiformis. *Cor.* fauce campanulata, 5fida, subtus ventricosa. *Capſ.* siliquosa 2locularis. *Sem.* membranaceo-alata.

* *foliis simplicibus.*

Catalpa. 1. B. foliis ternis cordatis, caule erecto, floribus diandris. *Catesb. Car.* 1. *t.* 29.

tomento- sa. 2. B. foliis cordatis subtus tomentosis, floribus axillaribus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 262. *Kaempf. am. exot.* 5. *p.* 859. 860. *ic.*

sempervirens. 3. B. foliis lanceolatis, caule volubili. *Catesb. Car.* 1. *t.* 53. *Jacq. coll.* 3. *p.* 259. *an forsan distincti generis?*

citrifolia. 30. B. foliis ovato-lanceolatis: petiolo alato, caule scandente. *Barrel. fr. equin.* 23.

4. B.

longiſſima. 4. B. arborea, foliis oblongis acuminatis, floribus diandris, capſulis filiformibus: ſeminibus lanatis. *Jacq. ſtirp. amer. p.* 182. *t.* 176. *f.* 78.

** *foliis compoſitis.*

unguis. 5. B. foliis conjugatis: cirrho breviſſimo arcuato tripartito. *Pluckn. alm. t.* 163. *f.* 2.

dichotoma. 31. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis ovatis; imis ternatis, floribus racemoſis: pedunculo communi dichotomo. *Jacq. am. p.* 183.

acquinoctialis. 6. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis ovato-lanceolatis, pedunculis biſloris, capſulis linearibus. *Schb. h. rom.* 2. *t.* 85.

paniculata. 7. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis cordato-ovatis, floribus racemoſis, pedunculis trifloris. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 175.

pubeſcens. 8. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis cordato-ovatis ſubtus pubeſcentibus.

crucigera. 9. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis cordatis, caule muricato. *Plum. ic. t.* 58.

capreolata. 10. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis cordato-lanceolatis, foliis imis ſimplicibus. *du Hamel arbr.* 1. *t.* 40.

alliacea. 11. B. foliis conjugatis: foliolis ellipticis integris coriaceis, pedunculis quinqueſloris axillaribus: calicibus integris. *Aubl. guj. p.* 659. *n.* 14.

echinata. 12. B. foliis inferioribus ternatis: ſuperioribus conjugatis; petiolis dichotomis cirrhoſis, capſulis echinatis. *Aubl. guj.* 2. *t.* 263. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 3. *t.* 52. *f.* 1.

incarnata. 13. B. foliis inferioribus ternatis: ſuperioribus conjugatis, petiolis cirrhigeris, capſulis glabris. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 645. *t.* 261.

Kerere. 14. B. foliis binatis ternatisque, floribus corymboſis axillaribus, capſulis ovatis ſubcompreſſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 644. *t.* 260.

triphylla. 15. B. foliis ternatis: foliolis ovatis acuminatis, caule fruticoſo erecto.

alba. 16. B. foliis ternatis; foliolis ovatis acuminatis, caule ſcandente. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 653. *t.* 266.

fluviatilis. 17. B. foliis digitatis: foliolis ovato-oblongis glabris integerrimis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 655. *t.* 267.

18. B.

pentaphylla. 18. B. foliis digitatis: foliolis integerrimis obovatis. *Catesb. Car.* 1. *t.* 37.

Leucoxylon. 19. B. foliis digitatis: foliolis integerrimis ovatis acuminatis. *Pluckn. alm. t.* 200. *f.* 4. *β*?) Bignonia orbiculata. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 77.

radiata. 20. B. foliis digitatis: foliolis pinnatifidis. *Feuill. peruv.* 1. *t.* 22.

radicans. 21. B. foliis pinnatis: foliolis inciſis, caule geniculis radicatis. *Mill. h. angl.* 65. *β) Catesb. Car.* 1. *t.* 65.

ſtans. 22. B. foliis pinnatis: foliolis ſerratis, caule erecto firmo, floribus racemoſis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 176.

grandiflora. 23. B. foliis pinnatis: foliolis ovatis acuminatis ſerratis, caule vdubili, calice ſemiquinquefido. *Thunb. flor. jap. p.* 253. *Banks ic. Kaempf. t.* 21.

Chelonoides. 24. B. foliis impari-pinnatis: foliolis ovatis integerrimis acuminatis pubeſcentibus, floribus barbatis ſemipentandris. *Suppl. p.* 282.

ſpathacea. 25. B. foliis impari-pinnatis: foliolis ovatis hirtis, calice monophyllo ſpathaceo, corolla hypocrateriformi. *Suppl. p.* 283.

peruviana. 26. B. foliis decompoſitis: foliolis inciſis, caule geniculis cirrhoſis.

indica. 27. B. foliis bipinnatis: foliolis integerrimis ovatis acuminatis. *Rheed. h. malab.* 1. *t.* 43. 45.

caerulea. 28. B. foliis bipinnatis: foliolis lanceolatis integris. *Catesb. Car.* 1. *t.* 42.

Copaja. 29. B. foliis bipinnatis: foliolis ovatis ſeſſilibus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 650. *t.* 265. *an ſatis diſtincta ab indica?*

760. CITHAREXYLUM.

Cal. 5dentatus, campanulatus. *Cor.* infundibuliformi-rotata: laciniis aequalibus ſupra villoſis. *Bacca* 2pyrena: officulis 2-locularibus.

cinereum. 1. C. ramis teretibus, racemis lateralibus, calicibus dentatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 178.

2. C.

erectum. 2. C. ramis teretibus, racemis erectis terminalibus, calicibus dentatis. *Brown. jam. t.* 28. *f.* 2.

caudatum. 3. C. ramis teretibus, calicibus truncatis.

villosum. 4. C. ramis teretibus: junioribus tetragonis; novellis villosis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 82.

quadrangulare. 5. C. ramis tetragonis, racemis erectis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 22.

subferratum. 6. C. ramis tetragonis, racemis axillaribus nutantibus, calicibus dentatis, foliis ellipticis subferratis venosis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 91.

Melanocardium. 7. C. ramis tetragonis, racemis terminalibus compositis, floribus tetrandris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 91.

paniculatum. 8. C. floribus paniculatis. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 8.

761. HALLERIA. *Cal.* 3fidus. *Cor.* 4fida, filamentis brevior. *Bacca* infera, 2locularis.

lucida. 1. Halleria. *Burm. afr. t.* 89. *f.* 3. *β) Burm. afr. t.* 89. *f.* 1.

TANAECIUM. *Cal.* cylindricus, truncatus. *Cor.* tubulosa, subaequalis, 5fida. *Rudimentum* filamenti quinti. *Bacca* corticosa maxima.

Jaroba. 1. T. foliis inferioribus ternatis: superioribus geminatis; cirrhis interpetiolaribus terminalibus, caule scandente. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 92.

parasiticum. 2. T. foliis ovatis coriaceis, caule scandente fruticoso radicante. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 92.

762. CRESCENTIA. *Cal.* 2partitus, aequalis. *Cor.* gibba. *Bacca* pedicellata, 1locularis. *Semina* multa 2locularia.

Cujete. 1. Cr. foliis cuneato-lanceolatis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 167.

2. Cr.

cucurbiti- 2. Cr. foliis lanceolato-ovatis. *Mant. p.* 250. *Pluckn. alm.*
na. *t.* 171. *f.* 2.

pinnata. 3. Cr. foliis pinnatis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 203. *t.* 18.

763. GMELINA. *Cal.* obsolete 4dentratus. *Cor.* 4-fida, campanulata. *Antherae* 2 2partitae, 2 simplices. *Drupa* baccata: *putamine* 3loculari; loculamento inferiori sterili.

asiatica. 1. Gm. spinis oppositis horizontalibus. *Rumpf. amb.* 1. *t.* 40. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 5.

coromandelica. 2. Gm. spinis oppositis erectiusculis. *Sloan. jam. t.* 207. *f.* 1.

indica. 3. Gm. spinis alternis folio longioribus. *Burm. fl. ind. p.* 132.

764. PETREA. *Cal.* 5partitus, maximus, coloratus. *Cor.* rotata. *Caps.* 2locularis in fundo calicis. *Sem.* solitaria.

volubilis, 1. PETREA. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 173.

1316. PREMNA. *Cal.* campanulatus, integerrimus, aut obsolete 2lobus, vel obiter 4dentatus. *Cor.* 4fida. *Drupa* baccata: putamine 4locolari. *Semina* solitaria.

integrifolia. 1. Pr. foliis integerrimis. *Mant. p.* 252. *Burm. ind. t.* 41. *f.* 1.

serratifolia. 2. Pr. foliis serratis. *Mant. p.* 253. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 6.

GALIPEA. *Cal.* 4-5angulus, 4-5dentatus. *Cor.* 4-5fida: tubo brevi. *Filam.* 2 sterilia, 2 fertilia. *Germen* 4-5gonum. *Stigma* 4partitum. *Peric.* - - -

trifoliata. 1. GALIPEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 662. *t.* 269.

AMBU-

AMBULIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* tubulosa, 4fida: laciniis inaequalibus. *Caps.* 5gona, 1locularis, 1sperma.

monosper- 1. AMBULIA. *la Marck encycl.* 1. *p.* 128.
ma.

765. LANTANA. *Cal.* obsolete 4dentatus. *Cor.* limbus subquadrifidus inaequalis. *Stigma* uncinato-refractum. *Drupae congregatae* (plurimis) 3loculares, loculamento inferiori sterili.

salvifolia. 1. L. foliis oppositis subsessilibus, floribus racemosis. *Mant. p.* 419.

aculeata. 2. L. foliis oppositis, caule aculeato ramoso, spicis hemisphaericis. *Mant. p.* 419. *Pluckn. alm. t.* 233. *f.* 5. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 4.

Camara. 3. L. foliis oppositis, caule inermi ramoso, floribus capitato-umbellatis aphyllis. *Dill. h. Elth. t.* 56. *f.* 65.

annua. 4. L. foliis oppositis, caule inermi herbaceo, spicis oblongis. *Mant. p.* 419. *Sloan. hist. jam.* 2. *t.* 195.

mista. 5. L. foliis oppositis acuminatis, floribus capitatis: involucris longitudine florum. *Dill. h. Elth. t.* 56. *f.* 64.

Radula. 6. L. foliis oppositis ovatis acutis serratis rugosis asperis subhirsutis, caule subinermi aspero, capitulis oblongis: bracteis ovatis acutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 92.

strícta. 7. L. foliis oppositis oblongo-lanceolatis acutis, caule inermi, capitulis subrotundis: bracteis ovato-lanceolatis squarrosis. *Sloan. hist. jam.* 2. *t.* 195. *f.* 4.

melissae- 8. L. foliis oppositis ovato-oblongis villosis mollibus, caule
folia. aculeato, spicis hemisphaericis: bracteis tubo dimidio brevioribus. *Dill. h. Elth. t.* 57. *f.* 66.

scabrida. 9. L. foliis oppositis ovato-ellipticis scabris, caule aculeato, spicis hemisphaericis; bracteis tubo dimidio brevioribus lanceolatis acutis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 352.

viburnoides. 14. L. foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule inermi, floribus capitato-spicatis, involucris lanceolatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 117. Characters viburnoides. *β)* Characters tetragona. *Forsk.* l. m. c.

odorata. 10. L. foliis oppositis ternisque lanceolato-ellipticis, caule inermi.

involucrata. 11. L. foliis oppositis ternisque cuneato-obovatis obtusis lineatis tomentosis, capitulis squarrosis. *Medic. act. palat.* 3. *phys.* 1. 16. *an proprii generis?*

trifolia. 12. L. foliis ternis, spicis oblongis imbricatis. *Plum. ic.* 70.

africana. 13. L. foliis alternis sessilibus, floribus solitariis. *Commel. rar.* t. 6. *an distincti generis? Drupa* 2*locularis: loculis* 1-*pyrenis.*

NEPHRANDRA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* galea trifida: media involuta; labium 2fidum. *Drupa* nuce 2loculari: loculis 1spermis.

dubia. 1. NEPHRANDRA. *Willden. ap. Cothen. disp. pl. meth. p.* 8.

766. CORNUTIA. *Cal.* 5dentatus. *Stamina* corolla longiora. *Stil.* longissimus. *Bacca* 1sperma.

pyramidata. 1. CORNUTIA. *Plum. ic.* 106. *f.* 1.

767. LOESELIA. *Cal.* tubulosus, 4fidus. *Cor.* profunde 5fida: laciniis oblongis ciliatis. *Rudimentum* staminis 5ti. *Capf.* 3locularis, apice dehiscens.

ciliata. 1. LOESELIA. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. t. 62. *f.* 3.

768.

768. CAPRARIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata, 5fida, acuta. *Stigma* 2valve. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

biflora. 1. C. foliis alternis, floribus geminis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 174. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 9.

lucida. 2. C. foliis oppoſitis oblongis acutis argute ſerrulatis laevibus: petiolis alatis, pedunculis trifloris. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 353.

undulata. 3. C. foliis alternis ovatis undulatis, racemis ſecundis. *Suppl. p.* 284. *Herit. ſert. angl. t.* 25.

durantifolia. 4. C. foliis ternis dentatis, pedunculis ſolitariis, ramis alternis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 124. *f.* 2.

uniflora. 8. C. foliis oppoſitis cordatis, floribus ſolitariis. *Burm. ind. t.* 19. *f.* 3.

lanceolata. 5. C. foliis oppoſitis lanceolatis, corymbo terminali compoſito. *Suppl. p.* 284.

cruſtacea. 6. C. repens, foliis oppoſitis ovatis ſubpetiolatis crenatis. *Mant. p.* 87. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 170. *f.* 3. *an Lindernia ſpecies?*

humilis. 7. C. pubeſcens, foliis oppoſitis ternisve ovatis ſerratis petiolatis, pedunculis axillaribus petiolo brevioribus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 354.

1315. LINDERNIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens: labio ſuperiori breviſſimo. *Stam.* 2 inferiora dente terminali antheraque ſublaterali. *Capſ.* 1locularis.

pyxidaria. 1. L. foliis ovalibus integerrimis ſeſſilibus, pedunculis ſolitariis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 419. Capraria gratioloides. *Lindern fl. alſat. t.* 1, 2.

japonica. 2. L. foliis obovatis dentatis: infimis petiolatis. *Thunb. flor. jap. p.* 253.

dianthera. 3. L. foliis petiolatis ovato-ſubrotundis ſubſerratis, caule repente. *Swartz nov. pl. gen. et ſp. p.* 92.

769. SELAGO. *Cal.* 5fidus. *Cor.* tubus filiformis: limbus ſubaequalis. *Sem.* 2 nuda, inverſa.

corymbo-ſa. 1. S. corymbo multiplici, floribus disjunctis, foliis filiformibus faſciculatis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 40.

faſcicula-ta. 2. S. corymbo multiplici, foliis obovatis glabris ferratis. *Mant. p.* 250. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 3. *t.* 51. *f.* 6. *Jacq. coll.* 3. *p.* 246.

cinerea. 3. S. corymbo compoſito, foliis linearibus faſciculatis glabris: margine reflexo. *Suppl. p.* 285.

rotundi-folia. 4. S. corymbo compoſito, foliis ovatis glabris obtuſis. *Suppl. p.* 285.

polyſta-chya. 5. S. corymbo ſpicis faſciculatis, foliis filiformibus aggregatis. *Mant. p.* 250.

coccinea. 6. S. ſpicis corymboſis, foliis inferioribus linearibus integerrimis: ſuperioribus lanceolato-ſubulatis ſubdentatis.

ſpuria. 7. S. ſpicis corymboſis, foliis linearibus denticulatis. *Burm. afr. t.* 42. *f.* 3.

rapuncu-loides. 8. S. ſpicis corymboſis, foliis dentatis. *Burm. afr. t.* 42. *f.* 1.

ſerrata. 20. S. ſpicis corymboſis, foliis oppoſitis cuneiformibus obtuſis ſerratis glabris decurrentibus. *Berg. flor. cap.*

ſtricta. 21. S. ſpicis paniculatis ſubrotundis, foliis faſciculatis filiformibus hirſutis. *Berg. flor. cap.*

verbena-cea. 9. S. ſpicis faſciculatis, foliis oblongis glabris, caule tetragono rectangulo. *Suppl. p.* 285.

hirta. 10. S. hirta, ſpicis longiſſimis, foliis obovatis. *Suppl. p.* 285.

genicula-ta. 11. S. ſpicis terminalibus, foliis linearibus faſciculatis glabris: margine reflexo. *Suppl. p.* 284.

triquetra. 12. S. ſpicis terminalibus, foliis triquetris imbricatis recurvato-reflexis glabris. *Suppl. p.* 284.

hiſpida. 13. S. ſpicis terminalibus, foliis linearibus ſparſis reflexis hiſpidis. *Suppl. p.* 284.

polyga-loides. 14. S. ſpicis terminalibus: bracteis calicibusque carinatis, foliis linearibus glabris: margine reflexo. *Suppl. p.* 284.

15. S.

canescens. 15. S. spicis terminalibus, foliis filiformibus fasciculatis glabris. *Suppl. p.* 284.

ciliata. 16. S. floribus spicatis, foliis ovatis ciliatis acutis. *Suppl. p.* 285.

divaricata. 17. S. capitulis terminalibus, foliis filiformi-linearibus fasciculatis glabris. *Suppl. p.* 284.

fruticosa. 18. S. capitulis subrotundis terminalibus, foliis sparsis linearibus obtusis integerrimis, caule fruticoso. *Mant. p.* 87.

capitata. 19. S. capitulo terminali, foliis fasciculatis linearibus carnosis glabris. *Mant. p.* 568. *an cum universo genere gymnospermis accensenda?*

1264. MANULEA.

Cal. 5partitus. *Cor.* subinfundibuliformis: limbo 5partito; laciniis subulatis, superioribus 4 magis connexis. *Caps.* 2locularis, polysperma.

Cheiranthus. 1. M. foliis nudis, caulibus subaphyllis, pedicellis alternis unifloris. *Mant. p.* 88.

tomentosa. 2. M. foliis tomentosis, caulibus foliosis, pedunculis multifloris. *Mant. p.* 420. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 419. Selago tomentosa.

microphylla. 3. M. foliis ovatis fasciculatis glabris integris. *Suppl. p.* 285.

integrifolia. 4. M. foliis ovatis sparsis glabris integris. *Suppl. p.* 285.

plantaginis. 5. M. foliis ovatis subdentatis integrisque glabris, capitulis ovatis, ramis diffusis. *Suppl. p.* 285.

capitata. 6. M. foliis ovatis serratis villosis, capitulis globosis, ramis diffusis. *Suppl. p.* 285.

antirrhinoides. 7. M. foliis ovatis dentatis glabris, floribus alternis. *Suppl. p.* 285.

pinnatifida. 8. M. foliis ovatis inciso-pinnatifidis: pinnis dentatis. *Suppl. p.* 286.

cuneifolia. 9. M. foliis elliptice ovatis glabris dentatis, spicis oblongis. *Suppl. p.* 285.

thyrſiflo-ra. 10. M. foliis obovatis tomentoſis dentatis, corymbo terminali elongato compoſito. *Suppl. p.* 285.

argentea. 11. M. foliis obovatis cuneiformibus ſerratis argenteo-punctatis, floribus axillaribus. *Suppl. p.* 286.

capillaris. 12. M. foliis caulinis obovatis glabris dentatis; rameis linearibus, ſpicis ovatis. *Suppl. p.* 285.

hetero-phylla. 13. M. foliis linearibus ſparſis villoſis integris dentatisve. *Suppl. p.* 285.

caerulea. 14. M. foliis linearibus oppoſitis tomentoſis dentatis, floribus racemoſis. *Suppl. p.* 285.

corymbo-ſa. 15. M. foliis oblongis dentatis glabris, corymbo faſtigiato. *Suppl. p.* 286.

altiſſima. 16. M. foliis lanceolatis ſubdentatis villoſis, ſpica ovata. *Suppl. p.* 286.

rubra. 17. M. foliis lanceolatis villoſis ſerratis, floribus racemoſis remotis. *Suppl. p.* 286.

770. HEBENSTREITIA. *Cal.* ſubtus longitudinaliter dehiſcens. *Cor.* 1-labiata: labio extrorſum ampliato apice trilobo; lobo medio 2fido, lateralibus emarginatis. *Stamina* margini limbi corollae inſerta. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, 2-ſperma.

dentata. 1. H. foliis linearibus dentatis, ſpicis laevibus. *Burm. afr. t.* 41. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 3. *t.* 51. *f.* 5.

integrifo-lia. 2. H. foliis linearibus integerrimis.

ciliata. 3. H. foliis linearibus dentatis, calicibus trivalvibus ciliatis. *Mant. p.* 420.

cordata. 4. H. foliis ſubcarnoſis cordatis ſeſſilibus. *Mant. p.* 420.

5. H.

erinoides. 5. H. foliis oblongis ferratis piloſis, bracteis integris hiſpidis. *Suppl. p.* 286.

fruticoſa. 6. H. foliis lanceolatis dentatis glabris, bracteis integris, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 287.

771. ERINUS. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* inaequalis: limbo 5partito ſubaequali, laciniis obcordatis. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

alpinus. 1. E. floribus racemoſis, foliis ſpatulatis. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 5. *Bulliard herb. Franc. t.* 5.

africanus. 2. E. floribus lateralibus ſeſſilibus, foliis lanceolatis ſubdentatis. *Burm. afr. t.* 50. *f.* 1.

maritimus. 3. E. foliis lanceolatis integerrimis glabris, limbi laciniis ſemibifidis. *Suppl. p.* 287.

Lychnidea. 4. E. foliis lanceolatis ferratis, limbi laciniis ſemibifidis. *Suppl. p.* 287. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 419. Selago lychnidea.

peruvianus. 5. E. foliis lanceolato-ovatis ferratis. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 25. *f.* 3.

triſtis. 6. E. foliis oblongis inciſis dentatis. *Suppl. p.* 287.

capenſis. 7. E. foliis linearibus dentatis, floribus ſpicatis. *Mant. p.* 252. *Burm. afr. t.* 49. *f.* 4. *an idem cum lychnidea?*

laciniatus. 8. E. foliis laciniatis. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 35. *t.* 25.

772. BUCHNERA. *Cal.* obſolete 5dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5-fido aequali; laciniis 3 infimis cordatis. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

americana. 1. B. foliis dentatis lanceolatis trinerviis. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 2.

cernua. 2. B. foliis cuneatis quinquedentatis glabris, floribus ſpicatis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 251.

cuneifolia. 3. B. foliis cuneiformibus glabris apice ſeptemdentatis. *Suppl. p.* 288.

cordifolia. 4. B. caule tetragono, foliis oppositis cordatis trinerviis serratis, racemis terminalibus subspicatis. *Suppl. p.* 287.

grandiflora. 5. B. scabra, foliis oppositis sessilibus oblongis integris, pedunculis axillaribus unifloris diphyllis, calice infundibuliformi. *Suppl. p.* 287.

elongata. 6. B. foliis integris oppositis, calicibus subpilosis capsula longioribus. *Aubl. pl. guj. p.* 627. *t.* 253. Peripea palustris.

aethiopica. 7. B. foliis tridentatis, floribus pedunculatis, caule fruticoso. *Mant. p.* 251.

capensis. 8. B. foliis dentatis linearibus, calicibus pubescentibus. *Mant. p.* 88. *Burm. afr. t.* 50. *f.* 2.

coccinea. 9. B. foliis oblongis crenatis villosis. *Scop. del. inf.* 2. *p.* 10. *t.* 5.

asiatica. 10. B. foliis integerrimis linearibus, calicibus scabris.

pinnatifida. 11. B. foliis pinnatifidis glabris. *Suppl. p.* 288.

773. BROWALLIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5fido, umbilico clauso antheris 2 majoribus. *Capf.* 2locularis, apice 4valvis. *Semina* parva, angulata.

demissa. 1. Br. pedunculis unifloris. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 100. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 4.

elata. 2. Br. pedunculis unifloris multifloriscque.

humifusa. 3. Br. hispida prostrata, floribus axillaribus sessilibus. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 112.

alienata. 4. Br. foliis superioribus oppositis, staminibus duobus longitudine corollae. *Mill. h. angl. t.* 69.

774. LINNAEA. *Cal.* duplex: fructus 4phyllus; floris 5partitus superus. *Cor.* campanulata. *Bacca* sicca, 3locularis.

borealis. 1. LINNAEA. *Flor. dan. t.* 3.

775. SIBTHORPIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata, 5partita. *Stamina* paribus remotis. *Capſ.* compreſſa, orbiculata, 2locularis: diſſepimento transverſo. *Semina* pauca.

europaea. 1. S. foliis reniformi-ſubpeltatis crenatis. *Mant. p.* 421. *Pluckn. alm. t.* 7. *f.* 6. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 6.

africana. 2. S. foliis orbiculatis integris crenatis, pedunculis ſolitariis; *an hujus generis?*

776. LIMOSELLA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5fida aequalis. *Stamina* per paria approximata. *Germen* 2loculare. *Capſ.* ſubunilocularis, 2valvis, polyſperma.

aquatica. 1. L. foliis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 69. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 3. *t.* 50. *f.* 3.

diandra. 2. L. foliis ſublinearibus. *Mant. p.* 252.

calicina. 3. L. calice exteriore parvo diphyllo: interiore pentaphyllo, corolla campanulata ſubaequali. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 112. *an hujus generis?*

1265. VANDELLIA. *Cal.* quadripartitus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2 exteriora e diſco labii corollae. *Antherae* per paria connexae. *Capſ.* 1locularis, polyſperma.

diffuſa. 1. VANDELLIA. *Mant. p.* 89.

777. STEMODIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ſubbilabiata. *Stamin.* 4: filamentis ſingulis 2fidis, 2antheris. *Capſ.* 2locularis. *Semina* minutula.

maritima. 1. St. foliis ſeſſilibus denticulatis haſtatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 48.

ruderalis. 2. St. foliis petiolatis ſerratis ovatis. *Koenig apud Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 25.

778. OBOLARIA. *Cal.* bracteae 2. *Cor.* 4fida, campanulata. *Stamina* ex diviſuris corollae. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, polyſperma.

virginica. 1. Obolaria. *Pluckn. alm. t.* 209. *f.* 6. *β*) Obolaria caroliniana. *Walt. flor. carol. p.* 166.

779. OROBANCHE. *Cal.* ſubbifidus. *Cor.* ringens. *Glandula* ſub baſi germinis. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, polyſperma.

purpurascens. 1. O. caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus incluſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 276. *an ſatis diſtincta a laevi?*

major. 2. O. caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexſertis. *Curt. flor. Lond. t.* 232.

foetida. 3. O. caule ſimpliciſſimo pubeſcente, antheris exſertis muronato-ſpinoſis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 195.

laevis. 4. O. caule ſimpliciſſimo laevi, ſtaminibus exſertis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 16. *f.* 2.

tinctoria. 5. O. caule ſimpliciſſimo bracteis imbricato, floribus ſpirali ductu caulem cingentibus: corollae limbo quinquefido. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 112.

americana. 6. O. caule ſimpliciſſimo, foliis imbricato, corollis recurvatis, ſtaminibus exſertis. *Mant. p.* 88.

cernua. 7. O. caule ſimpliciſſimo, nudiuſculo, corollis recurvatis, bractea ovata longioribus.

8. O.

Aegine-tia. 8. O. caule unifloro, flore ſubſpathaceo. *Rheed. h. malab.* 11. *t.* 47.

uniflora. 9. O. caule unifloro, calice nudo. *Pluckn. mant. t.* 348. *f.* 3.

crenata. 10. O. caule ſimplici villoſo, corolla quinqueloba denticulato-crenata ſtamina includente. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 113.

purpurea. 11. O. caule ſimplici ramoſoque, corollis quadrifidis, ſtaminibus calcaratis. *Suppl. p.* 288.

ramoſa. 12. O. caule ramoſo, corollis quinquefidis. *Bull. herb. Franc. t.* 399.

virginiana. 13. O. caule ramoſo, corollis quadridentatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 16. *f.* 9.

1317. HYOBANCHE.

Cal. 7phyllus. *Cor.* ringens: labio inferiori 0. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

ſanguinea. 1. HYOBANCHE. *Mant. p.* 253. *Pet. gaz. t.* 37. *f.* 4.

780. DODARTIA.

Cal. 5dentatus. *Cor.* ringens: labio inferiori duplo longiori. *Stigma* 2fidum. *Capſ.* ſubgloboſa, 2locularis. *Semina* plura, angulata.

orientalis. 1. D. foliis linearibus integerrimis glabris. *Mill. h. angl. t.* 127. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 3.

indica. 2. D. foliis ovatis ſerratis villoſis.

781. LIPPIA.

Cal. 4dentatus, ſeminibus maturis 2-valvis. *Cor.* ſubinfundibuliformis, 4fida. *Sem.* 2 oſſea, calice corticata.

americana. 1. L. capitulis pyramidatis. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 2.

hemiſphaerica. 2. L. capitulis hemiſphaericis. *Mant. p.* 89. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 179. *f.* 100.

ovata. 3. L. capitulis ovatis, foliis linearibus integerrimis. *Mant. p.* 89. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 3. *t.* 51. *f.* 2. *Distincti prorsus generis.*

hirsuta. 4. L. hirsuta, foliis oblongis satis rugosis serratis subtus tomentosis, paniculis axillaribus, capitulis ovatis. *Suppl. p.* 288.

cymosa. 5. L. floribus cymosis, foliis ovatis subintegris. *Sloane hist. jam.* 2. *p.* 30. *t.* 174. *f.* 3. 4. *Nonne potius cum universo genere ad gymnosperma amandanda?*

DOMBEYA. *Cal.* 2labiatus. *Cor.* 1labiata: labio concamerato. *Capf.* 4locularis, turgida. *Semina* pauca, imbricata, marginata.

lappacea. 1. Dombeya. *Herit. nov. stirp.* 2. *p.* 133. *t.* 17.

782. SESAMUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata, 5fida: lacinia infima paulo longiore. *Rudimentum* filamenti 5ti. *Stigma* lanceolatum. *Capf.* 4locularis.

prostratum. 1. S. caule depresse diffuso, foliis orbiculatis crenatis hispidis. *Pluckn. amalth. t.* 373. *f.* 2.

orientale. 2. S. foliis ovato-oblongis integris. *Burm. zeyl. t.* 38. *f.* 1.

javanicum. 3. S. foliis lanceolatis serratis sessilibus. *Burm. ind. p.* 133. *Rheede h. malab.* 9. *t.* 37.

indicum. 4. S. foliis inferioribus trifidis. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 76. *f.* 1.

783. MIMULUS. *Cal.* prismaticus, 4-5dentatus. *Cor.* ringens: labio superiore lateribus reflexo. *Capf.* ovalis, 2locularis, apice dehiscens, polysperma.

ringens. 1. M. erectus, foliis oblongis linearibus sessilibus. *Pluckn. phyt.* 393. *f.* 3. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 2.

2. M.

alatus. 2. M. erectus, foliis ovatis petiolatis, caule tetragono alato. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 361.

luteus. 3. M. repens, foliis ovatis. *Feuill. peruv.* 2. *t.* 34.

784. RUELLIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* irregularis. *Stamina* per paria approximata. *Stigma* 2fidum. *Capſ.* 2locularis. *Semina* 3na-4na: reticulis uncinulatis.

Blechum. 1. R. foliis ovatis integerrimis, ſpicis ovatis: bracteis interioribus geminis, floribus binis ſeſſilibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 109. *f.* 1.

rubra. 2. R. foliis ovato-oblongis ſinuatis glabris ſeſſilibus, corymbis axillaribus pedunculatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 666. *t.* 270.

violacea. 3. R. foliis ovato-oblongis acutis tomentoſis ſubſinuatis ſubpetiolatis, pedunculis ſolitariis unifloris alternatim axillaribus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 668. *t.* 271.

blechioides. 4. R. foliis oblongis ſubdentatis glabris, ſpicis ovatis; floribus bracteis longioribus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 93.

alternata. 33. R. foliis oblongis cordatis crenatis petiolatis, ſpicis alternis foliofis: bracteis crenatis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 13. *f.* 2. 3.

anguſtifolia. 5. R. foliis lineari-lanceolatis, ſpicis oblongis: bracteis ovatis hirſutis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 93.

repanda. 6. R. foliis lanceolatis obtuſe dentatis petiolatis, caule repente. *Burm. ind. t.* 40. *f.* 2.

repens. 7. R. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, floribus ſeſſilibus, bracteis petiolatis calice longioribus, caule repente. *Mant. p.* 89. *Burm. ind. t.* 41. *f.* 1.

Anagallis. 34. R. foliis lanceolatis ſerratis, caule procumbente, floribus axillaribus ſolitariis. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 170. *f.* 2.

guttata. 8. R. foliis ovato-lanceolatis, ſpicis terminalibus imbricatis: bracteis ternis calice longioribus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 114.

criſpa. 9. R. foliis lanceolato-ovatis ſubcrenatis, capitulis ovatis foliofis hiſpidis, caule repente.

adhaerens. 10. R. foliis ovatis acutis petiolatis profunde crenatis ſubtus hiſpidis, ſpicis terminalibus: floribus ſubſeſſilibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 114.

longiflora. 36. R. foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus solitariis longissimis, caule fruticoso. *Vahl. symb. bot.* 4. *p.* 45. *t.* 15.

pilosa. 11. R. foliis ovatis oppositis integris ciliatis, floribus terminalibus solitariis. *Suppl. p.* 290.

tuberosa. 12. R. foliis ovatis crenatis, pedunculis unifloris. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 95. *f.* 1.

patula. 13. R. fruticosa villosa viscosa, foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus aggregatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 41.

erecta. 35. R. foliis ovalibus integerrimis, caule erectiusculo, floribus axillaribus sessilibus. *Burm. ind. t.* 41. *f.* 3.

paniculata. 14. R. foliis integerrimis, pedunculis dichotomis lateralibus, calicibus sessilibus: lacinia suprema majore. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 100. *f.* 2.

ringens. 15. R. foliis oblongis integerrimis, floribus solitariis sessilibus, caule procumbente. *Vog. suppl. pl. Ehr. sel. t.* CX.

uliginosa. 16. R. diffusa hirsuta, foliis sessilibus oblongis integris, spicis terminalibus tetragonis. *Suppl. p.* 290.

fragrans. 17. R. foliis sessilibus oblongis obtuse serratis, floribus axillaribus solitariis sessilibus. *Forst. flor. austr. p.* 44.

reptans. 18. R. foliis petiolatis ovatis obtusis obtuse serratis, pedunculis terminalibus subspicatis. *Forst. flor. austr. p.* 44.

fasciculata. 19. R. decumbens, foliis petiolatis lanceolatis dentatis oppositis: alterno minore, floribus fasciculatis. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 4. *p.* 28.

balsamica. 20. R. erecta glabra, foliis petiolatis lanceolatis serratis, verticillis sessilibus. *Suppl. p.* 289.

strepens. 21. R. foliis petiolatis, pedunculis trifloris brevibus. *Mant. p.* 422. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 92. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 3.

clandestina. 22. R. foliis petiolatis, pedunculis longis subdivisis nudis. *Dill. h. Eltb. t.* 248. *f.* 320.

depressa. 23. R. foliis petiolatis oppositis obovatis integris, caule arcte depresso. *Suppl. p.* 290.

tentaculata. 24. R. foliis obovatis, verticillis obvallatis spinis inermibus bifurcatis. *Pluckn. phyt.* 279. *f.* 7.

japonica. 25. R. foliis ellipticis, floribus spicatis: bracteis oblongis obtusis. *Thunb. flor. jap. p.* 254.

26. R.

littoralis. 26. R. fruticosa cana, foliis cuneiformibus serratis glabris, floribus axillaribus solitariis subsessilibus. *Suppl. p.* 289.

antipoda. 27. R. foliis mucronato-serratis, caule repente, floribus subspicatis terminalibus quinis ternisve. *Mant. p.* 422. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 170. *f.* 2.

difformis. 28. R. diffusa hirsuta, foliis linearibus dentato-sinuatis integris, floribus verticillatis axillaribus. *Suppl. p.* 289. *Rheede h. mal.* 2. *t.* 46.

imbricata. 29. R. floribus in axillis foliorum summorum congestis secundis sessilibus: bractea obliqua subrotunda. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 113.

biflora. 30. R. floribus geminis subsessilibus.

intrusa. 31. R. foliis petiolatis ovatis pilosis, floribus spicatis secundis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 113.

acaulis. 32. R. foliis petiolatis oblongis crenato-undulatis, scapis erectis multifloris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 93.

785. BARRELIERA.

Cal. 4partitus: laciniis 2 majoribus. *Stam.* 2 longe minora. *Stigm.* 2fidum. *Capf.* angulata, 2locularis. *Semina* gemina: retinaculis uncinatis.

longifolia. 1. B. spinis verticillorum senis, foliis ensiformibus longissimis scabris. *Pluckn. alm. t.* 133. *f.* 4.

solanifolia. 2. B. spinis axillaribus, foliis lanceolatis denticulatis. *Plum. ic.* 43. *f.* 2.

Hystrix. 3. B. spinis axillaribus geminis simplicibus, foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *Mant. p.* 89. *Seb. mus.* 1. *t.* 13. *f.* 1.

acanthoides. 13. B. spinis axillaribus geminis foliaceis, spicis axillaribus secundis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 47.

Prionitis. 4. B. spinis axillaribus pedatis quaternis, foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 41.

buxifolia. 5. B. spinis axillaribus oppositis solitariis, foliis subrotundis integerrimis. *Rheed. h. malab.* 2. *t.* 47.

6. B.

noctiflora. 6. B. spinis axillaribus ramosis, foliis lanceolatis integerrimis cuspidatis, bracteis ovatis scariosis, tubo elongato. *Suppl. p.* 290.

trispinosa. 14. B. spinis axillaribus compositis triradiatis, spicis terminalibus imbricatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 6. Justicia trispinosa.

bispinosa. 15. B. spinis axillaribus biradiatis floriferis, foliis ovatis subtus pilosis. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 6. Justicia bispinosa.

cristata. 7. B. foliis oblongis integerrimis, calicis laciniis duabus latioribus ciliatis, duabusque linearibus acutis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 23. *f.* 7.

coccinea. 8. B. inermis, foliis ovatis denticulatis petiolatis. *Plum. ic.* 43. *f.* 1.

nitida. 9. B. inermis, foliis ovatis acuminatis integerrimis utrinque nitidis. *Jacq. stirp. amer.*

pungens. 10. B. inermis, foliis ovatis acutis pungentibus, bracteis ciliatis. *Suppl. p.* 290.

longiflora. 11. B. inermis, foliis ovatis sericeis, bracteis cordatis scariosis, corollis longissimis. *Suppl. p.* 290. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 2?

hirsuta. 12. B. inermis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis, caule hirsuto. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 192.

786. DURANTA.

Cal. 5fidus. *Cor.* infundibuliformis, 5fida. *Drupa* 1locularis, 4pyrena: ossiculis 2locularibus.

Plumieri. 1. D. calicibus fructiferis contortis. *Plum. ic.* 79. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 53. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 4. *t.* 57. *f.* 3.

Ellisia. 2. D. calicibus fructiferis erectis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 179.

Mutisii. 3. D. foliis ellipticis integerrimis. *Suppl. p.* 291.

787. OVIEDA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* ſupera, tubo longiſſimo; limbo 3lobo. *Bacca* 1locularis, 4pyrena: *officula* 1-locularia.

ſpinoſa. 1. O. foliis ovalibus dentatis. *Plum. ic.* 256.

mitis. 2. O. foliis lanceolatis ſubrepandis. *Burm. ind. t.* 40. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 57. *f.* 2.

1406. MILLINGTONIA. *Cal.* margine 5dentatus, reflexus. *Cor.* longiſſima: limbo 4partito. *Antherae* 2partitae, vaginantes. *Capſula* ſiliquoſa.

hortenſis. 1. MILLINGTONIA. *Suppl. p.* 291.

788. VOLKAMERIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* ringens, 5partita: laciniis ſecundis. *Stigm.* 2fidum. *Drupa* 2-pyrena: officulis 2locularibus.

aculeata. 1. V. ſpinis petiolorum rudimentis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 177. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 3.

inermis. 2. V. ramis inermibus, foliis floribusque ſubternis. *Pet. gaz. t.* 42. *f.* 7. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 57. *f.* 1. *an Clerodendri ſpecies?*

ſerrata. 3. V. inermis, foliis lato-lanceolatis ſerratis ſeſſilibus. *Mant. p.* 90.

ſcandens. 4. V. inermis, foliis petiolatis cordatis ovatis integerrimis, panicula corymboſa terminali: ramulis dichotomis. *Suppl. p.* 292.

japonica. 5. V. inermis, foliis cordatis ovatis acutis dentatis, racemis ſecundis. *Thunb. flor. jap. p.* 255.

Kaempferi. 6. V. inermis, foliis cordatis acutis ſubintegerrimis, panicula terminali erecta. *Jacq. coll.* 3. *p.* 207. *Banks ic. Kaempf. t.* 58.

789.

789. CLERODENDRUM. *Cal.* 5partitus, campanulatus. *Cor.* irregularis: tubo filiformi; limbo 5partito aequali. *Stamina* longissima inter corollae lacinias hiantes. *Bacca* 1locularis, 4pyrena: *Officula* 1locularia.

infortunatum. 1. Cl. foliis cordatis tomentosis. *Rumpf. amb.* 4. *t.* 49. *β*) *Burm. zeyl. t.* 29.

fortunatum. 2. Cl. foliis lanceolatis integerrimis. *Osb. it. t.* 11.

Phlomidis. 3. Cl. foliis ovatis serratis canis. *Suppl. p.* 292.

calamitosum. 4. Cl. foliis ovalibus subdentatis nudis. *Mant. p.* 90. *Burm. ind. t.* 44.

paniculatum. 5. Cl. foliis lobatis serratis, panicula amplissima. *Mant. p.* 90. *Burm. ind. t.* 45. *f.* 1.

trichotomum. 6. Cl. foliis ovatis indivisisque lato-ovatis integris, panicula trichotoma. *Thunb. flor. jap. p.* 256. *Banks ic. Kaempf. t.* 22.

790. VITEX. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* ringens, 2labiata. *Stigm.* 2. *Drupa* baccata: putamine 4loculari. *Sem.* solitaria.

ovata. 1. V. foliis simplicibus ovatis. *Suppl. p.* 294. *Thunb. flor. jap. p.* 257.

altissima. 2. V. foliis ternatis integerrimis, panicula verticillata, bacca trisperma. *Suppl. p.* 294.

divaricata. 3. V. foliis ternatis integerrimis utrinque glabris, panicula dichotoma divaricata. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p.* 93.

trifolia. 4. V. foliis ternatis quinatisque: foliolis ovatis acutis integerrimis subtus canescentibus, panicula rhachi recta: pedicellis dichotomis. *Suppl. p.* 293. *Rumpf. amb.* 4. *t.* 18.

5. V.

Negundo. 5. V. foliis quinatis ternatisque ſerratis, floribus racemoſo-paniculatis. *Mill. ic.* 275. *f.* 1. 2.

umbroſa. 6. V. foliis quinatis integerrimis utrinque glabris, racemis compoſitis axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 93.

Leucoxylon. 7. V. foliis digitatis quinatis: foliolis petiolatis oblongis integerrimis, paniculis dichotomis, bacca monoſperma. *Suppl. p.* 293.

Agnus caſtus. 8. V. foliis digitatis ſerratis, ſpicis verticillatis. *Blackw. herb. t.* 139. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 7.

ſinuata. 9. V. foliis digitatis ſinuatis, verticillis pedunculatis corymboſis cauli adpreſſis. *Medic. act. Palat.* 4. *phyſ. p.* 202. *t.* 8.

pinnata. 10. V. foliis pinnatis integerrimis, paniculis trichotomis. *Burm. ind. t.* 43. *f.* 2.

791. BONTIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 2labiata: labio inferiori ſemitrifido, revoluto. *Drupa* ovata, 1ſperma: apice obliquo.

daphnoides. 1. B. foliis alternis, pedunculis unifloris. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 161. *f.* 57.

1237. AVICENNIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 2labiata: labio ſuperiore quadrato. *Capſ.* coriacea, rhomboidea, 1ſperma.

tomentoſa. 1. A. foliis cordato-ovatis ſubtus tomentoſis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 46.

reſinifera. 2. A. foliis ovato-lanceolatis ſubtus tomentoſis. *Forſt. pl. eſcul. p.* 44. *flor. auſtr. p.* 45.

nitida. 3. A. foliis lanceolatis utrinque nitidis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 169.

792. COLUMNEA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens: labio ſuperiori ſaepe 3partito; laeinia intermedia fornicata ſupra baſin gibba. *Antherae* connexae. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* nidulantia.

ſcandens. 1. C. foliis ovatis acutis integris ſubvilloſis, calicis foliolis integris corollisque pubeſcentibus: labio ſuperiori indiviſo. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 48.

hirſuta. 2. C. foliis ovatis acuminatis ſuperne hirtis, calicis foliolis denticulatis lanceolatis corollisque hirſutis: labio ſuperiori bifido. *Brown. hiſt. jam. t.* 30. *f.* 3.

hiſpida. 3. C. foliis ovatis obtuſis denticulatis hiſpido-hirſutis, calicis foliolis lanceolatis integris piloſis, caule piloſo ſcabro. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 94.

rutilans. 4. C. foliis ovato-lanceolatis villoſis denticulatis, calicis foliolis laciniatis, corollis villoſis: labio ſuperiori bipartito. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 94.

longifolia. 5. C. foliis lanceolatis longiſſimis ſubſerratis glabris. *Mant. p.* 90. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 87.

793. ACANTHUS. *Cal.* foliolis trium parium alternantium. *Cor.* 1labiata, plana, 3loba. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* ſolitaria: retinaculis uncinatis.

mollis. 1. A. foliis ſinuatis inermibus. *Blackw. herb. t.* 89. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 1.

arboreus. 2. A. foliis ſinuato-dentatis ſpinoſis glabris, caule fruticoſo. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 115.

carduifolius. 3. A. foliis ſerrato-dentatis ſpinoſis, ſpica florum radicali. *Suppl. p.* 294.

ſpinoſus. 4. A. foliis pinnatis ſpinoſis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 14.

edulis. 5. A. foliis quaternis lineari-lanceolatis dentato-ſpinuloſis, caule ſcuticuloſo. *Mant. p.* 89. Ruellia ciliaris, *Burm. fl. ind. t.* 42. *f.* 1.

6. A.

Dioſcoridis. 6. A. foliis lanceolatis integerrimis margine ſpinoſis.

ilicifolius. 7. A. foliis repandis dentato-ſpinoſis, caule fruticoſo aculeato. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 71.

integrifolius. 8. A. foliis oblongis integris, caule herbaceo procumbente. *Suppl. p.* 294.

procumbens. 9. A. foliis oblongis ſerrato-ciliatis, caule procumbente fruticoſo. *Suppl. p.* 294.

furcatus. 10. A. foliis oblongis dentato-ſpinoſis, caule fruticoſo, bracteis ſpina trifurcata terminatis. *Suppl. p.* 295.

capenſis. 11. A. foliis oblongis dentato-ſpinoſis, caule fruticoſo erecto, bracteis ſpina ſimplici terminatis. *Suppl. p.* 295.

maderaſpatenſis. 12. A. foliis quaternis, floribus axillaribus: calicibus ciliatis. *Burm. ind. t.* 42. *f.* 2.

794. PEDALIUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ſubringens: limbo 5fido. *Drupa* corticoſa, 4ſpinoſa, 2locularis. *Sem.* ſolitaria, arillata.

Murex. 1. PEDALIUM. *Burm. ind. t.* 45. *f.* 2. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 58. *f.* 1.

1409. AMASONIA. *Cal.* campanulatus, ſemiquinquefidus. *Cor.* tubuloſa: limbo parvo 5fido. *Nux* ovata, 1locularis.

erecta. 1. AMASONIA. *Suppl. p.* 294.

TAMONEA. *Cal.* 5ariſtatus. *Cor.* ringens: limbo 5fido. *Nux* carnoſa, 4locularis. *Sem.* ſolitaria.

mutica. 1. TAMONEA. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 94. *Aublet pl. guj.* 2. *p.* 660. *t.* 268.

GEVUINA. *Cal.* o. *Cor.* 4petala. *Capſ.* coriacea, 1locularis.

Avellana. 1. GEVUINA. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 159.

795. MELIANTHUS. *Cal.* 5partitus: lacinia infima gibba. *Petala* 4: nectario infra infima. *Capſ.* 4locularis.

major. 1. M. ſtipulis ſolitariis petiolo adnatis. *Mill. illuſtr. ic.*

minor. 2. M. ſtipulis geminis diſtinctis. *Commel. rar. t.* 4.

CLAS-

CLASSIS XIV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

* *ſilicula apice non emarginata.*

800. DRABA. *Silic.* valvis planiuſculis. *Stilus* 0.
MOENCHIA. *Silic.* ovata, ſtilo coronata: valvis convexiuſculis.
809. LUNARIA. *Silic.* valvis planis, pedicellata. *Stilus* exſertus.
799. SUBULARIA. *Silic.* valvis ſemiovatis. *Stilus* ſilicula brevior.
796. MYAGRUM. *Silic.* valvis concavis. *Stilus* perſiſtens.
797. VELLA. *Silic.* valvis diſſepimento dimidio brevioribus.

** *Silicula apice emarginata.*

804. IBERIS. *Petala* 2 exteriora majora.
805. ALYSSUM. *Filamenta* quaedam latere interiore dente notata. *Silicula* 2locularis.
807. CLYPEOLA. *Silicula* orbiculata, decidua: valvis planis.
806. PELTARIA. *Silicula* orbiculata, compreſſo-plana, non dehiſcens.
803. COCHLEARIA. *Silicula* cordata: valvis obtuſis gibbis.
801. LEPIDIUM. *Silicula* cordata: valvis acute carinatis.
802. THLASPI. *Silicula* obcordata: valvis marginato-carinatis.
808. BISCUTELLA. *Silicula* biloba ſupra infraque: margine carinato.
798. ANASTATICA. *Silicula* retuſa: valvis diſſepimento mucronato longioribus.

SILIQUOSAE.

* *calice clauſo: foliolis longitudinaliter conniventibus.*

822. RAPHANUS. *Siliqua* articulata.
MNEMOSILLA. *Siliqua* toroſo-articulata, articulatim decidua.
814. ERYSIMUM. *Siliqua* tetragona.
CHAMIRA. *Cal.* baſi cornutus. *Glandul.* extra ſtamina breviora.
815. CHEIRANTHUS. *Germen* utrinque glandula notatum.
817. HESPERIS. *Glandulae* intra ſtamina breviora. *Petala* obliqua.

818. ARABIS. *Glandulae* 4 intra foliola calicina. *Stigma* simplex.
820. BRASSICA. *Glandulae* 2 intra ſtamina breviora, 2 extra ſtamina longiora.
819. TURRITIS. *Petala* erecta.
811. DENTARIA. *Siliqua* valvis revoluto-dehiſcentibus.
810. RICOTIA. *Siliqua* unilocularis.

** *calice hiante: foliolis ſuperne diſtantibus.*

825. CRAMBE. *Siliqua* decidua, globoſa, ſicco-baccata. *Filamenta* 4 apice 2 furca.
824. ISATIS. *Siliqua* decidua, lanceolata, monoſperma.
823. BUNIAS. *Siliqua* decidua, ſubrotunda, muricata.
826. CLEOME. *Siliqua* dehiſcens, 1locularis.
812. CARDAMINE. *Siliqua* dehiſcens: valvis revolutis.
827. SINAPIS. *Siliqua* dehiſcens. *Cal.* horizontaliter patens.
813. SISYMBRIUM. *Siliqua* dehiſcens: valvis rectiuſculis. *Cal.* patulus.
816. HELIOPHILA. *Siliqua* dehiſcens. *Nectaria* 2 recurvata.

SILICULOSA.

796. MYAGRUM. *Silicula* evalvis ſtilo conico terminata: loculo ſubmonoſpermo.

perenne. 1. M. ſiliculis biarticulatis monoſpermis, foliis extrorſum ſinuatis denticulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 414.

orientale. 2. M. ſiliculis ſulcatis laevibus, foliis oblongis dentato-ſinuatis.

rugoſum. 3. M. ſiliculis ſulcatis piloſis rugoſis, foliis oblongis obtuſis dentatis.

rigidum. 4. M. ſiliculis didymis ſeſſilibus ſulcatis piloſiſſimis biloculari-bus diſpermis, foliis ovali-oblongis dentatis. *Pallas it.* 3. *p.* 741. *t.* Ll. *f.* 1. *et t.* Mm. *f.* 2.

hiſpanicum. 5. M. ſiliculis laevibus ſubtoroſis, foliis lyratis.

auſtriacum. 6. M. ſiliculis ſubrotundis glabris, foliis oblongis amplexicaulibus, radice repente. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 111.

perfoliatum. 7. M. ſiliculis obcordatis ſubſeſſilibus, foliis amplexicaulibus. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 3. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 13.

paniculatum. 8. M. ſiliculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugoſis. *Flor. dan. t.* 204. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 9. *an diſtincti generis?*

ſaxatile. 9. M. ſiliculis lentiformibus obovatis glabris, foliis petiolatis oblongis ſerratis ſcabris, caule paniculato. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 128.

aegyptium. 10. M. ſiliculis angulatis, foliis tripartitis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 4.

797. VELLA. *Silicula* ſ. potius *Antrum* ſiliquoſum globoſum diſſepimento valvis duplo majore extrinſecus in laminam cochleariformem producto.

annua. 1. V. foliis pinnatifidis, ſiliculis pendulis. *Trew. ic.* 10. *t.* 8. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 8. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 10.

Pſeudo-cytiſus. 2. V. foliis integris obovatis ciliatis, ſiliculis erectis. *Lob. ic.* 2. *p.* 49.

tenuiſſima. 3. V. foliis lanceolatis obtuſis margine piloſis, ſiliculis remotiſſimis. *Pallas it.* 3. *p.* 740. *t.* U. *f.* 2.

798. ANASTATICA. *Silicula* ſ. potius *Antrum* ſiliquoſum ſubgloboſum retuſum margine coronatum, valvis diſſepimento duplo longioribus, *ſtilo* intermedio mucronato obliquo, loculis 1-ſpermis.

Hierochuntica. 1. A. foliis obtuſis, ſpicis axillaribus breviſſimis, ſiliculis ungulatis ſpinoſis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 58. *Gaertn. de fruct. et ſem. pl.* 9. *t.* 141. *f.* 11.

Syriaca. 2. A. foliis acutis, ſpicis folio longioribus, ſiliculis ovatis roſtratis. *Mant. p.* 424. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 4. *Gaertn. de fr. et ſem. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 11. *an potius* *buniades ſpecies?*

799. SUBULARIA. *Silicula* integra, ovata: valvis ovatis, concavis, diſſepimento contrariis. *Stilus* ſilicula brevior.

aquatica. 1. S. foliis teretiuſculis. *Flor. dan. t.* 53.

purpurea. 2. S. foliis cordato-oblongis ſubdentatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 117.

800. DRABA. *Silicula* integra, elliptico-oblonga compreſſiuſcula: valvis planiuſculis diſſepimento parallelis. *Stilus* o.

verna. 1. Dr. ſcapis nudis, foliis ſubſerratis. *Curt. flor. Lond. t.* 7. *Gaertn. de fr. et ſem. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 11.

2. Dr.

pyrenaica. 2. Dr. ſcapo nudo, foliis cuneiformibus palmatis trilobis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 228.

alpina. 3. Dr. ſcapo nudo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis. *Flor. dan. t.* 56.

carolinia-na. 9. Dr. ſcapo nudo ſimplici laevi, foliis hirſutis ovatis. *Walt. flor. carol. p.* 171.

hirta. 4. Dr. ſcapo unifolio, foliis ſubhirſutis, ſiliculis obliquis pedicellatis. *Flor. dan. t.* 142. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 432.

ſtadnizen-ſis. 5. Dr. ſcapo bifolio, foliis glabris ciliatis, ſiliculis rectis pedicellatis. *Wulfen apud Jacq. miſcell.* 1. *p.* 147. *t.* 17. *f.* 1.

ciliaris. 6. Dr. caule ſubnudo, foliis linearibus margine carinaque ciliatis, petalis integris. *Mant. p.* 91. *Ger. flor. prov. t.* 13. *f.* 1.

muralis. 7. Dr. caule ramoſo, foliis ovatis ſeſſilibus dentatis. *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 15. *β*) Draba nemoroſa. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 432. *Col. ecphr.* 1. *t.* 272.

incana. 8. Dr. foliis caulinis numeroſis incanis, ſiliculis oblongis obliquis ſubſeſſilibus. *Flor. dan. t.* 130.

MOENCHIA. *Silicula* integra, ovata, ſtilo coronata: valvis convexiuſculis diſſepimento parallelis; loculis polyſpermis.

aizoides. 1. M. ſcapo nudo ſimplici, foliis enſiformibus carinatis ciliatis. *Mant. p.* 91. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 432. Draba aizoides. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 192.

ſativa. 2. M. floribus racemoſis, petalis integerrimis, ſiliculis obovatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 431. Myagrum ſativum. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 78. *β*) *Lindern flor. alſ. t.* 1.

campeſtris. 3. M. floribus racemoſis, petalis bifidis, filamentis quatuor in medio denticulatis, ſiliculis ovatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 436. Alyſſum campeſtre.

incana. 4. M. floribus corymboſo-racemoſis, petalis bifidis, ſiliculis ovatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 436. Alyſſum incanum.

801. LEPIDIUM. *Silicula* emarginata, compressa: valvis argute carinatis; loculis rispermis.

* *floribus tetradynamis.*

vesicarium. 1. L. caulium geniculis inflatis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 26.

procumbens. 2. L. scapo nudo, foliis sinuato-pinnatifidis: extremo majore, caulibus prostratis racemiferis. *Mant. p.* 424. *Magn. fl. monsp. t.* 184.

spinosum. 3. L. foliis pinnatis: foliolis lanatis; exterioribus elongatis, ramis mucronatis. *Mant. p.* 253. *Arduin. spec.* 2. *t.* 16.

petraeum. 4. L. foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis calice minoribus. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 131.

suffruticosum. 5. L. foliis lanceolato-linearibus tenuibus integerrimis, caulibus suffruticosis. *Mant. p.* 91.

Piscidium. 6. L. foliis elliptico-oblongis acutis integerrimis. *Forst. plesc. p.* 39. *flor. austr. p.* 46.

latifolium. 7. L. foliis ovato-lanceolatis integris serratis. *Flor. dan. t.* 557.

subulatum. 8. L. foliis subulatis indivisis sparsis, caule suffruticoso.

lyratum. 9. L. foliis lyratis crispis. *Tournef. it.* 1. *p.* 339. *ic.*

sativum. 10. L. foliis oblongis multifidis. *Zorn pl. med. ic. t.* 16. *Gaertn. de fr. et sem.* 9. *t.* 141. *f.* 5. *β) C. Bauh. pr. th. bot. p.* 43. *ic.*

chalepense. 11. L. foliis sagittatis sessilibus dentatis. *Cent.* 169.

Draba. 12. L. foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 435. Cochlearia Draba. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 315.

perfoliatum. 13. L. foliis caulinis pinnato-multifidis ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 346.

cardamines. 14. L. foliis radicalibus pinnatis, caulinis lyratis. *Arduin. spec.* 1. *t.* 8.

** *floribus hexandris.*

graminifolium. 15. L. foliis linearibus: superioribus integerrimis, caule paniculato virgato.

*** *flo-*

**** floribus tetrandris.*

alpinum. 16. L. foliis pinnatis integerrimis, ſcapo ſubradicato, ſiliculis lanceolatis mucronatis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 137.

nudicaule. 17. L. ſcapo nudo ſimpliciſſimo, foliis pinnatifidis. *Magn. ſt. monſp. t.* 186.

oleraceum. 18. L. foliis elliptico-oblongis acutis ſerratis. *Forſt. pl. eſc. p.* 38. *flor. auſtr. p.* 46.

***** floribus ſubtriandris.*

virginicum. 19. L. foliis linearibus pinnatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 123. *f.* 3.

****** floribus diandris.*

ruderale. 20. L. foliis radicalibus dentato-pinnatis: ramiferis linearibus integerrimis, floribus ſubaperalis. *Flor. dan. t.* 184.

Iberis. 21. L. foliis inferioribus lanceolatis ſerratis: ſuperioribus linearibus integerrimis. *Mant. p.* 425.

bonarienſe. 22. L. foliis omnibus pinnato-multifidis. *Dill. h. Elth. t.* 286. *f.* 370.

didymum. 23. L. foliis pinnatifidis, caule erecto, fructibus didymis. *Mant. p.* 92.

******* incertae tribus.*

divaricatum. 24. L. foliis pinnatifidis, caule ramoſiſſimo, ſiliculis ovatis ſubemarginatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 375.

802. THLASPI. *Silicula* emarginata, obcordata: valvis navicularibus carinatis, (ſaepius) alato-marginatis, loculis polyſpermis.

peregrinum. 1. Thl. ſiliculis ſuborbiculatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 18. *f.* 30.

arvenſe. 2. Thl. ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Flor. dan. t.* 793. *Gaertn. de fr. et ſem. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 3.

alliaceum. 3. Thl. ſiliculis ſubovatis ventricoſis, foliis oblongis obtuſis dentatis glabris. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 18. *f.* 28.

ſaxatile. 4. Thl. ſiliculis ſubrotundis, foliis lanceolato-linearibus obtuſis carnoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 236.

5. Thl.

hirtum. 5. Thl. ſiliculis ſubrotundis piloſis, foliis caulinis ſagittatis villoſis. *C. Bauh. prodr. th. bot. t.* 47.

campeſtre. 6. Thl. ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis. *β*) *Blackw. herb. t.* 407.

montanum. 7. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis glabris: radicalibus ſubcarnoſis obovatis integerrimis; caulinis amplexicaulibus, corollis calice majoribus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 237.

alpinum. 8. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis glabris: radicalibus ſubcarnoſis obovatis integerrimis, caulinis ſeſſilibus, corollis calice majoribus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 238.

perfoliatum. 9. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris ſubdentatis, petalis longitudine calicis, caule raomſo. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 337.

alpeſtre. 10. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis ſubdentatis: caulinis amplexicaulibus, petalis longitudine calicis, caule ſimplici. *Ard. ſpec.* 2. *t.* 15. *f.* 2. *an mera perfoliati varietas?*

praecox. 11. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis carnoſis glaucis ſubcrenulatis decurrentibus: caulinis ſemiamplexicaulibus, obtuſe cordato-ſagittatis, petalis calice longioribus. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 2. *p.* 124. *t.* 9.

Schranckii. 12. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis ſubhiſpidis integris, radicalibus petiolatis caulinis amplexicaulibus, calice petalis minore. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 182.

Burſa paſtoris. 13. Thl. ſiliculis compreſſis obcordato-triangulis: valvis dorſo nudis obtuſis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Flor. dan. t.* 729. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 3. *an diſtincti generis?*

ceratocarpon. 14. Thl. ſiliculis oblongis ſurſum utrinque membranaceo cornutis, foliis ſuperioribus oblongis ſagittatis amplexicaulibus: inferioribus ovalibus petiolatis. *Murray comm. Goett.* 1774. *t.* 1.

803. COCHLEARIA. *Silicula* emarginata, turgida, ſcabra, polyſperma: valvis gibbis obtuſis.

officinalis. 1. C. foliis radicalibus cordato-ſubrotundis: caulinis oblongis ſubſinuatis. *Flor. dan. t.* 135.

danica. 2. C. foliis haſtato-angulatis: omnibus deltoidibus. *Mant. p.* 425. *Flor. dan. t.* 100.

3. C.

anglica. 3. C. foliis omnibus ovato-lanceolatis. *Flor. dan. t.* 329.

groenlandica. 4. C. foliis reniformibus integris carnosis. *Barthol. act. Hafn.* 3. *t.* 144.

Coronopus. 5. C. foliis pinnatifidis, caule depresso. *Flor. dan. t.* 202. *Gaertn. de fr. et sem. pl. fasc.* 9. *t.* 142. *f.* 5.

Armoracia. 6. C. foliis radicalibus lanceolatis crenatis: caulinis incisis. *Blackw. herb. t.* 415.

glastifolia. 7. C. foliis caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 12.

foetida. 8. C. foliis caulinis striatis lanceolato-sagittatis dentatis, siliculis cochleariformibus repandis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 185.

804. IBERIS.

Cor. inaequalis: petalis 2 exterioribus majoribus. *Silicula* subrotunda compressa: septo contrario, loculis ispermis.

* *frutescentes.*

semiperflorens. 1. I. foliis cuneiformibus integerrimis obtusis. *Seb. mus.* 1. *t.* 13. *f.* 4.

sempervirens. 2. I. foliis linearibus acutis integerrimis. *Rivin. tetrap.* 224. *f.* 1.

gibraltarica. 3. I. foliis apice dentatis. *Dill. h. Elth. t.* 287. *f.* 37.

** *suffrutescens.*

saxatilis. 4. I. foliis lanceolato-linearibus carnosis acutis integerrimis ciliatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 277. *f.* 1.

*** *herbaceae.*

rotundifolia. 5. I. foliis ovatis: caulinis amplexicaulibus laevibus succosis, floribus subregularibus. *Arduin. spec.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

cepaefolia. 6. I. foliis ovatis: caulinis sessilibus laevibus succosis. *Jacq. miscell.* 2. *p.* 28. *t.* 1.

arabica. 7. I. foliis ovatis glabris aveniis integerrimis, siliculis basi apiceque bilobis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 2. *f.* 1.

amara. 8. I. foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus racemosis. *Rivin. tetrap.* 112.

9. I.

umbellata. 9. I. foliis lanceolatis acuminatis: inferioribus ſerratis; ſuperioribus integerrimis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 7.

linifolia. 10. I. foliis linearibus integerrimis: caulinis ſerratis, caule paniculato, corymbis hemiſphaericis. *Garid. fl. aix. t.* 105.

odorata. 11. I. foliis linearibus ſuperne dilatatis ſerratis.

nudicaulis. 12. I. foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici. *Flor. dan. t.* 323.

pinnata. 13. I. foliis pinnatifidis. *Lob. ic.* 218.

805. ALYSSUM. *Filamenta* quaedam introrſum dente notata. *Cor.* aequalis. *Silicula* ſubgloboſa, leviter emarginata, ſtilo perſiſtente coronata: loculis ſubdiſpermis.

* *ſiliculis compreſſis.*

† *ſuffruticoſa.*

ſpinoſum. 1. A. ramis ſenilibus ſpiniformibus nudis. *Barr. pl. rar. ic.* 808.

halimifolium. 2. A. caulibus procumbentibus perennantibus, foliis lanceolato-linearibus acutis integerrimis. *Herm. par. Lugdb. t.* 595.

ſaxatile. 3. A. caulibus fruteſcentibus paniculatis, foliis lanceolatis molliſſimis repandis. *Ard. ſpec.* 1. *t.* 7. *Mill. h. angl. t.* 20. *f.* 1.

alpeſtre. 4. A. caulibus diffuſis, foliis ſubrotundis incanis, calicibus coloratis. *Mant. p.* 92. *Gerard. fl. prov. t.* 13. *f.* 2.

†† *herbacea.*

hyperboreum. 5. A. foliis incanis dentatis, ſtaminibus quatuor bifurcatis. *Kraſchenninck. act. Petrop. t.* 15. *f.* 1.

minimum. 6. A. caulibus diffuſis, foliis lanceolato-linearibus ſubhiſpidis.

calicinum. 7. A. ſtaminibus omnibus dentatis, calicibus perſiſtentibus. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 338. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 4.

montanum. 8. A. caulibus diffuſis, foliis ſublanceolatis punctato-echinatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 37.

clypeatum. 9. A. caule erecto, ſiliculis ſeſſilibus, ovalibus, petalis linearibus; *an potius lunariae ſpecies?*

** *fili-*

** *siliculis inflatis.*

sinuatum. 10. A. caule herbaceo, foliis lanceolato-deltoidibus. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 20.

gemonense. 11. A. caule herbaceo, ramis divaricatis, foliis radicalibus obovatis subtomentosis. *Mant. p.* 92. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 61.

utriculatum. 12. A. caule herbaceo erecto, foliis laevibus lanceolatis integerrimis. *Mant. p.* 92.

Vesicaria. 13. A. foliis linearibus dentatis, siliculis angulatis acutis. *Tournef. it.* 2. *t.* 14.

deltoideum. 14. A. caulibus suffruteſcentibus prostratis, foliis lanceolato-deltoidibus, siliculis hirtis.

creticum. 15. A. caule fruticoso, foliis lanceolatis subdentatis tomentosis, siliculis globosis. *Mant. p.* 92. *Alp. exot. t.* 118.

807. CLYPEOLA. *Silicula* subemarginata, orbiculata, compresso-plana, decidua.

Jonthlaspi. 1. Cl. siliculis unilocularibus monospermis. *Mant. p.* 426. *Col. ecphr.* 1. *t.* 284. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 6.

tomentosa. 2. Cl. siliculis bilocularibus, foliis subtomentosis. *Mant. p.* 92. *Ard. spec.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

maritima. 3. Cl. perennis, siliculis bilocularibus ovatis dispermis. *Mant. p.* 426. *Barr. pl. rar. ic.* 844.

carolinia-na. 4. Cl. siliculis bilocularibus, foliis duplicato-serratis subscabris. *Walt. flor. carol. p.* 173.

806. PELTARIA. *Silicula* s. potius *Pericarpium* simplex uniloculare integrum, suborbiculatum, compresso-planum non dehiscens.

alliacea. 1. P. foliis amplexicaulibus oblongis indivisis. *Suppl. p.* 295. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 123. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 7.

capensis. 2. P. foliis caulinis quinato-pinnatis linearibus subcarnosis. *Suppl. p.* 296.

808. BISCUTELLA. *Silicula* ſ. potius *Pericarpium* 1loculare gemellum compreſſo-planum, rotundatum, ſupra infraque bilobum: lobis 1ſpermis evalvibus. *Cal.* foliola baſi gibba.

auricula-ta. 1. B. calicibus nectario utrinque gibbis, ſiliculis in ſtilum coëuntibus. *Col. ecphr.* 2. *t.* 61. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 1.

apula. 2. B. ſiliculis ſcabris, foliis lanceolatis ſeſſilibus ſerratis. *Mant. p.* 254. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 437. Biſcutella didyma. *Col. ecphr.* 1. *t.* 284. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 1.

lyrata. 3. B. ſiliculis ſcabris, foliis lyratis. *Mant. p.* 254. *Bocc. ſic. t.* 23. *β*?) Biſcutella raphanifolia. *Poir. it.* 2. *p.* 198.

ſempervi-rens. 4. B. ſiliculis ſcabriuſculis, foliis lanceolatis tomentoſis. *Mant. p.* 255. *Barr. pl. rar. ic. t.* 841.

corono-pifolia. 5. B. ſiliculis glabris, foliis dentatis hirtis. *Mant. p.* 255.

laevigata. 6. B. ſiliculis glabris, foliis lanceolatis ſerratis.

apetala. 7. B. floribus apetalis, calicibus margine ſcabris. *Walt. flor. carol. p.* 174.

809. LUNARIA. *Silicula* integra, compreſſo-plana, ſubovata pedicellata: valvis diſſepimento aequalibus, parallelis planis. *Cal.* foliolis 2 ſaccatis.

rediviva. 1. L. foliis alternis, ſiliculis lanceolatis. *Besl. h. Eyſt. vern.* 7. *f.* 2. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 1.

annua. 2. L. foliis oppoſitis, ſiliculis ellipticis. *Mill. illuſtr. ic. Sabb. h. rom.* 4. *t.* 22.

SILI-

SILIQUOSA.

810. RICOTIA. *Siliqua* ilocularis, oblonga, compressa: valvis planis.

aegyptia-ca. 1. Ricotia. *Mill. h. angl.* 169. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 1. *an lunariae jungenda?*

811. DENTARIA. *Siliqua* teres, marginata, elastice dissiliens: valvis revolutis, dissepimento fungoso paulo brevioribus, *Stigma* emarginatum. *Cal.* longitudinaliter connivens.

ennea-phylla. 1. D. foliis ternis ternatis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 316.

bulbifera. 2. D. foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus. *Flor. dan. t.* 361.

penta-phylla. 3. D. foliis summis digitatis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 30. *β) Gesn. fasc.* 1. *t.* 1. *f.* 1.

812. CARDAMINE. *Siliqua* longa, anceps elastice dehiscens: valvis revolutis, dissepimento membranaceo parallelo. *Stigma* integrum, capitatum. *Cal.* subbians.

* *foliis simplicibus.*

bellidifolia. 1. C. foliis ovatis integerrimis, petiolis longis. *Flor. dan. t.* 20.

nivalis. 2. C. foliis radicalibus ovatis inaequaliter serratis; caulinis sublanceolatis sessilibus alternis. *Pall. it.* 2. *p.* 740. *t.* U.

nudicaulis. 3. C. foliis lanceolatis sinuato-dentatis, caulibus nudis.

petraea. 4. C. foliis oblongis dentatis. *Flor. dan. t.* 386.

asarifolia. 5. C. foliis subcordatis. *Herm. par. Lugdb. t.* 203.

resedifolia. 6. C. foliis inferioribus indivisis: superioribus trilobis pinnatisque. *Jacq. flor. austr.* 5. *app.* *t.* 21.

** *foliis ternatis.*

africana. 7. C. foliis ternatis acuminatis, caule ramosissimo. *Herm. par. Lugdb.* *t.* 202.

trifolia. 8. C. foliis ternatis obtusis, caule subnudo. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 27.

*** *foliis pinnatis.*

hirsuta. 9. C. floribus interdum tetrandris. *Curt. flor. Lond.* *t.* 277. *An satis constanterque distincta a pratensi?*

amara. 10. C. axillis stoloniferis. *Curt. flor. Lond.* *t.* 158.

impatiens. 11. C. foliis incisis stipulatis, floribus apetalis. *Flor. dan.* *t.* 735.

parviflora. 12. C. foliis exstipulatis: foliolis lanceolatis obtusis.

virginica. 13. C. foliolis lanceolatis basi unidentatis. *Pet. gaz.* *t.* 105. *f.* 18.

chelidonia. 14. C. foliolis quinis incisis. *Herm. par. Lugdb.* *t.* 204.

graeca. 15. C. foliolis palmatis aequalibus petiolatis. *Mant.* *p.* 427. *Bocc. mus.* 2. *t.* 166. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 1.

pratensis. 16. C. foliolis radicalibus subrotundis: caulinis lanceolatis. *Curt. flor. Lond.* *t.* 175.

813. SISYMBRIUM. *Siliqua* teres, dehiscens: valvis rectiusculis dissepimento fere aequalibus. *Cal.* patens. *Cor.* patens.

* *siliquis declinatis brevibus.*

Nasturtium. 1. S. foliis pinnatis: foliolis subcordatis. *Flor. dan.* *t.* 690.

sylvestre. 2. S. siliquis oblongo-ovatis, foliolis lanceolatis serratis. *Curt. flor. Lond.* *t.* 153.

islandicum. 3. S. foliis lyrato-pinnatis: foliolis ovalibus dentatis. *Flor. dan.* *t.* 403.

amphibium. 4. S. siliquis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis serratis, petalis calice longioribus. *Tabernaem. Kraeuterb.* *p.* 408.

5. S.

paluſtre. 5. S. filiquis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ſerratis, petalis calice minoribus. *C. Bauh. prodr. th. bot. t.* 38.

pyrenaicum. 6. S. filiquis ſubovatis, foliis inferioribus lyratis: ſuperioribus bipinnatifidis amplexicaulibus, ſtilis filiformibus. *de la Chenal act. helv.* 4. *t.* 15.

tanacetifolium. 7. S. foliis pinnatis: foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis: extimis confluentibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 6. *f.* 19.

tenuifolium. 8. S. foliis integerrimis: infimis tripinnatifidis; ſupremis integris. *Blackw. herb. t.* 266.

falſugineum. 9. S. foliis oblongo-cordatis ſeſſilibus ſubcarnoſis. *Pallas it.* 2. *p.* 740.

molle. 10. S. filiquis ſubcylindricis, foliis mollibus denticulatis: caulinis haſtatis oblongis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 85.

lippizenſe. 11. S. foliis inferioribus pinnatis: ſummis inferiorumque pinnis integerrimis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 161. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 62.

ſagittatum. 41. S. pubeſcens, filiquis ſubcylindricis recurvis, foliis obovato-oblongis ſagittatis dentatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 390.

** *filiquis ſeſſilibus axillaribus.*

ſupinum. 12. S. filiquis ſubſeſſilibus ſolitariis, foliis dentato-ſinuatis. *Isnard act. Pariſ.* 1724. *t.* 18.

hiſpanicum. 13. S. filiquis cylindricis breviuſculis erectis, foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 84.

polyceratium. 14. S. filiquis ſubulatis aggregatis, foliis repando-dentatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 79.

burſifolium. 15. S. racemo flexuoſo, foliis lyratis, caule erecto folioſo. *Dill. h. Elth. t.* 148. *f.* 177. *β*) Heſperis dentata. *Sp. pl.* 2. *p.* 928.

*** *caule nudo, aut nullo.*

vimineum. 16. S. acaule, foliis lyratis laevibus, ſcapis adſcendentibus, floribus minutis. *Bocc. ſic. t.* 10.

monenſe. 17. S. acaule, foliis pinnato-dentatis ſubpiloſis, ſcapis laevibus. *Dill. h. Elth. t.* 111. *f.* 135.

murale. 18. S. ſubacaule, foliis lanceolatis ſinuato-ſerratis laeviuſculis, ſcapis ſubſcabris adſcendentibus. *Barr. pl. rar. ic. t.* 131.

Barrelieri. 19. S. caule ſubnudo ramoſo, foliis radicalibus runcinatis dentatis hiſpidis. *Barr. pl. rar. ic.* 1016.

arenosum. 20. S. caule subfolioso ramoso, foliis lyratis rectangulo-dentatis hispidis: pilis ramosis. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *t.* 40.

valentinum. 21. S. caule simplici erecto superne glabro, foliis lanceolatis hispidis antrorsum dentatis. *Bocc. mus.* 2. *t.* 80.

simplicissimum. 22. S. caule simplicissimo, foliis radicalibus ovatis ciliato-hispidis petiolatis integerrimis. *S. G. Gmel. it.* 3. *p.* 303. *t.* 36. *f.* 3.

**** *foliis divisis aut compositis.*

altissimum. 23. S. foliis runcinatis flaccidis: foliolis linearibus integerrimis, pedunculis laxis. *Buxb. cent.* 5. *t.* 51.

Parra. 24. S. caulescens, foliis runcinatis muricatis. *Mant. p.* 255.

Columnae. 25. S. foliis runcinatis dentatis cauleque villosis subincanis, siliquis erectis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 323.

Loeselii. 26. S. foliis runcinatis acutis hirtis, caule hispido. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 324.

orientale. 27. S. foliis runcinatis tomentosis, caule laevi.

Irio. 28. S. foliis runcinatis dentatis nudis, caule laevi, siliquis erectis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 322.

sinapios. 29. S. foliis radicalibus runcinatis dentatis hirtis: caulinis incisis linearibus glabris, siliquis patentibus. *Retz. obs. bot.* 3. *p.* 37.

pinnatifidum. 30. S. foliis lyrato-pinnatifidis, siliquis glabris. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 118.

album. 31. S. siliquis lineari-teretibus laevibus, foliis pinnatifidis incanis: laciniis oblongo-linearibus obtusis subintegris. *Pallas it.* 3. *p.* 739. *t.* U. *f.* 1.

asperum. 32. S. siliquis scabris, foliis pinnatifidis: pinnis lineari-lanceolatis subdentatis, corollis calice longioribus.

Sophia. 33. S. petalis calice minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Flor. dan. t.* 528.

catholicum. 34. S. siliquis filiformibus laevibus, foliis pinnatis denticulatis caulinis. *Mant. p.* 93.

heterophyllum. 35. S. foliis pinnatifidis: foliolis reniformibus subtrilobis; infimis pinnatifidis pilosis. *Forst. flor. austr. p.* 46.

pannonicum. 36. S. foliis caulinis superioribus glabris pinnatis: pinnis linearibus integerrimis; extima elongata. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 83.

***** *fo-*

***** *foliis ſimplicibus indiviſis.*

barbareae. 37. S. foliis ſpatulato-ovatis dentatis amplexicaulibus nudis.

indicum. 38. S. foliis lanceolato-ovatis ſerratis petiolatis laevibus, ſiliquis ſubarcuatis. *Mant. p.* 93.

ſtrictiſſimum. 39. S. foliis lanceolatis dentato-ſerratis caulinis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 194.

integrifolium. 40. S. foliis linearibus integerrimis, pedunculis glutinoſo-hiſpidis. *Gmel. flor. ſibir.* 3. *t.* 63.

814. ERYSIMUM. *Siliqua* linearis ſtricta, exacte tetraëdra. *Cal.* clauſus. *Stigma* capitatum.

officinale. 1. E. ſiliquis ſpicae adpreſſis, foliis runcinatis. *Flor. dan. t.* 560. *annon potius ſiſymbrio adſcribendum?*

Barbarea. 2. E. ſiliquis obſolete tetragonis, foliis lyratis: extimo ſubrotundo. *Regn. bot. t.* 202.

Alliaria. 3. E. foliis cordatis. *Zorn pl. off. ic. t.* 91.

polyceraton. 4. E. foliis repando-dentatis, ſiliquis piloſis ſeſſilibus patentibus. *Pallas it.* 3. *p.* 741. *t.* Mm. *f.* 1. A. *an ſatis diſtinctum a cheiranthoide?*

cheiranthoides. 5. E. caule ramoſiſſimo, foliis lanceolatis obliquis repando-dentatis, ſiliquis patentibus. *Flor. dan. t.* 731. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 23. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 7.

repandum. 6. E. foliis lanceolatis dentatis, racemis oppoſitifoliis, ſiliquis ſubſeſſilibus, corollis minutis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 22.

hybridum. 7. E. foliis lanceolatis denticulatis glaberrimis, ſiliquis calice triplo longioribus ſuperne incraſſatis. *Weber ſuppl. flor. holſ. p.* 9.

hieracifolium. 8. E. foliis lanceolatis ſerratis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 73.

pinnatum. 9. E. foliis pubeſcentibus pinnatis: pinnis pinnatifidis. *Walt. flor. carol. p.* 174.

bicorne. 10. E. foliis lanceolatis piloſis, ſiliquis apice bicornibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 394.

CHAMIRA. *Cal.* basi cornutus. *Glandula* extra stamina breviora.

cornuta. 1. CHAMIRA. *Thunb. nov. pl. gen. p.* 49.

815. CHEIRANTHUS. *Germen* utrinque denticulo glandulato. *Cal.* clausus: foliolis 2 basi gibbis. *Semina* plana.

erysimoides. 1. Ch. foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto simplicissimo, siliquis tetragonis. *Flor. dan. t.* 229. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 74. *annon potius erysimi species?*

helveticus. 2. Ch. foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto, siliquæ tetragona stilo acuminata. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 9.

callosus. 3. Ch. foliis lanceolatis integris callosis, caule angulato fruticoso. *Suppl. p.* 296.

incanus. 4. Ch. foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. *Mill. illustr. ic.*

scapiger. 5. Ch. foliis lanceolatis integerrimis, caule florifero aphyllo: sterilibus simplicibus. *Will. denow fl. Beror. n.* 663. *an distincta species?*

salinus. 6. Ch. foliis lanceolatis obtusis integerrimis, caule erecto, antheris inclusis. *Mant. p.* 93.

fenestralis. 7. Ch. foliis conferto-capitatis recurvatis undatis, caule indiviso. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 179.

annuus. 8. Ch. foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. *Kniph. bot. orig. cent.* 12. *n.* 26.

littoreus. 9. Ch. foliis lanceolatis subdentatis subtomentosis subcarnosis, petalis emarginatis, siliquis tomentosis.

sinuatus. 10. Ch. foliis tomentosis obtusis subsinuatis: rameis integris, siliquis muricatis.

trilobus. 11. Ch. foliis dentatis obtusis, calicibus laevibus, siliquis nodosis mucronatis filiformibus laevibus.

fruticulosus. 12. Ch. foliis lanceolatis acutis glabris subserratis, caule fruticoso. *Mant. p.* 94. *Barr. pl. rar. ic.* 1228.

13. Ch.

Cheiri. 13. Ch. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo. *Knorr del. hort.* 1. *t.* V. 1. *Regn. bot. t.* 204.

mutabilis. 14. Ch. frutescens, foliis lanceolatis laxe ſerratis. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 92.

Farſetia. 15. Ch. foliis lineari-lanceolatis, caule fruticoſo erecto, siliquis ovalibus compreſſis. *Mant. p.* 94. *Forsk. flor. aeg. arab. ic. t.* 16. *β)* Cheiranthus linearis. *Forsk. fl. p.* 120.

montanus. 16. Ch. foliis linearibus integris, siliquis ſeſſilibus oblongis tetragonis. *Pallas it.* 1. *p.* 496. *Herit. ſtirp. nov. p.* 91. *t.* 44.

villoſus. 17. Ch. foliis linearibus villoſo-ſcabris remote dentatis, caulibus decumbentibus, floribus ſeſſilibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 120.

alpinus. 18. Ch. foliis linearibus integris ſubtomentoſis, caule ramoſo. *Mant. p.* 93. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 75.

canus. 19. Ch. foliis linearibus integris ſubtomentoſis, caule ramoſo teretiuſculo ſcabro ſubtomentoſo, ſiliquis brevibus tomentoſis ſcabris ſubtetraëdris. *Pill. et Mitterp. it. p.* 146.

ſtrictus. 20. Ch. foliis linearibus acutis glabris, caule fruticoſo erecto. *Suppl. p.* 296.

triſtis. 21. Ch. foliis linearibus ſubſinuatis, floribus ſeſſilibus: petalis undatis, caule fruticoſo. *Bocc. muſ. t.* 111.

tenuifolius. 22. Ch. frutescens, foliis linearibus integerrimis. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 92.

maritimus. 23. Ch. foliis ellipticis obtuſis nudis ſcabriuſculis, caule diffuſo ſcabro. *Mant. p.* 568. *Barr. pl. rar. ic.* 1127.

chius. 24. Ch. foliis obovatis aveniis emarginatis, siliquis apice ſubulatis. *Dill. h. Elth. t.* 147. *f.* 178.

tricuſpidatus. 25. Ch. foliis lyratis, siliquis apice tridentatis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 25. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 3.

816. HELIOPHILA. *Nectaria* 2 recurvata verſus calicis baſin veſicularem.

integrifolia. 1. H. foliis lanceolatis ſupra piloſis. *Mant. p.* 428. *Seb. muſ.* 1. *t.* 17. *f.* 5. *Jacq. coll.* 3. *p.* 219.

amplexicaulis. 2. H. foliis amplexicaulibus integris glabris, siliquis moniliformibus. *Suppl. p.* 296.

circaeoides. 3. H. foliis cordatis. *Suppl. p.* 298.

filiformis. 4. H. foliis subulatis filiformibus glabris, ramis divaricatis, filiquis pendulis. *Suppl. p.* 296.

pusilla. 5. H. foliis linearibus, filiquis moniliformibus erectis. *Suppl. p.* 297.

flava. 6. H. foliis linearibus, caulibus fruticosis junceis. *Suppl. p.* 297.

coronopifolia. 7. H. foliis linearibus pinnatifidis. *Herm. par. Lugdb. t.* 367.

digitata. 8. H. foliis palmato-pinnatifidis villosis: laciniis lincaribus. *Suppl. p.* 296.

pinnata. 9. H. foliis trifidis pinnatisque: foliolis linearibus, filiquis moniliformibus erectis. *Suppl. p.* 297.

817. HESPERIS. *Petala* oblique flexa. *Glandula* intra stamina breviora. *Cal.* clausus. *Siliqua* stricta. *Stigma* basi 2furcum: apice connivente.

tristis. 1. H. caule hispido ramoso-patente. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 102.

matronalis. 2. H. caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 58. *β*) Hesperis sibirica. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 442.

inodora. 3. H. caule simplici erecto, foliis subhastatis dentatis, petalis obtusis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 347.

tatarica. 4. H. caule nudo flexuoso decumbente, foliis radicalibus crassiusculis lanatis ovali-oblongis lacero-dentatis. *Pallas it.* 1. *p.* 497. *t.* L. *f.* 1. 2.

africana. 5. H. caule ramosissimo diffuso, foliis lanceolatis petiolatis acute dentatis scabris, filiquis sessilibus. *Bocc. sic. t.* 42. *t.* 1.

verna. 6. H. caule erecto ramoso, foliis cordatis amplexicaulibus serratis villosis. *Morif. hist. pl.* 2. *t.* 8. *f.* 5.

lacera. 7. H. foliis runcinatis, filiquis tricuspidatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 442. Cheiranthus lacerus. *Herm. par. Lugdb. t.* 193.

acris. 8. H. foliis oblongo-ovatis dentato-sinuatis glabris: inferioribus petiolatis, petalis subrotundis obtusis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 118.

818. ARABIS. *Glandulae* nectariferae 4, ſingulae intra calicis foliola, ſquamae inſtar reflexae. *Siliqua* longa, compreſſa, linearis: apice integro, capitato.

alpina. 1. A. foliis amplexicaulibus dentatis. *Flor. dan. t.* 62.

lucida. 2. A. foliis amplexicaulibus lucidis. *Suppl. p.* 298.

pendula. 3. A. foliis amplexicaulibus, ſiliquis ancipitibus linearibus, calicibus ſubpiloſis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 34.

turrita. 4. A. foliis amplexicaulibus, ſiliquis decurvis planis linearibus, calicibus ſubrugoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 11.

grandiflora. 5. A. caule nudo. *Amoen. acad. vol.* 4. *t.* 4. *f.* 10.

ovirenſis. 6. A. caule ſubnudo, foliis glabris petiolatis ſubovatis repando-denticulatis. *Wulfen apud Jacquin collect.* 1. *p.* 196.

lyrata. 7. A. foliis glabris: radicalibus lyratis; caulinis linearibus.

hiſpida. 8. A. foliis hiſpidis: radicalibus runcinatis; caulinis lanceolatis.

bellidifolia. 9. A. foliis ſubdentatis: radicalibus obovatis; caulinis lanceolatis. *Mant. p.* 94. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 280. *β*) Arabis pumila. *Jacq. flor. auſt.* 3. *t.* 281.

Halleri. 10. A. foliis caulinis ſublyratis: rameis lanceolatis inciſis. *Haller. opuſc. t.* 1. *f.* 1.

canadenſis. 11. A. foliis caulinis lanceolatis dentatis glabris, floribus pendulis. *Pluckn. alm. t.* 86. *f.* 8.

Thaliana. 12. A. foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Curt. flor. Lond. t.* 73.

caerulea. 13. A. foliis radicalibus obovato-cuneiformibus acutis glabris margine ſuperiori dentatis, racemo paucifloro nutante. *Allion. flor. pedem. n.* 981. *t.* 40. *f.* 2.

819. TURRITIS. *Siliqua* longiſſima, angulata, ſtricta, ſtigmata 2colli terminata. *Cal.* connivens, erectus. *Cor.* erecta.

glabra. 1. T. foliis radicalibus dentatis hiſpidis: caulinis amplexicaulibus integerrimis glabris. *Curt. flor. Lond. t.* 253. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 8.

alpina. 2. T. foliis radicalibus dentatis hiſpidis; caulinis ſemiamplexicaulibus integerrimis glabris.

hirſuta. 3. T. foliis omnibus hiſpidis: caulinis amplexicaulibus. C. *Bauh. prodr. th. bot. t.* 42. *nonne potius arabis?*

820. BRASSICA. *Cal.* erectus, connivens. *Glandula* inter ſtamina breviora et piſtillum, interque longiora et calicem. *Sem.* globoſa.

* *ſtilo obtuſiuſculo.*

orientalis. 1. Br. foliis amplexicaulibus cordatis glabris: radicalibus ſcabris integerrimis, ſiliquis tetragonis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 282.

auſtríaca. 2. Br. foliis amplexicaulibus cordatis glabris integerrimis, ſiliquis tetragonis ſtriatis erectis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 283.

arvenſis. 3. Br. foliis amplexicaulibus ſpatulatis repandis: ſummis cordatis integerrimis. *Mant. p.* 95. 568. *Bocc. ſic. t.* 25. *f.* 3. 4.

alpina. 4. Br. foliis caulinis amplexicaulibus cordato-ſagittatis: radicalibus ovatis, petalis erectis. *Mant. p.* 95.

campeſtris. 5. Br. foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus, radice cauleque tenui. *Flor. dan. t.* 550.

Napus. 6. Br. radice cauleſcente fuſiformi. *Blackw. herb. t.* 224.

Rapa. 7. Br. radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa. *Blackw. herb. t.* 226.

oleracea. 8. Br. radice cauleſcente tereti carnoſa. *Regn. bot. t.* 207. 209. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 2.

ſinenſis. 9. Br. foliis ovalibus ſubintegerrimis: floralibus amplexicaulibus lanceolatis, calicibus ungue petalorum longioribus.

violacea. 10. Br. foliis lanceolato-ovatis glabris indiviſis dentatis.

muralis. 11. Br. foliis lanceolatis ſinuato-ſerratis laeviuſculis, caule erecto glabro. *Hudſ. flor. angl.* 290.

polymorpha. 12. Br. foliis inferioribus lineari-lanceolatis pinnatifido-dentatis: ſuperioribus ſubulatis integris. *Murray comm. Goett.* 1776. *t.* 6.

craſſifolia. 13. Br. foliis craſſis pinnatifidis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 118. *An hujus tribus?*

** *ſtilo*

** *ſtilo enſiformi*, Erucae.

Eruca. 14. Br. foliis lyratis, caule hirſuto, ſiliquis glabris. *Blackw. herb. t.* 242.

Erucaſtrum. 15. Br. foliis runcinatis, caule hiſpido, ſiliquis laevibus. *Bulliard herb. Franc. t.* 331.

veſicaria. 16. Br. foliis runcinatis, ſiliquis hiſpidis tectis calice tumido.

821. SINAPIS. *Cal.* patens. *Cor.* ungues erecti. *Glandula* inter ſtamina breviora et piſtillum, interque longiora et calicem. *Siliqua* roſtrata dehiſcens: valvis diſſepimento brevioribus.

alba. 1. S. ſiliquis hiſpidis: roſtro obliquo longiſſimo enſiformi. *Mant. p.* 429. *Blackw. herb. t.* 29. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 4.

orientalis. 2. S. ſiliquis retrorſum hiſpidis apice ſubtetragonis compreſſis.

pyrenaica. 3. S. ſiliquis ſtriatis ſcabris, foliis runcinatis laevibus. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 97.

pubeſcens. 4. S. ſiliquis pubeſcentibus erectis: roſtro compreſſo, foliis lyratis villoſis. *Mant. p.* 95. *Ard. ſpec.* 1. *t.* 9.

Allioni. 5. S. ſiliquis ovato-oblongis patulis, foliis pinnatifidis: laciniis inciſis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 168.

nigra. 6. S. ſiliquis glabris, racemo adpreſſis. *Blackw. herb. t.* 446.

arvenſis. 7. S. ſiliquis multangulis toroſo-turgidis laevibus roſtro ancipiti longioribus. *Flor. dan. t.* 753.

ſinenſis. 8. S. ſiliquis laevibus ſubarticulatis patulis, foliis lyrato-runcinatis ſubhirſutis. *Mant. p.* 95. *Ard. ſpec.* 1. *t.* 10.

incana. 9. S. ſiliquis racemo adpreſſis laevibus: foliis inferioribus lyratis ſcabris: ſummis lanceolatis, caule ſcabro. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 169.

erucoides. 10. S. ſiliquis laevibus aequalibus, foliis lyratis oblongis glabris, caule ſcabro. *Mant. p.* 429. *Jacq. h. Vindob.* 2. *t.* 170.

laevigata. 11. S. ſiliquis laevibus patulis, foliis lyratis glabris: ſummis lanceolatis, caule laevi.

12. S.

cernua. 12. S. siliquis laevibus patulis, folio radicali lyrato: lobo terminali maximo ovato inciso-dentato. *Thunb. flor. jap. p.* 261.

japonica. 13. S siliquis laevibus erectis, foliis inciso-pinnatifidis glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 262.

frutescens. 14. S. siliquis laevibus linearibus, foliis inferioribus oblongis dentatis: superioribus lanceolatis integerrimis, caule glabro frutescente. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 404.

millefolia. 15. S. foliis bipinnatis: pinnulis ovatis serratis. *Jacq. coll.* 1. *p.* 41. *p. rar. ic. cent.* 1. *t.* 57.

hispanica. 16. S. foliis duplicato-pinnatis; laciniis linearibus.

brassicata. 17. S. foliis obovatis denticulatis laevibus. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 631.

Harra. 18. S. foliis ovalibus sinuatis calicibusque hispidis, caule glabro. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 118.

juncea. 19. S. ramis fasciculatis, foliis summis lanceolatis integerrimis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 171.

822. RAPHANUS.

Cal. clausus erectus. *Glandulae* melliferae 2 inter stamina breviora et pistillum, totidem inter stamina longiora et calicem. *Siliqua* s. potius *Pericarpium* loculamentosum torosum, subarticulatum, teres.

caudatus. 1. R. siliquis decumbentibus tota planta longioribus. *Mant. p.* 95. *Linn. dec.* 3. *t.* 10.

Raphanistrum. 2. R. siliquis teretibus articulatis laevibus unilocularibus. *Flor. dan. t.* 678. *Curt. flor. Lond. t.* 267. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 6. *an distincti generis?*

sativus. 3. R. siliquis teretibus torosis bilocularibus. *Blackw. herb. t.* 81. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 5.

sibiricus. 4. R. siliquis teretibus torulosis villosis, foliis linearibus pinnatifidis. *Murray comm. Goett.* 1775. *t.* 11.

5. R.

lyratus. 5. R. siliquis teretibus hispidis, foliis lyratis, caule basi procumbente. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 119.

erucoides. 6. R. siliquis ovatis gibbis: rostro longitudine siliquae. *Suppl. p.* 299. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1016.

tenellus. 7. R. *Pallas it.* 1. *p.* 497. *et* 3. *t.* L. *f.* 3.

Erucaria. 8. R. siliqua biarticulata: articulo inferiori polyspermo; superiori substerili. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 9. *an distincti generis?*

823. BUNIAS. *Silicula* s. potius *Drupa* decidua, 4-edra: angulis inaequalibus acuminatis, muricata: ossiculo loculamentoso.

spinosa. 1. B. racemis spinascentibus. *Forsk. flor. aeg. arab. ic. t.* 17. *et* 18. *f.* A. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

cornuta. 2. B. siliculis divaricato-bicornibus basi spinosis. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 3. *an distincti generis? Osseculum, uti in plurimis reliquis, 2loculare.*

Erucago. 3. B. siliculis tetragonis: angulis bicristatis, ossiculo quadriloculari. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 340. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

aegyptiaca. 4. B. siliculis tetragonis undique verrucoso-muricatis, foliis runcinatis. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 231. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 145. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

aspera. 5. B. siliculis muricatis quadrangulis, foliis lanceolatis subdentatis: pilis furcatis. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 21.

orientalis. 6. B. siliculis ovatis gibbis verrucosis. *Gmel. flor. sib.* 3. *t.* 57. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

balearica. 7. B. siliculis hispidis, foliis pinnatis: foliolis subdentatis. *Mant. p.* 429. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 144.

myagroides. 8. B. siliculis biarticulatis ancipitibus superne toruloſis, foliis pinnatis: sinubus reflexis. *Mant. p.* 96.

Cakile. 9. B. siliculis ovatis laevibus ancipitibus biarticulatis. *Mant. p.* 430. *Lob. ic.* 223. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 12. *an distincti generis?*

cochlearioides. 10. B. siliculis cordato-ovatis laevibus inflexis. *Murray comm. Goett.* 1771. *t.* 3. *nonne potius genus hoc ad siliculosas referendum.*

824.

824. ISATIS. *Silicula* s. *Pericarpium* simplex ovali-lanceolatum, compressum, stilo coronatum, 1loculare, 1spermum.

tinctoria. 1. I. foliis radicalibus crenatis: caulinis sagittatis, siliculis oblongis. *Regn. bot. t.* 211. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 6. β) *Blackw. herb. t.* 246.

lusitanica. 2. I. foliis radicalibus crenatis: caulinis sagittatis, pedunculis subtomentosis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 5.

aleppica. 3. I. foliis radicalibus lyratis, caulinis sagittatis, siliculis emarginatis villosis incurvis. *Scop. del. inf.* 2. *p.* 31. *t.* 16.

armena. 4. I. foliis integerrimis cordatis posterius obtusis, siliculis cordatis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 4.

aegyptia. 5. I. foliis omnibus dentatis.

pinnata. 6. I. foliis carnosis pinnatis subdentatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 121. *Totum genus potius siliculosis inserendum.*

825. CRAMBE. *Filamenta* 4 longiora, apice 2fida: altero antherifero. *Pericarpium* simplex, globosum, deciduum, 2articulatum.

maritima. 1. Cr. foliis cauleque glabris. *Flor. dan. t.* 316. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 4.

caspica. 2. Cr. foliis villosis, baccis bilocularibus dispermis. *S. G. Gmel. it.* 4. *p.* 184.

orientalis. 3. Cr. foliis scabris, caule glabro. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 93.

hispanica. 4. Cr. foliis cauleque scabris. *Jacq. obs. bot.* 2. *t.* 41. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 4.

Tataria. 5. Cr. foliis decomposito-multifidis. *Jacq. misc.* 2. *t.* 25.

fruticosa. 6. Cr. fruticosa, foliis ovatis pinnatifidis serratis canis, racemis in panicula effusa dichotoma. *Suppl. p.* 299. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 50. *Nonne potius cum universo genere ad siliculosas pertinet?*

826. CLEOME. *Glandulae* nectariferae 3, ad singulos calicis sinus singulae, excepto infimo. *Petala* omnia adscendentia. *Siliqua* 2valvis. *Semina* reniformia, globosa.

* *floribus hexandris.*

† *foliis septenatis.*

gigantea. 1. Cl. caule inermi. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 232. *Mant. p.* 430. *Jacq. obs. bot.* 1. *t.* 76. *Receptaculum infra cum valvis siliquae coalitum?*

spinosa. 2. Cl. foliis septenatis quinatisque, caule spinoso. *Marcgr. bras. t.* 34. *Jacq. coll.* 3. *p.* 216.

†† *foliis digitatis.*

angustifolia. 3. Cl. foliis septenatis ternatisque, filiformibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 120.

digitata. 4. Cl. foliis inferioribus digitatis: superioribus ternatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 120.

††† *foliis ternatis.*

aculeata. 5. Cl. foliis integerrimis: stipulis spinascentibus. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 232.

serrata. 6. Cl. foliolis lineari-lanceolatis serratis. *Jacq. Hirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 73.

ornithopodioides. 7. Cl. foliolis ovali-lanceolatis. *Dill. h. Elth. t.* 266. *f.* 345.

arabica. 8. Cl. foliolis lanceolatis obtusis, siliquis fusiformibus viscoso-scabris. *Linn. dec.* 3. *t.* 8.

violacea. 9. Cl. foliis ternatis solitariisque: foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Barr. pl. rar. ic.* 866.

†††† *foliis simplicibus.*

monophylla. 10. Cl. foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *Burm. zeyl. t.* 100. *f.* 2.

procumbens. 11. Cl. foliis lanceolatis petiolatis: caulibus procumbentibus. *Jacq. Hirp. amer. pict. t.* 181.

capensis. 12. Cl. foliis sessilibus lineari-lanceolatis, caule angulato.

13. Cl.

gujanen- 13. Cl. foliis ſeſſilibus linearibus, floribus ſolitariis axillaribus.
ſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 675. *t.* 273.

** *floribus dodecandris.*

dodecan- 14. Cl. foliis ternatis. *Burm. zeyl. t.* 100. *f.* 1.
dra.

viſcoſa. 15. Cl. foliis quinatis ternatisque. *Mant. p.* 430. *Martyn cent.* 25. *t.* 25.

*** *floribus polyandris.*

felina. 16. Cl. foliis ternatis cuneiformibus ſtrigoſis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis, ſiliquis linearibus compreſſis. *Suppl. p.* 300.

icoſandra. 17. Cl. foliis quinatis. *Burm. zeyl. t.* 99. *Stamina* 24.

Chelido- 18. Cl. foliis quinatis ſeptenatisve cuneiformibus ſcabris, racemis terminalibus, ſiliquis filiformibus. *Suppl. p.* 300.
nii.

**** *floribus gynandris.*

hepta- 19. Cl. foliis ſubſeptenatis, caule aculeato.
phylla.

penta- 20. Cl. foliis quinatis, caule inermi. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 24.
phylla. *Recept. ſiliq. feneſtratum.*

triphylla. 21. Cl. foliis ternatis, caule inermi. *Herm. par. Lugdb. t.* 565.

fruticoſa. 22. Cl. foliis ſimplicibus, caule fruticoſo, floribus tetrandris. *Burm. ind. t.* 46. *f.* 3.

juncea. 23. Cl. aphylla, corymbis lateralibus: floribus octandris; genitalibus elongatis, ſiliqua lineari tomentoſa, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 300. *Sparrm. nov. act. Upſ.* 3. *p.* 192.

***** *floribus polygamis.*

polyga- 24. Cl. floribus ſuperioribus tetrandris maſculis, foliis ternatis:
ma. foliolis ſeſſilibus margine ſubaculeatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 124. *f.* 1.

****** *incertae tribus.*

tenella. 25. Cl. foliis ternatis filiformibus linearibus. *Suppl. p.* 300.

CLAS.

CLASSIS XV.

MONADELPHIA.

DIANDRIA.

1278. GNETUM. *Flores* monoici. *Amentum* ex calicibus peltatis. *Cor.* o.
♀. *Stil.* 3fidus. *Drupa* 1sperma.

1279. STILLINGIA. *Flores* monoici.
♂. *Cal.* multiflorus. *Cor.* 1petala.
♀. *Cal.* 1florus. *Stilus* 3fidus. *Germen* 3coccum inter calicem et corollam.

1088. HIPPOMANE. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 2fidus. *Antherae* 2fidae.
♀. *Cal.* 3fidus. *Stigma* 3plex. *Drupa* 1sperma, aut *Capſ.* 3cocca.

* *Omphalea.*

TRIANDRIA.

1134. JUNIPERUS. *Flores* dioici.
♂. *Cal.* Amentum. *Cor.* o.
♀. *Cal.* 3partitus. *Cor.* 3petala. *Stil.* 3. *Bacca* infera, 3sperma, calicina.

1410. APHYTEIA. *Cal.* magnus, infundibuliformis, semitrifidus. *Petala* 3, fauci calicis inserta, illoque breviora.

GALAXIA. *Cor.* 1petala, 6fida.

GYMNANTHES. *Flores* diclini. *Amentum* nudum. *Cal.* o. *Cor.* o.
♂. *Pedicell.* 3partitus, antherifer.
♀. *Germen* pedicellatum. *Stilus* 3fidus. *Capſ.* 3cocca, 3locularis.

* *Sisyrinchium*, *Ferraria*, *Moraeae multae*. *Myristica.*

TETRANDRIA.

1138. CISSAMPELOS. *Flores* dioici. *Cal.* o.
♂. *Cor.* 4petala.
♀. *Cor.* o. *Stigm.* 2. *Bacca* 1sperma.

1078. THUJA. *Flores* monoici, amentacei. *Cor.* o.
♀. *Ament.* ſtrobilaceum. *Piſt.* 2. *Nux* ala cincta.

1070. CUPRESSUS. *Flores* monoici, amentacei. *Cor.* ◉.
♀. *Ament.* ſtrobilac. *Stigm.* 2. *Nux* angulata.

PENTANDRIA.

CAOUTCHOUA. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* ſemiquinquefidus, globoſo-campanulatus.
♀. *Cal.* ſubpyriformi-campanulatus, 5dentatus, circumſciſſus. *Piſt.* 1. *Stigm.* 3. *Capſ.* oſſea, 3cocca, 3locularis, 2valvis. *Semina* ſolitaria.

KIRGANELIA. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus.
♀. *Bacca*, ſubtrilocularis, 6ſperma.

SECURINEGA. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* 5partitus.
♂. *Columna.* filamentorum exterius corona crocea cincta.

ABRONIA. Monogyna. *Sem.* 1. imo calice tectum.

1318. LERCHEA. Monogyna. *Capſ.* 3locularis, polyſperma.

827. WALTHERIA. Monogyna. *Capſ.* 1locularis, 1ſperma.

1411. SYMPHONIA. Monogyna. *Cor.* globoſa. *Bacca* 5locularis.

MUTABEA. Monogyna. *Bacca* ſphaerica, 3locularis, 3ſperma.

TICOREA. Monogyna. *Petala* 5 unguibus longiſſimis, in tubum conjuncta. *Capſ.* 5locularis.

828. HERMANNIA. Pentagyna. *Petala* cucullata, obliqua. *Capſ.* 5locularis, 1ſperma.

829. MELOCHIA. Pentagyna. *Capſ.* 5locularis, 1ſperma.

OCHROMA. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus. *Antherae* connatae anfractuoſae. *Capſ.* 5locularis, polyſperma.

HEXANDRIA.

PHILESIA. *Cal.* o. *Cor.* campanulata, 6partita: laciniis 3 interioribus duplo longioribus. *Stigm.* 3. *Bacca* ſubtrigona, polyſperma.

NO-

NOTHRIA. *Cal.* cylindr. 5angul. 5fidus. *Cor.* infundibulif. 5petala. *Stigm.* 3fidum.

* *Celosia marilandica, margaritacea. Ayenia. Passiflora. Linum narbonense. Gerania multa. Byttneria. Mahernium. Xanthium.*

HEPTANDRIA.

1136. EPHEDRA. *Flores* dioici. *Cor.* 0.
♂. *Amentum* 2fidum.
♀. *Cal.* imbricatus. *Pist.* 2. *Bacca* 2-sperma, calicina.

* *Gerania multa.*

OCTANDRIA.

1080. PLUKENETIA. *Flores* monoici. *Cal.* 0. *Cor.* 4petala.
♀. *Stil.* 1. *Capf.* 4cocca.

ALCHORNEA. *Flores* dioici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 3-5phyllus.
♀. *Cal.* 5dentatus. *Stilus* 2partitus. *Capf.* baccata, 2cocca.

1412. AITONIA. *Cor.* 4petala. *Pist.* 1. *Bacca* sicca, 4angularis, inflata.

ENNEANDRIA.

DRYANDRA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* 5petala.

QUARARIBEA. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* 5petala. *Stigma* 2lobum. *Capf.* 2locularis. *Sem.* solitaria.

DECANDRIA.

830. CONNARUS. *Stam.* alterna, brevissima. *Pist.* 1. *Legumen* 1loculare.

832. GERANIUM. *Pist.* 1. *Receptac. commune* rostratum. *Cocculi* 5 cauda longissima tortili.

SERRA. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus; *interior* semiquinquepartitus. *Fructus* ovatus 10spermus.

CRINODENDRON. *Cal.* 0. *Capf.* coriacea, obtuse trigona, 1-locularis, apice elastice dehiscens, 3sperma.

HUGONIA. *Stam.* in urceolum. *Pist.* 5. *Drupa* baccata: putamine 10loculari.

AERVA. *Stamina* 5 sterilia. *Cal.* 5phyllus inferus. *Capf.* oblonga, 1sperma.

PLAGIANTHUS. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5fidus. *Germen* ovatum. *Stigma* clavatum. *Bacca.*

1084. JATROPHA. *Flores* monoici. *Cal.* 0.
♂. *Cor.* 5fida.
♀. *Cor.* 5petala. *Stil.* 3. *Capf.* 3cocca.

SUTHERLANDIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* campanulatus 5dentatus.
♀. *Pist.* 5. *Drupae* exsuccae 1loculares.
* *Kleinhovia. Styrax.*

ENDECANDRIA.

BROWNAEA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* exterior 5fida: interior 5petala. *Pist.* 1.

DODECANDRIA.

ACIOJA. *Stamina* inferne in membranam carnosam coalita. *Pist.* 1. *Drupa* sicca, coriacea, fibrosa, 1locularis. *Nux* 1.

835. PENTAPETES. *Stam.* 5. elongata, colorata. *Pist.* 1. *Capf.* 5locularis, polysperma.

WALCUFFA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata 5petala. *Stigma* 5fidum.

1083. CROTON. *Flores* monoici. *Cal.* 5phyllus.
♂. *Cor.* 5petala. *Stam.* 15.
♀. *Cor.* 0. *Stil.* 3. *Capf.* 3cocca.

1082. ACALYPHA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 4phyllus.
♀. *Cal.* 3phyllus. *Stil.* 3. *Capf.* 3cocca.

1086. STERCULIA. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 0.
♂. *Stam.* circiter 15.
♀. *Pist.* 1. *Capf.* 5.

ALEURITES. *Flores* monoici. *Cor.* 5petala, calice triplo longior. *Nectarium* squamis 5. *Cal.* 3fidus.
♀. *Stil.* 0. *Stigm.* 2. *Bacca* globosa, 2cocca.

LATA.

LATANIA. *Flores* dioici.
♂. *Spatha* polyphylla: foliolis imbricatis. *Spadix* ramosus: ramis apice digitato-ramulosis; ramulis amentiformibus, squamis 1floris. *Cal.* 6partitus.

* *Halesia.*

ICOSANDRIA.

1087. HURA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 2phyllus. *Antherae* sessiles.
♀. *Cal.* cylindricus. *Pist.* 1. *Capsl.* 10cocca.

1137. ADELIA. *Flores* dioici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 3partitus.
♀. *Cal.* 5partitus. *Stil.* 3. *Capsl.* 3cocca.

CROSSOSTYLIS. *Cal.* 4partitus. 4angularis. *Petala* 4. *Stigma* 4partitum. *Bacca* hemisphaerica, supera, 1locularis, polysperma.

ASSONIA. *Cal.* 2plex: exterior apice 3crenatus; interior profunde 5partitus. *Petala* 5. *Stil.* 5. *Capsl.* 5, 1loculares, 2spermae, in globum aggregatae.

CAVANILLA. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus, deciduus; interior 5partitus persistens. *Petala* 5. *Capsl.* 5 in orbem coalitae, 2valves, 1loculares.

POLYANDRIA.

* *pistillo uno.*

1414. GUSTAVIA. *Cal.* 0. *Petala* plura. *Bacca* multilocularis. *Semina* appendiculata.

SASSA. *Cal.* 0. *Cor.* 5fida. *Tub.* staminеus longissimus.

1344. GORDONIA. *Cal.* simplex, 5phyllus. *Capsl.* 5loculares. *Sem.* bina, alata.

642. MORISONIA. *Cal.* simplex, 2fidus. *Petala* 4. *Stil.* 1. *Bacca* corticata, pedicellata.

MYRODIA. *Cal.* simplex, 1phyllus. *Petala* 5. *Drupa* sicca. *Nuces* binae.

665. MESUA. *Cal.* simplex, 4phyllus. *Petala* 4. *Nux* 4gona, 1sperma.

SOLANDRA. *Cal.* simplex. *Capſ.* toruloſa, 5locularis. *Sem.* multa, duplici ordine.

835. BOMBAX. *Cal.* simplex. *Stil.* indiviſus. *Capſ.* 5locularis. *Semina* multa, lanata.

836. ADANSONIA. *Cal.* simplex. *Capſ.* loculamentoſa polyſperma: pulpa farinacea.

1413. BARRINGTONIA. *Cal.* simplex, 2phyllus, ſuperus. *Drupa.* *Nux* 1-vel 4locularis.

CURUPITA. *Cal.* simplex, 6partitus, ſuperus. *Capſ.* ſphaerica, operculata, incluſa, 6locularis, polyſperma.

1415. CAROLINEA. *Cal.* simplex, tubuloſus, truncatus. *Petala* enſiformia. *Pomum* 5ſulcatum, 2loculare.

LAGUNA. *Cal.* simplex, 1phyllus, 5cuſpidatus. *Petala* 5, tubo ſtaminifero inſerta. *Stigma* peltatum. *Capſ.* 5valvis, 5locularis: loculis polyſpermis.

1081. DALECHAMPIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 6phyllus. *Nectarium* lamellatum.
♀. *Cal.* 10phyllus. *Stil.* 1. *Capſ.* 3cocca.

1135. TAXUS. *Flores* dioici. *Cal.* 4phyllus. *Cor.* 0.
♂. *Antherae* 8fidae.
♀. *Stigm.* 1. *Bacca* 1ſperma, recutita.

845. GOSSYPIUM. *Cal.* exterior 3fidus. *Capſ.* loculamentoſa, polyſperma, coadunata.

844. URENA. *Cal.* exterior 5fidus. *Arilli* 1ſpermi, muricati quini.

CIENFUEGOSIA. *Cal.* exterior ſetulis 12 conſtans. *Stigm.* clavatum. *Capſ.* 3valvis, 3locularis: loculis 1ſpermis.

CAMELLIA. *Cal.* exterior imbricatus. *Stilus* indiviſus. *Capſ.* loculis polyſpermis.

PAVONIA. *Cal.* exterior polyphyllus. *Cor.* patens. *Stigm.* 8-10. *Capſ.* 5 in orbem poſitae, 1loculares, 2valves, 1ſpermae.

846. HIBISCUS. *Cal.* exterior polyphyllus aut multifidus. *Cor.* patens. *Stigm.* 5. *Capſ.* 5valvis, 5locularis: loculis polyſpermis, raro 1ſpermis.

MALVAVISCUS. *Cal.* exterior 8phyllus. *Cor.* tubuloſa: petalis baſi auriculatis. *Stilus* apice 10fidus. *Stigm.* globoſa. *Drupa* ſphaerica, 5locularis: loculis 1ſpermis.

ANO-

ANODA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus. *Petala* 5. *Stil.* multifidus. *Capſ.* ſubtus hemiſphaerica, ſupra ſtellato-plana, multilocularis: loculis 1ſpermis.

PALAVA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Petala* 5. *Stilus* multifidus. *Capſ.* plures, 1ſpermae receptaculo centrali conico glomeratim impoſitae.

837. SIDA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Petala* 5, baſi connata. *Germ.* ſtriatum. *Stil.* multifidus aut plures. *Capſ.* numero quatuor excedentes, in orbem poſitae, 1loculares, 1-3ſpermae.

CURATARI. *Cal.* - - - *Cor.* - - - *Piſt.* - - - *Stam.* - - - *Capſ.* oblonga, operculata, obtuſe 3-gona, 3ſperma. *Semina* alata.

*** piſtillis duobus.*

1077. PINUS. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 4phyllus.
♀. *Amentum* ſtrobilaceum. *Nuces* 2 alatae.

**** piſtillis tribus.*

1085. RICINUS. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 5partitus.
♀. *Cal.* 3partitus. *Capſ.* 3cocca.

***** piſtillis quinque.*

847. STEWARTIA. *Cal.* ſimplex, patens. *Capſ.* loculamentoſa. *Sem.* ſolitaria.

MALACHODENDRON. *Cal.* ſimplex, 5-6partitus. *Cor.* 5-6petala patens. *Capſ.* 5 coadunatae, 2-valves, 1ſpermae.

****** ſtilis decem.*

RUIZIA. *Cal.* exterior 3phyllus, deciduus. *Petala* 5 falcata. *Capſ.* 10 in orbem poſitae, membranaceae, 1loculares, 2ſpermae.

****** *pistillis pluribus.*

838. NAPAEA. *Flores* interdum dioici. *Cal.* simplex, 5-fidus. *Cor.* 5petala.
♀. *Stam.* effoeta. *Arilli* 10 in orbem positi.

842. LAVATERA. *Cal.* exterior 3fidus. *Arilli* 1spermi, verticillati.

840. ALCEA. *Cal.* exterior 6fidus. *Arilli* 1spermi, plures.

839. ALTHAEA. *Cal.* exterior 9fidus. *Arilli* 1spermi, verticillati.

841. MALVA. *Cal.* exterior 3phyllus. *Arilli* 1spermi, verticillati, plures.

843. MALOPE. *Cal.* exterior 3phyllus. *Arilli* 1spermi, conglomerati.

1266. MALACHRA. *Cal.* exterior 3phyllus. *Arilli* 5 monospermi.

DIANDRIA.

1278. GNETUM. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* squama amenti.
♂. *Filamentum* 1 antheris 2.
♀. *Stigma* 3fidum. *Drupa* 1-sperma.

Gnemon. 1. Gnetum. *Mant. p.* 125. *Rumpf. amb.* 1. *t.* 71.

1279. STILLINGIA. *Flores* monoici.
♂. *Cal.* hemisphaericus, multiflorus. *Cor.* tubulosa, lacera.
♀. *Cal.* 1florus, inferus. *Cor.* supera. *Stigm.* 3. *Caps.* 3cocca.

silvatica. 1. Stillingia. *Mant. p.* 126.

1088. HIPPOMANE. *Flores* monoici, amentacei. *Cor.* o.
♂. *Perianth.* 2partitum vel 4fidum.
♀. *Perianth.* 2-3fidum. *Stigmata* 3. *Drupa* vel *Caps.* 3cocca.

Mancinel- 1. H. foliis ovatis crenatis basi biglandulosis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 238.
biglandulosa. 2. H. foliis ovato-oblongis basi biglandulosis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 237.
spinosa. 3. H. foliis subovatis dentato-spinosis. *Pluckn. alm. t.* 196.

TRIANDRIA.

1134. JUNIPERUS.

Flores diclini.

♂. *Cal.* squama amenti. *Cor.* o. *Drupa* succulenta, clausa, polypyrena.

♀. *Cal.* 3partitus. *Petala* 3. *Pist.* 3. calicis tuberculis 3 inaequalis, 1locularis, glandulis balsamiferis ad basin externam stipata.

thurifera. 1. J. foliis quadrifariam imbricatis acutis.

barbadensis. 2. J. foliis omnibus quadrifariam imbricatis: junioribus ovatis, senioribus acutis. *Hort. angl. t.* 1. *f.* 1.

Sabina. 3. J. foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis. *Blackw. herb. t.* 214.

sinensis. 4. J. foliis decurrentibus imbricato-patentibus confertis: caulinis ternis; ramcis quaternis. *Mant. p.* 127.

bermudiana. 5. J. foliis inferioribus ternis: superioribus binis decurrentibus subulatis patulis acutis. *Herm. par. Lugdb. t.* 347.

virginiana. 6. J. foliis ternis: omnibus patentibus. *du Roi harbk. Baumz.* 1. *p.* 346.

caroliniana. 7. J. foliis ternis basi adnatis: junioribus imbricatis: senioribus patulis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 660. Juniperus virginiana. *Sloan. hist. jam.* 2. *t.* 157. *f.* 3.

communis. 8. J. foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. *Mill. ill. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* W. 8. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 3.

Oxycedrus. 9. J. foliis ternis patentibus mucronatis bacca brevioribus. *Mant. p.* 499. *du Hamel arbr.* 2. *t.* 128.

phoenicea. 10. J. foliis ternis obliteratis imbricatis obtusis.

lycia. 11. J. foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis. *Lob. ic.* 221. (*ined.*)

1410. APHYTEIA. *Cal.* magnus, infundibuliformis, superus semitrifidus. *Petala* 3 fauci tubi calicis inserta, eoque breviora. *Antherae* maximae, persistentes. *Stigm.* 3gonum. *Bacca* 1locularis.

Hydnora. 1. APHYTEIA. *Suppl. p.* 301. *Thunb. act. Stockh.* 1775. *t.* 2. *et* 1777. *t.* 4. *f.* 1. 2. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 137. *f.* 3.

GYMNANTHES. *Flores* diclini. *Amentum* nudum. *Cal.* 0. *Cor.* 0.
♂. *Pedicellus* 3partitus, antherifer.
♀. *Germen* pedicellatum. *Stigm.* 3. subsessilia. *Caps.* 3cocca, 3locularis.

elliptica. 1. G. dioica, staminibus tripartitis, floribus femineis amentaceis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 96.

lucida. 2. G. monoica, staminibus trichotomis, floribus femineis solitariis pedicellatis. *Swarts nov. pl. gen. et spec. p.* 96.

GALAXIA. *Spatha* 1valvis. *Cor.* 1petala, 6fida.

ovata. 1. G. foliis ovatis. *Thunb. nov. pl. gen. p.* 51. *ic. Suppl. p.* 93. Ixia Galaxia.

graminea. 2. G. foliis lineari-filiformibus, tubo longissimo. *Suppl. p.* 94. Ixia fugacissima. *Jacq. collect.* 2. *p.* 366. *t.* 18. *f.* 2.

obscura. 3. G. foliis subulato-canaliculatis, corollae tubo brevi. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 341. *n.* 603. *t.* 189. *f.* 4.

TE-

TETRANDRIA.

1138. CISSAMPELOS.

Flores dioici. *Cal.* o.
♂. *Cor.* 4petala. *Nectarium* roratum.
♀. *Nectar.* extrorſum dilatatum. *Cor.* o. *Stil.* 3. *Bacca* 1ſperma.

Caapeba. 1. C. foliis baſi petiolatis integris. *Plum. ic.* 67. *f.* 2.

Pareira. 2. C. foliis peltatis cordatis emarginatis integrisque. *Plum. amer. t.* 93. *Swarts obſ. bot. t.* 10. *f.* 5.

ſmilacina. 3. C. foliis cordatis acutis angulatis. *Catesb. Car.* 1. *t.* 51.

fruticoſa. 4. C. foliis ovatis petiolatis integris, caule erecto fruticoſo. *Suppl. p.* 432.

capenſis. 5. C. foliis ovatis obtuſis petiolatis integris, caule volubili. *Suppl. p.* 432.

1078. THUJA.

Flores monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* ſquama amenti.
♀. *Cal.* ſquama ſtrobili 2flora. *Piſt.* 1. *Nux* 1 ilocularis cincta ala emarginata.

occidentalis. 1. Th. ſtrobilis laevibus: ſquamis obtuſis. *Blackw. herb. t.* 210. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 2.

orientalis. 2. Th. ſtrobilis ſquarroſis: ſquamis acutis. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 6. *t.* 92. *f.* 2.

dolabrata. 3. Th. ſtrobilis ſquarroſis, foliis trifariam imbricatis ſubtus excavatis niveis. *Suppl. p.* 420. *Thunb. flor. jap. p.* 266.

aphylla. 4. Th. ſtrobilis quadrivalvibus, foliis turbinatis vaginantibus hinc mucronatis. β) Thuja cupreſſoides. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 633. *Mant. p.* 125.

1079. **CUPRESSUS.** *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* ſquama iflora.
♂. *Cal.* amenti ſquama. *Antherae* ſeſſiles.
♀. *Cal.* ſtrobili ſquama. *Nux* angulata, ılocularis, evalvis.

ſempervirens. 1. C. foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Regn. bot. t.* 373. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 5. *β*) *Blackw. herb. t.* 127.

luſitanica. 2. C. foliis imbricatis glanduloſis, frondibus quadrangulis, ramis dependentibus. *Herit. ſtirp. nov. faſc.* 1. *p.* 15. *t.* 8.

thyoides. 3. C. foliis imbricatis, frondibus ancipitibus. *Pluckn. mant. t.* 345. *f.* 1.

columnaris. 4. C. foliis imbricatis ſubulatis ſulcatis, ſtrobilis cylindricis elongatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 67.

diſticha. 5. C. foliis diſtichis patentibus. *Catesb. Car.* 1. *t.* 11.

japonica. 6. C. foliis quadrifariis falcatis compreſſis ſulcatis decurrentibus. *Suppl. p.* 421. *Banks ic. Kaempf. t.* 48. *Thumb. flor. jap. p.* 265? *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 5.

juniperoides. 7. C. foliis oppoſitis decuſſatis ſubulatis patulis.

pendula. 8. C. foliis oppoſitis ovatis, ramulis dichotomis pendulis. *Thumb. flor. jap. p.* 265.

PENTANDRIA.

CAOUTCHOUA. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* globoſo-campanulatus, ſemiquinquefidus. *Antherae* infra apicem dorſo columnae longitudinaliter adhaerentes, ſubovatae, 2loculares.
♀. ſolitar. terminal. *Cal.* ſubpyriformi-campanulatus, 5fidus, circumſciſſus. *Piſt.* 1. *Stigm.* 3 depreſſo-2loba. *Capſ.* 3cocca, oſſea, 3locularis: loculis 2valvibus, 1ſpermis.

elaſtica. 1. CAOUTCHOUA. *Suppl. p.* 422. *Aubl. pl. guj. p.* 871. *t.* 335.

KIR-

KIRGANELLA. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* 5-partitus.
♀. *Bacca* parva, ſubtrilocularis, 6ſperma.

virginea. 1. KIRGANELLA. *Juſſieu gen. plant. p.* 387.

SECURINEGA. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus. *Cor.* o.
♂. *Column.* filament. exterius corona crocea cincta.

duriſſima. 1. SECURINEGA. *Juſſieu gen. plant. p.* 388.

ABRONIA. *Cal.* tubuloſus: limbo hypocrateriformi 5partito; laciniis obcordatis. *Antherae* incluſae. *Sem.* 1. imo calice tectum.

californica. 1. ABRONIA. *Juſſieu gen. plant. p.* 449.

1318. LERCHEA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* infundibuliformis, 5fido. *Antherae* germinis tubo inſidentes. *Stilus* 1. *Capſ.* 3locularis, polyſperma.

longicauda. 1. LERCHEA. *Mant. p.* 257.

OCHROMA. *Cal.* duplex: exterior 3phyllus. *Antherae* connatae, anfractuoſae. *Capſ.* 5locularis, polyſperma.

Lagopus. 1. OCHROMA. *Cavanill. diſſ. bot.* 5. *t.* 153. Bombax pyramidale.

827. WALTHERIA. Monogyna. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, 1ſperma.

americana. 1. W. foliis ovatis plicatis dentato-crenatis tomentoſis, capitulis pedunculatis. *Cavan. diſſ. bot.* 6. *t.* 170. *f.* 1.

anguſtifolia. 2. W. foliis ovatis minimis plicatis ſerratis nudis, floribus axillaribus glomeratis. *Cavan. diſſ. bot.* 6. *t.* 180. *f.* 2.

3. W.

indica. 3. W. foliis ovatis ſerratis plicatis, capitulis ſeſſilibus. *Jacq. plant. rar. ic.* 1. *t.* 65. *nonne ſpecie conjungenda cum americana?*

carolinia-na. 4. W. foliis ovatis nervoſis caulibusque teretibus hirſutis, floribus ſolitariis. *Walt. flor. Carol. p.* 175.

ovata. 5. W. foliis lato-ovatis acuminatis ſerrato-dentatis tomentoſis craſſis, floribus racemoſis congeſtis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 317. *n.* 456. *t.* 171. *f.* 1.

elliptica. 6. W. caule fruticoſo, foliis ellipticis oblongis ſerratis plicatis tomentoſis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 316. *n.* 454. *t.* 171. *f.* 2.

1411. SYMPHONIA. Monogyna. *Cor.* globoſa. *Bacca* 5locularis.

globulifera. 1. SYMPHONIA. *Suppl. p.* 302.

MUTABEA. Monogyna. *Bacca* ſphaerica, 3locularis, 3ſperma. *Cal.* tubulatus, 5fidus: *Cor.* 5partita: tubo breviſſimo. *Filamentum* apice 5dentatum. *Stigma* capitatum.

gujanenſis. 1. MUTABEA. *Aubl. plant. guj.* 2. *p.* 680. *t.* 274.

TICOREA. *Cal.* minimus, 5dentatus. *Petala* 5 unguibus longiſſimis: inferne in tubum conjuncta. *Filamenta* in tubum coalita, apice 5cuſpidatum. *Capſ.* 5locularis.

foetida. 1. TICOREA. *Aubl. plant. guj.* 2. *p.* 689. *t.* 277.

828. HERMANNIA. Pentagyna. *Capſ.* 5locularis. *Petala* baſi ſemitubulata, obliqua.

althaeifolia. 1. H. foliis ovatis plicatis crenatis tomentoſis, calicibus florentibus campanulatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 179. *f.* 2.

incana. 2. H. foliis ovatis plicatis tomentoso-incanis: stipulis parvis subulatis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 328. *n.* 473.

plicata. 3. H. foliis cordato-ovatis denticulatis plicatis tomentosis, calicibus florentibus oblongo-ovatis subcylindricis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 411.

odorata. 4. H. foliis oblongo-lanceolatis tomentosis subtus rugosis: inferioribus truncato-denticulatis, calicibus urceolatis angulosis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 412.

falvifolia. 5. H. foliis ovatis integris rugosis tomentoso-hispidis, floribus cernuis. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 180. *f.* 2.

involucrata. 6. H. foliis ovatis acutis tomentosis, floribus solitariis involucratis corollis revolutis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 328. *n.* 475. *t.* 177. *f.* 1.

candicans. 7. H. foliis ovatis subcordatis obtusis tomentosis, calicibus florentibus patulis subangulatis, stipulis subulatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 412.

scabra. 8. H. foliis lanceolato-ovatis dentatis scabris, pedunculis biforis: calicibus brevibus. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 331. *n.* 481. *t.* 182. *f.* 2.

biserrata. 9. H. foliis ovato-lanceolatis inaequalibus serratis glabris, floribus cernuis. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 200. *f.* 2. *an cum glabrata, pulchella et diffusa Mahemiae potius species?*

trifurca. 10. H. foliis lanceolatis integris tridentatisque, racemis secundis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 178. *f.* 2.

hyssopifolia. 11. H. foliis lanceolatis obtusis serratis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 181. *f.* 3.

lavendulifolia. 12. H. foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Dill. h. Elth.* *t.* 147. *f.* 176.

denudata. 13. H. foliis lanceolatis acutis laevibus superne serratis. *Suppl. p.* 301. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 181. *f.* 1.

glabrata. 14. H. foliis lanceolatis acutis inciso-serratis glabris, floribus cernuis. *Suppl. p.* 301. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 200. *f.* 1.

ciliaris. 15. H. foliis lanceolatis acutis integris serratisque ciliatis. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 176. *f.* 1. *an eadem cum Mahemia verticillata?*

grossulariifolia. 16. H. foliis lanceolatis pinnatifidis. *Characterem augeant autoptae.*

17. H.

pulchella. 17. H. foliis lanceolatis pinnatifidis: pinnis integris inciſisque, caule erecto laevi. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 177. *f.* 3.

diffuſa. 18. H. foliis lanceolatis pinnatifidis: pinnis integris dentatisque, pedunculis capillaribus biſloris, caule procumbente. *Suppl. p.* 302.

procumbens. 19. H. foliis inciſo-pinnatifidis: inferioribus ovatis; ſuperioribus elongatis, floribus racemoſis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 329. *n.* 477. *t.* 177. *f.* 2.

veſicaria. 20. H. caule tomentoſo, foliis confertis pinnatifidis ſubtus piloſo-ſtellatis, capſulis magnis inflatis terminalibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 331. *n.* 483. *t.* 181. *f.* 2.

alnifolia. 21. H. foliis cuneiformibus lineatis plicatis crenato-emarginatis. *Mill. illuſtr. ic.*

capenſis. 22. H. foliis oblongis obtuſis inciſis ſeſſilibus, floribus axillaribus ſubſolitariis. *Paterſ. it. cap. p.* 60. *ic.*

linifolia. 23. H. foliis linearibus, pedunculis uniſloris.

filifolia. 24. H. foliis lineari-triquetris integerrimis. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 180. *f.* 3.

trifoliata. 25. H. foliis ternatis ſeſſilibus plicatis retuſis tomentoſis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 182. *f.* 1.

triphylla. 26. H. foliis ternatis petiolatis planis obovatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 178. *f.* 3.

829. MELOCHIA. Pentagyna. *Capſ.* 5 loculares, 1ſpermae.

depreſſa. 1. M. floribus ſolitariis, capſulis depreſſis pentagonis: angulis obtuſis ciliatis. *Mill. h. angl. t.* 3. *f.* 2.

venoſa. 2. M. pedunculis diſtinctis terminalibus multifloris, foliis ovatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis, caule piloſo. *Swartz nov. pl. gen. et ſp. p.* 97.

odorata. 3. M. paniculis pedunculatis compoſitis, foliis ovatis ſubcordatis ſublobatis, biſerratis glabris. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 173. *f.* 2.

concatenata. 4. M. racemis confertis terminalibus, capſulis globoſis ſeſſilibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 175. *f.* 2.

lupulina. 5. M. racemis confertis axillaribus, calicibus inflatis membranaceis, foliis ovato-cordatis inciso-ferratis subtus tomentosis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 97.

tomentosa. 6. M. floribus umbellatis axillaribus, capsulis pyramidatis pentagonis: angulis mucronatis, foliis tomentosis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 172. *f.* 2.

pyramidata. 7. M. floribus umbellatis, capsulis pyramidatis pentagonis: angulis inferne muricatis, foliis glabris. *Jacq. h. Vindob. t.* 30. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 7. *t.* 113. *f.* 7.

supina. 8. M. floribus capitatis, foliis ovatis serratis, caulibus procumbentibus. *Pluckn. almag. t.* 132. *f.* 4.

caracassana. 9. M. floribus capitatis, foliis alternis cordatis crenatis villosis petiolatis, caule erecto fruticoso. *Jacq. Collect.* 2. *p.* 369. *plant. rar. ic.* 2. *t.* 63.

corchorifolia. 10. M. floribus capitatis sessilibus, capsulis subrotundis, foliis subcordatis sublobatis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 174. *f.* 2.

nodiflora. 11. M. floribus conglobatis axillaribus, capsulis globosis, foliis ovatis acuminatis glabris. *Sloan. hist jam.* 1. *t.* 135. *f.* 2.

borbonica. 12. M. floribus axillaribus glomeratis, fructu quinquecapsulari, foliis ovato-lanceolatis cuspidatis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 321. *n.* 462. *t.* 174. *f.* 1.

hirsuta. 13. M. spicis terminalibus densis hirsutis, foliis ovatis inaequaliter serratis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 323. *n.* 465. *t.* 175. *f.* 1.

HEXANDRIA.

PHILESIA. *Cal.* o. *Cor.* regularis, campanulata, 6-partita: laciniis 3 interioribus duplo longioribus. *Stigmata* 3. *Bacca* subtrigona, polysperma.

magellanica. 1. PHILESIA. *Jussieu gen. plant. p.* 41.

NOTHRIA. *Cal.* prismat. 5angul. 5fidus. *Cor.* infundibuliformis, 5petala. *Stigm.* 3fidum. *Siliqua.*

capensis. 1. NOTHRIA. *Berg. flor. cap. p.* 171.

HEP-

HEPTANDRIA.

1136. EPHEDRA. *Flores* dioici amentacei. *Cor.* o.
♂. *Cal.* semibifidus. *Antherae* 4 inferiores, 3 superiores.
♀. *Cal.* 2partitus, 5plex. *Pist.* 2. *Sem.* 2, calice baccato tecta.

distachya. 1. E. pedunculis oppositis: amentis geminis. *Cam. hort. t.* 46.

monostachya. 2. E. pedunculis pluribus: amentis solitariis. *Gmel. flor. sib.* 1. *t.* 38. *f.* 1.

aphylla. 3. E. ramis patentissimis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 170.

OCTANDRIA.

1080. PLUCKNETIA. *Flores* monoici. *Cor.* 4petala.
♂. *Nectaria* 4 barbata. *Cal.* o.
♀. *Cal.* 4phyllus. *Stilus* longissimus: stigmate peltato 4fido. *Caps.* 4angularis, 4locularis.

volubilis. 1. PLUCKNETIA. *Suppl. p.* 421. *Rumpf. amb.* 1. *t.* 79. *f.* 2.

ALCHORNEA. *Flores* dioici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 3-5phyllus.
♀. *Cal.* 4-5dentatus. *Stilus* 2partitus. *Caps.* baccata, 2cocca.

latifolia. 1. ALCHORNEA. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 98.

1412. AITONIA. *Cal.* 4partitus. *Cor.* 4petala. *Pist.* 1. *Bacca* sicca, 4angularis, 1locularis, polysperma.

capensis. 1. AITONIA. *Suppl. p.* 303. *Thunb. act. Lund.* 1. *p.* 166. *ic.*

ENNEANDRIA.

DRYANDRA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* 5petala.

cordata. 1. DRYANDRA. *Thunb. flor. jap. p.* 267. *t.* 27.

QUARARIBEA. *Cal.* 3-5dentatus, perſiſtens. *Cor.* 5petala. *Stil.* longiſſimus, tubo vaginatus. *Stigma* 2lobum. *Capſ.* coriacea, ovata, 2locularis. *Sem.* ſolitaria, ovata.

gujanenſis. 1. QUARARIBEA. *Aubl. pl. guj. p.* 691. *t.* 278.

DECANDRIA.

830. CONNARUS. *Piſt.* 1. *Stigm.* ſimplex. *Capſ.* 2valvis, 1locularis, 1ſperma.

monocar. 1. C. foliis ovatis uninerviis ternatis. *Burm. zeyl. t.* 89. pos.

africanus. 2. C. foliis ternatis ſubtus nervoſis, floribus paniculatis: petalis imberbibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 7. *p.* 375. *t.* 221.

pentagynus. 3. C. foliis ternatis trinerviis, floribus pentagynis. *Cavanill. diſſ. bot.* 7. *p.* 376. *t.* 223.

pinnatus. 4. C. foliis ternatis aut quinato-pinnatis, petalis baſi biſetis. *Cavanill. diſſ. bot.* 7. *p.* 375. *t.* 222.

831. HUGONIA. *Cor.* 5petala. *Stili* 5. *Drupa* baccata: putamine ſtriato 10loculari.

Myſtax. 1. H. caule fruticoſo, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glabris, ſpinis oppoſitis revolutis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 73. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 58. *f.* 7.

tomentoſa. 2. H. foliis ovatis tomentoſis obſolete dentatis baſi anguſtatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 73. *f.* 2.

832.

832. GERANIUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Pist.* 1. *Stigm.* 5. *Receptac.* commune rostratum. *Coculi* 5: cauda longissima tortili.

* *corollis regularibus, glandulis* 5.

† *pedunculis unifloris.*

spinosum. 1. G. caule carnoso nodoso, spinis subulatis, foliis cuneiformibus reflexis. *Mant. p.* 98. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 75. *f.* 2. *Paterson journ. into Caffraria p.* 116. *ic.*

sanguineum. 2. G. caule articulato rubro hispido, foliis orbiculatis, profunde subseptempartitis: laciniis trifidis, pedunculis solitariis longissimis articulatis. *Bulliard herb. Franc. t.* 12.

prostratum. 3. G. caule prostrato nodoso, foliis oppositis profunde quinquelobis: lobis trifidis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 196. *t.* 76. *f.* 3.

ranunculoides. 4. G. radice tuberosa, foliis orbiculatis multifidis, pedunculis longissimis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 197. *n.* 271.

sessiliflorum. 5. G. radice napiformi squamosa, foliis subrotundis septempartitis: laciniis trifidis, floribus subsessilibus. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 198. *n.* 273. *t.* 77. *f.* 2.

emarginatum. 6. G. foliis emarginatis ovatis crenatis. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 193. *t.* 113. *f.* 1. *an monsoniae potius species?*

Reichardi. 7. G. foliis plerisque oblongis inciso-crenatis trilobis vel quinquelobis, scapis unifloris. *Murray comm. Goett.* 1780. *t.* 3. *Curtis bot. mag. t.* 18.

parvulum. 8. G. foliis cordatis obtusis villosis subtrilobis, scapis radicalibus nudis unifloris, floribus pentandris. *Scop. del. ins.* 1. *t.* 3. *f.* B.

sibiricum. 9. G. caule herbaceo villosissimo, foliis oppositis quinquepartitis, pedunculis subunifloris. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 77. *f.* 1.

†† *pedunculis bifloris*, Batrachia.

† *petalis bifidis, incisis aut emarginatis.*

arabicum. 10. G. foliis rotundis incisis, pedunculis binis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 126.

tuberosum. 11. G. foliis albicantibus multipartitis: laciniis linearibus subpinnatis obtusis, pedunculis binis aut bifloris, petalis emarginatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 78. *f.* 1.

montanum. 12. G. foliis petiolatis orbiculatis subseptemlobatis: lobis incisis venosis calicibusque pilosis, petalis emarginatis. *Hablizl ap. S. G. Gmel. it. 4. p. 173.*

dissectum. 13. G. caule villoso erectiusculo, foliis quinquepartito-trifidis pedunculos excedentibus, petalis emarginatis. *Cavanill. diss. 4. t. 78. f. 2.*

columbinum. 14. G. caule procumbente, foliis oppositis palmatis: laciniis pinnatis, pedunculis solitariis longissimis. *Cavanill. diss. 4. t. 82. f. 1.*

incanum. 15. G. caule procumbente, foliis palmatis subtus incanis: laciniis pinnato linearibus, pedunculis longissimis, coccu-lis hirsutis. *Cavanill. diss. 4. t. 82. f. 2.*

pusillum. 16. G. caule herbaceo ramoso, foliis subrotundo-lobatis: lobis trifidis, floribus pentandris. *Mant. p. 435. Cavanill. diss. 4. t. 83. f. 1.*

humile. 17. G. caule humili, foliis orbiculatis incisis lobatis, petalis bifidis aequalibus. *Cavanill. diss. 4. p. 202. n. 280. t. 83. f. 2.*

molle. 18. G. caule suberecto, foliis orbiculatis subseptemlobatis trifidis obtusis: caulinis oppositis, superioribus alternis. *Flor. dan. t. 679.*

pyrenaicum. 19. G. caule herbaceo villoso, foliis oppositis subpeltatis orbiculatis: lobis trifidis obtusis. *Cavanill. diss. 4. t. 79. f. 2. Curt. flor. Lond. t. 159.*

cinereum. 20. G. radice crassa, foliis orbiculatis cinereis profunde quinquelobis: radicalibus longissime petiolatis; caulinis oppositis. *Cavanill. diss. 4. t. 89. f. 1.*

lupinoides. 21. G. radice tuberosa, foliis orbiculatis tomentosis multipartitis: laciniis linearibus incisis, scapis radicalibus. *Burm. de geran. n. 65.*

argenteum. 22. G. radice crassa, foliis tomentoso-sericeis subpeltatis subseptempartitis: laciniis trifidis, scapis radicalibus. *Jacq. pl. var. ic. cent. 2. t. 65.*

bohemicum. 23. G. caule villoso viscoso, foliis oppositis rugosis glaucis viscosis, filamentis ciliatis. *Mant. p. 434. Cent. 176. Cavanill. diss. 4. t. 81. f. 2.*

carolinianum. 24. G. caule herbaceo dichotomo: geniculis inflatis rubescentibus, foliis oppositis quinquepartitis trifidis, cocculis hirsutis. *Cavanill. diss. 4. t. 124. f. 2. β) Mant. p. 434. Cavanill. diss. 4. t. 84. f. 1.*

25. G.

striatum. 25. G. caule herbaceo decumbente, foliis quinquelobis: lobis dentatis medio dilatatis, petalis bilobis venoso-reticulatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 79. *f.* 1. *Curtis bot. magaz. t.* 55.

nodosum. 26. G. caule quadrangulari erecto, foliis subquinquelobis dentatis supra scabris subtus lucidis, petalis striatis bifidis. *Mant. p.* 434. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 80. *f.* 1.

reflexum. 27. G. caule herbaceo, foliis alternis subseptemlobis acutis, petalis reflexis laciniatis basi hiantibus, calicibus muticis. *Mant. p.* 256. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 81. *f.* 1.

ibericum. 28. G. caule herbaceo dichotomo villoso, foliis oppositis quinquepartitis incisis, petalis trilobis: medio breviore cuspidato. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 209. *t.* 124. *f.* 1.

silvaticum. 29. G. caule erecto, foliis subpeltatis quinquelobis inciso-serratis, petalis emarginatis. *Flor. dan. t.* 124.

†† *petalis integris.*

fuscum. 30. G. caule herbaceo erecto, foliis alternis hirsutis palmatoquinquelobis dentatis incisis, floribus subspicatis: calicibus mucronatis. *Mant. p.* 97. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 89. *f.* 2.

phaeum. 31. G. caule erecto, pedunculis solitariis, calicibus subaristatis, petalis undulatis. *Kniph. bot. or. cent.* 5. *n.* 35. *an vere distincta a fusco species?*

pratense. 32. G. caule herbaceo erecto, foliis oppositis subpeltatis multipartitis rugosis: lobis pinnatis acutis. *Curt. flor. Lond. t.* 250.

palustre. 33. G. foliis oppositis quinquelobis incisis cauleque herbaceo villosis, pedunculis longissimis declinatis. *Flor. dan. t.* 596.

batrachioides. 34. G. caule herbaceo erecto dichotomo, foliis oppositis quinquepartitis incisis, calicibus inflatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 211. *n.* 295. *t.* 85. *f.* 2.

macrorhizum. 35. G. foliis oppositis quinquelobis, calibus inflatis sphaericis, pistillo declinato longissimo. *Mant. p.* 434. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 85. *f.* 1.

maculatum. 36. G. caule erecto herbaceo, foliis oppositis quinquepartitis incisis: summis sessilibus, petalis integerrimis rotundatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 86. *f.* 2.

asphadeloides. 37. G. radice tuberosa, foliis multipartitis orbiculatis: laciniis acutis. *Burm. de geran. n.* 27.

lucidum. 38. G. caule herbaceo, foliis oppositis pilosis lucidis rotundato-lobatis, calicibus pyramidatis transversim rugosis. *Flor. dan. t.* 213.

rotundifolium. 39. G. caule prostrato, foliis oppositis: inferioribus subrotundis; superioribus subcuneatis, petalis integerrimis caule paulo longioribus. *Mant. p.* 434. *Regn. bot. t.* 214.

robertianum. 40. G. foliis ternatis pinnatis incisis, calicibus decemstriatis pilosis. *Flor. dan. t.* 694.

palmatum. 41. G. caule dichotomo: internodiis aphyllis longissimis, foliis radicalibus palmatis: lobis pinnatis; superioribus hastato-trilobis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 216. *n.* 302. *t.* 84. *f.* 2.

gruinum 42. G. caule crasso herbaceo erecto piloso, foliis radicalibus cordatis ovatis indivisis: caulinis oppositis subternatis; media longissima, floribus pentandris saepissime binis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 88. *f.* 2.

lacerum. 43. G. foliis runcinato-pinnatifidis: laciniis dentatis. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 21.

Botrys. 44. G. caule supino, foliis cordatis oblongis sinuato-pinnatifidis hirsutis, fructibus longis erectis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 218. *n.* 304. *t.* 90. *f.* 2.

praecox. 45. G. acaule, foliis pinnatis, scapis bifloris. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 272. *n.* 392. *t.* 126. *f.* 2.

bipinnatum. 46. G. caule decumbente, foliis oppositis inaequalibus bipinnatis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 273. *n.* 399. *t.* 126. *f.* 3.

maritimum. 47. G. caule procumbente, foliis cordatis ovatis crenatis incisis scabris, floribus pentandris raro ternis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 88. *f.* 1.

TTT *pedunculis multifloris*, Myrrhina.

† *foliis subintegris aut lobatis.*

crassifolium. 48. G. caule humifuso, foliis cordatis subrotundis rugosis crassis, floribus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 219. *n.* 306. *t.* 90. *f.* 1.

malacoides. 49. G. caule herbaceo, foliis oppositis cordatis subovatis lobatis crenatis, floribus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 91. *f.* 1.

heliotropioides. 50. G. caule fruticoso, foliis oppositis incanis subrotundo-ovatis crenato-dentatis, floribus umbellatis, cucculorum cauda longissima. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 220. *n.* 308. *t.* 113. *f.* 1.

51. G

glaucophyllum. 51. G. foliis oblongis lineatis crenato-sublobatis crassis, floribus pentandris umbellatis, rostris plumosis. *Mant. p.* 433. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 92. *f.* 2.

murcicum. 52. G. caulibus gracilibus herbaceis ramosis, foliis oppositis trilobis: lobo medio longiore obtuso crenato. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 272. *n.* 397. *t.* 126. *f.* 1.

chium. 53. G. caule herbaceo erecto, foliis oppositis cordatis incisis; superioribus trilobis; lobis pinnatifidis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 92. *f.* 1.

littoreum. 54. G. acaule, foliis cordato-ovatis subtrilobis crenatis. *Burm. de geran. n.* 60.

arduinum. 55. G. scapis radicalibus, floribus pentandris, foliis cordatis quinquelobis.

incarnatum. 56. G. foliis incisis quinquelobis punctatis: petiolis longissimis, pedunculis trifloris. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 91. *f.* 2.

trifolium. 57. G. caule herbaceo crasso ramoso, foliis lobatis: radicalibus ternatis; caulinis simplicibus oppositis, petalis venosis: superioribus maculatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 223. *n.* 314. *t.* 97. *f.* 3.

triangulare. 58. G. foliis triangularibus subpinnatifidis dentatis subvillosis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 123.

†† *foliis pinnatis.*

pulverulentum. 59. G. caulibus reclinato-erectis, foliis oppositis pinnatifidis: laciniis incisis, pedunculis elongatis umbelliferis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 272. *n.* 396. *t.* 125. *f.* 1.

laciniatum. 60. G. caule herbaceo, foliis oppositis profundissime trifidis: laciniis pinnatis linearibus, pedunculis elongatis umbelliferis, receptaculo longissimo. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 228. *n.* 321. *t.* 113. *f.* 3.

cicorium. 61. G. caule herbaceo reclinato, foliis pinnatis: pinnulis incisis, petalis duobus superioribus latioribus. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 18.

moschatum. 62. G. caule procumbente, foliis pinnatis: pinnulis ovatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis, floribus umbellatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 55.

chaerophyllum. 63. G. caule erectiusculo, foliis oppositis pinnatis incisis, cotyledonibus trilobis, pedunculis elongatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 226. *n.* 319. *t.* 95. *f.* 1.

cicutarium. 64. G. caule ramoso prostrato, foliis pinnatis: pinnulis subovatis, floribus pentandris. *Curt. flor. Lond. t.* 53.

romanum. 65. G. acaule, foliis bipinnatis hirsutis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 94. *f.* 2.

rupestre. 66. G. radice crassa lignosa, foliis inodoris bipinnatis supra tomentoso-incanis, scapis subtrifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 225. *n.* 316. *t.* 90. *f.* 3.

petraeum. 67. G. subacaule, foliis oppositis numerosis bipinnatis, scapis axillaribus. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 224. *n.* 315. *t.* 96. *f.* 2.

alpinum. 68. G. caule herbaceo, foliis bipinnatis, floribus umbellatis rugosis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 229. *n.* 323. *t.* 96. *f.* 1.

hirtum. 69. G. foliis subbipinnatifidis caule ramoso, floribus pentandris. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 123.

glandulosum. 70. G. acaule, foliis tripinnatis longissime petiolatis, petalis duobus latioribus maculatis plumosis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 271. *n.* 395. *t.* 125. *f.* 2.

** *corollis irregularibus, cuniculo per pedunculum excurrente.*

† *foliis zona notatis.*

zonale. 71. G. caule fruticoso, foliis orbiculatis crenatis obtuse lobatis: zona nigricante, floribus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 98. *f.* 2. *Martyn plat. t.* 10. *ill. Linn. syst. t.* 22. *f.* 3.

marginatum. 72. G. caule frutescente, foliis rotundato-lobatis albo-limbatis vetustate scariosis, floribus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 230. *n.* 325.

tetragonum. 73. G. caule tetragono fruticoso, foliis lobatis carnosis, pedunculis bifloris, corollis tetrapetalis. *Suppl. p.* 305. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 99. *f.* 2. *Flores heptandri.*

peltatum. 74. G. caule fruticoso, foliis quinquelobis integerrimis subpeltatis glabris. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 100. *f.* 1. *Mill. b. angl. t.* 140.

tabulare. 75. G. caule fruticoso, foliis peltatis rotundatis angulosis dentatis glabris. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 100. *f.* 2.

elongatum. 76. G. caule herbaceo prostrato hispido, foliis longissime petiolatis quinquelobis, pedunculis elongatis erectis, fructibus cernuis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 233. *n.* 329. *t.* 101. *f.* 3.

77. G.

alchimilloides. 77. G. caule herbaceo, foliis orbiculatis pilosis quinquepartitis: lobis trifidis, umbellis longissimis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 98. *f.* 1.

TT *foliis unicoloribus.*

† *integris vel subintegris.*

ciliatum. 78. G. acaule, radice tuberosa, foliis ovatis ciliatis integerrimis, scapo umbellifero. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 234. *n.* 331. *t.* 98. *f.* 2.

glaucum. 79. G. acaule, foliis ovato-oblongis serratis incano-tomentosis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 237. *n.* 336. *t.* 103. *f.* 2. *Curtis bot. magaz. t.* 56.

auritum. 80. G. acaule, foliis ovalibus simpliciusculis, umbella composita divisa. *Mant. p.* 433. *Commel. h. Amst.* 2. *t.* 61.

longifolium. 81. G. acaule, foliis lanceolatis longissime petiolatis, scapo ramoso, umbellis multifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 235. *n.* 332. *t.* 102. *f.* 1.

lanceolatum. 82. G. caule fruticoso, ramis virgatis, foliis lanceolatis oppositis subintegerrimis glaucis, pedunculis axillaribus subunifloris. *Suppl. p.* 306. Geranium glaucum. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 102. *f.* 2.

oenotherae. 83. G. foliis oppositis lanceolatis serrato-dentatis mollissime tomentosis, umbella pauciflora. *Suppl. p.* 305.

oxaloides. 84. G. radice rapacea, foliis ovato-hastatis carnosis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 237. *n.* 337. *t.* 97. *f.* 2.

ovatum. 85. G. caule brevi suffruticoso, foliis ovatis dentatis tomentosis, pedunculis terminalibus pauciforis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 66.

betulinum. 86. G. caule fruticoso, foliis ovatis inaequaliter serratis planis. *Burm. afr. t.* 33. *f.* 1.

acetosum. 87. G. caule fruticoso, foliis cuneato-ovatis crenatis carnosis, petalis superioribus angustioribus. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 104. *f.* 3.

hybridum. 88. G. caule fruticoso succulento, foliis alternis orbiculatis crenatis, umbellis elongatis. *Mant. p.* 97. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 105. *f.* 2.

cordifolium. 89. G. caule fruticoso, foliis cordatis subrotundo-acutis denticulatis tomentosis, umbellis numerosis terminalibus. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 240. *n.* 342. *t.* 117. *f.* 3.

90. G.

hermannifolium. 90. G. caule fruticoſo, foliis cuneiformibus plicatis ſcabris ſuperne ſerratis. *Mant. p.* 569.

cotyledonis. 91. G. foliis cordato-orbiculatis peltatis cucullatis crenatis pubeſcentibus. *Mant. p.* 569.

cucullatum. 92. G. caule fruticoſo, foliis cucullatis dentatis. *Mant. p.* 432. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 106. *f.* 1.

odoratiſſimum. 93. G. caule carnoſo brevi, ramis herbaceis longis, foliis cordatis molliſſimis fragrantiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 103. *f.* 1.

acerifolium. 94. G. caule erecto fruticoſo, foliis angulatis acutis dentatis ſubcucullatis, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 243. *n.* 349. *t.* 112. *f.* 2.

althaeoides. 95. G. caule herbaceo tomentoſo, foliis oppoſitis cordato-ovatis ſinuatis crenatis, umbella longiſſime pedunculata. *Mant. p.* 433. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 123. *f.* 2.

bifolium. 96. G. radice rapacea, foliis binis cordato-angulatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 254. *t.* 115. *f.* 3.

inquinans. 97. G. caule fruticoſo ſucculento, foliis cordatis orbiculatis lucidis ſublobatis crenatis. *Mill. illuſtr. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 19. a.

groſſulariaoides. 98. G. caule proſtrato laevi herbaceo, foliis cordatis ſubrotundis lobato-inciſis crenatis, pedunculis capillaribus. *Mant. p.* 432. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 119. *f.* 2. *Antherae* 4-5.

biflorum. 99. G. radice craſſa nodoſa, foliis binis lobato-inciſis acutis, pedunculis terminalibus biſloris. *Burm. afr. p.* 95. *t.* 37. *f.* 1.

ſtipulaceum. 100. G. caule breviſſimo imbricato, foliis ſublobatis crenato-inciſis, ſtipulis reflexis lanceolatis apice biſidis, pedicellis longiſſimis. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 122. *f.* 3.

piloſum. 101. G. radice napiformi, ſcapis radicalibus proliferis, foliis ſubovatis ſubtrilobis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 273. *n.* 400. 6. *t.* 199.

africanum. 102. G. foliis alternis cordatis dentatis villoſis: inferioribus orbiculatis; ſuperioribus ſubtrilobis, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 242. *n.* 347. *t.* 104. *f.* 1.

†† *foliis diviſis.*

papilionaceum. 103. G. caule fruticoſo, foliis alternis cordatis lobatis rugoſis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 112. *f.* 1.

104. G.

vitifolium. 104. G. caule fruticoso, foliis oppositis cordatis rugosis pubescentibus, floribus capitatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 111. *f.* 2.

capitatum. 105. G. caule diffuso, foliis lobatis undatis villosis, floribus capitatis. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 105. *f.* 1.

crispum. 106. G. caule fruticoso, foliis cordatis lobatis dentatis crispis, stipulis cordatis, pedunculis subunifloris. *Mant. p.* 257. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 109. *f.* 2.

exstipulatum. 107. G. caule fruticoso, ramis erectis, foliis alternis duplicato-trilobis crenatis glabris subexstipulatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 253. *n.* 367. *t.* 123. *f.* 1. *et* 5. *p.* 271.

trifidum. 108. G. acaule, radice rapacea, foliis ternis trilobis trifidisque. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 254. *n.* 371. *t.* 115. *f.* 1.

articulatum. 109. G. radice squamosa lignosa articulata, foliis radicalibus quinquelobis incisis, umbella subquadriflora: radiis longissimis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 252. *n.* 365. *t.* 122. *f.* 1.

variegatum. 110. G. foliis alternis quinquelobis: lobis trifidis serrato-dentatis: stipulis latis cordatis, pedunculis subbifloris. *Suppl. p.* 305. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 118. *f.* 3.

viscosum. 111. G. caule fruticoso, foliis cordatis quinquelobis acutis dentatis viscosis sinuatis, floribus umbellatis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 85. *plant. rar. ic. cent.* 2. *t.* 35.

quercifolium. 112. G. caule fruticoso, foliis sinuatis: laciniis rotundatis crenatis oblongis, floribus umbellatis. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 119. *f.* 1.

terebinthinaceum. 113. G. caule arborescente, foliis duplicato-trifidis: laciniis latis incisis crenatis, umbellis multifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 250. *n.* 362. *t.* 114. *f.* 1. *an distinctum satis a quercifolio?*

scabrum. 114. G. caule fruticoso exsucco, foliis cuneiformi-trifidis multifidisque scabris; umbellis paucifloris. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 64.

hirsutum. 115. G. acaule, radice turbinata, foliis ovatis laciniatis rugosis hirsutis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 247. *n.* 357. *t.* 101. *f.* 2.

hispidum. 116. G. foliis palmatis dentato-laceris, cauleque fruticoso hispidis, umbellis compositis: involucris reflexis. *Suppl. p.* 304. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 110. *f.* 1.

bicolor. 117. G. caule brevi fruticoso, ramis teretibus, foliis oppositis hirsutis tripartitis: laciniis crispis dentatis, umbellis multifloris capitatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 39.

fulgidum. 118. G. caule fruticoſo ſucculento, foliis tripartitis inciſis: intermedio majore, umbellis geminis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 116. *f.* 2.

revolutum. 119. G. foliis multipartitis: laciniis revolutis, calicibus profundiſſime partitis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 84. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 33.

aculeatum. 120. G. foliis oblongis inciſo-lobatis, umbellis triſloris, caule ſpinoſo. *Paterſon journ. into Caffraria. p.* 67. *ic.*

††† *foliis ternatis.*

lobatum. 121. G. radice tuberoſa, foliis ternatis craſſis tomentoſis, ſcapis radicalibus diviſis umbelliferis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 114. *f.* 2.

ternatum. 122. G. caule fruticoſo hiſpido, foliis oppoſitis ternatis: foliolis cuneatis inciſo-trifidis ſerratis ſcabris. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 107. *f.* 2.

laevigatum. 123. G. caule fruticoſo glabro, foliis ternatis ſublinearibus trifidis glaucis, pedunculis biſloris. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 121. *f.* 1.

alceoides. 124. G. foliis ternatis trifidis laciniatis, caule herbaceo hirto.

abrotanifolium. 125. G. caule fruticoſo, foliis ternatis trifidis: laciniis linearibus, floribus umbellatis. *Suppl. p.* 304. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 117. *f.* 1.

†††† *foliis pinnatis.*

gibboſum. 126. G. caule fruticoſo carnoſo: geniculis gibbis, foliis pinnato-lobatis glaucis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 103. *f.* 1.

betonicum. 127. G. foliis ſubovatis lobato-pinnatis crenatis obtuſis, umbellis pauciſloris. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 264. *n.* 391. *t.* 118. *f.* 1.

carnoſum. 128. G. caule fruticoſo: articulis carnoſo-gibboſis, foliis alternis pinnatifidis laciniatis, petalis linearibus. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 99. *f.* 1.

arenarium. 129. G. acaule, foliis pinnatifidis: laciniis oblongis inciſo-ſerratis. *Burm. de geran. n.* 63.

pinnatifidum. 130. G. acaule, radice turbinata, foliis duplicato-pinnatifidis: laciniis linearibus obtuſis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 260. *n.* 382. *t.* 120. *f.* 1.

131. G.

pinnatum. 131. G. acaule, radice turbinata tuberosa, pinnis ovatis subsessilibus. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 257. *n.* 376. *t.* 115. *f.* 2.

astragalifolium. 132. G. radice crassa, pinnis ovato-acuminatis incanis hirsutis, scapis subradicalibus elongatis umbelliferis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 257. *n.* 377. *t.* 104. *f.* 2.

capillare. 133. G. foliis oppositis: pinnis linearibus, pedunculis axillaribus solitariis subunifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 258. *n.* 378. *t.* 97. *f.* 1.

proliferum. 134. G. radice turbinata, pinnis tri- et quinquepartitis linearibus. *Burm. de geran. n.* 70. *t.* 2.

minimum. 135. G. foliis radicalibus cespitosis, caulinis oppositis, floribus terminalibus umbellatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 260. *n.* 384. *t.* 121. *f.* 3.

ferulaceum. 136. G. pinnis lobatis incisis revolutis, petalo superiore erecto; reliquis dependentibus. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 265. *n.* 392. *t.* 110. *f.* 2.

villosum. 137. G. caule brevi hirto, foliis duplicato-pinnatis: pinnulis capillaribus, umbellis pluribus terminalibus elongatis. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 258. *n.* 379. *t.* 117. *f.* 2.

appendiculatum. 138. G. radice rapacea, foliis radicalibus tomentoso-lanatis duplicato-pinnatis: stipulis longe decurrentibus apice dilatatis, umbellae radiis scapo subaequalibus. *Suppl. p.* 304. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 121. *f.* 2.

ramosissimum. 139. G. caule frutescente, foliis bipinnatis: pinnulis subrotundis glabris. *Burm. pl. afr. t.* 34. *f.* 2.

triste. 140. G. radice tuberosa, foliis longissimis bipinnatis hirtis, floribus umbellatis: corollis subaequalibus. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 19.

fruticosum. 141. G. caule fruticoso exsucco, foliis oppositis bipinnatis, pedunculis bifloris. *Cavanill. diss.* 4. *p.* 263. *n.* 389. *t.* 122. *f.* 2.

coriandrifolium. 142. G. ramis reclinato-erectis nodosis, foliis bipinnatis linearibus, umbellis paucifloris. *Cavanill. diss.* 4. *t.* 116. *f.* 1.

myrrhifolium. 143. G. foliis bipinnatis: inferioribus cordatis lobatis, caule herbaceo, calicibus strigosis. *Mant. p.* 433. *Herm. par. Lugdb. t.* 281.

daucifolium. 144. G. foliis hirtis alternatim tripinnatis: foliolis pinnatifidis. *Murr. comm. Goett.* 1780. *t.* 4.

145. G.

flavum. 145. G. foliis trifariam alternatim pinnatis: foliolis pinnatifidis, scapis hirtis. *Mant. p.* 257. *an satis distinctum a daucifolio?*

SERRA. *Cal.* 2plex, persistens: exterior 3phyllus; interior semiquinquepartitus. *Stil.* 5-partitus. *Stigm.* globosa. *Capsula?* 10sperma.

incana. 1. SERRA. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 83. *t.* 35. *f.* 3.

CRINODENDRON. *Cal.* o. *Cor.* campanulata, patens, 6petala. *Caps.* coriacea, 1locularis, apice elastica vi dehiscens, 3sperma.

Patagua. 1. CRINODENDRON. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 300. *n.* 435. *t.* 158. *f.* 1.

AERVA. *Flores* polygami. *Cal.* 5phyllus, patens. *Stamina* hermaphroditis 5 sterilia. *Caps.* oblonga, 1sperma, calice vallata.

aegyptiaca. 1. AERVA. *Forsk. flor. aegypt. arab. p.* 170.

PLAGIANTHUS. *Cal.* 5fidus, brevis. *Cor.* 5petala. *Germen* ovatum. *Stigma* clavatum. *Bacca.*

divaricatus. 1. PLAGIANTHUS. *Forst. char. gen. p.* 43. *t.* 43.

1084. JATROPHA. *Flores* monoici. *Cal.* o.
♂. *Cor.* 1petala, infundibuliformis. *Stam.* alterna breviora.
♀. *Cor.* 5petala, patens. *Stil.* 3 2fidi. *Caps.* 3cocca. *Sem.* subsolitaria.

molucca- 1. J. foliis ovatis integerrimis subdentatis. *an distincti generis?*
na.

9. J.

variegata. 9. J. caliculata, foliis lanceolatis integerrimis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 79. *t.* 21.

Curcas. 2. J. foliis cordatis quinqueangulatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 63. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 7. *t.* 108. *f.* 1.

ſpinoſa. 10. J. caliculata, foliis tripartitis: lobis ſurſum angulatis integerrimis, caule fruticoſo aculeato. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 79.

herbacea. 3. J. aculeata, foliis trilobis, caule herbaceo.

urens. 4. J. foliis palmatis dentatis aculeatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 21.

Manihot. 5. J. foliis palmatis: lobis lanceolatis integerrimis laevibus. *Merian. ſurin.* 4. *f.* 4. 5.

Janipha. 6. J. foliis palmatis: lobis integerrimis; intermediis utrinque ſinu lobatis. *Mant. p.* 126. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 77.

glandulo-ſa. 11. J. caliculata, foliis villoſis quinquelobis: lobis denticulatis glanduloſis, caule fruticoſo exſtipulato. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 80.

glauca. 12. J. caliculata, foliis quinquefidis trifidisque ſerrato-dentatis: petiolis nudis, ſtipulis palmatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 78.

globoſa. 13. J. capſulis globoſis tetracoccis. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 7. *t.* 109. *f.* 3. *utrum hujus, an diſtincti generis?*

goſſypifo-lia. 7. J. foliis quinquepartitis: lobis ciliatis petiolisque, ſetis glanduloſis ramoſis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 23.

multifida. 8. J. foliis multifidis laevibus: ſtipulis ſetaceis multifidis. *Dill. h. Eltb. t.* 173. *f.* 213.

SUTHERLANDIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* campanulatus, 5dentatus.

♂. *Anth.* 5-10 in cylindr. connatae.

♀. *Anth.* 10 geminae. *Piſt.* 5. *Stigm.* clavatis. *Drupae* exſuccae, 1loculares, 1-ſpermae.

littoralis. 1. SUTHERLANDIA. *Rheed. h. malab.* 6. *p.* 37. *t.* 21.

ENDECANDRIA.

833. BROWNAEA. *Cal.* inaequaliter 2fidus. *Cor.* 2plex: exterior 5fida; interior 5petala. *Legumen* 2-loculare.

coccinea. 1. Br. foliis ſimplicibus, floribus lateralibus. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 121.

grandiceps. 2. Br. foliis pinnatis, ſpicis terminalibus. *Jacq. Collect.* 3. *p.* 287. *t.* 22. *f.* a-i. *an hujus generis quoque Palove Aubl. pl. guj. p.* 365. *t.* 141?

DODECANDRIA.

ACIOJA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala, inaequalis. *Filamenta* 11-12. *Drupa* ſicca, ovata, coriacea, fibroſa, 1locularis. *Nux* 1.

gujanenſis. 1. Acioja. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 698. *t.* 280.

834. PENTAPETES. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 20, quorum 5 caſtrata, longa. *Capſ.* lignoſa 5locularis: loculis 2valvibus. *Semina* alata.

acerifolia. 1. P. foliis cordatis repandis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 44. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 133. *f.* 2.

velutina. 2. P. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, floribus pentandris. *Forsk. fl. aeg. ar. p.* 64. Melhania velutina.

ſuberifolia. 3. P. foliis oblongis repandis apice ſinuatis acuminatis ſubtus incanis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 43. *f.* 2.

Erythroxylon. 4. P. foliis cordatis ſubcrenatis ſubtus tomentoſis ſubtus rugoſis, floribus ſubumbellatis decandris. *Pluckn. mant. p.* 6. *t.* 333. *f.* 1.

WALCUFFA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata 5-petala. *Stam.* 15. *Stigm.* 5fidum.

torrida. 1. WALCUFFA. *Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub.* 5. *app. p.* 67. *ic.*

1083. CROTON. *Flores* monoici, rarius dioici. ♂. *Cal.* cylindricus, 5dentatus aut 5phyllus. *Cor.* 5petala aut 0. *Glandul.* 5. *Stam.* 10-15. ♀. *Cal.* polyphyllus. *Cor.* 0. *Stil.* 3. ſemibifidi. *Capſ.* 3cocca. *Sem.* ſolitaria.

variegatum. 1. Cr. foliis lanceolatis integerrimis glabris pictis petiolatis. *Rumpf. amb.* 4. *t.* 25-27.

Caſcarilla. 2. Cr. foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis ſubtus tomentoſis, caule arboreo. *Catesb. Car.* 2. *t.* 46. *β*?) Croton lineare. *Jacq. amer.* 256. *t.* 162. *f.* 4.

caſtaneifolium. 3. Cr. foliis lanceolatis obtuſis ſerratis petiolatis glabris.

paluſtre. 4. Cr. foliis ovato-lanceolatis plicatis ſerratis ſcabris. *Mant. cent. t.* 38.

balſamiferum. 5. Cr. foliis ovato-lanceolatis ſcabris integerrimis ſubtus tomentoſis. *Mant. p.* 125. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 46.

obliquum. 40. Cr. foliis ovato-lanceolatis integerrimis, cauleque herbaceo tomentoſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 78.

plicatum. 41. Cr. foliis ovatis plicatis crenatis hirſutis, caule herbaceo. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 78.

cyanoſpermum. 42. Cr. capſulis globoſis glabris: ſeminibus glaberrimis violaceis. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6. *an diſtincta hujus generis ſpecies?*

cardioſpermum. 43. Cr. capſulis globoſis apice trituberculatis: ſeminibus cordiformibus. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

ſeſſiliflorum. 6. Cr. foliis ovatis acuminatis integerrimis glabris, floribus ſeſſilibus axillaribus dioicis pentandris. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 100.

pallens. 7. Cr. foliis ovatis acuminatis integerrimis utrinque glabris, racemis solitariis erectis terminalibus, calicibus fructu majoribus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 100.

maturense. 8. Cr. foliis ovatis acuminatis integerrimis subtus candido-sericeis basi biglandulosis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 879. *t.* 338.

gujanense. 9. Cr. foliis ovatis acuminatis serratis subtus ferrugineo-tomentosis basi biglandulosis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 882. *t.* 339.

acutum. 10. Cr. foliis ovatis serratis acuminatis biglandulosis, caule herbaceo. *Thunb. flor. jap. p.* 269.

Tiglium. 11. Cr. foliis ovatis glabris acuminatis serratis, caule arboreo. *Rumpf. amb.* 4. *t.* 42. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

hirtum. 12. Cr. foliis ovatis serratis basi pilis glanduliferis, spicis sessilibus, caule hispido. *Herit. stirp. nov.* 1. *p.* 17. *t.* 9.

laciferum. 13. Cr. foliis ovatis tomentosis serrulatis petiolatis, calicibus tomentosis. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 127. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

lucidum. 14. Cr. foliis ovatis glabris, floribus spicatis, stilis multifidis depresso-pubescentibus, caule frutescente. *Mant. p.* 497. *Berg. act. angl.* 1768. *t.* 7.

punctatum. 15. Cr. foliis alternis ovatis integerrimis petiolatis coriaceis incanis punctatis, pedunculis extrichotomia erectis solitariis racemosis. *Jacq. coll.* 1. *p.* 166.

maritimum. 38. Cr. foliis ovatis integerrimis obtusis supra rugosis, subtus petiolis calicibusque tomentosis, caule suffruticoso. *Walt. flor. carol. p.* 239.

glabellum. 16. Cr. foliis ovatis obtusiusculis integerrimis laevibus, capsulis pedunculatis. *Sloan. hist. jam.* 2. *t.* 174. *f.* 3. 4.

globosum. 17. Cr. foliis ovatis obtusis integris, pedunculis geminis, floribus dioicis, capsulis globosis echinato-hispidis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 100.

populifolium. 18. Cr. foliis lato-ovatis acuminatis serrato-dentatis subhirtis: petiolis longitudine foliorum, racemis terminalibus erectis solitariis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 101.

Inophyllum. 19. Cr. foliis obovatis integerrimis, caule arboreo. *Forst. flor. austr. p.* 67.

sebiferum. 20. Cr. foliis rhombeo-ovatis acuminatis integerrimis glabris. *Pet. gaz. t.* 34. *f.* 3.

21. Cr.

argenteum. 21. Cr. foliis cordato-ovatis ſubtus tomentoſis integris ſerratis. *Murray comm. Goett.* 1781. *t.* 4.

Ricinocarpos. 22. Cr. foliis ſubcordatis crenatis, pedunculis racemoſis oppoſitifoliis, caule herbaceo.

aſtroites. 39. Cr. foliis ovalibus ſubcordatis integerrimis utrinque ſtellato-tomentoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 375.

aromaticum. 23. Cr. foliis cordatis ſcabris ſubſerratis petiolatis, caule arboreo. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 126. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

moluccanum. 24. Cr. foliis cordatis angulatis ſcabris ſubtus tomentoſis. *Pluckn. alm. t.* 220. *f.* 5.

humile. 25. Cr. foliis cordatis integerrimis ſcabris ſubciliatis ſubtus incanis caule fruticoſo.

flavens. 26. Cr. foliis cordatis oblongis integerrimis utrinque tomentoſis, ramulis denſius tomentoſis.

macrophyllum. 27. Cr. foliis cordato-ſubrotundis acuminatis integris craſſis tomentoſis ſubtus nervoſis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 100.

nitens. 28. Cr. foliis cordato-ellipticis acuminatis ſubintegris glabris ſupra nitidis ſubtus punctato-argenteis, racemis axillaribus folio brevioribus erectis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 100.

nutans. 29. Cr. foliis rhombeo-ſubrotundis acuminatis undulatis glabris nutantibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 67.

tinctorium. 30. Cr. foliis rhombeis repandis capſulis pendulis, caule herbaceo. *Burm. ind. t.* 62. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

glandulo-ſum. 31. Cr. foliis oblongis ſerratis baſi biglanduloſis, capſulis ſeſſilibus.

divaricatum. 32. Cr. foliis oblongis obtuſis ſerratis hirtis baſi biglanduloſis, racemis terminalibus ſolitariis, caule frutiçoſo, ramis dichotomis divaricatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 100.

laurinum. 33. Cr. foliis oblongis acutis integerrimis conſiſtentibus glabris ſubtus una cum petiolis ſcabris punctatis, racemis axillaribus longiſſimis patulis, caule arboreſcente. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 100.

capenſe. 34. Cr. foliis haſtatis indiviſisque lanceolatis integerrimis glaberrimis. *Suppl. p.* 433.

japonicum. 35. Cr. foliis indivisis trilobisque ovatis acuminatis integris glabris. *Suppl. p.* 422. *Thunb. flor. jap. p.* 270. *t.* 28. 29.

lobatum. 36. Cr. foliis inermi-serratis: inferioribus quinquelobis; superioribus trilobis. *Mart. cent. t.* 46.

spinosum. 37. Cr. foliis palmatis quinquelobis trilobisque spinoso-serratis, floribus cauli appressis subsessilibus. *Pluckn. alm. t.* 108. *f.* 3.

1082. ACALYPHA.

Flores diclini. *Cal.* 3-4phyllus. *Cor.* o.

♂. *Stam.* 8-16.

♀. *Stil.* 3. *Capf.* 3sulca, 3locularis valvis bifariam dehiscentibus: *Sem.* solitaria.

* *caule fruticoso.*

fruticosa. 1. A. involucris femineis cordatis crenatis foliis ovatis acutis serratis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 161.

** *caule herbaceo.*

† *floribus monoicis.*

decidua. 2. A. involucris femineis cucullatis serratis deciduis, foliis lanceolato-ovatis petiolo sesquilongioribus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 161.

spicata. 3. A. involucris femineis cucullatis serratis, foliis lanceolatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 161.

ciliata. 4. A. involucris femineis urceolatis ciliatis spicis brevissimis, foliis ovatis acuminatis petiolum aequantibus. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 77. *t.* 20.

australis. 5. A. involucris femineis integerrimis, foliis lanceolatis obtusis.

villosa. 6. A. involucris femineis minimis dentatis villosissimis, spicis elongatis, foliis ovatis acuminatis serratis petiolo longioribus. *Suppl. p.* 422. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 47.

indica. 7. A. involucris femineis cordatis subcrenatis, foliis ovatis petiolo brevioribus. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 81. 82.

virginica. 8. A. involucris femineis cordatis incisis, foliis ovato-lanceolatis petiolo longioribus.

carolinia-na. 20. A. ſpicis femineis involucris villoſis ſubcordatis crenatis: ſpicis maſculis baſi involucri inſertis, foliis ovatis ſerratis. *Walt. flor. carol. p.* 238.

virgata. 9. A. ſpicis femineis involucris cordatis ſerratis: maſculis diſtinctis aphyllis, foliis lanceolato-ovatis.

hernandifolia. 10. A. ſpicis femineis longiſſimis: involucris cordatis ſerratis; maſculis diſtinctis aphyllis, foliis ſubcordatis ſerratis: petiolis longiſſimis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 99.

elliptica. 11. A. ſpicis femineis involucris germinibus brevioribus dentatis hirſutis: maſculis aphyllis laxis, foliis ellipticis acuminatis dentatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 99.

laevigata. 12. A. ſpicis femineis involucris multipartitis: maſculis laxis aphyllis, foliis cuneato-ovatis acuminatis ſerrulatis glaberrimis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 99.

tomentoſa. 13. A. ſpicis femineis terminalibus ſolitariis involucris multipartitis: maſculis erectis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris ſubtus villoſo-tomentoſis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 99.

corenſis. 14. A. floribus femineis terminalibus diſtinctis involucris triphyllis: ſpicis maſculis axillaribus involucratis, foliis ovatis ſerratis. *Jacq. ſtirp. amer. p.* 254. *t.* 161.

alopecuroidea. 21. A. ſpicis ſolitariis: maſculis lateralibus patentiſſimis; femineis terminalibus erectis: involucro ſetaceo tripartito. *Jacq. coll.* 3. *p.* 196.

anguſtifolia. 15. A. floribus femineis ſubſeſſilibus terminalibus involucris ſerratis: maſculis ſpicatis, foliis linearibus ſerratis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 99.

reptans. 16. A. ſpicis terminalibus erectis androgynis: floribus femineis inferioribus involucris cordatis ſerratis; maſculis aphyllis, foliis ovatis ſerratis, caule reptante. *Sloane hiſt. jam.* 1. *p.* 125. *t.* 82. *f.* 3.

ſupera. 17. A. amentis axillaribus maſculis flore femineo terminatis, foliis ovatis petiolo brevioribus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 162.

TT *floribus dioicis.*

ſcabroſa. 18. A. ſpicis femineis involucris cordatis inciſis, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſcabris. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 99.

betulaefolia. 19. A. floribus femineis axillaribus ſeſſilibus: involucris cordatis crenatis; maſculis ſpicatis, foliis ſubrotundis crenatis glabris. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 100.

1086. STERCULIA. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* 5partitus. *Nectarium* columnae cylindricae inſidens, 5dentatum.

♂. *Filamenta* 15.

♀. *Germen* globoſum, 5ſulcatum. *Capſ.* 5, 1loculares, polyſpermae.

Balanghas. 1. St. foliis ovatis integerrimis alternis petiolatis, floribus paniculatis. *Cavanill. diſſ.* 5. *t.* 144. *an Cratacuae ſpecies?*

Ivira. 2. St. foliis ovatis integerrimis alternatim ſparſis, capſulae baſi crinita. *Aubl. pl. guj. p.* 693. *t.* 279.

lanceolata. 3. St. foliis lanceolatis integerrimis, ſeminibus paucis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 287. *n.* 416. *t.* 143. *f.* 1.

cordifolia. 4. St. foliis cordatis latis acuminatis ſeptemnerviis venoſis, capſulis extrinſecus tomentoſis intus hiſpidis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 286. *n.* 414. *t.* 143. *f.* 2.

Fiorniana. 5. St. foliis cordatis lobatis, floribus paniculatis. *Suppl. p.* 423. Sterculia platanifolia. *Marſil. act. Pad.* 1. *p.* 106. *t.* 1. 2. *Cavanill. diſſ.* 5. *t.* 145.

foetida. 6. St. foliis digitatis, floribus laxe racemoſis. *Sonner. it. ind.* 2. *t.* 132.

platanifolia. 7. St. foliis palmatis? paniculis terminalibus ramoſis aphyllis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 352. *n.* 417. *t.* 145.

ALEU-

ALEURITES. *Flores* monoici. *Cal.* subtrifidus. *Cor.* 5petala, calice triplo longior. *Nectarium* squamis 5 angulatis ad basin petalorum. ♀. *Stil.* 2 2partiti. *Drupa* 2locularis, sicca. *Sem.* solitaria.

triloba. 1. ALEURITES. *Forst. char. gen. p.* 56. *t.* 56. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 125. *f.* 2.

LATANIA. *Flores* dioici.
♂. *Spatha* polyphylla, imbricata. *Spadix* ramosus: ramis apice digitato-ramulosis, ramulis amentiformibus imbricatim squamulosis, squamulis unifloris. *Cal.* sessilis, 6partitus. *Antherae* oblongae 2loculares.
♀. *Bacca* globosa 1locularis, 3pyrena.

Commersonii. 1. LATANIA. *Jussieu gen. plant. p.* 39. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 120. *f.* 1.

ICOSANDRIA.

1087. HURA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Amentum* imbricatum. *Cal.* truncatus. *Filamenta* cylindrica, apice peltata, cincta *antheris* geminatis.
♀. *Cal.* 0. *Stil.* infundibuliformis. *Stigm.* 12fidum. *Capsul.* 12locularis. *Sem.* solitaria.

crepitans. 1. HURA. *Trew Ehret. t.* 34. 35. *f.* 1.

1137. ADELIA.

Flores dioici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 3partitus.
♀. *Cal.* 5partitus. *Stil.* 3. divaricati.
Capſ. 3cocca.

Bernardia. 1. A. foliis oblongis tomentoſis ſerratis.

Ricinella. 2. A. foliis obovatis integerrimis.

Acidoton. 3. A. ramis flexuoſis, ſpinis gemmaceis.

CROSSOSTYLIS. *Cal.* 4angularis, 4partitus, germini adnatus. *Cor.* 4petala. *Nectarium* corpuſculis circiter 20, inter ſtamina. *Stil.* perſiſtens. *Stigm.* patentiſſima 3fida. *Bacca* hemiſphaerica, ſupera, 1locularis, polyſperma.

biflora. 1. Crossostylis. *Forſt. char. gen. p.* 44. *t.* 44.

ASSONIA. *Cal.* 2plex, perſiſtens: *exterior* apice 3crenatus; interior 5partitus. *Filamenta* baſi in urceolum coalita, 5 ſterilia. *Stil.* 5. *Capſ.* 5 3quetrae, 1loculares, 2ſpermae in globum cortice tectum coalitae.

populnea. 1. Assonia. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 120. *n.* 173. *t.* 42. *f.* 1.

CAVA-

CAVANILLA. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus, deciduus; interior 5partitus perſiſtens. *Filamenta* baſi in urceolum coalita. *Stil.* 1. *Stigm.* 5. recurva. *Capſ.* 5. 2valves, 1loculares, in orbem coalitae.

* *calicis exterioris foliolis latis.*

palmata. 1. C. foliis cordatis palmatis ſeptemlobis: lobis acutis ſerrato-crenatis, floribus corymboſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 122. *n.* 174. *t.* 38. *f.* 1. Dombeya palmata. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 137. *f.* 1? Dombeya borbonica.

acerifolia. 2. C. foliis multipartitis calicibusque interioribus tomentoſis. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 131. *f.* 1. *an diſtincta hujus generis ſpecies?*

acutangula. 3. C. foliis cordatis ſubrotundo-tricuſpidatis crenatis, floribus racemoſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 123. *n.* 175. *t.* 38. *f.* 2. Dombeya acutangula.

tiliaefolia. 4. C. foliis cordatis ſubrotundo-acutis crenatis, floribus racemoſo-corymboſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 124. *n.* 177. *t.* 39. *f.* 2. Dombeya tiliaefolia.

tomentoſa. 5. C. foliis cordatis ſubrotundis crenatis tomentoſis venoſis: venis ſubcircularibus, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 125. *n.* 178. Dombeya tomentoſa.

angulata. 6. C. foliis cordatis ſubrotundis ſupra angulatis ſerrato-dentatis tomentoſis, umbellis numeroſis: pedunculis communibus petiolo brevioribus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 123. *n.* 176. *t.* 39. *f.* 1. Dombeya angulata.

** *calicis exterioris foliolis anguſtiſſimis.*

umbellata. 7. C. foliis cordatis ovato-oblongis acuminatis repandis glabris, floribus umbellatis globoſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 127. *n.* 181. *t.* 41. *f.* 1. Dombeya umbellata.

punctata. 8. C. foliis ovato-lanceolatis longis integerrimis ſubtus tomentoſis, ſupra punctato-ſcabris, floribus dioicis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 125. *n.* 179. *t.* 40. *f.* 1. Dombeya punctata.

decanthera. 9. C. foliis ovatis acuminatis repando-crenatis, floribus umbellatis: ſtaminibus quinque diantheris, quinque ſterilibus.

bus. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 126. *n.* 180. *t.* 40. *f.* 2. Dombeya decanthera.

ovata. 10. C. foliis ovatis dentatis quinquenerviis tomentosis, stilo minimo. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 127. *n.* 182. *t.* 41. *f.* 2. Dombeya ovata.

ferruginea. 11. C. foliis ovato-oblongis septemnerviis subtus ferrugineis: petiolis, pedunculis calicibusque tomentosis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 128. *n.* 183. *t.* 42. *f.* 2. Dombeya ferruginea.

phoenicea. 12. C. foliis subhastatis elongatis angustis crenato-serratis, floribus cernuis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 456. Pentapetes phoenicea. *Mill. illustr. ic. Trew rar.* 7. *t.* 5. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 134. *f.* 4.

POLYANDRIA.

1414. GUSTAVIA. *Cal.* o. *Petala* 4-8. *Bacca* 4-6-locularis. *Sem.* appendiculata.

angusta. 1. Gustavia. *Suppl. p.* 313. *Aubl. pl. guj. t.* 192. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 138. *f.* 1. *β*) *Aubl. pl. guj. t.* 193.

SASSA. *Cal.* o. *Cor.* 5fida. *Tubus* staminеus longissimus.

gummifera. 1. Sassa. *Bruce trav. in Eg. Arab. Ab. and Nub.* 5. *app. p.* 28. *ic.*

836. ADANSONIA. *Cal.* simplex, deciduus. *Stil.* longissimus. *Stigm.* plura. *Caps.* lignosa, 10locularis, polysperma: pulpa farinacea.

digitata. 1. Adansonia. *Cavanill. diss.* 5. *t.* 157. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 5.

1413. BARRINGTONIA. *Cal.* 2phyllus, ſuperus. *Drupa* nuce 1-4loculari.

ſpecioſa. 1. BARRINGTONIA. *Suppl. p.* 312. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 362
Mammea aſiatica. *Forſt. char. gen. t.* 43.

CURATARI. *Cal.* - - - *Cor.* - - - *Capſ.* infera, operculata, 3gona, 3ſperma. *Sem.* alata, plana.

gujanenſis. 1. CURATARI. *Aubl. pl, guj.* 2. *p.* 724. *t.* 290.

1415. CAROLINEA. *Cal.* ſimplex, campanulatus, truncatus. *Petala* enſiformia. *Capſ.* ſulcata, 1locularis multivalvis, ovata.

princeps. 1. C. foliis ſubquinatis: foliolis ovato-lanceolatis. *Suppl. p.* 314. *Aubl. pl. guj. t.* 291. 292.

inſignis. 2. C. foliis ſubſeptenatis: foliolis obovato-oblongis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 101. *Cavanill. diſſ. bot.* 5. *t.* 154. Bombax grandiflorum.

LAGUNA. *Cal.* ſimplex, 5cuſpidatus, deciduus. *Stil.* ſimplex. *Stigma* peltatum. *Capſ.* 5locularis, 5valvis.

aculeata. 1. LAGUNA. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 173. *n.* 258. *t.* 71. *f.* 1.

835. BOMBAX. *Cal.* 3-5fidus. *Petala* ut plurimum 5. *Recept.* 5gonum. *Capſ.* lignoſa, 5locularis, 5valvis. *Semina* lanata.

pentandrum. 1. B. foliis ſeptenatis, floribus pentandris: antheris lunatis binis aut ternis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 182. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 133. *f.* 1.

Erianthos. 2. B. foliis ſeptenatis lanceolatis glabris, corollis exterius lanatis, antheris adnatis, caule aculeato. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 294. *n.* 427. *t.* 152. *f.* 1.

3. B.

heptaphyllum. 3. B. foliis ſeptenatis, ſtaminibus pentadelphis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 55. *Rheed. h. malab.* 3. *t.* 52.

globoſum. 4. B. foliis ſubſeptenatis glaberrimis, floribus faſciculatis: calice cyathiformi. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 353. *n.* 432.

Ceiba. 5. B. foliis quinatis, corollis monopetalis, fructus apice concavo, caule aculeato. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 54.

globiferum. 6. B. foliis quinatis emarginatis, fructu globoſo. *Aubl. pl. guj. p.* 701. *t.* 281.

Goſſypium. 7. B. foliis quinquelobis acuminatis ſubtus tomentoſis, caliciibus pentaphyllis. *Sonner. it. ind.* 2. *t.* 133.

ANODA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens, fructu maturo patentiſſimus. *Capſ.* multilocularis, ſupra hemiſphaerica, ſubtus ſtellato-plana, loculis ıſpermis.

Dilleniana. 1. A. foliis triangularibus: inferioribus lato-crenatis, ſuperioribus obſolete crenatis longe petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris longiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 40. *n.* 85. *t.* 11. *f.* 1.

haſtata. 2. A. foliis cordatis angulatis: ſuperioribus elongatis haſtatis, pedunculis longiſſimis axillaribus unifloris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 458. Sida criſtata. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 11. *f.* 2.

triloba. 3. A. foliis inferioribus cordatis ſubangulatis crenatis: ſuperioribus trilobis, pedunculis axillaribus ſolitariis longiſſimis unifloris. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 39. *n.* 84. *t.* 10. *f.* 3. *Scop. del. inſubr.* 1. *t.* 9.

PALAVA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Stil.* 1 multifidus. *Capſ.* plures ıſpermae, non dehiſcentes, receptaculo centrali conico glomeratim impoſitae.

malvifolia. 1. P. caulibus declinatis ramoſiſſimis, foliis cordatis ſublobatis glabris, pedunculis axillaribus unifloris petiolo longioribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 40. *n.* 86. *t.* 11. *f.* 4. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 50.

2. P.

moſchata. 2. P. foliis cordatis ovato-crenatis tomentoſis: ſtipulis lanceolatis parvis ſubnigris, pedunculis axillaribus unifloris longiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 41. *n.* 87. *t.* 11. *f.* 5.

837. SIDA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Stili* plures, *vel* 1 multifidus. *Capſ.* plures, quam 4, *in orbem* diſpoſitae, 1loculares, 1-3ſpermae, dehiſcendo ſaepius 2roſtres.

* *capſulis monoſpermis.*

† *quinque.*

‖ *foliorum longitudine latitudinem aequante aut pauliſper ſuperante.*

puſilla. 1. S. caule fruticoſo reclinato, foliis ellipticis dentatis glabris. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 6. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 4. *et diſſ.* 5. *t.* 127. *f.* 1.

plumoſa. 2. S. foliis ovatis dentatis retuſis, floribus terminalibus glomeratis: bracteis linearibus ciliatis cancellatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 7. *n.* 2. *t.* 12. *f.* 4.

veronicae-folia. 3. S. caule hirto, foliis cordatis acutis inaequaliter dentatis, pedunculis longiſſimis ſuberectis piloſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 7. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 3.

humilis. 4. S. caule ſpithamaeo ſcabro, foliis cordatis crenatis orbiculatis villoſis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 277. *n.* 402. *t.* 134. *f.* 2.

repens. 5. S. caule filiformi elongato proſtrato, foliis cordatis crenatis utrinque hiſpidis, pedunculis unifloris. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 7. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 2.

hederae-folia. 6. S. caule nodoſo radicante, foliis cordatis obtuſe crenatis ſubhirſutis, capſularum corniculis erectis longis hamatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 8. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 3.

foetida. 7. S. caule erecto atro-purpureo, foliis ovato-cordatis ſerratis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 349. *n.* 513. *t.* 196. *f.* 1.

ovata. 8. S. caule promato ramoſo, foliis ovato-cordatis crenatis; pedunculis axillaribus ſolitariis unifloris. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 350. *n.* 514. *t.* 196. *f.* 2.

radicans. 9. S. caule repente, ſurculis radicantibus, foliis cordatis acutis piloſis dentatis: dentibus ſeta terminatis. *Rheed. h. malab.* 10. *f.* 79.

morifolia. 10. S. foliis ſubrotundo-acutis cordatis lato-crenatis: crenulis acuminatis, pedunculis annulatis petiolo paulo longioribus, calicibus piloſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 9. *f.* 7 *t.* 1. *f.* 1.

borbonica. 11. S. caule erecto ramoſo hirto, foliis cordatis ſubrotundo-acutis dentatis, floribus ſolitariis axillaribus: pedunculis petiolo paulo longioribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 9. *n.* 8. *t.* 10. *f.* 2.

calicina. 12. S. foliis cordatis crenatis, calice inſigni quinquepartito, corollis patentibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 9. *n.* 9. *t.* 8. *f.* 2.

Retzii. 13. S. foliis ſubrotundis cordatis ſerratis ſupra piloſis, capſulis ecornibus. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 23. *n.* 76. *Herit. ſtirp. n.* 5. *t.* 56. *bis.*

piloſa. 14. S. caule ramoſo piloſo, foliis crenatis: inferioribus cordatis ſubrotundis; reliquis cordato-ovatis, pedunculis longis geniculatis piloſis, capſulis bicornibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 9. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 8.

atro-ſanguinea. 15. S. foliis cordato-ovatis acutis ſerratis utrinque villoſis, pedunculis unifloris ſolitariis capillaribus, caule fruticoſo. *Jacq. collect.* 1. *p.* 49. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 29. *β*) Sida paniculata. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 458. *n.* 11.

ſapina. 16. S. foliis cordato-ovatis crenatis, caulibus filiformibus proſtratis. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 109. *bis. t.* 52. *bis. Cavanill. diſſ.* 6. *t.* 196. *f.* 2.

fragrans. 17. S. foliis cordatis rotundatis ligulato-acuminatis dentatis, pedunculis ſolitariis petiolo brevioribus. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 111. *t.* 53. *an eadem cum althaeifolia?*

multicaulis. 18. S. caulibus tenuibus tomentoſo-incanis, foliis ſubrotundo-cordatis dentatis pulverulentis villoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 10. *n.* 12. *t.* 1. *f.* 6.

javenſis. 19. S caule reclinato, foliis cordatis acutis ſublobato-crenatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 10. *n.* 13. *t.* 1. *f.* 5.

pyramidata. 20. S. foliis cordatis ſubrotundis dentatis, panicula terminali numeroſiſſima. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 11. *n.* 15. 6. *t.* 194. *f.* 1.

ſpinoſa. 21. S. foliis cordato-oblongis ſerratis: ſtipulis ſetaceis, axillis ſubſpinoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 1. *f.* 9.

frutescens. 22. S. foliis ovato-oblongis ſerratis ſubtus albicantibus: pedunculis erectis unifloris, folio duplo minoribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 12. *n.* 17. *t.* 10. *f.* 1.

23. S.

alnifolia. 23. S. foliis ſerratis ſubvilloſis: inferioribus rotundatis cordatis; mediis ellipticis, ſuperioribus lanceolatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 12. *n.* 18. *t.* 1. *f.* 13.

verticillata. 24. S. caule piloſo, foliis cordatis acuminatis crenatis, floribus ſubverticillatis ſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 13. *n.* 19. *t.* 1. *f.* 12.

bivalvis. 25. S. foliis cordatis orbiculato-acuminatis tomentoſis, floribus ſubſeſſilibus, fructu pentagono depreſſo glabro patente. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 13. *n.* 20. *t.* 11. *f.* 3.

proſtrata. 26. S. caule proſtrato, foliis cordatis latis crenatis tomentoſis, floribus geminis, capſulis muticis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 13. *n.* 21. *t.* 13. *f.* 3.

|| *foliorum longitudine latitudinem duplo aut magis adhuc excedente.*

flaveſcens. 27. S. caule erecto, foliis cordatis oblongis crenatis tomentoſis, floribus geminis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 14. *n.* 22. *t.* 13. *f.* 2.

truncata. 28. S. foliis cordato-oblongis retuſis ſerratis, ſtipulis ſetaceis, geniculis ramorum ſubtriſpinoſis. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 107. *t.* 51.

viſcoſa. 29. S. foliis cordatis crenatis tomentoſis, floribus ſubſolitariis, capſulis ſeptemlocularibus rotundis depreſſis. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 53. *bis. vix hujus tribus.*

glutinoſa. 30. S. caule tomentoſo-glutinoſo, foliis cordatis oblongis acuminatis ſubtus tomentoſis, pedunculis capillaribus longiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 16. *n.* 28. *t.* 2. *f.* 8.

urens. 31. S. foliis cordatis acuminatis ſerratis hiſpidis, pedunculis multifloris axillaribus terminalibusque. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 2. *f.* 7.

ulmifolia. 32. S. foliis crenatis cordatis oblongis: acumine producto, capſularum roſtris longis hamatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 15. *n.* 26. *t.* 2. *f.* 4.

jamaicenſis. 33. S. foliis ovatis ſerratis tomentoſis, floribus axillaribus ſubpedunculatis, capſulis biroſtratis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 2. *f.* 5.

glomerata. 34. S. foliis ovato-lanceolatis dentatis ſubſeſſilibus, floribus conglomeratis ſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 18. *n.* 32. *t.* 2. *f.* 6.

acuta. 35. S. foliis lineari-lanceolatis dentatis inferne integris, floribus subsessilibus solitariis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 15. *n.* 25. *t.* 2. *f.* 3.

angustifolia. 36. S. foliis lineari-lanceolatis serratis subtus tomentosis, stipulis setaceis, axillis obtuse trispinosis. *Murr. flor. Goett. p.* 220. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 2. *f.* 2. *Scop. del. insubr.* 1. *t.* 14. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 52.

linifolia. 37. S. foliis linearibus hirsutis integerrimis, floribus corymboso-spicatis: spicis terminalibus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 14. *n.* 23. *t.* 2. *f.* 1.

†† *capsulis septem.*

triloba. 38. S. foliis inferioribus cordatis crenatis: superioribus dentatis trilobatis: medio lanceolato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 11. *n.* 14. *t.* 1. *f.* 11. *et* 5. *t.* 131. *f.* 1.

ciliaris. 39. S. foliis ovalibus retusis serratis: stipulis linearibus ciliatis, capsulis muricatis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 3. *f.* 9. *et* 5. *t.* 127. *f.* 2.

microphylla. 40. S. foliis ovatis dentatis, caule erecto duro ramosissimo, floribus axillaribus apicem versus numerosis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 22. *n.* 44. *t.* 12. *f.* 2.

stipulata. 41. S. foliis lanceolatis dentatis acutis pilosis: stipulis longis linearibus ciliatis, flore longioribus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 22. *n.* 46. *t.* 3. *f.* 10.

††† *capsulis octo.*

carpinifolia. 42. S. foliis bifariis ovato-lanceolatis serratis: serraturis arctatis, umbellis axillaribus. *Suppl. p.* 307. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 51.

palmata. 43. S. foliis palmatis quinquangulis serratis exstipulatis, floribus subumbellatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 67. *β*) Sida ricinoides. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 115. *t.* 55.

ricinoides. 44. S. foliis quinquelobis serratis acuminatis, capsulis biaristatis. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 115. *t.* 55. *an eadem cum palmata?*

jatroploides. 45. S. foliis palmatis peltatis: laciniis lanceolatis runcinato-lobatis. *Herit. stirp. nov. p.* 117. *t.* 56. *an satis distincta a ricinoide?*

†††† *cap-*

TTTT *capsulis novem.*

suberosa. 46. S. foliis ovalibus subinciso-dentatis, cortice suberoso. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 113. *t.* 54.

retusa. 47. S. foliis cuneiformibus retusis serratis subtus tomentosis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 3. *f.* 4. *et* 5. *t.* 131. *f.* 2.

multiflora. 48. S. foliis ovatis dentatis tomentosis, pedunculis axillaribus solitariis petiolo longioribus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 18. *n.* 34. *t.* 3. *f.* 3.

herbacea. 49. S. caule erecto piloso ramoso, foliis subcordatis crenato-dentatis, pedunculis petiolo paulo brevioribus, capsulis birostratis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 19. *n.* 36. *t.* 13. *f.* 1.

micans. 50. S. foliis subcordatis ovato-lanceolatis dentatis, tomento mollissimo micantibus, calicibus globosis decemangulatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 19. *n.* 37. *t.* 3. *f.* 1.

maculata. 51. S. foliis ovatis serratis tomentosis, floribus spicatis terminalibus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 20. *n.* 38. *t.* 3. *f.* 7.

rotundifolia. 52. S. foliis subcordatis subrotundis crenatis tomentosis, capsularum rostris fasciculatis hirtis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 20. *n.* 39. *t.* 3. *f.* 6. *et* 6. *t.* 194. *f.* 2.

planicaulis. 53. S. foliis ovato-lanceolatis serratis, caule compresso, floribus subsessilibus. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 24. *n.* 50. *t.* 3. *f.* 11.

rhombifolia. 54. S. foliis lanceolato-rhomboidibus serratis: axillis subspinosis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 3. *f.* 12.

†††† *capsulis decem.*

alba. 55. S. foliis ovato-oblongis angustis serratis glabris: axillis inermibus, pedunculis longissimis erectis, stigmatibus purpureis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 22. *n.* 14. *t.* 3. *f.* 8.

orientalis. 56. S. foliis ovato-acutis inferne integris supra inaequaliter serratis: stipulis oblongis linearibus, capsulis muticis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 21. *n.* 41. *t.* 12. *f.* 1.

capensis. 57. S. caule ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis dentatis: stipulis ciliatis, capsulis muticis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 23. *n.* 49. *t.* 12. *f.* 3.

canescens. 58. S. caule fruticoso, foliis rhomboideis subsessilibus subtus villosissimis: stipulis setaceis erectis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 23. *n.* 48. *t.* 8. *f.* 3.

cordifolia. 59. S. foliis cordatis subangulatis serratis villosis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 3. *f.* 2.

calyptrata. 60. S. caule herbaceo glabro, foliis cordatis ovato-lanceolatis oblongis dentatis, floribus solitariis, seminibus calyptratis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 57. *n.* 93. *et* 5. *t.* 133. *f.* 1.

†††††† *capsulis numerum denarium superantibus.*

spicata. 61. S. foliis subcordatis acuminatis, floribus spicatis, pedunculis petiolum subaequantibus, capsulis pendulis obtusis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 24. *n.* 51. *t.* 8. *f.* 1.

exstipulata. 62. S. foliis cordatis obtusis acutis subtomentosis exstipulatis, pedunculis axillaribus solitariis unifloris petiolo brevioribus. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 56. *n.* 91. *t.* 14. *f.* 2.

silvatica. 63. S. caule arborescente, foliis tomentosis cordatis cuspidatis, pedunculis binis axillaribus unifloris. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 56. *n.* 92. *et* 5. *t.* 133. *f.* 2.

occidentalis. 64. S. foliis cordatis sublobatis: stipulis patentibus, pedunculis petiolo brevioribus, capsulis pendulis obtusis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 4. *f.* 3.

multifida. 65. S. caule prostrato, foliis multifidis, floribus secundis, seminibus alatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 25. *n.* 53. *t.* 4. *f.* 2. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 57. *bis. an hujus generis?*

** *capsulis dispermis.*

coronata. 66. S. fruticosa, foliis cordatis serratis tomentosis, pedunculis lateralibus unifloris. *Scop. del. inf.* 3. *p.* 1. *t.* 1.

*** *capsulis trispermis.*

† *quinque.*

triquetra. 67. S. foliis cordatis subtomentosis, ramis triquetris. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 118. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 2. *t.* 134. *f.* 5.

periplocifolia. 68. S. foliis cordatis integerrimis subtus tomentoso-incanis, caule paniculato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 26. *n.* 55. *t.* 5. *f.* 2.

stellata. 69. S. foliis subrotundo-cordatis acutis integerrimis. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 5. *f.* 4. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 59.

excelsior. 70. S. foliis cordato-acuminatis integris subtus villosis, floribus paniculatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 27. *n.* 57. *t.* 5. *f.* 3.

hermandioides. 71. S. foliis cordatis subpeltatis acuminatis subintegris, pedunculis fructiferis productioribus. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 121. *t.* 58. *an hujus generis? an vere distincta species?*

†† *cap-*

†† *capsulis sex.*

ramosa. 72. S. foliis ovatis acutis inaequaliter dentatis, pedunculis ramosis, capsulis birostratis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 28. *n.* 58. *t.* 6. *f.* 1.

††† *capsulis septem ad undecim.*

lignosa. 73. S. foliis cordatis crenatis tomentosis orbiculato-acuminatis, capsulis durissimis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 28. *n.* 59. *t.* 6. *f.* 2.

umbellata. 74. S. foliis cordatis subangulatis subtomentosis, floribus umbellatis, capsulis birostratis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 56.

microsperma. 75. S. caule flexuoso ramoso, foliis cordatis orbiculato-acutis quinquenerviis, fructu vix calicem excedente. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 29. *n.* 61. *t.* 13. *f.* 4.

Sonnerati. 76. S. foliis cordatis crenatis acutis tomentosis, pedunculis crassis geniculatis erectis, folio duplo longioribus, fructu pilis stellatis ornato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 29. *n.* 62. *t.* 6. *f.* 4.

terminalis. 77. S. foliis cordatis sublobato-crenatis tomentosis, scapo longissimo spica terminato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 29. *n.* 63. *t.* 6. *f.* 6. *et* 6. *t.* 195. *f.* 2.

tricuspidata. 78. S. foliis cordatis subrotundo-tricuspidatis dentatis tomentoso-incanis, calicum laciniis introrsum carinatis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 30. *n.* 64. *t.* 6. *f.* 5. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 60.

mollissima. 79. S. caule erecto tomentoso, foliis cordatis orbiculato-acuminatis dentatis mollissimis, floribus solitariis, calice fructifero decagono. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 49. *n.* 67. *t.* 14. *f.* 1. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 61.

†††† *capsulis pluribus quam undecim.*

crispa. 80. S. foliis cordatis crenatis scabriusculis, capsulis cernuis inflatis crenatis repandis. *Mant. p.* 445. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 7. *f.* 1. *et* 5. *t.* 135. *f.* 2.

indica. 81. S. foliis cordatis sublobatis, stipulis reflexis, pedunculis petiolo longioribus, capsulis scabris calicem excedentibus. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 7. *f.* 10.

pubescens. 82. S. foliis cordatis sublobatis valde tomentosis, pedunculis erectis hirsutissimis unifloris, fructu tomentoso conico truncato. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 33. *n.* 71. *t.* 7. *f.* 6.

asiatica. 83. S. foliis cordatis dentatis, pedunculis unifloris petiolo longioribus, fructu lanuginoso calicem paulisper superante. *Cavanill. diss.* 1. *t.* 7. *f.* 2. *et* 5. *t.* 128. *f.* 1.

populifolia. 84. S. foliis cordatis crenatis subrotundo-acutis: stipulis spiralibus patulis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 32. *n.* 69. *t.* 7. *f.* 9. *et* 5. *t.* 128. *f.* 2.

hirta. 85. S. caule hirto, foliis cordatis subrotundis dentatis: stipulis horizontalibus corniformibus, floribus solitariis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 33. *n.* 70. *t.* 7. *f.* 5. *et* 5. *t.* 129. *f.* 1.

Abutilon. 86. S. foliis subrotundo-cordatis indivisis pedunculos excedentibus, capsularum corniculis bifidis. *Knpih. bot. orig. cent.* 4. *n.* 79. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 1.

obtusa. 87. S. foliis subrotundo cordatis sublobatis, pedunculis umbellatis. *Vogel apud Trew pl. rar. t.* 89.

planiflora. 88. S. foliis cordatis subrotundo-acuminatis dentatis tomentosis, capsularum rostris primum solitariis, tum binis longis villosis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 32. *n.* 68. *t.* 7. *f.* 4. *et* 5. *t.* 135. *f.* 1. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 62.

exstipularis. 89. S. foliis cordato-acuminatis crenatis mollissimis, pedunculis unifloris petiolo duplo brevioribus, stipulis capillaribus longis villosis caducis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 31. *n.* 67. *t.* 7. *f.* 3.

crassifolia. 90. S. foliis cordatis utrinque tomentosis, pedunculis petiolo aequalibus, capsulis calice quinquangulo vix majoribus. *Herit. stirp. nov.* 5. *p.* 125. *t.* 60. *nonne eadem cum tricuspidata?*

*** *capsulis pentaspermis.*

vesicaria. 91. S. foliis cordatis dentatis subtrilobis, fructu inflato capsulis decem composito. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 55. *n.* 87. *t.* 14. *f.* 3.

**** *capsulis polyspermis.*

reflexa. 92. S. foliis subrotundo-cordatis acutis tomentosis obsolete crenatis, corollis reflexis. *Cavanill. diss.* 1. *p.* 36. *n.* 79. *t.* 7. *f.* 7. *et* 2. *p.* 54. *Herit. stirp. nov.* 5. *t.* 64.

***** *capsularum seminumve numero aut nimis inconstanti aut nondum definito.*

sinensis. 93. S. foliis ovalibus serratis subtus tomentosis: stipulis filiformibus. *Retz. obs. bot.* 4. *p.* 29. *n.* 94.

94. S.

truncatula. 94. S. foliis ſubovatis dentatis rugoſo-tomentoſis apice truncatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 35. *n.* 76. *t.* 6. *f.* 7.

lanceolata. 95. S. foliis lanceolatis ſerratis: ſtipulis linearibus acutis nervoſis. *Koenig apud Retz. obſ. bot.* 4. *p.* 28. *n.* 93.

perſica. 96. S. foliis inferioribus petiolatis cordatis acuminatis: ſuperioribus ſeſſilibus lanceolatis dentatis, pedunculis ſolitariis unifloris. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 35. *n.* 75. *t.* 4. *f.* 1.

arborea. 97. S. foliis cordatis ovatis acuminatis crenatis quinquenerviis molliſſime tomentoſis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p.* 307.

biflora. 98. S. foliis cordatis crenatis tomentoſis acuminatis: inferioribus oblongis tricuſpidatis, floribus geminis axillaribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 37. *n.* 80. *t.* 9. *f.* 1.

mauritiana. 99. S. foliis cordatis acutis holoſericeis indiviſis, pedunculis petiolo longioribus, capſulis hirſutis, caule fruticoſo. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 352. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 29.

dumoſa. 100. S. foliis cordatis acuminatis ſerratis utrinque glabris, floribus paniculatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 101.

virgata. 101. S. foliis cordatis ſerratis apice attenuatis, caule virgato, pedunculis axillaribus filiformibus unifloris. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 101.

althaeifolia. 102. S. foliis cordatis ſubangulatis obtuſis ſerrato-crenatis utrinque tomentoſis, capſularum roſtris calice brevioribus. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 218. *t.* 136. *f.* 2.

procumbens. 103. S. foliis cordatis ovato-ſubrotundis ſerratis villoſis, caule procumbente villoſo. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 101.

americana. 104. S. foliis cordatis oblongis indiviſis, fructibus longitudine calicis: capſulis lanceolatis. *Plum. ic.* 1. *t.* 2.

braſilienſis. 105. S. caule tomentoſo, foliis ſubcordatis ovato-acutis crenatis: crenulis acuminatis, floribus numeroſis breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 37. *n.* 82. *et* 2. *t.* 34. *f.* 1.

peruviana. 106. S. foliis ſubrotundo-cordatis acutis crenatis tomentoſis: ſtipulis lanceolatis ciliatis patulis, pedunculis axillaribus unifloris longis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 36. *n.* 78. *t.* 7. *f.* 8. *et* 5. *p.* 276. *t.* 130. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 63. *an eadem cum arborea?*

arabica. 107. S. foliis ovato-oblongis ſerratis, pedunculis axillaribus ſolitariis unifloris petiolo brevioribus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 124.

bicuſpi-data. 108. S. foliis ſerratis: inferioribus cordato-lanceolatis; ſuperioribus linearibus, capſulis bicuſpidatis. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 37. *n.* 73.

Phyllanthos. 109. S. foliis craſſis tomentoſis imbricatis duplicato-trifidis: petiolis floriferis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 276. *n.* 401. *t.* 127. *f.* 4.

ternata. 110. S. foliis ternatis ſerratis. *Suppl. p.* 307. *an eadem cum triloba?*

838. NAPAEA.

Cal. ſimplex, 5fidus. *Petala* 5. *Stamina* in aliis floribus interdum ſterilia, in aliis *ſtili*. *Capſ.* 10 in orbem diſpoſitae, rotundato-3quetrae, dehiſcendo ſubbiroſtratae, 1ſpermae.

laevis. 1. N. pedunculis nudis laevibus, foliis lobatis glabris. *Syſt. nat.* XII 3. *p.* 459. Napaea hermaphrodita. *Cavanill.* 5. *t.* 132. *f.* 1.

ſcabra. 2. N. pedunculis involucratis angulatis, foliis palmatis ſcabris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 459. Napaea dioica. *Ehret. pict. t.* 8. *et t.* 7. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent. t.* 136. *f.* 4. *an potius utraque ſpecies ſidis ſubjungenda?*

SOLANDRA.

Cal. ſimplex. *Capſ.* oblonga, toruloſa, 5locularis. *Sem.* multa duplici ordine in loculamentis diſpoſita.

lobata. 1. S. foliis omnibus ſimplicibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 11. *et* 5. *t.* 136. *f.* 1. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 49.

ternata. 2. S. foliis inferioribus ternatis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 279. *n.* 405. *t.* 136. *f.* 2.

1266. MALACHRA. *Cal. communis* 3polyphyllus, multiflorus, major; *proprius* duplex. *Capſ.* 5. 1ſpermae, in orbem poſitae.

faſciata. 1. M. foliis ſerratis trilobis: infimis quinquelobis, involucro communi triphyllo ſubquinqueſloro. *Jacq. coll. 2. p. 352. pl. rar. ic. cent. 2. t. 68.*

capitata. 2. M. foliis cordatis, calice communi triphyllo ſeptemfloro. *Cavanill. diſſ. 2. t. 33. f. 1.*

alceaefolia. 3. M. foliis baſi cordatis quinquelobis, involucro communi pentaphyllo ſubdecemfloro. *Jacq. coll. 2. p. 350.*

radiata. 4. M. foliis palmatis, calice communi ſubhexaphyllo multifloro: floribus ebracteatis. *Cavanill. diſſ. 2. t. 33. f. 3.*

bracteata. 5. M. foliis palmatis, calice communi polyphyllo multifloro, floribus minimis bractea munitis. *Cavanill. diſſ. 2. p. 98. n. 168. t. 34. f. 2.*

839. ALTHAEA. *Cal.* exterior 9fidus. *Capſ.* plures, 1ſpermae, immarginatae.

officinalis. 1. A. foliis indiviſis tomentoſis. *Flor. dan. t. 530. Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent. 8. t. 136. f. 3.*

grandiflora. 2. A. foliis cordatis angulatis tomentoſis patulis, pedunculis ſubtrifloris. *Scop. del. inſ. 2. p. 33. t. 17.*

corymboſa. 3. A. foliis indiviſis cordatis angulatisve glabris, pedunculis calicibusque piloſis, floribus corymboſis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p. 101.*

narbonenſis. 4. A. caule tomentoſo, foliis cordatis dentatis: inferioribus angulatis acutis; ſuperioribus ſubhaſtatis. *Cavanill. diſſ. 2. p. 94. n. 163. t. 29. f. 2.*

hirſuta. 5. A. foliis cordatis piloſo-hiſpidis ſupra glabris, caulinis tri- et quinquelobis, pedunculis ſolitariis unifloris. *Jacq. flor. auſtr. 2. t. 170.*

Ludwigii. 6. A. foliis quinquelobis utrinque nudis, pedunculis congeſtis unifloris. *Mant. p. 98. Cavanill. diſſ. 2. t. 30. f. 3.*

cannabina. 7. A. foliis inferioribus palmatis dentatis: superioribus haſtatis: lacinia media longiſſima. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 101. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 3.

840. ALCEA. *Cal.* exterior 6fidus. *Capſ.* plures, 1ſpermae, margine membranaceo, ſulcato cinctae.

roſea. 1. A. foliis rugoſis cordatis quinque-vel ſeptangulis crenatis. *Mill. illuſtr. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* R. 15.

ſinenſis. 2. A. foliis cordatis ſcabris crenatis angulatis, caule inferne ramoſo. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 92. *n.* 158. *t.* 29. *f.* 3.

acaulis. 3. A. foliis numeroſis cordatis rotundo-lobatis, floribus ſpicatis, caule craſſo minimo. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 93. *n.* 160. *t.* 27. *f.* 3.

coromandelliana. 4. A. foliis ſubtriangularibus crenatis obtuſis quinquenerviis ſubtrilobis, floribus ſolitariis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 93. *n.* 159.

ficifolia. 5. A. foliis inferioribus palmatis ſeptemlobis crenatis: ſuperioribus haſtatis. *Blackw. herb. t.* 54.

841. MALVA. *Cal.* duplex: exterior utplurimum 3phyllus. *Capſ.* 8 aut plures in verticillum diſpoſitae, 1loculares, rarius 2loculares, 1ſpermae, rarius polyſpermae.

* *capſulis bilocularibus: loculis monoſpermis.*

caroliniana. 1. M. caule repente radicante, foliis ſuperioribus multifidis, fructu criſtato. *Dill. h. Elth. t.* 4. *f.* 4.

proſtrata. 2. M. caule humifuſo angulato, foliis palmato-multifidis, fructu glabro. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 59. *n.* 95. *t.* 16. *f.* 3.

** *capſulis unilocularibus.*

† *polyſpermis.*

elegans. 3. M. foliis pinnatifidis criſpis cauleque tomentoſis, fructu globoſo: capſulis triſpermis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 59. *n.* 96. *t.* 16. *f.* 1. *Suppl. p.* 307. Malva abutiloides.

4. M.

angustifolia. 4. M. foliis ovato-lanceolatis dentatis angustis, fructu globoso tomentoso; capsulis subtrispermis, calice exteriore minimo setaceo, *Cavanill. diss.* 2. *p.* 64. *n.* 104. *t.* 20. *f.* 3.

abutiloides. 5. M. caule frutescente, foliis angulatis planis tomentosis, pedunculo axillari multifloro. *Dill. h. Elth. t.* 1. *f.* 1. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 16. *f.* 2.

†† *capsulis monospermis.*

† *calice exteriore diphyllo.*

aegyptia. 6. M. caule erecto scabro, foliis palmatis dentatis, corollis calice brevioribus. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 65.

trifida. 7. M. foliis duplicato-trifidis, calicibus piloso-scabris. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 280. *n.* 406. *t.* 137. *f.* 2.

spithamea. 8. M. caule spithameo, foliis subrotundis crenulatis, calice exteriore submonophyllo. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 61. *n.* 99. *t.* 18. *f.* 3.

hispanica. 9. M. caule erecto villoso, foliis crenato-dentatis: inferioribus semiorbiculatis. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 19. *f.* 3.

stipulacea. 10. M. foliis inferioribus trilobis: superioribus palmato-incisis, stipulis longissimis, calice exteriore setaceo. *de Asso stirp. Arragon. p.* 90. *n.* 647. *t.* 5. *f.* 1.

Papaver. 11. M. caule hirsuto, foliis quinatis ternatisque. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 64. *n.* 102. *t.* 15. *f.* 3.

cuneifolia. 12. M. foliis lato-cuneiformibus supra crenatis, floribus solitariis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 64. *n.* 103. *t.* 20. *f.* 1.

†† *calice exteriori triphyllo.*

‡ *foliolis angustissimis.*

scabra. 13. M. caule virgato scabro, foliis cordatis crenatis subrugosis, pedunculis solitariis subbifloris. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 281. *n.* 408. *t.* 138. *f.* 1.

operculata. 14. M. foliis cordatis quinquelobis tomentosis, floribus racemoso-spicatis, fructu operculato. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 65. *n.* 105. *t.* 35. *f.* 1.

capitata. 15. M. caule arborescente, foliis sinuatis quinquelobis: medio longissimo, floribus corymboso-capitatis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 280. *n.* 407. *t.* 137. *f.* 1.

16. M.

scoparia. 16. M. foliis ovatis crenato-serratis, floribus axillaribus confertis, caule fruticoso, ramis virgatis. *Heritier stirp. nov.* 3. *p.* 53. *t.* 27.

coromandeliana. 17. M. ramis procumbentibus, foliis oblongis subserratis, floribus subspicatis, capsulis decem tricuspidatis.

cretica. 18. M. caule hirsuto, foliis cordatis subrotundo-lobatis crenatis, floribus solitariis longe pedunculatis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 67. *n.* 108. *et* 5. *t.* 138. *f.* 2.

Sherardiana. 19. M. caulibus prostratis, foliis orbiculatis plicatis tomentosis crenatis, pedunculis solitariis unifloris arcuatis. *Sp. pl.* 1674. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 142.

parviflora. 20. M. caule patulo, foliis angulatis, floribus axillaribus sessilibus glomeratis; calicibus glabris patentibus. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 39.

peruviana. 21. M. caule erecto herbaceo, foliis palmatis, spicis secundis axillaribus, capsulis denticulatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 156.

limensis. 22. M. caule erecto scabro ramosissimo, foliis septemlobis rugosis, spicis axillaribus, capsulis laevibus. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 111.

bryoniifolia. 23. M. caule fruticoso tomentoso, foliis pinnatis scabris, pedunculis multifloris.

lactea. 54. M. frutescens, foliis angulatis acutis cordatis villosis, petalis obcordatis calice brevioribus, pedunculis paniculatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 448.

bonariensis. 24. M. caule tomentoso, foliis trilobis, floribus glomeratis axillaribus subsessilibus. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 69. *n.* 114. *t.* 22. *f.* 1.

virgata. 25. M. caule frutescente, foliis basi angustatis multiformibus partitis: laciniis inciso-crenatis, pedunculis unifloris. *Murray comm. Goett.* 1779. *p.* 20. *t.* 6. *β) Cavanill. diss.* 2. *t.* 17. *f.* 3.

grossulariaefolia. 26. M. caule hirsuto frutescente, foliis subsinuato-lobatis serratis rugosis, floribus solitariis, fructu hirsuto. *Dill. h. Elth. t.* 169. *f.* 207. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 24. *f.* 2.

tridactylites. 27. M. caule frutescente ramosissimo, foliis cuneiformibus supra trilobis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 73. *n.* 121. *t.* 21. *f.* 2.

verticillata. 28. M. caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis sessilibus, calicibus scabris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 40. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

29. M.

rotundifolia. 29. M. caule proſtrato, foliis cordatis orbiculatis plicatis quinquelobis ſeptemlobisque, pedunculis fructiferis declinatis. *Flor. dan. t.* 721.

americana. 30. M. caule erecto ramoſo, foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus ſolitariis: terminalibus ſpicatis, capſulis tridentatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 22. *f.* 2.

11 *foliolis calicis latioribus, ovatis aut lanceolatis.*

fragrans. 31. M. caule fruteſcente viſcoſo, foliis cordatis crenatis quinque-vel ſeptemlobis, pedunculis ſolitariis unifloris capillaribus folio brevioribus. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 33.

ſubhaſtata. 32. M. caule pilis adpreſſis, foliis ſubhaſtatis, floribus ſolitariis breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 72. *n.* 119. *t.* 21. *f.* 3.

retuſa. 33. M. foliis ſublanceolatis retuſis dentato-crenatis obtuſe trilobis, floribus ſubſpicatis, fructu glabro. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 73. *n.* 120. *t.* 21. *f.* 1.

Tournefortiana. 34. M. caule decumbente, foliis pinnatifidis: laciniis linearibus ciliatis apice trifidis, pedunculis unifloris ſolitariis folio longioribus. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 17. *f.* 3.

criſpa. 35. M. caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 23. *f.* 1.

faſtigiata. 36. M. caule tomentoſo, foliis cordatis quinquelobis: lobis acutis; medio productiore, floribus faſtigiatis conglomeratis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 75. *n.* 124. *t.* 23. *f.* 2.

Alcea. 37. M. caule erecto glabro, foliis cordatis: ſuperioribus profunde quinquepartitis. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 48. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

moſchata. 38. M. caule erecto, foliis radicalibus reniformibus inciſis: caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Mill. h. angl. t.* 17. *Curt. flor. Lond. n.* 42. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

lobata. 39. M. foliis ſubcordatis quinquelobis crenatis tomentoſis, floribus axillaribus faſtigiatisque. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 76. *n.* 127. *t.* 18. *f.* 4.

abulenſis. 40. M. caule ſcabro-tomentoſo, foliis inferioribus baſi concavo-arcuatis: ſuperioribus cuneiformibus, floribus breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 76. *n.* 128. *t.* 34. *f.* 3.

41. M.

sinensis. 41. M. caule herbaceo reclinato glaberrimo, foliis quinquelobis obtusis crenatis, floribus axillaribus numerosis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 77. *n.* 129. *t.* 25. *f.* 4.

mauritiana. 42. M. caule erecto subglabro, foliis cordatis crenatis quinquelobis; stipulis connatis, floribus numerosis axillaribus pedunculatis. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 25. *f.* 2.

silvestris. 43. M. caule scabro, foliis quinque-vel septemlobis dentatis, calice exteriori submonophyllo. *Curt. flor. Lond. t.* 89. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

nicaeensis. 44. M. caule decumbente calicibusque glomeratis pilosis, foliis quinquelobis. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 79. *n.* 134. *t.* 25. *f.* 1.

polystachya. 45. M. caule fruticoso, foliis ovato-acuminatis serratis scabris, floribus spicatis, capsulis glabris muticis. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 281. *n.* 409. *t.* 138. *f.* 3.

spicata. 46. M. foliis subcordatis crenatis subtrilobis scabriusculis, floribus axillaribus solitariis: terminalibus dense spicatis. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 20. *f.* 4.

ovata. 47. M. caule tomentoso, foliis ovatis dentatis, spica densissima oblonga. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 138. *f.* 1. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 81. *n.* 137. *t.* 20. *f.* 2.

calicina. 48. M. foliis cordatis crenatis indivisis piloso-hispidis, floribus solitariis longe pedunculatis: calice exteriori maximo. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 81. *n.* 138. *t.* 22. *f.* 4.

tomentosa. 49. M. foliis cordatis crenatis tomentosis, floribus lateralibus congestis, caule fruticoso.

gangetica. 50. M. foliis cordatis obtusis scabris, floribus sessilibus glomeratis, capsulis denis muticis crenulatis. *Pluckn. phyt.* 74. *f.* 6.

acaulis. 51. M. acaulis, foliis lobatis denticulatis, scapis bi-vel quadrifloris. *Cavanill. diss.* 2. *p.* 82. *n.* 141. *t.* 35. *f.* 2.

††† *calice exteriori tetraphyllo.*

capensis. 52. M. caule fruticoso, foliis glutinosis crenato-dentatis quinquelobis: superioribus trilobis, floribus binis cernuis, pedunculis fructiferis erectis petiolo longioribus. *Cavanill. diss.* 2. *t.* 24. *f.* 3. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

pumila. 53. M. caule erecto, foliis quinquepartito-trifidis, calice exteriore filiformi. *Retz. obs. fas* 3. *p.* 37.

842. LAVATERA. *Cal.* 2plex: exterior 3fidus. *Capſ.* plures in orbem poſitae, ıſpermae, ſtigmatum numero reſpondentes.

* *caule arboreo.*

arborea. 1. L. foliis ſeptemangularibus tomentoſis plicatis, pedunculis confertis uniſloris axillaribus. *Cavanill. diſſ.* 5. *t.* 139. *f.* 2. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 2.

micans. 2. L. foliis ſeptemangularibus acutis crenatis plicatis tomentoſis, racemis terminalibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 1. *t.* 17. *f.* 9.

** *caule fruticoſo.*

luſitanica. 3. L. foliis ſeptemangularibus tomentoſis plicatis, racemis terminalibus. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 55.

africana. 4. L. foliis incanis quinquelobis crenatis, floribus cernuis geminis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 282. *n.* 410. *t.* 139. *f.* 1. *Mill. h. angl. t.* 161. *f.* 2.

olbia. 5. L. foliis dentatis: inferioribus quinquelobis; ſuperioribus trilobis acutis, medio duplo longiore, floribus ſolitariis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 73.

triloba. 6. L. foliis ſubcordatis ſubtrilobis rotundatis crenatis: ſtipulis cordatis, pedunculis aggregatis uniſloris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 74.

maritima. 7. L. foliis cordatis ſubrotundo-lobatis crenatis tomentoſis, floribus ſolitariis. *Gouan. illuſtr. t.* 25. *f.* 2.

americana. 8. L. foliis cordatis indiviſis crenatis acuminatis tomentoſis, pedunculis ſolitariis uniſloris. *An potius ſidae ſpecies?*

*** *caule herbaceo.*

thuringiaca. 9. L. foliis inferioribus cordatis crenatis ſubrotundo-lobatis; ſummis haſtatis, pedunculis longis ſolitariis uniſloris. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 311. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 2.

cretica. 10. L. caule erecto ſcabro, foliis cordatis ſeptemangulatis: ſuperioribus acutis, floribus confertis axillaribus: pedunculis erectis uniſloris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 41.

11. L.

trimeſtris. 11. L. caule ſcabro, foliis inferioribus ſubrotundis: mediis quinquelobis; ſummis lobo medio longiore fructibus orbiculo tectis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 72. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 2.

843. MALOPE. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus. *Capſ.* plures in capitulum conglomeratae, 1ſpermae, ſubrotundae.

malacoides. 1. M. foliis cordatis ovatis crenatis, floribus ſolitariis longiſſime pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 32. *f.* 1.

multiflora. 2. M. foliis ſubrotundis crenatis villoſis, floribus ſubquaternis axillaribus. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 85. *n.* 145.

trifida. 3. M. foliis craſſis trinerviis trifidis dentatis, floribus ſolitariis axillaribus longiſſime pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 85. *n.* 144. *t.* 27. *f.* 2.

844. URENA. *Cal.* duplex: exterior 5fidus. *Capſ.* 5 1loculares, echinatae, 1ſpermae.

lobata. 1. U. foliis triglandulоſis angulatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 185. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 2.

tricuſpis. 2. U. foliis uniglandulоſis ovato-angulatis: angulis acuminatis ſerratis, caule piloſo. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 334. *n.* 489. *t.* 183. *f.* 1.

ſinuata. 3. U. foliis triglandulоſis ſinuato-palmatis: ſinubus obtuſis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 185. *f.* 2.

procumbens. 4. U. foliis oblongis ſinuatis ſerratis, caule procumbente.

leptocarpa. 5. U. foliis lanceolatis ſerratis. *Suppl. p.* 308.

reticulata. 6. U. foliis ſinuato-ſerratis uniglandulоſis reticulatis: inferioribus trilobis, reliquis lanceolatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 335. *n.* 491. *t.* 183. *f.* 2.

multifida. 7. U. foliis uniglandulоſis ſinuato-multifidis: ſinubus rotundatis denticulatis, caule ramoſiſſimo. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 336. *n.* 493. *t.* 184. *f.* 2.

americana. 8. U. foliis trifidis baſi integris. *Suppl. p.* 308. *nonne mera ſinuatae varietas?*

9. U.

viminea. 9. U. foliis uniglandulosis: inferioribus rotundato-acutis sublobatis; superioribus lanceolatis serratis, calice exteriore majore. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 335. *n.* 492. *t.* 184. *f.* 1.

Typhalaea. 10. U. foliis lato-lanceolatis, capsularum mucronibus tribus retro denticulatis. *Mant.* 258. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 197. *an cum leptocarpa potius ad pavoniam amandanda?*

845. GOSSYPIUM. *Cal.* duplex: exterior 3fidus. *Capf.* 3-4locularis. *Sem.* lana obvoluta.

arboreum. 1. G. foliis palmatis: lobis lanceolatis, caule fruticoso. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 165.

rubrum. 2. G. foliis quinquelobis: venis rubentibus, caule fruticoso. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 125. *an distincta species?*

herbaceum. 3. G. foliis quinquelobis subtus uniglandulosis, caule herbaceo. *Regn. botan. t.* 376.

eglandulosum. 4. G. foliis quinquelobis eglandulosis: lobis tribus oblongis acuminatis, caule villoso. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 354. *n.* 518. *an vere distinctum ab herbaceo?*

micranthum. 5. G. foliis quinquelobis uniglandulosis glaberrimis, calice corollam superante. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 311. *n.* 445. *t.* 193.

peruvianum. 6. G. foliis quinquelobis acutis triglandulosis, calicibus exterioribus triphyllis triglandulosis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 313. *n.* 449. *t.* 168.

hirsutum. 7. G. foliis subquinquelobis subtus uniglandulosis, ramulis petiolisque hirsutis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 167.

vitifolium. 8. G. foliis quinquelobis palmatis uniglandulosis acutis, calice exteriori profunde laciniato. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 311. *n.* 447. *t.* 166.

indicum. 9. G. foliis subtrilobis, subtus eglandulosis: lobis cuneatis brevibus. *Cavanill. diss. bot.* 6. *p.* 314. *n.* 451. *t.* 169.

religiosum. 10. G. foliis superioribus trilobis acutis subtus triglandulosis, ramulis nigro-punctatis. *Cavanill. diss. bot.* 6. *t.* 164. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 134. *f.* 1.

barbadense. 11. G. foliis superioribus trilobis integerrimis subtus triglandulosis. *Pluckn. alm. t.* 188. *f.* 1.

latifolium. 12. G. foliis acutis: infimis indivisis; reliquis trilobis subtus uniglandulosis. *Murray comm. Goett.* 1776. *p.* 32. *t.* 1.

CIENFUEGOSIA. *Cal.* 2plex: exterior 12phyllus. *Caps.* globoso-acuminata, 3-valvis, 3locularis: loculis 1-spermis.

digitata. 1. CIENFUEGOSIA. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 174. *n.* 259. *t.* 72. *f.* 2.

PAVONIA. *Cal.* 2plex: exterior polyphyllus. *Caps.* 5 in orbem positae, articulatim dehiscentes, 2valves, 1loculares, 1spermae.

* *capsulis spinosis.*

spinifex. 1. P. caule arborescente, foliis ovato-lanceolatis inaequaliter dentatis, tubo stigmatibusque decumbentibus, capsulis aristatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 463. Hibiscus spinifex. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 103.

aristata. 2. P. caule fruticoso humili, foliis cordatis ovato-lanceolatis crenatis scabriusculis, floribus solitariis, capsulis aristatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 133. *n.* 189. *t.* 45. *f.* 3.

** *capsulis muticis.*

† *calice interiori breviori, exteriore cancellato.*

zeylanica. 3. P. caule herbaceo hirto, foliis cordatis crenato-dentatis; inferioribus subrotundis; superioribus profunde tri-vel quinquefidis, pedunculis elongatis geniculatis unifloris. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 134. *n.* 191. *t.* 48. *f.* 2.

cancellata. 4. P. caule debili hirto, foliis cordatis serratis, calicibus globosis: radiis vicenis subulatis hirtis. *Suppl. p.* 311. Hibiscus cancellatus.

paniculata. 5. P. caule hirto ramoso, foliis cordatis subrotundis acuminatis crenato-dentatis saepe tricuspidatis, floribus paniculatis: genitalibus declinatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 135. *n.* 193. *t.* 46. *f.* 2.

†† *calice interiore exteriorem superante.*

spicata. 6. P. foliis cordatis ovato-acuminatis serratis hirtis rugosis, thyrso terminali. *Vogel apud Trew pl. rar. t.* 90. *an forsan altheae potius species?*

7. P.

urens. 7. P. caule fruticoſo ſuburente, foliis palmatis, floribus axillaribus glomeratis ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 137. *n.* 195. *t.* 49. *f.* 1. *et* 5. *p.* 283.

haſtata. 8. P. foliis haſtatis crenato-dentatis ſupra punctatis, floribus ſolitariis longe pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 138. *n.* 196. *t.* 47. *f.* 2.

Columella. 9. P. foliis dentatis angulatis: inferioribus latis; ſuperioribus oblongis, floribus axillaribus ſolitariis: pedunculo brevi. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 138. *n.* 197. *t.* 48. *f.* 3.

cuneifolia. 10. P. caule fruticoſo, foliis obſolete cordatis ovato-truncatis crenatis, floribus ſolitariis erectis longe pedunculatis: calicibus glabris. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 139. *n.* 198. *t.* 45. *f.* 1.

praemorſa. 11. P. hirſuta, foliis ovatis baſi anguſtato-cordatis apice praemorſis crenatis, calicibus tomentoſis, capſulis tuberculatis. *Suppl. p.* 309. Hibiſcus praemorſus.

coccinea. 12. P. foliis cordatis ſubtrilobis pubeſcentibus, floribus ſolitariis revolutis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 140. *n.* 200. *t.* 47. *f.* 1.

papilionacea. 13. P. caule tereti tomentoſo, foliis cordatis dentatis ſubrotundo-acuminatis, floribus ſolitatiis: genitalibus declinatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 140. *n.* 201. *t.* 49. *f.* 1.

MALVAVISCUS. *Cal.* 2plex: exterior 8phyllus, interior 1phyllus, tubuloſus, 10ſtriatus, apice 5dentatus. *Petala* baſi auriculata. *Tubus* ſtamina ſuſtinens longiſſimus, contortus. *Drupa* 5locularis: loculis 1ſpermis.

arboreus. 1. M. foliis ſcabriuſculis acuminatis, calicis exterioris foliolis erectis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 463. Hibiſcus Malvaviſcus. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 54.

piloſus. 2. M. foliis piloſis obtuſis acutisque. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 102. Achenia piloſa.

mollis. 3. M. foliis tomentoſis, calicis foliolis externis patulis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 459.

846. HIBISCUS.

Cal. 2plex: exterior polyphyllus aut multifidus. *Capſ.* 5valvis, 5-locularis: loculis polyſpermis, ramis ſpermis.

* *capſularum loculis monoſpermis.*

laevis. 1. H. inermis herbaceus glaber, foliis ovalibus trilobis, pedunculis ſolitariis articulatis unifloris. *Scop. del. inſ.* 3. *p.* 33. *t.* 17.

pentacarpos. 2. H. caule annuo glaberrimo, foliis cordatis ſubhaſtatis acuminatis ſerratis, floribus ſubnutantibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 66. *f.* 3.

militaris. 3. H. foliis ſerratis haſtatis acutiſſimis, floribus magnis: petalis bifidis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 352. *n.* 399. *t.* 198. *f.* 2.

virginicus. 4. H. foliis inferioribus cordatis acuminatis ſerratis: ſuperioribus haſtatis. *Pluckn. phyt.* 6. *f.* 4. *an ſatis diſtinctus a pentacarpo?*

haſtatus. 5. H. foliis haſtatis ſerratis oblongis anguſtis, floribus ſolitariis, capſula tomentoſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 144. *n.* 203. *t.* 50. *f.* 1.

acuminatus. 6. H. caule tomentoſo, foliis cordatis ſubrotundo-acuminatis, capſula pentagona tomentoſa depreſſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 144. *n.* 204. *t.* 50. *f.* 2.

ovatus. 7. H. foliis ovatis integerrimis ciliatis trinerviis ſubtus villoſis, floribus axillaribus ſolitariis: pedunculis folio brevioribus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 143. *n.* 202. *t.* 50. *f.* 3.

** *capſularum loculis polyſpermis.*

† *caule aculeato.*

vitifolius. 8. H. caule herbaceo, foliis quinquangulis crenatis villoſis, floribus ſolitariis cernuis capſula pentaptera. *Mant. p.* 569. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 58. *f.* 2. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 4.

ſtriatus. 9. H. caule ſulcato, foliis haſtatis glabris ſerratis, calice interiori ſtriato, inflato inermi. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 146. *n.* 207. *t.* 54. *f.* 1.

10. H.

bifurcatus. 10. H. caule fruticoſo, foliis ſerratis: inferioribus trilobis; mediis haſtatis, ſuperioribus lanceolatis, calicis exterioris foliolis bifurcatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 146. *n.* 208. *t.* 51. *f.* 1.

trilobus. 11. H. caule arboreo, foliis trilobis ſerratis, floribus ſolitariis: pedunculis inermibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 147. *n.* 209. *t.* 53. *f.* 2.

ſinuatus. 12. H. foliis cordatis dentatis quinquelobis, calicibus deciduis: interioribus latere rumpendis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 147. *n.* 210. *t.* 52. *f.* 2.

ſpecioſus. 71. H. foliis glabris palmatis: laciniis lanceolatis ſerratis, caule pedunculis calicibusque laevibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 456.

ficulneus. 13. H. caule fruticoſo verrucoſo ramoſiſſimo, foliis quinquefido-palmatis: ſuperioribus oblongis ovato-lanceolatis, floribus ſubſpicatis terminalibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 51. *f.* 2.

cannabinus. 14. H. caule herbaceo glabro, foliis ſuperioribus palmatis quinquepartitis ſerratis uniglandulosis, floribus ſeſſilibus; calicibus glandulosis. *Ehret. pict. t.* 6. *f.* 1.

ſuratten-ſis. 15. H. aculeis recurvis, foliis digitatis, calicibus appendiculatis. *Mant. p.* 436. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 53. *f.* 1.

radiatus. 16. H. caule fruteſcente, foliis palmatis: lobis lanceolatis dentatis, floribus breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 150. *n.* 214. *t.* 54. *f.* 2.

digitatus. 17. H. foliis digitatis: foliolis inaequalibus lanceolatis ſerratis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus: calicibus monophyllis inermibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 151. *n.* 215. *t.* 70. *f.* 2.

diverſifolius. 18. H. caule arboreo, foliis inferioribus quinquelobis: ſuperioribus trilobis; ſummis indiviſis, pedunculis axillaribus ſolitariis uniflоris. *Jacq. coll.* 2. *p.* 307.

domingenſis. 70. H. caule arboreo ſeneſcente inermi, foliis omnibus quinquelobis pedunculis axillaribus ſolitariis uniflоris. *Jacq. coll.* 3. *p.* 213.

†† *caule inermi.*

[[*calice exteriori monophyllo.*

tiliaceus. 19. H. caule arboreo, foliis cordatis ſubrotundis indiviſis acuminatis crenatis, calice exteriori decemdentato. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 55. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 4.

tricuſpis. 20. H. caule arboreo, foliis trilobis: lobis acutis productis, ſtipulis magnis acutis, floribus racemoſis. *Suppl. p.* 310. Hibiſcus haſtatus. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 55. *f.* 2.

†† *calice exteriori polyphyllo.*
† *interiori hemiſphaerico.*

populneus. 21. H. caule arboreo, foliis cordatis acuminatis integerrimis, calice exteriori triphyllo deciduo. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 56. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 3.

liliflorus. 22. H. caule arboreo, foliis lanceolato-ovatis oblongis trinerviis: paucis tripartitis, corolla inſigni: tubo longiſſimo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 154. *n.* 219. *t.* 57. *f.* 1.

Lampas. 23. H. foliis ſubcordatis latis acuminatis trilobis ſupra punctatis, calice exteriori minimo ſetaceo: interiori laciniis longiſſimis anguſtiſſimis terminato. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 154. *n.* 220. *t.* 56. *f.* 2.

†† *calice interiori tubulato-dentato, aut ſemiquinquepartito.*
⊥ *foliis integris aut vix lobatis.*

micranthus. 24. H. foliis ſubrotundis ſerratis, corollis reflexis obliquis. *Suppl. p.* 308. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 66. *f.* 1.

aethiopicus. 25. H. caule fruticoſo minimo, foliis ovato-retuſis apice dentatis, floribus axillaribus terminalibusque. *Mant. p.* 258. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 61. *f.* 1.

rhombifolius. 26. H. caule fruticoſo glabro, foliis rhomboideis: lateribus ſuperioribus crenatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 156. *n.* 223. *t.* 69. *f.* 3.

rigidus. 27. H. ſuffruticoſus hirſutus, ramis ſimplicibus, foliis oblongis ſerratis, corollae limbo reflexo, ſeminibus lanatis. *Suppl. p.* 310.

hirtus. 28. H. caule herbaceo ſcabro, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis, floribus ſolitariis: calice exteriori longiori. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 67. *f.* 3.

microphyllus. 72. H. foliis ovalibus hirtis anterius ſerratis, caule fruticoſo. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 50. *an hujus tribus?*

ovalifolius. 73. H. foliis ovalibus ſubangulatisque, calicibus exterioribus pentaphyllis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 50.

29. H.

phoenicea. 29. H. caule fruticoſo hirſuto, foliis ſerratis acuminatis ſaepe ſubtrilobis, floribus rubris, feminibus lanatis. *Suppl. p.* 310. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 14.

unilateralis. 30. H. caule fruticoſo, foliis ovato-acutis mollibus, tubo ſtaminifero altera parte longitudinaliter nudo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 158. *n.* 227. *t.* 67. *f.* F. 2.

Roſa ſinenſis. 31. H. caule arboreo, foliis ovatis acuminatis ſerratis glabris. *Rheed. h. malab.* 2. *t.* 16. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 69. *f.* 2.

membranaceus. 32. H. foliis cordatis oblongo-acuminatis obſolete denticulatis, calice interiori tubuloſo membranis quinque inſtructo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 159. *n.* 229. *t.* 57. *f.* 2.

cordifolius. 33. H. arboreus tomentoſus, foliis cordatis ovatis ſerratis, floribus pedunculatis terminalibus, calice elongato. *Suppl. p.* 309.

laſiocarpos. 34. H. foliis ovato-lanceolatis crenato-ſerratis tomentoſis ſubtus incanis capſula ovato-acuminata ſetoſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 159. *n.* 231. *t.* 70. *f.* 1.

ſororius. 35. H. foliis cordatis crenatis ſcabris, calice exteriori tereti apice dilatato. *Suppl. p.* 311.

ſenegalenſis. 36. H. foliis cordatis ſubangulatis tomentoſis, calice interiori breviori, exteriori cancellato. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 160. *n.* 233. *t.* 68. *f.* 1.

tubuloſus. 37. H. caule fruteſcente hirſuto, foliis cordatis angulatis craſſis tomentoſis, floribus ſolitariis: calicis exterioris apicibus ſpatulatis recurvis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 161. *n.* 234. *t.* 68. *f.* 2.

urens. 38. H. tomentoſus, foliis reniformibus crenatis, calicibus lanatis corolla longioribus. *Suppl. p.* 309. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 67. *f.* 1.

ferrugineus. 39. H. caule tomentoſo-ferrugineo, foliis cordatis oblongis obtuſis ſcabris baſin verſus latioribus, floribus ſolitariis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 162. *n.* 236. *t.* 60. *f.* 1.

11 *foliis angulatis aut lobatis.*

Moſcheutos. 40. H. foliis ovatis acuminatis ſerratis: petiolis floriferis, caule ſimpliciſſimo. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 65. *f.* 1.

paluſtris. 41. H. caule herbaceo ſimpliciſſimo, foliis ovatis ſubtrilobis ſubtus tomentoſis, floribus axillaribus. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 65. *f.* 2.

pedunculatus. 42. H. caule fruteſcente, foliis quinquelobis trilobisque hirſutis, pedunculis axillaribus unifloris elongatis. *Suppl. p.* 309. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 66. *f.* 2.

ſpicatus. 43. H. caule hirto, foliis cordatis quinque-vel ſeptemlobis valde tomentoſis: ſtipulis utrinque ſex, floribus ſpicatis ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 163. *n.* 240. *t.* 69. *f.* 1.

flaveſcens. 44. H. caule pilis auteis hirſuto, foliis palmato-quinquelobis hirſutis, floribus numeroſis terminalibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 164. *n.* 242. *t.* 70. *f.* 3.

braſilienſis. 45. H. foliis cordatis denticulatis, calicibus exterioribus duplo longioribus, caule fruticoſo, ramis hirtis.

mutabilis. 46. H. caule arboreo, foliis cordatis quinquangulis: acuminibus productis acutis, capſula obovata rugoſa. *Merian. ſurin. t.* 31.

clypeatus. 47. H. foliis cordatis angulatis, capſulis turbinatis truncatis hirſutiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 58. *f.* 1.

columnaris. 48. H. foliis cordatis rotundato-angulatis ſubtomentoſis, calicibus monophyllis tubo ſtamina ſuſtinente longiſſimo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 166. *t.* 69. *f.* 2.

micans. 49. H. foliis cordatis latis quinquangulis tomento lucidis, calice exteriori monophyllo ſexpartito, corolla extrinſecus tomentoſa nervoſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 167. *t.* 60. *f.* 2.

Abelmoſchus. 50. H. foliis ſubpeltato-cordatis ſeptangulis, caule hiſpido. *Merian. ſurin. t* 42.

palmatus. 51. H. radice craſſa alba fungoſa, foliis cordatis palmato-lobatis, pedunculis nutantibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 168. *n.* 249. *t.* 63. *f.* 1.

eſculentus. 52. H. caule herbaceo craſſo, foliis quinquelobis crenatis ſubpedatis, calice utroque deciduo, capſula corniculatà. *Jacq. obſ. bot.* 2. *t.* 35.

ſyriacus. 53. H. caule fruticoſo, foliis cuneiformi-ovatis trilobis inaequaliter dentatis glabris ſubcordatis, feminibus zona hiſpida. *Knorr del. hort.* 1. *t.* K. 2. a. *et* b.

Sabdariffa. 54. H. caule herbaceo glaberrimo, foliis crenatis: inferioribus ovatis, ſuperioribus tripartitis, floribus ſolitariis axillaribus ſubſeſſilibus. *Jacq. obſ.* 2. *t.* 35.

elatus. 55. H. foliis cordatis ſubrotundis integris, pedunculis breviſſimis unifloris, calice decemdentato. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 95. *t.* 134. *f.* 2. 3.

††† *foliis profundius fissis.*

fraternus. 56. H. calicibus exterioribus radiis teretibus: apice mucronato-concavo, foliis trilobis. *Suppl. p.* 311. *Merian. surin. t.* 37. *an distinctus satis a Sabdariffa?*

Manihot. 57. H. foliis palmato-digitatis septempartitis. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 56.

vesicarius. 58. H. caule herbacco hispido urente, foliis imis subrotundo-crenatis indivisis: reliquis quinquelobis obtusis crenatis, calicibus inflatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 17. *n.* 253. *t.* 64. *f.* 2.

Trionum. 59. H. caule herbaceo scabro, foliis tripartitis dentato-serratis: lobo medio longissimo lanceolato, calicibus inflatis. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 55. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 8. *t.* 134. *f.* 6.

ternatus. 60. H. caule humili herbaceo, foliis ternatis, calicibus inflatis. *Cavanill. diss.* 3. *p.* 172. *n.* 255. *t.* 64. *f.* 3.

*** *tribus incertae.*

calyphylus. 61. H. foliis cordatis crenatis latis subtrilobis, calice exteriore foliolo maximo. *Cavanill. diss.* 5. *p.* 283. *n.* 411. *t.* 140.

arenarius. 62. H. glutinosus, foliis profunde trilobis: lobis lateralibus inaequalibus bilobis, calice exteriori foliolis setaceis glanduloso-pilosis. *Scop. del. inf.* 3. *t.* 2.

praecox. 63. H. caule suffruticoso, capsula hispida. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 125. *n.* 92. *an distincta species?*

purpureus. 64. H. foliis cordato-oblongis acutis serratis, stigmatibus quinque longis apice capitatis, capsula superne septemalata. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 126.

tripartitus. 65. H. acauleato-hispidus, foliis tripartitis: lobis lanceolatis serratis, pedunculis axillaribus, capsulis pilosis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 126.

hispidulus. 66. H. caule hispido, foliis palmatis dentatis glabris, calicis exterioris laciniis linearibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 126.

trilobatus. 67. H. foliis trilobis serratis, caule aculeato. *Burm. amer. p.* 152. *t.* 159.

gujanensis. 68. H. foliis ovato-oblongis denticulatis, capsulis aculeatis: aculeis recurvis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 708.

aculeatus. 69. H. pilosus, foliis infimis cordatis angulatis serratis: supremis palmatis lobatis, calicibus aculeatis. *Walt. flor. carol. p.* 177.

RUIZIA. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus, deciduus, interior perſiſtens, 5partitus. *Petala* 5 falcata. *Filamenta* baſi in urceolum coalita. *Stili* 10. *Capſ.* 10 in orbem poſitae, dorſo lignoſae, 1loculares, 2-ſpermae.

cordata. 1. R. foliis cordatis oblongo-acuminatis ſinuato-crenatis incanis ſubtus pulverulentis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 117. *n.* 169. *t.* 36. *f.* 2.

lobata. 2. R. foliis cordatis oblongis crenatis tri-vel quinquelobis: lobo medio productiore acuminato. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 118. *n.* 170. *t.* 36. *f.* 1.

palmata. 3. R. foliis incanis palmatis inciſis quinquepartitis: lobis acuminatis ſinuato-crenatis; medio productiore. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 119. *n.* 171. *t.* 37. *f.* 1.

laciniata. 4. R. foliis ad petiolum usque laciniatis: laciniis ſeptem anguſtiſſimis linearibus pinnatifidis; pinnulis decurrentibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 119. *n.* 172. *t.* 37. *f.* 2.

CURUPITA. *Cal.* ſimplex, 6partitus, ſuperus. *Cor.* 6fida, inaequalis. *Stigma* 6ſtriatum. *Capſ.* ampliſſima, ſphaerica, includens alteram globoſam pulpa fartam, 6locularem, polyſpermam.

gujanenſis. 1. Curupita. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 708. *t.* 282.

347. STEWARTIA. *Cal.* ſimplex, 1phyllus, ſemiquinquefidus. *Germen* orbiculatum, hirſutum. *Stil.* ſimplex, filiformis. *Fructus* conicus lignoſus, in pyramides 5 3angulares partibilis, inter quarum ſuperficies *ſem.* 2.

virginica. 1. Stewartia. *Catesb. Car.* 3. *t.* 13.

MALA-

MALACHODENDRON. *Cal.* simplex, 1phyllus, subquinquefidus. *Petala* lacero-fimbriata. *Filamenta* basi in urceolum brevem connata. *Stil.* 5. *Capf.* 5. coadunatae 2valves, 1spermae.

ovatum. 1. M. foliis glabris. *Cavanill. diff.* 5. *p.* 102. *n.* 437. *t.* 158. *f.* 2.

corchoroi-des. 2. M. foliis villosis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 126. *n.* 98. Stewartia corchoroides.

1344. GORDONIA. *Cal.* simplex. *Stil.* 5gonus: apice 5fidus. *Capf.* 5locularis. *Semina* bina: ala foliacea.

Lasianthus. 1. G. foliis utrinque glabris, floribus pedunculatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 509. Hypericum Lasianthus. *Ellis act. angl. p.* 60. *ad ann.* 1770. *p.* 518. *t.* 11. *Catesb. Car.* 1. *t.* 44.

pubescens. 2. G. foliis subtus pubescentibus, floribus sessilibus. *Cavanill. diff bot.* 6. *p.* 308. *n.* 442. *t.* 162. *an cum Lasiantho polyandriarum potius classi inserenda?*

848. CAMELLIA. *Cal.* imbricatus, polyphyllus: foliolis interioribus majoribus.

japonica. 1. C. foliis acute serratis acuminatis. *Jacq. pl. ar. ic. bot.* 2. *t.* 43.

Sasanqua. 2. C. foliis ovatis obtuse serratis emarginatis. *Thunb. flor. jap. p.* 263. *t.* 29.

665. MESUA. *Cal.* simplex, 4phyllus. *Cor.* 4petala. *Pist.* 1. *Nux* 4gona, 1sperma.

ferrea. 1. M. foliis lanceolatis. *Rumpf. amb.* 7. *t.* 2.

glabra. 2. M. foliis orbiculato-retusis crenatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 100. *n.* 9.

MYRO-

MYRODIA. *Cal.* simplex, 1phyllus. *Petala* 5. *Drupa* sicca: *Nuces* binae.

turbinata. 1. MYRODIA. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 102. *an distinctum a Quararibea genus?*

642. MORISONIA. *Cal.* simplex, 2fidus. *Cor.* 4-petala. *Pist.* 1. *Bacca* corticata, 1locularis, polyspermia, pedicellata.

americana. 1. MORISONIA. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 144. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 5. *t.* 78. *f.* 1. *an capparidis forsan species?*

1081. DALECHAMPIA. *Flores* monoici. *Involucrum* commune exterius foliolis 4, interius foliolis 2 3fidis. *Cor.* 0.

♂. *Umbellula* 10flora: *involucello* 2phyllo; paleis numerosis. *Perianthium proprium* 5-phyllum.

♀. *Flosculi* 3: *involucello* 3phyllo. *Perianthium proprium* 11phyllum. *Stil.* filiformis. *Caps.* 3cocca.

colorata. 1. D. foliis integerrimis. *Suppl. p.* 421.

scandens. 2. D. foliis trifidis serratis. *Mant. p.* 496. *Suppl. p.* 421. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 239.

1135. TAXUS. *Flores* dioici. *Cor.* o. *Cal.* gemmae 4phyllus, *aut* 7phyllus.
♂. *Antherae* peltatae, 8fidae.
♀. *Stil.* o. *Sem* 1. receptaculo baccante, integerrimo, seminudum.

verticillata. 1. T. foliis verticillatis linearibus falcatis. *Thunb. flor. jap.* p. 276.

baccata. 2. T. foliis solitariis linearibus cuspidatis approximatis receptaculis masculis subglobosis. *Blackw. herb. t.* 572. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 6.

elongata. 3. T. foliis lineari-lanceolatis, receptaculis masculis filiformi-cylindricis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 415.

nucifera. 4. T. foliis solitariis linearibus cuspidatis remotis. *Kaempf. amoen. exot.* 5. *p.* 814. 815. *ic. Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 6.

macrophylla. 5. T. foliis solitariis lanceolatis remotis. *Thunb. flor. jap. p.* 276. *Banks ic. Kaempf. t.* 24.

1077. PINUS. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* gemmae squamae hiantes. *Antherae* nudae.
♀. *Cal.* strobili: *Squama* 2flora. *Pist.* 1. *Nux* ala membranacea excepta, 1locularis, evalvis.

* *foliis pluribus ex eadem vagina.*

silvestris. 1. P. foliis geminis rigidis, strobilis ovato-conicis subgeminis foliorum longitudine squamis oblongis obtusis. *Oelhaf. Abb. t.* 1-4. β) Pinus montana. *Brücken. spec.* 1. *f.* 1. γ) Pinus rubra. *du Hamel arbr.* 2. *t.* 30.

Pinaster. 2. P. foliis geminis margine subasperis, strobilis oblongo-conicis, folio brevioribus: squamis echinatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 367.

virginiana. 3. P. foliis geminis, strobilis solitariis conicis longitudine foliorum oblongo: squamarum aculeis rectis. *du Roi harbk. Baumz.* 2. *p.* 35. *n.* 3. β) Pinus echinata.

4. P.

resinosa. 4. P. foliis geminis, strobilis ovato-conicis basi rotundatis solitariis folio dimidio brevioribus: squamis inermibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 367.

halepensis. 5. P. foliis geminis, strobilis ovato-conicis basi rotundatis folio subbrevioribus squamis obtusis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 367. *Mill. h. angl. t.* 208.

glabra. 6. P. foliis geminis, strobilis oblongo-ovatis brevibus, cortice glabro. *Walt. flor. carol. p.* 237.

Pinea. 7. P. foliis geminis primordialibus ciliatis, strobilis ovatis obtusis subinermibus folio longioribus lucidis; squamis oblongis obtusis, nucibus duris ovatis ala destitutis. *Blackw. herb. t.* 189. *Regn. bot. t.* 276.

maritima. 8. P. foliis geminis, strobilis pyramidatis: squamis oblongis obtusis apice lucidis. *du Hamel arbr.* 2. *t.* 29. *β) du Hamel arbr.* 2. *t.* 28. *an mera varietas silvestris?*

squarrosa. 9. P. foliis geminis glabris brevibus, strobilis ovatis squarrosis, cortice scabro. *Walt. flor. carol. p.* 237.

lutea. 10. P. foliis ternis pedalibus, strobilis ovato-subulatis, spinis rectis. *Walt. flor. Carol. p.* 237.

rigida. 11. P. foliis ternis, strobilis pyramidatis confertis: squamis oblongis acutis. *du Roi harbk. Baumz.* 2. *p.* 46. *Hort. angl. t.* 16. *an mera taedae varietas?*

Taeda. 12. P. foliis ternis, strobilis oblongo-conicis folio brevioribus aggregatis: squamis oblongis obtusis echinatis.

palustris. 13. P. foliis ternis longissimis, strobilis subcylindricis echinatis, ramis stipulis ramentaceis asperis.

occidentalis. 14. P. foliis quinis margine scabris longissimis, strobilis oblongis: squamis apice truncatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 103. *Plum. ic. t.* 161.

strobus. 15. P. foliis quinis margine scabris, strobilis cylindricis folio longioribus pendulis: squamis ovalibus planis laxis. *Hort. angl. t.* 17.

Cembra. 16. P. foliis quinis, strobilis ovatis obtusis erectis: squamis adpressis ovalibus concavis, nucibus duris cuneiformibus ala destitutis. *Pallas flor. foss. t.* 2. *Trew cedr. liban. mant. t.* 7.

Larix. 17. P. foliis fasciculatis mollibus obtusiusculis deciduis strobilis ovato-oblongis: bracteis extra squamas ovatas subtcabra, mar-

margine laceras exſtantibus. *Pallas flor. roſſ. t.* 1. *Blackw. herb. t.* 477.

laricina. 18. P. foliis faſciculatis deciduis, ſtrobilis ſubgloboſis: ſquamis laxis orbiculatis glabris. *du Roi harbk. Baumz.* 2. *p.* 83. *t.* 3. *f.* 5-7.

pendula. 19. P. foliis faſciculatis mollibus obtuſiuſculis, ſtrobilorum ſquamis bracteas obtegentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 369.

Cedrus. 20. P. foliis faſciculatis perennibus, ſtrobilis ovatis obtuſis erectis: ſquamis appreſſis rotundis, cortice laevi. *Trew Ehret. t.* 1. 60. 61. *et Cedr. hiſt. apol. cum mant. t.* 1-4.

&

** *foliis ſolitariis baſi diſtinctis.*

Abies. 21. P. foliis planis emarginatis pectinatis, ſtrobilis oblongis erectis: ſquamis obtuſiſſimis appreſſis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 632. Pinus Picea. *Blackw. herb. t.* 203. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 1.

Balſamea. 22. P. foliis planis emarginatis ſubpectinatis ſupra ſuberectis, ſtrobis ovato-oblongis erectis: florentis ſquamis reflexis acuminatis. *Hort. angl. t.* 6.

americana. 23. P. foliis obtuſis, ſtrobilis ſubrotundis: ſquamis ſubrotundis planis, cortice laevi. *Pluckn. alm.* 2. *t.* 121. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 1.

Picea. 24. P. foliis ſubtetragonis acutiuſculis diſtichis, ramis infra nudis, ſtrobilis ſubcylindricis: ſquamis ovalibus planis margine undulatis lacerisque. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 633. Pinus Abies. *Flor. dan. t.* 193. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 1. ?

alba. 25. P. foliis tetragonis lateralibus incurvis, ramis ſubtus nudiuſculis, conis ſubcylindricis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 371.

canadenſis. 26. P. foliis ſubulatis bifariam verſis, ramulis glabris: cicatricibus ſub foliis decurrentibus, ſtrobilis ovato-oblongis pendulis laxis: ſquamis ſubrotundis. *Miller hort. angl. t.* 1. *an eadem cum americana?*

mariana. 27. P. foliis ſubulatis bifariam verſis, ramulis pubeſcentibus; cicatricibus ſub foliis ſeſſilibus, ſtrobilis ovalibus pendulis: ſquamis ovalibus margine laceris undulatisque. *Seligm. av.* 5. *t.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 91. *f.* 1.

araucana. 28. P. foliis turbinatis imbricatis hinc mucronatis, ramulis quaternis cruciatis, ſtrobilis globoſis pendulis, nucibus conicis

? Pinus picea Linnaei Pinaſter Gladiſtethii iſt ſpecies in Monte Jordano in vigna ast, Pag in meinem Garten Lee, noch die Nadeln kurz 2. die Rinde grün wird.

conicis hyalinis ala deſtitutis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 157. *utrum hujus, an diſtincti generis?*

cupreſſoi-des. 29. P. foliis imbricatis acutis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 144. *an diſtincta ſpecies.*

1085. RICINUS. *Flores* diclini. *Cor.* o.

♂. *Cal.* 5partitus.

♀. *Cal.* 3partitus. *Stil.* 3. 2partiti. *Capſ.* duplicatae, aggregatae: *Pericarpia* intus nidulantia.

medicus. 1. R. foliis palmatis ſeptemlobis: lobis lanceolatis; infimis divaricatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 164.

inermis. 2. R. foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis: petiolis glandulosis, capſulis inermibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 28.

communis. 3. R. foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis cauleque coloratis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 27.

Tanarius. 4. R. foliis peltatis repandis. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 121.

Mappa. 5. R. foliis peltatis indiviſis. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 108.

dioicus. 6. R. foliis cordatis acuminatis. *Forſt. fl. auſtr. p.* 67.

CLASSIS XVI.

DIADELPHIA.

PENTANDRIA.

851. MONNIERIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens. *Filamentum* superius antheris 2: inferius 3. *Capsulae* 5.

HEXANDRIA.

849. FUMARIA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* ringens basi gibbosa, nectarifera. *Filamenta* antheris 3.

1267. SARACA. *Cal.* 0. *Cor.* 4fida. *Filamenta* utrinque 3 connexa.

OCTANDRIA.

850. POLYGALA. *Cal.* laciniae 2 alaeformes. *Cor.* vexillum cylindricum. *Stamina* connexa. *Capf.* obcordata, 2locularis.

851. SECURIDACA. *Cal.* 3phyllus. *Vexillum* 0. *Legumen* 1spermum: ala ligulata.

1416. DALBERGIA. *Staminum filamenta* 2 apice 4fida. *Fructus* pedicellatus, non dehiscens, leguminosus, membranaceo-compressus.

CUMARUNA. *Cal.* 3partitus. *Cor.* 5petala: petalis 3 erectis, 2 declinatis. *Legumen* 1loculare, 1spermum.

DECANDRIA.

* *staminibus omnibus connexis.*

853. NISSOLIA. *Legumen* 1spermum terminatum ala ligulata.

GALE-

VOLUBILES. *Phaseolus. Dolichos. Clitoria. Glycine.*

PINNATAE absque impari. *Orobus, Pisum, Lathyrus, Vicia, Ervum, Arachis, Abrus.*

PINNATAE cum impari. *Biserrula, Astragalus, Phaca, Hedysarum, Glycyrrhiza, Indigofera, Galega, Colutea, Amorpha, Piscidia, Müllera.*

TRIFOLIATAE. *Trifolium, Lotus, Medicago, Erythrina, Genista, Cytisus, Ononis, Trigonella, Phaseolus, Dolichos, Clitoria.*

UMBELLATAE. *Lotus, Coronilla, Ornithopus, Scorpiurus, Hippocrepis.*

GALEDUPA. *Legumen* 1-2ſpermum ellipticum ſubfalcatum planum acuminatum.

ANDIRA. *Legumen* 1ſpermum pedunculatum carnoſum punctatum hinc ſulcatum.

ZORNIA. *Antherae* alternatim oblongae et globoſae.

854. PTEROCARPUS. *Stamina* bina 3 anthera. *Legumen* foliaceum.

AMERIMNON. *Cal.* 2labiatus. *Legumen* compreſſo-foliaceum, 2valve, dehiſcens.

TARALEA. *Cal.* 5partitus $\frac{2}{3}$. *Cor.* 5petala: vexillo 2petalo. *Germen* pedicellatum. *Legumen* ſubrotundum depreſſum, 2valve, 1loculare, 1ſpermum.

MUTUCHI. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala. *Car.* 2petala. *Germen* pedicellatum. *Legumen* rugoſum, compreſſum, alatum, 1loculare, 1ſpermum.

DEGUELIA. *Cal.* 2labiatus $\frac{1}{3}$. *Cor.* 5petala: vexillo 2petalo. *Legumen* globoſum, 1loculare, 1ſpermum.

ACUROA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala: petalis 2 inferioribus conniventibus. *Germen* pedicellatum. *Legumen* ſubrotundum, 1loculare: 1ſpermum.

PARIVOA. *Petalum* 1 tubi modo convolutum.

861. AMORPHA. *Alae Carinaque* 0.

TETRAMNUS. *Carina* minima, calice recondita. *Stamina* alterna 5 ſterilia. *Stigma* ſeſſile, capitatum.

895. EBENUS. *Alae* 0. *Legum.* 1ſpermum.

855. ERYTHRINA. *Alae carinaque* breviſſimae. *Cal.* poro mellifero.

1286. ABRUS. *Filamenta* 9 baſi infima connexa latere ſuperiori diſtincta. *Sem.* 1phaerica.

858. SPARTIUM. *Filamenta* adhaerentia germini. *Stigma* adnatum villoſum.

859. GENISTA. *Piſtillum* deprimens carinam. *Stigma* involutum.

865. LUPINUS. *Antherae* alternae, rotundae oblongaeque. *Legumen* coriaceum.

864. ANTHYLLIS. *Cal.* turgidus, includens legumen.

856. PISCIDIA. *Legumen* alis 4 longitudinalibus.

857. BORBONIA. *Legumen* mucronatum. *Stigma* emarginatum.

881. ULEX. *Cal.* 2phyllus. *Legumen* vix calice longius.

876. ARACHIS. *Cor.* reſupinata. *Legumen* coriaceum.

860. ASPALATHUS. *Legumen* muticum, ovatum, ſubdiſpermum.

863. ONONIS. *Vexillum* ſtriatum. *Legumen* rhombeum, ſeſſile.
862. CROTALARIA. *Legumen* pedicellatum, turgidum.
VATAIREA. *Legumen* ſubrotundum, compreſſum, hinc rugoſum, marginibus membranaceis exaratum, 1loculare, 1ſpermum.

** *ſtigmate pubeſcente* (nec priorum ſequentiumve notae.)

880. COLUTEA. *Legumen* inflatum, ſupra baſin dehiſcens.
866. PHASEOLUS. *Carina ſtilusque* ſpirales.
867. DOLICHOS. *Vexillum* baſi callis 2.
871. OROBUS. *Stilus* linearis, teretiuſculus, ſupra villoſus.
870. PISUM. *Stilus* ſupra carinatus villoſusque.
872. LATHYRUS. *Stilus* ſupra planus villoſusque.
873. VICIA. *Stilus* ſub ſtigmate barbatus.

*** *legumine ſubbiloculari* (nec priorum ſequentiumve notae.)

892. ASTRAGALUS. *Legumen* 2loculare, rotundatum.
893. BISERRULA. *Legumen* 2loculare, planum, dentatum.
891. PHACA. *Legumen* ſemibiloculare.

**** *legumine ſubmonoſpermo* (nec priorum ſequentiumve notae.)

894. PSORALEA. *Cal.* punctis glandulosis.
DIPHYSA. *Legumen* 1loculare, polyſpermum, utrinque veſica membranacea inflata longitudinaliter aucta.
896. TRIFOLIUM. *Flores* (ſaepius) capitati. *Legumen* calice longius, 1-2ſpermum.
882. GLYCYRRHIZA. *Cal.* 2labiatus: labio ſuperiori 3fido.

***** *legumine ſubarticulato.*

888. AESCHYNOMENE. *Cal.* 2labiatus. *Legumen* articulis 1ſpermis.
STILOSANTHES. *Cal.* tubuloſus, longiſſimus, corallifer. *Germen* infra corollam. *Legumen* articulis 2, hamatum.
887. HEDYSARUM. *Carina* obtuſiſſima. *Legumen* articulis ſubrotundis, compreſſis.
883. CORONILLA. *Legumen* iſthmis interceptum, rectum.
884. ORNITHOPUS. *Legumen* articulatum, arcuatum.
886. SCORPIURUS. *Legumen* iſthmis interceptum, teretiuſculum, involutum.

PETAGNAMA. *Legumen* articulis distinctis 1spermis stilo connexis.

885. HIPPOCREPIS. *Legumen* compresso-membranaceum: altera sutura sinubus ad medium excisa.

899. MEDICAGO. *Pistillum* carinam deflectens. *Legumen* spirale, membranaceo-compressum.

****** *legumine unilocolari polyspermo* (nec priorum sequentiumve notae.)

898. TRIGONELLA. *Vexillum alae*que patula, quasi 3petala. *Carina* minuta.

868. GLYCINE. *Carina* vexillum reflectens.

CYLISTA. *Vexillum* basi utrinque lobulo auctum. *Carina* basi et apice fissa.

869. CLITORIA. *Vexillum* amplum alas obtegens. *Corolla* resupinata.

879. ROBINIA. *Vexillum* reflexo-patens, subrotundum.

889. INDIGOFERA. *Carina* utrinque denticulo.

875. CICER. *Calicis* laciniae 4 superiores vexillo incumbentes.

874. ERVUM. *Calix* 5partitus subaequalis, longitudine fere corollae.

1319. LIBARIA. *Calicis* lacinia infima elongata. *Alae* inferius 2lobae.

877. CYTISUS. *Calix* 2labiatus. *Legumen* pedicellatum.

1417. MÜLLERA. *Pericarpium* elongatum, carnosum, moniliforme: *globulis* 1spermis.

890. GALEGA. *Legumen* lineare striis oblique transversis.

FALCATA. *Legumen* falcatum, compressum, utrinque acuminatum.

897. LOTUS. *Legumen* teres, fartum seminibus cylindricis.

878. GEOFFROYA. *Drupa* nucleo ligneo.

PEN-

PENTANDRIA.

850. MONNIERIA. *Cal.* 5partitus: lacinia ſuperiori longa. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2: ſuperius antheris connatis 2; inferius 3. *Capſulae* 5 iſpermae.

trifolia. 1. MONNIERIA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 730. *t.* 293.

HEXANDRIA.

1267. SARACA. *Cal.* 0. *Cor.* infundibuliformis, 4fida. *Filamenta* 3 utrinque ad faucem. *Legumen* pedicellatum.

indica. 1. SARACA. *Mant. p.* 98. *Burm. ind. t.* 25. *f.* 2.

849. FUMARIA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2 membranacea: ſingula antheris 3. *Capſ.* 1locularis, 1ſperma.

* *corollis bicalcaratis.*

Cucullaria. 1. F. ſcapo nudo. *Mant. p.* 437. *Pluckn. alm. t.* 90. *f.* 3.

ſpectabilis. 2. F. floribus poſterius bilobis, caule folioſo. *Amoen. acad.* 7. *t.* 7.

fungoſa. 18. F. floribus baſi bigibbis, capſulis linearibus ancipitibus corolla fungoſo-inflata tectis, foliis ſcandentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 1.

** *corollis unicalcaratis.*

nobilis. 3. F. caulibus ſimplicibus bracteis flore brevioribus indiviſis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 116. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 2.

interme-ſdia. 19. F. radice bulboſa, caulibus ſimpliciſſimis, bracteis ſubrotundis indiviſis. *Ehrh. Beytr.* 6. *p.* 146.

bulbosa. 4. F. radice bulbosa, caule simplici, bracteis ovato-lanceolatis integerrimis flore brevioribus. *Flor. dan. t.* 605. *β) Knorr del. hort.* 1. *t.* H. 9.

minor. 5. F. radice bulbosa solida, caule simplici, bracteis pinnatis longitudine florum.

Schangini. 6. F. radice tuberosa, caule simplici folioso, bracteis flore dimidio brevioribus. *Pallas act. Petrop. ad* 1779. 2. *p.* 267. *t.* 14. *f.* 1-3.

sempervirens. 7. F. leguminibus linearibus paniculatis, caule erecto. *Mill. h. angl. t.* 78. *Siliqua receptaculo fenestrato.*

acaulis. 17. F. scapis nudis longitudine foliorum, foliis pinnatis: pinnis trilobis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 203.

lutea. 8. F. leguminibus teretibus, caulibus diffusis: angulis obtusis. *Mant. p.* 258. *Mill. h. angl. t.* 136. *f.* 1. *Siliqua longa: receptaculo cum valvis infra coalito.*

sibirica. 9. F. leguminibus ovalibus, caulibus patulis, foliolis oblongis. *Suppl. p.* 314. *Amm. rar. t.* 20.

capnoides. 10. F. leguminibus linearibus tetragonis, caulibus diffusis acutangulis. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 46. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 3.

enneaphylla. 11. F. foliis triternatis: foliolis cordatis. *Bocc. mus.* 2. *t.* 73.

officinalis. 12. F. leguminibus monospermis racemosis, caule diffuso. *Zorn pl. off. ic. t.* 14.

capreolata. 13. F. leguminibus monospermis racemosis, foliis scandentibus subcirrhosis. *Flor. dan. t.* 340. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 2.

spicata. 14. F. leguminibus monospermis spicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *β) Morif. hist. pl.* 2. *t.* 12. *f.* 13.

clavicula-ta. 15. F. leguminibus linearibus, foliis cirrhiferis. *Morif. hist. pl.* 2. *t.* 12. *f.* 3.

vesicaria. 16. F. leguminibus globosis acutis inflatis, foliis cirrhosis. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 1. *Pluckn. alm. t.* 335. *f.* 3. *Capsul. duplicatae: seminibus intus nidulantibus.*

OCTAN-

OCTANDRIA.

851. POLYGALA. *Cal.* 5phyllus: foliolis 2 majoribus alaeformibus, ante maturitatem feminis coloratis. *Capsula* obcordata, 2-locularis. *Semina* solitaria.

* *appendice florum penicilliformi*, cristatae.

asparatha. 1. P. floribus capitatis, caulibus simplicissimis, foliis setaceis sparsis. *Mant. p.* 99.

brasilien- 2. P. floribus subspicatis, caulibus simplicissimis, foliis lanceo-
sis. latis sparsis. *Mant. p.* 99.

incarnata. 3. P. floribus spicatis, caule herbaceo ramoso erecto, foliis alternis subulatis. *Pluckn. mant. t.* 438. *f.* 5.

tricho- 4. P. floribus spicatis, caulibus virgatis striatis, foliis linearis-
sperma. bus. *Mant. p.* 259. *Jacq. obs. bot.* 3. *t.* 67.

amara. 5. P. floribus racemosis, caulibus erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 412.

vulgaris. 6. P. floribus racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Flor. dan. t.* 516.

major. 7. P. floribus racemosis, caulibus herbaceis simplicibus suberectis, foliis lineari-lanceolatis. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 413.

monspe- 8. P. floribus racemosis, caule erecto, foliis lanceolato-linea-
liaca. ribus acutis; *an mera vulgaris varietas?*

bracteola- 9. P. floribus racemosis: bracteis triphyllis, foliis lineari-lan-
ta. ceolatis, caule fruticoso. *Buxb. cent.* 3. *t.* 71.

panicula- 10. P. racemis nudis, caulibus herbaceis erectis superne ra-
ta. mosis, foliis linearibus. *Swarts observ. bot. t.* 6. *f.* 2.

sibirica. 11. P. racemo laterali nudo, caulibus herbaceis, foliis lanceolatis. *Gmel. flor. sibir.* 4. *t.* 32.

spinosa. 12. P. floribus lateralibus, caule spinoso fruticoso, foliis ovalibus mucronatis. *Mant. p.* 437.

teretifo- 13. P. floribus lateralibus, caule fruticoso ramoso, foliis fili-
lia. formibus falcatis. *Suppl. p.* 316.

umbella- 14. P. floribus subumbellatis, foliis linearibus subciliatis.
ta. *Mant. p.* 259. *Burm. afr. t.* 73. *f.* 5.

myrtifolia. 15. P. floribus carina lunulata, caule fruticoſo, foliis laevibus oblongis obtuſis. *Mill. illuſtr. ic.*

violacea. 42. P. ſpicis terminalibus, foliis lanceolatis hirſutis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 735. t. 294.*

Timutu. 43. P. ſpica terminali, foliis lanceolatis: inferioribus ternis verticillatis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 737. t. 295.*

tinctoria. 44. P. villoſa, bracteis triphyllis, foliis obovatis, caule fruticoſo. *Vahl ſymb. bot. 1. p. 5.*

oppoſitifolia. 16. P. caule fruticoſo, foliis oppoſitis ovatis acutis. *Mant. p. 259.*

** *florum appendice nulla*, Imberbes.

† *caule arboreo.*

Penaea. 17. P. floribus lateralibus ſolitariis, foliis obtuſis petiolatis. *Plum. ic. 214. f. 1.*

diverſifolia. 18. P. floribus axillaribus confertis, foliis ſenioribus oblongo-ovatis: recentibus ſubovatis. *Brown. jam. t. 5. f. 3.*

Heilteria. 19. P. caule arboreſcente, floribus lateralibus, floribus triquetris mucronato-ſpinoſis. *Pluckn. alm. t. 229. f. 5.*

†† *caule fruticoſo.*

theezans. 20. P. pedunculis unifloris, foliis alternis lanceolatis. *Mant. p. 260. Burm. zeyl. t. 85.*

trinervia. 21. P. pedunculis unifloris, caule angulato, foliis alternis cordatis cuſpidatis trinerviis. *Suppl. p. 315.*

microphylla. 22. P. floribus racemoſis, foliis minutiſſimis ellipticis.

aeſtuans. 23. P. floribus racemoſis, foliis lanceolatis petiolatis. *Suppl. p. 315.*

Chamaebuxus. 24. P. floribus ſparſis: carinae apice ſubrotundo, foliis lanceolatis. *Jacq. flor. auſtr. 3. t. 233.*

alopecuroides. 25. P. floribus ſeſſilibus, floribus confertis ovatis acutis carinatis piloſis. *Mant. p. 260.*

mixta. 26. P. floribus ſeſſilibus, foliis teretibus mucronatis confertiſſimis. *Suppl. p. 316.*

ſquarroſa. 27. P. foliis aggregatis lanceolatis patulis. *Suppl. p. 315.*

††† *caule ſuffruticoſo.*

ſinenſis. 28. P. floribus ſpicatis axillaribus, foliis ovalibus.

29. P.

stipulacea. 29. P. floribus lateralibus, foliis ternis linearibus acutis. *Mant. p.* 260. *Seb. muſ.* 2. *t.* 62. *f.* 2.

†††† *caule herbaceo.*

† *ſimpliciſſimo.*

Senega. 30. P. floribus ſpicatis, caule erecto, foliis lato-lanceolatis. *Amoen. acad.* 2. *t.* 2.

lutea. 31. P. floribus oblongo-capitatis, caule erecto, foliis lanceolatis acutis. *Pluckn. amalth. t.* 438. *f.* 6.

virideſcens. 32. P. floribus globoſo-capitatis, caule erecto, foliis lanceolatis obtuſiuſculis.

triflora. 33. P. pedunculis ſubtrifloris, caule erecto, foliis linearibus alternis.

grandiflora. 39. P. caule ſubſimplici, foliis confertis ovato-lanceolatis. *Walt. flor. carol. p.* 179.

†† *caule ramoſo.*

polygama. 40. P. ſpicarum terminalium floribus corollatis, reliquarum apetalis. *Walt. flor. carol. p.* 179.

cymoſa. 41. P. caule ſubramoſo, cymis terminalibus, foliis ſubulatis. *Walt. flor. carol. p.* 179.

glaucoides. 34. P. pedunculis multifloris lateralibus, caulibus diffuſis, foliis acutis.

ciliata. 35. P. caule erecto, capſulis ciliato-dentatis.

ſanguinea. 36. P. pedunculis ſquarroſis, caule erecto. *Pluckn. mant. p.* 437. *f.* 5.

verticillata. 37. P. floribus ſpatio remotis, foliis linearibus verticillatis. *Pluckn. mant. t.* 438. *f.* 4.

cruciata. 38. P. foliis quaternis.

852. SECURIDACA. *Cal.* 3phyllus. *Cor.* papilionacea: vexillo 2phyllo intra alas. *Legumen* ovatum, 1loculare, 1ſpermum, deſinens in alam ligulatam.

erecta. 1. S. caule erecto, *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 56.

scandens. 2. S. caule scandente, foliis oblongis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 186.

virgata. 3. S. caule scandente: ramis virgatis, foliis subrotundis. *Plum. ic.* 144. *f.* 1.

1416. DALBERGIA. *Filamenta* 2, apice 4fida. *Fructus* pedicellatus, non dehiscens, leguminosus, membranaceo-compressus.

Lanceolaria. 1. D. foliis pinnatis subtus pilosis: pinnis ellipticis, fructibus lanceolatis. *Suppl. p.* 316.

Monetaria. 2. D. foliis ternatis glabris: foliolis ovatis, fructibus ovalibus aveniis. *Suppl. p.* 317.

CUMARUNA. *Cal.* turbinatus, 3partitus $\frac{2}{1}$. *Petala* 5, quorum 2 inferiora. *Legumen* 1loculare, 1spermum.

odorata. 1. Cumaruna. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 740. *t.* 296.

DECANDRIA.

853. NISSOLIA. *Cal.* 5dentatus. *Legumen* articulatum 1spermum, definens in alam ligulatam.

arborea. 1. N. caule arboreo erecto. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 60.

fruticosa. 2. N. caule fruticoso volubili. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 167. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 5.

TARALEA. *Cal.* 5partitus $\frac{2}{3}$. *Cor.* 5petala: petalis 2 inferioribus. *Germen* pedicellatum. *Legumen* 1loculare, 2valve, 1spermum.

oppositifolia. 1. Taralea. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 745. *t.* 298. *an distincti generis?*

MU-

MUTUCHI. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala: carina 2petala. *Germen* pedicellatum. *Legumen* alatum, non dehiſcens, 1loculare, 1ſpermum.

ſuberoſa. 1. MUTUCHI. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 748. *t.* 299.

DEGUELIA. *Cal.* 2labiatus $\frac{1}{3}$. *Cor.* 5petala: petalis 2 inferioribus. *Legumen* globoſum, 1loculare, 1ſpermum.

ſcandens. 1. DEGUELIA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 750. *t.* 300.

ACUROA. *Cal.* 5dentatus. *Petala* 5, quorum 2 inferiora. *Legumen* ſubrotundum, coriaceum, non dehiſcens, 1loculare, 1ſpermum.

violacea. 1. ACUROA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 753. *t.* 301.

VATAIREA. *Cal.* - - - *Cor.* - - - *Legumen* ſubrotundum coriaceum, compreſſum, non dehiſcens, margine membranaceum, uno latere rugoſum, 1loculare, 1ſpermum.

gujanenſis. 1. VATAIREA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 755. *t.* 302.

PARIVOA. *Cal.* 3-4partitus. *Petal.* 1. convolutum margine undulatum. *Germen* pedicellatum. *Stilus* longiſſimus. *Legumen* oblongum, lignoſum, 2valve, 1loculare, 1ſpermum.

grandiflora. 1. P. foliis trijugis glabris. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 737. *t.* 303.

tomentoſa. 2. P. foliis tomentoſis ternis quinisque. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 759. *t.* 304.

GALE-

GALEDUPA. *Cal.* cyathiformis, oblique truncatus integer. *Petala* unguiculata. *Legumen* ellipticum, subfalcatum planum, acuminatum. *Sem.* 1-2compressa, reniformia.

Pungam. 1. GALEDUPA. *Rumpf. herb. amb.* 2. *t.* 13.

ANDIRA. *Cal.* urceolatus subinteger, aut 5dentatus. *Car.* 2petala. *Legumen* carnosum, punctatum ovoideum hinc sulcatum, 1sperm.

Pisonis. 1. ANDIRA. *Jussieu gen. plant. p.* 363. *An congener Vourcapoa Aubl. pl. guj. t.* 373?

1286. ABRUS. *Cal.* obsolete 4lobus: lobo superiori latiori. *Filamenta* 9, basi infima connata, dorso hiantia. *Stigma* capitatum. *Semina* subglobosa.

precatori- us. 1. ABRUS. *Sp. pl. p.* 1025. Glycina Abrus. *Rheede h. malab.* 8. *t.* 39. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 5.

854. PTEROCARPUS. *Cal.* 5dentatus. *Caps.* falcata, foliacea, varicosa. *Sem.* aliquot solitaria.

Draco. 1. Pt. foliis pinnatis, caule arboreo inermi. *Jacq. stirp. amer. t.* 264. *f.* 91. *Plum. ic.* 246. *f.* 1. 2. *an idem cum Mutuchi?*

lunatus. 2. Pt. foliis pinnatis, spinis stipularibus, fructibus lunatis, caule fruticoso. *Suppl. p.* 317.

santalinus. 3. Pt. foliis ternatis subrotundis retusis glaberrimis, petalis crenatis undulatis. *Suppl. p.* 318.

Ecastaphyllum. 4. Pt. foliis simplicibus ovatis acuminatis subtus sericeis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 493. Hedysarum Ecastaphyllum. *Brown. jam. t.* 32. *f.* 1.

5. Pt.

buxifolius. 5. Pt. foliis ſimplicibus aggregatis obovatis aveniis. *Plum. ic. t.* 246. *f.* 1. *nonne idem cum Amerimno Ebeno?*

hemipterus. 6. Pt. capſula hinc ſutura tumida notata, inde in alam membranaceam extenuata. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 156. *f.* 2.

anterus. 7. Pt. capſula ſubcochleata nuda. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 156. *f.* 2. *an hujus generis?*

AMERIMNON. *Cal.* 2labiatus. *Legumen* compreſſo-foliaceum, 2valve, dehiſcens. *Sem.* aliquot ſolitaria.

Brownei. 1. A. inerme, foliis petiolatis alternis ſubcordato-ovatis, racemis compoſitis axillaribus lateralibusque. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 180. *f.* 58.

Ebenus. 2. A. ſpinoſum, foliis ſubſeſſilibus aggregatis obovato-oblongis, pedunculis biſloris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 476. Aſpalathus Ebenus. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 175. *f.* 1.

855. ERYTHRINA. *Cal.* integer. *Cor.* vexillum longiſſimum, lanceolatum.

herbacea. 1. E. foliis ternatis, caulibus ſimpliciſſimis fruticoſo-annuis. *Mant. p.* 438. *Trew Ehret. t.* 58.

carnea. 2. E. foliis ternatis glabris, caule arboreo aculeato, calicibus campanulatis truncatis. *Ait. hort Kew.* 3. *p.* 8.

Coralloidendrum. 3. E. foliis ternatis inermibus, caule arboreo aculeato, calicibus truncatis quinquedentatis. *Commel. hort. Amſt.* 1. *t.* 108. *β*) Erythrina orientalis. *Murray comm. Goett.*, 1777. *t.* 1.

picta. 4. E. foliis ternatis aculeatis, caule arboreo aculeato. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 77. *Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub.* 5. *app. p.* 65. *ic?*

Criſta galli. 5. E. foliis ternatis: petiolis ſubaculeatis glandulosis, caule arboreo inermi. *Mant. p.* 99. *Jacq. obſ. bot.* 3. *t.* 51.

planiſiliqua. 6. E. foliis ſimplicibus oblongis. *Plum. ic.* 102. *f.* 1.

856. PISCIDIA. *Stigma* acutum. *Legumen* 4fariam alatum.

Erythrina. 1. P. foliolis ovatis. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 176. *f.* 45.

carthagenenſis. 2. P. foliolis obovatis. *Pluckn. alm. t.* 214. *f.* 4. *an varietas Erythrinae?*

857. BORBONIA. *Cal.* acuminato-ſpinoſus. *Stigma* emarginatum. *Legumen* mucronatum.

ericifolia. 1. B. foliis ſublinearibus acutis villoſis, capitulis terminalibus.

laevigata. 2. B. foliis lanceolatis enerviis glabris, involucris calicibusque hirtis. *Mant. p.* 100.

trinervia. 3. B. foliis lanceolatis trinerviis integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 297. *f.* 4.

lanceolata. 4. B. foliis lanceolatis multinerviis integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 297. *f.* 3.

cordata. 5. B. foliis cordatis multinerviis integerrimis. *Mant. p.* 488. *Seb. muſ.* 1. *t.* 24. *f.* 3.

crenata. 6. B. foliis cordatis multinerviis denticulatis. *Breyn. cent. t.* 28.

858. SPARTIUM. *Cal.* deorſum productus, 2lobiatus. *Filamenta* germini adhaerentia. *Stigma* longitudinale, ſupra villoſum.

* *foliis nullis.*

aphyllon. 1. Sp. ramis virgatis alternis: ſenioribus angulatis elevato-punctatis, floribus terminalibus alternis. *Suppl. p.* 320. *Pall. it.* 3. *p.* 742. *t.* V. *f.* 3. a. b.

** *foliis ſimplicibus.*

contaminatum. 2. Sp. ramis teretibus, foliis alternis filiformibus baſi contaminatis. *Mant. p.* 268.

ſepiarium. 3. Sp. ramis ſcabris, foliis ſuperioribus confertis filiformibus. *Pet. gaz. t.* 83. *f.* 3.

4. Sp.

junceum. 4. Sp. ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *Regn. bot. t.* 220. *Legumen nodosum.*

monospermum. 5. Sp. ramis striatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis.

Sphaerocarpon. 6. Sp. ramis teretibus, foliis lanceolatis sessilibus subtus pubescentibus. *Mant. p.* 571. *Renealm. sp. t.* 33.

purgans. 7. Sp. ramis teretibus striatis, foliis lanceolatis subsessilibus, pubescentibus. *Sp. pl. p.* 999. Genista purgans. *Bulliard herb. Franc. t.* 115.

Scorpius. 8. Sp. ramis spinosis patentibus, foliis ovatis.

ferox. 9. Sp. ramis spinosis striatis, foliis sparsis sessilibus, racemis foliosis lateralibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 206.

**** foliis ternatis.*

angulatum. 10. Sp. foliis simplicibus ternatisque, ramis sexangularibus apice floriferis.

scoparium. 11. Sp. foliis ternatis simplicibusque, ramis inermibus angulatis. *Flor. dan. t.* 313. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 153. *f.* 4.

supranubium. 12. Sp. floribus axillaribus pluribus pedunculatis, ramis virgatis sulcatis incanis, leguminibus glabris. *Suppl. p.* 319.

complicatum. 13. Sp. foliolis conduplicatis, caulibus inermibus prostratis glabris, leguminibus scabris. *Pluckn. alm. t.* 86. *f.* 1.

radiatum. 14. Sp. foliis linearibus subverticillatis: petiolis persistentibus, ramis oppositis tetragonis apice umbelliferis. *Mill. h. angl. t.* 259. *f.* 1.

cytisoides. 15. Sp. foliis linearibus integerrimis petiolatis, ramis teretibus, racemis terminalibus. *Suppl. p.* 320. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 107.

sericeum. 16. Sp. inerme sericeum, foliis linearibus, racemis terminalibus, ramis angulatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 12.

spinosum. 17. Sp. ramis angulatis spinosis.

villosum. 18. Sp. ramis spinosis, calicibus leguminibusque villosis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 207.

horridum. 19. Sp. foliis complicatis sericeis, ramulis teretibus spinosis oppositis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 51.

859. GENISTA. *Cal.* 2labiatus $\frac{2}{3}$. *Vexillum* oblongum, a piſtillo ſtaminibusque deorſum reflexum. *Legumen* aequale.

* *Inermes.*

† *foliis ternatis.*

canarienſis. 1. G. foliis utrinque pubeſcentibus, ramis angulatis. *β) Seb. muſ.* 2. *t.* 4. *f.* 6. 7.

candicans. 2. G. foliis ſubtus villoſis, pedunculis lateralibus ſubquinquefloris foliatis, leguminibus hirſutis alatis. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 6.

linifolia. 3. G. foliis ſeſſilibus linearibus ſubtus ſericeis.

pendulina. 4. G. foliis ternatis ſimplicibusque obovatis, ramis virgatis ſtriatis patentibus, floribus lateralibus geminis ſubpendulis. *la Mark dict. bot. n.* 24.

†† *foliis ſimplicibus.*

ſagittalis. 5. G. ramis ancipitibus membranaceis articulatis, foliis ovato-lanceolatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 209. *an cum totu intermium tribu ſpartiis adſcribenda?*

tridentata. 6. G. ramis triquetris membranaceis ſubarticulatis, foliis tricuſpidatis.

tinctoria. 7. G. ramis ſtriatis teretibus erectis, foliis lanceolatis glabris. *Flor. dan. t.* 526. *Legumen cylindricum.*

ſericea. 8. G. ramis ſtriatis teretibus erectis, foliis lanceolatis ſubtus ſericeo-villoſis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 167.

ſibirica. 9. G. ramis aequalibus teretibus erectis, foliis lanceolatis glabris. *Mant. p.* 571. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 190. *Legumen cylindricum.*

florida. 10. G. ramis ſtriatis teretibus, foliis lanceolatis ſericeis, racemis ſecundis.

piloſa. 11. G. caule tuberculato decumbente, foliis lanceolatis obtuſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 208.

humifuſa. 12. G. ramis proſtratis ſtriatis villoſis, foliis lanceolatis ciliatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 69.

** *Spi-*

** *Spinoſae.*

anglica. 13. G. ſpinoſiſſima glabra, foliis lanceolatis, ſpinis ſimplicibus compoſitisque. *Flor. dan. t.* 619.

germanica. 14. G. ſpinoſiſſima hirſuta, foliis ovato-lanceolatis, ſpinis compoſitis et decompoſitis. *Tabern. Kraeuterb. p.* 1102.

hiſpanica. 15. G. ſpinis decompoſitis, ramis floriferis inermibus, foliis linearibus piloſis.

hirſuta. 18. G. ſpinis ternatis decuſſatis, foliis ſimplicibus lanceolatis, ſpicis terminalibus hirſutis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 51.

luſitanica. 16. G. caule aphyllo, ſpinis decuſſatis.

aſpalathoides. 17. G. foliis lineari-lanceolatis ſubſericeis, ramis ſtriatis tuberculatis apice ſpinoſis, floribus axillaribus. *la Mark dict. bot. n.* 15.

860. ASPALATHUS.

Cal. 5fidus: lacinia ſuperiore majore. *Legumen* ovatum, muticum, ſubdiſpermum.

* *foliis faſciculatis.*

ſpinoſa. 1. A. foliis linearibus nudis ſpinam gemmaceam circumſtantibus. *Pluckn. phyt.* 297. *f.* 6. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 144. *f.* 4.

capitata. 2. A. foliis linearibus acutis, floribus capitatis, bracteis nudis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 23. *f.* 6.

glomerata. 3. A. foliis linearibus acutis villoſis incurvatis, floribus capitatis, calicis laciniis ovatis, corollis glabris. *Suppl. p.* 321.

ericifolia. 4. A. foliis linearibus inermibus hirſutis, floribus alternis, calicibus linearibus. *Pluckn. mant. t.* 413. *f.* 6.

uniflora. 5. A. foliis linearibus inermibus glabris: ſtipulis acutis perſiſtentibus, floribus ſolitariis: calicum laciniis cymbiformibus. *Pluckn. mant. t.* 414. *f.* 7.

nigra. 6. A. foliis linearibus obtuſiuſculis, floribus capitato-ſpicatis pubeſcentibus. *Mant. p.* 262.

galioides. 7. A. foliis linearibus laevibus, pedunculis biſloris elongatis: apice folioſis. *Mant. p.* 260.

verrucoſa. 8. A. foliis filiformibus, gemmis verrucoſis tomentoſis nudis.

Hyſtrix. 9. A. foliis filiformibus rigidis ſpinoſis ſericeis, floribus lateralibus ſeſſilibus ſolitariis: corollis villoſis. *Suppl. p.* 322.

geniſtoides. 10. A. foliis filiformibus laevibus, calicibus ſubracemoſis pendulis corollisque glabris. *Mant. p.* 261.

ciliaris. 11. A. foliis filiformibus ſcabris, floribus terminalibus ſeſſilibus: vexillis pubeſcentibus. *Mant. p.* 262.

carnoſa. 12. A. foliis teretiuſculis obtuſis, calicibus ſubpubeſcentibus acutis, corollis glabris. *Mant. p.* 261.

araneoſa. 13. A. foliis ſetaceis inermibus hiſpidis, floribus capitatis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 23. *f.* 6.

aſparagoides. 14. A. foliis ſetaceis piloſiuſculis, calicibus foliiformibus longitudine corollae ſolitariis. *Suppl. p.* 321.

caneſcens. 15. A. foliis ſubulatis tomentoſo-ſericeis, floribus lateralibus: vexillis pubeſcentibus. *Mant. p.* 262.

pedunculata. 16. A. foliis ſubulatis glabris pedunculis filiformibus duplo brevioribus. *Herit. ſert. angl. p.* 21. *t.* 26.

retroflexa. 17. A. foliis ſubulatis glabris minimis, ramis filiformibus patentiſſimis, floribus ſolitariis terminalibus.

thymiſolia. 18. A. foliis ſubulatis inermibus glabris breviſſimis; floribus alternis. *Pluckn. mant. t.* 413. *f.* 1.

albens. 19. A. foliis ſubulatis ſericeis apice patulis, faſciculis floreis ſparſis. *Mant. p.* 261.

chenopoda. 20. A. foliis ſubulatis mucronatis hirtis, floribus capitatis hirſutiſſimis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 23. *f.* 4.

aſtroites. 21. A. foliis ſubulatis mucronatis glabris, caule villoſo, floribus ſparſis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 24. *f.* 6.

ſericea. 22. A. foliis lanceolatis ſericeis, pedunculis terminalibus biflori, vexillo nudiuſculo. *Suppl. p.* 321.

heterophylla. 23. A. foliis ramorum faſciculatis; ramulorum ternatis linearibus hirtis, ſpicis terminalibus: calice corollaque villoſis. *Suppl. p.* 321.

*** foliis quinis quinatisve.*

quinquefolia. 24. A. foliis quinis ſeſſilibus, pedunculis ſpicatis. *Pluckn. mant. t.* 273. *f.* 4.

pinnata. 25. A. foliis pinnato-quinatis obcordatis, pedunculis capitatis.

26. A.

indica. 26. A. foliis quinatis ſeſſilibus, pedunculis unifloris. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 37.

**** foliis trinis, ternis, ternatisve.*

candicans. 27. A. foliis trinis faſciculatisque filiformibus ſericeis, floribus ſublateralibus: vexillis nullis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 17.

cretica. 28. A. foliis trinis cuneiformibus glabris: lateralibus brevioribus, ſtipulis obſoletis, floribus congeſtis. *Zanon. hiſt. t.* 39.

tridentata. 29. A. foliis trinis lanceolatis glabris: ſtipulis tridentatis mucronatis, floribus capitatis.

anthyphylloides. 30. A. foliis trinis lanceolatis aequalibus ſubpubeſcentibus: ſtipulis nullis, capitulis terminalibus.

calloſa. 31. A. foliis trinis ſubulatis aequalibus: ſtipulis ſubrotundis calloſis, floribus ſpicatis glabris. *Pluckn. mant. t.* 345. *f.* 4.

argentea. 32. A. foliis trinis linearibus ſericeis: ſtipulis ſimplicibus mucronatis, floribus ſparſis tomentoſis.

laxata. 33. A. foliis ternis linearibus villoſis, floribus faſciculatis quinis, calicibus lanatis, caulibus proſtratis teretibus. *Mant. p.* 263.

piloſa. 34. A. foliis ternis linearibus villoſis, capitulis terminalibus piloſiſſimis, corollis pubeſcentibus. *Mant. p.* 263.

mucronata. 35. A. foliis ternis laevibus, ramis acuminatis, floribus racemoſis. *Suppl. p.* 320.

orientalis. 36. A. foliis ternatis lanceolatis pubeſcentibus, floribus faſciculatis quinis: calicibus pubeſcentibus, caulibus erectis angulatis. *Mant. p.* 263.

881. ULEX. *Cal.* 2phyllus. *Legumen* vix calice longius.

europaeus. 1. U. foliis villoſis acutis, ſpinis ſparſis. *Flor. dan. t.* 608. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 7.

capenſis. 2. U. foliis ſolitariis obtuſis, ſpinis ſimplicibus terminalibus. *Pet. gaz. t.* 83. *f.* 9.

861. AMORPHA. *Corollae* vexillum ovatum, concavum. *Alae* o. *Carina* o.

fruticoſa. 1. Amorpha. *du Hamel arbr.* 1. *t.* 46. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 144. *f.* 5. *Mill. h. angl. t.* 27.

TETRAMNUS. *Corollae* carina minima, calice recondita. *Stamina* alterna, 5sterilia. *Stigma* sessile, capitatum.

volubilis. 1. T. foliis ovato-lanceolatis pubescentibus. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 482. Dolichos uncinatus. *Plum. ic.* 221.

uncinatus. 2. T. foliis oblongis obtusis subtus sericeis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 105.

862. CROTALARIA. *Filamenta* connata cum fissura dorsali. *Legumen* turgidum, inflatum, pedicellatum, simplex.

* *foliis simplicibus.*

perforata. 1. Cr. foliis perfoliatis cordatis denticulatis. *Mant. p.* 439.

perfoliata. 2. Cr. foliis perfoliatis cordato-ovatis. *Dill. h. Elth. t.* 102. *f.* 122.

amplexicaulis. 3. Cr. foliis caulinis amplexicaulibus cordatis alternis: floralibus oppositis reniformibus coloratis, floribus solitariis. *Seb. mus.* 1. *t.* 24. *f.* 5.

sagittalis. 4. Cr. foliis lanceolatis alternis stipulis decurrentibus, bifidis. *Pluckn. alm. t.* 169. *f.* 6. *β*) *Pluckn. alm. t.* 277. *f.* 2.

juncea. 5. Cr. foliis lanceolatis petiolato-sessilibus, caule striato. *Mant. p.* 439. *Trew. Ehret. t.* 47.

sessiliflora. 6. Cr. foliis lanceolatis subsessilibus, floribus sessilibus lateralibus, caule aequali.

sericea. 7. Cr. foliis lanceolatis acutis subtus sericeis, florum racemis elongatis. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 5. *p.* 26.

opposita. 8. Cr. glabra exstipulata, foliis oblongis sessilibus, pedunculis axillaribus diphyllis. *Suppl. p.* 322. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 474. Spartium capense.

retusa. 9. Cr. foliis oblongis cuneiformibus retusis. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 25. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 2.

biflora. 10. Cr. foliis obtusis, caulibus prostratis herbaceis, pedunculis bifloris. *Mant. p.* 516. 570. *et p.* 273. Astragalus biflorus. *Burm. ind. t.* 48. *f.* 2.

11. Cr.

bifaria. 11. Cr. pubescens diffusa stipulata, foliis bifariis: inferioribus orbiculatis, superioribus oblongis, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 322.

caerulea. 12. Cr. foliis ovatis basi attenuatis sessilibus subretusis: stipulis sulcatis amplexicaulibus, caule tetragono. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 98.

verrucosa. 13. Cr. foliis ovatis: stipulis lanatis declinatis, ramis tetragonis. *Burm. zeyl. t.* 34.

triflora. 14. Cr. foliis ovatis sessilibus glabris, ramis angulatis, pedunculis ternis lateralibus unifloris. *Mant. p.* 440.

imbricata. 15. Cr. foliis ovatis acutis villosis sessilibus, floribus subsessilibus. *Pluckn. mant. t.* 388. *f.* 3.

sinensis. 16. Cr. foliis ovatis subpetiolatis: stipulis minutissimis.

rotundifolia. 27. Cr. foliis rotundatis integris pilosis sparsis, caule subdecumbente. *Walt. flor carol. p.* 181. *an cum sagittali distincti generis?*

floribunda. 28. Cr. foliis cuneiformibus, ramis pubescentibus, leguminibus pedicellatis glabris rugosis compressis carinatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 19.

axillaris. 29. Cr. foliis ovato-ellipticis subtus pilosis, stipulis subulatis minutis, pedunculis axillaribus geminis unifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 20.

pallida. 30. Cr. foliis lanceolatis glabris, racemis terminalibus spiciformibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 20.

linifolia. 17. Cr. hirsuta exstipulata, foliis linearibus obtusis petiolatis, caule angulato, racemo terminali. *Suppl. p.* 322. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 96. *f.* 1.

** *foliis compositis.*

— *ternatis.*

heterophylla. 18. Cr. foliis ternatis ellipticis emarginatis: inferioribus simplicibus. *Suppl. p.* 323.

capensis. 19. Cr. foliis obtusis: stipulis foliaceis, ramis incanis. *Suppl. p.* 323. *Jacq. h. Vind.* 4. *t.* 64.

latifolia. 20. Cr. foliis oblongis glabris, floribus lateralibus subracemosis, leguminibus sessilibus. *Sloan. hist. jam.* 2. *t.* 176. *f.* 1. 2.

microphylla. 31. Cr. foliis oblongis pedunculis lateralibus bifloris, caule filiformi decumbente. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 52.

lunaris. **21.** Cr. foliis ovatis acutis: ſtipulis ſemicordatis lunatis.

laburnifolia. **22.** Cr. exſtipulata, foliis ovatis acuminatis, leguminibus pedicellatis. *Burm. zeyl. t.* 35.

incana. **23.** Cr. foliis ellipticis, ſtipulis ſubulatis, legumibus villoſo-pubeſcentibus. *Mant. p.* 440. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 82.

cordifolia. **24.** Cr. foliis obcordatis mucronatis, floribus corymboſis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 266.

gujanenſis. **25.** Cr. foliis oblongis, legumine quadrangulari. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 761. *t.* 305.

⊢⊢ *foliis quinatis.*

quinquefolia. **26.** Cr. *Rheede h. malab.* 9. *t.* 28.

ZORNIA. *Cal.* campanulatus 2labiatus $\frac{1}{3}$. *Cor.* infera. *Vexillum* cordatum, revolutum. *Antherae* alternae oblongae, alternae globoſae. *Legumen* articulatum, hiſpidum.

bracteata. 1. ZORNIA. *Walt. flor. carol. p.* 181.

863. ONONIS. *Cal.* 5partitus: laciniis linearibus. *Vexillum* ſtriatum. *Filamenta* connata absque fiſſura. *Legumen* turgidum, ſeſſile, ſimplex, 1loculare.

* *floribus ſubſeſſilibus.*

antiquorum. **1.** O. floribus ſolitariis foliolo majoribus, foliis inferioribus ternatis, ramis laeviuſculis ſpinoſis.

ſpinoſa. **2.** O. floribus racemoſis ſolitariis, foliis ternatis ſimplicibusque, ramis ſpinoſis. *Flor. dan. t.* 783. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 6.

arvenſis. **3.** O. floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis: ſuperioribus ſimplicibus, ramis inermibus ſubvilloſis. *Zorn. pl. offic. ic. t.* 132.

4. O.

repens. 4. O. caulibus diffusis, ramis erectis, foliis superioribus simplicibus: stipulis ovatis. *Dill. h. Elth. t.* 25. *f.* 28.

minutissima. 5. O. floribus lateralibus, foliis ternatis glabris: stipulis ensiformibus, calicibus scariosis corolla longioribus. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 240.

mitissima. 6. O. floribus sessilibus spicatis: bracteis stipularibus ovatis ventricosis scariosis imbricatis. *Dill. h. Elth. t.* 24. *f.* 27.

alopecuroides. 7. O. spicis foliosis, foliis simplicibus obtusis: stipulis dilatatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 75.

flava. 8. O. foliis ternatis subrotundis, stigmate laevi. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 130. *an distincta hujus tribus species?*

variegata. 9. O. stipulis bracteisque dentatis, foliis simplicibus striatis, floribus subpedunculatis. *Bocc. sic. t.* 38. *f.* 3.

alba. 10. O. floribus racemosis, foliis simplicibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 210.

** *floribus pedunculatis.*

† *pedunculo mutico.*

T *caule herbaceo.*

capensis. 11. O. racemis pedunculatis longis, foliis ternatis suborbiculatis.

prostrata. 12. O. pedunculis unifloris longissimis, foliis ternatis acutis: stipulis subulatis, caulibus prostratis. *Mant. p.* 266. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 504. Lotus prostratus.

reclinata. 13. O. pedunculis unifloris, foliis ternatis subrotundis crenatis, leguminibus cernuis.

cenisia. 14. O. pedunculis unifloris, foliis ternis cuneatis: stipulis serratis, caulibus prostratis. *Mant. p.* 267. *Allion. flor. pedem. t.* 10. *f.* 3.

geminata. 36. O. pedunculis bifloris lateralibus, foliis ternatis obovatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 23.

TT *caule frutescente.*

serrata. 15. O. floribus subsessilibus solitariis, foliis inferioribus ternatis serrato-dentatis cuneiformibus apice subtridentatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 130. *an distincta species hujus tribus et cohortis?*

hircina. 16. O. floribus geminis brevissime pedicellatis, foliis superioribus simplicibus: stipulis serratis, caulibus villosis viscidis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 93.

umbellata. 17. O. pedunculis umbellatis, foliis ternatis emarginatis, caulibus proſtratis. *Mant. p.* 266.

argentea. 18. O. volubilis, pedunculis umbellatis, foliis ternatis: foliolis ſeſſilibus argenteo-tomentoſis. *Suppl. p.* 324.

involucrata. 19. O. hirſuta proſtrata, pedunculis involucratis: involucro tetraphyllo, foliis ternatis cuneiformibus. *Suppl. p.* 324.

filiformis. 20. O. pedunculis ſubtrifloris, foliis ternatis ſubſeſſilibus: foliolis ovatis mucronatis. *Mant. p.* 266.

cernua. 21. O. racemis ſtrictis, foliis cuneiformibus, leguminibus cernuis linearibus recurvatis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 82. *β*) Cyliſus aethiopicus. *Sp. pl.* 2. *p.* 1042.

pubeſcens. 22. O. pedunculis breviſſimis, foliis ſuperioribus ſimplicibus: ſtipulis ovato-lanceolatis integerrimis. *Mant. p.* 267.

rotundifolia. 23. O. foliis ternatis ovatis dentatis, calicibus triphyllo-bracteatis, pedunculis ſubtrifloris. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *app. t.* 49.

fruticoſa. 24. O. foliis ſeſſilibus ternatis lanceolatis ſerratis: ſtipulis vaginalibus, pedunculis ſubtrifloris. *du Hamel arbr.* 1. *t.* 58. *Mill. h angl. t.* 36.

tridentata. 25. O. foliis ternatis carnoſis ſublinearibus tridentatis, pedunculis bifloris. *Magn. h. monſp. t.* 16.

criſpa. 26. O. foliis ternatis undulatis ſubrotundis dentatis viſcoſo-pubeſcentibus, pedunculis unifloris. *Magn. h. monſp. t.* 17.

microphylla. 27. O. ſpinoſa, foliis minutis ternatis integerrimis, leguminibus recurvis. *Suppl. p.* 324.

mauritanica. 28. O. foliis quinatis obovatis ſubtus ſericeis: ſtipulis filiformibus, pedunculis racemoſis. *Mant. p.* 267. 453. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 504. Lotus mauritanicus.

†† *pedunculo ariſtato.*

† *caule fruticoſo.*

hiſpanica. 29. O. foliis ternatis canaliculatis recurvatis ſerratis, pedunculis ſubunifloris. *Suppl. p.* 324.

Nutrix. 30. O. foliis ternatis viſcoſis: ſtipulis integerrimis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 40. *Mill. h. angl. t.* 37.

pinguis. 31. O. foliis ternatis lanceolatis: ſtipulis integerrimis, pedunculis unifloris. *An mera nutricis varietas?* *β*) *Pluckn. alm. t.* 135. *f.* 5.

†† *cau-*

TT *caule herbaceo.*

Cherleri. 32. O. pedunculis unifloris, foliis ternatis ſtipulis ſerratis.

ornithopodioides. 33. O. pedunculis bifloris, leguminibus linearibus cernuis.

viſcoſa. 34. O. pedunculis unifloris, foliis ſimplicibus: infimis ternatis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1239.

vaginalis. 35. O. pedunculis unifloris ariſtatis, foliis ſeſſilibus ternatis ſtipulisque vaginantibus dentatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 53.

864. ANTHYLLIS. *Cal.* ventricoſus. *Legumen* ſubrotundum, tectum.

* *Herbaceae.*

tetraphylla. 1. A. foliis quaterno-pinnatis, floribus lateralibus. *Mill. h. angl. t.* 41. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 3.

Gerardi. 2. A. foliis pinnatis inaequalibus, pedunculis lateralibus folio longioribus, capitulis aphyllis. *Mant. p.* 100. *Gerard. flor. prov. t.* 18.

cornicina. 3. A. foliis pinnatis inaequalibus, capitulis ſolitariis.

Vulneraria. 4. A. foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato. *Riv. tetrap. t.* 18. *β) Dill. h. Elth. t.* 320. *f.* 413.

montana. 5. A. foliis pinnatis aequalibus, capitulo terminali ſecundo: floribus obliquatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 334.

quinqueflora. 6. A. foliis ternatis linearibus, capitulo quinquefloro. *Suppl. p.* 325.

lotoides. 7. A. foliis tripartitis, calicibus prismaticis faſciculatis leguminum longitudine.

involucrata. 8. A. ſubherbacea, foliis ternatis petiolatis ſtipulatis enſiformibus, floribus capitatis. *Mant. p.* 265.

** *Fruticoſae.*

viſciflora. 9. A. foliis digitato-pinnatis, calicibus hirſutis. *Suppl. p.* 325.

Barba jovis. 10. A. foliis pinnatis aequalibus tomentoſis, floribus capitatis. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 3. *Mill. h. angl. t.* 41. *f.* 2. *Pericarpium* 1*loculare.*

heterophylla. 11. A. foliis pinnatis: floralibus ternatis.

linifolia. 12. A. foliis ternatis ſeſſilibus enſiformibus, floribus capitatis. *Mant. p.* 265.

cytiſoides. 13. A. foliis ternatis inaequalibus, calicibus lanatis lateralibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1182.

Hermanniae. 14. A. foliis ternatis ſubpedunculatis, calicibus nudis. *Alp. exot. t.* 26.

Erinacea. 15. A. ſpinoſa, foliis ſimplicibus. *Cluſ. hiſp. t.* 214.

876. ARACHIS. *Cal.* 2labiatus. *Cor.* reſupinata. *Filamenta* connexa. *Legumen* gibbum toruloſum vènoſum, coriaceum.

hypogaea. 1. A. caule procumbente. *Ehret. pict. t.* 3. *f.* 3. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 144. *f.* 2.

aprica. 2. A. caule erecto, foliis ternatis. *Walt. flor. carol. p.* 182.

895. EBENUS. *Cal.* dentes longitudine corollae. *Cor.* alis ſubnullis. *Sem.* 1. hirtum.

cretica. 1. Ebenus. *Mant. p.* 451. *Pluckn. alm. t.* 67. *f.* 5.

865. LUPINUS. *Cal.* 2fidus. *Antherae* 5 oblongae, 5 ſubrotundae. *Legumen* coriaceum, inflatum, nodoſum.

perennis. 1. L. calicibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiori emarginato; inferiori integro. *Mill. h. angl.* 170. *f.* 1.

albus. 2. L. calicibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiori integro; inferiori tridentato. *Blackw. herb. t.* 282. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 4.

hirſutus. 3. L. calicibus alternis appendiculatis: labio ſuperiori bipartito; inferiori tridentato.

anguſtifolius. 4. L. calicibus alternis appendiculatis: labio ſuperiori bipartito; inferiori integro. *Knorr del. hort.* 2. *t.* L. 7. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 4.

Termis. 5. L. calicibus alternis appendiculatis: labio utroque integro acuto. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 131.

6. L.

integrifolius. 6. L. calicibus alternis appendiculatis, foliis simplicibus oblongis villosis.

varius. 7. L. calicibus semiverticillatis appendiculatis: labio superiori bifido; inferiori subtridentato. *Kniph. bot. orig. cent. 7. n. 47. Gaertn. de fr. et sem. pl. cent. 9. t. 150. f. 4.*

pilosus. 8. L. calicibus verticillatis appendiculatis: labio superiori bipartito; inferiori integro.

luteus. 9. L. calicibus verticillatis appendiculatis: labio superiori bipartito; inferiori tridentato. *Kniph. bot. orig. cent. 4. n. 47. Gaertn. de fr. et sem. pl. cent. 9. t. 150. f. 4.*

866. PHASEOLUS. *Carina* cum *staminibus* *stiloque* spiraliter torta. *Legumen* (plurimis) nodosum.

* *caule volubili.*

vulgaris. 1. Ph. floribus racemosis geminis, leguminibus pendulis. *Lob. ic. 59. Gaertn. de fr. et sem. pl. cent. 9. t. 150. f. 3.*

perennis. 21. Ph. floribus racemosis geminis, bracteis minimis, leguminibus pendulis, radice perenni. *Walt. flor. carol. p. 182.*

alatus. 2. Ph. floribus laxe spicatis, alis longitudine vexilli. *Dill. h. Elth. t. 235. f. 303.*

helvolus. 3. Ph. floribus capitatis: calicibus bracteatis, alis expansis maximis, foliolis deltoidibus oblongis. *Dill. h. Elth. t. 233. f. 300.*

vexillatus. 4. Ph. pedunculis petiolo crassioribus capitatis, alis subfalcatis difformibus, leguminibus linearibus strictis. *Jacq. h. Vind. 2. t. 102.*

farinosus. 5. Ph. pedunculis subcapitatis, seminibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Nissol. act. Paris. 1730. t. 42. Legumen* loculamentosum, latum, simplex.

bipunctatus. 6. Ph. leguminibus acinaciformibus pubescentibus, seminibus ad hilum bipunctatis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 100.*

lunatus. 7. Ph. leguminibus acinaciformibus laevibus sublunatis.

Pallas. 8. Ph. leguminibus cylindricis torulosis pendulis. *Molin. hist. nat. Chil. p. 108.*

inamoenus. 9. Ph. florum vexillo revoluto calicibus concolore. *Jacq. h. Vind. 1. t. 66.*

10. Ph.

Caracalla. 10. Ph. vexillo carinaque spiraliter convolutis. *Trew rar.* 14. *t.* 10.

aconitifolius. 11. Ph. foliis subquinquepartitis. *Suppl. p.* 325. *Jacq. obs. bot.* 3. *t.* 52. *an distinctus a glacine triloba?*

Asellus. 12. Ph. foliis sagittatis, seminibus globosis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 108.

** *caule semivolubili.*

semierectus. 13. Ph. floribus spicatis: calicibus ebracteatis, alis expansis majoribus, foliolis ovatis. *Mant. p.* 100. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 15.

hirtus. 14. Ph. leguminibus teretibus, carina sinistrorsum cornuta. *Retz. obs. bot.* 3. *p.* 38.

*** *caule erecto.*

Mungo. 15. Ph. caule flexuoso tereti hirsuto, leguminibus capitatis hirtis. *Mant. p.* 101.

Max. 16. Ph. caule recto anguloso hispido, leguminibus angustis pendulis hirtis. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 140.

nanus. 17. Ph. caule laevi, leguminibus pendulis compressis rugosis.

radiatus. 18. Ph. caule tereti, floribus capitatis, leguminibus cylindricis horizontalibus. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 139. *f.* 2. *Legumen per sepimenta loculamentosum.*

sphaerospermus. 19. Ph. seminibus globosis hilo tinctis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 117. *f.* 1-3.

lathyroides. 20. Ph. foliolis oblongis acuminatis, pedunculis elongatis, leguminibus tereti-subulatis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 116. *f.* 1.

867. DOLICHOS. *Vexilli* basis callis 2 parallelis, oblongis, alas subtus complimentibus. *Legumen* (plurimis) angustum, per sepimenta loculamentosum.

† *caule volubili.*

benghalensis. 1. D. frutescens, leguminibus longe mucronatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 124.

Faba nigrita. 2. D. frutescens, leguminibus pendulis linearibus compressis mucronatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 132.

3. D.

lignoſus. 3. D. caule perenni, pedunculis capitatis, leguminibus ſtrictis linearibus. *Hort. Cliff. t.* 20.

polyſtachyos. 4. D. caule perenni, ſpicis longiſſimis: pedicellis geminis, leguminibus acuminatis compreſſis.

ariſtatus. 5. D. pedunculis biſloris axillaribus, leguminibus linearibus compreſſis: ariſta terminali recta.

acinaciformis. 6. D. glaber, leguminibus craſſis compreſſis mucrone inflexo terminatis: ſeminibus membrana alba involutis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 114. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 44.

Lablab. 7. D. leguminibus ovato-acinaciformibus: ſeminibus ovatis hilo arcuato verſus alteram extremitatem. *Alp. aeg. t.* 75. *Banks ic. Kaempf t.* 25? *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 2. *Legumen huic et bengalenſi latum alatum.*

ſinenſis. 8. D. leguminibus pendulis cylindricis toruloſis, pedunculis erectis multifloris. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 134.

luteolus. 9. D. leguminibus capitatis pluribus cylindricis: ſeminibus rotundatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 90.

tranquebaricus. 10. D. leguminibus capitatis paucis cylindricis: apice mucronato recto. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 70.

unguiculatus. 11. D. leguminibus capitatis ſubcylindricis: apice recurvo concavo. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 23.

ſesquipedalis. 12. D. leguminibus ſubcylindricis laevibus longiſſimis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 67.

luteus. 13. D. floribus ſubſpicatis, leguminibus ſubcylindricis glabris, foliolis ſubrotundo-rhombeis obtuſis integris glabris. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 105.

capenſis. 14. D. pedunculis ſubbifloris, leguminibus ellipticis compreſſis, foliis glabris.

incurvus. 15. D. leguminibus ſolitariis incurvis tricarinatis. *Thunb. flor. jap. p.* 280.

tetragonolobus. 16. D. leguminibus membranaceo-quadrangulis. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 133.

gladiatus. 17. D. leguminibus oblongis cum mucrone obtuſis glabris ad ſuturam quadrimarginatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 276. *Banks ic. Kaempf. t.* 39.

enſiformis. 18. D. leguminibus gladiatis dorſo tricarinatis: ſeminibus arillatis. *Rheed. h. malab.* 8. *t.* 44.

19. D.

Lineatus. 19. D. leguminibus racemosis oblongis tricarinatis. *Thunb. flor. jap. p.* 280.

altissimus. 20. D. leguminibus racemosis hirtis aequalibus: seminibus hilo cinctis, foliis utrinque glabris. *Mant. p.* 101. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 190.

pruriens. 21. D. leguminibus racemosis: valvis subcarinatis hirtis, pedunculis ternis. *Mant. p.* 441. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 188.

urens. 22. D. leguminibus racemosis: sulcis transversis lanceolatis, seminibus hilo cinctis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 189.

minimus. 23. D. leguminibus racemosis compressis tetraspermis, foliis rhombeis. *Jacq. obs. bot.* 1. *t.* 22.

cultratus. 24. D. leguminibus racemosis compressis dorso ventroque tuberculatis, foliolis ovatis acutis glabris. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 134.

funarius. 25. D. caule perenni, leguminibus pendulis pentaspermis, foliis ovalibus utrinque glabris. *Molin. hist nat. Chil. p.* 132.

Faba indica. 26. D. foliolis stipulatis; ovatis repandis acuminatis subtus venosis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 133.

scarabaeoides. 27. D. foliis ovatis tomentosis, floribus solitariis, seminibus bicornibus. *Pluckn. alm. t.* 52 *f.* 3.

reticulatus. 28. D. foliis ovatis acutis rugosis reticulatis villosis, racemis paucifloris. *Ait. hort. Kew.* 3 *p.* 33.

Didire. 29. D. stipulis margine reflexis obtusis. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 133.

bulbosus. 30. D. foliis glabris multangulis dentatis. *Pluckn. alm. t.* 52. *f.* 4.

trilobus. 31. D. foliolis lateralibus extrorsum gibbis: intermedio trilobo. *Burm. ind. t.* 50. *f.* 1. *an distinctus a glycine triloba?*

filiformis. 32. D. foliolis linearibus obtusis mucronatis glabris subtus pubescentibus.

purpureus. 33. D. caule glabro, petiolis pubescentibus, corollae alis patentibus.

regularis. 34. D. foliis ovatis obtusis, pedunculis multifloris, petalis regularibus aequalibus.

†† *caule procumbente.*

roseus. 35. D. caule adscendente repente, foliis subrotundis nitidis, floribus racemosis, leguminibus dorso tricarinatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 105.

36. D.

repens. 36. D. caule repente, foliis pubescentibus ovatis, floribus racemosis geminis, leguminibus linearibus teretibus.

Lubia. 37. D. caule diffuso, pedunculis axillaribus longissimis apice racemosis, leguminibus erectis polyspermis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 133.

††† *caule erecto.*

pugioniformis. 38. D. caule suberecto, leguminibus acinaciformibus tricarinatis: seminibus arillatis.

Soja. 39. D. caule flexuoso, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hispidis subdispermis. *Kaempf. amoen. exot. p.* 838. *ic.*

Catianus. 40. D. leguminibus geminis linearibus erectiusculis. *Rheed. h. malab.* 3. *t.* 41.

biflorus. 41. D. caule perenni laevi, pedunculis bifloris, leguminibus erectis. *Pluckn. alm. t.* 213. *f.* 4.

868. GLYCINE. *Cal.* 2labiatus. *Corollae* carina apice vexillum reflectens.

* *foliis simplicibus.*

monophylla. 1. Gl. foliis cordatis, caule pubescente triquetro. *Mant. p.* 101. *Pluckn. amalth. t.* 454. *f.* 8.

** *foliis ternatis.*

subterranea. 2. Gl. foliis radicalibus, caulibus procumbentibus flexuosis, pedunculis bifloris. *Linn. dec.* 37. *t.* 17.

monoica. 3. Gl. foliis nudiusculis, caulibus pilosis, racemis pendulis, floribus fructiferis apetalis.

debilis. 21. Gl. foliolis ovalibus subtus pilosis, leguminibus subsolitariis linearibus polyspermis: stilo persistente erecto. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 34.

reticulata. 4. Gl. foliolis oblongo-lanceolatis pubescentibus subtus reticulato-venosis, racemis axillaribus subsessilibus, leguminibus oblongis compressis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 105.

villosa. 5. Gl. foliolis trilobis villosis, racemis axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 283.

phaseoloides. 6. Gl. foliis subtus villosis, racemis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 105.

7. Gl.

tomentosa. 7. Gl. foliis tomentosis, racemis breviſſimis axillaribus, leguminibus diſpermis. *Dill. h. Elth. t.* 26. *f.* 29. *β*?) Dolichos pubeſcens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 483. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 101.

comoſa. 8. Gl. foliis hirſutis, racemis lateralibus.

ſtriata. 9. Gl. volubilis, foliolis oblongis molliſſime incanis, racemis axillaribus foliorum longitudine, leguminibus hirſutiſſimis. *Suppl. p.* 326. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 76.

labialis. 10. Gl. volubilis, foliolis obovatis ſubincanis, floribus axillaribus congeſtis, corolla ſubbilabiata. *Suppl. p.* 325.

ſuaveolens. 11. Gl. fruticoſa erecta incana, foliolis ovatis acutis, floribus axillaribus ſolitariis, leguminibus diſpermis. *Suppl. p.* 326.

lucida. 12. Gl. volubilis, foliolis ovatis acuminatis integerrimis, racemis axillaribus glandulosis: pedicellis ternis, leguminibus inflatis diſpermis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 51.

roſea. 13. Gl. volubilis, foliolis cordato-ovatis acutis integerrimis, pedunculis trifloris, leguminibus compreſſis carinatis monoſpermis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 50.

caribaea. 14. Gl. foliolis rhombeis acutis, caulibus lignoſis glabris, racemis axillaribus elongatis multifloris patentibus. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 66.

numularia. 15. Gl. foliolis obtuſiſſimis, racemis floribus geminis, leguminibus ſeſſilibus ſuborbiculatis compreſſis *Mant. p.* 571.

triloba. 16. Gl. foliolis lobatis, caule proſtrato, pedunculis biſloris. *Mant. p.* 516. *Burm. ind. t.* 50. *f.* 1.

javanica. 17. Gl. caule villoſo, petiolis hirſutis, bracteis lanceolatis minutis.

bituminoſa. 18. Gl. floribus racemoſis, leguminibus tumidis villoſis. *Herm. par. Lugdb. p.* 493. *ic. Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 5.

**** foliis impari-pinnatis.*

Apios. 19. Gl. foliolis ſeptenis ovato-lanceolatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 9. *f.* 1.

frutescens. 20. Gl. caule perenni. *Hort. angl. t.* 15. *an diſtincti generis?*

CYLI-

CYLISTA. *Cor.* calice longior, perſiſtens. *Vexillum* baſi utrinque lobulo auctum. *Carina* apice baſique fiſſa. *Alae* utroque breviores.

villoſa. 1. CYLISTA. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 36. 512.

869. CLITORIA. *Cor.* ſupinata: vexillo maximo patente alas obumbrante.

* *foliis pinnatis.*

ternatea. 1. Cl. foliis glabris. *Rheed. h. malab.* 8. *t.* 38. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 149. *f.* 3.

multiflora. 2. Cl. foliolis oblongis ſubtus ſericeis, racemis axillaribus multifloris. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 106.

** *foliis ternatis.*

braſiliana. 3. Cl. calicibus ſolitariis campanulatis. *Breyn cent. t.* 32.

virginiana. 4. Cl. calicibus ſubternis campanulatis. *Dill. h. Elth. t.* 76. *f.* 87.

micrantha. 5. Cl. ſuffruticoſa volubilis, foliolis lanceolatis, pedunculis bifloris: flore altero ſterili. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 1. *t.* 1.

mariana. 6. Cl. calicibus cylindricis.

Galactia. 7. Cl. fruticoſa volubilis, ſpicis adſcendentibus: floribus pendulis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 6. *t.* 3.

aquilupienſis. 8. Cl. fruticoſa volubilis, foliolis ſubcordato-oblongis ſubperennantibus, ſpicis lateralibus folio longioribus patulis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 4. *t.* 2.

870. PISUM. *Calicis* laciniae 2 ſuperiores breviores. *Stilus* 3angulus, ſupra carinatus, pubeſcens. *Legumen* inflatum.

ſativum. 1. P. petiolis teretibus, ſtipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Blackw. herb. t.* 83. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 152. *f.* 2.

arvenſe. 2. P. petiolis tetraphyllis, ſtipulis crenatis, pedunculis unifloris. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 1. *f.* 4.

maritimum. 3. P. petiolis ſupra planiuſculis, caule angulato, ſtipulis ſagittatis, pedunculis multifloris. *Flor. dan. t.* 338.

Ochrus. 4. P. petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris. *Kniph. bot. orig. cent.* 10. *n.* 71. *Legumen alatum.*

871. OROBUS. *Cal.* baſi obtuſus: dentibus ſuperioribus profundioribus, brevioribus. *Stilus* filiformis.

lathyroides. 1. O. foliis conjugatis ſubſeſſilibus: ſtipulis dentatis. *Amm. ruth. t.* 7. *f.* 2.

hirſutus. 2. O. foliis conjugatis petiolatis: ſtipulis integris. *Buxb. cent.* 3. *t.* 41.

anguſtifolius. 3. O. foliis bijugis enſiformibus ſubſeſſilibus: ſtipulis ſubulatis, caule ſimplici. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 14. *f.* 5.

albus. 4. O. foliis bijugis enſiformibus petiolatis: ſtipulis ſimplicibus, caule ſimplici. *Suppl. p.* 327. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 39.

caneſcens. 5. O. foliis bijugis linearibus: ſtipulis ſemiſagittatis ſubulatis, caule ramoſo. *Suppl. p.* 327.

pyrenaicus. 6. O. foliis bijugis lanceolatis nervoſis: ſtipulis ſubſpinoſis, caule ramoſo. *Pluckn. phyt.* 210. *f.* 2.

tenuifolius. 7. O. foliis ſubtrijugis linearibus: ſtipulis ſemiſagittatis, caule inferne ramoſo quadrangulo, ſuperne alato. *Roth. Beytr.* 1. *p.* 78.

verſicolor. 8. O. foliis quadrijugis: ſtipulis ſemiſagittatis lanceolatis, pedunculis axillaribus angulatis. *Voy. ſuppl. pl. Ehr. ſel. t.* CVII. *f.* 2.

niger. 9. O. foliis ſexjugis ovato-oblongis, caule ramoſo. *Riv. tetrap. t.* 60. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 3.

ſilvaticus. 10. O. foliis ſubſeptemjugis, caule ramoſo hirſuto decumbente. *Mant. p.* 67. *Act. pariſ.* 1706. *t.* 90.

luteus. 11. O. foliis pinnatis ovato-oblongis: ſtipulis rotundato-lunatis dentatis. *Mant. p.* 442. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 4.

vernus. 12. O. foliis pinnatis ovatis: ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici. *Blackw. herb. t.* 208. *f.* 1. 2.

tuberoſus. 13. O. foliis pinnatis lanceolatis: ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici. *Flor. dan. t.* 781.

872.

872. LATHYRUS. *Cal.* laciniae 2 ſuperiores breviores. *Stilus* planus ſupra villoſus, ſuperne latior. *Legumen* (plurimis) aequale latum.

* *pedunculis unifloris.*

Aphaca. 1. L. cirrhis aphyllis, ſtipulis ſagittato-coronatis. *Mill. h. angl. t.* 43.

Niſſolia. 2. L. foliis ſimplicibus: ſtipulis ſubulatis. *Buxb. cent.* 3. *t.* 45. *f.* 1.

ſativus. 3. L. cirrhis diphyllis tetraphyllisque, leguminibus ovatis compreſſis dorſo bimarginatis. *Rivin. tetrap. t.* 47. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 152. *f.* 1. *Legumen aequale alatum.*

Cicera. 4. L. cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compreſſis dorſo canaliculatis.

ſetifolius. 5. L. cirrhis diphyllis, foliolis ſetaceo-linearibus.

amphicarpos. 6. L. pedunculis calice longioribus, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 23. *f.* 1.

inconſpicuus. 7. L. pedunculis calice brevioribus, cirrhis diphyllis ſimplicibus, foliolis lanceolatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 86.

ſphaericus. 8. L. pedunculis ariſtatis, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis, foliolis enſiformibus. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 39. *n.* 179.

angulatus. 9. L. pedunculis ariſtatis, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliolis linearibus. *Buxb. cent.* 3. *t.* 42. *f.* 2.

tomentoſus. 10. L. pedunculis ternis, paniculis axillaribus terminalibusque, cirrhis nullis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 135.

articulatus. 11. L. pedunculis ſubunifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis alternis. *Mill. h. angl. t.* 96. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 152. *f.* 1.

** *pedunculis bifloris.*

odoratus. 12. L. cirrhis diphyllis; foliolis ovato-oblongis, leguminibus hirſutis. *Curtis botan. magaz. t.* 60.

annuus. 13. L. cirrhis diphyllis: foliolis enſiformibus, ſtipulis bipartitis, leguminibus glabris. *Riv. tetrap. t.* 158.

tingitanus. 14. L. cirrhis diphyllis: foliolis alternis lanceolatis glabris, ſtipulis lunatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 46. *Legumen huic et articulato nodoſum.*

Clymenum. 15. L. cirrhis polyphyllis, ſtipulis dentatis. *Pluckn. phyt.* 114. *f.* 6.

**** pedunculis multifloris.*

hirſutus. 16. L. pedunculis ſubtrifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, leguminibus hirſutis: ſeminibus ſcabris. *Rivin. tetrap. t.* 41.

tuberoſus. 17. L. cirrhis diphyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Riv. tetrap. t.* 42.

pratenſis. 18. L. cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliolis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 527.

ſilveſtris. 19. L. cirrhis diphyllis: foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis. *Flor. dan. t.* 525.

latifolius. 20. L. cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Mill. ill. ic. Rivin. tetrap. t.* 40.

heterophyllus. 21. L. cirrhis diphyllis tetraphyllisque: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *β)* Lathyrus. *Hacq. it. carp. ſept.* 1. *p.* 32.

paluſtris. 22. L. cirrhis polyphyllis, ſtipulis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 399.

piſiformis. 23. L. cirrhis polyphyllis, ſtipulis ovatis foliolo latioribus. *Linn. dec.* 39. *t.* 20.

873. VICIA. *Stigma* latere inferiore transverſe barbatum. *Legumen* (multis) nodoſum.

** pedunculis elongatis.*

† multifloris.

piſiformis. 1. V. petiolis polyphyllis, foliolis ovatis; infimis ſeſſilibus. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 364. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

carolinia- na. 30. V. petiolis polyphyllis: foliolis lanceolatis mucronatis, ſtipulis ovato-lanceolatis. *Walt. flor. carol. p.* 182.

bohemica. 2. V. foliolis ellipticis: ſtipulis integris, floribus racemoſis. *Joh. Mayer boehm. Abh.* 3. 1787. *p.* 316. *t.* 11. a. b.

dumeto- rum. 3. V. foliolis reflexis ovatis mucronatis: ſtipulis ſubdentatis. *Rivin. tetrap. t.* 50.

ſilvatica. 4. V. foliolis ovalibus, ſtipulis denticulatis. *Flor. dan. t.* 277.

Cracca. 5. V. foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris, floribus imbricatis. *Flor. dan. t.* 804.

caneſcens. 6. V. foliis ſuperioribus ſubcirrhoſis: foliolis ovali-oblongis lanuginoſis, ſtipulis ſemiſagittatis integris. *la Billardiere ic. pl. ſyr. rar. dec.* 1. *p.* 17. *t.* 7.

tenuifolia. 7. V. foliolis linearibus trinerviis acuminatis, ſtipulis linearibus integris, floribus imbricatis, caule erecto. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 309.

onobrychoides. 8. V. foliolis linearibus ſtipulis inferne denticulatis, floribus diſtantibus.

Gerardi. 9. V. foliolis oblongis ſubpubeſcentibus, ſtipulis integris, caule erecto. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 229.

niſſoliana. 10. V. foliolis oblongis: ſtipulis integris, leguminibus villoſis ovato-oblongis.

bengha- lenſis. 11. V. foliolis integerrimis, ſtipulis integris, leguminibus erectiuſculis. *Herm. par. lugdb. p.* 625. *ic.*

multiflo- ra. 12. V. cirrhis polyphylliis: foliolis ovalibus pubeſcentibus, ſtipulis ſemiſagittatis integris, caule piloſo. *Leyſſ. flor. hal. p.* 725.

biennis. 13. V. petiolis ſulcatis ſubdodecaphyllis: foliolis lanceolatis glabris. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 11. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

†† *pedunculis ſubſexfloris.*

caſſubica. 14. V. foliolis denis ovatis acutis, ſtipulis integris. *Flor. dan. t.* 98.

††† *pedunculis unifloris.*

monantha. 15. V. pedunculis ariſtatis, foliolis lanceolatis obtuſis: ſtipulis bifidis. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 39.

exſtipulata. 16. V. petiolis polyphyllis: foliolis ſeſſilibus cordato-reniformibus. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 307. *t.* 33. *f.* 2.

ſepium. 17. V. leguminibus ſubquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decreſcentibus. *Flor. dan. t.* 699.

bithynica. 18. V. leguminibus solitariis erectis, foliolis quaternis ovali-lanceolatis, stipulis dentatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 147. *Huic et narbonensi legumen loculamentosum latum.*

Clymenum. 19. V. leguminibus subbinatis, foliolis retusis, stipulis notatis. *S. G. Gmel. it.* 3. *p.* 307. *t.* 33. *f.* 1. *an distincta satis a sativa?*

** *floribus axillaribus subsessilibus.*

sativa. 20. V. leguminibus subbinatis erectis, foliolis omnibus oblanceolatis retusis emarginatis, stipulis dentatis, seminibus compressis. *Flor. dan. t.* 522. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

angustifolia. 21. V. leguminibus subbinatis patentibus, foliis imis ovatis retusis emarginatis: superioribus linearibus apice integerrimis, stipulis dentatis, seminibus globosis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 310.

narbonensis. 22. V. leguminibus subternis erectis, foliolis senis subovatis, stipulis denticulatis. *Knorr del. hort.* 2. *t.* L. 1.

lathyroides. 23. V. leguminibus solitariis erectis glabris, foliolis subsenis: inferioribus obcordatis, stipulis semisagittatis integerrimis. *Flor. dan. t.* 58.

globosa. 24. V. leguminibus solitariis, foliolis ovatis, stipulis notatis quadrodentatis. *Retz. obs. bot.* 3. *p.* 39. *an distincta satis ab angustifolia?*

lutea. 25. V. leguminibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis, corollae vexillis glabris. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 21. *f.* 5.

hybrida. 26. V. leguminibus reflexis pilosis pentaspermis corollae vexillis villosis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 34. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

peregrina. 27. V. leguminibus pendulis glabris tetraspermis, foliolis linearibus emarginatis. *Pluckn. alm. t.* 233. *f.* 6.

Faba. 28. V. caule erecto, foliolis integerrimis: cirrhis nullis. *Blackw. herb. t.* 19.

ferratifolia. 29. V. caule erecto, foliolis serratis; cirrhis nullis. *Jacq. flor. austr.* 5. *app. t.* 8.

874. ERVUM. *Cal.* 5partitus, longitudine corollae.

monanthos. 1. E. pedunculis unifloris, corolla calicem superante.

2. E.

erectum. 2. E. pedunculis bifloris, caule erecto subdichotomo. *Walt. flor. carol. p.* 187.

solonien- 3. E. pedunculis subbifloris aristatis, petiolis acuminatis, fo-
se. liolis obtusis.

Lens. 4. E. pedunculis subbifloris, seminibus compressis convexis. *Flor. dan. t.* 95. *Legumen aequale latum.*

tetraspermum. 5. E. pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *Curt. flor. Lond. t.* 41.

volubile. 6. E. pedunculis multifloris: floribus geminatis, caule volubili. *Walt. flor. carol. p.* 187.

hirsutum. 7. E. pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. *Flor. dan. t.* 639.

Ervilia. 8. E. germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Blackw. herb. t.* 208. *f.* 3. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 4.

875. CICER. *Cal.* 5partitus, longitudine corollae: laciniis 4 superioribus vexillo incumbentibus. *Legumen* rhombeum, turgidum, 2spermum.

arietinum. 1. CICER. *S. G. Gmelin it.* 3. *t.* 3. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 2.

1319. LIPARIA. *Cal.* 5partitus: lacinia infima elongata. *Cor.* alae inferius 2lobae. *Staminis* majoris dentes 3breviores. *Legumen* ovatum.

sphaerica. 1. L. floribus capitatis, foliis lanceolatis nervosis glabris. *Mant. p.* 268.

graminifolia. 2. L. floribus capitatis: calicibus villosis, foliis lincaribus acutis alternis sessilibus. *Mant. p.* 268.

umbellata. 3. L. floribus umbellatis, foliis lanceolatis laevibus. *Nonne eadem cum Borbonia laevigata?*

villosa. 4. L. floribus fasciculatis, foliis ovatis villoso-tomentosis. *Mant. p.* 438. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 474. Borbonia tomentosa. *Seb. mus.* 1. *t.* 24. *f.* 1. 2.

sericea. 5. L. floribus subspicatis, foliis ovatis villosis tomentosis.

876. CYTISUS. *Cal.* 2labiatus: $\frac{2}{3}$. *Legumen* basi attenuatum (plurimis) aequale, latum.

* *foliis compositis.*

glaber. 1. C. floribus solitariis lateralibus subsessilibus pendulis, foliis ternatis. *Suppl. p.* 328.

hirsutus. 2. C. pedunculis simplicibus lateralibus, calicibus hirsutis trifidis obtusis ventricoso-oblongis. *Jacq. obs. bot. t.* 96.

purpureus. 3. C. floribus pedunculatis solitariis, foliis glabris, caulibus decumbentibus frutescentibus, leguminibus superne falcatis. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 48.

lupinus. 4. C. floribus subbinatis pedunculatis, foliis villosis, caulibus decumbentibus frutescentibus. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 20. β?) Cytisus glabrescens. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 269.

argenteus. 5. C. floribus subbinatis subsessilibus, foliis tomentosis: stipulis minutis, caulibus decumbentibus. *Lob. ic.* 2. *p.* 41.

austriacus. 6. C. floribus umbellatis terminalibus, caulibus erectis, foliolis lanceolatis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 21.

capitatus. 7. C. floribus umbellatis terminalibus, ramis erectis, foliolis ovatis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 33.

prolifer. 8. C. umbellis axillaribus sessilibus proliferis, foliis ternatis petiolatis sericeis: foliolis lanceolatis, bracteis filiformibus. *Suppl. p.* 328.

Cajan. 9. C. racemis axillaribus erectis, foliolis sublanceolatis tomentosis: intermedio longius petiolato. *Rheed. h. malab.* 6. *t.* 13. β) *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 119. *Legumen loculamentosum simplex.*

sessilifolius. 10. C. racemis erectis, calicibus bractea simplici, foliis floralibus sessilibus.

Wolgericus. 11. C. canus, racemis simplicibus erectis: floribus secundis, foliis pinnatis; foliolis subrotundis, stipulis subulatis. *Suppl. p.* 327. *Pall. it.* 3. *t.* G. 9. *f.* 3. *flor. ross. t.* 47.

foliolosus. 17. C. racemis terminalibus erectis, calicibus villosis: laciniis falcatis, foliolis obovato-oblongis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 49.

nigricans. 12. C. racemis terminalibus erectis, calicibus villosis, foliolis ellipticis, *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 387. *Stamina monadelphia.*

13. C.

Labur-num. 13. C. racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 306. *Stamina monadelphia.* *β*) Cytisus alpinus. *du Roi harbk. Baumz.* 1. *p.* 208. *Legumen nodosum.*

violaceus. 14. C. floribus spicatis, foliis ternatis, capsulis linearibus, leguminibus villosis compressis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 760. *t.* 306.

** *foliis simplicibus.*

graecus. 15. C. foliis lanceolato-linearibus, ramis angulatis.

tener. 16. C. foliis lanceolatis, ramis teretibus. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 40. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 88.

1417. MÜLLERA. *Pericarpium* elongatum, carnosum, moniliforme: *globulis* 1spermis.

monili-formis. 1. Müllera. *Suppl. p.* 329. *Merian. surin. t.* 35.

878. GEOFFROYA. *Cal.* semiquinquefidus. *Drupa* ovata: *Nucleus* compressus.

spinosa. 1. G. spinosa, foliolis oblongis obtusis. *Jacq. stirp. am. pict. t.* 262. *f.* 58.

inermis. 2. G. inermis, foliolis lanceolatis. *Wright act. angl.* 1777. *p.* 512. *t.* X*.

879. ROBINIA. *Cal.* 4fidus. *Legumen* elongatum, (multis) aequale, cylindricum.

Pseud-Acacia. 1. R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, stipulis spinosis. *Seb. mus.* 1. *t.* 15. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 2. *Legumen nodosum.*

violacea. 2. R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 61.

sepium. 3. R. racemis pedicellis bifloris, foliis impari-pinnatis: pinnis ovatis acuminatis, caule inermi. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 106.

hiſpida. 4. R. racemis axillaribus, foliis impari-pinnatis, caule inermi hiſpido. *Mant. p.* 101. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 3. *Mill. h. angl. t.* 244.

Haloden-dron. 5. R. racemis axillaribus triſloris, petiolis ſpineſcentibus, foliis conjugatis petiolatis: foliis cuneiformibus ſpinoſis cuſpidatis. *Suppl. p.* 330. *Pall. it.* 2. *t.* W. *Flor. roſſ. t.* 46.

mitis. 6. R. racemis pedicellis ternis, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Pluckn. t.* 310. *f.* 3.

Panacoco. 7. R. panicula ſpicata terminali, foliis impari-pinnatis tomentoſis: ſtipulis ſubrotundis. *Aubl. pl. guj. p.* 768. *t.* 307. β?) Robinia coccinea.

Nica. 8. R. ſpica axillari, foliis impari pinnatis, ramis ſcandentibus. *Aubl. pl. guj. p.* 771. *t.* 308.

veſicaria. 9. R. pedunculis axillaribus ſolitariis quinqueſloris, foliis praeter unicum ſimplex ovatum ſine impari pinnatis, leguminibus inflatis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 107.

Caragana. 10. R. pedunculis ſimplicibus, foliis abrupte pinnatis: petiolis inermibus. *Pallas flor. roſſ. t.* 42.

ſpinoſa. 11. R. pedunculis ſimplicibus, foliis abrupte pinnatis: ſtipulis petiolisque ſpineſcentibus. *Mant. p.* 269. *Pallas flor. roſſ. t.* 44.

fruteſcens. 12. R. pedunculis ſimplicibus, foliis quaternatis ſubpetiolatis terminatis ſpina inermi. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 8. *Pallas flor. roſſ. t.* 43.

pygmaea. 13. R. pedunculis ſimplicibus, foliis quaternatis ſeſſilibus. *Pallas flor. roſſ. t.* 45.

880. COLUTEA. *Cal.* 5fidus. *Legumen* aequale latum, plurimis. *Capſula* inflata.

* *caule arboreo.*

arboreſcens. 1. C. foliolis obcordato-oblongis: ſtipulis lanceolatis, racemis hirſutis, leguminibus apice clauſis. *Regn. bot. t.* 224. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 4. β) *Commel. rar. t.* 11.

orientalis. 2. C. foliolis obcordatis rotundatis ſubcarnoſis: ſtipulis minimis denticulatis, racemis glabris, leguminibus apice ſuperne hiantibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 305.

** *cau-*

*** caule fruticoso.*

humilis. 3. C. foliolis obcordatis, carinae apice truncato. *Scopol. Sel. inf.* 2. *p.* 23. *t.* 12.

frutescens. 4. C. foliolis ovato-oblongis, caule inermi. *Mill. h. angl. t.* 99.

**** caule herbaceo.*

peren- nans. 5. C. foliolis ovalibus, racemis approximatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 3.

fistulosa. 6. C. foliolis ovatis complicatis subtus pubescentibus. *Retz. obs. bot.* 3. *p.* 40.

aeschynomenoides. 7. C. foliolis glabris lanceolatis obtusis e nervo acuminatis. *Scopol. del. inf.* 3. *p.* 22. *t.* 12.

herbacea. 8. C. foliolis linearibus glabris. *Murray comm. goett.* 1774. *p.* 40. *t.* 7. *f.* 12. 13. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 4.

DIPHYSA. *Cal.* campanulatus, semiquinquefidus $\frac{2}{3}$. *Legumen* lineare, 1loculare, polyspermum utrinque longitudinaliter vesica membranacea inflata auctum.

carthagenensis. 1. DIPHYSA. *Jacq. stirp. amer. p.* 208. *t.* 180. *f.* 51.

882. GLYCYRRHIZA. *Cal.* 2labiatus: $\frac{3}{1}$. *Legumen* ovatum, compressum.

echinata. 1. Gl. leguminibus echinatis, foliis stipulatis: foliolo impari sessili. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 95. *Gaertn. de fruct. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 6.

hirsuta. 2. Gl. leguminibus hirsutis, foliolo impari petiolato.

glabra. 3. Gl. leguminibus glabris nodosis, stipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Regn. bot.*

asperrima. 4. Gl. foliolis ellipticis cuspidatis, caule hispido scabro. *Suppl. p.* 330. *Pallas it.* 1. *t.* I. *f.* 3. *t.* G. g. *f.* 1. 2.

883. CORONILLA. *Cal.* 2labiatus: $\frac{2}{3}$: dentibus superioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* aliis, aliis *Pericarpium* articulatum.

* *Fruticosae.*

Emerus. 1. C. pedunculis subtrifloris, corollarum unguibus calice triplo longioribus, caule angulato. *Mill. h. angl. t.* 132. *f.* 1. *β) Mill. h. angl. t.* 132. *f.* 2. *Legumen angustum loculamentosum.*

juncea. 2. C. foliis quinatis ternatisque lineari-lanceolatis subcarnosis obtusis. *Barr. pl. rar. ic.* 133.

glauca. 3. C. foliolis septenis obtusissimis: stipulis lanceolatis. *Mant. p.* 444. *Mill. ic. h. angl. t.* 106.

valentina. 4. C. foliolis subnovenis: stipulis suborbiculatis. *Rivin. tetrap.* 206. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 1.

coronata. 5. C. foliolis novenis obovatis: internis cauli approximatis, stipula oppositifolia bipartita. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 95.

argentea. 6. C. foliis undenis sericeis: extimo majore.

minima. 7. C. suffruticosa procumbens, foliolis novenis ovatis: stipula oppositifolia emarginata, leguminibus angulatis nodosis. *Mant. p.* 444. *Jacq. fl. austr.* 3. *t.* 271.

** *Herbaceae.*

securidaca. 8. C. leguminibus falcato-gladiatis, foliolis plurimis. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 153. *f.* 3. *Mill. h. angl. t.* 232. *Capsula composita.*

varia. 9. C. leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. *S. G. Gmelin. it.* 1. *t.* 21. *Mill. h. angl. t.* 101.

cretica. 10. C. leguminibus quinis erectis teretibus articulatis, foliolis undenis. *Mant. p.* 445. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 25.

scandens. 11. C. caule scandente flaccido. *Plum. ic.* 107. *f.* 3.

884. ORNITHOPUS. *Pericarpium* articulatum teres arcuatum.

perpusillus. 1. O. foliis pinnatis, leguminibus incurvatis, bractea pinnata duplo majoribus. *Flor. dan. t.* 730.

intermedius. 2. O. caulibus repentibus longissimis, foliis pinnatis, bractea pinnata leguminibus incurvatis majore. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 319.

compressus. 3. O. foliis pinnatis, leguminibus recurvatis compressis rugosis, bractea pinnata.

scorpioides. 4. O. foliis ternatis subsessilibus: impari maximo. *Rivin. tetrap. t.* 210. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 3.

tetraphyllus. 5. O. foliis quaternis, floribus solitariis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 116. *f.* 3.

repandus. 6. O. foliis ternatis quinatisque: impari majore, stipulis subreniformibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 215.

885. HIPPOCREPIS. *Pericarpium* multiloculare compressum, altera sutura pluries emarginatum, curvum.

unisiliquosa. 1. H. leguminibus sessilibus solitariis rectis. *Riv. tetrap. t.* 98. *Mill. h. angl. t.* 278. *f.* 1.

multisiliquosa. 2. H. leguminibus pedunculatis confertis circularibus: margine altero lobatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 300. *Mill. h. angl. t.* 278. *f.* 2.

comosa. 3. H. leguminibus pedunculatis confertis arcuatis: margine exteriore repandis. *Mant. p.* 445. *Riv. tetrap. t.* 97.

balearica. 4. H. leguminibus pedunculatis confertis subarcuatis lanceolato-oblongis; margine exteriori repandis. *Jacq. misc.* 2. *p.* 305. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 5.

PETAGNANA. *Legumen* articulis distinctis 1spermis stilo connexis.

sensitiva. 1. PETAGNANA. *Ait. hort. Kew.* 1. *p.* 496. 512. *t.* 13.

886. SCORPIURUS. *Pericarpium* articulatum, revolutum, teres.

vermiculata. 1. Sc. pedunculis unifloris, leguminibus tectis undique squamis obtusis. *Rivin. tetrap. t.* 210. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 4.

muricata. 2. Sc. pedunculis bifloris, leguminibus extrorsum obtuse aculeatis. *Morif. hist. pl.* 2. *t.* 11. *f.* IV.

sulcata. 3. Sc. pedunculis subbifloris, leguminibus extrorsum spinis distinctis acutis. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 4. *Mill. h. angl. t.* 230.

subvillosa. 4. Sc. pedunculis subquadrifloris, leguminibus extrorsum spinis confertis acutis. *Morif. hist. pl.* 2. *t.* 11. *f.* 11.

888. AESCHYNOMENE. *Cal.* 2labiatus. *Legumen* articulis truncatis, 1-spermis.

* *caule arboreo.*

arborea. 1. Ae. caule laevi, leguminum articulis semicordatis glabris.

grandiflora. 2. Ae. floribus maximis, leguminibus filiformibus. *Rheed. h. malab.* 1. *t.* 51.

coccinea. 3. Ae. foliis pinnatis: foliolis numerosis linearibus obtusis pulverulentis, leguminibus compressis aequalibus. *Suppl. p.* 330.

** *caule fruticoso.*

sensitiva. 4. Ae. caule glabro, foliolis obtusis: stipulis acutis deciduis, leguminibus laevibus obtusis. *Plum. ic.* 149. *f.* 2.

*** *caule herbaceo.*

cannabina. 5. Ae. foliolis obtusis acuminatis, pedunculis solitariis, leguminibus compressis laevibus. *Retz. obs. bot.* 5. *p.* 26.

aspera. 6. Ae. caule scabro, leguminum articulis medio scabris. *Breyn. cent.* 51. *t.* 52.

americana. 7. Ae. caule hirsutiusculo, leguminum articulis semicordatis, foliolis falcatis, bracteis ciliatis. *Act. Petrop.* 1763. *t.* 12. *Gaertn. de fr. et sem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 6.

8. Ae.

indica. 8. Ae. caule laevi, leguminibus laevibus hinc torosis obtusis, foliolis obtusis. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 18.

Sesban. 9. Ae. caule laevi, leguminibus cylindricis aequalibus, foliolis obtusis. *Burm. zeyl. t.* 41.

pumila. 10. Ae. caule laevi, leguminibus hinc serratis medio scabris, foliolis acuminatis. *Rheed h. malab.* 9. *t.* 20.

Burmanni. 11. Ae. leguminibus aequalibus laevibus, corollis hirsutis. *Burm. amer. p.* 115. *t.* 125. *f.* 1.

herbacea. 12. Ae. foliis subrotundis, leguminibus angustissimis compressis. *Rheed. h. mal.* 9. *t.* 20.

STILOSANTHES. *Cal.* tubulosus, longissimus, corollifer. *Germen* infra corollam. *Legumen* 2articulatum, hamatum.

procumbens. 1. St. foliis ternatis acuminatis lineatis glabris, spicis multifloris, caule procumbente. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 494. Hedysarum hamatum. *Burm. zeyl. t.* 106. *f.* 2. *Swarts nov. act. suec.* 1789. 4. *n.* 4. *t.* 11. *f.* 1.

viscosa. 2. St. foliis ternatis, ovatis ciliatis hirsutis, spicis paucifloris, caule erecto. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 119. *f.* 1. *Swarts nov. act. suec.* 1789. 4. *n.* 4. *t.* 11. *f.* 2.

elatior. 3. St. foliis glabris lanceolato-acutis, spicis paucifloris: vaginis foliolisque ciliatis caule erecto. *Swarts n. act. suec.* 1789. 4. *n.* 4. *t.* 11. *f.* 3. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 562. Trifolium biflorum.

gujanensis. 4. St. foliis lanceolato-acuminatis: petiolis longioribus, spicis multifloris villosis caule erecto hirsuto. *Aubl. guj. t.* 309.

887. HEDYSARUM. *Cor.* carina transversim obtusa. *Legumen* articulis 1spermis.

* *foliis simplicibus.*

gramineum. 1. H. foliis lineari-lanceolatis: stipulis scariosis, racemis nudis: pedicellis bifloris, calicum dentibus barbatis. *Koenig apud Retz. obs. bot.* 5. *p.* 26.

glumaceum. 2. H. foliis lanceolatis, stipulis calicibusque scariosis, leguminibus rugosis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 136.

3. H.

bupleuri-folium. 3. H. foliis lanceolatis acutis: stipulis scariosis, caule inermi. *Pluckn. amalth. t.* 443. *f.* 4.

hirsutum. 4. H. foliis lanceolatis nervosis hirsutis subtus incanis: nervis ferrugineis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 774.

Alhagi. 5. H. foliis lanceolatis obtusis, caule fruticoso spinoso. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 29.

vaginale. 6. H. foliis cordato-lanceolatis: petiolis simplicibus, stipulis vaginalibus. *Burm. zeyl. t.* 49. *f.* 1.

imbricatum. 7. H. foliis cordatis sessilibus stipulatis: superioribus imbricatis floriferis. *Suppl. p.* 331.

styracifolium. 8. H. foliis cordato-orbiculatis retusis supra glabris subtus tomentosis.

moniliferum. 9. H. foliis orbiculatis, leguminibus moniliformibus globosoarticulatis. *Mant. p.* 102. *Burm. ind. t.* 52. *f.* 3.

reniforme. 10. H. foliis reniformibus, caule tereti. *Burm. ind. t.* 52. *f.* 1.

sororium. 11. H. foliis reniformibus emarginatis, caule triquetro. *Mant. p.* 270. *Burm. ind. t.* 50. *f.* 2.

vespertilionis. 12. H. foliis lunatis: lobis retrofalcatis, racemo terminali, leguminibus retrofractis calici inflato inclusis. *Suppl. p.* 331.

gangeticum. 13. H. foliis ovatis acutis stipulatis. *Burm. zeyl. t.* 49. *f.* 2.

maculatum. 14. H. foliis ovatis obtusis. *Dill. h. Elth. t.* 141. *f.* 161.

latebrosum. 15. H. foliis ovatis serrulatis, leguminibus occultatis bractea fornicata supina scariosa. *Mant. p.* 270. *Pet. gaz. t.* 30. *f.* 11.

numulariifolium. 16. H. foliis cuneiformibus. *Petiv. gaz. t.* 26. *f.* 4.

triquetrum. 17. H. foliis oblongis: petiolis alatis, ramis triquetris. *Burm. ind. t.* 49. *f.* 2.

strobiliferum. 18. H. bracteis strobilorum inflatis cordatis obtusis. *Flor. zeyl. t.* 3.

** *foliis compositis.*

† *binatis.*

diphyllum. 19. H. foliis petiolatis, bracteis geminis ovatis acuminatis sessilibus. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 82. *β) Burm. zeyl. t.* 50. *f.* 1.

†† *ter-*

†† *ternatis.*

spartium, 20. H. foliis ternatis simplicibusque subtomentosis, caule dichotomo, floribus geminis, leguminibus articulatis hispidis. *Burm. ind. t.* 51. *f.* 2.

canadense. 21. H. foliis ternatis simplicibusque, caule laevi, floribus racemosis. *Morif. hist. pl.* 2. *t.* 11. *f.* 9. *Pericarpium articulatum.*

pulchellum. 22. H. bracteis geminis conjugatis orbiculatis lineatis. *Burm. ind. t.* 52.

umbellatum. 23. H. pedunculis umbelliferis, caule fruticoso. *Rumpf. amb.* 4. *t.* 52.

heterocarpon. 24. H. floribus paniculato-spicatis, leguminibus articulatis: infimo monospermo, stipulis setaceis. *Burm. zeyl. t.* 53. *f.* 1.

retroflexum. 25. H. racemis erectis, leguminibus pendulis multiarticulatis. *Mant. p.* 103.

barbatum. 26. H. floribus terminalibus subspicatis, leguminibus inflexis, calicibus hirsutis.

lagopodioides. 27. H. racemis oblongis, leguminibus inflexis, calicibus hirsutis. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 2.

nudiflorum. 28. H. scapo florifero nudo, caule folioso angulato.

biarticulatum. 29. H. caule suffruticoso, leguminibus biarticulatis. *Burm. zeyl. t.* 50. *f.* 2.

viscidum. 30. H. caule ramisque hispidis, leguminibus membranaceis laevibus integris. *Burm. zeyl. t.* 84. *f.* 1.

lineatum. 31. H. foliolis oblongis lineatis, racemis axillaribus pendulis. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 1.

Scorpiurus. 32. H. foliolis oblongis subtus hirsutis, caulibus procumbentibus trigonis, racemis axillaribus, leguminibus teretiusculis erectis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 107.

racemosum. 33. H. foliolis oblongis stipulatis glabris, caule frutescente erecto, racemis axillaribus erectis longissimis, leguminibus glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 285.

caudatum. 34. H. foliolis oblongis glabris, caule herbaceo, panicula terminali, leguminibus tomentosis. *Thunb. flor. jap. p.* 286.

striatum. 35. H. foliolis oblongis stipulatis, caule herbaceo, floribus axillaribus solitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 289.

tortuoſum. 36. H. foliis ovali-oblongis obtuſis glabriuſculis, racemis erectis axillaribus, leguminibus tortuoſis compreſſis pubeſcentibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 184. *t.* 116. *f.* 2.

volubile. 37. H. foliolis ovato-oblongis, caule volubili. *Dill. h. Elth. t.* 143. *f.* 170.

violaceum. 38. H. foliolis ovatis, floribus geminatis, leguminibus nudis venoſis, articulatis rhombeis.

microphyllum. 39. H. foliolis ovatis villoſis, caule fruteſcente erecto glabro, floribus terminalibus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 284.

ſpirale. 40. H. foliolis ovatis obtuſis glabris, caule ramoſiſſimo; ramis diffuſis, racemis laxis divaricatis, leguminibus ſpirali-tortuoſis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 107.

ſupinum. 41. H. foliolis ovatis obtuſiuſculis ſubtus incano-villoſis, caule ramoſo procumbente, racemis ſimplicibus erectis terminalibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 185. *t.* 118. *f.* 2.

canum. 42. H. foliolis ovatis acuminatis ſubtus incanis, caule tereti ramoſo erecto, racemis terminalibus erectis, leguminibus declinatis hirtis. *Plum. ic.* 149. *f.* 1.

piloſum. 43. H. foliolis ovatis acuminatis, caule decumbente hirto, racemis axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 290.

trigonum. 44. H. foliolis ovatis acutis hirtis, caule adſcendente triquetro, racemis longiſſimis axillaribus, leguminibus tortuoſis inflexis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 107.

triangulare. 45. H. foliolis ovatis acutis lineatis, umbellis axillaribus, ramis triquetris flexuoſis. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 40. *an diſtinctum ſatis a trigono.*

fruteſcens. 46. H. foliolis ſubovatis ſubtus villoſis, caule fruteſcente. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 89.

hirtum. 47. H. foliolis ovalibus, caule fruticoſo, ſpicis oblongis, fructibus monoſpermis calicibusque hirſutis.

marilandicum. 48. H. foliolis ſubrotundis, caule fruteſcente ramoſiſſimo, leguminibus articulatis laevibus. *Dill. h. Elth. t.* 144. *f.* 171.

adſcendens. 49. H. foliolis ſubrotundis ſubtus pubeſcentibus, caule tereti, ramis declinatis adſcendentibus piloſis, racemis ſimplicibus erectis axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 106.

axillare. 50. H. foliolis rhombeo-ſubrotundis: petiolis erectis, ſcapis axillaribus folio longioribus, caule repente radicante. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 107.

51. H.

virgatum. 51. H. foliolis cum acumine obtuſis, caule angulato piloſo, pedunculis capillaribus trifloris. *Thunb. flor. jap. p.* 290.

viridiflorum. 52. H. foliolis acutiuſculis, caule erecto, racemis longiſſimis erectis. *Pluckn. alm. t.* 308. *f.* 5.

junceum. 53. H. foliolis lanceolatis, pedunculis ſubumbellatis lateralibus, leguminibus uniarticulatis rhombeis. *Linn. dec.* 1. *t.* 4.

paniculatum. 54. H. foliolis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis, leguminibus rhombeis. *Pluckn. mant. t.* 432. *f.* 6.

repens. 55. H. foliolis obcordatis, caulibus procumbentibus, racemis lateralibus. *Dill. h. Elth. t.* 142. *f.* 169.

triflorum. 56. H. foliolis obcordatis, caulibus procumbentibus, pedunculis unifloris terminalibus. *Swarts obſ. bot. t.* 6. *f.* 1.

diſtortum. 57. H. caule fruticoſo, leguminibus tortuoſis. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 184. *t.* 116. *f.* 2.

ſericeum. 58. H. foliolis emarginatis villoſis, caule fruteſcente erecto, floribus axillaribus ſolitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 287.

tomentoſum. 59. H. foliis ſubtus tomentoſis, caule angulato tomentoſo, racemis axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 286.

caneſcens. 60. H. foliis ſubtus ſcabris, caule hiſpido, floribus racemoſis conjugatis.

gyrans. 61. H. foliolis lateralibus ſpontaneo motu gyratorio huc illuc agitatis. *Suppl. p.* 332.

lappaceum. 62. H. foliolis obcordatis, floribus axillaribus ſubſolitariis, leguminibus biarticulatis, ſetis hamoſis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 136.

racemiferum. 63. H. foliolis ovatis, floribus racemoſis conjugatis. *Burm. amer. p.* 140. *t.* 149. *f.* 1.

gujanenſe. 64. H. fruteſcens, foliis ſubtus incanis, floribus congeſtis racemoſis, leguminibus hirſutis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 774.

grandiflorum. 84. H. foliolis ovalibus venoſis utrinque laevibus, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis. *Walt. flor. carol. p.* 185.

††† *foliis pinnatis.*

argentatum. 65. H. foliis ſubtus ſericeis lucidis, leguminibus articulatis, ſcapo aphyllo. *Suppl. p.* 333. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 500. Aſtragalus grandiflorus. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 31.

frutico-ſum. 66. H. foliolis alternis oblongis mollibus: ſtipulis ſubulatis, ramis axillaribus, leguminum articulis reticulatis. *Suppl. p.* 333. *Pallas it.* 3. *t.* F.

cornutum. 67. H. foliolis linearibus, leguminibus monoſpermis laevibus, caule fruticoſo, pedunculis perſiſtenti-ſpinoſis. *Tournef. it.* 2. *p.* 108. *ic.*

incanum. 68. H. foliis exſtipulatis ſubtus inganis, caule erecto, floribus racemoſis cernuis. *Thunb. flor. jap. p.* 289.

Criſta galli. 69. H. leguminibus monoſpermis aculeatis: criſtae laciniis lanceolatis denticulatis. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 5. *Capſula duplicata.*

Caput galli. 70. H. leguminibus monoſpermis: criſtae dentibus ſubulatis, alis breviſſimis, caule diffuſo. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 44. *Capſula duplicata.*

ſaxatile. 71. H. legumibus monoſpermis ſulcatis muticis, corollarum alis breviſſimis, ſcapis ſubradicatis.

Onobrychis. 72. H. leguminibus monoſpermis aculeatis, corollarum alis calicem aequantibus, caule elongato. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 38. *Capſ. potius duplicata: capſulis intus nidulantibus.*

pumilum. 73. H. leguminibus monoſpermis, caule ſuffruticoſo, corollarum alis vexillo, vexilloque carina brevioribus. *Mant. p.* 448.

crinitum. 74. H. leguminibus inflexis, racemis longis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 102.

alpinum. 75. H. leguminibus articulatis glabris pendulis, caule erecto. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 10. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 5.

virginicum. 76. H. leguminibus articulatis glabris pedunculatis erectis, caule fruticoſo.

humile. 77. H. leguminibus articulatis aſperis, corollae alis obſoletis, ſpicis hirſutis, caulibus depreſſis. *Mant. p.* 449.

ſpinoſiſſimum. 78. H. leguminibus articulatis aculeatis tomentoſis, caule diffuſo. *Pluckn. phyt.* 50. *f.* 2.

flexuoſum. 79. H. leguminibus articulatis aculeatis flexuoſis, caule diffuſo. *Riv. tetr. t.* 213.

coronarium. 80. H. leguminibus articulatis dentatis nudis rectis, caule diffuſo. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 9. *t.* 159. *f.* 5. *Kniph. bot. orig. cent.* 3. *n.* 45. *Pericarpium hinc et flexuoſo articulatum.*

81. H.

pictum. 81. H. leguminibus articulatim huc illuc flexuosis rugosis, caule erecto subsimpliciſſimo. *Jacq. coll.* 2. *p.* 262.

obscurum. 82. H. stipulis vaginalibus, caule erecto flexuoso, floribus pendulis. *Mant. p.* 447. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 168.

**** incertae tribus.*

immaculatum. 83. H. leguminibus conjugatis rectis exterius lobatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 214.

889. INDIGOFERA. *Cal.* patens. *Cor.* carina utrinque calcari subulato patulo. *Legumen* lineare. ✓

** foliis simplicibus.*

linifolia. 34. I. foliis linearibus canis, leguminibus globosis. *Suppl. p.* 331. Hedysarum linifolium.

sericea. 1. I. foliis lanceolatis sericeis, spicis sessilibus, caule fruticoso. *Mant. p.* 271.

ovata. 2. I. foliis ovatis, caule herbaceo. *Suppl. p.* 335.

oblongifolia. 3. I. foliis oblongis sericeis, caule fruticoso, racemis axillaribus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 137.

*** foliis ternatis.*

trifoliata. 4. I. floribus sessilibus lateralibus.

mexicana. 5. I. panicula ramosa spicata, caule fruticoso. *Suppl. p.* 335.

spinosa. 6. I. foliis obovatis, pedunculis spinescentibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 137.

psoraloides. 7. I. foliis lanceolatis, racemis longissimis, leguminibus cernuis. *Sp. pl. p.* 1043. Cytisus psoraloides. *Rivin. tetrap.* 71. *f.* 135.

candicans. 32. I. foliis lanceolato-linearibus subtus sericeis, spicis pedunculatis pauciflоris, leguminibus cylindricis rectis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 67.

amoena. 33. I. foliis ovalibus piloſiuſculis, ramis teretibus, spicis pedunculatis, stipulis setaceis, calicibus laxis, caule frutescente. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 68.

sarmentosa. 8. I. foliis ovatis subsessilibus, pedunculis axillaribus subbiflоris, caule prostrato filiformi. *Suppl. p.* 334.

trita. 9. I. foliis ovatis acutis, racemis brevibus, caule erecto. *Suppl. p.* 335.

denudata. 10. I. foliis ovatis glabris, racemis pedunculatis folio longioribus, caule fruticoso erecto. *Suppl. p.* 334.

procumbens. 11. I. foliis obovatis, caule herbaceo proſtrato, ſpicis pedunculatis. *Mant. p.* 271.

**** foliis quinatis.*

filiformis. 12. I. foliis oblongis villoſis, floribus ſpicatis pedunculatis, pedunculis ramisque filiformibus, caule erecto. *Suppl. p.* 334.

digitata. 13. I. foliis digitatis, racemis pedunculatis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 335.

***** foliis pinnatis.*

cytiſoides. 14. I. foliis quinato-pinnatis ternatisque, racemis axillaribus, caule fruticoſo. *Sp. pl. p.* 1076. Pſoralea cytiſoides. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 84.

glabra. 15. I. foliis pinnatis ternatisque obovatis, racemis breviſſimis, leguminibus horizontalibus teretibus. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 67.

fragrans. 16. I. foliis quinato-pinnatis piloſis: foliolis ovatis; extimo majore; leguminibus tetragonis. *Koenig apud Retz. obſ. bot.* 4. *p.* 29.

pentaphylla. 17. I. foliolis ovalibus quinis, caulibus proſtratis, pedunculis bifloris.

ſemitrijuga. 18. I. foliolis obcordatis quinis, leguminibus ſubſpicatis toruloſis, pendulis caule proſtrato ſuffruticoſo. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 137.

enneaphylla. 19. I. foliolis cuneatis ſeptenis, caulibus proſtratis, ſpicis lateralibus. *Mant. p.* 102. 272. 571. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 496. Hedyſarum proſtratum. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 1.

ſpicata. 20. I. foliolis obovatis, floribus ſpicatis, leguminibus teretibus toruloſis pendulis, caule decumbente. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 138.

tinctoria. 21. I. foliolis obovatis, racemis brevibus, leguminibus rectis, caule ſuffruticoſo. *Mill. h. angl. t.* 34. *Blackw. herb. t.* 596.

frutescens. 22. I. foliolis ovatis glabris, racemis axillaribus pedunculatis, caule fruticoſo erecto. *Suppl. p.* 334.

23. I.

disperma. 23. I. foliolis ovalibus, racemis elongatis, leguminibus dispermis. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 232. *Trew Ehret. t.* 55.

stricta. 24. I. foliolis oblongis glabris, racemis axillaribus vix pedunculatis, caule fruticoso erecto. *Suppl. p.* 334.

Anil. 25. I. foliolis lanceolatis, racemis brevibus, caule suffruticoso. *Mant. p.* 272. *Sloan. jam.* 2. *t.* 176. *f.* 3.

angustifolia. 26. I. foliolis linearibus, racemis elongatis, caule fruticoso. *Mant. p.* 272.

hirsuta. 27. I. hirsuta, caule erecto, floribus spicatis, leguminibus pendulis lanatis. *Rheed. h. malab.* 1. *t.* 30.

dendroides. 28. I. foliolis oblongis, racemis axillaribus multifloris, caule erecto herbaceo. *Jacq. coll.* 2. *p.* 357. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 70.

hendecaphylla. 29. I. foliolis obovatis obtusis integerrimis, spicis axillaribus solitariis pedunculatis, caulibus prostratis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 359. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 71.

carolinia-na. 30. I. leguminibus gibbis, racemis axillaribus folio longioribus, radice perenni. *Walt. flor. carol. p.* 187.

argentea. 31. I. foliis simplicibus ternatis pinnatisque sericeis, leguminibus torulosis pendulis. *Mant. p.* 273.

890. GALEGA. *Cal.* dentibus subulatis, subaequalibus. *Legumen* striis obliquis, seminibus interjectis.

tinctoria. 1. G. leguminibus strictis pendulis, spicis lateralibus pedunculatis, foliolis emarginatis subtus villosis.

caribaea. 2. G. leguminibus strictis glabris pendulis racemosis, foliolis glabris mucronatis, caule fruticoso. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 193.

cinerea. 3. G. leguminibus strictis patentibus pedunculatis, racemis oppositifoliis, foliolis mucronatis subtus villosis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 72.

pallens. 4. G. leguminibus strictis patentibus ciliatis, stipulis subulatis, foliolis oblongis acutis subtus pubescentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 70.

officinalis. 5. G. leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. *Mill. h. angl. t.* 133. *Blackw. herb. t.* 92.

maxima. 6. G. leguminibus ſtrictis adſcendentibus glabris, ſtipulis lanceolatis, foliolis oblongis glabris ſtriatis. *Burm. zeyl. t.* 108. *f.* 2.

purpurea. 7. G. leguminibus ſtrictis adſcendentibus glabris racemoſis terminalibus, ſtipulis ſubulatis, foliolis oblongis glabris. *Burm. zeyl. t.* 33.

piſcatoria. 8. G. leguminibus ſtrictis adſcendentibus ſubvilloſis, pedunculis ancipitibus, ſtipulis ſubulatis, foliolis oblongis obtuſis ſubtus ſubpiloſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 71.

ochroleuca. 9. G. leguminibus linearibus glaberrimis compreſſis erectis, foliolis obovatis integerrimis ſubpetiolatis, pedunculis axillaribus ſuperne racemoſis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 79.

ſtricta. 10. G. leguminibus rectis villoſis, racemis oppoſitifoliis, ſtipulis ſubulatis, foliolis villoſis oblongis, vexillis ſupra ſericeis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 70.

pulchella. 11. G. leguminibus rectis teretibus villoſis, ſtipulis linearibus, foliolis plurimis acuminatis: acumine reflexo. *Scop. del. inſ.* 1. *p.* 3. *t.* 2.

ſenticoſa. 12. G. leguminibus binis lateralibus glabris, foliolis emarginatis ſubtus ſericeis, caule fruticoſo.

littoralis. 13. G. villoſo-tomentoſa, leguminibus racemoſis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 192.

villoſa. 14. G. leguminibus retrofalcatis villoſis pendulis racemoſis lateralibus, foliolis ſubtus ſericeis cuneiformibus. *Pluckn. alm. t.* 59. *f.* 6. *β) Burm. zeyl. t.* 33.

dauurica. 15. G. leguminibus retrofalcatis linearibus pubeſcentibus erectis ſpicatis, foliolis lanceolatis ſubpetiolatis albo-piloſis. *Pallas it.* 3. *p.* 742. *t.* W. *f.* 1.

virginiana. 16. G. leguminibus retrofalcatis compreſſis villoſis ſpicatis, calicibus lanatis, foliolis ovali-oblongis acuminatis. *Pluckn. alm. t.* 23. *f.* 2.

ſpinoſa. 17. G. leguminibus retrofalcatis ſolitariis compreſſis, ſtipulis ſpineſcentibus, foliolis cuneiformibus canis, caule diffuſo. *Suppl. p.* 335.

caerulea. 18. G. racemis terminalibus multifloris coarctatis, foliolis ſubdecemjugis ellipticis, caule ſcabro. *Suppl. p.* 335.

capenſis. 19. G. racemis paucifloris oppoſitifoliis, leguminibus linearibus rectis villoſis, foliolis ſubquinquejugis oblongis integerrimis, caule procumbente ſuffruticoſo. *Jacq. coll.* 2. *p.* 292.

20. G.

filiformis. 20. G. racemis axillaribus ſolitariis filiformibus: floribus ſubternis, leguminibus linearibus compreſſis retrofalcatis transverſim rugoſis, foliis ternatis integerrimis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 348. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 73.

longifolia. 21. G. racemis axillaribus ſolitariis erectiuſculis: floribus geminis, leguminibus linearibus compreſſis rectis villoſis, foliis ternatis integerrimis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 349.

ſpicata. 22. G. ſpicis longis terminalibus. *Walt. flor. carol. p.* 188.

FALCATA. *Cal.* 4dentatus. *Stilus* adſcendens. *Legumen* oblongum, compreſſum, falcatum, utraque acuminatum.

carolinia- 1. FALCATA. *Walt. flor. carol. p.* 188.
na.

891. PHACA. *Legumen* ſemibiloculare. *Filamentum* ſolitarium teres.

* *cauleſcentes.*

ſibirica. 1. Ph. foliolis quaternis lanceolatis obtuſis ſericeis, calice villoſo: dentibus ſetaceis. *Suppl. p.* 365. *Pallas it.* 3. *t.* A. a. *f.* 2.

trifoliata. 2. Ph. foliis ternatis ovalibus obtuſis, leguminibus ſemiorbiculatis. *Mant. p.* 270.

auſtralis. 3. Ph. caule ramoſo proſtrato, foliolis lanceolatis, corollarum alis ſemibifidis. *Mant. p.* 123. *Till. h. piſ. t.* 14. *f.* 1.

arenaria. 4. Ph. caule patulo glabro, leguminibus glabris ovato-inflatis, foliis pinnatis. *Pallas it.* 3. *p.* 748. *t.* Cc. *f.* 1. 2.

alpina. 5. Ph. caule erecto glabro, leguminibus oblongis inflatis ſubpiloſis. *Flor. dan. t.* 856.

falſula. 6. Ph. caule erecto caneſcente, foliis pinnatis, leguminibus pedunculatis globoſis cernuis. *Suppl. p.* 336. *Pallas it.* 3. *t.* Bb. *f.* 1. 2.

baetica. 7. Ph. caule erecto piloſo, leguminibus tereti-cymbiformibus.

** *ſubacaules.*

oxyphylla. 8. Ph. leguminibus ovato-inflatis extrinſecus piloſis, foliolis tomentoſis ſubquaternis. *Pallas it.* 3. *p.* 743. *t.* X. *f.* 2.

ſilvatica. 9. Ph. leguminibus inflatis, fuſco-piloſis, foliis pinnatis longe piloſis. *Pallas it.* 3. *p.* 744. *t.* W. *f.* 2.

*** *acaules.*

veſicaria. 10. Ph. glabra, calicibus fructiferis ovalibus inflatis, foliolis lanceolatis. *Mant. p.* 123. *Schreb. dec.* 9. *t.* 7.

incana. 14. Ph. incana, calicibus fructiferis ovatis inflatis villoſis, foliolis oblongis obtuſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 57.

proſtrata. 11. Ph. foliolis binatis linearibus ſericeis, ſcapo procumbente, calice villoſo: dentibus lanceolatis brevibus. *Suppl. p.* 336. *Pallas it.* 3. *t.* Y. *f.* 2.

microphylla. 12. Ph. foliolis binatis ovatis obtuſis villoſis, calice muricato piloſo: dentibus undique hiſpidis. *Suppl. p.* 337. *Pallas it.* 3. *t.* X. *f.* 1.

muricata. 13. Ph. foliolis ſubquaternis lineari-ſubulatis ſubtus muricatis, calice glabro: dentibus ciliatis. *Suppl. p.* 337. *Pallas it.* 3. *t.* A. a. *f.* 1.

892. ASTRAGALUS. *Capſula* (plurimis) 2locularis, gibba. *Filamentum* ſolitarium teres.

* *cauleſcentes.*

† *caule herbaceo.*

† *erecto.*

alopecuroides. 1. A. ſpicis cylindricis ſubſeſſilibus, calicibus leguminibusque lanatis. *Mill. h. angl. t.* 58.

melilotoides. 2. A. ſpicis terminalibus nudis, caulibus ſtriatis, leguminibus erectis didymo-ſubtriquetris transverſim ſtriatis. *Pallas it.* 3. *p.* 748. *t.* Dd. *f.* 1. 2.

bohemicus. 3. A. ſpicis laxis longe pedunculatis, caule ramoſo. *Jo. Mayer boehm. Abh.* 3. 1787. *p.* 314. *t.* 1.

piloſus. 4. A. floribus ſpicatis, leguminibus ſubulatis cauleque piloſis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 51.

aſper. 5. A. floribus ſpicatis in pedunculis elongatis, caule ſtricto laevi ſubaſpero, leguminibus oblongis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 335. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 33.

carolinianus. 6. A. pedunculis ſpicatis, caule laevi, leguminibus ovato-cylindricis ſtilo acuminatis. *Dill. h. Elth. t.* 39. *f.* 45.

viresſcens. 62. A. pedunculis multifloris folio longioribus, foliolis lanceolatis acutis, leguminibus recurvatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 73.

7. A.

uliginoſus. 7. A. floribus ſpicatis, leguminibus erectiuſculis nudis tumidis tereti-depreſſis: mucrone reflexo. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 17. 18.

Onobrychis. 8. A. floribus ſpicatis: vexillis duplo longioribus, ſtipulis ſolitariis, caule pubeſcente. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 38. *β*) Aſtragalus tenuifolius. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 499.

capitatus. 9. A. capitulis globoſis: pedunculis longiſſimis, foliolis emarginatis.

peregrinus. 63. A. ſpicis pedunculatis foliorum longitudine, leguminibus arcuatis lanuginoſis ſtilatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 57.

chriſtianus. 10. A. floribus glomeratis ſubſeſſilibus ex omnibus axillis foliaceis. *Tournef. it.* 2. *p.* 254. *ic.*

ſinenſis. 11. A. floribus racemoſis pendulis, caule ſtricto glabro, leguminibus ovatis inflatis utrinque mucronatis. *Linn. dec.* 1. *t.* 3.

galegiformis. 12. A. floribus racemoſis pendulis, caule ſtricto glabro, leguminibus triquetris utrinque mucronatis. *Legumen.*

falcatus. 64. A. glaber, leguminibus racemoſis pendulis falcatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 58.

ſulcatus. 13. A. caule glabro ſtricto ſtriato, foliolis lineari-lanceolatis acutis, leguminibus triquetris. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 40. *Legumen aequale.*

arenarius. 14. A. caule ramoſo tomentoſo albo, foliolis complicatis, pedunculis ſubquadriflоris. *Raj. angl.* 3. *t.* 12. *f.* 3.

deflexus. 15. A. ramis ſpiciferis nudis folio longioribus, foliolis leguminibusque retrorſum vergentibus. *Pall. act. Petrop.* 1779. 2. *p.* 260. *t.* 15.

microphyllus. 16. A. caule erecto-patulo, foliolis ovalibus, calicibus tumidiuſculis, leguminibus ſubrotundis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 19.

†† *caule adſcendente.*

hians. 17. A. pedunculis erectis racemoſis, leguminibus pendulis villoſis anterius hiantibus. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 87.

††† *caule diffuſo.*

canadenſis. 18. A. leguminibus ſubcylindricis mucronatis, foliolis nudiuſculis. *Mant. p.* 449. *Dodart mem. t.* 65.

annularis. 19. A. leguminibus ſubulatis incurvis glabris, foliolis obovatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 139.

65. A.

barbatus. 65. A. hirſutiſſimus, floribus capitatis, pedunculis folia ſubaequantibus. *Vahl ſymb. botan.* 1. *p.* 58.

Stella. 20. A. capitulis pedunculatis lateralibus, leguminibus rectis ſubulatis mucronatis. *Pluckn. phyt.* 79. *f.* 4.

Glaux. 21. A. capitulis pedunculatis imbricatis ovatis; floribus erectis, leguminibus ovatis calloſis inflatis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 241. *ic.*

ſeſameus. 22. A. capitulis ſubſeſſilibus lateralibus, leguminibus erectis ſubulatis acumine reflexis. *Pluckn. alm. t.* 79. *f.* 3.

†††† *caule procumbente.*

hamoſus. 23. A. leguminibus ſubulatis recurvatis glabris, foliolis obcordatis ſubtus villoſis. *Mant. p.* 449. *Riv. tetrap. t.* 221.

contortuplicatus. 24. A. leguminibus contortuplicatis canaliculatis villoſis. *Haller act. goett.* 2. *t.* 11. *Legumen.*

bacticus. 25. A. leguminibus priſmaticis rectis triquetris apice uncinatis, ſpicis pedunculatis. *Morif. hiſt. pl.* 2. *t.* 9. *f.* 11.

Laxmanni. 26. A. leguminibus oblongis trigonis ſulco exaratis mucronatis villoſis, ſpicis elongatis. *Suppl. p.* 337. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 37.

alpinus. 27. A. leguminibus piloſis utrinque acutis, floribus pendulis racemoſis. *Flor. dan. t.* 51. *an ad phacam potius referendus?*

hiſpidus. 78. A. leguminibus foliolisque ovato-oblongis hiſpidis, corollis calice brevioribus. *la Billardiere ic. pl. ſyr. rar. dec.* 1. *p.* 18. *t.* 8.

ſyriacus. 28. A. leguminibus ovato-oblongis tomentoſis, capitulis pedunculatis: floribus reflexis.

pentaglottis. 29. A. leguminibus capitatis replicatis compreſſis conniventibus criſtatis: acumine reflexo. *Mant. p.* 274. *Riv. tetrap.* 223. *f.* 2.

epiglottis. 30. A. leguminibus capitatis ſeſſilibus cernuis cordatis mucronatis replicatis nudis. *Mant. p.* 274. *Riv. tetrap.* 223. *f.* 1.

danicus. 31. A. decumbens hirtus, capitulis longe pedunculatis, leguminibus brevibus inflatis piloſis. *Flor. dan. t.* 614.

hypoglottis. 32. A. proſtratus, leguminibus capitatis ovatis replicatis compreſſis piloſis: acumine reflexo. *Mant. p.* 474.

Cicer. 33. A. proſtratus leguminibus ſubgloboſis inflatis mucronatis piloſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 251.

34. A.

glycyphyllos. 34. A. proſtratus, leguminibus ſubtriquetris arcuatis, foliolis ovalibus pedunculis longioribus. *Rivin. tetrap. t.* 103.

auſtriacus. 35. A. proſtratus glaber ſtriatus debilis, foliolis ſublinearibus emarginatis, leguminibus teretibus. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 195.

leontinus. 36. A. proſtratus leguminibus ovatis villoſis, floribus ſpicatis erectis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 59. *rar. pl. ic. cent.* 1. *t.* 37.

lineatus. 66. A. ſpicis pedunculatis, calicibus fructiferis ovalibus inflatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 59.

ſinicus. 37. A. umbellis pedunculatis, leguminibus erectis priſmaticis triquetris apice ſubulatis. *Mant. p.* 103.

†† *caule lignoſo.*

cornutus. 38. A. ſuffruticoſus ſtrictus, ſpica brevi terminali, leguminibus ſubtriquetro-teretibus acutis. *Pallas it.* 1. *p.* 500. *an phacae potius ſpecies?*

Ammodytes. 39. A. ſuffruticoſus, floribus geminis, leguminibus ovatis didymis lanatis. *Suppl. p.* 338. *Pallas it.* 2. *t.* X.

emarginatus. 79. A. ſcapis longiſſimis, capitulis globoſis, leguminibus capitatis. *la Billardiere ic. pl. rar. dec.* 1. *p.* 19. *t.* 9.

compactus. 40. A. fruteſcens, floribus glomerato-capitatis, petiolis ſpineſcentibus, foliolis mucronatis. *Vahl ſymb. bot. p.* 65.

lagopodioides. 67. A. fruteſcens, petiolis ſpineſcentibus, foliolis apice ſpinoſis, floribus ſpicatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 64.

Tragacantha. 68. A. fruteſcens, ſpicis pedunculatis longitudine foliorum, petiolis ſpineſcentibus. *Dalerh. hiſt. pl.* 1478. *f.* 1.

Parterium. 69. A. fruteſcens, floribus axillaribus ſeſſilibus, petiolis ſpineſcentibus, leguminibus magnitudine calicis. *Moriſ. h. pl. univ.* 2. *p.* 113. *ſ.* 1. *t.* 13. *f.* 2.

Rauwolfii. 41. A. arboreſcens, petiolis ſpineſcentibus; floribus ſubſolitariis pedunculatis, calicibus fructiferis inflatis villoſis. *Ruſſel h. nat. Alepp. tab.* 5.

** *ſubcauleſcentes.*

tragacanthoides. 42. A. floribus radicalibus numeroſis ſubſeſſilibus. *Buxb. cent.* 3. *t.* 38. *f.* 2.

trimeſtris. 43. A. ſcapis ſubbifloris, leguminibus hamatis ſubulatis bicarinatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 174.

44. A.

montanus. 44. A. ſcapis folio longioribus, floribus laxe ſpicatis erectis, leguminibus ovatis: acumine inflexo. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 167. *an phaca?*

uncatus. 45. A. exſcapus, leguminibus ſubulatis hamatis foliolo longioribus, foliolis obcordatis.

exſcapus. 46. A. exſcapus, leguminibus lanatis, foliis villoſis. *Mant. p.* 275. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 17.

numularius. 70. A. floribus radicalibus ſubſeſſilibus, foliolis ſubrotundis emarginatis hirſutis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 60.

**** acaules.*

verticillaris. 47. A. foliolis aggregato-ſemiverticillatis. *Mant. p.* 275. *Amm. ruth. t.* 19. *f.* 1. 2.

caprinus. 48. A. hirſutus, ſcapis erectis breviſſimis, foliolis oblongis, leguminibus ovatis tumidis villoſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 24. *f.* 3.

veſicarius. 49. A. ſcapis folio longioribus, floribus laxe ſpicatis, calicibus leguminibusque inflatis hirſutis.

uralenſis. 50. A. ſcapo erecto foliis longiore, leguminibus ſubulatis inflatis villoſis erectis. *Hall. it. t.* 2. *f.* 2.

denſifolius. 71. A. ſcapo erecto foliis longiore, foliolis oblongis emarginatis, floribus capitato-ſpicatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 60.

bicolor. 72. A. ſcapis erectis folio longioribus, floribus capitatis: bracteis lanceolatis calices hirſutiſſimos aequantibus. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 62.

alyſſoides. 73. A. ſcapis erectis folio longioribus, floribus ſpicatis, leguminibus oblongis hirſutis longitudine calicis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 61.

hirſutus. 74. A. ſcapis erectis folio longioribus, floribus capitatis, leguminibus globoſis hirſutiſſimis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 61.

pſoraloides. 75. A. ſcapis erectis foliis longioribus, floribus capitatis demum ſpicatis, leguminibus oblongis hirſutiſſimis. *Vahl ſymb. bot.* 2. *p.* 62.

globoſus. 76. A. ſcapis erectis foliis longioribus, capitulis globoſis, bracteis linearibus calicem aequantibus. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 60.

ampullatus. 51. A. ſcapo erecto fructifero ſubadſcendente, floribus terminalibus ſubquaternis, leguminibus inflatis ovato-mucronatis villoſis. *Pallas it.* 3. *p.* 750. *t.* Cc. *f.* 4. 5.

52. A.

laguroides. 52. A. ſcapis ſubſolitariis hiſpidis folia ſubaequantibus, floribus confertim ſpicatis, leguminibus falcatis piloſis. *Pallas it.* 3. *p.* 750. *t.* Cc. *f.* 3.

daſyanthus. 53. A. lanuginoſus, ſcapis folia aequantibus, floribus capitatis, leguminibus ſubtriquetris villoſis. *Pallas it.* 3. *p.* 749. *t.* G. g*. *f.* 1. A. b.

phyſodes. 54. A. ſcapis folia aequantibus, leguminibus inflatis ſubglobo-ſis nudis.

depreſſus. 55. A. ſcapis folio brevioribus, leguminibus cernuis, foliolis ſubemarginatis nudis.

lupulinus. 56. A. ſcapis ſulcato-angulatis folio brevioribus, floribus ſpicatis: calicibus hirſutiſſimis, leguminibus ovato-compreſſis. *Pallas it.* 3. *p.* 750.

lanatus. 80. A. ſcapo nudo longitudine foliorum villoſorum, leguminibus lanatis dente ſpicatis ſemicordatis triquetris ſubulatis. *la Billardiere ic. pl. ſyr. rar. dec.* 1. *p.* 21. *t.* 10.

monſpeſſulanus. 57. A. ſcapis declinatis longitudine foliorum, leguminibus ſubulatis teretibus ſubarcuatis glabris. *Mant. p.* 450.

latifolius. 77. A. ſcapis declinatis foliis longioribus, leguminibus teretibus rectis, foliis ſimplicibus compoſitisque. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 61.

incanus. 58. A. ſcapis declinatis, foliolis tomentoſis leguminibus ſubulatis ſubarcuatis incanis apice incurvis. *Mant. p.* 450.

campeſtris. 59. A. ſcapo decumbente, calicibus leguminibusque villoſis, foliolis lanceolatis acutis. *Haller hiſt. ſtirp. Helv. t.* 13.

leptophyllus. 60. A. ſcapis proſtratis, leguminibus pubeſcentibus inflatis ovato-mucronatis unilocularibus. *Pallas it.* 3. *p.* 749. *t.* X. *f.* 3. B. *Nonne potius phacae ſpecies?*

ſpicatus. 61. A. ſcapis tomentoſis, floribus ſpicatis. *Pallas it.* 2. *p.* 742. *t.* W. *an diſtincta ſpecies?*

893. BISERRULA. *Capſula* 2locularis plana: diſſepimento contrario.

Pelecinus. 1. Biserrula. *Giſeck. ic. faſc.* 1. *t.* 17.

894. PSORALEA. *Calix* punctis callosis adspersus, longitudine *leguminis* ispermis.

* *foliis nullis.*

aphylla. 1. Ps. stipulis mucronatis brevissimis versus flores subimbricatis. *Mant. p.* 450. *Breyn. cent. t.* 25.

** *foliis simplicibus.*

coryli-folia. 2. Ps. foliis ovatis subdentatis, spicis ovatis. *Burm. ind. t.* 49. *f.* 2. *Semina nuda.*

rotundi-folia. 3. Ps. foliis ovatis integerrimis, capitulis bracteisque villosis. *Suppl. p.* 338.

*** *foliis simplicibus ternatisque.*

capitata. 4. Ps. foliis linearibus, capitulo terminali. *Suppl. p.* 339.

tenuifolia. 5. Ps. foliis inferioribus ternatis: superioribus simplicibus lanceolato-subulatis. *Mant. p.* 450.

**** *foliis ternatis.*

lutea. 6. Ps. foliis fasciculatis: foliolis ovatis rugosis, spicis pedunculatis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 139.

stachydis. 7. Ps. foliis petiolatis: foliolis oblongis mucronatis, spicis terminalibus interruptis: calicibus villosis. *Suppl. p.* 338.

spicata. 8. Ps. foliolis oblongis obtusis, spicis cylindricis. *Mant. p.* 264.

aculeata. 9. Ps. foliolis cuneiformibus recurvo-mucronatis, capitulis terminalibus. *Mant. p.* 450.

decum-bens. 25. Ps. foliolis cuneiformi-lanceolatis: mucrone recurvato, floribus axillaribus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 80.

bracteata. 10. Ps. foliolis obovatis recurvato-mucronatis, spicis ovatis. *Mant. p.* 264. *Sp. pl. p.* 1085. Trifolium fruticans. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 106.

hirta. 11. Ps. foliolis obovatis recurvato-mucronatis, floribus ternis subsessilibus.

repens. 12. Ps. foliolis obovatis emarginatis, caule repente, floribus subumbellatis. *Mant. p.* 265.

palaesti-na. 13. Ps. foliolis ovatis: petiolis pubescentibus, floribus capitatis. *Suppl. p.* 339. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 184.

14. Ps.

americana. 14. Ps. foliolis ovatis dentato-angulatis, spicis lateralibus. *Lob. ic.* 2. *p.* 31. *Pericarpium huic et* 16. *et* 20. *loculare.*

tetragonoloba. 15. Ps. foliolis dentatis, caule flexuoso, spicis lateralibus, leguminibus striatis quadrangularibus. *Mant. p.* 104. *an hujus generis?*

glandulosa. 16. Ps. foliolis lanceolatis: petiolis scabris, floribus spicatis. *Regn. bot. t.* 360. *an satis distincta ab americana?*

bituminosa. 17. Ps. foliolis lanceolatis: petiolis laevibus, floribus capitatis. *β) Besl. h. eyst. aest. t.* 11. *f.* 2.

axillaris. 18. Ps. foliolis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p.* 338.

***** *foliis quinatis.*

pentaphylla. 19. Ps. foliis digitatis: foliolis inaequalibus. *B. Juss. act. paris.* 1744. *t.* 17.

****** *foliis pinnatis.*

pinnata. 20. Ps. foliolis linearibus, floribus axillaribus. *Herm. par. lugdb. p.* 273. *ic.*

leporina. 26. Ps. foliolis oblongo-linearibus numerosissimis, spicis ebracteatis villosis lanceolatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 81.

folioloſa. 27. Ps. foliolis oblongis numerosis, spicis terminalibus bracteatis globoso-ovatis, calicibus compressis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 82.

enneaphylla. 21. Ps. spicis axillaribus. *Mant. p.* 450. *Plucku. alm. t.* 166. *f.* 2.

Dalea. 22. Ps. spicis cylindricis terminalibus. *Hort. Cliff. t.* 22.

laevigata. 23. Ps. stipulis solidis subacutis minutissimis. *Suppl. p.* 339.

******* *foliis supradecompositis.*

prostrata. 24. Ps. foliis digitatis linearibus.

896. TRIFOLIUM. *Flores* ſubcapitati. *Capſula* vel *Legumen* vix calice longius, non dehiſcens, deciduum.

* *capſulis ſubpolyſpermis nudis, 1locularibus,* Meliloti.

M. ornithopodioides. 1. Tr. capſulis octoſpermis ſubternis, calicibus duplo longioribus, caulibus declinatis. *Flor. dan. t.* 368.

M. indica. 2. Tr. capſulis racemoſis monoſpermis, caule erecto. *Pluckn. alm. t.* 45. *f.* 4. 5.

meſſanense. 3. Tr. capſulis racemoſis monoſpermis arcuato-ſtriatis ſemiovatis acutis, caule erecto. *Mant. p.* 275. *Suppl. p.* 339. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 16. *f.* 9.

M. polonica. 4. Tr. capſulis racemoſis diſpermis lanceolatis, caule erecto.

M. officinalis. 5. Tr. capſulis racemoſis ſubdiſpermis acutis rugoſis, caule erecto. *Blackw. herb. t.* 80.

M. italica. 6. Tr. capſulis racemoſis nudis diſpermis rugoſis obtuſis, caule erecto, foliolis integris. *Camer. hort. t.* 29.

M. cretica. 7. Tr. pericarpiis racemoſis diſpermis compoſitis membranaceis, caule erectiuſculo. *C. Bauh. prodr. th. bot. p.* 142. *ic.* P.

M. caerulea. 8. Tr. racemis ovatis, leguminibus ſeminudis mucronatis, caule erecto, ſpicis oblongis. *Blackw. herb. t.* 284.

** *leguminibus polyſpermis, rectis,* Lotoidea.

Lupinaſter. 9. Tr. capitulis dimidiatis, foliis quinatis ſeſſilibus, leguminibus polyſpermis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 6. *f.* 1.

reflexum. 10. Tr. capitulis fructiferis reflexis, leguminibus ſubtriſpermis.

ſtrictum. 11. Tr. capitulis globoſis, leguminibus diſpermis, calicibus longitudine corollae, foliolis ſerrulatis, ſtipulis rhombeis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 25. *f.* 7.

comoſum. 12. Tr. capitulis umbellato-globoſis imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, leguminibus tetraſpermis.

13. Tr.

Trifolii *character, ntut genus habitu facillimum, difficillime eruitur. Inflorescentia ejus varia: racemoſa, umbellata, faſciculata, capitata, ſpicata.*

cespitosum. 13. Tr. capitulis umbellato-globosis, leguminibus subtetraspermis, furculis repentibus, foliis exstipulatis. *Regnier Mag. Naturk. Helv.* 2. *p.* 78. *ic. an satis distinctum a repente?*

repens. 14. Tr. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Curt. flor. Lond. t.* 193.

hybridum. 15. Tr. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente. *Rivin. tetrap. t.* 127. *f.* 3.

alpinum. 16. Tr. capitulis umbellaribus, scapo nudo, leguminibus dispermis pendulis, foliolis lineari-lanceolatis. *Pon. bald. p.* 340. *ic.*

hedysarioides. 17. Tr. pedunculis subumbellatis serioribus subunifloris, foliis subtus pubescentibus spinula terminatis, calicibus fructiferis pungentibus. *Pall. it.* 3. *p.* 751. *t.* Dd. *f.* 3. A.

*** *calicibus villosis*, Lagopoda.

subterraneum. 18. Tr. capitulis villosis quinquefloris, coma centrali reflexa rigida fructum obvolvente. *Curt. flor. Lond. t.* 128.

globosum. 19. Tr. capitulis villosis globosis, calicibus superioribus flosculo destitutis.

Cherleri. 20. Tr. calicibus villosis globosis terminalibus solitariis: calicibus omnibus fertilibus, caulibus procumbentibus, foliolis obcordatis. *Mant. p.* 451. *Barr. pl. rar. ic.* 859.

glaciale. 21. Tr. capitulis villosis globosis terminalibus bracteatis, foliolis cordato-ovatis villosis, stipulis cordatis, caule decumbente. *Regnier Mag. Naturk. Helv.* 2. *p.* 81. *an distinctum satis a Tr. Cherleri?*

glomeratum. 22. Tr. capitulis sessilibus hemisphaericis rigidis, calicibus striatis patulis aequalibus. *Curt. flor. Lond. t.* 227.

scabrum. 23. Tr. capitulis sessilibus lateralibus ovatis, calicis laciniis inaequalibus rigidis recurvis. *Vaill. flor. paris. t.* 33. *f.* 1.

striatum. 24. Tr. capitulis sessilibus sublateralibus ovatis, calicibus strictis rotundatis. *Vaill. flor. paris. t.* 33. *f.* 2.

alexandrinum. 25. Tr. capitulis oblongis pedunculatis, caule erecto, foliis oppositis.

squarrosum. 26. Tr. spicis oblongis subpilosis, calicum infimo dente longissimo reflexo, caule herbaceo erecto. *Moris. hist. pl.* 2. *t.* 13. *f.* 1.

incarnatum. 27. Tr. ſpicis oblongis obtuſis villoſis aphyllis, foliolis ſubrotundis crenatis. *Rivin. tetrap. t.* 77. *Mill. h. angl. t.* 267. *f.* 2.

anguſtifolium. 28. Tr. ſpicis conico-oblongis villoſis: dentibus calicinis ſetaceis ſubaequalibus, foliolis linearibus. *Barr. pl. rar. ic. t.* 698.

pannonicum. 29. Tr. ſpicis longis villoſis, corollis monopetalis, foliolis integerrimis cauleque erecto villoſiſſimis. *Mant. p.* 276. *Jacq. obſ. bot.* 2. *t.* 42.

rubens. 30. Tr. ſpicis longis villoſis, corollis monopetalis, caule erecto, foliolis ſerrulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 385.

arvenſe. 31. Tr. ſpicis ovalibus villoſis: calicis dentibus ſetaceis villoſis aequalibus. *Flor. dan. t.* 724.

albidum. 32. Tr. ſpicis ovalibus piloſis pedunculatis ebracteatis: calicibus petalis, caule diffuſo, foliolis ovatis. *Retz. obſ. bot.* 4 *p.* 30.

clypeatum. 33. Tr. ſpicis ovatis: calicibus petalis; lacinia infima maxima lanceolata, foliolis ovatis. *Alpin. exot. t.* 306.

ſtellatum. 34. Tr. ſpicis ovatis piloſis: calicibus patulis, caule diffuſo, foliolis obcordatis. *Barr. pl. rar. ic.* 755. *et* 860.

lappaceum. 35. Tr. ſpicis ſubovatis: calicis dentibus ſetaceis hiſpidis, caule patulo, foliolis ovatis.

flexuoſum. 36. Tr. ſpicis ſubgloboſis villoſis terminalibus, caule adſcendente flexuoſo ramoſiſſimo, foliolis ovato-lanceolatis ſerrulatis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 314.

alpeſtre. 37. Tr. ſpicis ſubgloboſis villoſis terminalibus, caule erecto, foliolis lanceolatis ſerrulatis. *Flor. dan. t.* 662. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 433.

pratenſe. 38. Tr. ſpicis globoſis ſubvilloſis cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis. *Blackw. herb. t.* 20. *β*?) Trifolium odoratum. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 286.

ochroleucum. 39. Tr. ſpicis villoſis, caule erecto pubeſcente, foliolis infimis obcordatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 40.

uniflorum. 40. Tr. acaule, pedunculis trifidis ſubtriflorisque ſtipula brevioribus. *Buxb. cent.* 3. *t.* 31. *f.* 12.

**** *calicibus inflatis ventricoſis*, Veſicaria.

bicorne. 41. Tr. capitulis globoſis pedunculatis axillaribus, caule repente, floribus reſupinatis, calicibus fructiferis inflatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 139.

42. Tr.

tomentosum. 42. Tr. spicis sessilibus globosis tomentosis, calicibus inflatis obtusis. *Magn. monsp. p.* 264. *ic.*

reflexum. 43. Tr. spicis subovatis: corollis reflexis, calicibus inflatis dorso gibbis, caulibus prostratis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 872.

spumosum. 44. Tr. spicis ovatis, calicibus inflatis glabris quinquedentatis, involucris universalibus pentaphyllis.

laevigatum. 45. Tr. spicis glabris pedunculatis ovalibus: dentibus calicis setaceis, caule foliisque glaberrimis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 219.

psoralioides. 56. Tr. spicis ovatis bracteatis imbricatis: bracteis cordatis, leguminibus rotundatis. *Walt. flor. carol. p.* 184.

fragiferum. 46. Tr. capitulis subrotundis, calicibus fructiferis reflexis, labio superiore inflato bidentato, caule repente. *Curt. flor. Lond. t.* 95.

***** *vexillis corollae inflexis*, Lupulina.

montanum. 47. Tr. spicis subimbricatis subtribus: vexillis subulatis emarcescentibus, calicibus nudis, caule erecto. *Rivin. tetrap. t.* 12.

agranum. 48. Tr. spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calicibus subpubescentibus, stipulis cordatis ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffuso. *Curt. flor. Lond. t.* 161.

aureum. 49. Tr. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calicibus nudis, stipulis lanceolatis nudis, foliolo impari sessili, caule erecto. *Pollich. flor. pal. n.* 708. *an distinctum ab agrario?*

spadiceum. 50. Tr. spicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis persistentibus, calicibus pilosis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic.* 1024.

procumbens. 51. Tr. spicis ovalibus imbricatis multifloris: vexillis deflexis persistentibus, caulibus procumbentibus firmis hirsutissimis. *Raj. angl.* 3. *t.* 14. *f.* 3.

filiforme. 52. Tr. spicis ovalibus subimbricatis pauciflоris: vexillis deflexis persistentibus, caulibus procumbentibus filiformibus pubescentibus. *Raj. angl.* 3. *t.* 14. *f.* 4.

suffocatum. 53. Tr. acaule exscapum, floribus subsessilibus radicalibus. *Mant. p.* 276. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 60.

erectum. 54. Tr. spicis axillaribus, caule erecto foliisque tomentosis, leguminibus dispermis. *Walt. flor. carol. p.* 184. *an hujus generis?*

simplicifolium. 55. Tr. capitulis rotundatis, leguminibus dispermis, foliis simplicibus villosis, caule decumbente. *Walt. flor. carol. p.* 184. *an hujus generis?*

897. LOTUS. *Cal.* tubulosus. *Alae* sursum longitudinaliter conniventes. *Legumen* strictum, (plurimis) loculamentosum.

* *leguminibus tetragonis alatis latis.*

maritima. 1. L. leguminibus solitariis, foliis glabris, bracteis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 800.

siliquosa. 2. L. leguminibus solitariis, foliis subtus pubescentibus, caulibus procumbentibus. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 361. *Semina subglobosa.*

tetragonoloba. 3. L. leguminibus solitariis, bracteis ovatis. *Commel. h. amst.* 1. *t.* 26.

conjugata. 4. L. leguminibus conjugatis, bracteis oblongo-ovatis.

** *leguminibus cylindricis.*
⊢ *paucioribus.*

tetraphylla. 5. L. leguminibus solitariis, foliis ternatis obcordato-cuneatis: stipula solitaria simili, bracteis monophyllis. *Suppl. p.* 340.

edulis. 6. L. leguminibus subsolitariis gibbis incurvis. *Alp. exot. t.* 268.

peregrina. 7. L. leguminibus subbinatis linearibus compressis nutantibus.

angustissima. 8. L. leguminibus subbinatis linearibus strictis erectis, caule erecto, pedunculis alternis.

oligocaritos. 9. L. leguminibus binatis rectis striatis villosis albo-punctulatis. *Scop. del. insubr.* 1. *p.* 14. *t.* 6.

ornithopodioides. 10. L. leguminibus subternatis arcuatis compressis, caulibus diffusis. *Cam. hort. t.* 25. *Legumen nodosum.*

jacobaea. 11. L. leguminibus subternatis, caule herbaceo erecto, foliolis linearibus. *Mill. h. angl. t.* 168.

cretica. 12. L. leguminibus subternatis, caule frutescente, foliis sericeis nitidis. *Pluckn. alm. t.* 43. *f.* 1.

arabica. 13. L. leguminibus aristatis, caulibus prostratis, pedunculis trifloris, bracteis monophyllis. *Mant. p.* 104. *Jaq. h. Vind.* 2. *t.* 155.

22. L.

glauca. 22. L. leguminibus ſubbinatis glabris, foliolis ſubcuneiformibus carnoſis incanis, ſtipulis foliiformibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 92.

⊢⊢ *leguminibus pluribus.*

⊤ *umbellatis.*

medicaginoides. 14. L. leguminibus arcuatis, foliolis obcordatis denticulatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 23.

arborea. 15. L. leguminibus quinatis, foliolis obcordatis, caule arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 52.

⊤⊤ *capitatis.*

hirſuta. 16. L. capitulis ſubrotundis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis. *Moriſ. hiſt. pl. t.* 18. *f.* 14.

graeca. 17. L. capitulis ſubrotundis, caule erecto, foliis quinatis, leguminibus ovatis. *Mant. p.* 104.

recta. 18. L. capitulis ſubgloboſis, caule erecto laevi, leguminibus erectis glabris. *Riv. tetrap. t.* 192.

cornicula-ta. 19. L. capitulis depreſſis, caulibus decumbentibus herbaceis, leguminibus patentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 107.

cytiſoides. 20. L. capitulis dimidiatis, caule diffuſo ramoſiſſimo, foliis tomentoſis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1031.

Dorycnium. 22. L. capitulis aphyllis, foliis ſeſſilibus quinatis. *Lob. ic.* 51.

898. TRIGONELLA. *Vexillum* et *Alae* ſubaequales, ✓ patentes, forma corollae 3petalae.

ruthenica. 1. Tr. leguminibus pedunculatis congeſtis pendulis linearibus rectis, foliolis ſublanceolatis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 8.

platycarpos. 2. Tr. leguminibus pedunculatis congeſtis pendulis ovalibus aequalibus compreſſis, caule diffuſo, foliolis ſubrotundis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 9.

ſtriata. 3. Tr. leguminibus pedunculatis congeſtis erectiuſculis diſtantibus, pedunculis folio longioribus. *Suppl. p.* 340.

polycerata. 4. Tr. leguminibus ſubſeſſilibus congeſtis erectis ſubrectis longis linearibus, pedunculis muticis.

hamoſa. 5. Tr. leguminibus pedunculatis racemoſis declinatis hamoſis teretibus, pedunculis ſpinoſis foliolo longioribus. *Alp. aeg. t.* 124.

ſpinoſa. 6. Tr. leguminibus ſubpedunculatis congeſtis declinatis falcatis compreſſis, pedunculis ſpinoſis breviſſimis. *Breyn. cent. t.* 33. *f.* 1.

cornicu-lata. 7. Tr. leguminibus aequalibus pedunculatis congeſtis declinatis ſubfalcatis: pedunculo longo ſubſpinoſo, caule erecto. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 16. *f.* 11.

ſtellata. 8. Tr. leguminibus axillaribus confertis ſeſſilibus rigidis arcuatis in ſtellam expanſis. *Forsk flor. aeg. arab. p.* 140.

monſpe-liaca. 9. Tr. leguminibus congeſtis ſeſſilibus arcuatis divaricatis inclinatis brevibus, pedunculo mucronato inermi. *Breyn. cent. t.* 33. *f.* 2.

laciniata. 10. Tr. leguminibus pedunculatis ſubumbellatis ellipticis, foliolis cuneiformibus dentatis, ſtipulis laciniatis.

Foenum graecum. 11. Tr. leguminibus ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto. *Zorn pl. off. ic. t.* 116. *β*) Silveſtris, caule baſi ramoſo-ſtolonifero. *Capſula potius ſimplex* 1*locularis*.

indica. 12. Tr. leguminibus ſeſſilibus ſubſolitariis ſubfalcatis, foliolis integerrimis, caule diffuſo. *Pluckn. alm. t.* 200. *f.* 7.

899. MEDICAGO. *Piſtillum* incurvatum e carina elaſtice exſiliens, eamque deflectens. *Legumen* vel *Pericarpium* compreſſum, arcuatum vel ſpirale.

virginica. 1. M. caule erecto ramoſiſſimo, floribus faſciculatis terminalibus.

arborea. 2. M. pericarpiis unilocularibus lunatis margine integerrimis, caule arboreo. *Lob. ic.* 2. *p.* 46. *β*) Medicago glabra. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 778.

falcata. 3. M. pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato. *Flor. dan. t.* 233.

ſativa. 4. M. pedunculis racemoſis, leguminibus anguſtis aequalibus contortis, caule erecto glabro. *Regn. bot. t.* 346.

obſcura. 5. M. pedunculis racemoſis, leguminibus reniformibus integerrimis, caule diffuſo hirto. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 24. *t.* 1.

6. M.

circinata. 6. M. pericarpiis bilocularibus reniformibus margine dentatis, foliis pinnatis. *Rivin. tetrap. t.* 201.

radiata. 7. M. pericarpiis quadrilocularibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. *Morif. hift. pl.* 2. *t.* 16. *f.* 3.

lupulina. 8. M. ſpicis ovalibus, pericarpiis reniformibus unilocularibus monoſpermis, caulibus procumbentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 120.

Karſtienſis. 9. M. pedunculis axillaribus ſubumbellatis, caule herbacco erecto, leguminibus cochleatis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 86.

polymorpha. 10. M. pericarpiis duplicatis cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *Curt. flor. Lond. t.* 176.

orbicularis. α. M. pedunculis unifloris ariſtatis, leguminibus compreſſis rugoſis nudis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

intertexta. β. M. pedunculis unifloris, leguminibus ſphaericis: ſpinis longioribus divaricatis recurvis. *Knorr del. hort. t.* M. 1. a.

coronata. γ. M. pedunculis ſubbifloris, leguminibus compreſſis ſubſpinoſis, ſtipulis ſubulatis integerrimis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 21.

marginata. δ. M. pedunculis ſubbifloris muticis, leguminibus depreſſis marginatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 23.

tuberculata. ε. M. pedunculis bifloris ariſtatis, leguminibus ovato-cylindricis: anfractibus quatuor bituberculatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *t.* 23.

muricata. ζ. M. pedunculis multifloris, leguminibus ſubrotundis ſpinoſis incanis, foliis villoſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

nigra. η. M. pedunculis pauciflоris, leguminum hamulis longitudine leguminum. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 19.

arabica. ϑ. M. pedunculis ſubtriflоris, leguminibus echinatis, foliolis obcordatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 27.

rigidula. ι. M. pedunculis multifloris, leguminibus intenſe aculeatis.

hirſuta. κ. M. pedunculis multifloris, leguminum ſpinulis hamatis, ſtipulis integris.

ſcutellata. λ. M. pedunculis multifloris, leguminibus globoſis inermibus nudis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 4.

ciliaris. μ. M. leguminibus congeſtis globoſis hiſpidis, ſtipulis ciliatis.

minima. ν. M. leguminibus ſubternatis: ſpinulis uncinatis, ſtipulis integris. *Flor. dan. t.* 211.

tornata. ☿ ξ. M. leguminibus nudis cylindricis apice baſique planiuſculis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

turbinata. o. M. leguminibus inermibus ſubcylindricis: extremitatibus complanatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 20.

laciniata. π. M. legumine echinato, foliis linearibus dentatis. *Mant. p.* 454. *Magnol. monſp. p.* 270. *ic.*

proſtrata. 11. M. leguminibus cochleatis inermibus, foliis ternatis cuneiformibus apice dentatis, ſtipulis ſetaceis integerrimis, caule diffuſo. *Suppl. p.* 340. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 89.

marina. 12. M. pedunculis racemoſis, leguminibus cochleatis ſpinoſis, caule procumbente tomentoſo. *Rivin. tetrap.* 205.

CLAS-

CLASSIS XVII.

POLYADELPHIA.

DECANDRIA.

900. THEOBROMA. *Cal.* 3-5phyllus. *Cor.* 5petala: nectariis 5. *Stam.* 5: antheris 3. *Piſtill.* 3.

1418. ABROMA. *Piſt.* 5. *Capſ.* 5locularis, 1valvis apice dehiſcens. *Semina* reniformia: *receptaculo* hirſuto.

OMPHALOBIUM. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* leguminoſa, pedicellata, 1ſperma.

DODECANDRIA.

1268. MONSONIA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 5: antheris 3. *Piſtillum* 5fidum.

ICOSANDRIA.

901. CITRUS. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 20, in cylindrum paſſim connata. *Piſtill.* 1. *Bacca* multilocularis: pulpa veſiculari.

POLYANDRIA.

OCOTEA. *Cal.* 6partitus. *Cor.* 0. *Capſ.* ſupera 4-6locularis polyſperma.

1269. MELALEUCA. *Cal.* 5dentatus, ſuperus. *Cor.* 5petala. *Capſ.* ſemiveſtita calice.

1270. HOPEA. *Cal.* 5fidus, ſuperus. *Cor.* 5petala. *Drupa* nucleo 2loculari.

MORONOBEA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Bacca* 1locularis.

APAMA. *Cal.* 3fidus. *Siliqua?*

DURIO. *Cal.* 5fidus, urceolatus, inferus. *Cor.* 5petala, parva. *Stil.* 1. *Stamin.* phalanges 5 ex 7. *Pomum* 5loculare.

1320. GLABRARIA. *Cal.* 5fidus, inferus. *Cor.* 5petala. *Stil.* 1. *Staminum* phalanges 5 ex 6. *Drupa.*

1321. MÜNCHHAUSIA. *Cal.* inferus, 6fidus. *Cor.* 6petala. *Capſ.* 2-locularis.

677. SYMPLOCOS. *Cal.* 5fidus, ſuperus. *Cor.* 5-8petala. *Stamina* 4plici ſerie corollae adnata.

902. HYPERICUM. *Cal.* 5partitus, inferus. *Cor.* 5petala. *Stil.* 1, 3, 5. *Capſ.* 3-5locularis.

903. ASCYRUM. *Cal.* 2phyllus, inferus. *Cor.* 4petala. *Stil.* 2. *Capſ.* 2valvis.

DE-

DECANDRIA.

900. THEOBROMA. *Cal.* 3-5phylius. *Petala* 5 fornicata, 2cornia. *Nectarium* 5fidum, regulare. *Stamina* nectario innata, fing. antheris 2-3. *Bacca* corticata, roſtrata.

Cacao. 1. Th. foliis integerrimis. *Catesb. Car.* 3. *t.* 6. *Regn. bot. t.* 397.

gujanenſe. 2. Th. foliis ſubdentatis ſubtus tomentoſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 683. *t.* 275.

Guazuma. 3. Th. foliis ſerratis. *Mant. p.* 455. *Trew Ehret.* 40. *t.* 76.
an monadelphiis accenſendum totum genus?

1418. ABROMA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5: unguibus ſuperne anguſtatis, canaliculatis, inferne dilatatis, fornicatis, conniventibus. *Nectarium* campanulatum, 5fidum: laciniis obcordatis erectis, apice recurvis. *Antherae* 15 ſeſſiles, ternae. *Stil.* 5. *Capſ.* 5alata, 5roſtrata, 5locularis, polyſperma.

auguſtum. 1. A. foliis cordatis ſeptangulis. *Suppl. p.* 341. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 64. *f.* 1.

Wheleri. 2. A. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubdentatis. *Koenig ap. Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 27.

OMPHALOBIUM. *Cal.* 5phyllus, persistens, longitudine staminum. *Petala* 5: unguibus linearibus. *Caps.* leguminosa, pedicellata 1-sperma.

indicum. 1. OMPHALOBIUM. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 3. *t.* 46. *f.* 3.

DODECANDRIA.

1268. MONSONIA. *Cal.* 5partitus, persistens. *Cor.* 5petala. *Stamina* 15 subtus coalita in urceolum brevissimum, in 5 lacinias oblongas partitum, singulas terminatas filamentis 3 antheriferis. *Stil.* 5fidus. *Caps.* 5gona, 5locularis.

lobata. 1. M. foliis ovato-cordatis sublobatis, calicibus muticis. *Montin act. gotheb.* 2. *t.* 1.

filia. 2. M. foliis simplicibus cordatis lobatis. *Suppl. p.* 341. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 74. *f.* 2.

speciosa. 3. M. foliis quinatis: foliolis bipinnatis. *Mant. p.* 105. *Suppl. p.* 342. *Cavanill. diss.* 3. *t.* 74. *f.* 1. *an hoc genus potius inter monadelphas militat?*

ICOSANDRIA.

901. CITRUS. *Cal.* 5fidus. *Petala* 5 oblonga. *Antherae* 20, filamentis connatis in varia corpora. *Bacca* 9locularis.

chilensis. 1. C. foliis sessilibus acuminatis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 147.

spinosa. 2. C. foliis subsessilibus utrinque ineisis, fructu oblongo rugoso tuberculato. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 108. *t.* 21-23.

Medica. 3. C. foliis petiolatis: petiolis linearibus. *Blackw. herb. t.* 361. *Regn. bot. t.* 232. *β) Knorr del. hort.* 1. *t.* C. 1.

4. C.

Auranti-um. 4. C. petiolis alatis, foliis acuminatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* P. 4.

decuma-na. 5. C. petiolis alatis, foliis obtusis emarginatis. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 24. *f.* 2.

japonica. 6. C. petiolis alatis, foliis acutis, caule fruticoso. *Thunb. flor. jap. p.* 292.

OCOTEA. *Cal.* 6partitus inaequalis. *Cor.* o. *Filamenta* 9: singula antheris 4. *Caps.* calice tecta 4-6locularis polyspermа.

guianensis. 1. Ocotea. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 780. *t.* 310.

POLYANDRIA.

1320. GLABRARIA. *Cal.* 5fidus. *Petala* 5. *Nectarium* receptaculi setis longitudine calicis. *Stamina* 30: 6semper connexis. *Drupa.*

tersa. 1. Glabraria. *Mant. p.* 276. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 44.

APAMA. *Cal.* 3fidus. *Cor.* o. *Filam.* in 3 phalang. divisa. *Siliqua?*

dubia. 1. Apama. *le Mank encycl.* 1. *p.* 91.

1321. MÜNCHHAUSIA. *Cal.* semi-sex-fidus, torulosus. *Petala* unguiculata. *Stamina* 6ies 4-5. *Pistillum* superum: stilo filiformi curvato.

speciosa. 1. Münchhausia. *Mant. p.* 243. *Münchh. Hausv.* 5. *p.* 356. *ic.*

DURIO.

DURIO. *Cal.* 5 lobus, deciduus. *Petala* 5 minora. *Filamenta* connata in corpora 5, partita singula in 7 subulata. *Stil.* setaceus. *Pomum* subrotundum, muricatum, 5loculare, 5fariam dehiscens.

zibethinus. 1. DURIO. *Rumpf. amb.* 1. *p.* 99. *t.* 29.

✓ 1269. MELALEUCA. *Cal.* 5dentatus, superus. *Cor.* 5petala. *Filamenta* multa, connata in 5 corpora: *Stil.* 1. *Capſ.* semivestita calice, 3valvis, 3locularis.

* *foliis alternis.*

Leucadendron. 1. M. foliis lanceolatis falcatis acutis multinerviis, spica elongata. *Mant. p.* 105. *Suppl. p.* 342. *Houttuyn natural. Hist.* II. 3. *t.* 15.

latifolia. 2. M. foliis lanceolatis falcatis acutis trinerviis, spica elongata. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 17.

angustifolia. 3. M. foliis oblongis subfalcatis obtusis glaucis multinerviis. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 16.

trinervia. 4. M. foliis oblongis subfalcatis obtusis glaucis trinerviis. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 3. *t.* 35. *f.* 1.

scoparia. 5. M. foliis ovatis acutis trinerviis punctatis, floribus terminalibus solitariis. *Suppl. p.* 343. *Cook. it.* 2. *p.* 200. *ic.*

** *foliis oppositis.*

diffusa. 6. M. foliis ovatis acuminatis, pedunculis rameis cymosis. *Forst. flor. austr. p.* 37. *n.* 213.

lucida. 7. M. glabra, foliis ovatis venosis, paniculis terminalibus: pedicellis oppositis bifloris. *Suppl. p.* 342.

villosa. 8. M. tomentosa, foliis ovatis venosis, paniculis terminalibus: pedicellis subtrifloris. *Suppl. p.* 342.

aestuosa. 9. M. foliis ovatis obovatisque subtrinerviis, pedunculis cymosis terminalibus tomentosis. *Forst. flor. austr. p.* 38. *n.* 215. *an eadem cum lucida?*

10. M.

florida. 10. M. foliis oblongo-obovatis venosis, pedunculis terminalibus cymosis, calicibus turbinatis. *Forst. flor. austr. p.* 37. *n.* 214.

perforata. 11. M. foliis ovali-subrotundis pellucido-punctatis, pedunculis axillaribus trifidis. *Forst. flor. austr. p.* 37. *n.* 212.

lucens. 12. M. foliis lanceolatis utrinque acuminatis aveniis enerviis, floribus terminalibus congestis subsessilibus. *Forst. flor. austr. p.* 38. *n.* 216.

virgata. 13. M. foliis linearibus enerviis, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Suppl. p.* 343. *Forst. flor. austr. p.* 37. *n.* 211.

**** foliis sparsis.*

ciliata. 14. M. foliis sparsis: superioribus suboppositis oblongis obtusis ciliatis aveniis enerviis, cymis corymbosis terminalibus. *Forst. flor. austr. p.* 38. *n.* 217. *an eadem cum villosa?*

***** incerto foliorum situ.*

suaveolens. 15. M. calice fructus subhemisphaerico: margine repando. *Gaertn. de fruct. et sem. cent.* 3. *t.* 35. *f.* 1.

viridiflora. 16. M. calice fructus hemisphaerico crasso edentulo. *Gaertn. de fr. et sem. cent.* 3. *t.* 35. *f.* 1.

1270. HOPEA. *Cal.* 5fidus, superus. *Cor.* 5petala. *Stamina* multa, connata in 5 corpora. *Stil.* 1. *Drupa* nuce 3loculari.

tinctoria. 1. Hopea. *Mant. p.* 105. *Catesb. Car.* 1. *t.* 54.

677. SYMPLOCOS. *Cal.* 5fidus, superus. *Cor.* 5-8-petala. *Stamina* 4plici serie tubo corollae adnata. *Drupa* 5locularis polysperma.

martinicensis. 1. S. corollis pentapetalis. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 41.

octopetala. 2. S. corollis octopetalis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 109.

HYPERICON. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5. *Filamenta* multa basi in 3-5 phalanges connata. *Capſ.* 3 aut 5locularis, polyſperma.

* *floribus pentagynis.*

⊢ *caule arboreo.*

arboreum. 1. H. foliis ovatis. *Suppl. p.* 345.

gujanenſe. 2. H. foliis ovato-oblongis acuminatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 784. *t.* 311.

latifolium. 3. H. foliis cordatis ſubtus rufeſcentibus tomentoſis petiolatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 787. *t.* 312. *f.* 1.

ſeſſilifolium. 4. H. foliis cordatis ſubtus rufeſcentibus tomentoſis ſeſſilibus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 787. *t.* 312. *f.* 2.

⊢⊢ *caule fruticoſo.*

balearicum. 5. H. foliis ramisque cicatriſatis. *Mill. h. angl. t.* 54.

Kalmianum. 6. H. foliis lineari-lanceolatis.

Brathys. 62. H. foliis ſubulatis imbricatis glabris, floribus monadelphis. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 41. *Suppl. p.* 268. Brathys juniperina; *an reuera hujus generis?*

calicinum. 7. H. foliis oblongo-ovatis coriaceis, caule tetragono, floribus ſolitariis terminalibus. *Mant. p.* 106. *Giſeck. ic. faſc.* 1. *t.* 18. *Theca baccans.*

cayanenſe. 8. H. foliis ovatis, calicibus ſtriatis, corollis barbatis. *Mant. p.* 277. *Suppl. p.* 343.

baccifERUM. 9. H. foliis ovatis, calicibus laevibus, corollis barbatis. *Mant. p.* 277. *Suppl. p.* 344.

guineenſe. 10. H. foliis ovatis acutis, ramis teretibus, floribus ſubumbellatis. *Suppl. p.* 344. *Linn. diſſ. de hyperic. p.* 4. *f.* 1.

patulum. 11. H. caule fruteſcente laxo, foliis ovatis margine revolutis, floribus ſolitariis terminalibus. *Thunb. flor. jap. p.* 295.

⊢⊢⊢ *caule herbaceo.*

Aſigron. 12. H. caule tetragono erecto ſimplici, foliis laevibus integerrimis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 69. *Martyn plat. to ill. Linn. ſyſt. t.* 24.

56. H.

pyrami-datum. 57. H. caule ſubtetragono ramoſo, floribus ſubpaniculatis: calicibus ovatis acutis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 103.

** *floribus trigynis.*

⊢ *caule fruticoſo.*

Androſae-mum. 13. H. fructibus baccatis, caule ancipiti. *Curt. flor. Lond. t.* 206. *Gaertn. de fr. et ſem. cent.* 4. *t.* 59. *f.* 2. *Theca baccans.*

olympicum. 14. H. calicibus acutis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Dill. h. Elth. t.* 151. *f.* 183. *Mill. h. angl. t.* 151. *f.* 1.

canarienſe. 15. H. calicibus obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus.

floribundum. 58. H. calicibus ovatis acutis ſubciliatis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lanceolato-ellipticis. *Commel. hort. amſt.* 2. *t.* 68.

folioſum. 59. H. calicibus lanceolatis acutis, ſtaminibus longitudine corollae, foliis ovali-oblongis ſeſſilibus glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 104.

elatum. 60. H. calicibus lanceolato-ovatis acutis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis ovato-oblongis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 104.

hircinum. 16. H. calicibus lanceolatis acutis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis oblongis, caule ancipiti. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 51.

petiolatum. 17. H. caule tetragono compreſſo, foliis ovatis petiolatis integerrimis ſubtus tomentoſis.

prolificum. 18. H. caule ancipiti, floribus primordialibus ſeſſilibus, foliis lanceolato-linearibus. *Mant. p.* 106. *Murray comm. Goett.* 1780. *t.* 7.

glandulo-ſum. 61. H. foliis oblongo-lanceolatis pellucido-punctatis margine glanduloſis, calicibus acutis ſerrato-glanduloſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 107.

repens. 19. H. caule tereti repente, foliis lanceolato-linearibus obtuſis.

orientale. 20. H. foliis oblongis denticulato-crenatis, ſtipulis reflexis. *Tournef. it.* 2. *p.* 97. *ic.*

reflexum. 21. H. foliis lanceolatis ſeſſilibus approximatis reflexis, ramis tomentoſis, panicula terminali. *Suppl. p.* 346.

ſinenſe. 22. H. foliis ovato-caniculatis integerrimis, pedunculis axillaribus biſloris. *Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 27.

mexicanum. 23. H. foliis ovatis imbricatis, ramis simplicibus. *Suppl. p.* 345. *Linn. diss. de hyper. p.* 5. *f.* 2.

⊢⊢ *caule suffruticoso.*

virginicum. 24. H. floribus enneandris, caule tereti, foliis ovatis amplexicaulibus. *Mant. p.* 255.

scabrum. 25. H. caule tereti muricato, foliis oblongis.

linarifolium. 63. H. caule tereti erecto, foliis linearibus obtusis glabris, calicibus serrato-glandulosis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 65.

aegyptium. 26. H. caulibus compressis, nectariis petalorum lanceolatis. *Linn. diss. de hyperic. f.* 3.

⊢⊢⊢ *caule herbaceo.*

ericoides. 27. H. foliis linearibus imbricatis. *Pluckn. alm. t.* 93. *f.* 5.

canadense. 28. H. foliis lineari-lanceolatis, caule quadrangulo, pericarpiis coloratis.

laevigatum. 64. H. foliis ovatis subamplexicaulibus, calicis foliolis ovatis acutis, panicula trichotoma: flore interme lio sessili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 106.

quadrangulare. 29. H. foliis ovatis pellucido-punctatis, caule quadrangulo. *Flor. dan. t.* 640.

japonicum. 30. H. foliis ovatis sessilibus integris, caule tetragono basi decumbente. *Thunb. flor. jap. p.* 295.

gramineum. 31. H. foliis oblongo-parabolicis, caule tetragono dichotomo. *Forster flor. austr. p.* 53. *n.* 281.

perforatum. 32. H. caule ancipiti, foliis obtusis, petalis oblique truncatis crenulatis puncto atro inter crenas notatis. *Mill. ill. ic. Blackw. herb. t.* 15.

perfoliatum. 33. H. caule subancipiti, foliis amplexicaulibus ovatis, cymis floribus sessilibus.

humifusum. 34. H. caulibus ancipitibus prostratis filiformibus, foliis glabris, floribus axillaribus solitariis. *Flor. dan. t.* 141. *Curt. flor. Lond. t.* 162.

crispum. 35. H. caule tereti, foliis sessilibus lanceolatis basi undulato-dentatis. *Mant. p.* 106. *Bocc. mus.* 2. *t.* 12.

montanum. 36. H. caule tereti erecto, foliis ovatis glabris, calicibus serrato-glandulosis. *Flor. dan. t.* 173.

37. H.

hirſutum. 37. H. caule tereti erecto, foliis ovatis ſubpubeſcentibus, calicibus ſerrato-glanduloſis. *Mant. p.* 456. *Flor. dan. t.* 802.

erectum. 38. H. caule tereti, foliis amplexicaulibus lanceolatis acutis. *Thunb. flor. jap. p.* 296.

pulchrum. 39. H. caule tereti, foliis amplexicaulibus cordatis glabris, calicibus ſerrato-glanduloſis. *Flor. dan. t.* 75. *Curt. flor. Lond. t.* 6.

elodes. 40. H. caule tereti repente foliisque villoſis ſubrotundis.

tomentoſum. 41. H. caulibus proſtratis, foliis ſemiamplexicaulibus flexuoſis tomentoſis, calicibus ſerrato-glanduloſis.

barbatum. 42. H. calicibus et petalis ciliatis iisdemque et foliis punctatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 259.

numularium. 43. H. foliis cordato-orbiculatis glabris, calicibus ſerrato-glanduloſis. *Pluckn. alm. t.* 93. *f.* 4.

Coris. 44. H. foliis ſubverticillatis, calicibus ſerrato-glanduloſis. *Magaz. für Botan. 7. t.* 4.

maculatum. 45. H. ramis trichotomis, foliis ſemiamplexicaulibus pellucido-punctatis glanduloſo-ciliatis, calicibus obtuſioribus. *Walt. flor. carol. p.* 189.

piloſum. 46. H. foliis ſubovatis adpreſſis cauleque erecto piloſis, floribus terminalibus, calicibus integris. *Walt. flor. carol. p.* 190.

denticulatum. 47. H. caule erecto quadrangulo, foliis ſubamplexicaulibus ovatis, petalis dente laterali. *Walt. flor. carol. p.* 190.

quinquenervium. 48. H. caule quadrangulo, foliis ſemiamplexicaulibus quinquenerviis. *Walt. flor. carol. p.* 190.

nudicaule. 49. H. caulibus erectis ramoſiſſimis, foliis infimis ſubovatis: ſuperioribus breviſſimis. *Walt. flor. carol. p.* 190.

campanulatum. 50. H. foliis oblongis obtuſis ſeſſilibus, pedunculis trifidis axillaribus oppoſitis, corollis campanulatis patulis. *Walt. flor. carol. p.* 191.

tubuloſum. 51. H. foliis ſeſſilibus, corollis tubuloſis ſtaminum corporibus ultra medium connatis. *Walt. flor. carol. p.* 191.

Walteri. 52. H. foliis petiolatis, ſtaminum corporibus ad medium connatis. *Walt. flor. carol. p.* 191. *an diſtincta ſpecies?*

***** *floribus digynis.***

muticum. 53. H. foliis ovatis ſeſſilibus.

ſetoſum. 54. H. foliis linearibus.

****** *foliis monogynis.***

monogynum. 55. H. ſtaminibus corolla longioribus, calicibus coloratis, caule fruticoſo. *Mill h. angl. t.* 151. *f.* 2.

revolutum. 56. H. ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lineari-lanceolatis baſi revolutis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 66.

903. ASCYRUM. *Cal.* 4phyllus. *Petala* 4. *Filamenta* multa, in 4 phalanges digeſta.

Crux Andreae. 1. A. foliis ovatis caule tereti, panicula dichotoma.

hyperiçoides. 2. A. foliis lanceolato-obtuſis ancipitibus. *Plum. gen. t.* 152. *f.* 1.

villoſum. 3. A. foliis hirſutis, caule ſtricto. *Pluckn. alm. t.* 245. *f.* 6.

MORONOBEA. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5, ab uno latere convoluta et imbricata. *Filamenta* in 5 phalanges diſpoſita. *Stigma* 5radiatum. *Bacca* ovata non dehiſcens, 1locularis, 2-5ſperma.

coccinea. 1. MORONOBEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 789. *t.* 313.

CLAS-

CLASSIS XVIII.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

* *Flores ſemiſtoſculoſi* Tournef. *corollis omnibus ligulatis.*

922. SCOLYMUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, ſquamoſus.

921. CICHORIUM. *Recept.* ſubpaleaceum. *Pappus* ſubquinquedentatus. *Cal.* caliculatus.

920. CATANANCHE. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 5ariſtatus, ſeſſilis. *Cal.* imbricatus, ſcarioſus.

917. SERIOLA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſubpiloſus. *Cal.* ſimplex.

918. HYPOCHOERIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſubplumoſus. *Cal.* imbricatus.

904. GEROPOGON. *Recept.* paleaceum. *Pappus* plumoſus diſci, 5ariſtatus radii. *Cal.* ſimplex.

915. ANDRYALA. *Recept.* villoſum. *Pappus* piloſus, ſeſſilis. *Cal.* ſubaequalis, rotundatus.

905. TRAGOPOGON. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus. *Cal.* ſimplex.

907. PICRIS. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus. *Cal.* caliculatus.

906. SCORZONERA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus. *Cal.* imbricatus: margine ſcarioſo.

912. LEONTODON. *Recept.* nudum. *Pappus* ſtipitatus. *Cal.* imbricatus: ſquamis laxis.

914. CREPIS. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* caliculatus: ſquamis difformibus.

910. CHONDRILLA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, ſtipitatus. *Cal.* caliculatus, multiflorus.

911. PRENANTHES. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* caliculatus, ſubquinqueflorus.

909. LACTUCA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, ſtipitatus. *Cal.* imbricatus: margine ſcarioſo.

913. HIERACIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, ſeſſilis. *Cal.* imbricatus, ovatus.

908. SONCHUS. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, ſeſſilis. *Cal.* imbricatus, gibbus.

919. LAPSANA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* caliculatus.
916. HYOSERIS. *Recept.* nudum. *Pappus* caliculo coronatus. *Cal.* subaequalis.
VIREA. *Recept.* planum, alveolatum. *Pappus* plumosus, stipitatus. *Cal.* imbricatus: squamis laxis.

** *Flores capitati.*

930. ATRACTYLIS. *Corolla* radiata: corollulis radii 5dentatis.
1419. BARNADESIA. *Corolla* radiata. *Cal.* nudus, imbricatus, pungens. *Pappus radii* plumosus, *disci* setosus retrofractus.
929. CARLINA. *Calix* radiatus: radiis coloratis.
926. CNICUS. *Calix* bracteis obvallatus.
923. ARCTIUM. *Calix* squamis apice incurvato-hamosis.
931. CARTHAMUS. *Calix* squarrosus: squamis foliaceis. *Flores* discoidei.
STOKESIA. *Cal.* squamosus: squamis foliaceis. *Cor.* radiata.
928. CYNARA. *Cal.* squarrosus: squamis canaliculatis, spinosis.
925. CARDUUS. *Cal.* ventricosus: squamis spinosis. *Recept.* pilosum.
927. ONOPORDON. *Cal.* ventricosus: squamis spinosis. *Recept.* favosum.
924. SERRATULA. *Cal.* subcylindricus imbricatus: squamis acutiusculis muticis.

*** *Flores discoidei.*

934. ETHULIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* aequalis.
936. AGERATUM. *Recept.* nudum. *Pappus* 5aristatus. *Cal.* subaequalis. *Corollulae* 4fidae.
933. CACALIA. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* caliculatus.
939. CHRYSOCOMA. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* imbricatus. *Pist.* brevissima.
935. EUPATORIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* imbricatus. *Pist.* longissima.
MARSHALLIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* coronata caliculo 5phyllo. *Cal.* polyphyllus persistens. *Stigm.* 2.
942. SANTOLINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, hemisphaericus.

941. CALEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* piloſus. *Cal.* imbricatus.

943. ATHANASIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* paleaceus. *Cal.* imbricatus.

1287. SPILANTHUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 2dentatus. *Cal.* ſubaequalis.

932. BIDENS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* imbricatus.

938. STAEHELINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* plumoſus, ramoſus. *Antherae* caudatae.

PACURINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſimplex piloſus. *Cal.* imbricatus.

937. PTERONIA. *Recept.* ſetis partitis. *Pappus* ſubplumoſus. *Cal.* imbricatus.

940. TARCHONANTHUS. *Recept.* piloſum. *Pappus* piloſus, veſtiens. *Cal.* turbinatus, 1phyllus.

CHUQUIRAGA. *Recept.* villoſum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* turbinatus, imbricatus: ſquamis numeroſiſſimis.

* *Tanacetum.*

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Flores diſcoidei.*

945. ARTEMISIA. *Recept.* ſubnudum. *Pappus* o. *Cor.* radii o.

948. CARPESIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cor.* radii 5fidae.

944. TANACETUM. *Recept.* nudum. *Pappus* ſubmarginatus. *Cor.* radii 3fidae.

968. COTULA. *Recept.* ſubnudum. *Pappus* marginatus. *Cor.* diſci 4fidae.

949. BACCHARIS. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* femineae hermaphroditis miſtae.

950. CONYZA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii 3fidae.

946. GNAPHALIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* ſcarioſus: ſquamis concavis.

947. XERANTHEMUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſubſetaceus. *Cal.* ſcarioſus: radio explanato.

969. ANACYCLUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Semina* marginata, emarginata.

** *Flores ſemifloſculoſi, ſubbilabiati.*

960. PERDICIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* 3fidae: exteriore majore 3loba.

**** Flores radiati.*

962. BELLIS. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* ſimplex: ſquamis aequalibus.

967. MATRICARIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus: ſquamis acutis.

966. CHRYSANTHEMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* ſquamis intimis ſcarioſis.

1420. UNXIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 5phyllus. *Flores radii diſcique* 5.

MADIA. *Recept.* nudum. *Papp.* o. *Cal.* 8phyllus. *Sem.* plano-convexa.

959. DORONICUM. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus: *radii* o.

958. ARNICA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Stamina* radii caſtrata.

956. INULA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Antherae* baſi 2ſetae.

951. ERIGERON. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii capillares.

955. SOLIDAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii ſubſenae remotae.

957. CINERARIA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* aequalis, ſimplex.

953. SENECIO. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſquamis apice ſphacelatis.

952. TUSSILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſquamis ſubmembranaceis.

955. ASTER. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſubſquarroſus.

1421. MUTISIA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* cylindricus, imbricatus. *Cor. radii* ovali-oblongae, *diſci* 3fidae.

1322. BELLIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus 8phyllusque. *Cal.* ſimplex.

964. TAGETES. *Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 1-phyllus. *Radius* 5florus.

965. PECTIS. *Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 5-phyllus. *Radius* 5florus.

961. HELENIUM. *Recept.* ſeminudum. *Pappus* 5ariſtatus. *Cal.* multipartitus. *Cor.* rad. 3fidae.

BOLTONIA. *Recept.* favoſum. *Pappus* obſolete dentatus, 2cornis. *Cor.* radiata.

963. LEYSERA. *Recept.* ſemipaleaceum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* ſquarroſus.

973. SIGESBECKIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Radius* dimidiatus.

1321. ECLIPTA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cor.* disci 4fidae.

970. ANTHEMIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* hemisphaericus.

971. ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* oblongus. *Radius* subquinqueflorus.

977. BUPHTHALMUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* marginatus. *Stigma* hermaphrodit. simplex.

978. AMELLUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* pilosus. *Cal.* imbricatus.

972. TRIDAX. *Recept.* paleaceum. *Pappus* pilosus. *Cor.* radii 3partitae.

975. VERBESINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Flosculi* radii circiter 5.

974. ZINNIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* imbricatus. *Rad.* persistens 5florus.

* *Tetragonotheca v. Polymniaca.*

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

SCLEROCARPUS. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* sulcatus.

982. GORTERIA. *Recept.* nudiusculum. *Pappus* pilosus. *Radius* corollae ligulatus.

DIDELTA. *Recept.* partim nudum, partim setosum, separabile. *Pappus* simplex. *Cal.* 2plex.

984. CENTAUREA. *Recept.* setosum. *Pappus* pilosus. *Radius* corollae tubulosus

1271. ZOEGEA. *Recept.* setosum. *Pappus* setaceus. *Radius* corollae ligulatus.

GALARDIA. *Recept.* paleaceum, planum. *Sem.* apice 8paleacea. *Radius* corollae ligulatus.

TITHONIA. *Recept.* palaceum. *Sem.* apice 5paleacea. *Radius* corollae ligulatus.

BASTERA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus.

980. RUDBECKIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* marginatus. *Cal.* serie 2plici.

981. COREOPSIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* caliculatus.

979. HELIANTHUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* squarrosus.

983. OSMITES. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obſoletus. *Cal.* imbricatus.

ENOELIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* paleae membranaceae conduplicatae incluſa. *Cal.* polyphyllus aequalis.

POLYGAMIA NECESSARIA.

995. FILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Floſculi feminei* inter ſquamas calicis.

996. MICROPUS. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Floſculi feminei* ſquamis calicis vaginati.

985. MILLERIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Floſculus* femineus ſubſolitarius.

FLAVERIA. *Recept.* nudum. *Sem.* ſquamis calicis involuta. *Cal.* 3 - 4phyllus, connivens, aequalis.

1323. BALTIMORA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* cylindricus. *Radius* 5florus.

1224. HIPPIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Sem.* glabra, compreſſo - marginata. *Radius* obſoletus.

992. OSTEOSPERMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Sem.* globoſa, oſſea.

990. CALENDULA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Sem.* membranacea.

993. OTHONNA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* 1-phyllus.

991. ARCTOTIS. *Recept.* ſubpiloſum. *Pappus* 5phyllus. *Sem.* tomentoſa.

TRIXIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice villoſa. *Cor.* radii 3fidae.

994. ERIOCEPHALUS. *Recept.* villoſum. *Pappus* o. *Floſculi* radii quini.

987. POLYMNIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* 5phyllus.

989. MELAMPODIUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* vulviformis. *Cal.* 5phyllus.

986. SILPHIUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 2ariſtatus. *Cal.* ſquarroſus.

988. CHRYSOGONUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 3ariſtatus. *Sem.* caliculis propriis.

BAILLIERIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice 2cornia.

POLY-

POLYGAMIA SEGREGATA.

1001. STOEBE. *Perianth.* 1florum. *Pappus* plumosus. *Polyg.* aequalis.

1325. OEDERA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* paleaceus. *Perianth.* proprium flosculis tubulosis ligulatisque.

999. ECHINOPS. *Perianth.* 1florum. *Pappus* pubescens. *Polyg.* aequalis.

998. ELEPHANTOPUS. *Perianth.* 4florum. *Pappus* setosus. *Polyg.* aequalis.

TETRANTHUS. *Cal.* comm. 4florus. *Perianth.* proprium 1phyllum. *Semina* coronata. *Polyg.* aequalis.

ROLANDRA. *Flosculi* fasciculati in capitulum: squamis interjectis. *Perianth.* proprium 2valve, 1florum. *Coroll.* hermaphroditae. *Pappus* o.

1000. GUNDELIA. *Recept.* 5florum. *Pappus* o. *Polyg.* frustranea.

1422. JUNGIA. *Recept.* paleaceum. *Perianth.* comm. 3florum. *Flosculi* tubulosi, 2labiati: *labio exteriori* ligulato; *interiori* 2partito.

CRASPEDIA. *Recept.* paleaceum. *Cal.* communis imbricatus. *Flosc.* tubulosi, fasciculis aliquot depressis. *Perianth.* proprium o. *Pappus* plumosus.

NASSAVIA. *Receptac.* nudum. *Perianth.* comm. 4-5florum. *Floscul.* subbilabiati, hinc 3dentati, inde 2fidi. *Pappus* setis 3-4caducis.

998. SPHAERANTHUS. *Recept.* multiflorum, *Pappus* o. *Polyg.* necessaria.

MONOGAMIA.

* *Strumpfia, Seriphium, Corymbium, Jasione, Simbuleta, Lobelia, Viola, Impatiens, Solanum, Shawia.*

POLY-

POLYGAMIA AEQUALIS.

904. GEROPOGON. *Receptaculum* setoso-paleaceum. *Cal.* simplex. *Sem.* disci pappo plumoso: radii 5aristato.

glaber. 1. G. foliis glabris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 33.

hirsutus. 2. G. foliis hirsutis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 231. *ic.*

caliculatus. 3. G. calicibus caliculatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 106.

✓ 905. TRAGOPOGON. *Recept.* nudum. *Cal.* simplex. *Pappus* plumosus.

pratensis. 1. Tr. calicibus corollae radium aequantibus, foliis integris strictis. *Knorr del. hort.* 2. *t.* T. 3.

mutabilis. 2. Tr. calicibus octophyllis corollae radium aequantibus, foliis integris strictis lanceolato-acuminatis. *Jacq. misc.* 2. *p.* 316. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 20.

capensis. 3. Tr. calicibus octophyllis ventricoso-conicis corolla brevioribus, foliis runcinatis sessilibus spinoso-dentatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 320. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 74.

undulatus. 4. Tr. calicibus corollae radium aequantibus, foliis integris sublinearibus: caulinis maxime undulatis. *Jacq. misc.* 2. *p.* 317. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 19.

villosus. 5. Tr. calicibus corollae radio sesquilongioribus, caule foliisque villosis.

major. 6. Tr. calicibus corollae radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis, corollulis ad apicem rotundatis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 29. β?) Tragopogon dubium. *Scop. fl. carn.* 2. *n.* 947.

portifolius. 7. Tr. calicibus corollae radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis, corollulis angustissimis truncatis. *Flor. dan. t.* 797.

crocifolius. 8. Tr. calicibus corollae radio longioribus, foliis integris: radicalibus pedunculisque basi villosis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 230. *ic.*

orientalis. 9. Tr. calicibus corollae radio brevioribus, foliis integris subundulatis. *Camer. epit. p.* 312. *ic.*

10. Tr.

Dale-champii. 10. Tr. calicibus monophyllis corolla brevioribus inermibus, foliis runcinatis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 209.

picroides. 11. Tr. calicibus monophyllis corolla brevioribus aculeatis, foliis runcinatis denticulatis.

aſper. 12. Tr. calicibus corolla brevioribus hiſpidis, foliis integris: caulinis oblongis.

ruber. 13. Tr. glaberrimus, foliis amplexicaulibus integris, floribus ſolitariis terminalibus. *S. G. Gmelin. it.* 2. *p.* 198.

Dande-lion. 14. Tr. foliis enſiformibus integris laevibus, ſcapis radicalibus.

lanatus. 15. Tr. foliis enſiformibus undulatis villoſis, ſcapis radicalibus.

virginicus. 16. Tr. foliis radicalibus lyratis rotundatis: caulinis indiviſis.

906. SCORZONERA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* imbricatus: ſquamis margine ſcarioſis.

tomento-ſa. 1. Sc. foliis ovatis nervoſis tomentoſis integerrimis ſeſſilibus.

humilis. 2. Sc. foliis lato-lanceolatis nervoſis planis, caule ſubnudo unifloro. *Flor. dan. t.* 816. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 36.

lanata. 3. Sc. foliis lanceolatis nervoſis planis, caule ſimplici baſi lanato. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 306.

caricifolia. 4. Sc. foliis lanceolato-linearibus nervoſis carinatis, caule unifloro ſubfolioſo. *Pallas it.* 3. *p.* 757. *t.* li. *f.* 1.

hirſuta. 5. Sc. foliis linearibus cauleque unifloro hirſutis. *Mant. p.* 278. *Col. ecphr.* 1. *p.* 233. *ic.*

laciniata. 6. Sc. foliis linearibus dentatis acutis, caule erecto, calicis ſquamis petalo-mucronatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 356.

puſilla. 7. Sc. foliis linearibus apice circinatis, caulibus folioſis ſubquadrifloris. *Pall. it.* 2. *p.* 744. *t.* L.

hiſpida. 8. Sc. foliis linearibus dentatis ciliatis, ſcapis unifloris. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 215.

ciliata. 9. Sc. foliis retrorſum alternatim ſinuato-dentatis glabris, margine acute ciliatis, caule procumbente ramoſo ſcabro, pedunculis ſquamoſis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 143.

parviflora. 10. Sc. foliis lineari-enſiformibus integris, caulibus ramoſis, radio corollae breviſſimo. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 305.

11. Sc.

graminifolia. 11. Sc. foliis lineari-enſiformibus integris carinatis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 100.

hiſpanica. 12. Sc. foliis amplexicaulibus integris ſerrulatis, caule ramoſo. *Blackw. herb. t.* 406.

tuberoſa. 13. Sc. foliis lineari-acuminatis carinatis ſubtus pubeſcentibus, radice ſubgloboſa, floribus terminalibus ante floreſcentiam nutantibus. *Pall. it.* 3. *p.* 757. *t.* Y. *f.* 3.

purpurea. 14. Sc. foliis lineari-ſubulatis integris canaliculato-triquetris, pedunculis cylindricis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 35.

anguſtifolia. 15. Sc. foliis ſubulatis integris, pedunculis incraſſatis, caulis baſi villoſa. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 1.

reſedifolia. 16. Sc. foliis obtuſe dentatis, caule divaricato, calicibus apicibus tomentoſis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 800.

picroides. 17. Sc. foliis ſuperioribus amplexicaulibus integerrimis: inferioribus runcinatis, pedunculis ſquamoſis. *Pluckn. phyt.* 61. *f.* 5.

tingitana. 18. Sc. foliis omnibus runcinatis amplexicaulibus. *Herm. par. lugdb. p.* 659. *ic.*

taraxatifolia. 19. Sc. foliis runcinatis petiolatis, ſcapo ramoſo aphyllo. *Jacq. coll.* 1. *p.* 52. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 91.

907. PICRIS. *Recept.* nudum. *Cal.* duplicatus. *Pappus* plumoſus. *Sem.* transverſim ſulcata.

echioides. 1. P. perianthiis exterioribus pentaphyllis interiori ariſtato majoribus. *Curt. flor. Lond. t.* 150. *β*) *Herm. par. lugdb. p.* 185. *ic.*

hieracioides. 2. P. perianthiis laxis, foliis integris, pedunculis ſquamatis in calicem.

ſcabra. 3. P. caule ſubunifloro, foliis undulatis hiſpidis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 143.

japonica. 4. P. perianthiis hiſpidis, foliis dentatis, pedunculis ſubaphyllis hiſpidis. *Thunb. flor. jap. p.* 299.

aſplenioides. 5. P. foliis pinnatifidis: lobis alternis rotundatis.

908. SONCHUS. *Recept.* nudum. *Cal* imbricatus, ventricosus. *Pappus* capillaris.

fruticosus. 1. S. fruticosus glaberrimus, foliis basi attenuatis lyratis, lobis rotundatis obtusis, calicibus florentibus squamosis, pedunculis subsquamosis. *Suppl. p.* 346.

pinnatus. 15. S. fruticosus, foliis pinnatis: pinnis linear-lanceolatis subdentatis, calicibus laevibus, pedunculis nudis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 116.

radicatus. 16. S. caule fruticoso subnudo, foliis radicalibus utrinque laevibus lyratis: lobis triangulari-ovatis, pedunculis nudis calicibusque glabris. *Ait. hort. Kew* 3. *p.* 116.

maritimus. 2. S. pedunculo nudo, foliis lanceolatis amplexicaulibus indivisis retrorsum argute dentatis. *Pluckn. alm. t.* 62. *f.* 5.

plumieri. 3. S. pedunculis nudis, floribus paniculatis, foliis runcinatis.

tataricus. 4. S. pedunculis nudis, foliis lanceolatis dentatis runcinatis. *Mant. p.* 572. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 3.

tuberosus. 5. S. foliis inferioribus runcinatis: superioribus sagittatis. *Suppl. p.* 246.

alpinus. 6. S. pedunculis squamosis, floribus racemosis, foliis runcinatis. *Flor. dan. t.* 182. *Smith pl. ic. ined.* 1. *t.* 11.

floridanus. 7. S. pedunculis squamosis, foliis lyrato-hastatis.

sibiricus. 8. S. pedunculis squamatis, foliis lanceolatis indivisis sessilibus. *Kniph. bot. orig. cent.* 10. *n.* 82.

canadensis. 9. S. pedunculis hispidis, foliis runcinatis, floribus racemosis.

arvensis. 10. S. pedunculis calicibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. *Flor. dan. t.* 606.

palustris. 11. S. pedunculis calicibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi aristatis.

oleraceus. 12. S. pedunculis tomentosis, calicibus glabris. *Curt. flor. Lond. t.* 123. *β) Flor. dan. t.* 682. *γ) Flor. dan. t.* 843.

tenerrimus. 13. S. pedunculis tomentosis, calicibus pilosis.

agrestis. 14. S. pedunculis tomentosis multifloris, calicibus glabris, caule striato, foliis inciso-serratis sessilibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 110.

909. LACTUCA. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, cylindricus: margine membranaceo. *Pappus* capillaris ſtipitatus. *Sem.* laevia.

quercina. 1. L. foliis runcinatis denticulatis acutis ſubtus laevibus, caule glabro.

intybacea. 2. L. foliis runcinatis dentato-ciliatis obtuſis amplexicaulibus, caule paniculato. *Jacq. coll.* 1. *p.* 53. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 96.

flava. 3. L. foliis radicalibus lyrato-ſinuatis margine ſpinuloſis, caulinis ſinuatis amplexicaulibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 143.

ſinuata. 4. L. foliis ſinuatis ciliato-aculeatis, racemis florum terminalibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 215. *an diſtincta ſatis a ſaligna?*

carolinia- 15. L. foliis laciniatis denticulatis praemorſis ſubglaucis, coſta
na. ſubtus carinata aculeata. *Walt. flor. carol. p.* 193.

tuberoſa. 5. L. foliis ſpinuloſo-denticulatis, caule ſubſimplici, radice tuberoſa multiplici. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 57.

Scariola. 6. L. foliis verticalibus carina aculeatis. *Regn. bot. t.* 345. *β*) *Herm. par. lugdb. p.* 191. *ic.*

viroſa. 7. L. foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 2. *f.* 16.

ſativa. 8. L. foliis rotundatis: caulinis cordatis, caule corymboſo. *Blackw. herb. t.* 88. *β*) *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 2. *f.* 2.

ſaligna. 9. L. foliis haſtato-linearibus ſeſſilibus carina aculeatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 250.

perennis. 10. L. foliis linearibus dentato-pinnatis: laciniis ſurſum dentatis. *Tabernaem. Kraeuterb. p.* 176. *ic. Mill. h. angl. t.* 157.

inermis. 11. L. foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus retrorſum dentatis inermibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 144.

decortica- 12. L. foliis lanceolatis dentato-ſinuatis glabris: appendice utrin-
ta. que lineari. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 216.

canaden- 13. L. foliis lanceolato-enſiformibus amplexicaulibus dentatis
ſis. inermibus.

indica. 14. L. foliis lanceolato-enſiformibus ſeſſilibus inaequaliter dentatis. *Mant. p.* 278.

910.

910. CHONDRILLA. *Recept.* nudum. *Cal* calicu- √
latus. *Floſculi* multipli-
ci ſerie. *Pappus* capil-
laris, ſtipitatus. *Sem.*
muricata.

juncea. 1. Ch. foliis radicalibus runcinatis: caulinis linearibus integris. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 427.

crepoides. 2. Ch. foliis ſagittatis amplexicaulibus, caule ſimplici, floribus ſubſeſſilibus lateralibus. *An crepidis potius ſpecies?*

nudicaulis. 3. Ch. ſcapo nudo, floribus paniculatis. *Mant. p.* 278. *Murr. comm. goett.* 1772. *t.* 4.

911. PRENANTHES. *Recept.* nudum. *Cal.* calicu- √
latus. *Pappus* capilla-
ris, ſubſeſſilis. *Floſcu-*
li ſimplici ſerie.

viminea. 1. Pr. foliorum ramentis cauli adnatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 9.

tenuifolia. 2. Pr. foliis linearibus integerrimis.

ſpinoſa. 3. Pr. foliis linearibus ſeſſilibus glabris caule fruticoſo dichotomo ſpinoſo, pedunculis lateralibus ſolitariis unifloris. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 144.

hiſpida. 4. Pr. foliis linearibus ſeſſilibus, ſpinis ſtipularibus, floſculis octonis, calice octophyllo ſpinuloſo. *Pall. it.* 1. *p.* 501. *n.* 126.

ſinenſis. 5. Pr. foliis linearī enſiformibus integris dentatisque. *Thunb. flor. jap. p.* 301.

integra. 6. Pr. foliis oblongis integris glabris, panicula coarctata. *Thunberg flor. jap. p.* 300.

dentata. 7. Pr. foliis oblongis dentatis glabris, caule paniculato. *Thunb. flor. jap. p.* 301.

debilis. 8. Pr. foliis ovatis integris, caule ſubnudo erecto. *Thunb. fl. jap. p.* 300.

chondrilloides. 9. Pr. foliis lanceolatis: radicalibus indiviſis ſubdentatis, floſculis denis, calicibus octofidis. *Mant. p.* 107. *Arduin. ſpec.* 2. *t.* 17.

purpurea. 10. Pr. foliis lanceolatis denticulatis, floſculis quinis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 307.

haſtata. 11. Pr. foliis haſtatis amplexicaulibus dentatis, caule ramoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 301.

alba. 12. Pr. foliis haſtato-angulatis, floribus nutantibus ſubumbellatis: floſculis plurimis.

repens. 13. Pr. foliis trilobis, caule repente. *Amoen. acad.* 2. *p.* 360. *f.* 23. *an hieracii potius ſpecies?*

altiſſima. 14. Pr. foliis trilobis, caule erecto, floſculis quinis. *Pluckn. alm. t.* 317. *f.* 2.

muralis. 15. Pr. foliis runcinatis, floſculis quinis. *Flor. dan. t.* 509.

multiflora. 16. Pr. foliis petiolatis runcinatis: lobis acutis dentatis, paniculа faſtigiata diffuſa. *Thunb. flor. jap. p.* 303.

ſquarroſa. 17. Pr. foliis ſeſſilibus runcinatis: laciniis recurvis dentatis. *Thunb. flor. jap. p.* 303.

lyrata. 18. Pr. foliis runcinato-lyratis dentatis, panicula coarctata. *Thunb. flor. jap. p.* 303.

humilis. 19. Pr. foliis lyratis: lobis obtuſis, caule ſubnudo, floribus terminalibus ſubternis. *Thunb. flor. jap. p.* 302.

japonica. 20. Pr. foliis radicalibus lyratis, caule ſubnudo, floſculis quindenis. *Mant. p.* 107.

pinnata. 21. Pr. fruticoſa, foliis impari-pinnatis multijugis: foliolis linearibus integerrimis panicula compoſita. *Suppl. p.* 347. *an Sonchi potius ſpecies?*

VIREA. *Recept.* ſubnudum. *Pappus* plumoſus, ſubſtipitatus radii ſeſſilis. *Cal.* imbricatus: ſquamis incumbentibus.

ſcabra. 1. VIREA. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 25. *t.* 13.

912. LEONTODON. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus: ſquamis interioribus parallelis aequalibus. *Pappus* capillaris ſtipitatus.

* *pappo ſtipitato*, Taraxacon.

officinalis. 1. L. ſquamis calicinis exterioribus reflexis integris, foliis runcinatis acute dentatis glabris. *Flor. dan. t.* 574.

2. L.

mucrona- tus. 2. L. squamis calicinis exterioribus apice recurvis integris, pedunculis squamosis, foliis pinnatifidis undatis dentato-mucronatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 144.

Taraxa- con. 3. L. squamis calicinis exterioribus erectis appressis integris, foliis lanceolatis integerrimis denticulatisve. *Wiggers prim. fl. holf. p.* 56.

carolinia- nus. 17. L. squamis calicis apice bifidis: exterioribus reflexis. *Walt. flor. carol. p.* 192.

asper. 4. L. foliis dentato-pinnatifidis calicibusque hispidis, caulibus squamosis. *Flor. flor. aeg. arab. p.* 145.

tomento- sus. 5. L. calice oblongo, foliis lanceolatis indivisis subtus tomentosis; *Suppl. p.* 347. *nonne potius tussilaginis species?*

** *pappo sessili.*

auctum- nalis. 6. L. caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris, pappo subsessili. *Flor. dan. t.* 501.

Hastile. 7. L. scapo laevi, calicibus pilosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Jacq. flor. austr. 2. t.* 164. *an potius hieracii species?*

hispidus. 8. L. calice toto erecto, foliis dentatis integerrimis hispidis: setis furcatis. *Flor. dan. t.* 862.

bulbosus. 9. L. foliis oblongo-ovatis subdentatis glabris, calice laevi, scapo superne hirto. *Col. phyt. t.* 4.

alpinus. 10. L. calice toto erecto scapoque infra florem hispidis, foliis dentatis subpilosis, setis simplicissimis. *Jacq. flor. austr. 1. t.* 93.

hirtus. 11. L. calice toto erecto, foliis dentatis hirtis: setis simplicissimis.

croceus. 12. L. calice erecto ovato hirsuto, scapo laevi, foliis lineari-lanceolatis acutis retrorsum dentatis supra subhirsutis. *Haënk. apud Jacq. coll. 2. p.* 26.

aureus. 13. L. foliis runcinatis, caule subunifolio, calice hispido. *Hall. hist. stirp. Helv. t.* 24.

tuberosus. 14. L. foliis runcinatis scabris, calice acuto hirsuto. *Lob. ic.* 232.

megalo- rhizos. 15. L. scapo piloso, squamis calicinis ad apicem gibbis, foliis ciliato-pinnatifidis glabris. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 216. *an hujus generis et tribus?*

danubia- lis. 16. L. scapo unifloro, foliis pinnatifidis calicibusque glabris. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 336.

913. HIERACIUM. *Recept.* (utplurimum) nudum. *Cal.* imbricatus, ovatus, interdum caliculatus. *Pappus* utplurimum sessilis, capillaris (rarius plumosus.)

* *scapo nudo.*

† *unifloro.*

⊢ *receptaculo villoso, pappo plumoso,* Apargia Scopoli.

incanum. 1. H. foliis integerrimis subdenticulatis lanceolatis scabris. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 287.

⊢⊢ *receptaculo laevi, pappo simplici.*

venosum. 2. H. foliis cuneiformibus hirtis, scapo crassissimo erecto.

Pilosella. 3. H. foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus. *Blackw. herb. t.* 365.

alpinum. 4. H. foliis oblongis integris dentatis, scapo subnudo, calice piloso. *Flor. dan. t.* 27.

taraxaconis. 5. H. foliis lanceolatis dentatis glabris, scapo subnudo, calice hirsuto. *Allion. flor. pedem.* 1. *t.* 31. *f.* 1.

alpestre. 6. H. foliis lanceolatis dentatis glabris, scapo subunifolio subunifloro, calice hirsuto cylindrico. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 191.

pumilum. 7. H. foliis ovatis: petiolis dilatatis, scapis subunifloris. *Mant. p.* 279. *Gouan. ill. t.* 22. *f.* 3. *idem cum crepide pygmaea.*

†† *scapo multifloro.*

dubium. 8. H. foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus.

Auricula. 9. H. foliis integerrimis lanceolatis, stolonibus repentibus.

praemorsum. 10. H. foliis ovatis subdentatis, scapo ramoso, floribus superioribus primoribus. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 13. *f.* 2.

capense. 11. H. foliis oblongis dentatis scabris, pedunculis inferioribus altioribus.

sanctum. 12. H. foliis lyratis obtusis dentatis. *Tabernaem. Kraeuterb. p.* 183.

cymosum. 13. H. foliis lanceolatis integris pilosis, scapo subnudo basi piloso, floribus subumbellatis. *Flor. dan. t.* 810.

Gmelini. 14. H. caule paniculato, foliis radicalibus ovatis serratis glabris. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 8. *f.* 2.

aurantiacum. 15. H. foliis integris, caule subnudo simplicissimo piloso corymbifero. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 410.

Gronovii. 16. H. foliis radicalibus obovatis integerrimis pilosis, caule paniculato subnudo.

lactucaceum. 44. H. foliis oblongis integris subdentatis scapo simplici, floribus racemosis caliculatis, squamis calicinis glabris. *J. G. Gmelin flor. sib.* 2. *p.* 32. *t.* 13. *f.* 2.

staticefolium. 17. H. foliis lanceolato-linearibus obsolete denticulatis obtusis, scapo ramoso, pedunculis longissimis unifloris superne squamosis. *Allion. flor. pedem. p.* 214. *t.* 81. *f.* 2.

incarnatum. 18. H. foliis hirsutis obovato-oblongis repando-denticulatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 127.

** *caule folioso.*

† *pappo stipitato.*

stipitatum. 19. H. caule subunifolio ramoso, foliis dentatis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 293.

†† *pappo sessili.*

pontanum. 20. H. caule subunifloro. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 526. Hypochaeris montana. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 190.

humile. 21. H. caule paucifloro, foliis inferioribus hirsutis et incisis vix altiore. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 189.

fabaudum. 22. H. caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semiamplexicaulibus. *Flor. dan. t.* 872.

hispidum. 23. H. foliis oblongo-lanceolatis subdentatis subtus cauleque erecto hispidis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 216.

echioides. 47. H. caule erecto, foliis sparsis lanceolatis pilosis rigidis subdentatis, floribus subumbellatis. *Lommizer flor. poson. p.* 348. *n.* 782.

Kalmii. 24. H. caule erecto multifloro, foliis lanceolatis dentatis, pedunculis tomentosis.

paniculatum. 25. H. caule erecto, foliis alternis lanceolatis nudis dentatis, panicula capillari.

paludosum. 26. H. caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calicibus hispidis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 47.

lyratum. 27. H. caule multifloro, foliis lyratis glabris, calice pedunculisque hispidis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 9.

porrifolium. 28. H. caule ramoso, foliis lanceolato-linearibus subintegerrimis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 286.

chondrilloides. 29. H. caule ramoso, foliis caulinis elongato-dentatis glabris: radicalibus lanceolatis integris. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 429.

murorum. 30. H. caule ramoso, foliis radicalibus ovatis dentatis: caulino minori. *β*) *Blackw. herb. t.* 538.

Sprengerianum. 31. H. caule ramoso, foliis semiamplexicaulibus oblongis repandis hispidis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 17.

aurimontanum. 45. H. caule pauciflore sulcato, foliis amplexicaulibus laxe dentatis patulis basi hastatis, calicibus villosis: squamis linearibus. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 332.

undulatum. 46. H. caule ramoso, foliis ellipticis dentatis undulatis pilosis: pilis plumosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 124.

villosum. 32. H. caule ramoso, foliis hirsutis: radicalibus lanceolato-ovatis dentatis; caulinis amplexicaulibus cordatis. *Jacq. fl. austr.* 1. *t.* 27.

amplexicaule. 33. H. caule ramoso, foliis amplexicaulibus cordatis subdentatis, pedunculis unifloris hirsutis. *Kniph. bot. orig. cent.* 12. *n.* 56.

cerinthoides. 34. H. foliis radicalibus obovatis denticulatis: caulinis oblongis semiamplexicaulibus. *Gouan. illustr. t.* 22. *f.* 4.

pyrenaicum. 35. H. foliis amplexicaulibus obovato-lanceolatis retrorsum dentatis, caule simplici, calicibus laxis.

blattarioides. *β*) H. foliis lanceolatis dentatis, floribus solitariis. *Sp. pl. p.* 1130.

pilosum. *γ*) H. caule piloso, foliis dentato-sinuatis. *Sp. pl. p.* 1115. Picris pyrenaica. *Herm. parad. lugdb. p.* 184. *ic.*

austriacum. *δ*) H. foliis oblongis denticulatis, calicibus hispidis. *Jacq. fl. austr.* 5. *t.* 441.

helveticum. *ε*) H. foliis minute serratis acutis.

36. H.

molle. 36. H. foliis lanceolatis ſubintegerrimis mollibus: inferioribus petiolatis, floribus pedunculis ſubcorymboſis. *Jacq. fl. auſtr.* 2. *t.* 119.

umbellatum. 37. H. foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. *Flor. dan. t.* 680. *β*) Hieracium glabrum. *Krock. flor. ſileſ.* 2. 2. *p.* 316.

glutinoſum. 38. H. foliis lanceolatis runcinatis ſcabriuſculis, floribus umbellatis.

viroſum. 39. H. foliis ſeſſilibus cordato-lanceolatis ſubintegerrimis, caule ſimplici, thyrſo terminali. *Pallas it.* 1. *p.* 501. *n.* 125.

ſquamoſum. 40. H. foliis radicalibus pinnatis, caulibus ſulcatis, ramis ſquamatis. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 9.

flexuoſum. 41. H. foliis radicalibus oblongis acuminatis viſcido-tomentoſis, caule ſimplici lanato. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 9.

dichotomum. 42. H. foliis radicalibus oblongis acuminatis ſinuatis lanatis, caule teretiuſculo dichotomo. *S. G. Gmelin it.* 1. *p.* 9.

rhomboidale. 43. H. foliis radicalibus rhomboideis petiolatis laevibus: caulinis amplexicaulibus, pedunculis calicibusque villoſis. *Lapeirouſe act. toloſ.* 1. *p.* 215. *t.* 18.

914. CREPIS. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus: exterior deciduus. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus. ✓

alpina. 1. Cr. involucris ſcarioſis longitudine calicis, floribus ſolitariis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 5.

veſicaria. 2. Cr. involucris ſcarioſis longitudine calicis, floribus corymboſis, bracteis ovatis. *β*) *Col. ecphr.* 1. *p.* 237. *ic.*

barbata. 3. Cr. involucris calice longioribus: ſquamis ſetaceis ſparſis. *Curtis bot. magaz. t.* 30.

pygmaea. 4. Cr. foliis ovatis integris villoſis petiolatis, caule procumbente. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 14.

ſibirica. 5. Cr. foliis amplexicaulibus oblongis rugoſis inferne dentatis, caule hirto, calicibus carina ciliatis. *Gmel. fl. ſib.* 2. *t.* 10.

rhagadioloides. 6. Cr. foliis integris amplexicaulibus oblongis, calicibus interioribus toroſo-articulatis hiſpidis: foliolis cymbiformibus. *Mant. p.* 108.

pulchra. 7. Cr. foliis ſagittatis denticulatis, caule paniculato, floribus pyramidatis glabris. *β*) *Col. ecphr.* 1. *p.* 249. *ic.*

filiformis. 22. Cr. foliis lineari-filiformibus integerrimis glabris, pappo ſeſſili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 128.

rigens. 28. Cr. foliis oblongis duplicato-ſerratis ſetoſis, caule nudo ramoſo, floribus paniculatis, calicibus cylindricis glabris, pappo ſeſſili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 127.

aſpera. 8. Cr. foliis dentatis: inferioribus ovatis auriculatis; ſuperioribus ſagittatis, caule ſetis rigidis ſparſis.

radicata. 9. Cr. foliis ſinuatis dentatis ciliatis radicalibus, caulibus proſtratis multifloris. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 145.

tectorum. 10. Cr. foliis lanceolato-runcinatis ſeſſilibus laevibus: inferioribus dentatis. *Flor. dan. t.* 501.

rubra. 11. Cr. foliis amplexicaulibus lyrato-runcinatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 36.

Dioſcoridis. 12. Cr. foliis radicalibus runcinatis: caulinis haſtatis, calicibus ſubtomentoſis.

neglecta. 13. Cr. foliis amplexicaulibus runcinatis dentatis ſubpiloſis, caule paniculato, calicibus inermi-ſubſpinoſis. *Mant. p.* 107.

virens. 14. Cr. foliis runcinatis glabris amplexicaulibus, calicibus ſubtomentoſis.

biennis. 15. Cr. foliis runcinato-pinnatifidis ſcabris: baſi ſuperne dentatis, calicibus muricatis. *Bauh. hiſt. pl.* 2. *p.* 1025. *ic.*

burſifolia. 16. Cr. foliis pinnatifidis crenatis, ſcapo nudo pauciflore. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 106. *et* 112.

hieracioides. 17. Cr. caule ſimplici, foliis oblongis dentatis: ſuperioribus amplexicaulibus; inferioribus petiolatis, petiolis dentatis, pappo ſeſſili. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 24. *t.* 9.

ſucculenta. 23. Cr. foliis pinnatifidis dentatisve ſubcarnoſis laevibus, calicibus ſubtomentoſis, pappo ſeſſili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 128.

foetida. 18. Cr. foliis runcinato pinnatis hirtis: petiolis dentatis, receptaculo piloſo, ſeminum radii, pappo ſeſſili. *Magn. flor. monſp. p.* 128. *ic. an hujus generis?*

albida. 19. Cr. foliis runcinato-dentatis ſubincanis, pedunculis nudis uniflоris, ſquamis calicis margine albidis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 81. *Allion. flor. pedem.* 1. *t.* 32. *f.* 3. *an hujus generis?*

arenoſa. 20. Cr. hirta, foliis elliptico-lanceolatis dentatis decurrentibus: caulinis ſeſſilibus, pappo ſimplici ſeſſili. *Scop. ann. hiſt. nat.* 2. *p.* 59. *an hujus generis?*

21. Cr.

patula. 21. Cr. foliis inferioribus lyratis obtusis, caule subnudo laxe ramoso. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 227.

915. ANDRYALA. *Recept.* villosum. *Cal.* multipartitus, subaequalis, rotundatus. *Pappus* capillaris, calicis longitudine.

integrifolia. 1. A. foliis inferioribus runcinatis: superioribus ovato-oblongis tomentosis. *β)* Andryala sinuata. *Sp. pl. p.* 1137.

cheiranthifolia. 2. A. foliis runcinatis: summis lanceolatis integris; villo glandulifero. *Herit. stirp. nov.* 2. *p.* 35. *t.* 18.

pinnatifida. 3. A. foliis tomentosis pinnatifidis, calicibus tomentosis pilosis: pilis rigidiusculis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 129.

crithmifolia. 4. A. foliis pinnatis linearibus tomentosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 129.

ragusina. 5. A. foliis lanceolatis indivisis denticulatis acutis tomentosis, floribus solitariis. *Mill. h. angl. t.* 146. *f.* 2.

lanata. 6. A. foliis oblongo-ovatis subdentatis lanatis, pedunculis ramosis. *Mill. h. angl. t.* 146. *f.* 1.

nigricans. 7. A. foliis inferioribus lyrato-pinnatis, pedunculis ramosis, tomento superne nigricante. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 228.

uniflora. 8. A. foliis glabris integris dentatis oblongo-acutis, scapo unifloro. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 342.

916. HYOSERIS. *Recept.* nudum. *Cal.* subaequalis. *Pappus* sessilis paleaceo-aristatus, capillari cinctus, aut ejus loco caliculus, capillarem pappum includens.

* *scapo nudo unifloro.*

foetida. 1. H. foliis pinnatifidis, seminibus nudis. *Michel. nov. pl. gen. t.* 28.

radiata. 2. H. foliis glabris runcinatis: angulis dentatis, apice laciniatis. *Pluckn. alm. t.* 37. *f.* 2.

3. H.

lucida. 3. H. foliis subcarnosis runcinatis angulatis dentatis. *Mant.* *p.* 108. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 150.

virginica. 4. H. foliis lanceolatis lyratis glabris.

scabra. 5. H. foliis scabris, seminibus papposis. *Bocc. mus.* 2. *t.* 106.

caliculata. 6. H. foliis runcinatis, scapis subhirsutis, calice caliculato. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 229.

carolinia-na. 7. H. foliis lyratis apice truncatis hirsutis. *Walt. flor. carol.* *p.* 194.

major. 8. H. foliis integris ensiformibus laevibus. *Walt. flor. carol.* *p.* 194.

minor. 9. H. foliis ovatis dentatis, scapo bifloro. *Walt. flor. carol.* *p.* 194.

pygmaea. 10. H. foliis spatulatis dentatis ciliatis, pappo stipitato plumoso. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 130.

** *caule diviso nudo.*

minima. 11. H. pedunculis incrassatis. *Flor. dan. t.* 201.

*** *caule folioso ramoso.*

Hedypnois. 12. H. fructibus ovatis glabris. *Lob. ic. p.* 239.

rhagadioloides. 13. H. fructibus ovatis pilosis. *Kniph. bot. orig. cent.* 5. *n.* 44.

cretica. 14. H. fructibus ovatis scabris. *Scop. del. inf.* 1. *t.* 16.

917. SERIOLA. *Recept.* paleaceum. *Cal.* simplex. *Pappus* capillaris stipitatus.

laevigata. 1. S. laeviuscula, foliis obovatis dentatis.

aethnensis. 2. S. hispida, foliis obovatis subdentatis. *Jacq. obs. bot.* 4. *t.* 79. *Calix subcaliculatus. Pappus subplumosus.*

urens. 3. S. urens, foliis dentatis, caule ramoso.

pretensis. 4. S. hirta, foliis runcinatis.

918. HYPOCHOERIS. *Recept.* paleaceum. *Cal.* subimbricatus. *Pappus* plumosus stipitatus.

helvetica. 1. H. caule simplici folioso unifloro, foliis lanceolatis dentatis. *Jacq. misc.* 2. *p.* 25. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 4.

maculata. 2. H. caule subnudo: ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Flor. dan. t.* 149.

glabra. 3. H. glabra, caule ramoso nudo, foliis dentato-sinuatis, calicibus oblongis imbricatis. *Flor. dan. t.* 424.

radicata. 4. H. caule ramoso nudo laevi, foliis runcinatis obtusis scabris, pedunculis squamosis. *Flor. dan. t.* 150.

minima. 5. H. caule superius squamoso, foliis sinuato-lyratis. *Cyrill. pl. rar. Neap. fasc.* 1. *t.* 10.

919. LAPSANA. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus: squamis singulis interioribus canaliculatis.

communis. 1. L. calicibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Flor. dan. t.* 500.

zacintha. 2. L. calicibus fructus torulosis depressis obtusis sessilibus.

stellata. 3. L. calicibus fructus undique patentibus: radiis subulatis rectis, foliis caulinis lanceolatis indivisis.

Koelpinia. 4. L. calicibus fructus undique patentibus: radiis subulatis incurvis echinatis, foliis caulinis lanceolatis indivisis. *Suppl. p.* 348. *Pallas it.* 3. *p.* 755. *t.* Ll. *f.* 2.

Rhagadiolus. 5. L. calicibus fructus undique patentibus: radiis subulatis, foliis lyratis. *Kniph. bot. orig. cent.* 4. *n.* 36. *an mera varietas?*

920. CATANANCHE. *Recept.* paleaceum. *Cal.* imbricatus. *Pappus* aristatus, caliculo 5feto.

caerulea. 1. C. squamis calicis inferioribus ovatis.

lutea. 2. C. squamis calicis inferioribus lanceolatis. *Bocc. mus.* 2. *t.* 7.

3. C.

graeca. 3. C. foliis inciſis. *Tournef. it.* 1. *p.* 223. *ic. an luteae varietas?*

921. CICHORIUM. *Recept.* ſubpaleaceum. *Cal.* caliculatus. *Pappus* ſubquinquedentatus, obſolete piloſus.

Intybus. 1. C. floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* W. 9.

Endivia. 2. C. floribus ſolitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Regn. bot. t.* 238. *β*) Cichorium pumilum. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 80.

ſpinoſum. 3. C. caule dichotomo ſpinoſo, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Bauh. prodr. theatr. bot. p.* 62. *ic.*

922. SCOLYMUS. *Recept.* paleaceum. *Cal.* imbricatus ſpinoſus. *Pappus* o.

maculatus. 1. Sc. floribus ſolitariis. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 85.

hiſpanicus. 2. Sc. floribus congeſtis. *Mill. h. angl. t.* 229.

angioſperm. 3. Sc. paleis receptaculi in membranacea ſeminum conceptacula abeuntibus.

923. ARCTIUM. *Cal.* globoſus: ſquamis apice hamis inflexis.

Lappa. 1. A. foliis cordatis inermibus petiolatis. *Flor. dan. t.* 642.

Perſonata. 2. A. foliis decurrentibus ciliato-ſpinoſis: radicalibus pinnatis; caulinis oblongo-ovatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 348. *an cardui potius ſpecies?*

Carduelis. 3. A. foliis pinnatifidis aculeatis. *Mant. p.* 108. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *t.* 53.

924. SERRATULA. *Cal.* ſubcylindricus, imbricatus, muticus.

tinctoria. 1. S. foliis lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, floſculis conformibus. *Flor. dan. t.* 281.

2. S.

coronata. 2. S. foliis lyrato-pinnatifidis: pinna terminali maxima, floſculis radii femineis longioribus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 20.

japonica. 3. S. foliis lyrato-pinnatifidis ſcabris, ſquamis calicis apice dilatatis membranaceis. *Thunb. flor. jap. p.* 305.

centauroides. 4. S. foliis pinnatifidis obliquis acutis glabris inermibus, ſquamis calicis mucronatis: interioribus ſcarioſis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 17.

ſpinoſa. 5. S. foliis glabris, caule dichotomo fruticoſo ſpinoſo. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 217.

alpina. 6. S. foliis indiviſis, calicibus ſubhirſutis ovatis. *Flor. dan. t.* 37.

caſpia. 7. S. foliis oblongis ſubacutis ſeſſilibus integerrimis carnoſis. *Pallas it.* 2. *p.* 743. *t.* Z.

glauca. 8. S. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis, floribus corymboſis, calicibus ſubrotundis. *Dill. h. Elth. t.* 262. *f.* 341.

novebora-cenſis. 9. S. foliis lanceolato-oblongis ſerratis pendulis. *Dill. h. Elth. t.* 263. *f.* 342. *an cum glauca diſtincti generis?*

praealta. 10. S. foliis lanceolato-oblongis ſerratis patentibus ſubtus hirſutis. *Mill. h. angl. t.* 234.

amara. 11. S. foliis lanceolatis, ſquamis calicis apice ſcarioſis obtuſis patulis coloratis, floribus terminalibus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 29.

ſcarioſa. 12. S. foliis lanceolatis integerrimis, calicibus ſquarroſis pedunculatis obtuſis lateralibus. *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 4.

multiflora. 13. S. foliis lanceolatis ſubtus villoſis ſubdecurrentibus integerrimis, caule corymboſo, calicibus cylindricis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 28?

ciliata. 19. S. foliis lanceolatis integris ſeſſilibus ſpinuloſo-ciliatis ſubtus tomentoſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 67.

ſalicifolia. 14. S. foliis lineari-lanceolatis alternis ſubtus incanis ſeſſilibus integerrimis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 27.

piloſa. 15. S. foliis linearibus piloſis, floribus axillaribus longe pedunculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 138.

ſquarroſa. 16. S. foliis linearibus, calicibus ſquarroſis ſubſeſſilibus acuminatis lateralibus. *Dill. h. Elth. t.* 71. *f.* 82.

ſpicata. 17. S. foliis linearibus baſi ciliatis, floribus ſeſſilibus lateralibus ſpicatis, caule ſimplici. *Dill. h. Elth. t.* 72. *f.* 83. *an cum ſquarroſa diſtincti generis?*

arvenſis. 18. S. foliis dentatis ſpinoſis. *Flor. dan. t.* 644. *Regnault bot. t.* 240.

925. CARDUUS. *Cal.* ventricoſus, imbricatus: ſquamis ſpinoſis. *Recept.* piloſum.

* *foliis decurrentibus.*

leucographus. 1. C. foliis dentatis ſpinoſis, pedunculis nudis longiſſimis uniflоris, calicibus ſpinoſis inclinatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 23.

paluſtris. 2. C. foliis dentatis margine ſpinoſis, floribus racemoſis erectis, pedunculis inermibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 32. *f.* 13.

peregrinus. 3. C. foliis ſinuatis ſpinoſis ſubtus tomentoſis, pedunculis nudis multifloris tomentoſis, calicibus ſpinoſis deciduis. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 27.

criſpus. 4. C. foliis ſinuatis margine ſpinoſis, floribus aggregatis terminalibus: ſquamis calicis inermibus ſubariſtatis patulis. *Mant. p.* 461. *Flor. dan. t.* 621.

acanthoides. 5. C. foliis ſinuatis margine ſpinoſis, calicibus pedunculatis ſolitariis erectis villoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 249.

polyanthemus. 6. C. foliis ſinuatis ciliatis ſubtus nudis, floribus pedunculatis congeſtis. *Mant. p.* 109. *Triumf. obſ. p.* 103. *ic.*

pycnocephalus. 7. C. foliis pinnatifido-ſinuatis pubeſcentibus ſpinoſis, pedunculis nudis tomentoſis, calicibus deciduis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 44.

lanceolatus. 8. C. foliis pinnatifidis hiſpidis: laciniis divaricatis, calicibus ovatis ſpinoſis villoſis, caule piloſo. *Tabern. Kraeuterb. p.* 699. *ic.*

arabicus. 9. C. foliis pinnatifidis lanuginoſe villoſis: laciniis divaricatis, calicibus oblongis ſpinuloſis ſeſſilibus aggregatis. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 56. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 95.

cyanoides. 10. C. foliis pinnatifidis linearibus integerrimis inermibus petiolatis ſubtus tomentoſis. α) *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 15. β) *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 16. γ) *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 24.

ſpinoſiſſimus. 42. C. foliis pinnatifidis amplexicaulibus angulato-ſpinoſis ſubtus tomentoſis, floribus pedunculatis aggregatis. *Walt. flor. carol. p.* 194.

carolinianus. 43. C. foliis haſtato-pinnatifidis amplexicaulibus ſpinoſo-ciliatis ſubtus tomentoſis, calicibus aphyllis. *Walt. flor. carol. p.* 195.

auſtralis. 11. C. foliis runcinatis ſpinoſis, calicibus ſubſeſſilibus terminalibus. *Suppl. p.* 348.

argentatus. 12. C. foliis runcinatis ſpinoſis, pedunculis ſubtomentois unifloris, calicibus ovatis mucronatis inermibus. *Mant. p.* 280. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 192.

pectinatus. 13. C. foliis lanceolatis pinnatifido-pectinatis, pedunculis longiſſimis, floribus defloratis cernuis. *Mant. p.* 279.

canus. 14. C. foliis lanceolatis eroſo-dentatis ciliato-aculeatis utrinque arachnoideo-ſubvilloſis. *Mant. p.* 108. *Jacq. for. auſtr.* 1. *t.* 42. 43.

defloratus. 15. C. foliis lanceolatis ſerratis ſubſpinoſo-ciliatis nudis, pedunculis longiſſimis lanuginoſis unifloris. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 89.

monſpeſſulanus. 16. C. foliis lanceolatis ſubrepandis glabris inaequaliter ciliatis, pedunculis alternis, calicibus inermibus.

carlinaefolius. 46. C. foliis decurrentibus ſpinoſis glabris, pedunculis erectis unifloris inermibus. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 67.

carlinoides. 47. C. foliis decurrentibus pinnatifidis tomentoſis: laciniis palmatis ſpinoſis, floribus glomeratis. *Gouan. illuſtr. p.* 62. *t.* 23.

paniculatus. 48. C. foliis ſemidecurrentibus dentato-ſinuatis ſpinoſis glabris, floribus paniculatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 68.

diſſectus. 17. C. foliis lanceolatis: denticulis inermibus, calicibus ſpinoſis. *Lob. ic. p.* 583.

pannonicus. 18. C. foliis ſemidecurrentibus nudis indiviſis ciliatis, flore ſubſolitario. *Suppl. p.* 348. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 127.

nutans. 19. C. foliis ſemidecurrentibus ſpinoſis, floribus cernuis: ſquamis calicis ſuperne patentibus. *Flor. dan. t.* 675.

chius. 20. C. foliis amplexicaulibus ſemipinnatifidis ciliato-ſpinuloſis: inferioribus ſemidecurrentibus, caule inermi, pedunculis unifloris. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 5.

tuberoſus. 21. C. foliis ſubdecurrentibus petiolatis ſubpinnatifidis ſpinoſis, caule inermi, floribus ſolitariis. *Mant. p.* 461. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 29. *f.* 27. 28.

parviflorus. 22. C. foliis baſi adnatis lanceolatis nudis eroſis ciliato-ſpinuloſis inermibus. *Mant. p.* 279.

** *foliis ſeſſilibus.*

panicula-tus. 44. C. foliis ſemidecurrentibus oblongo-lanceolatis inaequaliter ciliatis glabris: inferioribus lyratis undulatis, floribus paniculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 143.

rigens. 45. C. foliis oblongo-lanceolatis glabris margine ſpinoſis pinnatifidis: laciniis obliquis lobatis, calicibus oblongis bracteatis. *la Chenal act. helv.* 4. *p.* 294. *t.* 16.

linearis. 23. C. foliis linearibus ciliato-ſpinoſis glabris, floribus terminalibus ſolitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 305.

Caſeboiae. 24. C. foliis lanceolatis integerrimis: margine ſpinis ternatis. *Lob. ic. p.* 486. *f.* 1.

flaveſcens. 25. C. foliis lanceolatis integris inermibus dentatis glabris, floribus aphyllis inermi-ſpinoſis.

ſtellatus. 26. C. foliis lanceolatis integris inermibus ſubtus tomentoſis, ſpinis ramoſis axillaribus, floribus ſeſſilibus lateralibus. *Triumf. obſ. p.* 96. *ic.*

virginianus. 27. C. foliis lanceolatis ſpinuloſis ſubtus tomentoſis, caule inermi folioſo unifloro. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 99.

rivularis. 28. C. foliis inferne pinnatifidis: laciniis oblongis, ſuperne integris ſerratisque inermi-ſpinuloſis, caule inermi, floribus capitatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 91.

mollis. 29. C. foliis pinnatifidis linearibus ſubtus tomentoſis, caule inermi unifloro. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 18.

altiſſimus. 30. C. foliis pinnatifidis ſinuatis ſerratis inermibus, caule ramoſiſſimo, calicibus villoſis ſubſerratis. *Dill. h. Elth. t.* 69. *f.* 80.

eriophorus. 31. C. foliis bifariam pinnatifidis: laciniis alternis erectis, calicibus globoſis villoſis. *Mill. h. angl. t.* 293. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 171.

Boujarti. 32. C. foliis bifariam pinnatifidis ſubtus tomentoſis ſpina terminatis, calicibus ovatis erectis terminalibus. *Dill. et Mitterpach. it.* 1. *p.* 143. *t.* 13.

ſerratuloides. 33. C. foliis ſubamplexicaulibus lanceolatis integris: ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis, pedunculis unifloris. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 36. *f.* 2.

ciliatus. 34. C. foliis ſemiamplexicaulibus pinnatifidis laciniatis ſpinoſis ſubtus tomentoſis, calicis ſquamis ciliatis baſi reflexis. *Murray comm. Goett.* 1784. *p.* 35. *t.* 5.

35. C.

marianus. 35. C. foliis amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calicibus aphyllis: ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* M. 3.

ſyriacus. 36. C. foliis amplexicaulibus angulato-ſpinoſis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus obvallatis, foliolis ſubquinis. *Camer. hort. t.* 10.

hetero-phyllus. 37. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatisque, caule ſubunifloro, calice inermi. *Flor. dan. t.* 109. *an cum helenioide in unam ſpeciem conjungendus?*

gnaphaloides. 46. C. foliis ſubverticillatis lanceolatis integerrimis ſubtus tomentoſis. *Cyrill. pl. rar. Neap. faſc.* 1. *t.* 9.

helenioides. 38. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis: ſpinulis inaequalibus ciliatis, caule inermi. *Hall. hiſt. ſtirp. helv. t.* 7. *Mill. h. angl. t.* 94.

tataricus. 39. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis: ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis, floribus triphyllis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 90.

ſcaber. 40. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis dentato-ſpinoſis ſupra ſcabris, ſubtus tomentoſo-albis, calice inermi. *Poir. voy. en Barbar.* 2. *p.* 231.

acaulis. 41. C. acaulis, calice glabro. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 18.

926. CNICUS. *Cal.* ovatus, imbricatus: ſquamis ramoſo-ſpinoſis, (ſaepe) obvallatus bracteis. *Corollulae* aequales.

ſpinoſiſſimus. 1. Cn. foliis amplexicaulibus ſinuato-pinnatis ſpinoſis, caule ſimplici, floribus ſeſſilibus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 25.

oleraceus. 2. Cn. foliis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, bracteis concavis integris ſubcoloratis. *Flor. dan. t.* 860.

Eriſithales. 3. Cn. foliis amplexicaulibus pinnatifidis ariſtato-ſerratis, pedunculis cernuis, calicibus glutinoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 310.

dubius. 4. Cn. foliis pinnatifidis petiolatis: laciniis trilobis margine ſpinoſis, calice cylindrico glabro, caule villoſiſſimo folioſo. *Willden. prodr. fl. berol. n.* 801.

uniflorus. 5. Cn. foliis pinnatifidis, calice ſcarioſo villoſo. *Mant. p.* 572. *Gmel. flor. ſil.* 2. *t.* 38.

centauroides. 6. Cn. foliis pinnatifidis, calicibus ſcarioſis: ſquamis acuminatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 25. *f.* 2.

ferox. 7. Cn. foliis decurrentibus ligulatis dentato-spinosis, caule ramoso erecto. *Mant. p.* 109.

Acarna. 8. Cn. foliis decurrentibus lanceolatis indivisis, calicibus pinnato-spinosis.

pygmaeus. 9. Cn. foliis sessilibus sublinearibus confertissimis, calice inermi. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 440.

cernuus. 10. Cn. foliis cordatis: petiolis crispis spinosis amplexicaulibus, floribus cernuis: calicibus scariosis. *Gmel. flor. sibir.* 2. *t.* 19. *Mill. h. angl, t.* 248.

927. ONOPORDON. *Recept.* favosum. *Cal.* ventricosus: squamae mucronatae.

Acanthium. 1. O. calicibus squarrosis: squamis patentibus, foliis ovato-oblongis sinuatis. *Loes. flor. pruss. t.* 82.

illyricum. 2. O. calicibus squarrosis: squamis inferioribus uncinatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 148.

graecum. 3. O. calicibus squarrosis arachnoideo-tomentosis, foliis spinosis subulato-lanceolatis sinuatis tomentosis. *Suppl. p.* 349.

deltoides. 4. O. calicibus squarrosis arachnoideo-tomentosis, foliis petiolatis ovatis angulatis subtus tomentosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 146.

arabicum. 5. O. calicibus imbricatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 149.

acaulon. 6. O. acaule.

928. CYNARA. *Cal.* ventricosus, imbricatus: squamis carnosis emarginatis cum acumine.

humilis. 1. C. foliis spinosis pinnatifidis subtus tomentosis, calicis squamis subulatis. *Pluckn. alm. t.* 81. *f.* 2.

horrida. 2. C. foliis pinnatifidis subtus tomentosis spinosis: spinis baseos foliorum pinnarumque basi connatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 148.

Cardunculus. 3. C. foliis spinosis pinnatifidis, calicis squamis ovatis.

Scolymus. 4. C. foliis subspinosis pinnatis indivisisque, calicis squamis ovatis. *Blackw. herb. t.* 458.

5. C.

integrifolia. 5. C. foliis lanceolatis denticulatis, squamis calicinis lanceolato-acuminatis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 68.

acaulis. 6. C. acaulis, foliis pinnatis inermibus supra glabris. *Till. h. pis. t.* 20.

929. CARLINA. *Cal.* radiatus: squamis marginalibus longis, coloratis.

acaulis. 1. C. caule unifloro flore breviore. *Knorr. del. hort.* 2. *t.* C. 1.

involucrata. 2. C. caule unifloro flore longiore, calice aureo foliis spinosis obvallato. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 234.

lanata. 3. C. caule bifido, calicibus sanguineis terminalibus; primo axillari sessili. *Col. ecphr.* 1. *t.* 27. *f.* 2.

pyrenaica. 4. C. caule multifloro, foliis decurrentibus runcinatis.

vulgaris. 5. C. caule multifloro corymboso, floribus terminalibus: calicum radio albo.

corymbosa. 6. C. caule multifloro subdiviso; floribus sessilibus: calicum radio flavo. *Col. ecphr.* 1. *t.* 27. *f.* 1.

racemosa. 7. C. floribus sessilibus lateralibus pauciſſimis.

atractyloides. 8. C. caule ramoso, calicibus spinis ciliatis.

Xeranthemoides. 9. C. fruticosa ramosa tomentosa, foliis linear-subulatis: serraturis spinascentibus, panicula terminali: radio flavo. *Suppl. p.* 349.

930. ATRACTYLIS. *Cor.* radiatae: corollulis radii 5dentatis.

gummifera. 1. A. flore acauli. *Col. ecphr.* 1. *t.* 12.

humilis. 2. A. foliis dentato-sinuatis, involucro patente, caule herbaceo. *β) Barr. pl. rar. ic. t.* 592.

cancellata. 3. A. involucris cancellatis ventricosis linearibus dentatis, calicibus ovatis, floribus flosculosis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 39. *f.* 16.

Lancea. 4. A. involucris pinnatis, foliis lanceolatis ciliatis glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 306.

ovata. 5. A. involucris pinnatis, foliis ovatis ciliatis glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 306.

oppoſiti-folia. 6. A. foliis oppoſitis. *Mant. p.* 477. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 571. Gorteria fruticoſa. *Pluckn. alm. t.* 273. *f.* 5.

purpurea. 7. A. foliis haſtatis runcinatis. *Suppl. p.* 349.

mexicana. 8. A. foliis oblongis integerrimis. *Suppl. p.* 349.

1419. BARNADESIA. *Cor.* radiata. *Cal.* nudus, imbricatus, pungens. *Pappus* radii plumoſus: diſci ſetoſus, retrofractus.

ſpinoſa. 1. BARNADESIA. *Suppl. p.* 348.

STOKESIA. *Cor.* radiata. *Cal.* foliaceus, ſubimbricatus. *Recept.* nudum. *Pappus* deciduus, filamentoſus.

cyanea. 1. STOKESIA. *Herit. ſert. angl. p.* 28. *t.* 38.

931. CARTHAMUS. *Cal.* ovatus, imbricatus: ſquamis apice ſubovato-foliaceis.

tinctorius. 1. C. foliis ovatis integris ſerrato-aculeatis. *Zornpl. off. ic. t.* 140.

dentatus. 11. C. foliis lanceolato-ovatis ſpinoſo-dentatis, ſquamis calicinis apice dilatatis ſerrato-ciliatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 69. *t.* 17.

carolinianus. 12. C. foliis ſemiamplexicaulibus imtegris ſerrato-aculeatis, floribus ſolitariis. *Walt. flor. carol. p.* 194.

caeruleus. 2. C. foliis lanceolatis ſpinoſo-dentatis, caule ſubunifloro.

ſalicifolius. 3. C. fruticoſus, foliis lanceolatis integris ſubtus tomentoſis apice pungentibus: petiolis ſpinoſis, ramis unifloris. *Suppl. p.* 350.

arborescens. 4. C. foliis enſiformibus ſinuato-dentatis. *Mant. p.* 462.

mitiſſimus. 5. C. foliis inermibus: radicalibus dentatis; caulinis pinnatis.

Cardunccellus. 6. C. foliis caulinis linearibus pinnatis longitudine plantae. *Lob. ic.* 2. *p.* 20.

7. C.

tingitanus. 7. C. foliis radicalibus pinnatis: caulinis pinnatifidis, caule uniflore. *Morif. hift. pl.* 3. *t.* 34. *f.* 19.

lanatus. 8. C. caule pilofo fuperne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis: fummis amplexicaulibus dentatis. *Blackw. herb. t.* 468.

creticus. 9. C. caule laeviufculo, calicibus fublanatis, flofculis fubnovenis, foliis inferioribus lyratis.

corymbofus. 10. C. floribus corymbofis numerofis. *Morif. hift. pl.* 3. *t.* 33. *f.* 17.

1287. SPILANTHES.

Recept. paleaceum, conicum. *Pappus* ariftis 2: altera minore. *Cal.* fubhemifphaericus: fquamis duplici ferie. *Cor.* uniformis, tubulofa.

urens. 1. Sp. foliis lanceolatis integerrimis, caule proftrato. *Jacq. ftirp. amer. pict. t.* 194.

Pfeudo-acmella. 2. Sp. foliis lanceolatis ferratis, caule erecto. *Mant. p.* 475. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 568. Verbefina Pfeudo-acmella. *Seb. muf.* 1. *t.* 10. 11.

uliginofa. 3. Sp. foliis ovato-lanceolatis crenatis, caule erecto dichotomo, pedunculis ternis, floribus radiatis. *Swartz nov. pl. gen. et fp. p.* 110.

Acmella. 4. Sp. foliis ovatis ferratis, caule erecto, floribus radiatis. *Mant. p.* 475. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 568. Verbefina Acmella. *Seb. muf.* 1. *t.* 9. 10.

falivaria. 5. Sp. foliis ovatis obfolete ferratis, caule obliquo flexuofo paniculato. *Murray comm. Goett.* 1783. *t.* 1. *Herit. ftirp. nov.* 1. *t.* 4. *β*) Spilanthus indicans. *Jacq. coll.* 3. *p.* 229.

infipida. 6. Sp. foliis obovatis fubdentatis feffilibus. *Jacq. ftirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 63.

atriplicifolia. 7. Sp. foliis alternis deltoidibus dentatis petiolatis ftipulatis, caule paniculato. *Syft. nat.* XII. 3. *p.* 535. Bidens atriplicifolia.

oleracea. 8. Sp. foliis fubcordatis ferrulatis petiolatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 135.

932. BIDENS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristis erectis, scabris. *Cal.* imbricatus. *Cor.* rarius flosculo uno alterove radiante instructa.

* *foliis simplicibus.*

scandens. 1. B. foliis ovatis acuminatis serratis oppositis, caule scandente fruticoso, floribus oppositis paniculatis ovatis.

nodiflora. 2. B. foliis oblongis integerrimis unidentatis, caule dichotomo, floribus solitariis sessilibus. *Dill. h. Elth. t.* 44. *f.* 52.

verticillata. 3. B. foliis oblongis integris: inferne alternis; superne oppositis, floribus verticillatis.

hirsuta. 4. B. foliis ovato-lanceolatis integris tomentoso-hirsutis oppositis, caule scandente fruticoso, pedunculis oppositis divergentibus multifloris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 110.

minima. 5. B. foliis lanceolatis integerrimis, flore recto solitario basi involucrato bracteis duabus, radice repente. *Flor. dan. t.* 312.

cernua. 6. B. foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, seminibus erectis. *Flor. dan. t.* 841.

tenella. 7. B. foliis linearibus, pedunculis capillaribus, calicibus subtetraphyllis, seminibus erectis quinis.

nivea. 8. B. foliis simplicibus cordato-ovatis acuminatis serratis petiolatis, floribus hemisphaericis pedunculis elongatis, ramis trichotomis. *Dill. h. Elth. t.* 47. *f.* 55. *n.* 3. *β) Dill. h. Elth. t.* 47. *f.* 55. *γ) Dill. h. Elth. t.* 46. *f.* 54.

tripartita. 9. B. foliis trifidis, calicibus subfolioſis, seminibus erectis. *Knorr del. hort.* 2. *t.* B. 1. *f.* 2. *β)* Bidens pumila, caule simplicissimo unifloro, bracteis pluribus, foliis serratis, caule simplici. *Roth. fl. germ.* 1. *p.* 350.

** *foliis compositis.*

bullata. 10. B. foliis ovatis serratis: inferioribus oppositis; superioribus ternatis: intermedio majore. *Arduin. spec.* 2. *t.* 18.

frondosa. 11. B. foliis pinnatis serratis lineatis glabris, seminibus erectis, calicibus frondosis, caule laevi. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 21.

pilosa. 12. B. foliis pinnatis subpilosis, caule geniculis barbatis, calicibus involucro simplici, seminibus divergentibus. *Dill. h. Elth.*

Elth. t. 43. *f.* 51. β) Agrimonia molucca. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 15. *f.* 2.

bipinnata. 13. B. foliis bipinnatis incisis, calicibus involucratis, corollis semiradiatis, seminibus divergentibus. *Herm. parad. lugdb. p.* 123. *ic.*

933. CACALIA.

Recept. nudum. *Pappus* capillaris longissimus. *Cal.* cylindricus, oblongus, basi tantum subcaliculatus.

* *frutescentes.*

papillaris. 1. C. caule fruticoso obvallato spinis petiolaribus truncatis. *Dill. h. Elth. t.* 55. *f.* 63.

Kleinia. 2. C. caule fruticoso composito, foliis lanceolatis planis: petiolorum cicatricibus obsoletis. *Dill. h. Elth. t.* 54. *f.* 2.

odora. 3. C. caule fruticoso a cicatricibus foliorum albo striato ad apicem folioso: foliis lanceolatis. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 146.

pendula. 4. C. caulibus fruticosis descendentibus aphyllis squamatis, pedunculis terminalibus erectis. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 145.

sempervi-va. 5. C. caule fruticoso subdichotomo, foliis carnosis sessilibus lanceolatis confertis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 146.

laciniata. 6. C. caule fruticoso, foliis carnosis pinnatifide laciniatis, caule decumbente articulato. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 77.

repens. 7. C. caule fruticoso, foliis carnosis depressis. *Mant. p.* 110.

carnosa. 32. C. foliis teretiusculis carnosis incurvis, pedunculis terminalibus unifloris nudis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 156.

Ficoides. 8. C. caule fruticoso, foliis carnosis compressis. *Commel. rar. t.* 40.

cuneifolia. 9. C. caule fruticoso, foliis carnosis cuneiformibus. *Mant. p.* 110.

Anteuphorbium. 10. C. caule fruticoso, foliis ovato-oblongis planis: petiolis basi linea triplici deductis. *Dill. h. Elth. t.* 55. *f.* 2. 3.

laurifolia. 11. C. fruticosa glabra, foliis petiolatis ovatis triplinerviis obtusis integerrimis glaberrimis, thyrso terminali, calice tetraphyllo glabro. *Suppl. p.* 351.

appendiculata. 12. C. fruticosa, tomentosa, foliis cordatis ovatis acutis angulatis subtus tomentosis: petiolis appendiculate foliosis. *Suppl. p.* 352. *an potius Cinerariae species?*

tomentosa. 13. C. fruticosa tomentosa, foliis lanceolatis dentatis sessilibus subtus tomentosis. *Suppl. p.* 353.

asclepiadea. 14. C. fruticosa tomentosa, foliis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis supra glaberrimis subtus tomentosis, margine revolutis, paniculis terminalibus. *Suppl. p.* 352.

cordifolia. 15. C. frutescens hirsuta, foliis petiolatis cordato-ovatis nervosis acutis scabris, calice tetraphyllo quadrifloro pubescente. *Suppl. p.* 351.

suffruticosa. 16. C. caule suffruticoso ramoso, foliis linearibus planis sparsis. *Mant. p.* 109. *Ard. spec.* 2. *t.* 19

** *herbaceae.*

Porophyllum. 17. C. caule indiviso, foliis ellipticis subcrenatis. *Pluckn. alm. t.* 161. *f.* 1. *cum ruderali habitu et calice subturbinatis a congeneribus distincta.*

radicans. 18. C. caule repente radicante, foliis tereti-ovatis carnosis. *Suppl. p.* 354.

villosa. 19. C. caule erecto, foliis lyratis: infimis longe petiolatis, subsequis dentatis amplexicaulibus; summis sublanceolatis incisо-serratis, floribus erectis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 347. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 75.

sonchifolia. 20. C. foliis lyratis amplexicaulibus dentatis. *Mant. p.* 463. *Murray comm. Goett.* 1772. *t.* 7.

hastata. 21. C. foliis trilobis acuminatis serratis, floribus nutantibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 66.

scandens. 33. C. caule scandente, foliis sagittatis dentatis: petiolis simplicibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 157.

suaveolens. 22. C. erecta, foliis hastato-sagittatis denticulatis: petiolis superne dilatatis.

incana. 23. C. foliis lanceolatis dentatis.

saracenica. 24. C. foliis lanceolatis serratis decurrentibus.

atriplicifolia. 25. C. foliis subcordatis dentato-sinuatis, calicibus quinquefloris. *Pluckn. alm. t.* 101. *f.* 2.

echinata. 26. C. foliis reniformi-cordatis angulato-dentatis subtus tomentosis, calicis foliolis tuberculatis. *Suppl. p.* 353. *an potius cinerariae species?*

27. C.

alpina. 27. C. foliis reniformi-cordatis acutis denticulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 234.

albifrons. 28. C. foliis cordatis biſerratis acutis ſubtus tomentoſis, ſtipulis oblongis rotundatis. *Suppl. p.* 353. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 235.

ovata. 29. C. foliis ovatis nervoſis utrinque viridibus, calicibus ſubquadrifloris. *Walt. flor. carol. p.* 196.

bipinnata. 30. C. foliis bipinnatis linearibus. *Suppl. p.* 353.

acaulis. 31. C. acaulis, foliis ſemiteretibus, ſcapis unifloris. *Suppl. p.* 353.

934. ETHULIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o.

conyzoides. 1. E. floribus paniculatis. *Linn. fil. dec.* 1. *t.* 1.

Sparganophora. 2. E. floribus ſeſſilibus lateralibus.

ſtruchium. 3. E. floribus ſeſſilibus axillaribus: omnibus trifidis. *Brown. jam. p.* 312. *t.* 34. *f.* 2.

bidentis. 4. E. racemulis ſecundis: calicibus ſubquinqueflori, foliis lanceolatis oppoſitis. *Mant. p.* 110.

divaricata. 5. E. foliis linearibus dentatis decurrentibus, pedunculis oppoſitifoliis unifloris, caule divaricato. *Mant. p.* 110. *et* 572. *Burm. ind. t.* 58. *f.* 1. *an diſtincti generis?*

tomentoſa. 6. E. ſuffruticoſa, foliis linearibus integerrimis tomentoſis. *Mant. p.* 110.

uniflora. 7. E. caule unifloro, foliis linearibus verticillatis. *Walt. flor. carol. p.* 195.

935. EUPATORIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* pluməſus. *Cal.* imbricatus, oblongus. *Stilus* ſemibifidus, longus.

* *calicibus trifloris.*

parviflorum. 1. Eu. fruticoſum, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glabris, corymbis patentibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 111.

2. Eu.

triflorum. 2. Eu. fruticosum, foliis subcordatis subtus incanis, capitulis sessilibus racemosis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 795. *t.* 314.

** *calicibus quadrifloris.*

Dalea. 3. Eu. fruticosum, foliis lanceolatis venosis obsolete serratis glabris. *Brown. jam. t.* 34. *f.* 1.

scandens. 4. Eu. caule volubili, foliis cordatis dentatis acutis. *Pluckn. alm. t.* 163. *f.* 3.

micranthon. 5. Eu. caule volubili, foliis cordatis integerrimis, calicibus tetraphyllis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 797. *t.* 315.

Houstonis. 6. Eu. caule volubili, foliis ovatis integerrimis.

hyssopifolium. 7. Eu. foliis lanceolato-linearibus trinerviis subintegerrimis. *Dill. h. Elth. t.* 114. *f.* 150.

*** *calicibus quinquefloris.*

linearifolium. 46. Eu. foliis linearibus integris subverticillatis, calicibus subquinquefloris. *Walt. flor. carol. p.* 199.

rotundifolium. 8. Eu. foliis sessilibus distinctis subrotundo-cordatis. *Pluckn. alm. t.* 88. *f.* 4.

haſtatum. 9. Eu. foliis cordato-haſtatis subdentatis nudis, caule volubili, floribus spicatis. *Brown. jam. t.* 34. *f.* 3.

zeylanicum. 10. Eu. foliis ovato-haſtatis petiolatis dentatis. *Burm. zeyl. t.* 21.

Murrubium. 40. Eu. foliis ovato-deltoidibus obtuse serratis pubescentibus sessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 199.

fuscо-rubrum. 41. Eu. foliis ovatis utrinque acuminatis petiolatis senis, caule maculato. *Walt. flor. carol. p.* 199.

sinense. 11. Eu. foliis ovatis petiolatis serratis.

pilosum. 42. Eu. foliis lanceolato-ovatis basi obtusis serratis sessilibus, calicibus pilosis. *Walt. flor. carol. p.* 199.

sessilifolium. 12. Eu. foliis sessilibus amplexicaulibus distinctis lanceolatis.

chilense. 13. Eu. foliis oppositis amplexicaulibus lanceolatis denticulatis. *Molin. hist. nat. chil. p.* 188.

album. 14. Eu. foliis lanceolatis serratis, calicis foliolis lanceolatis apice scariosis coloratis. *Mant. p.* 111. *Banks ic. Kaempf. t.* 26.

15. Eu.

altissimum. 15. Eu. foliis lanceolatis nervosis: inferioribus apice subserratis, caule suffruticoso. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 164.

compositifolium. 43. Eu. foliis compositis sublanceolatis. *Walt. flor. carol. p.* 199.

foeniculoides. 44. Eu. foliis compositis linearibus. *Walt. flor. carol. p.* 199.

trifoliatum. 16. Eu. foliis ternis.

japonicum. 17. Eu. foliis indivisis trilobisque serratis, caule scabro. *Thunb. flor. jap. p.* 308.

syriacum. 18. Eu. foliis oppositis subsessilibus ternatis. *Jacq. misc.* 2. *p.* 349. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 35.

cannabinum. 19. Eu. foliis digitatis. *Flor. dan. t.* 745.

**** *calicibus septemfloris.*

cinereum. 20. Eu. foliis oppositis lanceolatis tomentosis. *Suppl. p.* 354.

***** *calicibus octofloris.*

maculatum. 21. Eu. foliis quinis subtomentosis lanceolatis aequaliter serratis venosis petiolatis. *Herm. par. bot. p.* 158. *ic.*

purpureum. 22. Eu. foliis quaternis scabris lanceolato-ovatis inaequaliter serratis petiolatis rugosis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 13. *f.* 4.

scabrum. 23. Eu. villosum, foliis oppositis petiolatis ovatis integriusculis rugosis supra scabris. *Suppl. p.* 354.

rigidum. 24. Eu. foliis petiolatis ovatis acutis serrato-dentatis rigidis subtus scabris, caule subherbaceo. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 111.

nervosum. 25. Eu. foliis elliptico-lanceolatis attenuatis dentatis triplinerviis utrinque glabris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 111.

****** *calicibus quindecim pluribusve floseulis.*

villosum. 26. Eu. foliis oppositis decussatis ovatis acutis subserratis subtus villoso-tomentosis, caule fruticoso. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 257. *t.* 161. *f.* 2. *Floseuli* 8-15.

perfoliatum. 27. Eu. foliis connato-perfoliatis tomentosis. *Pluckn. alm. t.* 87. *f.* 6.

microphyllum. 28. Eu. foliis triangulari-ovatis novemcrenatis subtus tomentosis fusco-venosis, panicula conglomerata terminali, pedunculo elongato. *Suppl. p.* 355.

29. Eu.

aromaticum. 29. Eu. foliis ovatis obtuſe ſerratis petiolatis trinerviis, calicibus ſimplicibus. *Pluckn. alm. t.* 88. *f.* 3.

Ageratoides. 30. Eu. foliis ovatis ſerratis petiolatis, caule glabro. *Suppl. p.* 355. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 537. Ageratum altiſſimum. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 18. *f.* 11.

caeleſtinum. 31. Eu. foliis cordato-ovatis obtuſe ſerratis petiolatis. *Dill. h. Elth. t.* 114. *f.* 139.

incarnatum. 45. Eu. foliis cordato-haſtatis trinerviis obtuſe ſerratis laevibus venoſis petiolatis. *Walt. flor. carol. p.* 200.

molle. 32. Eu. foliis cordatis acutis ſubſerratis petiolatis pubeſcentibus, caule herbaceo tomentoſo. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 111.

montanum. 33. Eu. foliis cordatis acutis denticulatis petiolatis ſcabris ſubtus hirſutis, corymbis patentibus, caule fruticoſo. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 111.

urticaefolium. 34. Eu. hiſpidum, foliis cordatis petiolatis inciſo-ſerratis, panicula terminali, calicibus ſubulatis ſubpungentibus. *Suppl. p.* 354.

cordifolium. 35. Eu. foliis cordatis ſerratis ſubtus tomentoſo-hirſutis: petiolis breviſſimis, corymbis ſubſeſſilibus, calicibus ſquarroſis, caule fruticoſo. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 111.

odoratum. 36. Eu. foliis deltoidibus ſerratis pubeſcentibus. *Pluckn. phyt.* 177. *f.* 3.

ivaefolium. 37. Eu. foliis lineari-lanceolatis trinerviis ſerratis, calicibus ſquarroſis.

ſtoechadifolium. 38. Eu. tomentoſum, foliis petiolatis linearibus crenatis tomentoſis ſubtus canis, panicula terminali. *Suppl. p.* 355.

myoſotifolium. 39. Eu. ſubvilloſum, foliis lanceolatis ſubintegerrimis, pedunculis terminalibus axillaribusque ramoſis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 341. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 45.

936. AGERATUM. *Recept.* nudum. *Pappus* 5ariſtatus. *Cal.* oblongus, ſubaequalis. *Corollulae* 4fidae.

conyzoides. 1. A. foliis ovatis, caule piloſo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 152. *f.* 2.

2. A.

ciliare. 2. A. foliis ovatis crenatis obtusis, caule glabro. *Pluckn. alm.* *t.* 81. *f.* 4.

gujanense. 3. A. foliis cordatis serratis petiolatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 800.

PACURINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* simplex, pilosus. *Cal.* ovatus, imbricatus. *Corollul.* 5fidae.

edulis. 1. Pacurina. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 800. *t.* 316.

937. PTERONIA. *Recept.* paleis multipartitis. *Pappus* subplumosus. *Cal.* imbricatus.

campho-rata. 1. Pt. foliis sparsis ciliatis, calicis foliolis serrulatis. *Mant. p.* 464. *Pluckn. mant. t.* 345. *f.* 56. *n.* 2.

stricta. 2. Pt. foliis sparsis basi subciliatis, calicis foliolis integerrimis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 162.

oppositi-folia. 3. Pt. foliis oppositis, ramis dichotomis divaricatis. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 17. *f.* 3.

flexicau-lis. 4. Pt. foliis filiformibus glabris, calicibus ubtetragonis, ramis brevibus rigidis. *Suppl. p.* 355.

pallens. 5. Pt. foliis filiformibus glabris, calicibus teretibus ovatis, caule ramisque incurvis teretibus. *Suppl. p.* 357.

minuta. 6. Pt. foliis linearibus vagis, floribus axillaribus. *Suppl. p.* 357.

Cephalo-tes. 7. Pt. foliis subulatis conduplicatis carinatis serrulatis, calicibus oblongis terminalibus minutissime laceris. *Suppl. p.* 358.

spinosa. 8. Pt. foliis subulatis spinascentibus pungentibus. *Suppl. p.* 357.

cinerea. 9. Pt. foliis oblongis tomentosis, calicis squamis ovatis membranaceis. *Suppl. p.* 356.

villosa. 10. Pt. foliis lanceolatis obtusis pilosis, squamis calicis ovatis membranaceis. *Suppl. p.* 356.

hirsuta. 11. Pt. foliis lanceolatis patentibus pilosis, caule procumbente, squamis calicis integris. *Suppl. p.* 346.

glabrata. 12. Pt. foliis lanceolatis glabris, squamis calicis ovatis membranaceis. *Suppl. p.* 356.

glomera-ta. 13. Pt. foliis ovato-triquetris glabris, caule tetragono. *Suppl. p.* 356.

14. Pt.

retorta. 14. Pt. foliis ovatis reflexis glabris margine ciliatis scabris, caule erecto, squamis calicis integris. *Suppl. p.* 356.

inflexa. 15. Pt. foliis ovatis pilosis, squamis calicis subarticulatis membranaceis, pedunculo inflexo. *Suppl. p.* 356.

membranacea. 16. Pt. foliis ovatis pulverulento-tomentosis, squamis calicis subulatis margine scariosis. *Suppl. p.* 357.

scariosa. 17. Pt. foliis ovalibus, calicibus scariosis, ramis spinosis. *Suppl. p.* 356.

fasciculata. 18. Pt. floribus fasciculatis unifloseculosis. *Suppl. p.* 357.

carolinia-na. 19. Pt. foliis radicalibus aggregatis gramineis pilosis, paleis receptaculi setis simplicibus. *Walt. flor. carol. p.* 202.

938. STAEHELINA. *Recept.* breviſſime paleaceum. *Pappus* ramosus. *Antherae* caudatae.

gnaphalioides. 1. St. foliis filiformibus tomentosis, squamis calicis apice membranaceis reflexis. *Pluckn. alm. t.* 302. *f.* 3.

dubia. 2. St. foliis linearibus denticulatis, squamis calicis lanceolatis, pappo calicibus duplo longiore. *Gerard. flor. prov. t.* 6.

Chamaepeuce. 3. St. foliis linearibus confertis longissimis revolutis. *Sp. pl. p.* 1147. Serratula Chamaepeuce. *Pluckn. alm. t.* 94. *f.* 3.

elegans. 11. St. foliis lineari-lanceolatis caule erecto tomentoso, floribus spicatis, calicibus quinquefloris. *Swarts flor. carol. p.* 202.

imbricata. 4. St. foliis subulatis erectis tomentosis. *Mant. p.* 281.

corymbosa. 5. St. foliis cuneatis praemorsis, floribus corymbosis. *Suppl. p.* 359.

fruticosa. 6. St. foliis lanceolatis obtusis. *Sp. pl. p.* 1286. Centaurea fruticosa. *Lob. ic.* 548.

ilicifolia. 7. St. foliis oppositis brevissime petiolatis cordatis dentatis supra lucidis subtus tomentosis. *Suppl. p.* 358.

arborescens. 8. St. foliis ovalibus. *Mant. p.* 111. *Schreb. dec.* 1. *t.* 1.

hastata. 9. St. fruticosa, foliis hastatis incanis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 70.

spinosa. 10. St. foliis subulatis spinascentibus: basi utrinque spinula. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 69.

939. CHRYSOCOMA. *Recept.* nudum. *Pappus* papillaris sessilis. *Cal.* hemisphaericus, imbricatus. *Stilus* vix flosculis longior. ✓

* *fruticosae.*

dichotoma. 1. Chr. prolifera dichotoma glabra, foliis linearibus planis serratis scabriusculis, pedunculis corymbosis squamosis hirtis. *Suppl. p.* 359. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 78?

sericea. 2. Chr. albo-sericea, foliis linearibus canaliculatis, ramulis apice paniculatis. *Suppl. p.* 360.

cernua. 3. Chr. foliis linearibus recurvis subscabris, floribus nubilibus cernuis. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 45.

Coma aurea. 4. Chr. foliis linearibus rectis glabris dorso decurrentibus? *Pluckn. alm. t.* 327. *f.* 2.

fruticosa. 22. Chr. foliis cuneiformibus superne subserratis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 280. *t.* 22. *f.* 2.

montana. 23. Chr. foliis oblongis integerrimis, floribus solitariis. *Vahl symb. bot.* 1. *p.* 70.

oppositifolia. 5. Chr. foliis oppositis obovatis, floribus fasciculatis pedunculatis. *Breyn. ic. t.* 17. *f.* 2.

** *suffruticosae.*

scabra. 6. Chr. foliis lanceolato-ovatis recurvis denticulato-serratis, pedunculis pubescentibus. *Dill. h. Elth. t.* 88. *f.* 103.

ciliata. 7. Chr. foliis linearibus rectis ciliatis, ramis pubescentibus. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 48.

patula. 8. Chr. foliis linearibus glabris, ramis divaricatis. *Mant. p.* 280.

tomentosa. 9. Chr. foliis ramisque tomentosis.

*** *herbaceae.*

Linosyris. 10. Chr. foliis linearibus glabris, calicibus laxis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 82. *ic.*

pilosa. 11. Chr. foliis linear-aciculosis, caulequè simplici pilosis, floribus sessilibus subimbricatis spicatis. *Walt. flor. carol. p.* 197.

graminifolia. 12. Chr. foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus corymboſis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 556. *n.* 13. Solidago lanceolata.

biflora. 13. Chr. paniculata, foliis lanceolatis trinerviis punctatis nudis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 82. *f.* 1.

villoſa. 14. Chr. foliis lanceolatis villoſis, calicibus arctis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 82. *f.* 2.

ramoſa. 15. Chr. foliis lanceolatis, caule ſubramoſo pubeſcente, floribus ſubſeſſilibus ſpicatis. *Walt. flor. carol. p.* 198.

paniculata. 16. Chr. foliis lanceolatis adſcendentibus, cauleque viſcoſo ſimplici piloſis, panicula terminali. *Walt. flor. carol. p.* 198.

uniflora. 17. Chr. foliis lanceolatis; pedunculis terminalibus unifloris, caule ramoſo. *Walt. flor. carol. p.* 198.

purpurea. 18. Chr. foliis elliptico-lanceolatis ſubſerratis pubeſcentibus, panicula terminali corymboſa. *Forſt. flor. auſtr. p.* 54.

gigantea. 19. Chr. foliis confertis ſeſſilibus ovato-lanceolatis ſerratis rugoſis utrinque laevibus. *Walt. flor. carol. p.* 196.

odoratiſſima. 20. Chr. foliis radicalibus obovato-oblongis; caulinis oblongo-lanceolatis laevibus, floribus corymboſis. *Walt. flor. carol. p.* 198.

acaulis. 21. Chr. ſubacaulis, foliis dentatis: radicalibus planis ſubovatis; floralibus alternis, remotis lanceolatis. *Walt. flor. carol. p.* 196.

940. TARCHONANTHUS. *Recept.* piloſum. *Pappus* piloſus. *Cal.* iphyllus, ſemiſeptemfidus, turbinatus.

camphoratus. 1. T. foliis oblongis planis, calice quinquefido. *Suppl. p.* 361. *Pluckn. alm. t.* 174. *f.* 1.

glaber. 2. T. foliis glabris integris dentatisque. *Suppl. p.* 361.

ericoides. 3. T. foliis aceroſis, calicibus tetraphyllis. *Suppl. p.* 360. *an hujus generis?*

CHUQUIRAGA. *Recept.* villoſum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* turbinatus, imbricatus polyphyllus.

Juſſieui. 1. CHUQUIRAGA. *Juſſieu gen. plant. p.* 178.

941. CALEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus.

jamaicenſis. 1. C. floribus ſubternis pedunculatis, foliis ovato-oblongis ſubſerratis petiolatis. *Sloan. jam.* 1. *t.* 151. *f.* 3.

leptophylla. 2. C. floribus terminalibus ternis quinisve congeſtis, foliis oblongis imbricatis integerrimis ſeſſilibus, caule fruticoſo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 55.

piniſolia. 3. C. pedunculis terminalibus congeſtis, foliis linearibus aceroſis, caule fruticoſo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 55.

oppoſitifolia. 4. C. corymbis congeſtis, pedunculis longiſſimis, foliis lanceolatis caule herbaceo.

Amellus. 5. C. floribus ſubpaniculatis: calicibus brevibus, ſeminibus nudis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis.

carolinia-na. 6. C. floribus paniculatis, foliis alternis lanceolatis ſubſerratis ſeſſilibus. *Walt. flor. carol. p.* 200.

ſcoparia. 7. C. caule fruticoſo, ramis ſuboppoſitis tetraquetris.

aſpera. 8. C. aſpera, pedunculis terminalibus cauleque tetragonis, foliis petiolatis oppoſitis ſerratis, deltoideis lanceolatisque. *Jacq. coll.* 2. *p.* 290. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 46.

942. SANTOLINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, hemiſphaericus.

Chamaecyparifſus. 1. S. pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Blackw. herb. t.* 346.

roſmarinifolia. 2. S. pedunculis unifloris, foliis linearibus margine tuberculatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 22.

tinctoria. 3. S. pedunculis unifloris, foliis linearibus integerrimis, caulibus ſtriatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 119.

alpina. 4. S. pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caulibus simplicibus. *Mich. nov. pl. gen. t.* 27.

anthemoides. 5. S. pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caule ramosissimo villoso.

fragrantissima. 6. S. corymbis fastigiatis, caule fruticoso diffuso tomentoso, foliis ovatis crenulatis sessilibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 147.

943. ATHANASIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* paleaceus, brevissimus. *Cal.* imbricatus.

* *corolla aequali.*

crenata. 1. A. floribus solitariis terminalibus, foliis linearibus.

capitata. 2. A. floribus terminalibus subsessilibus, foliis lanceolatis hirsutis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 48.

trinervia. 29. A. floribus terminalibus, foliis caulinis alternis ovato-lanceolatis trinerviis. *Walt. flor. carol. p.* 201.

graminifolia. 30. A. pedunculis unifloris, scapo paucifloro, foliis radicalibus gramineis. *Walt. flor. carol. p.* 200.

maritima. 3. A. pedunculis bifloris, foliis lanceolatis crenatis obtusis tomentosis. *Mill. h. angl. t.* 135. *nonne potius ob semina nuda santolinae species?*

obovata. 31. A. pedunculis praelongis, foliis radicalibus obovato-oblongis. *Walt. flor. carol. p.* 201.

haftata. 32. A. caule erecto, foliis haftatis scabris rugosis. *Walt. flor. carol. p.* 201.

paniculata. 33. A. caule erecto, panicula terminali, foliis lanceolatis decurrentibus. *Walt. flor. carol. p.* 201.

pubescens. 4. A. corymbis simplicibus, foliis lanceolatis indivisis villosis. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 47.

annua. 5. A. corymbis simplicibus coarctatis, foliis pinnatifidis dentatis. *Herm. par. Lugdb. p.* 227. *ic.* β) Achillea inodora. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 566.

trifurcata. 6. A. corymbis simplicibus, foliis trilobis cuneiformibus. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 49.

crithmifolia. 7. A. corymbis simplicibus, foliis semitrifidis linearibus. *Mill. h. angl. t.* 227. *f.* 2.

8. A.

linifolia. 8. A. corymbo ſimplici, foliis linearibus. *Suppl. p.* 361.

dentata. 9. A. corymbis compoſitis, foliis recurvis: inferioribus linearibus dentatis; ſuperioribus ovatis ſerratis. *Commel. rar. t.* 41. *β*) Athanaſia laevigata. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 541.

parviflora. 10. A. corymbis compoſitis, foliis pinnatis linearibus. *Mant. p.* 464. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 541. Tanacetum crithmifolium. *Burm. afr. t.* 68. *f.* 4.

pinnata. 11. A. corymbis compoſitis denſis, foliis pinnatis linearibus tomentoſis. *Suppl. p.* 361.

pectinata. 12. A. corymbo compoſito, foliis pinnatis glabris. *Suppl. p.* 361.

ſerrata. 13. A. corymbo compoſito, foliis lanceolatis dentato-ſerratis. *Suppl. p.* 361.

filiformis. 14. A. corymbo compoſito, foliis linearibus glabris, patulis. *Suppl. p.* 361.

cinerea. 15. A. corymbo compoſito, foliis linearibus tomentoſis integris. *Suppl. p.* 361.

** *corolla radiata*, Relhaniae.

† *floribus aggregatis.*

ſquarroſa. 16. A. foliis oblongis acuminatis enervibus apice recurvis. *Herit. ſert. angl. p.* 22. *t.* 29.

geniſtifolia. 17. A. foliis lanceolatis, acuminatis uninerviis ſubimbricatis. *Mant. p.* 464.

microphylla. 18. A. foliis linearibus enervibus confertiſſimis, floribus pedicellatis. *Herit. ſert. angl. p.* 22.

paſſerinoides. 19. A. foliis linearibus enervibus, floribus ſubſeſſilibus. *Herit. ſert. angl. p.* 23.

viſcoſa. 20. A. foliis linearibus triquetris ſubcarnoſis viſcidis. *Herit. ſert. angl. p.* 23.

†† *floribus ſolitariis.*

laxa. 21. A. foliis linearibus villoſis remotis, floribus longius pedunculatis, caule erecto. *Herit. ſert. angl. p.* 23.

pumila. 22. A. foliis linearibus villoſis, floribus pedunculatis, caulibus diffuſis. *Suppl. p.* 362. *an eadem cum Zoegea capenſi?*

ſeſſiliflora. 23. A. foliis linearibus villoſis, pedunculis lateralibus folio brevioribus. *Suppl. p.* 362.

virgata. 24. A. foliis linearibus glabris, acumine recurvo folio breviore, floribus ſeſſilibus. *Herit. ſert. angl. p.* 23.

pungens. 25. A. foliis linearibus ſubpungentibus ſubtus ſtriatis, floribus ſeſſilibus. *Herit. ſert. angl. p.* 24.

ſantolinoides. 26. A. foliis linearibus triquetris ſubtus turionibusque incanis, calicibus globoſis ſubpetiolatis. *Herit. ſert. angl. p.* 24.

decuſſata. 27. A. foliis linearibus triquetris decuſſatis acutis, floribus ſeſſilibus. *Herit. ſert. angl. p.* 24.

uniflora. 28. A. foliis obovatis glabris, floribus ſeſſilibus. *Suppl. p.* 362.

MARSHALLIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* coronata calic. 5phyllo. *Cal.* polyphyllus perſiſtens. *Stigm.* 2.

Schreberi. I. MARSHALLIA. *Schreb. nov. Linn. gen. plant. ad* 2. *p.* 810.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

944. TANACETUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, hemiſphaericus. *Cor.* radii 3fidae, lineari-ligulatae, interdum o.

annuum. 1. T. foliis bipinnatifidis linearibus acutis, corymbis tomentoſis. *Mill. h. angl. t.* 227. *f.* 1.

vulgare. 2. T. foliis bipinnatis inciſis ſerratis. *Flor. dan. t.* 871.

incanum. 3. T. foliis bipinnatis tomentoſis, corymbo ovato compoſito.

myriophyllum. 4. T. foliis bipinnatis tomentoſis: pinnulis caulinorum dentatis: radicalium integerrimis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 566. Achillea bipinnata.

monanthon. 5. T. caulibus ſimpliciſſimis unifloris longitudine foliorum. *Mant. p.* 111.

argenteum. 6. T. foliis pinnatis tomentoſis: pinnis lanceolatis, floribus cymoſis. *Willden. de achill. t.* 2.

ſibiricum. 7. T. foliis pinnatis: pinnis lineari-filiformibus, corymbis glabris, caule herbaceo. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 65. *f.* 2.

8. T.

angulatum. 8. T. foliis pinnatifidis: laciniis inciso-dentatis, calice angulato. *Willden. de achilleis t.* 2.

suffruticosum. 9. T. foliis pinnato-multifidis: laciniis linearibus subdivisis acutis, caule suffruticoso. *Mant. p.* 465.

cotuloides. 10. T. foliis dentato-pinnatis acuminatis, caule ramosissimo, floribus subpaniculatis. *Mant. p.* 282.

flabelliforme. 11. T. foliis deltoidibus apice serratis, corymbis simplicibus. *Herit. sert. angl. p.* 21. *t.* 27.

Balsamita. 12. T. foliis ovatis integris serratis. *Blackw. herb. t.* 98.

945. ARTEMISIA. *Recept.* subvillosum vel nudiusculum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus: squamis rotundatis conniventibus. *Cor.* radii o.

* *fruticosae erectae.*

vermiculata. 1. A. foliis acerosis confertis minimis, panicula racemosa, floribus sessilibus. *Mant. p.* 281. *Breyn cent. p.* 24. *t.* 12.

capillaris. 2. A. foliis simplicibus capillaceis. *Thunb. flor. jap. p.* 309.

Abrotanum. 3. A. foliis setaceis ramosissimis. *Blackw. herb. t.* 555.

laricifolia. 4. A. foliis fasciculatis indivisis fissisque, ramis deflexis, floribus oblongis cernuis. *S. G. Gmel. it.* 2. *p.* 3.

Lerchii. 5. A. incana, foliis superioribus linearibus indivisis: inferioribus pinnatis brevibus tenuiter divisis; pinnis palmatis, corymbis sessilibus copiosissimis spicatis oblongis. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 114. *n.* 99. *t.* 50. *f.* 2. 3. *β*) *Gmel. flor. sib. p.* 112. *n.* 97. *t.* 49. *f.* 2.

nitrosa. 6. A. subincana, foliis superioribus integris obtusis: inferioribus tenuiter multifidis, corymbis erectis incurvis oblongis spicatis sessilibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 113. *n.* 98.

arborescens. 7. A. foliis compositis multifidis linearibus, floribus subglobosis. *Lob. ic.* 753.

Gmelini. 8. A. foliis duplicato-pinnatis obtusis linearibus subtus incanis, corymbis subrotundis nutantibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 121. *n.* 106.

argentea. 9. A. ſericea, foliis ſubpalmatis pinnatisve: laciniis lato-linearibus remotis. *Herit. ſert. angl. p.* 22. *t.* 28.

aethiopica. 10. A. foliis palmatis linearibus minutiſſimis, floribus racemoſis pedunculatis. *Mant. p.* 283.

Contra. 11. A. foliis palmatis linearibus minutis, panicula racemoſa, floribus ſeſſilibus. *Mant. p.* 282.

judaica. 12. A. foliis obovatis obtuſis lobatis parvis, floribus paniculatis pedicellatis. *Mant. p.* 111. 281. *Pluckn. alm. t.* 73. *f.* 2.

pauciflora. 13. A. ramis virgatis filiformibus, corymbis ſecundis ſpicatis ſubſeſſilibus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 116. *n.* 101.

** *ſuffruticoſae.*

Meſſerſchmidii. 14. A. tomentoſa, caule erecto, foliis linearibus multifidis, racemis erectis tenuibus laxis. *Weber apud Stechmann de artemiſ. p.* XIX. *n.* IX.

humilis. 15. A. foliis ſetaceis pinnatifidis, caule decumbente. *Lob. ic.* 769. *Mill. b. angl. t.* 2. *f.* 1.

hiſpanica. 16. A. foliis laxe pinnatis: pinnis longis linearibus, ſpicis denſiſſimis calicibus oblongis. *Weber apud Stechmann de artemiſ. p.* XXX. *n.* XXIV.

italica. 17. A. foliis tomentoſis laxe pinnatis: pinnis longis linearibus; radicalibus punctatis, ſpicis denſis: floribus erectis. *Haller flor. Goett. p.* 373.

tatarica. 18. A. tomentoſa, foliis inferioribus bipinnatis pinnis aequalibus: ſuperioribus pinnatis linearibus, racemis erectis laxis multifloris. *Weber ap. Stechmann de artemiſ. p.* XIX. *n.* X.

*** *herbaceae.*

† *procumbentes ante floreſcentiam.*

campeſtris. 19. A. foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *β*) Artemiſia Mutellina. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 159. *γ*) Artemiſia incana. *Mill. b. angl. t.* 2. *f.* 2.

canethifolia. 20. A. foliis multifidis tenuiſſime diviſis, corymbis ſubrotundis nutantibus ſecundis laxe ſpicatis, caule adſcendente. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 119. *n.* 103.

crithmifolia. 21. A. foliis compoſitis divaricatis linearibus carnoſis glabris, caule adſcendente paniculato.

22. A.

glacialis. 22. A. foliis palmatis multifidis sericeis, caulibus adscendentibus, floribus glomeratis fastigiatis. *Jacq. flor. austr.* 5. *app. t.* 35. *coll.* 2. *t.* 7. *f.* 1-3.

maritima. 23. A. foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, floscu-lis femineis ternis.

santonica. 24. A. foliis caulinis linearibus pinnato-multifidis: rameis indivisis, spicis secundis reflexis, floribus quinquefloris. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 51.

palustris. 25. A. foliis linearibus pinnatis integerrimis, floribus glomeratis subsessilibus. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 55.

rupestris. 26. A. foliis pinnatis, caulibus adscendentibus, floribus globosis cernuis, receptaculo papposo. *Flor. dan. t.* 801.

spicata. 27. A. foliis radicalibus biternatis, caule adscendente spicato, floribus erectis. *Jacq. flor. austr.* 5. *app. t.* 34.

‖ ‖ *erectae.*

† *foliis compositis aut divisis.*

filaginoi-dea. 28. A. tomentosa, foliis multifidis, floribus subspicatis subsessilibus. *Haller hist. stirp. Helv.* 1. *p.* 55. *n.* 128.

sericea. 29. A. foliis multifidis lineari-lanceolatis, floribus ellipticis pendulis. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 131. *n.* 113.

tenella. 30. A. caule lanato, foliis tenuissime multifidis brevibus, paniculis tenuibus laxis foliosis. *Weber ap. Stechm. de artemis. p.* XXVI. *n.* XX.

Semsek. 31. A. foliis multifidis filiformibus subvillosis: petiolis triquetris. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 218.

Absinthi-cum. 32. A. foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villoso. *Knorr del. hort.* 2. *t.* A. 17.

inodora. 33. A. foliis compositis multifidis tomentosis, floribus subglobosis: receptaculo villoso; *an satis distincta ab Absinthio?*

pontica. 34. A. foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 99.

austriaca. 35. A. foliis multipartitis tomentosis incanis, floribus oblongis nutantibus: receptaculo nudo. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 100.

vulgaris. 36. A. foliis pinnatifidis planis inciſis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. *Blackw. herb. t.* 431.

borealis. 37. A. foliis pinnato-subseptemfidis villosis linearibus, floribus conglomeratis. *Pallas it.* 3. *p.* 755. *t.* Hh. *f.* 1.

Jacquini. 38. A. foliis pinnatis: pinnis lanceolatis inaequaliter incisis; inferioribus integerrimis, floribus globosis axillaribus subgeminis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 98.

pectinata. 39. A. foliis pinnatis pectinatis glabris sessilibus, floribus axillaribus solitariis sessilibus quadrifloris. *Suppl. p.* 362. *Pallas it.* 3. *p.* 755. *t.* Hh. *f.* 2.

tanacetifolia. 40. A. foliis bipinnatis subtus tomentosis nitidis: pinnis transversis, racemis simplicibus. *Allion. pedem. t.* 2. *f.* 1.

annua. 41. A. foliis triplicato-pinnatis utrinque glabris, floribus subglobosis nutantibus, receptaculo glabro conico. *Amm. ruth. t.* 193. *f.* 23.

†† *foliis simplicibus et indivisis.*

caerulescens. 42. A. foliis caulinis lanceolatis integris: radicalibus multifidis, flosculis femineis ternis. *du Hamel arbr.* 1. *t.* 24. *f.* 5.

japonica. 43. A. foliis glabris: rameis lanceolatis integris; caulinis oblongis trifidis, floribus racemosis cernuis. *Thunb. fl. jap. p.* 310.

Dracunculus. 44. A. foliis lanceolatis glabris integerrimis. *Blackw. herb. t.* 116.

integrifolia. 45. A. foliis lanceolatis subtus tomentosis integerrimis dentatisque, flosculis femineis quinis. *Gmel. flor. sib.* 2. *t.* 48. *f.* 1.

finensis. 46. A. foliis tomentosis obtusis lanceolatis: inferioribus cuneiformibus trilobis. *Pluckn. amalth.* 3. *t.* 153. *f.* 5.

minima. 47. A. foliis cuneiformibus repandis, caule procumbente, floribus axillaribus sessilibus. *Burm. ind. t.* 58. *f.* 3. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 88?

littoralis. 48. A. procumbens strigosa, foliis spatulatis serrato-dentatis, calicibus nudis pedicellatis. *Retz. obs. bot.* 5. *p.* 28.

maderaspatana. 49. A. foliis lyrato-sinuatis, caulibus procumbentibus, floribus pedunculatis solitariis globosis oppositifoliis. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 49.

946. GNAPHALIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus vel capillaris. *Cal.* imbricatus: squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis.

* *Fruticosa.*

† *Argyrocoma.*

eximium. 1. Gn. foliis sessilibus ovatis confertis erectis tomentosis, corymbo sessili. *Mant. p.* 573. *Edw. av. t.* 183. *Mill. an var. subj. t.* 3. *f.* 1.

trinerve. 2. Gn. foliis sessilibus lanceolatis trinerviis subtus argenteis, panicula corymbosa terminali laxa. *Forst. flor. austr. p.* 55.

appendiculatum. 3. Gn. foliis sessilibus imbricatis lanceolatis lanatis apice membrana scariosa appendiculatis. *Suppl. p.* 363.

coronatum. 4. Gn. foliis sessilibus lanceolatis, corymbis compositis sessilibus, pedunculis aphyllis, calicibus coronatis. *Burm. afr. t.* 69. *f.* 3.

discolorum. 5. Gn. foliis sessilibus lanceolatis, calicibus albis: squamis inferioribus incarnatis. *Burm. afr. t.* 79. *f.* 4.

arboreum. 6. Gn. foliis sessilibus linearibus supra glabris margine revolutis, floribus subcapitatis, pedunculis elongatis.

ericoides. 7. Gn. foliis sessilibus linearibus, calicibus exterioribus rudibus: interioribus incarnatis.

grandiflorum. 8. Gn. foliis amplexicaulibus ovatis trinerviis utrinque lanuginosis. *Burm. afr. t.* 76. *f.* 1.

fruticans. 9. Gn. foliis amplexicaulibus ovatis, caule rigente, cyma sessili. *Mant. p.* 282.

undatum. 10. Gn. foliis subtus tomentosis supra scabris: radicalibus petiolatis oblongis; caulinis amplexicaulibus undulatis. *Suppl. p.* 363.

teretifolium. 11. Gn. foliis confertis teretiusculis, corymbis ramosis; calicibus exterius ferrugineis. *Burm. afr. t.* 77. *f.* 3.

muricatum. 12. Gn. foliis subulatis mucronatis, umbella composita: calicibus subtrifloris cylindricis. *Burm. afr. t.* 79. *f.* 1. 2. 3.

†† *Chry-*

†† *Chryſocoma.*

mucrona- 13. Gn. foliis ſubulatis mucronatis, calicum ſquamis ſubrotun-
tum. dis. *Mant. p.* 283. *Burm. afr. t.* 66. *f.* 3.

umbella- 14. Gn. foliis ſubulatis tortis faſciculatis, umbellis ſimplicibus
tum. terminalibus ſeſſilibus. *Suppl. p.* 363.

repens. 15. Gn. foliis linearibus, caule repente recto, ramis erectis ſimpliciſſimis. *Mant. p.* 283.

ſtoeches. 16. Gn. foliis linearibus, corymbo compoſito, ramis virgatis. *Blackw. herb. t.* 438.

hiſpidum. 17. Gn. foliis linearibus ſemiteretibus ſulcatis hiſpidis, capitulis terminalibus ſimplicibus. *Suppl. p.* 363.

Forskäh- 18. Gn. foliis linearibus amplexicaulibus, corymbis termina-
lii. libus. *Forsk. Flor. aeg. arab. p.* 218.

igneſcens. 19. Gn. foliis ſublanceolatis tomentoſis ſeſſilibus, corymbis alternis conglobatis: floribus globoſis.

mariti- 20. Gn. ramoſiſſimum, foliis lanceolatis ſeſſilibus acutiuſculis,
mum. calicis ſquamis intimis aureis. *Mant. p.* 283. *Burm. afr. t.* 77. *f.* 2.

ſerratum. 21. Gn. foliis lanceolatis ſerratis amplexicaulibus ſupra nudis. *Burm. afr. t.* 76. *f.* 3.

craſſifo- 22. Gn. foliis lato-lanceolatis ſubpetiolatis coriaceis tomento-
lium. ſis, corymbo compoſito, caule prolifero. *Mant. p.* 112.

dentatum. 23. Gn. foliis cuneiformibus dentatis ſeſſilibus, corymbo ſimplici. *Burm. afr. t.* 68. *f.* 3.

patulum. 24. Gn. foliis ſpatulatis amplexicaulibus, corymbis aggregatis, ramis patentibus.

petiola- 25. Gn. foliis ovatis integerrimis petiolatis, floribus confertis
tum. terminalibus. *Burm. afr. t.* 76. *f.* 1.

** *Herbacea.*

† *Chryſocoma.*

orientale. 26. Gn. ſubherbaceum, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus, corymbo compoſito: pedunculis elongatis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 55.

milleflo- 27. Gn. floribus corymboſis faſtigiatis rufeſcenti-albidis, cali-
rum. cibus ſubcylindricis. *Suppl. p.* 362.

28. Gn.

cylindricum. 28. Gn. foliis ſeſſilibus oblongis tomentoſis, corymbis inaequalibus: calicibus glabris cylindricis ſeſſilibus. *Pluckn. phyt.* 298. *f.* 4.

arenarium. 29. Gn. foliis lanceolatis: inferioribus obtuſis, corymbo compoſito, caulibus ſimpliciſſimis. *Flor. dan. t.* 641.

rutilans. 30. Gn. foliis lanceolatis, corymbo decompoſito, caule inferne ramoſo. *Dill. h. Elth. t.* 107. *f.* 127.

imbricatum. 31. Gn. foliis lanceolatis tomentoſis, ſquamis calicis reflexis, caule ramoſo. *Burm. afr. t.* 80. *f.* 2.

cymoſum. 32. Gn. foliis lanceolatis trinerviis ſupra glabris, racemo terminali, caule inferne ramoſo. *Pluckn. alm. t.* 279. *f.* 1.

nudifolium. 33. Gn. foliis lanceolatis trinerviis nudis reticulato-venoſis. *Petiv. gaz. t.* 82. *f.* 1.

unifiorum. 34. Gn. foliis lanceolatis alternis lanatis, caulibus unifloris proſtratis lanatis. *Hablizl ap. S. G. Gmel. it.* 4. *p.* 176.

albeſcens. 35. Gn. niveo-tomentoſum, foliis lineari-lanceolatis, caule erecto, inferne ſimplici, ramis terminalibus faſtigiatis, floribus confertis conicis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 112.

luteo-album. 36. Gn. foliis ſemiamplexicaulibus enſiformibus repandis obtuſis utrinque pubeſcentibus, floribus conglomeratis. *Pluckn. alm. t.* 31. *f.* 16.

pedunculare. 37. Gn. foliis ſpatulatis ſubamplexicaulibus ſubtus tomentoſis, calicis ſquamis acutiſſimis. *Mant. p.* 284.

Vira vira. 38. Gn. foliis decurrentibus ſpatulatis utrinque tomentoſis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 125.

odoratiſſimum. 39. Gn. foliis decurrentibus mucronatis utrinque tomentoſis planis. *Mill. h. angl. t.* 131. *f.* 2.

⊢⊢ *Argyrocoma.*

ſanguineum. 40. Gn. foliis decurrentibus lanceolatis tomentoſis planis: apiculo nudo terminali. *Rauw. it. p.* 285. *ic.*

undulatum. 41. Gn. foliis decurrentibus lanceolatis undulatis acutis ſubtus tomentoſis, caule ramoſo. *Dill. h. Elth. t.* 108. *f.* 130.

foetidum. 42. Gn. foliis amplexicaulibus integerrimis acutis ſubtus tomentoſis, caule ramoſo. *Volkam. norimb. p.* 194. *ic. Pappus ſimplex.*

criſpum. 43. Gn. foliis amplexicaulibus ſpatulatis tomentoſis, calicibus obtuſiſſimis plicato-undulatis baſi tomentoſis. *Pluckn. alm. t.* 298. *f.* 3.

44. Gn.

helianthemifolium. 44. Gn. foliis ſubamplexicaulibus lanceolatis, corymbis compoſitis, calicis ſquamis ſubplicatis. *Volkam. norimb. p.* 194. *ic.*

ſquarroſum. 45. Gn. foliis ſeſſilibus lingulatis tomentoſis, calicis ſquamis interioribus ſubulatis recurvatis. *Pluckn. alm. t.* 323. *f.* 1.

ſtellatum. 46. Gn. foliis ſeſſilibus lanceolatis villoſis, calicibus acutis extrinſecus incarnatis. *Burm. afr. t.* 80. *f.* 1.

obtuſifolium. 47. Gn. foliis lanceolatis, caule tomentoſo paniculato, floribus glomeratis conicis terminalibus. *Dill. h. Elth. t.* 108. *f.* 131.

arabicum. 48. Gn. foliis lanceolatis remotis petiolatis ſupra piloſis integris, corymbo terminali, caule ramoſo. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 218.

indicum. 49. Gn. foliis lanceolatis, caule ramoſiſſimo diffuſo, corymbis inaequalibus, calicibus intus coloratis. *Pluck. alm. t.* 187. *f.* 5.

purpureum. 50. Gn. foliis lanceolatis nudis, caule erecto ſimpliciſſimo, floribus ſpicatis lateralibus ſeſſilibus. *Dill. h. Elth. t.* 109. *f.* 132.

margaritaceum. 51. Gn. foliis lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule ſuperne ramoſo, corymbis faſtigiatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 12. *n.* 50.

cinereum. 52. Gn. foliis linearibus integris, calicibus cinereis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 218.

cuneifolium. 53. Gn. foliis cuneatis obtuſis ſubſinuatis, calicibus cinereis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 218.

denudatum. 54. Gn. foliis ſpatulatis ſubtus niveis tomentoſis, ſupra laevibus. *Suppl. p.* 364.

americanum. 55. Gn. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſubtomentoſis, caule inferne ſimplici ſuperne corymboſo, floribus ovatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 112.

plantagineum. 56. Gn. foliis radicalibus ovatis maximis, caule ſimpliciſſimo, ſarmentis procumbentibus. *Pluckn. alm. t.* 348. *f.* 9.

dioicum. 57. Gn. ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, floribus dioicis. *Dod. pempt.* 68.

alpinum. 58. Gn. ſarmentis procunbentibus, caule ſimpliciſſimo, capitulo aphyllo, floribus oblongis. *Flor. dan. t.* 332.

††† *Filaginoidea.*

silvaticum. 59. Gn. caule simplicissimo erecto, floribus sparsis. *Flor. dan. t.* 254. *β)* Gnaphalium germanicum. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 368.

norwegicum. 60. Gn. caule herbaceo simplicissimo, foliis lanceolatis utrinque acutis trinerviis subtus lanuginosis, spica florum terminali dense foliosa. *Flor. dan. t.* 254.

verticillatum. 61. Gn. caule simplicissimo, floribus verticillatis, foliis linearibus. *Suppl. p.* 364.

spicatum. 73. Gn. caule simplicissimo herbaceo, floribus verticillatis, foliis fasciculatis linearibus revolutis. *Petiv. gazoph. t.* 8. *f.* 12.

supinum. 62. Gn. caule simplici procumbente, floribus sparsis. *Bocc. mus. t.* 85.

Oculus Cati. 63. Gn. caule prostrato, foliis ovatis, floribus glomeratis terminalibus villosissimis. *Suppl. p.* 364.

glomeratum. 64. Gn. caule diffuso, calicibus squamis interioribus subulatis nudis, foliis subamplexicaulibus.

uliginosum. 65. Gn. caule ramoso diffuso, floribus confertis terminalibus. *Flor. dan. t.* 859.

nudum. 74. Gn. caule ramoso herbaceo diffuso, floribus confertis terminalibus nudis. *Hoffm. bot. Taschenb.* 1791. *p.* 292.

tomentosum. 75. Gn. caule ramoso herbaceo diffuso, floribus confertis terminalibus tomentosis. *Hoffm. bot. Taschenb.* 1791. *p.* 292.

pilosellum. 66. Gn. foliis lanceolatis quinquenerviis subtus tomentosis, caule nudo, floribus capitatis. *Suppl. p.* 364.

radiatum. 67. Gn. foliis lanceolatis, calicum radio multiplici subrotundo. *Suppl. p.* 365.

declinatum. 68. Gn. foliis lineari-lanceolatis, calicibus radio albo lanceolato. *Suppl. p.* 365.

†††† *incertae cohortis.*

lanatum. 69. Gn. lanatum, foliis lineari-oblongis apice calloso-mucronatis, corymbo coarctato, caule simplicissimo. *Forst. flor. austr. p.* 55.

involucratum. 70. Gn. foliis linearibus elongatis mucronatis subtus tomentosis, capitulo terminali folioso. *Forst. flor. austr. p.* 55.

71. Gn.

japonicum. 71. Gn. erectum, foliis lineari-enſiformibus ſubtus niveis, capitulis terminalibus. *Thunb. flor. jap. p.* 311.

hyemale. 72. Gn. ſarmentis procumbentibus, foliis radicalibus obtuſis tomentoſis, floribus glomeratis conicis rubris. *Walt. flor. carol. p.* 203.

947. XERANTHEMUM. *Recept.* paleaceum aut nudum. *Pappus* ſetaceus, plumoſus aut piloſus. *Cal.* imbricatus, radiatus: radio colorato.

* *receptaculo paleaceo, pappo quinqueſeto.*

annuum. 1. X. herbaceum, foliis lanceolatis patentibus. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 388. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 20.

** *receptaculo nudo.*

⊢ *pappo piloſo.*

bellidioides. 2. X. ramis unifloris, foliis ovato-oblongis cuſpidatis amplexicaulibus, pedunculis tomentoſis ſubaphyllis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 55.

caneſcens. 3. X. fruticoſum, foliis imbricatis ovato-ſubulatis glabris. *Burm. afr. t.* 68. *f.* 1.

veſtitum. 4. X. fruticoſum erectum, foliis adnatis lanceolato-linearibus apice calloſo-mucronatis, ramis unifloris folioſis. *Seb. muſ.* 2. *t.* 43. *f.* 5.

imbricatum. 5. X. caulibus fruticoſis erectum, foliis ovatis ſubtomentoſis, pedunculis ſquamoſis. *Petiv. gaz. t.* 95. *f.* 19.

proliferum. 6. X. caule fruticoſo prolifero, floribus ſeſſilibus, foliis granulato-ſubrotundis imbricatis obſoletis. *Mant. p.* 467. *Seb. muſ.* 2. *t.* 89. *f.* 8.

⊢⊢ *pappo plumoſo.*

ſpecioſiſſimum. 7. X. fruticoſum erectum, foliis amplexicaulibus lanceolatis trinerviis, floribus pedunculatis. *Seb. muſ.* 2. *t.* 43. *f.* 6.

retortum. 8. X. caulibus frutеſcentibus provolutis, foliis tomentoſis recurvatis. *Dill. h. Elth. t.* 322. *f.* 415.

9. X.

stolonifer- 9. X. procumbens repens sericeum, foliis oblongis recurvato-
rum. patulis, ramulis unifloris. *Suppl. p.* 366.

virgatum. 10. X. ramis unifloris virgatis, foliis lanceolatis tomentosis, pedunculis subnudis. *Mant. p.* 284. *Breyn prodr.* 3. *t.* 16. *f.* 3.

sesamoi- 11. X. ramis unifloris imbricatis, foliis linearibus. *Burm.*
des. *afr. t.* 67. *f.* 2. *β) Seb. mus.* 2. *t.* 43. *f.* 5.

squamo- 12. X. ramis unifloris inferne imbricatim foliosis, superne
sum. dense squamosis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 279. *t.* 20. *f.* 2.

paniculat- 13. X. floribus paniculatis, foliis linear-lanceolatis. *Suppl.*
tum. *p.* 366? *Burm. afr. t.* 67. *f.* 1.

Staehelina. 14. X. pedunculis terminalibus exsertis nudis unifloris, foliis lanceolatis tomentosis.

variegat- 15. X. floribus solitariis nutantibus, squamis calicis obtusis
tum. maculatis.

spinosum. 16. X. squamis calicis mucronato-spinosis. *Burm. afr. t.* 67. *f.* 3.

*** *incertae tribus.*

fulgidum. 17. X. foliis lato-lanceolatis convoluto-incumbentibus, floribus subsenis. *Suppl. p.* 365.

recurvat- 18. X. foliis recurvatis lanceolatis complicato-canaliculatis cu-
tum. spidatis ciliatis, ramulis unifloris. *Suppl. p.* 366.

948. CARPESIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus: squamis exterioribus reflexis.

cernuum. 1. C. floribus terminalibus. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 204.

abrotanoides. 2. C. floribus lateralibus. *Osb. it. t.* 10.

949. BACCHARIS. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus, cylindricus. *Flosculi* feminei hermaphroditis immisti.

ivaefolia. 1. B. foliis lanceolatis longitudinaliter dentato-serratis. *Barth. act. Hafn.* 2. *t.* 57.

foetida. 2. B. foliis lanceolatis serrato-dentatis, corymbis foliosis.

neriifolia. 3. B. foliis lanceolatis ſuperne uno alterove denticulo ſerratis.

Dioſcoridis. 4. B. foliis lato-lanceolatis dentatis ſeſſilibus ſtipulatis. *Suppl. p.* 366. *Rauw. it. p.* 54. *ic.*

arborea. 5. B. foliis elliptico-lanceolatis integerrimis nudis petiolatis. *Mant. p.* 284.

halimifolia. 6. B. foliis obovatis ſuperne emarginato-crenatis. *du Hamel arbr.* 1. *t.* 35.

braſiliana. 7. B. foliis obovatis integris ſcabris ſeſſilibus ſubtus venoſis.

indica. 8. B. foliis obovatis denticulatis petiolatis. *Breyn. cent. t.* 70.

viſcoſa. 9. B. foliis ſubcuneiformibus ſemiamplexicaulibus dentatis obtuſis piloſo-viſcoſis alternis, floribus corymboſis. *Walt. flor. carol. p.* 202.

950. CONYZA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus, ſubrotundus. *Cor.* radii 3fidae.

caneſcens. 1. C. foliis linearibus, panicula faſtigiata. *Suppl. p.* 397.

ſaxatilis. 2. C. foliis linearibus ſubdentatis, pedunculis longiſſimis unifloris, caule ſuffruticoſo. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 10. *f.* 16.

ſordida. 3. C. foliis linearibus integerrimis, pedunculis longis trifloris, caule ſuffruticoſo. *Mant. p.* 466. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 543. Gnaphalium ſordidum.

linifolia. 4. C. foliis lineari-lanceolatis integerrimis, corollis radiatis. *Pluckn. alm. t.* 79. *f.* 2.

ſquarroſa. 5. C. foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboſo, calicibus ſquarroſis. *Flor. dan. t.* 622.

virgata. 6. C. foliis lanceolatis ſerrulatis decurrentibus, caulibus virgatis, floribus ſpicatis ſparſis congeſtis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 152. *f.* 5.

decurrens. 7. C. foliis lanceolatis ſerrulatis decurrentibus, floribus axillaribus ſeſſilibus glomeratis.

balſamifera. 8. C. foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis: petiolis etiam dentatis. *Suppl. p.* 1208. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 24. *f.* 1.

aſteroides. 9. C. foliis lato-lanceolatis ſubſerratis, corollis radiatis, calicibus ſquarroſis.

crispata. 10. C. foliis lanceolatis decurrentibus serrato-dentatis nudis, pedunculis unifloris, caule fruticoso. *Vahl symbol. bot.* 1. *p.* 71.

purpurascens. 11. C. foliis ovato-lanceolatis serratis subtomentosis, caule subherbaceo inferne simplici superne corymboso, floribus ovatis. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 258. *t.* 252. *f.* 1.

lobata. 12. C. foliis superioribus ovato-lanceolatis obsolete serratis: inferioribus trifidis, floribus corymbosis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 152. *f.* 4. *an Caleae potius species?*

anthalmintica. 13. C. foliis lanceolato-ovatis scabris, pedunculis unifloris, calicibus squarrosis. *Rheed. h. malab.* 2. *t.* 24.

sinensis. 14. C. foliis lanceolato-ovatis reflexo-serratis subtus tomentosis, floribus terminalibus congestis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 14. *f.* 2.

colorata. 15. C. foliis ovatis serratis subtomentosis acutis, caule corymboso, corollis subglobosis. *β) Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 2.

candida. 16. C. foliis ovatis tomentosis, floribus confertis, pedunculis lateralibus terminalibusque. *Buxb. cent.* 2. *t.* 17.

arborescens. 17. C. foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, racemis erectis secundis: bracteis reflexis. *Plum. spec. t.* 130. *f.* 2.

fruticosa. 18. C. foliis ovatis integerrimis obtusis, floribus sessilibus alternis, ramulis flexuosis.

incisa. 30. C. foliis ovatis subcordatis piloso-viscidis dentatis basi auriculatis, receptaculi disco favoso. *Ait. hort. Kew.* 3 *p.* 184.

tortuosa. 19. C. foliis ovato-oblongis integerrimis, caule tortuoso fruticoso, racemis reflexis.

bifrons. 20. C. foliis ovato-oblongis amplexicaulibus. *Pluckn. alm. t.* 87. *f.* 4.

scabra. 21. C. foliis oblongis subdentatis sessilibus scabris, pedunculis unifloris elongatis. *Mant. p.* 113.

pubigera. 22. C. foliis oblongis subdentatis subpetiolatis, pedunculis lanatis subbifloris. *Mant. p.* 113. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 103. *f.* 2.

cinerea. 23. C. foliis oblongis, floribus paniculatis, corollis cylindricis calice duplo longioribus. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 17. *f.* 7.

carolinensis. 24. C. foliis lanceolato-oblongis integerrimis, corymbis axillaribus, pedunculis multifloris. *Jacq. coll.* 2. *p.* 271.

rupeſtris. 25. C. foliis ſpatulatis ſubdentatis cauleque ſuffruticoſo tomentoſis, pedunculis elongatis unifloris. *Mant. p.* 113. *Shaw afr. t.* 176.

rugoſa. 33. C. foliis ellipticis decurrentibus crenatis ſubtus tomentoſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 71.

bifoliata. 26. C. foliis ovalibus dentatis, pedunculis diphyllis: bracteis oppoſitis. *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 1.

hirſuta. 27. C. foliis ovalibus integerrimis ſcabris ſubtus hirſutis.

patula. 31. C. foliis ellipticis ſerratis ſubtus villoſis, calicibus ſubgloboſis: foliolis lanceolato-ſubulatis, ramis patulis. *Mill. h. angl. t.* 247.

rugoſa. 32. C. fruticoſa, foliis cuneiformibus ſerratis villoſis rugoſis reticulatis, pedunculis villoſis unifloris, floribus radiatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 184.

rigida. 28. C. foliis petiolatis obovatis integris ſcabris ſubtus venoſis, ſpicis flexuoſis; floribus ſecundis geminatis. *Plum. ic.* 14. *f.* 1.

aurita. 29. C. foliis dentato-ſinuatis: auriculis ſubdecurrentibus. *Suppl. p.* 367.

951. ERIGERON. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cor.* radii lineares, anguſtiſſimae.

carolinianum. 1. E. caule paniculato, floribus ſubſolitariis terminalibus, foliis linearibus integerrimis. *Dill. h. Elth. t.* 306. *f.* 393.

gramineum. 2. E. caule unifloro, foliis linearibus ciliatis ſcabris. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 76. *f.* 2.

decurrens. 34. E. foliis linearibus tomentoſis decurrentibus, floribus paniculatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 72.

incanum. 35. E. foliis linearibus tomentoſis ſubdentatis, floribus corymboſis, caule fruticoſo. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 72.

tuberoſum. 3. E. foliis linearibus, ramis unifloris, caule ſuffruticoſo. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 19. *f.* 20. *β*) *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 20. *f.* 15. *γ*) *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 22. *f.* 7.

graveolens. 4. E. foliis ſublinearibus integerrimis, ramis lateralibus multifloris. *Mant. p.* 468. *Lob. ic.* 346.

foetidum. 5. E. foliis lanceolato-linearibus retuſis, floribus corymboſis. *Mill. h. angl. t.* 223.

6. E.

glutinosum. 6. E. foliis lanceolato-linearibus piloso-viscidis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 112.

viscosum. 7. E. foliis lanceolatis denticulatis basi reflexis, pedunculis unifloris lateralibus, calicibus squarrosis, corollis radiatis. *Mant. p.* 468. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 165.

canadense. 8. E. foliis lanceolatis ciliatis, caule floribusque paniculatis hirtis. *Hoffmann bot. Taschenb.* 1791. *t.* 12.

philadelphicum. 9. E. foliis lanceolatis subserratis: caulinis semiamplexicaulibus, flosculis radii capillaceis longitudine disci.

bahamense. 10. E. fruticosum, foliis lanceolatis petiolatis integris, floribus terminalibus corymbosis: flosculis radii trifidis. *Scop. del. inf.* 3. *p.* 14. *t.* 7.

Gouani. 11. E. foliis lanceolatis subdentatis margine scabris, floribus congestis: calicibus scariosis. *Mant. p.* 469. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 79.

sumatrense. 12. E. tomentosum, floribus racemoso-paniculatis, foliis lanceolatis subserratis. *Wennerberg ap. Retz. obs. bot.* 5. *p.* 28.

sericeum. 13. E. floribus paniculatis, foliis ovato-lanceolatis tomentososericeis integris serratisque basi appendiculatis. *Wennerberg apud Retz. obs. bot.* 5. *p.* 28.

glandulosum. 29. E. foliis ovato-lanceolatis integris cauleque pilosis, pedunculis ternis: calicibus hemisphaericis glanduloso pilosis. *Walt. flor. carol. p.* 205.

camphoratum. 14. E. foliis lanceolato-ovatis villosis. serraturis apice cartilagineis.

purpureum. 33. E. foliis oblongis subdentatis amplexicaulibus, caule piloso multifloro, radii corollis capillaribus disco longioribus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 186.

scandens. 15. E. foliis ovatis serratis villosis, floribus axillaribus, caule scandente. *Thunb. flor. jap. p.* 313.

obliquum. 16. E. ramosissimum, foliis ovatis obliquis. *Mant. p.* 573.

japonicum. 17. E. foliis sessilibus obovatis serratis villosis, floribus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 312.

alpinum. 18. E. foliis obtusis subtus villosis, caule subbifloro, calice subhirsuto. *Flor. dan. t.* 292.

aegyptiacum. 19. E. foliis spatulatis dentatis semiamplexicaulibus, floribus globosis. *Mant. p.* 112. 517. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 19.

jamaicen- 20. E. foliis lanceolatis: ſerraturis utrinque duabus, caule pau-
ſe. cifloro albeſcente. *Swarts obſ. bot. p.* 306. *t.* 8. *f.* 2.

rivulare. 21. E. foliis cuneatis acutis hirtis, apice utrinque dentatis margine ciliatis: caulinis ſeſſilibus, caule ſimpliciuſculo erecto paucifloro. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 113.

cuneatum. 22. E. fruticuloſum, foliis cuneatis trilobis. *Suppl. p.* 368.

pinnatum. 23. E. foliis pinnatifidis dentatis. *Suppl. p.* 368.

bonarienſe. 24. E. foliis baſi revolutis. *Dill. h. Elth. t.* 257. *f.* 334.

ſiculum. 25. E. calicis ſquamis inferioribus laxis florem ſuperantibus, pedunculis folioſis. *Magn. h. monſp. p.* 76. *ic.*

acre. 26. E. pedunculis alternis unifloris. *Jungh. pl. off. ic. t.* 12.

uniflorum. 27. E. caule unifloro, calice piloſo. *Flor. lapp. t.* 9. *f.* 3.

Droebachiense. 28. E. caule floribusque paniculatis: terminali majore. *Flor. dan. t.* 874.

piloſum. 30. E. calicibus piloſis: ſquamis laxis. *Walt. flor. carol. p.* 206.

ſquarroſum. 31. E. calicibus tomentoſis: ſquamis patentibus. *Walt. flor. carol. p.* 206.

cymoſum. 32. E. foliis dentato-laciniatis, calicibus laevibus. *Walt. flor. carol. p.* 206.

962. TUSSILAGO.

Recept. nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* ſquamae aequales, diſcum aequantes, ſubmembranaceae.

* *ſcapo unifloro.*

Anandria. 1. T. ſcapo ſquamoſo erecto, calice clauſo, foliis lyrato-ovatis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 68. *f.* 1.

nana. 2. T. ſcapo ſquamoſo erecto, calice ſubaperto. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 143. *t.* 67. *f.* 2.

ſibirica. 3. T. ſcapo imbricato, foliis ovato-oblongis ſinuato-dentatis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 141. *t.* 67. *f.* 1.

pumila. 4. T. ſcapo ebracteato erecto, foliis lyratis inciſis denticulatis tomentoſis. *Swartz nov. pl. gen. et ſp. p.* 113.

5. T.

nutans. 5. T. ſcapo ebracteato, flore nutante, foliis lyratis obtuſis. *Plum. ic.* 41. *f.* 1.

dentata. 6. T. ſcapo ebracteato, foliis lanceolatis dentatis villoſis. *Plum. ic.* 40. *f.* 2.

alpina. 7. T. ſcapo ſubnudo, foliis cordato-orbiculatis crenatis utrinque virentibus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 246.

diſcolor. 8. T. ſcapo ſubnudo, foliis cordato-orbiculatis crenatis ſupra lucidis, ſubtus tomentoſo-incanis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 247.

Farfara. 9. T. ſcapo imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Flor. dan. t.* 595. *ad polygamias neceſſarias potius ſpectat.*

** *ſcapo paucifloro.*

ſilveſtris. 10. T. ſcapo ſubunifloro ſubnudo, foliis cordato-orbiculatis inciſo-lobatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *app. t.* 12.

japonica. 11. T. floribus alternis radiatis. *Mant. p.* 113. *Banks ic. Kaempf. t.* 27. 28.

*** *floribus in thyrſum aggregatis*, Petaſites.

Petaſites. 12. T. thyrſo ovato, floſculis femineis nudis paucis. *Flor. dan. t.* 842.

paradoxa. 13. T. thyrſo ſubovato, floſculis femineis nudis multis: hermaphroditis ternis: antheris liberis, foliis triangulari-cordatis denticulatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 24. *t.* 3.

hybrida. 14. T. thyrſo oblongo: floſculis femineis nudis plurimis. *Dill. h. Elth. t.* 230. *f.* 297. *an diſtincta ſatis a Petaſite.*

ſpuria. 15. T. thyrſo faſtigiato: floſculis femineis ſubpetaloideis plurimis, foliis triangulari-cordatis denticulatis: lobis finuatis. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 29. *t.* 2. *an diſtincta a paradoxa?*

rubella. 16. T. thyrſo faſtigiato: floſculis petaloideis; femineis paucis, foliis ſubcordatis angulatis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 145. *t.* 68. *f.* 2.

lutea. 17. T. thyrſo faſtigiato, pedunculis multifloris, floſculis pauciſſimis hermaphroditis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 149. *t.* 69. *f.* D. E.

alba. 18. T. thyrſo faſtigiato; floribus femineis nudis paucis. *Flor. dan. t.* 524.

frigida. 19. T. thyrſo faſtigiato: floribus radiatis, foliis ſubtus incanis. *Flor. dan. t.* 61.

radiata. 20. T. thyrſo faſtigiato, floribus radiatis, foliis utrinque glaberrimis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 140. *t.* 69.

palmata. 21. T. thyrſo faſtigiato, foliis palmatis dentatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 188. *t.* 11.

953. SENECIO. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris longus. *Cal.* conicus, calicula-tus: ſquamis apice ſphacelatis.

* *floribus floſculoſis.*

hieracifolius. 1. S. foliis amplexicaulibus laceris, caule herbaceo erecto. *Mant. p.* 469. *Herm. par. Lugdb. p.* 226. *ic.*

cernuus. 2. S. foliis eroſis auriculatis, floribus nubilibus cernuis. *Suppl. p.* 370. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 98.

japonicus. 3. S. foliis inciſo-pinnatifidis dentatis glabris petiolatis. *Thunb. flor. jap. p.* 315.

vulgaris. 4. S. foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis. *Flor. dan. t.* 513.

arabicus. 5. S. foliis ſubbipinnatis petiolatis laevibus. *Mant. p.* 114.

peucedanifolius. 6. S. foliis pinnatis filiformibus. *Suppl. p.* 372.

virgatus. 7. S. foliis lyratis ſubtus tomentoſis, pedunculis unifloris: ſquamis ſubulatis.

purpureus. 8. S. foliis lyratis hirtis: ſuperioribus lanceolatis dentatis. *Breyn. cent. t.* 67.

erubeſcens. 64. S. foliis lyratis viſcoſis utrinque piloſis: ſuperioribus oblongo-lanceolatis, caulibus adſcendentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 190.

divaricatus. 9. S. foliis lanceolatis dentatis ſcabris, ramulis floriferis divaricatis.

perſicifolius. 10. S. foliis lanceolatis integerrimis baſi dentatis.

reclinatus. 11. S. foliis linearibus ſparſis ſcabris recurvis, caule fruteſcente. *Suppl. p.* 369. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 66. *Herit. ſtirp. nov.* 1. *t.* 5.

biflorus. 70. S. foliis linearibus planis ſubdentatis laevibus, pedunculis ſubbifloris, caule fruticoſo. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 72.

12. S.

Pſeudo-China. 12. S. ſcapo ſubnudo longiſſimo. *Dill. h. Elth. t.* 258. *f.* 335.

tuſſilaginoides. 63. S. foliis crenatis: infimis cordatis petiolatis; ſuperioribus pinnatifidis lyratis. *Walt. flor. carol. p.* 208.

* *floribus radiatis.*

⊢ *radio revoluto.*

triflorus. 13. S. foliis ſeſſilibus ſinuatis, calicibus conicis: ſquamis minimis intactis. *Kniph. bot. orig. cent.* 1. *n.* 80. *β*) Senecio paucifoliis. *S. G. Gmel. it.* 3. *p.* 171. *t.* 38. *f.* 1.

laniger. 14. S. foliis ſeſſilibus dentatis oblongis. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 155. *t.* 35. *f.* 1.

aegyptius. 15. S. foliis amplexicaulibus ſinuatis, ſquamis calicis brevioribus integris ſphacelatis. *Mant. p.* 517.

lividus. 16. S. foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, ſquamis calicis breviſſimis intactis. *Kniph. bot. orig. cent.* 10. *n.* 79.

glaucus. 17. S. foliis amplexicaulibus lanceolatis obtuſis dentatis.

trilobus. 18. S. foliis amplexicaulibus, ſquamis calicis ſphacelatis laceris.

cinerascens. 66. S. foliis pinnatifidis tomentoſis margine revolutis, panicula patula, calicis ſquamis exterioribus patulis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 191.

viſcoſus. 19. S. foliis pinnatifidis viſcidis, ſquamis calicis laxis longitudine perianthii. *Dill. h. Elth. t.* 258. *f.* 336.

ſilvaticus. 20. S. foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboſo erecto. *Flor. dan. t.* 869.

nebrodensis. 21. S. foliis lyratis ſinuatis obtuſis petiolatis, caule hirto. *Barr. rar. pl. ic. t.* 401.

varicoſus. 22. S. foliis ovatis petiolatis dentatis punctulato-varicoſis. *Linn. fil. dec.* 9. *t.* 5.

hadienſis. 23. S. foliis ellipticis petiolatis integerrimis denticulatisque, caule fruticoſo, floſculis radii quinis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 149. *ic. t.* 19.

leucanthemifolius. 62. S. foliis ſpatulatis inciſo-crenatis, corymbo paucifloro. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 238.

⊢⊢ *radio patente.*

† *foliis diviſis aut compoſitis.*

pubigerus. 24. S. petiolis radicalibus lanatis, foliis runcinatis, caulibus

simpliciſſimis, floribus lateralibus ſeſſilibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 18. *f.* 32.

elegans. 25. S. foliis pinnatifidis aequalibus patentiſſimis: margine incraſſato recurvato. *Seb. muſ.* 1. *t.* 22. *f.* 1. β) *Volkam. norimb. p.* 225. *ic.*

ſqualidus. 26. S. foliis pinnatifidis: laciniis linearibus diſtantibus, corollis calice longioribus integris. β?) Senecio alpeſtris. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 387.

erucifolius. 27. S. foliis pinnatifidis dentatis ſubhirtis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic. t.* 153.

venuſtus. 67. S. foliis pinnatifidis: laciniis linearibus acutis dentatis, caule calicibusque glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 192.

alpinus. 28. S. foliis cordatis lyratis groſſe ſerratis: petiolis auritis. *Suppl. p.* 371. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 557. Cineraria alpina.

auriculatus. 71. S. foliis lanceolatis lyrato-pinnatis dentatis nudis: petiolis auritis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 72. *t.* 18.

Jacobaea. 29. S. foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Knorr del. hort.* 1. *t.* 1.

umbellatus. 30. S. foliis pinnato-denticulatis: laciniis diſtantibus. *Mant. p.* 470.

haſtatus. 31. S. foliis pinnato-ſinuatis petiolis amplexicaulibus, pedunculis folio triplo longioribus. *Dill. h. Elth. t.* 152. *f.* 184.

abrotanifolius. 32. S. foliis pinnato-multifidis linearibus nudis acutis, pedunculis ſubbifloris. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 79.

incanus. 33. S. foliis utrinque tomentoſis ſubpinnatis incanis, corymbo ſubrotundo. *Pluckn phyt.* 39. *f.* 6.

tenuifolius. 34. S. foliis pinnatis: pinnis linearibus, pedunculis corymboſis, caule erecto. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 278.

diffuſus. 35. S. foliis bipinnatis linearibus, caulibus diffuſis. *Suppl. p.* 371.

canadenſis. 36. S. foliis bipinnatis linearibus, pedunculis corymboſis.

aureus. 37. S. foliis crenatis: infimis cordatis petiolatis; ſuperioribus pinnatifidis lyratis.

lyratus. 38. S. foliis infimis lyratis dentatis: ſupremis ſerratis amplexicaulibus: lobis margine muricatis. *Suppl. p.* 369.

†† *foliis indiviſis ſimplicibusque.*

linifolius. 39. S. foliis linearibus integerrimis, corymbo ſubſquamato, caule herbaceo. *Barr. pl. rar. ic. t.* 802.

40. S.

rosmarinifolius. 40. S. foliis linearibus margine revolutis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 369. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 20.

longifolius. 41. S. foliis linearibus ſparſis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 470. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 71.

cruciatus. 42. S. foliis linearibus ſubtus tomentoſis: inferioribus cruciatis, ſuperioribus integris. *Suppl. p.* 371.

aſper. 68. S. foliis lanceolato-linearibus dentatis rigidis, calicibus ſublanuginoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 196.

juniperinus. 43. S. foliis ſubulatis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 371.

byzantinus. 44. S. foliis oblongis remote dentatis ſpinoſo-denticulatis ſupra nudis, caule herbaceo.

eroſus. 45. S. foliis radicalibus petiolatis oblongis ſinuatis ſerratis villoſis, caule unifloro ſubnudo. *Suppl. p.* 370.

ilicifolius. 46. S. foliis ſagittatis amplexicaulibus dentatis, caule herbaceo. *Seb. muſ.* 1. *t.* 22. *f.* 4.

paludoſus. 47. S. foliis enſiformibus acute ſerratis ſubtus ſubvilloſis, caule ſtricto. *Flor. dan. t.* 385.

nemorenſis. 48. S. foliis lanceolatis biſerratis ſubtus villoſis, caule ramoſo, corollis octonis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 184.

ſarracenicus. 49. S. foliis lanceolatis ſerratis glabriuſculis, floribus corymboſis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 186.

Doria. 50. S. foliis lanceolatis denticulatis nudis ſubdecurrentibus: ſuperioribus ſenſim minoribus, floribus corymboſis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 185.

marginatus. 51. S. foliis lanceolatis glabris ſubarticulatis marginatis amplexicaulibus, corymbo compoſito. *Suppl. p.* 370.

glaſtifolius. 52. S. foliis lanceolatis ſubdentatis laevibus amplexicaulibus. *Suppl. p.* 372.

lanceus. 69. S. foliis lanceolatis baſi cordatis amplexicaulibus laevibus argute ſerratis, caule fruteſcente. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 194.

lanatus. 53. S. foliis ſeſſilibus utrinque lanatis dentatis: infimis ovatis; ſuperioribus lanceolatis. *Suppl. p.* 370.

maritimus. 54. S. foliis ovatis denticulatis carnoſis amplexicaulibus, caule herbaceo procumbente. *Suppl. p.* 369.

angulatus. 55. S. foliis ovatis dentato-angulatis glabris petiolatis. *Suppl. p.* 369.

56. S.

Doroni- 56. S. foliis indiviſis ſerratis: radicalibus ovatis ſubtus villoſis,
cum. caule indiviſo ſubuniflоro. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *app. t.* 45.

populifo- 57. S. foliis ovatis ſpatulatis integris obtuſis: adultioribus ſupra
lius. glabris, caule fruticoſo.

rigidus. 58. S. foliis ſpatulatis repandis eroſis ſcabris amplexicaulibus,
caule fruticoſo. *Seb. muſ.* 1. *t.* 22. *f.* 5.

ſibiricus. 59. S. foliis ellipticis laevibus, floſculis radii quinis. *Suppl.*
p. 370.

halimifo- 60. S. foliis obovatis carnoſis dentatis, caule fruticoſo. *Dill.*
lius. *h. Eltb. t.* 104. *f.* 124.

cordifoli- 61. S. foliis cordatis dentatis, calicibus ſimpliciſſimis. *Suppl.*
us. *p.* 372.

incertae tribus.

ciliatus. 65. S. floribus radiatis, caule piloſo, foliis lanceolato-linearibus ciliatis. *Walt. flor. carol. p.* 208.

954. ASTER. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Coroll.* radii plures, quam 10. *Cal.* imbricati ſquamae inferiores patulae.

* *Fruticoſi.*

reflexus. 1. A. foliis ovatis ſubimbricatis recurvatis ſerrato-ciliatis, floribus terminalibus. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 28.

Cymbala- 46. A. foliis ovatis ſinuatis calicibusque imbricatis hirtis. *Ait.*
riae. *hort. Kew.* 3. *p.* 197.

crinitus. 2. A. foliis ovato-oblongis acutis ſubtus tomentoſis, calicibus pilo terminatis.

fruticulo- 3. A. foliis linearibus punctatis, pedunculis uniflоris nudis.
ſus. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 27.

taxifolius. 4. A. ſuffruticoſus, foliis decurrentibus ſubulatis canaliculatis ciliatis, floribus terminalibus.

caroliniа- 43. A. caule ramoſiſſimo flexuoſo ſubſcandente, foliis integris
nus. laevibus lanceolatis ſeſſilibus, pedunculis folioſis uniflоris. *Walt. flor. carol. p.* 208.

** *Her-*

** *Herbacei.*

⊢ *foliis subintegerrimis.*

† *pedunculis squamatis.*

hyssopifolius. 5. A. foliis lineari-lanceolatis basi attenuatis striatis, ramulis corymbosis fastigiatis. *Mant. p.* 114. 517.

dumosus. 6. A. foliis linearibus glabris: ramulorum brevissimis paniculatis, ramis calicibus cylindricis. *Pluckn. alm. t.* 78. *f.* 6.

ericoides. 7. A. foliis linearibus glaberrimis: rameis subulatis, caulinis elongatis, calicibus subsquarrosis, caule glabro.

multiflorus. 52. A. foliis linearibus glabriusculis, ramulis secundis, calicibus squarrosis: squamis acutis, caule pubescente. *Dill. hort. Elth.* 40. *t.* 36. *f.* 40.

foliolosus. 53. A. foliis lanceolato-linearibus glabris; ramulorum patentissimis, calicis squamis acutis, caule pubescente. *Dill. hort. Elth.* 39. *t.* 35. *f.* 39.

salicifolius. 54. A. foliis lineari-lanceolatis glabris, calicibus laxis, caule laevi. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 203.

linariifolius. 8. A. foliis linearibus mucronatis scabris striatis: superioribus laxis remotis, calicibus inermibus, ramis fastigiatis. *Pluckn. alm. t.* 14. *f.* 7.

linifolius. 9. A. foliis linearibus scabriusculis, ramis corymbosis fastigiatis, radiis disco subaequalibus.

rigidus. 10. A. foliis linearibus alternis, floribus terminalibus solitariis.

tenuifolius. 11. A. foliis sublinearibus, pedunculis foliosis. *Pluckn. alm. t.* 78. *f.* 5.

nemoralis. 47. A. foliis lineari-lanceolatis basi attenuatis scabriusculis, ramis filiformibus unifloris, calicibus laxis imbricatis: foliolis acutis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 198.

acris. 12. A. foliis lanceolato-linearibus striatis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pedunculis foliosis. *Lob. ic.* 349.

umbellatus. 48. A. foliis lanceolatis basi attenuatis margine scabris, ramis corymbosis fastigiatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 199.

novae angliae. 13. A. foliis lanceolatis cordatis pilosis amplexicaulibus, calicibus laxis discum superantibus: foliolis lineari-lanceolatis subaequalibus, caule hispido. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 2.

ciliatus. 44. A. foliis lanceolatis integris ciliatis, floribus subsolitariis. *Walt. flor. carol. p.* 209.

45. A.

ſquarroſus. 45. A. foliis ſquarroſis triangularibus confertis ſcabris, floribus ſubpaniculatis. *Walt. flor. carol. p.* 209.

grandiflorus. 14. A. foliis linearibus ſubamplexicaulibus hiſpidis ciliatis: ramorum calicisque reflexis. *Mill. h. angl. t.* 282.

paludoſus. 49. A. foliis linearibus amplexicaulibus erectis glaberrimis margine ſcabris, pedunculis ſubnudis, calicibus ſquarroſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 201.

patens. 50. A. foliis oblongis integris acutis cordatis ſubamplexicaulibus ſcabris, ramis patulis elongatis pauciflоris, calicibus ſubſquarroſis, caule hirto. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 201.

aeſtivus. 51. A. foliis lanceolatis ſubamplexicaulibus glabris margine ſcabris, calicibus laxis: foliolis aequalibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 203.

undulatus. 15. A. foliis ſerratis piloſis undulatis: inferioribus cordatis; petiolis alatis caule hiſpido: ramulis virgatis. *Herm. par. Lugdb. p.* 96. *ic.*

coriaceus. 16. A. foliis ovatis ſuperne ſulcatis ſubtus lanatis, pedunculis unifloris lanatis. *Forſter flor. auſtr. p.* 56.

concolor. 17. A. foliis ovatis ſeſſilibus, caule ſimpliciſſimo, racemo terminali.

†† *pedunculis nudis.*

Tripolium. 18. A. foliis lineari-lanceolatis carnoſis glabris trinerviis, calicis ſquamis ſubmembranaceis obtuſis. *Flor. dan t.* 615.

vernus. 19. A. foliis radicalibus lanceolatis obtuſis, caule ſubnudo filiformi ſubramoſo.

Amellus. 20. A. foliis oblongo-lanceolatis integris ſcabris, ramis nudiuſculis corymboſis, calicibus imbricatis ſubſquarroſis: ſquamis obtuſis interioribus membranaceis apice coloratis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 435.

ſibiricus. 21. A. foliis lanceolatis ſubamplexicaulibus piloſo-ſcabris ſerratis, calicibus laxis hiſpidis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 80. *f.* 1.

alpinus. 22. A. foliis ſubſpatulatis hirtis, caule ſimplici unifloro. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 88.

tenellus. 23. A. foliis filiformibus aculeato-ciliatis, calicibus hemiſphaericis foliolis aequalibus. *Mant. p.* 471. *Curtis bot. magaz. t.* 33.

24. A.

divarica-tus. 24. A. foliis ovatis ſerratis: floralibus integerrimis obtuſiuſculis amplexicaulibus, ramis divaricatis. *Pluckn. alm. t.* 79. *f.* 1.

⊢⊢ *foliis ſerratis.*

† *pedunculis nudis.*

cordifoli-us. 25. A. foliis cordatis petiolatis ſubtus piloſis: petiolis ſubſimplicibus, caule hirto: ramis paniculatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 22. *f.* 34.

corymbo-ſus. 59. A. foliis cordatis glabris acuminatis petiolatis: petiolis ſimplicibus, caule glabro: ramis faſtigiatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 207.

paniculatus. 60. A. foliis glabris acutis petiolatis: radicalibus cordatis, caulinis ovatis, ſummis lanceolatis integris, caule glabro paniculato, calicibus laxis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 207.

puniceus. 26. A. foliis amplexicaulibus lanceolatis ſcabris, caule hiſpido: ramis paniculatis, calicibus laxis diſcum ſuperantibus. *Herm. par. Lugdb. p.* 651. *ic.*

annuus. 27. A. foliis piloſiuſculis: ſuperioribus lanceolatis, inferioribus ſubovatis crenatis, calicibus hemiſphaericis: ſquamis ſtrigoſis ſubaequalibus. *Flor. dan. t.* 486.

ſcaber. 28. A. foliis oblongis ſcabris, pedunculis paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 316.

†† *pedunculis ſquamoſis.*

indicus. 29. A. foliis ovato-oblongis: floralibus ovali-lanceolatis, ramulis unifloris. *Pluckn. alm. t.* 149. *f.* 4.

miſus. 30. A. foliis ſeſſilibus lanceolatis ſubſerratis glabris, calicis ſquamis acutis, diſco radiis aequali, caule villoſiuſculo.

laevis. 31. A. foliis amplexicaulibus: lucidis oblongis: radicalibus ſubſerratis, caule glabro: ramis ſimplicibus ſubumbelliferis.

novi Belgii. 32. A. foliis ſubamplexicaulibus lanceolatis glabris margine ſcabris: inferioribus ſerratis, caule glabro, ramis ſubdiviſis, calicibus laxis. *Herm. par. Lugdb. p.* 67. *ic.*

Tradeſcanti. 33. A. foliis lanceolatis ſeſſilibus cauleque tereti glabris; ramis virgatis.

junceus. 55. A. foliis lanceolato-linearibus ſeſſilibus glabris: infimis ſubſerratis, ramulorum lanceolatis, caule glabriuſculo, ramis virgatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 204.

56. A.

pendulus. 56. A. foliis elliptico-lanceolatis glabris: ramulorum remotiusculis, caule pubescente: ramis divaricatissimis pendulis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 204.

diffusus. 57. A. foliis elliptico-lanceolatis glabris, caule pubescente, ramis patentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 205.

divergens. 58. A. foliis elliptico-lanceolatis glabris: caulinis lineari-lanceolatis, caule pubescente: ramis patentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 205.

tardiflorus. 34. A. foliis glabris lanceolatis basi attenuatis sessilibus, calicibus laxis glabris.

spectabilis. 61. A. foliis lanceolatis scabriusculis: inferioribus serratis, ramis corymbosis, calicibus laxis squarrosis foliaceis: squamis subcuneiformibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 209.

Radula. 62. A. foliis lanceolatis acuminatis rugosis scaberrimis, calicis squamis lanceolatis obtusis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 210.

holosericeus. 35. A. foliis oblongo-lanceolatis subtus argenteo-sericeis, pedunculis unifloris foliosis. *Forst. flor. austr. p.* 56.

mutabilis. 36. A. foliis subamplexicaulibus laevibus lanceolatis, calicibus laxis, caule glabro: ramulis virgatis. *Pluckn. alm. t.* 326. *f.* 1.

tataricus. 37. A. foliis radicalibus lanceolato-ovatis scabris, caule pauciflоro. *Suppl. p.* 373.

sinensis. 38. A. foliis ovato-oblongis integris sinuatisve ciliatis, calicibus ciliatis foliosis patentibus. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 3. 4. 5.

macrophyllus. 39. A. foliis oblongis, caulinis cordatis petiolatis; summis ovatis sessilibus. *Otterit. stirp. nov.* 2. *t.* 66.

crispus. 40. A. foliis linearibus serrato-crispis, caule tomentoso, radio disco breviore. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 150.

††† *pedunculis nullis.*

hispidus. 41. A. foliis infimis oblongis crenatis scabris: caulinis lanceolatis integris ciliatis, caule scabro, floribus ramos terminantibus. *Thunb. flor. jap. p.* 315. *Banks ic. Kaempf. t.* 29.

*** *incertae tribus.*

ericaefolius. 42. A. calice cylindrico: squamis membranaceis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 150.

salicinus. 63. A. foliis lanceolatis serratis margine scabris, ramis sublinearibus integerrimis, pedunculis alternis subnudis. *Scholl. flor. barb. t.* 1.

955. SOLIDAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cor.* radii circiter 5. *Cal.* ſquamae imbricatae, conniventes.

ſuaveolens. 1. S. foliis lineari-lanceolatis integerrimis acutis ſubquinquenerviis punctatis glabris tenerrime ciliatis, racemis paniculatis ſecundis, caule erecto pubeſcente. *Schoepf. it.* 1. *p.* 166. *Pluckn. alm. t.* 116. *f.* 6.

viminea. 24. S. caule erecto ſubpubeſcente, foliis lineari-lanceolatis membranaceis baſi attenuatis glabris margine ſcabris: infimis ſubſerratis, racemis erectis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 215.

dubia. 2. S. foliis lanceolatis ſeſſilibus nervoſis ſupra ſcabris rariter denticulatis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 19. *t.* 10.

mexicana. 3. S. foliis lanceolatis ſubcarnoſis laevibus integerrimis, racemis paniculatis erectis: pedunculis ſquamoſis, caule obliquo glabro.

ſerotina. 4. S. racemis terminalibus folioſis ſecundis, foliis lanceolatis ſubſerratis deflexis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 26. *an diſtinctae ſatis ſpecies?*

piloſa. 18. S. panicula terminali, caule piloſo, foliis ovatis integris ciliatis. *Walt. flor. carol. p.* 207.

ſempervirens. 5. S. foliis lineari-lanceolatis ſubcarnoſis laevibus integerrimis margine ſcabro, racemis paniculatis ſecundis, caule erecto glabro. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 5.

gigantea. 25. S. caule erecto glabro, foliis lanceolatis ſerratis glabris margine ſcabris, racemis paniculatis ſecundis: pedunculis hirtis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

arguta. 26. S. caule erecto glabro, foliis glabris argute inaequaliter ſerratis: caulinis ellipticis, radicalibus ovato-oblongis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 213.

juncea. 27. S. caule erecto glabro, foliis lanceolatis glabris margine ſcabris: inferioribus ſerratis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 213.

elliptica. 28. S. caule erecto glabro, foliis ellipticis laevibus ſerratis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 214.

strícta. 29. S. caule erecto glabro, foliis caulinis lanceolatis glabris margine scabris integerrimis: radicalibus serratis, racemis paniculatis erectis: pedunculis glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 216.

laevigata. 30. S. caule erecto laevi, foliis carnosis lanceolatis integerrimis laevibus, racemis paniculatis erectis: pedunculis squamosis villosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 215.

Sera. 31. S. caule erecto tereti laevi, foliis lineari-lanceolatis triplinerviis glabris margine asperis serratis, racemis paniculatis secundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

caesia. 6. S. foliis lanceolatis serratis glabris, racemis erectis, caule recto laevi. *Dill. h. Elth. t.* 307. *f.* 395.

latériflora. 7. S. racemis paniculatis secundis subrecurvis, foliis lanceolatis subtriplinerviis glabris margine scabris, caule erecto pilosiusculo.

altíssima. 8. S. caule erecto hirto, paniculis secundis, foliis enerviis serratis rugosis scaberrimis lanceolatis. *Mart. cent. t.* 14.

canadénsis. 9. S. caule villoso erecto, racemis paniculatis secundis recurvis, foliis lanceolatis triplinerviis serratis scabris. *Pluckn. alm. t.* 263. *f.* 1.

procera. 19. S. caule erecto villoso, racemis spiciformibus erectis: innuptis nutantibus, foliis lanceolatis serratis triplinerviis scabris subtus villosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

reflexa. 20. S. caule erecto villoso, racemis paniculatis subsecundis, foliis lanceolatis subserratis triplinerviis scabris reflexis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

petiolaris. 21. S. caule erecto villoso, racemis erectis, foliis ellipticis scabriusculis petiolatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 215.

nemoralis. 22. S. caule erecto tomentoso, foliis caulinis lanceolatis hispidis integerrimis: radicalibus subcuneiformibus serratis, racemis paniculatis secundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 213.

bicolor. 10. S. racemis erectis, caule foliisque ellipticis pilosis: inferioribus serratis, calicis squamis obtusis. *Mant. p.* 114. *Pluckn. alm. t.* 114. *f.* 8.

minuta. 11. S. caule simplicissimo piloso, foliis lanceolatis acutis serratis glabris, racemo terminali simplici erecto. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 7. 8.

23. S.

aſpera. 23. S. caule erecto tereti piloſo, racemis paniculatis ſecundis, foliis ovatis ſubellipticis ſcaberrimis rugoſis ſerratis enerviis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 212.

Virgaurea. 12. S. caule erecto tereti pubeſcente ſuperne ramoſo, racemis erectis, foliis inferioribus ellipticis ſerratis. *Flor. dan. t.* 663.

cambrica. 33. S. caule ſimpliciſſimo pubeſcente, foliis cuneiformi-lanceolatis ſerratis ſubpiloſis, racemis erectis. *Dill. hort. Elth.* 413. *t.* 306. *f.* 393.

multiradiata. 34. S. caule ſubvilloſo, foliis ſeſſilibus lanceolatis glabris ciliatis: inferioribus apice ſerratis, racemo terminali erecto. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 218.

flexicaulis. 13. S. caule flexuoſo glabro angulato, foliis ovatis acuminatis ſerratis glabris, racemis erectis. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 3. *an eadem cum latifolia?*

ambigua. 32. S. caule ſubflexuoſo angulato glabro ramoſo, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſubtus ſubpiloſis, racemis erectis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 217.

latifolia. 14. S. caule erecto, foliis ovatis acuminatis ſerratis, racemis lateralibus ſimplicibus. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 4.

rigida. 15. S. caule foliisque ovato-oblongis piloſis ſcabris: caulinis integerrimis infimis ſerratis floriferis paniculatis, racemis compactis erectis. *Herm. par. Lugdb. p.* 243. *ic.*

novebora-cenſis. 16. S. foliis radicalibus ovato-oblongis petiolatis, caule nudiuſculo ramoſo faſtigiato.

arboreſcens. 17. S. caule arboreo, paniculis corymboſis ſtrictis terminalibus, foliis ovato-ſubrotundis acutis repandis petiolatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 56.

951. CINERARIA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* ſimplex, polyphyllus, aequalis. ✓

geifolia. 1. C. pedunculis ramoſis, foliis reniformibus ſuborbiculatis ſublobatis dentatis petiolatis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 22. *f.* 2.

humifuſa. 2. C. pedunculis unifloris, foliis reniformibus ſubangulatis: petiolis apice auriculatis nudisve. *Herit. ſert. angl. p.* 25.

cymbalarifolia. 3. C. foliis lyratis: impari reniformi denticulato, caulinis ſummis amplexicaulibus lobatis integerrimis.

tuſſilaginis. 4. C. floribus laxe paniculatis, foliis reniformi-cordatis multangulis ſubtus tomentoſis: petiolis baſi auritis. *Herit. ſert. angl. p.* 26.

ſibirica. 5. C. racemo ſimplici, foliis cordatis obtuſis denticulatis laevibus, caule ſimpliciſſimo monophyllo. *Mant. p.* 472. *Amm. ruth. t.* 24.

cordifolia. 6. C. panicula pauciflora, foliis caulinis petiolatis cordatis acute ſerratis glabris, caule angulato. *Suppl. p.* 371. 375. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 176. β) *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 177.

aurita. 7. C. floribus corymboſis, foliis cordatis ſubangulatis ſubtus tomentoſis: petiolis baſi biauritis. *Herit. ſert. angl. p.* 26. *t.* 31.

malvaefolia. 8. C. floribus cymoſis, foliis cordatis angulatis ſubtus ſubtomentoſis: petiolis ſimplicibus. *Herit. ſert. angl. p.* 26. *t.* 32.

cruenta. 9. C. floribus cymoſis, foliis cordatis angulatis ſubtus purpuraſcentibus: petiolis baſi auritis. *Herit. ſert. angl. p.* 26. *t.* 33.

elongata. 10. C. foliis ſubcordatis eroſis, pedunculis longiſſimis ſubulato-ſquamoſis. *Suppl. p.* 374.

lanata. 11. C. pedunculis unifloris, foliis cordato-ſubrotundis ſeptangulis ſubtus lanuginoſis. *Herit. ſert. angl. p.* 25. *t.* 30. *Jacq. Collect.* 3. *p.* 177. *t.* 19. *f.* 1.

glauca. 12. C. racemo ſimplici, foliis ſpatulato-cordatis integerrimis, caule ſimpliciſſimo. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 74.

criſpa. 13. C. floribus paniculatis, foliis caulinis ſpatulato-oblongis ſerratis obtuſis amplexicaulibus baſi dilatato-dentatis. *Suppl. p.* 376. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 178.

longifolia. 14. C. foliis oblongis obſolete denticulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 181.

cacalioides. 15. C. foliis oblongis teretibus carnoſis, panicula terminali elongata pauciflora: pedunculis alternis. *Suppl. p.* 374.

glabra. 16. C. foliis oblongis acutis ſubdenticulatis enerviis utrinque glabris ſubcarnoſis, caule fruticoſo corymboſo, calicibus cylindricis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 113.

linifolia. 17. C. pedunculis unifloris, foliis ſparſis, caule fruticoſo.

japonica. 18. C. foliis enſiformibus dentatis tomentoſis, floribus terminalibus. *Thunb. flor. jap. p.* 317.

integrifolia. 19. C. floribus umbellatis, foliis denticulatis lanceolatis, radicalibus ſpatulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 179. γ) *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 180.

20. C.

aurea. 20. C. floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis subtus tomentosis.

denticulata. 21. C. foliis lanceolatis glabris denticulatis, floribus paniculatis. *Suppl. p.* 375.

lineata. 22. C. foliis lanceolatis subtus tomentosis apice serratis basi dentatis. *Suppl. p.* 375.

discolor. 23. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subdenticulatis glabris subtus niveo-tomentosis, caule fruticoso corymboso. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 114.

americana. 24. C. fruticosa, paniculis axillaribus, foliis alternis petiolatis lato-lanceolatis serratis supra glabris subtus incanis. *Suppl. p.* 373.

palustris. 25. C. floribus corymbosis, foliis lato-lanceolatis dentato-sinuatis, caule villoso. *Flor. dan. t.* 573.

hastifolia. 26. C. foliis hastatis: laciniis lateralibus bifidis divaricatis. *Suppl. p.* 376.

sonchifolia. 27. C. foliis amplexicaulibus sinuatis difformibus. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 21. *f.* 1.

senecionis. 28. C. foliis sinuato-pinnatifidis glabris: caulinis subsessilibus, floribus subcorymbosis. *Herit. sert. angl. p.* 27.

viscosa. 29. C. pedunculis unifloris, foliis pinnatifido-lobatis acutis viscidis subcarnosis. *Herit. sert. angl. p.* 25.

maritima. 30. C. floribus paniculatis, foliis pinnatifidis tomentosis laciniis sinuatis, caule frutescente. *Kniph. bot. orig. cent.* 6. *n.* 68.

canadensis. 31. C. floribus paniculatis, foliis pinnatifidis subvillosis: laciniis sinuatis, caule herbaceo.

capillacea. 32. C. foliis pinnatis: pinnis capillaceis integris. *Suppl. p.* 375.

lobata. 33. C. floribus subcorymbosis, foliis subrotundis multilobatis glabris: petiolis basi auritis, calicibus subcaliculatis. *Herit. sert. angl. p.* 26. *t.* 34.

purpurata. 34. C. caule subbifloro, foliis obovatis subtomentosis. *Mant. p.* 285.

alata. 35. C. caule herbaceo, foliis obovatis decurrentibus, floribus corymbosis. *Suppl. p.* 374.

Amelloides. 36. C. pedunculis unifloris, foliis oppositis ovatis nudis, caule suffruticoso. *Mill. h. angl. t.* 76. *f.* 2.

repanda. 37. C. paniculis compoſitis racemoſis diffuſis, foliis petiolatis ovatis repando-ſinuatis ſubtus tomentoſis, caule arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 56. *Charact. gen. t.* 46.

ſcapiflora. 38. C. pedunculis longiſſimis unifloris, foliis ovatis glabris duplicato-dentatis. *Suppl. p.* 25.

multiflora. 39. C. floribus cymoſis, foliis cordato-ovatis ſubtus tomentoſis: petiolis dimidio auritis. *Herit. ſert. angl. p.* 26.

perfoliata. 40. C. foliis ovato-cordatis amplexicaulibus, pedunculis unifloris elongatis. *Suppl. p.* 375.

rotundifolia. 41. C. paniculis pauciflоris, foliis petiolatis ovato-ſubrotundis integerrimis ſubtus tomentoſis, caule arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 56. *Charact. gen. t.* 46.

caroliniенſis. 42. C. floribus paniculatis, foliis petiolatis oblongis denticulatis laevibus, caule herbaceo. *Walt. flor. carol. p.* 207.

956. INULA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Antherae* baſi in ſetas 2 deſinentes.

ſquarroſa. 1. I. foliis ſeſſilibus ovatis laevibus reticulato-venoſis ſubcrenatis, calice ſquarroſo. *Pluckn. alm. t.* 16. *f.* 1.

caerulea. 2. I. foliis decurrentibus obovatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo, floribus ſeſſilibus terminalibus. *Mant. p.* 471. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 553. After polifolius.

provinciалis. 3. I. foliis ſubſerratis ſubtus tomentoſis: radicalibus petiolatis ovatis, caule erecto unifloro.

odora. 4. I. foliis amplexicaulibus dentatis hirſutiſſimis: radicalibus ovatis; caulinis lanceolatis, caule paucifloro. *Col. ecphr.* 1. *p.* 253. *ic.*

Helenium. 5. I. foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis ſubtus tomentoſis, calicum ſquamis ovatis. *Flor. dan. t.* 728.

ſpiraeifolia. 6. I. foliis ſubſeſſilibus ovato-oblongis nudis reticulatis confertis ſerrulatis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus.

Oculus Chriſti. 7. I. foliis amplexicaulibus oblongis integris hirſutis, caule piloſo corymboſo. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *p.* 223.

arabica. 8. I. foliis oblongis ſeſſilibus, pedunculis filiformibus, calicibus cylindricis. *Mant. p.* 115. *Pluckn. alm. t.* 149. *f.* 4.

dubia. 9. I. foliis ſeſſilibus oblongis ciliatis, caule unifloro. *Thunb. flor. jap. p.* 318.

10. I.

bifrons. 10. I. foliis decurrentibus oblongis denticulatis, floribus congestis terminalibus subsessilibus. *Bocc. mus.* 1. *t.* 121.

dysenterica. 11. I. foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoso paniculato, calicis squamis setaceis. *Flor. dan. t.* 410.

indica. 12. I. foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis serratis, pedunculis unifloris filiformibus, floribus globosis. *Burm. zeyl. t.* 55. *f.* 2.

undulata. 13. I. foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis undulatis. *Mant. p.* 115.

Pulicaria. 14. I. foliis amplexicaulibus undulatis, caule prostrato, floribus subglobosis: radio brevissimo. *Flor. dan. t.* 613.

suaveolens. 15. I. foliis lanceolatis subserratis: inferioribus petiolatis; superioribus sessilibus, caule multifloro subcorymboso. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 51.

britannica. 16. I. foliis amplexicaulibus lanceolatis serratis distinctis subtus villosis, caule ramoso erecto villoso. *Flor. dan. t.* 413.

chrysocomoides. 17. I. foliis semiamplexicaulibus linearibus margine revolutis minutis, pedunculis unifloris. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 239.

germanica. 18. I. foliis sessilibus lanceolatis recurvis scabris, floribus subfasciculatis. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 134.

salicina. 19. I. foliis lanceolatis recurvis serrato-scabris, ramis angulatis, floribus inferioribus altioribus. *Flor. dan. t.* 786.

hirta. 20. I. foliis sessilibus lanceolatis recurvis subserrato-scabris, caule teretiusculo subpiloso, floribus inferioribus altioribus. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 358.

mariana. 21. I. foliis sessilibus lanceolatis subserratis pilosis, pedunculis subunifloris subviscosis: foliolis linearibus. *Mill. dict. ic. t.* 56.

Buboninum. 22. I. foliis lanceolatis rigidulis denticulatis subvillosis sessilibus, caule ramisque subbifloris: calice squarroso. *Jacq. flor. austr.* 5. *app. t.* 19.

japonica. 23. I. foliis sessilibus lanceolatis denticulatis, pedunculis virgatis unifloris. *Thunb. flor. jap. p.* 318. *Banks ic. Kaempf. t.* 30.

montana. 24. I. foliis lanceolatis hirsutis integerrimis, caule unifloro, calice brevi imbricato. *Lob. ic.* 350.

foetida. 25. I. foliis lanceolato-linearibus integerrimis, corymbis ramosis, radiis florum brevissimis. *Bocc. sicc. t.* 13.

26. I.

aromatica. 26. I. foliis linearibus integerrimis tomentosis sparsis, caule fruticoso. *Pluckn. alm. t.* 326. *f.* 2.

ensifolia. 27. I. foliis sessilibus linearibus acuminatis nervosis glabris sparsis, caule subunifloro. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 162.

crithmifolia. 28. I. foliis linearibus carnosis tricuspidatis.

pinifolia. 29. I. foliis subulato-linearibus triquetris confertissimis, caule fruticoso. *Mant. p.* 472. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 18. *f.* 31.

aestuans. 30. I. foliis spatulatis subtus tomentosis. *Plum. ic.* 41. *f.* 2.

958. ARNICA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Corollul.* radii filamentis 5 fine antheris.

montana. 1. A. foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis. *Flor. dan. t.* 63.

ciliata. 2. A. foliis amplexicaulibus ovatis dentatis ciliatis glabris, caule simplici unifloro. *Thunb. flor. jap. p.* 318.

crocea. 3. A. foliis ovatis repando-denticulatis subtus tomentosis. *Burm. afr. t.* 55. *et t.* 56. *f.* 2.

glacialis. 4. A. foliis alternis repando-subdentatis: radicalibus ovatis; caulinis lanceolatis. *Wulfen ap. Jacq. Collect.* 1. *p.* 230. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 47.

scorpioides. 5. A. foliis alternis dentatis mollibus oblongo-ovatis. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 349.

Doronicum. 6. A. foliis alternis subserratis oblongis asperis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 92.

hirsuta. 7. A. foliis oblongis hirsutis subtus tomentosis, scapo nudo unifloro. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 151.

piloselloides. 8. A. foliis integerrimis ellipticis villosis, scapo unifloro aphyllo lanato, calice radium aequante.

maritima. 9. A. foliis lanceolatis: inferioribus serratis, caule folioso multifloro.

Oporina. 10. A. fruticosa, foliis lanceolatis calloso-crenatis subtus tomentosis, pedunculis unifloris solitariis terminalibus squamatis. *Forst. flor. austr. p.* 56.

japonica. 11. A. foliis inciso-palmatis denticulatis, floribus terminalibus subbinis. *Thunb. flor. jap. p.* 319.

12. A.

palmata. 12. A. foliis inciso-palmatis dentatis, floribus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 319.

Gerbera. 13. A. foliis pinnatifidis: laciniis rotundatis. *Burm. afr. t.* 56. *f.* 1.

coronopifolia. 14. A. foliis pinnatis: pinnis linearibus.

959. DORONICUM. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Calic.* squamae 2plicis ordinis aequales disco longiores. *Sem.* radii nuda pappoque destituta.

Pardalianches. 1. D. foliis cordatis obtusis denticulatis: radicalibus petiolatis; caulinis amplexicaulibus. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 350. *β*) Doronicum austriacum. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 130.

altaicum. 2. D. foliis ovalibus decurrenti-amplexicaulibus alternis. *Pallas act. Petrop.* 1779. 2. *p.* 271. *t.* 16.

plantagineum. 3. D. foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alternis.

Bellidiastrum. 4. D. caule nudo simplicissimo unifloro. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 400.

acaule. 5. D. scapis nudis simplicissimis multifloris tomentosis. *Walt. flor. carol. p.* 205.

laevifolium. 6. D. caule subsimplici, foliis laevibus subdentatis. *Walt. flor. carol. p.* 205.

ramosum. 7. D. caule ramoso, foliis lanceolatis subhirsutis sessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 205.

960. PERDICIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris sessilis. *Corollul.* 2labiatae.

semiflosculare. 1. P. scapo unifloro nudo: flore semiflosculoso.

radiale. 2. P. floribus subradiatis, calice exteriore tetraphyllo; caule fruticoso. *Brown. jam. t.* 33. *f.* 1.

brasiliense. 3. P. floribus subradiatis, calicibus simplicibus, caule herbaceo. *Mant. p.* 115.

laevigatum. 4. P. floribus subradiatis, caule suffruticoso, foliis lanceolatis acutis integerrimis. *Bergius act. Stockh.* 1772. *p.* 228. *t.* 7.

magellanicum. 5. P. foliis runcinatis, caule diphyllo simplici unifloro. *Suppl. p.* 376.

tomentosum. 6. P. foliis lyratis subtus tomentosis. *Thunb. flor. jap. p.* 319.

1421. MUTISIA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* cylindricus, imbricatus. *Corollul. radii* ovali-oblongae: *disci* trifidae.

Clematis. 1. Mutisia. *Suppl. p.* 373.

961. HELENIUM. *Recept.* nudum: *radii* paleaceum. *Pappus* 5dentatus. *Cal.* simplex multipartitus. *Corollulae* radii semitrifidae.

auctumnale. 1. H. foliis serratis decurrentibus glaberrimis. *Pluckn. amalth. t.* 372. *f.* 4.

aestivale. 2. H. foliis integerrimis, corollulis radii quadrifidis. *Walt. flor. carol. p.* 210.

vernale. 3. H. foliis integerrimis, corollulis radii trifidis. *Walt. flor. carol. p.* 210.

serotinum. 4. H. foliis serratis sessilibus. *Walt. flor. carol. p.* 210.

pubescens. 5. H. foliis pubescentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 227.

BOLTONIA. *Cal.* imbricatus: squamis linearibus. *Pappus* obsolete dentatus, 2cornis. *Recept.* favosum. *Germ.* compressa, verticalia.

glastifolia. 1. B. foliis inferioribus serratis. *Herit. sert. angl. p.* 27. *t.* 35.

asteroides. 2. B. foliis integerrimis. *Herit. sert. angl. p.* 27. *t.* 36. *Mant. p.* 116. Matricaria asteroides.

962. BELLIS. *Recept.* nudum, conicum. *Pappus* o. *Cal.* hemiſphaericus: ſquamis aequalibus. *Sem.* obovata.

perennis. 1. B. ſcapo nudo. *Flor. dan. t.* 503.

annua. 2. B. caule ſubfolioſo ramoſo multifloro.

arabica. 3. B. foliis lanceolatis ciliatis: petiolo alato lineari. *Forsk. flor. aeg. amb. p.* 151.

1322. BELLIUM. *Recept.* nudum. *Sem.* turbinata: corona paleacea 8phylla, *pappo*que ariſtato. *Cal.* foliolis aequalibus.

bellidioides. 1. B. ſcapis nudis filiformibus. *Mant. p.* 285. *Triumf. obſ. t.* 82.

minutum. 2. B. caule folioſo. *Mant. p.* 286. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 561. Pectis minuta. *Schreb. n. act. Upſ.* 1. *t.* 5. *f.* 2.

964. TAGETES. *Recept.* nudum. *Pappus* paleis 5 erectis. *Cal.* 1phyllus, 5dentatus, tubuloſus. *Floſculi* radii 5 perſiſtentes.

patula. 1. T. caule ſubdiviſo patulo. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 7. 8.

erecta. 2. T. caule ſimplici erecto, pedunculis nudis unifloris. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 6. a. *β*) *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 6. *γ*) *Col. ecphr.* 2. *t.* 46. *f.* 1. *δ*) *Col. ecphr.* 2. *t.* 46.

minuta. 3. T. caule ſimplici recto, pedunculis ſquamoſis multifloris. *Dill. h. Elth. t.* 280. *f.* 362.

963. LEYSERA. *Recept.* ſubpaleaceum. *Pappus* paleaceus: diſci etiam plumoſus. *Cal.* ſcarioſus.

gnaphaloides. 1. L. foliis ſparſis, floribus pedunculatis. *Seb. muſ.* 2. *t.* 66. *f.* 6.

Californ[illegible]. 2. L. foliis trifariis, floribus ſubſeſſilibus. *Mant. p.* 286. *Pluckn. phyt.* 350. *f.* 4.

3. L.

carolinia-na. 3. L. foliis radicalibus rotundatis ſubſerratis hirſutis, caulinis oppoſitis. *Walt. flor. carol. p.* 211.

paleacea. 4. L. foliis triquetris apice calloſis recurvatis; *an potius Athanaſiae ſpecies?*

974. ZINNIA. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* mucronibus 2 erectis. *Cal.* ovato-cylindricus, imbricatus. *Floſcul.* radii 5 perſiſtentes, integri.

pauciflora. 1. Z. floribus ſeſſilibus. *Mill. h. angl. t.* 64.

multiflora. 2. Z. floribus pedunculatis, foliis petiolatis. *Linn. dec.* 23. *t.* 12.

verticillata. 3. Z. foliis verticillatis integris.

Bidens. 4. Z. foliis pinnatifidis, caulinis ſeſſilibus, ſeminum ariſtis longis retro aculeatis. *Koenig apud Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 28.

965. PECTIS. *Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 5phyllus, cylindricus. *Floſculi* radii 5.

linifolia. 1. P. foliis linearibus integerrimis utrinque laevibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 149. *f.* 3.

punctata. 2. P. foliis linearibus ſeſſilibus ſubtus punctatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 196.

ciliaris. 3. P. foliis linearibus ſemiamplexicaulibus baſi ciliatis. *Plum. ic.* 51. *f.* 2.

humifuſa. 4. P. foliis ovatis ſubtus punctatis baſi utrinque ciliatis, caulibus procumbentibus. *Plum. ic.* 84. *t.* 95. *f.* 2.

966. CHRYSANTHEMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* marginatus. *Cal.* hemisphaericus, imbricatus: squamis marginalibus membranaceis.

* *Leucanthema.*

frutescens. 1. Chr. fruticosum, foliis carnosis linearibus pinnatis dentatis apice trifidis. *Walt. hort. t.* 24.

corymbosum. 2. Chr. foliis pinnatis inciso-serratis, caule multifloro. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 379.

inodorum. 3. Chr. foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffuso. *Flor. dan. t.* 896.

Achilleae. 4. Chr. foliis bipinnatis: pinnis imbricatis, caule stricto multifloro. *Mich. nov. pl. gen. t.* 29.

monspeliense. 5. Chr. foliis imis palmatis: foliolis linearibus pinnatifidis. *Jacq. obs. bot.* 4. *t.* 93.

alpinum. 6. Chr. foliis cuneiformibus pinnatifidis: laciniis integris, caulibus unifloris. *Barrel. pl. rar. ic.* 458. *f.* 3.

atratum. 7. Chr. foliis omnibus cuneiformibus oblongis incisis carnosis.

Leucanthemum. 8. Chr. foliis amplexicaulibus oblongis superne serratis inferne dentatis. *Blackw. herb. t.* 42. *β) Barrel. pl. rar. ic. t.* 458. *f.* 2.

serotinum. 9. Chr. foliis lanceolatis superne serratis utrinque acuminatis. *Jacq. obs. bot.* 4. *t.* 90.

carolinianum. 26. Chr. foliis lanceolatis integris laevibus, caule ramosissimo. *Walt. flor. carol. p.* 204.

montanum. 10. Chr. foliis imis spatulato-lanceolatis serratis: summis linearibus. *Jacq. obs. bot.* 4. *t.* 91. *an mera* Chr. *leucanthemi varietas?*

graminifolium. 11. Chr. foliis linearibus subintegerrimis. *Jacq. obs. bot.* 4. *t.* 92.

Balsamita. 12. Chr. foliis ovatis oblongis serratis auriculatis. *Jacq. obs. bot.* 4. *t.* 89.

13. Chr.

paludo-ſum. 13. Chr. foliis omnibus ſpatulatis inciſo-ſerratis carnoſis, ramis unifloris. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 241.

** *Chryſanthema.*

indicum. 14. Chr. foliis ſimplicibus ovatis ſinuatis angulatis ſerratis acutis. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 44. *β) Pluckn. alm. t.* 160. *f.* 6.

Myconis. 15. Chr. foliis lingulatis obtuſis ſerratis, calicis ſquamis aequalibus. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 94.

floſculoſum. 16. Chr. floſculis omnibus uniformibus hermaphroditis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 9. *f.* 16. *β)* Cotula grandis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 564. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 81.

ſegetum. 17. Chr. foliis amplexicaulibus ſuperne laciniatis inferne dentato-ſerratis. *Bulliard herb. Franc. t.* 339.

arcticum. 18. Chr. foliis ſimplicibus cuneiformibus ſubpalmatis multifidis obtuſis. *Gmel. flor. ſibir.* 2. *t.* 84.

pinnatifidum. 19. Chr. fruticoſum, foliis ſimplicibus oblongis pinnatifidis: laciniis ſerratis. *Suppl. p.* 377.

coronarium. 20. Chr. foliis pinnatis inciſis extrorſum latioribus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 4. *f.* 2. 3.

pectinatum. 21. Chr. foliis pinnatis linearibus parallelis acutis integerrimis, pedunculis ſolitariis unifloris.

italicum. 22. Chr. foliis bipinnatis ſerratis, florum radiis longitudine diſci, caule procumbente. *Mant. p.* 116. *Mich. nov. pl. gen. t.* 29.

millefolia-tum. 23. Chr. foliis bipinnatis dentatis, caule decumbente, corollae radiis diſco brevioribus. *Sp. pl.* 1263. Anthemis millefolia. *Mill. dict. ic. t.* 9.

bipinnatum. 24. Chr. foliis bipinnatis ſerratis villoſis, radiis diſco brevioribus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 85. *f.* 1.

*** *incertae tribus.*

japanicum. 25. Chr. foliis petiolatis apice inciſis dentatis. *Suppl. p.* 321.

967. MATRICARIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* hemiſphaericus, imbricatus: ſquamis marginalibus ſolidis, acutiuſculis.

proſtrata. 1. M. foliis ſimplicibus ovatis dentatis, pedunculis lateralibus unifloris, ramis decumbentibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 114.

Partheni-um. 2. M. foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Flor. dan. t.* 674.

argentea. 3. M. foliis bipinnatis, pedunculis ſolitariis.

maritima. 4. M. receptaculis hemiſphaericis, foliis bipinnatis ſubcarnoſis: ſupra convexis ſubtus carinatis. *Raj. angl.* 3. *t.* 7. *f.* 1.

ſuaveolens. 5. M. receptaculis conicis, radiis deflexis, ſquamis calicis margine aequalibus; *an vere diſtincta a chamomilla?*

Chamomilla. 6. M. receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calicis margine aequalibus. *Zorn pl. off. ic. t.* 139.

1420. UNXIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 5-phyllus: foliolis ovatis. *Floſculi radii* et *diſci* 5.

camphorata. 1. UNXIA. *Suppl. p.* 368.

MADIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 8phyllus. *Sem.* plano-convexa.

ſativa. 1. M. foliis lineari-lanceolatis petiolatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 114.

mellita. 2. M. foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 114.

968. COTULA. *Recept.* ſubnudum. *Pappus* marginatus. *Corollul.* diſci 4fidae, radii fere nullae.

turbinata. 1. C. receptaculis ſubtus inflatis turbinatis, floribus radiatis. *Mant. p.* 473. *Breyn. cent. t.* 73.

2. C.

Verbesina. 2. C. foliis oppositis trinerviis cordatis crenatis, floribus radiatis pedunculatis binis. *Mant. p.* 473. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 155. *f.* 2. *an forte cum Verbesina Lavenia proprium genus constituit?*

pyrethraria. 3. C. foliis oppositis ovatis crenatis petiolatis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 116.

coronopifolia. 4. C. foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus dentatis, floribus flosculosis. *Flor. dan. t.* 341.

umbellata. 5. C. foliis lanceolatis hirsutis, floribus umbellatis, caule erecto. *Suppl. p.* 378.

minuta. 6. C. foliis alternis subamplexicaulibus oblongis dentatis; floribus solitariis sessilibus folio oppositis. *Forst. flor. austr. p.* 57.

quinqueloba. 7. C. foliis quinquelobis subtomentosis, caulibus erectis. *Suppl. p.* 377.

stricta. 8. C. foliis pinnatifidis planis nudis punctatis, caule erecto stricto, floribus radiatis. *Mant. p.* 287. *Berg. cap. t.* 5. *f.* 9.

aurea. 9. C. foliis pinnato-setaceis multifidis, floribus flosculosis cernuis.

anthemoides. 10. C. foliis pinnato-multifidis dilatatis, floribus flosculosis. *Dill. h. Elth. t.* 23. *f.* 25. *β)* Artemisia nilotica. *Sp. pl. p.* 1189.

viscosa. 11. C. foliis lyrato-pinnatis, floribus radiatis.

capensis. 12. C. foliis pinnatis subcarnosis teretiusculis: infimis subbipinnatis, floribus radiatis. *Mant. p.* 115. 287. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 563. Matricaria capensis.

pilulifera. 13. C. foliis bipinnatis, capitulis globosis, caule erecto. *Suppl. p.* 378.

tanacetifolia. 14. C. foliis tripinnatis: lacinulis acutis, caule erecto, floribus flosculosis corymbosis. *Pluckn. mant. t.* 430. *f.* 7.

sericea. 15. C. foliis supra decompositis tomentosis linearibus. *Suppl. p.* 377.

969. ANACYCLUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Semina* lateralia membranacea, emarginata.

orientalis. 1. A. foliis compositis setaceis acutis rectis. *Boerh. ind. b. Lugdb.* I. *p.* 110. *ic.*

2. A.

creticus. 2. A. foliis decompositis linearibus: foliolis divisis planis.

valentinus. 3. A. foliis decompositis linearibus: foliolis divisis teretiusculis acutis, floribus flosculosis.

aureus. 4. A. foliis bipinnatis teretiusculis incanis excavato-punctatis. *Mant. p.* 287. *Lob. ic.* 771.

970. ANTHEMIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* hemisphaericus, subaequalis. *Flosculi* radii plures, quam 5.

* *radio albo.*

Cota. 1. A. florum paleis rigidis pungentibus. *Mant. p.* 474. *Till. h. pis. t.* 19.

arvensis. 2. A. receptaculis conicis: paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 5.

Cotula. 3. A. receptaculis conicis: paleis setaceis, seminibus nudis. *Blackw. herb. t.* 67.

mixta. 4. A. foliis simplicibus dentato-laciniatis. *Pluckn. alm. t.* 17. *f.* 4.

alpina. 5. A. foliis dentato-pinnatis integerrimis linearibus, caule villoso unifloro, petalis ovatis, paleis sphacelatis. *Jacq. flor. austr.* 5. *t.* 30.

nobilis. 6. A. foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis. *Blackw. herb. t.* 526.

Pyrethrum. 7. A. foliis pinnato-multifidis, caulibus simplicibus unifloris decumbentibus. *Mill. h. angl. t.* 38.

chia. 8. A. foliis pinnatifidis laciniatis, pedunculis nudis subvillosis.

tomentosa. 9. A. foliis pinnatifidis obtusis planis, pedunculis hirsutis foliosis, calicibus tomentosis. *Flor. dan. t.* 685?

maritima. 10. A. foliis pinnatis denticulatis carnosis nudis punctatis, caule prostrato, calicibus subtomentosis. *Till. h. pis. t.* 19. *f.* 3.

altissima. 11. A. erecta, foliis pinnatis: pinnarum basibus denticulo reflexo asperis. *Mant. p.* 474. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 4.

corymbosa. 12. A. foliis subbipinnatis linearibus acutis, caule simplici erectiusculo villoso, corollulis radii obovatis obtusissimis tridentatis. *Haënk. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 73.

auſtriaca. 13. A. receptaculis conicis: paleis oblongis mucronatis, ſeminibus nudis, foliis bipinnatis lanuginoſo-villoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 444.

** *radio flavo ſ. concolore.*

valentina. 14. A. caule ramoſo, foliis pubeſcentibus tripinnatis ſetaceis, calicibus villoſis pedunculatis. *Breyn. cent. t.* 75.

americana. 15. A. foliis triternatis, pedunculis terminalibus ramo longioribus; *an eadem cum verbeſina mutica?*

tinctoria. 16. A. foliis bipinnatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule corymboſo. *Flor. dan. t.* 741.

odorata. 17. A. foliis apice pinnatifidis, pedunculis elongatis, calicibus membranaceis, radio ſterili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 238.

trinervia. 18. A. foliis ovatis ſerratis trinerviis oppoſitis petiolatis, receptaculo conico. *Suppl. p.* 378.

repanda. 19. A. foliis ſimplicibus ovato-lanceolatis repando-crenatis.

repens. 20. A. foliis ſimplicibus ovato-lanceolatis obſolete ſerratis, caule repente. *Walt flor. carol. p.* 211.

arabica. 21. A. caule decompoſito, calicibus ramiferis. *Shaw afr. t.* 36. *f.* 58.

971. ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* ovatus, imbricatus. *Floſculi* radii 5-10.

* *foliis ſimplicibus.*

† *integris.*

Ageratum. 1. A. foliis oblongis obtuſis ſerratis faſciculatis. *Mill. h. angl. t.* 10. *Jungh. pl. offic. ic. t.* 17.

herbarato. 2. A. foliis cuneiformibus, apice dentatis. *Allion. fl. pedem. n.* 656. *ic.*

alpina. 3. A. foliis lanceolatis ſemiamplexicaulibus ſerratis: ſerraturis ſerrulatis.

Ptarmica. 4. A. foliis lineari-lanceolatis amplexicaulibus ſerrulatis. *Flor. dan. t.* 643.

†† *foliis diviſis.*

lobata. 5. A. foliis villoſis linearibus ſubdentatis apice lobatis. *Forsk. flor. aegypt. arab. p.* 218.

6. A.

Clavennae. 6. A. foliis obovatis laciniatis tomentosis. *Jacq. flor. austr.* 1. *t.* 76.

serrata. 7. A. foliis pinnatifidis lineari-lanceolatis tomentosis basi laciniatis. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 25.

capitata. 8. A. foliis profunde pinnatifidis tomentosis: laciniis dentatis, floribus umbellato-capitatis. *Willden. de achill. n.* 7. *t.* 1.

cristata. 9. A. foliis pectinato-pinnatifidis argute serratis glabris. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 25.

coronopifolia. 10. A. foliis pinnatifidis dentatis glabris. *Willden. de achill. n.* 9. *t.* 1.

ligustica. 11. A. foliis pinnatifidis glabris: incisuris tri- vel multifidis. *Allion. fl. pedem.* 4. 660. *ic.*

macrophylla. 12. A. foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis inciso-serratis; infimis distinctis. *Pill. et Mitterpach. it. t.* 11.

magna. 13. A. foliis pinnatifidis: laciniis inaequaliter dentatis. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 25.

squarrosa. 32. A. foliis lanceolato-linearibus pinnatifidis; laciniis ovato-cuneiformibus inciso-acuminatis verticalibus, caule subvilloso. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 242.

** *foliis compositis.*

† *pinnatis.*

aegyptiaca. 14. A. foliis tomentosis: pinnis subrotundis dentatis. *Tournef. it.* 1. *t.* 87.

cretica. 15. A. foliis tomentosis: pinnis quadrifidis imbricatis.

nana. 16. A. foliis villosis: pinnis linearibus integerrimis: foliorum inferiorum dentatis. *Allion. pedem.* 3. *t.* 2. *f.* 3.

Halleri. 17. A. foliis hirsutis: pinnis acute dentatis latescentibus. *Hall. hist. stirp. Helv.* 1. *p.* 47. *n.* 110.

micrantha. 18. A. foliis pubescentibus: pinnis laciniatis, florum radio minimo. *Gmel. flor. sib.* 2. *p.* 198. *n.* 164. *t.* 83. *f.* 2.

pilosa. 19. A. foliis subtus pilosis: pinnis integris bifidisque. *Willden. de achill. n.* 19.

falcata. 20. A. foliis alternis: pinnis falcatis argute serratis.

impatiens. 21. A. pinnis lanceolatis geminatis. *Gmel. flor. sib* 2. *t.* 83. *f.* 1.

Santolina. 22. A. foliis fasciculatis glabris: pinnis obtusis tridentatis.

moſchata. 23. A. foliis glabris: pinnis lineari-lanceolatis integerrimis punctatis. *Haller. hiſt. ſtirp. Helv.* 1. *p.* 47. *n.* 112. *Scop. del. inſ.* 1. *t.* 3.

†† *foliis ſubbipinnatis.*

atrata. 24. A. foliis glabris pectinatis, caule piloſo. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 22.

tanaceti-folia. 25. A. foliis punctatis: pinnis pinnatifidis; laciniis integris inciſisque. *Mill. h. angl. t.* 9. *Allion. pedem. n.* 666. *an diſtincta ſpecies?*

pubeſcens. 26. A. foliis pubeſcentibus: pinnis pinnatifidis; laciniis inaequalibus.

nobilis. 27. A. foliis pubeſcentibus: pinnis oblongis pinnatifidis; inciſuris aequalibus.

tomentoſa. 28. A. foliis tomentoſis: pinnulis denſe imbricatis integerrimis acutis. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 25. *f.* 2.

††† *foliis bipinnatis.*

Millefolium. 29. A. foliis glabris: pinnarum laciniis linearibus dentatis. *Flor. dan. t.* 737.

abrotanifolia. 30. A. foliis pubeſcentibus: pinnulis tenuiſſimis linearibus integerrimis.

odorata. 31. A. foliis piloſis: pinnulis lanceolatis integerrimis mucronatis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 942. *β) Wulfen apud Jacq. Collect.* 1. *t.* 21. *an mera nobilis varietas?*

972. TRIDAX. *Recept.* paleaceum. *Pappus* multiradiatus, ſimplex. *Cal.* imbricatus, cylindricus. *Corollulae* radii 3partitae.

procumbens. 1. Tridax.

978. AMELLUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus. *Corollulae* radii indiviſae.

lychnitis. 1. A. foliis oppoſitis lanceolatis obtuſis tomentoſis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 476. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 15. *f.* 2.

umbellatus. 2. A. foliis oppositis triplinerviis subtus tomentosis, floribus umbellatis. *Brown. jam. t.* 33. *f.* 2.

carolinianus. 3. A. foliis oppositis sublanceolatis subserratis, pedunculis geminis unifloris axillaribus. *Walt. flor. carol. p.* 213.

1321. ECLIPTA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Corollulae* disci 4fidae.

erecta. 1. E. caule erecto, foliis basi deflexis, sessilibus lanceolatis. *Mant. p.* 286. 475. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 564. Cotula alba. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 18. *f.* 1.

sessilis. 2. E. caule erecto, foliis subamplexicaulibus, ovatis dentatis, floribus axillaribus sessilibus discoideis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 114.

latifolia. 3. E. caule erecto, foliis ovatis petiolatis. *Suppl. p.* 378.

punctata. 4. E. caule erecto punctato, foliis planis. *Mant. p.* 286. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 197.

prostrata. 5. E. caule prostrato, foliis subundulatis subpetiolatis. *Mant. p.* 128. 475. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 564. Cotula prostrata. *Zinn. comm. Goett.* 3. *t.* 11.

973. SIGESBECKIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* exterior, 5phyllus, proprius, patens. *Radius* dimidiatus.

orientalis. 1. S. petiolis sessilibus, calicibus exterioribus majoribus patentibus. *Hort. Cliff. t.* 23.

occidentalis. 2. S. petiolis decurrentibus, calicibus nudis. *Mant. p.* 475. *an potius Verbesina?*

flosculosa. 3. S. flosculis tridentatis: hermaphroditis triandris. *Herit. stirp. nov.* 2. *p.* 37. *t.* 19.

975. VERBESINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* 2plici ordine. *Flosculi* radii circiter 5.

alata. 1. V. foliis alternis decurrentibus angulato-dentatis acuminatis. *Commel. h. amst.* 1. *t.* 3.

sinensis. 2. V. foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis serratis.

virginica. 3. V. foliis alternis petiolatis lanceolatis, floribus corymbosis.

mutica. 14. V. foliis alternis petiolatis: superioribus tripartitis; inferioribus integris ovatis, pedunculis terminalibus unifloris. *Swarts observ. bot. p.* 314. *t.* 8. *f.* 1.

pinnatifida. 4. V. foliis alternis pinnatifidis, caule herbaceo. *Plum. ic.* 41. *t.* 51.

gigantea. 5. V. foliis alternis profunde pinnatifidis, caule fruticoso. *Jacq. coll.* 1. *p.* 53. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 97.

Bosvallea. 6. V. foliis multifido-capillaribus, caulibus prostratis, floscu-lis senis: femineo unico. *Suppl. p.* 379.

Lavenia. 7. V. foliis oppositis ovatis trinerviis glabris petiolatis, seminibus tricornibus. *Rheed h. malab.* 10. *t.* 63. *an cum Cotula Verbesina in distinctum genus conjungenda? an eadem cum Adenostemate Forsteri prodr. fl. austr. p.* 58. *n.* 284.

dichotoma. 8. V. foliis oppositis ovatis tomentosis petiolatis, caule supra dichotomo: extimo internodio compresso. *Murray comm. Goett.* 1779. *p.* 15. *t.* 4.

fruticosa. 9. V. foliis oppositis ovatis serratis petiolatis, caule fruticoso. *Plum. ic.* 52.

nodiflora. 10. V. foliis oppositis ovatis serratis, calicibus oblongis sessilibus; caulinis lateralibus. *Dill. h. Eltb. t.* 45. *f.* 53.

biflora. 11. V. foliis oppositis oblongo-ovatis triplinerviis acuminatis serratis, pedunculis geminis bifloris. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 79.

calendulacea. 12. V. foliis oppositis lanceolatis obtusiusculis, pedunculis longis unifloris: calicibus simplicibus. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 42.

laciniata. 13. V. foliis sinuato-laciniatis. *Walt. flor. carol. p.* 213. *an hujus generis?*

977. BUPHTHALMUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obsoletus. *Semina* latera, praesertim radii, marginata. *Stigma* flosculorum hermaphroditicorum indivisum.

* *Asterisci* T.

frutescens. 1. B. foliis oppositis lanceolatis: petiolis bidentatis, caule fruticoso. *Catesb. Car.* 1. *t.* 93.

arborescens. 2. B. foliis oppositis lanceolatis utrinque tomentosis edentulis integerrimis, caule fruticoso. *Plum. ic.* 106. *f.* 2.

sericeum. 3. B. foliis oppositis approximatissimis spatulato-oblongis sericeis, squamis calicis setaceis hirsutis, caule arboreo. *Suppl. p.* 379. *Herit. sert. angl. t.* 37.

spinosum. 4. B. calicibus acute foliosis, foliis alternis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis. *Blackw. herb. t.* 272. *Mill. h. angl. t.* 249. *f.* 1.

melitense. 5. B. calicibus acute foliosis pedunculatis, foliis lanceolatis basi attenuato-petiolatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 218.

pratense. 15. B. calicibus acute foliosis, foliis alternis cuneiformibus incisis hirtis. *Forsk. fl. aeg. arab. p.* 153. Ceruana pratensis.

graveolens. 6. B. calicibus acute foliosis, foliis alternis pinnatifidis. *Vahl symbol. botan.* 1. *p.* 74. *t.* 19.

ramosum. 7. B. calicibus obtuse foliosis terminalibus solitariis, foliis oppositis sessilibus lanceolatis remotis, caule hispido ramoso. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 151.

aquaticum. 8. B. calicibus obtuse foliosis sessilibus axillaribus, foliis alternis oblongis obtusis, caule herbaceo. *Mill. h. angl. t.* 249. *f.* 2.

maritimum. 9. B. calicibus obtuse foliosis pedunculatis, foliis alternis spatulatis, caule herbaceo. *Bocc. mus.* 2. *t.* 129.

durum. 10. B. foliis alternis lanceolatis integerrimis, caule suffruticoso. *Pluckn. alm. t.* 21. *f.* 3.

** *Asteroidea* T.

salicifolium. 11. B. foliis alternis lanceolatis subserratis villosis, calicibus nudis, caule herbaceo. *Jacq. flor. austr.* 4. *t.* 370.

grandiflorum. 12. B. foliis alternis lanceolatis subdenticulatis glabris, calicibus nudis, caule herbaceo. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 7. *f.* 52.

speciosissimum. 13. B. foliis alternis amplexicaulibus ovatis nudis serratis subciliatis, caule unifloro. *Mant. p.* 177. 517. *Arduin. spec.* 1. *t.* 12. *an ad silphium potius spectat?*

helianthoides. 14. B. foliis oppositis ovatis serratis triplinerviis, calicibus foliosis, caule herbaceo. *Herit. stirp. nov.* 4. *t.* 45. *an distinctum satis ab heliantho laevi et silphio solidaginoide, et Rudbeckia oppositifolia?*

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

979. HELIANTHUS.

Recept. paleaceum, planum. *Pappus* radii 0, disci 2 paleis constans. *Cal.* imbricatus, subsquarrosus.

annuus. 1. H. foliis omnibus cordatis trinerviis, pedunculis incrassatis, floribus cernuis. *Mill. illustr. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 1.

indicus. 2. H. foliis omnibus cordatis trinerviis, pedunculis aequalibus, calicibus foliosis. *Mant. p.* 117.

multiflorus. 3. H. foliis inferioribus cordatis trinerviis: superioribus ovatis. *Pluckn. phyt.* 159. *f.* 2.

tuberosus. 4. H. foliis ovato-cordatis triplinerviis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 161.

frondosus. 5. H. calicibus squarrosis undulatis frondosis, radiis octopetalis, foliis ovatis, caule inferne scabro.

divaricatus. 6. H. foliis oppositis sessilibus ovato-oblongis trinerviis, paniculа dichotoma.

atro-rubens. 7. H. foliis oppositis spatulatis crenatis triplinerviis scabris, squamis calicis erectis longitudine disci. *Dill. h. Elth. t.* 94. *f.* 110.

decapetalus. 8. H. caule inferne laevi, foliis lanceolato-cordatis triplinerviis, radiis decapetalis, pedunculis scabris.

altissimus. 9. H. foliis alternis latiuscule lanceolatis scabris: petiolis ciliatis, caule stricto glabro. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 160.

10. H.

giganteus. 10. H. foliis alternis lanceolatis scabris basi ciliatis, caule stricto scabro. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 7. *f.* 66.

laevis. 11. H. foliis oppositis trinerviis lanceolatis serratis laevibus, caule pedunculisque glabris.

thurifer. 12. H. caule fruticoso, foliis lineari-lanceolatis. *Molin. hist. nat. Chil. p.* 135.

anguſtifolius. 13. H. foliis alternis linearibus.

ſtrumosus. 14. H. radice fusiformi. *Bocc. sic. t.* 27. *f.* 4. *an mera gigantei varietas?*

GALARDIA. *Recept.* paleaceum, convexum. *Sem.* angulata, apice cornu 5phylla. *Cal.* duplici squamarum ordine subaequalis.

alternifolia. 1. Galardia. *Fougeroux act. Paris. ad ann.* 1786. *p.* 1. *seq. t.* 1. 2.

TITHONIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* apice 5paleacea. *Cal.* duplici squamarum ordine connivens cylindricus, subaequalis.

uniflora. 1. Tithonia. *Des Fontaines act. Paris. extran. vol.* 12.

980. RUDBECKIA. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* margine 4dentato. *Cal.* 2plici squamarum ordine.

laciniata. 1. R. foliis compositis laciniatis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 6. *f.* 53. 54.

digitata. 2. R. foliis inferioribus compositis: caulinis quinatis ternatisque; summis simplicibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 251.

triloba. 3. R. foliis spatulatis: inferioribus trilobis; superioribus indivisis. *Pluckn. alm. t.* 22. *f.* 2.

hirta. 4. R. foliis indivisis spatulato-ovatis, triplinerviis serratis hirtis, receptaculo conico, paleis lanceolatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* F. 1. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 29.

fulgida. 5. R. foliis oblongo-lanceolatis denticulatis hispidis basi angustatis subcordatis, receptaculo hemisphaerico: paleis lanceolatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 251.

purpurea. 6. R. foliis lanceolato-ovatis alternis indivisis, radii petalis bifidis. *Catesb. Car.* 2. *t.* 59.

oppositifolia. 7. R. foliis lanceolato-ovatis oppositis serratis, radii petalis bifidis.

angustifolia. 8. R foliis oppositis linearibus integerrimis. *Mill. b. angl. t.* 224. *f.* 2.

√ 981. COREOPSIS.

Recept. paleaceum. *Pappus* 2-4-cornis. *Cal.* erectus, polyphyllus: basi radiis coloratis patentibus cinctus.

verticillata. 1. C. foliis decomposito-linearibus. *Ehret. pict. t.* 9. *f.* 1.

coronata. 2. C. foliis pinnatis serratis lineatis glabris. *Plum. ic.* 53. *f.* 2.

leucantha. 3. C. foliis pinnatis serratis, radio florum diversicolore.

chrysantha. 4. C. foliis ternatis ovato-oblongis serratis, radio florum concolore. *Plum. ic.* 53. *f.* 1.

alba. 5. C. foliis subternatis cuneatis serratis. *Pluckn. alm. t.* 160. *f.* 3.

tripteris. 6. C. foliis subternatis integerrimis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 44.

aurea. 7. C. foliis serratis: radicalibus tripartitis: caulinis trifidis integrisve lanceolato-linearibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 252.

procera. 8. C. foliis ellipticis acuminatis serratis petiolatis venosis decurrentibus: inferioribus verticillatis; superioribus alternis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 253.

reptans. 9. C. foliis serratis ovatis: summis ternatis, caule repente. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 154. *f.* 2. 3.

baccata. 10. C. foliis serratis ovatis, seminibus bacciformibus. *Suppl. p.* 380.

Bidens. 11. C. foliis lanceolatis serratis oppositis amplexicaulibus, pappo bicorni. *Morif. hist.* 3. *t.* 5. *f.* 25. *an mera bidentis cernuae varietas?*

quadricornis. 12. C. foliis lanceolatis serratis oppositis amplexicaulibus, pappo quadricorni. *Kreck. flor. silef.* 2. 2. *p.* 481.

13. C.

alternifo- 13. C. foliis lanceolatis serratis alternis petiolatis decurrenti-
lia. bus *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 110.

lanceola- 14. C. foliis lanceolatis integerrimis ciliatis. *Dill. h. Elth.*
ta. *t.* 48. *f* 56.

linensis. 15. C. foliis subintegerrimis caule ovatis tomentosis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 299. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 49.

auricula- 16. C. foliis integerrimis ovatis: inferioribus ternatis. *Pluckn.*
ta. *alm. t.* 83. *f.* 5. *et t.* 242. *f.* 4.

crassifolia. 17. C. foliis obovato oblongis obtusis integerrimis pubescentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 253.

angustifo- 18. C. foliis alternis lineari-lanceolatis integerrimis laevibus,
lia. radii petalis oblongis trifidis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 253.

major. 19. C. foliis verticillatis lato-lanceolatis basi pubescentibus. *Walt. flor. carol. p.* 214.

perfolia- 20. C. foliis caulinis oblongis ensiformibus oppositis perfoliatis,
ta. caule ramoso. *Walt. flor. carol. p.* 215.

gladiata. 21. C. foliis radicalibus linearibus laevibus integris, caulinis alternis, pedunculis terminalibus. *Walt. flor. carol. p.* 215.

983. OSMITES. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obsoletus. *Cor.* radii ligulatae. *Cal.* imbricatus, gibbus.

Bellidia- 1. O. foliis linearibus carnosis, calicibus scariosis.
strum.

campho- 2. O. foliis lanceolatis subserratis basi dentatis. *Mant. p.* 477.
rata. *Seb. mus.* 1. *t.* 90. *f.* 2. *β*) *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 565. Anthemis leucantha.

Asteriscoi- 3. O. foliis lanceolatis punctatis, caulibus foliosis. *Seb. mus.* 1.
des. *t.* 16. *f.* 4.

calicina. 4. O. foliis lanceolatis nudis, calicibus scariosis. *Suppl. p.* 380.

ENCELIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* paleae membranaceae conduplicatae inclusa. *Cal.* polyphyllus, simplex, aequalis.

alternifolia. 1. ENCELIA. *Jussieu gen. plant. p.* 180.

SCLE-

SCLEROCARPUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* foliol. inter. canaliculatis.

africanus. 1. SCLEROCARPUS. *Jacq. fil. act. Helv.* 9. *f.* 1.

981. GORTERIA. *Recept.* nudum. *Pappus* ſimplex. *Cor.* radii ligulatae. *Cal.* imbricatus: ſquamis ſpinoſis.

uniflora. 1. G. foliis lanceolatis indiviſis ſubtus tomentoſis, caulibus unifloris depreſſis. *Suppl. p.* 382.

perſonata. 2. G. foliis lanceolatis integris ſinuatisque, caule erecto, floribus pedunculatis. *Pluckn. phyt.* 273. *f.* 6.

rigens. 3. G. foliis lanceolatis pinnatifidis, caule depreſſo, ſcapis unifloris. *Mill. h. angl. t.* 49.

ſetoſa. 4. G. foliis lanceolatis decurrentibus adnatis ciliato-ſpinoſis, floribus terminalibus pedunculatis. *Mant. p.* 287.

ſquarroſa. 5. G. foliis lanceolatis decurrentibus adnatis ciliato-ſpinuloſis, floribus ſeſſilibus. *Mant. p.* 470. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 28.

echinata. 6. G. foliis oblongis ſinuato-inciſis ſpinuloſis, caulibus adſcendentibus, receptaculis paleaceis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 254. *an hujus generis?*

barbata. 7. G. foliis elliptico-lanceolatis dentato-ariſtatis, calicibus pedunculatis ciliato-ſetaceis. *Suppl. p.* 382.

Aſteroides. 8. G. foliis ellipticis: ſerraturis ſetaceis. *Suppl. p.* 381. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 48.

hiſpida. 9. G. foliis oblongis ciliato-ſpinoſis erectis glabris, calicibus integris ſpina terminatis. *Suppl. p.* 382.

ſpinoſa. 10. G. foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſpinoſis patentibus glabris, calicibus ciliato-ſpinoſis, erectis. *Suppl. p.* 381.

cernua. 11. G. foliis oblongis amplexicaulibus dentato-ſpinoſis patentibus glabris, calicibus ciliato-ſerratis cernuis. *Suppl. p.* 382.

herbacea. 12. G. foliis caulinis amplexicaulibus ciliatis: radicalibus inermibus ſubtus villoſis. *Suppl. p.* 381.

ciliaris. 13. G. foliis imbricatis bifariam ciliatis: ciliis exterioribus ſpinaque terminali reflexis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 23. *f.* 1.

DIDEL-

DIDELTA. *Recept.* 4partitum: medium 3angulare nudum; lateralia fungosa, setosa: segmentis indurescentibus in pericarpium. *Pappus* simplex. *Cal.* 2-plex. *Flosculi* disci medii steriles, laterales perfecti, radii ligulati, neutri. *Germina* immersa.

tetragoni-aefolia. 1. DIDELTA. *Herit. stirp. nov.* 3. *p.* 55. *t.* 28. *an segregatis potius accensenda?*

2271. ZOEGEA. *Recept.* setosum. *Pappus* setaceus. *Cor.* radii ligulatae. *Cal.* imbricatus.

Leptaurea. 1. Z. foliis oblongis, calice hirto campanulato. *Mant. p.* 117. *Suppl. p.* 383. *Herit. stirp. nov.* 3. *p.* 57. *t.* 29.

capensis. 2. Z. foliis linearibus, calice glabro basi gibbo. *Suppl. p.* 382.

aleppica. 3. Z. foliis pinnatis: pinnis linear-lanceolatis integerrimis, calicis squamis exterioribus ciliatis apice scariosis. *Jacq. coll.* 1. *p.* 89.

984. CENTAUREA. *Recept.* setosum. *Pappus* plumosus vel capillaris. *Cor.* radii infundibuliformes, longiores, irregulares. ✓

* *calicibus laevibus inermibus*, Jaceae.

Centaureum. 1. C. calicis squamis ovatis, foliis pinnatis: pinnis serratis decurrentibus. *Regn. bot. t.* 354.

alpina. 2. C. calicis squamis ovatis obtusis, foliis pinnatis glabris integerrimis: impari serrato. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 25. *f.* 5.

moschata. 3. C. calicibus subrotundis glabris: squamis ovatis, foliis lyrato-dentatis. *Knorr del. hort.* 2. *t.* C. 4. *f.* 1. 2.

Moschus. 4. C. calicis squamis ovato-lanceolatis, foliis pinnatis linearioblongis integerrimis. *Hablizl apud S. G. Gmelin it.* 4. *p.* 176.

5. C.

Crupina. 5. C. calicis ſquamis lanceolatis, foliis pinnatis ſerratis ſubciliatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 34.

erucifolia. 6. C. calicis ſquamis lanceolatis, foliis lanceolatis ſubdentatis. *Pluckn. phyt.* 39. *f.* 3. *mala.*

Lippii. 7. C. calicis ſquamis mucronatis, foliis ſubdecurrentibus lyrato-dentatis. *Isnard act. Pariſ.* 1719. *t.* 10.

maxima. 8. C. caule fruticoſo, foliis ellipticis tomentoſis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 152.

mucronata. 9. C. calicis ſquamis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis ſeſſilibus mucronatis ſerratis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 151.

** *ſquamis calicis ſerrato-ciliatis*, Cyani.

bracteata. 10. C. calicibus ſubciliatis baſi foliоſis, foliis margine ſcabris: radicalibus oblongis ſubintegerrimis; caulinis lanceolatis ſeſſilibus integerrimis. *Scop. del inſ.* 2. *p.* 17. *t.* 9.

ſpinoſa. 11. C. calicibus ſubciliatis, ramis ſpinoſis. *Alp. exot. p.* 162. *ic.*

montana. 12. C. calicibus ſerratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule ſimpliciſſimo. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 371.

Cyanus. 13. C. calicibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* K. 4. 5.

argentea. 14. C. calicibus ſerratis, foliis tomentoſis: radicalibus pinnatifidis; laciniis inauritis. *Barr. pl. rar. ic.* 218.

nigra. 15. C. calicis ſquamulis ovatis: ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis, floribus floſculoſis. *Reich. flor. francof. n.* 625. *ic.*

paniculata. 16. C. calicis ſquamis planis ciliatis, foliis bipinnatis: rameis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 320.

pullata. 17. C. calicibus ciliatis verticillato-foliоſis, foliis lyratis dentatis obtuſis. *Mill. h. angl. ic. t.* 152. *f.* 2.

cineraria. 18. C. calicibus ciliatis terminali-ſeſſilibus, foliis tomentoſis bipinnatifidis: laciniis acutis *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 92. *β?*) Centaurea. *Krock. flor. ſil.* 2. 2. *p.* 489. *n.* 1462.

Stoebe. 19. C. calicibus ciliatis oblongis, foliis pinnatifidis linearibus integerrimis.

ſempervirens. 20. C. calicibus ciliatis, foliis lanceolatis ſerratis: infimo dente ſubſtipulatis; inferioribus haſtatis. *Bocc. ſic. t.* 39. *f.* 3.

21. C.

acaulis. 21. C. calicibus ciliatis, foliis lyratis, caule ſubnullo. *Shaw. ſpec. p.* 342. *ic.*

ſibirica. 22. C. calicibus ciliatis, foliis tomentoſis *indiviſis* pinnatifidisque integerrimis, caule declinato. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 42. *f.* 2.

tagulina. 23. C. calicibus ciliatis, foliis tomentoſis pinnatifidis: laciniis obtuſis ovatis integerrimis: exterioribus majoribus. *Mill. h. angl. t.* 152. *f.* 1.

caroliniana. 76. C. foliis ſeſſilibus baſi ſerrato-ſetaceis. *Walt. flor. carol. p.* 214.

Scabioſa. 24. C. calicibus ciliatis, foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis.

tatarica. 25. C. calicibus ciliatis, foliis pinnatis: pinnis lanceolatis indiviſis. *Suppl. p.* 383.

capillata. 26. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis imis pinnatis dentatis: ſummis lanceolatis. *Haller act. Goett. i. t.* 6.

pectinata. 27. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis lyratis denticulatis: ramis lanceolatis integerrimis.

uniflora. 28. C. calice recurvato-plumoſo, foliis lanceolatis ſubdentatis tomentoſis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 2.

phrygia. 29. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis indiviſis oblongis ſcabris. *Flor. dan. t.* 520. *β*) Centaurea ſerratuloides? *Krocke flor. ſileſ.* 2. 2. *p.* 484.

hyſſopifolia. 30. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis lineari-lanceolatis apice patulis ſuffruticoſis. *Barrel. pl. rar. ic.* 306.

linifolia. 31. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis linearibus ſparſis cauleque hirtis. *Mant. p.* 117. *Barr. pl. rar. ic.* 139. 162.

diluta. 79. C. calicibus ciliatis: ſquamis acuminatis ſubſpinoſis, foliis oblongis pinnatifidisque, radii floſculis dilco longioribus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 261.

**** ſquamis calicis aridis ſcarioſis*, Rhapontica.

orientalis. 32. C. calicibus ſcarioſis ciliatis, foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 4. *n.* 16.

ſtrobilacea. 33. C. calicibus ſcarioſis ſerrato-ciliatis ſpinoſis, foliis ſubtus punctatis pinnatis: pinnis lanceolatis falcatis erectis. *Scop. del. inſ.* 1. *t.* 17.

Jacea. 34. C. calicibus laceris, foliis lanceolatis: radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis. *Flor. dan. t.* 519.

humilis. 77. C. calicibus laceris, foliis lanceolatis repando-dentatis, caule unifloro. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 376.

anguſtifolia. 78. C. calicibus coloratis ſerrato-laceris, foliis linearibus ſubtus lanatis. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 376.

alba. 35. C. calicibus integris mucronatis, foliis pinnato-dentatis: caulinis linearibus baſi dentatis. *Tabernaem. Kraeuterb. p.* 153. *ic.*

ſplendens. 36. C. calicibus obtuſis, foliis radicalibus bipinnatifidis: caulinis pinnatis; dentibus lanceolatis.

Behan. 37. C. foliis radicalibus lyratis: lobis oppoſitis; caulinis amplexicaulibus. *Rauw. it. p.* 288. *ic.*

babylonica. 38. C. foliis ſubtomentoſis decurrentibus indiviſis: radicalibus lyratis. *Mant. p.* 460. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 528. Serratula babylonica. *Alpin. exot. p.* 282. *ic.*

conifera. 39. C. foliis tomentoſis: radicalibus lanceolatis; caulinis pinnatifidis, caule ſimplici. *Lob. ic.* 7. *Mill. b. angl. t.* 153.

procumbens. 40. C. foliis tomentoſis pinnatis: caulinis ſeſſilibus alternis; ſuperioribus ternatis, ſummis ſimplicibus ovato-lanceolatis, caulibus procumbentibus ramoſis quadrangulis, floribus terminalibus ſeſſilibus ſolitariis. *Hablizl ap. S. G. Gmel. it.* 4. *p.* 167.

Cardunculus. 41. C. foliis glabris: radicalibus decumbentibus ovalibus ſubrepandis margine ſpinuloſis: caulinis ſimplicibus. *Pall. it.* 1. *p.* 500. *n.* 123.

glaſtifolia. 42. C. foliis indiviſis integerrimis decurrentibus. *Curtis bot. mag. t.* 62.

amara. 43. C. foliis lanceolatis integerrimis, caulibus decumbentibus. *Lob. ic.* 548.

repens. 44. C. foliis lanceolatis ſubpetiolatis dentatis, pedunculis filiformibus aphyllis.

Rhapontica. 45. C. foliis ovato-oblongis denticulatis integris petiolatis ſubtus tomentoſis. *Lob. ic.* 288.

**** *ſquamis calicis ſpinoſis.*

† *ſpinis ſimplicibus*, Crocodilia.

nudicaulis. 46. C. calicibus ſubinermibus laevibus nitidis, foliis imis oblongis dentatis: ſuperioribus pinnatis; ſummis indiviſis, cauls nudiuſculo unifloro ſimplici. *Scop. del. inſ.* 3. *t.* 11.

47. C.

radiata. 47. C. calicibus ſubinermibus ſubariſtatis radiatis, foliis pinnatifidis. *Sp. pl.* 1201. Xeranthemum erucifolium. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 47. *f.* 1.

ſalmantica. 48. C. calicibus ſetula ſubſpinoſa exſtante glabris, foliis lyratoruncinatis ſerratis. *Mant. p.* 478. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 64.

tingitana. 49. C. calicibus margine ſpinoſis, foliis lanceolatis indiviſis ſerrato ſubſpinoſis. *Herm. par. Lugdb. p.* 163. *ic.*

cichoracea. 50. C. calicum ſpinis ſetaceis, foliis decurrentibus indiviſis ſerrato-ſpinoſis. *Till. h. piſ. t.* 27.

galactites. 51. C. calicum ſpinis ſetaceis, foliis decurrentibus ſinuatis ſpinoſis ſubtus tomentoſis.

peregrina. 52. C. calicum ſpinis ſetaceis, foliis lanceolatis petiolatis inferne dentatis.

pumila. 53. C. calicum ſpinis ſimpliciſſimis, foliis dentato-pinnatis villoſis, caule nullo.

muricata. 54. C. calicum ſpinis ſimpliciſſimis, foliis inferioribus pinnatifidis: ſuperioribus lanceolatis, pedunculis longiſſimis.

Venetum. 55. C. calicum ſpinis ſimpliciſſimis: dentibus duobus oppoſitis, foliis lanceolatis integris decurrentibus. *Mant. p.* 478.

Crocodilium. 56. C. calicibus ſcarioſis ſimpliciſſime ſpinoſis, foliis pinnatifidis integerrimis: lacinia extima majore dentata. *Barr. pl. rar. ic. t.* 503.

†† *calicis ſpinis palmatis*, Stoebae.

ſeſſilis. 57. C. calicibus oblongis radicalibus glomerato-ſeſſilibus, foliis pinnatis inciſis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 152.

ſonchifolia. 58. C. foliis ſubdecurrentibus ſpinuloſis repando-dentatis. *Mant. p.* 478. *Pluckn. phyt.* 39. *f.* 1.

ſeridis. 59. C. foliis decurrentibus tomentoſis oblongis: infimis ſinuato-dentatis. *Pluckn. phyt.* 38. *f.* 1.

romana. 60. C. foliis decurrentibus inermibus: radicalibus pinnatifidis: impari maximo. *Zanon. hiſt. t.* 42.

napifolia. 61. C. foliis decurrentibus ſinuatis ſpinuloſis: radicalibus lyratis. *Herm. par. Lugdb. p.* 189. *ic.*

Isnardi. 62. C. foliis lyrato-dentatis hiſpidis ſubamplexicaulibus, floribus ſeſſilibus terminalibus. *Isnard act. Pariſ.* 1719. *t.* 9.

ſphaerocephala. 63. C. foliis ovato-lanceolatis petiolatis dentatis. *Herm. par. Lugdb. p.* 333. *ic.*

aſpera. 64. C. calicum ſquamis palmato-triſpinoſis, foliis lanceolatis dentatis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 26.

ceſpitoſa. 81. C. foliis ſinuato-dentatis: inferioribus petiolatis, ſuperioribus ſemiamplexicaulibus. *Cyrill. pl. rar. Nat. f.* 1. *t.* 8.

†††† *caliçis ſpinis compoſitis*, Calcitrapae.

collina. 65. C. calicibus ciliatis inermibus ſpinoſis, foliis radicalibus bipinnatifidis, caule acutangulo.

rupeſtris. 66. C. calicibus ciliatis ſpinoſis, foliis bipinnatis linearibus. *Col. ecphr.* 1. *t.* 35. *f.* 2.

Centauroides. 67. C. calicibus ciliatis ſpinoſis, foliis lyrato-pinnatis integerrimis: lacinia impari majore. *Col. ecphr.* 1. *t.* 35. *f.* 1.

ſicula. 68. C. calicibus ciliato-ſpinoſis terminalibus, foliis decurrentibus lyratis inermibus incanis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 28. *f.* 26.

aurea. 80. C. calicibus ſimpliciſſime ſpinoſis: ſpinis patulis, floſculis aequalibus, foliis hirtis: inferioribus pinnatifidis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 265.

Calcitrapoides. 69. C. calicibus ſubduplicato-ſpinoſis, foliis amplexicaulibus lanceolatis indiviſis ſerratis.

Calcitrapa. 70. C. calicibus ſubduplicato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloſo. *Regn. bot. t.* 329.

aegyptiaca. 71. C. calicibus duplicato-ſpinoſis ſublanatis, foliis ſeſſilibus lanceolatis integris dentatisque, caule prolifero. *Mant. p.* 118.

eriophora. 72. C. calicibus duplicato-ſpinoſis lanatis, foliis ſemidecurrentibus integris ſinuatisque, caule prolifero. *Mant. p.* 478. *Kniph. bot. orig. cent.* 7. *n.* 10.

Benedicta. 73. C. calicibus duplicato-ſpinoſis lanatis involucratis, foliis ſemidecurrentibus denticulato-ſpinoſis. *Blackw. herb. t.* 476.

ſolſtitialis. 74. C. calicibus duplic to-ſpinoſis ſolitariis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis: radicalibus lyrato-pinnatifidis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 31.

melitenſis. 75. C. calicibus duplicato-ſpinoſis confertis terminalibus, foliis decurrentibus lanceolatis ſinuoſis inermibus. *Bocc. ſic. t.* 35.

POLY-

POLYGAMIA NECESSARIA.

985. MILLERIA. *Recept.* minimum. *Pappus* o. *Cal.* 3partitus. *Radius* corollae dimidiatus.

quinqueflora. 1. M. foliis cordatis pedunculis dichotomis. *Mant. p.* 478. *Mart. cent. t.* 41. β) *Mart. cent. t.* 47. *f.* 2.

biflora. 2. M. foliis ovatis, pedunculis simpliciſſimis. *Mart. cent. t.* 47. *f.* 1.

FLAVERIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* connivens, aequalis, 3-4phyllus.

chilenſis. 1. Fl. glomerulis terminalibus capitatis. *Juſſieu gen. plant. p.* 186. 187.

peruviana. 2. Fl. glomerulis terminalibus ſpiratis. *Juſſieu gen. plant. p.* 187.

1323. BALTIMORA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* cylindricus, polyphyllus. *Radius* corollae 5florus.

recta. 1. Baltimora. *Mant. p.* 288. *Pluckn. mant. t.* 342. *f.* 3.

986. SILPHIUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* marginato-2cornis. *Cal.* ſquamoſus.

laciniatum. 1. S. foliis alternis pinnato-ſinuatis. *Linn. fil. faſc.* 1. *t.* 1.

terebinthinaceum. 2. S. foliis alternis ovatis ſerratis ſcabris: radicalibus cordatis. *Suppl. p.* 383. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 43.

ſcabrum. 9. S. foliis alternis lato-lanceolatis ſerratis ſcabris ciliatis ſubſeſſilibus. *Walt. flor. carol. p.* 216.

ſolidaginoides. 3. S. foliis oppoſitis petiolatis lanceolatis acute ſerratis.

perfoliatum. 4. S. foliis oppoſitis petiolatis deltoidibus perfoliatis, caule tetragono laevi. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 33.

connatum. 5. S. foliis oppositis sessilibus perfoliatis, caule tereti scabro. *Mant. p.* 574. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 26.

Asteriscus. 6. S. foliis oppositis sessilibus indivisis: inferioribus alternis. *Dill. h. Elth. t.* 37. *f.* 42.

trilobatum. 7. S. foliis oppositis sessilibus cuneiformibus. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 155. *f.* 1.

trifoliatum. 8. S. foliis ternis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 68.

987. POLYMNIA.

Recept. paleaceum. *Pappus* 0. *Cal.* exterior 4-5phyllus. interior 10phyllus: foliolis cymbiformibus.

carnosa. 1. P. foliis alternis oblongis, calicibus serratis, caule frutescente decumbente. *Suppl. p.* 384.

canadense. 2. P. foliis alternis hastato-sinuatis. *Amoen. acad.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

Uvedelia. 3. P. foliis oppositis hastato-sinuatis. *Pluckn. alm. t.* 83. *f.* 3.

Tetragonotheca. 4. P. foliis oppositis spatulatis subdentatis. *Sp. pl. p.* 1273. Tetragonotheca helianthoides.

spinosa. 5. P. foliis oppositis ovato-cordatis sessilibus, aculeis supra axillaribus, calicibus integris, caule fruticoso erecto. *Suppl. p.* 384.

abyssinica. 6. P. foliis oppositis lanceolatis sessilibus. *Suppl. p.* 383.

Wedelia. 7. P. foliis lanceolatis, caule fruticoso. *Mant. p.* 118. *Jacq. stirp. amer. pict. t.* 198. *Pappus* 10*dentatus*; *an ergo hujus generis?*

988. CHRYSOGONUM.

Recept. paleaceum. *Pappus* 1phyllus, 3dentatus. *Cal.* 5phyllus. *Sem.* caliculo 4phyllo involuta.

virginianum. 1. Chrysogonum. *Pluckn. alm. t.* 83. *f.* 4. *et t.* 242. *f.* 3. *Petioli folio longiores.*

BASTERA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus.

Houttuyni. 1. Bastera. *Houttuyn. Linn. Syſt.* 4. *p.* 437.

989. MELAMPODIUM. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* 1phyllus, vulviformis. *Cal.* 5phyllus.

humile. 1. M. caule erecto, foliis lyrato-dentatis ſeſſilibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 114.

americanum. 2. M. caule erecto, foliis ſublinearibus utrinque unidentatis.

auſtrale. 3. M. caule decumbente, foliis ovatis ſerratis.

TRIXIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice hirſuto. *Corollul.* radii 3fidae.

terebinthinacea. 1. Tr. foliis ovatis ſerrulatis hiſpidis ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 115.

aſpera. 2. Tr. foliis ovatis baſi et apice attenuatis dentato-ſerratis aſperis, floribus paniculatis. *Aubl. pl. guj. p.* 804. *t.* 317.

eroſa. 3. Tr. foliis lato-ovatis inciſo-ſerratis rugoſis ſcabris petiolo longioribus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 115.

BAILLIERIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice 2cornia. *Cal.* ovatus, 4-5-phyllus. *Corollul.* rad. 7.

aſpera. 1. Baillieria. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 804. *t.* 317. *β*) Baillieria ſilveſtris. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 807.

990. CALENDULA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* polyphyllus, ſubaequalis. *Sem.* diſci utplurimum membranacea.

ſancta. 1. C. feminibus urceolatis obovatis laevibus, calicibus ſubmuricatis.

arvenſis. 2. C. ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis; intimis conglobatis; extimis erectis caudatis. *Bulliard herb. Franc. t.* 239.

officinalis. 3. C. ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Mill. ill. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* R. 21.

pumila. 4. C. ſeminibus oblongis incurvatis, foliis orbiculatis crenato-ſerratis: ſerraturis mucronatis, ſcapo nudo unifloro. *Forſt. flor. auſtr. p.* 57.

tomentoſa. 5. C. foliis obovatis integris tomentoſis, ſcapo nudo unifloro. *Suppl. p.* 284.

fruticoſa. 6. C. foliis obovatis ſubdentatis, caule fruticoſo decumbente. *Mill. h. angl. t.* 283.

rigida. 7. C. foliis ellipticis dentatis ſcabriuſculis, ſeminum alis ſemiorbiculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 271.

hybrida. 8. C. foliis lanceolatis dentatis, caule folioſo, pedunculis ſuperne incraſſatis. *Mill. h. angl. t.* 75. *f.* 1.

pluvialis. 9. C. foliis lanceolatis ſinuato-denticulatis, caule folioſo, pedunculis filiformibus. *Mill. h. angl. t.* 75. *f.* 2.

nudicaulis. 10. C. foliis lanceolatis ſinuato-dentatis, caule ſubnudo. *Mant. p.* 479. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 33.

arboreſcens. 11. C. foliis cuneiformi-lanceolatis ſerrato-dentatis, caule ramoſo, pedunculis unifloris teretibus. *Jacq. Collect.* 3. *p.* 167.

graminifolia. 12. C. foliis linearibus ſubintegerrimis, caule ſubnudo unifloro, ſeminibus obcordato-orbiculatis laevibus. *Mill. h. angl. t.* 76. *f.* 1.

Tragus. 13. C. cauleſcens, foliis alternis linearibus ſubintegerrimis ſubpiloſis, ſeminibus ſuborbiculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 271.

oppoſitifolia. 14. C. foliis oppoſitis linearibus integerrimis ſubcarnoſis glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 272.

991. ARCTOTIS. *Recept.* villosum vel paleaceum. *Pappus* corona subcentophylla. *Cal.* imbricatus: squamis intimis apice scariosis.

* *receptaculo villoso.*

⊢ *floseulis radiantibus sterilibus.*

calendulacea. 1. A. foliis runcinatis subtomentosis.

Calendula. α. A. floseulis radiantibus duodenis subintegris. *Herm. par. bat. p.* 42. *ic.*

hypochondriaca. β. A. floseulis radiantibus trifidis: media inflexa. *Breyn ic. t.* 15.

tristis. γ. A. floseulis radiantibus quadripartitis. *Mant. p.* 479. *Commel rar. t.* 36.

coruscans. δ. A. floseulis radiantibus tripartitis: exteriori trifida.

superba. ε. A. floseulis radiantibus quinquepartitis.

serrata. 2. A. foliis lanceolatis indivisis dentato-serratis. *Suppl. p.* 385.

microphylla. 3. A. foliis linearibus indivisis nudis. *Suppl. p.* 385.

⊢⊢ *floseulis radiantibus fertilibus.*

argentea. 4. A. foliis lanceolato-linearibus integerrimis tomentosis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 273.

plantaginea. 5. A. foliis lanceolato-ovatis nervosis denticulatis amplexicaulibus.

angustifolia. 6. A. caulibus repentibus arachnoideis, foliis lyratis utrinque bidentatis. β) *Mant. p.* 479.

aspera. 7. A. foliis pinnato-sinuatis villosis: laciniis oblongis dentatis. *Mant. p.* 480. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 22.

grandiflora. 8. A. foliis pinnatifidis denticulatis arachnoideis trinerviis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 272.

** *receptaculo paleaceo.*

tenuifolia. 9. A. foliis linearibus indivisis glabris. *Mant. p.* 288. *an vere distincta ab angustifolia?*

scarioſa. 10. A. foliis decompoſitis, floſculis radiantibus ſterilibus: paleis floſculos diſci aequantibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 274.

acaulis. 11. A. pedunculis radicalibus, foliis lyratis. *Commel. rar. t.* 35.

dentata. 12. A. floſculis radiantibus ſterilibus, foliis pinnatis: pinnis pinnatifido-dentatis. *Burm. afr. t.* 64.

paleacea. 13. A. floſculis radiantibus ſterilibus, paleis floſculos diſci aequantibus, foliis pinnatis linearibus. *Burm. afr. t.* 65. *f.* 1.

paradoxa. 14. A. floſculis radiantibus ſterilibus, paleis coloratis diſco longioribus, foliis bipinnatis linearibus. *Pluckn. phyt.* 312. *f.* 5.

anthemoides. 15. A. paleis floſculo brevioribus, foliis ſupradecompoſitis linearibus. *Burm. afr. t.* 63. *f.* 2.

carolinia-na. 16. A. foliis radicalibus ovatis dentatis hirſutis, pedunculis radicatis piloſis unifloris. *Walt. flor. Carol. p.* 216.

992. OSTEOSPERMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* polyphyllus. *Drupae* ſubgloboſae, coloratae, tandem oſſeae, congregatae, 1loculares.

junceum. 1. O. foliis linearibus acutis carinatis diſtantibus, panicula terminali. *Mant. p.* 290.

triquetrum. 2. O. foliis linearibus triquetris. *Suppl. p.* 385.

ilicifolium. 3. O. foliis oblongis, dentato-angulatis ſcabris ſemiamplexicaulibus, ramis ſulcatis. *Burm. zeyl. t.* 62.

ſpinoſum. 4. O. ſpinis ramoſis. *Mant. p.* 480. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 43. *Piſifero proximum.*

piſiferum. 5. O. foliis lanceolatis mucronatis ſubpetiolatis glabris ſerratis, ramis denticulato-angulatis. *Mill. h. angl. t.* 194. *f.* 1.

calendulaceum. 6. O. foliis lanceolatis ſeſſilibus dentatis ſcabris, caule carnoſo laxo. *Suppl. p.* 386.

polygaloides. 7. O. foliis lanceolatis ſparſis decurrentibus glabris integerrimis: axillis lanatis. *Mant. p.* 480. *Pluckn. mant. t.* 382.

corymboſum. 8. O. foliis lanceolatis glabris, floribus paniculatis. *Mant. p.* 290.

9. O.

ciliatum. 9. O. foliis elliptico-lanceolatis crenatis ciliatis. *Burm. afr. t.* 61. *f.* 2.

imbricatum. 10. O. foliis ovatis obtusis imbricatis. *Mant. p.* 290.

herbaceum. 11. O. foliis ovatis subsessilibus spatulatis serratis, caule herbaceo. *Suppl. p.* 385.

niveum. 12. O. foliis ovatis petiolatis dentatis lanatis. *Suppl. p.* 386.

perfoliatum. 13. O. foliis ovatis petiolatis angulato-dentatis subtus tomentosis: petiolis perfoliato-amplexicaulibus. *Suppl. p.* 386.

moniliferum. 14. O. foliis obovatis serratis petiolatis subdecurrentibus. *Dill. h. Elth. t.* 78. *f.* 79.

Arctotoides. 15. O. foliis lyratis petiolatis: petiolis basi auriculatis semiamplexicaulibus tomentosis. *Suppl. p.* 385.

rigidum. 16. O. foliis dentato-pinnatifidis pilosis, ramis inermibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 275.

pinnatifidum. 17. O. foliis pinnatifidis. *Herit. stirp. nov.* 1. *p.* 11. *t.* 6.

caeruleum. 18. O. erectum viscosum, foliis pinnatis: pinnis oblongis inaequaliter serratis utrinque decrescentibus. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 78. *an idem cum pinnatifido?*

993. OTHONNA. *Recept.* nudum. *Pappus* subnullus. *Cal.* 1phyllus, multifidus, subcylindricus.

* *foliis simplicibus indivisisque.*

ericoides. 1. O. caule dichotomo imbricato, foliis aceroſis, pedunculo longissimo, ex divaricaturis solitario. *Suppl. p.* 388.

tenuissima. 2. O. foliis filiformibus carnosis, caule fruticoso. *Mant. p.* 118. *Pluckn. phyt.* 319. *f.* 5.

linifolia. 3. O. herbacea, foliis linearibus marginatis gramineis. *Suppl. p.* 388.

crassifolia. 4. O. foliis lanceolatis integerrimis subcarnosis, caule erecto. *Mill. h. angl. t.* 245. *f.* 2.

cheirifolia. 5. O. foliis lanceolatis trinerviis integerrimis, caule suffruticoso repente. *Mill. h. angl. t.* 245. *f.* 1.

coronopi folia. 6. O. foliis lanceolatis: infimis integerrimis; superioribus sinuato-dentatis. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 70.

parviflora. 7. O. foliis lanceolatis glabris amplexicaulibus, floribus paniculatis. *Mant. p.* 289. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 553. Senecio rigens. *Commel. h. amst.* 2. *t.* 72.

lateriflora 8. O. foliis lanceolatis, floribus lateralibus, pedunculis longitudine foliorum. *Suppl. p.* 387.

Lingua. 9. O. foliis ovato-lanceolatis semiamplexicaulibus. *Suppl. p.* 387.

hetero-phylla. 10. O. foliis radicalibus ovatis angulato-dentatis: caulinis lanceolatis integriusculis. *Suppl. p.* 387.

Cacalioides. 11. O. ramosa nuda laevis, foliis fasciculatis obovatis sessilibus, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 388.

frutescens. 12. O. foliis ovalibus subdentatis, caule frutescente. *Mant. p.* 288. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 557. Cineraria othonnites. *Commel. h. amst.* 20 *t.* 76.

virginea. 13. O. foliis cuneatis incisis. *Suppl. p.* 389.

arborescens. 14. O. foliis oblongis integerrimis, caule arborescente carnoso: cicatricibus lanatis. *Dill. h. Elth. t.* 103. *f.* 123.

bulbosa. 15. O foliis oblongis nudis petiolatis, caule herbaceo, pedunculis unifloris longissimis. *Breyn cent.* 1. *t* 66.

denticulata. 16. O. foliis oblongis denticulatis glabris basi attenuatis amplexicaulibus, floribus paniculatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 276.

digitata. 17. O. foliis oblongis indivisis, vel digitato-dentatis, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 386.

** *foliis divisis compositisve.*

capillaris. 18. O. foliis lyratis ramis capillaribus. *Suppl. p.* 388.

trifida. 19. O. foliis trifidis linearibus, floribus lateralibus pedunculatis. *Suppl. p.* 387.

trifurcata. 20. O. foliis trifido-pinnatifidis: laciniiis linearibus, pedunculis lateralibus fastigiatis. *Suppl. p.* 387.

pectinata. 21. O. foliis pinnatifidis: laciniis linearibus parallelis. *Mill. h. angl. t.* 194. *f.* 2.

ciliata. 22. O. foliis pinnatifidis sessilibus: laciniis ovatis ciliatis, pedunculis terminalibus elongatis unifloris. *Suppl. p.* 386.

23. O.

pinnata. 23. O. foliis pinnatifidis: laciniis lanceolatis integerrimis decurrentibus. *Suppl. p.* 387. *Burm. afr. t.* 59.

munita. 24. O. foliis pinnatifidis imbricatis incurvis: laciniis triquetris ſubulatis, caule dichotomo, pedunculis ex divaricaturis. *Suppl. p.* 388.

abrotanifolia. 25. O. foliis multifido-pinnatis linearibus, caulium geniculis villoſis. *Seb. muſ.* 2. *t.* 23. *f.* 6.

Tagetes. 26. O. foliis linearibus pinnatis ſubdentatis. *Murray comm. goett.* 1780. *p.* 17. *t.* 5.

Athanaſiae. 27. O. foliis pinnatis filiformibus, calice hemiſphaerico duodecimdentato. *Suppl. p.* 386.

1324. HIPPIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Semina* marginibus latiſſimis. *Cal.* hemiſphaericus, ſubimbricatus. *Corollul.* radii 10, obſoletae, ſubtrifidae.

integrifolia. 1. H. hiſpida erecta, foliis obovatis ſerratis quinquenerviis, racemis terminalibus. *Suppl. p.* 389.

minuta. 2. H. herbacea repens glabra, foliis pinnatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p.* 389.

fruteſcens. 3. H. fruticoſa villoſa, foliis pinnatifidis, floribus corymboſis. *Mant. p.* 291. *Suppl. p.* 390. *Sp. pl. p.* 1183. Tanacetum fruteſcens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 579. Eriocephalus pectinifolius. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 101.

994. ERIOCEPHALUS. *Recept.* ſubvilloſum. *Pappus* o. *Cal.* 10phyllus, aequalis. *Radii* floſculi 5.

africanus. 1. E. foliis integris diviſisque, floribus corymboſis. *Dill. h. Elth. t.* 110. *f.* 134.

racemoſus. 2. E. foliis linearibus indiviſis, floribus racemoſis.

995.

995. FILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* o. vel brevis ſimplex. *Cal.* imbricatus. *Floſculi feminei*, partim apetali inter ſquamas calicis locati.

acaulis. 1. F. floribus acaulibus ſeſſilibus, foliis floralibus majoribus. *Barr. pl. rar. ic.* 127.

arvenſis. 2. F. caule paniculato, floribus conicis lateralibus.

germanica. 3. F. panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirſutis, foliis acutis.

pyramidata. 4. F. caule dichotomo, floribus pyramidatis pentagonis axillaribus: floſculis femineis ſerratis.

gallica. 5. F. caule dichotomo erecto floribus ſubulatis axillaribus, foliis filiformibus. *Pluckn. alm. t.* 298. *f.* 2.

montana. 6. F. caule ſubdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribusque. *Lob. ic.* 481.

Leontopodium. 7. F. caule ſimpliciſſimo, capitulo terminali bracteis hirſutiſſimis radiato. *Mant. p.* 481. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 86.

996. MICROPUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus.* o. *Cal.* caliculatus. *Rad.* corollae o. *Floſculi feminei* ſquamis calicis involuti.

ſupinus. 1. M. caule procumbente, foliis geminis. *Pluckn. alm. t.* 187. *f.* 6.

erectus. 2. M. caule erecto, calicibus edentulis, foliis ſolitariis. *Loeſl. hiſp. t.* 1. *f.* 3.

POLY-

POLYGAMIA SEGREGATA.

997. ELEPHANTOPUS. *Caliculus* 4florus. *Corollulae* ligulatae, hermaphroditae. *Recept.* nudum. *Pappus* ſetaceus vel ariſtatus.

ſcaber. 1. E. foliis oblongis ſcabris. *Dill. h. Elth. t.* 106. *f.* 126.

tomentoſus. 2. E. foliis ovatis tomentoſis.

ſpicatus. 3. E. foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus. *Sloan. jam.* 1. *p.* 256. *t.* 150. *f.* 3. 4.

anguſtifolius. 4. E. foliis caulinis lineari-lanceolatis integris villoſis. *Sloan. jam.* 1. *p.* 256. *t.* 148. *f.* 4.

1325. OEDERA. *Calic.* multiflori. *Corollulae* tubuloſae, hermaphroditae: una alterave feminea ligulata. *Recept.* paleaceum. *Pappus* paleis pluribus.

prolifera. 1. Oe. foliis lanceolatis oppoſitis ciliatis utrinque glabris. *Mant. p.* 291. *Suppl. p.* 391. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 569. Buphthalmum capenſe.

aliena. 2. Oe. foliis linearibus ſubtus tomentoſis. *Suppl. p.* 390.

998. SPHAERANTHUS. *Calic.* multiflori. *Coroll.* tubuloſae hermaphroditae et obſoletae femineae. *Recept.* ſquamoſum. *Pappus* o.

indicus. 1. Sph. foliis decurrentibus lanceolatis ſerratis, pedunculis eriſpatis. *Rheed. h. malab.* 10, *t.* 43.

2. Sph.

africanus. 2. Sph. foliis decurrentibus ovatis ſerratis, pedunculis teretibus. *Mant. p.* 119. *Burm. ind. t.* 60. *f.* 2.

ſinenſis. 3. Sph. foliis ſeſſilibus pinnatifidis. *Mant. p.* 119.

999. ECHINOPS. *Calic.* 1florus. *Coroll.* tubuloſae, hermaphroditae. *Recept.* ſetoſum. *Pappus* obſoletus.

ſphaerocephalus. 1. E. capitulis globoſis, foliis ſinuatis aſperis ſubtus tomentoſis. *Mill. illuſtr. ic.*

ſpinoſus. 2. E. capitulis inſperſis ſpinis longis. *Mant. p.* 119.

Ritero. 3. E. capitulo globoſo, foliis pinnatifidis ſupra glabris. *Mill. h. angl. t.* 130. *β) Gmel. ſlor. ſib. 2. t.* 46.

ſtrigoſus. 4. E. capitulis faſciculatis; calicibus lateralibus ſterilibus, foliis ſupra ſtrigoſis. *Herm. par. Lugdb. p.* 224. *ic.*

TETRANTHUS. *Calix* 4florus. *Calic.* 1phyllus. *Sem.* coronata. *Coroll.* tubuloſae, hermaphroditae.

littoralis. 1. TETRANTHUS. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 116.

ROLANDRA. *Flores* faſciculati in capitulum ſquamis interjectis. *Cal.* partial. 2-valvis, 1florus. *Coroll.* hermaphroditae. *Pappus* o.

argentea. 1. ROLANDRA. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 116. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 7. *Echinops fruticoſus.*

1000. GUNDELIA. *Calic.* fere 0. *Corollul.* 5. tubulosae, masculae et hermaphroditae. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 0. *Sem.* margine obsoleto.

Tourne- 1. GUNDELIA. *Mill. h. angl. t.* 287.
fortii.

1422. JUNGIA. *Cal.* communis 3florus. *Recept.* paleaceum. *Flosculi* tubulosi, 2labiati: labio exteriori ligulato, interiori 2partito.

ferruginea. 1. JUNGIA. *Suppl. p.* 3901.

CRASPEDIA. *Cal.* communis imbricatus. *Calic.* 0. *Flosculi* hermaphroditi, tubulosi: fasciculis aliquot depressis. *Recept.* paleaceum. *Pappus* plumosus.

uniflora. 1. CRASPEDIA. *Forst. flor. austr. p.* 58.

NASSAUVIA. *Cal. comm.* 4-5florus. *Recept.* nudum. *Floscul.* subbilabiati, hinc 3dentati, inde 2fidi.

magellanica. 1. NASSAUVIA. *Jussieu gen. plant. p.* 175.

1001. STOEBE. *Calic.* 1florus. *Coroll.* tubulosae, hermaphroditae. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus.

aethiopica. 1. St. foliis recurvato-uncinatis nudis. *Mant. p.* 481.

ericoides. 2. St. foliis recurvatis incanis, corollis bifloris difformibus. *Mant. p.* 574. *Breyn. cent. t.* 9.

districha. 3. St. foliis recurvis fasciculatis, spicis bifariis. *Suppl. p.* 391.

4. St.

proſtrata. 4. St. foliis reſupinatis hinc tomentoſis, caulibus proſtratis. *Mant. p.* 291.

gnaphaloides. 5. St. foliis imbricatis appreſſis filiformibus. *Mant. p.* 119. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 582. Seriphium corymbiferum. *Spec. pl. p.* 1192. Gnaphalium niveum. *Burm. afr. t.* 77. *f.* 1.

gomphrenoides. 6. St. foliis imbricatis appreſſis lanceolatis, capitulo terminali ſeſſili. *Suppl. p.* 391.

ſcabra. 7. St. foliis tortis appreſſis linearibus exterius tuberculato-ſcabris intus tomentoſis, floribus racemoſis. *Suppl. p.* 391.

Rhinocerotis. 8. St. foliis triquetris appreſſis, ramulis tomentoſis cernuis, racemis proliferis. *Suppl. p.* 391.

reflexa. 9. St. procumbens, foliis linearibus, ſpicis ovatis, ramis adſcendentibus. *Suppl. p.* 391.

CLAS-

CLASSIS XIX.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

* *fructificationibus ſpicatis.*

1169. EQUISETUM. *Spica* ſparſa: *Fructificationes* peltatae, baſi valvatae.

1170. ONOCLEA. *Spica* 2ſticha: *Fructificationes* 5valves.

1171. OPHIOGLOSSUM. *Spica* articulata: *Fructificationes* circumſciſſae.

1172. OSMUNDA. *Spica* racemoſa: *Fructificationes* 2valves.

MARATTA. *Capſulae* multiloculares: loculis ſuperne dehiſcentibus.

1185. LYCOPODIUM. *Capſulae* dehiſcentes 2valves.

** *fructificationibus frondoſis, in paginæ inferiori.*

1173. ACROSTICHUM. *Fructificationes* ſubtus totam frondem tegentes.

1179. POLYPODIUM. *Fructificationes* in acervulos ſubrotundos ſub fronde diſtributae.

DICKSONIA. *Fructificationes* ſubrotundae, margini averſo ſubjectae.

1176. HEMIONITIS. *Fructificationes* lineas decuſſantes ſub fronde efficientes.

1178. ASPLENIUM. *Fructificationes* lineas ſubparallelas ſub fronde efficientes.

1175. BLECHNUM. *Fructificationes* lineas utrinque coſtis adjacentes efficientes.

1177. LONCHITIS. *Fructificationes* lineas ad ſinus marginis efficientes.

1174. PTERIS. *Fructificationes* ſubtus in linea marginali frondis.

DAREA. *Fructificationes* lineas breves ſolitarias ex unico frondis latere ſubtus exſertas efficientes.

1180. ADIANTUM. *Fructificationes* maculas apicem margine reflexo obtectas efficientes.

1181. TRICHOMANES. *Fructificationes* ſolitariae margini ipſi infertae.

CAENOPTERIS. *Fructificationes* puncto marginali ſolitario rima concava ſcobe parva capitulata farta.

**** fructificationibus lateralibus,*

1182. MARSILEA. *Fructus* 4capsularis.
1183. PILULARIA. *Fructus* 4locularis.
1184. ISOETES. *Fructus* 2locularis.

MUSCI.

** frondosi.*

1186. PORELLA. *Capsf.* multilocularis, poris pertusa, sine operculo et calyptra.

1187. SPHAGNUM. *Flos masculus* clavatus: antheris planis. *Capsf.* operculatae sine calyptra: ore laevi, in eadem planta.

1191. SPLACHNUM. *Gemma* orbicularis, terminalis. *Capsf.* in alia planta cum calyptra et apophysi maxima: peristomate octodentato.

1192. POLYTRICHUM. *Gemma* orbicularis, terminalis. *Capsula* in alia planta calyptra munita, peristomatis dentibus 32.

1193. MNIUM. *Gemma* orbicularis, rarius capitata. *Capsf.* utplurimum in alia planta, calyptra munitae; peristomatis dentibus 16, rarius 4.

1189. PHASCUM. *Capsula* calyptra munita cum rudimento operculi persistente.

1194. BRYUM. *Gemmae* saepe axillares, nunc in alia nunc in eadem planta cum capsulis calyptra munitis, pedunculo terminali ex tuberculo exeunti insidentibus.

1195. HYPNUM. *Gemmae* in alia utplurimum planta. *Capsulae* pedunculo laterali ex perichaetio prodeunti insidentes: peristomatis dentibus sedecim.

1190. FONTINALIS. *Gemma* in eadem planta cum *capsula* sessili perichaetio imbricato obvoluta et calyptra munita.

1188. BUXBAUMIA. *Gemma* orbicularis. *Capsf.* pedunculata: peristomate externo 16dentato; interno membranaceo plicato.

*** hepatici.*

1198. MARCHANTIA. *Capsula* peltata, pedunculata, inferne seminifera.

1196. JUNGERMANNIA. *Capsula* pedunculata, nuda, 4valvis.
1197. TARGIONIA. *Cal.* 2valvis, includens capsulam campanulatam.

ALGAE.

* *terrestres.*

1201. ANTHOCEROS. *Capf.* subulata, 2valvis: valvis seminiferis.
1199. BLASIA. *Theca* cylindrica e fundo gemmas globulosas excludens.
1200. RICCIA. *Fructificationes* granulosae frondi innatae.
1202. LICHEN. *Propagines* et *gemmae* receptaculis elevatis laevibus nitidis crustae vel frondis innidulantes.
1208. BYSSUS. *Fibrae* simplices uniformes lanuginosae.

** *aquaticae.*

1206. ULVA. *Gemmae* vel *Gangyli* rotund. in membrana diaphana.
1205. FUCUS. *Gangyli* cuspomorphi vel *semina* graniformia sub punctis perforatis latentia.
1207. CONFERVA. *Fibrae* simplices, aut ramosae, gemmas globulosas protrudentes.

* *Spongia? Corallina?*

FUNGI.

1209. AGARICUS. *Fungus* subtus lamellosus.
MERULIUS. *Fungus* subtus venosus.
1210. BOLETUS. *Fungus* subtus porosus.
THAELAEPHORA. *Fungus* subtus papillosus.
1211. HYDNUM. *Fungus* subtus echinatus.
1212. PHALLUS. *Fungus* subtus laevis, supra cellulosus.
1214. HELVELLA. *Fungus* turbinatus, plicatus, rugosus.
ATRACTOBOLUS. *Fungus* ejaculatorius sessilis cupularis operculatus: vesicula gemmifera fusiformi ejicienda.
TYMPANIS. *Fungus* cyathiformis: cupula superne volvata; gemmis levis confectis in pulverem fatiscentibus.
MYROTHECIUM. *Fungus* cyathiformis: cupula superne volvata, gemmis lento viscidis.

SETARIA. *Fungus* hypocrateriformis ſtipitatus: pilei ſuperficie ſuperiori punctata: umbilicata; margine primum aevoluto, gemmis ſimilaribus, ſtipite brevi ſetaceo.

CYATHUS. *Fungus* campanulatus, capſulas lentiformes intus gerens.

PORONIA. *Fungus* patelliformis, in ſuperficie externa gemmas ejaculans.

1215. PEZIZA. *Fungus* ſaepe concavus, ſine capſulis aut gemmis oculo nudo viſibilibus.

PATERA. *Fungus* carnoſus, ſeſſilis, planiuſculus, ſuperne glaber.

1216. CLAVARIA. *Fungus* glaber clavatus aut ramoſus.

ACROSPERMUM. *Fungus* ſimpliciſſimus ſuberectus, in apice convexo extrinſecus gemmas portans.

PUCCINIA. *Fungus* cylindricus, gemmis caudatis farctus.

STEMONITIS. *Fungus* corticatus, tomento pollinifero elaſtice proſiliente impletus.

1213. CLATHRUS. *Fungus* cancellatus.

1217. LYCOPERDON. *Fungus* gemmas filo inſtructas continens.

TUBER. *Fungus* ſucco pulpoſo repletus.

CARPOBOLUS. *Fungus* capſulam globoſam ejaculans, ſeſſilis, vertice radiatim dehiſcente.

SPERMODERMIA. *Fungus* globoſus ſeſſilis ſimpliciſſimus ſpongioſus: corticis vicem ſupplente polline conferto.

VERMICULARIA. *Capſula* globoſa ſeſſilis, corporibus vermiformibus liberis repleta.

PYRENIUM. *Fungus* globoſus ſeſſilis integerrimus, germina nuda conglobata nuclei inſtar includens.

MEDUSULA. *Fungus* globoſus ſtipitatus confertus ſolidus: gemmis externis fuſiformibus flexilibus colliqueſcentibus.

CHORDOSTYLUM. *Fungus* tenuiſſimus ſtipitatus: capitulo globoſo ſubdeciduo intus gemmas gerente, ſtipite longiſſimo ſubramoſo.

SPHAERIA. *Fungus* gemmis ecaudatis farctus, per poros in ſuperficie ſparſos emittens

THELEOBOLUS. *Fungus* ejaculatorius ſeſſilis: ſubſtantia et placenta gemmifera ſolidis gelatinoſis dejiciendis.

1204. TREMEILA. *Fungus* gelatinoſus: gemmis latitantibus.

MESENTERICA. *Fungus* expanſus gelatinoſus venoſus, in margine gemmas ferens.

TUBER-

TUBERCULARIA. *Fungus* gelatinosus stipitatus pileatus: stipite crassissimo farcto; pileo tuberculato-papilloso stipiti arcte appresso in superficie superiori gemmas portante.

STILBUM. *Fungus* gelatinosus aggregatus stipitatus: capitulo diaphano nitente solido persistente, extrinsecus gemmas portante.

ASCOPHORA. *Fungus* erectus stipitatus: capitulo globoso-oblongo inflato opaco elastico: extrinsecus gemmas ferente stipite setaceo.

SCLEROTIUM. *Fungus* simplicissimus globoso-oblongus: substantia tenaci duriuscula centro demum subhiante, cortice inseparabili superne nunquam dehiscente.

HYSTERIUM. *Fungus* labiato-globosus sessilis: capsula in labia dehiscente, substantia prominente exterius gemmas portante.

XYLOSTROMA. *Fungus* expansus coriaceus deformis interpolatus laevis aequalis, gemmis globulosis minutissimis intus fibrillis fungi infixis.

HYDROGERA. *Fungus* stipitatus stipite capillari superne ventricoso hydrophoro: placenta gemmifera dejicienda pileum constituente.

MUCILAGO. *Fungus* cellulosus aut filamentosus aquosus, sine granulis et capitulis.

EMBOLUS. *Fungus* cellulosus, pulverulentus, sine cortice.

HELOTIUM. *Fungus* fugacissimus perpendicularis: stipite capillari, pileo minuto convexo inferne nudas gemmas portante.

1218. MUCOR. *Fungus* mollis in pulverem capitulo inclusum dehiscens.

MONILIA. *Granula* minuta substantiae filamentosae affixa.

RETICULARIA. *Fungus* germina pulverulenta reticulo implicata gerens.

FULIGO. *Fungus* mollis, butyraceus, in atrum pulverem dilabens.

FILICES.

1169. EQUISETUM. *Clava* ovato-oblonga, multivalvis: Fructificationes peltatae intus dehiſcentes.

ſilvaticum. 1. E. frondibus compoſitis, ſpica terminali flaccida. *Weinm. phytanth. t.* 479. *f.* f.

arvenſe. 2. E. ſcapo fructificante nudo, fronde ſterili verticillato-ramoſo decumbente. *Curt. flor. Lond. t.* 285.

paluſtre. 3. E. caule angulato, frondibus ſimplicibus. *Weinm. phytanth. t.* 479. *f.* d. e. *β) Raj. angl.* 3. *t.* 5. *f.* 3.

fluviatile. 4. E. caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus. *Blackw. herb. t.* 217. *f.* 2.

limoſum. 5. E. caule ſubnudo laevi. *Raj. angl.* 3. *t.* 5. *f.* 2. *an mera fluviatilis varietas?*

hiemale. 6. E. caule nudo ſcabro baſi ſubramoſo. *Regn. bot. t.* 401.

pratenſe. 7. E. caule ſubaequali ramoſo ſulcato ſcaberrimo: ramis patentiſſimis ſterilibus, dentibus vaginarum ſubulatis ſcarioſis. *Ehrhart Hannöv. Mag.* 1784. 9.

gigantеum. 8. E. caule ſtriato arboreſcente, frondibus ſimplicibus ſtrictis ſpiciferis. *Plum. ic.* 125. *f.* 2.

1185. LYCOPODIUM. *Capſulae?* reniformes, 2-valves, elaſticae, polyſpermae.

nudum. 1. L. foliis ſubnullis, ſpicis dichotomis: floribus diſtantibus. *Mant. p.* 506. *Dill. muſc. t.* 64. *f.* 4.

ſelaginoides. 2. L. foliis ſparſis ciliatis lanceolatis, ſpicis ſolitariis terminalibus folioſis. *Flor. dan. t.* 70.

taxifolium. 3. L. foliis ſparſis lanceolato-linearibus patulis, caule erecto dichotomo, capſulis ſparſis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 138.

alopecuroides. 4. L. foliis ſparſis ciliatis linearibus, ſpicis terminalibus folioſis. *Dill. muſc. t.* 62. *f.* 8.

ſquarroſum. 5. L. foliis ſparſis linearibus glabris, ſpicis terminalibus folioſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 86.

6. L.

dichotomum. 6. L. foliis ſparſis lineari-acuminatis patulis, caule declinato aſſurgente dichotomo: ramis patulis, capſulis ſparſis. *Jacq. h. Vind.* 3. *p.* 26. *t.* 45.

clavatum. 7. L. foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Flor. dan. t.* 126.

rupeſtre. 8. L. foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis terminalibus tetragonis. *Dill. muſc. t.* 63. *f.* 11.

inundatum. 9. L. foliis ſparſis integerrimis, ſpicis terminalibus folioſis. *Flor. dan. t.* 336.

cernuum. 10. L. foliis ſparſis curvatis, caule ramoſiſſimo, ſpicis nutantibus. *Dill. muſc. t.* 63. *f.* 10.

obſcurum. 11. L. foliis ſparſis decurrentibus, ſarmentis repentibus, furculis erectis dichotomis. *Dill. muſc. t.* 67.

Bryopteris. 12. L. foliis ſparſis imbricatis, ramulis convolutis. *Dill. muſc. t.* 66. *f.* 11.

annotinum. 13. L. foliis ſparſis quinquefariis ſubſerratis, furculis annotinoarticulatis, ſpicis terminalibus glabris erectis. *Flor. dan. t.* 127.

Selago. 14. L. foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, capſulis ſparſis. *Flor. dan. t.* 104.

linifolium. 15. L. foliis alternis remotis lanceolatis, capſulis axillaribus. *Dill. muſc. t.* 57. *f.* 5.

gnidioides. 16. L. foliis ternis imbricatis lanceolatis obtuſis glaberrimis, caule dichotomo, ramis elongatis, capſulis axillaribus. *Suppl. p.* 448.

ſerratum. 17. L. foliis quaternis lanceolatis ſerratis, capſulis ſeſſilibus axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 341.

Phlegmaria. 18. L. foliis verticillato-quaternis, ſpicis terminalibus dichotomis. *Dill. muſc. t.* 61. *f.* 5.

rigidum. 19. L. foliis ſubverticillatis undique reflexis: inferioribus ſquarroſis rigidis, caule dichotomo faſtigiato, capſulis ſparſis. *Dill. muſc. p.* 4410. *t.* 57. *f.* 4.

ſcarioſum. 20. L. foliis bifariis imbricatis erectis ovatis glabris, ſpicis terminalibus ſquamoſis, ſquamis ſcarioſis reflexis. *Forſt. fl. auſtr. p.* 87.

complanatum. 21. L. foliis bifariis connatis: ſuperficialibus ſolitariis, ſpicis geminis pedunculatis. *Flor. dan. t.* 78.

stoloniferum. 22. L. foliis bifariis patentibus: superficialibus oblongis acutis distichis, surculis tetragonis repentibus longissimis inferne subnudis stoloniferis, spicis terminalibus sessilibus. *Plum. fil. t.* 43.

plumosum. 23. L. foliis bifariis patentibus: superficialibus semiovatis ciliatis, surculis erectiusculis, spicis terminalibus tetragonis sessilibus. *Dill. musc. t.* 66. *f.* 10.

ornithopodioides. 24. L. foliis bifariis patentibus: superficialibus distichis, surculis repentibus, spicis sessilibus. *Dill. musc. t.* 66. *f.* 1. B.

carolinianum. 25. L. foliis bifariis patulis: superficialibus solitariis, scapis longissimis monostachyis. *Dill. musc. t.* 62. *f.* 6.

helveticum. 26. L. foliis bifariis patulis: superficialibus distichis, spicis geminis pedunculatis. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 196.

flabellatum. 27. L. foliis bifariis: superficialibus distichis, caule erecto tereti. *Dill. musc. t.* 65. *f.* 5.

canaliculatum. 28. L. foliis bifariis: superficialibus distichis, caule erecto canaliculato. *Dill. musc. t.* 65. *f.* 6.

ciliare. 29. L. foliis bifariis: superficialibus distichis, caule ramoso, spicis terminalibus solitariis foliosis compressis unilateralibus. *Koenig ap. Retz. obs. bot.* 5. *p.* 32.

circinale. 30. L. foliis bifariis: superficialibus geminis, ramis convolutis. *Suppl. p.* 448. *Dill. musc. t.* 66. *f.* 11.

denticulatum. 31. L. foliis bifariis: superficialibus imbricatis, surculis repentibus, capitulis sparsis. *Dill. musc. t.* 66. *f.* 1. A. *an varietas helvetici?*

lupus. 32. L. foliis bifariis: alternis minoribus, caule repente, spicis sessilibus. *Dill. musc. t.* 64. *f.* 3.

myrtifolium. 33. L. foliis quadrifariis lineari-oblongis, spicis terminalibus filiformibus foliosis. *Forst. flor. austr. p.* 87.

verticillatum. 34. L. foliis quadrifariis approximatis acerosis, ramis dichotomis, capitulis axillaribus verticillatis. *Suppl. p.* 448.

sanguinolentum. 35. L. foliis quadrifariis imbricatis, caulibus repentibus dichotomis, spicis sessilibus tetragonis. *Amoen. acad.* 3. *f.* 26.

alpinum. 36. L. foliis quadrifariam imbricatis acutis caulibus erectis bifidis, spicis sessilibus teretibus. *Flor. dan. t.* 79.

japonicum. 37. L. foliis sexfariis integris, caule radicante. *Thunb. flor. jap. p.* 341.

38. L.

radicans. 38. L. foliis quadrifariis: binis patulis; binis imbricatis, ſpica filiformi bifurca, caule ramisque repentibus dichotomis compreſſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 493. *Dill. muſc. t.* 65. *f.* 2. A.

1170. ONOCLEA. *Spica* 2ſticha: fructificationibus 3-5valvibus.

ſenſibilis. 1. O. frondibus pinnatis apice ſubracemoſis. *Mant. p.* 504. *Pluckn. mant. t.* 404. *f.* 2.

polypodioides. 2. O. frondibus bipinnatis, fructificationibus trivalvibus *Mant. p.* 306.

1171. OPHIOGLOSSUM. *Spica* 2ſticha, articulata: articulis transverſim dehiſcentibus, ſubgloboſis.

vulgatum. 1. O. fronde ovata, ſcapo unifolio. *Flor. dan. t.* 147.

nudicaule. 2. O. frondibus ovatis, ſcapo aphyllo. *Suppl. p.* 443.

luſitanicum. 3. O. fronde lanceolata. *Barr. pl. rar. ic. t.* 252. *f.* 2.

reticulatum. 4. O. fronde cordata. *Plum. fil. t.* 164.

crotalophoroides. 10. O. fronde ſubcordata ſcapo breviori. *Walt. flor. carol. p.* 256.

pendulum. 5. O. frondibus linearibus longiſſimis indiviſis. *Rumpf amb. 6. t.* 37. *f.* 3.

palmatum. 6. O. fronde palmata baſi ſpicifera. *Plum. fil. t.* 163.

flexuoſum. 7. O. ſcapo flexuoſo tereti, frondibus oppoſitis petiolatis palmatis, laciniis lanceolatis integerrimis glabris. *Suppl. p.* 443. *Rumpf amb.* 6. *t.* 33.

ſcandens. 8. O. caule flexuoſo tereti, frondibus conjugatis pinnatis: pinnis utrinque ſpiniferis. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 33.

japonicum. 9. O. caule flexuoſo angulato, frondibus ſupradecompoſitis: foliolis alternis inciſis. *Thunb. flor. jap. p.* 328.

1172. OSMUNDA. *Spica* ramosa: Fructificationibus subglobosis, sessilibus transverse dehiscentibus.

* *fructificationibus in scapis distinctis.*
† *cauli ad basin frondis insidentibus.*

zeylanica. 1. O. scapo solitario, frondibus verticillatis lanceolatis indivisis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 68. *f.* 3.

Lunaria. 2. O. scapo solitario, racemo laterali, fronde pinnata solitario. *Flor. dan. t.* 18.

virginica. 3. O. scapo solitario, fronde supradecomposita. *Plum. fil. t.* 159.

ternata. 4. O. scapo solitario, fronde tripartita supradecomposita. *Thunb. flor. jap. p.* 329. *t.* 32.

phyllitidis. 5. O. scapis geminis, fronde pinnata, caule laevi. *Plum. fil. t.* 156.

hirta. 6. O. scapis geminis, fronde pinnata, caule hirto. *Plum. fil. t.* 157.

hirsuta. 7. O. scapis geminis, fronde bipinnata hirsuta. *Plum. fil. t.* 162.

adiantifolia. 8. O. scapis geminis, frondibus supradecompositis. *Plum. fil. t.* 158.

†† *scapis nudis radicalibus.*

bipinnata. 9. O. fronde pinnata: pinnis pinnatifidis. *Plum. fil. t.* 155.

cervina. 10. O. fronde pinnata: pinnis integerrimis. *Plum. fil. t.* 154.

verticillata. 11. O. racemis verticillatis, fronde supradecomposita. *Plum. fil. t.* 160.

filiculifolia. 12. O. scapo paniculato, fronde supradecomposita. *Plum. fil. t.* 161.

bifurcata. 27. O. fronde pinnata: pinnis bifidis dichotomis simplicibusque. *Jacq. coll.* 3. *p.* 282. *t.* 20. *f.* 4.

matricariae. 28. O. fronde pinnata: pinnis ovatis crenatis. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 419.

trifida. 29. O. fronde ternata. *Jacq. coll.* 3. *p.* 281. *t.* 20. *f.* 3.

** *fructificationibus frondi insidentibus.*
⊢ *omni*

regalis. 13. O. fronde bipinnata, racemo terminali supradecomposito. *Flor. dan. t.* 217.

14. O.

Clayto-niana. 14. O. frondibus pinnatis: pinnis pinnatifidis apice coarctato fructificantibus.

⊢⊢ *fructificationibus in frondibus distinctis.*

Spicanthus. 15. O. frondibus sterilibus pinnatifidis: fructificantibus pinnatis angustioribus; laciniis integerrimis. *Flor. dan. t.* 99. *an acrostichi potius species?*

capensis. 17. O. frondibus pinnatis: pinnis cordato-lanceolatis crenulatis. *Mant. p.* 306.

cinnamomea. 17. O. fronde pinnata: pinnis pinnatifidis, scapis hirsutis: racemis oppositis compositis.

carolinia-na. 26. O. fronde pinnata: pinnis inferioribus undulato-dentatis lanceolatis distinctis; superioribus confluentibus. *Walt. flor. carol. p.* 287.

Struthiopteris. 18. O. frondibus sterilibus binnatifidis, scapo fructificante pinnato disticho.

japonica. 19. O. fronde bipinnata: pinnulis cordato-lanceolatis serratis. *Thunb. flor. jap. p.* 330.

Lancea. 20. O. fronde bipinnata: pinnulis lanceolatis serratis. *Thunb. flor. jap. p.* 330.

crispa. 21. O. frondibus supradecompositis: foliolis alternis subrotundis incisis. *Mant. p.* 505. *Flor. dan. t.* 496.

*** *tribus incertae.*

ramosa. 22. O. racemis lateralibus, frondibus bipinnatis: pinnulis incisis. *Roth flor. germ.* 1. *p.* 444.

scandens. 23. O. caule scandente; frondibus pinnatis oppositis. *Rheed. h. mal.* 12. *p.* 67. *t.* 34.

discolor. 24. O. frondibus pinnatis: pinnis oblongis acutiusculis integris sessilibus alternis approximatis. *Forst. fl. austr. p.* 78.

procera. 25. O. frondibus pinnatis: pinnis remotis ovato-oblongis acuminatis serratis sessilibus. *Forst. flor. austr. p.* 78.

MARATTIA. *Caps.* multiloculares: loculis superne longitudinaliter dehiscentibus.

alata. 1. M. rhachibus squamosis: partialibus alatis: foliolis acute serratis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 128. *Smith plant. ic. ined.* 2. *t.* 46.

2. M.

laevis. 2. M. rhachibus laevibus: partialibus alatis, foliolis apice obtuſe ſerratis: ſummis confluentibus. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 47.

fraxinea. 3. M. rhachibus laevibus ſimplicibus, foliolis lanceolatis ſerratis omnibus diſtinctis. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 48.

1173. ACROSTICHUM. *Fructificationes* diſcum totum frondis inferius tegentes.

* *fronde ſimplici.*

† *indiviſa.*

ſerrulatum. 1. A. frondibus linearibus dentatis apice fructificantibus, ſurculo breviſſimo radicante. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 128.

graminoides. 2. A. frondibus nudis linearibus apice ſubdichotomis fructificantibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 128.

longifolium. 3. A. frondibus lineari-lanceolatis acutis integerrimis: ſterilibus erectis: fertilibus ſpiraliter revolutis. *Plum. fil. t.* 118. *t.* 135.

heterophyllum. 4. A. frondibus integerrimis glabris petiolatis: ſterilibus ſubrotundis; fertilibus linearibus. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 29.

petiolatum. 5. A. frondibus glabris petiolatis: ſterilibus lineari-lanceolatis; fertilibus linearibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 128.

muſcoſum. 6. A. frondibus petiolatis ſquamoſis: ſterilibus ovato-lanceolatis obtuſis; fertilibus lineari-lanceolatis. *Plum. fil. t.* 139.

lanceolatum. 7. A. frondibus lineari-lanceolatis acutis, ſurculo ſcandente. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 33.

ſimplex. 8. frondibus glabris petiolatis: ſterilibus lanceolatis acuminatis; fertilibus lineari-lanceolatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 128.

ſpicatum. 9. A. fronde petiolata lanceolata utrinque attenuata integerrima ſpica terminali lineari. *Suppl. p.* 444. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 49.

villoſum. 10. A. frondibus lato-lanceolatis ſubcrenulatis utrinque villoſis. *Plum. fil. t.* 127. *f.* D.

latifolium. 11. A. frondibus lato-lanceolatis glaberrimis marginatis: fructificantibus ovato-lanceolatis, ſurculo repente. *Plum. fil. t.* 135.

12. A.

citrifolium. 12. A. frondibus lanceolato-ovatis integerrimis, ſurculo ſcandente. *Plum. fil. t.* 116.

crinitum. 13. A. frondibus ovatis obtuſis hirſutis ſupra crinitis. *Pet. fil. t.* 13. *f.* 14.

Lingua. 14. A. frondibus oblongis obtuſis petiolatis, ſurculo repente. *Thunb. flor. jap. p.* 330. *t.* 33.

punctatum. 15. A. frondibus cordato-lingulatis acuminatis integerrimis ſupra punctatis.

haſtatum. 16. A. fronde haſtata. *Thunb. flor. jap. p.* 331. *t.* 34.

⊢⊢ *fronde diviſa.*

ſeptentrionale. 17. A. frondibus nudis linearibus laciniatis. *Flor. dan. t.* 60.

auſtrale. 18. A. ſtipitibus nudis glaberrimis apice dichotomo-ramoſis ſubſexradiatis ſubulatis laterifloris. *Suppl. p.* 444. *Vahl ſymb. bot.* 1. *t.* 25.

pectinatum. 19. A. nudum ſimpliciſſimum, ſpica lanata ſecunda adſcendente compreſſa. *Pluckn. alm. t.* 95. *f.* 4.

dichotomum. 20. A. nudum dichotomum, ſpicis ſecundis adſcendentibus reflexis compreſſis. *Pet. gaz. t.* 70. *f.* 12.

digitatum. 21. A. ſtipitibus nudis triquetris, fronde digitata lineari integerrima aequali *Amoen. acad.* 1. *p.* 269. *f.* 1.

ferrugineum. 22. A. frondibus pinnatifidis: laciniis linearibus acutis patentibus integerrimis connatis, ſtipite laevi. *Pluckn. phyt.* 89. *f.* 9.

polypodioides. 23. A. frondibus pinnatifidis: laciniis linearibus obtuſis integerrimis patentibus connatis, ſtipite ſquamoſo *Pluckn. alm. t.* 289. *f.* 1. *nonne potius polypodii ſpecies?*

** *fronde compoſita.*

⊢ *pinnata.*

platyneuron. 24. A. pinnis alternis ovatis crenatis ſeſſilibus ſurſum arcuatis. *Pluckn. alm. t.* 289. *f.* 2.

punctulatum. 25. A. pinnis alternis lanceolatis integerrimis ſupra punctatis glabris: infimis auriculatis; ſummis decurrentibus. *Suppl. p.* 444.

aureum. 26. A. pinnis alternis linguiformibus integerrimis glabris. *Plum. fil. t.* 104.

27. A.

areolatum. 27. A. pinnis alternis linearibus apice ſerratis.

rufum. 28. A. pinnis oblongo-ovatis integerrimis pubeſcentibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 45. *f.* 1.

ſorbifolium. 29. A. pinnis oblongo-ovatis integris ſerratis acutis, ſtipitibus ſquamoſis. *Pet. fil. t.* 9. *f.* 8.

marginatum. 30. A. pinnis oblongis integerrimis undulatis acuminatis ſtipite nudo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 40. *vix propria ſpecies, certe hujus generis.*

ſanctum. 31. A. frondibus lanceolatis: pinnis lineari-lanceolatis inciſo-ſerratis; ſerraturis infimis majoribus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 49. *f.* 2. *an polypodium?*

trifoliatum. 32. A. pinnis ternatis lanceolatis. *Plum. fil. t.* 144.

⊢⊢ *fronde ſubbipinnata.*

filiquoſum. 33. A. pinnis alternis ſurſum pinnulatis linearibus: inferioribus bipartitis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 270. *f.* 3.

thalictroides. 34. A. pinnis alternis utrinque pinnatifidis: ſterilibus latioribus. *Flor. zeyl. p.* 377. *f.* 4. *an idem cum ſiliquoſo?*

ſulphureum. 35. A. pinnis alternis ovatis pinnatifidis: laciniis retuſis ſerratis. *Plum. fil. t.* 44.

Marantae. 36. A. pinnis oppoſito-coadunatis ſubtus hirſutiſſimis baſi ſubdentatis. *Pluckn. alm. t.* 281. *f.* 4.

ilvenſe. 37. A. pinnis oppoſito-coadunatis obtuſis ſubtus hirſutis baſi integerrimis. *Flor. dan. t.* 391.

ebeneum. 38. A. pinnis ſeſſilibus oblongis ſinuatis: ſummis breviſſimis integerrimis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 53. *f.* 1. *an ſola aetate minore ab calomelan. diſtinctum?*

furcatum. 39. A. dichotomum, pinnis pinnatis: pinnulis parallelis lanceolatis approximatis integerrimis. *Plum. fil. t.* 28. *polypodii potius ſpecies.*

⊢⊢⊢ *fronde bipinnata.*

cruciatum. 40. A. pinnis oppoſitis lanceolatis: infimis cruciatim appendiculatis. *Plum. fil. t.* 38.

barbarum. 41. A. pinnis oppoſitis: pinnulis lanceolatis obtuſis ſerratis ſeſſilibus alternis. *Pluckn. alm. t.* 181. *f.* 5.

42. A.

filare. 42. A. pinnis alternis remotis; pinnulis erectis confluentibus linearibus apice filari dentatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 184.

calomelas. 43. A. pinnis alternis lanceolatis acuminatis pinnatifidis. *Plum. fil. t.* 40.

velleum. 44. A. pinnis ovatis cordatis latere incisis subtus hirsutissimis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 457.

⊢⊢⊢⊢ *fronde supradecomposita.*

aculeatum. 45. A. foliolis bifidis, stipitibus aculeatis. *Sloan. hist. jam.* 1. *t.* 61. *an potius Trichomanes?*

1174. PTERIS. *Fructificationes* in lineam digestae subtus cingentem frondis marginem.

* *frondibus simplicissimis*

piloselloides. 1. Pt. frondibus sterilibus obovatis: fertilibus lanceolatis longioribus, furculis repentibus. *Banks ic. Kaempf. t.* 21.

lanceolata. 2. Pt. frondibus lanceolatis subangulatis glabris: apice fructificante. *Plum. fil. t.* 132.

angustifolia. 3. Pt. frondibus lanceolato-linearibus integris erectis margine toto fructificantibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 129.

lineata. 4. Pt. frondibus linearibus integerrimis longitudinaliter fructificantibus. *Plum. fil. t.* 143.

tricuspidata. 5. Pt. frondibus linearibus apice trifidis. *Plum. fil. t.* 140.

furcata. 6. Pt. frondibus dichotomis subtus hispidis apice fructificantibus. *Plum. fil. t.* 141.

** *frondibus compositis.*

⊢ *quaternata.*

quadrifoliata. 7. Pt. fronde subrotunda integerrima, furculis repentibus. *Pluckn. phyt.* 401. *f.* 5. *Linn. mant. p.* 202. Marsilea minuta.

⊢⊢ *frondibus pinnatis.*

grandifolia. 8. Pt. pinnis oppositis ovato-linearibus acuminatis integerrimis. *Plum. fil. t.* 106.

9. Pt.

cretica. 9. Pt. pinnis oppositis lanceolatis ferrulatis basi angustatis: infimis subtripartitis. *Mant. p.* 130. *Tournef. inst.* 1. *herb. t.* 321.

rotundifolia. 10. Pt. frondibus hispidis: pinnis suboppositis subrotundis obsolete crenatis. *Forst. flor. austr. p.* 79.

lunulata. 11. Pt. pinnis alternis petiolatis lunulatis striatis. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 28. *t.* 4.

trichomanoides. 12. Pt. pinnis subovatis obtusis repandis subtus hirsutis. *Plum. fil. t.* 75.

subciliata. 13. Pt. pinnis lanceolatis ferrulato-ciliatis: basi supra latioribus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 185.

nervosa. 14. Pt. pinnis lanceolatis parallelo-nervosis integris: infimis binatis. *Thunb. flor. jap. p.* 332.

stipularis. 15. Pt. pinnis linearibus sessilibus; stipulis lanceolatis. *Plum. fil. t.* 70.

vittata. 16. Pt. pinnis linearibus rectis basi rotundatis. *Osb. it. t.* 4.

longifolia. 17. Pt. pinnis linearibus repandis basi cordatis. *Plum. fil. t.* 69.

⊢⊢⊢ *frondibus semibipinnatis.*

ferrulata. 18. Pt. frondibus linearibus ferrulatis. *Suppl. p.* 445. *Burm. zeyl. t.* 37. *f.* ext.

⊢⊢⊢⊢ *frondibus subbipinnatis.*

argula. 19. Pt. pinnis lanceolatis serratis: foliolis infimis bis bipartitis. *Pluckn. almag. p.* 153. *t.* 290. *f.* 2.

pedata. 20. Pt. frondibus quinquangulis trifoliatis: foliolis pinnatifidis; lateralibus bipartitis. *Plum. fil. t.* 152. *β) Pallas Comm. petrop.* 12. *t.* 12.

sinuata. 21. Pt. frondibus bipinnatifidis: laciniis sinubusque rotundatis. *Thunb. flor. jap. p.* 332.

humilis. 22. Pt. pinnis oblongis incisis subpinnatis: extimis obsolete crenatis confluentibus. *Forst. flor. austr. p.* 79.

comans. 23. Pt. pinnis pinnatifidis: laciniis elongatis lanceolatis apice attenuatis serratis. *Forst. flor. austr. p.* 79.

arborea. 24. Pt. pinnis pinnatifidis, caudice arboreo aculeato.

biaurita. 25. Pt. pinnis pinnatifidis: infima bipartita. *Plum. fil. t.* 15.

denticulata. 26. Pt. pinnis inferioribus semipinnatis lanceolatis sterilibus denticulato-ciliatis: fertilibus integerrimis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 29.

27. Pt.

semipinnata. 27. Pt. pinnis lateralibus loboque infimo semipinnatifidis. *Osb. it. t.* 3. *f.* 1.

mutilata. 28. Pt. pinnis pinnatis: infimis semipinnatifidis; terminalibus baseosque longissimis. *Plum. fil. t.* 51.

atropurpurea. 29. Pt. pinnis lanceolatis: infimis subpinnatis; terminalibus longioribus.

viridis. 30. Pt. pinnis superioribus lanceolatis sessilibus: inferioribus pinnatifidis pinnatisque petiolatis. *Forsk. fl. aeg. ar. p.* 186.

dentata. 31. Pt. pinnis sessilibus remotis decursive pinnatis: pinnulis oppositis linearibus crenato-dentatis. *Forsk. flor. aeg. ar. p.* 186.

farinosa. 32. Pt. pinnis sessilibus oppositis: supremis concatenatis, inferioribus remotis; pinnulis connatis! subtus farinoso-tomentosis. *Forsk. flor. aeg. arvb. p.* 187.

⊢⊢⊢⊢⊢ *frondibus quadripinnatis.*

quadripinnata. 33. Pt. pinnulis basi liberis: infimis bipinnatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 186.

⊢⊢⊢⊢⊢⊢ *frondibus supradecompositis.*

aculeata. 34. Pt. pinnis bipinnatifidis: laciniis lato-lanceolatis, caudice arboreo aculeato. *Plum. fil. t.* 5.

regularis. 35. Pt. pinnis sessilibus: pinnulis connatis patentibus lineari-lanceolatis integris; infimis pinnatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 186.

decursiva. 36. Pt. pinnulis erecto-recurvis decurrentibus: infimis decursive pinnatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 186.

serrata. 37. Pt. pinnulis concatenatis lanceolatis serrulatis: infimis sejunctis pinnatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 187.

aquilina. 38. Pt. pinnis pinnatis: pinnulis lanceolatis; infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. *Blackw. herb. t.* 325.

caudata. 39. Pt. pinnis linearibus: infimis basi pinnato-dentatis; terminalibus longioribus. *Plum. fil. t.* 29. β) *Jacq. coll.* 2. *p.* 273. *pl. rar. ic. cent.* 2. *fasc.* 1. *t.* 25.

esculenta. 40. Pt. frondibus sulcatis; foliolis pinnatis; pinnis linearibus decurrentibus, summis brevioribus. *Forst. fl. austr. p.* 79.

heterophylla. 41. Pt. pinnis ovato-oblongis serratis obtusis, frondibus fertilibus integerrimis. *Sloan. jam.* 1. *t.* 53. *f.* 2.

1175. BLECHNUM. *Fructificationes* in lineis 2 costae frondis approximatis parallelis.

occidentale. 1. Bl. frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis oppositis basi emarginatis. *Pet. fil. t.* 3. *f.* 9.

australe. 2. Bl. frondibus pinnatis: pinnis subsessilibus cordato-lanceolatis integerrimis; infimis oppositis. *Mant. p.* 130.

orientale. 3. Bl. frondibus pinnatis: pinnis linearibus alternis.

virginicum. 4. Bl. frondibus pinnatis: pinnis multifidis. *Mant. p.* 307.

japonicum. 5. Bl. fronde bipinnatifida: lacinulis ovatis obtusis serratis. *Suppl. p.* 445. *Thunb. flor. jap. p.* 333. *t.* 35.

radicans. 6. Bl. frondibus bipinnatis: pinnatis lanceolatis crenulatis; lineolis fructificantibus interruptis. *Mant. p.* 307. *Pluckn. alm. t.* 179. *f.* 2. *β)* Blechnum carolinianum. *Walt. flor. carol. p.* 257.

1176. HEMIONITIS. *Fructificationes* in lineis ramosis vel decussatis.

lineata. 1. H. frondibus lanceolato-linearibus, fructificationibus subparallelis longitudinalibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 129.

reticulata. 2. H. frondibus lanceolato-falcatis integerrimis: venis reticulatis. *Forst. flor. austr. p.* 79.

lanceolata. 3. H. frondibus lanceolatis integerrimis. *Plum. fil.* 127. *f.* 6.

parasitica. 4. H. frondibus ovatis acuminatis, furculis paleaceis repentibus.

palmata. 5. H. frondibus palmatis hirsutis. *Plum. fil t* 151.

japonica. 6. H. frondibus bipinnatis: pinnulis lanceolatis integris. *Thunb. flor. jap. p.* 333.

1177. LONCHITIS. *Fructificationes* in lineolis sub frondis sinubus.

hirsuta. 1. L. frondibus pinnatifidis obtusis integerrimis, furculis ramosis hirsutis. *Plum. fil. t.* 20.

pedata. 2. L. frondibus pedatis: foliolis pinnatifidis serrulatis. *Brown. jam. t.* 1. *f.* 1. 2.

3. L.

repens. 3. L. frondibus pinnatis: pinnis alternis ſinuatis; ſurculis ramoſis aculeatis. *Plum. fil. t.* 12.

aurita. 4. L. frondibus pinnatis: pinnis infimis bipartitis, ſurculis indiviſis aculeatis. *Plum. fil. t.* 17.

bipinnata. 5. L. fronde bipinnata: pinnis alternis: pinnulis linearibus confluentibus interioribus emarginatis. *Forsk. fl. aeg. ar. p.* 184.

tenuifolia. 6. L. arboreſcens, frondibus ſupradecompoſitis: foliolis pinnatis; pinnis lineari-oblongis ſerratis, infimis pinnatifidis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

1178. ASPLENIUM. *Fructificationes* in lineas rectas ſubparallelas in pagina inferiori frondis congeſtae.

* *fronde ſimplici.*

† *indiviſa.*

rhizophyllum. 1. A. frondibus cordato-enſiformibus: apice filiformi radicante. *Pluckn. alm. t.* 105. *f.* 3.

Scolopendrium. 2. A. frondibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. *Jungh. pl. off. ic. cent.* 1. *t.* 5.

anguſtifolium. 3. A. frondibus lineari-lanceolatis acutiuſculis integerrimis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 121.

Nidus. 4. A. frondibus lanceolatis integerrimis glabris. *Breyn. cent. t.* 99.

ſerratum. 5. A. frondibus lanceolatis ſerratis ſubſeſſilibus. *Plum. fil. t.* 124.

proliferum. 6. A. frondibus lato-lanceolatis ſubſeſſilibus: primoribus obovatis apice radicantibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 71. *t.* 26. *f.* 1.

plantagineum. 7. A. frondibus ovato-lanceolatis ſubcrenatis, ſtipite tetragono.

lanceum. 8. A. fronde elliptico-glabra, ſtipite tereti ſquamoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 333.

†† *fronde diviſa.*

Hemionitis. 9. A. frondibus cordato-haſtatis quinquelobis integerrimis, ſtipitibus laevibus.

Ceterach. 10. A. frondibus pinnatifidis: laciniis alternis confluentibus obtuſis. *Blackw. herb. t.* 216.

praemor- 11. A. frondibus tripinnatifidis: laciniis subcuneiformibus; la-
sum. cinulis apice erolo dentatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 130.

** *fronde composita.*

⊢ *ternata.*

pumilum. 12. A. foliolis tripartito-incisis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 129.

⊢⊢ *fronde pinnata.*

obtusifo- 13. A. frondibus subpinnatis: pinnis obtusis sinuatis decurren-
lium. tibus alternis. *Pet. fil. t.* 2. *f.* 4.

bifolium. 14. A. pinnis lanceolatis subsinuatis connatis. *Plum. fil. t.* 133.

nodosum. 15. A. pinnis lanceolatis integerrimis oppositis. *Plum. fil. t.* 108.

grandifo- 16. A. pinnis lanceolatis subserratis alternis basi superne rectan-
lium. gulis inferne rotundatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 130.

dissectum. 17. A. pinnis lanceolatis inciso-serratis apice caudatis. *Plum. fil.* 46.

ebeneum. 50. A. pinnis lanceolatis subfalcatis serratis basi auriculatis, stipite laevissimo simplici. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 462.

salicifo- 18. A. pinnis falcato-lanceolatis crenatis basi sursum angulatis.
lium. *Plum. fil. t.* 60.

cultrifo- 19. A. pinnis falcato-lanceolatis inciso-serratis basi deorsum
lium. angulatis. *Plum. fil. t.* 59.

marginа- 20. A. pinnis cordato-lanceolatis oppositis submarginatis inte-
tum. gerrimis. *Pet. fil. t.* 12. *f.* 2.

dentatum. 21. A. pinnis cuneiformibus obtusis crenato-emarginatis. *Plum. fil. t.* 101.

alternifo- 22. A. pinnis cuneiformibus alternis superne incisis. *Wulfen*
lium. *apud Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 51. *t.* 5. *f.* 2. *an distinctum a germanico?*

monan- 23. A. pinnis trapeziis obtusis superne crenatis: linea fructifi-
themum. cationis unica. *Mant. p.* 130.

viride. 24. A. frondibus lanceolatis: pinnis trapezoideis crenatis. *Hudson flor. angl.* 453. *Boldon filic. Brit.* 1. *p.* 24. *t.* 14.

polyodon. 25. A. pinnis trapezoidibus acuminatis acutis duplicato-serra-
tis. *Forst. flor. austr. p.* 80.

erosum. 26. A. pinnis trapezio-oblongis striatis erosis basi erectis. *Slon. hist. jam.* 1. *t.* 33. *f.* 2.

27. A.

dimidiatum. 27. A. pinnis trapezio-oblongis acuminatis ſurſum angulatis deorſum integris planis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 129.

tenerum. 28. A. pinnis rhombeo-oblongis obtuſis inciſo-ſerratis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

obtuſatum. 29. A. pinnis oblongis obtuſis ſerratis oppoſitis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

obliquum. 30. A. pinnis oblongis oppoſitis acuminatis ſerratis: margine exteriore breviore, ſtipite ſquamuloſo. *Forſt. fl. auſtr. p.* 80.

lanceolatum. 31. A. frondibus lanceolatis: pinnis oblongis acutis inciſis alternis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 185.

ſquamoſum. 32. A. pinnis acuminatis inciſis, ſtipite ſquamoſo. *Pet. fil. t.* 5. *f.* 2.

lucidum. 33. A. pinnis oblongo-ovatis acuminatis ſerratis oppoſitis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

rhizophorum. 34. A. frondibus apice radicantibus: pinnis ovatis repando-ſubauritis; minimis remotis integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 253. *f.* 4.

marinum. 35. A. pinnis obovatis ſerratis ſuperne gibbis obtuſis baſi cuneatis. *Bolton fil. Brit.* 1. *t.* 15.

pygmeum. 36. A. pinnis ſubrotundis quinis ternisve. *Vix diſtincta ſpecies.*

trichomanoides. 37. A. pinnis ſubrotundis crenatis. *Flor. dan. t.* 119.

anthriſcifolium. 38. A. pinnis obtuſe lobato-ſerratis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 103. *t.* 2. *f.* 3. 4.

ſorbifolium. 39. A. pinnis longe lanceolatis acuminatis crenatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 106. *t.* 3. *f.* 2.

⊢⊢⊢ *fronde ſubbipinnata.*

japonicum. 40. A. pinnis acutis inciſo-pinnatifidis ſerrulatis ſtipite ſquamoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 334.

ſtriatum. 41. A. pinnis pinnatifidis obtuſis crenatis: terminali acuminata. *Pet. fil. t.* 3. *f.* 3. 4.

flaccidum. 42. A. pinnis alternis remotis pinnatifidis: laciniis linearibus ſtriatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

caudatum. 43. A. pinnis pinnatifidis linearibus apice ſetaceis: laciniis obtuſis apice inciſo-ſerratis, ſtipite hirto. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

bulbiferum. 44. A. pinnis pinnatifidis decurrentibus oblongis obtusis, fructificationibus proliferis. *Forst. flor. austr. p.* 80.

germanicum. 45. A. pinnis imis trifoliatis: superioribus simplicibus dentatis. *Hall. hist. stirp. helv.* 3. *p.* 8. *Breyn. cent. p.* 189. *f.* 97.

Trichomanes ramosum. 46. A. pinnis pinnatis: inferioribus minoribus; pinnulis obovatis crenatis.

fragrans. 47. A. pinnis pinnatis alternis: pinnulis lanceolatis latiusculis apice serratis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 130.

leptophyllum. 51. A. frondibus bipinnatis tripinnatifidisque pinnis remotis, lobis cuneiformibus incisis, fructificationibus solitariis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 694. *n.* 53. Polypodium leptophyllum. *Magnol. hort. monsp. t.* 5.

⊢⊢⊢⊢ *frondibus alternatim decompositis.*

Ruta muraria. 48. A. foliolis cuneiformibus crenulatis. *Flor. dan.. t.* 190.

⊢⊢⊢⊢⊢ *fronde subtripinnata.*

Adiantum nigrum. 49. A. pinnis alternis: pinnulis lanceolatis inciso-serratis. *Flor. dan. t.* 250.

cicutarium. 50. A. fronde glaberrima: pinnulis superioribus pinnatifidis; laciniis lanceolatis integris. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 92. *t.* 52. *f.* 3.

1179. POLYPODIUM. *Fructificationes* per inferiorem frondis partem in globulos dispositae.

* *fronde simplici.*

⊢ *indivisa.*

minimum. 1. P. scandens, foliis subrotundis crassis acutis. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 74. *t.* 28. *f.* 3.

rigidum. 2. P. frondibus integerrimis glabris acutis. *Plum. fil. t.* 135.

gramineum. 3. P. frondibus acuminatis integerrimis glabris, fructificationibus solitariis, surculo nudo. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 130.

lanceolatum. 4. P. frondibus lanceolatis integerrimis glabris, fructificationibus solitariis, surculis nudis. *Pet. fil. t.* 6. *f.* 2.

lycopodioides. 5. P. frondibus lanceolatis integerrimis glabris, fructificationibus solitariis, surculo squamoso repente. *Plum. fil. t.* 119.

6. P.

comoſum. 6. P. frondibus lanceolatis glabris integerrimis apice multifidis, fructificationibus ſparſis. *Plum. fil. t.* 131.

craſſifolium. 7. P frondibus lanceolatis glabris integerrimis, fructificationibus ſerialibus *Pet. fil.* 1. *t.* 8.

phylliti dis. 8 P. frondibus lanceolatis glabris integerrimis, fructificationibus ſparſis. *Pet. pter. t.* 6. *f.* 10.

repens. 9. P. frondibus lanceolatis acuminatis glabris, fructificationibus ſparſis, ſurculo repente. *Plum. fil. t.* 134.

trifurcatum. 10. P. frondibus lanceolatis glabris repando-ſinuatis apice trilobis. *Plum. fil. t.* 138.

plantagineum. 11. P. frondibus lanceolato-oblongis glabris integerrimis, fructificationibus ſerialibus. *Jacq. coll.* 2. *p.* 104. *t.* 3. *f.* 1.

heterophyllum. 12. P frondibus crenatis glabris: ſterilibus ſubrotundis ſeſſilibus; fertilibus lanceolatis, fructificationibus ſolitariis. *Plum fil. t.* 120.

piloſelloides. 13. P. frondibus integerrimis hirtis: ſterilibus ovatis; fertilibus lanceolatis, fructificationibus ſolitariis. *Plum. fil. t.* 118.

lineare. 14. P. frondibus lineari-lanceolatis glabris, fructificationibus ſolitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 335.

anguſtifolium. 15. P. frondibus lineari-lanceolatis longiſſimis acuminatis rigidis: margine convexo, fructificationibus ſparſis, ſurculo repente. *Swarts nov. pl. geu. et ſp. p.* 130.

ſerpens. 16. P. frondibus lanceolato-linearibus ſubundulatis glabris, fructificationibus ſolitariis, ſurculo hirſuto radicante. *Plum. fil. t.* 124.

marginellum. 17. P. frondibus cuneiformi-linearibus obtuſis marginatis glabris, fructificationibus ſolitariis confertis, ſurculo breviſſimo nudo. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 130.

acroſtichoides. 18. P. frondibus linearibus glabris, fructificationibus confertis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

ſtoloniferum. 19. P. frondibus linearibus obtuſis pubeſcentibus, fructificationibus ſerialibus, ſtolonibus repentibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

ſurinamenſe. 143. P. fronde lineari remote ſerrulata glabra: fructificationibus ſolitariis. *Jacq. collect.* 3. *p.* 285. *t.* 21. *f.* 4.

⊢⊢ *fronde divisa.*

† *lobata.*

Pica. 20. P. fronde cordata triloba: lobis lanceolatis subulatis basi auriculatis; intermedio elongato. *Suppl. p.* 446.

phymatodus. 21. P. frondibus trifidis quinquelobisve lanceolatis supra fructificationes verrucosis. *Mant. p.* 306. *Burm. zeyl. t.* 86.

hastatum. 22. P. fronde trifido-hastata. *Thunb. flor. jap. p.* 335.

†† *frondibus pinnatifidis: laciniis saepe coadunatis.*

scandens. 23. P. frondibus laevibus: laciniis linearibus obtusis undulatis distantibus, stolonibus radicantibus scandentibus. *Forst. flor. austr. p.* 81.

pustulatum. 24. P. frondibus laevibus: laciniis oblongis integris acuminatis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

aureum. 25. P. frondibus laevibus: laciniis oblongis distantibus infimis patulis: terminali maxima, fructificationibus serialibus. *Plum. fil. t.* 76.

ellipticum. 26. P. frondibus laevibus: laciniis ellipticis integris, furculo repente. *Thunb. flor. jap. p.* 335.

loriceum. 27. P. frondibus laevibus: laciniis lanceolatis distantibus horizontalibus repandis. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 10. 12.

alatum. 28. P. frondibus laevibus: laciniis oblongis distantibus dentatis. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 13.

squamatum. 29. P. frondibus scabris: laciniis lanceolatis distantibus horizontalibus integerrimis. *Plum. fil. t.* 79.

asplenifolium. 30. P. frondibus pilosis: laciniis semiovatis acutis. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 16. *β*) *Plum. fil. t.* 88.

trichomanoides. 31. P. frondibus subpilosis: laciniis semiovatis obtusis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 131.

suspensum. 32. P. frondibus glabris: laciniis semiovatis acutis. *Plum. fil. t.* 87.

crispatum. 33. P. frondibus glabris: laciniis semiorbiculatis crenatis. *Pet. fil. t.* 13. *f.* 12.

myosuroides. 34. P. frondibus glabris: laciniis in apice lanceolatis coadunatis, fructificationibus inferioribus remotis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 131.

pendulum. 35. P. frondibus subsessilibus glabris pendulis: laciniis oblongis obtusiusculis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 131.

36. P.

incisum. 36. P. frondibus lanceolatis: laciniis rotundatis; infimis minoribus coadunatis. *Plum. fil. t.* 91.

scolopendroides. 37. P. frondibus lanceolatis: laciniis obtusiusculis; infimis remotis. *Pet. fil.* 2. *t.* 1.

pectinatum. 38. P. frondibus lanceolatis: laciniis approximatis ensiformibus parallelis acutis horizontalibus, radice nuda. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 14.

taxifolium. 39. P. laciniis approximatis ensiformibus parallelis acutis adscendentibus, radice hirta. *Plum. fil. t.* 89.

struthionis. 40. P. laciniis approximatis ensiformibus repandis horizontalibus. *Plum. fil. t.* 82.

Otiter. 41. P. laciniis lanceolatis obtusis alternis distantibus. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 16.

virginianum. 42. P. laciniis oblongis subserratis obtusis, radice laevi. *Plum. fil. t.* 77.

vulgare. 43. P. laciniis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. *Zorn pl. off. ic.* 1. *t.* 46.

quercifolium. 44. P. frondibus sterilibus sessilibus brevioribus obtusis sinuatis: fertilibus alterno-pinnatis lanceolatis. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 11.

††† *frondibus bipinnatifidis.*

cambricum. 45. P. laciniis lanceolatis lacero-pinnatifidis serratis. *Pluckn. alm. t.* 30. *f.* 1.

obliteratum. 46. P. lacinulis alternis lato-lanceolatis attenuatis crenatis: crenis apice et basi utrinque obliteratis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 132.

Serra. 47. P. laciniis linearibus longissimis attenuatis serratis: serraturis semiovatis acutis striatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 132.

tetragonum. 48. P. laciniis lanceolatis acuminatis oppositis distantibus horizontalibus: lacinulis ovatis obtusiusculis, stipite tetragono. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 132.

deltoideum. 49. P. laciniis inferioribus abbreviatis integris oblongis deltoideis reflexis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 133.

invisum. 50. P. fronde glabra: laciniis lineari-lanceolatis acuminatis longissimis; lacinulis ovato-falcatis acutis integris, infimis aequalibus. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 90. *t.* 51.

patens. 51. P. fronde ſubtus villoſiuſcula: laciniis lineari-lanceolatis elongatis; lacinulis oblongis acutis integris, infimis longioribus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 91. *t.* 52. *f.* 1.

†††† *fronde tripinnatifida.*

hirtum. 52. P. fronde inferne tripinnatifida, ſuperne bipinnatifida et tandem pinnatifida: laciniis ovatis obtuſis ſubintegris, ſtipite ramisque hirtis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 133.

punctatum. 53. P. lacinulis lanceolatis obtuſis pinnatifidis, ſtipite villoſo. *Thunb. flor. jap p.* 337.

coriaceum. 54. P. fronde coriacea inferne tripinnatifida, ſuperne bipinnata: pinnis pinnulisque acuminatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 133.

††††† *fronde quadripinnatifida.*

diſſectum. 55. P. fronde glabriuſcula: lacinulis ovatis obtuſis inciſo-ferratis, fructificationibus in ſinu ſolitariis, ramis ramulisque pubeſcentibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 96. *t.* 37. *f.* 1. 2.

aemulum. 149. P. fronde glabra: pinnis oblongo-linearibus inciſis; pinnulis apice denticulatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 466.

†††††† *fronde quinquepinnatifida.*

effuſum. 56. P. fronde ſubglabra membranacea: lacinulis acutis argute ſerratis, rachi ramulisque marginatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 57. *f.* 3.

** *fronde compoſita.*

⊢ *ternata.*

trifoliatum. 57. P. frondibus ſinuato-lobatis: foliolo intermedio majore. *Plum. fil. t.* 148.

cicutarium. 58. P. foliolis bipinnatis baſi laciniatis obtuſe inciſo-ſerratis acuminatis: infimis gibboſioribus.

triphyllum. 144. P. frondibus pinnatis: pinnis tribus alternis linearibus. *Jacq. coll.* 3. *p.* 284. *t.* 22. *f.* 1.

⊢⊢ *frondibus pinnatis.*

dentatum. 59. P. fronde dentata ſuperne pinnatifida: pinnis crenatis: infimis deflexis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 185.

fontanum. 60. P. frondibus lanceolatis: pinnis ſubrotundis argute inciſis, ſtipite laevi. *Bolton fil. Brit.* 1. *t.* 21.

61. P.

Lonchitis. 61. P. pinnis lunulatis ciliato-ferratis declinatis, ſtipitibus ſtrigoſis. *Flor. dan. t.* 497.

rhizophyllum. 62. P. frondibus decumbentibus apice caudatis: fertilibus radicantibus; pinnis ovato-deltoideis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 132.

reptans. 63. P. frondibus repentibus apice radicantibus: pinnis ſubcordatis ovatis obtuſis crenatis baſi ſubauriculatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 30. *f.* 1.

cordifolium. 64. P. pinnis cordatis obtuſis integerrimis repandis. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 11.

falcatum. 65. P. pinnis cordatis falcatis acuminatis integris, fructificationibus approximatis ſparſis. *Suppl. p.* 446. *Thunb. flor. jap. p.* 336. *t.* 35.

echinatum. 66. P. pinnis falcato-lanceolatis ſubſerratis ſurſum auritis baſi et anterius ſpinoſis, ſtipite ſquamoſo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 82. *t.* 36. *f.* 4. 5.

auriculatum. 67. P. pinnis falcato-lanceolatis ſerratis baſi truncatis ſurſum auritis. *Burm. zeyl. t.* 44. *f.* 2.

crenatum. 68. P. pinnis oblongo-lanceolatis crenatis glabris, fructificationibus biſeriatis. *Plum. fil. t.* 3.

ſimile. 69. P. pinnis lanceolatis integerrimis diſtantibus: ſupremis minoribus, punctis ſerialibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 32.

diſſimile. 70. P. pinnis lanceolatis ſubpubeſcentibus confluentibus: inferioribus diſtinctis, punctis ſparſis. *Pluckn. almag. t.* 288. *f.* 1.

ſemicordatum. 71. P. pinnis lanceolatis parallelis glaberrimis baſi oblique cordatis: lobo inferiore gibboſiore, fructificationibus quadriſeriatis. *Plum. fil. t.* 113.

ſagittatum. 72. P. pinnis lanceolatis obtuſis integris baſi utrinque denticulo acutis: inferioribus mutilatis triangularibus minutis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 132.

triangulare. 73. P. pinnis triangularibus dentatis. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 10.

exaltatum. 74. P. pinnis enſiformibus integris: baſi inferiore introrſum, ſuperiore ſurſum gibbis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 31.

unitum. 75. P. pinnis enſiformibus ſerratis: ſerraturis ſemiovatis ovato-nervoſis. *Burm. zeyl. t.* 44. *f.* 1.

marginale. 76. P. pinnis ſuperioribus coalitis: inferioribus enſiformibus ſurſum auriculatis inciſis ſtipite villoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

77. P.

evectum. 77. P. pinnis oppositis oblongis apice lineari acuminatis serratis, fructificationum serie submarginali continua. *Forst. flor. austr. p.* 81.

hirsutulum. 78. P. pinnis oblongis obtuse serratis basi sursum auriculatis, stipite villoso. *Forst. flor. austr. p.* 81.

reticulatum. 79. P. pinnis oblongis integerrimis: anastomosibus rectangulis, punctis rectangulis approximatis. *Forst. flor. austr. p.* 81. *Plum. fil. t.* 92.

tenellum. 80. P. pinnis alternis remotis linearibus acuminatis undulatis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

molliss-imum. 147. P. pinnis pinnatifidis linearibus acuminatis utrinque villosis. *Jacq. collect.* 3. *p.* 188.

gujanense. 81. P. pinnis latis crenatis suboppositis. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 86. *t.* 43 *f.* 1. 2.

adiantoides. 82. P. pinnis auriculatis. *Plum. fil. f.* 7. *an distincta species?*

serratum. 83. P. pinnis alternis serratis. *Sloan. hist jam.* 1. *p.* 78. *t.* 33. *f.* 1.

Hippocrepis 145. P. pinnis oblongis acuminatis obtuse incisis supra pilosis subtus glabris. *Jacq. coll.* 3. *p.* 186.

fraxinifolium. 146. P. pinnis lanceolatis acuminatis undulatis transversim lineatis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 187.

⊢⊢⊢ *frondibus subbipinnatis.*

Phegopteris. 84. P. pinnis oppositis: superioribus pinnula trapezoide conjunctis infimo pari deflexo, pinnulis obtusis, glomerulis capsularum dimidiam marginis partem occupantibus. *Bolton fil. Brit.* 1. *t.* 20.

montanum. 85. P. pinnis alternis: pinnulis integerrimis lanceolatis obtusiusculis, glomerulis marginalibus. *Willden. prodr. fl. berol. n.* 883.

retroflexum. 86. P. pinnis infimis reflexis: pinnulis laceris. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 9.

fragrans. 87. P. frondibus lanceolatis: pinnis confertis; laciniis obtusis serratis, stipite paleaceo.

parasiticum. 88. P. frondibus lanceolatis: pinnis ad medium pinnatifidis; laciniis rotundatis integerrimis striatis. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 17.

molle. 89. P. pinnulis lanceolatis obtusiusculis apice crenulatis. *Schreb. spic. fl. lipf. p.* 70.

90. P.

Callipteris. 90. P. pinnis ovato-oblongis profunde pinnatifidis: laciniis ovatis duplicato-ferratis; ferraturis mucronulatis. *Ehrh. Hannöv. Mag.* 1784. 9. *an vere distinctum a cristato?*

cristatum. 91. P. pinnulis oblongis obtusis ferratis: ferraturis ciliatis, glomerulis capsularum duplici serie dispositis. *Ad Afzelius n. act. Stockh.* 1787. *t.* 9. *f.* 1. 2. *Bolton fil. Brid.* 1. *t.* 23.

Thelypteris. 92. P. pinnis pinnatifidis integerrimis subtus undique glomerulis capsularum tectis. *Mant. p.* 505. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 687. Acrostichum Thelypteris. *Flor. dan. t.* 760.

nymphale. 93. P. frondibus pubescentibus: pinnis linearibus acuminatissimis ferratis basi pinnatifidis; laciniis oblongis obtusis vix antrorsum falcatis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

laciniatum. 94. P. pinnis pinnatifidis: laciniis oblongis obtuse ferratis; inferioribus longioribus vix coalitis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

exosum. 95. P. frondibus glabris: pinnis linearibus acuminatissimis serrato-pinnatis; pinnulis lanceolatis falcato-acutis basi connatis. *Forst. flor. austr. p.* 81.

pennigerum. 96. P. frondibus glabris: pinnis linearibus acuminatissimis subpinnatis; pinnulis ovato-oblongis obtusis connatis. *Forst. flor. austr. p.* 82.

vestitum. 97. P. pinnis rhombeo-ovatis acutis inciso-ferratis: infimis lobatis subpinnatis, stipite squamis scariosis vestito. *Forst. flor. austr. p.* 82.

setosum. 98. P. pinnis subpinnatis: pinnulis linearibus inciso-ferratis: ferraturis setaceis, stipite villoso. *Forst. flor. austr. p.* 82.

adiantiforme. 99. P. pinnis ovatis profunde incisis: laciniis ovatis obtusis crenato ferratis; infimis discretis, stipite squamuloso aspero. *Forst. flor. austr. p.* 82.

latifolium. 100. P. pinnis ovatis acuminatis pinnatifidis lobatisque: lobis repandis crenatis, stipite glaberrimo nitido. *Forst. flor. austr. p.* 83.

varium. 101. P. frondibus lateralibus bipinnatis: pinna infima pinnatifida.

⊢⊢⊢⊢ *frondibus bipinnatis.*

aristatum. 102. P. pinnis inferioribus pinnatis: pinnulis rhombeo-oblongis incisis; laciniis mucronato-serratis, stipite villosiusculo. *Forst. flor. austr. p.* 82.

103. P.

fragile. 103. P. pinnis remotis: pinnulis ſubrotundis inciſis. *Flor. dan. t.* 401.

villoſum. 104. P. frondibus hirſutis: pinnulis obtuſis oblongis; terminalibus acuminatis. *Plum. fil. t.* 27.

decuſſatum. 105. P. pinnulis obtuſis horizontalibus integerrimis: terminalibus lanceolatis. *Pet. fil. t.* 2. *f.* 5. 6.

Filix mas. 106. P. pinnulis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Blackw. herb. t.* 323.

Filix femina. 107. P. pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Blackw. herb. t.* 325.

Barometis. 108. P. pinnulis lanceolatis pinnatifidis ſerratis, radicibus lanatis.

rhaeticum. 109. P. pinnis pinnulisque lanceolatis remotis: ſerraturis acuminatis.

ſetigerum. 110. P. pinnulis lanceolatis inciſis integris, ſtipite ſetoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

orientale. 111. P. pinnulis lanceolatis connexis integris patentibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 185.

pubeſcens. 112. P. frondibus piloſis: pinnulis lanceolato-ovatis ſubinciſis acutis; extimis confluentibus.

muricatum. 113. P. pinnulis ovatis denticulato-ſpinoſis. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 6.

ſetiferum. 114. P. pinnulis reniformibus; dentibus ſetiferis, ſtipite lanato. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 185.

nudum. 115. P. pinnulis rhombeis inciſo-crenatis, ſtipite ſcabro nudo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

aculeatum. 116. P. pinnulis lunulatis ciliato-dentatis, ſtipite ſtrigoſo. *Mill. illuſtr. ic. Bolton. fil. Brit.* 1. *t.* 26.

novebora-cenſe. 117. P. pinnulis oblongis integerrimis parallelis, ſtipite laevi.

bulbiferum. 118. P. pinnis remotis: pinnulis oblongis obtuſis ſerratis ſubtus bulbiferis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 10.

medullae. 119. P. pinnis acuminatiſſimis: pinnulis oblongis ſubfalcatis acutis crenatis, ſtipite aſpero, caudice arboreo hiſpido. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

extenſum. 120. P. pinnis acuminatis apice ſerratis: pinnulis oblongis ſerratis, ſtipite punctis aſpero, caudice arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

121. P.

arboreum. 121. P. frondibus ferratis, caudice arboreo inermi. *Plum. fil. t.* 1.

ſpinoſum. 122. P. frondibus ferratis, caudice arboreo aculeato. *Plum. fil. t.* 3. *nonne potius pteridis ſpecies?*

dealbatum. 123. P. pinnis acuminatis ſubtus albis: pinnulis oblongis ſubfalcatis ſerratis, ſtipite aſpero, caudice arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

lacerum. 124. P. pinnulis ſeſſilibus: extimis confluentibus falcatis ſerratis, ſtipite ſquamoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

lunulatum. 125. P. pinnis apice ſerratis ſetaceis: pinnulis lineari-oblongis falcatis apice ſerrulatis, ſtipite aſpero. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

elongatum. 150. P. pinnis glabris obtuſis argute ſerratis, ſuperioribus ovatis; mediis oblongis; inferioribus lanceolatis pinnatifidis acutiuſculis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 465.

affine. 126. P. pinnis acuminatis: pinnulis lineari-oblongis crenatis, ſtipite glabro. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

dichotomum. 127. P. frondibus dichotomis: pinnulis linearibus integris parallelis. *Thunb. flor. jap. p.* 338. *t.* 37.

glaucum. 128. P. fronde bipartita ſubtus glauca: pinnulis inciſis integris. *Thunb. flor. jap. p.* 338.

regium. 129. P. pinnis ſuboppoſitis: pinnulis alternis laciniatis. *Vaill. flor. pariſ. t.* 9 *f.* 1.

marginatum. 130. P. pinnulis baſi ſinuato-repandis, fructificationibus marginalibus.

⊢⊢⊢⊢⊢ *fronde ſupradecompoſita.*

ſpeluncae. 131. P. frondibus piloſis: foliolis lanceolatis pinnatis: pinnis oppoſitis pinnatifidis. *Pluckn. alm. t.* 244. *f.* 2.

crenulatum. 132. P. foliolis alternis bipinnatis: pinnulis pinnatifidis crenatis ciliatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 185.

Dryopteris. 133. P. foliolis ternis bipinnatis. *Flor. dan. t.* 759.

capenſe. 134. P. foliolis bipinnatis: pinnulis baſi unifloris *Suppl. p.* 445.

pyramidale. 135. P. pinnulis terminalibus lanceolatis longiſſimis ſerratis, ſtipite inferne aculeato. *Pet. fil. t.* 4. *f.* 2.

alpinum. 136. P. frondibus alterne tripinnatis: pinnulis oblongis vage inciſis; lacinulis obtuſis ſubbifidis. *Wulf. uſſ. Jacq. coll.* 2. *p.* 171. *Seg. pl. ver. ſuppl. t.* 1. *f.* 3.

148. P.

multifidum. 148. P. fronde tripinnata glabra triangulari: pinnulis oblongis pinnatifide inciſis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 187.

axillare. 151. P. fronde tripinnata glabra: pinnis oblongis apice ſerratis adnatis paucifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 466.

umbroſum. 152. P. fronde tripinnata glabra: pinnis lanceolato-linearibus ſerratis adnatis multifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 466.

horridum. 137. P. pinnulis ſemiſagittatis baſi connexis apice ſerratis, caudice aculeato. *Pet. fil. t.* 5. *f.* 1.

aſperum. 138. P. pinnulis obtuſis apice ſerratis: terminalibus acuminatis, caudice arboreo aculeato. *Pet. fil. t.* 4. *f.* 7.

montium. 139. P. fronde triangulari: pinnulis pinnatifidis: ſegmentis ultimis oblongis obtuſis bifidis trifidisque. *Pluckn. alm. t.* 89. *f.* 4.

⊢⊢⊢⊢⊢⊢ *frondibus quadripinnatis.*

denticulatum. 140. P. fronde glabra inferne quadripinnata ſuperne tripinnata: pinnulis cuneato-ovatis inciſis denticulatis, fructificationibus ſolitariis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 134.

quadripinnatum. 141. P. pinnulis lanceolatis pinnatifidis: laciniis ovatis acutis ſubtus glaucis, ramis ramulisque aſperis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 134.

armatum. 142. P. pinnulis lanceolatis crenulatis ſupra glabris ſubtus hirſutis, fructificationibus confertis, ramis ramulisque aſperis, caudice arboreo aculeato. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 134.

DICKSONIA. *Fructificationes* ſubrotundae, margine averſo frondis ſubjectae.

arboreſcens. 1. D. frondibus ſupradecompoſitis villoſis: foliolis ſubintegris. *Herit. ſert. angl. p.* 31. *t.* 43.

Culcita. 2. D. frondibus ſupradecompoſitis glabris: foliolis ſerratis. *Herit. ſert. angl. p.* 31. *an eadem cum Polypodio Barometis?*

1180. ADIANTUM. *Fructificationes* in maculis ovalibus terminalibus ſub replicato frondis margine.

* *fronde ſimplici.*

reniforme. 1. A. frondibus reniformibus ſtipitatis multifloris. *Pluckn. alm. t.* 287. *f.* 5.

2. A.

sagittatum. 2. A. frondibus sagittatis stipitatis. *Aubl. pl. jug.* 2. *p.* 964. *t.* 366.

philippense. 3. A. frondibus reniformibus alternis petiolatis lobatis multifloris. *Pet. gaz. t.* 4. *f.* 4.

repens. 4. A. frondibus trapeziformibus cordatis pinnatifidis: laciniis lanceolatis apice serratis floriferis infimis incisis. *Suppl. p.* 446.

decurrens. 5. A. fronde bipinnatifida. *Jacq. coll.* 2. *p.* 103. *t.* 2. *f.* 1. 2.

** *fronde composita.*

trilobum. 6. A. pinnis tripartitis obtusis incisis multifloris. *Pet. fil. t.* 11. *f.* 9.

radiatum. 7. A. fronde digitata: foliolis pinnatis; pinnis unifloris. *Plum. fil. t.* 100.

pedatum. 8. A. frondibus pedatis: foliolis pinnatis; pinnis anterius gibbis incisis fructificantibus. *Plucken. alm. t.* 124. *f.* 2.

fuscum. 9. A. frondibus pedatis: foliolis pinnatis; pinnis rhombeo-rotundatis subquadrifloris. *Retz. obs. bot.* 2. *p.* 28. *t.* 5.

caudatum. 10. A. frondibus pinnatis falcatis apice caudatis. *Mant. p.* 308. *Burm. zeyl. t.* 5. *f.* 1.

ferrulatum. 11. A. frondibus bipinnatis: pinnulis deltoideo-oblongis serratis, fructificationibus solitariis superioribus. *Pluckn. phyt. t.* 253. *f.* 1.

hastatum. 12. A. frondibus pinnatis: pinnis hastato-trilobis rectis. *Suppl. p.* 447.

Lancea. 13. A. frondibus pinnatis: pinnis oppositis oblongis: terminalibus triangulari-hastatis. *Seb. mus.* 2. *t.* 64. *f.* 7. 8.

macrophyllum. 14. A. frondibus pinnatis: pinnis oppositis rhomboideis acutis: ima majora; infima subhastata reflexa, fructificationibus anterius et inferius reflexis. *Brown. jam. p.* 87. *t.* 38. *f.* 1.

deltoideum. 15. A. frondibus pinnatis: pinnis alternis deltoideis obtusis; summa triangulari, fructificationibus superne et anterius continuatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 134.

pumilum. 16. A. fronde pinnata: pinnis alternis subrotundis serrulatis; summa majuscula trapezoide, fructificationibus interruptis, stipite capillari. *Pluckn. alm. t.* 251. *f.* 4.

cuneatum. 17. A. frondibus pinnatis: pinnis oppositis subpinnatis; pinnulis cuneiformibus retusis alternis. *Forst. flor. austr. p.* 84.

**** fronde decompoſita.*

denticula- 18. A. foliolis alternis trapezoideis acuminatis crenatis: ſere-
tum. nis denticulatis, fructificationibus ſuperioribus interruptis. *Pet. fil. t.* 52.

flabellula- 19. A. foliolis alternis rhombeis rotundatis multifloris, ſtipi-
tum. tibus ſupra pubeſcentibus. *Pluckn. alm. t.* 4. *f.* 3.

trifolia- 20. A. foliolis alternis ternatis linearibus unifloris. *Pet. fil.*
tum. *t.* 11. *f.* 4.

Capillus 21. A. foliolis alternis: ſecundariis cuneiformibus lobatis pedi-
Veneris cellatis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 7.

chuſanum. 22. A. foliolis alternis pinnatifidis: laciniis inaequalibus.

trunca- 23. A. foliolis pinnatis: pinnis alternis cuneatis ſubfalcatis
tum. truncatis integerrimis. *Burm. ind. t.* 66. *f.* 4.

gujanenſe. 24. A. fronde bipinnata: pinnis oppoſitis; pinnulis reniformi-
bus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 963. *t.* 365.

criſtatum. 25. A. frondibus bipinnatis: pinnis infimis bipartitis; pinnulis
lunatis ſuperne multifloris.

furcatum. 26. A. fronde bipinnata: pinnulis ſaepius bipartitis linearibus,
pinea fructificationis unica. *Suppl. p.* 447. *Pluckn. mant. t.* 350. *f.* 4?

ſtrictum. 27. A. fronde bipinnata: pinnis tetragonis faſtigiatis erectis;
pinnulis alternis lunatis integris, fructificationibus ſuperius continuatis. *Swarts nov. pl. gen et ſp. p.* 135. *Plum. fil. t.* 97.

ſerratum. 28. A. fronde bipinnata: pinnulis deltoideo-oblongis ſerratis,
fructificationibus ſolitariis ſuperioribus. *Pluckn. alm. t.* 253. *f.* 1.

villoſum. 29. A. frondibus bipinnatis: pinnulis rhombeis anterius exte-
riusque fructificantibus, ſtipite villoſo. *Mant. p.* 505. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 55. *f.* 1.

pulveru- 30. A. frondibus bipinnatis: pinnulis ovalibus anterius trun-
lentum. catis unifloris, ſtipite hirto. *Plum. fil t.* 55.

caffrorum. 31. A. frondibus bipinnatis: pinnulis ovatis inciſo-denticula-
tis ſubtus paleaceis. *Suppl. p.* 447. *Mant. p.* 307. Polypodium caffrorum.

fragrans. 32. A. frondibus bipinnatis: pinnulis ovatis ſublobatis obtuſis
ſubtus nudis. *Suppl. p.* 447. *Mant. p.* 307. Polypodium fragrans.

33. A.

striatum. 33. A. frondibus bipinnatis: pinnulis rigidis falcato-ovatis striatis, fructificationibus superne interruptis: stipite tereti aspero. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 135.

microphyllum. 34. A. fronde bipinnata: pinnulis alternis oblongis obtusis curvatis inferius pinnatifidis. *Sloan. hist. jam.* 1. *p.* 98. *t.* 13. *f.* 2.

borbonicum. 43. A. fronde bipinnata glabra: pinnulis oblongis: infima superne bipartita, reliquis integerrimis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 286. *t.* 21. *f.* 1.

tenellum. 44. A. frondibus bipinnatis: pinnulis lobatis; lobis oblongis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 287. *t.* 21. *f.* 3.

**** fronde supradecomposita.*

fragile. 35. A. fronde supradecomposita superne bipinnata: pinnulis obovatis cuneatis integris, fructificationibus interruptis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 135.

tenerum. 36. A. foliolis secundariis alternis rhombeo-cuneiformibus obtusis incisis, fructificationibus interruptis. *Pluckn. phyt.* *t.* 254. *f.* 1.

clavatum. 37. A. foliolis alternis: secundariis cuneiformibus integerrimis alternis unifloris. *Plum. fil. t.* 101. *f.* B.

trapeziforme. 38. A. foliolis alternis: secundariis rhombeis incisis utrinque fructificantibus.

aculeatum. 39. A. foliolis secundariis palmatis multifloris, stipite aculeato. *Plum. fil. t.* 94.

hexagonum. 40. A. foliolis secundariis sexangularibus emarginatis integerrimis utrinque unifloris. *Pet. fil. t.* 10. *f.* 2. *anne idem cum pteride heterophylla?*

pteroides. 41. A. foliolis secundariis ovatis integris crenulatis, stipite laevi. *Mant. p.* 130.

aethiopicum. 42. A. foliolis secundariis rotundatis integris grenulatis: petiolatis capillaribus. *Pluckn. alm. t.* 253. *f.* 2.

1181. TRICHOMANES. *Fructificationes* solitariae, turbinatae stilo setaceo terminatae, margini frondis ipsi insertae.

* *fronde simplici.*

† *indivisa.*

reniforme. 1. Tr. frondibus reniformibus stipitatis multifloris, capsulis exsertis. *Forst. flor. austr. p.* 84.

pusillum. 2. Tr. frondibus linearibus incisis, surculo repente. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 136.

membranaceum. 3. Tr. frondibus oblongis laceris. *Pet. fil. t.* 13. *f.* 5.

†† *frondibus pinnatifidis.*

reptans. 4. Tr. frondibus cuneato-ovatis inciso-pinnatifidis, surculo repente. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 136.

crispum. 5. Tr. frondibus lanceolatis: laciniis parallelis subserratis. *Plum. fil. t.* 86.

polypodioides. 6. Tr. frondibus lanceolatis repandis, fructificationibus solitariis terminalibus.

asperioides. 7. Tr. frondibus pendulis lanceolatis glaberrimis: laciniis bilobis; lobis obtusis, fructificationibus bivalvibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 136.

humile. 8. Tr. frondibus dichotomis: laciniis alternis decurrentibus linearibus obtusis integris, fructificationibus turbinato-infundibuliformibus: stilis setaceis exsertis, stipite vix ullo. *Forst. flor. austr. p.* 84.

††† *frondibus bipinnatifidis.*

sericeum. 9. Tr. frondibus pendulis lanceolatis tomentosis: laciniis alternis; lacinulis linearibus obtusis integris, inferioribus bifidis, fructificationibus terminalibus hirsutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 136.

ciliatum. 10. Tr. frondibus erectis deltoidibus: laciniis ovatis; lacinulis linearibus obtusis ciliatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus hirtis, stipite marginato. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 136.

1811

11. Tr.

lucens. 11. Tr. frondibus pendulis lanceolatis hirſutis lucidis: laciniis parallelis; lacinulis ſubrotundis ſubſerrulatis, ſtipite hirſutiſſimo. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 136.

fucoides. 12. Tr. frondibus ovatis glabris: laciniis ovatis; lacinulis bipartitis, ſegmentis ſerratis obtuſis, fructificationibus bivalvibus ſupra baſin pinnarum inſertis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 136.

†††† *frondibus tripinnatifidis.*

undulatum. 13. Tr. frondibus tripinnatifidis bipinnatisve pendulis lanceolatis: laciniis lacinulisque alternis decurrentibus; ſecundariis linearibus retuſis crenulatis undulatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 137.

††††† *frondibus quadripinnatifidis.*

rigidum. 14. Tr. frondibus erectis deltoideis: laciniis patentibus; lacinulis lanceolatis; ſecundariis linearibus apice inciſis, ſeyphis fructificantibus pedicellatis axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 137.

polyanthon. 15. Tr. frondibus deltoideis erectis: laciniis lacinulisque decurrentibus; ſecundariis linearibus obtuſis, fructificationibus bivalvibus numeroſis, ſtipite marginato. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 137.

clavatum. 16. Tr. frondibus oblongo-lanceolatis laxis: laciniis lacinulisve decurrentibus; ſecundariis linearibus emarginatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus ſubrotundis, ſtipite teretiuſculo. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 137.

** *fronde compoſita.*

† *pinnata.*

contiguum. 17. Tr. pinnis linearibus alternis approximatis integris: fructificantibus apice inciſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

adiantoides. 18. Tr. pinnis enſiformibus acuminatis inciſo-ſerratis: ſerraturis bifidis. *Burm. zeyl. t.* 43.

tumbrigenſe. 19. Tr. pinnis oblongis dichotomis decurrentibus dentatis. *Bolton fil. brit. t.* 31.

†† *frondibus ſubbipinnatis.*

dilatatum. 20. Tr. pinnis alternis decurrentibus dichotomis cuneiformibus inciſis, fructificationibus bivalvibus orbicularibus inflatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

bivalve. 21. Tr. pinnis alternis decurrentibus dichotomis laciniis linearibus ſerratis, fructificationibus ſubrotundis bivalvibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

pyxidiferum. 22. Tr. pinnis alternis confertis lobatis linearibus. *Bolton fil. brit. t.* 30.

hirſutum. 23. Tr. pinnis alternis pinnatifidis piloſis. *Pet. fil. t.* 15. *f.* 5.

ſanguinolentum. 24. Tr. pinnis alternis pinnatifidis: laciniis dichotomis lineari-obtuſis integris decurrentibus, fructificationibus ovato-ſubrotundis dehiſcentibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

crinitum. 25. Tr. frondibus piloſis: pinnis ovatis pinnatifidis; laciniis bifidis, lacinulis obtuſis, ſtipite erecto hirto. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 136.

lineare. 26. Tr. frondibus pendulis lanceolatis glabris: pinnis remotis; pinnulis linearibus bipartitis, fructificationibus terminalibus bivalvibus, ſtipite capillari. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 137.

ſquarroſum. 27. Tr. pinnis oblongis acuminatis ſubpinnatis ſerratis: ſerraturis mucronatis, fructificationibus ſinuum globoſis dehiſcentibus ſubbivalvibus, ſtipite hiſpido barbato, caudice arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 86.

††† *frondibus bipinnatis.*

ſtrigoſum. 28. Tr. pinnulis rhombeis piloſis ſerratis, fructificationibus ſolitariis infra ſerraturas. *Thunb. flor. jap. p.* 339.

epiphyllum. 29. Tr. pinnis acuminatis: pinnulis linearibus inciſo-ſerratis, fructificationibus in pagina ſuperiore infra apicem ſerraturarum ſquamaceis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

cuneiforme. 30. Tr. pinnis dichotomis pinnulisque alternis: his cuneiformibus inciſis, fructificationibus truncato-laceris. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

gibberoſum. 31. Tr. pinnulis oblongis pinnatifido-inciſis: laciniis linearibus integris margine interiori infra apicem fructificantibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

demiſſum. 32. Tr. pinnis alternis ſtrictis: pinnulis pinnatifido-dichotomis; laciniis linearibus obtuſis integris, fructificantibus globoſis terminalibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

tamariſciforme. 42. Tr. pinnulis pinnatifide lobatis, coſta piloſa. *Jacq. coll.* 3. *p.* 285. *t.* 21. *f.* 3.

†††† *frondibus decompositis.*

multifidum. 33. Tr. foliolis alternis-pinnatis: pinnis dichotomis linearibus decurrentibus argute serratis, fructificationibus ovato-subrotundis dehiscentibus. *Forst. flor. austr. p.* 85.

elatum. 34. Tr. foliolis pinnatis: pinnis oblongis strictis pinnatifido-incisis: laciniis oblongis apice serratis, fructificationibus terminalibus ovatis. *Forst. flor. austr. p.* 85.

flaccidum. 35. Tr. foliolis rhombeis subpinnatis: pinnis cuneiformibus apice incisis margine interiore infra apicem fructificantibus. *Forst. flor. austr. p.* 85.

solidum. 36. Tr. foliolis acuminatis: secundariis ovato-oblongis incisis crenatis, fructificationibus filiformibus tubulosis. *Forst. flor. austr. p.* 86.

††††† *fronde supradecompositа.*

sinense. 37. Tr. foliis pinnisque alternis lanceolatis: pinnis laciniis cuneiformibus. *Osb. it. t.* 6.

scandens. 38. Tr. foliolis pinnisque alternis: his oblongis serratis. *Plum. fil. t.* 93.

capillaceum. 39. Tr. pinnis filiformibus linearibus unifloris. *Plum. fil. t.* 99.

japonicum. 40. Tr. pinnulis inciso-trifidis acutis. *Thunb. flor. jap. p.* 340.

canariense. 41. Tr. frondibus tripartitis: foliolis pinnisque alternis; his pinnatifidis. *Pluckn. alm. t.* 291. *f* 2. *β)* Polypodium lusitanicum. *Sp. pl.* 2. *p.* 1556. *Magn. h. monsp. p.* 79. *ic.*

CAENOPTERIS. *Fructificationes* in lineolis submarginalibus lateralibus membrana exterius dehiscente tectis.

rutaefolia. 1. C. frondibus pinnatifidis: laciniis linearibus planis obtusis. *Berg. act. Petrop. pr.* 1782. 2. *p.* 249. *t.* 7. *f.* 2.

furcata. 2. C. fronde bipinnata: pinnulis imis furcatis, rhachi compressa marginata. *Berg. act. Petrop. pr.* 1782. 2. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1.

rhizophylla. 3. C. fronde bipinnata apice radicante: pinnulis obovatis subfalcatis petiolatis: primordialibus lobatis. *Smith. plant. ic. ined. fasc.* 2. *t.* 80.

vivipara. 4. C. frondibus subtripinnatis: laciniis subulatis erectis. *Berg. act. Petropol. pr.* 1782. 2. *p.* 250. *t.* 7. *f.* 3. *Suppl. p.* 444. Acrostichum viviparum.

1182. MARSILEA. *Cal.* communis ovalis coriaceus multilocularis. *Cor.* o. *Filam.* o. *Anther.* plures. *Pist.* plura. *Stil.* o.

patens. 1. M. foliis oppositis simplicibus. *Mant. p.* 506. *Act. palat.* 3. *phys. t.* 21.

quadrifolia. 2. M. foliis quaternis integerrimis. *Moris. hist. pl.* 3. *t.* 4. *f.* 5.

1183. PILULARIA. *Cal.* communis villosus, 4fariam dehiscens, globosa, 4locularis. *Anth.* plures sessiles. *Pist.* plura. *Stil.* o.

globulifera. 1. PILULARIA. *Flor. dan. t.* 223.

1184. ISOETES. *Flores masculi: Anthera* intra basin frondis sessilis. *Fructificatio feminea: Capsula* 2locularis intra basin frondis.

lacustris. 1. I. foliis subulatis semiteretibus recurvis. *Suppl. p.* 448. *Flor. dan. t.* 191. *an vere distincta sui generis planta perfecta?*

coromandeliana. 2. I. foliis filiformibus erectis glabris. *Suppl. p.* 447.

MUSCI.

1186. PORELLA. *Anthera?* oblonga dehiscens poris plurimis lateralibus, non operculata. *Calyptra* o.

pinnata. 1. PORELLA. *Dill. muse. t.* 68. *f.* 1.

1187.

1187. SPHAGNUM. *Flos maſculus?* clavatus: antheris planis. *Capſ.* in eadem planta, operculatae ſeſſiles ſine calyptra integra: ore laevi.

paluſtre. 1. Sph. ramis deflexis. *Flor. dan. t.* 474. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. *t.* 3. *f.* 9. *et* 4. *f.* 14. *et* 9. *f.* 53. 54. β) *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 3. *f.* 13-15.

alpinum. 2. Sph. ſubramoſum erectum. *Dill. muſc. t.* 32. *f.* 3. *an bryi potius ſpecies?*

1189. PHASCUM. *Capſula* ovata calyptra munita cum rudimento operculi perſiſtente.

pedunculatum. 1. Ph. acaule, capſula pedunculata. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* II.

cernuum. 2. Ph. acaule, foliis floralibus erectis, pedunculo curvato. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 31. *t.* 11. *Schreb. de phaſco. p.* 8. *t.* 1. *f.* 6. 7.

ſerratum. 3. Ph. acaule, foliis ovato-lanceolatis ſerratis planis erectis. *Schreb. de phaſco. p.* 8. *t.* 2.

muticum. 4. Ph. acaule, foliis ovatis muticis concavis conniventibus. *Schreb. de phaſco. p.* 8. *t.* 1. *f.* 11. 12.

cuſpidatum. 5. Ph. cauleſcens, foliis ovatis cuſpidatis patulis: ſummis erectis conniventibus. *Flor. dan. t.* 249. *f.* 3. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 699. Phaſcum acaulon.

ſubulatum. 6. Ph. cauleſcens, foliis lanceolato-linearibus patulis. *Flor. dan. t.* 249. *f.* 1. *Hedw. crypt.* 4. *t.* 35.

piliferum. 7. Ph. cauleſcens, foliis oblongis apice piliferis. *Schreb. phaſco. t.* 1. *f.* 6-10.

criſpum. 8. Ph. caneſcens, foliis minutis laxis: capſulam cingentibus baſi latis concavis, apice culpidato undulatis. *Hedw. cryptog.* 1. *p.* 25. *t.* 9.

patens. 9. Ph. cauleſcens, foliis lanceolatis dentatis patulis, capſulae apice diaphano. *Hedw. cryptog.* 1. *p.* 28. *t.* 10.

nitidum. 10. Ph. caulescens humile, foliis subulato-carinatis subfasciatis, capsulis pedunculatis suberosis. *Hedw. cryptog.* 4. *p.* 91. *t.* 34.

caulescens. 11. Ph. caulescens erectum, foliis lanceolatis alternis. *Dill. musc. t.* 85. *f.* 15.

repens. 12. Ph. caulescens repens, capsulis lateralibus sessilibus. *Dill. musc. t.* 85. *f.* 16.

alternifolium. 13. Ph. caulibus capsuliferis nanis: sterilibus altioribus erectis, foliis alternis subulatis. *Dicks. crypt. brit. fasc.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 2.

1190. FONTINALIS. *Gemma* in eadem planta cum *capsula* subsessili perichaetio imbricato obvolata et calyptra munita.

minor. 1. F. foliis ovatis concavis trifariis acutis passim geminis, capsulis terminalibus. *Dill. musc. t.* 33. *f.* 2.

antipyretica. 2. F. foliis complicato-carinatis trifariis acutis, capsulis lateralibus. *Dill. musc. t.* 33. *f.* 1. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 5. *f.* 27. *et* 2. *t.* 1. *f.* 5. *t.* 4. *f.* 14. 15. *et t.* 9. *f.* 53-55.

crispa. 3. F. furculis ramosis pennatis, foliis duplicato-bifariis rotundatis patentibus imbricatis undulatis, capsulis lateralibus posterioribus. *Dill. musc. t.* 32. *f.* 7. 8.

dilliciha. 4. F. furculis simplicibus, foliis bifariis patentibus retusis imbricatis planis, capsulis lateralibus posterioribus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 138.

squamosa. 5. F. foliis imbricatis subulato-lanceolatis, capsulis lateralibus. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 32. *t.* 12.

albicans. 6. F. foliis imbricatis ovato-lanceolatis pilo terminatis, capsulis lateralibus. *Dill. musc. t.* 32. *f.* 5.

capillacea. 7. F. foliis secundis lineari-setaceis: perichaetialibus longissimis convolutis subulatis. *Dill. musc. p.* 260. *t.* 33. *f.* 5.

alpina. 8. F. foliis subsecundis ellipticis obtusiusculis: perichaetialibus lanceolatis acutis. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 2. *p.* 2. *t.* 4. *f.* 1.

1188. BUXBAUMIA. *Gemma* orbicularis. *Capsula* pedunculata: peristomate externo 16dentato: interno membranaceo plicato.

aphylla. 1. B. aphylla, pedunculo elongato. *Flor. dan. t.* 44. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 3. *f.* 10. *et t.* 9. *f.* 51.

folios a. 2. B. acaulis, capsula subsessili foliis cincta. *Linn. fil. de musc. p.* 33. *t.* 1. *f.* 4. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 9. *f.* 52.

1191. SPLACHNUM. *Gemma* orbicularis, terminalis. *Capsula* in alia planta cylindrica cum calyptra et apophysi maxima: peristomate octodentato.

luteum. 1. Spl. umbraculo orbiculari plano. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 17.

ampullaceum. 2. Spl. umbraculo ampullaceo obconico. *Flor. dan. t.* 822. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 7. *f.* 33. 34. *et crypt.* II. 2. *t.* 14.

vasculosum. 3. Spl. umbraculo ampullaceo subgloboso. *Flor. dan. t.* 192. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 15.

rubrum. 4. Spl. umbraculo orbiculari hemisphaerico. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 18.

sphaericum. 5. Spl. receptaculo globoso. *Linn. fil. musc. t.* 1. *f.* 1. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 16.

angustatum. 6. Spl. caulescens, foliis piliferis, pedunculo brevissimo. *Linn. fil. musc. p.* 33. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 12.

urceolatum. 7. Spl. trunco erecto bifloro, foliis cochleariformibus imbricatis apicularis, apophysi tumidiuscula obconica. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 13.

Breweri. 8. Spl. foliis lanceolatis integerrimis. *Hedw. crypt.* 114. *p.* 120. *t.* 38.

longisetum. 9. Spl. foliis ovatis cuspidatis, umbraculo subgloboso. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 441.

tenue. 10. Spl. caulescens, foliis ovato-oblongis acutis, receptaculo obconico attenuato. *Dicks. crypt. Brit. f.* 2. *p.* 2. *t.* 4. *f.* 2.

11. Spl.

ovatum. 11. Spl. acaule, foliis lanceolato-ovatis acutis, receptaculo obovato. *Dill. muſc. p.* 344. *t.* 44. *f.* 4.

1192. POLYTRICHUM. *Gemma* orbicularis, terminalis. *Capſula* in alia planta calyptra munita: periſtomatis externis dentibus 32.

* *capſula apophyſi munita.*

commune. 1. P. ſurculo ſimplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis ferrulatis, capſulis oblongis tetraëdris, calyptris villoſis. *Blackw. herb. t.* 375. *Hedw. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 9. *f.* 62-64. *et* 2. *t.* 7. *f.* 37.

magellanicum. 2. P. ſurculo ſimplici prolifero, foliis ſubulatis canaliculatis cartilagineo-ſerratis, capſulis oblongis tetraëdris; calyptris villoſis. *Suppl. p.* 449.

juniperinum. 3. P. ſurculo ſimplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis integerrimis mucronatis, capſulis oblongis tetraëdris: calyptris villoſis. *Flor. dan. t.* 295.

piliferum. 4. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis, apice piliferis, capſulis oblongis tetraëdris: calyptris villoſis. *Dill. muſc. t.* 54. *f.* 3.

pulverulentum. 5. P. ſurculo ſubſimplici folioſo, foliis lanceolatis acuminatis horizontalibus roridis. *Reynar act. Lauſann.* II. 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 2.

ſerratum. 13. P. ſurculo ſimplici, capſulis tetraëdris, foliis lanceolato-linearibus ſerratis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 446.

** *capſula ſine apophyſi.*

nanum. 6. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis apice ſubſerratis, capſulis ſubrotundis: calyptris villoſis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium polytrichoides. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 37. *t.* 13.

aloides. 7. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis apice ſerrulatis, capſulis cylindricis: calyptris villoſis. *Hedw. cryptog.* 2. *p.* 40. *t.* 14.

undulatum. 8. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis ſerratis undulatis, capſulis cylindricis: operculi acumine longe producto; calyptris dimidiatis glabris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum

um undulatum. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 46. *t.* 16. *β*) *Hedw. crypt.* 2. *t.* 17.

hercynicum. 9. P. furculo subsimplici, foliis lanceolatis carnosis, capsulis erectis urceolatis; calyptris interrupte villosis. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 43. *t.* 15.

alpinum. 10. P. furculo ramosissimo, foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis terminalibus, capsulis ovatis. *Flor. dan. t.* 296.

urnigerum. 11. P. furculo ramosissimo, foliis lanceolatis dentato-serratis, pedunculis axillaribus, capsulis cylindricis. *Dill. musc. t.* 55. *f.* 5.

convolutum. 12. P. caule folioso, foliis involutis subulatis glabris, pedunculo filiformi brevi, calyptra villosa. *Suppl. p.* 449. *Linn. fil. musc. t.* 1. *f.* 3.

1193. MNIUM. *Gemma* orbicularis, rarius capitata. *Capsulae*, utplurimum in alia planta, calyptra munitae: peristomatis dentibus 16, rarius 4.

* *gemmis capsulisque in eadem planta.*

† *peristomate interno ciliis* 16 *membranaceis planis,* Funaria f. Koelreutera.

hygrometricum. 1. Mn. furculo subsimplici, foliis oblongis acuminatis, capsulis ovatis nutantibus: operculis planis. *Flor. dan. t.* 648. *f.* 2. *Hedw. hist. musc. frond.* 1. *t.* 5. *f.* 21-26. *et* 2. *t.* 3. *f.* 11. *t.* 5. *f.* 25. 26. *t.* 6. *f.* 27. *t.* 10. *f.* 58-61.

†† *peristomate interno obsolete sulcato laciniato:* Timmia.

megapolitanum. 2. Mn. erectum, foliis lineari-lanceolatis serratis patulis, capsula cernua: operculo convexo medioque depresso. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 83. *t.* 31.

** *gemmis capsulisque in diversa planta.*

† *illis capitatis, harum peristomate simplici.*

† *peristomatis dentibus* 4 Tetraphis, like Georgia.

pellucidum. 3. Mn. furculo simplici, foliis ovatis, capsulis cylindricis. *Flor. dan. t.* 300. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 7. *f.* 32.

†† *per-*

†† *peristomatis dentibus* 16: Dicranum.

purpureum. 4. Mn. surculo ramoso, foliis oblongis acutis carinatis, capsulis subcylindricis, setis axillaribus. *Dill. musc. t.* 49. *f.* 51. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 4. *f.* 17.

strictum. 5. Mn. surculo caulescente, foliis capillaceis, pedunculis elongatis terminalibus, capsulis obliquis. *Swartz nov. pl. gen. et sp. p.* 139. *an hujus cohortis?*

latifolium. 6. Mn. erectum, foliis oblongo-dilatatis concavis pilo brevi terminatis, capsula cylindrica recta. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 89. *t.* 33.

scoparium. 7. Mn. surculo ramoso, foliis lineari-lanceolatis recurvis secundis, capsulis erectis oblongo-cylindricis: operculis conicis acuminatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum scoparium. *Curt. flor. Lond. t.* 38. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 41. 42.

heteromallum. 8. Mn. surculo subsimplici, foliis setaceis recurvis, capsulis ovatis: operculis acuminatis recurvis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum heteromallum. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 72. *t.* 26. *et fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 9. *f.* 55-61.

tortile. 33. Mn. surculo subdiviso, foliis subulato-carinatis reflexis heteromallis siccitate tortilibus, thecis oblongis: operculo rostrato. *Schrader.*

glaucum. 9. Mn. surculo ramoso, foliis ovatis acutis imbricatis, capsulis oblongis: operculis acuminatis recurvis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum glaucum. *Dill. musc. t.* 46. *f.* 20.

pellucens. 10. Mn. surculo hirsuto, foliis recurvis acutis, capsulis erectiusculis. *Dill. musc. t.* 46. *f.* 23. 24. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum pellucidum.

aciculare. 11. Mn. foliis erectis subsecundis, capsulis erectis: operculo aciformi. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum aciculare. *Dill. musc. t.* 46. *f.* 25.

simplex. 12. Mn. surculo simplicissimo: medio pedunculifero, foliis subulatis capsula nutante oblonga. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum simplex. *Dill. musc. t.* 50. *f.* 9. *Hedw. crypt.* II. 4. *p.* 108. *t.* 34.

pusillum. 34. Mn. foliis capillaribus rigidulis erectis: summis aequalibus. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 96. *t.* 29. *f.* B.

spuricum. 35. Mn. surculo erecto, foliis nitidis cuspidatis concavis: summis confertis patulis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 96. *t.* 30.

†† *gemmis orbicularibus, peristomate duplici.*
† *interno reticulato*, Macsia.

trique- trum. 13. Mn. furculo ramoso, foliis lanceolatis acutis carinatis patulis, capsulis obliquis oblongo-cylindricis: operculis conicis. *Hedw. crypt.* 3. *t.* 21. 22.

uligino- sum. 14. Mn. furculo subsimplici, foliis oblongo-lanceolatis obtusis, capsulis obliquis pyriformibus: operculis conicis umbilicatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum trichodes. *Hedw. crypt.* 1. *t.* 1. 2. *et fund. hist. musc. frond.* 1. *f.* 16-20. 2. *t.* 6. *f.* 28. *et t.* 9. *f.* 56. 57.

†† *peristomate interno e membrana ciliis difformibus.*

tomento- sum. 15. Mn. furculo dichotomo erecto tomentoso, foliis subulatis, capsulis sphaericis. *Swarts nov. plogen. et sp. p.* 139.

sphaero- capron. 16. Mn. furculis erectis tomentosis filiformibus: ramis simplicibus falciculatisque terminalibus, foliis capillaribus, capsulis sphaericis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 139.

ramosum. 17. Mn. furculo ramoso erecto, pedunculis axillaribus. *Dill. musc. t.* 31. *f.* 4. *an cum* 2 *praecedentibus hujus cohortis?*

fontanum. 18. Mn. furculo subramoso erecto, foliis lanceolatis apice setaceis incurvis, capsulis subrotundis obliquis: operculo conico umbilicato obtuso. *Flor. dan. t.* 299.

marchi- cum. 19. Mn. furculo ramoso erecto, foliis ovatis acuminatis, capsulis subrotundis obliquis: operculis mucrone crasso adunco. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 474. *Hedw. crypt.* II. 4. *t.* 39.

paluſtre. 20. Mn. furculo ramoso dichotomo, foliis subulatis acutis carinatis, capsulis oblongis: operculis conicis. *Dill. musc. t.* 31. *f.* 3.

annoti- num. 21. Mn. foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis subradicalibus, capsulis nutantibus. *Dill. musc. t.* 50. *f.* 68.

hornum. 22. Mn. capsulis pendulis: pedunculo curvato, furculo simplici, foliis margine scabris. *Curt. flor. Lond. t.* 48. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 1. *f.* 2. 3. 10. *et* 12. *t.* 1. *f.* 4. *et t.* 4. *f.* 22. 23.

capillare. 23. Mn. capsulis pendulis, foliis ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. *Dill. musc. t.* 50. *f.* 67.

crudum. 24. Mn. furculo simplici, foliis lanceolatis acutis, capsulis nutantibus ovatis: operculis conicis; calyptris recurvatis. *Hedw. crypt.* 4. *t.* 37.

25. Mn.

punctatum. 25. Mn. capsulis cernuis, pedunculis aggregatis, foliis obovatis integerrimis obtusis punctatis. *Dill. musc. t.* 53. *f.* 81. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 10. *f.* 66-69.

cuspidatum. 26. Mn. capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis ovatis acutis serratis. *Dill. musc. t.* 53 *f.* 79.

serratum. 27. Mn. furculo simplici, foliis ovatis acuminatis: summis angustioribus serratis, thecis ovatis nutantibus; operculi rostello recurvo. *Schrader.*

rostratum. 28. Mn. furculo simplici, foliis ovato-ligulatis subserratis, thecis ovatis nutantibus: operculi rostello recurvo. *An satis distinctum a serrato? Schrader.*

proliferum. 29. Mn. capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis rosacco congestis lanceolatis acutis. *Dill. musc. t.* 52. *f.* 77.

undulatum. 30. Mn. capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis serrulatis. *Dill. musc. t.* 52. *f.* 76.

nutans. 31. Mn. furculo subramoso, foliis ovatis acutis, capsulis pyriformibus nutantibus. *Dill. musc. t.* 51. *f.* 74.

caespiticium. 32. Mn. capsulis pendulis, foliis lanceolatis acuminato-setaceis pedunculis longissimis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum caespiticium. *Curt. flor. Lond. t.* 166. a. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 3. *f.* 12. *et t.* 10. *f.* 67.

1194. BRYUM. *Gemmae* saepe axillares, nunc in alia, nunc in eadem planta cum *capsulis* calyptra munitis, pedunculo terminali ex tuberculo exeunti insidentibus.

* *gemmis conspicuis nullis*, Webera.

pomiforme. 1. Br. furculo ramoso, foliis lineari-lanceolatis seta terminatis imbricato-patulis capsulis sphaericis: operculo plano. *Dill. musc. t.* 44. *f.* 1.

mnioides. 2. Br. furculo subsimplici, foliis linearibus, capsulis pyriformibus nutantibus: operculis conicis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium pyriforme. *Hedw. cryptog.* 1. *t.* 3. *et fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 3. *f.* 12.

3. Br.

nutans. 3. Br. furculo simplici, foliis ovato-lanceolatis conniventibus, capsulis cylindricis: operculis conicis mucronatis. *Hedw. crypt.* I. *p.* 9. *t.* 4.

rubrum. 56. Br. capsula oblonga nutante, foliis subulatis, caule simplicissimo medio pedunculifero. *Mant. p.* 309. *an huc spectat?*

** *gemmis instructa.*

† *gemmis capsulas includentibus*, Swartzia.

capillaceum. 61. Br. foliis distichis basi semivaginantibus, capsulis erectis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 88. *t.* 26.

inclinatum. 62. Br. foliis basi semivaginantibus subsetaceis, capsulis inclinatis: peristomatis dentibus perforatis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 90. *t.* 27.

trifarium. 63. Br. foliis trifariis: superioribus lanceolatis; inferioribus subulatis, capsulis ovatis erectis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 92. *t.* 28.

†† *in eadem planta cum capsulis.*

† *peristomate nudo*, Hedwigia.

ciliatum. 4. Br. capsulis sessilibus terminalibus: calyptra minima. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 107. *t.* 40.

aquaticum. 95. Br. capsulis oblongis, trunco tenui declinato: apice foliisque linearibus acuminatis reclinatis. *Hedw. crypt.* III. 2. *p.* 29. *t.* 11. *Jacq. flor. austr. t.* 290.

†† *peristomate octodentato.*

Octoblepharis. 4*. Br. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 15. *t.* 6.

††† *peristomate* 16*dentato.*

‡ *simplici.*

§ *gemmis axillaribus*: Leersia.

pulvinatum. 5. Br. furculo ramoso, foliis oblongis piliferis, capsulis subrotundis nutantibus: calyptris minutis. *Dill. musc. t.* 50. *f.* 65. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 10. *f.* 65.

cirrhatum. 6. Br. furculo ramoso foliis lanceolatis acutis, capsulis oblongis: operculo acuminato; calyptris dimidiatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium cinctum. *Flor. dan. t.* 538. *f.* 4. *nonne potius ad dicrana Hedwigii ablegandum?*

exſtincto- rium. 7. Br. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis, capſulis cylindricis: calyptris campanulatis margine integris capſulas ſuperantibus. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 49. *t.* 18. *fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 4. *f.* 19. *et* 24. a.

cuſpidatum. 68. Br. ſurculo ſimplici, foliis lanceolato-linearibus acuminatis, capſulis ovatis: operculis conico-roſtratis ſubincurvis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 442.

ciliare. 8. Br. ſurculo ſubramoſo, calyptra ampla conica ciliata. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 53. *t.* 19.

LL *gemmis ſparſis:* Trichoſtomum.

hypnoides. 9. Br. ſurculo ramoſo decumbente, foliis oblongis apice piliferis, capſulis oblongis: calyptris integris. *Flor dan. t.* 476. *Hedw. frond. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 43. 44.

microcarpon. 10. Br. ſurculo ramoſo, foliis patulis, ſetis terminalibus, capſulis ſubrotundis. *Dill. muſc. t.* 46 *f.* 29.

indicum. 11. Br. ſurculo ramoſo erecto, foliis lanceolatis convolutis: ſetis ſuperne incraſſatis axillaribus, capſulis oblongis: operculis roſtratis. *Willdenav bot. Mag.* 4 *p.* 7. *t.* 1. *f.* 1.

faſcicula- re. 89. Br. ſurculo procumbente: ramis confertis brevibus, foliis lanceolatis margine revoluto-patulis, capſulis ovato-oblongis. *Schrader.*

ericoides. 88. Br. ſurculo erecto: ramis confertis brevibus, foliis lanceolato-acuminatis: apice diaphanis recurvis, capſulis ovatis. *Schrader.*

anguſtatum. 87. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolato-ſubulatis ſiccitate tortilibus, capſulis oblongis. *Schrader.*

lanceolatum. 58. Br. ſurculo ſubſimplici erecto, foliis lanceolatis mucronatis, capſulis ovatis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 81. *t.* 23.

pallidum. 12. Br. ſurculo ſimplici breviſſimo, foliis capillaceis ſubulatis vaginantibus, capſulis cylindricis: operculis conicis; calyptris dimidiatis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 75. *t.* 27.

baſiflorum. 69. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis erectis, capſularum pedunculis ex baſi ramorum bracteatis, operculo conico ſubobliquo. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 448.

tortum. 70. Br. capſula ſubcylindrica flexuoſa: periſtomatis dentibus articulatis, operculo conico, pedunculis intortis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 449. *an diſtincta ſpecies?*

71. Br.

repens. 71. Br. capsula recta: senescente incurva, surculo repente: ramis filiformibus erectis, foliis enervibus, lanceolatis patulis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 450.

fontinoloides. 96. Br. trunco longo ramoso, foliis lanceolatis patulis, capsulis lateralibus. *Hedw. crypt.* III. 2. *p.* 36. *t.* 14.

pusillum. 13. Br. surculo simplici brevissimo, foliis subulatis vaginantibus, capsulis oblongis: operculis conicis, calyptris dimidiatis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 78. *t.* 28.

secundum. 60. Br. foliis lanceolatis dentato-cuspidatis, capsulis oblongis erectis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 86. *t.* 25.

11 *peristomate praeter dentes ciliis spiraliter convolutis munito:* Tortula.

murale. 14. Br. surculo brevissimo subdiviso, foliis ovatis acutis apice piliferis, capsulis oblongis: operculis conicis acutis. *Dill. musc. t.* 45. *f.* 14.

tortuosum. 90. Br. surculo ramoso, foliis lanceolato-linearibus serratis undulatis siccitate crispis, capsulis cylindricis: operculo rostrato. *Dill. musc. t.* 48. *f.* 40.

agrarium. 15. Br. acaule, capsulis cylindricis erectiusculis subulatis, foliis lanceolatis acutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 139. *an hujus cohortis?*

acuminatum. 16. Br. capsulis cylindricis erectis subulatis, surculis caulescentibus cespitosis, foliis linearibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 139. *an hujus cohortis?*

subulatum. 17. Br. surculo brevissimo simplici, foliis ovatis obtusiusculis, capsulis cylindricis: operculo conico acuto. *Curt. flor. Lond. t.* 214. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 38-40.

†††† *peristomate dentibus* 32.

Didymodon. 17*. Br. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 8.

111 *gemmis in alia, capsulis in alia planta.*

† *peristomate nudo:* Gymnostomum.

pyriforme. 18. Br. foliis explanatis oblongis acutis, capsulis pyriformibus. *Flor. dan. t.* 537. *f.* 1. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 1. *f.* 2. 3. *t.* 2. *f.* 6. *α. β. t.* 4. *f.* 18. *et f.* 24. b. *et t.* 6. *f.* 31.

Heimii. 19. Br. trunco erecto foliisque spatulato-acuminatis ad apicem denticulatis, capsulis oblongis erectis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 80. *t.* 30.

ovatum. 20. Br. foliis ovatis concavis piliferis, capſulis ovatis. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 16. *t.* 6.

obtuſum. 74. Br. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, capſulis erectis obovatis truncatis: operculo convexo. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 5. *t.* 4. *f.* 7.

truncatulum. 21. Br. foliis explanatis mucronatis, capſulis truncatis. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 13. *t.* 5.

pennatum. 22. Br. ſurculo ſimplici erecto pinnatifido apice fructifero: pinnis diſtichis lanceolatis integerrimis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 81. *t.* 29.

curviroſtrum. 59. Br. ſurculo pallido debili recto, foliis linearibus reflexis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 84. *t.* 24.

ſtelligerum. 73. Br. capſulis erectis ſemiglobooſis nudis, foliis linearibus ſtellato-verticillatis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 2. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 4.

†† *periſtomate* 16*dentato.*

‡ *ſimplici.*

§ *gemmis ſparſis:* Grimmia.

apocarpum. 23. Br. capſulis ſeſſilibus terminalibus: calyptra minima. *Hedw. crypt.* I. 4. *p.* 104. *t.* 39.

ſeſſile. 24. Br. capſulis ſeſſilibus, foliis rectis carinatis. *Dill. muſc. t.* 55. *f.* 10.

ſilvaticum. 25. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis, capſulis oblongis pedunculatis axillaribus terminalibusque: operculo mucrone obtuſo, calyptris villoſis. *Flor. dan. t.* 648. *f.* 1.

ſetaceum. 26. Br. foliis ſetaceis, capſulis pyriformibus: pedunculis recurvatis. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 102. *t.* 38.

§§ *gemmis terminalibus capitatis:* Weiſſia.

viridulum. 27. Br. capſulis ovatis erectis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *Curt. flor. Lond. t.* 132. a.

Dickſoni. 28. Br. foliis lineari-lanceolatis, capſulis oblongis: operculo acuminato; calyptra dimidiata. *Dickſon crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

recurviroſtrum. 29. Br. foliis lanceolatis imbricato-patulis, capſula gracili: operculi roſtello recurvo. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 19. *t.* 7.

30. Br.

unilatera-le. 30. Br. trunco erecto, foliis basi latioribus: cuspide subulata rigida unilaterali, capsularum operculo conico annulato. *Hedw. crypt.* I. *p.* 22. *t.* 8.

minutum. 31. Br. furculo simplici nano capsulaque ovata erectis, foliis capillaribus. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 94. *t.* 29. *f.* A.

‡‡ *peristomate duplici.*

‖ *interno simili:* Orthothrichum.

crispum. 32. Br. foliis imbricatis cuspidatis siccitate crispis, capsulis ovatis. *Hedw. crypt.* II. 4. *p.* 111. *t.* 35.

striatum. 33. Br. furculo ramoso, foliis lanceolatis acutis, capsulis oblongis sessilibus axillaribus terminalibusque: operculo acuminato; calyptris pilosis. *Dill. musc. t.* 55. *f.* 8. *Hedw. fund. hist. musc. frond* I. *t.* 8. *et* 2. *t.* 2. *f.* 7. 8. *et t.* 7. *f.* 36. *crypt.* II. 4. *t.* 36.

— rectorum. 34. Br. capsulis subsessilibus: calyptris villosis conicis, setis brevissimis axillaribus. *Dill. musc. t.* 55. *f.* 9. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 7. *f.* 35. *crypt.* II. 4. *t.* 37.

diaphanum. 93. Br. foliis lanceolato-acuminatis apice diaphanis, capsula oblonga striata: peristomii dentibus internis capillaceis. *Schrader.*

affine. 94. Br. foliis lanceolatis margine revoluto-patulis, capsula oblonga striata: peristomatis dentibus ciis internis capillaceis. *Schrader.*

‖‖ *interno membrana* 16*dentata:* Pohlia.

elongatum. 35. Br. trunco erecto, foliis lineari-lanceolatis, capsularum basi elongata. *Hedw. crypt.* I. 4. *p.* 96. *t.* 36.

‖‖‖ *interno membrana plicata canaliculata:* Bartramia.

Bartramia. 67. Br. foliis apice subulatis, capsulis ovatis lateralibus. *Hedw. crypt.* II. 4. *p.* 126. *t.* 40.

‖‖‖‖ *interno ciliato.*

† *ciliis spiraliter convolutis:* Barbula.

rurale. 36. Br. furculo ramoso, foliis reflexis obovatis obtusis apice piliferis, capsulis cylindricis: operculis conicis acutis. *Dill. musc. t.* 45. *f.* 12. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* I. *t.* 6. *f.* 28-32.

hercynicum. 92. Br. ſurculo ſubdiviſo, foliis lanceolato-ligulatis obtuſiuſculis piloſis, capſulis oblongis: operculo ſubulato. *Schrader.*

piloſum. 91. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolato-carinatis piloſis, capſulis ovato-oblongis: operculo ſubulato. *Schrader.*

unguiculatum. 37. Br. ſurculo ſubramoſo, foliis lineari-lanceolatis carinatis, capſulis ſubcylindricis: operculo conico. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 63. *t.* 23. *fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 4. *f.* 20.

imberbe. 38. Br. foliis patulis recurvis, capſulis oblongis: operculi roſtello obliquo. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 66. *t.* 24.

barbatum. 39. Br. foliis lanceolatis acutis: ſummis patulis capſulis erectis oblongis: operculo acuminato obliquo, pedunculo laterali. *Curt. flor. Lond. t.* 274.

rigidum. 40. Br. trunco humillimo, foliis margine inflexis, capſulis oblongis erectis. *Hedw. crypt.* I. 3. *p.* 69. *t.* 25.

convolutum. 41. Br. foliis communibus lanceolatis: perigonialibus obtuſis in cylindrum convolutis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium ſetaceum. *Hedw. crypt.* 1. 4. *p.* 86. *t.* 32.

TT *ciliis difformibus e membrana carinata.*

androgynum. 42. Br. ſurculo ramoſo erecto, foliis lanceolatis patulis, capſulis cylindricis: operculis acuminatis, ſeta terminali. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium androgynum. *Flor. dan. t.* 299. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 6. *f.* 33-36.

lycopodioides. 43. Br. capſulis erectis: pedunculis abbreviatis ſolitariis, ſurculis elongatis ſubramoſis, foliis patulis linearibus acutis ſerrulatis ſubundulatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 139.

albidum. 44. Br. capſulis erectis, foliis lingulatis obtuſiuſculis patulis. *Dill. muſc. t.* 46. *f.* 21. *Swarts obſ. bot. t.* 11. *f.* 1.

paraſiticum. 45. Br. capſulis erectiuſculis: pedunculis breviſſimis, ſurculis confertis ramoſis brevibus, foliis patulis linearibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 139.

calicinum. 46. Br. capſulis erectiuſculis: perichaetio longiſſimo pedunculum aequante, ſurculis erectis, foliis linearibus cirrhatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 139.

flexuoſum. 48. Br. capſulis erectis: pedunculis flexuoſis, foliis ſetaceis. *Dill. muſc. t.* 47 *f.* 33.

aeſtivum. 51. Br. capſulis erectis ſubrotundis axillaribus, foliis ſubulatis diſtantibus. *Dill. muſc. t.* 47. *f.* 36.

72. Br.

calcarium. 72. Br. acaulon, capſulis erectis obconicis dentatis, foliis erectis teretibus obtuſiuſculis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 3.

paludoſum. 52. Br. acaulon, foliis ſetaceis, capſulis obtuſiſſimis patulis. *Dill. muſc. t.* 49. *f.* 53.

verticillatum. 53. Br. capſulis erectis: pedunculis arefactione confertis, foliis piliferis, ſurculis faſtigiatis. *Dill. muſc. t.* 47. *f.* 35.

Celſii. 54. Br. capſulis erectiuſculis: pedunculis longiſſimis, foliis ſetaceis, ſurculis acaulibus. *Dill. muſc. t.* 49. *f.* 54.

ſquarroſum. 55. Br. capſulis obliquis, foliis quinquefariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo-tomentoſo. *Buxb. cent.* 4. *t.* 65. *f.* 1.

argenteum. 56. Br. capſulis pendulis, ſurculis cylindricis imbricatis laevibus. *Flor. dan. t.* 880. *f.* 2. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond. t.* 6. *f.* 29.

ventricoſum. 57. Br. capſulis pendulis ventricoſis oblongis, foliis trifariis patulis ſubulato-lanceolatis carinatis, ſurculis ramoſis. *Dill. muſc. t.* 51. *f.* 72.

carneum. 64. Br. capſulis pendulis ſubgloboſis, foliis acutis alternis. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 56. *t.* 20.

alpinum. 65. Br. capſula pendula oblonga, foliis ovatis acuminatis carinatis, ſurculis ramoſis: axillis pedunculiferis. *Dill. muſc. t.* 50. *f.* 64.

dendroides. 66. Br. capſulis nutantibus ſurculo erecto: ramis verticillatis terminalibus; ramulis alternis, foliis ſerratis. *Linn. fil. muſc. p.* 34. *t.* 1. *f.* 2.

*** *dubiae tribus.*

† *periſtomate dentato.*

reticulatum. 75. Br. capſulis erectis pyriformibus, foliis ovatis ſerratis reticulatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 4. *t.* 4. *f.* 6.

ſplachnoides. 76. Br. capſulis erectis obovatis: apophyſi ſubrotunda, foliis lineari-ſetaceis. *Flor. dan. t.* 538. *f.* 2.

bipartitum. 77. Br. capſulis erectis ſubobliquis, ſurculis bifidis, foliis lanceolatis acutis carinatis imbricato-patulis. *Dill. muſc. p.* 385. *t.* 49. *f.* 50.

Zierii. 78. Br. capſulis pendulis clavatis elongatis, ſurculis teretibus, foliis radicalibus patentibus longioribus. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 8. *t.* 4. *f.* 10.

cubitale. 79. Br. capsulis pendulis clavatis oblongis, furculis setisque inflexis, foliis sagittatis acutis marginatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 9. *t.* 5. *f.* 2.

11 *peristomate ciliato.*

margina- tum. 80. Br. capsulis nutantibus: operculo rostrato, foliis ovato-lanceolatis acutis denticulatis marginatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 9. *t.* 5. *f.* 1.

dealba- tum. 81. Br. capsulis erectis subrotundis subincurvis dentato-ciliatis, foliis lanceolatis acutis patentibus. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 8. *t.* 5. *f.* 3.

brevifoli- um. 82. Br. capsulis erectis oblongis attenuatis obsolete ciliatis, foliis confertis linearibus carinatis. *Dill. musc. p.* 377. *t.* 47. *f.* 39.

flaves- cens. 83. Br capsulis erectis cylindricis, furculis subsimplicibus, foliis lanceolato-linearibus carinatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 4. *t.* 4. *f.* 5.

ericeto- rum. 84. Br. capsulis erectis ovato-oblongis annulatis, foliis lanceolatis exsiccatione contortis. *Dill. musc. p.* 354. *t.* 45. *f.* 13.

patens. 85. Br. capsulis erectis subpyriformibus: setis brevissimis furculis erectiusculis: ramis patentibus subfastigiatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 6. *t.* 4. *f.* 8.

111 *peristomate annulato.*

tetrago- num. 86. Br. capsulis erectiusculis subglobosis, furculis tetragonis: junioribus scandenti-flexuosis, foliis adpressis subulatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 8. *t.* 4. *f.* 9.

1195. HYPNUM. *Gemmae* in alia ut plurimum planta. *Capsulae* pedunculo laterali ex perichaetio prodeunti insidentes: peristomate exteriori 16dentato.

* *gemmis capsulisque in eadem planta, peristomate simplici:* Fissidens.

† *fronde pinnata.*

spinifor- me. 1. H. fronde simplicissima: pinnis patentibus subulatis, pedunculis radicalibus. *Dill. musc. t.* 43. *f.* 68. *Swarts obs. bot. t.* 11. *f.* 2. *an hujus tribus?*

2. H.

taxifolium. 2. H. fronde ſimplici baſi ſetifera: pinnis oblongis acutis, capſulis oblongis: operculo acuminato. *Flor. dan. t.* 473. *f.* 2.

denticulatum. 3. H. fronde ſubſimplici baſi ſetifera: pinnis cuneiformibus acutis conjugatis, capſulis cylindricis: operculo obtuſo. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 5.

bryoides. 4. H. fronde ſimplici apice ſetifera: pinnis oblongis acutis, capſulis oblongis: operculis acutis. *Flor. dan. t.* 473. *f.* 1.

ſemicompletum. 14. H. trunco filiformi ramoſo, foliis alternis: inferioribus bracteolatis; ſuperioribus lanceolatis ſemivaginantibus pinnatis, capſulis ſubſeſſilibus minimis. *Hedw. crypt.* III. 2. *p.* 34. *t.* 13.

acacioides. 5. H. fronde ramoſa apice pedunculifera. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 4. *an hujus tribus?*

adiantoides. 6. H. fronde ſubramoſa medio ſetifera: pinnis oblongis acutis, capſulis ſubcylindricis: operculis acumine brevi. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 3.

ornithopodioides. 6. H. fronde ramoſa: pinnis patentiſſimis ovatis carinatis mucronatis. *Dill. muſc. t.* 34 *f.* 9.

palmatum. 8. H. fronde ſimpliciſſima ſubpalmata apice pedunculifera: pinnis diſtantibus patentibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 140.

polypodioides. 9. H. fronde ſimpliciſſima lanceolata erecta apicem verſus pedunculifera: pinnis obtuſis, pedunculis capſulisque incurvis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 140.

aſplenioides. 10. H. fronde ſubramoſa erecta lineari apice pedunculifera, capſulis incurvis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 140. *Dickſ. crypt. Br.* 2. *t.* 6. *f.* 5. *an cum* 3. *praecedentibus hujus tribus?*

†† *ſurculis confertis.*

ſciuroides. 11. H. ſurculo ſubramoſo, foliis imbricatis ovato-lanceolatis apice piliferis, capſulis oblongis: operculo conico. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 54. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 45. 46.

polycarpon. 90. H. foliis linearibus ſiccitate criſpis, capſulis ad apicem confertis. *Hedw. cryptog.* II. 4. *p.* 99. *t.* 31.

ſtrumoſum. 91. H. foliis lineari-lanceolatis, capſulis incurvis baſi ad latus intumeſcentibus. *Hedw. cryptog.* II. 4. *p.* 102. *t.* 32.

crispatum. 92. H. erectum, foliis subdistichis basi semivaginantibus apice capillaribus, capsulis ovatis rectis. *Hedw. cryptog.* II. 4. *p.* 105. *t.* 133.

** *gemmis in alia, capsulis in alia planta*, peristomatis interni.

† *ciliis apice liberis:* Neckera.

crispum. 12. H. furculis ramosis erectiusculis, foliis distichis oblongis obtusis rugosis, capsulis oblongis: operculo rostrato; rostro reflexo. *Dill. musc. t.* 36. *f.* 12. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 47. 48.

viticulosum. 13. H. furculis ramosis decumbentibus, foliis oblongis acutis patulis, capsulis oblongis: operculis conicis. *Dill. musc. t.* 39. *f.* 43. *Hedw. fund. hist. musc. frond.* 1. *t.* 3. *f.* 11. *et* 2. *t.* 8. *f.* 49. 50.

dendroides. 15. H. furculo erecto inferne nudo superne fasciculato ramoso folioso, foliis lineari-lanceolatis imbricatis, capsulis subcylindricis erectis: operculi rostello incurvo. *Flor. dan. t.* 823. *f.* 2.

curtipendulum. 16. H. furculis erectis ramosis teretibus foliosis, foliis oblongo-ovatis acutis imbricatis, capsulis nutantibus ovatis: operculis acuminatis. *Dill. musc. t.* 43. *f.* 69.

sericeum. 17. H. furculo ramoso repente, foliis oblongis seta terminatis ante imbricatis, capsulis erectis cylindricis: operculis acuminatis recurvis. *Curt. flor. Londin. t.* 126.

aduncum. 18. H. furculo ramoso erecto, foliis lineari-lanceoatis, falcatis carinatis apice setaceis secundis capsulis obliquis oblongis; operculis conicis oblongis. *Dill. musc. t.* 37. *f.* 26.

heteromallum. 107. H. trunco inferius ramoso superius florido, capsulis heteromallis, foliis ovato-acuminatis concavis. *Hedw. cryptog.* III. 2 *p.* 38. *t.* 15.

filiforme. 108. H. trunco subramoso filiformi pendulo, foliis ovatis acutis concavis patulis, capsulis basi annulato-pilifera brevissime pedunculatis. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 41. *t.* 16.

filicoides. 109. H. trunco erecto bifariam ramoso: ramis approximatis, foliis ovato-acutis concavis, capsulis axillaribus: operculo ruguloso. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 45. *t.* 18.

pennatum. 110. H. trunco tenui decumbente ramoso: ramis subramosis, foliis lanceolatis confertis bifariam divergentibus, capsula perichaetio immerse ovata. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 47. *t.* 19.

111. H.

jamaicen- se. 111. H. trunco debili ſubramoſo: ramulis patulis bifariis capſuligeris, foliis oblongo-ovatis: vaſorum faſciculo profunde ſulcato. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 43. *t. t.* 17.

pumilum. 112. H. trunco ramuloſo, foliis lanceolatis reſime acuminatis alternatim confertis bifariam divergentibus, capſula ovata pedunculoque exſertis. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 49. *t.* 20.

albicans. 19. H. ſurculo ramoſo adſcendente, foliis oblongo-lanceolatis apice ſetaceis capſulis oblongis obliquis: operculis conicis obtuſis. *Dill. muſc. t.* 42. *f.* 63.

†† *periſtomatis internis ciliis uniformibus baſi membranacea connexis:* Leskea.

trichomanoides. 20. H. ſurculo ramoſo, foliis diſtichis oblongis ſublunatis obtuſis, capſulis ſubcylindricis: operculi roſtello reflexo. *Willdenom prodr. flor. berol. n.* 941.

filifolium. 21. H. ſurculis ramoſis: ramis breviſſimis, foliis ſubulatis acutis, capſulis oblongis: operculis conicis obtuſis. *Dill. muſc. t.* 42. *f.* 62.

flagellare. 93. H. ſurculis repentibus: ramis erectis ſubſimplicibus, foliis lanceolatis acuminatis apice reflexis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 462.

paluſtre. 22. H. ſurculis repentibus vagis ramoſis, foliis ovatis acutis ſecundis, capſulis cylindricis: operculis obtuſis. *Dill muſc. t.* 37. *f.* 27.

myoſuroides. 23. H. frondibus reptantibus ramoſiſſimis: ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis erecte imbricatis pilo terminatis, capſulis cylindricis. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 51.

attenuatum. 24. H. ſurculis ramoſiſſimis: ramis incurvatis apice gracileſcentibus, foliis ſecundis ovatis carinatis obtuſis, capſulis erectis cuſpidatis. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. p.* 100. *Hedw. cryptog.* 2. *p.* 34. *t.* 12.

complanatum. 25. H. frondibus complanatis ramoſiſſimis, foliis diſtichis imbricatis ovato-obtuſis complicatis, capſulis ovatis: operculo conico. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 7. *Hedw. fund. hiſt. muſc. froud.* 2. *t.* 10. *f.* 62. 64.

ſerpens. 26. H. ſurculis repentibus filiformibus, foliis ſetaceis, capſulis cylindricis inflexis; operculo conico. *Dill. muſc. t.* 42. *f.* 64. A.

ſetaceum. 27. H. ſurculis repentibus: ramis tenuiſſimis filiformibus, foliis ſetaceis, capſulis erectis: operculis acuminatis. *Schrader.*

28. H.

luteſcens. 28. H. furculis procumbentibus, foliis ovato-lanceolatis ſubulatis ſtriatis, capſulis obliquis. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 98.

††† *periſtomatis interni ciliis e membrana difformibus.*

† *frondibus pinnatis.*

Dickſoni. 29. H. fronde ramoſa: pinnis imbricatis acutis diſtichis compreſſis undulatis, perichaetio pedunculum aequante. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 8.

ſilvaticum. 30. H. fronde ramoſa decumbente medio pedunculifera: pinnis acutis. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 6.

†† *furculis vagis.*

lucens. 31. H. furculis ramoſis, frondibus ſubpinnatis: pinnis punctatis. *Dill. muſc. t.* 34.

undulatum. 32. H. furculis ramoſis, frondibus ſubpinnatis: foliis undulatis complicatis. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 11.

ſtramineum. 33. H. furculis ſubramoſis erectis filiformibus, foliis ovato-lanceolatis enervibus imbricatis. *Dickſ. cryptog. Brit. faſc.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 9.

fulgens. 34. H. furculis longiſſimis pendulis, frondibus compreſſis: foliolis diſtichis complicato-carinatis nitidis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 140.

diaphanum. 35. H. furculis erectis ſubdiviſis, foliis bifariis ovatis acuminatis pellucidis planis. *Swarts nov. nov. pl. gen. et ſp. p.* 140.

rugoſum. 36. H. furculis erectiuſculis, foliis ſecundis recurvatis baſi rugoſis. *Mant. p.* 131. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 24.

fluitans. 37. H. furculis ramoſis, foliis ovatis acutis patulis, capſulis oblongis obliquis: operculis conicis. *Willden. prodr. fl. berol. n.* 957.

ruſcifolium. 38. H. furculis ramoſis, foliis imbricatis lato-lanceolatis capſulis ſubrotundis: operculo roſtrato. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 466.

triquetrum. 39. H. ramis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Dill. muſc. t.* 38. *f.* 28. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 7.

ſtriatum. 40. H. ramis recurvis, foliis ovatis lineatis acutis undique patentibus, operculis mucronatis. *Schreb. ſpicil. flor. lipſ. p.* 91. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 1. *f.* 1.

piliferum. 41. H. ramis rectis, foliis ovatis concavis obtuſis apice piliferis, operculis cuſpidatis. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 91.

42. H.

intricatum. 42. H. furculis repentibus : ramis brevibus, foliis laxis lanceolatis acuminatis, capitulis obliquis cernuis : mucrone obliquo. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 99. *Vaill. flor. pariſ. t.* 28. *f.* 2.

albens. 43. H. furculis repentibus ramoſis compreſſis, foliis bifariis ovatis acutis pallidis, captulis ſubnudantibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 140.

††† *furculis pinnatis.*

filicinum. 44. *a.* H. furculo ſimpliciter pinnato, foliis oblongis acuminatis reflexis ſecundis, capſulis ſubcylindricis : operculis conveXis. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 19.

glabellum. 44. H. furculis erectiuſculis ramoſis divaricatis, foliis bifariis imbricatis oblongis obtuſis planis ſubdenticulatis. *Swarts nov pl. gen. et ſp. p.* 140.

proliferum. 45. H. furculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Curt. flor. Lond. t.* 9.

delicatulum. 46. H. furculis ſubproliferis plano-pinnatis cuſpidatis, pedunculis aggregatis. *Dill. muſc. t.* 83. *f.* 6.

parietinum. 47. H. furculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 14. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 4 *f.* 4.

praelongum. 48. H. furculis ſubpinnatis decumbentibus : ramulis remotis, foliis ovatis, capſulis cernuis. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 15.

Criſta caſtrenſis. 49. H. ramulis approximatis ; apicibus recurvis. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 20.

abietinum. 50. H. furculis teretiuſculis remotis inaequalibus. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 17.

plumoſum. 51. H. furculis repentibus : ramis confertis, foliis imbricatis ſubulatis, capiulis erectis. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 16.

†††† *furculorum foliis reflexis.*

cupreſſiforme. 52. H. furculis ſubpinnatis, foliis ſecundis recurvis apice ſubulatis. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 23.

compreſſum. 53. H. furculis compreſſis pinnato-ramoſis, foliis falcatis acuminatis recurvis, capiulis ovatis : operculo brevi conico. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 22.

54. H.

Schreberi. 54. H. ſurculis pinnato-ramoſis apice ſubulatis, foliis oblongis acutis laxe imbricatis, capſulis oblongis: operculis conicis. *Willden. prodr. fl. Berol. n.* 955.

ſcorpioides. 55. H. ramis vagis procumbentibus recurvis, foliis ſecundis acuminatis. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 25.

patulum. 56. H. ſurculis filiformibus repentibus: ramulis vagis breviſſimis, foliis lanceolatis reflexo-patulis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 140.

ſquarroſum. 57. H. ſurculis ramoſis, foliis lanceolatis acutis, capſulis oblongis: operculis acutis. *Flor. dan. t.* 535. *f.* 2.

loreum. 58. H. ſurculis reptantibus; ramis vagis erectis, foliis ſecundis ſubreflexis, capſulis ſubrotundis. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 40.

reptans. 59. H. ſurculis reptantibus: ramis vagis faſciculatisque radicantibus filiformibus, foliis capillaribus patulis capſulis nutantibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 140.

†††† *ſurculis faſciculatis.*

faſciculatum. 60. H. ſurculo erecto: ramis terminalibus confertis ſubdiviſis; ramulis compreſſis, foliis oblongis decuſſatis ſparſis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 140.

tamariſci. 61. H. ſurculo erecto: ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, foliis bifariis ſubtus medio auriculatis: foliolis ſubrotundis acutis carinatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

alopecurum. 62. H. ſurculo erecto: ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, capſulis ſubnutantibus. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 49. *an cum* 2 *praecedentibus hujus tribus?*

†††††† *ſurculis teretiuſculis.*

flexile. 63. H. ſurculis repentibus pendulisque longiſſimis flexuoſis: ramulis vagis abbreviatis teretibus recurvis, foliis confertis ovatis patulis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

nigreſcens. 64. H. ſurculis filiformibus pendulis; ramis brevibus teretibus ſparſis, foliis aequalibus ſubulatis patulis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

denſum. 65. H. ſurculis erectis teretibus: ramis vagis ſimpliciuſculis, foliis approximatis lanceolatis acutis carinatis patulis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

66. H.

compoſi-tum. 66. H. ſurculis ramisque pinnato-ſparſis: ramulis confertis, pedunculis breviſſimis, capſulis erectis: calyptris piloſis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

purum. 67. H. ſurculis pinnato-ſparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis ſubulatis? *Curt. flor. Lond. t.* 207.

Illece-brum. 68. H. ſurculis ramisque vagis teretibus erectiuſculis obtuſis. *Flor. nan. t.* 706. *f.* 1.

polytri-choides. 69. H. ſurculis teretibus erectis ſimplicibus, foliis patulis, pedunculis brevibus, capſula erecta: calyptra piloſa. *Swarts nov pl. gen. et ſp. p.* 141.

riparium. 70. H. ſurculis teretibus ramoſis, foliis acutis patulis diſtantibus. *Flor. dan. t.* 649 *f.* 1.

cuſpida-tum. 71. H. ſurculis pinnato ramoſis apice longe cuſpidatis, foliis oblongo acuminatis, capſulis cylindricis: operculis conicis. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 34.

††††††† *ſurculis confertis.*

capillare. 72. H. ſurculis repentibus filiformibus ramoſis: ramis confertis capillaribus, foliis appreſſis ſubulatis, capſulis ovatis erectis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

tomento-ſum. 73. H. ſurculis repentibus tomentoſis: ramis vagis confertis erectiuſculis, foliis acutis patentibus diſtantibus, capſulis cylindricis nutantibus: operculis incurvis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

depreſ-ſum. 74. H. ſurculis repentibus ramoſis: ramulis depreſſis, foliis lineari-lanceolatis patulis: ſiccis criſpis, capſulis nutantibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 142.

tricho-phyllum. 75. H. ſurculo repente: ramis diſtantibus erectis, foliis capillaribus patentibus, capſulis erectis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 25. *f.* 1.

veluti-num. 76. H. ſurculo repente: ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, capſulis ſubnutantibus. *Flor. dan. t.* 475.

micro-phyllum. 77. H. ſurculis repentibus ramoſis: ramulis filiformibus teretibus erectis, foliis incumbentibus ſubulatis, capſulis obliquis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 142.

ceſpito-ſum. 78. H. ſurculis ſimplicibus erectiuſculis tereti-compreſſis, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis ſurculo brevioribus, capſulis erectis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 142.

79. H.

pungens. 79. H. ſurculis teretibus ramoſis apice attenuatis acutis, foliis lanceolatis ſubulatis patulis rigidiuſculis, pedunculis capillaribus brevibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 142.

congeſtum. 80. H. ſurculis ramoſis declinatis: ramis erectiuſculis apice inflexis, foliis ſecundis ſubcapillaribus, pedunculis brevibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 142.

tetragonum. 81. H. ſurculis repentibus: ramis vagis erectiuſculis tetragonis foliis quadrifariam imbricatis concavis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 142.

torquatum. 82. H. ſurculis repentibus: ramis erectis teretibus, foliis ſiccitate ſpiralibus appreſſis, calyptra coriacea: baſi quinquepartita. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 142.

cirrhoſum. 83. H. ſurculis repentibus: ramis ſubdiviſis, foliis ſiccitate revolutis, capſulis globoſis: capſulis baſi multipartitis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 142.

gracile. 84. H. ſurculis repentibus: ramis faſciculatis teretibus erectiuſculis, capſulis erectis ovatis. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 55.

myoſuron. 85. H. ſurculis ramoſiſſimis ſubulatis incurvatis utrinque attenuatis teretibus. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 50.

clavellatum. 86. H. repens, ramis rectis confertiſſimis capſulis incurvis: operculis reflexis. *Pollich flor. palat. n.* 1055. *ic.*

julaceum. 87. H. ramis erectis teretibus imbricatis obtuſis: perichaetiis longitudine fere pedunculorum. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 56.

Halleri. 88. H. ramulis approximatis brevibus, foliis planis recurvatis. *Hall. hiſt. ſtirp. helv. n.* 1734.

nitens. 89. H. ramis breviſſimis, foliis lanceolatis ſubulatis nitentibus. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 37.

*** *incertae tribus.*

rotundifolium. 94. H. ſurculis repentibus ramoſis foliis ovalibus patentibus diſtichis, capſulis ovatis dentato-ciliatis cernuis. *Scop. fl. carn.* 2. *p.* 339. *n.* 1333. *t.* 62.

atrovirens. 95. H. ſurculis repentibus ramoſis filiformibus, foliis ovato-lanceolatis laxis, capſulis obovatis ciliatis cernuis. *Dill. muſc. p.* 332. *t.* 43. *f.* 68.

flagellatum. 96. H. ſurculis proſtratis inferne elongatis tenuiſſimis nudis ſuperne ramoſis curvatis ſtellulatis, foliis reflexis, capſulis ciliatis ſubcylindricis. *Dill. muſc. p.* 306. *t.* 39. *f.* 42.

97. H.

medium. 97. H. ſurculis repentibus ramoſis, foliis lato-lanceolatis acutis imbricato-patulis, capſulis erectis cylindricis ciliatis. *Dill. muſc. p.* 331. *t.* 42. *f.* 65.

prolixum. 98. H. ſurculis ramoſis elongatis inferne ſubnudis, capſulis ovatis ciliatis: ſetis adſcendentibus abbreviatis. *Dill. muſc. p.* 238. *t.* 38. *f.* 32. *et t.* 85. *f.* 20.

pulchellum. 99. H. ſurculis confertis erectis: ramis ſubfaſciculatis linearibus, ſetis elongatis, capſulis erectis ſubobliquis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 13. *t.* 5. *f.* 6.

filamentoſum. 100. H. ſurculis confertis filiformibus ramoſis, capſulis ovatis ciliatis: perichaetio bulbiformi. *Dill. muſc. p.* 282. *t.* 36. *f.* 18.

molle. 101. H. ſurculis pendulis filiformibus ramoſiſſimis, foliis imbricatis ovatis acutis, capſulis cernuis ſubrotundis. *Dickſ. crypt. Br.* 2. *p.* 11. *t.* 5. *f.* 8.

Smithii. 102. H. ſurculis pinnatis undique ramoſis, foliis ſuborbicularibus ſubconcavis, capſulis ovato-cylindricis: calyptra ſurſum piloſa. *Dickſ. crypt. Br.* 2. *p.* 10. *t.* 5. *f.* 4. *coll. of. driad. pl. n.* 19.

cylindricum. 103. H. ſurculis repentibus: ramis capſulisque cylindricis, foliis erecte imbricatis ovatis acutis. *Dill. muſc. p.* 322. *t.* 41. *f.* 57.

chryſocomum. 104. H. ſurculis erectis ramoſis, foliis oblongo-lanceolatis acutis, multinerviis ſubreflexo-patulis. *Dill. muſc. p.* 302. *t.* 39. *f.* 36.

Ratabulum. 105. H. ramis vagis erectiuſculis, foliis ovatis acutis mucronatis patulis, operculis conicis. *Flor. dan. t.* 824. *f.* 2.

1196. JUNGERMANNIA. *Scyphuli* veſiculiferi *ſquamulae* gemmiferae laterales aut *capitula* pulverulenta. *Capſula* pedunculata, nuda, 4valvis: ſeminibus ſubrotundis.

* *cauleſcentes.*

† *frondibus compoſitis.*

‡ *pinnatis.*

aſplenioides. 1. J. pinnis ovatis ſubciliatis. *Dill. muſc. t.* 69. *f.* 5. 6.

adiantoides. 2. J. frondibus erectis ſubdiviſis: pinnis ovatis obliquis ciliatis, capſulis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 142.

criſtata. 3. J. ſurculis repentibus, frondibus ramoſis erectis: pinnis lanceolatis acutis patentibus incumbentibus margine ſuperiori ſerratis ſubtus lobatis conniventibus criſtatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 143.

proſtrata. 4. J. frondibus filiformibus reptantibus proſtratis ſimpliciuſculis: pinnis alternis ovatis integris. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 143.

ſphagni. 5. J. frondibus reptantibus latere capſuliferis: pinnis ſubrotundis integerrimis imbricatis ſecundis. *Dickſon. crypt. Brit. faſc.* 1. *t.* 6. *t.* 1. *f.* 10.

anguloſa. 6. J. pinnis latiuſculis truncatis obtuſe tridentatis medio pedunculiferis, capſula campanulata. *Dill. muſc. t.* 71. *f.* 22. C. D.

javanica. 7. J. ſurculis ramoſiſſimis, pinnis ovatis imbricatis convexis. *Linn. fil. muſc. p.* 35. *f.* 2. *t.* 1.

viticuloſa. 8. J. pinnis planis nudis dinearibus. *Dill. muſc. t.* 69. *f.* 7.

polyanthus. 9. J. pinnis integerrimis imbricatis convexis. *Dill. muſc. t.* 70. *f.* 9.

ſcalaris. 10. J. pinnis integerrimis ovatis diſtichis, extremo caule ſetifero. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 701. Mnium Trichomanis. *Dill. muſc. t.* 31. *f.* 5.

lanceolata. 11. J. frondibus lanceolatis apice pedunculiferis: pinnis integerrimis. *Dill. muſc. t.* 70. *f.* 10.

perfoliata. 12. J. frondibus confertis erectis indiviſis: pinnis perfoliatis incumbentibus ſecundis ovatis integris. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 143.

bidentata. 13. J. ſurculis procumbentibus ramoſis apice pedunculiferis, pinnis ovatis biculſpidatis: ſtipulis lanceolatis quadridentatis. *Dill. muſc.* 15. *t.* 70. *f.* 11. β) Jungermannia bidentata. *Weiſs cryptog.* 116. *Dill. muſc. t.* 70. *f.* 12.

bicornis. 14. J. pinnis alternis biculſpidatis: cuſpidibus polliniferis. *Flor. dan. t.* 888.

globulifera. 15. J. pinnis emarginato-bidentatis: dentibus apice globuliferis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 481.

emarginata. 16. J. ſurculis ſimplicibus erectis, pinnis ſubrotundis obtuſe emarginatis integerrimis parentibus exſtipulatis. *Ehrh. Hannöv. Mag.* 1784. *n.* 9.

17. J.

setifor-mis. 17. J. furculis simplicibus teretibus filiformibus erectis, pinnis quadripartitis: laciniis lato-subulatis canaliculatis aequalibus, stipulis nullis. *Ehrh. Hannöv. Magaz.* 1784. *n.* 9.

bicuspida-ta. 18. J. frondibus medio pedunculiferis: pinnis distichis inciso-bifidis. *Dill. musc. t.* 70 *f.* 13.

sphaero-cephala. 19. J. frondibus apice globuliferis: pinnis distichis inciso-bidentatis. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 701. Mnium fissum. *Dill. musc. t.* 31. *f.* 6.

connata. 20. J. frondibus vagis: pinnis oppositis incumbentibus apice retusis subemarginatis; posterius connatis bidentatis, capsulis terminalibus: perichaetiis denticulatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 143.

quadri-dentata. 21. J. frondibus prostratis vage ramosis apice floriferis: pinnis quadratis subquadridentatis. *Wulf. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 154.

quinque-dentata. 22. J. frondibus ramosis apice pedunculiferis: pinnis quinquedentatis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 23.

tenera. 23. J. frondibus congestis repentibus: pinnis alternis distantibus subrotundis integris; auriculis subtus medio minutissimis bifidis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 143.

aquatica. 74. J. frondibus teretibus; foliis siccis subtus excavatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 496. *Dill. musc. t.* 69. *f.* 8.

minuta. 75. J. frondibus erectis ramosis: pinnis subtus auriculatis, foliis subrotundis. *Dill. musc. p.* 481. *t.* 69. *f.* 2.

ventrico-sa. 76. J. frondibus medio floriferis, vagina sphaeroidea foliis bifidis. *Dill. musc. p.* 489. *t.* 70 *f.* 14.

spinulosa. 77. J. frondibus erectis ramosis, foliis obovatis dentato-spinosis. *Dill. musc. p.* 489. *t.* 70. *f.* 15.

pauciflo-ra. 78. J. furculis repentibus ramosissimis filiformibus medio floriferis, foliis incurvatis bipartitis, vaginis conicis remotis. *Dickf. crypt. Brit.* 2. *p.* 15. *t.* 5. *f.* 9.

macro-rhiza. 79. J. furculis erectis ramosis apice floriferis, foliolis alternis retusis patulis. *Dickf. crypt. Brit.* 2. *p.* 16. *t.* 5. *f.* 10.

†† *frondibus subbipinnatis.*

pallens. 24. J. frondibus erectis ramosis: pinnis pinnatis incumbentibus subrotundis integris basi semicordatis, perichaetiis monophyllis retusis infundibuliformibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 143.

simplex. 25. J. furculis filiformibus repentibus, frondibus erectis simplicibus: pinnis pinnatis ovatis distantibus ferrato-ciliatis, capsulis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 143.

undulata. 26. J. frondibus supra bipinnatis apice pedunculiferis; pinnulis subrotundis integerrimis undulatis. *Vaill. flor. paris. t.* 19. *f.* 6.

nemorosa. 27. J. frondibus supra bipinnatis apice pedunculiferis: pinnulis ciliatis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 18.

resupinata. 28. J. frondibus supra bipinnatis apice pedunculiferis: pinnulis crenulatis imbricatis rotundis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 19.

serrulata. 29. J. furculis confertis erectis simpliciusculis obtusis supra bipinnatis: pinnulis ovatis concavis bifidis serratis, capsulis terminalibus: perichaetio subulato. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 143.

juniperina. 30. J. frondibus erectis simpliciusculis rigidis supra bipinnatis apice pedunculiferis: pinnulis lanceolato falcatis bifidis secundis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 144.

albicans. 31. J. frondibus supra bipinnatis apice pedunculiferis: pinnulis linearibus recurvis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 20.

capillaris. 32. J. furculis repentibus ramosis capillaribus supra bipinnatis: pinnulis subimbricatis; omnibus tripartitis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 144.

cupressina. 33. J. frondibus procumbentibus confertis pennatis supra bipinnatis: pinnulis imbricatis convexis quadrifidis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p* 144.

trilobata. 34. J. frondibus subtus bipinnatis: pinnulis quadratis obsolete trilobis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 22. 23.

reptans. 35. J. furculis decompositis medio pedunculiferis, foliis quadratis anterius incisis: stipulis quadrifidis. *Dill. musc. t.* 71. *f.* 24.

multiflora. 36. J. fronde repente ramosa; foliolis alternis geminis setaceis aequalibus. *Mant. p.* 310 *Pollich flor. palat. n.* 1063. *tc.*

cochleariformis. 37. J. frondibus subteretibus erectiusculis: foliolis concavis rotundatis. *Syst. nat.* XII. 3. *p* 701. Mnium jungermannia. *Dill. musc. t.* 69. *f.* 1.

barbata. 38. J. furculis elongatis medio pedunculiferis, foliis anterius crenatis, caulículo subtus villoso. *Schreb. spic. flor. Lips. p.* 107.

†† *frondibus imbricatis.*

complanata. 39. J. furculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis aequalibus. *Curt. flor. Lond. t* 271.

transversalis. 40. J. frondibus transversalibus repentibus duplicato imbricatis: foliis subrotundis integris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 144.

flava. 41. J. frondibus repentibus ramosis duplicato-imbricatis, foliis subrotundis: inferioribus minutis bifidis, perichaetio monophyllo retuso. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 144.

diffusa. 42. J. furculis ramosissimis, frondibus dichotomis erectis duplicato imbricatis, foliis ovatis convexis: inferioribus subrotundis denticulatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 144.

stolonifera. 43. J. stolonibus reptantibus filiformibus, frondibus erectis confertis subdivisis duplicato-imbricatis, foliis lanceolatis tridentatis secundis: inferioribus minimis subrotundis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 144.

brachiata. 44. J. frondibus erectis dichotomis duplicato-imbricatis, foliis ovatis planis: inferioribus subrotundis convexis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 144

dilatata. 45. J. furculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Dill. musc. t.* 72. *f.* 27.

tamariscifolia. 46. J. furculis decompositis apice pedunculiferis, foliis subrotundis subtus auriculatis: stipulis ovatis emarginatis. *Dill. musc. t.* 72. *f.* 31.

atrata. 47. J. furculis ramosissimis pendulis capillaribus duplicato-imbricatis, foliis ovatis retusis: interioribus minutis cordatis bifidis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 144.

filiformis. 48. J. frondibus erectis filiformibus simpliciusculis duplicato-imbricatis, foliis subrotundis integris: inferioribus minutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 144.

platyphylla. 49. J. furculis procumbentibus subtus imbricatis, foliis cordatis acutis. *Dill. musc. t.* 72. *f.* 32. 33.

filicina. 50. J. furculis erectis ramosis pennatis pinnatis linearibus duplicato-imbricatis: pinnis ovatis acutis serrulatis; inferioribus subemarginatis dentatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 145.

ciliaris. 51. J. furculis repentibus supra tomentosis, foliis integris tomentosissimis. *Vaillant. flor. Paris. t.* 26. *f.* 11.

vaginata. 52. J. ſurculis repentibus, foliis alternis cuneiformibus retuſis complicatis amplexicaulibus. *Linn. fil. muſc. p.* 35. *t.* 1. *f.* 5.

tomentoſa. 53. J. ſurculis erectis confertis pennatis duplicato-imbricatis: pinnis laciniatis tomentoſis ciliatis, capitulis terminalibus ſolitariis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 145.

varia. 54. J. ſurculis erectiuſculis bifariam imbricatis, foliis bipartitis. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 36.

pulcherrima. 55. J. ſurculis repentibus, foliis duplicato-imbricatis inferne auriculatis ciliatis. *Linn. fil. muſc. p.* 35. *Dill. muſc. t.* 69. *f.* 3. *an diſtincta ſatis a varia?*

bifaria. 56. J. ſurculis erectis ſimpliciuſculis confertis bifariam imbricatis, foliis ſubſecundis ovatis acutis denticulatis, capitulis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 145.

pygmaea. 57. J. ſurculis ſubramoſis repentibus apice florigeris, foliis orbiculato-concavis ſubimbricatis alterne pinnatis. *Wulf. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 152.

puſilla. 58. J. ſurculis breviſſimis apice floriferis, foliis imbricatis anterius crenatis, caulículo ſubtus villoſo. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 46.

julacea. 59. J. ſurculis teretibus erectis, foliis undique imbricatis bidentatis, capitulis pedunculatis. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 38.

rupeſtris. 60. J. ſurculis teretibus, foliis ſubulatis ſecundis. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 40.

trichophylla. 61. J. ſurculis teretibus, foliis capillaceis aequalibus. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 37. *an diſtincta ſatis a multiflora et ſertularioide?*

alpina. 62. J. ſurculis teretibus, foliis ovatis patentibus, calicibus imbricatis. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 39.

ſertularioides. 63. J. ſurculis repentibus: ramulis undique floriferis, foliis capillaceis aequalibus articulatis. *Suppl. p.* 449. *Linn. fil. muſc. p.* 35. *t.* 1. *f.* 6.

curvifolia. 80. J ſurculis repentibus ramoſis teretibus, foliis ſubrotundis acuminatis bifidis: apicibus incurvatis. *Dickſ. cryp. Brit.* 2. *p.* 15. *t.* 5. *f.* 7.

cinerea. 81. J. ſurculis repentibus ſupra bipinnatis medio floriferis; vagina cylindrica, foliis rotundatis. *Dill. muſc. p.* 498. *t.* 72. *f.* 28.

** *acau-*

** *acaules.*

epiphylla. 64. J. folio fundi innato. *Flor. dan. t.* 359.

sinuata. 65. J. fronde plana integra pinnatifidaque sinuata: laciniis coadunatis obtusis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 145.

pinguis. 66. J. fronde oblonga sinuata pingui. *Dill. musc. t.* 74. *f.* 42.

fucoidea. 67. J. fronde erecta supra decomposita: foliis foliolisque oppositis; his linearibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 145.

multifida. 68. J. fronde bipinnatifida. *Dill. musc. t.* 74. *f.* 43.

macrorhiza. 82. J. fronde bipinnatifida plana sinuata patula: apicibus inaequaliter bilobis. *Dill. musc. p.* 511. *t.* 74. *f.* 44.

bipinnata. 69. J. fronde procumbente ramosa bipinnata: pinnis pinnulisque linearibus acutis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 145.

furcata. 70. J. fronde lineari ramosa: extremitatibus furcatis obtusiusculis. *Dill. musc. t.* 74. *f.* 45.

dichotoma. 71. J. fronde lineari dichotoma erectiuscula. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 145.

linearis. 72. J. fronde reptante lineari dichotoma divaricata. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 145.

polyphylla. 73. J. frondibus congestis subrepentibus laciniatis palmatisque, capsulis radicalibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 145.

1197. TARGIONIA.

Cal. 2valvis compressus, fovens in fundo *capsulam* subglobosam, polyspermam.

hypophylla. 1. T. calicibus dehiscentibus, fructificationibus solitariis. *Dill. musc. t.* 78. *f.* 9.

sphaerocarpos. 2. T. calicibus apice perforatis, fructificationibus aggregatis. *Dill. musc. t.* 78. *f.* 17.

1198. MARCHANTIA.

Capsula sessilis, campanulata. *Gemma* peltata pedunculata.

polymorpha. 1. M. furculis obtuse lobatis, capsulis sternatim decemfid *Schmidel ic. plant. et anal. part. t.* 9.

umbellata. 2. M. capsulis multilobis: pedunculo tetraëdro. *Dill. mus t.* 76. *f.* 6. C. D. *et t.* 77. *f.* 7. D.

triloba. 3. M. capſulis hemiſphaericis trilobis. *Schranck flor. bav. 2. p.* 502.

hirſuta. 4. M. capſulis hemiſphaericis octofidis hirſutis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 145.

hemiſphaerica. 5. M. ſurculis crenatis, capſulis hemiſphaericis quinquefidis. *Flor. dan. t.* 762.

chenopoda. 6. M. capſula dimidiata palmata quadrifida. *Dill. muſc. t.* 77. *f.* 8.

quadrata. 7. M. ſurculis dichotomis, capſula tetragona quadrifida ſubtus quadriloculari. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 487.

cruciata. 8. M. capſula quadripartita: laciniis tubulofis. *Dill. muſc. t.* 75. *f.* 5.

conica. 9. M. furculis dichotomis ſinuatis, capſula conica ſubtus ſubquinqueloculari. *Flor. dan. t.* 274.

trilocularis. 10. M. ſurculis dichotomis undulatis, capſula hemiſphaerica integerrima ſubtus triloculari. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 487.

tenella. 11. M. capſula hemiſphaerica apiculata: margine lamellis radiato. *Dill. muſc. t.* 75. *f.* 4.

androgyna. 12. M. ſurculis dichotomis linearibus, capſulis hemiſphaericis integris. *Dill. muſc. t.* 75. *f.* 3.

ALGAE.

1199. BLASIA. *Flos maſculus?* ſeſſilis, ſubgloboſus, frondi immerſus.
Flos femineus? Piſt. 1. *Capſ.* ovata, 1locularis, tubo coronata, per quem ſemina prorumpunt.

pufilla. 1. Blasia. *Flor. dan. t.* 45.

1200. RICCIA. *Capſulae* ſeſſiles, globoſae, 1oculares, frondi ad apicem innatae, ſemina 20-30 alba vel fuſca hemiſphaerica continentes.

cryſtallina. 1. R. frondibus ſuperficie papilloſis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 12.

natans. 2. R. frondibus obcordatis ciliatis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 18.

3. R.

minima. 3. R. frondibus glabris bipartitis acutis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 11.

glauca. 4. R. frondibus glabris canaliculatis bilobis obtuſis. *Flor. dan. t.* 898. *f.* 1. *β*) Riccia ciliata.

reticulata. 5. R. fronde difformi laciniata glabra reticulata. *Dill. muſc. t.* 79. *f.* 21.

fluitans. 6. R. frondibus dichotomis lineari-filiformibus. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 47.

fruticulo-ſa. 7. R. frondibus compreſſis ramoſis: ramis erectis furcatis ſubulatis. *Flor. dan. t.* 898. *f.* 3.

ſinuata. 8. R. frondibus ramoſis, laciniis ſinuatis apice dilatatis crenatis. *Dill. muſc. t.* 19. *f.* 29.

arachnoides. 9. R. frondibus capillaceis implexis. *Flor. dan. t.* 898. *f.* 2.

pyramidata. 10. R. frondibus indiviſis oblongis apice inferne triangulariter incraſſatis, capſulis pyramidatis. *Willden. bot. Magaz.* 4. *p.* 9. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 16.

1201. ANTHOCEROS. *Scyphuli* ſeſſiles, cylindrici integras gemmas granuloſas exhibentes. *Capſ.* ſubulata, ſubbivalvis: ſeminibus diſſepimento adhaerentibus.

laevis. 1. A. fronde plana crenata. *Dill. muſc. t.* 68. *f.* 2.

criſpus. 2. A. fronde ſinuato-laciniata undulata margine criſpa non punctata. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 146. *an diſtincta ſpecies?*

punctatus. 3. A. fronde criſpa ſinuato-laciniata punctata. *Flor. dan. t.* 396.

multifidus. 4. A. frondibus bipinnatifidis linearibus. *Dill. muſc. t.* 88. *f.* 4.

1202. LICHEN. *Gemmae* vel pulverem ſubtiliſſimum inorganicum referentes, vel receptaculis elevatis nitidis farinae cruſtae frondisve immixtis contentae.

* *pulverulenti.*

antiquitatis. 1. L. ater. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus antiquitatis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 18.

cinereus. 2. L. cinereus, rupes operiens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus ſaxatilis. *an mera prioris varietas?*

Jolithus. 3. L. ſanguineus ſaxis innaſcens, violas olens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus Jolithus. *Flor. dan. t.* 899. *f.* 1.

flavus. 4. L. flavus, lignis adnaſcens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus candelaris. *Flor. dan. t.* 840. *f.* 2.

arcumatus. 5. L. croceus. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. p.* 139.

incanus. 6. L. albus, globulis rotundatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus incana. *Dill. muſc.* 3. *t.* 1. *f.* 3.

botryoides. 7. L. viridis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus botryoides. *Flor. dan. t.* 840. *f.* 3.

rubens. 8. L. ruber. *Hoffmann lichen. p.* 4. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 5. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 550. *n.* 1578?

roſeus. 9. L. conglomeratus roſeus. *Schreb. ſpicil. flor. Lipſ. p.* 140. *an lichen?*

odoratus. 10. L. fugax odoratus miniatus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 491. *an mera rubentis varietas?*

putredinis. 11. L. tenuiſſimus purpureus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 491. *an mera rubentis varietas?*

luteſcens. 12. L. verrucoſus ſulphureus. *Hoffm. lichen. p.* 3. *n.* 3.

variegatus. 13. L. cruſta rubro alboque colore varia. *Hagen lichen. p.* 41. *n.* 8. *t.* 1. *f.* 1.

villoſus. 345. L ater villoſus. *Haller hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1082.

albus. 14. L. pulverulento-cruſtaceus albiſſimus. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus lactea. *Flor. dan. t.* 840. *f.* 4.

graminеus. 15. L. pulverulento-cruſtaceus elegantiſſime viridis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 491.

16. L.

ferrugine-us. 16. L. pulverulento-cryſtaceus minoſus cinereus. *Hoffm. lichen. p.* 9. *n.* 12. *t.* 2. *f.* 3. *an tuberculoſi varietas?*

tubercu-loſus. 17. L. pulverulento-cruſtaceus verrucoſus ſubcinereus. *Hoffm. lichen. p.* 9. *n.* 11. *t.* 2. *f.* 1.

farinoſus. 18. L. cruſta pulverulenta candida. *Hoffm. lichen. p.* 8. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 1.

** *leproſi.*

† *tuberculati*, Verrucariae.

ſcriptus. 19. L. albicans, lineolis atris planis diviſis ſimplicibusque. *Hoffm. lichen. t.* 11. *f.* 2. a. b. c. d. β) Lichen hebraicus. *Hoffm. lichen. p.* 13. *t.* 3. *f.* 2. e. γ) Lichen pulivaris. *Hoffm. lichen. p.* 14. *t.* 3. *f.* 2. f.

geogra-phicus. 20. L. flaveſcens lineolis ramoſis punctisque nigris mappam referens. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 5.

rugoſus. 21. L. albicans, lineolis ſimplicibus punctisque nigris confertis. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 2.

atrovi-rens. 22. L. viridis, margine tuberculisque atris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 2.

paraſiti-cus. 23. L. farinoſus albicans, tuberculis ſtipitatis congeſtis nigris. *Hoffm. lichen. p.* 39. *n.* 48. *t.* 8. *f.* 5.

fuſcus. 24. L. viridis; tuberculis ſtipitatis congeſtis fuſcis. *Hoffm. lichen. p.* 39. *n.* 47. *t.* 8. *f.* 4.

byſſoides. 25. L. farinoſus, peltis ſtipitatis ſubglobooſis. *Mant. p.* 133. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 5. *an mera fungiformis varietas?*

fungifor-mis. 26. L. glauco-vireſcens, tuberculis planis ſtipitatis fuſcis. β) *Weber ſpic flor. goett. p.* 196. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 4.

fungoi-des. 27. L. candidus, tuberculis ſtipitatis capitatis difformibus ſubcarneis ſtipite longioribus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 146.

oculatus. L. fungoſo-papilloſus albus: tuberculis ſeſſilibus ſtipitatisve nigris. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 17. *t.* 6. *f.* 3.

rufus. 28. L. fuſcus, tuberculis ſtipitatis planis ſubfuſcis. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 4.

ericeto-rum. 29. L. albidus, tuberculis ſtipitatis convexis carneis. *Hoffm. lichen. t.* 8. *f.* 3.

capitatus. 30. L. luteo-vireſcens, tuberculis ſtipitatis ſphaericis concoloribus. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 726. Mucor furfuraceus.

31. L.

albo-caerulescens. 31. L. albus, tuberculis caerulescentibus annulo atro circumscriptis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 184. *t.* 15. *f.* 1.

fabuletorum. 32. L. virescens, tuberculis substipitatis planiusculis atris. *Schreb. spic. flor. Lipf. p.* 134. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 3. *t.* 2. *f.* 1.

Icmadophila. 33. L. cinereus, tuberculis sessilibus planis carneis. *Flor. dan. t.* 472. *f.* 4.

candidus. 34. L. candidissimus margine sublobatus, tuberculis sessilibus glauco-caeruleiscentibus. *Weber spic. flor. goett. p.* 193. *Hoffm. lichen. t.* 4. *f.* 6.

elveloides. 35. L. glauco-virescens, tuberculis sessilibus planis aetate undulatis. *Weber spicil. flor. goett. p.* 186.

viridatus. 36. L. crustaceus verniciformis, tuberculis sessilibus planis. *Weber spic. flor. goett. p.* 187.

querneus. 37. L. fusco-flavescens, tuberculis subimmersis atris. *Dickf. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 3.

hemisphaericus. 38. L. luteiscens, tuberculis immersis atris politis. *Hagen lichen. p.* 48. *n.* 15.

coccineus. 39. L. farinaceus viridi-sulphureus, tuberculis immersis ruberrimis. *Dickf. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 1.

lacteus. 41. L. albus, tuberculis concoloribus hemisphaericis. *Mant. p.* 132. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 4. a. b.

rupicola. 42. L. albidus, tuberculis pallidis albo-marginatis. *Mant. p.* 132. *Hoffm. lichen. t.* 6. *f.* 3.

pertusus. 43. L. verrucis subtessellatis laevigatis pertusis poro uno alterove cylindrico. *Mant. p.* 131. *Flor. dan. t.* 766. *Hoffm. lichen. p.* 16. 17. *t.* 3. *f.* 3. *β) Hoffm. lichen. t.* 3. *f.* 4. *γ) Hagen lichen. t.* 1. *f.* 3. *δ) Schranck fl. bav.* 2. *p.* 510. *n.* 1489?

punctiformis. 336. L. cinereus, tuberculis punctiformibus nigris pertusis immersis tandem prominulis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 573.

muscorum. 44. L. farinosus incanus, tuberculis atris. *Rethan flor. cant. p.* 424. *ic.*

petraeus. 45. L. farinaceus viridi-cinerascens, tuberculis inaequalibus convexis atris. *Wulfen berl. Naturforsch. Schr.* 8. *p.* 89. *nomine idem cum l. fabuletorum?*

caneseens. 46. L. incanus, tuberculis nigris confertis. *Dill. musc. t.* 18. *f.* 17. A.

47. L.

caeruleo-nigricans. 47. L. caeruleſcens tuberculis nigricantibus. *Lightf. flor. ſcot.* 805. *Dill. muſc. t.* 82. *f* 2.

eſculentus. 48. L albus, tuberculis rugoſis griſeis. *Pall. it.* 3. *p.* 760. *t.* 1. *f.* 4.

graniformis. 49. L. cruſta albeſcente granulata, tuberculis atris. *Hagen. lichen. p.* 47. *t.* 1. *f.* 2.

concentricus. L. albus, tuberculis planis atris ſpirae in modum congeſtis. *Linck. Ann. Naturgeſch.* 1. *p.* 36.

confluens. 50. L. ſubcinereus, tuberculis maximis aterrimis aetate confluentibus. *Weber ſpicil. flor. goett. p.* 180. *t.* 2.

lutereus. 50*. L. cinereus, tuberculis ſparſis luteſcentibus. *Arboreus. Schrader.*

ſphaeroides. 51. L. cinereo virеſcens, tuberculis globoſis incarnatis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 9. *t.* 2 *f.* 2.

flavo-fuſcus. 51*. L. cruſtaceus flavus, tuberculis carnoſis irregularibus pallide fuſcis. *Ad arenarium. Schrader.*

ſanguinarius. 52. L. cinereo virеſcens, tuberculis atris. *Mant. p.* 507. *Wulff ap Jacq. coll.* 3. *t.* 5. *f.* 3. b. β) *Hoffm. lichen. t.* 5. *f.* 4. γ) *Hoffm lichen. t.* 5. *f.* 5.

colliculoſus. 53. L. cinereo virеſcens, tuberculis albis. *Hoffm. lichen. p.* 17. *n.* 19. *t.* 2. *f.* 2. *nonne potius ſphaeria?*

viridulus. 54. L. tuberculis hemiſphaericis viridibus. *Hoffm. lichen. p.* 18. *n.* 20. *t.* 2. *f.* 6.

ſulphureus. 55. L. rimoſus gibboſiuſculus ſulphureus, tuberculis nigris irregularibus minutis *Hoffm. lichen. p.* 32. *n.* 40. *t.* 4. *f.* 1. *pl. lichen.* 2. *t.* 11. *f.* 3.

fuſco-ater. 56. L. fuſcus tuberculis atris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 3. 4. *et* 3. *t.* 6. *f.* 2. bb.

vernalis. 57. L albidus, tuberculis ſubrotundis ferrugineis. *Hoffm. lichen. t.* 5. *f.* 1.

vernici-formis. 58. L. cruſta verniciformi glauco-virеſcente linea duplici griſea circumſcripta: tuberculis planis albidis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 494.

calcarius. 59. L. candidus, tuberculis atris. *Dill. muſc. t.* 18. *f* 8.

albo-ater. 60. L. albus, tuberculis nigricantibus. *Hoffm. lichen. p.* 30. *n.* 35.

cineraſcens. 61. L. tuberculis nigris albo-marginatis. *Mant. p.* 132. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 5. 6.

62. L.

atro-albus. 62. L. niger, tuberculis albis ſubmarginatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 1.

niger. 63. L. ater, tuberculis ſubrotundis concoloribus. *Suppl. p.* 449. *Hoffm. lichen. t.* 3. *f.* 6. *β*) Lichen terminalis. *Flor. dan. t.* 879. *f.* 1.

Oederi. 64. L. rimoſus ruber, tuberculis nigris congeſtis innatis. *Flor. dan. t.* 470. *f.* 1.

ventoſus. 65. L. flavus, tuberculis rubris. *Flor. dan. t.* 472. *f.* 1. *an cruenti varietas?*

fagineus. 66. L. albus, tuberculis albis farinaceis. *Hoffm. lichen. t.* 2. *f.* 4. *β*) *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 11. C. *γ*) *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 11. A. B. *δ*) *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 11. D.

batulinus. 67. L. albus, tuberculo centrali concolore. *Hudſ. flor. angl. ed.* 2. *p.* 525.

ferrugi-noſus. 68. L. albicans, tuberculis rufis. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 4. *et t.* 55. *f.* 8.

roſaceus. 69. L. tuberculis niveis nigro-punctatis. *Flor. dan. t.* 825. *f.* 1.

cinereo-fuſcus. 70. L. tenuis cinereus, tuberculis fuſcis planis aetate convexis. *Weber ſpic. flor. goett. p.* 188.

flavo-vireſcens. 71. L. cruſtaceus tener adhaerens albo-ſubvireſcens, tuberculis lentiformibus triſte luteolis. *Wulfen berl. Naturf. Schr.* 8. *p.* 122. *ap. Jacq coll.* 2. *t.* 13. *f.* 46.

flavo-rubeſcens. 72. L. vireſcens, tuberculis flavo-rubeſcentibus. *Hudſ. flor. angl. p.* 443. *n.* 11.

petroſus. 73. L. cruſta ſubnulla, tuberculis duris convexis. *Weber ſpic. flor. goett. p.* 190.

circumſcriptus. 74. L. cruſtaceus canus, margine ſerpentino atro, tuberulis diſci lentiformibus concoloribus. *Wulfen berl. Naturf. Schr.* 8. *p.* 123.

ochro-chlorus. 316. L. albicans, tuberculis laevibus ſubgloboſis olivaceo-flavis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 101. *t.* 2 *f.* 1.

rutilus. 317. L. nigricans, tuberculis globoſis ſaturate aurantiis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 101. *t.* 6. *f.* 2. *litt.* c.

calvus. L. albidus nigro-peruloſus, tuberculis pulvinatis ſparſis glabris nitidis obſcure fulvis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 18. *t.* 6. *f.* 4.

†† *scutellato-tuberculati.*

carpineus. 75. L. albidus, tuberculis sessilibus confertis: junioribus scutelliformibus marginatis, aetate convexis cinerascentibus.

lentiger. 76. L. albus margine subfoliaceus, tuberculis confertis sessilibus: junioribus scutelliformibus albo-marginatis, aetate convexis flavescentibus. *Weber spic. flor. goett. p.* 192. *Hoffm. lichen.* 2. *t.* 9. *f.* 4.

anguloſus. 77. L. ſc. albidus, ſcutellis confertis albidis in tubercula demum abeuntibus. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. n.* 1137.

viridiater. 78. L. pallide e flavo virescens, tuberculis atris tandem subscutellatis. *Wulf. apud Jacq. coll.* 2. *p.* 186.

candelarius. 79. L. crustaceus luteus: junior pulverulentus scutellatus; aetate subfoliaceus tuberculosus. *Hoffm. lichen.* 2. *t.* 9. *f.* 3. *β?*) Lichen flavescens. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 18. A. C.

elegans. L. imbricatus margine foliaceus: foliis appressis explicatis aurantiis, tuberculis concoloribus. *Linck Ann. Naturg.* 1. *p.* 37.

Linckii. L. pulverulentus flavus, scutellis immersis aurantiis. *Linck Ann. Naturg.* 1. *p.* 37.

gelidus. 80. L. albicans, peltis tuberculosis rugosis testaceis. *Mant. p.* 133. *Flor. dan. t.* 170. *f.* 2.

carbonarius. 80*. L. farinosus ater, tuberculis scutellisque concoloribus. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 93. *et ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 6. *f.* 2 l. bb.

vitellinus. 80**. L. vitellinus: patellis concoloribus. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 5. *t.* 26. *f.* 1. *et t.* 27. *f.* 2.

virideſcens. 80***. L. viridis tuberculis confertis rugosis fusco-nigrescentibus. *Ad arenarium. Schrader.*

androgynus. 81. L. crustaceus albicans, tuberculis pulverulentis scutellisque pallidis: margine albo crenulato-pulverulento. *Hoffm. lichen. p.* 56. *n.* 70. *t.* 7. *f.* 3.

ocellatus. 82. L. crustaceus ramosus cinereo fuscescens, scutellis tuberculisque nigris: margine cinereo integro. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 96.

griseus. 84. L. ater tenuissimus: tuberculis griseis. *Willden. botan. Mag.* 4. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 4.

Haematomma. 85. L. tartareus albidus, verrucis marginatis truncatis sanguineis. *Hoffm. pl. lichen.* 2. *p.* 53. *t.* 11. *f.* 1.

rosatus. 318. L. pallide roseus crustaceo-glebosus late effusus. *Wulff. ap. Jacq. coll* 3. *p.* 100. *t.* 1. *f.* 1.

albo-incarnatus. 319. L. tener glebulosus albus tuberculis lentiformibus incarnatis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 106. *t.* 2 *f.* 3.

elveliformis. 320. L. glebulis concavo-pelviformibus supra rubens, subtus et margine albus, tuberculis submarginalibus globosis atris. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 108. *t.* 3. *f.* 3.

sanguineo-ater. 321. L. albido virescens, tuberculis hemisphaerico-convexis immarginatis saturate sanguineis ex rubro tandem atris. *Wulff. ap. Jacq. collect.* 3. *p.* 117.

111 *scutellati*, Scutellariae.

pannosus. 86. L. crustaceus subtus nigro-tomentosus superne sublobatus obsolete multifidus, scutellis convexis rufis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 146.

gossypinus. 87. L. crustaceus capillaceus mollis tomentosus candidus, scutellis nigris margine albidis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 146.

scruposus. 88. L. crustaceus cinereus granosus, scutellis immersis atris: margine crenulato. *Schreb. spicil. flor. Lipf. p.* 133. *Hoffm. pl. liben.* 2. *p.* 54. *t.* 11. *f.* 2. *β) Scop. flor. carn. ad.* 2. *n.* 1375.

clausus. 89. L. crustaceus albicans, scutellis immersis concavis clausis. *Hoffm. liben. p.* 48. *n.* 62.

fulvus. 90. L. sc. luteo-viridis, scutellis fulvis. *Schreb. spic. fil. Lipf. n.* 1139.

badius. 92. L. crustaceus fuscus, scutellis planis badiis. *Swarts nov. act. upf.* 4.

excavatus. 94. L. crustaceus obscure viridis, scutellis immersis excavatis. *Hoffm. liben. p.* 47. *n.* 61. *t.* 7. *f.* 4. *nonne sphaeriae species?*

aeruginosus. 95. L. crustaceus aeruginosus, scutellis cernuis. *Jacq. flor. austr.* 3. *t.* 275.

flaveolus. 96. L. albido-virescens, scutellis rubris planiusculis. *Wulff. ap. Jacq. coll* 2. *t.* 13. *f.* 4. a? *β) Hoffm. liben. t.* 6. *f.* 6.

tartareus. 97. L. crustaceus ex albido virescens, scutellis flavescentibus: margine albo. *Dill. musc. t.* 18. *f.* 12. 13.

98. L.

luteus. 98. L. cinereo-virescens, scutellis luteis margine concoloribus. *Dicks. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 6.

cruentus. 99. L. crustaceus rimosus viridi-flavescens, scutellis rubro-fuscis submarginatis. *Weber spicil. flor. goett. p.* 148. *t.* 1. *an distinctus a ventoso?*

rimosus. 100. L. albicans, crusta rimosa: insulis subrotundo-angulosis, scutellis glaucis margine albis. *Flor. dan. t.* 468. *f.* 3.

flavescens. 101. L. crustaceus verrucosus flavescens, scutellis rubris: margine albo. *Wulfen apud Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 79. *t.* 9. *f.* 1. β) Lichen flavo rubescens. *Huds. flor. angl.* 528. *an idem cum ventoso?*

gibbosus. L. crustaceus verrucosus fuscus, scutellis subimmersis atris crusta marginatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 20. *t.* 6. *f.* 5.

Dicksoni. L. ferrugineo-ochraceus, scutellis elevatis atro-caerulescentibus obtuse marginatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 19. *t.* 6. *f.* 6.

fusco-luteus. L. crustaceus granoso-glebaceus albidus, scutellis planis fordide luteis obsolete marginatis. *Dicks. crypt. Brit.* 2. *p.* 18. *t.* 6. *f.* 2.

pallidus. 102. L. crustaceus subvillosus albicans, scutellis elevatis planis scabris brunneis: margine albo undulato. *Hoffm. lichen. p.* 50. *n.* 66. *t.* 5. *f.* 2. *an varietas subfusci?*

subfuscus. 103. L. crustaceus albicans, scutellis subfuscis; margine cinereo subcrenato. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1005.

salicinis. 103*. L. flavus, scutellis convexiusculis aurantiis margine pallidioribus. *Arboreus. Schrader.*

ater. 104. L. crustaceus albicans rugosus, scutellis atris: margine albo subcrenato. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 710. Lichen subfuscus. *Dill. muse. t.* 18. *f.* 16.

pallescens. 105. L. crustaceus albicans verrucosus, scutellis pallidis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 5.

cupularis. 106. L. crustaceus albo-virescens nigro-punctatus rimosus, scutellis hemisphaericis dilutissime lateritiis: margine convexo exalbido. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 20. B.

marmoreus. 107. L. subcinereus, scutellis subconcavis intus cerneis exterius et margine subhirsutis albis. *Hoffm. lichen. t.* 6. *f.* 4.

rufescens. 108. L. crustaceus lividus, scutellis minutis rufis. *Flor. dan. t.* 825. *f.* 2.

caerulescens. 109. L. albido-caerulescens, scutellis copiosissimis concoloribus. *Hagen lichen. p.* 50. *n.* 26. *t.* 1. *f.* 5.

canus. 110. L. cruſtaceus expanſus glauco-candicans, ſcutellis nigerrimis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 5.

aurantiacus. 111. L. albido-cinereus ſcutellis aurantiacis. *Willden. prodr. flor. berol n.* 1004.

Parellus. 112. L. cruſtaceus albus, peltis concavis concoloribus obtuſis tumentibus. *Hoffm. lichen. p.* 55. *t.* 6. *f.* 2. *pl. lichen.* 2. *t.* 12. *f.* 5.

byſſinus. 113. L. pulverulentus nigricans, ſcutellis planis minutiſſimis flavis albo-marginatis. *Hoffm. lichen. p.* 46. *n.* 59. *t.* 4. *f.* 7.

corallinus. 114. L. ramoſus teres faſciculatus faſtigiatus confertiſſimus albus ſcutellis terminalibus minutiſſimis concoloribus. *Mant. p.* 131. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 13. *f.* 2.

pezizoides. 115. L. cruſta fugaci-glauca, ſcutellis luteo-fuſcis confertis ſerratis. *Weber ſpic. flor. goett. p.* 200. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *t.* 2. *f.* 4.

urceolaris. 337. L. cinereus aut viridis, ſcutellis pallidis hemiſphaericis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 514. *n.* 1501.

upſaliensis. 116. L. cruſtaceus, foliolis ſubulatis ſtriatis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *t.* 2. *f.* 7.

cinereofuſcus. 117. L. cruſtaceus cinereus, patellis complanatis rufeſcentibus tenuiſſime marginatis. *Weber ſpic. flor. goett. p.* 244. *Hoffm. pl. lichen. t.* 12. *f.* 1.

fulgens. 118. L. cruſtaceus flavicans ſublobatus, verrucis carneis. *Swartz nov. act. Upſ.* 4.

albeſcens. 119. L. cruſtaceus cinereus, ſcutellis planis albis farinaceis. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 11. *an mera faginei varietas?*

verrucoſus. 120. L. cruſtaceus cinereus, ſcutellis vireſcentibus. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 9.

melanoſtictos. 121. L. cruſtaceus albicans, ſcutellis rugoſis nigris. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 15.

flavicans. 122. L. cruſtaceus luteo-vireſcens, ſcutellis flavis. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 18.

ſubimbricatus. 123. L. cruſtaceus cinereus ſubimbricatus, ſcutellis atris confertis margine albo. *Relh. flor. cantabr. p.* 427. *ic.*

minutiſſimus. 124. L. flavelcens, ſcutellis fuſcis vix prominentibus: margine albo craſſiori. *Hagen lichen. p.* 61. *n.* 29. *t.* 1. *f.* 7.

marmora-tus. 125. L. pallide roſeus ambitu rivisque ſerpentinis, ſcutellis pulverulentis atro-ſanguineis. *Wulf. ap. Jacq. coll. 2. p.* 178. *t.* B. *f.* 1.

**** Imbricati.*

† *cruſtacei*, Pſorae.

muralis. 126. L. flavo-vireſcens, ſcutellis concoloribus demum luteſcentibus: margine pallido. *Schreb. ſpicil. flor. lipſ. p.* 130. *Hoffm. lichen. 2. t.* 9. *f.* 1. *β*) Lichen murorum. *Hoffm. lichen. 2. p.* 64. *n.* 80. *t.* 9. *f.* 2.

granoſus. 127. L. foliolis oblongis lobatis inciſis cinereis laevibus, ſcutellis nigris: margine crenulato. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 130.

radioſus. 128. L. foliolis obſolete lobatis radiantibus cinereis, ſcutellis minimis fuſcis. *Hoffm. lichen. p.* 62. *n.* 78. *t.* 4. *f.* 5.

caeſius. 129. L. albido-cinereus, ſcutellis concoloribus tuberculis pulverulentis caeſiis. *Hoffm. plant. lichen. faſc. 2. p.* 37. *t.* 8. *f.* 1.

cinnabarinus. 130. L. foliolis minutiſſimis linearibus miniatis, ſcutellis concoloribus. *Hoffm. lichen. p.* 62. *n.* 79.

luridus. 131. L. foliolis craſſis minutis luridis ſinuatis ſubtus albidis; ſcutellis nigris. *Swarts nov. act. upſ.* 4. *Dill. muſc. t.* 30. *f.* 134.

melanoleucos. 132. L. depreſſus, fronde glabra obtuſe lobata albida inferne atra. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 9. *t.* 1. *f.* 2.

candidus. 132*. L. Pſ. albicans ſublobatus, tuberculis glaucis caeruleſcentibus. *Web. ſpic. flor. goett. n.* 279.

orbicularis. 133. L. Pſ. foliolis margine verrucoſis pulverulentis, ſcutellis fuſco-nigricantibus. *Hoffm. lichen. 2. p.* 63. *n.* 85. *t.* 9. *f.* 1.

obſcurus. 134. L. foliolis linearibus multifidis ſubfuſcis, ſcutellis fuſco-atris. *Hudſ. flor. angl. ed. 2. p.* 533.

craſſus. 135. L. foliolis rotundatis crenatis vireſcentibus, ſcutellis planis fulvis. *Hudſ. flor. angl. ed. 2. p.* 530. *Hoffm. lich. 3. t.* 19. *f.* 1.

Acetabulum. 136. foliolis obtuſis laevibus, ſcutellis margine duplicato ſerratis. *Hoffm. lich. 3. p.* 92. *n.* 102. *t.* 18. *f.* 2.

tiliaceus. 137. L. rotunde lobatus pulverulentus albido-glaucus. *Hoffm. lich. 3. p.* 96. *n.* 104. *t.* 16. *f.* 2.

verrucarius. 138. L. ſcrobiculatus, foliis ſubrotundis ſinuatis, ſcutellis rufis. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 1. *f.* 1.

†† *foliacei*, Pulmonariae.

carnoſus. L. foliolis confertiſſimis erectiuſculis rotundatis laceris: margine farinaceo, ſcutellis craſſis elevatis planis ruſis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 7.

ſquamatus. L. foliolis minutis craſſiuſculis rotundatis ſinuato-angulatis glauco-viridibus, ſcutellis convexo-planis ſcabris nigris obſolete marginatis. *Dill. muſc. p.* 228. *t.* 30. *f.* 135.

centrifugus. 139. L. foliolis obſolete multifidis laevibus albidis centrifugis, ſcutellis rufo-fuſcis. *Hoffm. lich.* 2. *t.* 10. *f.* 3.

ſaxicola. 140. L. foliolis multifidis adpreſſis albo-viridantibus centrifugis, ſcutellis parvis flavicanti-fuſceſcentibus in centro congeſtis: margine albido crenulato. *Pollich flor. palat. n.* 1098. *an idem cum murali?*

leucophaeus. L. foliolis minutiſſimis crenato-multifidis glauco-fuſcis: apicibus incraſſatis obtuſiſſimis albo-farinaceis, ſcutellis planis nigris albido-marginatis. *Flor. dan. t.* 955. *f.* 2.

rigidus. 141. L. foliolis teretibus compreſſis ramoſo-multifidis atris centrifugis, ſcutellis ſeſſilibus concavis concoloribus. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 87. *t.* 9. *f.* 6. *et coll.* 2. *t.* 13. *f.* 5.

pictus. 142. L. foliolis multifidis ſinuatis adnatis centrifugis albidis, ſcutellis atris albo-marginatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 146.

ſpecioſus. 325. L. centrifugus ſupra exalbido virore per exſiccationem lacteo-caeruleſcens, foliolis lineari-frondoſis: frondibus pinnatifido-lobatis ciliatis, ſcutellis fuſco-ruſis: margine incano-vireſcente integro crenulatove. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 119. *t.* 7.

quercifolius. 326. L. centrifugus dilute glauceſcens, frondoſo-lobatus, frondibus ſinuato-pinnatifidis: laciniis rotundatis ſinuatis, ſcutellis obſcure rubris albo-marginatis. *Wulff. ap. Jacq. Coll.* 3. *p.* 127. *t.* 9. *f.* 2.

patellatus. 327. L. ſaturate viridis depreſſus plicato-lobatus: lobis ſinuato-undatis, ſcutellis ſubcutaneis ſubſeſſilibus ſubcrenulatis concoloribus: exterius tuberculis albis farinaceo-leproſis inaequalibus. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 125. *t.* 9. *f.* 1.

laciniatus. 338. L. foliolis multilobis: lineis elevatis reticulatis farinosis, subtus niger hispidus. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 520. *Dill. musc. t.* 20. *f.* 42. 43.

omphalodes. 143. L. foliolis multifidis glabris obtusis incanis, punctis vagis eminentibus. *β) Hoffm. lich.* 2. *t.* 12. *f.* 2. b. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 15. *f.* 2. a. b.

lanuginosus. 144. L. foliis planis multifidis margine pulverulentis subtus lanuginosis. *Hoffm. lichen. p.* 82. *n.* 97. *t.* 10. *f.* 4.

ciliatus. 145. L. foliolis linearibus multifidis obscure viridibus, scutellis pullis ciliatis. *Hoffm. lichen. p.* 60. *n.* 86. *t.* 14. *f.* 1.

diffusus. 146. L. foliolis angustissimis multifidis in centro pulverulentis scutellis subfuscis. *Hoffm. lichen. p.* 70. *n.* 87.

fahlunensis. 147. L. foliolis linearibus dichotomis planiusculis acutis nigris, scutellis atris. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 10. *f.* 2.

stellaris. 148. L. foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis scutellis pullis. *Hoffm. lich.* 2. *t.* 13. *f.* 1. 2.

stellariformis. 149. L. foliolis oblongis planis laciniatis, scutellis fuscis. *Hoffm. lichen. p.* 73. *n.* 89. *an distinctus satis a stellari?*

pullus. 151. L. foliolis lobatis olivaceis scutellis integerrimis. *Schreb. spicil. flor. lipf. p.* 131. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 13. *f.* 4. B. *an varietas sequentis?*

olivaceus. 152. L. foliolis lobatis nitidis olivaceis scutellis crenatis. *β) Hoffm. lich.* 3. *t.* 13. *f.* 5.

pulchellus. 153. L. canus foliolis subpinnato-lobatis centrifugis ciliatis scutellis cinereis albo-marginatis. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 2. *p.* 199. *t.* 16. *f.* 2.

pulverulentus. 154. L. foliolis lobatis crenatis obtusis viridibus polline consperfis, scutellis nigris margine crenatis. *Schreb. spicil. flor. lipf. p.* 128. *Hoffm. pl. lichen.* 2. *p.* 39. *t.* 8. *f.* 2. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 15. *f.* 2. a. b.

quercinus. 155. L. frondibus obtuse lobatis glaucis glabris, scutellis badiis margine crenatis. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1018.

stygius. 156. L. foliolis palmatis recurvis atris. *Hoffm. lich.* 2. *t.* 14. *f.* 2. *plant. lichen.* II. 1. *p.* 3. *t.* 25. *f.* 2.

saxatilis. 157. L. foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis badiis. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 15. *f.* 1. *β) Hoffm. lich.* 3. *t.* 16. *f.* 1.

Cocoës. 158. L. foliolis sinuatis candidis adnatis, scutellis sparsis atris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 146.

parietinus. 159. L. foliolis crispis fulvis, peltis concoloribus. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 18. *f.* 1.

angustatus. 160. L. foliolis linearibus diffusis crenatis, punctis eminentibus nigris. *Hoffm. lichen. p.* 77. *n.* 94. *t.* 11. *f.* 1.

luteolus. 161. L. viridi-cinerascens centrifugus, tuberculis lentiformibus aggregatis pallide luteolis. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 86.

physodes. 162. L. foliolis angustis apice inflatis, scutellis pedicellatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 8.

squamosus. 163. L. scutellis margine crispis fuscis. *Hoffm. lichen. p.* 100. *n.* 107.

atratus. 314. L. scutellis atratis concoloribus. *Hedwig cryptogam.* II. 3. *t.* 21. *f.* A.

cerinus. 315. L. crustaceus albidus, scutellis concoloribus medio cerinis. *Hedw. crypt.* II. 3. *t.* 25. *f.* B.

laqueatus. 322. L. supra viridis subtus et margine albus, scutellis flavis albo-marginatis in hemisphaerica demum tubercula abeuntibus. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 3. *p.* 109. *t.* 5. *f.* 2.

albo-flavescens. 323. L. albus nodulose-verrucosus, scutellis aurantiis: margine tumidiusculo albo. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 111. *t.* 5. *f.* 1.

fusco-rubens. 324. L. tenacissimus ex fusco rubens, scutellis rubellis: margine tumido concolore introrsum crenato. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 112. *t.* 2. *f.* 2.

tenax. 165. L. plumbeus sinuato-lobatus, scutellis sparsis excavatis aureis. *Swarts nov. act. Upf.* 4.

**** *Gelatinosi.*

crispus. 166. L. foliolis imbricatis lobatis truncatis crenatis atro-viridibus, scutellis crenulatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 10. *f.* 1.

jacobaeae-folius. 339. L. ex atro virens foliolis multipartitis crispis, scutellis ex atro sanguineis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 530. *Dill. musc. t.* 19. *f.* 50?

cristatus. 167. L. foliolis imbricatis dentato-ciliatis, scutellis rubris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 12. *f.* 1.

pulcher. 168. L. imbricatus viridis exasperatus undique concolor scutellis rufescentibus: margine crenulato. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 259. *Dill. musc. t.* 19. *f.* 22.

herbaceus. 169. L. lobatus, foliis imbricatis obtuse crenatis glabris; scutellis fulvis. *Hoffm. pl. lich.* 2. *p.* 51. *t.* 10. *f.* 2.

170. L.

granulatus. 170. L. imbricatus, foliolis ſubrotundis crenatis ſcabriuſculis atro-viridibus, ſcutellis fulvis: diſco depreſſo. *Suppl. p.* 450. *Dill. muſc. t.* 19. *f.* 24. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 3. *t.* 10 *f.* 2.

Tremella. 171. L. atroviridis, foliorum ſegmentis capillaceis ſcutello exiguis puniceis. *Syſt. nat.* XII. 3 *p.* 714. Tremella lichenoides. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 11. *f.* 1.

nigreſcens. 169*. L. foliaceus ſubrotundus lobatus rugoſus atro-virens, ſcutellis confertis rugoſis. *Suppl. p.* 451. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 10. *f.* 3.

faſcicularis. 172. L. foliaceus erectus, ſcutellis terminalibus: junioribus concavis virescentibus; aetate turbinatis rufeſcentibus. *Mant. p.* 133. *Flor. dan. t.* 462. *f.* 2.

rupeſtris. 174. L. foliaceus lobatus: lobis obtuſis, ſcutellis ſparſis minutis concoloribus. *Linn. fil. de muſc. p.* 37. *Dill. muſc. t.* 19. *f.* 22.

oputioides. 328. proſtratus ramoſiſſimus: ramis diffuſis ſubarticulatis ſubreniformi-lobatis granulis globoſis undique obſitis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 133. *Dillen. muſc. t.* 19. *f.* 29.

fugax. 329. L. ſuborbiculatus undoſo-plicatus ſublobatus hyalino-nigricans. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 141. *t.* 12. *f.* 2.

coriiformis. 330. L. atro ſubviridescens repens ſinuato-lobatus: lobis ſuberectis repando-criſpis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 142.

***** *Foliacei laciniosi.*

chryſophthalmus. 175. L. ſubimbricatus linearis lacerus ciliatus, peltis elevatis radiatis fulvis. *Mant. p.* 311. *β) Jacq. Collect.* 1. *t.* 4. *f.* 3. a. b. *Nonne potius fruticuloſis accenſendus.*

Burgaſſii. 176. L. criſpus, peltis elevatis exterius muricato-criſpis: fundo depreſſo plano. *Suppl. p.* 450. *Lightf. flor. ſcot. t.* 26.

ciliaris. 178. L. erectiuſculus, laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis. *Flor. dan. t.* 711.

tenellus. 179. L. albus tener, laciniis erectiuſculis obtuſis ciliatis, aetate tubuloſis apertis, ſcutellis nigris ſeſſilibus. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 46.

islandicus. 180. L. adſcendens marginibus elevatis ciliatis, peltis terminalibus. *Flor. dan. t.* 155. *Hoffm. pl. lichen. faſc.* 2. *t.* 9. *f.* 1.

citrinus. 181. L. lobatus ſupra citrinus ſubtus albus, ſcutellis concoloribus inaequaliter marginatis: diſco rufo. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 60. *t.* 20. C.

Endocarpon. 181*. L. trunco plano minuto rotundato-angulato crassiusculo obscuro-viridi nigro-punctato supra albido, peltis immersis. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 20. A.

nivalis. 182. L. adscendens crispus glaber lacunosus: margine elevato. *Flor. dan. t.* 227.

pulmonarius. 183. L. repens supra reticulato-lacunosus subtus fusco-tomentosus, peltis marginalibus. *Hoffm. pl. lichen. fasc.* 1 *t.* 1. *f.* 2. *β)* Lichen viviparus. *Roth bot. Mag.* 4. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 3.

plumbeus. 184. L. repens obtuse lobatus supra lacunosus virescenti-plumbeus, globulis farinosis scuteilisque croceis albo-marginatis sparsis subtus tomentosus ferrugineus. *Roth. bot. Mag.* 4. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 2. *an idem cum verrucario?*

sepincola. 185. L. adscendens subcrenulatus glaber superne castaneus, scutellis concoloribus subterminalibus. *Ehrh. hann. Mag.* 1783. *p.* 207. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 1-10.

furfuraceus. 185*. L. decumbens, furfuraceus laciniis acutis subtus lacunosis atris. *Hoffm. pl. lichen. fasc.* 2. *p.* 45. *t.* 9. *f.* 2.

ampullaceus. 186. L. planiusculus lobatus crenulatus, peltis globosis inflatis. *Jacq. Collect.* 1. *t.* 4. *f.* 3. c.

leucomelas. 187. L. linearis ramosus nigro-subciliatus, peltis subpedunculatis radiatis. *Swarts obs. bot. t.* 11. *f.* 3.

farinaceus. 188. L. erectus compressus ramosus, verrucis marginalibus farinosis. *Dill. musc. t.* 23. *f.* 63.

linearis. 189. L. erectus dichotomus, ramis linearibus divaricatis altero latere canaliculatis, peltis minutis marginalibus. *Linn. fil. musc. p.* 36.

Filix. 190. L. fronde stipitata bifida laciniata lobata: lobis obtusis crenatis, scutellis sparsis planiusculis. *Linn. fil. musc. p.* 36. *t.* 2. *f.* 2.

calicaris. 191. L. erectus linearis ramosus lacunosus convexus mucronatus. *Dill. musc. t.* 23. *f.* 62. A. B. C.

tinctorius. 192. L. erectus, laciniis angustis compressis anastomosantibus: extremitatibus liberis furcatis. *Weber spic. flor. goett.* 241.

fraxineus. 193. L. erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis. *Dill. musc. t.* 22. *f.* 59.

fuciformis. 194. L. rectiusculus laevis subtomentosus ramosus, laciniis lanceolatis. *Mant. p.* 507. *Dill. musc. t.* 22. *f.* 61.

195. L.

fucoides. L. ramoſiſſimus poroſus albido-caneſcens, ramis faſciculatis teretibus: ramulis abbreviatis faſtigiatis ſubulatis obtuſiuſculis, tuberculis lateralibus planiuſculis farinaceis. *Dill. muſc. p.* 167. *t.* 22. *f.* 60.

ſaturninus. L. rotunde lobatus ſupra nigricans ſubtus villoſus cinereus ſcutellis rufis marginatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 8.

membranaceus. L. depreſſus plicato-rugoſus farinaceus albido-ſubſulphureus, ſcutellis ſubconcavis concoloribus. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 1.

prunaſtri. 195. L. erectiuſculus lacunoſus ſubtus tomentoſus albus. *Dill. muſc. t.* 22. *f.* 54. 55.

fallax. 196. L. tenuis ſuperne glaucus inferne candidus nigro-maculatus, ſcutellis terminalibus. *Weber ſpic. flor. goett. p.* 244.

juniperinus. 197. L. criſpus fulvus, peltis fuſcis. *Hoffm. lichen. fuſc.* 2. *p.* 35. *t.* 7. *f.* 2.

caperatus. 198. L. pallide viridis rugoſus margine undulatus.

crocatus. 199. L. lacunoſus luteo-rufeſcens flavo-granulatus: laciniis ſinuatis rotundatis: ſcutellis ſubconcavis fuſco-atris a fronde marginatis. *Dill. muſc. t.* 84. *f.* 12.

glaucus. 200. L. depreſſus lobatus glaber, margine criſpo farinaceo. *Flor. dan. t.* 598.

japonicus. 201. L. depreſſus inciſo-lobatus farinaceus criſpus ſubtus villoſus. *Thunb. flor. jap. p.* 344.

tremelloides. 202. L. plumbeus rugoſo-criſpus glaber, peltis ſparſis rubris. *Suppl. p.* 450.

ornatus. 203. L. erectiuſculus pellucidus criſpus, ſcutellis marginalibus plano-depreſſis rubris margine criſpis. *Suppl. p.* 450.

tenuiſſimus. 204. L. fuſco-vireſcens, foliis digitato-multifidis, ſcutellis ſubimmerſis fuſco-rufeſcentibus margine obtuſis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 8.

cochleatus. 205. L. membranaceus lobatus plicatus obſcuro-virens, ſcutellis rufis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 13. *t.* 2. *f.* 9.

pinaſtri. 205*. L. adſcendens lobatus criſpus: margine pulverulento flavo. *Hoffm. lichen. faſc.* 2. *p.* 33. *t.* 7. *f.* 1. *et t.* 22. *f.* 2.

fraudulentus. 206. L. tenuis ſuperne glaucus inferne candidus nigro-maculatus, ſcutellis terminalibus. *Weber ſpic. flor. goett. p.* 244. *Dill. muſc. t.* 22. *f.* 58. *an glauci varietas?*

semipinnatus. 204*. L. fronde semipinnata canaliculata cinerea. *Leers flor. herb. ed. 2. p.* 261. *Dill. musc. t.* 20. *f.* 46.

damaecornis. 207. L. multipartito-dichotomus glaber subtus tomentosus: apicibus bifidis peltis marginalibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 146.

lacerus. 209. L. depressus rigidus irregularis incisus glaber subtus tomentosus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 146.

flavens. 210. L. foliis lineari-teretibus ramosis fulvis: scutellis planis marginalibus concoloribus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 146.

ceratophyllus. 211. L. rectus, foliolis obtusis cornigeris. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 147.

diaphanus. 212. L. membranaceus pellucidus caerulescens tenerrimus plicato-undulatus, laciniis crispis, scutellis sparsis ferrugineis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 147.

marginellus. 213. L. membranaceus pellucidus lobatus plicato-undulatus, scutellis marginalibus minutis ferrugineis albo-marginatis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 147.

vesiculosus. 214. L. membranaceus pellucidus lobatus undulatus vesiculosus: vesicnlis turbinatis inferne apertis, apice scutelliger: scutellis convexis rufis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 147.

dissectus. 215. L. depressus laciniato-lobatus obtusus laevis utrinque albidus, peltis concavis sparsis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 147.

tomentosus. 216. L. depressus membranaceus rotundatus inciso-lobatus laevissimus: lobis bifidis inferne villoso-tomentosus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 147.

roridus. 217. L. foliis pulposis calcariis glauco polline villosis: scutellis atris. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 260.

pulposus. 218. L. foliis pulposis calcariis fuscis, scutellis atris. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 260.

lobatus. 219. L. fronde rotunde lobata glauca polline concolore scabra, subtus hirta atra. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 261. *Michel. nov. pl. gen. t.* 45. *f.* 1.

serratus. 220. L. viridis concolor, scutellis planis serratis. *Leers flor. herb. p.* 261.

laciniosus. 221. L. repens lobatus glaber, lobis sinuatis, scutellis fulvis. *Hudf. flor. angl. p.* 449. *Dill. musc. t.* 26. *f.* 99.

222. L.

cornicula-tus. 222. L. erectiuſculus ſublacunoſus glaber, laciniis anguſtis corniculatis. *Roth. flor. cantabr. p.* 433. *Dill. muſc. t.* 21. *f.* 54.

****** *Coriacei*, Pettigerae.

fluviatilis. 223. L. repens lobatus obtuſus: lobis margine integerrimis, ſupra viridis: ſubtus ochroleucus parum lacunoſus. *Weber ſpic. flor. goett. p.* 265. *t.* 4.

aquaticus. 224. L. repens lobatus obtuſus, peltis hemiſphaericis maximis. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 44?

ſcopulorum. 225. L. rectus compreſſus linearis nitidus: lateribus verrucoſis. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 60.

reſupinatus. 225*. L. repens lobatus, peltis marginalibus poſticis. *Flor. dan. t.* 764.

venoſus. 226. L. repens ovatus planus ſubtus venoſus villoſus, peltis marginalibus horizontalibus. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 6. *f.* 2.

aphthoſus. 228. L. repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. *Flor. dan. t.* 767. *f.* 1.

verrucifer. 229. L. repens lobatus obtuſus planus: lobis pulmariis ſuperne lente viridibus verrucoſis ſubtus maxima parte atris, peltis lateralibus marginatis. *Weber ſpic. fl. goett. p.* 273.

arcticus. 230. L. repens lobatus obtuſus planus laevis, ſubtus avenius villoſus.

antariticus. 231. L. repens lobatus obtuſus planus glaber ſupra lacunoſus ſubtus bullatus, peltis planis ampliſſimis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 370. *t.* 10. *f.* 1.

caninus. 232. L. repens lobatus obtuſus planus, ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente. *Flor. dan. t.* 767. *f.* 2.

rufus. 233. L. repens profunde lobatus: marginibus obtuſis introflexis, ſubtus villoſus cirrhis nigricantibus, peltis marginalibus adſcendentibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 508. *n.* 101. *Dill. muſc. t.* 27. *f.* 103.

polydactylos. 234. L. repens planus lobatus ſubtus venoſo-villoſus: lobis digitatis divaricatis peltigeris; peltis ovatis adſcendentibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 508. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 4. *f.* 1.

horizontalis. 235. L. repens planus ſubtus avenius, peltis marginalibus horizontalibus. *Flor. dan. t.* 533. *β) Flor. dan. t.* 765.

ſilvaticus. 236. L. repens laciniatus lacunoſus, peltis marginalibus adſcendentibus foſſulisque albis ſphaericis: oſculo regulari. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 4. *f.* 2.

237. L.

perlatus. 237. L. repens lobatus glaber subtus ater, scutellis pedunculatis integris. *Dill. musc. t.* 20. *f.* 39. *β) Dill. musc. t.* 20. *f.* 42.

saccatus. 238. L. repens subrotundus, peltis depressis subtus saccatis. *Flor. dan. t.* 532. *f.* 3.

croceus. 239. L. repens subrotundus planus subtus venosus villosus croceus, peltis sparsis adnatis. *Flor. dan. t.* 263.

sarcoides. 240. L. gelatinosus carneus, scutellis similibus. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 22. *an tremellae potius species?*

perforatus. 241. L. repens lobatus glaber ciliatus subtus ater, lobis extimis aurantiis, peltis perforatis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 116. *t.* 3.

fuliginosus. 242. L. repens sinuato-lobatus scaber subtus spongioso-villosus lacunosus, scutellis planis ferrugineis margine pallidis. *Diekf. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 13. *Dill. musc. t.* 29. *f.* 100.

******* *Umbilicati*, Umbilicariae.

miniatus. 243. L. gibbus punctatus subtus fulvus. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 10. *f.* 3.

exasperatus. 245. L. undique laevis superius asper, tuberculis contortis nigris. *Hoffm. pl. lich. fasc.* 1. *p.* 7. *t.* 2. *f.* 1. 2.

valleus. 244. L. subtus hirsutissimus. *Dill. musc. t.* 82. *f.* 5. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 9. *t.* 26. *f.* 3?

pustulatus. 245*. L. subtus lacunosus, furfure nigro adspersus. *Flor. dan. t.* 597. *n.* 2.

proboscideus. 246. L. peltis turbinatis truncatis perforatis. *Hedw. crypt.* II. 1. *t.* 1. A.

deustus. 247. L. undique laevis, supra cinereus, tuberculis nigris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 15. *f.* 3.

polyphyllus. 250. L. polyphyllus undique laevis atrovinea crenatus. *Dill. musc. t.* 10. *f.* 129. *et* 3. *t.* 2. *f.* 4.

erosus. 251. L. diaphanus inferne albens fibrosus. *Weber spic. flor. goett. p.* 259.

polyrhizos. 252. L. polyphyllus utrinque laevis polyrhizos. *Dill. musc. t.* 30. *f.* 130. *Hoffm. pl. lich. fasc.* 1. *t.* 2. *f.* 3. 4?

Jacquini. 253. L. utrinque laevis plicato-crispus lobatus subtus papillosus ater, supra peltis convexo-depressis concoloribus notatus. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 9. *f.* 3.

mesenterieus. 254. L. utrinque laevis plicato-crispus lobatus subtus glaber supra peltatus. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 85. *t.* 9. *f.* 5.

anthracinus. 255. L. undique laevis plicato-crispus lobatus, peltis omnino nullis. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 9. *f.* 4.

viridis. 256. L. subtus niger supra viridis, punctis elevatis. *Suppl. p.* 451.

flocculosus. 335. L. coriaceus suborbiculatus crispo-lobatus fusco-niger, supra squamoso-flocculosus, subtus laevis sublacunosus. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 99. *t.* 1. *f.* 2.

******** *Scyphiferi.*

foliaceus. 257. L. foliis adscendentibus multifido-laciniatis subtus niveis scyphiferis: scyphulis conicis brevissimis. *Hudf. flor. angl. p.* 457. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 12.

simplex. 258. L. simplicissimus, scyphulis conicis margine integerrimis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 510.

coccifer rus. 259. L. simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 7.

cornucopioides. 260. L. simplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 9. *an mera cocciferi varietas?*

pyxidatus. 261. L. simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 6. B. C. *et f.* 8. B. *β*) Lichen prolifer. *Syst. nat.* XII. 4. *p.* 552. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 6. D.

fimbriatus. 262. L. simplex denticulatus, stipite cylindrico. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 8. 9. *an mera pyxidati varietas?*

gracilis. 263. L. dichotomo-ramosus, tuberculis fuscis. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 13. C. *β*) Lichen polycerus. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 535? *Dill. musc. t.* 15. *f.* 16. E. *an sola aetate minore a deformi distinctus?*

filiformis. 264. L. simplex integerrimus filiformis, tuberculis fuscis. *Hudf. flor. angl. p.* 456. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 10.

digitatus. 265. L. ramosissimus: ramis cylindricis, calicibus integris nodosis. *Dill. musc. t.* 15. *f.* 19. *β?*) Lichen impetiginosus. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 538. *n.* 1552.

ventricosus. 266. L. ramosissimus ventricosus, scyphis dentatis, tuberculis fuscis. *Dill. musc. t.* 15. *f.* 17.

deformis. 267. L. simpliciusculus subventricosus, calicibus dentatis. *Flor. lapp. t.* 11. *f.* 3.

268. L.

cornutus. 268. L. ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calicibus integris. *Hoffm. plant. lichen.* II. 1. *p.* 1. *t.* 25. *f.* 1. *β*?) Lichen clavaeformis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 556. *an mera pyxidati varietas?*

radiatus. 269. L. ſubramoſus cylindricus elongatus, ſcyphis inaequaliter dentatis radiatisque, tuberculis fuſcis. *Schreb. ſpic. flor. lipſ.* 122. *Dill. muſc. t.* 15. *f.* 16.

flammeus. 272. L. tubuloſus ramoſus retuſus croceus. *Suppl p.* 451. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 3. *f.* 1. *an fruticuloſis potius adſcribendus?*

********* *Fruticuloſi*, Coralloides.

botrytis. 270. L. ſubramoſus, tuberculis terminalibus ſphaericis flavobruneis maximis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 512.

triſtis. 271. L. ceſpitoſus, ramis compreſſis ramoſis ſuperne nigricantibus ſcutelliferis. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1966. *t.* 47. *f.* 1.

rangiferinus. 273. L. perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. *α*) alpeſtris. *Flor. dan. t.* 180. *β*) ſilvaticus. *Flor. dan. t.* 539.

furcatus. 274. L. tubuloſus ramoſus, ramis erectis furcatis. *Hudſ. flor. angl. p.* 458. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 27.

ſpinoſus. 275. L. tubuloſus ſpinoſus ramoſiſſimus, ramulis tuberculatis ſubdigitatis. *Hudſ. flor. angl. p.* 459. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 25.

hiſpidus. 276. L. ſolidus ramoſiſſimus badius, ramis divaricatis ſubcompreſſis glabris ſpinuloſis: angulis obtuſis. *Lightf. flor. ſcot.* 883. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 3. *f.* 2. 3.

uncialis. 277. L. perforatus, ramulis breviſſimis acutis. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 22. *β*) Lichen ceranoides. *Dill. muſ. t.* 16. *f.* 21. *γ*) Lichen ramoſus. *Hall. hiſt. ſtirp. helv. n.* 1961.

ſubuliformis. 278. L. tubuloſus filiformis ſubulatus ſimplex ceſpitoſus adſcendens laevis albiſſimus, ramis pauciſſimis breviſſimis, ſaepe nullis. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 15. *t.* 29. *f.* 1-3. *Ehrhart hann. Magaz.* 1784. *n.* 9. *an vere diſtincta ſpecies?*

ſubulatus. 279. L. ſubdichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 26.

280. L.

Cuinam tribui inſerendi lichenes a Clariſſ. Fabricio in *Angliae fodinis carbonariis urbi Whitehaven vicinis reperti, et apud* Ill. Ferber *neue Beytr. zur Mineralg. verſch. Laender &c.* I. *p.* 405. *nominati* cryptarum *atque* urceolarus?

verinicel- 280. L. laevis ſubulatus candidus ſubramoſus, ramis diffuſis;
laris. tuberculis lateralibus globoſis. *Linn. fil. muſc. p.* 37. *Wulf. ap Jacq. collect.* 2. *t.* 12. *f.* 2.

globifer. 281. L. ſolidus laevis, tuberculis globoſis cavis terminalibus. *Mant. p.* 133. *Dill muſc. t* 17. *f.* 35.

paſchalis. 282. L. ſolidus tectus foliolis cruſtaceis. *Flor. dan. t.* 251.

ramulo- 283. L. ſolidus ramoſus tectus, foliolis filamentoſis, tubercu-
ſus. lis globoſis ſolidis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 147.

fragilis. 284. L. ſolidus, ramulis teretibus obtuſis. *Dill. muſc. t.* 17. *f.* 34.

ſertularia. 340. L. ſolidus multifidus albus baſi ferrugineus. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 542 *n.* 1553.

ceſpitoſus. 285. L. erectus ſolidus denſiſſime ceſpitoſus ramoſiſſimus, ramis teretibus furcatis obtuſis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 513.

ſiliquo- 286. L. ſolidus ſubramoſus, tuberculis lateralibus concavis.
ſus. *Hudſ. flor. angl. p* 460. *Dill. muſc. t.* 17. *f.* 38.

aculeatus. 287. L. compreſſus ramoſiſſimus ſolidus caſtaneus, ramis furcatis ſpinuloſis, tuberculis radiatis. *Weber ſpicil. flor. goett. p* 207. *Hoffm. pl. lich faſc.* 1. *t.* 5. *f.* 2.

quisqui- 288. L cinereus ſcaber, ramis brevibus acutis furfure albido
liaris. tectis: ſcutellis nigerrimis. *Leers flor. herbom. n.* 993. *Mich. nov. pl. gen. t.* 53. *f.* 8.

melano- 289. L. ſolidus ramoſus albidus, ramulis foliolisque compreſ-
carpus. ſis, tuberculis globoſis depreſſis atro-tomentoſis. *Swarts nov. pl gen. et ſp. p.* 147.

aggrega- 290. L. perforatus ramoſiſſimus: ramulis erectis, tuberculis
tus. granuloſis aggregatis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 147.

ſpadiceus. 290*. L. erectus ramoſiſſimus fiſtuloſus, ramis vagis ſpinoſiſſimis, ſcutellis terminalibus magnis laceris ſpinoſis ramiferis. *Roth. bot. Mag.* 4. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1. *an idem cum aculeato?*

verruciger. 291. L. ſolidus, ramulis teretibus capitatis. *Suppl. p.* 451.

Papillaria. 292. L. fiſtuloſus aphyllus albidus, ramis pauciſſimis obtuſis breviſſimis, tuberculis terminalibus carneis. *Ehrh. Hann. Mag.* 1783. *p.* 218. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 28.

Roccella. 293. L. ſolidus aphyllus ſubramoſus, tuberculis alternis. *Pluckn. alm. t.* 205. *f.* 6.

294. L.

decipiens. 294. L. ſimplex compreſſiuſculus ſupra lateritius, ſubtus margineque albus, ſcutellis nigris convexis marginalibus. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 8. *t.* 1. *f.* B.

cinchonae. 295. L. teres erectus ramoſiſſimus fulvus. *Wilden. bot. Mag.* 4. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 3.

madreporaeformis. 331. L. e viridi canus, cauliculis erectis fiſtuloſis denſiſſime aggregatis apicem verſus digitato-ſubramoſis: ramulorum apicibus dilute fuſcis. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 3. *p.* 105. *t.* 3. *f.* 2.

fucinus. 332. L. ater tereti-compreſſus ramoſus ramulis utrinque tuberculoſo-denticulatis, ſcutellis ſubterminalibus concoloribus ſeſſilibus pedunculatisque. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 143. *t.* 12. *f.* 3.

muſcicola. L. cruſtaeformis ramoſiſſimus: ramis breviſſimis contextis atroviridibus, ſcutellis concoloribus. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 23. *t.* 6. *f.* 9.

********** *Filamentoſi*, Uſneae.

floridus. 296. L. ramoſus erectus, ſcutellis radiatis. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *t.* 30. *f.* 2. *Tenax.*

plicatus. 297. L. pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Dill. muſc. t.* 11. *f.* 1. *Tenax.*

barbatus. 298. L. pendulus ſubarticulatus, ramis patentibus. *Dill. muſc. t.* 12. *f.* 6. *Tenax.*

citricolorus. 341. L. erectus ramoſiſſimus flavus rufeſcens: ramis fubulatis. *Dill. muſc. t.* 13. *f.* 16.

albidus. 342. L. albus filamentis ſubramoſis longiſſimis complicatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 548. *n.* 1569.

ſaxoſus. 343. L. niger durus. *Dill. muſc.* 2. *t.* 13. *f.* 8.

hippotrichioides. 344. L. ſubſimplex niger capillaris. *Dill. muſc. t.* 13. *f.* 11.

ſubvireſcens. 344. *a.* L. erectus dichotomo-ramoſus, ramis divaricatis apice furcatis nigris. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 7. *t.* 26. *f.* 2.

radiciformis. 300. L. teres ramoſiſſimus glaber radiciformis. *Linn. fil. muſc. p.* 37. *an hujus familiae?*

ſetoſus. 301. L. ſimplex ſubcompreſſus nigricans, tuberculis globoſis acuminatis atris. *Lexſ. flor. hal. n.* 1171.

307. L.

divaricatus. 302. L. pendulus angulatus articulatus intus tomentosus, ramis divaricatis, peltis orbiculatis sessilibus. *Dill. musc. t.* 12. *f.* 5. *Tenax.*

bicolor. 303. L. ramosissimus erectiusculus teres inarticulatus glaber inanis nitidus infra nigricans supra sordide albus, ramis patentissimis subulatis. *Ehrh. hann. Magaz.* 1784. *n.* 9.

usnea. 304. L. pendulus compressus ramosus laevis. *Mant. p.* 131. *Dill. musc. t.* 14. *f.* 31. *et. t.* 54. *f.* 10.

jubatus. 305. L. pendulus, axillis compressis. *Dill. musc. t.* 12. *f.* 7. *Fragilis.*

lanatus. 306. L. ramosissimus decumbens implicatus opacus. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 10. *f.* 5. *Fragilis.*

pubescens. 307. L. ramosissimus decumbens implexus nitidus. *Jacq. misc. austr. t.* 9. *f.* 7. *Fragilis.*

chalybeiformis. 308. L. ramosus divaricatus decumbens implicato-flexuosus. *Flor. dan. t.* 262. *Fragilis.*

hirtus. 309. L. ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 17. *t.* 30. *f.* 1. *Tenax.*

vulpinus. 310. L. ramosissimus erectus fastigiatus inaequali-angulosus. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 10. *f.* 4. *Fragilis.*

articulatus, 311. L. articulatus, ramulis tenuissime punctatis. *Dill. musc. t.* 11. *f.* 4. *Tenax.*

aurantiaco-ater. 311*. L. ramosus aurantiacus apicibus ater, scutellis supra atris subtus aurantiis. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 369. *t.* 11. *f.* 2.

capensis. 312. L. ramosus erectus ciliatus flavus, peltis fulvis radiatis. *Suppl. p.* 451. *Hoffm. pl. lichen. fasc.* 2. *p.* 48. *t.* 10. *f.* 2.

flavidus. 313. L. dichotomo-ramosus teres erectiusculus inanis ochroleucos, ramis divaricatis apice furcatis nigris. *Ehrh. Hann. Mag.* 1784. *n.* 9.

gujanensis. 314. L. purpurascens ramosissimus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 971. *an distincta species?*

reticulatus. 314*. L. ramosissimus decumbens ater, opacus, filamentis reticulatis coadunatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 187. *t.* 13. *f.* 6.

1205. FUCUS. *Globuli* carpomorphi, vel *semina* graniformia sub punctis perforatis latentia.

* Vesiculosi s. *vesiculis mucifluis in substantia frondium aggregatis.*

uvarius. 1. F. caule filiformi ramoso, foliis confertis ovatis fornicatis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 13. *f.* 1?

lendige-rus. 2. F. caule filiformi, ramoso, foliis lanceolatis serratis, vesiculis racemosis siliculosis tuberculosis.

natans. 3. F. caule filiformi ramoso, foliis lanceolatis serratis, vesiculis globosis pedunculatis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 76. *f.* 1. 2.

einarius. 4. F. caule filiformi ramoso, foliis linearibus integerrimis, vesiculis globosis pedunculatis. *Mant. p.* 508. *Seb. mus.* 3. *t.* 101. *f.* 3.

salicifoli-us. 5. F. caule simplici planiusculo, foliis lanceolato-linearibus integerrimis, vesiculis globosis axillaribus sessilibus. *S. G. Gmelin fuc. p.* 98. *Buxb. cent.* 3. *t.* 65. *n.* 1.

turbina-tus. 6. F. caule filiformi subramoso, vesiculis racemosis: una turbinata folio cordato crenato peltata. *S. G. Gmel. fuc. t.* 5. *f.* 1.

serratus. 7. F. fronde plana dichotoma costata serrato-dentata, vesiculis terminalibus tuberculosis. *Reaumur. act. Paris.* 1711. *t.* 9. *f.* 1.

vesiculo-sus. 8. F. fronde plana dichotoma costata integerrima, vesiculis axillaribus geminis: terminalibus tuberculatis. *Borrich. act. Hafn.* 1671. *t.* 7.

divarica-tus. 9. F. fronde plana dichotoma integerrima: axillis divaricatis, vesiculis axillaribus geminis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 5. *an mera vesiculosi varietas?*

inflatus. 10. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata ovato-lanceolata inflata: apice diviso.

ceranoi-des. 11. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, vesiculis tuberculatis bifidis terminalibus. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 13. *β*) Fucus lacerus. *Sp. pl. p.* 1627. *n.* 4.

spiralis. 12. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata: inferne lineari-canaliculata, vesiculis tuberculatis geminis. *Flor. dan. t.* 286. *an vesiculosi varietas?*

13. F.

canalicu- 13. F. fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari,
latus. veſiculis tuberculatis bipartitis obtuſis. *Flor. dan. t.* 244.
β) Fucus exciſus. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 715. *Moriſ. hiſt.*
pl. 3. *t.* 8. *f.* 11.

geniculatus. 14. F. caule ramisque geniculatis, fronde dichotoma pellucida aequali, veſiculis terminalibus. *S. G. Gmelin fuc. p.* 75. *t.* 1. A. *f.* 3.

diſtichus. 15. F. fronde plana dichotoma integerrima lineari, veſiculis tuberculatis mucronatis. *Flor. dan. t.* 351.

peucedanifolius. 16. F. caule compreſſo ramis ramulisque alternis punctis creberrimis geminis exalperatis, frondibus ſubdichotomis lanceolato-oblongis, veſiculis terminalibus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 76. *t.* 1. A. *f.* 4.

articulatus. 17. F. caule plano ſubdichotomo articulato, frondibus lanceolatis geminato-denticulatis: denticulo altero veſiculam ovatam tuberculatam portante. *S. G. Gmel. fuc. p.* 77.

nodoſus. 18. F. fronde compreſſa dichotoma, foliis diſtichis integerrimis, veſiculis innatis ſolitariis dilatatis. *Flor. dan. t.* 146.

pyriferus. 19. F. ſtirpe filiformi dichotoma, frondibus membranaceis enſiformibus ſolitariis ſerratis: terminalibus petiolo inflatis. *Mant. p.* 311.

ſiliquoſus. 20. F. fronde compreſſa ramoſa, foliis diſtichis alternis integerrimis, veſiculis pedunculatis oblongis mucronatis. *Flor. dan. t.* 106.

ſiliculoſus. 21. F. fronde filiformi-compreſſa, foliis alternis ſubſerratis, veſiculis ſubgloboſis pedunculatis mucronatis.

denticulatus. 22. F. caule tereti ramoſo, foliis linearibus denticulatis, veſiculis globoſis pedunculatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 191.

undulatus. 23. F. caule tereti ſubramoſo, foliis confertis ſeſſilibus ovalibus denticulatis undulato-criſpis, veſiculis pedunculatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 191.

ſubrepandus. 24. F. caule compreſſo, ramis alternis, foliis lineari-lanceolatis ſubrepando-dentatis, veſiculis pedunculatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 192.

elongatus. 25. F. fronde filiformi compreſſa dichotoma articulata: geniculis tumidiuſculis. *Reaum. act. Pariſ.* 1712. *p.* 24. *f.* 2.

Roſa marina. 26. F. caule tereti carnoſo ramoſo, foliis perfoliatis verticillatis ſubternis annulo in medio notatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 102. *t.* 5. *f.* 2. *et* 2. a.

loreus. 27. F. fronde filiformi compreſſa dichotoma undique utrinque tuberculata. *Flor. dan. t.* 710. *an hujus tribus?*

foeniculaceus. 28. F. fronde filiformi ramoſiſſima, veſiculis ovatis terminatis foliolis multipartitis obtuſis apice granuloſis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 86. *t.* 2. a. *f.* 3. *β)* Fucus barbatus. *Sp. plant. n.* 19.

Myrica. 29. F. caule hirto ramoſiſſimo: ramis alternis tenuiſſime alternatim denticulatis, veſiculis globoſis pellucidis pedunculatis ramos terminantibus in dentes exeuntibus. *S. G. Gmelin fuc. p.* 88. *t.* 3. *f.* 1.

abrotanoides. 30. F. caulibus filiformibus teretibus ramoſis, frondibus linearimultifidis integerrimis, veſiculis ramorum ramulorumque medio immerſis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 89. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 17.

baccatus. 31. F. caule lignoſo teretiuſculo ramoſo, veſiculis lateralibus pedunculatis immerſisque. *S. G. Gmelin fuc. p.* 90. *t.* 3. *f.* 2. *an diſtincta ſatis ſpecies?*

triqueter. 32. F. fronde ancipiti ramoſa, foliis petiolatis denticulatis, veſiculis immerſis oblongis triquetris. *Mant. p.* 312.

granulatus. 33. F. fronde filiformi ramoſiſſima: ramulis accumulatis, veſiculis ſubrotundis cumulatis ramulis foliisque acutis omnibus innatis. *Flor. dan. t.* 591.

ſelaginoides. 34. F. fronde filiformi ramoſiſſima: ramis dichotomis, foliis ſubulatis alternis baſi veſiculoſis. *Mant. p.* 134. *S. G. Gmel. fuc. p.* 83. *t.* 2. a. *f.* 1.

concatenatus. 35. F. fronde filiformi ramoſiſſima: ramulis dichotomis, veſiculis moniliformibus diſtantibus innatis foliis ſubulatis.

racemoſus. 36. F. caule tereti repenti-ramoſo aphyllo, veſiculis obovatis conferte racemoſis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 191.

trinodis. 37. F. caule tereti ramoſo: ramulis in tres veſiculas inflectis apice ſubulatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 192.

ſeticuloſus. 38. F. teres ramoſus ſparſim papilloſus, ramis baſi in veſicam papilloſam ampliatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 190.

penicilliformis. 39. F. caule plano firmo alato, foliis amplexicaulibus oppoſitis ovato-oblongis, veſiculis ad foliorum exortum ternis. *Seb. muſ.* 3. *p.* 186. *t.* 98. *f.* 1. *an vere diſtincta ſpecies?*

edulis. 40. F. caule tereti glabro ramoſo: ramulis confertis erectis apice bifidis. *Rumpf. amb.* 6. *p.* 181. *t.* 74. *f.* 3. *et t.* 76. A. B. C.

41. F.

angulatus. 41. F. caule planiuſculo, ramis divaricatis dichotomis apice bifidis, verrucis lateralibus axillaribusque ſparſis minutis opacis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 112.

viridis. 42. F. ſtirpe tereti: ramis ramoſiſſimis capillaceis. *Flor. dan. t.* 887. *an hujus tribus?*

rotundus. 43. F. mollis, caule tereti dichotomo, verrucis difformibus caulium ramorumque medio immerſis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 110. *t.* 6. *f.* 3.

furcellatus. 44. F. fronde filiformi dichotoma ramoſiſſima acuminata. *Flor. dan. t.* 419.

faſtigiatus. 45. F. fronde filiformi dichotoma ramoſiſſima faſtigiata obtuſa. *Flor. dan. t.* 393.

lanoſus. 46. F. frondibus capillaceis dichotomis ramoſiſſimis ſcabris.

** globuliferi, *globulis ſimplicibus per plantam ſparſis.*

pſeudoceranoides. 47. F. caulibus ramoſis infra teretibus, globulis inſignibus lateralibus congeſtis pellucidis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 119. *t.* 7. *f.* 4. *an vere diſtincta ſpecies?*

lichenoides. 48. F. cartilagineus pellucidus albus, caule ſuperne flexuoſo ramoſiſſimo, ramulis denticulatis ſubdichotomis, globulis pellucidis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 120. *t.* 8. *f.* 1. 2.

Burſa paſtoris. 49. F. caule ſuperne ramoſo, ramis pinnato-ramoſis: ramulis denticulatis; extimorum ad apicem ſquamulis reniformibus alatis ſeſſilibus apice mucronatis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 121. *t.* 8. *f.* 3.

triangularis. 50. F. caule ramisque linearibus triquetris ſerratis: denticulis trifariam imbricatis patentibus biuncronatis, globulis ſeriatis ſeſſilibus. *S. G. Gmelin fuc. p.* 122. *t.* 8. *f.* 4.

capitatus. 51. F. caule tereti-depreſſo, ramis teretibus ſubulatis alternis confertiſſimis, globulis racemoſis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 123.

corymbiferus. 52. F. fronde lineari plana dichotoma elongata nigra, laciniis arrectis alternis diſtantibus in denticulos exeuntibus, globulis terminalibus creberrimis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 124. *t.* 9.

dentatus. 53. F. membranaceus enervis rubens, fronde ſubpinnata: laciniis denticulatis creberrime punctatis. *Mant. p.* 135. *Flor. dan. t.* 354.

Pilularia. 54. F. caule plano, ramis alternis, fronde pinnatifida: laciniis lanceolatis ſerratis mucronatis, globulis ſolitariis geminisque

que ſeſſilibus pedunculatisque. *S. G. Gmelin fuc. p.* 126. *t.* 10. *f.* 2.

hirſutus. 55. F. fronde filiformi tereti dichotoma obtecta undique hirſutie. *Mant. p.* 134. *t.* 11. *f.* 1.

ericoides. 56. F. filiformis ramoſiſſimus hirtus. *S. G. Gmel. fuc. t.* 11. *f.* 2.

aculeatus. 57. F. fronde filiformi compreſſa ramoſiſſima: dentibus marginalibus ſubulatis alternis erectis. *Flor. dan. t.* 355. *β*) Fucus muſcoides. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 317. *S. G. Gmel. fuc. t.* 12.

lycopodioides. 58. F. fronde filiformi tereti ſubramoſa obtecta undique ſetis. *Flor. dan. t.* 357.

diſcors. 59. F. fronde tereti inermi aculeatiſſima, foliis diſtichis ſubpinnatis lineari-lanceolatis ferratis.

marginalis. 142. F. ſubcartilagineus, fronde filiformi tereti compreſſa ramoſiſſima: margine laterali utroque ſupra tuberculis umbilicatis obſito. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 153.

muſciformis. 143. F. fronde membranacea filiformi ramoſiſſima: ramulis ſetaceis: marginibus caulis ramorumque ciliatis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 154. *t.* 14. *f.* 3.

Tendo. 60. F. fronde filiformi ſimplici cartilaginea ſubdiaphana. *Amoen. ac.* 4. *t.* 3. *f.* 2.

Filum. 61. F. fronde filiformi ſubfragili opaca. *Flor. dan. t.* 821.

longiſſimus. 62. F. cartilagineus caule erecto tereti: ramis longiſſimis, globulis lateralibus ſeſſilibus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 134. *t.* 13.

ſcorpioides. 63. F. lividus, caule tereti lignoſo, ramis apice capillaribus ſupra dentatis: dentibus tumidiuſculis recurvatis. *Flor. dan. t.* 887.

confervoides. 64. F. filiformis teres ramoſiſſimus: ramis ſimplicibus, globulis lateralibus. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 14. *f.* 1.

albus. 65. F. filiformis teretiuſculus ſubdichotomus, geniculis tumidiuſculis, ramis diſtantibus acutis. *Hudſ. flor. angl. p.* 470. *n.* 20.

purpureus. 66. F. filiformis teres ramoſiſſimus: ramis alternis; ramulis confertis globuliferis. *Hudſ. flor. angl. p.* 471. *n.* 22.

coralloides. 67. F. caulibus tereti-triquetris: ramis alternis patentibus; ramulis utrinque denticulatis ſuperne dichotomis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 141.

68. F.

plicatus. 68. F. capillaris uniformis ramoſiſſimus implicatus ſubdiaphanus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 142. *t.* 14. *f.* 2.

corneus. 69. F. cartilagineus, caule teretiuſculo compreſſo ramoſiſſimo, ramis ſubpinnatis: laciniis acutis globuliferis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 144. *t.* 14. *f.* 3.

capillaceus. 70. F. cartilagineo-membranaceus, caule teretiuſculo, medio complanato, ramis oppoſitis congeſtis, foliolis ſetaceis apice globuliferis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 146. *t.* 15. *f.* 1.

rudis. 71. F. caule tereti ramoſiſſimo: ramulis alternis faſciculatis breviſſimis tuberculatis ſcabris. *S. G. Gmel. fuc. p.* 147. *t.* 15. *f.* 2.

aphyllanthos. 72. F. cartilagineus, caulibus teretibus implexis, ſetis terminalibus ſubulatis apice incraſſatis vel bifariam divaricatis, globulis ad divaricationem pellucidis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 148. *Buxb. cent.* 2. *t.* 9. *f.* 1.

ſericeus. 73. F. caule planiuſculo ramoſo: ramis ſuperioribus corymboſis; ſetis tenuiſſimis creberrimis per paria oppoſitis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 149. *t.* 15. *f.* 3.

ſerra. 74. F. caule cartilagineo ſimplici proſtrato ſetis ſubulatis per paria oppoſitis obſeſſo. *S. G. Gmel. fuc. p.* 150. *Buxb. cent.* 2. *t.* 8. *f.* 3.

ſertularioides. 75. F. cartilagineus, caule erecto depreſſo tenuiſſimo ramoſo, frondibus ſetiformibus imbricatis pinnatis: pinnis numeroſiſſimis incurvis integerrimis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 151. *t.* 15. *f.* 4.

plumoſus. 76. F. frondibus cartilagineis lanceolatis bipinnatis plumoſis, caule filiformi compreſſo ramoſo. *Mant. p.* 134. *Flor. dan. t.* 350.

Osmunda. 77. F. caulibus teretibus ramoſiſſimis, apice obtuſo incraſſatis globuliferis, frondibus copioſiſſimis cartilagineis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 155. *t.* 16. *f.* 2.

pinnatifidus. 78. F. frondibus planis ramoſis: ramis dentato-pinnatifidis margine calloſis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 156. *t.* 16. *f.* 3.

abrotanifolius. 79. F. fronde filiformi compreſſa bipinnata: apicibus veſiculoſis dilatatis terminatis globulis hinc tuberculatis. *S. G. Gmel. fuc. t.* 17. *f.* 1.

cartilagineus. 80. F. fronde cartilaginea compreſſa ſupra decompoſito-pinnata: laciniis linearibus. *Giſeck. pl. ic. faſc.* 1. *t.* 25. *β)* Fucus Placomium? *S. G. Gmel. fuc. p.* 153. *t.* 16. *f.* 1.

pistillatus. 81. F. cartilagineus, caule depresso ramoso, ramis setiferis: setis subulatis ex opposito pinnatis, apice globuliferis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 159. *t.* 18. *f.* 1.

crinitus. 82. F. cartilagineus, caule plano ramosissimo, ramulis denticulatis: dentibus simplicibus dichotomisque, globulis sparsis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 160. *t.* 18. *f.* 2. *an hujus tribus?*

spinulosus. 83. F. cartilagineus, caule ramosissimo inferne depresso teretiusculo, ramis explanatis patentibus: ramulis suboppositis utrinque pinnatim setiferis; setis subulatis apice incrassatis. *S. G Gmelin fuc. p.* 161. *t.* 18. *f.* 3.

vermicularis. 84. F. mollis pellucidus, caulibus teretibus ramosis, frondibus teretibus alternatim subpinnatis petiolatis brevissimis apice tumescentibus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 162. *t.* 18. *f.* 4.

gigantinus. 85. F. fronde cartilaginea filiformi-compressa dichotoma, globulis pedunculatis terminalibus subjacente arista.

spinosus. 86. F. aphyllus cartilagineus ramosus, denticulis verticillato-ternis. *Mant. p.* 313. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 15. *f.* 1.

spermophorus. 87. F. fronde membranacea dichotoma compressa capillacea, globulis pedunculatis lateralibus, foliis linearibus multifidis.

papillosus. 88. F. aphyllus caule tereti ramoso: undique seriebus spiralibus papillarum apice multilobarum. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 190.

cespitosus. 89. F. caule tereti ramoso confertim papilloso: papillis attenuatis simplicibus ramulosis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 190.

avifer. 90. F. teres, ramis sparsis, glandulis confertis ovatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 192. *an cum 2 praecedentibus hujus tribus?*

*** penicilliferi, *corpusculis ovatis penicillo terminatis.*

Gaertneri. 91. F. caulibus filiformibus, ramis numerosis trifariam alternis: mediis longissimis, corpusculis penicilliferis ternis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 164. *t.* 19.

Baillovia-na. 92. F. caule supra planiusculo ramoso, filamentis penicillorum minutissimis congestis laxis fluitantibus. *Grisel. epist. cum ic.*

Bastera. 93. F. caule tenui superne ramoso, corpusculis monospermis ovatis alternis. *Bast. op. subs. 2. t.* 3. *p.* 127. *t.* 12. *f.* 1.

**** mem-

**** membranacei, *fronde pellucida colorata: proli-bus deciduis.*

volubilis. 94. F. fronde plana ſpirali perfoliata repando-dentata. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 13. *f.* 2.

ſanguineus. 95. F. frondibus membranaceis ovato-oblongis integerrimis petiolatis, caule tereti ramoſo. *Mant. p.* 136. *Flor. dan. t.* 349.

ciliatus. 96. F. frondibus membranaceis lanceolatis proliferis ciliatis. *Mant. p.* 136. *S. G. Gmel. fuc. t.* 20. *f.* 2. *β)* Fucus ciliatus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 176. *t.* 21. *f.* 1.

holoſetaceus. 97. F. frondibus membranaceis ſubpinnato-ramoſis enervibus: diſco et margine ſetis ſimplicibus dichotomisque. *S. G. Gmelin fuc. p.* 177. *t.* 21. *f.* 2.

ligulatus. 98. F. frondibus membranaceis planis enerviis: margine ſetis longiſſimis ſimplicibus dichotomisque ciliato. *S. G. Gmelin fuc. p.* 178. *t.* 21. *f.* 3.

laceratus. 99. F. frondibus membranaceis aveniis glaberrimis margine undulato-ciliatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 179. *t.* 21. *f.* 4.

criſpus. 100. F. frondibus membranaceis dichotomis: lacinis dilatatis. *Mant. p.* 134. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 6.

criſpatus. 101. F. frondibus membranaceis ſublinearibus ramoſiſſimis criſpis coloratis. *Flor. dan. t.* 826.

alatus. 102. F. frondibus membranaceis ſubdichotomis coſtatis: laciniis alternis decurrentibus bifidis. *Mant. p.* 135. *Flor. dan. t.* 352.

rubens. 103. F. frondibus membranaceis oblongis undulatis ſinuatis, ſtirpe tereti ramoſa. *Mant. cent.* 32. *t.* 32. *an idem cum F. Palmetia?*

venoſus. 104. F. fronde plana oblonga picta venis verrucoſis. *Mant. p.* 312.

vittatus. 105. F. frondibus membranaceis diviſis enſiformibus dentato-criſpatis. *Flor. dan. t.* 353. *β)* Fucus cornatus. *Mant. p.* 312.

ramentaceus. 106. F. frondibus filiformibus ſimplicibus, hinc ramentis foliaceis confertis. *Flor. dan. t.* 356.

contortus. 107. F. frondibus planis enervibus apicem verſus proliferis ad axillas ſubcontortis margine denticulatis utrinque ſubundulatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 181. *t.* 22. *f.* 1.

laciniatus. 108. F. frondibus membranaceis ramoſis: ramis dilatatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 181. *t.* 22. *f.* 2.

Palmetta. 109. F. caule plano ramoſo, frondibus membranaceis aveniis multifido-palmatis crenatis undulatis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 183. *t.* 22. *f.* 3. *et t.* 23.

crenatus. 110. F. caule tereti ramoſo, frondibus membranaceis ovatis nervoſis crenatis ſubundulatis pinnato. *S. G. Gmelin fuc. p.* 182. *t.* 24. *f.* 1.

polypodioides. 111. F. caule teretiuſculo flexuoſo ramoſo, foliis membranaceis enervibus alternatim pinnatis obtuſis integerrimis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 186. *Mart. cent. t.* 32. *n.* 1.

Koelreuteri. 112. F. membranaceo-cartilagineus, caule breviſſimo tereti ramoſo, frondibus integris linearibus, adultioribus papilloſis. *Koelreut. act. Petrop.* 11. *p.* 424. *t.* 23. *f.* 1. 2.

digitatus. 113. F. fronde palmata: foliolis enſiformibus, ſtirpe tereti. *Mant. p.* 134. *Flor. dan. t.* 392.

bicornis. 114. F. fronde membranacea pulverulenta dilatata apice bifida. *S. G. Gmel. fuc. p.* 192.

ſerrulatus. 115. F. caulibus teretibus ramoſis, foliis linearibus ſerrulatis ſimplicibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 189.

linearis. 116. F. frondibus planis linearibus dichotomis ſenſim anguſtioribus apice acutis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 190.

plumaris. 117. F. caule tereti repente ſurſum ramoſo, ramis plumiformibus foliatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 190.

laminoſus. 118. F. frondibus planis dichotomis ſenſim latioribus margine nudis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 191.

foliifer. 119. F. frondibus planis ſenſim dilatatis dichotomis: extimis verrucoſis margine et apice folia lineari-lanceolata integra protrudentibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 191.

truncatus. 120. F. frondibus membranaceis trichotomis tetrachotomisque: laciniis truncatis apice crenato-criſpis. *Pall. it.* 3. *p.* 760.

glacialis. 121. F. fronde plana lineari dichotomo multifida ramoſiſſima ramentis ſubtiliſſimis ciliata. *Pall. it.* 3. *p.* 760.

filicinus. 144. F. fronde coriacea teretiuſcula ramoſiſſima ramis in orbem diffuſis apicem verſus ramoſo-frondoſis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 157. *t.* 15. *f.* 2.

145. F.

fruticulo-sus. 145. F. caule coriaceo tereti filiformi ſupra decompoſito-ramoſiſſimo, ramis ſubſetaceis alternatim laxe ramuloſis: ramulis exiguis ſubpinnato-denticulatis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 159. *t.* 16. *f.* 1.

***** radicati, *radice ramoſa affixi, bullis frondium mucifluis.*

palmatus. 122. F. fronde palmata plana. *S. G. Gmel. fuc. t.* 26.

buccinalis. 123. F. ſtirpe fiſtuloſa, fronde pinnato-palmata coriacea, foliolis enſiformibus integerrimis. *Mant. p.* 312.

eſculentus. 124. F. fronde ſimplici indiviſa enſiformi, ſtirpe tetragona pinnata folium percurrente. *Mant. p.* 135. *Flor. dan. t.* 417.

ſaccharinus. 125. F. fronde ſubſimplici enſiformi, ſtirpe tereti breviſſima. *Flor. dan. t.* 416.

bifidus. 126. F. cartilagineus, frondibus ſubſeſſilibus planis glabris hinc inde veſiculoſis apicem verſus anguſtatis trifidis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 201. *t.* 29. *f.* 2.

anguſtifolius. 127. F. frondibus ſubſeſſilibus membranaceo-cartilagineis ſimplicibuſſimis ſenſim dilatatis apice rotundatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 205.

polyphyllus. 128. F. cartilagineus, caule teretiuſculo ad apicem plano utrinque dentato, frondibus ſenſim dilatatis integris. *S. G. Gmel. fuc. p.* 206. *t.* 31. *f.* 1.

Flagellum. 129. F. ſtirpe ſimpliciſſima aphylla coriaceo-cartilaginea. *S. G. Gmelin fuc. p.* 208.

aceroſus. 130. F. aphyllus, caulibus teretibus ramoſis: ramis diſtichis confertis; undique ſetis filiformibus patentibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 190.

fragilis. 131. F. caulibus filiformibus dichotomis fragilibus faſtigiatis aphyllis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 190.

debilis. 132. F. caulibus teretibus ramoſis ſubfaſtigiatis tubuloſis debilibus aphyllis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 191.

cuneiformis. 133. F. aphyllus, ramis alternis triquetris articulatis: articulis cuneiformibus, angulis ſubulatis dentatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 191. *an hujus generis?*

viſcidus. 134. F. caulibus teretibus dichotomis ramoſis faſtigiatis: apicibus bicornibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 192.

135. F.

prolifer. 135. F. frondeſcens viridis, articulis ovatis planis proliferis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 192.

hypnoides. 136. F. caule ramulisque vage ſparſis filiformibus tereti-compreſſis cartilagineis pinnatis: pinnis ſubulatis. *Wulfen ap. Jacq. collect.* 1. *p.* 352.

flavus. 137. F. ſpongioſus, ramis erectis ſubquinquangularibus laciniato-dentatis areolatis nitidis. *Suppl. p.* 452. *an hujus tribus?*

pinnatus. 138. F. caule repente ramoſiſſimo, frondibus ſimplici-pinnatis: pinnis obtuſis aequalibus approximatis; peltis verticillatis. *Suppl. p.* 452.

****** Agara, *caule frondi ipſi applicato foraminibus cribri inſtar pertuſae.*

Agarum. 139. F. caule erecto plano, fronde orbiculata: margine rarius dentato. *S. Gmel. fuc. p.* 210. *t.* 32.

Clathrus. 140. F. caule tereti ſulcato, fronde orbiculata: margine integerrimo. *S. G. Gmel. fuc. p.* 211. *t.* 33. *an diſtinctus ab Agaro?*

bracteatus. 141. F. frondibus lato-lanceolatis margine ſinuato-proliferis crenatis. *Seb. muſ.* 3. *t.* 103. *n.* 1.

1206. ULVA. *Gemmae* vel *Gongyli* rotundi in membrana diaphana.

pavonia. 1. U. plana reniformis ſeſſilis decuſſatim ſtriata. *Sp. pl. p.* 1630. Fucus pavonius. *Ellis corall. t.* 33. *f.* C.

ſquamaria. 2. U. plana reniformis ſupra longitudinaliter, ſubtus transverſim et concentrice ſtriata. *S. G. Gmel. fuc. p.* 171. *t.* 20. *f.* 1.

montana. 3. U. plana reniformis ſeſſilis aggregata zonata ſubtus incana. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 148.

umbilicalis. 4. U. plana orbicularis ſeſſilis peltata coriacea. *Dill. muſc. t.* 8. *f.* 3.

latiſſima. 5. U. plana oblonga undulata membranacea viridis.

purpurea. 6. U. plana oblonga coriacea purpuraſcens, ſiccata purpureo-violacea. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 524.

lanceolata. 7. U. plana lanceolata. *Dill. muſc. t.* 9. *f.* 5.

reticulata. 8. U. fronde reticulata, ramis linearibus planis varie perforatis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 187.

9. U.

intestina- lis. 9. U. tubulosa simplex aequalis. *Dill. musc. t.* 9. *f.* 7.

Priapus. 10. U. tubulosa simplex intus cellulosa subtus bulbosa. *S. G. Gmel. fuc. p.* 231. *t.* 31. *f.* 2.

glandifor- mis. 11. U. tubulosa simplex glaberrima integerrima utrinque obtusa. *S. G. Gmel. fuc. p.* 232.

lumbrica- lis. 12. U. tubulosa isthmis intercepta. *Mant. p.* 311.

compressa. 13. U. tubulosa ramosa compressa. *Dill. musc. t.* 9. *f.* 8.

rugosa. 14. U. tubulosa ramosa rugosa. *Mant. p.* 311.

articulata. 15. U. tubulosa ramosissima articulata: articulis cylindricis, ramis oppositis. *Morif. hist. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 14.

vermicu- laris. 16. U. tubulosa filiformis subramosa aggregata sursum incrassata, isthmis intercepta candida. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 523.

confervoi- des. 17. U. filiformis articulata: articulis alternatim compressis. *Dill. musc. t.* 6. *f.* 39.

stellata. 18. U. aggregata subsessilis subovata simplicissima: utriculis intercutaneis translucentibus in stellam caudatam digestis. *Wulfen apud Jacq. Coll.* 1. *p.* 351.

oryzifor- mis. 19. U. articulis vesicularibus congestis cohaerentibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 188.

moccana. 20. U. vesiculis ovatis compressis: apicis foramine oblongo. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 188.

cuneata. 21. U. caule tereti undique imbricato, vesiculis cuneiformibus compressis apice perforatis; limbo dilatato concavo. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 188.

labyrin- thiformis. 22. U. cellulis labyrinthiformibus prominentiisque clavatis. *Vandell. therm.* 120. *t.* 2.

Linza. 23. U. fronde oblonga bullata. *Flor. dan. t.* 889.

papillosa. 24. U. lanceolato-subulata undique papillis muricata. *S. G. Gmel. fuc. t.* 6. *f.* 4.

Lactuca. 25. U. palmata prolifera membranacea: ramentis inferne angustatis. *Dill. musc. t.* 8. *f.* 1.

ramosa. 26. U. fronde ramosa plana undulata purpurea. *Hudf. flor. angl. p.* 476.

dichoto- ma. 27. U. fronde dichotoma viridi. *Hudf. flor. angl. p.* 476.

28. U.

Sagarum. 28. U. fuſca, ſuperne punctis elevatis granulata, ſubtus plana. *S. G. Gmel. fuc. p.* 228. *Buxb. comm. Petr.* 3. *t.* 14. *f.* 3.

porrifolia. 29. U. fronde tenui laevi dilute viridi plana integra ſurſum angulata. *Dill. muſc. p.* 46. *t.* 9. *f.* 5.

calenduli-folia. 30. U. atrovirens ſubſtipitata, ſupra verrucis irregularibus rugoſa. *Dill. muſc. p.* 46. *t.* 9. *n.* 4.

✓ 1207. CONFERVA. *Fibrae* ſimplices aut ramoſae, intra quas *gemmae* globuloſae.

* *filamentis ſimplicibus.*

⊢ *aequalibus.*

rivularis. 1. C. filamentis ſimpliciſſimis longiſſimis. *Flor. dan. t.* 881.

fontinalis. 2. C. filamentis ſimpliciſſimis digito brevioribus. *Flor. dan. t.* 651. *f.* 3.

punctalis. 3. C. punctorum ſerie longitudinali. *O. Fr. Müller nov. act. petrop. p.* 3. *hiſt.* 90. *t.* 1. *f.* 1.

porticalis. 4. C. punctorum lineis transverſis arcuatis. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 90. *t.* 1. *f.* 2. 3.

pectinalis. 5. C. filamentis transverſim confertim ſtriatis. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 91. *t.* 1. *f.* 4-7.

piſcium. 63. C. filamentis imbricatis pellucidis ſubclavatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 553.

Chaetophora. 60. C. filamentis e baſi orbiculari parallelis. *O. F. Müller. flor. dan. t.* 660.

lobata. 61. C. graminea filamentis e baſi lobata parallelis. *Schranck Naturf.* 19. *t.* 7. *f.* 2. 3.

lanceolata. 62. C. filamentis e baſi ſimplici lanceolata obtuſa. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 490.

moniliformis. 6. C. filamentis ſerie corpuſculorum ovalium. *O. F. Müller n. act. Stockh.* 1783. *p.* 77. *t.* 3. *f.* 1-5.

⊢⊢ *filamentis geniculatis.*

fluviatilis. 7. C. filamentis ſimpliciſſimis ſetiformibus rectis: geniculis craſſioribus angulatis. *Dill. muſc. t.* 7. *f.* 47. 48.

8. C.

filiformis. 8. C. simplicissima, globulorum glomerulis duobus in quovis articulo longitudinaliter dispositis. *Schrauck ap. v. Moll oberd. Beytr.* 1787. *p.* 136. *t.* 2. *f.* 1366.

capillaris. 9. C. articulis alternatim compressis. *Dill. musc. t.* 5. *f.* 25.

jugalis. 10. C. filamentis saepe conjugatis globiferis. *Flor. dan. t.* 883.

armillaris. 11. C. articulis tripartitis: disco rosaceo. *O. F. Müller nov. act. Stockh.* 1783. *p.* 80. *t.* 3. *f.* 6. 7.

serpentina. 12. C. articulis elongatis aequalibus. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hist. p.* 92. *t.* 1. *f.* 8-11.

transversina. 13. C. articulis inaequalibus: fascia duplici. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *hist. p.* 93. *t.* 1. *f.* 12.

stellina. 14. C. articulis brevibus aequalibus: puncto radiato duplici. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *hist. p.* 93. *t.* 2. *f.* 1.

decimina. 15. C. articulis quadruplici notatis. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3 *hist. p.* 93. *t.* 2.

quinina. 16. C. articulis aequalibus: lineis in zic zac obliquis. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *p.* 94. *t.* 2. *f.* 4. 5.

** *filamentis ramosis.*

† *aequalibus.*

bullosa. 17. C. filamentis bullas aëreas includentibus. *Dill. musc. t.* 3. *f.* 11.

canalicularis. 18. C. filamentis basin versus ramosioribus. *Dill. musc. t.* 4. *f.* 15.

amphibia. 19. C. filamentis exsiccatione coeuntibus in aculeos. *Dill. musc. t.* 4. *f.* 15.

littoralis. 20. C. filamentis ramosissimis elongatis scabriusculis. *Dill. musc. t.* 4 *f.* 19.

aeruginosa. 21. C. filamentis mollibus digito brevioribus viridissimis. *Dill. musc. t.* 4. *f.* 20.

seticulosa. 22. C. teres viridis, setulis sparsis numerosis brevibus. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 188.

plana. 23. C. compressa rubro-violacea, ramis distichis confertis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 188.

furcata. 24. C. filamentis apice ramosis; ramis subsimplicibus. *Dill. musc. t.* 2. *f.* 6. β) *Dill. musc. t.* 3. *f.* 10.

25. C.

An hujus generis et cujus tribus cohortisve Conferva thermalis Forsk. fl. aeg. ar. p. 189.

foenicula-cea. 25. C. filamentis ramoſiſſimis: ramis ramulisque longiſſimis ſparſis. *Dill. muſc. t.* 2. *f.* 8.

rigida. 26. C. filamentis ramoſiſſimis: ramulis breviſſimis alternis. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 16.

tomento-ſa. 27. C. filamentis ramoſiſſimis: ramis ſimplicibus confertis fuſcis. *Dill. muſc. t.* 3. *f.* 12. 13.

ſpongioſa. 28. C. ramulis ſimplicibus imbricatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 9. *f.* 67.

nigra. 29. C. ramis faſciculatis breviſſimis. *Hudſ. flor. angl. p.* 481.

ſcoparia. 30. C. filamentis proliferis faſtigiatis hirtis. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 23.

cancellata. 31. C. filis ramoſis: filamentis alternis brevibus multipartitis digitatis. *Dill. muſ. t.* 4. *f.* 22.

reticulata. 32. C. filamentis reticulato-coadunatis. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 14.

dichotoma. 33. C. filamentis dichotomis. *Dill. muſc. t.* 3. *f.* 9.

veſicata. 34. C. filamentis ſubramoſis medio et apice in veſicam productis. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 95. *t.* 2. *f.* 6.

burſata. 35. C. filamentis divaricatis veſicas laterales emittentibus. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 96. *t.* 2. *f.* 10.

ſaccata. 36. C. filamentis in idem latus pluries divaricatis area globifera alternatim expletis. *O. Fr. Müller nov. act. Petrop.* 3. *hiſt. p.* 96. *t.* 2. *f.* 11.

thermalis. 64. C. filamentis ramoſiſſimis: ramis immerſis membranae ope combinatis. *Schranck flor. bav. p.* 556. *n.* 1594.

infuſionum. 65. C. filamentis intricatis: junioribus ſolitariis ramoſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 556. *n.* 1595.

†† *filamentis geniculatis.*

gelatinoſa. 37. C. filis moniliformibus: articulis globoſis gelatinoſis. *Weis crypt. flor. goett. p.* 33. *ic.*

Helmin-thochorton. 38. C. rufeſcens filamentis dichotomis: ramis horizontalibus. *Gazette de ſanté* 1773. *n.* 5.

corallina. 39. C. filis dichotomis albis, ramulis acutis: geniculis purpureis. *Dill. muſc. t.* 6. *f.* 36.

catenata. 40. C. articulis cylindricis. *Dill. muſc. t.* 5. *f.* 27.

pellucida. 41. C. filamentis ramoſiſſimis: articulis cylindricis, ramis oppoſitis. *Hudſ. flor. angl. p.* 483.

42. C.

sericea. 42. C. filamentis ramosissimis e centro confertissimis elongatis viridibus, ramulis confertis tenuissimis. *Leyss. flor. hal. n.* 1254.

polymorpha. 43. C. ramis fasciculatis. *Flor. dan. t.* 395.

flexuosa. 44. C. filamentis flexuosis, ramis intricatis pinnatis: exterioribus longissimis simplicibus. *Flor. dan. t.* 882.

fulva. 45. C. ramis ramulisque brevissimis alternis. *Hudf. flor. angl. p.* 484.

plicata. 46. C. filamentis ramosissimis implexis. *Dill. musc. t.* 6. *f.* 19.

vagabunda. 47. C. filamentis flexuosis, ramis ramulisque brevioribus. *Dill. musc. t.* 5. *f.* 32.

glomerata. 48. C. ramulis brevioribus multifidis. *Flor. dan. t.* 651. *f.* 2.

trichodes. 49. C. ramis fasciculatis confertis viridibus. *Dill. musc. t.* 5. *f.* 33.

fucoides. 50. C. filamentis ramosissimis: ramulis multifidis fasciculatisque. *Hudf. flor. angl. p.* 485.

fusca. 51. C. filamentis ramosissimis: ramulis alternis simplicibus. *Hudf. flor. angl. p.* 486.

rupestris. 52. C. filamentis ramosissimis viridibus. *Dill. musc. t.* 5. *f.* 29.

elongata. 53. C. filamentis ramosissimis: ramulis longissimis distantibus acutis. *Dill. musc. t.* 6. *f.* 38.

pennata. 54. C. ramis duplicato-pinnatis fuscis. *Hudf. flor. angl. p.* 486.

Acgagropila. 55. C. filamentis ramosissimis e centro confertissimis globum constituentibus.

corallinoides. 56. C. filamentis dichotomis. *Dill. musc. t.* 6. *f.* 37. β *Dill. musc. t.* 5. *f.* 36.

tubulosa. 57. C. articulis alternatim compressis. *Dill. musc t.* 6. *f.* 39.

parasitica. 58. C. filis pinnatis. *Hudf. flor. angl. p.* 486.

catenulata. 59. C. articulis linearibus apice nodosis; medio nigro-punctatis. *Dill. musc. t.* 7. *f.* 48.

1208. BYSSUS. *Fibrae* simplices uniformes lanuginosae.

septica. 1. B. capillacea mollissima parallela fragilissima pallida; *an agarici varietas aut rudimentum?*

Flos aquae. 2. B. filamentis plumoſis natantibus. β) *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 1.

cancellata. 3. B. filis exacte undique cancellata. *Lederm. microſc. t.* 72.

phoſphorea. 4. B. lanuginoſa violacea lignis adnaſcens. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 6.

velutina. 5. B. capillacea viridis, filamentis ramoſis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 14.

petraea. 6. B. capillacea atra, filamentis ramoſis breviſſimis erectis denſiſſime ſtipatis, panno holoſericeo ſimilis. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 101.

ſanguinea. 7. B. capillacea velutina perennis coccinea, cortici adnaſcens. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 148.

aurea. 8. B. capillacea pulverulenta, gemmis ſparſis, filamentis ſimplicibus ramoſisque. *Flor. dan. t.* 718. *f.* 1.

coriacea. 9. B. perennis denſiſſima albicans. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 144.

alutoſa. 10. B. alba membranacea tenera alutae ſimilis. *Falck. it.* 2. *p.* 279.

nigra. 11. B. filamentis ramoſis rigidis atris ſaxis adnaſcens. *Hudſ. flor. angl. p.* 487.

fulva. 12. B. filamentis ramoſis fulvis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 17.

barbata. 13. B. filamentis erectiuſculis: ſummitatibus ramoſis ſubfaſtigiatis fulvis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 19.

candida. 14. B. filamentis ramoſiſſimis: ramis faſtigiatis albidis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 15. *an hydni potius ſpecies?*

bombycina. 15. B. lanuginoſa albiſſima filamentis longioribus implexis, lignis adnaſcens. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1081.

atra. 16. B. filamentoſo-pulverulenta atra. *Wiggers prim. fl. holſ. p.* 92.

cryptarum. 17. B. capillacea perennis cinerea tenax rupi innata.

radiciformis. 18 B. nivea tenerrima, filamentis ramoſis pendulis: globis floccoſis hinc inde adhaerentibus. *Lesk. it.* 1. *p.* 92.

globoſa. 19. B. alba, filamentis in globum glomeratis. *Lesk. it.* 1. *p.* 92. *t.* 3. *Scop. diſſ. hiſt. nat.* 1. *p.* 84.

aquatica. 20. B. hyalina, filamentis ſimplicibus apice clavatis. *Flor. dan. t.* 896.

conoidea. 21. B. capitulis conico-acuminatis, ſtipite ſetaceo. *Flor. dan. t.* 897. *n.* 2. *an hujus generis?*

22. B.

Flos cobalti. 22. B. capillacea perennis rosea, filamentis tenerrimis, sericei panni instar arcte intertextis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 175. *t.* 12. *f.* 1.

tremelloides. 23. B. ex luteo fuscescens gelatinosa, fibris intricatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 552. *n.* 1585.

FUNGI.

1209. AGARICUS. *Fungus* subtus lamellosus.

* *stipitati.*

† validi, *pileo pleno, stipite valido.*

⊢ *stipite volva et annulo cincto.*

caesareus. 1. A. pileo convexo aureo, carne ochroleuca, lamellis medio latioribus, minoribus mediis brevissimis. *Bulliard herb. Franc. t.* 120.

muscarius. 2. A. pileo sanguineo, verrucis, lamellis stipiteque albis: hoc basi globoso. *Kern. Schwaemm. t.* 33. β) *Schaeff. fung. t.* 28. γ) *Balt. fung.* 1. 27. *t.* 27.

margaritiferus. 3. A. pileo pallescente verrucis carneis tuberculisque albidis aspero lamellis albis. *Bulliard herb. Franc. t.* 316. β) *Schaeff. fung. t.* 261.

maculatus. 4. A. pileo badio lividove: margine verrucis albis inaequali, lamellis albidis brevibus latis. *Schaeff. fung. t.* 90. *Bull. herb. Franc.* 2. Agaricus phalloides?

Mappa. 5. A. pileo convexo ex flavescenti cinerascente, lamellis alternatim longioribus stipiteque flavescentibus. *Schaeff. fung. t.* 20.

solitarius. 6. A. pileo convexo: medio parumper concavo verrucis squamisve convolutis inaequali, lamellis liberis. *Bulliard. herb. Franc. t.* 48. β) Agaricus verrucosus. *Bolton* II. 47. *t.* 47.

subgracilis. 7. A. pileo hemisphaerico glabro canescente, lamellis albis, stipite fistuloso. *Batsch al. fung.* 59.

vernus. 8. A. totus albus, pileo plano humidiusculo: medio impresso, stipite farcto basi bulboso, lamellis numerosis divisis. *Bulliard herb. Franc. t.* 108. β) *Bolton fung.* 2. *t.* 48.

⊢⊢ *stipite volva cincto, annulo nullo.*

giganteus. 9. A. albus pileo subsquamoso, lamellis crassis, stipite crasso cylindrico. *Batsch el. fung.* 51.

plumbeus. 10. A. pileo medio fuſcelcente marginem verſus livido ſtriato, lamellis duplici ordine poſitis albidis poſterius obtuſis ſublividis, ſtipite fiſtuloſo baſi bulboſo. *Schaeff. fung. t.* 85 86. *β) Schaeff. fung. t.* 257. *γ) Schaeff. fung. t.* 244. *δ) Bull. herb. Franc. t.* 512. *ε) Bolton fung.* II. 49. *t.* 49.

badius. 11. A. pileo ex caſtaneo fulvo: margine plicato, lamellis flaveſcentibus integris aequalibus, ſtipite thalaſſino ſubaequali baſi bulboſo. *Schaeff. t.* 245.

fulvus. 12. A. pileo fulveſcente medio ſubmaculato marginem verſus plicato lamellis ochroleucis inaequalibus, ſtipite elongato albo fuſco-floccoſo baſi bulboſo. *Schaeff. fung. t.* 95.

denudatus. 13. A. pileo convexo cucullo ex luteo fuſco obvoluto: margine nudo vireſcente fibroſo, ſtipite albido farcto baſi bulboſo. *Schaeff. fung. t.* 98.

griſeo-albus. 14. A. pileo caneſcente impellucido lucido: marginis plicis acute carinatis; carina fuliginoſo-pulverulenta, lamellis confertis inaequalibus ſtipiteque farcto pulverulentis albidis. *Batſch. el. fung. cent. p.* 85.

naevius. 15. A. pileo convexo albo ambino-radiato, lamellis inaequalibus cinnamomeis poſterius liberis, ſtipite cinereo deorſum incraſſato. *Bulliard herb. Franc. t.* 264.

trilobus. 16. A. pileo glabro fulvo: margine ſtriato, lamellis dilute cinnamomeis aequalibus antrorſum dilatatis obtuſis ſimplici ordine poſitis, ſtipite flavicante baſi tuberoſo. *Bolton fung. p.* 38. *t.* 38.

lucens. 395. A. luteſcens pileo ſupra lucido ſubtus fuſco. *Bulliard herb. Franc. t.* 431. *f.* 1.

helvolus. 396. A. helvolus, ſtipite exalbido. *Bull. herb. Franc. t.* 431. *f.* 5. *β) Bull. herb. Franc. t.* 431. *f.* 4.

praealtus. 17. A. pileo hemiſphaerico, junioris tomentoſo, ſtipite quadruplo longiore gracili cinereo, lamellis ferreis. *Mich. nov. pl. gen. p.* 189. *t.* 81. *f.* 3.

vaginatus. 18. A. albus, pileo plano: medio papilloſo; margine ſtriato, lamellis diviſis apice acutis, ſtipite fiſtuloſo bulboſo: baſi latente. *Bull. herb. Franc. t.* 98. *an ſatis diſtinctus a plumbeo?*

minor. 19. A. pileo ex cervino caeruleſcente tela araneoſa obvoluto, lamellis rarioribus latis cinnamomeis ſtipiti farcto contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 330. *β) Bull. herb. Franc. t.* 431. *f.* 2. 3.

⊢ ⊢ ⊢ *ſti-*

⊢⊢⊢ *ſtipite annulato: volva nulla.*

procerus. 20. A. pileo medio papilloſo: centro fruſtulis transverſis ſeriatis; disco floccis ſparſis atris vario, ſtipite concolore ſquamoſo elongato baſi bulboſo, colore lamellisque albis. *Flor. dan. t.* 772.

bulboſus. 21. A. pileo glaberrimo integerrimo carneo niveo, ſtipite lineari concolore: baſi ſemiovata ſupra truncata, lamellis pallidiſſime flaventibus ſtipiti contiguis. *Schaeff. fung. t.* 241.

piſtillaris. 22. A. pileo ſpadiceo-flavente: margine undulato-plicato, ſtipite concolore clavato farcto, lamellis dilute lateritiis confertis. *Batſch el.* 55. *β*) Agaricus putridus. *Scop. flor. carn.* 2. *n.* 1468.

obſcurus. 23. A. pileo convexo obſcure caſtaneo piloſo-ſquamoſo, lamellis latis duplici ſerie digeſtis, ſtipite aequali fuſco, annulo albo. *Schaeff. fung. t.* 74.

excoriatus. 24. A. pileo convexo ex lateritio dilute cinereo: diſco tela dilute carnea tecto, lamellis inaequalibus, ſtipiteque fiſtuloſo baſi bulboſo albidis. *Schaeff. fung. t.* 18. 19.

campeſtris. 25. A. pileo convexo caneſcente: maculis piloſo-ſquamoſis, lamellis inaequalibus introrſum rotundatis (adulti) rufeſcentibus, ſtipite albido recti. *Bull. herb. Franc. t.* 134. *β*) *Bolton fung.* 2. *t.* 45. *γ*) *Schaeff. fung. t.* 310. 311.

pratenſis. 26. A. pileo convexo albido vel ex thalaſſino dilute cinereo ſtriato, lamellis ſordide carneis, ſtipite craſſo albido: baſi inflexa fuſceſcente. *Schaeff. fung. t.* 96.

laceratus. 27. A. pileo ex carneo fuſceſcente maculis ſquamoſis medio majoribus vario, margine lacero, lamellis ſordide carneis, ſtipite fuſceſcente fiſtuloſo. *Schaeff. fung. t.* 242.

nitens. 28. A. pileo convexo flaveſcente nitido, lamellis atris nigropunctatis divifis, ſtipite farcto baſi tuberoſo. *Bull. herb. Franc. t.* 84. *β*?) *Schaeff. fung. t.* 210.

radicoſus. 29. A. pileo convexo fuſco albo-maculato, lamellis numeroſis ſubſerratis umbrinis, ſtipite ſquamoſo: radice fuſiformi fibrilloſa. *Bull. herb. Franc. t.* 160.

ſquamoſus. 30. A. pileo convexo umbonato fulvo ſquamis erectis aſpero: margine undulato, lamellis ligneis triplici ordine digeſtis, ſtipite infra annulum ſquamoſo. *Bull. herb. Franc. t.* 266. *nonne idem cum floccoſo?*

floccoſus. 31. A. pileo convexo piloſo-ſquamoſo, lamellis flavicantibus, ſtipite farcto annuloque ſquamoſis. *Schaeff. fung. t.* 61. *Batſch el. fung. t.* 38. Agaricus flammeus. *β*) Agaricus piloſus. *Schaeff. fung. t.* 80. *γ*) *Schaeff. fung. t.* 409. *δ*) Agaricus amanitea. *Batſch el. fung. cent.* 1. 109. *f.* 113. *ε*) Agaricus caeſius. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 113. *f.* 114. *ζ*) Agaricus Pallor. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 115. *f.* 115.

imbricatus. 32. A. pileo pallide ſulphureo ſericeo-unctuoſo faſciculis ſericeis obducto, lamellis quintuplici ſerie digeſtis ex flavo ſubolivaceis, ſtipite elongato ſuperne pallido inferne ferrugineo. *Batſch el. fung.* 149.

villoſus. 33. A. pileo fulvo-villoſo, lamellis confertis triplici ordine digeſtis dilute einereis, cortica alba, ſtipite fragili ſordide albo adſcendente. *Bolt. fung. p.* 42. *t.* 42.

vitellinus. 351. A. totus ſulphureus, pileo conico faſciculatim tomentoſo margine undulato, lamellis liberis lanceolatis in unam ſeriem digeſtis, ſtipite glabro deorſum craſſiori. *Bolton fung.* 2. *t.* 50.

mutabilis. 34. A. pileo glabro fuſco-ochraceo, lamellis dilute fuſcis, ſtipite pallidiori lineari ſuperne ſquarroſo; inferne laevi albo. *Schaeff. fung. t.* 9.

durus. 364. A. pileo convexo luteſcente, lamellis numeroſis pallidis triplicis ordinis ſtipite fragili velo fugaci. *Bolton fung.* 2. *t.* 67. *f.* 1.

orichalceus. 370. A. bulboſus ſtipite flavente, pileo livido ex flavente pallidiſſime virente: diſco lamellisque elongatis ferrugineis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 1. *t.* 31. *f.* 184.

olivaſcens. 371. A. bulboſus lividus ex cinereo olivaſcens, pileo ſubviſcido umbonato, ſtipite magis cineraſcente, lamellis dilatatis annuloque brunneis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 3. *t.* 31. *f.* 185.

ferrugināſcens. 372. A. bulboſus pileo pulvinato craſſo glabro ex albido ſubferrugineo, ſtipite ſericeo-fibroſo albo annulo ex ferrugineo brunneo, laminis anguſtis ochraceis margine ſubfuſcis. *Batſch el. fung cent.* 2. *p.* 9. *t.* 32. *f.* 187.

ſubantiquatus. 383. A. pileo brunneo-maculato; diſco brunneo, ſtipite laevi elongato, lamellis ordine triplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 59. *t.* 37. *f.* 205.

arcuatus. 394. A. lamellis arcuatis. *Bull. herb. Franc. t.* 443. *an diſtincta ſpecies?*

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *ſti-*

⊢⊢⊢⊢ *ſtipite annulo volvaque deſtituto.*

virgineus. 35. A. niveus, lamellis arcuatim per ſtipitem cylindricum farctum decurrentibus. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 15. *f.* 1. *Schaeff. fung. t.* 39. 232. *Batſch el. fung. cent.* 2. *f.* 200? *β*) Agaricus eburneus. *Bulliard herb. Franc. t.* 118. *γ*) Agaricus denticulatus. *Bolton fung.* 4. *t.* 4. *δ*) *Schaeff. fung. t.* 307.

integer. 36. A. ſolitarius, pileo viſcido purpureo, lamellis albis integris aequalibus. *Bolton fung.* 1. *t.* 1.

Ruſſula. 37. A. fragrans dulcis ſolitarius, pileo rubro, carne albida tenera firma, lamellis craſſis aequalibus rigidis. *Krapf oeſterr. Schw.* 1. *t.* 1. *f.* 1-7. *et t.* 2. *f.* 4-6. *β*) *Schaeff. fung. t.* 75. *γ*) *Krapf oeſterr. Schw.* 1. *t.* 4. *f.* 1-4. 7. *et t.* 5. *f.* 1. 2.

emeticus. 38. A. acris graveolens ſolitarius, pileo ſanguineo, lamellis aequalibus craſſis fragilibus apice bifurcis ſtipiti farcto tereti intus albo continuis. *Schaeff. fung. t.* 15. 16. 254.

cyanoxanthus. 39. A. pileo pallido vel ſubrubello: margine caeruleſcente, lamellis aequalibus albidis craſſis, ſtipite farcto brevi tereti. *Krapf oeſterr. Schw. t.* 6. *f.* 1-6. *t.* 7. *f.* 1-7. *et t.* 8. *f.* 1. 2. 4. 7.

xerampelinus. 40. A. pileo carnoſo punctato obſolete purpureo, lamellis craſſis flavis, ſtipite elongato tereti farcto albido purpuraſcente-obumbrato. *Schaeff. fung. t.* 214. 215. *β*) Agaricus olivaceus. *Schaeff. fung. t.* 204.

vireſcens. 41. A. pileo vario luridove viſcido, lamellis albidis aequalibus, ſtipite tereti farcto. *Krapf oeſterr. Schw. t.* 9. *f.* 6. 7. *et t.* 10. *f.* 1. 2. 3. 7.

glutinoſus. 42. A. pileo viſcido nitente ochroleuco exſiccatione nigreſcente, lamellis concoloribus craſſis ramoſis aequalibus, ſtipite tereti farcto incurvo baſi incraſſato. *Krapf oeſterr. Schw. t.* 11. *f.* 1-7.

violaceus. 43. A. pileo convexo aſpero punctato: margine violaceo, lamellis dilute badiis margine purpuraſcentibus, ſtipite caeruleſcente craſſo baſi bulboſo. *Kern. Schw. t.* 1. *f.* 1. *β*) Agaricus caeruleſcens. *Schaeff. fung. t.* 34. *γ*) Agaricus amethyſtinus. *Schaeff. fung. t.* 56. *δ*) Agaricus glaucopus. *Schaeff. fung. t.* 53.

araneo-sus. 44. A. pileo ſpadiceo: margine filis araneoſis fimbriato, lamellis latis poſterius diviſis ſtipiti albido brevi craſſo concoloribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 96.

ventricoſus. 45. A. pileo convexo laevi croceo badioque, lamellis dilute ſulphureis decurrentibus: brevioribus interſitis, ſtipite brevi ventricoſo ochroleuco laterali. *Schaeff. fung. t.* 71. 72. *an mera araneoſi varietas?*

armeniacus. 46. A. pileo caſtaneo-ferrugineo, ſtipite albido farcto baſi incraſſato, lamellis rubentibus. *Schaeff. fung. t.* 81.

ſericeus. 47. A. pileo luteo maculis obſoletis ſquamoſo, ſtipite brevi baſi bulboſo ſulphureo, lamellis concoloribus. *Schaeff. fung. t.* 24.

varius. 48. A. pileo ſpadiceo, lamellis flexuoſis purpuraſcentibus margine flaveſcentibus, ſtipite tereti farcto albido, inferne ſpadiceo incraſſato. *Schaeff. fung. t.* 42. 54.

rutilus. 49. A. pileo aurantio umbonato, lamellis flavis, ſtipite tereti farcto flavicante, ſuperne purpuraſcente. *Schaeff. fung. t.* 219.

croceus. 352. A. luteus, ſtipitis parte inferiori pileoque conico villoſis, lamellis numeroſis denſis ſtipitisque parte ſuperiori albis. *Bolton fung.* 2. *t.* 51. *f.* 2.

fulvidus. 357. A. fulvus, pileo convexo glabro, lamellis remotis craſſis triplici ſerie decurrentibus, ſtipite dilutiori. *Bolton fung.* 2. *t.* 56.

Georgii. A. pileo flavo convexo: lamellis albis. *Sterb. fung. t.* 11. *f.* 3.

clypeatus. A. pileo hemiſphaerico acuminato viſcido, lamellis ſtipiteque elongato cylindrico albis.

fragilis. A. pileo convexo viſcido pellucido lamellisque luteis. *Vaill. ſt. pariſ. t.* 11. *f.* 16-18.

gilvus. 50. A. pileo luteſcente, lamellis craſſis ochroleucis, ſtipite albo tereti inferne incraſſato. *Schaeff. fung. t.* 221. *an aurantii varietas?*

truncatus. 51. A. pileo obſcure lateritio, lamellis rubellis vel ſordide albis, ſtipite brevi craſſo farcto albido inferne fuſceſcente. *Schaeff. fung. t.* 251.

punctatus. 52. A. pileo granulato aurantio margine flavo: diſco conico, lamellis flavis baſi aurantiis, ſtipite elongato tereti farcto flavo. *Schaeff. fung. t.* 21.

53. A.

vaccinus. 53. A. pileo vaccino obſcurius maculato, ſtipite concolore tereti inferne incraſſato, lamellis dilute fuſcis. *Schaeff. fung. t.* 25. *An hujus cohortis? ſtipes fiſtuloſus annulatus.*

luteus. 54. A. pileo granulato aureo: diſco ſpadiceo obumbrato, lamellis ſtipiteque tereti farcto baſi tuberoſo flavicantibus. *Schaeff. fung. t.* 41.

ferrugineus. 55. A. pileo ferrugineo-fuſco fibroſo-ſtriato, lamellis fuſcescentibus, ſtipite tereti farcto inferne incraſſato. *Schaeff. fung. t.* 37.

ſtriatus. 56. A. pileo caſtaneo: margine dilutius ſtriato, ſtipite tereti craſſo brevi farcto albido. *Schaeff. fung. t.* 38.

ceraneus. 57. A. pileo punctato pallide lateritio, lamellis olivaceis, ſtipite tereti longitudinaliter ſtriato fiſtuloſo albo. *Schaeff. fung. t.* 40.

mollis. 58. A. pileo campanulato albente-croceo, carne molli, pileo elongato ſubconcolore glauco. *Batſch el. fung.* 45. *f.* 15. *Bull. herb. Franc.* I. *t.* 400.

Rudolphi. 59. A. gregarius, pileo ovali-conico obtuſo ſcabro ferrugineo, ſtipite flexuoſo ſulphureo, inferne opaco fuſco. *Batſch el. fung.* 45. *f.* 23.

ſubgranulatus. 60. A. pileo ſicco aſpero fuſco craſſo: margine attenuato revoluto, lamellis concoloribus ſinuatis, ſtipite pallidiore ſtriato fiſtuloſo baſi bulboſo. *Batſch el. fung.* 45. *f.* 22.

adhaerens. 61. A. pileo atro glutinoſo, lamellis ſordidis ramoſis ſubdecurrentibus, ſtipite farcto tereti albido. *Schaeff. fung. t.* 36. *β) Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 43. *t.* 35. *f.* 200.

terreus. 62. A. pileo umbrino maculis piloſis fuſcescentibus vario, lamellis ſtipiteque tereti farcto inferne incraſſato albis. *Schaeff. fung. t.* 64. *β)* Agaricus luridus. *Schaeff. fung. t.* 69. *γ)* Agaricus multiformis. *Schaeff. fung. t.* 14.

mitratus. 63. A. pileo ſulphureo-ferrugineo maculis piloſis parvis confertis adſperſo, lamellis fulvo-violaceis, ſtipite ſquamoſo fiſtuloſo flavescente. *Schaeff. fung. t.* 84.

undulatus. 64. A. pileo obtuſe conico cano maculis obſcurioribus inaequalibus anguloſis transverſim ſeriatis vario, lamellis ſordide albis, ſtipite tereti brevi albido baſi bulboſo. *Schaeff. fung. t.* 89.

ſpadiceus. 65. A. pileo viſcido depreſſo ſpadiceo, lamellis fuſcis difformibus: extimis miniinis ſtipite cano clavato ſericeo-fibroſo. *Batſch. el. fung.* 49. *f.* 16.

ochraceus. 66. A. pileo ochraceo nitente subcampanulato, stipite concolore subclavato sericeo-fibroto, lamellis ferrugineo-fulcis angustis. *Batsch el. fung.* 51.

fastigiatus. 67. A. pileo conico umbonato luteo longitudinaliter striato, lamellis fuscescentibus, stipite tereti farcto elongato lineari flavescente. *Schaeff. fung. t.* 26. β) Agaricus conicus. *Schaeff. fung. t.* 2.

latus. 68. A. pileo convexo marino fuscove sicco, lamellis numerosis latissimis teneris, triplici serie dispositis, stipite tereti recto farcto sordide albo. *Bolton fung.* 2. *t.* 2.

pompo- fus. 69. A. pileo rotundo coccineo, lamellis numerosis angustis teneris olivaceis triplici serie dispositis, fine acuminato stipiti flavicanti inferne fulco angustiori contiguis. *Bolton fung.* 5. *t.* 5. β?) Agaricus aureus. *Bulliard herb. Franc. t.* 92. *an distinctus satis a lateritio Schaefferi?*

caerules- cens. 70. A. pileo hemisphaerico sicco aspero caesio, lamellis crassis albis serie triplici dispositis, stipiti subconcolori recto tereti contiguis. *Bolton fung.* 12. *t.* 12.

cinnamo- meus. 71. A. tenax pileo sicco laevi rufo, lamellis teneris coriaceis dilute cinnamomeis triplici ordine dispositis, stipite luteo inferne angustato compresso fibroso. *Schaeff. fung. t.* 4. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 158. *n.* 117. *t.* 117.

elephan- tinus. 72. A. pileo crasso hemisphaerico subluteo viscido, lamellis distantibus crassis latis cereis triplici serie digestis, stipite albo crasso spongioso basi fibrilloso. *Bolt. fung.* 28. *t.* 28.

politus. 73. A. pileo convexo thalassino laevigato, lamellis numerosis latiusculis ferrugineis flexilibus duplici ordine positis, stipite brevi farcto terete fusco. *Bolton fung.* 30. *t.* 30. *vix distinctus a Beryllo.*

mollissi- mus. 74. A. pileo pulvinato, molli murino, lamellis angustis teneris albidis inaequalibus triplici ordine dispositis, stipite bulboso crasso spongioso. *Bolton fung.* 40. *t.* 40.

Offa. 75. A. pileo convexo lubrice humido fusco pellucido: margine undulato, lamellis concoloribus posterius rotundatis liberis, stipite tomentoso farcto terete. *Bulliard herb. Franc. t.* 308.

turbina- tus. 76. A. pileo flavicante convexo, lamellis numerosis divisis dilute ligneis, stipite crasso inferne bulboso undulato. *Bull. herb. Franc. t.* 110.

77. A.

lycoperdonoides. 77. A. pulverulentus, pileo rotundo craſſo flaveſcente, lamellis brevibus ex atro flavis, ſtipite terete brevi. *Bulliard herb. Franc. t.* 167.

contiguus. 78. A. pileo convexo luteo tomentoſo; margine involuto, lamellis boleti poros mentientibus, ſtipitique brevi craſſo concoloribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 240. *vix diſtinctus ab involuto.*

involutus. 79. A. pileo laevi ſubviſcido fibroſo ſpadiceo fuſco convexo; diſco depreſſo, margine involuto, lamellis anguſtis craſſiuſculis denſis ramoſis flaveſcentibus, ſtipiti concolori laevi venoſo contiguis. *Batſch el. fung. cent.* 39. *f.* 61. *Schaeff. fung. t.* 72? *β*?) Agaricus ſubinvolutus. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 57. *t.* 37. *f.* 204. *γ*) Agaricus adſcendens. *Bolt. fung.* 11. *t.* 55.

libertatis. 80. A. pileo obſcuro fuſceſcente umbonato parvo: margine caneſcente involuto, lamellis canis ſemipellucidis anguſtis inaequalibus arcuatis integris bifidisque, ſtipite elongato cano ſolido bulboſo. *Batſch el. fung. cent.* 43. *f.* 62. *β*) Agaricus peltigerus? *Batſch el. fung. cont.* 2. *p.* 17. *t.* 32. *f.* 190. *γ*) Agaricus Clavus. *Batſch ib. p.* 41. *t.* 35. *f.* 199.

pileatus. 81. A. pileo opaco ſicco ferrugineo cano-tomentoſo umbonato parvo, lamellis anguſtis craſſis confertis: paucioribus bifidis cum ſtipite elongato fiſtuloſo bulboſo flaveſcentibus. *Batſch el. fung. cent.* 47. *f.* 63.

nivoſus. 82. A. niveus, pileo parvo convexo: margine ſtipiteque craſſo elongato ſolido furfuraceo-pruinoſis, lamellis anguſtis confertis ſtipiti continuis: brevioribus intermiſtis. *Batſch el. fung. cent.* 49. *f.* 64.

nimbatus. 83. A. pileo humeſcente glabro cano fuſco obumbrato: limbo albo, lamellis lutis triplicis longitudinis albis ſtipiti concolori furfuraceo contiguis. *Batſch el. fung. cent.* 50. *f.* 65.

puſillus. 84. A. pileo glabro ſubconico cano medio fuſco obumbrato margine intusque albo, lamellis latis truncatis albidis, ſtipite ſubfuraceo cano-caeruleſcente intus atro. *Batſch el. fung. cent.* 51. *f.* 66. *an vere diſtincta ſpecies?*

tuberoſus. 85. A. albidus, pileo convexo margine ſubplicato, lamellis (junioris) decurrentibus, ſtipite tenui farcto tomentoſo infra bulboſo. *Bull. herb. Franc. t.* 256.

craſſipes. 86. A. pileo fuſco ſicco convexo: margine involuto, ſtipite concolore fuſiformi, lamellis dilute fuſcis diviſis. *Schaeff. fung. t.* 87.

87. A.

coralli-nus. 87. A. pileo laevi fuſceſcente convexo parvo, lamellis diſtantibus minutis ſubdecurrentibus, ſtipite medio craſſiori. *Scop. diſſ. hiſt. nat.* 1. *p.* 109. *t.* 9. *f.* F.

fuſipes. 88. A. pileo dilute umbrino rimoſo: margine undulato, lamellis concoloribus rarioribus truncatis, ſtipite deorſum attenuato. *Schaeff. fung. t.* 87. (*fig. ſup.*) 88. 260. *β*) Agaricus luxurians. *Batſch el. fung.* 28. *p.* 49.

longipes. 89. A. pileo conico fuliginoſo, ſtipite concolore ſtriato farcto deorſum turgido infra terram denuo attenuato, lamellis latis inaequalibus cano-fuliginoſis. *Bulliard herb. Franc. t.* 232. *an vere diſtinctus a clypeato?*

oedema-toſus. 90. A. pileo ſubconico hepatico pulverulento, lamellis angu-ſtis ſubdecurrentibus ſtipiteque farcto carnoſo medio craſſiore rufeſcentibus. *Schaeff. fung. t.* 259.

rigidus. 91. A. pileo craſſo hepatico: (ſenelcentis) margine rimoſo, lamellis anguſtis rigidis fragilibus duplici ſerie poſitis flaveſcentibus, ſtipite elongato inaequali fuſco griſeo. *Bolton fung.* 43. *t.* 43.

laricinus. 92. A. pileo convexo anguſto fulvo, lamellis anguſtis craſſis albis duplici ſerie poſitis, ſtipite fuſco ramoſo craſſo ſpongioſo. *Bolton fung.* 19. *t.* 19.

faſciatus. 93. A. pileo ſubconico ſpadiceo, lamellis paucioribus parvis brevibus purpuraſcentibus, ſtipite anguſto terete farcto fuſceſcente faſciato. *Schaeff. fung. t.* 223.

rufeſcens. 94. A. rufeſcens, pileo ſtriato: centro excavato, lamellis decurrentibus, ſtipite tereti. *Schaeff. fung. t.* 55.

hepaticus. 95. A. pileo convexo laevi ſicco margine involuto lamellisque carneo-ſpadiceis, ſtipite pallidiori ſicco opaco lineari inaequali. *Batſch el. fung.* 43.

flavidus. 96. A. pileo ochroleuco, lamellis albidis, ſtipite tereti flexuoſo interne craſſiori fuſceſcente, ſuperne flaveſcente. *Schaeff. fung. t.* 35.

tuberculoſus. 97. A. pileo convexo vitellino: margine tuberculato ſtriato, ſtipite lineari breviuſculo ſtriato concolore ſuperne albo, lamellis latis brevibus inaequalibus ſulphureis. *Schaeff. fung. t.* 79.

leoninus. 98. A. pileo umbonato luteo: margine ſtriato, lamellis brevibus latis inaequalibus carneis, ſtipite elongato tenui farcto flaveſcente flexuoſo ſtriato. *Schaeff. fung. t.* 48.

99. A.

fascicularis. 99. A. pileo luteo, lamellis cinereis margine flavicantibus, stipite flavo lineari elongato. *Schaeff. fung. t.* 49. 35? *Batsch el. fung.* 83. *t.* 29.

pallidus. 100. A. ochroleucus, pileo convexo, lamellis congestis divisis, stipite brevi farcto tereti. *Schaeff. fung. t.* 50.

incertus. 101. A. sparsim squamulosus, pileo badio, lamellis lutescentibus, stipite elongato subclavato flavescente deorsum fuscescente. *Schaeff. fung. t.* 62.

viscosus. 102. A. pileo laevi coriaceo viscido convexo pallide ochraceo, lamellis concoloribus distantibus margine inferiori sinuatis superiori undulatis triplicis longitudinis, stipite solido. *Batsch el. fung. cent.* 63. *f.* 70.

umbrinus. 103. A. pileo humescente ochraceo-albo: margine pellucido tenui, lamellis concoloribus latissimis decurrentibus: minoribus interfitis, stipite brevi crasso farcto. *Batsch el. fung. cent.* 65. *f.* 71.

risigallinus. 104. A. pileo laevi lato deformi tenui ochraceo-lutescente, lamellis latiusculis oblongis integris lutescente-carneis flexuosis, stipite brevi opaco albo. *Batsch el. fung. cent.* 67. *f.* 72.

defossus. 105. A. pileo laevi rigido pulvinato, lamellis subaequalibus canescenti-caeruleiscentibus, stipite tericeo-fibroso basi bulboso. *Batsch el. fung. cent.* 69. *f.* 73.

subpurpurascens. 106. A. pileo laevi subvilcido pulvinato cinereo-fuscescente, lamellis latis triplicis ordinis furfureque a velo superstite ferrugineis, stipite tericeo-fibroso lilacino basi bulboso. *Batsch el. fung. cent.* 73. *f.* 74.

subannulatus. 107. A. pileo pallide fusco laevigato venoso pulvinato, lamellis angustis oblongis utrinque obtusis teneris confertis rubellis: minoribus interfitis, stipite laevi basi bulboso flavente supra annulum spurium albo. *Batsch el. fung. cent.* 75. *f.* 75.

impuber. 108. A. siccus, pileo carneo-fulvo lanato squamis lanatis mollibus obtecto margine repando, stipite pallidiore fistuloso, lamellis subcarneis. *Batsch el. fung.* 155. *f.* 116.

squamulosus. 109. A. siccus, pileo obscure flavo squamulis villosis brunneis appressis tenerrimis densissime obsito, lamellis latis extrorsum angustatis lutescente-ferrugineis triplici ordine digestis, stipite flavescente tericeo-fibroso. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 19. *t.* 33. *f.* 190.

subferrugineus. 373. A. bulbosus fibrosus, lividus ex brunneo canus, stipite crasso, laminis laxis ferrugineis ordine triplici. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 7. t. 31. f. 186.*

elatior. 374. A. pileo angusto ex ochraceo carneo, stipite albo elongato torto sericeo-fibroso, lamellis ordine quadruplici ferrugineo-fulvescentibus. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 11. t. 32. f. 188.*

Fusus. 375. A. testaceus, pileo glabro rimoso, stipite sericeo-fibroso sursum incrassato, laminis pallidioribus ordine triplici. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 13. t. 32. f. 189.*

nebularis. 376. A. griseus, pileo obscuriore glabro margine involuto, stipite pallidiore fibroso-hispido basi albo-tomentoso, laminis utrinque angustis pallide ochraceis: ordine triplici. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 25. t. 33. f. 193.*

laterinus. 377. A. lateritius, pileo pulvinato subviscido, stipite pallidiore floccoso-aspero, lamellis fulvescentibus angustis. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 29. t. 33. f. 195. Bull. herb. Franc. 2. t. 308.*

discors. 378. A. albus, stipite floccis inferne longitudinalibus superne transversis aspero, pileo umbonato, deflexo subliviscente subviscido. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 31. t. 34. f. 196.*

senescens. 379. A. ochraceus mutabilis, stipite floccis pallidis transversim striatis squamoso, pileo viscido, lamellis latis pallidis fulvescentibus: ordine quadruplici. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 35. t. 34. f. 197.*

subtestaceus. 380. A. opacus ex ochraceo carneus, stipite floccis hirto, pileo glabro subviscido, laminis fulvescentibus triplici ordine. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 39. t. 35. f. 198.*

cruentatus. 381. A. opacus rigidus ex ochraceo niveus, lamellis ordine quadruplici dispositis margine, stipite maculis, pileo punctis et zonis purpurascentibus vario. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 47. t. 36. f. 201.*

madreporeus. 382. A. rigidus fragilis, pileo cinereo fusco-fibroso, stipite niveo, lamellis dilatatis griseo-liviscentibus: ordine triplici. *Batsch el. fung. cent. 2. p. 53. t. 36. f. 203.*

horizontalis. 110. A. pileo convexo subhemisphaerico, lamellis horizontalibus, stipite fistuloso annulato: annulo reflexo sulcato. *Hoffm Blaetterschw. t. 5. f. 1. an una cum 4 sequentibus hujus cohortis.*

111. A.

teſtaceus. 111. A. pileo albido: margine pallidiſſime ochraceo, centro luteſcente, lamellis albis, ſtipite elongato baſi adſcendente pallide ochraceo. *Planer fung. Erf. p.* 14. *n.* 49.

ſuaveolens. 112. A. cineraſcenti-albus opacus, lamellis triplici ordine poſitis, ſtipite lineari elongato ſubflexuoſo fiſtuloſo. *Planer fung. Erf. p.* 14. *n.* 50.

violaceofulvus. 113. A. pileo convexo violaceo, ſtipite lineari concolore, lamellis umbrinis. *Planer fung. Erf. p.* 17. *n.* 65.

holoſericeus. 114. A. pileo campanulato tomentoſo brunneo-ferrugineo, ſtipite elongato gracili fuſco ſurſum luteo, lamellis palliſſimis. *Planer fung. Erf. p.* 17. *n.* 67.

⊢⊢⊢⊢⊢ *pileo infundibuliformi vel obliquo.*

infundibuliformis. 115. A. ſiccus albus ſenio ſubtinctus, pileo maximo umbonato, lamellis inaequalibus ramoſis, ſtipite laevi. *Buxb. cent.* 4. *t.* 1.

ſubalutaceus. 384. A. ſubrufeſcens ſubcoriaceus, pileo margine involuto, ſtipite albo-tomentoſo vel floccoſo, lamellis ordine quadruplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 27. *t.* 33. *f.* 194.

cochleariformis. 116. A. ſiccus albidus, pilei margine undulatim ſtriato, lamellis craſſis ramoſis, ſtipite obliquo brevi craſſo. *Schaeff. fung. t.* 225.

flammeus. 117. A. luteus pileo lacerato-ſquamoſo: ſquamis diverſicoloribus, lamellis crenatis, ſtipite brevi farcto. *Schaeff. fung. t.* 29. 30.

tubaeformis. 118. A pileo pallide aureo, lamellis decurrentibus ſimplicibus ſubdentatis albis, ſtipite longo tereti, fuſiformi recurvo. *Schaeff. fung t.* 248. 249.

cyathiformis. 119. A. albidus vel pallidus, lamellis decurrentibus anguſtis divilis, ſtipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 248.

impreſſus. 120. A. pileo obconico griſeo: margine revoluto plicato, lamellis numeroſis virelcentibus, ſtipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 38.

ſanguinolentus. 121. A. ſtipite farcto pileoque ſanguineis, lamellis ſimplicibus apice fiſſis albidis fragilibus ſtipiti continuis. *Bulliard herb. Franc. t.* 42.

obconicus. 122. A. murinus, pilei margine undulato, lamellis decurrentibus utrinque acuminatis duplici ordine digeſtis, ſtipite farcto ſurſum dilatato. *Bulliard herb. Franc. t.* 286.

123. A.

furcatus. 123. A. pileo farinoſo viridi-cinereo, lamellis furcatis ſtipiti farcto ſpongioſo continuis. *Bulliard herb. Franc. t.* 26.

atro-tomentoſus. 124. A. pileo obliquo ſubſcabro ferrugineo-fuſco, lamellis pallide ochraceis diſtincte adnatis, ſtipite brevi craſſo tereti ſubincurvo fuliginoſo tomentoſo. *Batſch el. fung.* 89. *f.* 32.

caliciformis. 125. A. pileo laevi carneo-fulveſcente: margine involuto, ſtipite craſſo concolore griſeo-tomentoſo ſurſum ampliato, lamellis pallide ochraceo-carneis decurrentibus. *Schaeff. fung. t.* 252.

degener. 126. A. pileo carneo-fulveſcente circulis concentricis ſaturatioribus picto: margine lacero, ſtipite concolore lineari elongato ſurſum ampliato, lamellis pallide carneo-ochraceis decurrentibus. *Schaeff. fung. t.* 243.

liveſcens. 127. A. humeſcens, pileo cinereo-livido, lamellis inaequalibus utplurimum integerrimis contiguis ſtipitique elongato ſubfibroſo ſubconcoloribus. *Batſch el. fung. cent.* 55. *f.* 67.

cervinus. 128. A. ſtipite in pileum oblique reflexum dilatato cervino ſubtus tuberoſo tomentoſo, lamellis anguſtiſſimis albis inaequaliter decurrentibus. *Hoffm. nomencl. fung. n.* 139. *t.* 2. *f.* 2.

neptuneus. 129. A. glaber ochraceo-carneus, ſtipite ſubelongato in pileum dilatato, lamellis anguſtis diſtantibus ſaepe bifidis. *Batſch el. fung. cent.* 161. *f.* 118.

alutaceus. 130. A. glaber pallide carneus, pileo biſcido, lamellis latiuſculis inaequalibus. *Batſch el. fung. cent.* 163. *f.* 119.

alabaſtrinus. 131. A. totus niveus diaphanus, pileo obliquo umbonato, lamellis rarioribus ſubdecurrentibus, ſtipite ſurſum incraſſato, baſi pallide roſeo. *Plan. fung. Erf. p.* 5. *n.* 8.

flabellatus. 132. A. pileo difformi fuſco vel lurido vario, lamellis ſubrepandis ſtipiteque brevi cylindrico ſordide albis. *Schaeff. fung. t.* 43. 44.

ſemipetiolatus. 133. A. pileo ochraceo-croceo ſubcarneo ſubfaſciato: margine undulato, ſtipite concolore farcto obconico, lamellis pallidioribus ramoſis. *Schaeff. fung. t.* 208.

tremulus. 134. A. nigro-fuſcus, lividus faſciatus, lamellis ſordide albis, ſtipite tereti farcto. *Schaeff. fung. t.* 224.

craſſus. 135. A. pileo obliquo tomentoſo fulco-olivaceo, lamellis bifidis ſubramoſis flavis, ſtipite craſſo dilatato luteo: tomento olivaceo. *Plan. fung. Erf. p.* 5. *n.* 7.

136. A.

ostreatus. 136. A. pileo coriaceo stipiteque planiusculo pallide ochraceis, lamellis umbrinis. *Jacq. flor. austr.* 2. *t.* 104.

⊢⊢⊢⊢⊢⊢ *pileo dimidiato, stipite laterali.*

dimidiatus. 137. A. pileo squamiformi maculis latis rubellis vario, lamellis pallide sulphureis, stipite brevi albido. *Schaeff. fung.* *t.* 233.

aggregatus. 138. A. gregarius, pileo fusco: margine lobato crispo, lamellis rufescentibus ramosis subdecurrentibus, stipite crasso curvo farcto fuscescenti-albo. *Schaeff. fung.* *t.* 305. 306.

palmatus. 139. A. gregarius, pileo convexo obliquo spadiceo vel obscure ligneo, lamellis concoloribus inaequalibus margine undulatis, stipite albido farcto brevi. *Bull. herb. Franc.* *t.* 216.

petalodes. 140. A. pileo violaceo-fusco: margine undulato, lamellis confertis decurrentibus flavicantibus, stipite albido farcto. *Bull. herb. Franc.* *t.* 226. *β?) Batsch el. fung.* 89. *t.* 8. *f.* 33.

conchatus. 141. A. pallide cinnamomeus, pileo conchiformi, lamellis inaequalibus longioribus decurrentibus, stipite arcuato farcto. *Bull. herb. Franc.* *t.* 298.

fallax. 142. A. fuscescenti-aurantius, pileo semiorbiculari, lamellis latiusculis: tribus brevioribus inter duas longiores positis, stipite brevi horizontali. *Bull. herb. Franc.* *t.* 324.

glaucus. 143. A. canus, pileo sericeo tenello, lamellis distantibus alterne brevioribus, stipite albidiore brevi pruinato. *Batsch el. fung. cent.* 170. *f.* 123.

flurstedtiensis. 144. A. ochraceo-pallens, stipite brevi posterius lato tomentoso pede adnato. *Batsch el. fung. cent.* 171. *f.* 124.

buccinalis. 385. A. tener ex caesio albus, pileo membranaceo fovente, lamellis in stipitem brevem flexuosum decurrentibus. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 85. *t.* 39. *f.* 214.

fragillimus. 386. A. ochraceus, pileo convexo fragili: medio umbilicato, stipite gracili brevi. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 87. *t.* 39. *f.* 215.

obesus. 387. A. crassus ochroleucus, pileo pulvinato inaequali, stipite brevi rufescente. *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 89. *t.* 39. *f.* 216.

flabelliformis. A. cespitosus, pileo subfurfuraceo pallido, lamellis subcinnamomeis, stipite laterali compresso apice dilatato. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 140. Agaricus stypticus.

⊢⊢⊢⊢⊢⊢⊢⊢ *fauciati fuccum fundentes*, lactiflui.

delicioſus. 145. A. pileo luteo-fuſceſcente: vertice depreſſo, ſtipite tereti maculato, lamellis luteis ſucco luteo refertis inaequalibus: longioribus decurrentibus. *Kern. Schwaemm. t.* 6. *f.* 1.

tormino- ſus. 146. A. pileo luteſcente: vertice depreſſo, margine piloſo ſtriato, lamellis inaequalibus luteis ſucco luteo refertis. *Schaeff. fung. t.* 12.

necator. 147. A. ſuccum albidum fundens, pileo umbrino: vertice concentrice ſtriato; margine deflexo fibroſo, lamellis alternis pallidioribus, ſtipite farcto. *Bull. herb. Franc. t.* 13.

zonarius. 148. A. pileo ſpadiceo concentrice ſtriato: vertice depreſſo, lamellis albidis, ſtipite fuſceſcenti-albido brevi farcto tereti. *Schaeff. fung. t.* 235.

dulcis. 149. A. ſordide ruber intus albus, ſuccum album dulcem fundens, pileo (adulti) infundibuliformi, lamellis numeroſis ſubdecurrentibus. *Bull. herb. Franc. t.* 224.

rufus. 150. A. pileo aurantio: vertice (adulti) umbilicato, lamellis tenuibus anguſtis fragilibus fuſceſcentibus ſuccum luteum fundentibus: ſecundi tertiique ordinis inaequalibus, ſtipite farcto fragili. *Bolton fung.* 9. *t.* 9.

ſcrobiculatus. 151. A. ſuccum lacteum demum ſulphureum fundens, pileo luteo piloſo convexo: vertice depreſſo, lamellis pallidioribus ramoſis, ſtipite tereti craſſo brevi. *Schaeff fung. t.* 227. *β*) Agaricus crinitus. *Schaeff. fung. t.* 228.

livens. 388. A. rigidus fragilis, pilei maculis obſoletis fuſcis, lamellis ochroleucis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 51. *t.* 36. *f.* 202.

lactifluus. 152. A. ſuaveolens dulcis ſuccum vix acrem fundens, pileo fuſceſcente firmo, lamellis fragilibus flavicantibus carneisve, ſtipite farcto tereti ſpongioſo. *Schaeff. fung. t.* 5. *α*) Agaricus fulvens. *Kern. Schw. t.* 11. *f.* 1. *β*) Agaricus aureus. *Krapf oeſterr. Schw.* 2. *t.* 1. *f.* 1-3. *γ*) Agaricus argenteus. *Kern. Schw. t.* 11. *f.* 2.

acerrimus. 153. A. inodorus aut graveolens acris ſuccum acerrimum fundens, pileo fuſceſcente firmo, lamellis fragilibus flavicantibus carneisve, ſtipite farcto tereti ſpongioſo. *α*) *Krapf oeſterr. Schw.* 2. *t.* 3. *f.* 5. *β*) *Krapf oeſterr. Schw.* 2. *t.* 4. *f.* 8. 9. *et t.* 5 *f.* 1. 2. *γ*) *Krapf oeſterr. Schw.* 2. *t.* 5. *f.* 5. *δ*) *Krapf oeſterr. Schw.* 2. *t.* 5. *f.* 8. *ε*) *Krapf. oeſterr. Schw.* 2. *t.* 6. *f.* 4-9. *ζ*) *Bull. herb. Franc. t.* 282.

154. A.

ichoratus. 154. A. pileo opaco tenello ſicco ochraceo-fulvo: vertice depreſſo, margine croceo elevato, lamellis inaequalibus extrorſum biſidis cum ſtipite pallide ochraceis. *Batſch el. fung. cent.* 37. *f.* 60.

cimicarius. 155. A. ferrugineo-fulvus, pileo opaco humeſcente infundibuliformi, lamellis triplicis longitudinis per regulas ſaepe connexis, ſtipite teretiuſculo fiſtuloſo. *Batſch el. fung. cent.* 59. *f.* 69. *nonne mera rufeſcentis varietas?*

opacus. 156. A. ſuccum acrem album fundens, pileo rigido humeſcente viſcoſo, fuſceſcente-cinereo: vertice excavato obſolete concentrice faſciato, lamellis latis triplicis longitudinis utrinque anguſtioribus ochraceo-carneis, ſtipite albido. *Batſch el. fung. cent.* 57. *f.* 68. *an varietas agacris?*

piperatus. 157. A. albus ſuccum acrem fundens, pileo laevi fragili: vertice (ſeneſcentis) excavato, margine deflexo, lamellis inaequalibus, irregularibus anguſtis, ſtipite farcto utrinque anguſtato. *Bolton fung.* 21. *t.* 21. *Schaeff. fung. t.* 83.

Bulliardi. 158. A. acris, pileo laevi dilute cinnamomeo: vertice excavato; margine inflexo crenulato, lamellis duplicis longitudinis, ſtipite tereti craſſo. *Bull. herb. Franc. t.* 292.

amarus. 159. A. ſuccum acrem fundens, pileo ochroleuco: vertice (adulti) excavato; margine undulato, ſtipite concolore craſſo tereti farcto, lamellis ramoſis flavicantibus. *Kern Schw. t.* 9. *f.* 1.

acris. 360. A. pileo diſtorto mutabili fuſceſcente, lamellis triplicis ordinis, ſtipite compreſſo ſulcato deorſum anguſtato. *Bolton fung.* 2. *t.* 60. *nonne plumbeo affinis?*

†† *laeves, membranacei, vix carnoſi.*

† Coriacei, *pileo lamellisque coriaceis.*

melleus. 160. A. pileo convexo pallide ſulphureo ferrugineoque: margine pallido ſtriato, lamellis albidis, ſtipite elongato tereti ſublineari fiſtuloſo cereo. *Schaeff. fung. t.* 45.

caryophyllaeus. 161. A. pileo convexo exſolete aureo: vertice elevato ſubferrugineo; margine crenulato, lamellis pallide cinnamomeis, ſtipite flavicante tenui tereti farcto. *Schaeff. fung. t.* 77.

cereolus. 162. A. pileo campanulato pallide ſulphureo: margine ochraceo-ferrugineo, lamellis cinereo-fulcis, ſtipite elongato niveo farcto. *Schaeff. fung. t.* 51.

lacrimalis. 163. A. pileo depreſſo fuſceſcente ochraceove, lamellis ochraceo-fuſcis inaequalibus, ſtipite obſcuriori elongato lineari baſi bulboſo. *Batſch el. fung.* 75. *f.* 7. 8.

auricornus. 164. A. pileo laevi ſicco depreſſo: medio elevato, luteo fuſco-radiato, lamellis anguſtis fuſco-cinereis duplicis longitudinis, ſtipite lineari brevi ſemipellucido fuſceſcente. *Batſch el. fung.* 75. *f.* 21.

farinoſus. 165. A. farinoſus, pileo conico depreſſo laevi pallidiſſime ochraceo: medio flavicante, lamellis exſolete terreis, ſtipite elongato lineari albido ſemipellucido baſi bulboſo. *Schaeff. t.* 205. *an hujus cohortis?*

candicans. 166. A. pileo convexo ſubviſcido nitente flavicante, lamellis fuſcis, ſtipite lineari albo farcto annulato. *Schaeff. fung. t.* 21.

umbilicatus. 167. A. ochroleucus, pilei vertice umbilicato flavicante, lamellis ſubdecurrentibus, ſtipite tereti farcto ſurſum ampliato. *Schaeff. fung. t.* 207.

decurrens. 168. A. ochroleucus, pilei vertice umbilicato: margine plicato-ſtriato, lamellis decurrentibus: minoribus interſitis, ſtipite elongato tereti fiſtuloſo. *Schaeff. fung. t.* 232. *an varietas umbilicati?*

fuſceſcens. 169. A. pileo convexo fuſco, lamellis fuſco-fulventibus, ſtipite lineari ſubelongato pallido fiſtuloſo. *Schaeff. fung. t.* 60.

collinus. 170. A. pileo convexo umbonato albo vel pallide-ochraceo nitente, ſtipite concolore elongato ſemipellucido fiſtuloſo, lamellis griſeo-albis. *Schaeff. fung. t.* 220.

criſtatus. 171. A. pileo lacteo ſquamis faſciculatis ſpadiceis vario, lamellis teneris albis triplici ordine digeſtis, ſtipite tereti fiſtuloſo fuſceſcente. *Bolton fung.* 7. *t.* 7. *Bull. herb. Franc. t.* 405? *β) Bulliard herb. Franc. t.* 70. *t.* 506. *f.* 2.

tigrinus. A. pileo convexo ſquamato albido: centro depreſſo, lamellis decurrentibus luteſcentibus. *Bull. herb. Franc. t.* 70.

caſtaneus. 172. A. pileo laevi ſericeo caſtaneo, lamellis teneris rubello-fuſcis: tertii ordinis breviſſimis, ſtipite lineari albo fiſtuloſo elaſtico. *Bulliard herb. Franc. t.* 268.

irregularis. 173. A. pileo ſordido viſcido ſpadiceo: margine lobato-undulato, lamellis diſtantibus obſcure carneis triplici ordine digeſtis, ſtipite tereti laevi fiſtuloſo cineraſcente duro. *Bolton fung.* 13. *t.* 13.

174. A.

elasticus. 174. A. pileo convexo ferrugineo, carne cortinaque elasticis lamellisque triplici ordine digestis latiusculis distantibus albis, stipite inaequali farcto elastico ferrugineo. *Bolton fung.* 16. *t.* 16.

plumosus. 175. A. pileo hemisphaerico murino squamulis lanatis obsesso, lamellis latis numerosis albis flexilibus triplici ordine positis, stipite lineari elongato squamato. *Bolton fung.* 33. *t.* 33.

nigro-villosus. 176. A. pileo humescente tomentoso nigricante (adulti) cucullato: margine inaequali, stipite lineari albo, lamellis introrsum latioribus (senescentis) rubellis. *Bulliard herb. Franc. t.* 214.

fissus. 177. A. pileo conico fusco: margine striato olivaceo, lamellis latis numerosis tenuibus flexilibus aurantio-carneis triplici ordine positis, stipite murino elastico fistuloso compresso. *Bolt. fung.* 35. *t.* 35.

rubens. 178. A. ruberrimus mollis, pileo opaco, lamellis latis teneris pellucidis triplici ordine digestis, stipite farcto elongato. *Bolton fung.* 36. *t.* 36. *an satis distinctus a sanguineo?*

ramealis. 179. A. pileo (adulti) excavato albo: medio fusco rubellove, lamellis numerosis divisis, stipiteque farcto tereti albidis. *Bulliard herb. Franc. t.* 336.

velutipes. 180. A. gregarius, pileo convexo flavo laevi, lamellis ligneis: minoribus interspersis, stipite fistuloso inferne tomentoso nigro, superne igneo. *Bulliard herb. Franc. t.* 344. *Curtis flor. Lond.*

ardesiacus. 181. A. pileo hemisphaerico concentrice striato stipiteque fistuloso superne caerulescentibus, hoc inferne albo, lamellis latis igneis: inter binas longiores quinis brevioribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 348.

repens. 182. A. pileo convexo flavicante: centro depresso, lamellis concoloribus divisis, stipite repente fistuloso fibroso ramoso: ramis rubris. *Bull. herb. Franc. t.* 90.

croceus. 183. A. pileo croceo laevi sicco truncato-conico: vertice mammillari, margine repando-lacero, lamellis rarioribus, stipite flavicante, farcto tereti. *Bulliard herb. Franc. t.* 50. *β*) Agaricus coccineus. *Schaeff. fung. t.* 302. *γ*) Agaricus psittacinus. *Schaeff. fung. t.* 301.

Hyacinthus. 184. A. pileo conico luteo-vel virescenti-fusco, lamellis pallidioribus, stipite elongato lineari recto fistuloso. *Batsch el. fung.* 81. *t.* 28. *an distinctus satis a fastigiato?*

vinosus. 185. A. fuscus vinum olens subacris, pileo orbiculari sicco: medio verrucoso, lamellis confertis, stipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 54.

auratus. 365. A. pileo convexo viscido stipiteque fistuloso exterius aurantiis, lamellis sulphureis. *Bolton fung.* 2. *t.* 67. *f.* 2.

sciissus. 366. A. sulphureus pileo subconico margine lacero, lamellis latissimis basi angustis triplicis ordinis, stipite fistuloso contorto. *Bolton fung.* 2. *t.* 68.

superstitiosus. 186. A. albidus, pileo orbiculari sicco: centro impresso luteo, lamellis subflexuosis duplicis longitudinis, stipite lineari superne fistuloso. *Bull. herb. Franc. t.* 56.

ramosus. 187. A. albus, pileo orbiculari sicco: margine convexiusculo, lamellis minoribus paucioribus inter longiores, stipitibus pluribus farctis flexuosis e communi trunco. *Bull. herb. Franc. t.* 102.

piluliformis. 188. A. pileo sicco globoso fuscescente: margine albido, lamellis albis divisis, stipite fistuloso albido superne incrassato. *Bull. herb. Franc. t.* 112.

contortus. 189. A. pileo sicco umbrino convexo: vertice papilloso, lamellis fragilibus stipiteque spirali albidis. *Bulliard herb. Franc. t.* 36.

amaricans. 190. A. pileo unguinoso flavo-viridi, stipite concolore subflexuoso fistuloso, lamellis viridibus: minoribus inter longiores positis. *Bulliard herb. Franc. t.* 30.

cyaneus. 191. A. unguinosus, pileo rotundo caeruleo: vertice mammillari fuscescente; margine albo-floccoso, stipite concolore subtomentoso, lamellis umbrinis divisis. *Bulliard herb. Franc. t.* 170. *an diversus a Beryllo?*

Beryllus. 192. A. pileo convexo-conico flavo extrorsum thalassino fibroso, lamellis inaequalibus pallide rubellis, stipite elongato lineari flavescente: annulo nigricante. *Schaff. fung. t.* 1. Agaricus viridulus.

moschatus. 193. A. moschum olens, pileo plano thalassino sicco, lamellis numerosis divisis, stipiteque lineari firmo albidis. *Bull. herb. Franc. t.* 176.

194. A.

sulphureus. 194. A. sulphureus, pileo subconico sicco, lamellis numerosis triplici ordine digestis: longioribus stipiti fibroso contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 168.

olivaceus. 195. A. pileo convexo-conico laevi integro aureo: centro ferrugineo, lamellis numerosis confertis olivaceis margine sinuatis quintuplicis longitudinis, stipitibus aggregatis divaricatis adscendentibus elongatis linearibus fistulosis: annulo striato. *Mich. nov. pl. gen. p.* 199. *t.* 80. *f.* 7.

abbreviatus. 196. A. pileo obtuse conico ferrugineo aut fuliginoso, lamellis albidis aut flavescentibus, stipite elongato exalbido (senescentis) fistuloso. *Schaeff. fung. t.* 250. *et* 253.

subcorneus. 197. A. pileo conico depresso castaneo: margine aurantio, lamellis crassis inaequalibus, stipiteque elongato lineari flexuoso fistuloso pallidis. *Batsch el. fung.* 83.

sanguineus. 198. A. sanguineus, pileo convexo laevi, lamellis divisis, stipite tereti lineari farcto: annulo fibroso aurantio. *Jacq. misc. austr.* 2. *t.* 15. *f.* 3.

cereus. 199. A. pileo hemisphaerico sicco laevi cereo, lamellis tenuibus distantibus integris divisisque flavescentibus, stipite tereti lineari flavo: medio fistuloso. *Jacq. miss. austr.* 2. *p.* 105. *t.* 15. *f.* 2.

sordidus. 200. A. lamellis simplicibus rectis pileoque plano livido-fuscis: centro umbilicato, margine depresso, stipite basi crassiore. *Dickf. crypt. Brit. fasc.* 1. *p.* 56. *t.* 3. *f.* 1.

flavo-floccosus. 201. A. pileo umbonato sulphureo ochraceo obumbrato furfuraceo: margine crenulato stipiteque farcto subferrugineo floccis furfuraceis inaequali, lamellis subquadruplicis longitudinis albentibus. *Batsch el. fung. cent.* 117. *f.* 97.

circumseptus. 202. A. pileo subcarneo ante marginem stipiteque medio saepe floccis furfuraceis cincto, lamellis latis ferrugineis triplicis longitudinis. *Batsch el. fung. cent.* 119. *f.* 98.

rosellus. 203. A. pileo subcarneo convexiusculo opaco, lamellis laxis triplicis longitudinis stipiteque farcto torto fibroso rubellis. *Batsch el. fung. cent.* 121. *f.* 99

subcarneus. 204. A. humescens, pileo mutabili ochraceo, stipite fistuloso recto fibroso, lamellisque carneolis: his semipellucidis triplicis longitudinis; longissimis stipiti adnatis. *Batsch el. fung. cent.* 123. *f.* 100.

cineraſcens. 205. A. pileo glabrato ſtipiteque fibrilloſo farcto fuſco-cinereis, lamellis flaveſcentibus quadruplicis ordinis: longioribus ſtipiti affixis. *Batſch el. fung. cent.* 125. *f.* 101.

obſoleſcens. 206. A. pileo pulvinato laevi ochraceo-carneo, lamellis latiuſculis lividis, ſtipiti concolori farcto ſpongioſo affixis ſubquadruplici ordine diſpoſitis. *Batſch el. fung. cent.* 127. *f.* 102. *β*) Agaricus obſoletus. *Batſch el. fung. cent.* 129. *f.* 103.

tremebundus. 207. A. pileo pallide carneo: medio craſſiuſculo, ſtipite fibroſo torto fiſtuloſo, lamellis inaequalibus pileo ſoli adnatis. *Batſch el. fung. cent.* 129. *f.* 104. *β*) *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 73. *t.* 38. *f.* 209. *γ*) *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 75. *t.* 38. *f.* 210.

canobrunneus. 208. A. humeſcens, pileo tenero ſtipiteque fibroſo fiſtuloſo carneo-caneſcentibus, lamellis brunneis ſubquadruplicis longitudinis: extremo margine farinaceo. *Batſch el. fung. cent.* 133. *f.* 105.

candidobulboſus. 209. A. pileo umbonato ſtipiteque ſolido validiuſculo baſi bulboſo pileum ſuſtentante albis ſericeo-nitentibus, lamellis lividis ſubtriplicis longitudinis: extimo margine albo. *Batſch el. fung. cent.* 133. *f.* 106.

aurivenius. 210. A. pileo umbonato obſcurius fibroſo-venoſo ſtipiteque obſolete fibroſo baſi bulboſo flaventibus, lamellis inaequalibus pileo ſoli adnatis margine crenato furfuraceo-albis. *Batſch el. fung. cent.* 137. *f.* 107. *Bull. herb. Franc. t.* 388.

bulbularis. 211. A. pileo laevi pulvinato hemiſphaerico depreſſo luteſcente, ſtipite albo ſericeo-nitente farcto bulboſo pileum ſuſtentante, lamellis ſemiorbiculatis pileo ſoli adnatis lividofulvellis triplicis ordinis. *Batſch el. fung. cent.* 137. *f.* 108.

coriaceus. 212. A. pileo depreſſo-convexo carneo-ochraceo, ſtipite farcto elongato torto, pileum ſuſtentante lamellisque pileo ſoli adnatis pallidioribus. *Batſch el. fung. cent.* 139. *f.* 109.

tomentoſus. 213. A. pileo convexo-conico tomentoſo fulvo, ſtipite gracili, annulo fugaci. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 241. *t.* 2. *f.* 1.

muſcorum. 214. A. pileo impreſſo ſtriato flavo-fuſco, ſtipite brevi baſi incraſſato, lamellis horizontalibus pallidioribus. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 242. *t.* 5. *f.* 3.

ſemiglobatus. 215. A. pileo glabro ſemiglobоſo flaveſcente, ſtipite ſubconcolore, opaco: medio nigro-pruinato gracili elongato pileum

leum ſuſtentante, lamellis cinereis obſcurius maculatis: majoribus ſtipiti adnexis. *Batſch el. fung. cent.* 141. *f.* 110. *β*) Agaricus clypeatus. *Bolton fung.* 2. 57. *t.* 57.

diffuſus. 216. A. pileo tenero laevi livido-carneo, lamellis elongatis violacco-fulvis quadruplicis ordinis: majoribus ſtipiti adnexis, ſtipite niveo elongato fiſtuloſo pileum ſuſtentante. *Batſch el. fung. cent.* 143. *f.* 111.

purpureus. 217. A. pileo hemiſphaerico ſtipiteque brevi fiſtuloſo purpureis, lamellis triplicis ordinis albidis. *Bolton fung.* 41. *t.* 41. *f.* B.

contortilis. 218. A. pileo fuſco ſtriato undulato, lamellis ſtipiteque brevi carneis. *Bolton fung.* 41. *t.* 41. *f.* A.

granuloſus. 219. A. pileo albo-granulato ſtipiteque lineari valido ochraceo-ferrugineis, lamellis albis. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 24.

hiſpidus. 220. A. pileo brunneo: vertice hiſpido, ſtipite lineari valido lamellisque pallidiſſime concoloribus. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 25.

fuliginatus. 221. A. pileo conico ſtriis niveis caneſcentibus et obſolete fuligineis ſubſquamoſo, ſtipite lineari ſubelongato valido lamellisque niveis. *Batſch. el. fung.* 81. *f.* 26.

atro ſquamoſus. 222. A. pileo fuſceſcente-niveo maculis ſtriatis nigris ſubſquamoſo, ſtipite ſubulato valido lamellisque albis. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 27. *β*) Agaricus conſpurcatus. *Willd. prodr. fl. berol. n.* 1104. *Mich. nov. pl. gen. t.* 78. *f.* 6-8. *an diſtincta ſatis a criſtato ſpecies?*

umbraculum. 223. A. pileo rorido depreſſo-conico lamellisque rarioribus triplicis longitudinis fuſceſcenti-cinereis, ſtipite ſubulato albo ſtriato torto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 4.

Placenta. 224. A. pileo depreſſo umbonato cinereo fuſceſcente, lamellis carneo-albis, ſtipite lineari-elongato valido fibroſo torto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 18. *nonne forſan olypanti varietas?*

murinus. 225. A. pileo depreſſo atro, lamellis ſtipiteque elongato lineari valido atro-ſtriato cinereis. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 19.

farinaceus. 226. A. pileo rubro-violaceo convexo: vertice ſubdepreſſo, lamellis violaceis, ſtipite fuſceſcente. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1117. *Schaeff. fung. t.* 8. *t.* 12. *t.* 13. *f.* 1-3 *t.* 223?

janthinus. 227. A. violaceo-rubens, pileo ſubconvexo, lamellis diſtantibus convexis decurrentibus, ſtipite elongato lineari. *Schaeff. fung. t.* 13. *f.* 2. 4. 5-8.

laccatus. 228. A. ſubcarneus, pileo ſtriato convexo : vertice depreſſo, ſtipite tereti recto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 20.

majalis. 229. A. ſuaveolens, pileo convexo ſicco dilute coriaceo, ſtipite concolore deorſum incraſſato, lamellis membranaceis ſubdecurrentibus utrinque acuminatis. *Bull. herb. Franc. t.* 142.

mammoſus. 230. A. ſuaveolens dilute fuſcus, pileo difformi, lamellis latiuſculis diviſis a ſtipite lineari farcto ſpirali diſtantibus. *Bull. herb. Franc. t.* 144.

alliatus. 231. A. allium redolens ſapiensque canus, pilei margine undulato ſtriato, lamellis diviſis ſtipiti contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 153. *vix diſtinctus ab alliaceo.*

alliaceus. 232. A. allium ſapiens reddensque, pileo convexo glabro e fuſco-palleſcente, lamellis albidis, ſtipite atro nitido fiſtuloſo. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 82.

plicatus. 233. A. allium ſapiens olensque, pileo planiuſculo: margine luteo-rufo undulato-plicato, lamellis inaequalibus albidis, ſtipite tereti lineari rufo. *Schaeff. fung. t.* 99 *f.* 2. 5-8.

abietis. 234. A. pileo glaberrimo ſubviſcido depreſſo-convexo, lamellis albidis, ſtipite lineari elongato fulvo. *Schaeff. fung. t.* 99. *f.* 1. 3. 4.

pineti. 235. A. ceſpitoſus, pileo depreſſo-convexo umbonato glaberrimo ſubniveo, lamellis ſubconcoloribus inaequalibus, ſtipite gracili lineari obſcuro. *Batſch el. fung.* 73. *f.* 9.

eſculentus. 236. A. pileo convexo terreo, ſtipite gracili fiſtuloſo ſordide ochroleuco, lamellis albis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 14 *f.* 4.

Clavus. 237. A. pileo planiuſculo umbonato luteo: margine ſtriato plicatove, lamellis ſordide albis, ſtipite lineari tereti farcto, inferne torto. *Schaeff. fung. t.* 59.

fibrilloſus. 238. A. pileo convexo lamellisque paucioribus griſeis, ſtipite gracili lineari fiſtuloſo ſubſpadiceo. *Schaeff. fung. t.* 236. *an mera Clavi varietas?*

crenulatus. 239. A. pileo dilute cinnamomeo albo-pulverulento: margine crenato, lamellis ſtipiteque gracili fiſtuloſo concoloribus *Schaeff. fung. t.* 226.

ſubcoriaceus. 240. A. pileo convexiuſculo fuſceſcente-ochraceo: margine integro, lamellis fuſco-lividis, ſtipite lineari elongato ſubgracili flavicante. *Schaeff. fung. t.* 203.

241. A.

atro rufus. 241. A. pileo convexo umbonato hepatico albido-striato: margine crenato, lamellis ſtipiteque lineari gracili elongato fiſtuloſo pallidioribus. *Schaeff. fung. t.* 234.

ſetaceus. 242. A. pileo umbonato miniato, lamellis aureis, ſtipite elongato ſubfubulato pallide ſulphureo. *Schaeff. fung. t.* 222.

angulatus. 243. A. albus pileo plano: margine fimbriato repando-angulato, lamellis raris, ſtipite elongato gracili. *Mich. nov. pl. gen. p.* 146. *t.* 74. *f.* 4.

Clavis. 244. A. ſuaveolens, pileo rotundo luteo-fuſco, lamellis ramis diviſis ſtipiti nigricanti tereti brevi farcto contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 148.

Fibula. 245. A. ochroleucus, pileo rotundo infundibuliformi, lamellis decurrentibus, ſtipite lineari laevi farcto. *Bull. herb. Franc. t.* 186.

Campanella. 246. A. pileo conico-convexo umbilicato glabro ſtriato ſtipiteque tereti farcto fragili gracili croceis, lamellis pallide ſulphureis. *Schaeff. fung. t.* 230.

minutus. 247. A. parvus, pileo campanulato fuſcеſcente ſtriato, ſtipite brevi incurvo. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 277. *t.* 6. *f.* 3. 4.

ferrugi-natus. 248. A. pileo minuto conico luteſcente: medio ferrugineo, lamellis ſtipiteque elongato torto ſubſubulato pallidiſſime fuſceſcentibus. *Batſch el. fung. cent.* 109. *f.* 92.

hyſni. 249. A. pileo umbonato pallide ochraceo: margine plicato ferrugineo, lamellis ferrugineis triplicis ordinis: intimis ſtipiti gracili fiſtuloſo affixis. *Batſch el. fung. cent.* 117. *f.* 96.

ſtriatellus. 250. A. pileo conico ſubovato albo griſeo-flavente denſe plicato, lamellis plumbeis inaequalibus, ſtipite filiformi fiſtuloſo albo. *Schaeff. fung. t.* 211.

Fumus. 251. A. pileo conico ſubovato acuminato fuſco vel flavente, lamellis rubris: ſtipite lineari elongato pallidiori. *Schaeff. fung. t.* 63. 70. 229.

fuligina-rius. 252. A. pileo conico ſubovato acuminato atro ſcabro, ſtipite valido ſubconcolore ſuperius albente, lamellis carneis. *Batſch el. fung.* 71. *f.* 40.

contra-ctus. 253. A. pileo nigro-fuſceſcente ſtriato oblongo: margine conſtricto albidiore, ſtipite fibroſo flexuoſo ſtriato ſubconcolore: baſi hiſpidula albidiore. *Batſch el. fung. cent. f.* 85.

254. A.

glandifer. 254. A. pileo oblongo nigro-fuſco ſtriato: margine conſtricto albo, ſtipite lineari nigro-fuſco, lamellis albis elongatis. *Batſch el fung. cent.* 99. *f.* 86.

atro cyaneus. 255. A. niger cyaneo-pruinatus, pileo cucullato denſe ſtriato-ſulcato: margine extremo lamellisque albidioribus, ſtipite elongato lineari ſtriato ſulcato. *Batſch el. fung. cent.* 1101. *f.* 87.

luridus. 256. A. pileo glabro humeſcente ochraceo-cineraſcente, ſtipite lineari albo baſi clavato lamellis duplicis ordinis ſpadiceis. *Batſch el fung. cent.* 107. *f.* 90.

rimoſus. 389. A. pileo fuſco-griſeo pruinato ſaepius albo-rimoſo, ſtipite fericeo fibroſo niveo, laminis albidis latis laxis ſubundulatis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 63. *t.* 37. *f.* 206.

marginatus. 390. A. pileo glabro ſubferrugineo margine membranaceo, ſtipite fibrilloſo ex livido ochraceo baſi niveo, lamellis ferrugineis triplicis ordinis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 65. *t.* 37. *f.* 207.

alterabilis. 391. A. pileo luteſcente depreſſo-conico, ſtipite fibrilloſo, lamellis fuſco-ferrugineis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 69. *t.* 38. *f.* 208.

viſceralis. 392. A. ex hepatico fulvus, pileo convexo fovente ſtipite gracili baſi albo, lamellis craſſis rarioribus: ordine triplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 77. *t.* 38. *f.* 211.

chryſodon. 393. A. albus pilei margine crenato luteſcente, ſtipite ſuperne luteo-pruinato, laminis margine ſulphureo-pruinatis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 79. *t.* 38. *f.* 212.

⊢⊢ tenelli, *pileo lamellisve et ſtipite pellucidis, utplurimum concoloribus; illo ſtriato, plicato.*

gracilis. 353. A. pileo ſubconico elaſtico ſicco, lamellis paucis trifidis rubris ſtipite praelongo gracili. *Bolton fung.* 2. *t.* 51. *f.* 1.

ſulphuratus. 257. A. pileo luteſcente-cano convexo plicis latis inaequali, lamellis albidis duplicis ordinis, ſtipite lineari elongato fiſtuloſo ſulphureo. *Schaeff. fung. t.* 31.

aduſtus. 258. A. fuſcus, pileo convexo-conico late plicato extrorſum pallide griſeo, ſtipite lineari elongato fiſtuloſo. *Schaeff. fung. t.* 32.

piloſulus. 259. A. fuſco-cineraſcens, pileo convexo ad latera late plicato: margine dentato-repando, lamellis duplicis longitudinis,

dinis, ſtipite filiformi inferne ad latera piloſo. *Batſch el. fung.* 67. *f.* 2.

Tintinnabulum. 260. A. cinereus, pileo ſemiovato integro ad latera denſe ſtriato, ſtipite lineari elongato flavicante. *Batſch el. fung.* 67. *f.* 3. *Schaeff. fung. t.* 237. Agaricus palleſcens.

minutulus. 261. A. pileo campanulato obſolete aureo, lamellis raris flavicantibus, ſtipite tereti farcto curvulo albido. *Schaeff. fung. t.* 308.

hirtus. 262. A. pileo conico ſtipiteque fiſtuloſo ſub tomento tenero glabris ſtriatis cinereis, lamellis concoloribus numeroſis diviſis utrinque acuminatis duplicis ordinis. *Bull. herb. Franc. t.* 138.

androſaceus. 263. A. pileo conico pellucido ſtriato crenato lamellisque albidis, ſtipite gracili obſcuro. *Schaeff. fung. t.* 239.

trichopus. A. albus, pileo campanulato ſubſtriato, ſtipite procero ſetaceo caudato albo. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *n.* 1493.

bicolor. 264. A. lamellis raris diſtantibus pileoque caduco (feneſcentis) fuſceſcentibus, ſtipite capillari duro pellucido nigro. *Bolton fung.* 32. *t.* 32.

nothus. 265. A. albidus cineraſcens flavicansve, lamellis decurrentibus, carne albo, ſtipite gracili farcto. *Bull. herb. Franc. t.* 276.

umbellatus. 266. A. albidus, pileo convexo ſubconico tandem planiuſculo umbonato plicato, lamellis diſtantibus, ſtipite gracili terete fiſtuloſo. *Schaeff. fung. t.* 309.

umbelliferus. 267. A. minutus albus pellucidus, pileo hemiſphaerico: margine plicato, lamellis diſtantibus, ſtipite filiformi. *Bolton fung.* 39. *t.* 39. *f.* A.

candidus. 268. A. minutus albus, pileo hemiſphaerico margine involuto lamellis flexilibus, ſtipite tereti flexuoſo. *Bolton fung. t.* 39. *f.* D.

radiatus. 269. A. pileo cinereo radiato plicato ſtipiteque filiformi pellucidis. *Bolton fung.* 39. *t.* 39. *f.* C.

perforans. 270. A. pileo hemiſphaerico marginato ſtriato, ſtipite ſetaceo nigro perforante. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 304. *t.* 4. *f.* 2. *an ſatis diſtinctus ab androſaceo?*

membranaceus. 271. A. pileo campanulato murino fuſco-ſtriato, ſtipite elongato fiſtuloſo ſubtus incraſſato. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 305. *t.* 6. *f.* 1.

272. A.

stellatus. 272. A. pileo striato, stipite gracili involucro radicali stellato cincto. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 306. *t.* 6. *f.* 2.

papillatus. 273. A. albus, pilei papilla fuscescente, lamellis convexis, stipite filiformi. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 307. *t.* 3. *f.* 2.

mammillaris. 274. A. pileo hemisphaerico longe papillato, stipite fistuloso caudato. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 308. *t.* 4. *f.* 1.

turbaceus. 275. A. pileo terreo pallide striato pellucido contorto, lamellis rugosis, stipite arcuato. *Bolton fung.* *t.* 41. *f.* c.

luteo-albus. 276. A. pileo conico striato, stipiteque filiformi flavescentibus, lamellis albis latiusculis triplicis ordinis. *Bolton fung.* 38. *t.* 38. *f.* 1.

tenuis. 277. A. albidus, pileo campanulato membranaceo, lamellis triplicis ordinis stipiteque longissimo fistuloso pellucidis. *Bolt. fung.* 37. *t.* 37.

confertus. 278. A. gregarius albidus, pileo glabro conico acuminato: apice fusco, lamellis aequalibus confertis tenellis fusco obumbratis stipite farcto. *Bolton fung.* 18. *t.* 18.

norwegicus. 279. A. sulphureus, pileo umbonato striato angulato-repando, lamellis linearibus alternatim minoribus, stipiteque lineari-fistuloso pallidioribus. *Gunn. flor. norv. n.* 994. *t.* 7. *f.* a. b.

Rotula. 280. A. albidus, pileo convexo umbonato extrorsum striato, lamellis latiusculis distantibus annulo peculiari annexis. *Mich. nov. pl. gen.* 195. *t.* 79. *f.* 7.

conicus. 281. A. pileo campanulato acuto nitido livido striato, lamellis albis, stipite fistuloso cinereo. *Schaeff. fung. t.* 52. *f.* 1-6.

peronatus. 359. A. pileo hemisphaerico, lamellis paucis angustis triplici serie digestis, stipite superius glabro inferius lanuginoso basi arcuato. *Bolton fung.* 2. *t.* 58.

equinus. 361. A. sulphureus, pileo mutabili fuscescente luteo-radiato, stipite fistuloso, lamellis triplicis ordinis. *Bolton fung.* 2. *t.* 65.

variegatus. 362. A. pileo obtuso-conico nigro, fuscescente vel cinereo, lamellis triplicis ordinis stipiteque fistuloso cinereis. *Bolt. fung.* 2. *t.* 66. *f.* 1.

cuspidatus. 363. A. pileo acute-conico subspadiceo, lamellis triplicis ordinis angustis subfuscis, stipite fistuloso. *Bolton fung.* 2. *t.* 66. *f.* 2.

nuceus. 367. A. pileo globoſo caſtaneo: margine lobato incurvo lamellis undulatis triplicis ordinis, ſtipite gracili albo fiſtuloſo. *Bolton fung.* 2. *t.* 70.

ſulcatus. 282. A. cinereus, pileo conico: vertice acuminato fuſcelcente, ſtipite elongato lineari deorſum incraſſato. *Schaeff. fung. t.* 52. *f.* 7-9. *an mera conici varietas?*

griſeus. 283. A. pileo conico explanato umbonato opaco plicis latis obtuſis arato, ſtipite elongato baſi fibrilloſo, lamellis triplicis longitudinis. *Batſch el. fung.* 87. *f.* 80.

clavularis. 284. A. tener vireſcenti-albus, pileo ſubhemiſphaerico umbilicato obſolete plicato, lamellis paucioribus inaequalibus, ſtipite gracili baſi bulboſo. *Batſch el. fung. cent.* 89. *f.* 81.

Mucor. 285. A. minutiſſimus griſeus, pileo convexo, lamellis paucis, ſtipite tenero pellucido: baſi bulbo annulari inſerta. *Batſch el. fung. cent.* 91. *f.* 82.

ſaccharinus. 286. A. albus, pileo conico-explanato opaco laxe plicato undulato, lamellis paucis anguſtis craſſis, ſtipite ſubulato rubente. *Batſch el. fung. cent.* 93. *f.* 83.

acicularis. 287. A. minimus albidus, pileo hemiſphaerico, lamellis paucis craſſiuſculis, ſtipite ſetaceo. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 322. *t.* 5. *f.* 2.

⊢⊢⊢ *partim in liquorem nigrum diffluentes aut lamellis nigris inſtructi.*

momentaneus. 288. A. pileo conico ſubpapilloſo cineraſcente-fuſco ſtriato crenulato lamellis ſtipiteque fiſtuloſo lineari canis. *Bulliard herb. Franc t.* 128.

ſpadiceo-griſeus. 289. A. pileo pallido: umbone magis flavo, margine tenuiſſime ſtriato griſeo, lamellis (ſeneſcentis) nigreſcentibus, ſtipite elongato fiſtuloſo albido ſurſum graciliori. *Schaeff. fung. t.* 237.

papyraceus. 290. A. albus, pileo hemiſphaerico membranaceo, lamellis triplicis ordinis diſtantibus aetate nigreſcentibus, ſtipite fiſtuloſo. *Bolt. fung* 11. *t.* 11.

umbilicaris. 291. A. coriaceus albidus in liquorem fuſcum deliqueſcens, lamellis triplicis ordinis diſtantibus, ſtipite farcto. *Bolton fung.* 17 *t.* 17.

faſciculatus. 292. A. fuſceſcendo diffluens, pileo convexo laevi luteo, lamellis numeroſis anguſtis olivaceis, ſtipite flexuoſo fiſtuloſo flavo. *Bolton fung.* 29. *Vix diſtinctus a faſciculari.*

293. A.

acuminatus. 293. A. pileo conico acuminato pallide murino, lamellis atris, ſtipite tereti anguſto fiſtuloſo atrorubente. *Schaeff. fung. t.* 202.

ſordidulus. 294. A. pileo ſquamoſo ſordide luteo, lamellis terreis nigropulverulentis, demum atris, ſtipite gracili elongato fiſtuloſo fuſceſcente. *Schaeff. fung. t.* 210.

carbonarius. 295. A. pileo conico nitente plumbeo, lamellis ſubquadruplicis longitudinis nigris, margine albidis, ſtipite ſemipellucido inferne ſpadiceo. *Batſch el. fung.* 69. *f.* 6. *β) Batſch el. fung. cent.* 107. *f.* 91.

ſubatratus. 296. A. pileo opaco umbonato denſe et alternatim plicato ſtriato ſtipiteque elongato fiſtuloſo ochraceo caneſcentibus, lamellis confertis brunneo-atris margine albidis. *Batſch el. fung. cent.* 103. *f.* 89.

marcoticus. 297. A. pileo convexo extrorſum plicis furcatis radiato, lamellis cineraſcentibus alternis integris et dimidiatis, ſtipite ſubulato albo. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 77.

ciliaris. 354. A. pileo conico ochroleuco primo niveo-roridо, poſtea glutinoſo, margine ciliato, lamellis triplici ordine diſpoſitis, ſtipite albo baſi incraſſato. *Bolton fung.* 2. *t.* 53.

tricolor. 355. A. pileo campanulato fuſco ſtriato glabro, lamellis atris margine criſpis, ſtipite fiſtuloſo. *Bolton fung.* 2. *t.* 54.

papilliger. 298. A. pileo campanulato lacero griſeo-furfuroſo: margine ſtriato; vertice papillifero, ſtipite lineari pellucido nigropulverulento, lamellis atris margine niveis longioribus brevioribusque alternis. *Batſch el. fung. cent.* 81. *f.* 78.

lacrimabundus. 299. A. pileo campanulato luteo, lamellis ſuccum atrum ſtillantibus fuſceſcentibus nigro maculatis inaequalibus. *Bull. herb. Franc. t.* 194.

clypeiformis. 358. A. pileo viſcido umbonato, lamellis utrinque acuminatis triplici ordine digeſtis prima aetate murinis, ſtipite longo cylindrico. *Bolton fung.* 2. *t.* 57.

TTT Fuliginoſi, *pileo opaco conico, lamellis ſeneſcendo fuliginoſis tandem in ſeniem nigram diſtuentibus, ſtipite fiſtuloſo.*

congregatus. 300. A. gregarius, pileo flaveſcente cano crenulato digitiformi, lamellis diviſis ſtipiteque lineari recto albidis. *Bull. herb. Franc. t.* 94.

301. A.

succineus. 301. A. pileo convexo-campanulato lacero glabro pallide aurantio striato, lamellis plumbeis, stipite subelongato albo. *Schaeff. fung. t.* 6.

aqueus. 302. A. pileo glabro lacero cano-fuscescente leviter striato plicatoque, lamellis nigro-fuscis, stipite subelongato albo. *Schaeff. fung. t.* 17.

tortus. 303. A. pileo lacero subcarneo confertissime striato-sulcato, lamellis atris, stipite elongato albo torto valido. *Schaeff. fung. t.* 201.

cinereus. 304. A. pileo canescente umbonato confertissime striato, lamellis connatis, stipite elongato fuscescente albo. *Schaeff. fung. t.* 100.

margaritaceus. 305. A. pileo argenteo purpurascente misto extrorsum striato, stipite tereti squalido inferne incrassato. *Schaeff. fung. t.* 216.

ovatus. 306. A. pileo squamato striato cano, stipite annulato elongato albo terete deorsum crassiori: volva ovata squamosa. *Schaeff. fung. t.* 7.

Vaillantii. 307. A. gregarius, pileo striato cinereo ovato tandem spadiceo campanulato, lamellis latiusculis serrulatis, stipite lineari tereti albo. *Vaill. flor. par. t.* 12. *f.* 10. 11. *β*) Agaricus cylindricus. *Schaeff. fung. t.* 8. *γ*) Agaricus fugax. *Schaeff. fung. t.* 67. 68.

Balanus. 308. A. pileo dilute ochraceo, demum fuscescente extrorsum sulcato lacero revoluto, lamellis livido-rubellis, stipite elongato gracili tereti albido. *Schaeff. fung. t.* 66.

porcellaneus. 309. A. pileo aquose albo striis longitudinalibus purpurascentibus squamisque lutescentibus vario fusiformi demum campanulato, lamellis utrinque acuminatis, stipite flexuoso. *Schaeff. fung. t.* 47. 48.

squalidus. 310. A. pileo viscido olivaceo cinereo: margine inaequali, lamellis aequalibus numerosis confertis latiusculis, stipite duro flexuoso. *Bolton fung.* 25. *t.* 25. *an distinctus satis ab aqueo?*

domesticus. 311. A. pileo primum ovato floccis fuscescentibus aspero: margine undulato lacero, lamellis aequalibus latiusculis numerosis, stipite niveo. *Bolt. fung.* 26. *t.* 26.

papilionaceus. 312. A. pileo convexo-conico sublacero, lamellis latiusculis cinereo-virescentibus maculatis, stipite flexuoso. *Bull. herb. Franc. t.* 88.

fimiputris. 313. A. pileo umbrino (fenescentis) plano: margine inaequali, lamellis concoloribus nigro-maculatis divisis, stipite nigro-annulato deorsum incrassato. *Bull. herb. Franc. t. 66.*

pullatus. 314. A. pileo campanulato plicato atro viscido, stipite elongato ventricoso argenteo. *Bolton fung.* 20. *t.* 20. *an distinctus satis a cinereo?*

stercorarius. 315. A. pileo convexo diaphano cinerascente nigro: margine lacero revoluto, lamellis canis, stipite subobliquo angusto inferne incrassato. *Bull. herb. Franc. t.* 68.

campanulatus. 316. A. pellucidus; pileo campanulato vario striato, lamellis cinereis adscendentibus duplici ordine positis, stipite lineari gracili nudo. *Bolt. fung.* 31. *t.* 31.

atramentarius. 317. A. gregarius, pileo humescente laevi plicato fusco hinc inde maculato, lamellis latiusculis divisis albidis, stipite tereti lineari. *Bulliard herb. Franc. t.* 164.

Digitalis. 318. A. pileo semiovato crenulato livido-canescente extrorsum confertissime striato: vertice glabro ferrugineo, lamellis triplicis longitudinis atris, stipite adscendente elongato pallidissimo. *Batsch el. fung* 61. *f.* 1.

sobolifer. 319. A. pileo conico striato-piloso, stipite sobolifero albido. *Hoffm. nomencl. fung. n.* 357. *t.* 3. *f.* 1.

micaceus. 320. A. pileo humescente atro striato lamellisque primo albidis partiachis micantibus consitis. *Bull. herb. Franc. t.* 246.

picaceus. 321. A. ater, pileo striato rudimentis cuculli albis vario, lamellis latiusculis duplicis longitudinis, stipite albo inferne crassiusculo. *Bulliard herb. Franc. t.* 206.

rostratus. 322. A. pileo conico-campanulato striato plumbeo caducis cuculli rudimentis aspero, lamellis atris, stipite albido: medio incrassato deorsum tubulato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 80. *f.* 5.

gossypinus. 396. A. stipite fistuloso, albido: juniores tomentoso. *Bull. herb. Franc. t.* 425. *f.* 2.

** acaules.

glandulosus. A. subacaulis fuscus subtus albus, granulis interstitis. *Bull. herb. Franc.* 1. *t.* 426.

depluens. 323. A. subacaulis, pileo cano-sericeo dimidiato opaco, lamellis latiusculis fusco-rubellis margine arcuatis quadruplicis longitudinis. *Batsch el. fung.* 167. *f.* 122.

perennis. 324. A. subacaulis suberoso-coriaceus pallide ochraceus, lamellis pallidioribus. *Plan. fung. Erf. p.* 8. *n.* 25. *an coriaceus?*

325. A.

dichrous. 325. A. pileo ſpadiceo nigricanti miſto: margine repando-lobato, lamellis biſidis pallide ſulphureo-ochraceis. *Schaeff. fung. t.* 246.

applicatus. 326. A. inverſus orbicularis cinereo-nigricans, lamellis in centro contingentibus albido-caeruleſcentibus, centrum impreſſo-adnatum tendentibus. *Batſch el. fung. cent* 171. *f.* 125.

violaceo-fulvens. 327. A. violaceo fulvus, pileo coriaceo aſpero ſemiorbiculato. *Batſch el. fung.* 95. *f.* 39.

Lingua. 328. A. ſemiorbicularis glaber fulvus, lamellis purpureis. *Mich. nov. pl. gen. p.* 123. *t.* 65. *f.* 3.

fulveſcens. 329. A. coriaceus villoſus albicans, lamellis fulvis. *Vaill. flor. par. t.* 1. *f.* 4.

ceſpitoſus. 330. A. ſpatulatus convexus luteus glabriuſculus, lamellis terreis. *Mich. nov. pl. gen. p.* 123. *t.* 65. *f.* 5. 6. *β)* Agaricus ochraceus. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1095.

niveus. A. ſubacaulis albus tener ſiccus pileo glabro ſubtus pallide ferrugineo: margine (ſeneſcentis) inaequali. *Jacq. fl. auſtr.* 3. *t.* 288.

verſicolor. 331. A. ſuberoſo-coriaceus tomentoſus fuſco-griſeoque faſciatus, lamellis albis ſimplicibus tenuibus. *Plan. fung. Erf. p.* 4. *n.* 3.

ſtriatulus. 332. A. ferrugineus pubeſcens, margine integro lamellis alternis interruptis cinereis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 148.

radians. 333. A. flabelliformis albidus villoſus, margine inciſo crenato, lamellis concoloribus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 148.

gelatinoſus. 334. A. pileo difformi albido ſublanato, lamellis ochroleucis ſimplicibus inaequalibus. *Schaeff. fung. t.* 213.

planus. 369. A. erectus planus ſemicircularis margine undulatus fuſcus, lamellis lanceolatis triplicis ordinis. *Bolton fung.* 2. *t.* 72. *f.* 3.

plumatus. 370. A. pileo multiformi apice crenato revoluto pennas ſtruthionis referente. *Walt. flor. carol. p.* 261.

fagineus. 397. A. pileo ſuberoſo tomentoſo albido, lamellis cervinis margine ſubvenoſis. *Schrader an diſtincta ſatis ſpecies?*

MERULIUS. *Fungus* ſubtus venoſus.

* *ſtipitati.*

cornucopioides. 1. M. fuſcus tenax, pileo lobato, venis ſubquadruplici ordine decurrentibus. *Bolton fung.* 8. *t.* 8. *β?) Schaeff. fung. t.* 275.

umbonatus. 2. M. pileo umbonato cinereo, ſtipite concolori tereti, venis albis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 109. *t.* 16, *f.* 1. Agaricus muſcoides.

Cyathus. 3. M. coloris lignei, pileo infundibuliformi, venis decurrentibus, ſtipite tereti fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 208.

infundibuliformis. 4. M. murinus mollis, pileo infundibuliformi, venis argenteis, ſtipite compreſſo rugoſo fiſtuloſo. *Bolt. fung.* 34. *t.* 34.

helvelloides. 5. M. pileo infundibuliformi zonato, ſtipite fiſtuloſo. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 294. *t.* 46. Helvella tubaeformis.

agaricoides. 6. M. mollis luteſcens pileo infundibuliformi zonato, ſtipite fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 208. Agaricus cornucopioides.

cantharelloides. 7. M. ſtipite aurantio fiſtuloſo bulboſo, pileo fuſceſcenti unicolore. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 297. *t.* 473. *f.* 3. Helvella cantharelloides.

hydropipes. 8. M. fuſco-nigricans, ſtipite ad baſin fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 292. *t.* 465. *f.* 2. *an diſtincta hujus generis ſpecies?*

aurantiacus. 9. M. pileo ſicco aurantio, venis rubris, ſtipite tereti lineari farcto. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 101. *t.* 14. *f.* 3.

aleſtoriophoides. 10. M. obſcure aureus, pileo punctato: margine lobato, venis rectis. *Schaeff. fung. t.* 206. *an mera varietas aurantiaci? β) Schaeff. fung. t.* 212.

criſpus. 11. M. coriaceus, pileo infundibuliformi, margine criſpo, ſtipite ſolido. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 293. *t.* 465. *f.* 1.

Cantharellus. 12. M. vitellinus ſuaveolens, pileo (ſeneſcentis) excavato: margine undulato lobato, venis ſubcriſpis decurrentibus, ſtipite tereti farcto ſurſum dilatato. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 722. Agaricus Chantarellus. *Schaeff. fung. t.* 82. *Bolton. fung.* 2. *t.* 62.

pruinatus. 13. M. pileo plano crenulato fuſco-cinereo, venis cinereo-griſeis pruinatis, ſtipite luteo lineari elongato valido. *Batſch el. fung.* 93. *f.* 35. *an diſtincta ſatis ſpecies?*

ſquamula. 14. M. pileo albente convexo-plano, venis rarioribus obſoletis radiantibus, ſtipite tenerrimo ſubulato-ſetaceo. *Batſch el. fung. cent.* 95. *f.* 84.

inflexus. 15. M. luteus pileo infundibuliformi: margine inflexo criſpo, venis luteſcentibus decurrentibus, ſtipite aureo: medio incraſſato ſurſum attenuato. *Vaill. flor. par. t.* 11. *f.* 9. 10. *β) Vaill. flor. par. t.* 11. *f.* 11-13. *ad ſequent.*

16. M.

fissus. 16. M. pileo infundibuliformi fisso cinereo, venis decurrentibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 534.

muscigenus. 17. M. grisea-luteſcens subacaulis dimidiatus suborbiculatus. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 288. Agaricus muscigenus.

pezizoides. 18. M. subacaulis infundibuliformis, disco patente sinuato-punctato, venis obsoletis. *Schaeff. fung. t.* 165. 166. *Syst. Nat. Ed.* XII. 2. Peziza infundibuliformis.

** *acaules.*

niveus. 19. M. laevis horizontalis niveus, subtus fuscus. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 152.

alneus. 20. M. coriaceus albidus cano-tomentosus, semiorbicularis, margine repando, venis ramosis. *Bulliard herb. Franc. t.* 346. *an forsan distincti generis?*

squamosus. 21. M. membranaceus, pileo rubiginoso squamoso, venis cervinis. *Schrader.*

reticulatus. 22. M. verticulis subrotundus membranaceus laevis canus, venis reticulatis cinerascentibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 289. *t.* 498. *f.* 1. Helvella utiruga.

dimidiatus. 23. M. membranaceus horizontalis laevis fuscescens. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 290. *t.* 498. *f.* 2.

alutaceus. 24. M. coriaceus supra griseus erectus villosus. *Bull. herb. Franc. t.* 394.

lichenoides. 25. M, laminis depressis decumbentibus connatis ex centro dilatatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 575. *n.* 1633.

betulina. 26. M. coriaceus villosus suborbicularis margine obtuso, venis confertis anastomosantibus ochroleucis flavisve. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 723. Agaricus betulinus. *Bull. herb. Franc. t.* 290. Auricularia tremelloides. *β?*) *Batsch el. fung. p.* 95. *n.* 138. *f.* 34. Agaricus Chantarellus.

quercinus. 27. M. suberoso-coriaceus planus villosus semiorbicularis annulis diversi coloris pictus, venis confertis cartilagineis anastomosantibus albidis vel fuscescentibus. *Syst. n t.* XII. 3. *p.* 723? Agaricus quercinus. *Schaeff. fung. t.* 57. *Bull. herb. Franc. t.* 362. 442. *f.* 1.

labyrinthiformis. 28. M. lignosus fuscus deformis, venis pallidioribus labyrinthiformibus. *Schaeff. fung. t.* 231. *vonne mera quercini varietas?*

vaſtator. 29. M. orbicularis (adultus) aureus, venis criſpis centrum verſus in plicas abeuntibus: tuberculis intus albis utplurimum aggregatis cauleſcentibus intermediis. *Tode Abh. hall. Geſ.* 1. *p.* 351. *t.* 2. *f.* 1-4.

ſerpens. 30. M. coriaceus niveus orbicularis, venis criſpis fuſceſcentibus medium verſus in plicas transeuntibus. *Tode Abh. hall. Geſ.* 1. *p.* 355.

✓ 1210. BOLETUS. *Fungus* ſubtus poroſus.

* *ſtipitati.*

perennis. 1. B. perennis, pileo utrinque planiuſculo peltato fuſco, poris punctiformibus ochraceo-albis, ſtipite laevi. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 334. *t.* 28. *et t.* 449. *f.* 2.

numularius. 2. B. perennis, pileo albo: centro concavo papillato: margine deflexo: ſtipite baſi nigro. *Bulliard herb. Franc. t.* 124. *an ſatis diſtinctus a leptocephalo?*

leptocephalus. 3. B. pileo plano tenui ſupra cervino ſubtus albo. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 142. *t.* 12.

dimidiatus. 4. B. perennis, pileo dimidiato undulato laevi, poris albis. *Thunb. flor. jap. p.* 348. *t.* 39.

viſcidus. 5. B. pileo pulvinato viſcido, poris teretibus convexis immerſis diſtinctis, ſtipite lacero. *Schaeff. fung. t.* 103. 104.

granulatus. 6. B. pileo pulvinato viſcido, poris teretibus ſubangulatisque truncatis: angulo granulato.

luteus. 7. B. pileo pulvinato viſcido, porisque rotundatis convexis flaviſſimis, ſtipite annulato. *Schaeff. fung. t.* 114. *et* 115. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 316. *t.* 332.

bovinus. 8. B. pileo pulvinato glabro marginato, poris acutis compoſitis: porulis angulatis breviotibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 322. *t.* 60. 494. *β)* Boletus aeſtivus. *Schlotterb. act. helv.* 4. *p.* 54. *t.* 5. *f.* 2.

mutabilis. 9. B. pileo pulvinato fuſco, tubis flaveſcentibus rubisve, ſtipite incraſſato brevi fuſceſcente rubellove. *Schaeff. fung. t.* 108. 133. *β)* Boletus bulbolus. *Schaeff. fung. t.* 134. 135.

ferrugineus. 10. B. pileo pulvinato ochraceo-fuſco glabro poris ferrugineo-brunneis, ſtipite ſubferrugineo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 318. *t.* 451. *f.* 2. *Batſch el. fungi cent. p.* 181. *f.* 128. *β?)* Boletus ſuſpectus. *Gled. meth. fung. p.* 66. *n.* 1. *var.* i.

11. B.

tuberoſus. 11. B. pileo pulvinato ſtramineo, poris flavis, ſtipite brevi baſi tuberoſo. *Bull. herb. Franc. t. 100.*

cereus. 12. B. pileo pulvinato pullo, poris ochroleucis, ſtipite albido. *Bull. herb. Franc. t. 385.*

cinnamomeus. 13. B. cinnamomeus, fragilis pileo concavo villoſo in centro infundibuliformi fulvo, poris annulatis. *Jacq. collect. 1. p. 116. t. 2.*

aurantiacus. 14. B. pileo fulvo-caneſcente, ſtipite rugoſo maculoſo. *Bull. herb. Franc. t. 236.*

exaſperatus. 105. B. pileo flaveſcente margine deflexo hiſpidulo, poris rhomboideis albis, ſtipite fuſceſcenti. *Schrader. Mich. nov. pl. gen. t. 70. f. 5.*

faſciculatus. 106. B. pileo fuſco faſciculatim piloſo, poris flaveſcentibus, ſtipite laevi fuſceſcenti. *Schrader.*

palleſcens. 107. B. laevis, pileo planiuſculo flaveſcente, poris tenuiſſimis, ſtipite ſubgracili ſubcompreſſo. *Schrader.*

fuſcidulus. B. pileo plano acute caſtaneo, poris ſubrotundis flaveſcentibus, ſtipite ſubflexuoſo. *Schrader.*

puſillus. B. pileo convexo cinereo, poris ſubangulatis albidis, ſtipite craſſiuſculo. *Schrader.*

ſupinus. 15. B. pileo caſtaneo: margine coſtato ſinuatoque, poris albidis. *Flor. dan. t. 894.* β?) Boletus caſtaneus. *Weber ſuppl. flor. holſ. p. 13.*

biennis. 95. B. pileo infundibuliformi crenato rufeſcente ad marginem albido, carne alba coriacea. *Bull. herb. de la Franc. t. 449. f. 1.*

lacteus. 16. B. pileo convexo peltato orbiculato fuſco, ſtipite lineari valido diffuſo porisque linearibus confertiſſimis catenulatis niveis. *Batſch el. fung. p. 103. f. 42.* β) *Schaeff. fung. t. 111. 265. 266.* γ) *Mich. nov. pl. gen. t. 71. f. 1.* δ) *Schaeff. fung. t. 127.*

ramoſiſſimus. 17. B. ramoſiſſimus, pileis numeroſis hemiſphaericis multiplex. *Jacq. flor. auſtr. 2. t. 172.*

frondoſus. 18. B. frondoſus ceſpitoſus fuſcus frondibus imbricatis planiuſculis reflexis, poris albis. *Schaeff. fung. t. 128. 129.*

ſtrobiliformis. 19. B. pileo hemiſphaerico teſſellato-ſquamoſo fuſco, poris angulatis albis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc. 1. p. 17. t. 3. f. 2.*

fragilis. 20. B. pileo peltato pallidiſſime flavo, poris pallide ſulphureo-virentibus, ſtipite diffuſo valido craſſo albo teretiuſculo. *Schaeff. fung. t.* 121. 122. 264. 3.

carolinianus. 85. B. pileo adſcendente ſubdimidiato pulvinato marginato, poris minutiſſimis fulvis. *Walt. flor. carol. p.* 262.

procerus. 21. B. pileo parvo convexo glabro ſtipiteque longo ſubfuſiformi ſubolivaceis, poris tenuiſſimis numeroſis albidis. *Bolt. fung.* 2. *t.* 86. *an diſtincta ſatis ſpecies?*

hirſutus. 22. B. cinereus, pileo rimoſo, poris latis irregularibus, ſtipite elongato valido ſublineari hirſuto-ſquamuloſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 71. *f.* 2.

ſubtomentoſus. 23. B. pileo ſubtomentoſo ſtipiteque flavis, poris ſubangulatis difformibus fulvis planis. *Bull. herb. Franc. t.* 490. *f.* 3. *β) Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 317. *t.* 451. *f.* 1. Boletus paraſiticus.

ſquamoſus. 24. B. pileo flaveſcente ſquamoſo, poris difformibus oblonge flexuoſis niveis, ſtipite laterali. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 344. *t.* 19. *et t.* 312.

infundibuliformis. 25. B. fulvens, ſtipite in pileum infundibuliformem dilatato, poris dilatatis brevibus. *Mich. nov. pl. gen. t.* 70. *f.* 4. 8. 10.

lucidus. 26. B. pileo coriaceo caſtaneo lucido concentrice ſulcato, poris minutiſſimis albis, ſtipite laterali. *Leyſſ. fl. hal. n.* 1245.

hypocrateriformis. 90. B. albus, pileo coriaceo depreſſo, ſtipite aequali. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 621. *n.* 1749. *an Hydnum ſublamelloſum?*

umbilicatus. 91. B. pileo coriaceo depreſſo: merilo excavato, margine fuſco, ſtipite baſi bulboſo, poris connexis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 621. *n.* 1748.

Bulliardi. 27. B. hepaticus ſubtus dilutior, pileo viſcido, ſtipite laterali. *Bull. herb. Franc. t.* 74.

ſubveſcus. 92. B. carnoſus, pileo convexo ſubtus miniato, carne flavicante ad aërem nigreſcente, ſtipite brevi craſſo rufeſcente. *Schranck flor. bavar.* 2. *p.* 620 *n.* 1747. *Schaeff. fung. t.* 107? *an a mutabili ſatis diſtinctus?*

lapidum. 93. B. carnoſus, pileo convexo ſupra fuſco ſubtus flavo, carne alba, ſtipite ſolido ſubrugoſo exalbido. *Schaeff. fung. t.* 105.

nigreſcens. 94. B. carnoſus, pileo viſcido fuſco, carne alba ad aërem caeruleſcente. *Pallas it.* 1. *p.* 31. *an mutabilis forſan varietas?*

28. B.

scaber. 28. B. mollis spongiosus albidus, pileo superne griseo, poris longissimis, stipite rugosissimo. *Bull. herb. Franc. t.* 132.

obliquatus. 29. B. exsiccabilis badius nitidus coriaceo-suberosus, pileo obliquo fluctuante: tubis albo-ferrugineis, stipite laterali. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 335 *t.* 7. *et* 459.

elegans. 30. B. subacaulis tenax auriformis, supra nitens spadiceus. *Bulliard herb. Franc. t.* 46.

ramulorum. 31. B. coriaceus, pileo orbiculari, stipite laterali. *Bulliard herb. Franc. t.* 124. *β)* Boletus flabelliformis. *Leyss. fl. hal. ed.* 1. *n.* 1093.

Batschii. B. perennis, pileo glabro ferrugineo ad marginem lacero erenato, stipite laterali. *Batsch el. fung cent.* 1. *p.* 181. *f.* 129.

fagineus. B. substipitatus, pileo nitido albido, poris subrotundis rufescentibus stipite laterali. *Schrader.*

** *acaules.*

agaricoides. 32. B. coriaceus laevis, poris angulatis lineari-oblongis undulatis. *Thunb. flor. jap. p.* 347.

lacrymans. 33. B. coriaceus semiovalis aurantiacus rugoso-reticulatus, fascia marginali lata nivea fornicata. *Wulfen ap. Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 111. *t.* 8. *f.* 2.

rufus. 109. B. explanatus coriaceus rufus, poris minutissimis rotundatis. *Schrader.*

citrinus. B. pulvinatus imbricatus flavus laevis, poris tenuissimis concentricis. *Lemmig. fl. poson. p.* 525.

cristatus. B. fasciculatus squamosus: poris minutissimis, lobis laciniato-fimbriato-cristatis. *Gled. meth. fung. p.* 75. *n.* VIII.

tuberculosus. B. durus tuberculosus, ex albo cinereoque fulvescens, poris minutissimis connexis. *Gled. meth. fung. p.* 80. *n.* 12. *var. c.*

lobatus. 34. B. coriaceus convexus lobatus flavus laevis, poris tenuissimis. *Willd. prodr. flor. Berol. n.* 1136.

fasciatus. 35. B. durus superne inaequalis fuscus nigro-fasciatus, poris albis tenuissimis. *Swarts nov. pl. gen. p.* 149.

micropo-rus. 36. B. ligneus durus difformis inaequalis, poris inaequalibus impalpabilibus pallidis. *Brown jam. p.* 77. *Poria* 4.

hydnoides. 37. B. crassus fetis crassis ramosis erectis densis nigris superne tectus, poris tenuissimis teretibus. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 149.

Favus. 38. B. ſubpulvinatus ſcaber ſetis erectis ramoſis, poris patulis angulatis. *Flor. dan. t.* 893? *Bull. herb. Franc. t.* 421.

lipſienſis. 39. B. pulvinatus ſuberoſus, ſupra glaber incrementis convexis tuberculisque gradatus, margine declivi falciato. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 130.

ſuberoſus. 40. B. pulvinatus albus laevis poris acutis difformibus. *β*?) *Bull. herb. Franc. t.* 491. *f.* 1. *γ*) *Bolt. fung.* II. 78. *t.* 78.

nitens. 41. B. pulvinatus laeviuſculus nitens varie rubicundus, poris albis flavidisve. *Schaeff. fung. t.* 109. 110.

fomentarius. 42. B. pulvinatus inaequalis obtuſus, poris teretibus aequalibus glaucis.

igniarius. 43. B. pulvinatus laevis, poris tenuiſſimis. *Bulliard herb. Franc. t.* 82. 401. *et* 454. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 1305?

purgans. 44. B. pulvinatus ſubconicus ſuberoſo-carnoſus levis inaequalis, ſupra incrementis convexis circulariter fimbriatus et gradatus. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *n.* 6. *t.* 20. 21.

cinnabarinus. 45. B. pulvinatus, totus intus et foris ruber. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 304.

ſanguineus. 59. B. ſubmembranaceus ruber, poris impulpabilibus.

villoſus. 46. B. ſubmembranaceus fuſcus griſeo-albidus villoſus, poris difformibus dentatis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 148.

membranaceus. 47. B. ſubmembranaceus prolifer gregarius laevis radiatus albus, poris eroſis difformibus. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 148.

betulinus. 48. B. gregarius, pileo pellicula rufeſcente tecto. *Bulliard herb. Franc. t.* 312. *an diſtinctus ſatis a fomentario?*

Calceolus. 99. B. ſubacaulis excavatus: margine elevato repando. *Bull. herb. Franc. t.* 300. *et* 494. *f.* 2.

ſalignus. 100. B. ſuaveolens unicolor albidus intus niveus dimidiatus ſupra laevis, tubis breviſſimis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 340. *t.* 433. *f.* 1.

fraxineus. 101. B. dimidiatus glaber intus luteſcens, ſubtus lateritius, pilei margine albo, tubis brevibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 341. *t.* 433. *f.* 2.

ſulphureus. 102. B. viſcidus mollis dimidiatus aureus, ſubtus ſulphureus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 347. *t.* 429. *Schaeff. fung. t.* 131. 132.

ramoſus. 103. B. albidus fragilis utrinque poroſus ramoſus: ramis cylindricis. *Bull. herb. Franc. t.* 418.

B. co-

decipiens. B. coriaceus dimidiatus supra villosus fasciatus, tubis daedaleis subrutilo-cinereis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 365. *t.* 408. *et* 501. *f.* 3. *Willdenow bot. Mag.*

imbricatus. 49. B gregarius lutescens, pileis fimbriatis. *Bulliard herb. Franc. t.* 366.

scalaris. 86. B subacaulis, pileo excavato scalae instar coccimellae quasi circumvoluto. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 617. *n.* 1737.

ferruginosus. B. resupinatus explanatus inaequalis coriaceus fusco-ferrugineus, poris subrotundis. *Schrader.*

abietinus. B. resupinatus effuso-reflexus, pileo tenui hirsuto albido: poris angulatis margine acutis fuscis. *Persoon.*

salicinus. B. resupinatus suberosus late effusus undulato-rugosus cinnamomeus. *Persoon.*

versicolor. 50. B. fasciis discoloribus, poris albis. *Bull. herb. Franc. t.* 86.

hispidus. 51. B. supra viscidus pilosus badius. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 251. *t.* 210. *et* 493. *an vere distinctus ab hepatico?*

suaveolens. 52. B. totus albus superne laevis poris inaequalibus. *Bull. herb. Franc. t.* 310.

fuscus. 53. B. lateralis membranaceus suberoso-lignosus, supra laevis fuscus subfasciatus, poris brevibus subcircularibus canescentibus. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 178. *f.* 127.

adustus. 54. B. fuscescens, margine nigro, poris tenuissimis reticulatis. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1138. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 339. *t.* 445. *f.* 1. B. *imberbis.*

fulvus. 55. B. totus fulvus inaequalis, poris tenuissimis aequalibus teretibus. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1134.

globatus. 56. B. convexus subglobatus rufus laevis, poris teretibus flavis. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1133.

resupinatus. 57. B. resupinatus subtus glabriusculus albus, superne poris impulpabilibus fuscis. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 149.

hirsutulus. 58. B. semicircularis plano-convexus niveus supra hirsutus: lineis concentricis alternis depressis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 149.

odoratus. 59. B. plano-convexus subpulvinatus aurantiacus, poris angulatis, caryophyllum olens. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 150.

cornutus. 82. B. coriaceus lobatus: lobis linguiformibus. *Bolton fung.* 2. *t.* 76.

hepaticus. 84. B. laevis carnosus sanguineus mollis dimidiatus tubulis liberis inaequalibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 314. *t.* 74. 464. 497. *an distincti generis?*

sebaceus. 60. B. undulatus late expansus albido-spadiceus. *Leyss. flor. hal. n.* 1250.

papyraceus. 89. B. albus, siccus papyraceus, poris inconspicuis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 618. *n.* 1739.

Medulla panis 75. B. crustaceus albus effusus difformis. *Jacq. misc. austr.* 1. *p.* 141. *t.* 11.

obliquus. 76. B. ligneus poris obliquis rostratis inaequalibus. *Bolton fung.* 2. *t.* 74.

1211. HYDNUM. *Fungus* subtus fibris subulatis echinatus.

* *stipitata.*

imbricatum. 1. H. fuscum, pileo subconvexo squamoso: squamis imbricatis subrectis. *Schaeff. fung. t.* 140. H. squamosum. *Batsch el. fung. f.* 43. *Bull. herb. Franc. t.* 409.

carnosum. 2. H. pileo convexo glabro rubello, aculeis griseis stipiteque subconcoloribus. *Schaeff. fung. t.* 273.

sublamellosum. 3. H. album, senescens ochroleucum, pileo infundibuliformi, papillis duplicatis tortuosis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 306. *t.* 453. *f.* A-E.

zonatum. 4. H. pileo conico-excavato coriaceo fasciato stipiteque brevi atris, aculeis griseo-albis. *Schaeff. fung. t.* 272.

repandum. 5. H. pileo convexo rufo subtus albo, stipite basi incrassato. *Flor. dan. t.* 310. *β) Schaeff. fung. t.* 318. *γ?) Bolton fung.* II. 88. *t.* 88.

tomentosum. 6. H. pileo plano-infundibuliformi. *Flor. dan. t.* 534. *f.* 3.

coralloides. 7. H. albidum ramosissimum: ramis compressis, apicibus deflexis. *Schaeff. fung. t.* 142. Hydnum ramosum. *Bulliard herb. Franc. t.* 390.

8. H.

An distincta species Boletus canceolatus a Cl. Fabricio *in fodinis carbonariis prope Whitehaven repertus et ab* Ill. Ferber *u. Beytr. zur Mineralg. f.* 1. *p.* 405. *memoratus?*

florifor-me. 8. H. coriaceum, pileo turbinato velutino purpurafcente, ſtipite nigro ſubligniſo. *Schaeff. fung. t.* 146.

hybridum. 28. H. rufeſcens vel atrum, pileo infundibuliformi ad marginem crenato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 307. *t.* 451. *f.* F. I.

cyathiforme. 9. H. gregarium, pileo infundibuliformi faſciato fibroſo elaſtico, ſtipite brevi. *Bulliard herb. Franc. t.* 156. *β*) Hydnum cinereum. *Bull. herb. Franc. t.* 419.

ſuberoſum. 10. H. ligniſo-ſuberoſum, pileo colorato ſupra fovento-plicato: margine acuto criſpove, ſtipite obconico. *Batſch el. fung. f.* 45. 221. 222. 223.

clandeſtinum. 11. H. carnoſum albidum, pileo obtuſato ſupra glabro, ſtipite obconico. *Schaeff. fung. t.* 144. 145.

Auriſcalpium. 12. H. pileo dimidiato hirſuto fuſco inferne albicante, ſtipite fuſco. *Curt. flor. Lond. t.* 190.

gelatinoſum. 13. H. gelatinoſum, pileo dimidiato ſupra glaberrimo. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 239.

** *acaulia.*

parafiticum. 14. H. arcuato-rugoſum ſubvilloſum. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 12. *f.* 5. *an potius agaricus aut merulius?*

rubicundum. 15. H. album, aculeis rufeſcentibus breviſſimis. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 13. *f.* 6.

candidum. 16. H. album aculeis longis concoloribus. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 14. *f.* 7.

Erinaceus. 17. H. ſubacaule convexum cordiforme ochroleucum, aculeis longiuſculis apice ſubulatis imbricatis lubro-fuſcis gradatim pendulis. *Bulliard herb. Franc. t.* 34.

agaricoides. 18. H. convexum laeve pallidum ſubtus ferrugineum. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 149.

reſupinatum. 19. H. planum imbricatum ſubtus ſcabrum ſupra ſetis ramentaceis ferrugineis tectum. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 149.

ſericeum. 20. H. imbricatum planum molle utrinque ſericeum exalbido-vireſcens. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 149.

Occarium. 21. H villoſum album, aculeis magnis oblongis obtuſis planis. *Mich. nov. plant. gen. t.* 64. *f.* 3.

pectiniforme. 22. H. villoſum album, aculeis ſubulatis validis abbreviatis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 64. *f.* 4. 5.

23. H.

hyſtricinum. 23. H. ſubclavatum album, aculeis elongatis validis ſubulatis patenti-arrectis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 64. *f.* 1.

carolinianum. 24. H. ovatum, ſupra ſubtusque echinatum. *Walt. flor. carol. p.* 263. *an forſan thaelaephora?*

ſtalactitum. 25. H. ramoſiſſimum, ſtipite immerſo craſſiſſimo, ramis ramulisque aculeis ramoſiſſimis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 624. *n.* 1756. *an potius coralloides?*

clathroides. 26. H. ſtrigoſum ramoſiſſimum hinc papilloſum inde villoſum. *Pall. it.* 2. *p.* 744. *t.* K.

papyraceum. 27. H. membranaceum niveum ſupra laeve, ſubtus aculeis ſimplicibus multifidisque. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 1. *p.* 345.

mucidum. H. effuſum album, aculeis teretibus integerrimis. *Perſoon fung. ined.*

ochraceum. H. effuſo-reflexum, pileo coriaceo tenui zonato ochraceo, aculeis minutis ochraceo-carneis. *Perſoon.*

Barba jovis. H. membranaceum ſtramineo-rufeſcens, aculeis multifidis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 303. *t.* 481. *f.* 2. *an hujus generis?*

THAELAEPHORA. *Fungus* ſuberoſus ſubtus papillatus fructificans.

† *horizontales.*

meſenteriformis. 1. Th. ſubſtipitata imbricata floccoſo-faſciata fuſca: margine laciniato albido. *Willd. prodr. fl. berol. t.* 7 *f.* 15. *Schaeff. fung. t.* 328. Elvela caryophyllea. *Batſch el. fung. t.* 24. *f.* 41. Agaricus triſtis. *Bull. herb. Franc. t.* 274. *et t.* 483. *f.* 6. 7.

meſenterica. 2. Th. acaulis gelatinoſo-coriacea imbricata tortuoſa, ſupra villoſa faſciata, ſubtus glabra violacea. *Mich nov. pl. gen. t.* 66. *f.* 4. *Bull. herb. Franc. t.* 290. Auricularia tremelloides.

hirſuta. 3. Th. acaulis imbricata coriacea, ſupra villoſa faſciata variegata, ſubtus glabra pallida. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Helvella pineti. *Bolt fung. t.* 82. Boletus auriformis *Bull. herb. Franc. t.* 274. 483. *f.* 1-3. Auricularia reflexa.

lilacea. 4. Th. acaulis ochraceo-pallida ſupra tomentoſa ſpadiceo-faſciata; margine extimo ſupra ſubtusque roſeo-lilacino. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 187. *f.* 131. Elvela lilacina; *an diſtincta ſatis ſpecies?*

5. Th.

fericea. 5. Th. acaulis imbricata coriacea, supra fericea fasciata pallescens, subtus glabra flavescens. *Schrader fung. ined.*

striata. 6. Th. acaulis subimbricata coriacea supra striata tomentosa fusco-ferruginea, subtus piloso-exalbida. *Schrader fung. ined.*

rubiginosa. 7. Th. acaulis imbricata rubiginosa supra tomentosa, subtus pilosa. *Bull. herb. Franc. t.* 378. Auricularia ferruginea.

variegata. 8. Th. acaulis imbricata membranacea supra fericea fasciata variegata, subtus pilosa ochracea. *Schrader fung. ined.*

fusca. 9. Th. acaulis subimbricata membranacea, supra tomentosa fasciata fusca subtus nivea. *Schrader fung. ined.*

†† *explanatae.*

undulata. 10. Th. coriaceo-lignosa supra glabra carnea, subtus undulata fusco-purpurea. *Schrader fung. ined.*

applanata. 11. Th. appressa coriaceo-lignosa supra glabra flava subtus tomentosa. *Schrader fung. ined.*

ferruginosa. 12. Th. membranacea supra albida, subtus tomentosa ferruginea. *Schrader fung. ined.*

glabra. 13. Th. laevis exalbida. *Willd. prodr. fl. Berol. n.* 1104.

carnea. 14. Th. membranacea supra glabra carnea, subtus tenuissime tomentosa nigra. *Bull. herb. Franc. t.* 436. Auricularia corticalis.

phylacteris. 15. Th. membranacea plicata supra glabra fuliginoso-fusca, subtus tomentosa. *Bull. herb. Franc. t.* 436 *f.* 2. Auricularia phylacteris.

papyracea. 16. Th. membranacea tenuissima supra glabra carnea, subtus tomentosa nivea. *Schrader fung. ined. β?) Bull. herb. Franc. t.* 402. Auricularia papyrina.

alutacea. 17. Th. membranacea tenuissima, supra exalbida, subtus tomentosa albida. *Schrader fung. ined.*

††† *effusae.*

crocea. 18. Th. tenuis fragilis tota crocea. *Schrader fung. ined.*

XYLOSTROMA. *Fungus* expanſus coriaceus deformis interpolatus laevis aequalis ſeminibus globuloſis minutiſſimis intus fungi fibrillis inſidentibus.

gigantеum. 1. XYLOSTROMA. *Tode fung. meklenb. ſel.* 1. *p.* 36. *t.* 6. *f.* 51.

HELOTIUM. *Fungus* pileo carnoſo-membranaceo convexo-hemiſphaerico ſubtus laevi ſemina nuda portante.

glabrum. 1. H. pileo plano ſtipiteque glabris. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 22. *t.* 4. *f.* 35. *β) Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 96. *t.* 473. *f.* 1.

cucullatum. 2. H. ferrugineum flavum, ſtipite lineari gracili, pileo ſemiovali. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 189. *f.* 132. Elvella cucullata.

unctuoſum. 3. H. pileo ſubtus ſtipiteque glabris, pileo ſupra unctuoſo: margine calloſo. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 193. *f.* 134. Elvella unctuoſa.

hirſutum. 4. H. pileo ſupra ſtipiteque hirſutis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 23. *t.* 4. *f.* 36.

agaricoides. 5. H. candidum, ſtipite longo baſi piloſo ſubtuberoſo. *Bolton fung.* 3. *p.* 98. *t.* 98. *f.* 1.

aureum. 6. H. luteum, pileo lato craſſiuſculo, ſtipite brevi. *Bolton fung.* 3. *p.* 98. *t.* 98. *f.* 2.

✓ 1216. CLAVARIA. *Fungus* elongatus (ſimilaris) ſubſolidus; in ſuperficie omni fructificans.

* acaules.

† indiviſae.

piſtillaris. 1. Cl. clavaeformis ſimpliciſſima glabra ſolida. *Schaeff. fung. t.* 169.

glabra. 2. Cl. clavaeformis ſimpliciſſima glabra fiſtuloſa. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 212. *t.* 463. *f.* 1.

3. Cl.

atra. 3. Cl. clavata integerrima ſubcompreſſa tomentoſa atra. *Schrader Schmidel anal. pl. t.* 25? *β) Mich. n. pl. gen. t.* 87. *f.* 8.

ophioglo-ſoides. 4. Cl. clavata integerrima compreſſa obtuſa. *Bulliard herb. Franc. t.* 372. *an forſan helvellae propior?*

ſimpliciſſima. 5. Cl. ſimpliciſſima teres ſubulata flava apice fuſca. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1180. *Baumgart. fl. Lipſ. t.* 4. *f.* 2. a.

atro-purpurea. 6. Cl. clavata tereti-pliculata, cute glabra fulvo-atra. *Batſch el. fung. p.* 133. *f.* 47. *β?)* Clavaria rugoſa. *Bull. herb. Franc. t.* 448. *f.* 2. *an forſan helvellae ſpecies?*

ſerpentina. 7. Cl. viridis, clava oblonga. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 571. *n.* 1623.

viridis. 8. Cl. ceſpitoſa integerrima viridis, clava integra rugoſa. *Schrader.*

cornea. 9. Cl. lanceolato-ſubulata valida fulvens gelatinoſa. *Batſch el. fung. p.* 139. *n.* 15. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 204. *t.* 463. *f.* 4.

reſinoſorum. 10. Cl. conico-oblonga obtuſa valida abbreviata gelatinoſa. *Mich. nov. pl. gen. t.* 92. *f.* 1.

tubuloſa. 11. Cl. ſimplex teres gracilis tubuloſa, pilis deciduis veſtita. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 213. *t.* 463. *f.* 2.

purpurea. 12. Cl. ceſpitoſa rufo-fuſca ſubcompreſſa apice acuminata. *Flor. dan. t.* 837. *f.* 2.

inaequalis. 13. Cl. ceſpitoſa compreſſo-lata apice acuminata. *Flor. dan. t.* 836. *f.* 1.

ceſpitoſa. 14. Cl. ceſpitoſa ſimpliciſſima baſi nonnunquam unita oblongo-clavata farcta aquoſe luteola. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 98. *t.* 12. *f.* 2.

elveloides. 15. Cl. ceſpitoſa ſimpliciſſima craſſiſſima baſi unita obverſe pyramidata ſtriata. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 99. *t.* 12. *f.* 5.

fuſca. 16. Cl. ceſpitoſa fuſca ſubſimplex compreſſa baſi coalita tomentoſa apice interdum furcata. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 150.

ſubdiviſa. 17. Cl. ſubdiviſa minuta fuſceſcens. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1185.

⊢⊢ ra-

An diſtinctum genus Tabularia, ab Clariſſ. Fabricio *apud* Ill. Ferber *n. Beytr. z. Mineralg.* 1. *p.* 405. *memorata, et quae ejus notae?*

⊢⊢ *ramoſae*, Coralloidae, 1. Ramariae.

vermicularis. 18. Cl. rugoſa, ramorum extimorum apice obtuſo. *Hall. ſtirp. helv. hiſt. n.* 2202.

anthocephala. 19. Cl. rufeſcens: ramoſa planis apice albo ſublobato-crenatis. *Bull. herb. Franc. t.* 452. *f.* 1. *an hujus generis?*

cornuta. 20. Cl. ramis ſimpliciſſimis conoideis plano-truncatis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 98. *t.* 14 *f.* 2. *an eadem cum damaecorni?*

coralloides. 21. Cl. ramis confertis ramoſiſſimis inaequalibus. *Schaeff fung. t.* 175 177. *β*) *Bulliard herb. Franc. t.* 354. *γ*) *Bull. herb. Franc. t.* 452. *f.* 2.

plebeja. 22. Cl. ramoſiſſima, ramis ſimpliciuſculis ſubovatis apice denticulatis. *Jacq miſc auſtr.* 2. *p.* 101. *t.* 13. *β*?) Caput meduſae. *Bull. herb. Franc. t.* 412.

faſtigiata. 23. Cl. ramis confertis ramoſiſſimis faſtigiatis obtuſis luteis. *Bulliard herb. Franc. t.* 358. D. E.

muſcoides. 24. Cl. ramis ramoſis acuminatis inaequalibus luteis. *Flor. dan. t.* 775. *β*) *Flor. dan. t.* 836. *f.* 2. *γ*?) *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 2.

criſpa. 25. Cl. foliacea: ramoſiſſima, ramis planis criſpis per oras ſerratis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 100. *t.* 14. *f.* 1.

bifida. 26. Cl. bifida, laciniis ſubbifidis. *Koenig apud Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 32. *Bull. herb. Franc. t.* 263?

Cornu Alces. 27. Cl. albens fuſiformis, apice truncato lobulato lacero criſtato. *Schaeff. fung. t.* 291. *Bolt. fung.* III. 115. *t.* 115.

Cornu Cervi. 28. Cl. ochracea ramis apicem verſus ſenſim attenuatis acutiuſculis teretibus. *Schaeff. fung. t.* 289. *β*) *Schaeff. fung. t.* 273.

damaecornis. 29. Cl. alba ſupra truncata ſubramoſa: ramis extimis compreſſis palmatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 666. *n.* 1845.

corticalis. 30. Cl. firma exalbida, ramis brevibus rudibus vagis apice ſubbarbatis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 231. *f.* 162.

brachiata. 31. Cl. lanceolata alba, ramis lanceolatis vagis ſubdiviſis ſubbrachiatis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 233. *f.* 163.

** ſtipitatae, *capitulo diſtincto ſolo ſemina elidente.*

gracilis. 32. Cl. ſtipite pellucido, capite clavato. *Bolt. fung.* III. 111. *t.* 111. *f.* 1.

33. Cl.

fistulosa. 33. Cl. cespitosa alba fistulosa deorsum crassa sursum sensim acuminata. *Michel. nov. pl. gen. p.* 209. *t.* 87. *f.* 13.

granulata. 34. Cl. clavata alba simpliciſſima fistulosa teres, radice granulata nigra. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1179.

parasitica. 35. Cl. clavata nigra simpliciſſima, stipite tereti, capitulo oblongo-tereti obtuso papilloso. *Willden. prodr. flor. ber. n.* 1178. *Holm. nov. act. dan.* 1. *p.* 302. *f.* 12.

placorhiza. 36. Cl. simpliciſſima tenuiſſima clavata fistulosa fusca, clava subulata albida, radice lentiformi clava. *Reich. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 315. *t.* 9. *f.* 4. 5.

capillaris. 37. Cl. stipite capillari violaceo laevi fistuloso, capitulo albo clavato. *Holm. nov. act. dan.* 1. *p.* 287. *f.* 2.

farinosa. 38. Cl. sanguinea albo-farinosa, ramis abbreviatis truncatis crenulatis. *Holm. hav. act. dan.* 1. *p.* 299. *f.* 6.

media. 39. Cl. candido-flavescens, capitulo simpliciſſimo obtuso integro. *Flor. dan. t.* 775. *f.* 2. *et t.* 837. *f.* 1.

adscendens. 40. Cl. cespitosa simpliciſſima fasta acuminata alba. *Flor. dan. t.* 837. *f.* 1.

delicatula. 41. Cl. candida, capitulo simpliciſſimo integro obtuso. *Gled. meth. fung. p.* 29. *t.* c. *β)* Clavaria alba. *Baumgart. fl. Lipſ. p.* 652.

cylindrica. 42. Cl. luteo rufa, capitulo integro simpliciſſimo tenuiſſimo longiſſimo. *Mich. nov. pl. gen. p.* 208. *t.* 87. *f.* 7.

pedunculata. 43. Cl. nigra, stipite elongato gracili hirto, capitulo valido subovato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 87. *f.* 8.

lumbricalis. 44. Cl. cespitosa alba vel lutea lanceolato-clavata teres. *Mich. nov. pl. gen. t.* 87. *f.* 10. 11.

polymorpha. 45. Cl. rufa cespitosa apice saepius fissa, stipite flexuoso. *Flor. dan. t.* 73. *f.* 1.

phalloides. 46. Cl. simplex fistulosa, stipite niveo undulato, apice capitato ovato-oblongo aurantio. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 214. *t.* 3. *f.* 3. *an hujus generis?*

1204. TREMELLA. *Fungus* gelatinosus, uniformis diaphanus seminibus latitantibus.

granulata. 1. Tr. sphaerica aggregata viridis. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 720. Ulva granulata. *Flor. dan. t.* 705.

Pisum. 2. Tr. globosa farcta viridis. *Mant. p.* 136. Ulva Pisum. *Flor. dan. t.* 660. *f.* 2.

moniliformis. 3. Tr. globosa pallide viridis in lineas dispositа. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1224.

cavernosa. 4. Tr. subglobosa solitaria rugoso-plicata intus varia. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 187. Ulva cavernosa.

fucata. 5. Tr. subglobosa subacaulis granulosa coccionellae colore. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 218. *t.* 455. *f.* 2.

pruniformis. 6. Tr. subglobosa solitaria intus subulata. *Syst. nat.* XII. 3. *p.* 720. Ulva pruniformis. *Weig. obs. bot. t.* 2. *f.* 4.

hemisphaerica. 7. Tr. hemisphaerica sparsa. *Weig. obs. bot. t.* 2. *f.* 3.

punctiformis. 8. Tr. sordide aurantia acaulis e globulis irregularibus conflata. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 561. *n.* 1602.

adnata. 9. Tr. rotunda imbricata livida.

difformis. 10. Tr. subrotunda sinuata difformis.

arborea. 11. Tr. subrotunda sessilis undulata nigrescens. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 37. *t.* 8. *f.* 1.

stipitata. 12. Tr. tota rubra diaphana stipitata, corpore cylindrico. *Willd. prodr. flor. berol. n* 1225.

orbicularis. 13. Tr. sessilis pateriformis sordide viridis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 560. *n.* 1601. *an hujus generis?*

rufa. 14. Tr. longitudinaliter dimidiato-infundibuliformis. *Jacq. misc. austr.* 1. *p.* 143. *t.* 14.

meteorica. 15. Tr. sinuoso-gyrosa alba subtus membrana coarctata. *Persoon.*

vesicaria. 16. Tr. griseo-fusca membranacea saccata. *Bull. herb. Franc. t.* 427. *f.* 3.

clavariaeformis. 17. Tr. gregaria simplex aurantiaca compresso-subulata subpyramidata bicornisve. *Wulf. ap. Jacq. Coll.* 2. *p.* 174. *an hujus generis?*

18. Tr.

viridis. 18. Tr. oblonga laete viridis convexa. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1222.

lithophila. 19. Tr. fuſco-viridis oblongo-convexa. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 17.

ſepincola. 20. Tr. convexa ſparſa crocea diaphana. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 18.

meſenterica. 21. Tr. ſubrotunda ſeſſilis plicato-undulata aurea. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *t.* 13.

Noſtoc. 22. Tr. plicata undulata. *Flor. dan. t.* 885. *f.* 1. *Bull. herb. Franc. t.* 184.

perſiſtens. 23. Tr. membranacea plicata rubra. *Bull. herb. Franc. t.* 304.

cinnabarina. 24. Tr. plicata mollis craſſa ramoſa rubra. *Bulliard herb. Franc. t.* 306.

juniperina. 25. Tr. plicata ſeſſilis adſcendens flava. *Mant. p.* 508. *Bull. herb. Franc. t.* 427. *f.* 1.

Sagarum. 26. Tr. membranacea ſinuata rufo-fuſca. *Flor. dan. t.* 885. *f.* 3.

undulata. 27. Tr. adſcendens ſinuato-undulata purpurea. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 32. *t.* 7. *f.* 1.

uſtulata. 28. Tr. membranacea nigra laevis plicata. *Bull. herb. Franc. t.* 420. *f.* 2.

encephaloides. 29. Tr. oblonga ſeſſilis dilute carnea plicato-rugoſa. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 17. *f.* 14.

cerebrina. 30. Tr. carnoſa in gyros plicata. *Bull. herb. Franc. t.* 386.

inteſtinalis. 31. Tr. tortuoſa nigro-virens. *Flor. dan. t.* 805. *f.* 2.

torta. 32. Tr. flaveſcens minuta inteſtinorum inſtar torta. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 18.

allii. 33. Tr. ſeſſilis membranacea labyrinthiformis griſea intus alba. *Holm. nov. act. dan.* 1. *p.* 286. *f.* 1.

violacea. 34. Tr. ſeſſilis rugoſa violacea inferne laevis. *Relh. flor. cant. p.* 442. *n.* 899. *an a perſiſtente ſatis diſtincta?*

plana. 35. Tr. expanſa plana undulata atrovirens. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 95.

ruberrima. 36. Tr. ruberrima criſpo-undata ſinuoſo-plicata. *Wulf. Schr. berl. Naturf.* VIII. 1. *p.* 155.

verticalis. 37. Tr. verticalis atra elaſtica varie plicata, recens pollinem tenuiſſimum explodens. *Bull. herb. Franc. t.* 272.

criſpa. 38. Tr. terreſtris tenera criſpa. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. p.* 140.

atra. 39. Tr. atra ſeſſilis minutim criſpata. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 562. *n.* 1606.

digitata. 40. Tr. linearis dentata fulva. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 33. *t.* 7. *f.* 2.

hydnoidea. 41. Tr. compreſſo-plana difformibus digitata hirſuta. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 145. *t.* 16. *nonne eadem cum Puccinia?*

verrucoſa. 42. Tr. ſeſſilis tuberculoſa ſolida. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 39. *t.* 8. *f.* 2.

glandulo-ſa. 43. Tr. ſubſeſſilis diaphana nigra intus fuliginoſa glandulis conſperſa. *Bull. herb. Franc. t.* 420. *f.* 1.

miliaris. 44. Tr. rubra verrucis confluentibus, ſicco fiſſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 563. *n.* 1609.

rubra. 45. Tr. ſupra tomentoſa ſubtus glabra nitida punctis ſparſis. *Flor. dan. t.* 884.

rubella. 46. Tr. rubra, ſtipite brevi. *Schaeff. fung. t.* 323. 324. Ulva purpurea.

annulata. 47. Tr. oblonga fuſca aetate annulata. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 17. *f.* 15.

deliqueſcens. 48. Tr. flava adultior flaveſcens deliqueſcens. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 219. *t.* 455. *f.* 3.

coralloides. 49. Tr. rubra fruticuloſa, ramis brachiatis obtuſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 562. *n.* 1608. *an tremella?*

1212. PHALLUS. *Fungus* ſubtus laevis, ſupra cellulis reticulatus.

fungoides. 1. Ph. pileo acute lobato, glabriuſculo, ſtipite glabro ſurſum attenuato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 9.

undoſus. 2. Ph. pileo conico margine criſpo, rugis undulatis anaſtomoſantibus, ſtipite ſulcato-teſſellato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 84. *f.* 2.

Gigas. 3. Ph. pileo conico margine ſubundulato, rugis flexuoſis anaſtomoſantibus, ſtipite clavato ſquamoſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 84. *f.* 1.

4. Ph.

Rete. 4. Ph. pileo conico margine crenato-sinuato, rugis anastomosantibus areolisque decurrentibus, stipite clavato integro. *Mich. nov. pl. gen. t.* 34. *f.* 3.

impudicus. 5. Ph. pileo conico margine crenulato vertice perforato, stipite basi volvato. *Schaeff. fung. t.* 196. *f.* 198.

caninus. 6. Ph. pileo conico angusto acuto impervio stipiteque cellulosis: hoc volvato. *Curt. flor. Lond. t.* 235. *Schaeff fung. t.* 335.

Mokusin. 7. Ph. pileo acuto quinquepartito: laciniis conniventibus, stipite pentagono, volva radicali. *Suppl. p.* 452.

Anastomosis. 8. Ph. pileo oblongo margine adnato, rugis decurrentibus anastomosantibus, stipite crasso. *Mich. nov. pl. gen. t.* 85. *f.* 3.

esculentus. 9. Ph. pileo ovato margine adnato, rugis undulatis undique anastomosantibus, stipite tenuiori. *Schaeff. t.* 298-300.

patulus. 10. Ph. pileo rugoso supra subconico subtus libero. *Schaeff. fung. t.* 199. *f.* 1. 3.

1213. CLATHRUS. *Fungus* subrotundus ramis carnosis inter se continuis cancellatus.

cancellatus. 1. CLATHRUS. *Schaeff. fung.* 4. (*tab. tit.*) *Bull. herb. Franc. t.* 441.

1214. HELVELLA. *Fungus* pileo inflato difformi concavoque laevi semina superne elastice protrudente.

* stipitatae.

gelatinosa. 1. H. stipite fistuloso, pileo convexo laevi subtus undulato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 296. *t.* 473. *f.* 2.

fuliginosa. 2. H. pileo inflato angulato plicato nigricante, stipite fistuloso. *Bull. herb. Franc. t.* 242.

revoluta. 3. H. stipite fistuloso compressiusculo, pileo plano depresso: margine revoluto integerrimo. *Vaill. flor. par. p.* 58. *t.* 13. *f.* 7-9.

pezizoides. 4. H. stipite fistuloso, pileo deflexo-bilobo libero subtus scabro. *Ad. Afzel. n. act. Stockh.* 1783. *p.* 299. *t.* 10. *f.* 2. a. b. c.

brunnea. 5. H. ſtipite fiſtuloſo laevi, pileo deflexo adnato-rugoſo brunneo. *Schaeff. fung. t.* 159-161. β) *Michel. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 8.

Mitra. 6. H. ſtipite fiſtuloſo ſulcis lacunisque inaequali pileo deflexo multilobato adnato. *Schaeff. fung. t.* 154. 162. β) *Juſſieu act. pariſ. ad.* 1728. *t.* 14. γ) *Schaeff. fung. t.* 322.

ſulcata. 7. H. ſtipite ſolido rimoſo regulariter ſulcato, pileo deflexo bilobo adnato. *Ad. Afzel. n. act. Stockh. ad.* 1783. *p.* 297. *t.* 10. *f.* 1. β) Helvella alba. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 541. γ) Helvella cinerea. *Batt. fung. t.* 3. F. B.

atra. 8. H. ſtipite ſolido, pileo deflexo bilobo libero ſubtus ſcabro. *Flor. dan. t.* 534. *f.* 1.

horizontalis. 9. H. ſtipite ſolido tereti, pileo plano infundibuliformi: margine horizontali crenulato. *Ad. Afzel. n. act. Stockh.* 1783. *p.* 302. *t.* 10. *f.* 3. a. b.

clavata. 10. H. ſtipite ſubcompreſſo albido pileum intrante, pileo deflexo. *Schaeff. fung. t.* 149. *Bolt. fung.* III. *t.* 97.

caliciformis. 11. H. pileo ochraceo glabro, ſubtus ſtipiteque brevi carneis furfuraceo-granuloſis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 197. *f.* 135.

hiſpida. 12. H. pileo plano aut concavo exterius ſubaſpero. *Bolton fung.* III. 96. *t.* 96. β) Elvela villoſa. *Schaeff. fung. t.* 321.

aeruginoſa. 13. H. minima viridiſſima, pileo difformi. *Flor. dan. t.* 534. *f.* 2.

ceraſina. 14. H. ſubſeſſilis gregaria pyriformi-campanulata rubra: margine dentato. *Wulfen. ap. Jacq. Collect.* 1. *p.* 347.

** acaules; *an forſan pezizis jungendae?*

cochleata. 15. H. turbinata cochleata albicans, intus aurantiaco coccinea. *Schaeff. fung. t.* 150. *Syſt. nat.* XII. 2. Peziza cochleata.

lilacea. 16. H. gregaria ceracea plano-concava lilacina; margine elevato tumidiuſculo. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 1. *p.* 317. *an cum praecedente atque ſequentibus hujus generis? nonne potius pezizae?*

ciliaris. 17. H. ceracea hemiſphaerico-concava coccinea: margine nigro-ciliato. *Mich. nov. pl. gen. p.* 206. *n.* 12.

verſicolor. 18. H. membranacea: faſciis diſcoloribus ſubtus laevis alba. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 149.

19. H.

atrata. 19. H. membranacea fragilis utrinque laevis nigra. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 149.

pallida. 20. H. coriacea fragilis utrinque laevis supra fusca subtus albescens. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 150.

tremellina. 21. H. coriacea undulata laevis plumbea subtus incana villosa. *Swarts nov. pl. gen. et sp. p.* 149.

coccinea. 22. H. subgloboso-campanulata intus coccinea margine integro. *Schaeff. fung. t.* 148. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 269. *t.* 474. Peziza coccinea.

mesenterica. 23. H. gelatinoso-coriacea rugosa resupinata supra spongioso-villosa cinerea, subtus laevis violacea. *Mich. n. plant. gen.* 26. *p.* 124. *t.* 66. *f.* 4.

1215. PEZIZA. *Fungus* saepe concavus, sine capsulis aut seminibus nudo oculo conspicuis.

* stipitatae.

coriacea. 1. P. infundibuliformis: stipite tortuoso. *Bulliard herb. Franc. t.* 438. *f.* 1.

Tuba. 2. P. fulva conico-dilatata, stipite lineari elongato radicato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 10.

carpini. 31. P. ochraceo-albens, stipite lineari elongato in cyathum planiusculum terminato. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 217. *f.* 150.

echinophila. 3. P. crassiuscula firma fragilis glabra subfuliginosa in stipitem crassum definens, patera scutellato-cupulari ferruginea. *Bull. herb. Franc. t.* 500. *f.* 1.

tenella. 4. P. alba, stipite gracili elongato in cyathum excavatum subdiffuso. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 217. *f.* 151.

tuberosa. 5. P. stipite gracili elongato in cyathum fuscum intus dilutiorem terminato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 39. *t.* 10. B.

sceptrum. 6. P. depresso-globosa grisea extrinsecus rugoso-costata, ore contracto rugarum apicibus dentato, stipite albo elongato distincte inserto. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 3.

bulbosa. 7. P. rotundata exterius albo-punctata intus atra, stipite bulbilloso elongato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 26. *t.* 10. C.

Hirudo. 8. P. cinereo-fusca, stipite elongato sursum diffuso in discum superne pulvinatum reflexum cicatrice notatum: margine ferrugineo. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 214. *f.* 149.

Halleri. 9. P. sordide lutea, stipite longissimo patella parabolica: margine punctato serrata. *Hall. hist. stirp. helv. n.* 2225. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *t.* 13. *f.* 2.

Fungoidaster. 10. P. stipite exili gracili elongato albido patella fuscescente terminato. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 53. *t.* 19. A.

villosa. 11. P. stipite mediocri elongato patellaque convexo-marginata villosa: villis connexis sursum spectantibus. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 54. *t.* 19. B.

Craterella. 12. P. albicans, stipite gracili elongato patellaque ampliuscula aequaliter marginata brevissime tomentosis. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 55. *t.* 19.

quercina. 13. P. subfuscens tomentosa: stipite elongato, patella concava laevi nigra. *Schrader.*

Caliculus. 14. P. convexa hemisphaerica patens, stipite subelongato lineari valido distincte inserto. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 5. 11. *Batsc el. fung. p.* 125. *f.* 57.

nutans. 14*. P. stipite filiformi erectiusculo, cyatho nutante acute conico. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 12. 13.

varia. 15. P. laevis fuscescens, stipite cartilagineo in cyathum dilatato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 26. *t.* 6. *f.* D.

violacea. 16. P. laevis dilute violacea, stipite in cyathum violaceum dilatato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 32. *t.* 8. *f.* A.

Infundibulum. 17. P. hemisphaerica ferruginea, stipite sursum incrassato cum medio pileo confluente. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 211. *f.* 147.

sulphurea. 18. P. convexo-depressa patens, stipite confluente brevi valido. *Batsch el. fung. p.* 122. *n.* 18. *cent.* 1. *p.* 210. *f.* 147.

Crater. 19. P. cano fuscescens depresso-convexa pateris subundulata, stipite subelongato subtubulato valido. *Schaeff. fung. t.* 167.

dubia. 20. P. albens farta supra plana subtus convexa, stipite distincto deorsum incrassato. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 209. *f.* 145.

caliciformis. 21. P. convexa intus fuscescens exterius cinerascens. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1174. *Hedw. cryptogam.* II. 3. *p.* 78. *t.* 22. *f.* B.

22. P.

ciliaris. 22. P. infundibuliformis nivea: ciliis longis. *Schrader.*

umbrina. 23. P. pulvinata umbrina, patella planiuſcula concolore. *Schrader.*

urceolata. 24. P. luteſcens urceolata: margine ciliato. *Bull. h. Fr. t.* 416. *f.* 4.

clandeſtina. 25. P. villoſa cinerea intus laevis. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 2.

purpurea. 26. P. purpurea, ſtipite coriaceo, in cyathum exterius exalbidum terminato. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 77. *t.* 22. *f.* A.

paleacea. 27. P. minima fuſca: margine palearum ordinibus coronato. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 8.

urticae. 28. P. margine radiis cuneiformibus demum cirratis cincto. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 7.

ſtipitata. 29. P. hemiſphaerica exterius fuſco hiſpida, ſtipite cylindrico. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1164. *β)* Octoſperma ſetigera. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 506?

pyriformis. 30. P. albicans, ſtipite gracili in patellam pyriformem terminato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 38. *t.* 10. A.

pedunculata. 31*. P. plana orbiculata rufeſcens ſtipitata. *Pallas it.* 1. *p.* 503.

hians. 32. P. intus fulva exterius alba, ſtipite laevi conico in cyathum infundibuliformi-foveatum diffuſo. *Mich nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 6.

convivalis. 33. P. albicans acute conica patens, ſtipite ſubdiſtincto lineari brevi. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 14.

ſigillatoria. 34. P. alba inverſe conico patens, ſtipite confluente brevi. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 204. *f.* 142.

cruciformis. 35. P. procumbens oblonga truncato-aperta, ore ſubconſtricto, ſtipite brevi. *Mich. nov. pl. gen. t.* 68. *f.* 16.

virginea. 36. P. nivea depreſſo-convexa patens circularis, ſtipite brevi lineari valido. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 15.

minutiſſima. 37. P. alba minutiſſima convexo-depreſſa patens, ſtipite brevi diſtincto. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 206. *f.* 143.

miniata. 38. P. ruberrima convexo-depreſſa farcta leniter excavata, ſtipite brevi ſubconfluente. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 210. *f.* 144.

bolaris. 39. P. convexo-depreſſa patens intus fulva opaca extrinſecus ochraceo-carnea deorſum fulva, ſtipite brevi. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 222. *f.* 155.

40. P.

candidiſſima. 40. P. infundibuliformis nivea, ſtipite breviſſimo. *Mich. nov. pl. gen. p.* 205. *t.* 86. *f.* 15.

minima. 41. P. plano-convexa, margine nudo, ſtipite breviſſimo. *Murray comm. goett.* 1772. *p.* 82. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *t.* 13. *f.* 5?

citrina. 42. P. flava plana, ſtipite breviſſimo anguſto. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 33. *t.* 8. B.

albidula. 43. P. laevis albida plana: margine convexo, ſtipite breviſſimo. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 36. *t.* 9. B.

luteſcens. 44. P. laevis luteſcens, plana margine inflexo, ſtipite breviſſimo anguſto. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 37. *t.* 9. C.

cupularis. 45. P. globoſo-campanulata lutea margine crenata, ſtipite breviſſimo. *Flor. dan. t.* 469. *f.* 3.

infundibuliformis. 46. P. ſubſtipitata conico-dilatata intus fuſca exterius alba. *Schaeff. fung. t.* 152.

diſcolor. 47. P. ſubſeſſilis exterius fuſca intus dilute ochracea. *Hedw. cryptog.* II. 3. *p.* 80. *t.* 22. *f.* C.

ſpadicea. 48. P. ſubſeſſilis ſaturate ſpadicea, ſuperne nitens inferne ſcabra, margine crenulato. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 93. *t.* 39. *f.* 217.

lactea. 49. P. ſubſeſſilis alba plana, exterius villoſiſſima. *Bulliard herb. Franc. t.* 376. *f.* 3.

⊢⊢ ſeſſiles.

cyathoides. 51. P. cyathiformis, margine obtuſo erecto. *Raj. ſtirp. angl.* 5. 2. *t.* 24. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 3.

tremelloides. 52. P. infundibuliformis: margine crenato. *Bull. herb. Franc. t.* 410. *f.* 1.

Crucibulum. 53. P. ſubalbide inverſe conica ſubrudis hians. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 1.

cupreſſi. 54. P. lutea ſeſſilis inverſe conico-oblonga truncato-ſubcavata. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 20.

ſarcoides. 55. P. purpurea lobulis criſpa plicata hemiſphaerica infundibuliformis floriformis. *Bolton fung.* III. 101. *t.* 101. *f.* 2.

ſepulcralis. 56. P. ventricoſa depreſſa, ochracea ore baſi anguſtiore acuto. *Schaeff. fung. t.* 280.

57. P

coronata. 57. P. inverſe ovata ventricoſa albo-griſea, margine erecto dentato. *Batſch el. fung. p.* 121. *Mich. n. pl. gen. t.* 86. *f.* 2. β?) *Bolton fung.* III. *t.* 106. *f.* 2.

pinguis. 58. P. urceolata ſanguinea, tomento cano obducta. *Bull. herb. Franc. t.* 396. *f.* 1.

lanuginoſa. P. lanuginoſa fuſca: intus canis: juniores margine brevi.

lacera. 59. P. campanulata ſeſſilis albicans, margine lacero. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1166.

flava. 60. P. globoſo-campanulata flava intus pubeſcens exterius glaberrima, margine integro. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 150.

nigreſcens. 61. P. globoſo-campanulata obliqua intus glabra atra, exterius incano-villoſa, margine integro. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 150.

Diadema. 62. P. nigra globoſa, extrinſecus rugoſo-coſtata, vertice late aperto: ore contracto marginato-crenato. *Michel. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 18.

Haematigma. 63. P. ſeſſilis ſubglobоſa minuta dilute ſanguinea. *Hedw crypt.* II. 1. *p.* 21. *t.* 5. B. *f.* 1-5.

Labellum. 64. P. hemiſphaerica fragilis cerea diaphana ciliata exterius piloſa. *Bull. herb. Franc. t.* 204.

rhizophora. 65. P. hemiſphaerica convexa fuſca inferne albido-concava: radicibus ſimplicibus teretibus. *Reich. berl. Naturf. Beſch.* 3. *p.* 214 *t.* 4. *f.* 4-6.

hemiſphaerica. 66. P. hemiſphaerica concava atra exterius tomentoſa intus laevis. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 141.

hiſpida. 67. P. hemiſphaerica, exterius fuſca hiſpida, intus laevis glauca. *Schaeff. fung. t.* 151.

hirta. 68. P. hemiſphaerica extrinſecus piloſa ſpadicea, intus coccinea glabra. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 15. *t.* 3. *f.* B. 1-6.

puſtulata. 69. P. ſubhemiſphaerica ſeſſilis, extrinſecus albo-punctata. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 23. *t.* 6. A. *f.* 1-5.

crenata. 70. P. turbinata margine crenulata intus fuſca extrinſecus albido pulvere conſperſa. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1168. β) *Bull. herb. Franc. t.* 396. *f.* 3.

epiphylla. 71. P. ſubturbinata fuſca: margine crenulato. *Naturf.* 19. *p.* 126. *t.* 7. *f.* 5-8.

72. P.

hypocrateriformis. 72. P. hypocrateriformis flava laevis, senescens plana: margine glabro. *Schranck flor. bav. 2. p. 596.*

fimetaria. 73. P. sessilis carnosa fragilis ochroleuca patellata: margine calloso crenulato. *Bull. herb. Franc. t. 376. f. 1.*

calloſa. 74. P. caerulescens scutellata subvillosa intus laevis margine calloso. *Bull. herb. Franc. t. 416. f. 1.*

araneoſa. 75. P. concava margine crenulata tela araneosa vestita. *Bull. herb. Franc. t. 280.*

tomentoſa. 76. P. concava tomentosa nivea, intus laevis albida. *Schrader.*

hiſpidula. 77. P. concava, extrinsecus hispidula nigra, intus laevis albida. *Schrader.*

hirſuta. 78. concava extrinsecus nigra villis flavis hirsuta, flava intus laevis carnea. *Schrader.*

pulla. 79. P. concava coriacea fusca undique laevis nitida. *Schrader.*

membranacea. 80. P. minima concava albida subdiaphana. *Schrader.*

hirtella. 80. *a*) concava dilute nigra, extrinsecus fusco-pilosa: margine albido. *Schrader.*

pusilla. 81. P. plana albida subdiaphana, extrinsecus tenuissime tomentosa. *Schrader.*

nigra. 81. *b*) P. plana marginata scabra nigra. *Schrader.*

atra. 82. P. concava atra. *Hall. stirp. helv. n. 2243.*

viridans. 83. P. sessilis cava, margine viridi. *Hedw. cryptogam. II. 1. p. 24. t. 6. B.*

ciliata. 84. P. fulva concava exterius laevis: margine ciliato. *Bull. herb. Franc. t. 438. f. 2.*

granulata. 85. P. fulva concava exterius granulosa: margine nudo. *Bull. herb. Franc. t. 438. f. 3.*

leporina. 86. P. coriacea spatulata concava fusca extrinsecus albida. *Schaeff. fung. t. 156.*

marchica. 87. P. gregaria fusca concavo-compressa lobata, extrinsecus ochracea papillata. *Willd. bot. Mag. 4. p. 14. f. 9.*

floccoſa. 88. P. semiovalis vel oblonga cava margine involuta intus fusco, extrinsecus cana floccis cinereis distantibus conspersa. *Batsch el. fung. cent. I. p. 225. f. 156.*

89. P.

cartilaginea. 89. P. coccifer pulvinata glabra. *Bolton fung.* III. 101. *f.* 1.

jenenſis. 90. P. ſeſſilis craſſa mebranacea ſulphurea patens, convexo-depreſſa exterius tomentoſa. *Batſch el. fung. p.* 125. *n.* 21. *cent.* 1. *p.* 221. *f.* 153.

Schenkii. 91. P. membranacea convexo-depreſſa patens atra intus nitidiſſima, margine brunneo. *Batſch el. fung. p.* 126. *n.* 27. *f.* 52.

pulvinata. 92. P. ſeſſilis ochraceo-caneſcens farta: margine pulvinato; diſco glabro. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 95. *t.* 39. *f.* 219.

livida. 93. P. plana livido-violaceo-glabra extrinſecus pulvinata. *Schrader.*

immarginata. 94. P. orbicularis miniata: margine nullo. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 504.

vireſcens. 95. P. minuta dilute viridis: margine nullo. *Schrader.*

aquifolii. 96. P. minutiſſima plana, membrana hyalina obvoluta. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 10.

rugoſa. 97. P. explanata marginata rugoſa nigra. *Schrader.*

expalleſcens. 98. P. ſeſſilis plana cana lacvis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 504. *an vere diſtincta a chryſocoma?*

caerulea. 99. P. plana caerulea, margine obtuſo ciliato. *Bolton fung.* III. 108. *t.* 108. *f.* 2.

crocea. 100. P. plana crocea utrinque glabra. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 107.

ſtercorea. 101. P. plana flava extrinſecus hirſuta. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 106.

palpebralis. 102. P. aurantia plana longe ciliata. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 106.

chryſocoma. 103. P. ſeſſilis laeviſſima luteſcens plana. *Bulliard herb. Franc. t.* 376. *f.* 2.

ſcutellata. 104. P. plana, margine convexo piloſo. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 12. *t.* 3. A.

flava. 105. P. plana orbiculata flava. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1175.

cinerea. 106. P. plana diaphana cinerea. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1173.

nivea. 107. P. nivea tota plana vel anguſta marginata. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1172, *Batſch el. fung. f.* 56.

108. P.

fulva. 108. P. plana fulva, margine convexo glabro. *Vaill. flor. pariſ. t.* 13. *f.* 14.

griſea. 109. P. opaca cinerea tota plana vel anguſte marginata. *Batſch el. fung. p.* 118. *f.* 55.

Seminulum. 110. P. atra laevigata explanata. *Batſch el. fung. p.* 118. *n.* 3.

comitialis. 111. P. ſeſſilis plana caneſcens, ſuperficie marginali externa fuſca nigro-venoſa in marginem erectum lobato-coronatum producta. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 217. *f.* 152.

applanata. 112. P. expanſa plana rugoſa cinnamomea ſubtus pallidior. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 22. *t.* 5. C.

carnea. 113. P. infra ventricoſa, ſuperne plana: margine inaequali. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 31. *t.* 7. B.

nana. 114. P. laevis cinnamomeo rubella ſubtus anguſtata ſupra plana: annulo obſcuriori craſſo. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 35. *t.* 9. A.

leucoloma. 115. P. minuta depreſſa ruberrima, margine albo fimbriato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 17. *t.* 4. A.

olivacea. 115*. P. membranacea orbicularis plana intus nigra opaca, extrinſecus ruguloſa olivacea: margine anguſto convexo. *Batſch el. fung. p.* 127. *f.* 51.

punicea. 116. P. ſeſſilis orbicularis opaca ſarta ſupra miniata, margine pallido. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 97. *t.* 39. *f.* 220.

crinita. 117. P. ſeſſilis orbicularis cana nigro-piloſa, intus laevis ſanguinea. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 2.

viridis. 118. P. viridis complanata: margine calloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 876. *f.* 4.

Pileolus. 118*. P. nigra minutiſſima ſubcordata margine fimbriata. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13 *f.* 12.

criſpa. 119. P. cinerea reflexa, margine criſpo ſinuato-lobato. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 197. *f.* 137.

hepatica. 120. P. atropurpurea reflexa diſco ſaepius ſcrobiculo notata. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 199. *f.* 138.

pinati. 121. P. caneſcente-alba reflexa, margine ochraceo fuſceſcente ſublurido. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 201. *f.* 140.

papyracea. 122. P. membranacea fuſceſcens. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 620. *n.* 1761.

123. P.

minuta. 123. P. ſeſſilis fuſca, margine concolori aequali. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 25. A. 6. C.

porphyro-ſperma. 124. P. minuta ſeſſilis ſordide viridis ſubhirta. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 30. *t.* 7. A.

aceris. 125. P. junior cinerea, ſeneſcens nigra: margine albo lacero. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 507.

cerea. 125*. P. pellucida ceracea, margine eroſo. *Bull. herb. Fr. t.* 44.

exilis. 126. P. ſupra flava, ſubtus lanuginoſa alba. *Flor. dan. t.* 779. *f.* 2.

bicolor. 127. P. villoſa nivea, intus laevis fulva. *Bull. h. Fr. t.* 410. *f.* 3.

ſanioſa. 128. P. ſeſſilis coriacea pulvinata extrinſecus pulverulenta umbrina intus glabra e fuſco purpurea. *Schrader.*

limbata. 129. P. ſeſſilis viridis: margine nigro. *Bolton fung.* III. 109. *t.* 109. *f.* 1.

⊢ ⊢ ⊢ *gelatinoſae.*

Acetabulum. 130. P. cyathiformis ſeſſilis exterius angulata: venis ramoſis. *Schaeff. fung. t.* 150. 155. 156. *Bulliard herb. Franc. t.* 485. *f.* 4.

porphyrea. 131. P. cylindrica truncato-foveata intus ſanguineo-fulva nitidiſſima, exterius carneo-fulva. *Batſch el. fung. p.* 129. *f.* 53.

claſtica 132. P. carnoſa polymorpha intus atra extrinſecus anguloſo-fuſco-brunnea. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 28. *t.* 6. E.

polymorpha. 133. P. atra ſupra rugoſa inaequalis concava viſcoſa. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 236. *t.* 116. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon truncatum.

Auricula. 134. P. rugoſa auriformis concava. *Syſt. nat.* XII. 2. Tremella Auricula. *Blackw. herb. t.* 334.

gelatinoſa. 135. P. ferruginea in ſtipitem brevem ſublateralem baſi attenuatum deſinens, patella planiuſcula. *Bull. herb. Franc. t.* 460. *f.* 2.

VOLUTELLA. *Fungus*, hypocrateriformis ſtipitatus: pilei ſuperficie ſuperiori punctato-umbilicata: margine primum revoluto, ſeminibus ſimilaribus, ſtipite brevi ſetaceo.

volvata. 1. V. coriacea ſparſa: volva marginali discreta diſſiliente, seminibus unguinoſis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 28. *t.* 5. *f.* 43.

nuda. 2. V. nuda fugaciſſima ſparſa: pileo plano nudo demum diſciformi. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 29. *t.* 6. *f.* 44. *Batſch el. fung. colt.* 1. *t.* 27. *f.* 148. *Cum volutellae genus a Forskaehlio conſtitutum* Vahlii *curatiu examen non ſuſtinuerit, inventoris nomen huic generi reſtituo.*

TYMPANIS. *Fungus* cyathiformis: cupula ſupra volvata, ſeminibus ſiccis confertis in pulverem fatiſcentibus.

ſaligna. 1. TYMPANIS. *Tode fung. mekl. ſel* 1. *p.* 24. *t.* 4. *f.* 37.

MYROTHECIUM. *Fungus* ſeſſilis cyathiformis: cupula ſupra volvata, ſeminibus lento-viſcidis.

roridum. 1. M. bombacinum niveum thecis hemiſphaericis connatis roridis; margine in volvam continuato, ſeminibus turgidis fuſcis. *Tode fung. meklenb. ſel.* 1. *p.* 25. *t.* 5. *f.* 38.

inundatum. 2. M. candidum bombacino-membranaceum, thecis polymorphis connatis inundatis: margine in volvam continuato, ſeminibus viridi nigreſcentibus. *Tode fung. meklenb. ſel.* 1. *p.* 25. *t.* 5. *f.* 39.

Stercoreum. 3. M. membranaceum nigrum aggregatum, ſeminibus turgidis albido-fuſceſcentibus. *Tode fung. meklenb.* 1. *p.* 26. *t* 5. *f.* 40.

hiſpidum. 4. M. coriaceum hiſpidum fuſcum ſparſum, cupulae margine in volvam continuato, ſeminibus fuſceſcentibus diaphanis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 27. *t.* 5. *f.* 42.

dubium. 5. M. parabolicum aggregatum, cupula cortice volvaque marginali deſtituta, ſeminibus nigreſcentibus pauco. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 27. *t.* 5. *f.* 42.

EPICHYSIUM. *Fungus* rotundato-concavus, ſeminibus ecaudato-globoſis, filo ramoſo intus reptanti affixis.

argenteum. 1. EPICHYSIUM. *Tode fung. mekl. ſel.* 2. *p.* 1. *t.* 8. *f.* 60.

CYA-

CYATHUS. *Fungus* campanulatus cylindricusve capſulas lentiformes intus gerens.

laevis. 1. C. campanulatus exterius villoſus intus laevis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Peziza lentifera. *Flor. dan. t.* 105. *Bull. herb. Franc. t.* 300. A. B.

ſtriatus. 2. C. campanulatus exterius hirſutus intus ſtriatus. *Flor. dan. t.* 469. *f.* 1. *Schaeff. fung. t.* 178.

cylindricus. 3. C. cylindricus arhizos totus glaber. *Willden. prodr. flor. Berol. n.* 1161.

deformis. 4. C. arhizos rugoſus albus, capſulis oblongis brunneis. *Willden. bot. Mag. 4. p.* 14. *f.* 8.

crucibuliformis. 5. C. ventricoſus glaber aureus. *Schaeff. fung. t.* 179. 181.

fructiger. 6. C. cyathiformis totus laevis albidus ſtipitatus. *Bull. herb. Franc. t.* 228.

coronarius. 7. C. cyathiformis utrinque glaber: limbo laciniato recto. *Jaeq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 140. *t.* 10. *an hujus generis?*

Cupula. 8. C. globoſus glaber ore late patulo ſubconſtricto lobato crenulato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 102. *f.* 4.

ATRACTOBOLUS. *Fungus* ſeſſilis cupularis operculatus veſicula ſeminifera fuſiformi ejicienda.

annularis. 1. ATRACTOBOLUS. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 45. *t.* 7. *f.* 59. *Batſch el. fung. cent.* 1. *t.* 26. *f.* 139.

ASCOBOLUS. *Perſoon fung. ined.* *Fungus* hemiſphaericus: *Veſicula* oblonga diſco ſparſim ſubimmerſa elaſtice ejiciens ſemina.

pezizoides. 1. ASCOBOLUS. *Bull. herb. Franc. t.* 376. *f.* 1. *et t.* 438. *f.* 4. Peziza ſtercoraria.

THELEOBOLUS. *Fungus* ſeſſilis gelatinoſus ſolidus: placenta ſeminifera dejicienda.

ſtercoreus. 1. THELEOBOLUS. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 41. *t.* 7. *f.* 56

SPHAEROBOLUS. *Fungus* ſeſſilis globoſo-concavus, radiatim dehiſcens, capſulam globoſam ejaculans.

ſtellatus. 1. Sph. globoſus volvatus liber. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon carpobolus. *Flor. dan. t.* 895.

roſaceus. 3. Sph. urceolatus nudus immerſus. *Tode fung. meklenb. ſel.* 1. *p.* 44. *t.* 7. *f.* 57.

PILOBOLUS. *Fungus* ſtipitatus: ſtipite capillari ſupra ventricoſo hydrophoro, pileo hemiſphaerico ſemina elaſtice ejiciente.

cryſtallinus. 1. P. pileo compreſſo glutinoſo atro. *Wigg. prim. fl. holſ. p.* 110. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 111. *t.* 480 *f.* 1. Mucor urceolatus.

conglomeratus. 2. P. capſulis luteis ſphaericis ſeſſilibus conglomeratis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 557.

roridus. 3. pileo globoſo nigro. *Bolton fung.* 3. *t.* 132. *f.* 4.

PUCCINIA. *Fungus* cylindricus ſeminibus caudatis radiatim poſitis elaſtice profilientibus farctus.

ſimplex. 1. P. corpore ſimpliciſſimo obtuſo. *Willden. prodr. flor. ber. n.* 1186.

byſſoides. 2. P. ramoſus ramis primum glabris clavatis niveis, tum depreſſis piloſis cinereis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 200. *t.* 415. *f.* 2.

1217. LYCOPERDON. *Fungus*: Fila ſeminifera cum thecae parietibus internis connexa.

* *ſolida, ſubterranea, radice deſtituta.*

cervinum. 1. L. globoſum ſolidiuſculum, centro farinifero. *Bolt. fung.* III. 116. *t.* 116.

2. L.

scabrum. 2. L. fuscescens scabrum subglobosum. *Willd. prodr. flor. ber. n.* 1192.

aestivum. 3. L. subglobosum glabrum. *Wulf. ap. Jacq. Coll.* 1. *p.* 349.

** *pulverulenta, supra terram crescentia, plurima radicata.*

Proteus. 4. L. subrotundum substipitatum lacero-dehiscens, carne alba seminibus atris. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 148. α) L. cepaeforme. *t.* 435. *f.* 2. β) L. ovoideum. *t.* 435. *f.* 3. B. *et t.* 475. *f.* B. C. D. M. N. P. γ) L. pyriforme. *t.* 32. *t.* 340. *et t.* 475. *f.* B. D. M. δ) L. hyemale. *t.* 72. *et t.* 475. *f.* E. ε) L. lacunosum. *t.* 72. ζ) L. hirtum. *t.* 340. *et t.* 475. *f.* A. B. C. D. F. G. H. I. M. η) L. excepuliforme. *t.* 450. *f.* 2. *et t.* 475. *f.* F. G. H. I. *an forsan diversae species?*

verrucosum. 5. L. subrotundum verrucosum. *Bull. herb. Franc. t.* 22.

circumscissum. 6. L. subsessile subrotundum exasperatum: parte inferiore persistente circumscisso-lacera, polline brunneo. *Schaeff. fung. t.* 186. 189-191. β) *Bull. herb. Franc. t.* 340.

spadiceum. 7. L. subrotundum solidiusculum radicatum spadiceum. *Schaeff. fung. t.* 188.

squamosum. 8. L. depresso-globosum acuminatum: acumine truncato-aperto, stipite elongato squamoso. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 7.

admorsum. 9. L. subglobosum scabriusculum: parte infera persistente circumscisso-lacera, stipite abbreviato valido. *Schaeff. fung. t.* 187.

capitatum. 10. L. subglobosum glabrum, stipite valido incrassato, radicibus fusiformibus flexuosis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 98. *f.* 1.

dispar. 11. L. subglobosum fuscum, stipite lineari valido brevi distincte albo, polline atro-purpureo. *Schaeff. fung. t.* 188.

gemmatum. 12. L. stipitatum subglobosum aculeis acutis dense obsitum. *Willd. prodr. flor. ber. n.* 1195. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 1.

aurantium. 13. L. sphaeroidale basi rugosum stipitatum, laciniis obtuse emarginatis dehiscens. *Bulliard herb. Franc. t.* 279. β?) *Batsch el. fung. cent.* 2. *p.* 125. *t.* 41. *f.* 229. Lycoperdum defossum.

equinum. 14. L. ſphaericum circumſciſſum, ſtipite cylindrico. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1198. *an hujus generis?*

Boviſta. 15. L. globoſum lacero-dehiſcens ſtipite validiſſimo clavato ventricoſo, carne alba, ſeminibus atris. *Schaeff. fung. t.* 292. 295.

puſillum. 16. L. atrum globoſum ſeſſile: orificio anguſto. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 123. *t.* 41. *f.* 228.

goſſypinum. 17. L. globoſum ſubacaule albidum atro-villoſum. *Bull. herb. Franc. t.* 435. *f.* 1.

furfuraceum. 18. L. ſeſſile globoſum: ſuperficie furfuraceo ſquamoſa. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 6.

polyrhizon. 19. L. globoſum aequale lacero-dehiſcens, ſtipite breviſſimo incraſſato, radice brevi ramoſiſſima, polline ſordide purpureo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 99. *f.* 2.

rufum. 20. L. globoſum circumſciſſum ſtipite brevi. *Schmid. ic. plant. p.* 91. *t.* 24.

lanatum. 21. L. globoſum piloſo-hirtum, ſtipite ſubelongato valido incraſſato lineari. *Mich nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 2.

giganteum. 22. L. ochraceo-album glabrum ſeſſile deforme globoſum, filamentis teneris denſis flavo-virentibus. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 237. *f.* 165.

ardeſiacum. 23. L. caeruleſcens globoſo-acuminatum. *Bulliard. herb. Fr.* 1. *p.* 146. *t.* 192.

lacerum. 24. L. ſubſeſſile globoſo-pyriforme depreſſum, parte infera perſiſtente circumſciſſo-lacera, polline virente. *Schaeff. fung. t.* 193. 194.

muricatum. 25. L. ſeſſile pyriforme extrinſecus muricatum, ore ſubrotundo. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1194. *Mich.. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 5. *β) Schaeff. fung. t.* 184. *γ) Bull. herb. Franc. t.* 430.

ſubalpinum. 26. L. album turbinatum laeve horizontaliter dehiſcens. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 627. *n.* 1764. *an diſtincta ſpecies?*

Infundibulum. 27. L. infundibuliforme ſordide albidum interius celluloſum. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 15. *f.* 11.

phalloides. 28. L. deflexum campanulatum ſupra pulverulentum calyptratum, ſubtus glabrum liberum, ſtipite volvato. *Woodward angl.* 74. *p.* 423. *t.* 16.

29. L.

utriforme. 29. ſubcylindricum ſubhiſpidum rufeſcens ſolidum. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 153. *t.* 450. *f.* 1.

piſtillare. 30. L. clavatum, ſtipite torto. *Mant. p.* 313.

carcinomale. 31. L. clavatum, ſtipite cylindrico recto. *Suppl. p.* 453.

herculeum. 32. L. truncato-clavatum extrinſecus album ſcarioſum. *Pall. it.* 1. *p.* 553. *n.* 132.

arhizon. 33. L. ferrugineum celluloſum; cellulis ſubſtantia ſpongioſo-filamentoſa repletis. *Scop. del. inſubr.* 1. *p.* 40. *t.* 18.

Hypoxylon. 34. L. rufeſcens, ſtipite albido filiformi. *Pall. it.* 1. *p.* 503. *n.* 133.

pruinatum. 35. L. ſeſſile laevigatum cinereum pruinatum, cicatrice radicali obſoleta, ore anguſtato lobato, filamentis laxis brunneis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 239. *f.* 166.

*** ſtellata.

ſtellatum. 36. L. volva multifida, capitulo ſubrotundo ſeſſili; ore integro. *Flor. dan. t.* 360.

Geaſter. 37. L. volva multifida, capitulo oblongo ſeſſili acuminato: ore pilolo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 1.

pedicellatum. 38. L. volva multifida, capitulo oblongo acuminato pedicellato: ore fimbriato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 2.

radicans. 39. L. volva multifida, capitulo globoſo ſeſſili: ore ſtellato. *Schaeff. fung. t.* 182. *Nonne idem cum Geaſtro?*

corollinum. 40. L. volva multifida, capitulo ſeſſili globoſo acuminato: ore fimbriato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 3.

multifidum. 41. L. volva multifida: laciniis dilatatis fiſſis, capitulo ſeſſili globoſo: ore ſtellato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 5.

feneſtratum. 42. L. volva multifida fornicata: tunica exteriori filamentoſa, capitulo nigricante ſtipitato, radice fibroſa. *Schaeff. fung. t.* 183. *β) Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 168. a. *γ) Batſch el. fung. f.* 168. b. *an ſatis diſtinctum a petiolato?*

coliforme. 43. L. volva multifida patente, capitulo depreſſo-ſphaerico, pedunculis oſculisque numeroſis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 24. *t.* 3. *f.* 4.

**** paraſitica in farinam fatiſcentia; *an hujus generis?*

piſiforme. 44. L. globoſum ſcabrum: ore perforato. *β) Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 137. *t.* 7.

Epidendrum. 45. L. cortice farinaque purpurea. *Flor. dan. t.* 720.

ramoſum. 46. L. pyriforme ſcabrum, radice filiformi ramoſiſſima prolifera. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 224.

corticale. 47. L. luteo-fuſceſcens glabrum, pulvere concolore. *Batſch el. fung. p.* 155. *nonne ſtemonitis?*

nitidulum. 48. L. luteum fragile nitens, pulvere atro arenaceo. *Schaeff. fung. t.* 192.

ſcabridum. 49. L. brunneum induratum ſcabrum. *Batſch el. fung. t.* 155.

gregarium. 50. L. congeſtum ſphaericum, cortice fuſco nitente, pulvere aureo. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 33.

SPUMARIA. *Folliculi* ramoſi intus filis ſeminiferis repleti, cortice celluloſo furfuraceo tecti.

Perſoon fung. ined.

Mucilago. 1. SPUMARIA. *Bull. herb. Franc.* 1. *t.* 326. Reticularia' alba. *Mich. n. pl. gen. t.* 96. *f.* 2. *Leyſſ. fl. hal.* Mucor ſpongioſus.

FULIGO. *Fungus* cortice celluloſo-fibroſo: fibris per maſſam ſeminalem reticulatim penetrantibus.

ſeptica. 1. F. flava laciniata. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 727. Mucor ſepticus. *Flor. dan. t.* 778. *β*?) Reticularia hortenſis. *Bull. herb. Franc. t.* 424. *f.* 2.

capitata. 2. F. flava capitata. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2135.

panicea. 3. F. minima alba ſeſſilis, panici granum referens. *Gled. meth. fung. p.* 159. *n.* 11. *var.* b.

Lycoperdon. 4. F. marſupialis ſeſſilis alba intus atra. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 9. *t.* 446. *f.* 4, *et t.* 476. *f.* 1. *β*) *Bolt. fung.* III. *t.* 133. *f.* 1.

STE-

STEMONITIS. *Fungus*: cortice (fugaci membranaceove) thecae rupto fila seminifera reticulato-compacta elastice sese expandentia.

† *receptaculo subulato fila seminifera penetrante.*

⊢ *capitulo elongato.*

typhina. 1. St. fusco-rubens stipite tereti aequali. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 724. Clathrus nudus. *Bull. herb. Franc. p.* 119. *t.* 477. *f.* 1. *Bolt. fung. t.* 93. *f.* 1.

fusca. 2. St. stipite nigro basi dilatato, capitulo fusco. *Bull. herb. Franc. t.* 477. *f.* 2.

Embolus. 3. St. stipite nigro albo-villoso, capitulo fusco. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor Embolus. *Hall. enum. stirp. Helv. t.* 1. *f.* 1. *an vere distincta a typhina?*

⊢⊢ *capitulo rotundato.*

nigra. 4. St. tota nigra. *Persoon fung. ined.*

†† *filis seminiferis receptaculo hemisphaerico integro insidentibus*, Arcyriae.

crocea. 5. *a*) St. coccinea, receptaculo subtus striato, filis seminiferis oblongo-ovatis. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 724. Clathrus denudatus. *Jacq. misc. austr.* 1. *t.* 6.

recutita. 5. *b*) St. albida filis ovatis, stipite brevi. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 724. Clathrus recutitus.

incarnata. 6. St. tota dilute incarnata, filis seminiferis ovato-oblongis formae fluxilis. *Persoon fung. ined. ic.*

nutans. 7. St. flavicans stipite brevissimo, capitulo longissimo decumbente. *Bull. herb. Franc. p.* 122. *t.* 502. *f.* 3.

cinerea. 8. St. leucophaea, capitulis subcylindricis basi complanatis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 129. *t.* 477. *f.* 3.

leucocephala. 9. St. receptaculo infundibuliformi, filis seminiferis subprominulis furfuraceo-albis. *Persoon fung. ined. ic.*

nivea. 10. St. stipite flavescente filiformi, receptaculo globoso niveo. *Hoffmann cryptog. veget.* 2. *t.* 4. *f.* 1.

Sphaerocephala. 11. St. ſtipite filiformi nigro, capitulo globoſo cinereo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor ſphaerocephalus. *Hoffm. veget. crypt .2. t.* 4. *f.* 2. *an hujus generis?*

lichenoides. 12. St. ſtipite ſubulato nigro, capitulo lentiformi cinereo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor lichenoides. *Hoffm. crypt. veget.* 2. *t.* 4. *f.* 13. *Batſch fung. t.* 26. *f.* 133. *an hujus generis?*

furfuracea. 13. St. ſtipite filiformi, capitulo ſubgloboſo fuſco glabro, ſeminibus viridibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1726. Mucor furfuraceus. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 267. *f.* 178. *An diſtincti forſan generis, perinde ac* 11 *et* 12?

fulva. 14. St. capitulo globoſo coccineo: filis ſeminiferis fuſcis. *Bolton fung. t.* 93. *f.* 3. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor fulvus.

flava. 15. St. capitulo globoſo: filis ſeminiferis flavis. *Bolton fung. t.* 94. *f.* 1.

olivacea. 16. St. capitulo globoſo ſtipiteque olivaceis. *Bolton fung. t.* 94. *f.* 2.

ſemitrichoides. 17. St. ſtipite ſimplici ſtriato, capitulo globoſo parte dimidia ſuperiori cancellato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 125. *t.* 387. *f.* 1.

cancellata. 18. St. ſtipite ſimplici, capitulo globoſo exterius cancellato: receptaculo nullo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 124. *t.* 387. *f.* 2. *Batſch el. fung. t.* 42. *f.* 242. Mucor cancellatus. *nonne una cum praecedentis diſtincti generis?*

††† *cortice toto membranaceo irregulariter diſſiliente.* Trichicae.

† *ſtipitatae.*

botrytis. 19. St. faſciculata capitulo pyriformi purpureo. *Hoffm. crypt. veget.* 2. *t.* 1. *f.* 1. Trichoa pyriformis.

faſciculata. 20. St. chalybea faſciculata, capitulo ſubturbinato, ſtipite breviſſimo. *Perſoon fung ined.*

graniformis. 21. St. rubra, ſtipite cylindrico ſimplici, capitulo globoſo: ſeminibus coccineis. *Hoffmann crypt. veget.* 2. *t.* 1. *f.* 2. Trichia graniformis.

rufa. 22. St. tota rufa capitulo ſubrotundo. *Hoffm. crypt. veget.* 2. *t.* 2. *f.* 5. Trichia rufa.

coccinea. 23. St. rubra, ſtipite cylindrico ſimplici. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 126. *t.* 368. *f.* 1.

24. St.

antiades. 24. St. ſtipite craſſiuſculo ſulcato ſubramoſo, capitulo globoſo luteo-ſubfuliginoſo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 127. *t.* 368. *f.* 2.

violacea. 25. St. ſtipite nigro, capitulo lentiformi depreſſo: filis ſeminiferis albis; ſeminibus violaceis. *Roth flor. germ.* 1. *p.* 448. *Hoffm. veget. crypt.* 2. *t.* 2. *f.* 1.

cinnabarina. 26. St. gregaria ruberrima clavata. *Roth flor. german.*

pyriformis. 27. St. lutea lucida, capitulo turbinato in ſtipitem cylindricum ſenſim deſinente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 129. *t.* 417. *f.* 2.

pomiformis. 27. St. fulva, ſtipite breviſſimo, capitulo globoſo: filis ſeminiferis fulvis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 448.

ficoides. 28. St. fuſco-nigricans, capitulo turbinato-elongato in ſtipitem baſi turgidum ſenſim deſinente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 130. *t.* 417. *f.* 3.

turbinata. 30. St. aurantio-ſubferruginea, capitulo apice compreſſo in ſtipitem cylindricum ſenſim deſinente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 132. *t.* 484. *f.* 1.

aurantia. 31. St. ſtipite nigro ſtriato baſi ventricoſo, capitulo orbiculari exterius luteo intus fuſco-nigricante. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 133. *t.* 484. *f.* 2.

globulifera. 32. St. capitulo orbiculari ſeminibus nigro-fuſceſcentibus inter globulos diſcolores diſperſis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 134. *t.* 484. *f.* 3.

viridis. 33. St. ſtipite filiformi, capitulo orbiculari umbilicato granuloſo vireſcente: ſeminibus fuſco-nigricantibus. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 135. *t.* 407. *f.* 1.

bicolor. 34. St. ſtipite filiformi, capitulo orbiculari umbilicato granuloſo exterius niveo: filis ſeminiferis luteis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 136. *t.* 407. *f.* 2.

alba. 35. St. ſtipite cylindrico ſimplici, capitulo globoſo umbilicato granuloſo cano: ſeminibus filisque atris. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 137. *t.* 407. *f.* 3. *et t.* 470. *f.* 1.

argillacea. 36. St. ſtipite nigreſcente, capitulo globoſo terreo. *Perſoon fung. ined.*

floriformis. 37. St. ſtipite filiformi, capitulo luteo-ſtramineo primum globoſo demum ſtellatim patente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 142. *t.* 371.

38. St

leucopus. 38. St. ſtipite niveo baſi dilatato, capitulis elongatis nigricantibus: ſeminibus ellipticis. *Bull. herb. Franc. t.* 502. *f.* 2. *an diſtinctae tribus?*

⊢⊢ acaules.

veſparia. 39. St. cylindrica rufeſcens, ſeminibus rufis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 172. Lycoperdon veſparium.

veſiculoſa. 40. St. globuloſa, ſeminibus ferrugineo-ochraceis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 171. Lycoperdon veſiculoſum.

bombacina. 41. St. ſubgloboſa ferruginea, ſeminibus concoloribus. *Batſch el. fung. p.* 153. *n.* 28. Lycoperdon bombacinum.

favaginea. 42. St. globoſa lutea, ſeminibus concoloribus. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 257. *f.* 173. Lycoperdon favagineum. *Bolton fung. t.* 94. *f.* 3. *Bull. herb. Franc. t.* 417. *f.* 4?

vitellina. 43. St. ſubrotunda glabra lutea: ore fuſco. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 138 *t.* 5. Lycoperdon luteum; *an forſan varietas fuliginis ſepticae?*

Trichia. 44. St. globoſa purpurea. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 449.

globularis. 45. St. orbicularis extrinſecus atra intus aurea. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 132. *t.* 417. *f.* 5.

ſulphurea. 46. St. pyriformis ſulphurea, filis feminiferis pallidioribus. *Wiggers fl. holſ. p.* 110. *n.* 1153.

varia. 47. St. capitulis decumbentibus oblongis ſubreniformibusque. *Perſoon fung. ined.*

lumbricalis. 48. St. filiformis lutea. *Batſch el. fung. f.* 172. Lycoperdon lumbricale.

MICROCARPON. *Schrader.* *Fungus:* Theca membranacea (irregulariter dehiſcens) ſeminibus filamentis reticulato-compactis baſi fixis interſitis repleta.

nigrum. 1. MICROCARPON. *Schrader fung. ined.*

CRI-

CRIBRARIA. *Fungus*: Theca membrana duplici instructa: externa tenella fugaci; interna reticulata, semina filamentis orba per foramina emittentia.

pallida. 1. CRIBRARIA. *Schrader fung. ined.*

RETICULARIA. *Fungus* subrotundus: theca rigida seminibus inter fila reticulata dispersis repleta.

† *stipitatae.*

fragilis. 1. R. obovata fusca, cortice nitido, seminibus nigris, stipite brevissimo. *Dickf. crypt. Brit.* 1. *p.* 25. *t.* 3. Lycoperdon fragile.

utricularis. 2. R. stipite brevissimo tenuissimo, capitulo ovato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 128. *t.* 417 *f.* 1. Sphaerocarpus utricularis.

hemisphaerica. 3. R. stipite simplici, capitulo hemisphaerico. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 93. *t.* 446. *f.* 1.

ramosa. 4. R. stipite ramoso, capitulis subglobosis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 89. *t.* 380. *f.* 3.

†† *acaules.*

Lycoperdon. 5. R. sacciformis cinerea fuscescensve. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 95. *t.* 476. *f.* 2-4.

Lycogala. 6. R. albida, seminibus fuscis. *Bolton fung. t.* 96. *f.* 1. Mucor Lycogala.

Epixylon. 7. R. pulvinata ex cinereo nigricans. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 90. *t.* 472. *f.* 1.

caesia. 8. R. globoso-ovata nigro-caesia sensim albicans. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 139. *t.* 470. *f.* 2. Reticularia capsulifera.

cinerea. 9. R. cinereo-caesia globosa scabra, seminibus atris, filis albis. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 249. *f.* 169. Lycoperdon cinereum; *an satis distincta a caesia?*

complanata. 10. R. cinereo-caesia depressa diffusa, seminibus atris, filis albis. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 251. *f.* 170. Lycoperdon complanatum.

11. R.

sphaeroi-dalis. 11. R. suborbicularis albicans. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 94. *t.* 446. *f.* 2.

angulata. 12. R. subdepressa angulata alba. *Persoon fung. ined.* in foliis.

sinuosa. 13. R. laminis duabus parallelis flexuosis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 94. *t.* 446. *f.* 3.

Ustilago. 14. R. fusco-nigricans. *Syst. nat. Ed.* XII. 1. *p.* 1326. *n.* 4. Chaos Ustilago. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 90. *t.* 472. *f.* 2. Reticularia segetum. *An forte distincti generis?*

nigra. 15. R. senescens nigra, seminibus nigris. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 88. *t.* 380. *f.* 2.

alba. 16. R. ovata alba, seminibus nigris. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 635. *an satis distincta a nigra?*

TUBIFERA. *Fungus:* Thecae (membranae expansae superimpositae) inter se connatae, seminibus nudiusculis repletae.

cylindrica. 1. R. cylindrica ferruginea, apice acuminato primum niveo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 140. *t.* 470. *f.* 3.

fragiformis. 2. R. cylindrico-clavata primum rosea post ferruginea. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 141. *t.* 384.

ferruginosa. 3. R. glabra vesicularis versicolor, seminibus terreis. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 263. *f.* 175. *Jacq. misc. austr.* 2. *p.* 144. *t.* 15? Tubulifera arachnoidea. *Flor. dan. t.* 659. *f.* 2.

AECIDIUM. *Persoon fung. ined.* *Fungus:* Theca (membranacea) utrinque glabra seminibus nudis non cohaerentibus plena.

* *thecae cortice distincto membranaceo.*

† *cespitosa.*

cornutum. 1. Ae. flavum, thecis longissimis subarcuatis olivaceo-griseis. *Flor. dan. t.* 838.

rhamni. 2. Ae. thecis cylindricis roseis: seminibus aurantiis. *Persoon.*

cancellatum. 3. Ae. thecis latere fissis apice integris. *Suppl. p.* 443. Lycoperdon cancellatum. *Flor. dan. t.* 704.

penicillatum. 4. Ae. flavum, thecis rectis dehiscentibus. *Flor. dan. t.* 839. *an satis distinctum a cancellato?*

5. Ae.

berberidis. 5. Ae. orbiculare ſubconvexum, thecis prominentibus ſeminibusque flavis. *Jacq. coll. auſtr.* 1. *p.* 122. *t.* 4. *f.* 1. Lycoperdon pauciforme.

cuonymi. 6. Ae. craſſum effuſum, thecis prominentibus ſeminibusque aurantiis. *Perſoon.*

rubellum. 7. Ae. rubrum. *α*) rumicis, thecis congeſtis ſeminibusque albis. *β*) groſſulariae, thecis ſparſis ſeminibusque pallidis. *Perſoon.*

tuſſilaginis. 8. Ae. thecis ſubprominentibus flavis, ſeminibus aurantiis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon epiphyllum.

TT *thecis ſolitariis.*

pini. 9. Ae. oblongo-compreſſum pallidum, ſeminibus aurantiis. *Willden. bot. Mag.* 4. *t.* 4. *f.* 12.

euphorbiae. 10. Ae. confertum cylindricum, ore reflexo, ſeminibus aurantiis. *Perſoon.*

anemones. 11. Ae. ſparſum ſubgloboſum pallidum, ſeminibus concoloribus. *Perſoon.*

ſcutellatum. 12. Ae. ſparſum albidum, ſeminibus fuſcis. *Schranck fl. bav. n.* 1776. Lycoperdon ſcutellatum.

pynolae. 13. Ae. ſparſum depreſſum luteum, ſeminibus concoloribus. *Perſoon.*

⊢⊢ *cortice diſtincto orbata, ſeminibus ſub epidermide effuſis.*

fuſcum. 14. Ae. ſeminibus fuſcis. *Perſoon.*

nigrum. 15. Ae. ſubrotundum ſeminibus nigricantibus. *Perſoon.*

flavum. 16. Ae. oblongum, ſeminibus flavis. *Perſoon.*

candidum. 17. Ae. difforme effuſum, ſeminibus candidis. *Perſoon.*

lineare. 18. Ae. lineare, ſeminibus fuſco-atris. *Schranck fl. bav. n.* 1852. Lycoperdon lineare.

SPHAERIA. *Fungus:* Thecae ſubrotundis ſeminibus nudis, gelatinoſis repletae.

* *cauleſcentes, pileo multicapſulari.*

⊢ *molles.*

agariciformis. 1. Sph. ſtipite flavo tereti, pileo ovato caſtaneo, radice tuberoſa volvata intus nigra. *Bolton fung. p.* 130. *t.* 130. *Flor. dan. t.* 570.

2. Sph.

entomorhiza. 2. Sph. pileo ſubrotundo fuſco, ſtipite longo attenuato. *Dickſ. cryptog. Brit.* 1. *p.* 22. *t.* 3. *f.* 3.

militaris. 3. Sph. pileo clavato elongato rubro, ſtipite laeviuſculo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Clavaria militaris. *Flor. dan. t.* 637. *f.* 1. *Bolton fung. t.* 128.

ophioglossoides. 4. Sph. pileo clavato atro-viridi, ſtipite longiuſculo baſi intusque flavo. *Bull. herb. Franc. t.* 440. *f.* 2.

\+ \+ *ſuberoſae.*

truncata. 5. Sph. nivea plana, thecis nigricantibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Peziza punctata. *Bolton fung. t.* 127. *f.* 2.

Carcharias. 6. Sph. pileo rugoſo ſubramoſo, thecis apicem ambientibus. *Weig. obſ. bot. t.* 3. *f.* 6.

digitata. 7. Sph. nigra ramoſa, pileo tereti acuminato. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Clavaria digitata. *Bull. herb. Franc. t.* 220.

bulboſa. 8. Sph. pileo ramoſo ſubtereti, radice bulboſa. *Perſoon fung. ined. it.*

Hypoxylon. 9. Sph. pileo ramoſo compreſſo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Clavaria Hypoxylon. *Bull. herb. Franc. t.* 180. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *t.* 3. *f.* 1.

flexuoſa. 10. Sph. ſimpliciſſima ſubulata, pileo flexuoſo. *Schranck flor. bavar.* 2. *t.* 1844.

* *compoſitae.*

caſtorea. 11. Sph. aggregato-ſparſa aequalis nigra monoſticha ſubgloboſa, volva fuſca fugaci, ſphaerulis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 28. *t.* 12. *f.* 100.

aeruginoſa. 12. Sph. ſparſa oblonga convexa ſparſa monoſticha, ſubſtantia ſphaerulisque atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 27. *t.* 12. *f.* 99.

atro-purpurea. 13. Sph. ſparſa atropurpurea monoſticha rotundato-plana: ſphaerulis ovalibus papillatis connatis nigris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 32. *t.* 13. *f.* 105.

decidua. 14. Sph. aggregata oblongo-convexa monoſticha, ſubſtantia flava, glebulis globoſo-papillatis rubris prominentibus deciduis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 31. *t.* 13. *f.* 104.

ribis. 15. Sph. aggregata convexo-oblonga purpuraſcens monoſticha, glebulis ovalibus papillatis prominulis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 31. *t.* 12. *f.* 103.

16. Sph.

lenta. 16. Sph. aggregata lentiformis lenta pulla monosticha, glebulis globosis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 30. *t.* 12. *f.* 102.

natans. 17. Sph. aggregata atra subrotunda convexo-plana monosticha, cortice superne colliculoso substantiam viscidulam indurescentem includente, glebulis aggregatis albis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 27. *t.* 12. *f.* 98.

Cucurbitula. 18. Sph. aggregata convexa plana monosticha, glebulis ovalibus contabescendo, concavis insitis rubris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 38. *t.* 14. *f.* 110.

sanguinaria. 19. Sph. limitata glauca monosticha rotundato-polymorpha crustacea, glebulis globosis obsolete papillatis atris. *Tode fung meklenb.* 2. *p.* 40. *t.* 14. *f.* 112.

insitiva. 20. Sph. corticalis plana lineari-acuminata candida monosticha, velo cum substantia connato, glebulis papillatis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 36. *t.* 13. *f.* 108.

Macula. 21. Sph. planissima atra monosticha polymorpha, glebulis globoso-papillatis: singulis velo fugaci tectis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 33. *t.* 13. *f.* 106.

Placenta. 22. Sph. rotundo-complanata tuberculosa monosticha, glebulis globoso-acuminatis connatis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 26. *t.* 12. *f.* 97.

Talus. 23. Sph. nivea monosticha tuberculosa: tuberculis truncatis polymorphis, glebulis globosis atris. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 23 *t.* 11. *f.* 80. 92-95.

radians. 24. Sph. aggregato-sparsa subtuberculosa subglobosa atra submonosticha, volva pulverulenta fulva, glebulis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 29. *t.* 12. *f.* 101.

tunicata. 25. Sph. subcaulescens fusca monosticha subovalis tuberoso-bicorticata stilo-cirrifera, tunicis glebulisque biformibus connatis, velis particularibus confluentibus fugacibusque. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 59. *t.* 17. *f.* 130.

gelatinosa. 26. Sph. pulvinato-gelatinosa lutea monosticha globifera: globulis spermaticis stramineis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 48. *t.* 16. *f.* 123. 124.

fragifera. 27. Sph. plana nigra monosticha stilifera: stilis spermaticis e singulis capsulis successive protrusis brevissimis coadunatis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 55. *t.* 17. *f.* 132.

deusta. 28. Sph. nigra polymorpha convexo-bicorticata monosticha stilifera, glebulis biformibus, stilis spermaticis obsolete

nodosis subuncinatis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 55. *t.* 17. *f.* 129. Sphaeria versipellis.

Hystrix. 29. Sph. nigra ovalis convexo-plana aggregata monosticha stilifera: stilis spermaticis proceris superne subincrassatis cum glebulis connatis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 53. *t.* 16. *f.* 127.

Ceratosperma. 30. Sph. nigra aggregata subrotunda pulvinato-convexa stilifera, glebulis bifariis, stilis spermaticis scabro-rudibus cum glebulis connatis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 53. *t.* 17. *f.* 131. *Bull. herb. Franc. t.* 492. *f.* 1.

succenturiata. 31. Sph. oblongo-pulvinata sparsa bicorticata atra, glebulis succenturiatis simplicibusque. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 37. *t.* 14. *f.* 109.

convergens. 32. Sph. aggregata rosacea, glebulis atris excipuliformibus liberis convergentibus. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 39. *t.* 14. *f.* 111.

cespitosa. 33. Sph. aggregata globoso-cespitosa atra lamellata: lamellis radiatis subtus connatis apice glebuliferis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 41. *t.* 14. *f.* 113.

fissivela. 34. Sph. globosa atra: massa glutinoso-farinacea rimas agente capsularum congeriem obtegente. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 18. *t.* 10. *f.* 86.

carpini. 35. Sph. atra, spiculis minutissimis terminata. *Batsch el. fung. p.* 274. *t.* 30. *f.* 187. Sphaeria spiculosa. *β) Batsch el. fung. cent.* 2. *t.* 41. *f.* 231. Sphaeria coryli.

bullata. 36. Sph. convexa nigra intus alba. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 5. *t.* 2. *f.* 1.

Stigma. 37. Sph. corticalis nigra punctata. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 7. *t.* 2. *f.* 2.

pulvinata. 38. Sph. atra convexo-tuberculosa. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 3. *an distincta vere species?*

virescens. 39. Sph. convexo-plana nigra intus virescens. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 4.

discifor-mis. 40. Sph. subrotunda plana punctata. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 15. *t.* 4. *f.* 1.

papillata. 41. Sph. papillis minutissimis atris apice pertusis crustae fuscae vel nigricanti innatis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 19. *t.* 4. *f.* 3. *an hujus tribus distincta species?*

42. Sph.

fragiformis. 42. Sph. convexa obscure rubra. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 20. *t.* 5. *f.* 1.

coronata. 43. Sph. ostiolis epidermide perforata spinulosis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 24. *t.* 5. *f.* 4. 5.

pustulata. 44. Sph. lentiformis perforata. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 26. *t.* 5. *f.* 3.

cirrata. 45. Sph. atra, ostiolis cirrhosis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 27. *t.* 6. *f.* 1.

nivea. 46. Sph. tuberculosa, tuberculis truncatis niveis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 28. *t.* 6. *f.* 3.

granulosa. 47. Sph. cinereo-nigricans tenax: loculis prominulis numerosissimis in congeriem crustaceam connatis. *Bull. herb. Franc. t.* 482. *f.* 2.

melanogramma. 48. Sph. fuliginoso-nigricans irregulariter bullata, loculis higantibus. *Bull. herb. Franc. t.* 492. *f.* 1.

globularis. 49. Sph. aggregata globosa clausa nigra opaca indurata. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 271. *f.* 180.

acinosa. 50. Sph. aggregata globosa clausa nigro-fusca verrucosa sparsim pilosa. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 269. *f.* 179. *an hujus tribus?*

byssina. 51. Sph. aggregata fulva, cortice floccoso niveo. *Wigg. prim. flor. holf. p.* 84.

Bombarda. 52. Sph. aggregata oblonga nigro-fusca: glebulis albis. *Batsch el. fung. cent.* 1. *p.* 271. *f.* 181. *an distincta hujus generis et tribus species?*

cancellata. 53. Sph. subcomposita atra aggregato-sparsa rotundo-ovalis convexa monosticha: velo prominente, glebulis comatis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 34. *t.* 13. *f.* 107.

*** *simplices.*

tubaeformis. 54. Sph. aggregata atra globosa collabescendo cupularis stilifera: stilo spermatico connato crassiusculo bicolori. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 51. *t.* 16. *f.* 128.

Lingua. 55. Sph. aggregata atra subovalis pulvinata collabescendo concavo-rugosa stilifera: stilo spermatico breviusculo decumbente. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 51. *t.* 16. *f.* 126.

Gnomon. 56. Sph. aggregata nigra globosa collabescendo concava stilifera: stilo spermatico procero subrecto. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 50. *t.* 16. *f.* 125.

Acrosper-mum. 57. Sph. conferto-aggregata pulla globifera cylindrico-ventricosa collabescendo strigosa *Tode fung. meklenb. p.* 47. *t.* 15. *f.* 119.

Peziza. 58. Sph. aggregata hydrophora rubens: globosa collabescendo concava. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 46. *t.* 15. *f.* 122.

penetrans. 59. Sph. globoso-acuminata collabescendo excavata aggregata nigra globifera: globo spermatico nigro. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 45. *t.* 9. *f.* 74. *et t.* 15. *f.* 121.

dubia. 60. Sph. elongato-attenuata aggregata grisea globifera: guttula spermatica diaphana albo-lutescente. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 45. *t.* 15. *f.* 118.

subulata. 61. Sph. subulato-granulata aggregata fusca globifera: globo spermatico flavo atrescente. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 44. *t.* 15. *f.* 117.

conica. 62. Sph. conico-tomentosa aggregata globifera: globo spermatico flavo atrescente. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 43. *t.* 15. *f.* 116.

paraboli-ca. 63. Sph. globifera parabolica laevis aggregata nigra, globo spermatico livido. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 43. *t.* 15. *f.* 115.

cylindri-ca. 64. Sph. globifera cylindrica sparsa nigra: globo spermatico candido. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 42. *t.* 15. *f.* 114.

morifor-mis. 65. Sph. aggregato-sparsa atra ovalis tuberculosa. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 22. *t.* 11. *f.* 90. 91.

episphae-ria. 66. Sph. aggregato-sparsa purpurea globosa, collabescendo complanata, pupilla convexo-oblonga. *Tode fung. meklenb.* 2 *p.* 21. *t.* 11. *f.* 89.

compla-nata. 67. Sph. aggregata mammiformis pulla collabescendo complanata. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 21. *t.* 11. *f.* 88.

artocreas. 68. Sph. sparsa atra mammiformis contabescendo convexo-complanata, plica annulari. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 20. *t.* 9. *f.* 73.

confluens. 69. Sph. confluens atra papillata volva fugaci. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 19. *t.* 10. *f.* 87.

inquinans. 70. Sph. aggregata obvelato-papillata, atra immersa, seminum glebis effetis cylindricis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 17. *t.* 10. *f.* 85.

gregaria. 71. Sph. irregulariter aggregata miniata, crusta alba tenera. *Weig. obs. bot. p.* 43. *t.* 2. *f.* 10.

72. Sph.

epiphylla. 72. Sph. cruſtacea alba, ſphaerulis nigris cortice atro. *Wigg. prim. fl. holſ. p.* 84.

byſſacea. 73. Sph. ſolitaria minima atra: cruſta nivea pulverulenta. *Weigel obſ. bot. p.* 42. *t.* 2. *f.* 9.

hemiſphaerica. 74. Sph. aggregata hemiſphaerica nigra intus alba. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 66.

mucoſa. 75. Sph. hemiſphaerica ſpadicea rugoſa. *Weigel obſ. bot. p.* 42.

mucida. 76. Sph. conferto-aggregata globoſa tomentoſa: cortice papillaque atris, tomento mucido. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 15. *t.* 9. *f.* 75 *t.* 10. *f.* 82.

rugoſa. 77. Sph. aggregata globoſo-rugoſa nigerrima intus nigra. *Weig. obſ. bot. p.* 43. *t.* 2. *f.* 12.

ſphincterica. 78. Sph. pyriformis nigra villoſa: apice excavato plicato. *Bull. herb. Franc. t.* 444. *f.* 1.

hiſpida. 79. Sph. ſparſa pyriformis hiſpida atra. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 17. *t.* 10. *f.* 84.

calva. 80. Sph ſparſa atra papillata: hemiſphaerio ſuperiori glabro; inferiori hiſpido. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 16. *t.* 10. *f.* 83.

mollis. 81. Sph. aggregata atra nitidiuſcula ſubpapillata. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 8. *t.* 9. *f.* 66.

triſtis. 82. Sph. aggregata atra immerſa minima granulata. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 9. *t.* 9. *f.* 67.

cinnavarina. 83. Sph. ſparſo-aggregata rubra ovalis granulata. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 9. *t.* 9. *f.* 68.

byſſiſeda. 84. Sph. ſparſa mammiformis bicorticata, cruſtae filamentoſae innaſcens. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 10. *t.* 9. *f.* 69. 70.

mobilis. 85. Sph. conferta globoſa mobilis, papilla decidua. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 71.

acuta. 86. Sph. ſolitaria minima atra. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 22. 23. *t.* 5. *f.* 2.

porphyrogona. 87. Sph. aggregata phialaeformis atra, cruſtae tenuiſſimae violaceae innata. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 12. *t.* 9. *f.* 72.

macroſtoma. 88. Sph. aggregato-ſparſa globoſa: orificio largo labiato. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 12. 13. *t.* 9. *f.* 76-78.

roſtrata. 89. Sph. ſparſo-aggregata globoſa longiſſime roſtrata. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 14. *t.* 10. *f.* 79. 80.

connata. 90. Sph. aggregata globosa vertice capillata, capillis fastigiatis conniventibus. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 15. *t.* 10. *f.* 81.

ciliaris. 91. Sph. gregaria ex albo nigricans, loculis cirrhiferis. *Bull. herb. Franc. t.* 488. *f.* 1.

phoenicea. 92. Sph. minima sparsa globoso-elliptica rubra glabra. *Bull. herb. Franc. t.* 487. *f.* 3. *Weigel obs. bot. t.* 2. *f.* 10? Sph. mori.

miliacea. 93. Sph. unilocularis gregaria subgloboso-turbinata ex albo nigricans: superficie granulosa. *Bull. herb. Franc. t.* 444. *f.* 3.

HYSTERIUM. *Fungus* sessilis cavus: supra rima transversa, seminibus globosis ecaudatis discum obducentibus.

candidum. 1. H. aggregatum fusiforme papyraceum. *Tode fung. mekl. sel.* 2. *p.* 4. *t.* 8. *f.* 62.

caeruleum. 2. H. sparsum oblongo-ovale membranaceum crustaceum. *Tode fung. mekl. sel.* 2. *p.* 4. *t.* 8. *f.* 60.

VERMICULARIA. *Capsula* globosa sessilis, corporibus vermiformibus liberis seminiferis repleta.

Pseudosphaeria. 1. V. aggregata, capsula granulata nigra, filamentis gemmiferis nudis albis. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 31. *t.* 6. *f.* 46.

pubescens. 2. V. sparsa, capsula pubescente bicolore filamentis gemmiferis nudis canis. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 31. *t.* 6. *f.* 47.

hispida. 3. V. pulvinata sparsa, capsula nigra hispida: volva verticis fugaci, filamentis gemmiferis demersis albidis. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 32. *t.* 6. *f.* 48.

PYRENIUM. *Fungus* globosus sessilis integerrimus semina nuda conglobata, nuclei instar, includens.

lignorum. 1. P. sparsum candidum cortice bombacino, nucleo aeruginoso fatiscente. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 33. *t.* 3. *f.* 29.

aureum. 2. P. sparsum aureum cortice tomentoso, nucleo subaurantio fatiscente. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 33.

3. P.

metallorum. 3. P. compreſſum adſcendens imbricatum hirſutum: nucleo duriori. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 34. *t.* 6. *f.* 49.

terreſtre. 4. P. aggregatum pulpa gelatinoſa, nucleo cereo ſubrecedente. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 35. *t.* 6. *f.* 50.

TUBER. *Fungus* ſubgloboſus carnoſus: carne intus venis diſtincta.

guloſorum. 1. T. globoſum ſolidum muricatum radice deſtitutum. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon Tuber. *Mich. nov. pl. gen. t.* 102. *β) Mich. nov. pl. gen. t.* 164. *γ) Bull. herb. Franc. t.* 356.

oleraceum. 2. T. ſubrotundum nigrum congeſtum ſeſſile rugoſum. *Weber ſuppl. flor. holſ. p.* 14.

paraſiticum. 3. T. rubrum elongatum ſquamoſum. *Bull. herb. Franc. t.* 456.

album. 4. T. difforme ſubrotundum convexo-gibboſum rugoſum ſolidum albidum. *Bull. herb. Franc. t.* 404.

SCLEROTIUM. *Fungus* ſimpliciſſimus globoſo-oblongus tenax duriuſculus centro demum ſubhians, cortice inſeparabili nunquam ſupra dehiſcente.

* *ovalia.*

purpureum. 1. Scl. perpendiculare glaberrimum minimum ſparſum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 2. *Bolt. fung.* 3. *p.* 119. *t.* 119. *f.* 1.

immerſum. 2. Scl. decumbens glabrum aequale. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Mucor. 3. Scl. decumbens aggregatum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 7.

** *globoſa.*

Semen. 4. Scl. nigreſcens corrugandum ſparſum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 6.

radicatum. 5. Scl. ſparſum radicatum baſi producta. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 8.

villoſum. 6. Scl. villoſum aggregatum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 10. 11.

ſubterraneum. 7. Scl. globoſo-difforme aggregatum ſubterraneum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

**** pyriforme.*

complanatum. 8. Scl. complanatum, ſtipite breviſſimo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 9.

TUBERCULARIA. *Fungus* gelatinoſus pileatus: pileo tuberculato-papilloſo, ſtipiti craſſiſſimo farcto arcte appreſſo, in ſuperficie ſuperiori ſemina portante.

* *ſparſae.*

vulgaris. 1. T. ſtipite ventricoſo-globoſo, pileo convexo rugoſo: margine ſubrepando. *Bulliard herb. Franc. t.* 284. *Bolton fung.* III. *t.* 127. *f.* 1.

volvata. 2. T. ſtipite conico volvato: volva cyathiformi, pileo rugoſo convexo: margine appreſſo repando. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p* 20. *t.* 3. *f.* 33.

ſulcata. 3. T. ſulcata integra, ſtipite crucibuliformi cum pileo depreſſo ſubtus connato. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 21. *t.* 4. *f.* 34.

nigricans. 4. T. primum coccinea, demum nigra. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 217. *t.* 455. *f.* 1.

** *faſciculata.*

faſciculata. 5. T. ſtipite tereti, pileo complanato grenulato. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 20. *t.* 4. *f.* 32.

SPERMODERMIA. *Fungus* ſimpliciſſimus globoſus ſeſſilis ſpongioſus: ſeminibus confertis urticis vicem ſubeuntibus.

clandeſtina. 1. SPERMODERMIA. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 1.

ACRO-

ACROSPERMUM. *Fungus* simplicissimus suberectus in apice exterius semina emittens.

unguinosum. 1. A. cespitosum perpendiculare unctuosum (adultum) purpureum, apice tumidum. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 263. *t.* 12.

compressum. 2. A. perpendiculare ovato-elongatum compressum rigidissimum. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 13.

pyramidale. 3. A. perpendiculare ovato-acuminatum durissimum solitarium. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 14.

arachnoides. 4. A. gelatinosum fibrosum subtus tela araneosa vestitum, capitulo aurantio demum atro. *Jacq. misc. austr.* 1. *p.* 144. *t.* 15. *an hujus generis?*

siccum. 6. A. lacteum coriaceum intus cavum. *Schranck flor. bav.* 7. *p.* 676. *n.* 1634.

STILBUM. *Fungus* gelatinosus stipitatus aggregatus: capitulo diaphano nitente solido persistente extrinsecus semina portante.

* *capitulo sphaerico.*

vulgare. 1. St. stipite cylindrico crassiusculo. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 16.

bulbosum. 2. St. stipite attenuato bulboso. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 7.

** *capitulo ovato.*

rubicundum. 3. St. capitulo compresso, stipite attenuato. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 18.

minimum. 4. St. capitulo compresso, stipite capillari. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 19.

pubens. 5. St. stipite subtus incrassato pubente. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 12. *t.* 3. *f.* 21.

*** *capitulo turbinato.*

turbinatum. 6. St. stipite cylindrico ad capitulum contracto. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 20.

ASCOPHORA. *Fungus* erectus, ſtipitatus: ſtipite ſetaceo, capitulo globoſo-oblongo inflato opaco elaſtico extrinſecus ſemina portante.

* *ſparſae.*

Mucedo. 1. A. aggregato capitulo ſphaerico ad ſtipitem longum rumpendo. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 18. *f.* 17. Mucor roridus.

fragilis. 2. A. conferta, capitulo ſphaerico in medio diſſiliente, ſtipite breviuſculo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 14. *t.* 3. *f.* 23.

Stilbum. 3. A. capitulo ovato nitido, ſtipite breviſſimo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 14. *t.* 3. *f.* 24.

ovalis. 4. A. capitulo ovali demum corrugando et multifariam dehiſcente, ſtipite longiuſculo. *Tode Schr. berl. Naturf.* 3. *p.* 247. *t.* 4. *f.* 4-6. Aſcidium ovatum.

cylindrica. 5. A. gregaria, capitulo cylindrico corrugando, ſtipite breviuſculo. *Tode Schr. berl. Naturf.* 3. *p.* 248. *t.* 4. *f.* 7-9.

** *in receptaculo communi convexo aggregatae.*

limbiflora. 6. A. receptaculo communi demum depreſſo, capitulis globoſis nutantibus deciduis, ſtipitibus capillaribus laxis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 15. *t.* 3. *f.* 25.

diſciflora. 7. A. capitulis ovato-elongatis deciduis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 16. *t.* 3. *f.* 26. 27.

articulata. 8. A. nigro-fuſceſcens, capitulis elongatis articulatis apice acuminatis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 110. *t.* 504. *f.* 14.

CHORDOSTYLUM. *Fungus* tenaciſſimus, ſtipitatus, ſtipite longiſſimo tenaciſſimo ſubramoſo, capitulo globoſo ſubdeciduo ſemina includente.

* *erecta.*

Clavaria. 1. Ch ſimplex, ſtipite capillari glabro flexuoſo, capitulo pyriformi coriaceo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 40. *t.* 7. *f.* 55.

capillare. 2. Ch. ſparſum, ſtipite capillari glabro indiviſo, capitulo ſphaerico fatiſcente. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 37. *t.* 6. *f.* 52.

3. Ch.

byssoides. 3. Ch. aggregatum, stipite capillari debili ramoso. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 38. *t.* 7. *f.* 53.

** *repens.*

hispidulum. 4. Ch. hispidulum, furculo capillari decumbente ramoso subradicante, capitulis obovatis immersis. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 39. *t.* 7. *f.* 54.

filiforme. 5. Ch. luteum pubescens, stipite gracillimo apicibus albis pilosis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 205. *t.* 448. *f.* 1.

penicillatum. 6. Ch. croceum glabrum, stipite tenui, apicibus multifidis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 207. *t.* 448. *f.* 3. *an hujus generis?*

RHIZOMORPHA. *Fungus* ramosissimus repens corneus: seminibus latentibus.

fragilis. 1. Rh. nigra glabra compressa reticulata, intus solida alba. *Flor. dan. t.* 713.

cinchonae. 2. R. fusca pubescens reticulata compressa, intus cava nitidissima. *Willden. bot. Ann.* 1. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 2.

capillaris. 3. R. crocea subcompressa capillaris pubescens. *Willd. bot. Ann.* 1. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 3.

MESENTERICA. *Fungus* expansus gelatinosus venosus, in margine gemmas ferens.

tremelloides. 1. MESENTERICA. *Tode fung. mekl. sel.* 1. *p.* 7. *t.* 2. *f.* 12.

MUCOR. *Fungus* fugax: Capitula rorida primo diaphana demum opaca, stipitibus simplicibus ramosisve affixa.

ovalis. 1. M. cespitosus niveus, capitulo ovali. *Hall. hist. stirp. Helv. n.* 2149.

minimus. 2. M. minimus albus, capitulo nutante. *Mich. n. pl. gen. t.* 95 *f.* 1.

paniceus. 3. M. capitulis globosis albis siccis. *Mich. n. pl. gen. t.* 96. *f.* 6.

albus. 4. M. albus, capitulo globoso. *Bull. herb. Franc. t.* 407. *f.* 3.

5. M.

flavus. 5. M. luteus capitulo globoſo. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2151.

tremelloides. 6. M. aggregatus gelatinoſus lentiformis confluens. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 637. *n.* 1793.

plumoſus. 7. M. albus ramoſus lanam referens. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 638. *n.* 1795.

araneoſus. 8. M. canus telam aranearum referens. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 638. *n.* 1796.

purpureus. 9. M. purpureus guttam aemulans. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 639. *n.* 1799.

globoſus. 10. M. gregarius ochroleucus. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 638. *n.* 1798.

infuſorius. 11. M. gelatinoſus, filamentis ad latera globuliferis. *Spallanzani phyſ. Abh. t.* 1. *f.* 11. *an hujus generis?*

Mucedo. 12. M. ſtipitatus, capſula globoſa. *Mich. nov. pl. gen. t.* 95. *f.* 2. 4.

Eryſiphe. 13. M. albus, capitulis fuſcis ſeſſilibus.

virens. 14. M. thalaſſinus, capitulo globoſo. *Batſch el. fung. p.* 157. *n.* 2. *an hujus generis?*

HYDROPHORA. *Fungus* globoſus aqueus: ſtipite capillari ſubrecto.

minima. 1. H. capitulo excolore, ſtipite luteſcente. *Tode fung. mekl. ſel.* 2. *p.* 5. *t.* 8. *f.* 68.

tenella. 2. H. capitulo excolore, ſtipite griſeo. *Tode fung. mekl. ſel.* 2. *p.* 6. *n.* 2.

ſtercorea. 3. H. capitulo ſtipiteque ſordide luteſcentibus. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 6. *n.* 3.

PERICONIA. *Fungus* globoſus, ſeminibus ſeſſilibus deciduis, capitulum et ſtipitem ubique obducentibus.

lichenoides. 1. PERICONIA. *Tode fung. mekl. ſel.* 2. *p.* 2. *t.* 8. *f.* 61.

GRANULARIA. *Fungus* ſubrotundus: granis mucilagini immerſis farctus.

piſiformis. 1. GRANULARIA. *Willden. bot. Ann.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 1.

MEDUSULA. *Fungus* ſolidus globoſus ſtipitatus confertus: ſeminibus externis filiformibus flexilibus colliquescentibus.

labyrinthica. 1. MEDUSULA. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 17. *t.* 3. *f.* 28.

MONILIA. Fila moniliformia in capitulum congregata.

* *ſtipitatae.*

cruſtacea. 1. M. ſpicis digitatis. *Syſt. nat* XII. 3. *p.* 727. Mucor cruſtaceus. *Flor. dan. t.* 897. *f.* 1.

ceſpitoſa. 2. M. ſtipite ramoſo, ſpicis ternatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 727. Mucor ceſpitoſus. *Mich. nov. pl. gen. t.* 91. *f.* 3. *β) Mich. nov. pl. gen. t.* 91. *f.* 4.

Aſpergillus. 3. M. ſtipite ſetaceo dichotomo procero, capitulis aqueis.. *Scop. flor. carn. n.* 1642.

aurea. 4. M. ceſpitoſa flava, capitulo ſubrotundo. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2154.

alba. 5. M. alba, ſtipite articulato. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2155.

purpurea. 6. M. cruſta villoſa alba, ſtipitibus brevibus capitulisque rubris. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2153.

glauca. 7. M. cana villoſa, ſtipite ſetaceo brevi capitulo globoſo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 727. Mucor glaucus. *Bull. herb. Franc. t.* 504. *f.* 10.

** *ſeſſiles.*

ochroleuca. 8. M. globoſa ochroleuca villis radiantibus farcta. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2152.

leproſa. 9. M. ſetacea capitulis radicalibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 727. Mucor leproſus.

MUCI-

MUCILAGO. *Fungus*: Fila ſimpliciſſima fugacia.

plumoſa. 1. M. nivea plumoſa. *Hall. ſtirp. Helv. n.* 2130.

ceſpitoſa. 2. M. plumoſa lutea. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 112.

cinerea. 3. M. cinerea filis ceſpitoſis ramoſis ſimplicibusque. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2131.

miniata. 4. M. villoſa ruberrima. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2132.

INDEX

INDEX

TOMII IIdi

DUPLEX.

INDEX I.

CONTINENS NOMINA GENERUM, CUM SPECIEBUS SUBJECTIS OMNIBUS.

ABROMA 1149, 1151
augustum 1151
Wheleri *ib.*
Abronia 996, 1008
californica 1008
ABRUS 1075, 1076, 1086
precatorius 1086
ACAENA 218, 278
elongata 278
Acalypha 998, 1032-1034
alopecuroides 1033
angustifolia *ib.*
australis 1032
betulifolia 1034
caroliniana 1033
ciliata 1032
corensis 1033
decidua 1032
elliptica 1033
fruticosa 1032
hernandifolia 1033
indica 1032
laevigata 1033
reptans *ib.*
scabrosa *ib.*
spicata 1032
supera 1033
tomentosa *ib.*
villosa 1032
virgata 1033
virginica 1032
Acanthus 887, 964, 965
arboreus 964
capensis. 965
carduifolius 964
Dioscoridis 965
edulis 964
furcatus 965
ilicifolius *ib.*
integrifolius *ib.*
mollis 964
procumbens 965
spinosus 964
Acarna 1076, 1085
violacea 1085
Acer 598, 615-617
campestre 616
carolinianum 617
creticum 616
dissectum *ib.*
japonicum *ib.*
laciniatum *ib.*
monspessulanum *ib.*
montanum 616
Negando *ib.*
palmatum *ib.*
pensilvanicum *ib.*
pictum *ib.*
Platanoides *ib.*
Pseudoplatanus *ib.*
rubrum *ib.*
saccharinum *ib.*
sempervirens 615
septemlobum 616
tataricum *ib.*
trifidum *ib.*
Achillea 1165, 1252-1254
abrotanifolia 1254
aegyptiaca 1253
Ageratum 1252
alpina *ib.*
atrata 1254
capitata 1253
Cerbarato. 1252
Clavennae 1253
coronopifolia *ib.*
cretica *ib.*
crista 1253
falcata *ib.*
Halleri 1253
impatiens *ib.*

ligu-

Achillea
liguſtica 1253
lobata 1252
macrophylla 1253
magna *ib.*
micrantha *ib.*
Millefolium 1254
moſchata *ib.*
nana 1253
nobilis 1254
odorata *ib.*
piloſa 1253
Ptarmica 1252
pubeſcens 1254
Santolina 1253
ſerrata *ib.*
ſquarroſa *ib.*
tanacetifolia 1254
tomentoſa *ib.*
Achras 523, 573, 574
Balata 574
diſſecta 573
mammoſa *ib.*
ſalicifolia *ib.*
Sapota *ib.*
Achyranthes 303, 423, 424
alternifolia 424
altiſſima *ib.*
aſpera 423
capitata 424
corymboſa *ib.*
decumbens *ib.*
dichotoma *ib.*
lappacea 423
muricata 424
nivea *ib.*
polyſtachya *ib.*
proſtrata *ib.*
Acidoton 772, 819
urens 819
Acioja 998, 1028
guianenſis 1028
Acnida 313, 509
cannabina 509
Aconitum 778, 838, 839
album 839
Anthorus 838
Cammarum *ib.*
cernuum *ib.*
japonicum *ib.*
lycoctonum *ib.*
Napellus *ib.*
neomontanum *ib.*
pyrenaicum *ib.*
ſeptentrionale *ib.*
tauricum *ib.*
uncinatum 839
variegatum 838
volubile *ib.*
Acorus 526, 568
Calamus 568
gramineus *ib.*
Acroſpermum 1286, 1483
arachnoideum 1483
compreſſum *ib.*
pyramidale *ib.*
ſiccum *ib.*
unguinoſum *ib.*
Acroſtichum 1283, 1294-1297
aculeatum 1297
areolatum 1296
aureum 1295
auſtrale *ib.*
barbarum 1296
calomelas 1297
citrifolium 1295
crinitum *ib.*
cruciatum 1296
dichotomum 1295
digitatum *ib.*
ebeneum 1296
Acroſtichum
ferrugineum 1295
filare 1297
furcatum 1296
graminoides 1294
haſtatum 1295
heterophyllum 1294
ilvenſe 1296
lanceolatum 1294
latifolium *ib.*
Lingua 1295
longifolium 1294
Marantae 1296
marginatum *ib.*
muſcoſum 1294
pectinatum 1295
petiolatum 1294
platyneuron 1295
polypodioides *ib.*
punctatum *ib.*
punctulatum *ib.*
rufum 1296
ſanctum *ib.*
ſeptentrionale 1295
ſerrulatum 1294
ſiliquoſum 1296
ſimplex 1294
ſorbifolium 1296
ſpicatum 1294
ſulphureum 1296
thalictroides *ib.*
trifoliatum *ib.*
velleum 1297
villoſum 1294
Actaea 774, 807, 808
dioica 808
japonica *ib.*
monogyna *ib.*
pentagyna *ib.*
racemoſa *ib.*
ſpicata 807
Adambea 776, 821
capſulifera 821

Adan-

Adanſonia 1000, 1038
digitata 1038
Adelia 999, 1036
Acidoton 1036
Bernardia ib.
Ricinella ib.
Adenanthera 656, 678
falcata 678
pavonina ib.
ſcandens ib.
Adenia 523, 565
venenata 565
Adiantum 1283, 1314-1317
aculeatum 1317
aethiopicum ib.
borbonium ib.
caffrorum 1316
Capillus Veneris 1316
caudatum 1315
chryſanum 1316
clavatum 1317
criſtatum 1316
cuneatum 1315
decurrens ib.
deltoideum ib.
denticulatum 1316
flabellulatum ib.
fragile 1317
fragrans 1316
furcatum ib.
fuſcum 1315
gujanenſe 1316
haſtatum 1315
hexagonum 1317
Lancea 1315
macrophyllum ib.
microphyllum 1317
pedatum 1315
philippenſe ib.
pteroides 1317
pulverulentum 1316
pumilum 1315
radiatum ib.
reniforme 1314
repens 1315
ſagittatum ib.
ſerratum 1316
ſerrulatum 1315
ſtriatum 1317
ſtrictum 1316
tenellum 1317
tenerum ib.
trapeziforme ib.
trifoliatum 1316
trilobum 1315
truncatum 1316
villoſum ib.
Adonis 783, 876
aeſtivalis 876
apennina ib.
auctumnalis ib.
capenſis ib.
flammea ib.
miniata ib.
veſicatoria ib.
vernalis ib.
Adoxa 603, 643
moſchatellina 643
Aecidium 1472 *ſq.*
anemones 1473
berberidis ib.
cancellatum 1472
candidum 1473
cornutum 1472
euonymi 1473
euphorbiae ib.
flavum ib.
fuſcum ib.
lineare ib.
nigrum ib.
penicillatum 1472
pini 1473
pynolae ib.
rhamni 1472
rubellum 1473
ſcutellatum ib.
tuſſilaginis ib.
Aegilops 87, 178
aromatica 178
caudata ib.
ovata ib.
ſaccharina ib.
ſquarroſa ib.
triuncialis. ib.
AEGIPHILA 211, 259
arboreſcens 259
elata ib.
foetida ib.
laevis ib.
martinicenſis ib.
trifida ib.
villoſa ib.
Aegopodium 310, 493
Podagraria 493
Aegopricon 4, 18
betulinum 18
Aerva 998, 1026
aegyptiaca 1026
Aeſchynomene 1077, 1120, 1121
americana 1120
arborea ib.
aſpera ib.
Burmanni 1121
cannabina 1120
coccinea ib.
grandiflora ib.
herbacea 1121
indica ib.
pumila ib.

Aeſchynomene
ſenſitiva 1120
Sesban 1121
Aeſculus 593, 595
Hippocaſtanum 595
lutea *ib.*
parva *ib.*
pavia *ib.*
Aethuſa 309, 486
Bunius 486
Cynapium *ib.*
fatua *ib.*
Meum *ib.*
Afzelia 889, 927
caſſioides 927
Agaricus 1285, 1397-1429
abietis 1420
abbreviatus 1417
acerrimus 1412
acicularis 1425
acris 1413
acuminatus 1426
adhaerens 1403
aduſtus 1422
aggregatus 1411
alabaſtrinus 1410
alliaceus 1420
alliatus *ib.*
alterabilis 1422
alutaceus 1410
amaricans 1416
amarus 1413
androſaceus 1423
angulatus 1421
applicatus 1429
aqueus 1427
araneoſus 1402
arcuatus 1400
ardeſiacus 1415
armeniacus 1402
atromentarius 1428
Agaricus
atro-cyaneus 1422
atro-rufus 1421
atro-ſquamoſus 1419
atro-tomentoſus 1410
auratus 1416
auricomus 1414
aurivenius 1418
badius 1398
Balanus 1427
Beryllus 1416
bicolor 1423
buccinalis 1411
bulboſus 1399
Bulliardi 1413
bullularis 1418
caeruleſcens 1404
caeſareus 1397
caliciformis 1410
Campanella 1421
campanulatus 1428
campeſtris 1399
candicans 1414
candido-bulboſus 1418
candidus 1423
cano-brunneus 1418
carbonarius 1426
caryophylleus 1413
caſtaneus 1414
ceraceus 1403
Cereolus 1413
cereus 1417
cervinus 1410
ceſpitoſus 1429
Chryſodon 1422
ciliaris 1426
cimicarius 1413
cineraſcens 1418
cinereus 1427
cinnamomeus 1404
circumſeptus 1417
Clavis 1421
clavularis 1425
Agaricus
Clavus 1420
clypeatus 1402
clypeiformis 1426
cochleariformis 1409
collinus 1414
conchatus 1411
confertus 1424
congregatus 1426
conicus 1424
contiguus 1405
contortilis 1419
contortus 1416
contractus 1421
corallinus 1406
coriaceus 1418
craſſipes 1405
craſſus 1410
crenulatus 1420
criſtatus 1414
croceus 1402, 1415
cruentatus 1408
cuſpidatus 1424
cyaneus 1416
cyanoxanthus 1401
cyathiformis 1409
decurrens 1414
defoſſus 1407
degener 1410
delicioſus 1412
denticulatus
denudatus 1398
depluens 1428
dichrous 1429
diſcors 1408
diffuſus 1419
Digitalis 1428
dimidiatus 1411
domeſticus 1427
diſcors 1408
dulcis 1412
durus 1400
elaſticus 1415

elatior

Agaricus elatior 1408
Agaricus elephantinus 1404
Agaricus emeticus 1401
Agaricus equinus 1424
Agaricus esculentus 1420
Agaricus excoriatus 1399
Agaricus fagineus 1429
Agaricus fallax 1411
Agaricus farinaceus 1419
Agaricus farinosus 1414
Agaricus fasciatus 1406
Agaricus fascicularis 1407
Agaricus fasciculatus 1425
Agaricus fastigiatus 1404
Agaricus ferrugineus 1400
Agaricus ferruginatus 1421
Agaricus ferrugineus 1403
Agaricus fibrillosus 1420
Agaricus Fibula 1421
Agaricus fimiputris 1428
Agaricus fissus 1415
Agaricus flabellatus 1410
Agaricus flabelliformis 1411
Agaricus flamineus 1409
Agaricus flavidus 1406
Agaricus flavo-floccosus 1417
Agaricus floccosus 1399
Agaricus Flurstediensis 1411
Agaricus fragillimus ib.
Agaricus fragilis 1402
Agaricus fuliginarius 1421
Agaricus fuliginatus 1419
Agaricus fulvescens 1429
Agaricus fulvidus 1402
Agaricus fulvus 1398
Agaricus furcatus 1410
Agaricus Fumus 1421
Agaricus fuscescens 1414
Agaricus fusipes 1406
Agaricus Fusus 1408
Agaricus gelatinosus 1429
Agaricus Georgii 1402
Agaricus giganteus 1397
Agaricus gilvus 1402
Agaricus glandifer 1422
Agaricus glandulosus 1428
Agaricus glaucus 1411
Agaricus glutinosus 1401
Agaricus gossypinus 1428
Agaricus gracilis 1422
Agaricus granulosus 1419
Agaricus griseo-albus 1398
Agaricus griseus 1425
Agaricus helvolus 1398
Agaricus hepaticus 1406
Agaricus hirtus 1423
Agaricus hispidus 1419
Agaricus holosericeus 1409
Agaricus horizontalis 1408
Agaricus Hyacinthus 1416
Agaricus hypni 1421
Agaricus janthinus 1419
Agaricus ichoratus 1413
Agaricus imbricatus 1400
Agaricus impressus 1409
Agaricus impuber 1407
Agaricus incertus ib.
Agaricus infundibuliformis 1409
Agaricus integer 1401
Agaricus involutus 1405
Agaricus irregularis 1414
Agaricus laccatus 1420
Agaricus laceratus 1399
Agaricus lacrimabundus 1426
Agaricus lacrimalis 1414
Agaricus lactifluus 1412
Agaricus laricinus 1406
Agaricus laterinus 1408
Agaricus latus 1404
Agaricus leoninus 1406
Agaricus libertatis 1405
Agaricus Lingua 1429
Agaricus livens 1412
Agaricus livescens 1410
Agaricus longipes 1406
Agaricus lucens 1398
Agaricus luridus 1422
Agaricus luteo-albus 1424
Agaricus luteus 1403
Agaricus lycoperdioides 1405
Agaricus maculatus 1397
Agaricus madreporeus 1408
Agaricus majalis 1420
Agaricus mammillaris 1424
Agaricus mammosus 1420
Agaricus Mappa 1397
Agaricus margaritaceus 1427
Agaricus margaritifer 1397
Agaricus marginatus 1422
Agaricus melleus 1413
Agaricus membranaceus 1423
Agaricus micaceus 1428
Agaricus minor 1398
Agaricus minutulus 1423
Agaricus minutus 1421
Agaricus mitratus 1403
Agaricus mollis ib.
Agaricus mollissimus 1404
Agaricus momentaneus 1425
Agaricus moschatus 1416
Agaricus Mucor 1425
Agaricus murinus 1419
Agaricus muscarius 1397
Agaricus muscorum 1418
Agaricus mutabilis 1400
Agaricus naevius 1398
Agaricus narcoticus 1426
Agaricus nebularis 1408
Agaricus necator 1412
Agaricus neptuneus 1410
Agaricus nigro-villosus 1415
Agaricus nimbatus 1405
Agaricus nitens 1399
Agaricus niveus 1429
Agaricus nivosus 1405

Agaricus norwegicus 1424
Agaricus nothus 1423
Agaricus nuceus 1425
Agaricus obconicus 1409
Agaricus obesus 1411
Agaricus obscurus 1399
Agaricus obsoletescens 1418
Agaricus ochraceus 1404
Agaricus oedematosus 1406
Agaricus Offa 1404
Agaricus olivaceus 1417
Agaricus olivascens 1400
Agaricus opacus 1413
Agaricus orichalceus 1400
Agaricus ostreatus 1411
Agaricus ovatus 1427
Agaricus pallidus 1407
Agaricus palmatus 1411
Agaricus papilionaceus 1427
Agaricus papillatus 1424
Agaricus papilliger 1426
Agaricus papyraceus 1425
Agaricus perennis 1428
Agaricus perforans 1423
Agaricus peronatus 1424
Agaricus petalodes 1411
Agaricus picaceus 1428
Agaricus pileatus 1405
Agaricus piloselus 1422
Agaricus piluliformis 1416
Agaricus pineti 1420
Agaricus piperatus 1413
Agaricus pistillaris 1399
Agaricus Placentæ 1419
Agaricus planus 1429
Agaricus plicatus 1420
Agaricus plumatus 1429
Agaricus plumbeus 1398
Agaricus plumosus 1415
Agaricus politus 1404
Agaricus pompolus ib.
Agaricus porcellaneus 1427
Agaricus praealtus 1398
Agaricus pratensis 1399
Agaricus procerus ib.
Agaricus pullatus 1428
Agaricus punctatus 1402
Agaricus purpureus 1419
Agaricus pusillus 1405
Agaricus radians 1429
Agaricus radiatus 1423
Agaricus radicosus 1399
Agaricus ramealis 1415
Agaricus ramosus 1416
Agaricus repens 1415
Agaricus rigidus 1406
Agaricus rimosus 1422
Agaricus risigallinus 1407
Agaricus rosellus 1417
Agaricus rostratus 1428
Agaricus Rotula 1424
Agaricus rubens 1415
Agaricus Rudolphi 1403
Agaricus rufescens 1406
Agaricus rufus 1412
Agaricus Russula 1401
Agaricus rutilus 1402
Agaricus saccharinus 1425
Agaricus sanguineus 1417
Agaricus sanguinolentus 1409
Agaricus scissus 1416
Agaricus scrobiculatus 1412
Agaricus semiglobatus 1418
Agaricus semipetiolatus 1410
Agaricus senescens 1408
Agaricus sericeus 1402
Agaricus setaceus 1421
Agaricus soboliferus 1428
Agaricus solitarius 1397
Agaricus sordidulus 1426
Agaricus sordidus 1417
Agaricus spadiceo-griseus 1425
Agaricus spadiceus 1403
Agaricus squalidus 1427
Agaricus squamosus 1399
Agaricus squamulosus 1407
Agaricus stellatus 1424
Agaricus stercorarius 1428
Agaricus striatellus 1421
Agaricus striatulus 1429
Agaricus striatus 1403
Agaricus suaveolens 1409
Agaricus subalutaceus ib.
Agaricus subannulatus 1407
Agaricus subantiquatus 1400
Agaricus subatratus 1426
Agaricus subcarneus 1417
Agaricus subcoriaceus 1420
Agaricus subcorneus 1417
Agaricus subferrugineus 1408
Agaricus subgracilis 1397
Agaricus subgranulatus 1403
Agaricus subpurpurascens 1407
Agaricus subtestaceus 1408
Agaricus succineus 1427
Agaricus sulcatus 1425
Agaricus sulphuratus 1422
Agaricus sulphureus 1417
Agaricus superstitiosus 1416
Agaricus tenuis 1424
Agaricus terreus 1403
Agaricus testaceus 1409
Agaricus tigrinus 1414
Agaricus Tintinnabulum 1423
Agaricus tomentosus 1418
Agaricus torminosus 1412
Agaricus tortus 1427
Agaricus tremebundus 1418
Agaricus tremulus 1410
Agaricus trichopus 1423
Agaricus tricolor 1426
Agaricus trilobus 1398
Agaricus truncatus 1402
Agaricus tubaeformis 1409
Agaricus tuberculosus 1406
Agaricus tuberosus 1405

Agaricus
turbinatus 1404
turfaceus 1424
umbellatus 1423
umbelliferus *ib.*
umbilicaris 1425
umbilicatus 1414
Umbraculum 1419
umbrinus 1407
undulatus 1403
vaccinus *ib.*
vaginatus 1398
Vaillantii 1427
variegatus 1424
varius 1402
velutipes 1415
ventricosus 1402
versicolor 1429
vernus 1397
villosus 1400
vinosus 1416
violaceo-fulvens 1429
violaceo-fulvus 1409
violaceus 1401
virescens *ib.*
virgineus *ib.*
visceralis 1422
viscosus 1407
vitellinus 1400
xerampelinus 1401
zonarius 1412

Agave 524, 563
americana 563
cubensis *ib.*
foetida *ib.*
lurida *ib.*
tuberosa *ib.*
virginica *ib.*
vivipara *ib.*

Ageratum 1162, 1200, 1201
ciliare 1201
conyzoides 1200
guianense 1201

Agrimonia 742, 757
Agrimonoides 757
decumbens *ib.*
Eupatoria *ib.*
parviflora *ib.*
repens *ib.*

Agrostemma 662, 735
Caeli rosa 735
Coronaria *ib.*
Flos jovis *ib.*
Githago *ib.*

Agrostis 86, 168-171
alba 170
alpina 169
aspera 171
australis 169
avenacea 171
brornoides 169
capillaris 170
ciliata 171
Cinna 170
Cornu copiae *ib.*
coromandeliana *ib.*
diandra *ib.*
dubia 169
festucoides *ib.*
filiformis *ib.*
gigantea *ib.*
glomerata 171
hirsuta 169
indica 171
interrupta 169
lateralis 171
Leersii 169
lenta 171
linearis 170
Matrella 169
mexicana 171
miliacea 169
minima 170
ovata *ib.*
procera *ib.*
pumila *ib.*
pungens 171
purpurascens 170
rubra 169
serotina *ib.*
silvatica 170
Spica venti 168
spicata *ib.*
spiciformis 169
stolonifera 170
stricta *ib.*
tenacissima *ib.*
verticillata *ib.*
vinealis 169
virginica 171

Agyneja 84, 106
impuber 106
puber *ib.*

Ailanthus 662, 726
Pongelion 726

Ajovea 522, 574
guianensis 574

Aira 87, 174, 175
aegilopsoides 174
alpina 175
antarctica *ib.*
aquatica 174
arundinacea *ib.*
bengalensis *ib.*
canescens 175
capensis 174
caryophyllea 175
cespitosa 174
festucoides 175
flexuosa *ib.*
juncea *ib.*
Koenigii 174
media 175
miliacea 174
minuta

Aira
minuta 174
montana 175
paludosa 174
praecox 175
purpurea *ib.*
setacea *ib.*
sinensis *ib.*
subspicata *ib.*
villosa *ib.*

Aitonia 997, 1013
capensis 1013

Ajuga 885, 892
alpina 892
decumbens *ib.*
genevensis *ib.*
orientalis *ib.*
pyramidalis *ib.*
reptans *ib.*

Aizoon 779, 848, 849
canariense 848
fruticosum *ib.*
glinoides *ib.*
hispanicum *ib.*
lanceolatum *ib.*
paniculatum *ib.*
perfoliatum *ib.*
rigidum *ib.*
secundum *ib.*
tomentosum 849

Alangium 656, 667
pungens 667

Albuca 525, 547, 548
abyssinica 547
altissima *ib.*
coarctata *ib.*
fastigiata 548
major 547
minor *ib.*
spiralis 548
viscosa *ib.*

Alcea 1002, 1052
acaulis 1052
coromandeliana *ib.*
ficifolia *ib.*
rosea *ib.*
sinensis *ib.*

Alchemilla 217, 281
alpina 281
aphanoides *ib.*
pentaphylla *ib.*
vulgaris *ib.*

Alchornea 997, 1013
latifolia 1013

Aldrovanda 313, 514
vesiculosa 514

Aletris 524, 561, 562
aurea 562
capensis 561
farinosa *ib.*
fragrans *ib.*
guineensis *ib.*
hyacinthoides. *ib.*
japonica 562
pumila 561
Uvaria *ib.*

Aleurites 998, 1035
triloba 1035

Alisma 528, 591, 592
cordifolium 592
Damasonium *ib.*
flavum 591
natans 592
parnassifolium *ib.*
Plantago 591
ranunculoides 592
repens *ib.*
subulatum *ib.*

ALLAMANDA 293, 435
cathartica 435

Alsine 210, 231
albida 231
incarnata *ib.*
violacea *ib.*

Allium 524, 541-544
altaicum 544
Ampeloprasum 541
angulosum 543
arenarium 542
ascalonicum 543
caeruleum 541
canadense 543
carinatum 542
Cepa 543
Chamaemoly 544
desertorum 542
descendens *ib.*
fistulosum 543
flavum 542
gracile 544
illyricum *ib.*
inodorum *ib.*
lineare 541
magicum *ib.*
Moly 544
monspessulanum 543
moschatum 542
multibulbosum 543
narcissiflorum *ib.*
neapolitanum *ib.*
nigrum *ib.*
nutans *ib.*
obliquum 541
odorum 543
oleraceum 542
ornithogaloides 544
Pallasii 542
pallens *ib.*
paniculatum *ib.*
parviflorum 542
Pomum 541
ramosum *ib.*

Allium
roſeum 541
rotundum ib.
ſativum 542
Schoenopraſum 543
Scorodopraſum 542
ſeneſcens 543
ſibiricum ib.
ſphaerocephalon 542
ſuaveolens 541
ſubhirſutum ib.
tataricum ib.
tenuiſſimum 543
tricoccum 544
triquetrum ib.
urſinum ib.
Victorialis 541
vineale 542
Allophylus 599, 611, 612
racemoſus 612
rigidus ib.
zeylanicus 611
Aloë 524, 562, 563
arachnoidea 563
dichotoma ib.
diſticha 562
humilis ib.
linguaeformis ib.
maculata ib.
pendens ib.
perfoliata ib.
picta ib.
pumila 563
retuſa ib.
ſinuata ib.
ſpicata ib.
ſpiralis ib.
variegata 562
viſcoſa 563
Alopecurus 86, 167
agreſtis 167
bulboſus ib.
carolinianus 167
caudatus ib.
ciliatus ib.
geniculatus ib.
hordeiformis ib.
indicus ib.
monſpelienſis ib.
panicus ib.
pratenſis ib.
typhoides ib.
Alpinia 1, 7, 8
jamaicenſis 8
Languas 7
occidentalis ib.
racemoſa ib.
ſpicata ib.
Alſine 311, 506, 507
media 506
mucronata 507
proſtrata ib.
ſegetalis 506
Alstonia 771, 798
theaeformis 798
Alſtroemeria 524, 564
Ligta 564
multiflora ib.
peregrina ib.
pulchella ib.
Salſilla ib.
Alternanthera 84, 106
repens 106
Althaea 1002, 1051, 1052
cannabina 1052
corymboſa 1051
grandiflora ib.
hirſuta ib.
Ludwigii ib.
narbonenſis 1051
officinalis ib.
Alyſſum 967, 976, 977
alpeſtre 976
calicinum ib.
clypeatum ib.
creticum 977
deltoideum ib.
gemonenſe ib.
halimifolium 976
hyperboreum ib.
minimum ib.
montanum ib.
ſaxatile ib.
ſinuatum 977
ſpinoſum 976
utriculatum 977
Veſicaria ib.
Amanoa 304, 427
gujanenſis 427
Amarantus 89, 204-206
albus 205
Blitum ib.
caudatus ib.
cruentus ib.
deflexus ib.
flavus ib.
gangeticus ib.
graecizans 204
hybridus 205
hypochondriacus ib.
lividus ib.
mangoſtanus ib.
melancholicus 204
oleraceus 205
paniculatus ib.
polygamus 204
polygonoides 205
retroflexus 206

Amarantus
sanguineus 206
scandens 205
spinosus 206
tricolor 204
tristis 205
viridis ib.

Amaryllis 524, 538-540
alba 540
Atamasco 539
aurea ib.
Belladonna ib.
capensis 538
chilensis 539
ciliaris 540
cinnamomea ib.
clavata 539
districha 540
formosissima 539
longifolia ib.
lutea 538
maculata 539
orientalis ib.
pumilio ib.
radiata 540
reginae 539
reticulata ib.
revoluta ib.
samiensis 540
tatarica ib.
tubiflora 539
tubispatha 538
undulata 540
vittata 539

Amasonia 894, 965
erecta 965

Ambrosia 291, 374, 375
artemisiifolia 374
elatior ib.
maritima ib.
simplicifolia 375
trifida 374

Ambrosinia 782, 866
Bassii 866

Ambulia 887, 945
monosperma 945

Amellus 1165, 1254 *sq.*
carolinianus 1255
lychnitis 1254
umbellatus 1255

Amerimnum 1076, 1087
Brownei 1087
Ebenus ib.

Amethystea 20, 43
caerulea 43

Ammannia 215, 264, 265
baccifera 264
debilis ib.
latifolia ib.
octandra ib.
pinnatifida 265
ramosior 264
sanguinolenta ib.

Ammi 308, 474, 475
copticum 475
daucifolium ib.
glaucifolium ib.
majus 474

Amomum 1, 5-7
angustifolium 6
Cardamomum 5
Curcuma ib.
Globba 6
Grana Paradisi 5
Koenigii 6
Leonurus ib.
littorale ib.
medium 7
minus ib.
Mioga 6
montanum ib.
repens ib.
Scyphiferum ib.
silvestre ib.
spurium ib.
uliginosum ib.
Zerumbet 5
Zingiber ib.

Amorpha 1075, 1076, 1093
fruticosa 1093

Amsonia 294, 439
ciliata 439
Tabernaemontana ib.

Amygdalus 770, 793, 794
communis 793
dulcis 794
incana ib.
nana ib.
orientalis ib.
persica 793
pumila 794

Amyris 600, 614, 615
ambrosiaca 614
Balsamea ib.
balsamifera 615
Elemifera 614
gujanense 615
maritima 614
Opobalsamum ib.
Protium ib.
silvatica ib.
toxifera ib.
zeylanica 615

Anabasis 307, 454
aphylla 454
foliosa ib.

tama-

Anabasis
spinosissima 454
tamariscifolia ib.
Anacardium 647, 652
occidentale 652
Anacyclus 1163, 1250 sq.
aureus 1251
creticus ib.
orientalis 1250
valentinus 1251
Anagallis 292, 332
arvensis 332
caerulea ib.
latifolia ib.
linifolia ib.
Monelli ib.
pumila ib.
tenella ib.
verticillata ib.
Anagyris 655, 665
foetida 665
Anasser 293, 333
Barboniae 333
Anastatica 967, 970
hierichuntica 970
syriaca ib.
Anavinga 660, 702
exotica 702
Anchusa 292, 317, 318
amoena 318
angustifolia 317
Barrelieri ib.
echinocarpos 318
flava ib.
hispida ib.
italica 317
lanata 318
officinalis 317
Anchusa
paniculata 317
saxatilis 318
sempervirens ib.
tinctoria 317
tuberculata 318
undulata 317
virginica ib.
Ancistrum 21, 50
latebrosum 50
Sanguisorbae ib.
Andira 1076, 1086
Pisonis 1086
Andrachne 312, 504
fruticosa 504
telephioides ib.
Andromeda 659, 695, 696
anastomosans 696
arborea ib.
caerulea 695
caliculata 696
Catesbaei 695
cerea ib.
fasciculata ib.
ferruginea ib.
ferruginosa ib.
hypnoides ib.
jamaicensis ib.
japonica 696
lucida ib.
mariana 695
nitida ib.
octandra ib.
paniculata 696
polifolia 695
racemosa 696
reticulata ib.
rupestris ib.
tetragona 695
Andropogon 87, 163-166
aciculatus 165
afer 166
alopecuroides 165
annulatus 164
barbatus ib.
bicornis ib.
binatus ib.
Bladhii ib.
brevifolius ib.
caricosus 163
ciliatus 165
contortus 163
cotuliferus 165
crinitus 163
cymbarius 165
distachyos 164
divaricatus ib.
fastigiatus 165
glaucus ib.
Gryllus ib.
hirtus ib.
incurvatus 164
insularis 166
Ischaemum ib.
muricatus 165
muticus 164
Nardus 166
nutans 165
prostratus 166
provincialis 164
ramosus ib.
saccharoides 165
Schoenanthus 164
serratus ib.
serrulatus 165
squarrosus ib.
undatus 166
virginicus 164
Androsace 292, 325, 326
carnea 326

brevi-

Androsace
brevifolia 326
elongata 325
filiformis 326
lactea *ib.*
maxima 325
obtusifolia *ib.*
odoratissima *ib.*
pauciflora *ib.*
septentrionalis *ib.*
villosa *ib.*
Andryala 1161, 1181
cheiranthifolia 1181
crithmifolia *ib.*
integrifolia *ib.*
lanata *ib.*
nigricans *ib.*
pinnatifida *ib.*
ragusina *ib.*
uniflora *ib.*
Anemone 782, 870-872
alpina 870
apennina 871
apiifolia 870
baldensis *ib.*
cernua *ib.*
coronaria *ib.*
decapetala 871
dichotoma *ib.*
fasciculata 872
fragifera 871
Halleri 870
Hepatica *ib.*
hortensis *ib.*
narcissiflora 871
nemorosa *ib.*
palmata *ib.*
patens 870
pensilvanica 871
pratensis 870
Pulsatilla *ib.*
quinquefolia 871
Anemone
ranunculoides 871
sibirica *ib.*
silvestris *ib.*
sulphurea 870
thalictroides 871
trifolia *ib.*
vernalis 870
virginiana *ib.*
Anethum 310, 491
Foeniculum 491
graveolens *ib.*
segetum *ib.*
Angelica 309, 482
Archangelica 482
atro purpurea *ib.*
integrifolia *ib.*
lobata *ib.*
lucida *ib.*
Razulii *ib.*
silvestris *ib.*
verticillaris *ib.*
Anguillaria 295, 430
bahamensis 430
zeylanica *ib.*
Anguria 21, 70
pedata 70
trifoliata *ib.*
trilobata *ib.*
Annona 782, 868, 869
aegyptiaca 868
africana 869
amara *ib.*
Amboini *ib.*
Aperamoa *ib.*
asiatica *ib.*
glabra *ib.*
longifolia *ib.*
muricata 868
paludosa 869
palustris *ib.*
Annona
punctata 869
reticulata 868
rufescens 869
sinensis 868
squamosa 869
triloba *ib.*
Anoda 1001, 1040
Dilleniana 1040
hastata *ib.*
triloba *ib.*
Anredera 306, 454
spicata 454
Anthemis 1165, 1251 *sq.*
alpina 1251
altissima *ib.*
americana 1252
arabica *ib.*
arvensis 1251
austriaca 1252
chia 1251
corymbosa *ib.*
Cota 1251
Cotula *ib.*
maritima *ib.*
mixta 1251
nobilis *ib.*
odorata 1252
Pyrethrum 1251
repanda 1252
repens *ib.*
tinctoria *ib.*
tomentosa 1251
trinervia 1252
valentina *ib.*
Anthericum 525, 554-556
Adenanthera 554
alooides *ib.*
annuum 555
aphyllum 556

Anthericum
asphodeloides 554
caliculatum ib.
Cauda felis ib.
ciliatum ib.
cirratum 555
contortum 554
falcatum ib.
filiforme ib.
flexifolium 555
floribundum ib.
frutescens 554
graecum 555
hirpidum ib.
japonicum 554
latifolium ib.
Liliago 555
Liliastrum ib.
muricatum ib.
ossifragum 554
planifolium 555
ramosum ib.
revolutum ib.
scabrum ib.
serotinum ib.
spirale 556
squameum 555
subtrigonum 554
triquetrum 555
ANTHISTIRIA 88, 194
ciliata 194
imberbis ib.
Anthoceros 1285, 1355
crispus 1355
laevis ib.
multifidus ib.
punctatus ib.
Antholyza 82, 112, 113
aethiopica 113
Cunonia 112
Lucidor 113
Meriana ib.
Merianella ib.
plicata 112
ringens ib.
Anthospermum 219, 285
aethiopicum 285
ciliare ib.
herbaceum ib.
Anthoxanthum 22, 75, 76
aculeatum 75
avenaceum 76
crinitum ib.
indicum ib.
odoratum 75
paniculatum 76
Anthyllis 1076, 1099, 1100
Barba jovis 1099
cornicina ib.
cytisoides 1100
Erinacea ib.
Gerardi 1099
Hermanniae 1100
involucrata 1099
linifolia 1100
lotoides 1099
montana ib.
quinqueflora ib.
tetraphylla ib.
visciflora ib.
Vulneraria ib.
Antichorus 599, 609
depressus 609
Antidesma 304, 432
alexiterium 432
Antirhea 212, 244
borbonica 244
Antirrhinum 889, 930-934
aegyptiacum 931
aerugineum 933
alpinum ib.
aphyllum ib.
arvense 932
Asarina 934
bellidifolium 933
bicorne 932
bipunctatum ib.
canadense 933
chalepense 931
cirrhosum ib.
Cymbalaria 933
dalmaticum ib.
Elatine 931
flavum 933
genistifolium 931
glaucum 933
Haelava 932
hexandrum ib.
hirtum 931
junceum ib.
lagopodioides 933
Linaria 931
linifolium ib.
macrocarpon 932
majus 934
minus 931
molle 934
monospessulanum 933
multicaule ib.
origanifolium 932
Orontium 934
papilionaceum ib.
pedunculatum 931
pelisserianum ib.
pilosum 930
pinifolium 933
pinnatum 932
purpu-

Antirrhinum
purpureum 933
reflexum ib.
repens ib.
saxatile 932
spurium 933
supinum ib.
triornithophorum ib.
triphyllum 932
triste ib.
unilabiatum 934
versicolor 932
villosum 933
virgatum ib.
viscidum 932
viscosum ib.
Antura 295, 405
hadiensis 405
APACTIS 740, 747
japonica 747
Apama 1149, 1153
dubia 1153
Aphanes 3, 15
arvensis 15
Swartsii ib.
Aphyllanthes 524, 540
monspelliensis 540
APHYTEJA 995, 1005
Hydnora 1005
Apium 316, 493
bipinnatum 493
graveolens ib.
Petroselinum ib.
Apluda 85, 148
aristata 148
digitata ib.
mutica ib.
scirpoides ib.
Zeagites ib.
Apocynum 306, 442, 443
Acuti 443
androsaemifolium 442
cannabinum 443
filiforme ib.
frutescens ib.
lineare ib.
minutum ib.
reticulatum ib.
sibiricum 442
triflorum 443
umbellatum ib.
venetum ib.
APONOGETON 594, 597
angustifolium 597
distachyon ib.
monostachyon ib.
Aquartia 211, 247
aculeata 247
Aquilaria 660, 685
ovata 685
Aquilegia 779, 850, 851
alpina 851
canadensis ib.
viridiflora ib.
viscosa 850
vulgaris ib.
AQUILICIA 301, 421
iambucina 421
Arabis 968, 987
alpina 987
bellidifolia ib.
caerulea ib.
canadensis ib.
grandiflora ib.
Halleri ib.
hispida ib.
lucida ib.
lyrata ib.
ovirensis 987
pendula ib.
thaliana ib.
turrita ib.
Arachis 1075, 1076, 1100
aprica 1100
hypogaea ib.
Aralia 312, 509, 510
arborea 509
capitata ib.
cordata 510
japonica ib.
nudicaulis ib.
pentaphylla 509
racemosa 510
Sciodaphyllum 509
sinensis 510
spinosa 509
Arbutus 659, 697
acadiensis 697
alpina ib.
Andrachne ib.
ferruginea ib.
lauriifolia ib.
mucronata ib.
pumila ib.
Unedo ib.
Uva ursi ib.
Arctium 1162, 1184
Carduelis 1184
Lappa ib.
Personata ib.
Arctopus 308, 465
echinatus 465
Arctotis 1166, 1273 *sq.*
acaulis 1274
angustifolia 1273
anthemoides 1274
argentea 1273

aspe-

Arctotis
aspera 1273
calendulacea ib.
carotiniana 1274
dentata ib.
grandiflora 1273
microphylla ib.
palcacea 1274
paradoxa ib.
plantaginea 1273
scariosa 1274
serrata 1273
tenuifolia ib.
Ardisia 295, 394, 395
coriacea 395
excelsa ib.
lateriflora ib.
parasitica ib.
serrulata ib.
tinifolia 394
ARDUINA 295, 403
bispinosa 403
Areca 647, 649
Catechu 649
oleracea ib.
Arenaria 661, 719-721
austriaca 721
balearica 719
bavarica 721
biflora 719
calicina 720
capillacea 721
caroliniana ib.
cerastioides 719
ciliata ib.
cucubaloides 720
dianthoides ib.
dichotoma 719
fasciculata 721
filifolia ib.
geniculata 720
Arenaria
grandiflora 721
gypsophiloides 720
Halleri 719
hispida 721
juniperina ib.
lanceolata 719
lavicifolia 721
lateriflora 719
liniflora 721
marina 720
media ib.
montana ib.
multicaulis 719
norwegica ib.
obtusa 720
peploides 719
polygonoides 720
recurva 721
rubra 721
saxatilis 720
serpyllifolia 719
striata 720
tenuifolia 721
tetraquetra 719
triflora 720
trinervia 719
verna 720
Arethusa 21, 61
biplumata 61
bulbosa ib.
capensis ib.
ciliaris ib.
divaricata ib.
foliosa ib.
ophioglossoides ib.
racemosa ib.
spicata ib.
villosa ib.
Aretia 292, 325
alpina 325
Aretia
helvetica 325
Vitaliana ib.
Argemone 776, 810
armeniaca 810
mexicana ib.
pyrenaica ib.
Argolasia 524, 560
capensis 560
ARGOPHYLLUM 303, 418
nitidum 418
Argythamnia 219, 286
candicans 286
Aristea 119
cyanea 119
Aristida 86, 195, 196
adscensionis 195
americana ib.
arundinacea ib.
depressa 196
geniculata 195
gigantea ib.
Hystrix ib.
lanata 196
paniculata ib.
plumosa 195
setacea ib.
Aristolochia 528, 590, 591
anguicida 590
arborescens ib.
baetica ib.
barbata 591
bilabiata 590
bilobata ib.
bracteata 591
caudata 590
Clematitis 591
erecta 590

Aristolochia
grandiflora 591
hirsuta *ib.*
indica *ib.*
longa *ib.*
maurorum 590
maxima *ib.*
obtusata 591
odoratissima *ib.*
peltata 590
pentandra *ib.*
Pistolochia 591
rotunda *ib.*
sempervirens 590
serpentaria *ib.*
Sipho 591
trilobata 590
Aristotela 741, 751
Macqui 751
Arnebia 292, 320
tinctoria 320
Arnica 1164, 1242 *sq.*
ciliata 1242
coronopifolia 1243
crocea 1242
Doronicum *ib.*
Gerbera 1243
glacialis 1242
hirsuta *ib.*
japonica *ib.*
maritima 1242
montana *ib.*
oporina *ib.*
palmata 1243
piloselloides 1242
scorpioides *ib.*
Artedia 308, 473
squamata 473
Artemisia 1163, 1209-1212
Abrotanum 1209
Absinthium 1211
Artemisia
aethiopica 1210
anethifolia *ib.*
annua 1212
arborescens 1209
argentea 1210
austriaca 1211
borealis 1212
caerulescens *ib.*
campestris 1210
capillaris 1209
Contra 1210
crithmifolia *ib.*
Dracunculus 1212
filaginoides 1211
glacialis *ib.*
Gmelini 1209
hispanica 1210
humilis *ib.*
Jacquini 1212
japonica *ib.*
inodora 1211
integrifolia 1212
italica 1210
judaica *ib.*
laricifolia 1209
Lerchii *ib.*
littoralis 1212
maderaspatana *ib.*
maritima 1211
Messerschmidii 1210
minima 1212
nitrosa 1209
palustris 1211
pauciflora 1210
pectinata 1212
pontica 1211
rupestris *ib.*
Samtonica *ib.*
Semsek *ib.*
sericea *ib.*
sinensis 1212
spicata 1211
Artemisia
tanacetifolia 1212
tatarica 1210
tenella 1211
vermiculata 1209
vulgaris 1211
Artocarpus 2, 14
incisa 14
integrifolia *ib.*
Aruba 311, 504
gujanensis 504
Arum 781, 864-866
arborescens 865
Arisenum *ib.*
atro-rubens 864
auritum 866
bicolor 864
cannaefolium 865
Colocasia 864
divaricatum 865
Dracontium 864
Dracunculus *ib.*
esculentum *ib.*
flavum *ib.*
hederaceum 865
helleborifolium 864
lingulatum 866
macrorhizon 864
maculatum 865
muscivorum *ib.*
ovatum *ib.*
pentaphyllum 864
peregrinum 865
pictum *ib.*
proboscideum *ib.*
sagittaefolium *ib.*
seguinum *ib.*
spirale *ib.*
tenuifolium *ib.*
ternatum 864
trilobatum 865
triphyllum 864

Arum
venosum 864
virginicum 865
Aruna 21, 50
gujanensis 50
Arundo 88, 194, 195
bifaria 195
Donax 194
gigantea ib.
mauritanica 195
phragmites ib.
Quila ib.
Rugi ib.
recta ib.
Valdivia ib.
Asarum 740, 745
canadense 745
carolinianum ib.
europaeum ib.
virginicum ib.
Ascarina 2, 12
polystachya 12
Ascium 775, 817
gujanense 817
Asclepias 306, 444-447
acanthocarpos 446
alexicaca 445
amoena ib.
aphylla 447
arborescens 445
asthmatica 444
carnosa 446
cinerea ib.
citrifolia 445
cordata 444
crispa 445
curassavica 444
Daemia ib.
decumbens ib.
filiformis 446
fruticosa 445
Asclepias
gigantea 445
glabra 444
gonocarpos 446
grandiflora ib.
humistrata ib.
incarnata 444
lactifera 445
lanceolata 446
laniflora 445
nigra 444
nivalis ib.
nivea ib.
parviflora ib.
pedicellata 447
perennis 446
polystachyos ib.
pubescens 445
purpurascens ib.
radians ib.
repanda ib.
rubra 446
setosa ib.
sibirica ib.
spiralis 445
stipitacea 447
syriaca 445
tuberosa 446
undulata 445
variegata 444
verticillata 446
viminalis 444
Vincetoxicum 445
viridis 447
volubilis 444
Ascobolus 1461
pezizoides ib.
Ascophora 1287, 1484
articulata 1484
cylindrica ib.
disciflora ib.
fragilis ib.
Ascophora
limbiflora 1484
Mucedo ib.
ovalis ib.
Stilbum ib.
Ascyrum 1150, 1160
Crux Andreae 1160
Hypericoides ib.
villosum ib.
Aspalathus 1076, 1091-1093
albens 1092
anthylloides 1093
araneosa 1092
argentea 1093
asparagoides ib.
astroites 1092
callosa 1093
candicans ib.
canescens 1092
capitata 1091
carnosa 1092
chenopoda ib.
ciliaris ib.
cretica 1093
ericifolia 1091
galioides ib.
genistoides 1092
glomerata 1091
heterophylla 1092
Hystrix ib.
indica 1093
laxata ib.
mucronata ib.
nigra 1091
orientalis 1093
pedunculata 1092
pilosa 1093
pinnata 1092
quinquefolia ib.
retroflexa ib.
sericea ib.
spinosa

Aſpalathus
ſpinoſa 1091
thymifolia 1092
tridentata 1093
uniflora 1091
verrucoſa 1092

Aſparagus 525, 557
acutifolius 557
aethiopicus ib.
albus ib.
aphyllus ib.
aſiaticus ib.
capenſis ib.
declinatus ib.
falcatus ib.
horridus ib.
officinalis ib.
retrofractus ib.
ſarmentoſus ib.
ſtipularis ib.
verticillaris ib.

Aſperugo 292, 321
aegyptiaca 321
procumbens ib.

Aſperula 214, 235
ariſtata 235
arvenſis ib.
calabrica ib.
cynanchica ib.
hexaphylla ib.
laevigata ib.
odorata ib.
pyrenaica ib.
taurina ib.
tinctoria ib.

Aſphodelus 525, 553
altaicus 553
fiſtuloſus ib.
liburnicus ib.
luteus ib.
ramoſus ib.

Aſplenium 1283, 1301 - 1304
Adiantum nigrum 1304
alternifolium 1302
anguſtifolium 1301
anthriſcifolium 1303
bifolium 1302
bulbiferum 1304
caudatum 1303
Ceterach 1301
cicutarium 1304
cultrifolium 1302
dentatum ib.
dimidiatum 1303
diſſectum 1302
ebeneum ib.
eroſum ib.
flaccidum 1303
fragrans 1304
germanicum ib.
grandifolium 1302
Hemionitis 1301
japonicum 1303
canceolatum ib.
lanceum 1301
leptophyllum 1304
lucidum 1303
marginatum 1302
marinum 1303
monanthemum 1302
Nidus 1301
nodoſum 1302
obliquum 1303
obtuſatum ib.
obtuſifolium 1302
plantagineum 1301
polyodon 1302
praemorſum 1302
proliferum 1301
pumilum 1302
pygmaeum 1303
rhizophorum ib.
rhizophyllum 1301
Ruta muraria 1304
ſalicifolium 1302
Scolopendrium 1301
ſerratum ib.
ſorbifolium 1303
ſquamoſum ib.
ſtriatum ib.
tenerum ib.
Trichomanes ramoſum 1304
trichomanoides 1303
viride 1302

Aſſa 778, 839
exotica 839

Aſſonia 999, 1036
populnea 1036

After 1164, 1230-1234
acris 1231
aeſtivus 1232
alpinus ib.
Amellus 1232
annuus 1233
carolinianus 1230
ciliatus 1231
concolor 1232
cordifolius 1233
cortaceus 1232
corymboſus 1233
crinitus 1230
criſpus 1234
Cymbalariae 1230
diffuſus 1234
divaricatus 1233
divergens 1234
dumoſus 1231
ericaefolius 1234
ericoides 1231
folioloſus ib.

Aſter
fruticuloſus 1230
grandiflorus 1232
hiſpidus 1234
holoſericeus 1234
hyſſopifolius 1231
indicus 1233
junceus *ib.*
laevis *ib.*
linariifolius 1231
linifolius *ib.*
macrophyllus 1234
miler 1233
multiflorus 1231
mutabilis 1234
nemoralis 1231
novae Angliae *ib.*
novi Belgii 1233
paludoſus 1232
paniculatus 1233
patens *ib.*
pendulus 1234
puniceus 1233
Radula 1234
reflexus 1230
rigidus 1231
ſalicifolius *ib.*
ſalicinus 1234
ſcaber 1233
ſibiricus 1232
ſinenſis 1234
ſpectabilis *ib.*
ſquarroſus 1232
tardiflorus 1234
tataricus *ib.*
taxifolius 1230
tenellus 1232
tenuifolius 1231
Tradeſcanti 1233
Tripolium 1232
umbellatus 1231
undulatus 1232
vernus *ib.*

Aſtragalus 1075, 1077, 1132-1137
alopecuroides 1132
alpinus 1134
alyſſoides 1136
Ammodytes 1135
ampullatus 1136
annularis 1133
arenarius *ib.*
aſper 1132
auſtriacus 1135
baeticus 1134
barbatus *ib.*
bicolor 1136
bohemicus 1132
campeſtris 1137
canadenſis 1133
capitatus *ib.*
caprinus 1136
carolinianus 1132
chriſtianus 1133
Cicer 1134
compactus 1135
contortuplicatus 1134
cornutus 1135
danicus 1134
daſyanthus 1137
deflexus 1133
denſifolius 1136
depreſſus 1137
Epiglottis 1134
emarginatus 1135
exſcapus 1136
falcatus 1133
galegiformis *ib.*
Glaux 1134
globoſus 1136
glycyphyllos 1135
hamoſus 1134
hians 1133
hirſutus 1136
hiſpidus 1134
Hypoglottis *ib.*

Aſtragalus
incanus 1137
lagopodioides 1135
laguroides 1137
lanatus *ib.*
larifolius *ib.*
Laxmanni 1134
leontinus 1135
leptophyllos 1137
lineatus 1135
lupulinus 1137
melilotoides 1132
microphyllus 1133
monſpeſſulanus 1137
montanus 1136
numularius *ib.*
Onobrychis 1133
pentaglottis 1134
peregrinus 1133
phyſodes 1137
piloſus 1132
Poterium 1135
pſoraloides 1136
Rauwolfii 1135
ſeſameus 1134
ſinenſis 1133
ſinicus 1135
ſpicatus 1137
Stella 1134
ſulcatus 1133
ſyriacus 1134
Tragacantha 1135
tragacanthoides *ib.*
trimeſtris *ib.*
uliginoſus 1133
uncatus 1136
uralenſis *ib.*
verticillaris *ib.*
veſicarius *ib.*
vireſcens 1132

Aſtrantia 308, 469
carniolica 469

Aſtrantia
Epipactis 469
major *ib.*
minor *ib.*
Aſtronium 311, 499
graveolens 499
Athamanta 309, 476, 477
annua 477
Cervaria 476
condenſata *ib.*
cretenſis 477
daucoides *ib.*
Libanotis 476
Matthioli 477
Oreoſelinum 476
ſibirica *ib.*
ſicula *ib.*
ſinenſis 477
Athanaſia 1163, 1206 *ſqq.*
annua 1206
capitata *ib.*
cinerea 1207
crenata 1206
crithmifolia *ib.*
decuſſata 1208
dentata 1207
filiformis *ib.*
geniſtifolia *ib.*
graminifolia 1206
haſtata *ib.*
laxa 1207
linifolia *ib.*
maritima 1206
microphylla 1207
obovata 1206
paniculata *ib.*
parviflora 1207
paſſerinoides *ib.*
pectinata 1207
pinnata *ib.*
Athanaſia
pubeſcens 1206
pumila 1207
pungens 1208
ſantolinoides *ib.*
ſerrata 1207
ſeſſiliflora *ib.*
ſquarroſa 1207
trifurcata 1206
trinervia *ib.*
uniflora 1208
virgata *ib.*
viſcoſa 1207
Athenaea 601, 629
gujanenſis 629
Atractobolus 1285, 1461
annularis 1461
Atractylis 1162, 1191, 1192
cancellata 1192
gummifera *ib.*
humilis *ib.*
Lancea *ib.*
mexicana *ib.*
oppoſitifolia *ib.*
ovata 1191
purpurea 1192
Atragene 782, 872
alpina 872
capenſis *ib.*
japonica *ib.*
polygama *ib.*
tenuifolia *ib.*
zeylanica *ib.*
Atraphaxis 526, 580
ſpinoſa 580
undulata *ib.*
Atriplex 306, 450, 451
alba 451
albicans 450
coriacea *ib.*
glauca *ib.*
Halimus *ib.*
haſtata *ib.*
hortenſis 451
laciniata 450
littoralis 451
patula *ib.*
pedunculata *ib.*
portulacoides 450
roſea *ib.*
ſalicina 451
ſibirica 450
tatarica *ib.*
virgata 451
Atropa 296, 380, 381
arboreſcens 381
Belladonna *ib.*
fruteſcens *ib.*
Mandragora 380
phyſaloides 381
ſolanacea *ib.*
Aubletia 776, 812
aſpera 812
laevis *ib.*
Paturno *ib.*
Tiburua *ib.*
Aucuba 216, 276
japonica 276
Avena 88, 192-194
aurata 193
brevis 192
bromoides 194
calicina 193
capenſis *ib.*
caroliniana 194
diſtichophylla 193
dubia 192
fatua 193
flaveſcens *ib.*
fragilis *ib.*

hiſpi-

Avena
hiſpida 193
Loeflingiana 192
lupulina 193
lutea 192
montana *ib.*
nuda 193
penſilvanica 192
pratenſis 193
pubeſcens 192
purpurea *ib.*
rupeſtris 194
ſativa 192
Scheuchzeri 193
ſempervirens *ib.*
ſesquitertia 192
ſetacea 193
ſibirica 192
ſpicata 194
ſterilis 193
ſtipiformis 192
ſtrigoſa *ib.*
verſicolor 194

Averrhoa 663, 729
Bilimbi 729
Carambola *ib.*

Avicennia 888, 963
nitida 963
reſinifera *ib.*
tomentoſa *ib.*

Axyris 86, 151
amarantoides 151
ceratoides *ib.*
hybrida *ib.*
proſtrata *ib.*

Ayenia 416
laevigata *ib.*
magna *ib.*
puſilla *ib.*
tomentoſa *ib.*

Azalea 294, 336
indica 336
lapponica 336
nudiflora *ib.*
pontica *ib.*
procumbens *ib.*
roſmarinifolia *ib.*
viſcoſa *ib.*

Azima 215, 262
novae 262

Baccharis 1163, 1219 *ſq.*
arborea 1220
braſiliana *ib.*
Dioſcoridis *ib.*
foetida 1219
halimifolia 1220
indica *ib.*
ivaefolia 1219
neriifolia 1220
viſcoſa *ib.*

Bacopa 293, 329
aquatica 329

Baea 38
indica 38

Baeckea 598, 635
frutescens 635

Baeobotrys 298, 370
nemoralis 370

Baillieria 1166, 1271
aſpera 1271

Balanophora 2, 13
fungoſa 13

Ballota 885, 908
alba 908
diſticha *ib.*
lanata *ib.*
nigra *ib.*
ſuaveolens *ib.*

Baltimora 1166, 1269
recta 1269

Bambus 526, 579
Arundo 579

Banara 741, 747
gujanenſis 747

Baniſteria 662, 724, 725
angulata 724
benghalenſis *ib.*
brachiata *ib.*
dichotoma *ib.*
fulgens *ib.*
laurifolia *ib.*
longifolia 725
purpurea 724
Quapara *ib.*
ſinimarienſis *ib.*

Banksia 215, 262
dactyloides 262
dentata *ib.*
ericaefolia *ib.*
integrifolia *ib.*
muſculiformis *ib.*
pyriformis *ib.*
ſerrata *ib.*

Barbylus 600, 610
Brownii 610

Barnadeſia 1162, 1192
ſpinoſa 1192

Barreliera 959, 960
acanthoides 959
biſpinoſa 960
buxifolia 959
coccinea 960
criſtata *ib.*
hirſuta *ib.*
Hyſtrix 959
longiflora 960

Barreliera
longifolia 959
nitida 960
noctiflora 960
Prionitis 959
pungens 960
solanifolia 959
trispinosa 960
Barringtonia 1000, 1039
speciosa 1039
Bartsia 887, 922
alpina 922
coccinea *ib.*
Gymnandra *ib.*
pallida *ib.*
viscosa *ib.*
Basella 311, 507
alba 507
japonica *ib.*
lucida *ib.*
rubra *ib.*
Bassia 740, 746
longifolia 746
obovata *ib.*
Bassovia 296, 390
silvatica 390
Bastera 1165, 1271
Houttuyni 1271
Batis 217, 272
maritima 272
Batschia 292, 315
carolinienſis 315
Bauhinia 655, 666, 667
aculeata 666
acuminata *ib.*
candida *ib.*
divaricata *ib.*
glabra *ib.*
inermis 667
porrecta 666
purpurea *ib.*
scandens *ib.*
tomentosa *ib.*
ungulata *ib.*
variegata *ib.*
Befaria 743, 748
aestuans 748
resinosa *ib.*
Begonia 778, 835, 836
acutifolia 835
capensis 836
dichotoma 835
Erminea 836
ferruginea 835
glabra *ib.*
grandifolia *ib.*
hirsuta 836
humilis 835
malabarica *ib.*
minor *ib.*
nana 836
obliqua 835
octopetala 836
urticae 835
Bellis 1164, 1245
annua 1245
arabica *ib.*
perennis *ib.*
Bellium 1164, 1245
bellidioides 1245
minutum *ib.*
Bellonia 297, 360
aspera 360
spinosa *ib.*
Berberis 523, 575
cretica 575
ilicifolia *ib.*
sibirica 575
vulgaris *ib.*
Bergia 662, 733
capensis 733
glomerata *ib.*
Bertiera 298, 362
gujanensis 362
Besleria 890, 935, 936
bivalvis 935
coccinea 936
crista 935
incarnata 936
lutea 935
melittifolia *ib.*
violacea *ib.*
Beta 306, 451, 452
Cicla 452
maritima *ib.*
patula 451
vulgaris *ib.*
Betonica 885, 906
alopecuros 906
heraclea *ib.*
hirsuta *ib.*
incana *ib.*
officinalis *ib.*
orientalis *ib.*
stricta *ib.*
Betula 218, 282, 283
alba 282
Alnus *ib.*
crispa *ib.*
dauurica 283
excelsa *ib.*
fruticosa *ib.*
incana 282
lenta 283
nana *ib.*
nigra *ib.*
oblongata 282

papy-

Betula
papyracea 283
pendula 282
populifolia *ib.*
pumila *ib.*
ſerrulata *ib.*
Bidens 1163, 1194, 1195
bipinnata 1195
bulbata 1194
cernua *ib.*
frondoſa *ib.*
hirſuta *ib.*
minima *ib.*
nivea *ib.*
nodiflora *ib.*
piloſa *ib.*
ſcandens *ib.*
tenella *ib.*
tripartita *ib.*
verticillata *ib.*
Bignonia 889, 940-942
aequinoctialis 941
alba *ib.*
alliacea *ib.*
caerulea 942
capreolata 941
Catalpa 940
chelonoides 942
citrifolia 940
Copaja 942
crucigera 941
dichotoma *ib.*
echinata *ib.*
fluviatilis *ib.*
grandiflora 942
incarnata 941
indica 942
Keſera 941
Leucoxylon 942
longiſſima 941
paniculata *ib.*
pentaphylla 942
peruviana *ib.*
pubeſcens 941
radiata 942
radicans *ib.*
ſempervirens 940
ſpathacea 942
ſtans *ib.*
tomentoſa 940
triphylla 941
Unguis *ib.*
Bineclaria 599, 615
peregrina 615
Biſcutella 967, 978
apetala 978
apula *ib.*
auriculata *ib.*
coronopifolia *ib.*
laevigata *ib.*
lyrata *ib.*
ſempervirens *ib.*
Biſerrula 1075, 1077, 1137
Pelecinus 1137
Bixa 774, 812
Orellana 812
Blackburnia 215, 258
pinnata 258
Blackea 741, 748
trinervia 748
triplinervia *ib.*
Blackwellia 743, 768
Juſſieui 768
BLADHIA 295, 404
criſpa 404
japonica *ib.*
villoſa *ib.*
Blaeria 212, 249, 250
articulata 249
ciliaris 249
ericoides *ib.*
muſcoſa 250
purpurea 249
puſilla *ib.*
Blaſia 1285, 1354
puſilla 1354
Blechnum 1283, 1300
auſtrale 1300
japonicum *ib.*
occidentale *ib.*
orientale *ib.*
radicans *ib.*
virginicum *ib.*
Blitum 3, 17
capitatum 17
chenopodioides *ib.*
virgatum *ib.*
Bobartia 86, 151
indica 151
Bocconia 740, 745
fruteſcens 745
Boehmeria 217, 267
caudata 267
cylindrica *ib.*
hirta *ib.*
littoralis *ib.*
ramiflora *ib.*
Boerhaavia 2, 14, 15
anguſtifolia 15
diffuſa *ib.*
erecta 14
hirſuta 15
repens *ib.*
ſcandens *ib.*
tetrandra *ib.*
Boletus 1285, 1432-1438
abietinus 1437

Boletus
adustus 1437
agaricoides 1435
aurantiacus 1433
Batschii 1435
betulinus 1436
biennis 1433
bovinus 1432
Bulliardi 1434
Calceolus 1436
carolinianus 1434
cereus 1433
cinnabarinus 1436
cinnamomeus 1433
citrinus 1435
cornutus 1437
cristatus 1435
decipiens 1437
dimidiatus 1432
elegans 1435
exasperatus 1433
fagineus 1435
fasciatus *ib.*
fasciculatus 1433
Favus 1436
ferruginatus 1432
ferruginosus 1437
fomentarius 1436
fragilis 1434
fraxineus 1436
frondosus 1433
fulvus 1437
fuscidulus 1433
fuscus 1437
globatus *ib.*
granulatus 1432
hepaticus 1438
hirsutulus 1437
hirsutus 1434
hispidus 1437
hydnoides 1435
hypocrateriformis 1434
igniarius 1436
imbricatus 1437
infundibuliformis 1434
lacrymans 1435
lacteus 1433
lapidum 1434
leptocephalus 1432
lipsiensis 1436
lobatus 1435
lucidus 1434
luteus 1432
Medulla panis 1438
membranaceus 1436
microporus 1435
mutabilis 1432
nigrescens 1434
nitens 1436
nummularius 1432
obliquatus 1435
obliquus 1438
odoratus 1437
pallescens 1433
papyraceus 1438
perennis 1432
procerus 1434
purgans 1436
pusillus 1433
ramosissimus *ib.*
ramosus 1436
ramulorum 1435
resupinatus 1437
rufus 1435
salicinus 1437
saligneus 1436
sanguineus *ib.*
scaber 1435
scalaris 1437
sebaceus 1438
squamosus 1434
strobiliformis 1433
suaveolens 1437
suberosus 1436
subtomentosus 1434
subvescus *ib.*
sulphureus 1436
supinus 1433
tuberculosus 1435
tuberosus 1433
umbilicatus 1434
versicolor 1437
villosus 1436
viscidus 1432

Boltonia 1164, 1244
asteroides 1244
glastifolia *ib.*

Bombax 1000, 1039, 1040
Ceiba 1040
Erianthos 1039
globiferum 1040
globosum *ib.*
Gossypium *ib.*
grandiflorum *ib.*
heptaphyllum *ib.*
pentandrum 1039
pyramidale 1040

Bonnetia 775, 814
palustris 814

Bontia 890, 963
daphnoides 963

Borago 291, 321
africana 321
indica *ib.*
longifolia *ib.*
officinalis *ib.*
orientalis *ib.*
verrucosa *ib.*
zeylanica *ib.*

Borassus 527, 583
flabelliformis 583

Bor-

Borbonia 1076, 1088
cordata 1088
crenata ib.
ericifolia ib.
laevigata ib.
lanceolata ib.
trinervia ib.
Bofea 305, 455
Yervemora 455
Brabejum 212, 248
stellulifolium 248
Brasenia 780, 853
Schreberi 853
Brasilium 301, 417
glabrum 417
hirsutum ib.
Brassica 968, 988, 989
alpina 988
arvensis ib.
austriaca ib.
campestris ib.
crassifolia ib.
Eruca 989
Erucastrum ib.
muralis 988
Napus ib.
oleracea ib.
orientalis ib.
polymorpha ib.
Rapa ib.
sinensis ib.
vesicaria 989
violacea 988
BRATHYS 780, 852
juniperina 852
Breynia 304, 430
disticha 430
Briza 88, 183
caroliniana 183
cynosuroides ib.
Eragrostis ib.
maxima 183
media ib.
minor ib.
virens ib.
Bromelia 522, 529
Acanga 529
Ananas ib.
bracteolata ib.
humilis ib.
Karates ib.
lingulata ib.
nudicaulis ib.
paniculata ib.
Pinguin ib.
Bromus 88, 188-191
alopecuros 189
ambiguus ib.
anguſtifolius ib.
aquaticus ib.
arvensis ib.
asper ib.
bifidus 188
ciliatus 189
cristatus 191
dilatatus 189
distachyos 191
erectus 189
geniculatus ib.
giganteus 190
gracilis ib.
grandiflorus 189
hirsutus 190
japonicus 188
incrassatus 189
jubatus 190
madritensis 188
massiliensis 191
mollis 189
montanus 190
multiflorus 188
pauper 191
phleoides 190
Bromus
Phoenix 190
pinnatus ib.
Plackenetii 191
poiformis 190
polystachyos 188
purgans 189
racemosus 190
ramosus ib.
rigens ib.
rubens ib.
scoparius ib.
secalinus 188
silvaticus 190
squarrosus 189
sterilis 188
stipoides 189
strictus 188
tectorum 190
triflorus 188
triticeus 191
villosus 190
Brosimum 2, 12
Alicastrum 12
spurium ib.
Brossaea 294, 377
coccinea 377
Browallia 888, 952
alienata 952
demissa ib.
elata ib.
humifusa ib.
Brownea 998, 1028
coccinea 1028
grandiceps ib.
Brucea 220, 286
antidysenterica 286
Brümmichia 661, 722
cirrhosa 722
Brunia 302, 410
abrotanoides 410
ciliata ib.

Brunnia
glutinosa 410
lanuginosa ib.
nodiflora ib.
paleacea ib.
radiata ib.
verticillata ib.
Brunsfelsia 887, 929
americana 929
undulata ib.
Bryonia 81, 103, 104
africana 104
alba ib.
cordifolia ib.
cretica ib.
dioica ib.
grandis ib.
japonica ib.
laciniosa ib.
lutebrosa ib.
palmata ib.
racemosa ib.
scabra ib.
scabrella ib.
verrucosa ib.
Bryum 1284, 1330-1338
acuminatum 1333
aestivum 1336
affine 1335
agrarium 1333
albidum 1336
alpinum 1337
androgynum 1336
angultatum 1332
apocarpum 1334
aquaticum 1331
argenteum 1337
barbatum 1336
Bartramia 1335
bassiforum 1332
bipartitum 1337
brevifolium 1338
Bryum
calcarium 1337
calicinum 1336
capillaceum 1331
carneum 1337
Celsii ib.
ciliare 1332
ciliatum 1331
cirrhatum ib.
convolutum 1336
ericetorum 1338
crispum 1335
cubitale 1338
curviroſtrum 1334
cuspidatum 1332
dealbatum 1338
dendroides 1337
diaphanum 1335
Dicksoni 1334
Didymodon 1333
elongatum 1335
ericoides 1332
extinctorium ib.
falciculare ib.
flavescens 1338
flexuosum 1336
fontinalioides 1333
Heimii ib.
hercynicum 1336
hypnoides 1332
imberbe 1336
inclinatum 1331
indicum 1332
lanceolatum ib.
lycopodioides 1336
marginatum 1338
microcarpon 1332
minutum 1335
mnioides 1330
murale 1333
nutans 1331
obtusum 1334
Octoblepharis 1331
Bryum
ovatum 1334
pallidum 1332
paludosum 1337
parasiticum 1336
patens 1338
pennatum 1334
pilosum 1336
pomiforme 1330
pulvinatum 1331
pusillum 1333
pyriforme ib.
recurviroſtrum 1334
repens 1333
reticulatum 1337
rigidum 1336
rubrum 1331
rurale 1335
secundum 1333
sessile 1334
setaceum ib.
silvaticum ib.
splachnoides 1337
squarrosum ib.
stelligerum 1334
striatum 1335
subulatum 1333
tectorum 1335
tetragonum 1338
tortum 1332
tortuosum 1333
trifarium 1331
truncatulum 1334
unguiculatum 1336
unilaterale 1335
ventricosum 1337
verticillarum ib.
viridulum 1334
Zierii 1337
Bubon 309, 484
Galbanum 484
gummiferum ib.

Bubon
laevigatum 484
macedonicum *ib.*
rigidius *ib.*
Buchnera 889, 951
952
aethiopica 952
americana 951
asiatica 952
capensis *ib.*
cernua 951
coccinea 952
cordifolia *ib.*
cuneifolia 951
elongata 952
grandiflora *ib.*
pinnatifida *ib.*
BUCIDA 660, 702
Buceras 702
Buddleja 212, 250
americana 250
capitata *ib.*
globosa *ib.*
incompta *ib.*
occidentalis *ib.*
virgata *ib.*
Buffonia 218, 281
tenuifolia 281
Buginvillea 602, 632
brasiliensis 632
Büttneria 301, 404
carthagenensis 404
cordata *ib.*
microphylla *ib.*
ovata *ib.*
scabra *ib.*
Bulbocodium 524
vernum *ib.*
BUMALDA 306, 463
trifolia 463
Bumelia 295, 397, 398
montana 397
nigra *ib.*
pallida *ib.*
pentagona 398
retusa 397
rotundifolia 398
salicifolia *ib.*
Bunara
gujanensis
Bunias 968, 991
aegyptiaca 991
aspera *ib.*
balearica *ib.*
Cakile *ib.*
cochlearioides *ib.*
cornuta *ib.*
Erucago *ib.*
myagroides *ib.*
orientalis *ib.*
spinosa *ib.*
Bunium 309, 475
aromaticum 475
Bulbocastanum *ib.*
Buphthalmum 1165, 1257 *sq.*
aquaticum 1257
arborescens *ib.*
durum *ib.*
frutescens *ib.*
grandiflorum 1258
graveolens 1257
helianthoides 1258
maritimum 1257
melitense *ib.*
pratense *ib.*
ramosum *ib.*
salicifolium 1258
sericeum 1257
speciosissimum 1258
spinosum 1257
Bupleurum 309, 469-471
angulosum 469
arborescens 471
baldense 470
difforme 471
falcatum 470
flavum *ib.*
frutiocescens *ib.*
fruticosum *ib.*
Gerardi *ib.*
junceum *ib.*
longifolium *ib.*
nudum *ib.*
odontites 469
petraeum 470
pyrenaeum *ib.*
ranunculoides 469
rigidum 470
rotundifolium 469
semicompositum 470
spinosum *ib.*
stellatum 469
tenuissimum 470
Burcarda 313, 514
villosa 514
Burmannia 522, 531
biflora 531
distycha *ib.*
Bursera 522, 575
gummifera 575
Butomus 645, 654
umbellatus 654
Buxbaumia 1284, 1325
aphylla 1325
foliosa *ib.*
Buxus 219, 286
dioica 286
sempervirens *ib.*

Byssus

Byssus 1285, 1395-1397
alutosa 1396
aquatica *ib.*
atra *ib.*
aurea *ib.*
barbata *ib.*
bombycina *ib.*
cancellata *ib.*
candida *ib.*
conoidea *ib.*
coriacea *ib.*
cryptarum *ib.*
Flos aquae *ib.*
Flos cobalti 1397
fulva 1396
globosa *ib.*
nigra *ib.*
petraea *ib.*
phosphorea *ib.*
rudiciformis *ib.*
sanguinea *ib.*
septica 1395
tremelloides 1397
velutina 1396

Cacalia 1162, 1195-1197
acaulis 1197
albifrons *ib.*
alpina *ib.*
Anteuphorbium 1195
appendiculata 1196
asclepiadea *ib.*
atripiicifolia *ib.*
bipinnata 1197
carnosa 1195
cordifolia 1196
cuneifolia 1195
echinata 1196
Ficoides 1195
haſtata 1196
incana *ib.*
Kleinia 1195
laciniata *ib.*
laurifolia *ib.*
odora *ib.*
ovata 1197
papillaris 1195
pendula *ib.*
Porophyllum 1196
radicans *ib.*
repens 1195
ſaracenica 1196
ſcandens *ib.*
ſempervivae 1195
ſonchifolia 1196
ſuaveolens *ib.*
ſuffruticoſa *ib.*
tomentoſa *ib.*
villoſa *ib.*

Cachrys 309, 478
Libanotis 478
odontalgica *ib.*
panacifolia *ib.*
ſicula *ib.*

Cactus 770, 784, 785
alatus 785
cochenillifer *ib.*
coquimbanus 784
curaſſavicus 785
Ficus indica *ib.*
flagelliformis *ib.*
grandiflorus *ib.*
heptaginus 784
hexagonus *ib.*
lanuginoſus *ib.*
mammillaris *ib.*
Melocactus *ib.*
moniliformis 785
nobilis 784
Opuntia 785
paraſiticus *ib.*
pendulus 785
pentagonus 784
Pereskia 785
peruvianus 784
Phyllanthus 785
Pitujaya 784
portulacifolius 785
repandus 784
Royeni *ib.*
ſpinoſiſſimus 785
tetragonus 784
triangularis 785
Tuna *ib.*

Cacucia 656, 693
coccinea 693

Cadaba 300, 405
farinoſa 405
glanduloſa *ib.*
rotundifolia *ib.*

Cadamba 647, 649
jaſminiſtora 649

Cadia 656, 667
arabica 667

Caenopteris 1283
1321 *ſq.*
furcata 1321
rhizophylla *ib.*
rutaefolia *ib.*
vivipara 1322

Caeſalpinia 655, 672
Crilta 672
Sappan *ib.*
veſicaria *ib.*

Calamagroſtis 86, 171, 172
arenaria 172
arundinacea *ib.*
Arundo 171
bicolor 172
caneſcens *ib.*
conſpicua *ib.*

epigeios

Calamagroſtis
epigeios 172
farcta ib.
Karka ib.
lanceolata ib.
Plinii ib.
villoſa 171
Calamus 526, 570
Rotang 570
Calceolaria 20, 39
Fothergillii 39
integrifolia ib.
nana ib.
perfoliata ib.
pinnata ib.
plantaginea ib.
Calea 1163, 1205
Amellus 1205
aſpera ib.
caroliniana ib.
jamaicenſis ib.
leptophylla ib.
oppoſitifolia ib.
pinifolia ib.
ſcoparia ib.
Calendula 1166, 1271 *ſq.*
arboreſcens 1272
arvenſis ib.
fruticoſa ib.
graminifolia ib.
hybrida ib.
nudicaulis ib.
officinalis ib.
oppoſitifolia ib.
pluvialis ib.
pumila ib.
rigida ib.
ſancta 1271
tomentoſa 1272
Tragus ib.
Calla 781, 863
aethiopica 863
paluſtris ib.
CALLICARPA 211, 246
americana 246
ferruginea ib.
japonica ib.
integrifolia ib.
reticulata ib.
tomentoſa ib.
Callicocca 298, 370, 371
alba 370
glabra 371
gujanenſis ib.
purpurea 370
tomentoſa ib.
CALLIGONUM 777, 839
polygonoides 839
Calliſia 83, 121
repens 121
Callitriche 3, 17
auctumnalis 17
brutia ib.
dubia ib.
verna ib.
Callixene 525, 556
magellanica 525, 556
CALODENDRUM 301, 417
capenſe 417
Calophyllum 774, 814
Akara 814
Calaba ib.
Inophyllum ib.
Sculatti ib.
Caltha 782, 883
paluſtris 883
Calycanthus 781, 862
fertilis 862
floridus ib.
praecox ib.
ſterilis ib.
Camex 296, 403
gujamenſis 403
Cambogia 774, 810
Gutta 810
Camellia 1000, 1069
japonica 1069
Saſangua ib.
Cameraria 294, 438
anguſtifolia 438
gujanenſis ib.
latifolia ib.
Tamaquarina ib.
Campanula 297, 348, 353
adpreſſa 353
alpeſtris 351
alpina ib.
altiflora 352
americana 349
aurea ib.
barbata 351
Bellardi 348
Bocconis ib.
bononienſis 350
capenſis 351
capillacea 349
carpatica ib.
cenisia 348
Cervicaria 350
ceſpitoſa 348
cinerea 350
criſpa 352
dichotoma 350
edulis

Campanula
edulis 350
Elatines 351
erinoides 352
Erinus *ib.*
fasciculata 353
fragilis *ib.*
fruticosa 352
glauca 353
glomerata 350
gracilis 352
graminifolia 350
grandiflora 349
hederacea 351
heterophylla 352
hispidula 350
hybrida 352
interrupta *ib.*
laciniata 351
latifolia 350
lilifolia 349
limonifolia 351
linearis 349
lobelioides *ib.*
marginata 353
Medium 350
mollis 351
nitida 352
patula 348
pedunculata 352
pentagonia *ib.*
peregrina 351
perfoliata *ib.*
perficifolia 348
petraea 350
porosa 349
procumbens 352
pulla 348
pusilla *ib.*
pyramidalis 349
rapunculoides 350
Rapunculus 348
rhomboidea 349
rotundifolia 348
saxatilis 351
Scheuchzeri 348
sessiliflora 352
sibirica 351
speculum 352
spicata 351
stricta *ib.*
tenella 349
tetraphylla 353
thyrsoidea 350
Trachelium *ib.*
tridentata 351
triphylla 353
undulata 349
unidentata *ib.*
unistora 348
urticaefolia 350
valdensis 351
verticillata 353
vesula 348
zoysii 349
Camphorosma 217, 280, 281
acutum 281
glabrum *ib.*
monspelienſe 280
paleaceum 281
Pteranthus *ib.*
Cananga 782, 868
Uregu 868
CANARINA 522, 577
Campanula 577
CANARIUM 300, 405
commune 405
CANELLA 741, 749
alba 749
Canephora 302, 372
madagascariensis 372
Canna 1, 5
angustifolia 5
glauca *ib.*
indica *ib.*
juncea *ib.*
Cannabis 305, 457
sativa 457
Canscora 216, 262
ventricosa 262
Cansiera 216, 280
Rheedii 280
Cantua 294, 347
peruviana 347
Cantuffa 656, 677
exotica 677
Capparis 774, 806, 807
Baducca 806
Breynia 807
Carandas 806
comosa 807
cynophallophora 806
Dahi 807
erythrocarpos 806
Eustachiana 807
exstipulata *ib.*
ferruginea 806
flexuosa *ib.*
frondosa *ib.*
grandis 807
hastata *ib.*
horrida 806
jamaicensis 807
linearis *ib.*
longifolia 806
mithridatica 807
nemorosa *ib.*
oblongifolia *ib.*
pulcherrima *ib.*
sepiaria 806
siliquosa *ib.*
spinosa *ib.*

tenuifo-

Capparis
tenuifolia 807
toruloſa 806
verrucoſa 807
zeylanica 806
Capraria 889, 947
biflora 947
cruſtacea *ib.*
durantifolia *ib.*
humilis *ib.*
lanceolata *ib.*
lucida *ib.*
undulata *ib.*
uniflora *ib.*
Capſicum 296, 387
annuum 387
baccatum *ib.*
fruteſcens *ib.*
groſſum *ib.*
ſinenſe *ib.*
CAPURA 575
purpurata 575
Caquepiria 647, 651
Bergkia 651
Caraipa 773, 821
anguſtifolia 821
latifolia *ib.*
longifolia *ib.*
parvifolia *ib.*
Cardamine 968, 979
980
africana 980
amara *ib.*
aſarifolia 979
bellidifolia *ib.*
chelidonia 980
graeca *ib.*
hirſuta *ib.*
impatiens *ib.*
nivalis 979
nudicaulis *ib.*
perviflora 980
Cardamine
petraea 979
pratenſis 980
reſeditolia *ib.*
trifolia *ib.*
virginica *ib.*
Cardioſpermum
603, 642
Corindum 642
grandiflorum *ib.*
Halicacabum *ib.*
Carduus 1162, 1186-1189
acanthoides 1186
acaulis 1189
altiſſimus 1188
arabicus 1186
argentatus 1187
auſtralis *ib.*
Boujarti 1188
canus 1187
carlinaefolius *ib.*
carlinoides *ib.*
carolinianus 1186
Caſabonae 1188
chius 1187
ciliatus 1188
criſpus 1186
cyanoides *ib.*
defloratus 1187
diſſectus *ib.*
eriophorus 1188
flaveſcens *ib.*
gnaphaloides 1189
helenioides *ib.*
heterophyllus *ib.*
lanceolatus 1186
leucographus *ib.*
linearis 1188
marianus 1189
mollis 1188
monſpeſſulanus 1187
nutans *ib.*
Carduus
paluſtris 1186
paniculatus 1187
pannonicus *ib.*
parviflorus *ib.*
pectinatus *ib.*
peregrinus 1186
polyanthemus *ib.*
puniceus 1188
pycnocephalus 1186
rigens 1188
rivularis *ib.*
ſcaber 1189
ſerratuloides 1188
ſpinoſiſſimus 1186
ſtellatus 1188
ſyriacus 1189
tataricus *ib.*
tuberoſus 1187
virginianus 1188
Carex 84, 137-147
acuta 144
Agaſtachys 145
alpina 143
arenaria 139
argentea 143
aſpera 141
atrata 146
baldenſis 139
bifurca 145
brachyſtachys 146
brizoides 139
brunnea 140
caneſcens 141
capillaris 142
capitata 138
caryophyllea 142
cernua 146
ceſpitoſa 142
chordorhiza 139
curvula 140
cyperoides 139
diandra 141
digitata

Carex
digitata 141
dioica 138
diſſimilis 144
diſtans 143
diſticha 140
echinata *ib.*
elegans 143
elongata 140
erecta 145
ericetorum 142
ferax 146
ferruginea 143
filiformis 141
flacca 145
Flagellum 138
flava 141
foetida 140
folliculata 142
frigida, 146
fuſca *ib.*
glauca 145
globularis 142
glomerata 141
gracilis 144
gynobaſis *ib.*
Haleonaſter 139
Halleri 138
hermaphrodita 139
hirta 144
hirtella 138
hordeoſtichos 145
humilis 143
japonica *ib.*
inaequalis 146
indica 140
juncifolia 142
laevis 138
laſiocarpa 145
latifolia 138
leporina 139
leptoſtachys 143
Leucoglochin 139

Carex
limoſa 142
lithoſperma 137
lobata 140
loliacea *ib.*
marcida 146
microſtachya 140
miliacea 144
mitis 138
mixta 146
montana 141
muricata 140
mutabilis 143
myoſuroides 147
nemoroſa 143
nutans 146
oblonga *ib.*
palleſcens 142
paluſtris 145
panicea 142
paniculata 141
paradoxa 145
patula 144
pedata 141
pendula 143
pilulifera 141
poaeformis 138
Poireti 140
polygama 145
praecox 140
proſtrata 142
Pſeudo-cyperus 146
pulicaris 138
pumila 144
quinata 146
remota 140
rhizantha 144
ſaxatilis 141
Scheuchzeri 144
ſempervirens *ib.*
ſilvatica 143
ſinenſis 144
ſpadicea *ib.*

Carex
ſpicata 139
ſplendida 142
ſquarroſa 138
ſubulata *ib.*
tenuifolia 142
ternaria 145
tomentoſa 141
torfacea 145
triceps 142
triſtachya 141
uliginoſa 139
uncinata 138
verna 143
veſicaria 144
vulpina 139
Carica 659, 701
Papaya 701
Poſopoſa *ib.*
ſpinoſa *ib.*
Cariſſa 295, 433
Carandes 433
edulis *ib.*
ſpinarum *ib.*
Carlina 1162, 1191
acaulis 1191
atractyloides *ib.*
corymboſa *ib.*
involucrata *ib.*
lanata *ib.*
pyrenaica *ib.*
racemoſa *ib.*
vulgaris *ib.*
xeranthemoides *ib.*
CAROLINEA 1000, 1039
inſignis 1039
princeps *ib.*
CAROXYLON 302, 422
Salſola 422

Carpe-

Carpesium 1163, 1219
abrotanoides 1219
cernuum ib.
Carphalea 213, 264
madagascariensis 264
Carpinus 742, 754, 755
Betulus 754
caroliniana ib.
orientalis 755
Ostrya 754
virginiana 755
Carpodetus 300, 402
serratus 402
Carthamus 1162, 1192, 1193
arborescens 1192
caeruleus ib.
Carduncellus ib.
carolinianus ib.
corymbosus 1193
creticus ib.
dentatus 1192
lanatus 1193
mitissimus 1192
salicifolius ib.
tinctorius ib.
tingitanus 1193
tomentosus 1192
Carum 310, 491
Carvi 491
Caryocar 779, 839
nuciferum 839
Caryophyllus 770, 822
aromaticus 822
Caryota 773, 805
urens 805
Casearia 660, 700
aculeata 700
nitida 700
parviflora ib.
Cassia 655, 667-671
Absus 668
alata 670
angustifolia ib.
Apucuita 668
Asbrek ib.
atomaria 669
auriculata 670
bacillaris 668
bicapsularis ib.
biflora 669
bracteata 670
caroliniana 668
Chamaecrista 671
Crista ib.
diphylla 667
emarginata 668
falcata ib.
Fistula 669
flexuosa 671
frondosa 670
glandulosa 671
grandis 670
hirsuta 669
javanica 670
lanceolata 669
ligustrina 670
lineata 669
longisiliqua 668
marilandica 670
mimosoides 671
multiglandulosa 669
multisiliqua 670
nictitans 671
nigricans 670
obtusifolia 668
occidentalis 669
patula ib.
pilosa ib.
planisiliqua ib.
procumbens 671
ruscifolia 669
Senna ib.
semoides 668
sensitiva 669
sericea 668
serpens 669
sinensis ib.
Sophera 670
stipularia ib.
Sunsub 668
surattensis 670
Tagera 668
tenuissima 670
tomentosa ib.
Tora 668
viminea ib.
virgata 670
Cassine 311, 497
capensis 497
Maurocenia ib.
Peragua ib.
Cassipurea 771, 796
guianensis 796
Cassytha 647, 653
corniculata 653
filiformis ib.
zeylanica ib.
Castilleja 886, 921
fissifolia 921
integrifolia ib.
Casuarina 2, 13
equisetifolia 13
nodiflora ib.
stricta ib.
torulosa ib.
Catananche 1161, 1183, 1184
caerulea 1183
graeca

Catananche
graeca 1184
lutea 1183
Catesbaea 213, 243
longiflora 243
parviflora *ib.*
Catha 301, 411
inermis 411
spinosa *ib.*
Catinga 770, 788
aromatica 788
moschata *ib.*
Caturus 89, 202
spiciflorus 202
Caucalis 308, 472, 473
angustifolia 473
Anthriscus *ib.*
daucoides 472
glabra 473
grandiflora 472
helvetica 473
latifolia 472
leptophylla 473
maritima *ib.*
mauritanica *ib.*
nodosa *ib.*
orientalis *ib.*
pumila *ib.*
scandicina *ib.*
virgata *ib.*
Caucanthus 661, 726
Forskählei 726
Cautschua 996, 1007
elastica 1007
Cavanilla 999, 1037, 1038
acutangula 1037
angulata *ib.*
decaphera *ib.*
ferruginea 1038
Cavanilla
ovata 1038
palmata 1037
phoenicea 1038
punctata 1037
tiliaefolia *ib.*
tomentosa *ib.*
umbellata *ib.*
Ceanothus 300, 402, 403
africanus 402
americanus *ib.*
asiaticus *ib.*
capsularis 403
reclinatus 402
Cecropia 22, 71
peltata 71
CEDRELA 301, 416
odorata 416
Cedrota 601, 629
guianensis 629
Celastrus 300, 405, 406
acuminatus 406
alatus *ib.*
bullatus *ib.*
buxifolius *ib.*
cassinoides *ib.*
crenatus *ib.*
edulis *ib.*
filiformis *ib.*
integrifolius *ib.*
linearis *ib.*
lucidus *ib.*
microphyllus *ib.*
myrtifolius *ib.*
octogonus *ib.*
orbiculatus *ib.*
parviflorus *ib.*
procumbens *ib.*
punctatus *ib.*
pyracanthus *ib.*
Celastrus
scandens 405
striatus 406
undulatus *ib.*
Celosia 304, 425, 426
argentea 425
baccata *ib.*
castrensis *ib.*
caudata *ib.*
coccinea *ib.*
corymbosa *ib.*
cristata *ib.*
gnaphaloides *ib.*
lanata *ib.*
margaritacea *ib.*
nodiflora *ib.*
paniculata *ib.*
procumbens *ib.*
pyramidalis 426
trigyna 425
virgata *ib.*
Celsia 889, 938
Arcturus 938
cretica *ib.*
linearis *ib.*
orientalis *ib.*
Celtis 305, 456
australis 456
Lima *ib.*
occidentalis *ib.*
orientalis *ib.*
Cenchrus 85, 150
capitatus 150
carolinianus *ib.*
ciliaris *ib.*
echinatus *ib.*
frutescens *ib.*
granularis *ib.*
lappaceus *ib.*
muricatus *ib.*
racemosus *ib.*
setosus *ib.*
tribuloides *ib.*

Centaurea 1163, 1263-1268
acaulis 1265
aegyptiaca 1268
alba 1266
alpina 1263
amara 1266
anguſtifolia *ib.*
argentea 1264
aſpera 1268
aurea *ib.*
babylonica 1266
Behen *ib.*
benedicta 1268
bracteata 1264
Calcitrapa 1268
Calcitrapoides *ib.*
capillata 1265
Cardunculus 1266
caroliniana 1265
Centaureum 1263
Centauroides 1268
ceſpitoſa *ib.*
cichoracea 1267
Cineraria 1264
collina 1268
conifera 1266
Crocodilium 1267
Crupina 1264
Cyanus *ib.*
diluta 1265
eriophora 1268
erucifolia 1264
galactites 1267
glaſtifolia 1266
humilis *ib.*
hyſſopifolia 1265
Jacea *ib.*
Isnardi 1267
linifolia 1265
Lippii 1264
maxima *ib.*
melitenſis 1268
montana 1264
moſchata 1263
Moſchus *ib.*
mucronata 1264
muricata 1267
napifolia *ib.*
nigra 1264
nudicaulis 1266
orientalis 1265
paniculata 1264
pectinata 1265
peregrina 1267
phrygia 1265
procumbens 1266
pullata 1264
pumila 1267
radiata *ib.*
raguſina 1265
repens 1266
Rhapontica *ib.*
romana 1267
rupeſtris 1268
ſalmantica 1267
Scabioſa 1265
ſempervirens 1264
ſeridis 1267
ſeſſilis *ib.*
ſibirica 1265
ſicula 1268
ſolſtitialis *ib.*
ſonchifolia 1267
ſphaerocephala *ib.*
ſpinoſa 1264
ſplendens 1266
Stoebe 1264
ſtrobilacea 1265
tatarica *ib.*
tingitana 1267
uniflora 1265
Venetum 1267
Centunculus 211, 255
minimus 255
Cephaëlis 298, 372
axillaris 372
elata *ib.*
muſcoſa *ib.*
violacea *ib.*
Cephalanthus 210, 227
occidentalis 227
Ceranthus 19, 26
Schreberi 26
Ceraſtium 663, 736-738
alpinum 737
aquaticum *ib.*
arvenſe *ib.*
dichotomum *ib.*
dioicum *ib.*
illyricum 738
latifolium 737
lineare *ib.*
mantieum *ib.*
maximum *ib.*
pentandrum *ib.*
perfoliatum 736
procumbens 737
refractum 738
repens 737
rigidum 738
ſemidecandrum 737
ſtrictum *ib.*
ſuffruticoſum *ib.*
tomentoſum *ib.*
viſcoſum 736
vulgatum 737
Ceratocarpus 3, 17
arenarius 17
Ceratonia 303, 431
chilenſis 431
Siliqua *ib.*

Ceratophyllum 740, 746
demersum 746
submersum ib.
Ceratosanther 81, 102
tuberosa 102
Ceratostema 659, 676
peruvianum 676
Cerbera 295, 433
Ahovai 433
Manghas ib.
parviflora ib.
Thevetia ib.
Cercis 655, 666
canadensis 666
Siliquastrum ib.
Cerinthe 291, 320
major 320
minor ib.
Ceropegia 294, 439
biflora 439
Candelabrum ib.
sagittata ib.
tenuifolia ib.
Cestrum 296, 388, 389
auriculatum 338
diurnum ib.
foetidum 389
hirtum ib.
laurifolium 388
nocturnum ib.
Parqui ib.
tomentosum ib.
toxicarium ib.
vespertinum ib.
Chadara 775, 815
arborea 815
velutina ib.
Chaerophyllum 310, 487, 488
alpinum 487
arboreſcens 488
ariſtatum ib.
aromaticum ib.
aureum ib.
bulboſum 487
Cicutaria 488
coloratum ib.
hirſutum ib.
ſcabrum ib.
ſilveſtre 487
temulum 488
Chaetocarpus 211, 248
Ponteria 248
Chalcas 658, 678
paniculata 678
Chamaerops 527, 584
humilis 584
Chamira 967, 984
cornuta 984
Chamitis 310, 491
integrifolia 491
trifurcata ib.
Chara 2, 14
flexilis 14
hiſpida ib.
tomentoſa ib.
vulgaris ib.
Cheiranthus 967, 984, 985
alpinus 985
annuus 984
calloſus ib.
canus 985
Cheiri ib.
chius ib.
erylimoides 984
Farſetia 985
feneſtralis 984
fruticuloſus ib.
helveticus ib.
incanus ib.
littoreus ib.
maritimus 985
montanus ib.
mutabilis ib.
ſalinus 984
ſcapiger ib.
ſinuatus ib.
ſtrictus 985
temuifolius ib.
tricuſpidatus ib.
trilobus 984
triſtis 985
villoſus ib.
Chelidonium 774, 809
corniculatum 809
dodecandrum ib.
Glaucium ib.
hybridum ib.
japonicum ib.
majus ib.
Chelidurus 82, 105
ignotus 105
Chelone 890, 928
glabra 928
hirſuta ib.
obliqua ib.
Pentſtemon ib.
ruellioides ib.
Chendea 304, 426
diffuſa 426
Chenopodium 306, 448-450
album 449
ambroſioides ib.
anthelminticum ib.

ariſta-

Chenopodium
aristatum 449
atriplicis 448
Bonus Henricus ib.
Botrys 449
caudatum ib.
glaucum ib.
guineense ib.
hybridum ib.
laterale 450
maritimum ib.
multifidum 449
murale ib.
oppositifolium 450
polyspermum 449
punctulatum 448
rubrum ib.
Scoparia 449
sepium ib.
sericeum 450
serotinum 449
triangulare 448
urbicum ib.
viride 449
Vulvaria ib.

Cherleria 661, 721
sedoides 721

Chimarrhis 297, 370
cymosa 370

Chiococca 298, 366
barbata 366
paniculata ib.
racemosa ib.

Chionanthus 19, 26
caribaea 26
compacta ib.
Ghaeri ib.
incrassata ib.
virginiana ib.
zeylanica ib.

Chironia 294, 391,
392
angularis 391
baccifera 392
campanulata 391
decandra 392
dichotoma 391
dodecandra 392
fruteſcens ib.
jasminoides 391
lanceolata ib.
linoides ib.
lychnoides ib.
nudicaulis ib.
tetragona 392
trinervia 391

CHLORA 600, 618
dodecandra 618
imperfoliata ib.
perfoliata ib.
quadrifolia ib.

Chloranthus 216, 280
inconſpicuus 280

Chloris 86, 163
ciliata 163
cruciata ib.
petraea ib.
polydactyla ib.
radiata ib.

Chomelia 212, 245
ſpinoſa 245

Chondrilla 1161,
1173
crepoides 1173
juncea ib.
nudicaulis ib.

Chordoſtylum 1286,
1484 ſq.
byſſoides 1485
capillare 1484
Clavaria ib.
filiforme 1485
hiſpidulum 1485
penicillatum ib.

Chryſanthemum
1164, 1247 ſq.
Achilleae 1247
alpinum ib.
arcticum 1248
atratum 1247
Balſamita ib.
bipinnatum 1248
carolinianum 1247
coronarium 1248
corymboſum 1247
floſculoſum 1248
fruteſcens 1247
graminifolium ib.
japonicum 1248
indicum ib.
inodorum 1247
italicum 1248
Leucanthemum 1247
millefoliatum 1248
monſpelienſe 1247
montanum ib.
Myconis 1248
paludoſum ib.
pectinatum 1248
pinnatifidum ib.
ſegetum ib.
ſerotinum 1247

CHRYSITRIX 777,
828
capenſis 828

Chryſobalanus 771,
796
Icaco 796

Chryſocoma 1162,
1203 ſq.
acaulis 1204
biflora ib.
cernua 1203

Chryſocoma
ciliata 1203
Coma aurea ib.
dichotoma ib.
fruticoſa ib.
gigantea 1204
graminifolia ib.
Linoſyris 1203
montana ib.
odoratiſſima 1204
oppoſitifolia 1203
paniculata 1204
patula 1203
piloſa ib.
purpurea 1204
ramoſa ib.
ſcabra 1203
ſericea ib.
tomentoſa ib.
uniflora 1204
villoſa ib.
Chryſogonum 1166, 1270
virginianum 1270
Chryſophyllum 296, 395, 396
argenteum 396
Cainito 395
glabrum 396
Macucu ib.
microcarpum ib.
monopyrenum 395
Chryſoſplenium 661, 704
alternifolium 704
oppoſitifolium ib.
Chuncoa 660, 702
amazonia 702
Chuquiraga 1163, 1205
Juſſieui 1205
Cicca 220, 287
diſticha 287
Cicer 1078, 1113
arietinum 1113
Cichorium 1161, 1184
Endivia 1184
Intybus ib.
ſpinoſum ib.
Cicuta 310, 485
bulbifera 485
maculata ib.
perennans ib.
viroſa ib.
Cienfuegoſia 1000, 1060
digitata 1060
Cimicifuga 778, 839
foetida 839
Cinchona 297, 361
anguſtifolia 361
brachycarpa ib.
caribaea ib.
corymbifera ib.
floribunda ib.
montana ib.
officinalis ib.
ſpinoſa ib.
Cineraria 1164, 1237-1240
alata 1239
Amelloides ib.
americana ib.
aurea ib.
aurita 1238
cacalioides ib.
canadenſis 1239
capillacea ib.
carolinienſis 1240
cordifolia 1238
Cineraria
criſpa 1238
cruenta ib.
cymbalarifolia 1237
denticulata 1239
diſcolor ib.
elongata 1238
geifolia 1237
glabra 1238
glauca ib.
haſtifolia 1239
humifuſa 1237
japonica 1238
integrifolia ib.
lanata 1238
lineata 1239
linifolia 1238
lobata 1239
longifolia 1238
malvaefolia ib.
maritima 1239
multiflora 1240
paluſtris 1239
perfoliata 1240
purpurata 1239
repanda 1240
rotundifolia ib.
ſcapiflora ib.
ſenecionis 1239
ſibirica 1238
ſonchifolia 1239
tuſſilaginis 1238
viſcoſa 1239
Ciponima 773, 798
gujanenſis 798
Circaea 21, 27
alpina 27
lutetiana ib.
Ciſſampelos 995, 1006
Caapeba 1006
capenſis ib.
fruticoſa ib.

Ciſſampelos
Pareira 1006
ſimilacina *ib.*
Ciſſus 216, 255, 256
acida 256
cordifolia 255
digitata 256
glandulosa *ib.*
heptaphylla *ib.*
quadrangularis *ib.*
ficyoides 255
ternata 256
trifoliata *ib.*
vitiginea 255
Ciſtus 775, 822-825
aegyptiacus 824
albidus 823
alternifolius
anglicus 824
anguſtifolius 825
apenninus *ib.*
arabicus *ib.*
calicinus 824
canadenſis *ib.*
canarienſis 825
canus 823
capenſis *ib.*
carolinianus 824
creticus 823
criſpus *ib.*
elongatus
foetidus 825
Fumana 823
glutinoſus 825
guttatus 824
halimifolius 823
Helianthemum 825
hirtus *ib.*
hybridus
incanus 823
italicus 824
ladeniferus 822
laevipes 823
laurifolius 823
lavandulifolius
laxus 823
ledifolius 824
Libanotis 822
Lippii 824
marifolius 823
medius 822
monſpelienſis *ib.*
mutabilis 825
niloticus 824
numularius 825
oelandicus 824
piloſus 825
polifolius *ib.*
populifolius 823
racemoſus 825
roſcus 823
ſalicifolius 824
ſalvifolius 823
ſcabroſus 824
ſericeus 825
ſerpyllifolius *ib.*
ſquamatus *ib.*
ſtipulatus *ib.*
ſurrejanus *ib.*
ſyriacus 824
thymifolius 825
Tuberaria 824
umbellatus 823
vaginatus *ib.*
villoſus *ib.*
Citharexylum 890, 942, 943
caudatum 943
cinereum 942
erectum 943
Melanocardium *ib.*
paniculatum *ib.*
quadrangulare *ib.*
Citharexylum
ſubſerratum 943
villoſum *ib.*
Citrus 1149, 1152, 1153
Aurantium 1153
chilenſis 1152
decumana 1153
japonica *ib.*
Medica 1152
ſpinoſa *ib.*
Clathrus 1286, 1449
cancellatus 1449
Claucena 600, 610
javenſis 610
Clavaria 1286, 1442-1445
adſcendens 1445
anthocephala 1444
atra 1443
atro-purpurea *ib.*
bifida 1444
brachiata *ib.*
capillaris 1445
ceſpitoſa 1443
corallioides 1444
cornea 1443
Cornu Alces 1444
Cornu Cervi *ib.*
cornuta *ib.*
corticalis *ib.*
criſpa *ib.*
cylindrica 1445
damaecornis 1444
delicatula 1445
elveloides 1443
farinoſa 1445
faſtigiata 1444
fiſtuloſa 1445
fuſca 1443
glabra 1442
gracilis 1444

Clavaria
granulata 1445
inaequalis 1443
lumbricalis 1445
media ib.
muscoides 1444
ophioglossoides 1443
parasitica 1445
pedunculata ib.
phalloides ib.
pistillaris 1442
placorhiza 1445
plebeja 1444
polymorpha 1445
purpurea 1443
resinosorum ib.
serpentina ib.
simplicissima ib.
subdivisa ib.
tubulosa ib.
vermicularis 1444
viridis 1443

Claytonia 423
Portulacaria 423
sibirica ib.
virginica ib.

Clematis 782, 872-874
cirrhosa 872
crispa ib.
dioica 873
erecta 874
Flammula 873
florida ib.
Forsteri ib.
hexapetala ib.
japonica 872
integrifolia 874
maritima ib.
ochroleuca ib.
orientalis 873
Pallasii ib.
paniculata ib.
reticulata 873
sinensis ib.
Viorna ib.
virginiana 872
Vitalba 873
Viticella ib.

Cleome 968, 993, 994
aculeata 993
angustifolia ib.
arabica ib.
capensis ib.
Chelidonii 994
digitata 993
dodecandra 994
felina ib.
fruticosa ib.
gigantea 993
gujanensis 994
heptaphylla ib.
icosandra ib.
juncea ib.
monophylla 993
ornithopodioides ib.
pentaphylla 994
polygama ib.
procumbens 993
serrata ib.
spinosa ib.
tenella 994
triphylla ib.
violacea 993
viscosa 994

Cleonia 886, 921
lusitanica 921

Clerodendrum 890, 962
calamitosum 962
fortunatum ib.
infortunatum ib.
paniculatum ib.

Clerodendrum
Phlomidis 962
trichotomum ib.

Clethra 658, 698
alnifolia 698
arborea ib.
paniculata ib.

Cleyera 775, 816
japonica 816

Clibadium 298, 375
surinamense 375

Cliffortia 777, 831, 832
crenata 831
cuneata ib.
ericifolia ib.
falcata 832
ferruginea 831
filifolia ib.
graminea ib.
ilicifolia ib.
juniperina 832
obcordata ib.
odorata 831
polygonifolia ib.
pulchella ib.
ruscifolia ib.
sarmentosa ib.
strobilifera ib.
teretifolia ib.
ternata 832
trifoliata 831

Clinopodium 886, 912
incanum 912
martinicense ib.
rugosum ib.
vulgare ib.

Clito-

Clitoria 1078, 1107
aquilupiensis 1107
brasiliana *ib.*
Gelactia *ib.*
mariana *ib.*
micrantha *ib.*
multiflora *ib.*
ternatea *ib.*
virginiana *ib.*
Clusia 776, 818
alba 818
flava *ib.*
rosea *ib.*
venosa *ib.*
Clutia 312, 504, 505
acuminata 505
alaternoides 504
Eluteria 505
hirta *ib.*
lanceolata *ib.*
polygonoides *ib.*
pulchella *ib.*
retusa *ib.*
stipularis *ib.*
tomentosa *ib.*
Clypeola 967, 977
caroliniana 977
Jonthlaspi *ib.*
maritima *ib.*
tomentosa *ib.*
Cneorum 83, 99
tricoccon 99
Cnestis 662, 729
scandens 729
Cnicus 1162, 1189, 1190
Acarna 1190
centauroides 1189
cernuus 1190
dubius 1189
Erysithales *ib.*
Cnicus
ferox 1190
oleraceus 1189
pygmaeus 1190
spinosissimus 1189
uniflorus *ib.*
Coccoloba 603, 640, 641
australis 640
barbadensis *ib.*
diversifolia *ib.*
emarginata *ib.*
excoriata *ib.*
flavescens *ib.*
leoganensis *ib.*
nivea 641
obtusifolia 640
pubescens *ib.*
punctata *ib.*
tenuifolia *ib.*
Uvifera *ib.*
Coccosipsilum 213, 245
repens 245
Cochlearia 967, 974, 975
anglica 975
Armoracia *ib.*
Coronopus *ib.*
danica 974
foetida 975
glastifolia *ib.*
groenlandica *ib.*
officinalis 974
Cocos 521, 569
aculeata 569
butyracea *ib.*
chilensis *ib.*
guineensis *ib.*
lapidea *ib.*
maldivica *ib.*
nucifera *ib.*
Codia 602, 636
montana 636
Codon 658, 675
Royeni 675
Coffea 298, 365
arabica 365
gujanensis *ib.*
occidentalis *ib.*
odorata *ib.*
opulina *ib.*
paniculata *ib.*
sambucina *ib.*
triflora *ib.*
Coix 85, 149
Lacryma 149
Colchicum 527, 588
autumnale 588
montanum *ib.*
variegatum *ib.*
Coldenia 220, 288
procumbens 288
Colletia 304, 408
spinosissima 408
Colliguaja 603, 640
odorifera 640
Collinsonia 20, 48, 49
praecox 48
scabriuscula 49
serotina *ib.*
Columnea 889, 964
hirsuta 964
hispida *ib.*
longifolia *ib.*
rutilans *ib.*
scandens *ib.*
Colutea 1075, 1077, 1116, 1117
aeschynomenoides 1117
arborescens 1116
fistulosa 1117

Colutea
fruteſcens 1117
herbacea ib.
humilis ib.
orientalis 1116
perennans 1117
Comarum 781, 861
fragarioides 861
paluſtre ib.
Combretum 600, 609
decandrum 609
laxum ib.
ſecundum ib.
Cometes 217, 266
alterniflora 266
Commelina 82, 120, 121
africana 120
benghalenſis ib.
caroliniana 121
Commelinoides 120
communis ib.
diffuſa 121
erecta 120
hexandra 121
longicaulis 120
mollis ib.
nudicaulis 121
nudiflora ib.
papilionacea ib.
ſpirata ib.
tuberoſa ib.
vaginata ib.
virginica ib.
Zanonia ib.
COMMERSONIA 310, 510
echinata 510
Comocladia 83, 99
dentata 99
ilicifolia 99
integrifolia ib.
Conami 778, 834
braſilienſe 834
Conceveiba 772, 826
gujanenſis 826
Conferva 1285, 1392-1395
Aegogropila 1395
aeruginoſa 1393
amphibia ib.
armillaris ib.
bulloſa ib.
burſata 1394
canaliculatis 1393
cancellata 1394
capillaris 1393
catenata 1394
catenulata 1395
Chaetophora 1392
corallina 1394
corallinoides 1395
decimina 1393
dichotoma 1394
elongata 1395
filiformis 1393
flexuoſa 1395
fluviatilis 1392
foeniculacea 1394
fontinalis 1392
fucoides 1395
fulva ib.
furcata 1393
fuſca 1395
gelatinoſa 1394
glomerata 1395
Helminthochorton 1394
infuſionum 1394
jugalis 1393
lanceolata 1392
littoralis 1393
lobata 1392
moniliformis ib.
nigra 1394
paraſitica 1395
pectinalis 1392
pellucida 1394
pennata 1395
piſcium 1392
plana 1393
plicata 1395
polymorpha ib.
porticalis 1392
punctalis ib.
quinina 1393
reticulata 1394
rigida ib.
rivularis 1392
rupeſtris 1395
ſaccata 1394
ſcoparia ib.
ſericea 1395
ſerpentina 1393
ſeticuloſa ib.
ſpongioſa 1394
ſtellina 1393
thermalis 1394
tomentoſa ib.
transverſina 1393
trichoides 1395
tubuloſa ib.
vagabunda ib.
veſicata 1394
Conium 309, 475
africanum 475
maculatum ib.
rigens ib.
Royeni ib.
ſuffruticoſum ib.
Connarus 997, 1014
africanus 1014
monocarpos ib.

penta-

Connarus
pentagynus 1014
pinnatus *ib.*
Conobea 886, 936
aquatica 936
Conocarpus 303, 372, 373
erecta 372
procumbens *ib.*
racemosa 373
Conohoria 302, 396
flavescens 396
Convallaria 525, 559
biflora 559
japonica *ib.*
latifolia *ib.*
majalis *ib.*
multiflora *ib.*
Polygonatum *ib.*
racemosa *ib.*
spicata *ib.*
stellata *ib.*
trifolia *ib.*
verticillata *ib.*
Convolvulus 293, 339-344
althaeoides 341
anceps *ib.*
angularis 340
aquaticus 344
arenarius
arvensis 339
Batatus 341
biflorus 340
brasiliensis 344
caelestis 340
cairicus 342
canariensis 341
Cantabrica 344
carolinus 340
Cneorum 344
copticus 342
Convolvulus
corymbosus 343
crenatus 341
dianthus 343
dissectus 342
Dorycnium 343
edulis *ib.*
farinosus 340
floridus 343
formosus *ib.*
gemellus 340
glaber 342
grandiflorus 341
gujanensis 342
hastatus 341
havanensis *ib.*
hederaceus 340
Hermanniae 339
hirtus 343
humistratus 344
Hystrix
Jalapa 342
japonicus 341
Jetiaucu 339
Imperati
lanatus
lineatus 344
littoralis *ib.*
macrocarpus 342
macrorhizos *ib.*
malabaricus 341
martinicensis 342
maximus 341
Medium *ib.*
minimus *ib.*
mucronatus 342
muricatus 341
nervosus 340
Nil *ib.*
obscurus *ib.*
oenotheroides 343
panduratus 340
Convolvulus
paniculatus 342
peltatus *ib.*
pentapetaloides 344
persicus 343
Pes caprae 344
prostratus *ib.*
purpureus 340
quinquefolius 342.
repens 343
reptans *ib.*
Scammonea 340
scoparius 343
sepium 339
sericeus 342
sibiricus 340
siculus 343
Soldanella *ib.*
speciosus 341
spinosus 343
spithamaeus *ib.*
sublobatus 344
tomentosus 342
tricolor 344
trinervius 341
tuguriorum 340
Turpethum 341
umbellatus 340
uniflorus 341
verticillatus 340
vitifolius 342
Conyza 1163, 1220-1222
anthelmintica 1221
arborescens *ib.*
asteroides 1220
aurita 1222
balsamifera 1220
bifoliata 1222
bifrons 1221
candida *ib.*
canescens 1220
carolinensis 1221
cinerea

Conyza
cinerea 1221
crispata *ib.*
decurrens 1220
fruticosa 1221
hirsuta 1222
incisa 1221
linifolia 1220
lobata 1221
odorata *ib.*
patula 1222
pubigera 1221
purpurascens *ib.*
rigida 1222
rugosa *ib.*
rupestris *ib.*
saxatilis 1220
scabra 1221
sinensis *ib.*
sordida 1220
squarrosa *ib.*
tortuosa 1221
virgata 1220
Cookia 19, 24
Gnidia 24
pilosa *ib.*
prostrata *ib.*
Copaifera 660, 700
officinalis 700
COPROSMA 307, 471
foetidissimum 471
lucidum *ib.*
Corchorus 775, 827
aestuans 827
capsularis *ib.*
hirsutus *ib.*
hirtus *ib.*
japonicus *ib.*
javanicus *ib.*
olitorius *ib.*
siliquosus *ib.*
tridens *ib.*
trilocularis *ib.*
Cordia 295, 392, 393
aspera 392
Callococca 393
dichotoma 392
elliptica 393
flavescens 392
Gerascanthes *ib.*
juglandifolia *ib.*
macrophylla 393
micrantha *ib.*
Myxa 392
Sebestena *ib.*
spinescens *ib.*
tetrandra 393
tetraphylla 392
Toqueve 393
Coreopsis 1165, 1260 *sq.*
alba 1260
alternifolia 1261
angustifolia *ib.*
aurea 1260
auriculata 1261
baccata 1260
Bidens *ib.*
chrysantha *ib.*
coronata *ib.*
crassifolia 1261
gladiata *ib.*
lanceolata *ib.*
leucantha 1260
limensis 1261
major *ib.*
perfoliata *ib.*
procera 1260
quadricornis *ib.*
reptans 1260
tripteris *ib.*
verticillata *ib.*
Coriandrum 309, 486
sativum 486
testiculatum *ib.*
Coriaria 663, 728
myrtifolia 728
ruscifolia *ib.*
sarmentosa *ib.*
Coris 292, 377
monspeliensis 377
Corispermum 3, 16, 17
hyssopifolium 16
squarrosum 17
Cornucopiae 86, 151
alopecuroides 151
altissimum *ib.*
cucullatum *ib.*
hyemale *ib.*
perennans *ib.*
Cornus 216, 256, 257
alba 257
alternifolia *ib.*
chilensis *ib.*
circinata *ib.*
cyanocarpos *ib.*
florida 256
japonica 257
mascula *ib.*
panicutata *ib.*
sanguinea *ib.*
sericea *ib.*
Cornutia 890, 946
pyramidata 946
Coronilla 1075, 1077, 1118
argentea 1118
coronata *ib.*
cretica *ib.*
Emerus *ib.*
glauca *ib.*
juncea *ib.*
minima *ib.*
scandens *ib.*
Securidaca *ib.*

Coronilla
valentina 1118
varia *ib.*
Corrigiola 311, 505
albella 505
littoralis *ib.*
repens *ib.*
Cortusa 292, 328
Ginelini 328
Matthioli *ib.*
Corylus 602, 637
americana 637
Avellana *ib.*
Colurna *ib.*
rostrata *ib.*
Corymbium 299, 373, 374
filiforme 374
glabrum *ib.*
scabrum 373
villosum 374
Corynocarpus 301, 418
laevigata 418
Corypha 521, 569
minor 569
Palmetto *ib.*
Scribus *ib.*
umbraculifera *ib.*
Cosaria 22, 71
Forskahlii 71
Cossignia 522, 577
Commersoni 577
Costus 1, 7
arabicus 7
glabratus *ib.*
Cotula 1163, 1249 *sq.*
anthemoides 1250
aurea *ib.*
capensis *ib.*
coronopifolia *ib.*
Cotula
minima 1250
pilulifera *ib.*
pyrethraria *ib.*
quinqueloba *ib.*
sericea *ib.*
stricta *ib.*
tanacetifolia *ib.*
turbinata 1249
umbellata 1250
Verbesina *ib.*
viscosa *ib.*
Cotyledon 662, 729, 730
cacalioides 730
deficiens 729
fasciculatis 730
hemisphaerica 729
hispanica 730
laciniata *ib.*
lanceolata *ib.*
malacophylla *ib.*
mammillaris *ib.*
medicatilis 729
orbiculata *ib.*
paniculata 730
papillaris *ib.*
reticulata *ib.*
serrata *ib.*
spinosa *ib.*
spuria *ib.*
triflora *ib.*
Umbilicus *ib.*
Crambe 968, 992
caspica 992
fruticosa *ib.*
hispanica *ib.*
maritima *ib.*
orientalis *ib.*
Tataria *ib.*
Crameria 216, 278
Ixina 278
Cranichis 61
aphylla 61
diphylla 62
muscosa *ib.*
oligantha *ib.*
stachyoides *ib.*
Craniolaria 890, 934, 935
annua 935
fruticosa 934
Cranzia 219, 286
laevigata 286
Craspedia 1167, 1281
uniflora 1281
Crassula 312, 515-519
alba 516
alooides 518
alpestris *ib.*
alternifolia 517
argentea 518
barbata *ib.*
caerulata *ib.*
capitella *ib.*
centauroides 516
cephalophora 518
ciliata 517
coccinea 515
columnaris 517
corallina 519
cordata *ib.*
Cotyledon 516
cotyledonoides 518
crenulata 519
cultrata 516
cymosa *ib.*
deltoidea 519
dichotoma 517
diffusa 519
expansa 518
flava 516

Crassula
fruticulosa 516
glomerata 517
imbricata *ib.*
lactea 516
lineolata 517
marginalis 516
mollis 519
montana 518
muscosa 517
nudicaulis *ib.*
obliqua 516
obvallata 518
orbicularis 517
pellucida *ib.*
perfoliata 516
perforata 519
pinnata 516
pruinosa *ib.*
pubescens 518
pulchella 517
punctata *ib.*
pyramidalis 518
ramosa 516
retroflexa 518
rubens 517
rupestris 518
scabra 516
sparsa 519
spicata 518
strigosa 517
subulata *ib.*
tecta 518
tetragona 516
thyrsiflora 519
tomentosa *ib.*
turrita 518
verticillaris 517
vestita 519

Crataegus 777, 829, 830
alpina 829
Aria *ib.*
Azarolus 830
coccinea *ib.*
Crus galli 829
edulis *ib.*
elliptica *ib.*
glabra *ib.*
glandulosa *ib.*
indica 830
laevis 829
leucophleos *ib.*
lucida 830
maura *ib.*
monogyna *ib.*
Oxyacantha *ib.*
populifolia *ib.*
punctata 829
rotundifolia *ib.*
tomentosa *ib.*
torminalis 830
triloba *ib.*
uniflora 829
viridis *ib.*

Crataeva 741, 749
gynandra 749
Marmelos *ib.*
religiosa *ib.*
Tapia *ib.*

Crenaea 740, 747
maritima 747

Crepis 1161, 1179-1181
albida 1180
alpina 1179
arenosa 1180
aspera *ib.*
barbata 1179
biennis 1180
bursifolia *ib.*
Dioscoridis *ib.*
filiformis *ib.*
foetida *ib.*
hieracioides *ib.*
neglecta 1180
patula 1181
pulchra 1179
pygmaea *ib.*
radicata 1180
rhagadioloides 1179
rigens 1180
rubra *ib.*
sibirica 1179
succulenta 1180
tectorum *ib.*
vesicaria 1179
virens 1180

Crescentia 887, 943, 944
cucurbitina 944
Cujete 943
pinnata 944

Cressa 307, 454
arabica 454
cretica *ib.*

Cribraria 1471
pallida *ib.*

Crinita 210, 231
capensis 231

Crinodendron 997, 1026
Patagua 1026

Crinum 524, 537, 538
africanum 537
americanum 538
asiaticum 537
caspicum 538
falcatum *ib.*
latifolium 537
lineare 538
nervosum *ib.*
obliquum 537
speciosum 538

tenel-

Crinum
tenellum 538
zeylanicum *ib.*
Criſtaria 656, 675
coccinea 675
Crithmum 309, 478
latifolium 478
maritimum *ib.*
pyrenaicum *ib.*
Crocus 81, 107
ſativus 107
Croſſoſtylis 999, 1036
biflora 1036
Crotalaria 1077, 1094-1096
amplexicaulis 1094
axillaris 1095
bifaria *ib.*
biflora 1094
caerulea 1095
capenſis *ib.*
cordifolia 1096
floribunda 1095
gujanenſis 1096
heterophylla 1095
imbricata *ib.*
incana 1096
juncea 1094
laburnifolia 1096
latifolia 1095
linifolia *ib.*
lunaris 1096
microphylla 1095
oppoſita 1094
pallida 1095
perfoliata 1094
perforata *ib.*
quinquefolia 1096
retuſa 1094
rotundifolia 1095

Crotalaria
ſagittalis 1094
ſericea *ib.*
ſeſſiliflora *ib.*
ſinenſis 1095
triflora *ib.*
verrucoſa *ib.*
Croton 998, 1029-1032
acutum 1030
argenteum 1031
aromaticum *ib.*
aſtroites *ib.*
balſamiferum 1029
capenſe 1031
cardioſpermum 1029
Caſcarilla *ib.*
caſtaneifolium *ib.*
cyanoſpermum *ib.*
divaricatum 1031
flavens *ib.*
glabellum 1030
glanduloſum 1031
globoſum 1030
gujanenſe *ib.*
hirtum *ib.*
humile 1031
japonicum 1032
Inophyllum 1030
laccifertum *ib.*
laurinum 1031
lobatum 1032
lucidum 1030
macrophyllum 1031
maritimum 1030
maturenſe *ib.*
moluccanum 1031
nitens 1031
nutans *ib.*
obliquum 1029
pallens 1030
paluſtre 1029

Croton
plicatum 1029
populifolium 1030
punctatum *ib.*
Ricinocarpos 1031
ſebiferum 1030
ſeſſiliflorum 1029
ſpinoſum 1032
Tiglium 1030
variegatum 1029
Crucianella 214, 241
aegyptiaca 241
anguſtifolia *ib.*
herbacea *ib.*
latifolia *ib.*
maritima *ib.*
monſpeliaca *ib.*
patula *ib.*
Crudia 660, 674
Schreberi 674
Cruzita 219, 281
hiſpanica 281
Cryptoſtomum 296, 390
gujanenſe 390
Cubaea 655, 671
paniculata 671
trigona *ib.*
Cublandia 773, 797
fruteſcens 797
Cucubalus 661, 712, 713
aegyptiacus 713
bacciferus 712
Behen *ib.*
catholicus 713
fabarius *ib.*
fruticuloſus *ib.*
glutinoſus 712
italicus *ib.*
molliſſimus *ib.*
Otites 713

polype-

Cucubalus
polypetalus 713
procumbens 712
pumilio 713
reflexus *ib.*
faxifragus 712
fibiricus 713
ſtellatus *ib.*
tataricus *ib.*
viſcoſus *ib.*

Cucullaria 3, 10
Vochy 10

Cucumis 81, 100,
acutangulus 100
africanus *ib.*
anguinus *ib.*
Anguria *ib.*
Chate *ib.*
Colocynthis *ib.*
Conomon *ib.*
Dudaim *ib.*
flexuoſus *ib.*
glaber *ib.*
maderaſpatanus *ib.*
Melo *ib.*
prophetarum *ib.*
ſativus *ib.*

Cucurbita 81, 101
Citrullus 101
hiſpida *ib.*
lagenaria *ib.*
mammoſa *ib.*
Melopepo *ib.*
ovifera *ib.*
Pepo *ib.*
ſiceraria *ib.*
verrucoſa *ib.*

Cuepia 771, 820
guianenſis 820

Calhamia 740, 754
badienſis 754

Cumaruna 1075, 1084
odorata 1084

Cuminum 309, 484
Cyminum 484

Cunila 20, 43
capitata 43
mariana *ib.*
pulegioides *ib.*
thymioides *ib.*

CUNONIA 661, 703
capenſis 703

Cupania 598, 610
americana 610
glabra *ib.*
ſaponarioides *ib.*
tomentoſa *ib.*

Cupreſſus 996, 1007
columnaris 1007
diſticha *ib.*
japonica *ib.*
juniperoides *ib.*
luſitanica *ib.*
pendula *ib.*
ſempervirens *ib.*
thyoides *ib.*

Curatari 1001, 1039
gujanenſis 1039

CURATELLA 777
839
americana 839

Curcuma 1, 8
longa 8
rotunda *ib.*

Curtiſia 311, 498
Schreberi 498

Curupita 1000, 1068
guianenſis 1068

Cuſcuta 219, 285
americana 285
Epithymum 285
europaea *ib.*

Cuſſarea 213, 279
violacea 279

CUSSONIA 310, 492
ſpicata 492
thyrſiflora *ib.*

Cyanella 525, 553
alba 553
capenſis *ib.*
lutea *ib.*

Cyathus 1285, 1461
carovarius 1461
crucibuliformis *ib.*
Cupula *ib.*
cylindricus *ib.*
deformis *ib.*
fructifer *ib.*
laevis *ib.*
ſtriatus *ib.*

CYCAS 781, 872
circinalis 862
revoluta *ib.*

Cyclamen 292, 328, 329
coum 328
europaeum *ib.*
hederaefolium 329
indicum *ib.*
perſicum *ib.*

Cyclas 660, 674
aromatica 674
ſpicata *ib.*

Cyliſta 1078, 1107
villoſa 1107

Cymbaria 890, 934
dauurica 934

Cynanchum 306, 441, 442
acutum 442

altiſſi-

Cynanchum
altissimum 442
arboreum 441
capense *ib.*
carolinense *ib.*
clausum 442
cordifolium 441
crispiflorum *ib.*
creticum 442
extensum *ib.*
filiforme *ib.*
hirtum 441
lanceolatum 442
longiflorum *ib.*
maritimum 441
monspeliacum 442
obliquum 441
obtusifolium 442
parviflorum 441
planifolium 442
pyrotechnicum *ib.*
racemosum 441
reticulatum *ib.*
suberosum *ib.*
tenellum 442
undulatum 441
viminale 442

Cynara 1162, 1190, 1191
acaulis 1191
Cardunculus 1190
horrida *ib.*
humilis *ib.*
integrifolia 1191
Scolymus 1190

Cynoctonum 307, 443
petiolatum 443
sessilifolium *ib.*

Cynoglossum 292, 318, 319
apenninum 319
cheirifolium *ib.*
creticum 318
Dioscoridis *ib.*
japonicum 319
laevigatum *ib.*
lanceolatum 318
linifolium 319
lusitanicum *ib.*
officinale 318
omphalodes 319
pictum *ib.*
scorpioides *ib.*
silvaticum 318
virginicum 319

Cynometra 656, 674
cauliflora 674
ramiflora *ib.*

Cynomorium 2, 13
coryanense 13
coccineum *ib.*
jamaicense *ib.*

Cynosurus 88, 184, 185
aegyptius 185
aureus *ib.*
caeruleus 184
coracanus 185
cristatus 184
domingensis 185
echinatus 184
floccifolius 185
indicus *ib.*
lagopodoides *ib.*
Lima 184
multibracteatus *ib.*
siculus 185
sphaerocephalus 184
ternatus 185
uniflorus *ib.*
Uniolae *ib.*
virgatus *ib.*

Cyperus 84, 129-135
aegyptius 129
alopecurus 131
alternifolius *ib.*
arenarius 130
articulatus 129
capitatus 130
cinnamomeus *ib.*
compactus *ib.*
complanatus 131
compressus 133
confertus 134
conglomeratus *ib.*
corymbosus 135
cruentus 132
denudatus *ib.*
difformis 133
diphyllus 130
distans 133
dubius 134
effusus 130
elatus 133
elegans *ib.*
esculentus 132
exaltatus *ib.*
fastigiatus 131
fastigiosus 134
ferrugineus 131
filiformis 134
flabelliformis 135
flavescens 133
flavidus 132
fuscus 133
glaber *ib.*
globosus 131
globulosus 135
glomeratus 133
gradatus 130
Halpan *ib.*
hirsutis *ib.*
Jaminicus 132
imbricatus 134
Iria 132

Cyperus
laevigatus 132
lateralis 129
leucocephalus 134
ligularis 132
longus 130
minimus 129
minutus 130
monostachyos 132
Monti 130
mucronatus 129
niloticus *ib.*
niteus 131
niveus 134
odoratus 133
Pangorei 131
paniculatus *ib.*
pannonicus 132
Papyrus 133
polystachyos 131
pumilus 133
pygmaeus 130
rotundus 132
Santonici 131
setaceus 129
spathaceus 132
sphacelatus 134
squarrosus 132
stoloniferus 134
strigosus 133
surinamensis 134
tenellus 129
tenuiflorus 131
tenuis 134
triflorus 133
tuberosus 131
umbellatus 135
viscosus 134
Cyphium 303, 370
capense 370
Cypripedium 21, 62
acaule 62
album *ib.*
Cypripedium
bulbosum *ib.*
Calceolus *ib.*
japonicum *ib.*
Cyrilla 303, 411
racemiflora 411
Cytinus 740, 745
Hypocistis 745
Cytisus 1075, 1078, 1114, 1115
argenteus 1114
austriacus *ib.*
Cajan *ib.*
capitatus *ib.*
folioloſus *ib.*
glaber *ib.*
graecus 1115
hirsutus 1114
Laburnum 1115
nigricans 1114
prolifer *ib.*
purpureus *ib.*
sessilifolius *ib.*
supinus *ib.*
tener 1115
violaceus *ib.*
Wolgaricus 1114
Dactylis 87, 184
capitata 184
ciliaris *ib.*
cynosuroides *ib.*
geniculata *ib.*
glomerata *ib.*
lagopoides *ib.*
patens *ib.*
Dais 659, 686, 687
cotinifolia 686
disperma 687
laurifolia *ib.*
octandra *ib.*
Dalbergia 1075, 1084
Lanceolaria 1084
Monetaria *ib.*
Dalechampia 1000, 1070
colorata 1070
scandens *ib.*
Daphne 602, 631, 632
alpina 631
altaica 632
buxifolia *ib.*
calicina 631
caucasica 632
Cneorum *ib.*
dioica 631
foetida 632
Gnidium *ib.*
indica *ib.*
Lagetto *ib.*
Laureola 631
Mezereum *ib.*
occidentalis *ib.*
odora 632
oleoides *ib.*
pontica 631
pubescens *ib.*
rotundifolia 632
sericea *ib.*
squarrosa *ib.*
Tartonraira 631
Thymelaea *ib.*
trifolia 632
vermiculata *ib.*
villosa 631
Datisca 743, 757
cannabina 757
hirta *ib.*
Datura 293, 378, 379
arborea 379
fastuosa

Datura
- faltuosa 379
- ferox 378
- laevis 379
- Metel ib.
- Stramonium ib.
- Tatula ib.

Daucus 308, 474
- *alatus* 474
- Carota ib.
- *divaricatus* ib.
- Gingidium ib.
- *gummifer* ib.
- lucidus ib.
- mauritanicus ib.
- muricatus ib.
- *polygamus* ib.
- Visnaga ib.

Decodon 656, 677
- *aquaticus* 677

DECUMARIA 742

749
- barbara 749

Deguelia 1076, 1085
- *scandens* 1085

DELIMA 772, 819
- sarmentosa 819

Delphinium 778, 837
- aconiti 837
- Ajacis ib.
- ambiguum ib.
- *carolinianum* ib.
- Consolida ib.
- elatum ib.
- *exaltatum* ib.
- granditlorum ib.
- *hybridum* ib.
- *intermedium* ib.
- peregrinum ib.
- puniceum ib.
- Staphisagria 837
- *virgeolatum* ib.

Demidofia 307, 458
- *repens* 458

Dentaria 968, 979
- bulbifera 979
- enneaphylla ib.
- pentaphylla ib.

Dentella 297, 370
- *repens* 370

Detarium 660, 700
- *senegalense* 700

DEUTZIA 651, 722
- scabra 722

Dialium 21, 27
- indum 27

Dianthera 20, 35-37
- americana 36
- *caerulea* ib.
- *clavata* ib.
- comata ib.
- *debilis* ib.
- *ensiformis* 37
- *eustachiana* 36
- *flava* ib.
- *hirsuta* 35
- *humifusa* 36
- *hyssopifolia* 37
- japonica 36
- *malabarica* ib.
- *martinicensis* ib.
- *nitida* 35
- *odora* 36
- *ovata* 37
- *paniculata* 36
- *pectoralis* ib.
- *punctata* ib.
- *reptans* ib.
- sessilis 35
- *sulcata* 36
- *trisulca* ib.
- *verticillata* 36
- *violacea* ib.

Dianthera 661, 710-712
- *albens* 711
- alpinus 712
- arboreus ib.
- arenarius 711
- Armeria 710
- *atro-rubens* ib.
- barbatus ib.
- *carolinianus* ib.
- Carthusianorum ib.
- Caryophyllus 711
- deltoideus ib.
- diminutus ib.
- ferrugineus 710
- fruticosus 712
- *glacialis* 711
- glaucus ib.
- japonicus 710
- monspeliacus 711
- *moschatus* ib.
- plumarius ib.
- pomeridianus ib.
- prolifer 710
- *pumilus* 711
- pungens 712
- rupestris 711
- silvestris ib.
- smensis ib.
- superbus ib.
- virgineus 712

Diapensia 294, 325
- japonica 325

Dichondra 307, 457, 458
- *repens* 457
- *sericea* 458

Dicksonia 1283, 1314
arborescens 1314
Culcita *ib.*
Dictamnus 655, 676
albus 676
capensis *ib.*
Didelta 1165, 1263
tetragoniaefolia 1263
Digera 300, 408
arvensis 408
Digitalis 889, 939, 940
ambigua 940
canariensis *ib.*
ferruginea 939
lutea *ib.*
minor *ib.*
obscura *ib.*
purpurea *ib.*
Sceptrum 940
Thapsi 939
Dilatris 82, 119
paniculata 119
umbellata *ib.*
viscosa *ib.*
Dillenia 783, 866
indica 866
Diodia 214, 235, 236
prostrata 236
sarmentosa *ib.*
scandens *ib.*
simplex 235
teres 236
tetragona *ib.*
virginica 235
DIONAEA 658, 685
Muscipula 685
Dioscorea 527, 581, 582
aculeata 582
alata *ib.*
bulbifera 582
japonica 581
oppositifolia 582
pentaphylla 581
quaternata *ib.*
quinata *ib.*
quinqueloba *ib.*
sativa *ib.*
septemloba *ib.*
trifida *ib.*
triphylla *ib.*
villosa *ib.*
Diosma 301, 408-410
barbigerum 410
bifidum 409
capense *ib.*
ciliatum *ib.*
corymbosum *ib.*
crenatum *ib.*
cupressinum *ib.*
ericoides *ib.*
hirsutum *ib.*
imbricatum *ib.*
lanceolatum *ib.*
latifolium *ib.*
marginatum 410
odoratissimum 409
oppositifolium *ib.*
pulchellum *ib.*
rubrum *ib.*
succulentum 408
tetragonum 410
unicapsulare 409
uniflorum *ib.*
villosum 410
Diospyros 601, 617
Ebenum 617
glaberrima *ib.*
hirsuta *ib.*
Kaki *ib.*
Lotus *ib.*
tetrasperma 617
virginiana *ib.*
Diphysa 1077, 1117
carthagenensis 1117
Dipsacus 210, 227
fullonum 227
laciniatus *ib.*
pilosus *ib.*
silvestris *ib.*
Dirca 602, 632
palustris 632
DISA 21, 62
grandiflora 62
longicornis *ib.*
maculata *ib.*
racemosa *ib.*
DISANDRA 593, 595
prostrata 595
Disperma 885, 892
repens 892
Dodartia 889, 955
indica 955
orientalis *ib.*
DODECAS 741, 751
surinamensis 751
Dodecatheon 292, 328
Meadia 328
DODONAEA 601, 618
angustifolia 618
viscosa *ib.*
Dolichos 1075, 1077, 1102-1105
acinaciformis 1103
altissimus 1104
aristatus 1103
benghalensis 1102
biflorus

Dolichos
biflorus 1105
bulbosus 1104
capensis 1103
Catjang 1105
cultratus 1104
Didice *ib.*
ensiformis 1103
Faba indica 1104
Faba nigrita 1102
filiformis 1104
funarius *ib.*
gladiatus 1103
incurvus *ib.*
Lablab *ib.*
lignosus *ib.*
lineatus 1104
Lubia 1105
luteolus 1103
luteus *ib.*
minimus 1104
polystachyos 1103
pruriens 1104
pugioniformis 1105
purpureus 1104
repens 1105
reticulatus 1104
roseus *ib.*
scarabaeoides *ib.*
sesquipedalis 1103
sinensis *ib.*
Soja 1105
tetragonolobus 1103
tranquebaricus *ib.*
trilobus 1104
unguiculatus 1103
urens 1104

Doliocarpus 774, 805
Calinea 805
major *ib.*
Rolandri *ib.*

Dombeya 887, 956
lapponica 956
DORAENA 293, 329
japonica 329
Doronicum 1164, 1243
acaule 1243
altaicum *ib.*
Bellidiastrum *ib.*
laevifolium *ib.*
Pardalianches *ib.*
plantagineum *ib.*
ramosum *ib.*
Dorstenia 217, 265
caulescens 265
Contragenea *ib.*
cordifolia *ib.*
Drakena *ib.*
Houstoni *ib.*
lucida *ib.*
pubescens *ib.*
Draba 967, 970, 971
alpina 971
caroliniana *ib.*
ciliaris *ib.*
fladnizensis *ib.*
hirta *ib.*
incana *ib.*
muralis *ib.*
pyrenaica *ib.*
verna 970
Dracaena 525, 558
australis 558
borealis *ib.*
Draco *ib.*
ensifolia *ib.*
erecta *ib.*
ferrea *ib.*
graminifolia *ib.*
indivisa *ib.*
marginata *ib.*
medeoloides *ib.*

striata 558
terminalis *ib.*
undulata *ib.*
volubilis *ib.*
Dracocephalum 886, 915
austriacum 915
canariense *ib.*
canescens *ib.*
denticulatum *ib.*
grandiflorum *ib.*
Moldavica *ib.*
nutans *ib.*
peltatum *ib.*
peregrinum *ib.*
pinnatum *ib.*
Ruyschiana *ib.*
sibiricum *ib.*
thymiflorum *ib.*
virginianum *ib.*
Dracontium 593, 596, 597
camtschaticum 596
cordatum *ib.*
foetidum *ib.*
pentaphyllum 597
pertusum *ib.*
polyphyllum 596
Quebitea *ib.*
scandens 597
spinosum 596
Drosera 313, 514, 515
acaulis 514
anglica 515
capensis *ib.*
ciliflora *ib.*
cuneifolia 514
indica 515
longifolia 514

Drosera
lusitanica 515
rotundifolia 514
Dryandra 997, 1014
cordata 1014
Dryas 781, 861
anemonoides 861
geoides *ib.*
octopetala *ib.*
Drypis 311, 507
spinosa 507
Dugortia 775, 816
nucamentosa 816
Duranta 960
Ellisia *ib.*
Mutisia *ib.*
Plumieri *ib.*
Durio 1149, 1154
Zibethinus 1154
Duroia 523, 574
Eriopila 574

Ebenus 1076, 1100
cretica 1100
Echinophora 308 471
spinosa 471
tenuifolia *ib.*
Echinops 1167, 1280
Ritro 1280
sphaerocephalus *ib.*
spinosus *ib.*
strigosus *ib.*
Echites 294, 436-437
agglutinata 436
annularis 437
asperuginis 437
biflora *ib.*
bispinosa 437
caudata *ib.*
circinalis 436
corymbosa *ib.*
costata 437
difformis 436
domingensis *ib.*
floribunda *ib.*
heterophylla 437
quinquangularis 438
repens *ib.*
scholaris 437
semidigyna 436
siphylitica 437
spicata *ib.*
suberecta 436
succulenta 437
torulosa 436
trifida *ib.*
umbellata 437

Echium 291, 322, 323
argenteum 323
candicans 322
capitatum 323
creticum *ib.*
fruticosum 322
giganteum *ib.*
glaucophyllum 323
italicum *ib.*
laevigatum *ib.*
lusitanicum *ib.*
orientale *ib.*
plantagineum *ib.*
rubrum *ib.*
rusticum *ib.*
spicatum *ib.*
strictum 322
violaceum 323
vulgare *ib.*

Eckebergia 656, 680
capensis 680
Ecliptai 1165, 1255
erecta 1255
latifolia *ib.*
prostrata *ib.*
punctata *ib.*
sessilis *ib.*
Ehretia 295, 393, 394
Beurreria 394
dubia *ib.*
exsucca *ib.*
halimifolia 393
internodis 394
linifolia *ib.*
spinosa 393
virgata *ib.*
Ehrharta 524, 549
Banksii 549
capensis *ib.*
punicea *ib.*
Elaeagrus 218, 275, 276
angustifolia 275
crispa *ib.*
glabra *ib.*
latifolia *ib.*
macrophylla 276
multiflora 275
orientalis *ib.*
pungens 276
spinosa *ib.*
umbellata *ib.*
Elaeis 521, 568
guineensis 568
Elaeocarpus 775, 816, 817
copallifera 817
Dicera 816
oblonga

Elaeocarpus
oblonga 817
ſerrata 816
Elaeodendrum 301, 417
orientale 417
Elate 83, 94
ſilveſtris 94
Elaterium 2, 11
carthaginenſe 11
trifoliatum *ib.*
Elatine 603, 643
Alſinaſtrum 643
Hydropiper *ib.*
Elephantopus 1167, 1279
anguſtifolius 1279
ſcaber *ib.*
ſpicatus *ib.*
tomentoſus *ib.*
ELLISIA 296, 330
Nyctelaea 330
Elymus 88, 197, 198
arenarius 197
canadenſis *ib.*
caninus 198
Caput Meduſae *ib.*
carolinianus *ib.*
europaeus *ib.*
Hyſtrix *ib.*
philadelphicus 197
ſibiricus *ib.*
ſubulatus 198
tener *ib.*
virginicus *ib.*
Embelia 217, 280
indica 280
EMBOTHRIUM 216, 279
coccineum 279
umbellatum *ib.*
Empetrum 90, 209
album 209
nigrum *ib.*
pinnatum *ib.*
Empleurum 217, 268
Aitoni 268
Enargea 524, 547
marginata 547
Encelia 1166, 1261
alternifolia 1261
Endrachium 293, 339
madagaſcarienſe 339
Enurea 741, 748
capreolata 748
EPACRIS 294, 336, 337
faſciculata 337
juniperina *ib.*
longifolia 336
pumila 337
rosmarinifolia *ib.*
Eperua 659, 672
falcata 672
Ephedra 997, 1013
aphylla 1013
diſtachya *ib.*
monoſtachya *ib.*
Ephielis 598, 611
gujanenſis 611
Epichyſium 1460
argenteum *ib.*
Epidendrum 21, 63-69
alvifolium 68
alpeſtre 69
altiſſimum 67
amabile 68
anceps 65
anguſtifolium 66
autumnale 64
bifidum 68
biflorum 64
capenſe 68
carinatum *ib.*
caudatum 63
ciliare 65
clavicularatum 63
Clypeolus 66
cochlearifolium 69
cochleatum 68
coccineum 63
corniculatum 67
criſpatum 64
cucullatum 65
diffuſum *ib.*
echinocarpon 66
elongatum *ib.*
equitans 64
Faſciola 66
filiforme 69
flabelliforme 67
Flos aëris 63
fragrans 66
funale 69
furvum 63
glaucum 64
globoſum 65
graminifolium 69
graminoides 64
guttatum 68
juncifolium *ib.*
labiatum 67
Lanceola *ib.*
laxum 69
lineare 63
maculatum 68
micranthum 69
minimum 68
minutum *ib.*
moniliforme *ib.*
montanum 65
Myoſuros 64
nocturnum 65

Epidendrum
nodosum 66
nutans 64
ophioglossoides 69
ovale *ib.*
ovatum 63
palmifolium 66
polybulbon *ib*
prolliferum 64
pulchellum 69
punctatum 63
pusillum 68
racemiflorum 69
ramosum 63
resupinatum 64
retusum 68
rigidum 65
ruscifolium 69
sanguineum 66
Satyrioides 67
scriptum 68
secundum 63
serrulatum 65
Sertularioides *ib.*
sessile 67
spatulatum 63
subulatum 67
tenuifolium 63
teretifolium 65
teres *ib.*
testaefolium 66
tetrapetalum 67
tribuloides *ib.*
trichocarpon 66
tridentatum 69
triquetrum 67
triste 64
tuberosum 68
umbellatum 66
umbelliferum 65
undulatum 67
utricularioides *ib.*
Vanilla 63

Epidendrum
variegatum 67
vestitum 64
vomeriforme *ib.*

Epigaea 659, 696
cordifolia 696
repens *ib.*

Epilobium 599, 607, 608
alpinum 608
angustifolium 607
Dodonaei 608
glabellum *ib.*
hirsutum *ib.*
latifolium *ib.*
montanum *ib.*
obscurum *ib.*
palustre *ib.*
rotundifolium *ib.*
roseum *ib.*
tetragonum *ib.*

Epimedium 215, 256
alpinum 256

Equisetum 1283, 1288
arvense 1288
fluviatile *ib.*
giganteum *ib.*
hiemale *ib.*
limosum *ib.*
palustre *ib.*
pratense *ib.*
silvaticum *ib.*

Eraclissa 313, 520
hexagyna 520

Eranthemum 19, 27
angustifolium 27
capense *ib.*
parvifolium *ib.*
salsoloides *ib.*

Erica 601, 622-629
abietina 627
arborea *ib.*
articularis 626
australis 628
axillaris 623
baccans 628
Bergiana *ib.*
bicolor 626
bracteata 622
bryantha 623
calicina 628
capitata 623
cephalotes 625
cerinthoides 624
cernua 629
ciliaris 623
cinerea 628
coccinea 625
comosa *ib.*
concinna *ib.*
conspicua 624
corifolia 628
cruenta 626
cubica 625
curviflora 624
cylindrica *ib.*
Deboecia 622
dentata 625
depressa 626
empetrifolia 627
fastigiata 624
florida 627
formosa 628
fucata 622
glandulosa 624
glutinosa 626
gnaphalodes 628
grandiflora 624
halicacaba 626
herbacea 624
hirta 626
hispida 623

imbri-

Erica
imbricata 624
incarnata 628
inflata 627
leucanthera 623
lutea 626
mammosa 627
margaritacea 629
marifolia 626
Massoni 624
mediterranea *ib.*
melanthera 623
Monsoniana 626
mucosa 628
multiflora 625
nigrita 626
nudicaulis 625
obliqua 627
octophylla *ib.*
passerinae 623
persoluta 627
petiolata 622
Petiverii 623
physodes 628
pilulifera 627
pinea 625
planifolia 626
Plukenetii 623
pubescens 627
pulchella 625
purpurascens *ib.*
pyramidalis 624
racemosa *ib.*
ramentacea 629
regerminans 626
retorta 629
rubens 628
scoparia *ib.*
Sparrmanni 624
spicata 627
spumosa 623
strigosa 627
tenuifolia 622

Erica
tetragona 623
Tetralix 627
Thunbergii 623
Totta *ib.*
tubiflora 624
umbellata 623
urceolaris 626
vagans 625
ventricosa 624
verticillata 625
vestita *ib.*
virescens 626
virgata 623
viscaria 625
vulgaris 628

Erigeron 1164, 1222-1224
acre 1224
aegyptiacum 1223
alpinum *ib.*
bahamense *ib.*
bonariense 1224
camphoratum 1223
canadense *ib.*
carolinianum 1222
cymosum 1224
decurrens 1222
Droebachiense 1224
foetidum 1222
glandulosum 1223
glutinosum *ib.*
Gouani *ib.*
gramineum 1222
graveolens *ib.*
jamaicense 1224
japonicum 1223
incanum 1222
obliquum 1223
philadelphicum *ib.*
pilosum 1224
pinnatum *ib.*
purpureum 1223

Erigeron
rivulare 1224
scandens 1223
sericeum *ib.*
siculum 1224
squarrosum *ib.*
sumatrense 1223
tricuneatum 1224
tuberosum 1222
uniflorum 1224
viscosum 1223

Erinus 889, 951
africanus 951
alpinus *ib.*
capensis *ib.*
Lychnidea *ib.*
maritimus *ib.*
peruvianus *ib.*
tristis *ib.*

Eriocaulon 89, 206
amplexicaule 206
anceps *ib.*
decangulare *ib.*
fasciculatum *ib.*
quinquangulare *ib.*
serotinum *ib.*
setaceum *ib.*
sexangulare *ib.*
triangulare *ib.*

Eriocephalus 1166, 1277
africanus 1277
racemosus *ib.*

Eriophorum 84, 124
alpinum 124
cyperinum *ib.*
polystachyon *ib.*
vaginatum *ib.*
virginicum *ib.*

Erithalis 299, 376
fruticosa 376

Erithalis
inodora 376
polygama *ib.*
Ernodea 212, 244
litteralis 244
Eroteum 775
theoides
undulatum
Ervum 1075, 1078, 1112, 1113
erectum 1113
Ervilia *ib.*
hirsutum *ib.*
Lens *ib.*
monanthon 1112
solonienſe 1113
tetraſpermum *ib.*
volubile *ib.*
Eryngium 308, 466, 467
alpinum 467
americanum *ib.*
amethyſtinum *ib.*
aquaticum 466
Bourgati 467
campeſtre *ib.*
foetidum 466
maritimum 467
planum 466
puſillum *ib.*
tricuſpidatum *ib.*
Eryſimum 967, 983
Alliaria 983
Barbarea *ib.*
b. corne *ib.*
cheiranthoides *ib.*
hieracifolium *ib.*
hybridum *ib.*
officinale *ib.*
pinnatum *ib.*
polyceraton *ib.*
repandum *ib.*
Erythrina 1075, 1076, 1087
carnea 1087
Corallodendrum *ib.*
Criſta galli *ib.*
herbacea *ib.*
picta *ib.*
planiſiliqua *ib.*
Erythronium 525, 546
carolinianum 546
Dens canis *ib.*
Erythroxylum 662, 725, 726
areolatum 725
buxifolium 726
ferrugineum *ib.*
havanenſe 725
hypericifolium 726
laurifolium *ib.*
longifolium *ib.*
macrophyllum *ib.*
rufum 725
ſideroxyloides 726
ſquamatum 725
Escallonia 302, 418
myrtilloides 418
Ethulia 1162, 1197
bidentis 1197
conyzoides *ib.*
divaricata *ib.*
Sparganophora *ib.*
Struchium *ib.*
tomentoſa *ib.*
uniflora *ib.*
Eucalyptus 770, 790
obliqua 790
Euclea 742, 756
racemoſa 756
Eugenia 770, 787, 788
acutangula 788
aquea 787
baruenſis 788
carthagenenſis 787
cotinifolia 788
gujanenſis *ib.*
Jambos 787
latifolia *ib.*
malaccenſis *ib.*
Mini *ib.*
montana *ib.*
paniculata *ib.*
periplocifolia *ib.*
Pſeudopſidium *ib.*
racemoſa 788
ſinemarienſis *ib.*
undulata *ib.*
uniflora *ib.*
Euonymus 300, 407
americanus 407
atro-purpureus *ib.*
europaeus *ib.*
japonicus *ib.*
inermis *ib.*
latifolius *ib.*
Tobira *ib.*
verrucoſus *ib.*
Euparea 303, 332
amoena 332
Eupatorium 1162, 1197-1200
ageratoides 1200
album 1198
altiſſimum 1199
aromaticum 1200
caeleſtinum *ib.*
cannabinum 1199
chilenſe 1198
cinereum 1200

compo-

Eupatorium
compositifolium 1199
cordifolium 1200
Dalea 1198
foeniculoides 1199
fusco-rubrum 1198
battatum *ib.*
Houstoni *ib.*
hyssopifolium *ib.*
japonicum 1199
incarnatum 1200
ivaefolium *ib.*
linearifolium 1198
maculatum 1199
Marrubium 1198
micranthon *ib.*
microphyllum 1199
molle 1200
montanum *ib.*
myosotifolium *ib.*
nervosum 1199
odoratum 1200
parviflorum 1197
perfoliatum 1199
pilosum 1198
purpureum 1199
rigidum *ib.*
rotundifolium 1198
scabrum 1199
scandens 1198
sessilifolium *ib.*
sinense 1198
stoechadifolium 1200
syriacum 1199
triflorum 1198
trifoliatum 1199
urticaefolium 1200
villosum 1199
zeylanicum 1198

Euphorbia 743, 759-766
abyssinica 759
aculeata *ib.*
aleppica 765
amygdaloides 766
anacantha 760
angulata 765
antiquorum 759
Apios 763
articulata 761
Atota 762
balsamifera 760
belgradica 761
biumbellata 766
bombensis 761
canariensis 759
canescens 761
Caput Medusae 759
carniolica 764
cereiformis 759
Chamaesyce 761
Characias 766
Clava 760
corallioides 765
cordata 764
corollata 765
cotinifolia 760
cuneiformis 763
cyathophora *ib.*
Cyparissias 766
dendroides *ib.*
dichotoma 761
diffusa 763
divaricata *ib.*
dulcis 764
emarginata 766
epithymoides 764
Esula 766
exigua 763
falcata *ib.*
fimbriata 754
fruticosa *ib.*

Euphorbia
genistoides 764
Gerardiana 766
glabrata 760
glauca 764
graminea 762
granulata 761
helioscopia 765
heptagona 759
heterophylla 760
hiberna 766
hirta 762
hypericifolia *ib.*
hyssopifolia *ib.*
Ipecacuanhae 761
juncea 765
laeta 763
Lathyris *ib.*
linearis 761
linifolia 760
litterata 765
maculata 761
mammillaris 759
mauritanica 760
mellifera *ib.*
meloformis *ib.*
myrsinites 766
myrtifolia 761
nereifolia 759
nicaeensis 763
nudiflora 760
obliquata 762
oblitterata *ib.*
ocymoides 760
officinalis 759
orientalis 765
origanoides 762
palustris 766
Parelias 764
parviflora 761
Peplis *ib.*
peploides 762
Peplus 763

pistus

Euphorbia
picta 760
piloſa 765
pilulifera 762
pinea 765
piſcatoria 760
Pithyuſa 764
platyphyllos 765
polygoniſolia 761
portlandica 764
portulacoides 761
proſtrata 762
punctata 761
punicea 765
retuſa 763
roſea 762
ſaxatilis 764
ſegetalis *ib.*
Sequieri 766
ſerrata 765
ſeticornis 764
ſilvatica *ib.*
ſpinoſa *ib.*
taurinenſis *ib.*
terracina 763
thymifolia 762
Tiraculli 760
tithymaloides *ib.*
triaculeata 759
tuberoſa 763
verrucoſa 765

Euphoria 598, 611
ſinenſis 611

Euphraſia 888, 923, 924
cuneata 924
latifolia 923
linifolia 924
lutea 923
Odontites *ib.*
officinalis *ib.*
rubra *ib.*

Euphraſia
tricuſpidata 923
viſcoſa 924
EURYA 741, 750
japonica 750
Euryandra 778, 835
ſcandens 835
Evea 210, 231
gujanenſis 231
Evolvulus 312, 508
alſinoides 508
emarginatus *ib.*
gangeticus *ib.*
hederaceus *ib.*
linifolius *ib.*
numularius *ib.*
ſericeus *ib.*
tridentatus *ib.*
Exacum 212, 250, 251
albens 250
aureum *ib.*
cordatum 251
gujanenſe *ib.*
punctatum *ib.*
ramoſum *ib.*
ſpicatum *ib.*
tenuifolium *ib.*
Excaecaria 89, 203
Agallocha 203

Fabricia 770, 789
myrtifolia 789
Fagara 215, 258
acuminata 258
emarginata *ib.*
Euodia *ib.*
octandra *ib.*
pentandra *ib.*
Piperita *ib.*
Pterota *ib.*

Fagara
ſpinoſa 258
tragodes *ib.*
trifoliata *ib.*
zeylanica *ib.*
Fagelia 20, 40
flavicans 40
Fagonia 683
arabica *ib.*
cretica *ib.*
hiſpanica *ib.*
indica *ib.*
ſcabra *ib.*
FAGRAEA 296, 336
zeylanica 336
Fagus 743, 757, 758
Caſtanea 757
ferruginea 758
pumila *ib.*
ſilvatica *ib.*
Falcata 1078, 1131
caroliniana 1131
FALCKIA 526, 580
repens 580
Faramea 212, 279
corymboſa 279
ſeſſiliflora *ib.*
Fernelia 213, 244
mauritiana 244
Ferraria 81, 119
pavonia 119
undulata *ib.*
Ferula 309, 478, 479
Aſſa foetida 479
canadenſis *ib.*
communis 478
Ferulago *ib.*
glauca *ib.*
meoides *ib.*
nodiflora 479
orientalis 478

Ferula
persica 479
tingitana 478
villosa 479

Festuca 88, 185-188
amethystina 186
arundinacea 187
bromoides 185
calicina 187
cinerea 186
cristata 187
dichotoma ib.
dumetorum 186
duriuscula ib.
elatior ib.
fasciculata ib.
fluitans 187
fulca ib.
heterophylla ib.
Halleri 186
indica 187
lanceolata 188
misera 187
monostachya 188
mucronata 187
multiflora 188
myuros 186
nemorum ib.
octoflora 188
ovina 185
pauciflora 187
phoenicoides 186
picta 187
pumila 186
quadriflora 188
reptatrix 186
rubra 187
sciuroides 186
silvatica 187
spadicea 186
speciosa 187
spinosa 188

Festuca
triflora 187
varia ib.

Feuillea 310, 500
cordifolia 500
trilobata ib.

Ficus 83, 96-99
americana 98
aspera ib.
bengalensis 96
benjamina ib.
capensis 99
Carica 96
Chanas 97
cordata 98
coriacea 97
costata 96
drupacea 99
falcata 98
Granatum ib.
heterophylla 97
hispida ib.
indica 96
lucida ib.
maculata 97
microcarpa ib.
morifolia 97
nymphaeifolia 96
obliqua 98
palmata 97
pedunculata 96
pertusa 97
prolixa 98
pumila 97
punctata 98
racemosa 97
religiosa 96
reticulata 99
retusa 97
scabra 98
septica ib.
serrata 97

Ficus
sinuata 99
stipulata 98
Sur 97
Sycomorus 96
Taab 98
Toka ib.
toxicaria 97
trigona ib.
vasta ib.
venosa 96
virens ib.

Filago 1166, 1278
acaulis ib.
arvensis ib.
gallica ib.
germanica ib.
Leontopodium ib.
montana ib.
pyramidata ib.

Fissilia 82, 93
psittacorum 93

Fiwa 740, 745
japonica 745

Flacourtia 780, 852
Ramontchi 852

Flagellaria 527, 586
indica 586

Flaveria 1166, 1269
chilensis 1269
peruviana ib.

Foetidia 771, 793
borbonica 793

Fontinalis 1084, 1324
albicans 1324
alpina ib.
antipyretica ib.
capillacea ib.
crispa ib.

disticha

Fontinalis
distica 1324
minor *ib.*
squamosa *ib.*
Forgesia 297, 353
racemosa 353
Forskahlea 663, 738
angustifolia 738
candida *ib.*
tenacissima *ib.*
FORSTERA 21, 70
sedifolia 70
Forsythia 776, 808
scandens 808
FOTHERGILLIA 777, 839
alnifolia 839
Fragaria 781, 857
monophylla 857
vesca *ib.*
Frankenia 522, 577
hirsuta 577
laevis *ib.*
pulverulenta *ib.*
revoluta 578
Franklinia 775, 810
americana 810
Fraseria 215, 256
carolinienſis 256
Fraxinus 22, 75
americana 75
excellior *ib.*
integrifolia *ib.*
novae Angliae *ib.*
Ornus *ib.*
pubescens *ib.*
rotundifolia *ib.*
Fritillaria 525, 545, 546
imperialis 545
Meleagris *ib.*
Fritillaria
nana 546
persica 545
punctata *ib.*
pyrenaica *ib.*
regia 546
Fuchsia 601, 617
coccinea 617
excorticata *ib.*
involucrata *ib.*
multiflora *ib.*
triphylla *ib.*
Fucus 1285, 1380-1390
abrotanifolius 1385
abrotanoides 1382
aceroſus 1389
acinarius 1380
aculeatus 1384
Agarum 1390
alatus 1387
albus 1384
angulatus 1383
anguſtifolius 1389
aphyllanthos 1385
articulatus 1381
baccatus 1382
Bailloviana 1386
Baſtera *ib.*
bicornis 1388
bifidus 1389
bracteatus 1390
buccinalis 1389
Burſa paſtoris 1383
canaliculatus 1381
capillaceus 1384
capitatus 1383
cartilagineus 1385
ceranoides 1380
ceſpitoſus 1386
ciliatus *ib.*
Clathrus 1390
concatenatus 1382
Fucus
confervoides 1384
contortus 1387
corallioides 1384
corneus *ib.*
corymbiferus 1383
crenatus 1388
crinitus 1386
crispatus 1387
crispus *ib.*
cuneiformis 1389
debilis *ib.*
dentatus 1383
denticulatus 1381
digitatus 1388
discors 1384
distichus 1381
divaricatus 1380
edulis 1382
elongatus 1381
ericoides 1384
esculentus 1389
fastigiatus 1383
filicinus 1388
Filum 1384
Flagellum 1389
flavus 1390
foeniculaceus 1382
foliifer 1388
fragilis 1389
fruticuloſus *ib.*
furcellatus 1383
Guertnera 1386
geniculatus 1381
gigartinus 1386
glacialis 1388
granulatus 1382
hirsutus 1384
holoſetaceus 1387
hypnoides 1390
inflatus 1380
Koelreuteri 1388
laceratus 1387

lacinia-

Fucus
laciniatus 1388
laminosus *ib.*
lanolus 1383
lendigerus 1380
lichenoides 1383
ligulatus 1387
linearis 1388
longissimus 1384
loreus 1382
lycopodioides 1384
marginalis *ib.*
musciformis *ib.*
Myrica 1382
natans 1380
nodosus 1381
Osmunda 1385
ovarius 1380
palmatus 1389
Palmetta 1388
papillosus 1386
penicilliformis 1382
peucedanifolius 1381
Pilularia 1383
pinnatifidus 1385
pinnatus 1390
pistillatus 1386
plicatus 1385
plumaris 1388
plumosus 1385
polyphyllus 1389
polypodioides 1388
prolifer 1390
pseudoceranoides 1383
purpureus 1384
pyriferus 1381
racemosus 1382
ramentaceus 1387
Rosa marina 1381
rotundus 1383
rubens 1387
rudis 1385
saccharinus 1389
Fucus
salicifolius 1380
sanguineus 1387
scorpioides 1384
selaginoides 1382
sericeus 1385
Serra *ib.*
serratus 1380
serrulatus 1388
sertularioides 1385
seticulosus 1382
siliculosus 1381
siliquosus *ib.*
spermophorus 1386
spinosus *ib.*
spinulosus *ib.*
spiralis 1380
subrepandus 1381
Tendo 1384
triangularis 1383
trinodis 1382
triqueter 1382
truncatus 1388
turbinatus 1380
undulatus 1381
uvifer 1386
venosus 1387
vermicularis 1386
vesiculosus 1380
viridis 1383
viscidus 1389
vittatus 1387
volubilis *ib.*
FUIRENA 84, 123
paniculata 123
Fuligo 1287, 1466
capitata 1466
Lycoperdon *ib.*
panicea *ib.*
septica *ib.*
Fumaria 1075, 1079, 1080
acaulis 1080
Fumaria
bulbosa 1080
capnoides *ib.*
capreolata *ib.*
claviculata *ib.*
Cucullaria 1079
enneaphylla 1080
fungosa 1079
intermedia *ib.*
lutea 1080
minor *ib.*
nobilis 1079
officinalis 1080
Schaugini *ib.*
sempervirens *ib.*
spectabilis 1079
spicata 1080
vesicaria *ib.*
Gaertnera 656, 685
indica 685
GAHNIA 526, 578
procera 578
scheenoides *ib.*
Galanthus 523, 534
nivalis 534
Galardia 1165, 1259
alternifolia 1259
Galax 415
aphylla *ib.*
GALAXIA 995, 1005
graminea 1005
obscura *ib.*
ovata *ib.*
Galedupa 1076, 1086
Pungam 1086
Galega 1075, 1078, 1129-1131
caerulea 1130
capensis *ib.*

cani-

Galega
canibaea 1129
cinerea ib.
dauurica 1130
filiformis 1131
littoralis 1130
longifolia 1131
maxima 1130
ochroleuca ib.
officinalis 1129
pallens ib.
piscatoria 1130
pulchella ib.
purpurea ib.
senticosa ib.
spicata 1131
spinosa 1130
stricta ib.
tinctoria 1129
villosa 1130
virginica ib.
Galenia 602, 636
africana 636
procumbens ib.
Galeopsis 885, 905
cannabina 905
grandiflora ib.
Ladanum ib.
Tetrahit ib.
Galipea 887, 944
trifoliata 944
Galium 214, 237-240
anisophyllum 238
Aparine 240
aparinoides ib.
aristatum 239
asperum 238
austriacum ib.
bermudianum 240
Bocconi 238
boreale 239
cinereum 238
corrudaefolium 237
Galium
elatum 238
glaucum 239
graecum 240
hercynicum 238
hierotolymitanum 239
Jussieui 237
Linckii 240
linifolium 235
lucidum ib.
maritimum 240
megalospermum 238
minutum 239
Mollugo ib.
montanum 237
montium ib.
obliquum 238
palustre 237
parisiense 240
paschale 237
pilosum 240
purpureum 239
pusillum ib.
pyrenaicum 238
rigidum 239
rubioides 237
rubrum 239
saxatile 237
scabrum 239
silvaticum ib.
silvestre ib.
spurium ib.
tenue 238
tenuifolium ib.
tinctorium 237
trifidum ib.
tunetanum 240
uliginosum 237
verum 239
Walteri 237
Galopina 219, 281
circaeoides 281
Galvesia 888, 937
fruticosa 937
Garcinia 740, 748
celebica 748
cornea ib.
Mangostana ib.
Gardenia 298, 433-434
dumetorum 434
florida 433
gummifera ib.
jasminoides 434
lazifolia 433
micranthos 434
Mussaenda 433
Pandacaki 434
radicans 433
Rothmannia 434
scandens ib.
spinosa ib.
Thunbergia 433
uliginosa 434
Garidella 661, 722
Nigellastrum 722
Gastonia 744, 769
spongiosa 769
Gaura 599, 607
biennis 607
Geniostoma 377
rupestre ib.
Genipa 298, 388
americana 388
Genista 1075, 1076, 1090, 1091
anglica 1091
aspalathoides ib.
canariensis 1090
candicans ib.
florida ib.
germanica 1091
hirsuta ib.
hispanica ib.

humi-

Genista
humifusa 1090
linifolia ib.
lusitanica 1091
pendulina 1090
pilosa ib.
sagittalis ib.
sericea ib.
sibirica ib.
tinctoria ib.
tridentata ib.

Gentiana 307, 460-462
acaulis 460
Amarella 462
aphylla ib.
aquatica 461
asclepiadea 460
aurea 461
bavarica ib.
Cachanlahuan 462
campanulata 460
campestris 460
Catesbaei 461
Centaurium ib.
ciliata 462
Cruciata ib.
decumbens 461
elongata 462
exacoides ib.
exaltata 461
filiformis 462
frigida 461
heterodita 462
lutea 460
maritima 462
montana 461
nana ib.
nivalis ib.
pannonica 460
Pneumonanthe ib.
Porphyrio 462
prostrata ib.

Gentiana
pulchella 461
pumila ib.
punctata 460
purpurea ib.
pyrenaica ib.
quinquefolia 462
Saponaria 460
saxosa 461
scilloides 462
sessilis ib.
spicata ib.
tetragona ib.
utriculosa ib.
verna 461
verticillaris 462
verticillata ib.
villosa 460
viscosa 462

Geoffroya 1078, 1115
inermis 1115
spinosa ib.

Geranium 997, 1015-1026
abrotanifolium 1024
acerifolium 1022
acetosum 1021
aculeatum 1024
africanum 1022
alceoides 1024
alchimilloides 1021
alpinum 1020
althaeoides 1022
appendiculatum 1025
arabicum 1015
arduinum 1019
arenarium 1024
argenteum 1016
articulatum 1023
asphodeloides 1017
astragalifolium 1025

Geranium
auritum 1021
betrachioides 1017
betonicum 1024
betulinum 1021
bicolor 1023
biflorum 1022
bifolium ib.
bipinnatum 1018
bohemicum 1016
Botrys 1018
capillare 1025
capitatum 1023
carnosum 1024
carolinianum 1016
chaerophyllum 1019
chium ib.
ciconium ib.
cicutarium 1020,
ciliatum 1021
cinereum 1016
columbinum ib.
cordifolium 1021
coriandrifolium 1025
cotyledonis 1022
crassifolium 1018
crassum 1025
crispum 1023
cucullatum 1022
daucifolium 1025
dissectum 1016
elongatum 1020
emarginatum 1015
exstipulatum 1023
ferulaceum 1025
flavum 1026
fruticosum 1025
fulgidum 1024
fuscum 1017
gibbosum 1024
glandulosum 1020
glaucophyllum 1019

Geranium
glaucum 1021
grossularioides 1022
gruinum 1018
heliotropioides *ib.*
hermannifolium 1022
hirsutum 1023
hirtum 1020
hispidum 1023
humile 1016
hybridum 1021
ibericum 1017
incanum 1016
incarnatum 1019
inquinans 1022
lacerum 1018
laciniatum 1019
laevigatum 1024
lanceolatum 1021
littoreum 1019
lobatum 1024
longifolium 1021
lucidum 1018
lupinoides 1016
macrorhizon 1017
maculatum *ib.*
malacoides 1018
marginatum 1020
maritimum 1018
minimum 1025
molle *ib.*
montanum 1016
moschatum 1019
murcicum *ib.*
myrrhifolium 1025
nodosum 1017
odoratissimum 1022
oenotherae 1021
ovatum *ib.*
oxaloides *ib.*
palmatum 1018
palustre 1017
papilionaceum 1022
parvulum 1015
peltatum 1020
petraeum *ib.*
phaeum 1017
pilosum 1022
pimatifidum 1024
pinnatum 1025
praecox 1018
pratense 1017
proliferum 1025
prostratum 1015
pulverulentum 1019
pusillum 1016
pyrenaicum *ib.*
quercifolium 1023
ramosissimum 1025
ranunculoides 1015
reflexum 1017
Reichardi 1015
revolutum 1024
robertianum 1018
romanum 1020
rotundifolium 1018
rupestre 1020
sanguineum 1015
scabrum 1023
sessiliflorum 1015
sibiricum *ib.*
silvaticum 1017
spinosum 1015
stipulaceum 1022
striatum 1017
tubulare 1020
terebinthinaceum 1023
ternatum 1024
tetragonum 1020
triangulare 1019
trifidum 1023
trifolium 1019
triste 1025
tuberosum 1015
variegatum 1023
villosum 1025
viscosum 1023
vitifolium *ib.*
zonale 1020

Gerardia 889, 927, 928
delphinifolia 928
erecta *ib.*
flava 927
glutinosa *ib.*
japonica *ib.*
nigrina *ib.*
pedicularia *ib.*
purpurea 928
scabra *ib.*
setacea *ib.*
tuberosa 927
tubulosa 928

Gerbera 647, 652
recentior 652

Geropogon 1161, 1168
caliculatus 1168
glaber *ib.*
hirsutus *ib.*

Geruma 301, 411
alba 411

Gesneria 888, 929, 930
acaulis 930
calicina *ib.*
corymbosa 929
exserta *ib.*
grandis 930
humilis *ib.*
pulchella 929
pumila *ib.*
scabra *ib.*

tomen-

Gesneria
tomentosa 929
ventricosa *ib.*
GETHYLLIS 524, 564
ciliaris 564
lanceolata *ib.*
spiralis *ib.*
villosa *ib.*
Geum 781, 860, 861
album 861
aleppicum 860
canadense *ib.*
carolinianum 861
hybridum *ib.*
japonicum 860
montanum 861
reptans *ib.*
rivale *ib.*
urbanum 860
virginianum *ib.*
Gevuina 891, 966
Avellana 966
Ghinia 20, 37
Tamonea 37
Gilibertia 656, 682
decandra 682
heterophylla *ib.*
oppositifolia *ib.*
ovata *ib.*
Ginannia 647, 653
guianensis 653
GINORA 741, 754
americana 754
GISECKIA 312, 515
pharnacioides 515
GLABRARIA 1149, 1153
tersa 1153
Gladiolus 82, 110-112
alatus 110
alopecuroides 111
anceps *ib.*
angustus *ib.*
blandus *ib.*
capitatus 112
carinatus 111
carneus *ib.*
communis 110
crispus 112
falcatus *ib.*
flavus 111
flexuosus *ib.*
gramineus 112
imbricatus 110
junceus 112
latifolius *ib.*
Lomenia *ib.*
longiflorus 111
marginatus 112
montanus 111
plicatus 110
ramosus 111
recurvus 110
securiger 111
spathaceus 112
spicatus 111
strictus 112
sulphureus 111
tenellus 112
tristis 111
tubiflorus 112
undulatus 110
viridis *ib.*
Watsonius 111
Glandularia 886, 920
carolinienſis 920
Glaux 304, 428
maritima 428
Glecoma 885, 904
hederaceum 904
Gleditschia 521, 566
inermis 566
triacantha *ib.*
Glinus 744, 768
crystallinus 768
dictamnoides *ib.*
lotoides *ib.*
setiflorus *ib.*
GLOBBA 21, 49
marantina 49
nutans *ib.*
uviformis *ib.*
Globifera 19, 32
Umbros 32
Globularia 210, 226
Alypum 226
bisnagarica *ib.*
cordifolia *ib.*
longifolia *ib.*
nudicaulis *ib.*
orientalis *ib.*
spinosa *ib.*
vulgaris *ib.*
Glochidion 82, 104
uniflorum 104
Glorioſa 525, 546
simplex 546
superba *ib.*
Glossopetalum 312, 510
glabrum 510
tomentosum *ib.*
GLUTA 301, 417
Benghas 417
Glycina 1075, 1078, 1105, 1106
Apios 1106
bituminosa *ib.*
caribaea *ib.*
comosa *ib.*
debilis 1105

Glycina
frutescens 1106
javanica ib.
labialis ib.
lucida ib.
monoica 1105
monophylla ib.
numularia 1106
phaseloides 1105
reticulata ib.
rosea 1106
striata ib.
suaveolens ib.
subterranea 1105
tomentosa 1106
triloba ib.
villosa 1105

Glycyrrhiza 1075, 1077, 1117
asperrima 1117
echinata ib.
glabra ib.
hirsuta ib.

Gmelina 888, 944
asiatica 944
coromandeliana ib.
indica ib.

Gnaphalium 1163, 1213-1218
albescens 1215
alpinum 1216
americanum ib.
appendiculatum 1213
arabicum 1216
arboreum 1213
arenarium 1215
cinereum 1216
coronatum 1213
crassifolium 1214
crispum 1215
cuneifolium 1216

Gnaphalium
cylindricum 1215
cymosum ib.
declinatum 1217
dentatum 1214
denudatum 1216
dioicum ib.
discolorum 1213
ericoides ib.
eximium ib.
foetidum 1215
Forskohlii 1214
fruticans 1213
glomeratum 1217
grandiflorum 1213
helianthemifolium 1216
hiemale 1218
hispidum 1214
japonicum 1218
ignescens 1214
imbricatum 1215
indicum 1216
involucratum 1217
lanatum ib.
luteo-album 1215
margaritaceum 1216
maritimum 1214
milleflorum ib.
mucronatum ib.
muricatum 1213
norwegicum 1217
nudifolium 1215
nudum 1217
obtusifolium 1216
Oculus cati 1217
odoratissimum 1215
orientale 1214
patulum ib.
pedunculare 1215
petiolatum 1214
pilescellum 1217
plantagineum 1216

Gnaphalium
purpureum 1216
radiatum 1217
repens 1214
rutilans 1215
sanguineum ib.
serratum 1214
silvaticum 1217
spicatum ib.
squarrosum 1216
stellatum ib.
Stoechas 1214
supinum 1217
tegetifolium 1213
tomentosum 1217
trinerve 1213
uliginosum 1217
umbellatum 1214
undatum 1213
undulatum 1215
uniflorum 1215
verticillatum 1217
Vira vira 1215

Gnetum 995, 1003
Gnemon 1003

Gnidia 600, 633
acerosa 633
capitata ib.
daphnaefolia ib.
filamentosa ib.
imbricata ib.
oppositifolia ib.
pinifolia ib.
polystachya ib.
radiata ib.
sericea ib.
simplex ib.
tomentosa ib.

GOMOZIA 219, 286
granadensis 286

Gom-

Gomphrena 305, 455
arborescens 455
brasilienſis ib.
flava ib.
globoſa ib.
hiſpida ib.
interrupta ib.
perennis ib.
ſerrata ib.
Gonocarpus 218, 276
micranthus 276
Gordonia 999, 1069
Laſianthus 1069
pubeſcens ib.
Gorteria 1165, 1262
Aſteroides 1262
barbata ib.
cernua ib.
ciliaris ib.
echinata ib.
herbacea ib.
hiſpida ib.
perſonata ib.
rigens ib.
ſetoſa ib.
ſpinoſa ib.
ſquarroſa ib.
uniflora ib.
Goſſypium 1000, 1059, 1060
arboreum 1059
barbadenſe ib.
eglanduloſum ib.
herbaceum ib.
hirſutum ib.
indicum ib.
latifolium 1060
micranthum 1059
peruvianum ib.
religioſum ib.
rubrum ib.
vitifolium ib.
Gouania 304, 432
domingenſis 432
Grangeria 771, 796
borbonica 796
Granularia 1487
piſiformis ib.
Gratiola 19, 37, 38
acuminata 38
betonicifolia ib.
grandiflora ib.
hyſſopioides 37
inaequalis 38
lobelioides ib.
Monnieria 37
officinalis ib.
oppoſitifolia 38
peruviana ib.
ramoſa ib.
repens ib.
rotundifolia 37
virginiana 38
Greggia 774
aromatica ib.
Grewia 775, 817, 818
aſiatica 818
Microcos ib.
occidentalis 817
orientalis 818
Grias 774, 814
cauliflora 814
Grielum 663, 733
tenuifolium 733
Griſelinia 310, 493
lucida 493
Grislea 600, 612
ſecunda 612
Gronovia 303, 421
ſcandens 421
Grubbia 599, 629
capenſis 629
Guajacum 656, 673, 674
dubium 674
officinale 673
ſanctum ib.
Gualtheria 659, 697
antipoda 697
procumbens ib.
Guapira 522, 574
guianenſis 574
Guapurum 771, 793
peruvianum 793
Guarea 600, 614
trichilioides 614
Guettarda 521, 566
elliptica 566
membranacea ib.
rugoſa ib.
ſpecioſa ib.
Gujera 656, 675
ſenegalenſis 675
Guilandina 655, 672, 673
Bonduc 672
Bonducella 673
Nuga ib.
Gundelia 1167, 1281
Tournefortii 1281
Gunnera 22, 76
perpenſa 76
Gustavia 999, 1038
angusta 1038

Gymnanthes 995, 1005
elliptica 1005
lucida *ib.*
Gymnocarpos 304, 429
decandrus 429
Gynopogon 295, 430
Alyxia 430
ſcandens *ib.*
ſtellatus *ib.*
Gypſophila 661, 708, 709
adſcendens 709
alpina *ib.*
altiſſima *ib.*
faſtigiata *ib.*
muralis *ib.*
paniculata *ib.*
perfoliata 708
proſtrata *ib.*
repens 709
rigida *ib.*
ſaxifraga *ib.*
Struthium *ib.*
viſcoſa *ib.*

Haemanthus 523, 534
carinatus 534
coccineus *ib.*
pubeſcens *ib.*
puniceus *ib.*
Haematoxylon 656, 677
campechianum 677
Hagenia 598, 613
abyſſinica 613
Haleſia 740, 749
diptera 749
tetraptera *ib.*
Halleria 887, 943
lucida 943
Haloragis 603, 643
alata 643
proſtrata *ib.*
Hamadryas 783, 876
magellanica 876
Hamamelis 218, 281, 282
androgyna 281
dioica 282
monoica *ib.*
Hamellia 299, 366
axillaris 366
chryſantha *ib.*
grandiflora *ib.*
patens *ib.*
ventricoſa *ib.*
Hartogia 215, 278
capenſis 278
Haſſelquiſtia 309, 471
aegyptiaca 471
cordata *ib.*
Hebe 19, 27
magellanica 27
Hebenſtreitia 887, 950, 951
ciliata 950
cordata *ib.*
dentata *ib.*
erinoides 951
fruticoſa *ib.*
integrifolia 950
Hedera 302, 420, 421
Helix 420
nutans 421
pendula *ib.*
quinquefolia 420
Hedwigia 601, 614
balſamifera 614
Hedycaria 781, 862
dentata 862
Hedycrea 304, 428
incana 428
Hedychium 1, 9
coronarium 9
Hedyoſmum 772, 826
arboreſcens 826
nutans *ib.*
Hedyotis 213, 232
americana 232
Auricularia *ib.*
fruticoſa *ib.*
graminifolia *ib.*
herbacea *ib.*
hiſpida *ib.*
maritima *ib.*
pumila *ib.*
rupeſtris *ib.*
umbellata *ib.*
Hedyſarum 1075, 1077, 1121-1127
adſcendens 1124
Alhagi 1122
alpinum 1126
argenteum 1125
axillare 1124
barbatum 1123
biarticulatum *ib.*
bupleurifolium 1122
canadenſe 1123
caneſcens 1125
canum 1124
Caput galli 1126
caudatum 1123
cornutum 1126
coronarium *ib.*
crinitum *ib.*

Hedysarum
Crista galli 1126
diphyllum 1122
distortum 1125
flexuosum 1126
fruteſcens 1124
gangeticum 1122
glumaceum 1121
gramineum *ib.*
grandiflorum 1125
gujanenſe *ib.*
gyrans *ib.*
heterocarpon 1123
hirſutum 1122
hirtum 1124
humile 1126
imbricatum 1122
immaculatum 1127
incanum 1126
junceum 1125
lagopodioides 1123
lappaceum 1125
latebroſum 1122
lineatum 1123
maculatum 1122
marilandicum 1124
microphyllum *ib.*
moniliferum 1122
nudiflorum 1123
numulariifolium 1122
obſcurum 1127
Onobrychis 1126
paniculatum 1125
pictum 1127
piloſum 1124
pulchellum 1123
pumilum 1126
racemiferum 1125
racemoſum 1123
reniforme 1122
repens 1125
retroflexum 1123

Hedysarum
ſaxatile 1126
Scorpiurus 1123
ſericeum 1125
ſororium 1122
ſpartium 1126
ſpinoſiſſimum *ib.*
ſpirale 1124
ſtriatum 1123
ſtrobiliferum 1122
ſtyracifolium *ib.*
ſupinum 1124
tomentoſum 1125
tortuoſum 1124
triangulare *ib.*
triflorum 1125
trigonum 1126
triquetrum 1122
umbellatum 1123
vaginale 1126
veſpertilionis 1122
violaceum 1124
virgatum 1125
virginicum 1126
viridiflorum 1125
viſcidum 1123
volubile 1124

Heinzia 599, 609
peregrina 609

Heiſteria 658, 686
coccinea 686

Helenium 1164, 1244
aeſtivale 1244
auctumnale *ib.*
pubeſcens *ib.*
ſerotinum *ib.*
vernale *ib.*

Helianthus 1165, 1258 *ſq.*
altiſſimus 1258

Helianthus
anguſtifolius 1259
annuus 1258
atro-rubens *ib.*
decapetalus *ib.*
divaricatus *ib.*
frondoſus *ib.*
giganteus 1259
indicus 1258
laevis 1259
multiflorus 1258
ſtrumoſus 1259
thurifer *ib.*
tuberoſus 1258

Heliconia 303, 423
alba 423
Bihai *ib.*
hirſuta *ib.*
pſittacorum *ib.*
Strelizia *ib.*

Helicteras 662, 727
anguſtifolia 727
apetala *ib.*
baruenſis *ib.*
carthagenenſis *ib.*
Iſora *ib.*
pentandra *ib.*

Heliocarpus 742, 755
americana 755

Heliophila 968, 985, 986
amplexicaulis 985
circaeoides *ib.*
coronopifolia 986
digitata *ib.*
filiformis *ib.*
flava *ib.*
integrifolia 985

Heliophila
pinnata 986
pusilla ib.

Heliotropium 291, 314, 315
baccifera 314
coromandelianum ib.
curassavicum ib.
europaeum ib.
fruticosum ib.
gnaphalodes 315
hispidum 314
indicum ib.
inundatum ib.
lineatum ib.
malabaricum ib.
marifolium ib.
orientale 315
ovalifolium 314
parviflorum ib.
peruvianum ib.
scabrum ib.
supinum ib.

Helleborus 782, 882
foetidus 882
hiemalis ib.
niger ib.
trifolius ib.
viridis ib.

Helonias 527, 589
asphadeloides 589
bullata ib.
pumila ib.

Helotium 1287, 1442
agaricoides 1442
aureum ib.
cucullatum ib.
glabrum ib.
hirsutum ib.
unctuosum ib.

Helvella 1285, 1249-1251
aeruginosa 1450
atra ib.
atrata 1451
brunnea 1450
caliciformis ib.
cerasina ib.
ciliaris ib.
clavata ib.
cochleata ib.
coccinea 1451
fuliginosa 1449
gelatinosa ib.
hispida 1450
horizontalis ib.
lilacea 1450
mesenterica 1451
Mitra 1450
pallida 1451
pezizoides 1449
revoluta ib.
sulcata 1450
tremellina 1451
versicolor 1450

Hemerocallis 525, 565
cordata 565
flava ib.
fulva ib.
japonica ib.

HEMIMERIS 889, 939
diffusa 939
montana ib.
fabulosa ib.

Hemionitis 1283, 1300
japonica 1300
lanceolata ib.
lineata ib.
palmata ib.
parasitica 1300
reticulata ib.

Hepetis 522, 531
angustifolia 531

Heracleum 308, 480
alpinum 480
angustifolium ib.
austriacum ib.
longifolium ib.
Panaces ib.
pumilum ib.
sibiricum ib.
Sphondylium ib.
tuberosum ib.

Heritiera 81, 113
tinctorum 113

Hermannia 995, 1009-1011
alnifolia 1011
althaeifolia 1009
biserrata 1010
candicans ib.
capensis 1011
ciliaris 1010
denudata ib.
diffusa 1011
filifolia ib.
glabrata 1010
grossularifolia ib.
hyssopifolia ib.
incana ib.
involucrata ib.
lavandulifolia ib.
linifolia 1011
odorata 1010
plicata ib.
procumbens 1011
pulchella ib.
salvifolia 1010
scabra ib.
trifoliata 1011

Hermannia
trifurca 1010
triphylla 1011
veſicaria *ib.*
Hermas 308, 465
capitata 465
ciliata *ib.*
depauperata *ib.*
gigantea *ib.*
quinquedentata *ib.*
Hernandia 83, 95
gujanenſis 95
ovigera *ib.*
ſonora *ib.*
Herniaria 306, 448
fruticoſa 448
glabra *ib.*
hirſuta *ib.*
lenticulata *ib.*
Payco *ib.*
Heſperis 967, 986
acris 986
africana *ib.*
inodora *ib.*
lacera *ib.*
matronalis *ib.*
tatarica *ib.*
triſtis *ib.*
verna *ib.*
Heuchera 307, 459
americana 459
dichotoma *ib.*
Heymaſſoli 593, 629
inermis 629
ſpinoſa *ib.*
Hibiſcus 1000, 1062-1067
Abelmoſchus 1066
aculeatus 1067
acuminatus 1062
aethiopicus 1064
arenarius 1067
bifurcatus 1063
braſilienſis 1066
calyphyllus 1067
cannabinus 1063
clypeatus 1066
columnaris *ib.*
cordifolius 1065
digitatus 1063
diverſifolius *ib.*
domingenſis *ib.*
elatus 1066
eſculentus *ib.*
ferrugineus 1065
ficulneus 1063
flaveſcens 1066
fraternus 1067
gujanenſis *ib.*
haſtatus 1062
hirtus 1064
hiſpidulus 1067
laevis 1062
Lampas 1064
laſiocarpus 1065
liliflorus 1064
Manihot 1067
membranaceus 1065
micans 1066
micranthus 1064
microphyllus *ib.*
militaris 1071
Moſcheutos 1065
mutabilis 1066
ovalifolius 1064
ovatus 1062
palmatus 1066
paluſtris 1065
pedunculatus 1066
pentacarpos 1062
phoeniceus 1065
populneus 1064
praecox 1067
purpureus *ib.*
Hibiſcus
radiatus 1063
rhombifolius 1064
rigidus *ib.*
Roſa ſinenſis 1065
Sabdariffa 1066
ſenegalenſis 1065
ſinuatus 1063
ſororius 1065
ſpecioſus 1063
ſpicatus 1066
ſtriatus 1062
ſurattenſis 1063
ſyriacus 1066
ternatus 1067
tiliaceus 1063
tricuſpis 1064
trilobatus 1067
trilobus 1063
Trionum 1067
tripartitus *ib.*
tubuloſus 1065
unilateralis *ib.*
urens *ib.*
veſicarius 1067
virginicus 1062
vitifolius *ib.*
Hieracium 1161, 1176-1179
alpeſtre 1176
alpinum *ib.*
amplexicaule 1178
aurantiacum 1177
Auricula 1176
aurimontanum 1178
auſtriacum *ib.*
blattarioides *ib.*
capenſe 1176
cerinthoides 1178
chondrilloides *ib.*
cymoſum 1177
dichotomum 1179
dubium 1176

Hieracium
echioides 1177
flexuosum 1179
glutinosum *ib.*
Gmelini 1177
Gronovii *ib.*
helveticum 1178
hispidum 1177
humile *ib.*
incanum 1176
incarnatum 1177
Kalmii *ib.*
lactucaceum *ib.*
lyratum 1178
molle 1179
murorum 1178
paludosum *ib.*
paniculatum *ib.*
Pilosella 1176
pilosum 1178
pontanum 1177
porrifolium 1178
praemorsum 1176
pumilum *ib.*
pyrenaicum 1178
rhomboidale 1179
sabaudum 1177
sanctum *ib.*
Sprengerianum 1178
squamosum 1179
staticefolium 1177
stipitatum *ib.*
taraxaconis 1176
umbellatum 1179
undulatum 1178
venosum 1176
villosum 1178
virosum 1179

Hillia 522, 576
longiflora 576
tetrandra *ib.*

HIPPIA 1166, 1277
frutescens 1277
integrifolia 1277
minuta *ib.*

Hippocratea 82, 107
comosa 107
volubilis *ib.*

Hippocrepis 1075, 1078, 1119
baleurica 1119
comosa *ib.*
multisiliquosa *ib.*
unisiliquosa *ib.*

Hippomane 995, 1003
biglandulosa 1003
Mancinella *ib.*
spinosa *ib.*

Hippomanica 656, 674
sessilifolia 674

Hippophae 218, 274
canadensis 274
rhemnoides *ib.*

Hippuris 2, 16
lanceolata 16
tetraphylla *ib.*
vulgaris *ib.*

Hiraea 662, 725
reclinata 725

Hirtella 301, 418, 419
americana 418
paniculata 419

Hoffmannia 213, 245
pedunculata 245

Hoitzia 294, 347
mexicana 347

Holcus 87, 172-174
Arduini 174
avenaceus 173
bistatus 172
bicolor 173
cafer 174
Dochna 173
Durra *ib.*
exiguus *ib.*
halepensis *ib.*
lanatus *ib.*
latifolius 172
laxus 173
mollis *ib.*
niger 174
odoratus 172
pertusus 173
racemosus *ib.*
saccharatus *ib.*
serratus *ib.*
Sorghum *ib.*
spicatus *ib.*
striatus *ib.*
Taff 174

Holosteum 90, 207
cordatum 207
diandrum *ib.*
hirsutum *ib.*
succulentum *ib.*
umbellatum *ib.*

Homalium 778, 836
racemosum 836
Rocoubea *ib.*

Honkenya 599, 609
Willdenovii 609

Hopea 1149, 1155
tinctoria 1155

Hordeum 88, 198, 199
bulbosum 199
distichon 198
geniculatum 199
hexastichon 198
imrinum 199
jubatum *ib.*
maritimum *ib.*

Hordeum
montanum 199
murinum *ib.*
nodoſum *ib.*
perverſum *ib.*
pratenſe *ib.*
ſecalinum *ib.*
vulgare 198
Zeocrithon 199
Horminum 886, 916
pyrenaicum 916
HORTENSIA 662, 722
japonica 722
Hottonia 293, 329
indica 329
paluſtris *ib.*
Houſtonia 214, 236
caerulea 236
longifolia *ib.*
purpurea *ib.*
puſilla *ib.*
Houttuynia 782, 883
cordata 883
HOVENIA 301, 410
dulcis 410
Hudſonia 740, 751
ericoides 751
Hugonia 998, 1014
Myſtax 1014
tomentoſa *ib.*
Humulus 305, 451
Lupulus 451
Hura 999, 1035
crepitans 1035
Hyacinthus 525, 560, 561
amethyſtinus 560
botryoides *ib.*
cernuus *ib.*
comoſus 561
convallarioides 560
corymboſus *ib.*
lanatus 561
monſtroſus 560
Muſcari *ib.*
non ſcriptus *ib.*
orientalis *ib.*
racemoſus *ib.*
revolutus *ib.*
romanus *ib.*
Hydnum 1285, 1438-1440
agaricoides 1439
Auriſcalpium *ib.*
Barba Jovis 1440
candidum 1439
carnoſum 1438
carolinianum 1440
clandeſtinum 1439
clathroides 1440
coralloides 1438
cyathiforme 1439
Erinaceus *ib.*
floriforme *ib.*
gelatinoſum *ib.*
hybridum *ib.*
hyſtricinum 1440
imbricatum 1438
mucidum 1440
Occarium 1439
ochraceum 1440
papyraceum *ib.*
paraſiticum 1439
pectiniforme *ib.*
repandum 1438
reſupinatum 1439
rubicundum *ib.*
ſericeum *ib.*
ſtalactticum 1440
ſuberoſum 1439
ſublamelloſum 1438
Hydnum
tomentoſum 1438
zonatum *ib.*
Hydrangea 661, 703
arboreſcens 703
Hydraſtis 782, 883
canadenſis 883
Hydrocharis 648, 654
Morſus ranae 654
Hydrocotyle 308, 467, 468
americana 467
aſiatica *ib.*
bidentata 468
cordata *ib.*
erecta *ib.*
glabrata *ib.*
hirſuta 467
moſchata *ib.*
natans *ib.*
ranunculoides 468
reniformis *ib.*
ſinenſis *ib.*
Solandra *ib.*
umbellata 467
villoſa 468
virgata *ib.*
vulgaris 467
Hydrolea 307, 458
quadrivalvis 458
ſpinoſa *ib.*
trigyna *ib.*
Hydrophora 1486
minima *ib.*
ſtercorea *ib.*
tenella *ib.*
HYDROPHYLAX 213, 260
maritima 260

cana-

Hydrophyllum 292, 330
canadense 330
virginicum *ib.*
Hymenaea 655, 667
Courbarit 667
HYOBANCHE 891, 955
sanguinea 955
Hyoscyamus 293, 379, 380
albus 379
aureus *ib.*
Datora *ib.*
muticus *ib.*
niger *ib.*
physaloides *ib.*
pusillus *ib.*
reticulatus *ib.*
Scopolia 380
Hyoseris 1162, 1181-1182
caliculata 1182
caroliniana *ib.*
cretica *ib.*
foetida 1181
Hedypnois 1182
lucida *ib.*
major *ib.*
minima *ib.*
minor *ib.*
pygmaea *ib.*
radiata 1185
rhagadioloides 1182
scabra *ib.*
virginica *ib.*
Hypecoum 218, 285
erectum 285
littorale *ib.*
pendulum *ib.*
procumbens *ib.*
Hypelate 598, 613
trifoliata 613
Hyperanthera 301, 408
arborea 408
Hypericon 1130, 1156-1170
aegyptium 1158
Androsaemum 1157
arboreum 1156
Ascyron *ib.*
bacciferum *ib.*
balearicum *ib.*
barbatum 1160
Brathys 1156
calicinum *ib.*
campanulatum 1160
canadense 1158
canariense 1157
cayanense 1156
Coris 1160
crispum 1158
denticulatum 1160
elatum 1157
elodes 1159
erectum *ib.*
ericoides 1158
floribundum 1157
foliosum *ib.*
glandulosum *ib.*
gramineum 1158
gujanense 1156
guineense *ib.*
hircinum 1157
hirsutum 1160
humifusum 1158
japonicum *ib.*
Kalmianum 1156
laevigatum 1158
latifolium 1156
linarifolium 1158
maculatum 1160
mexicanum 1158
monogynum 1160
montanum 1158
mutilum 1160
nudicaule *ib.*
nummularium *ib.*
olympicum 1157
orientale *ib.*
patulum 1156
perfoliatum 1158
perforatum *ib.*
petiolatum 1157
pilosum 1160
prolificum 1157
pulchrum 1160
pyramidatum 1157
quadrangulare 1158
quinquenervium 1160
reflexum 1157
repens *ib.*
revolutum 1160
scabrum 1158
sessilifolium 1156
serotum 1160
sinense 1157
tomentosum 1160
tubulosum *ib.*
virginicum 1158
Walteri 1160
Hypnum 1284, 1338-1347
abietinum 1343
acacioides 1339
adiantoides *ib.*
aduncum 1340
albens 1343
albicans 1341
alopecurum 1344
asplenioides 1339
atrovirens 1346
attenuatum 1341
bryoides 1339
capillare 1345

cespito-

Hypnum
cæspitosum 1345
chrysocomum 1347
cirrhosum 1346
clavellatum *ib.*
complanatum 1341
compositum 1345
compressum 1343
congestum 1346
crispatum 1340
crispum *ib.*
Crista castrensis 1343
cupressiforme *ib.*
curtipendulum 1340
cuspidatum 1345
cylindricum 1347
delicatulum 1343
dendroides 1340
densum 1344
denticulatum 1339
depressum 1345
diaphanum 1342
Dicksoni *ib.*
fasciculatum 1344
filamentosum 1347
filicinum 1343
filicoides 1340
filifolium 1341
filiforme 1340
flagellare 1341
flagellatum 1346
flexile 1344
fluitans 1342
fulgens *ib.*
glabellum 1343
gracile 1346
Halleri *ib.*
heteromallum 1340
jamaicense 1341
Illecebrum 1345
intricatum 1343
julaceum 1346
loreum 1344
Hypnum
lucens. 1342
lutescens 1342
medium 1347
microphyllum 1345
molle 1347
myosuroides 1341
myosuron 1346
nigrescens 1344
nitens 1346
ornithopodioides 1339
palmatum *ib.*
palustre 1341
parietinum 1343
patulum 1344
pennatum 1340
piliferum 1342
plumosum 1343
polycarpon 1339
polypodioides *ib.*
polytrichoides 1345
praelongum 1343
proliferum *ib.*
prolixum 1347
pulchellum *ib.*
pumilum 1341
pungens 1346
purum 1345
reptans 1344
riparium 1345
rotundifolium 1346
rugosum 1342
ruscifolium *ib.*
Rutabulum 1347
Schreberi 1344
sciuroides 1339
scorpioides 1344
semicompletum 1339
sericeum 1340
serpens 1341
setaceum *ib.*
silvaticum 1342
Hypnum
Smithii 1347
spiniforme 1338
squamosum 1344
stramineum 1342
striatum *ib.*
strumosum 1339
tamarisci 1344
taxifolium 1339
tetragonum 1346
tomentosum 1345
torquatum 1346
trichomanoides 1341
trichophyllum 1345
triquetrum 1342
undulatum *ib.*
velutinum 1345
viticulosum 1340

Hypochoeris 1161, 1183
glabra 1183
helvetica *ib.*
maculata *ib.*
minima *ib.*
radicata *ib.*

Hypoxis 524, 548, 549
alba 548
aquatica *ib.*
decumbens *ib.*
erecta *ib.*
fascicularis *ib.*
minuta *ib.*
ovata *ib.*
plicata *ib.*
serrata *ib.*
sessilis *ib.*
spicata *ib.*
stellata *ib.*
villosa 549
violacea *ib.*

Hyptis 886, 898
capitata 898
Hyſſopus 885, 898
Lophanthus 898
nepetoides *ib.*
officinalis *ib.*
Hyſterium 1287, 1480
caeruleum 1480
candidum *ib.*

Jaborosa 295, 380
bonarienſis 380
Jacquinia 295, 390
armillaris 390
linearis *ib.*
rutcifolia *ib.*
venoſa *ib.*
Jamboliferа 600, 613
pedunculata 613
Jaſione 303, 373
capenſis 373
montana *ib.*
Jaſminum 19, 24
azoricum 24
didymum *ib.*
fruticans *ib.*
grandiflorum *ib.*
humile *ib.*
oblongum *ib.*
odoratiſſimum *ib.*
officinale *ib.*
ſimplicifolium *ib.*
Jatropha 998, 1026, 1027
Curcas 1027
glandulosa *ib.*
glauca *ib.*
goſſypifolia *ib.*
herbacea *ib.*
Janipha *ib.*
Jatropha
Mānihot 1027
moluccana 1026
multifida 1027
ſpinoſa *ib.*
urens *ib.*
variegata *ib.*
Iberis 967, 975, 976
amara 975
arabica *ib.*
cepaeifolia *ib.*
gibraltarica *ib.*
linifolia 976
nudicaulis *ib.*
odorata *ib.*
pinnata *ib.*
rotundifolia 975
ſaxatilis *ib.*
ſemperflorens *ib.*
ſempervirens *ib.*
umbellata 976
Icica 600, 619
Acuchini 619
altiſſima *ib.*
decandra *ib.*
gujanenſis *ib.*
heptaphylla *ib.*
IGNATIA 294, 388
amara 388
Ilex 220, 287, 288
Aquifolium 287
aſiatica *ib.*
Caſſine *ib.*
cuneifolia *ib.*
Daboon *ib.*
decidua 288
emarginata 287
japonica *ib.*
integra *ib.*
latifolia *ib.*
myrtifolia 288
opaca 287
Perado *ib.*
Ilex
rotunda 287
ſerrata *ib.*
Illecebrum 304, 426, 427
Achyrantha 427
alſinefolium *ib.*
arabicum *ib.*
ariſtatum 426
benghalenſe 427
brachiatum 426
canarienſe *ib.*
capitatum 427
cymoſum 426
echinatum 427
ficoideum *ib.*
fruteſcens 426
javanicum *ib.*
lanatum *ib.*
Monſoniae *ib.*
Paronychia 427
polygonifolium *ib.*
polygonoides *ib.*
ſanguinolentum 426
ſeſſile 427
ſuffruticoſum 426
vermiculatum 427
verticillatum *ib.*
Illicium 783, 867
aniſatum 867
floridanum *ib.*
Imbricaria 600, 612
borbonica 612
Impatiens 301, 415
Balſamina 415
biflora *ib.*
cornuta *ib.*
latifolia *ib.*
Noli tangere *ib.*
oppoſitifolia *ib.*
roſmarinifolia *ib.*

Impa-

Impatiens
finenſis 415
triflora ib.
Imperatoria 309, 488
Oſtruthium 488
Indigofera 1075, 1078, 1127-1129
amoena 1127
anguſtifolia 1129
Anil ib.
argenteum ib.
candicans 1127
caroliniana 1129
cytiſoides 1128
dendroides 1129
denudata 1128
digitata ib.
diſperma 1129
enneaphylla 1128
filiformis ib.
fragrans ib.
fruteſcens ib.
glabra ib.
hendecaphylla 1129
hirſuta ib.
linifolia 1127
mexicana ib.
oblongifolia ib.
ovata ib.
pentaphylla 1128
procumbens ib.
pſoraloides 1127
ſarmentoſa ib.
ſemitrijuga 1128
ſericea 1127
ſpicata 1128
ſpinoſa 1127
ſtricta 1129
tinctoria 1128
trifoliata 1127
trita 1128

Inocarpus 659, 698
edulis 698
Inula 1164, 1240-42
aeſtuans 1242
arabica 1240
aromatica 1242
bifrons 1241
Britannica ib.
Bubonium ib.
caerulea 1240
chryſocomoides 1241
crithmifolia 1242
dubia 1240
dyſenterica 1241
enſifolia 1242
foetida 1241
germanica ib.
Helenium 1240
hirta 1241
japonica ib.
indica ib.
mariana ib.
montana ib.
Oculus Chriſti 1240
odora ib.
pinifolia 1242
provincialis 1240
Pulicaria 1241
ſalicina ib.
ſpiralifolia 1240
ſquarroſa ib.
ſuaveolens 1241
undulata ib.
Ioncquetia 663, 728
gujanenſis 728
Ipomoea 294, 345-347
anguſtifolia 346
aquatica 345
biloba ib.
Bona nox 346
campanulata 346
carnea ib.
carolina 345
coccinea 346
digitata 345
filiformis 346
glaucifolia ib.
haſtata ib.
hederacea ib.
hederifolia 345
hepaticifolia 346
lacunoſa ib.
leucantha 345
luteola 346
palmata 345
paniculata 346
pentaphylla 347
Pes tigridis ib.
Quamoclit 345
repanda 346
rubra 345
ſcabra ib.
ſolanifolia 346
ſtolonifera 345
tamnifolia 347
triflora 345
triloba ib.
tuberoſa ib.
umbellata ib.
verticillata 346
violacea ib.
Ireſine 307, 463
Celoſia 463
Iris 81, 113-116
alata 115
anguſta ib.
aphylla 114
biflora 113
bituminoſa 116
ciliata 113
compreſſa 114
criſpa 116
criſtata

Iris
cristata 113
dichotoma 114
edulis 116
fragrantissima 114
flexuosa *ib.*
florentina 113
foetida 115
germanica 114
graminea 116
Güldenstaedti 115
halophila *ib.*
hexagona 114
juncea 116
lurida 114
martinicensis 116
minuta 113
ochroleuca 115
papilionacea 116
pavonia *ib.*
persica 115
plumaria 114
polystachya 116
Pseudacorus 115
pumila 113
ramosa 115
sambucina 114
setacea 115
sibirica 116
Sisyrinchium 115
spathacea *ib.*
spuria 116
squalens 114
susiana 113
tenuifolia 116
tricuspis 114
tripetala *ib.*
tristis 116
tuberosa *ib.*
unguicularis 115
variegata 114
ventricosa 115
versicolor *ib.*
verna 115
viscaria 116
Xiphium 114

Isatis 968, 992
aegyptia 992
aleppica *ib.*
armena *ib.*
lusitanica *ib.*
pinnata *ib.*
tinctoria *ib.*

Ischaemum 87, 177
aristatum 177
glabrum *ib.*
involutum *ib.*
murinum *ib.*
muticum *ib.*
scariosum *ib.*
secundatum *ib.*

Isertia 521, 567
coccinea 567

Isnardia 218, 265
palustris 265

Isoetes 1284, 1322
coromandeliana 1322
lacustris *ib.*

Isopyrum 782, 881, 882
aquilegioides 882
fumarioides 881
thalictroides 882

Itea 302, 411
virginica 411

Juglans 742, 755
alba 755
angustifolia *ib.*
baccata *ib.*
cinerea *ib.*
glabra *ib.*
nigra *ib.*
Pacan 755
regia *ib.*

Juncus 526, 571-573
acutus 571
alpinus 572
aquaticus 571
biglumis 572
butonius *ib.*
bulbosus *ib.*
campestris 573
conglomeratus 571
effusus *ib.*
filiformis *ib.*
gracilis *ib.*
grandiflorus 572
Jacquini *ib.*
inflexus 571
luteus 573
luzulinus 572
maximus *ib.*
niveus 573
nodosus 571
pediformis 572
pilosus *ib.*
punctorius 571
serratus 573
silvativus 571
spadiceus 572
spicatus 573
spinosus *ib.*
squarrosus 571
stygius 572
subulatus 573
subverticillatus 572
supinus *ib.*
Tenageia *ib.*
trifidus 571
triglumis *ib.*
uliginosus *ib.*

Jungermannia 1285, 1347-1353
adiantoides 1348

albi-

Jungermannia
albicans 1350
alpina 1352
anguloſa 1348
aquatica 1349
aſplenioides 1347
atrata 1351
barbata 1350
bicornis 1348
bicuſpidata 1349
bidentata 1348
bifaria 1352
bipinnata 1353
brachiata 1351
capillaris 1350
ciliaris 1351
cinerea 1352
cochleariformis 1350
complanata 1351
connata 1349
criſtata 1348
cupreſſina 1350
curvifolia 1352
dichotoma 1353
diffuſa 1351
dilatata *ib.*
emarginata 1348
epiphylla 1353
filicina 1351
filiformis *ib.*
flava *ib.*
fucoidea 1353
furcata *ib.*
globulifera 1348
javanica *ib.*
julacea 1352
juniperina 1350
lanceolata 1348
linearis 1353
macrorhiza 1349, 1353
minuta 1349
multifida 1353
multiflora 1350

Jungermannia
nemoroſa 1350
pallens 1349
pauciflora *ib.*
perfoliata 1348
pinguis 1353
platyphylla 1351
polyanthos 1348
polyphylla 1353
proſtrata 1348
pulcherrima 1352
puſilla *ib.*
pygmaea *ib.*
quadridentata 1349
quinquedentata *ib.*
reptans 1350
reſupinata *ib.*
rupeſtris 1352
ſcalaris 1348
ſerrulata 1350
ſertularioides 1352
ſetiformis 1349
ſimplex 1350
ſinuata 1353
ſphaerocephala 1349
ſphagni 1348
ſpinuloſa 1349
ſtolonifera 1351
tamariſcifolia *ib.*
tenera 1349
tomentoſa 1352
transverſalis 1351
trichophylla 1352
trilobata 1350
undulata *ib.*
vaginata 1352
varia *ib.*
ventricoſa 1349
viticuloſa 1348

Junghanſia 212, 259
faginea 259

Jungermannia
JUNGIA 1167-1281
ferruginea 1281
Juniperus 995, 1005
barbadenſis 1005
bermudiana *ib.*
caroliniana *ib.*
communis *ib.*
lycia *ib.*
Oxycedrus *ib.*
phoenicea *ib.*
Sabina *ib.*
ſinenſis *ib.*
thurifera *ib.*
virginiana *ib.*
Juſſieua 658, 686
diffuſa 686
edulis *ib.*
erecta *ib.*
inclinata *ib.*
peruviana *ib.*
pubeſcens *ib.*
repens *ib.*
ſuffruticoſa *ib.*
tenella *ib.*
Juſticia 20, 32-35
acaulis 34
acicularis 33
Adhatoda 32
armata 33
aſſurgens 34
Betonica 32
bivalvis 35
bracteolata 33
caerulea *ib.*
carthaginenſis 34
ciliaris *ib.*
coccinea 35
Ecbolium 32
echioides 34
faſtuoſa 33
foetida *ib.*
Gandaruſſa *ib.*
gangetica 35

Justicia
hyssopifolia 33
japonica 35
infundibuliformis 32
lanceata 33
longifolia *ib.*
madurensis 34
moretiana 35
naluta 34
nemorosa 35
nitida 33
nutans 35
orchioides 33
paniculata 34
parviflora 35
pectinata 34
picta 32
procumbens 34
pulcherrima 32
purpurea 35
repanda 33
repens 34
scorpioides 32
sexangularis 34
sinensis *ib.*
spinosa 32
tranquebarensis 33
triflora 34
trispinosa 32
variegata 33
verticillaris *ib.*
viridis 34

Iva 305, 463
annua 463
frutescens *ib.*
imbricata *ib.*
monophylla *ib.*

Ixia 82, 108-110
aristata 109
aulica *ib.*
bulbifera 109
Bulbocodium 108
capillaris 109
cinnamomea *ib.*
corymbosa *ib.*
crispa *ib.*
crocata 110
deusta 109
erecta *ib.*
excisa 110
falcata *ib*
fenestrata *ib.*
fruticosa 108
hirta *ib.*
humilis *ib.*
Lancea 110
Lapeironsia 108
linearis 109
maculata *ib.*
minuta 108
patens 109
pendula *ib.*
pentandra 110
pilosa 108
polystachya 110
purpurea *ib.*
rubra cyanea 108
scillaris 109
secunda 108
setacea 109
squalida *ib.*
villosa 108
villosula 110

Ixora 212, 243
alba 243
alternifolia *ib.*
americana *ib.*
coccinea *ib.*
fasciculata *ib.*
multiflora *ib.*

Kaempferia 1, 8, 9
Galanga 8
purpurea 9
rotunda 8

Kalmia 659, 693
angustifolia 693
glauca *ib.*
hirsuta *ib.*
latifolia *ib.*
polifolia *ib.*

Kiggelaria 663, 727
africana 727
integrifolia *ib.*

Kirganella 996, 1008
virginea 1008

Kleinhovia 656, 683
Hospita 683

Knautia 210, 231
orientalis 231
palaestina *ib.*
plumosa *ib.*
propontica *ib.*

Knoxia 214, 236
stricta 236
zeylanica *ib.*

Koenigia 89, 207
islandica 207

Krameria 278
Ixina *ib.*

Kraschenninikofia 218, 274
latens 274

Kuhnia 292, 375
eupatorioides 375
pinnata *ib.*

KYLLINGA 84, 122
filiformis 122
monocephala *ib.*
punicea *ib.*
sumatrensis *ib.*
triceps *ib.*
umbellata *ib.*

Kyr-

Kyrtandra 20, 37
biflora 37
cymosa *ib.*
Kyrtanthus 298, 362
longiflorus 362

Labatia 212, 250
sessiliflora 250
Lachenalia 522, 532
contaminata 532
mediana *ib.*
orchioides *ib.*
orthopetala *ib.*
pallida *ib.*
pendula *ib.*
pustulata *ib.*
tricolor *ib.*
Lachnaea 602, 635
conglomerata 635
eriocephala *ib.*
Lacis 777, 834
fluviatilis 834
Laciſtema 3, 16
myricoides 16
Lactuca 1161, 1172
canadensis 1172
caroliniana *ib.*
decorticata *ib.*
flava *ib.*
indica *ib.*
inermis *ib.*
intybacea *ib.*
perennis *ib.*
quercina *ib.*
sativa *ib.*
Scariola *ib.*
sinuata *ib.*
tuberosa *ib.*
virosa *ib.*
Laëtia 772, 816
apetala 816
completa 816
Guidonia *ib.*
Thamnia *ib.*
Lagerstroemia 776, 821
indica 821
Lagoecia 303, 422
cuminoides 422
Laguna 1000, 1039
aculeata 1039
Lagurus 87, 194
cylindricus 194
ovatus *ib.*
Lamium 885, 904, 905
album 904
bifidum *ib.*
garganicum *ib.*
laevigatum *ib.*
maculatum *ib.*
molle 905
multifidum *ib.*
Orvala 904
purpureum 905
rugosum 904
Lantana 888, 945, 946
aculeata 945
africana 946
annua 945
Camara *ib.*
involucrata 946
melissaefolia 945
mista *ib.*
odorata 946
Radula 945
salvifolia *ib.*
scabrida *ib.*
stricta *ib.*
trifolia 946
viburnoides *ib.*
Lapsana 1162, 1183
communis 1183
Koelpinia *ib.*
Rhagadiolus *ib.*
stellata *ib.*
taraxaconoides *ib.*
Zacintha *ib.*
Laserpitium 308, 479, 480
Aciphylla 480
angustifolium 479
aquilegifolium *ib.*
Chironium 480
dauuricum 479
ferulaceum 480
gallicum 479
Halleri *ib.*
latifolium *ib.*
peucedanoides *ib.*
prutenicum *ib.*
silaifolium *ib.*
Siler *ib.*
simplex 480
trilobum 479
Lasiostoma 211, 248
Ruhamon 248
Latania 999, 1035
Commersoni 1035
Lathraea 887, 924, 925
Anblatum 924
Clandestina *ib.*
Phelypaea *ib.*
quinquefida *ib.*
Squamaria 925
Lathyrus 1075, 1077, 1109, 1110
amphicarpos 1109
angulatus *ib.*
annuus *ib.*
Aphaca *ib.*

Lathyrus
articulatus 1109
Cicer ib.
Clymenum 1110
heterophyllus ib.
hirſutus ib.
inconſpicuus 1109
latifolius 1110
Niſſolii 1109
odoratus ib.
paluſtris 1110
piſiformis ib.
pratenſis ib.
ſativus 1109
ſetifolius ib.
ſilveſtris 1110
ſphaericus 1109
tingitanus 1110
tomentoſus 1109
tuberoſus 1110
Laugeria 295, 395
lucida 395
odorata ib.
tomentoſa ib.
Laurembergia 219, 284
capenſis 284
Laurus 647, 649-651
aeſtivalis 650
Benzoin ib.
Borbonia 651
Camphora 650
Caſſia 649
cauſtica 651
Chloroxylon 649
Cinnamomum ib.
coriacea 650
Culilaban 649
exaltata 650
floribunda 651
foetens ib.
geniculata 650
glauca ib.
Laurus
indica 651
Leucoxylon ib.
lucida ib.
martinicenſis 650
meliſſaefolia ib.
membranacea ib.
montana ib.
nobilis ib.
patens 651
pedunculata 650
pendula ib.
Perſea ib.
Saſſafras 651
ſumatrenſis 650
triandra 651
umbellata ib.
Lavandula 885, 900, 901
carnoſa 901
dentata 900
multifida ib.
pinnata ib.
Spica ib.
Stoechas ib.
viridis ib.
Lavatera 1002, 1057, 1058
africana 1057
americana ib.
arborea ib.
cretica ib.
luſitanica ib.
maritima ib.
micans ib.
olbia ib.
thuringiaca ib.
triloba ib.
trimeſtris 1058
Lawſonia 599, 619
Acronychia 619
Lawſonia
inermis 619
ſpinoſa ib.
Leaeba 521, 567
dubia 567
Lechea 89, 209
juncifolia 209
major ib.
minor ib.
Lecythis 776, 818, 819
amara 818
grandiflora ib.
Idatimon 819
lutea ib.
minor ib.
Ollaria 818
parviflora ib.
Zabucajo 819
Ledum 658, 693, 694
groenlandicum 694
latifolium ib.
paluſtre 693
Leea 299, 405
aequata 405
criſpa ib.
Leerſia 526, 578
hexandra 578
monandra ib.
Legnotis 775, 817
Caſſipurea 817
elliptica ib.
Lemna 22, 70
arhiza 70
gibba ib.
minor ib.
polyrhiza ib.
triſulca ib.
Lemniſcia 775, 817
gujanenſis 817

Leon-

Leontice 523, 556
altaica 556
Chryſogonum *ib.*
leontopetaloides *ib.*
Leontopetalum *ib.*
thalictroides *ib.*
veſicaria *ib.*

Leontodon 1161, 1174-1176
alpinus 1175
aſper *ib.*
aureus *ib.*
autumnalis *ib.*
bulboſus *ib.*
carolinianus *ib.*
croceus *ib.*
danubialis 1176
Haſtile 1175
hirtus *ib.*
hiſpidus *ib.*
megalorhizos *ib.*
mucronatus *ib.*
officinalis *ib.*
Taraxacon 1175
tomentoſus *ib.*
tuberoſus *ib.*

Leonurus 885, 909
Cardiaca 909
criſpus *ib.*
Marrubiaſtrum *ib.*
ſibiricus *ib.*
tataricus *ib.*

Lepidium 967, 972, 973
alpinum 973
bonarienſe *ib.*
cardamines 972
chalepenſe *ib.*
didymum 973
divaricatum *ib.*
Draba 972
graminifolium *ib.*
Iberis 973
latifolium 972
lyratum *ib.*
nudicaule 973
oleraceum *ib.*
perfoliatum 972
petraeum *ib.*
Piſcidium *ib.*
procumbens *ib.*
ruderale 973
ſativum 972
ſpinoſum *ib.*
ſubulatum *ib.*
ſuffruticoſum *ib.*
veſicarium *ib.*
virginicum 973

LERCHEA 996, 1008
longicauda 1008

Leucojum 523, 534
aeſtivum 534
auctumnales *ib.*
vernum *ib.*

Leyſera 1164, 1245 *ſq.*
Callicarnia 1245
caroliniana 1246
gnaphalodes 1245
paleacea 1246

Lichen 1285, 1356-1379
Acetabulum 1365
aculeatus 1377
aeruginoſus 1362
aggregatus 1377
albeſcens 1364
albidus 1378
albo-ater 1359
albo-caeruleſcens 1358
albo-flaveſcens 1368
albo-incarnatus 1362
albus 1356
ampullaceus 1370
androgynus 1361
anguloſus *ib.*
anguſtatus 1368
antarcticus 1373
anthracinus 1375
antiquitatis 1356
aphthoſus 1373
aquaticus *ib.*
arcticus *ib.*
articulatus 1379
ater 1363
atratus 1368
atro-albus 1360
atro-virens 1357
aurantiaco-ater 1379
aurantiacus 1364
badius 1362
barbatus 1378
betulinus 1360
bicolor 1379
botryoides 1356
botrytis 1376
Burgeſſii 1369
byſſinus 1364
byſſoides 1357
caeruleo-nigricans 1359
caeruleſcens 1363
caeſius 1365
calcareus 1359
calicaris 1370
candelaris 1361
candidus 1358, 1365
calvus 1360
caneſcens *ib.*
caninus 1373
canus 1364
capenſis 1379
caperatus 1371
capitatus 1357

Lichen
carbonarius 1361
carnosus 1366
carpineus 1361
centrifugus 1366
ceratophyllus 1372
cerinus 1368
cespitosus 1377
chalybeiformis 1379
chrysophthalmos 1369
ciliaris *ib.*
ciliatus 1367
cinchonae 1378
cinerascens 1359
cinereo-fuscus 1360, 1364
cinereus 1356
cinnabarinus 1365
circumscriptus 1360
citricolorus 1378
citrinus 1369
clausus 1362
cocciferus 1375
coccineus 1358
cochleatus 1371
Cocoës 1367
colliculosus 1359
concentricus *ib.*
confluens *ib.*
corallinus 1364
corniculatus 1373
coriiformis 1369
cornucopioides 1375
cornutus 1376
crassus 1365
crispus 1368
cristatus *ib.*
crocatus 1371
croceus 1374
cruentus 1363
cupularis *ib.*
curcumatus 1256
damaecornis 1372

Lichen
decipiens 1378
deformis 1375
deustus 1374
diaphanus 1372
Dicksoni 1363
diffusus 1367
digitatus 1375
dissectus 1372
divaricatus 1379
elegans 1361
elveliformis 1362
elveloides 1358
Endocarpon 1370
ericetorum 1357
erosus 1374
esculentus 1359
exasperatus 1374
excavatus 1362
fagineus 1360
Fahlunensis 1367
fallax 1371
farinaceus 1370
farinosus 1357
fascicularis 1369
ferrugineus 1357
ferruginosus 1360
filiformis 1375
Filix 1370
fimbriatus 1375
flammeus 1376
flavens 1372
flaveolus 1362
flavescens 1363
flavicans 1364
flavidus 1379
flavo-fuscus 1359
flavo-rubescens 1360
flavo-virescens 1360
flavus 1356
flocculosus 1375
floridus 1378
fluviatilis 1373

Lichen
foliaceus 1375
fragilis 1377
fraudulentus 1371
fraxineus 1370
fuciformis 1370
fucinus 1378
fucoides 1371
fugax 1369
fulgens 1364
fuliginosus 1374
fulvus 1362
fungiformis 1357
fungoides *ib.*
furcatus 1376
furfuraceus 1370
fusco-ater 1359
fusco-luteus 1363
fusco-rubens 1368
fuscus 1357
gelidus 1361
geographicus 1357
gibbosus 1363
glaucus 1371
globifer 1377
gossypinus 1362
gracilis 1375
gramineus 1356
graniformis 1359
granosus 1365
granulatus 1369
griseus 1361
gujanensis 1379
Haematomma 1361
hemisphaericus 1358
herbaceus 1368
hippotrichioides 1378
hirtus 1379
hispidus 1376
horizontalis 1373
jacobaeifolius 1368
Jacquini 1374
japonicus 1371

Joma-

Lichen
Jcmadophila 1358
incanus 1356
Jolithus *ib.*
islandicus 1369
jubatus 1379
juniperinus 1371
lacerus 1372
laciniatus 1367
laciniosus 1372
lacteus 1358
lanatus 1379
lanuginosus 1367
laqueatus 1368
lentiger 1361
leucomelas 1370
leucophaeus 1366
Linckii 1361
linearis 1370
lobatus 1372
luridus 1365
luteolus 1368
lutereus 1359
lutescens 1356
luteus 1363
madreporaeformis 1378
marginellus 1372
marmoratus 1365
marmoreus 1363
melanocarpos 1377
melanoleucos 1365
melanostictos 1364
membranaceus 1371
mesentericus 1375
miniatus 1374
minutissimus 1364
muralis 1365
muscicola 1378
muscorum 1358
niger 1360
nigrescens 1369
nivalis 1370

Lichen
obscurus 1365
oculatus 1357
ocellatus 1361
ochrochlorus 1360
odoratus 1356
Oederi 1360
olivaceus 1367
omphalodes *ib.*
opuntioides 1369
orbicularis 1365
ornatus 1371
pallescens 1363
pallidus *ib.*
pannosus 1362
Papillaria 1377
parasiticus 1357
Parellus 1364
parietinus 1368
paschalis 1377
patellatus 1366
perforatus 1374
perlatus *ib.*
pertusus 1358
petraeus *ib.*
petrosus 1360
pezizoides 1364
physodes 1368
pictus 1366
pinastri 1371
plicatus 1378
plumbeus 1370
polydactylos 1373
polyphyllus 1374
polyrhizos *ib.*
proboscideus *ib.*
prunastri 1371
pubescens 1379
pulchellus 1367
pulcher 1368
pullus 1367
pulmonarius 1370
pulposus 1372

Lichen
pulverulentus 1367
punctiformis 1358
pustulatus 1374
putredinis 1356
pyxidatus 1375
quercifolius 1366
quercinus 1367
querneus 1358
quisquiliaris 1377
radiatus 1376
radiciformis 1378
radiosus 1365
ramulosus 1377
rangiferinus 1376
reflupinatus 1373
reticulatus 1379
rigidus 1366
rimosus 1363
Roccella 1377
roridus 1372
rosaceus 1360
rosetus 1362
roseus 1356
rubens *ib.*
rufescens 1363
rufus 1357, 1373
rugosus 1357
rupestris 1369
rupicola 1358
rutilus 1360
sabuletorum 1358
saccatus 1374
salicinus 1363
sanguinarius 1359
sanguineo-ater 1362
surcoides 1374
saturninus 1371
saxatilis 1367
saxicola 1366
saxosus 1378
scopulorum 1373
scriptus 1357

Lichen
scrupoſus 1362
ſemipinnatus 1372
ſepincola 1370
ſerratus 1372
Sertularia 1377
ſetoſus 1378
ſiliquoſus 1377
ſilvaticus 1373
ſimplex 1375
ſpadiceus 1377
ſpecioſus 1366
ſphaeroides 1359
ſpinoſus 1376
ſquamatus 1366
ſquamoſus 1368
ſtellariformis 1367
ſtellaris *ib.*
ſtygius *ib.*
ſubfuſcus 1363
ſubimbricatus 1364
ſubulatus 1376
ſubuliformis *ib.*
ſubvireſcens 1378
ſulphureus 1359
tartareus 1362
tenax 1368
tenellus 1369
tenuiſſimus 1371
tiliaceus 1365
tinctorius 1370
tomentoſus 1372
Tremella 1369
tremelloides 1371
triſtis 1376
tuberculoſus 1357
uncialis 1376
upſalienſis 1364
urceolaris *ib.*
Uſnea 1379
variegatus 1356
velleus 1374
venoſus 1373
Lichen
ventoſus 1360
ventricoſus 1375
vermicellaris 1377
vernalis 1359
verniciformis *ib.*
verrucarius 1366
verrucifer 1373
verruciger 1377
verrucoſus 1364
veſiculoſus 1372
villoſus 1356
viridatus 1358
virideſcens 1361
viridi-ater 1361
viridis 1375
viridulus 1359
vitellinus 1361
vulpinus 1379
Licuala 522, 529
ſpinoſa 529
Lidbeckia 210, 227
capenſis 227
Lightfootia 772, 826
oxycoccoides 826
ſerrata *ib.*
ſubulata *ib.*
Lignonia 303, 373
monodynama 373
Liguſticum 309, 481
auſtriacum 481
balearicum *ib.*
candicans *ib.*
cornubienſe *ib.*
Gingidium *ib.*
Gmelini *ib.*
Leviſticum *ib.*
luteum *ib.*
nodiflorum *ib.*
peloponnenſe *ib.*
Liguſticum
peregrinum *ib.*
pyrenaeum *ib.*
Liguſtrum 18, 25
japonicum 25
vulgare *ib.*
Lilium 525, 544, 545
bulbiferum 544
camtſchatcenſe 545
canadenſe *ib.*
candidum 544
Catesbaei 545
chalcedonium 544
japonicum 545
Martagon *ib.*
philadelphicum *ib.*
pomponium 544
ſuperbum 545
Limeum 593, 597
africanum 597
aphyllum *ib.*
humile *ib.*
Limodorum 21, 60
altum 60
autumnale 61
enſatum 60
gentianoides *ib.*
grandiflorum *ib.*
pendulum *ib.*
praecox 61
ſtriatum 60
Tancarvillea *ib.*
tuberoſum *ib.*
utriculatum *ib.*
Limonia 658, 684
acidiſſima 684
dulcis *ib.*
lucida *ib.*
minuta *ib.*
monophylla *ib.*
pentaphylla *ib.*
trifoliata *ib.*

Limoſella 888, 953
aquatica 953
calicina *ib.*
diandra *ib.*
LINCONIA 307, 448
alopecuroidea 448
LINDERA 525, 565
umbellata 565
LINDERNIA 888, 947
dianthera 947
japonica *ib.*
pyxidaria *ib.*
Linnaea 890, 952
borealis 952
Linum 313, 512-514
africanum 513
alpinum *ib.*
aquilinum 512
arboreum 513
auſtriacum *ib.*
campanulatum *ib.*
catharticum *ib.*
flavum *ib.*
gallicum *ib.*
hirſutum 512
maritimum 513
monogynum *ib.*
narbonenſe 512
nodiflorum 513
perenne 512
quadrifolium 513
ſtriatum 514
ſtrictum 512
ſuffruticoſum 513
uſitatiſſimum 512
verticillatum 513
virginianum *ib.*
vilcoſum *ib.*
LIPARIA 1078, 1113
graminifolia 1113
ſericea *ib.*
ſphaerica *ib.*
umbellata *ib.*
villoſa *ib.*
Lippia 887, 955, 956
americana 955
cymoſa 956
hemiſphaerica 955
hirſuta 956
ovata *ib.*
Liquidambar 777, 832
imberbe 832
peregrinum *ib.*
ſtyraciflua *ib.*
Liriodendron 782, 867
Liliifera 867
Tulipifera *ib.*
Liſianthus 293, 334, 335
alatus 335
caeruleſcens 334
chelonoides 335
cordifolius *ib.*
exſertus *ib.*
frigidus *ib.*
glaber *ib.*
glaucifolius *ib.*
grandiflorus *ib.*
latifolius *ib.*
longifolius 334
purpuraſcens 335
umbellatus *ib.*
Litchi 603, 635
ſinenſe 635
Lithophila 20, 49
japonica 49
muſcoides *ib.*
Lithoſpermum 291, 316, 317
anguſtifolium 317
arvenſe 316
ciliatum 317
digynum *ib.*
diſpermum 316
fruticoſum *ib.*
heliotropoides 317
hiſpidum *ib.*
incanum *ib.*
officinale 316
orientale *ib.*
purpuro-caeruleum *ib.*
retortum 317
tenuiflorum 316
virginicum *ib.*
LITTORELLA 211, 251
lacuſtris 251
Lobelia 294, 355-358
acuminata 355
anceps *ib.*
angulata 357
arborea 355
aſſurgens 356
bellidiflora *ib.*
bulboſa *ib.*
Cardinalis *ib.*
cliffortiana 357
Columneae 356
comoſa 357
cornuta 355
coronopifolia 357
Cyphia *ib.*
debilis *ib.*
depreſſa 355
Dortmanna *ib.*
erinoides 357
Erinus *ib.*

Lobelia
ferruginea 356
fruticosa 358
glandulosa 356
grandis 355
hirsuta 357
inflata *ib.*
Kalmii 355
laevigata 356
Laurentia 357
longiflora 356
lutea 357
minuta *ib.*
paniculata 355
patula 356
Phyteuma *ib.*
pinifolia 355
pubescens 358
secunda 356
simplex 355
siphylitica 357
stricta 356
subulata 368
surinamensis 356
tenella 368
tomentosa 356
triquetra *ib.*
Tupa 355
urens 357
volubilis 355
zeylanica 357
Loeflingia 82, 105
caspica 105
hispanica *ib.*
indica *ib.*
Loefelia 888, 946
ciliata 946
Logania 302, 422
pentacrina 422
Lolium 88, 196
distachyum 196
perenne *ib.*
remotum *ib.*
Lolium
temulentum 196
tenue *ib.*
Lonchitis 1283, 1300 *sq.*
aurita 1301
bipinnata *ib.*
hirsuta 1300
pedata *ib.*
repens 1301
tenuifolia *ib.*
Lonicera 298, 368-369
alpigena 369
bubalina *ib.*
caerulea *ib.*
Caprifolium 368
caucasica 369
corymbosa *ib.*
Diervilla *ib.*
dioica 368
grata *ib.*
japonica *ib.*
implexa *ib.*
media *ib.*
mongolica 369
nigra 368
Periclymenum *ib.*
pyrenaica 369
sempervirens 368
symphoricarpos 369
tatarica *ib.*
Xylosteum *ib.*
Loosa 774, 819
hispida 819
Loranthus 522, 575, 576
americanus 576
emarginatus *ib.*
europaeus 575
falcatus 576
loniceroides *ib.*
Loranthus
occidentalis 576
parvifolius *ib.*
pauciflorus *ib.*
pentandrus *ib.*
Scurrula 575
spicatus 576
Stelis *ib.*
tetrapetalus 575
uniflorus *ib.*
Lotus 1075, 1078, 1144, 1145
angustissima 1144
arabica *ib.*
arborea 1145
conjugata 1144
corniculata 1145
cretica 1144
cytisoides 1145
Dorycnium *ib.*
edulis 1144
glauca 1145
graeca *ib.*
hirsuta *ib.*
jacobaea 1144
maritima *ib.*
medicaginoides 1145
oligoceratos 1144
ornithopodioides *ib.*
peregrina *ib.*
recta 1145
siliquosa 1144
tetragonoloba *ib.*
tetraphylla *ib.*
Lucuma 777, 830, 831
bistora 830
Keula *ib.*
spinosa 831
turbinata 830
valparadisea *ib.*

Ludiae

Ludiae 779, 839
mauritanica 839
Ludwigia 216, 261
alternifolia 261
apetala *ib.*
arcuata *ib.*
decurrens *ib.*
glandulosa *ib.*
irrigata *ib.*
linearis *ib.*
oppositifolia *ib.*
pilosa *ib.*
ramosissima *ib.*
repens *ib.*
rudis *ib.*
suffruticosa *ib.*
trifolia *ib.*
Lunaria 967, 978
annua 978
rediviva *ib.*
Lupinus 1076, 1100, 1101
albus 1100
angustifolius *ib.*
hirsutus *ib.*
integrifolius 1101
luteus *ib.*
perennis 1100
pilosus 1101
Termis 1100
varius 1101
Luziola 602, 637
peruviana 637
Lychnis 662, 736
alpestris 736
alpina *ib.*
apetala *ib.*
chalcedonica *ib.*
coronata *ib.*
dioica *ib.*
Flos cuculi *ib.*
Lychnis
grandiflora 736
laeta *ib.*
quadridentata *ib.*
sibirica *ib.*
Viscaria *ib.*
Lycium 296, 389
afrum 389
barbarum *ib.*
barbatum *ib.*
capsulare *ib.*
europaeum *ib.*
foetidum *ib.*
heterophyllum *ib.*
japonicum *ib.*
ruthenicum *ib.*
tetrandrum *ib.*
Lycoperdon 1286, 1462-1466
admorsum 1463
aestivum *ib.*
ardesiacum 1464
arhizon 1465
aurantium 1463
Bovista 1464
capitatum 1463
carcinomale 1465
cervinum 1462
circumscissum 1463
coliforme 1465
corollinum *ib.*
corticale 1466
dispar 1463
Epidendron 1466
equinum 1464
fenestratum 1465
furfuraceum 1464
Geaster 1465
gemmatum 1463
giganteum 1464
gossypinum *ib.*
gregarium 1466
Lycoperdon
herculeum 1465
Hypoxylon *ib.*
Infundibulum 1464
lacerum *ib.*
lanatum *ib.*
multifidum 1465
muricatum 1464
nitidulum 1466
pedicellatum 1465
phalloides 1464
pisiforme 1465
pistillare *ib.*
polyrhizon 1464
Proteus 1463
pruinatum 1465
pusillum 1464
radians 1465
ramosum 1466
rufum 1464
scabridum 1466
scabrum 1463
spadiceum *ib.*
squamosum *ib.*
stellatum 1465
subalpinum 1464
utriforme 1465
verrucosum 1463
Lycopodium 1283, 1288-1291
alopecuroides 1288
alpinum 1290
annotinum 1289
apus 1290
Bryopteris 1289
canaliculatum 1290
carolinianum *ib.*
cernuum 1289
ciliare 1290
circinale *ib.*
clavatum 1289
complanatum *ib.*
denticulatum 1290

dicho-

Lycopodium
dichotomum 1289
flabellatum 1290
guidioides 1289
helveticum 1290
japonicum ib.
inundatum 1289
linifolium ib.
myrtifolium 1290
nudum 1288
obscurum 1289
ornithopodioides 1290
Phlegmaria 1289
plumosum 1290
radicans 1291
rigidum 1289
rupestre ib.
sanguinolentum 1290
scariosum 1289
selaginoides 1288
Selago 1289
serratum ib.
squarrosum 1288
stoloniferum 1290
taxifolium 1288
verticillatum 1290
Lycopsis 292, 322
aegyptia 322
arvensis ib.
bullata ib.
orientalis ib.
pulla ib.
variegata ib.
vesicaria ib.
virginica ib.
Lycopus 20, 42
europaeus 42
exaltatus ib.
virginicus ib.
Lygeum 84, 123
Spartum 123
Lysimachia 202, 331, 332
atro-purpurea 331
ciliata ib.
decurrens ib.
Ephemerum ib.
japonica 332
lanceolata 331
Linum stellatum ib.
nemorum 332
Numularia ib.
punctata 331
quadrifolia ib.
stricta ib.
thyrsiflora ib.
vulgaris ib.
Lythrum 741, 752, 753
carthagenense 753
ciliatum ib.
cordifolium 752
Cuphaea 753
dipetalum ib.
fruticosum ib.
Hyssopifolia ib.
lineare ib.
Melanium ib.
Parsonsia ib.
Pemphis ib.
petiolatum ib.
racemosum ib.
Salicaria 752
Thymifolia 753
triflorum ib.
verticillatum ib.
virgatum 752
Maba 83, 95
elliptica 95
Mabea 740, 746
Piriri 746
Macrocnemum 297, 360
jamaicense 360
Macrolobium 83, 93
Simira 93
Utea ib.
Vuapa ib.
Macucua 210, 262
guianensis 262
Madhuca 773, 799
indica 799
Madia 1164, 1249
mellita 1249
sativa ib.
Maerua 772, 827
arabica 827
Maesa 298, 403
arabica 403
Magnolia 782, 867
acuminata 867
Fraseri ib.
glauca ib.
grandiflora ib.
Plumieri ib.
tripetala ib.
Mahernia 313, 519, 520
heterophylla 520
pinnata 519
verticillata ib.
Majanthemum 217, 266
Convallaria 266
Malachodendron 1001, 1069
corchoroides 1069
ovatum ib.
Malachra 1002, 1051
alceaefolia 1051
bracteata ib.
capitata

Malachra
capitata 1051
fasciata *ib.*
radiata *ib.*

Malanea 213, 279
sarmentosa 279

Malaxis 21, 58
spicata 58
umbelliflora *ib.*

Mallococca 775, 811
crenata 811

Malope 1002, 1058
malacoides 1058
multiflora *ib.*
trifida *ib.*

Malpighia 662, 722-724
altissima 723
angustifolia 724
aquifolia *ib.*
armeniaca 723
canescens 724
coccigera 723
coriacea *ib.*
crassifolia *ib.*
diphylla *ib.*
dubia 724
faginea 723
glabra 722
glandulosa 723
grandifolia 724
lucida 723
martinicensis 722
Mureila 723
nitida *ib.*
odorata *ib.*
punicifolia *ib.*
spicata *ib.*
urens *ib.*
verbascifolia *ib.*

Malva 1002, 1052-1056
abulensis 1055
abutiloides 1053
acaulis 1056
aegyptia 1053
Alcea 1055
americana *ib.*
angustifolia 1053
bonariensis 1054
bryonifolia *ib.*
calicina 1056
capensis *ib.*
capitata 1053
caroliniana 1052
coromandeliana 1054
cretica *ib.*
crispa 1055
cuneifolia 1053
elegans 1052
fastigiata 1055
fragrans *ib.*
gangetica 1056
grossularifolia 1054
hilpanica 1053
lactea 1054
limensis *ib.*
lobata 1055
mauritiana 1056
molchata 1055
nicaeensis 1056
operculata 1053
ovata 1056
Papaver 1053
parviflora 1054
peruviana *ib.*
polystachya 1056
prostrata 1052
pumila 1056
retusa 1055
rotundifolia *ib.*
scabra 1053
scoparia 1054
Sherardiana 1054
silvestris 1056
sinensis *ib.*
spicata *ib.*
spithamaea 1053
stipulacea *ib.*
subhastata 1055
tomentosa 1056
Tournefortiana 1055
tridactylites 1054
trifida 1053
verticillata 1054
virgata *ib.*

Malvaviscus 1000, 1060
arboreus 1060
mollis *ib.*
pilosus *ib.*

Mammea 774, 813
americana 813

MANETTIA 213, 277
Lygistum 277
reclinata *ib.*

Mangifera 301, 418
Amba 418
glauca *ib.*
indica *ib.*
pinnata *ib.*

Manglilla 296, 398
peruviana 398

MANISURIS 85, 149
myuros 149

Mansana 526, 580
arborea 580

Manulea 889, 949, 950
altissima 950
antirrhinoides 949
argentea 950

caeru-

Manulea
caerulea 950
capillaris ib.
capitata 949
Cheiranthus ib.
corymbosa 950
cuneifolia 949
heterophylla 950
integrifolia 949
microphylla ib.
pinnatifida ib.
plantaginis ib.
thyrsiflora 950
tomentosa 949
Maprunea 217, 272
gujanensis 272
Mapuria 299, 371
gujanensis 371
Maranta 1, 8
Allovia 8
Arcuma ib.
arundinacea ib.
comosa ib.
Galanga ib.
humilis ib.
lutea ib.
malaccensis ib.
spicata ib.
Tonkat ib.
Marattia 1283, 1293 *sq.*
alata 1293
fraxinea 1294
laevis ib.
Marcgravia 773, 797
umbellata 797
Marchantia 1284, 1353 *sq.*
androgyna 1354
chenopoda ib.
conica ib.
cruciata ib.
hemisphaerica ib.
Marchantia
hirsuta 1354
polymorpha 1353
quadrata 1354
tenella ib.
triloba ib.
trilocularis ib.
umbellata 1353
Margaritaria 604, 645
nobilis 645
Marica 82, 118
Cipura 118
Marilla 775, 816
racemosa 816
Maripa 296, 393
scandens 393
Marrubium 885, 908, 909
acetabulosum 909
africanum ib.
Alysson 908
candidissimum ib.
crispum 909
hispanicum ib.
peregrinum 908
plicatum ib.
Pseudodictamnus 909
supinum ib.
vulgare ib.
Marsana 656, 675
buxifolia 675
Marshallia 778, 836
Lagunae 836
Marschallia 1162, 1208
Schreberi 1208
Marsilea 1284, 1322
minuta 1322
natans ib.
quadrifolia ib.
Martynia 890, 935
annua 935
longiflora ib.
perennis ib.
proboscidea ib.
MASSONIA 525, 537
angustifolia 537
echinata ib.
latifolia ib.
undulata ib.
Matelea 306, 443
palustris 443
Matricaria 1164, 1249
argentea 1249
Chamomilla ib.
maritima ib.
Parthenium ib.
prostrata ib.
suaveolens ib.
Matthiola 298, 376
scabra 376
Matthuschkia 528, 589
aquatica 589
Maturea 887, 939
pratensis 939
MAURITIA 521, 568
flexuosa 568
Mayepea 215, 259
gujanensis 259
Mayna 776, 808
odorata 808
Maytenus 19, 25
Boaria ib.
Meborea 207
gujanensis ib.
Medeola 527, 588
angustifolia 588
asparagoides ib.
virginica ib.

Medi-

Medicago 1075, 1078, 1146-1148
arabica 1147
arborea 1146
ciliaris 1147
circinata ib.
coronata ib.
Falcata 1146
hirsuta 1147
intertexta ib.
Karstiensis ib.
laciniata 1148
lupulina 1147
marginata ib.
marina 1148
minima 1147
muricata ib.
nigra ib.
obscura 1146
orbicularis 1147
polymorpha ib.
prostrata 1148
radiata 1147
rigidula ib.
sativa 1146
scutellaris 1147
tornata 1148
tuberculata 1147
turbinata 1148
virginica 1146
Medusula 1286, 1487
labyrinthica 1487
Meesia 300, 417
serrata 417
Meisteria 297, 391
anonyma 391
Melaleuca 1149, 1154, 1155
aestuosa 1154
angustifolia ib.
ciliata 1155
diffusa 1154
florida 1155
latifolia 1154
Leucadendron ib.
lucens 1155
lucida 1154
perforata 1155
scoparia 1154
suaveolens 1155
trinervia 1154
villosa ib.
virgata 1155
viridiflora ib.
Melampodium 1166, 1271
americanum 1271
australe ib.
humile ib.
Melampyrum 888, 924
arvense 924
cristatum ib.
nemorosum ib.
pratense ib.
silvaticum ib.
Melanthium 527, 587, 588
capense 587
ciliatum ib.
dioicum 588
hybridum 587
indicum 588
monoicum 587
monopetalum 588
myostonum 587
racemosum 588
sibiricum 587
spicatum ib.
triquetrum ib.
virginicum ib.
viride 588
Melastoma 658, 687-692
Acinodendron 688
agreste 690
alatum 689
albicans ib.
alpinum 691
angustifolium ib.
aquaticum 692
arborescens 689
argenteum ib.
asperum 687
bivalve 688
Cacatin ib.
capillare 692
cinnamomifolium 688
coriaceum 690
crispatum 688
discolor 692
elaeagroides 691
elatum 690
elegans 691
fasciculare ib.
flavescens 689
fragile 691
glabratum ib.
glabrum 687
grandiflorum 690
grossularioides 688
grossum ib.
hirsutum 691
hirtellum ib.
hirtum 690
hispidum 692
holosericeum 687
imperiolare 690
laevigatum 689
longifolium 687
Majeta 691
Malabathrum 689
micranthum 692
microphyllum 691
montanum 688
octandrum 691
ornatum 687

Melastoma
parviflorum 691
patens 687
pilosum 692
prasinum 688
procerum *ib.*
purpurascens 691
quadrangulare 687
racemosum 690
ramiflorum 688
rigidum *ib.*
rubens 692
rubescens 689
rubrum 690
rufescens *ib.*
scabrosum *ib.*
scandens *ib.*
sessilifolium 688
spicatum 690
splendens 689
strigilosum *ib.*
strigosum 687
succosum 689
Tamonea *ib.*
Taniboa *ib.*
tetrandrum 692
Tibuchina 691
Tococa 690
trinervium 687
trivalve 688
umbrosum 692
villosum 689
virgatum 692

Melhania 301, 416
velutina 416

Melia 656, 680, 681
Azadirachta 681
Azederach 680
dubia 681
Koetjape *ib.*
sempervirens 680

Melianthus 891, 966
major 966
minor *ib.*
Melica 87, 176
altissima 176
arundinacea *ib.*
caerulea *ib.*
ciliata *ib.*
Falx *ib.*
Lobelii *ib.*
minuta *ib.*
mutica *ib.*
nodosa *ib.*
nutans *ib.*
papilionacea *ib.*
pyramidalis *ib.*
ramosa *ib.*
uniflora *ib.*
Melicocca 599, 613
bijuga 613
Melicope 599, 620
ternata 620
Melicytus 302, 421
ramiflorus 421
Melissa 886, 914
Calamintha 914
cretica *ib.*
fruticosa *ib.*
grandiflora *ib.*
Nepeta *ib.*
officinalis *ib.*
Melittis 886, 916
Melissophyllum 916
Melochia 996, 1011, 1012
borbonica 1012
caracassana *ib.*
concatenata 1011
corchorifolia 1012
depressa 1011
hirsuta 1012
lupulina *ib.*
nodiflora 1012
odorata 1011
pyramidata 1012
supina *ib.*
tomentosa *ib.*
venosa 1011
Melodinus 307, 440
scandens 440
Melothria 81, 99
pendula 99
Memecylon 600, 619
capitellatum 619
grande *ib.*
Menais 296, 376
topiaria 376
Menichea 770, 799
rosata 799
Menispermum 742, 756
acutum 756
canadense *ib.*
carolinum *ib.*
Cocculus *ib.*
crispum *ib.*
edule *ib.*
fenestratum *ib.*
hirsutum *ib.*
japonicum *ib.*
myosotoides *ib.*
orbiculatum *ib.*
trilobum *ib.*
virginicum *ib.*
Mentha 885, 902-904
aquatica 903
arvensis *ib.*
Auricularia 902
austriaca 903
cabirina *ib.*

cana-

Mentha
canadenſis 903
canarienſis *ib.*
cervina 904
criſpa 903
dubia *ib.*
exigua *ib.*
gentilis *ib.*
hirſuta *ib.*
niliaca 902
origanifolia *ib.*
perilloides *ib.*
piperita 903
plumoſa 902
Pulegium 903
punctata *ib.*
rotundifolia 902
ſativa 903
ſilveſtris 902
viridis *ib.*
Mentzelia 774, 819
aſpera 819
Menyanthes 293, 329
indica 329
nymphoides *ib.*
ovata *ib.*
trifoliata *ib.*
Mercurialis 648, 653
ambigua 653
annua *ib.*
perennis *ib.*
tomentoſa *ib.*
Merorea 89
gujanenſis
Merulius 1285, 1429-1432
agaricoides 1430
alectorolophoides *ib.*
alneus 1431
alutaceus *ib.*
aurantiacus 1430
betulinus 1431
cantharelloides 1430
Cantharellus *ib.*
cornucopioides 1429
Criſpus 1430
Cyathus *ib.*
dimidiatus 1431
fiſſus *ib.*
helvelloides 1430
inflexus *ib.*
hydropipes *ib.*
infundibuliformis *ib.*
labyrinthiformis 1431
lichenoides *ib.*
muſcigenus *ib.*
niveus *ib.*
pezizoides *ib.*
pruinatus 1430
quercinus 1431
reticulatus *ib.*
ſerpens 1432
ſquamoſus 1431
Squamula 1430
umbonatus *ib.*
vaſtator 1432
Meſembryanthemum 779, 843-848
albidum 848
apetalum 844
auſtrale 845
barbatum 846
bellidiflorum 844
bicolorum 847
brachiatum *ib.*
bracteatum 846
brevifolium 845
caducum 844
calamiforme *ib.*
capillare 848
ciliatum 843
compactum 848
copticum 844
cordifolium *ib.*
corniculatum 846
craſſifolium 845
criniflorum 844
cryſtallinum 843
cuneifolium 846
deflexum 845
deltoides 844
diffoime 847
digitatum 843
dolabriforme 847
echinatum 846
edule *ib.*
emarginatum 845
expanſum 844
falcatum 846
filamentoſum 845
forficatum 846
geniculiflorum 844
glabrum 847
glaucum 846
glomeratum 845
groſſum 847
helianthoides *ib.*
hiſpidum 845
humifuſum 844
laeve 845
linguiforme 848
loreum 845
micans 847
molle 846
noctiflorum 844
nodiflorum 843
pallens *ib.*
papuloſum 847
pinnatifidum 847
pomeridianum *ib.*
pugioniforme 846
reptans 845
ringens 847

Mesembryanthemum
roſtratum 847
ſcabrum 845
ferratum 846
ſeſſiliflorum 847
ſpinoſum 845
ſplendens 844
ſtipulaceum 845
tenuifolium 846
teſticulare 844
tortuoſum 847
Tripolium 843
tuberoſum 845
umbellatum 844
uncinatum 846
verruculatum 847
villoſum 846
viridiflorum 848
Meſenterica 1286, 1485
tremelloides 1485
Meſpilus 779, 840, 841
aeſtivalis 840
Amelanchier 841
arbutifolia *ib.*
canadenſis *ib.*
Chamaemeſpilus *ib.*
Cotoneaſter *ib.*
germanica *ib.*
hiemalis 840
japonica 841
laciniata 840
Phoenopyrum 841
Pyracantha 840
Xanthocarpos 841
Meſſerſchmidia 291, 324
Arguzia 324
fruticoſa *ib.*
Meſua 999, 1069
ferrea 1069
glabra *ib.*
Metroſideros 771, 788, 789
albiflora 789
arachnoidea *ib.*
armillaris *ib.*
coſtata *ib.*
excelſa *ib.*
fulgens *ib.*
gummifera 788
myrtifolia 789
ſalicifolia *ib.*
ſcandens *ib.*
ſpectabilis *ib.*
ſquarroſa *ib.*
umbellata *ib.*
viminalis *ib.*
Metroxylon 521, 570
Sagu 570
Michauxia 600, 618
nova 618
Michelia 782, 868
Champaca 868
Tſjambaca *ib.*
Microcarpon 1470
nigrum *ib.*
Micropus 1166, 1278
erectus 1278
ſupinus *ib.*
Microtea 305, 452
debilis 452
Milium 86, 168
capenſe 168
compreſſum *ib.*
confertum *ib.*
digitatum *ib.*
eſtulum *ib.*
globoſum *ib.*
Milium
lendigerum 168
paradoxon *ib.*
punctatum *ib.*
Milleria 1166, 1269
biflora 1269
quinqueflora *ib.*
MILLINGTONIA 890, 951
hortenſis 961
Mimoſa 773, 800-805
alba 801
arborea 802
Aſak 803
aſperata 804
balſamica 802
bigemina 800
bipinnata 803
Burgoni 801
caeſia 804
caſta 800
Catechu 804
Cavenia 803
Ceratonia 805
cineraria 800
cinerea 803
circinalis 800
comoſa 802
cornigera 804
cornuta *ib.*
eburnea *ib.*
Entada 801
fagifolia *ib.*
farneſiana 804
flava 803
glauca 802
glomerata 803
grandiflora 802
gujanenſis 803
horrida 804
Juga 801

Mimosa
India 804
juliflora 803
latifolia 800
latisiliqua 802
latronum 804
laurina 801
Lebbek 802
mangensis 803
muricata *ib.*
natans 801
nilotica 803
nodosa 801
odoratissima 802
pennata 804
Orfota 803
peregrina 802
pernambucana *ib.*
pigra 804
plena 801
polystachya 802
pudica 801
punctata *ib.*
purpurea 800
quadrivalvis 804
reticulata 800
sanguinea 803
scandens 801
Sejal 802
semispinosa 804
Senegal 803
sensitiva 801
simplicifolia 800
speciosa 802
stellata 801
tamarindifolia 805
tenuifolia 804
tergemina 800
torrilis 803
tortuosa 804
Unguis cati 800
vaga 802
verticillata 800

Mimosa
villosa 804
virgata 803
viva 800

Mimulus 889, 956, 957

alatus 957
luteus *ib.*
ringens 956

Mimusops 598, 612
Elengi 612
Kauki *ib.*

Mindium 601, 618
spicatum 618

Minuartia 89, 208
campestris 208
dichotoma *ib.*
montana *ib.*

Mirabilis 291, 377
dichotoma 377
Jalapar *ib.*
longiflora *ib.*

Misandra 22, 76
magellanica 76

Mitchella 213, 245
repens 245

Mitella 661, 708
diphylla 708
nuda *ib.*

Mitraria 771, 799
Commersoni 799

Mnasium 524, 533
paludosum 533

Mnemosilla 967
aegyptiaca *ib.*

MNIARUM 3, 17
bifiorum 17

Mnium 1284, 1327-1330
aciculare 1328
acinotinum 1329
capillare *ib.*
cespititium 1330
crudum 1329
cuspidatum 1330
fontanum 1329
glaucum 1328
heteromallon 1328
hornum 1329
hygrometricum 1327
latifolium 1328
marchicum 1329
megapolitanum 1327
nutans 1330
palustre 1329
pellucens 1328
pellucidum 1327
proliferum 1330
punctatum *ib.*
purpureum 1328
pusillum *ib.*
ramosum 1329
rostratum 1330
scoparium 1328
serratum 1330
simplex *ib.*
sphaerocarpon 1329
spurium 1328
strictum *ib.*
tomentosum 1329
tortile 1328
triquetrum 1329
uliginosum *ib.*
undulatum 1330

Moehringia 602, 636
muscosa 636

Moenchia 967, 971
aizoides 971
campestris *ib.*
incana *ib.*
sativa *ib.*

Molinaea 598, 611
arborea 611
Mollia 303, 420
imbricata 420
Mollugo 89, 208
oppositifolia 208
paniculata *ib.*
pentaphylla *ib.*
stricta *ib.*
triphylla *ib.*
verticillata *ib.*
Moluccella 885, 911
fruteſcens 911
laevis *ib.*
ſpinoſa *ib.*
tuberoſa *ib.*
Momordica 81, 101, 102
Balſamina 101
Charantia *ib.*
cylindrica *ib.*
Elaterium 102
Luffa 101
operculata *ib.*
pedata 102
trifoliata *ib.*
Monarda 20, 44
ciliata 44
clinopodia *ib.*
didyma *ib.*
ſtiſtuloſa *ib.*
oblongata *ib.*
punctata *ib.*
rugoſa *ib.*
Monetia 215, 254
barlerioides 254
Monilia 1287, 1487
alba 1487
Aſpergillus *ib.*
aurea *ib.*
ceſpitoſa *ib.*
cruſtacea *ib.*
glauca 1487
leproſa *ib.*
ochroleuca *ib.*
purpurea *ib.*
Monnieria 1075, 1079
trifolia 1079
Monodynamis 3, 10
Iſerti 10
Monotropa 658, 685
Hypopithys 685
uniflora *ib.*
Monſonia 1149, 1152
filia 1152
lobata *ib.*
ſpecioſa *ib.*
Montia 89, 206
fontana 206
MONTINIA 216, 277
acris 277
Montira 889, 936
gujanenſis 936
Moquilea 771, 820
gujanenſis 820
Moraea 81, 116-118
africana 117
aphylla *ib.*
collina 118
criſpa *ib.*
filiformis 117
flexuoſa *ib.*
fugax *ib.*
gladiata *ib.*
iridioides *ib.*
ixioides 118
lugens 117
polyanthos 116
ſinenſis 117
ſpathacea *ib.*
Moraea
ſpiralis 117
umbellata 118
virgata 117
Morina 21, 49
perſica 49
Morinda 298, 371
citrifolia 371
muſcoſa *ib.*
Royeni *ib.*
umbellata *ib.*
Moriſonia 999, 1070
americana 1070
Moronobea 1149, 1160
coccinea 1160
Morus 219, 283
alba 283
indica *ib.*
mauritanica *ib.*
nigra *ib.*
papyrifera *ib.*
rubra *ib.*
tatarica *ib.*
tinctoria *ib.*
Xanthoxylum *ib.*
Moſcharia 219, 275
Forſkahlii 275
Mucilago 1287, 1488
ceſpitoſa 1488
cinerea *ib.*
miniata *ib.*
plumoſa *ib.*
Mucor 1287, 1485 *ſq.*
albus 1485
araneoſus 1486
Eryſiphe *ib.*
flavus *ib.*
globoſus *ib.*

infuſo-

Mucor
infusorius 1486
minimus 1485
Mucedo 1486
ovalis 1485
paniceus *ib.*
plumosus 1486
purpureus *ib.*
tremelloides *ib.*
virens *ib.*
Mühlenbergia 87, 171
Schreberi 171
Müllera 1075, 1078, 1115
monilifera 1115
MUNCHHAUSIA 1150, 1153
speciosa 1153
Muntingia 775, 811
Calabara 811
Muriri 656, 693
guianensis 693
MURRAYA 658, 678
exotica 678
Murucoa 294, 344
violacea 344
Musa 523, 567
Ensete 567
humilis *ib.*
paradisiaca *ib.*
sapientum *ib.*
Troglodytarum *ib.*
Mussaenda 299, 376
frondosa 376
spinosa *ib.*
Mutabea 996, 1009
guianensis 1009
MUTISIA 1164, 1244
Clematis 1244
Mutuchi 1076, 1085
suberosa 1085
Myagrum 967, 969
aegyptium 969
austriacum *ib.*
hispanicum *ib.*
orientale *ib.*
paniculatum *ib.*
perenne *ib.*
perfoliatum *ib.*
rigidum *ib.*
rugosum *ib.*
saxatile *ib.*
Myginda 220, 290
latifolia *ib.*
uragoga *ib.*
Myonima 211, 246
Borboniae 246
Myoporum 890, 936
crassifolium 936
laetum *ib.*
pubescens *ib.*
tennifolium *ib.*
Myosotis 292, 315, 316
apula 315
arvensis *ib.*
echinophora 316
fruticosa 315
Lappula *ib.*
nana 316
palustris 315
pectinata 316
rupestris 315
spatulata *ib.*
squarrosa 316
terglovienſis 315
virginiana *ib.*
Myosurus 313, 520
minimus 520
Myrica 219, 284
aethiopica 284
cerifera 284
cordifolia *ib.*
Faya *ib.*
Gale *ib.*
Nagi *ib.*
quercifolia *ib.*
segregata *ib.*
trifoliata *ib.*
Myriophyllum 603, 646
spicatum 646
verticillatum *ib.*
MYRISTICA 2, 10, 11
dactyloides 11
fatua *ib.*
moschata *ib.*
sebifera *ib.*
tomentosa 10
Myrmecia 211, 247
Tachia 247
Myrobalanifera 660, 702
fertilis 702
Myrodendrum 775, 817
balsamiferum 817
Myrodia 999, 1070
turbinata 1070
MYROSMA 1, 7
cannaefolium 7
Myrospermum 655, 665
frutescens 665
Myrothecium 1285, 1460
dubium 1460
hispidum *ib.*
inundatum *ib.*
roridum *ib.*
stercoreum *ib.*

Myroxylon 655, 672
peruiferum 672
Myrsine 295, 404
africana 404
retusa ib.
scabra ib.
Myrtus 770, 790-793
acris 792
alpina 790
androsaemoides 792
angustifolia 791
axillaris ib.
biflora 790
brasiliana ib.
buxifolia 791
caryophyllata 792
Chytraculia ib.
communis 790
cordata 791
cotinifolia 792
crenulata 790
cumini 791
dioica ib.
disticha ib.
fragrans 792
glabrata 791
Gregii 791
laevis ib.
laurina ib.
ligustrina 790
linearis 793
lineata 791
lucida 790
Luma ib.
Makul 792
maxima 791
monticola ib.
nitida 792
paniculata ib.
Pimenta ib.
procera 790
rigida 792
saligna 793
splendens 792
tomentosa 790
triflora 792
Ugni 790
virgultosa 791
zeylanica 792
Zuzygium ib.

Nacibea 213, 279
alba 279
coccinea ib.
Najas 4, 18
marina 18
Nama 307, 457
jamaicensis 457
zeylanica ib.
Napaea 1002, 1050
laevis 1050
scabra ib.
Napimoga 743, 767
guianensis 767
Narcissus 523, 535, 536
bicolor 535
Bulbocodium ib.
calathinus 536
dubius ib.
hispanicus ib.
Jonquilla ib.
minor 535
moschatus ib.
odorus ib.
orientalis 536
poëticus 535
Pseudonarcissus ib.
serotinus ib.
Tazetta 536
triandrus 535
trilobus 536

Nardina 523, 577
domestica 577
Nardus 114, 123
aristata 123
ciliaris ib.
gangitis ib.
indica ib.
stricta ib.
thomaea ib.
Nassauia 1167, 1281
magellanica 1281
Nastus 526, 580
borbonicus 580
Nauclea 302, 358
orientalis 358
Neckeria 3, 16
campestris 16
Nectandra 773, 799
bijuga 799
sanguinea ib.
Nectris 522, 580
aquatica 580
Nemia 888, 936
capensis 936
Nepenthes 275
distillatoria 275
Nepeta 885, 898-900
amboinica 899
americana ib.
angustifolia 900
caerulea 899
canescens 900
Cataria 899
hirsuta ib.
incana 900
indica ib.
italica 899
lanata ib.
lavandulifolia ib.
malabarica ib.
multifida ib.

Nepeta
Nepetella 900
nuda 899
pannonica 900
pectinata 898
scordotis 899
sidaefolia 898
tomentosa 899
tuberosa *ib.*
ucranica 900
violacea 899
virginica 900
Nephelium 305, 464
lappaceum 464
Nephrandra 888, 946
dubia 946
Nerium 294, 435
antidysentericum 435
coronarium *ib.*
divaricatum *ib.*
Oleander *ib.*
zeylanicum *ib.*
Nertera 218, 282
depressa 282
Neurada 663, 739
procumbens 739
Nicandra 658, 677
amara 677
Nicotiana 293, 380
fruticosa 380
glutinosa *ib.*
minima *ib.*
paniculata *ib.*
pusilla *ib.*
rustica *ib.*
Tabacum *ib.*
urens *ib.*
Nigella 779, 851
arvensis 851
damascena *ib.*
hispanica *ib.*
Nigella
orientalis 851
sativa *ib.*
Nigrina 216, 275, 293
spicata 275
NIPA 2, 12
fruticans 12
Nissolia 1075, 1084
arborea 1084
fruticosa *ib.*
Nitraria 741, 751
Schoberi 751
Nolana 292, 325
prostrata 325
Nothria 997, 1012
capensis 1012
Nyotanthes 19, 23
acuminata 23
angustifolia *ib.*
Arbor tristis *ib.*
elongata *ib.*
glauca *ib.*
hirsuta *ib.*
multiflora *ib.*
pubescens *ib.*
Sambac *ib.*
scandens *ib.*
triflora *ib.*
undulata *ib.*
vimineа *ib.*
Nymphaea 776, 811
812
advena 812
alba *ib.*
Lotus *ib.*
lutea 811
Naccheli *ib.*
Nelumbo 812
pentapetala *ib.*
reniformis *ib.*
sagittifolia *ib.*
Nyssa 304, 431, 432
aquatica 431
biflora *ib.*
capitata 432
multiflora 431
Obolaria 887, 954
virginica 954
Ochna 657, 682, 683
Jabotapita 682
nitida 683
parvifolia 682
squarrosa *ib.*
Ochroma 996, 1008
Lagopus 1008
Ochrosia 295, 439
borbonica 439
Ocotea 1149, 1153
guianensis 1153
Ocymum 886, 916-918
acutum 916
album 917
americanum *ib.*
Basilicum 918
capitatum *ib.*
crispum 916
filamentosum 917
fruticosum *ib.*
gratissimum *ib.*
hadiense *ib.*
holosericeum 918
inflexum 916
inodorum *ib.*
menthoides 918
minimum *ib.*
molle *ib.*
monachorum *ib.*
Plectranthus 917
polystachyon *ib.*
prostratum *ib.*

Ocymum
punctatum 917
punctulatum ib.
rugosum 916
salinum 918
sanctum ib.
scutellarioides 917
serpyllifolium 916
tenuiflorum 917
thyrsiflorum 916
verticillatum 917
virgatum ib.
Vaalae 918
Zatarhendi 917
zeylanicum 918

OEDERA 1167, 1279
aliena 1279
prolifera ib.

Oenanthe 308, 484, 485
crocata 485
filiformis ib.
fistulosa 484
globulosa 485
peucedanifolia ib.
pimpinelloides ib.
prolifera ib.

Oenothera 599, 606-607
biennis 606
fruticosa 607
hirta ib.
longiflora ib.
mollissima ib.
muricata ib.
nocturna ib.
octovalvis ib.
parviflora ib.
pumila ib.
sinuata ib.

Olax 83, 93
zeylanica 93

Oldenlandia 213, 263, 264
biflora 263
capensis ib.
corymbosa 264
debilis 263
digyna 264
foetida 263
hirsuta ib.
paniculata 264
pentandra 263
repens ib.
stricta 264
tenuifolia 263
trinervia ib.
umbellata ib.
uniflora ib.

Olea 19, 25
americana 25
cajetana ib.
capensis ib.
europaea ib.
excelsa ib.
fragrans ib.

Olyra 85, 148
latifolia 148
pauciflora ib.

Omphalea 22, 71, 72
axillaris 71
cauliflora ib.
cordata ib.
nucifera 72

Omphalobium 1149, 1152
indicum 1152

Oncoba 776, 828
spinosa 828

Onoclea 1283, 1291
polypodioides 1291
sensibilis ib.

Ononis 1075, 1077, 1096-1099
alba 1097
alopecuroides ib.
antiquorum 1096
argentea 1098
arvensis 1096
capensis 1097
cenisia ib.
cernua 1098
Cherleri 1099
crispa 1098
filiformis ib.
flava 1097
fruticosa 1098
geminata 1097
hircina ib.
hispanica 1098
involucrata ib.
mauritanica ib.
microphylla ib.
minutissima 1097
mitissima ib.
Natrix 1098
ornithopodioides 1099
pinguis 1098
prostrata 1097
pubescens 1098
reclinata 1097
repens ib.
rotundifolia 1098
serrata 1097
spinosa 1096
tridentata 1098
umbellata ib.
vaginalis 1099
variegata 1097
viscosa 1099

Onoperdon 1162, 1190
Acanthium 1190
acaule ib.
arabicum ib.
deltoides ib.
graecum ib.
illyricum ib.
Onosma 291, 321
echioides 321
micranthon ib.
orientale ib.
simplicissimum ib.
Opercularia 214, 232, 233
aspera 233
diphylla ib.
umbellata 232
Ophioglossum 1283, 1291
crotalophoroides 1291
flexuosum ib.
japonicum ib.
lusitanicum ib.
nudicaule ib.
palmatum ib.
pendulum ib.
reticulatum ib.
scandens ib.
vulgatum ib.
Ophiorhiza 293, 333
lanceolata 333
Mitreola ib.
Mungos ib.
subumbellata ib.
Ophioxylum 299, 334
serpentinum 334
Ophira 599, 629
stricta 629
Ophrys 21, 56-58
alaris 58
alata 57
alpina 58
anthropophora 57
arachnites ib.
atrata 58
barbata ib.
bivalvata ib.
bracteata ib.
caffra ib.
camtschatica 58
catholica 57
cernua 56
circumflexa 58
Corallorhiza 56
cordata ib.
crucigera 57
fimbriata ib.
gujanensis ib.
lilifolia ib.
Loeselii ib.
monophyllos ib.
monorchis ib.
myodes ib.
nervosa 58
Nidus avis 56
ovata ib.
paludosa 57
patens 58
peruviana 57
spiralis 56
squamata ib.
trifolia 57
unifolia 58
Volucris 57
Orchis 21, 50-55
abortiva 54
aphylla ib.
barbata 51
batrachites 55
bicornis 50
biflora ib.
bifolia 51
calcarata ib.
carnea 50
ciliaris 51
conopsea 53
coriophora 52
cornuta 51
cruenta 53
cubitalis 52
cucullata ib.
draconis 51
elata 53
falcata 54
filicornis ib.
fimbriata ib.
flava 53
flexicaulis 51
flexuosa ib.
fusca 52
fuscescens 54
globosa 52
habenaria 53
hispidula 52
hyperborea 54
japonica ib.
incarnata 53
lata 51
latifolia 53
longicornis ib.
maculata ib.
mascula 52
militaris ib.
monorhiza 54
moravica 52
Morio ib.
nigra 51
odoratissima 53
ophioglossoides 51
Ornithis ib.
pallens 52
palustris ib.
papilionacea ib.

Orchis
ptycodes 54
pyramidalis 52
rubra *ib.*
sagittalis 51
sambucina 53
sancta 54
spatulata 51
speciosa 53
spectabilis 54
strateumatica *ib.*
suaveolens 53
Susannae 51
tenella *ib.*
tipuloides 54
tripetaloides 51
ustulata 52
varia 53
variegata 52
viridis 54

Oribasia 299, 367
longiflora 367
lutea *ib.*
officinalis *ib.*
paniculata *ib.*
racemosa *ib.*
violacea *ib.*

Origanum 886, 912, 913
aegyptiacum 912
bengalense *ib.*
clinopodioides 913
creticum 912
Dictamnus *ib.*
flexuosum 913
heracleoticum 912
Majorana 913
Maru *ib.*
Onites 912
sipyleum *ib.*
smyrnacum *ib.*
syriacum *ib.*

Origanum
Tournefortii 912
vulgare *ib.*

ORIXA 215, 255
japonica 255

Ornithogalum 525, 549-551
altissimum 551
arabicum *ib.*
bohemicum 550
bulbiferum 551
capense *ib.*
caudatum 550
ciliatum 551
circinatum *ib.*
comosum 550
conicum *ib.*
crenulatum 551
flavescens 550
flavum 551
japonicum *ib.*
latifolium 550
longibracteatum *ib.*
luteum 549
maculatum 550
Massonii 551
miniatum 550
minimum 549
narbonense 550
niveum *ib.*
nutans 551
pilosum *ib.*
pyramidale 550
pyrenaicum 549
reticulatum *ib.*
rupestre 551
suaveolens 550
tenellum *ib.*
thyrsoides 551
uniflorum 549
unifolium 551

Ornithopus 1075, 1077, 1119
compressus 1119
intermedium *ib.*
perpusillus *ib.*
repandus *ib.*
scorpioides *ib.*
tetraphyllus *ib.*

Ornithrophe 603, 613
borbonica 613

Orobanche 887, 954, 955
Arginetia 955
americana 954
cernua *ib.*
crenata 955
foetida 954
laevis *ib.*
major *ib.*
purpurascens *ib.*
purpurea 955
ramosa *ib.*
tinctoria 954
uniflora 955
virginiana *ib.*

Orobus 1075, 1077, 1108
albus 1108
angustifolius *ib.*
canescens *ib.*
hirsutus *ib.*
lathyroides *ib.*
luteus *ib.*
niger *ib.*
pyrenaicus *ib.*
silvaticus *ib.*
tenuifolius *ib.*
tuberosus *ib.*
vernus *ib.*
versicolor *ib.*

Oron-

Orontium 526, 568
aquaticum 568
japonicum ib.
Ortegia 83, 105
dichotoma 105
hiſpanica ib.
Orygia 775, 815
decumbens 815
portulacifolia ib.
Oryza 526, 578
ſativa 578
Osbeckia 599, 605
ſinenſis 605
zeylanica ib.
Osmites 1166, 1261
aſteriſcoides 1261
Bellidiaſtrum ib.
calicina ib.
camphorata ib.
Osmunda 1283, 1292 ſq.
adianthifolia 1292
bifurcata ib.
bipinnata ib.
capenſis 1293
caroliniana ib.
cervina 1292
cinnamomea 1293
Claytoniana ib.
criſpa ib.
diſcolor ib.
filiculifolia 1292
hirſuta ib.
hirta ib.
japonica 1293
Lancea ib.
Lunaria 1292
matricariae ib.
phyllitidis ib.
procera 1293
ramoſa ib.
regalis 1292
ſcandens 1293
Spicanthus ib.
Struthiopteris ib.
ternata 1292
trifida ib.
verticillata ib.
virginica ib.
zeylanica ib.
Oſteoſpermum 1166, 1274 ſq.
aritetoides 1275
caeruleum ib.
calendulaceum 1274
ciliatum 1275
corymboſum 1274
herbaceum 1275
ilicifolium 1274
imbricatum 1275
junceum 1274
moniliferum 1275
niveum ib.
perfoliatum ib.
pinnatifidum ib.
piſiferum 1274
polygaloides ib.
rigidum 1275
ſpinoſum 1274
triquetrum ib.
Oſyris 83, 95
alba 95
japonica ib.
Othera 215, 255
japonica 255
Othonna 1166, 1275-1277
abrotanifolia 1277
arboreſcens 1276
Athanaſia 1277
bulboſa 1276
cacalioides ib.
capillaris 1276
cheirifolia 1275
ciliata 1276
coronopifolia ib.
craſſifolia 1275
denticulata 1276
digitata ib.
ericoides 1275
fruteſcens 1276
heterophylla ib.
lateriflora ib.
Lingua ib.
linifolia 1275
munita 1277
parviflora 1276
pectinata ib.
pinnata 1277
Tagetes ib.
tenuiſſima 1275
trifida 1276
trifurcata ib.
virginea ib.
Ovieda 890, 961
mitis 961
ſpinoſa ib.
Oxalis 662, 733-735
Acetoſella 734
Barrelieri ib.
bifida 735
caprina 734
cernua ib.
compreſſa ib.
corniculata ib.
flava 735
fruteſcens ib.
glabra ib.
hirta ib.
incarnata 734
lanata ib.
longiſtora ib.
minuta 734

Oxalis
monophylla 733
natans 734
punctata ib.
purpurea ib.
repens ib.
sensitiva 735
sericea 734
stricta 735
tomentosa ib.
tuberosa 734
versicolor 735
violacea 734
virgosa ib.

Pacurina 1162, 1201
edulis 1201

Paederia 295, 432
foetida 432

Paederota 19, 31
Ageria 31
bonae spei ib.
Bonarota ib.
caerulea ib.
lutea ib.
minima ib.

Paeonia 777, 839
anomala 839
humilis ib.
integra ib.
officinalis ib.
tenuifolia ib.

Pagamea 219, 285
guianensis 285

Palava 1001, 1040, 1041
malvifolia 1040
moschata 1041

PALLASIA 743, 767
caspica 767

Panax 308, 466
arborea 466
attenuata ib.
fruticosa ib.
Morototoni ib.
quinquefolia ib.
simplex ib.
spinosa ib.
trifolia ib.

Pancratium 523, 536, 537
amboinense 537
caribaeum 536
carolinianum ib.
declinatum ib.
illyricum 537
littorale ib.
maritimum 536
maximum ib.
mexicanum ib.
verecundum 537
zeylanicum 536

PANDANUS 2, 12
odoratissimus 12

Panicum 86, 156-163
acuminatum 159
adhaerens 156
aegyptium 159
alopecuroides 156
anomalum 157
antidoton 161
arborescens 162
aristatum 160
arundinaceum 162
brevifolium ib.
brizoides 158
Burmanni ib.
caffrorum 162
capillare 161
carthaginense 159
ciliare 158

Panicum
cimicinum 160
clandestinum 161
colonum 157
coloratum 160
compositum 157
compressum 159
conglomeratum 157
Crus corvi ib.
Crus galli ib.
curvatum 161
dactylon 159
dichotomum 160
diffusum ib.
distachyon 158
divaricatum 161
divisum 156
elatius 157
falcatum 163
fasciculatum 159
filiforme ib.
flavescens 160
flavidum 156
flexuosum 161
fluitans 158
fugax 162
fuscum 160
geminatum 158
germanicum 156
glaucum ib.
glutinosum 162
grossarium 160
helvolum 156
hirtellum 157
hispidulum 158
hispidum 157
indicum 156
ischaemoides 161
italicum 157
lanatum 162
lanceolatum 158
latifolium 160
laxum ib.

lineare

Panicum
lineare 159
longiflorum 158
maculatum 163
maximum 162
miliaceum 161
molle 159
muricatum 161
muticum 157
nemorosum 159
notatum 161
nudum 162
oryzinum 157
oryzoides 160
pallens 161
palmaefolium 162
patens 161
piliferum 157
pilosum 159
polygamum 162
polystachyon 156
radicans 162
ramosum 160
remotum 161
repens *ib.*
rigens 160
sanguinale 159
sericeum 156
setigerum *ib.*
setosum 157
speciosum 162
squarrosum 158
stagninum 157
tetrastichon 158
trigonum 161
tumidum 157
turgidum 160
umbrosum 158
verticillatum 156
virgatum 161
viride 156

Panke 647, 652
acaulis 652
caulescens *ib.*

Panzeria 211, 247
caroliniana 247

Papaver 774, 809, 810
alpinum 809
Argemone *ib.*
cambricum 810
dubium *ib.*
hybridum 809
nudicaule *ib.*
orientale 810
Rhoeas 809
somniferum 810

Papuleria 304, 429
crystallina 429

Paralea 773, 798
guianensis 798

Pariana 773, 828
campestris 828

Parietaria 217, 266
cretica 266
debilis *ib.*
indica *ib.*
judaica *ib.*
lusitanica *ib.*
officinalis *ib.*
urticaefolia *ib.*

Paris 603, 643
quadrifolia 643

Parivoa 1076, 1085
grandiflora 1085
tomentosa *ib.*

Parkinsonia 655, 667
aculeata 667

Parnassia 312, 507, 508
palustris 508
polynectaria 507

Parthenium 291, 375
Hysterophorus 375
integrifolium *ib.*

Paspalum 87, 155
conjugatum *ib.*
decumbens *ib.*
dissectum *ib.*
distichon *ib.*
filiforme *ib.*
hirsutum *ib.*
longiflorum *ib.*
membranaceum *ib.*
orbiculare *ib.*
paniculatum *ib.*
praecox *ib.*
scrobiculatum *ib.*
vaginatum *ib.*
villosum *ib.*
virgatum *ib.*

Passerina 601, 634
anthylloides 634
capitata *ib.*
ciliata *ib.*
ericoides *ib.*
filiformis *ib.*
grandiflora *ib.*
hirsuta *ib.*
laxa *ib.*
Matnak *ib.*
spicata *ib.*
uniflora *ib.*

Passiflora 311, 500-503
adulterina 501
alata *ib.*
angustifolia *ib.*
aurantia 502
caerulea 503
capsularis 501
ciliata 502
coccinea 501
cuprea *ib.*
foetida 502

glauca

Passiflora
glauca 502
heterophylla *ib.*
hirsuta *ib.*
holosericea *ib.*
incarnata *ib.*
laurifolia 500
lutea 502
maliformis 501
minima 502
mixta *ib.*
multiflora 501
Muracuja *ib.*
normalis *ib.*
oblongata *ib.*
pallida 500
parviflora 502
pedata 503
perfoliata 501
punctata 502
quadrangularis 501
rotundifolia 502
rubra 501
serrata 503
serratifolia 500
stipulata 502
suberosa *ib.*
tiliaefolia 501
Velpertilio *ib.*

Pastinaca 310, 490
lucida 490
opopanax *ib.*
sativa *ib.*

Patabea 213, 280
coccinea 280

Patagonula 293, 393
americana 393

Patima 299, 366
gujanensis 366

Patterſonia 888, 925
caroliniana 925

Paullinia 603, 641, 642
asiatica 641
barbadensis *ib.*
caribaea *ib.*
carthaginensis *ib.*
curassavica *ib.*
Cururu *ib.*
divaricata *ib.*
diversifolia 642
japonica 641
mexicana *ib.*
nodosa *ib.*
pinnata 642
polyphylla 641
Seriana *ib.*
tetragona 642
tomentosa *ib.*
triternata 641
Vespertilia 642

Pavetta 212, 243
caffra 244
foetidissima 243
indica 244

Pavonia 1000, 1060, 1061
aristata 1060
cancellata *ib.*
coccinea 1061
Columella *ib.*
cuneifolia *ib.*
hastata *ib.*
paniculata 1060
papilionacea 1061
praemorsa *ib.*
Spicata 1060
spinifex *ib.*
urens 1061
zeylanica 1060

Paypayrola 303, 419
gujanensis 419

Pectis 1164, 1246
ciliaris 1246
humifusa *ib.*
linifolia *ib.*
punctata *ib.*

Pedalium 890, 965, 966

Murex 965

Pedicularis 889, 925, 927
acaulis 927
canadensis 926
comosa *ib.*
crista *ib.*
flammea *ib.*
flava *ib.*
foliosa *ib.*
hirsuta *ib.*
incarnata *ib.*
lapponica *ib.*
myriophylla 925
palustris *ib.*
recutita 926
resupinata *ib.*
rosea *ib.*
rostrata 925
Sceptrum carolinum 926
silvatica 925
spicata 927
striata *ib.*
tristis 926
tuberosa *ib.*
verticillata *ib.*

Peganum 741, 750
dauuricum 750
Harmala *ib.*
retusum *ib.*

Peltaria 967, 977
alliacea 977
capensis *ib.*

Penaea 212, 249
fruticulosa 249
furcata ib.
lateriflora ib.
marginata ib.
mucronata ib.
myrtoides ib.
Sarcocolla ib.
squamosa ib.
tetragona ib.
Pennantia 304, 430
corymbosa 430
Pentaglossum 20, 50
linifolium 50
Pentapetes 998, 1028
acerifolia 1028
Erythroxylon ib.
tuberosa ib.
velutina ib.
Penthorum 662, 733
sedoides 733
Peplis 526, 578
Portula 578
tetrandra ib.
Pera 778, 840
arborea 840
Perama 210, 232
hirsuta 232
Perdicium 1163, 1243 sq.
brasiliense 1243
laevigatum 1244
magellanicum ib.
radiale 1243
semiflosculare 1243
tomentosum 1244
PERGULARIA 306, 440
glabra 440
japonica 440
tomentosa ib.
Periconia 1486
lichenoides ib.
Perilla 885, 904
ocymoides 904
Periploca 306, 440, 441
africana 440
capsularis ib.
emetica 441
esculenta 440
graeca ib.
indica ib.
laevigata ib.
Secamone ib.
silvestris 441
tunicata ib.
Petagnana 1078, 1119
sensitiva 1119
Petaloma 658, 678
Mouriri 678
myrtilloides ib.
Peteſia 212, 244
carnea 244
stipularis ib.
tomentosa ib.
Petitia 211, 245
domingensis 245
Petiveria 528, 589
alliacea 589
octandra ib.
Petrea 889, 944
volubilis 944
Petrocarya 593, 596
campestris 596
montana ib.
Peucedanum 308, 477
alpestre 477
allaticum ib.
aureum ib.
geniculatum ib.
japonicum ib.
minus ib.
nodosum ib.
officinale ib.
redivivum ib.
Silaus ib.
Peumus 523, 565, 566
alba 565
Boldus 566
mammosa 565
rubra ib.
Peziza 1286, 1451-1459
aceris 1458
Acetabulum 1459
albidula 1454
applanata 1458
aquifolii 1457
arancosa 1456
atra ib.
Auricula 1459
bicolor ib.
bolaris 1453
bulbosa 1451
caerulea 1457
caliciformis 1452
Caliculus ib.
callosa 1456
candidissima 1454
carnea 1458
cartilaginea 1457
carpini 1451
cerea 1459
chrysocoma 1457
ciliaris 1453
ciliata

Peziza
ciliata 1456
cinerea 1457
citrina 1454
clandestina 1453
comitialis 1458
convivalis 1453
coriacea 1451
coronata 1455
Crater 1452
Craterella ib.
crenata 1455
crinita 1458
crispa ib.
crocea 1457
Crucibulum 1454
cupressi ib.
cupularis 1454
cyathoides ib.
Diadema 1455
discolor 1454
dubia 1452
echinophila 1451
elastica 1459
epiphylla 1455
cruciformis 1453
exilis 1459
expallescens 1457
fimetaria 1456
flava 1455, 1457
floccosa 1456
fulva 1458
Fungoidaster 1452
gelatinosa 1459
granulata 1456
grisea 1458
Haematigma 1455
Halleri 1452
hemisphaerica 1455
hepatica 1458
hians 1453
hirsuta 1456
hirta 1455
hirtella 1456
Hirundo 1452
hispida 1455
hispidula 1456
hypocrateriformis 1456
jenensis 1457
immarginata 1457
infundibuliformis 1454
Infundibulum 1452
Labellum 1455
lacera ib.
lactea 1453
lanuginosa 1455
leporina 1456
limbata 1459
livida 1457
leucoloma 1458
lutescens 1454
marchica 1456
membranacea ib.
miniata 1453
minima 1454
minuta 1459
minutissima 1453
nana 1458
nigra 1456
nigrescens 1455
nivea 1457
nutans 1452
olivacea 1458
palearea 1453
palpebralis 1457
papyracea 1458
pedunculata 1453
Pileolus 1458
pineti ib.
pinguis 1455
polymorpha 1459
porphyrea ib.
porphyrospermos ib.
pulla 1456
pulvinata 1457
punicea 1458
purpurea 1453
pusilla 1456
pustulata 1455
pyriformis 1453
quercina 1452
rhizophora 1455
rugosa 1457
famosa 1459
farcoides 1454
Sceptrum 1451
Schenkii 1457
scutellata 1457
Seminulum 1458
sepulcralis 1454
sigillatoria 1453
spadicea 1454
stercorea 1457
stipitata 1453
sulphurea 1452
tenella 1451
tomentosa 1456
tremelloides 1454
Tuba 1451
tuberosa ib.
umbrina 1453
urceolata ib.
urticae ib.
varia 1452
villosa ib.
violacea ib.
virescens 1457
virginea 1453
viridans 1456
viridis 1458

Phaca 1075, 1077, 1131, 1132
alpina 1131
arenaria ib.
australis ib.

Phaca
bactica 1131
incana 1132
microphylla *ib.*
muricata *ib.*
oxyphylla 1131
proſtrata 1132
falſula 1131
ſibirica *ib.*
ſilvatica *ib.*
trifoliata *ib.*
veſicaria 1132
Phacelia 293, 330
ſecunda 330
Phalaris 86, 153, 154
alpina 153
aquatica *ib.*
arundinacea *ib.*
aſpera *ib.*
bulboſa *ib.*
canarienſis *ib.*
caroliniana 154
criſtata *ib.*
dentata *ib.*
diſticha *ib.*
erucaeformis 153
hiſpida 154
muricata *ib.*
nodoſa 153
oryzoides *ib.*
paradoxa *ib.*
phleoides *ib.*
ſemiverticillata 154
ſetacea *ib.*
utriculata 153
vaginiflora 154
velutina *ib.*
zizanioides 153
Phallus 1285, 1448 *ſq.*
Anaſtomoſis 1449
caninus *ib.*
eſculentus *ib.*
fungoides 1448
Gigas *ib.*
impudicus 1449
Mokuſin *ib.*
patulus *ib.*
Rete *ib.*
undoſus 1448
Pharnaceum 311, 505, 506
albens 506
Cerviana 505
cordifolium 506
depreſſum *ib.*
dichotomum 506
diſtichum *ib.*
glomeratum *ib.*
incanum *ib.*
lineare 505
maritimum 506
microphyllum 505
Mollugo 506
occultum *ib.*
quadrangulare *ib.*
ſerpyllifolium *ib.*
ſuffruticoſum *ib.*
umbellatum *ib.*
Pharus 526, 579
ariſtatus 579
ciliatus *ib.*
lappulaceus *ib.*
latifolius *ib.*
Phaſcum 1284, 1323 *ſq.*
alternifolium 1324
cauleſcens *ib.*
cernuum 1323
crispum 1323
cuſpidatum *ib.*
muticum *ib.*
nitidum 1324
patens 1323
pedunculatum *ib.*
piliferum *ib.*
repens 1324
ſerratum 1323
ſubulatum *ib.*
Phaſeolus 1075, 1077, 1101, 1102
aconitifolius 1102
alatus 1101
Aſellus 1102
bipunctatus 1101
Caracalla 1102
farinoſus 1101
helvolus *ib.*
hirtus 1102
inamoenus 1101
lathyroides 1102
lunatus 1101
Max 1102
Mungo *ib.*
nanus *ib.*
Palla 1101
perennis *ib.*
radiatus 1102
ſemierectus *ib.*
ſphaeroſpermos *ib.*
vexillatus 1101
vulgaris *ib.*
Phellandrium 309, 485
aquaticum 485
Mutellina *ib.*

Philadelphus 786
aromaticus 786
coronarius *ib.*
floribundus *ib.*
inodorus *ib.*
laniger *ib.*
Phileſia 996, 1012
magellanica 1012
Phillyrea 19, 25
angulifolia 25
latifolia *ib.*
media *ib.*
Philydrum 1, 9
lanuginoſum 9
Phleum 86, 166, 167
alopecuroides 166
alpinum *ib.*
arenarium *ib.*
aſperum 167
Bellardi 166
Gerardi *ib.*
Micheli *ib.*
nodoſum *ib.*
paniculatum 167
pratenſe 166
ſchoenoides *ib.*
viride *ib.*
Phlomis 885, 910, 911
alba 910
alpina 911
caribaea 910
fruticoſa 911
glabrata 910
Herba venti 911
indica 910
laciniata *ib.*
Leonotis *ib.*
Leonurus *ib.*
Lychnitis *ib.*
martinicenſis 911
770, Phlomis
moluccoides 910
nepetifolia 911
Niſſolii 910
purpurea 911
ſamia *ib.*
ſinenſis 910
tuberoſa 911
zeylanica 910
Phlox 294, 338, 339
carolina 338
divaricata *ib.*
glaberrima *ib.*
maculata *ib.*
ovata *ib.*
paniculata *ib.*
piloſa *ib.*
ſetacea 339
ſibirica 338
ſuaveolens *ib.*
ſubulata *ib.*
undulata *ib.*
Phoenix 83, 95
dactylifera 95
puſilla *ib.*
PHORMIUM 525, 561
bulbiferum 561
tenax *ib.*
Phryma 886, 921
carolinenſe 921
Leptoſtachyon *ib.*
Phylica 302, 401, 402
bicolor 401
buxifolia 402
calloſa *ib.*
cordata *ib.*
dioica *ib.*
ericoides 401
eriophoros *ib.*
imberbis *ib.*
parviflora 402
Phylica
pinifolia 402
plumoſa *ib.*
pubeſcens 401
ſpicata 402
ſtipularis 401
ſtriguſa *ib.*
Phyllachne 2, 11
uliginoſa 11
Phyllanthus 89, 203, 204
Arbuſcula 204
bacciformis 203
carolinianus 204
Conami 203
Emblica *ib.*
falcatus 204
grandifolius 203
Hamrur 204
maderaſpatenſis 203
mimoſoides *ib.*
Niruri *ib.*
nutans *ib.*
racemoſus *ib.*
rhamnoides 204
ſimplex *ib.*
ſpecioſus 203
ſtellatus 204
Urinaria *ib.*
virgatus *ib.*
Phyllis 307, 464
nobla 464
Phyſalis 296, 381, 382
Alkekengi 381
angulata 382
arboreſcens 381
ariſtata *ib.*
barbadenſis 382
curaſſavica 381
dubia 382
flexuoſa 381

limenſis

Physalis
limenſis 382
lutea *ib.*
minima *ib.*
nutans *ib.*
penſilvanica 381
peruviana *ib.*
proſtrata *ib.*
pruinoſa 382
pubeſcens *ib.*
ramoſa *ib.*
ſomnifera 381
torrentoſa 382
viſcoſa 381

Phyteuma 297, 354, 355
americanum 355
betonicaefolium 354
Charmelii *ib.*
comoſum *ib.*
hemiſphaericum *ib.*
orbiculare *ib.*
pauciflorum *ib.*
pinnatum 355
ſcorzonerifolium 354
ſpicatum *ib.*

Phytolacca 663, 739
decandra 739
dioica *ib.*
icoſandra *ib.*
octandra *ib.*

Picris 1161, 1170
aſplerioides 1170
echioides *ib.*
hieracioides *ib.*
japonica *ib.*
ſcabra *ib.*

Pilobolus 1462
conglomeratus *ib.*
cryſtallinus *ib.*
roridus *ib.*

Pilularia 1284, 1322
globulifera 1322

Pimpinella 310, 491, 492
Anium 492
dichotoma *ib.*
dioica *ib.*
glauca *ib.*
hircina *ib.*
magna *ib.*
nigra *ib.*
peregrina *ib.*
ſaxifraga 491
Tragium 492

Pinguicula 20, 39
alpina 39
caerulea *ib.*
luſitanica *ib.*
lutea *ib.*
villoſa *ib.*
vulgaris *ib.*

Pinus 1001, 1071-1074
Abies 1073
alba *ib.*
americana *ib.*
araucana *ib.*
balſamea *ib.*
canadenſis *ib.*
Cedrus *ib.*
Cembra 1072
cupreſſoides 1074
glabra 1072
halepenſis *ib.*
laricina 1073
Larix 1072
lutea *ib.*
mariana 1073
maritima 1072
occidentalis *ib.*
paluſtris *ib.*
pendula 1073
Picea 1073
Pinaſter 1071
Pinea 1072
reſinoſa *ib.*
rigida *ib.*
ſilveſtris 1071
ſquarroſa 1072
Strobus *ib.*
Taeda *ib.*
virginiana 1071

Piper 22, 76-79
acuminatum 77
aduncum *ib.*
alpinum 78
Amalago 76
amplexicaule 79
Betel 76
blandum 77
capenſe *ib.*
cluſiaefolium *ib.*
cordifolium 79
Cubeba 77
decumanum *ib.*
diſcolor 78
diſtachyon *ib.*
excelſum 79
filiforme *ib.*
geniculatum 78
glabellum 79
hiſpidulum *ib.*
hiſpidum 78
latifolium 77
longum *ib.*
macrophyllum 78
maculatum 77
magnoliaefolium *ib.*
Malamiri 76
medium 77
methyſticum 78
nigrum 76
nitidum 78
numularifolium 79

Piper
obtusifolium 77
pallidum 79
pellucidum 77
peltatum 78
pulchellum *ib.*
quadrifolium *ib.*
reflexum *ib.*
reticulatum 77
retusum *ib.*
rotundifolium *ib.*
scandens 79
serpens *ib.*
Siriboa 76
stellatum 79
tenellum *ib.*
tetraphyllum *ib.*
trifolium 78
umbellatum *ib.*
verrucosum *ib.*
verticillatum *ib.*
Pirigara 770, 787
hexapetala 787
tetrapetala *ib.*
Piripea 888
Piscidia 1075, 1076, 1088
carthagenensis 1088
Erithrina *ib.*
Pisonia 303, 431
aculeata 431
buxifolia *ib.*
coccinea *ib.*
inermis *ib.*
subcordata *ib.*
Pistacia 305, 457
Lentiscus 457
narbonensis *ib.*
Terebinthus *ib.*
trifolia *ib.*
vera *ib.*
Pistia 525, 565
Stratiotes 565
Pisum 1075, 1077, 1107, 1108
arvense 1107
maritimum 1108
Ochrus *ib.*
sativum 1107
Pitcarnia 522, 530
angustifolia 530
bromelinefolia *ib.*
latifolia *ib.*
Pittosporum 311, 411, 412
coriaceum 412
tenuifolium 411
umbellatum *ib.*
Placoma 390
pendulum *ib.*
Plagianthus 998, 1026
divaricatus 1026
Planera 86, 150
aquatica 150
Plantago 212, 251-254
aegyptiaca 253
afra 254
albicans 252
alpina 253
altissima 252
argentea *ib.*
asiatica *ib.*
Bellardi *ib.*
caroliniana 254
Columnae 253
Cornuti *ib.*
coronopifolia *ib.*
crassifolia *ib.*
cretica *ib.*
cylindrica *ib.*
Cynops 254
decumbens 253
dentata 252
exigua 254
Gouani 251
gracilis 252
incurvata 253
indica 254
Lagopus 252
lanata *ib.*
lanceolata *ib.*
Loeflingii 253
lusitanica 252
macrorhiza 251
major *ib.*
maritima 253
media 252
minuta *ib.*
ovata 253
Psyllium 254
serpentina 253
Serraria 252
subulata 253
virginica 252
Platanus 777, 821
occidentalis 821
orientalis *ib.*
Plectronia 302, 419
ventosa 419
Plegorhiza 647, 652
Guaicuru 652
Plinia 771, 796
crocea 796
pedunculata *ib.*
Plocama 296, 428
pendulum 428
Plotea 295, 404
Adansoni 404
Pluckenetia 997, 1013
volubilis 1013

Plumbago 291, 337, 338
europaea 337
rosea ib.
scandens 338
zeylanica 337
Plumieria 294, 437
alba 437
obtusa ib.
pudica ib.
rubra ib.
Poa 88, 179-183
abyssinica 180
alpina 179
amabilis 180
amboinensis 182
anceps 180
angustifolia 179
annua ib.
aquatica ib.
aspera 181
barbata 180
bohemica 181
brizoides ib.
bulbosa ib.
capillaris 180
cilianensis 181
ciliaris 182
cinerea 183
compressa 182
contracta ib.
cristata ib.
cynosuroides ib.
decumbens ib.
distans 181
disticha 183
divaricata 181
dura ib.
Eragrostis 180
expensa 181
ferruginea 180
flava 179
Gerardi ib.
glomerata 182
glutinosa 180
hirta ib.
japonica ib.
malabarica 181
maritima ib.
montana ib.
multiflora 182
nemoralis 181
nitens 179
nutans 182
palustris 179
peruviana 182
Phoenix 180
pilosa 179
planiculmis 182
plumosa 180
pratensis 179
prolifera 180
punctata ib.
rigida 181
salina 179
secuta 183
silvatica 180
simplex 179
sinensis 181
spicata 182
subnuda 179
tenella 181
trivialis 179
unioloides 182
Villarsii ib.
viscosa 180
Podophyllum 776, 808
diphyllum 808
peltatum ib.
Poinciana 655, 671
bijuga 671
elata ib.
pulcherrima ib.
Poiretia 213, 263
erecta 263
procumbens ib.
Polemonium 294, 347
caeruleum 347
campanuloides ib.
dubium ib.
reptans ib.
roelloides ib.
POLLIA 525, 556
japonica 556
Pollichia 885, 905
amplexicaulis 905
Galeobdolon ib.
Polyanthes 524, 559
tuberosa 559
Polycardia 301, 407
madagascariensis 407
Polycarpon 89, 207, 208
magellanicum 207
tetraphyllum 208
uniflorum ib.
Polycnemum 84, 106
arvense 106
monandrum ib.
oppositifolium ib.
sclerospermum ib.
Polygala 1075, 1081-1083
aestuans 1082
alopecuroides ib.
amara ib.
aspalatha ib.
bracteolata ib.
brasilienfis ib.
Chamaebuxus 1082

Polygala
ciliata 1083
cruciata *ib.*
cymosa *ib.*
diversifolia 1082
Fimuu *ib.*
glaucoides 1083
grandiflora *ib.*
Heisteria 1082
incarnata 1081
lutea 1083
major 1081
microphylla 1082
mixtus *ib.*
monspeliaca 1081
myrtifolia 1082
oppositifolia *ib.*
paniculata 1081
Penaea 1082
polygama 1083
sanguinea *ib.*
Senega *ib.*
sibirica 1081
sinensis 1082
spinosa 1081
squarrosa 1082
stipulacea 1083
terétifolia 1081
theezans 1082
trichosperma 1081
triflora 1083
trinervia 1082
umbellata 1081
verticillata 1083
violacea 1082
virideſcens 1083
vulgaris 1081

Polygonum 603, 637-639
amphibium 637
arifolium 638
articulatum 639
aviculare *ib.*
barbatum 638
Bellardi 639
Biſtorta 638
Convolvulus 639
crassifolium *ib.*
divaricatum *ib.*
dumetorum *ib.*
erectum *ib.*
Fagopyrum *ib.*
filiforme 638
fruteſcens 637
Hydropiper 638
lapathifolium 637
maritimum 639
minus 638
multiflorum 639
ocreatum 638
orientale *ib.*
penſilvanicum *ib.*
perfoliatum *ib.*
Perſicaria *ib.*
ſagittatum *ib.*
ſcandens 639
ſerratum *ib.*
ſinenſe *ib.*
tataricum *ib.*
tinctorium 638
undulatum 639
virginianum 637
viviparum 639

Polymnia 1166, 1270
abyſſinica 1270
canadenſis *ib.*
carnoſa *ib.*
ſpinoſa *ib.*
Tetragonotheca *ib.*
Uvedelia *ib.*
Wedelia *ib.*

Polypodium 1283, 1304-1314
acroſtichoides 1305
aculeatum 1312
adiantiforme 1311
adiantoides 1310
aemulum 1308
affine 1313
alatum 1306
alpinum 1313
anguſtifolium 1305
arboreum 1313
ariſtatum 1311
armatum 1314
aſperum *ib.*
aſplenifolium 1306
aureum *ib.*
auriculatum 1309
axillare 1314
Barometis 1312
bulbiferum *ib.*
Callipteris 1311
cambricum 1307
capenſe 1313
cicutarium 1308
comoſum 1305
cordifolium 1309
coriaceum 1308
craſſifolium 1305
crenatum 1309
crenulatum 1313
criſpatum 1306
criſtatum 1311
dealbatum 1313
decuſſatum 1312
deltoideum 1307
dentatum 1308
denticulatum 1314
dichotomum 1313
diſſectum 1308
diſſimile 1309
Dryopteris 1313
echinatum 1309
effuſum

Polypodium *effuſum* 1308
Polypodium elliptícum 1306
Polypodium *elongatum* 1313
Polypodium *erectum* 1310
Polypodium exaltatum 1309
Polypodium *exoſum* 1311
Polypodium *extenſum* 1312
Polypodium falcatum 1309
Polypodium Filix femina 1312
Polypodium Filix mas *ib.*
Polypodium fontanum 1308
Polypodium fragile 1312
Polypodium fragrans 1310
Polypodium *fraxinifolium* *ib.*
Polypodium glaucum 1313
Polypodium *gramineum* 1304
Polypodium *gujanenſe* 1310
Polypodium haſtatum 1306
Polypodium heterophyllum 1305
Polypodium *Hippocrepis* 1310
Polypodium *hirſutulum* *ib.*
Polypodium *hirtum* 1308
Polypodium *horridum* 1314
Polypodium *inciſum* 1307
Polypodium *inviſum* *ib.*
Polypodium lacerum 1313
Polypodium *laciniatum* 1311
Polypodium lanceolatum 1304
Polypodium *latifolium* 1311
Polypodium lineare 1305
Polypodium Lonchitis 1309
Polypodium loriceum 1306
Polypodium *lunulatum* 1313
Polypodium lycopodioides 1304
Polypodium marginale 1309
Polypodium marginatum 1313
Polypodium *marginellum* 1305
Polypodium *medullare* 1312
Polypodium *minimum* 1304
Polypodium *molle* 1310
Polypodium *molliſſimum* *ib.*
Polypodium *montanum* *ib.*
Polypodium *montium* 1314
Polypodium *multifidum* *ib.*
Polypodium muricatum 1312
Polypodium *myoſuroides* 1306
Polypodium noveboracenſe 1312
Polypodium *nudum* *ib.*
Polypodium *nymphale* 1311
Polypodium *obliteratum* 1307
Polypodium *orientale* 1312
Polypodium Otites 1307
Polypodium paraſiticum 1310
Polypodium *patens* 1308
Polypodium pectinatum 1307
Polypodium *pendulum* 1306
Polypodium *pennigerum* 1311
Polypodium Phegopteris 1310
Polypodium phyllitidis 1305
Polypodium phymatodes 1306
Polypodium Pica *ib.*
Polypodium piloſelloides 1305
Polypodium *plantagineum* *ib.*
Polypodium pubeſcens 1312
Polypodium punctatum 1308
Polypodium *puſtulatum* 1306
Polypodium pyramidale 1313
Polypodium *quadripinnatum* 1314
Polypodium quercifolium 1307
Polypodium regium 1313
Polypodium *repens* 1305
Polypodium reptans 1309
Polypodium *reticulatum* 1310
Polypodium retroflexum *ib.*
Polypodium rhaeticum 1312
Polypodium *rhizophyllum* 1309
Polypodium *rigidum* 1304
Polypodium *ſagittatum* 1309
Polypodium *ſcandens* 1306
Polypodium ſcolopendroides 1307
Polypodium *ſemicordatum* 1309
Polypodium *ſerpens* 1305
Polypodium *Serra* 1307
Polypodium *ſerratum* 1310
Polypodium *ſetiferum* 1312
Polypodium ſetigerum *ib.*
Polypodium *ſetoſum* 1311
Polypodium ſimile 1309
Polypodium ſpeluncae 1313
Polypodium ſpinoſum *ib.*
Polypodium ſquamatum 1306
Polypodium *ſtoloniferum* 1305
Polypodium ſtruthionis 1307
Polypodium *ſurinamenſe* 1305
Polypodium ſuſpenſum 1306
Polypodium taxifolium 1307
Polypodium *tenellum* 1310
Polypodium *tetragonum* 1307
Polypodium Thelypteris 1311
Polypodium triangulare 1309
Polypodium *trichomanoides* 1306
Polypodium trifoliatum 1308
Polypodium trifurcatum 1305
Polypodium *triphyllum* 1308
Polypodium *umbroſum* 1314
Polypodium unitum 1309
Polypodium varium 1311
Polypodium *veſtitum* 1311
Polypodium villoſum 1312
Polypodium virginianum 1307
Polypodium vulgare *ib.*
Polypremum 212, 248
Polypremum procumbens 248
Polytrichum 1284, 1326 *ſq.*
Polytrichum *aloides* 1326
Polytrichum alpinum 1327
Polytrichum commune 1326
Polytrichum convolutum 1327
Polytrichum *hercynicum* *ib.*
Polytrichum *juniperinum* 1326
Polytrichum magellanicum *ib.*
Polytrichum nanum *ib.*
Polytrichum *piliferum* *ib.*

Polytrichum
pulverulentum 1326
ſerratum *ib.*
undulatum *ib.*
urnigerum 1327
Pometia 593, 595, 596
pinnata 595
ternata 596
POMMEREULA 83, 123
Cornucopiae 123
moneica *ib.*
Ponaea 603, 640
gujanenſis 640
Pontederia 524, 533, 534
azurea 533
cordata 534
haſtata *ib.*
limoſa *ib.*
ovata 533
rotundifolia *ib.*
vaginalis 534
Populus 601, 630-631
alba 630
angulata *ib.*
balſamifera *ib.*
canadenſis 631
candicans 630
carolinenſis 631
dilatata 630
graeca *ib.*
heterophylla *ib.*
laevigata *ib.*
monilifera *ib.*
nigra *ib.*
tremula *ib.*
PORANA 307, 339
volubilis 339
Poraqueiba 299, 331
gujanenſis 331
Porella 1284, 1322
pinnata 1322
Porteſia 600, 609, 610
mucronata 610
ovata 609
Portlandia 297, 360
coccinea 360
grandiflora *ib.*
hexandra *ib.*
tetrandra *ib.*
Portulaca 741, 751, 752
Anacampſeros 752
arabica *ib.*
craſſifolia *ib.*
fruticoſa *ib.*
halimoides 751
imbricata 752
meridiana *ib.*
oleracea 751
patens 752
piloſa 751
quadrifida 752
triangularis *ib.*
Poſſira 773, 797
ſimplex 797
triphylla *ib.*
Potamogeton 220, 288, 289
compreſſum 288
criſpum *ib.*
dentum *ib.*
fluitans *ib.*
gramineum *ib.*
lucens *ib.*
marinum 289
natans 288
nitens *ib.*
pectinatum *ib.*
Potamogeton
perfoliatum 288
pinnatum 289
puſillum *ib.*
ſerratum 288
ſetaceum *ib.*
verticillatum 289
Potentilla 781, 857-860
alba 859
alchimilloides *ib.*
Anſerina 858
argentea *ib.*
aſtracanica 859
aurea *ib.*
bifurca 858
canadenſis *ib.*
cauleſcens 859
Cluſiana *ib.*
fragarioides 858
fruticoſa *ib.*
grandiflora 860
hirta 858
intermedia 859
monſpelienſis *ib.*
multifida 858
nitida 859
nivalis 858
nivea 860
norwegica *ib.*
opaca 859
penſilvanica 858
pimpinelloides *ib.*
recta *ib.*
reptans 859
rupeſtris 858
ſalisburgenſis 859
ſericea 857
ſtipularis 858
ſubacaulis 860
ſupina 858
tridentata 860

valde-

Potentilla
valderia 858
verna 859
Poterium 777, 832
caudatum 832
hybridum *ib.*
Sanguiſorba *ib.*
ſpinoſum *ib.*
Pothos 218, 274, 275
acaulis 274
cordata 275
crenata 274
cuſcuaria *ib.*
lanceolata *ib.*
macrophylla 275
ovata 274
palmata 275
pinnata *ib.*
ſcandens 274
violacea *ib.*
Poupartia 663, 728
gujanenſis 728
Praſium 886, 921
coccineum 921
incarnatum *ib.*
majus *ib.*
minus *ib.*
purpureum *ib.*
PREMNA 887, 944
integrifolia 944
ferratifolia *ib.*
Prenanthes 1161, 1173, 1174
alba 1174
altiſſima *ib.*
chondrilloides 1173
debilis *ib.*
dentata *ib.*
haſtata 1174
biſpida 1173
humilis 1174
Prenanthes
japonica 1174
integra 1173
lyrata 1174
multiflora *ib.*
muralis *ib.*
pinnata *ib.*
purpurea *ib.*
repens *ib.*
ſinenſis 1173
ſpinoſa *ib.*
ſquarroſa 1174
tenuifolia 1173
viminea *ib.*
Primula 292, 326, 327
acaulis 326
Auricula 327
calycantha 326
carniolica 327
cortuſoides *ib.*
elatior 326
farinoſa 327
glutinoſa *ib.*
hirſuta *ib.*
integrifolia *ib.*
longiflora *ib.*
lutea *ib.*
minima *ib.*
nivalis *ib.*
officinalis 326
Palinuri 327
verticillata *ib.*
villoſa *ib.*
viſcoſa *ib.*
Prinos 523, 574
glaber 574
lucidus *ib.*
montanus *ib.*
ſideroxyloides *ib.*
verticillatus *ib.*
Prockia 772
Crucis *ib.*
Procris 217, 267
axillaris 267
Proſerpinaca 89, 207
paluſtris 207
Proſopis 657, 678
ſpicigera 678
Protea 215, 221-225
acaulis 224
alba 223
argentea 224
aulacea 223
bracteata 222
bruniades 223
caudata 222
cinerea 224
comoſa 222
conifera 224
conocarpa 222
cordata 225
corymboſa 223
crinita 222
cucullata *ib.*
cyanoides 221
cynaroides 225
decumbens 221
divaricata 225
elliptica 222
florida 221
Gaguedi 225
glabra *ib.*
glomerata 221
grandiflora 224
heterophylla 221
hirta 225
hypophylla 222
imbricata 224
incurva 222
Lagopus 221
lanata 223
Leviſanus 224
linearis 223
mellifera *ib.*

Protea
myrtifolia 224
nana 223
obliqua ib.
pallens 224
parviflora ib.
patula 221
phylicoides ib.
pinifolia 222
plumosa 224
prolifera 223
puber 225
purpurea 223
racemosa 222
repens 223
saligna 224
Sceptrum 222
Scolymus 223
sericea 224
Serraria 221
spatulata 225
speciosa ib.
sphaerocephala 221
spicata ib.
strobilina 224
tomentosa 222
torta 223
totta 225
triternata 221
umbellata 223

Prunella 886, 920
grandiflora 920
hyssopifolia ib.
indica ib.
intermedia ib.
laciniata ib.
parviflora ib.
vulgaris ib.

Prunus 771, 794-796
americana 795
aspera 796
avium 795

Prunus
canadensis 794
carolina ib.
Cerasus 795
Chamaecerasus ib.
domestica ib.
elliptica ib.
glandulosa ib.
japonica ib.
incisa 796
insititia 795
latifolia ib.
Lauro-cerasus 794
lusitanica ib.
Mahaleb 795
nana 794
nigra 795
occidentalis 794
Padus ib.
paniculata 795
pensilvanica 795
pumila ib.
rubra 794
sibirica 795
sphaerocarpa 794
spinosa 795
tomentosa 796
virginiana 794

Psathura 523, 577
borbonica 577

Psidium 770, 786, 787
aromaticum 786
Cujavillus ib.
decaspermum ib.
grandiflorum ib.
guineense ib.
montanum 787
pomiferum 786
pyriferum ib.

Psoralea 1077, 1138, 1139
aculeata 1138
americana 1139
aphylla 1138
axillaris 1139
bituminosa ib.
bracteata 1138
capitata ib.
corylifolia ib.
Dalea 1139
decumbens 1138
enneaphylla 1139
folioloſa ib.
glandulosa ib.
hirta 1138
laevigata 1139
leporina ib.
lutea 1138
palaestina ib.
pentaphylla 1139
pinnata ib.
prostrata ib.
repens 1138
rotundifolia ib.
spicata ib.
stachydis ib.
tenuifolia ib.
tetragonoloba 1139

Psychotria 298, 362-364
alpina 364
asiatica 363
brachiata 364
citrifolia 363
corymbosa 362
crocea 363
emetica 364
foetens 363
glabrata ib.
grandis 364
herbacea ib.
hirsuta

Pſychotria
birſuta 363
horizontalis *ib.*
laurifolia *ib.*
marginata *ib.*
Myrſiphyllum *ib.*
nervoſa *ib.*
nutans *ib.*
paraſitica 364
Pavetta *ib.*
pedunculata 362
pubeſcens 363
ſerpens 364
ſpecioſa 362
tenuifolia 364
uliginoſa *ib.*
violacea *ib.*

Ptelea 215, 260
trifoliata 260

Pteris 1283, 1297-1299
aculeata 1299
anguſtifolia 1297
aquilina 1299
arborea 1298
arguta *ib.*
atro-purpurea 1299
biaurita 1298
caudata 1299
comans 1298
cretica 1298
decurſiva 1299
dentata *ib.*
denticulata 1298
eſculenta 1299
farinoſa *ib.*
furcata 1297
grandifolia *ib.*
heterophylla 1299
humilis 1298
lanceolata 1297
lineata *ib.*
longifolia 1298
lunulata 1298
mutilata 1299
nervoſa 1298
pedata *ib.*
piloſelloides 1297
quadrifoliata *ib.*
quadripinnata 1299
regularis *ib.*
rotundifolia 1298
ſemipinnata 1299
ſerrata *ib.*
ſerrulata 1298
ſinuata *ib.*
ſtipularis *ib.*
ſubciliata *ib.*
trichomanoides *ib.*
tricuſpidata 1297
viridis 1299
vittata 1298

Pterocarpus 1076, 1086, 1087
anterus 1087
buxifolius *ib.*
Draco 1086
Ecaſtaphyllum *ib.*
hemipterus 1087
lunatus 1086
ſantalinus *ib.*

Pteronia 1163, 1201, 1202
camphorata 1201
caroliniana 1202
cephalotes 1201
cinerea *ib.*
faſciculata 1202
flexicaulis 1201
glabrata *ib.*
glomerata *ib.*
hirſuta *ib.*
inflexa 1202
membranacea *ib.*

Pteronia
minuta 1201
oppoſitifolia *ib.*
pallens *ib.*
retorta 1202
ſcarioſa *ib.*
ſpinoſa 1201
ſtricta *ib.*
villoſa *ib.*

Puccinia 1286, 1462
byſſoides 1462
ſimplex *ib.*

Pulmonaria 291, 319, 320
anguſtifolia 319
maritima 320
officinalis 319
ſibirica 320
ſuffruticoſa 319
virginica *ib.*

Punica 770, 793
Granatum 793
nana *ib.*

Puya 525, 553
chilenſis 553

Pyrenium 1286, 1480 *ſq.*
aureum 1480
liguorum *ib.*
metallorum 1481
terreſtre *ib.*

Pyrola 658, 698
maculata 698
minor *ib.*
rotundifolia *ib.*
ſecunda *ib.*
umbellata *ib.*
uniflora *ib.*

Pyroſtria 211, 246
Commerſoni 246

Pyrus

Pyrus 779, 841, 842
angustifolia 842
baccata *ib.*
communis 841
coronaria 842
Cydonia *ib.*
dioica *ib.*
hadiensis *ib.*
hybrida *ib.*
japonica *ib.*
Malus *ib.*
nivalis *ib.*
Pollveria 841
praecox *ib.*
salicifolia 842
spectabilis *ib.*
spinosa *ib.*

Qualea 3, 10
caerulea 10
rosea *ib.*
Quapoya 313, 514
scandens 514
Quararibea 997, 1014
gujanensis 1014
QUASSIA 657, 682
amara 682
excelsa *ib.*
Simaruba *ib.*
Quercus 603, 643-645
acuta 644
Aegilops *ib.*
alba 645
aquatica *ib.*
Cerris 644
coccifera *ib.*
cuspidata *ib.*
dentata *ib.*
Esculus 645
femina 644
glabra 644
glauca *ib.*
humilis *ib.*
Ilex *ib.*
laevis *ib.*
lyrata *ib.*
molucca 644
nigra 645
palustris *ib.*
Phellos 643
Prinus 644
pumila *ib.*
Robur *ib.*
rubra 645
sempervirens 643
serrata 644
sinuata 645
Suber 644
villosa 645
Queria 89, 208
canadensis 208
hispanica *ib.*
Quillaja 743, 767
saponaria 767
Quinchenamelium 311, 493
chilense 493
Quisqualis 658, 686
indica 686
Quiviſia 600, 633
fruticosa 633

Racua 213, 245
torrida 245
Radiola 220, 289
linoides 289
Rajania 527, 580, 581
angustifolia 580
caroliniana 581
cordata 581
hastata *ib.*
hexaphylla *ib.*
ovata 580
quinata 581
quinquefolia *ib.*
Randia 296, 335
aculeata 335
mitis *ib.*
Ranunculus 783, 877-881
abortivus 878
aconitifolius 881
acris 878
alpestris *ib.*
amplexicaulis 877
aquatilis 879
arvensis 881
asiaticus 879
auricomus 878
Breynii 880
bulbosus *ib.*
bullatus 877
cassubicus 878
chaerophyllos 880
Columnae *ib.*
creticus 878
falcatus 880
Ficaria 877
Flammula *ib.*
fluviatilis 880
glacialis 879
gramineus 877
grandiflorus 879
hederaceus *ib.*
heterophyllus *ib.*
hirsutus 880
illyricus 881
lanuginosus 879
lapponicus 880
Lingua 877
monspelliensis 880

multi-

Ranunculus
multifidus 879
muricatus *ib.*
nitidus 878
nivalis *ib.*
nodiflorus 877
orientalis 879
paludosus 880
parnassifolius 877
parviflorus 879
parvulus *ib.*
pensilvanicus 881
plantaginifolius 877
platanifolius 880
polyanthemos 880
polymorphus 878
pyrenaeus 877
repens 880
reptans 877
rutaefolius 881
sceleratus 878
ternatus 881
Thora 878
Rapanea 298, 330
gujanensis 330
Raphanus 967, 990, 991
caudatus 990
Erucaria 991
erucoides *ib.*
lyratus *ib.*
Raphanistrum 990
sativus *ib.*
sibiricus *ib.*
tenellus 991
Rauwolfia 295, 432
canescens 432
nitida *ib.*
tomentosa *ib.*
Ravenala 523, 567
madagascariensis 567
Ravensara 742, 754
aromatica 754
Reaumuria 779, 851
vermiculata 851
Reichelia 311, 449
angustifolia 449
palustris *ib.*
Relhamia 211, 247
fagínea 247
RENEALMIA 1, 5
exaltata 5
Reseda 743, 758, 759
alba 758
canescens *ib.*
dipetala *ib.*
fruticulosa 759
glauca 758
hexagyna *ib.*
lutea *ib.*
Luteola *ib.*
mediterranea *ib.*
odorata *ib.*
Phyteuma *ib.*
purpurascens *ib.*
sesamoides *ib.*
tetragyna *ib.*
undata *ib.*
RESTIO 89, 201, 202
acuminatus 202
argenteus *ib.*
aristatus 201
cernuus *ib.*
dichotomus *ib.*
digitatus 202
Elegia 201
erectus 202
fruticosus *ib.*
imbricatus 201
incurvatus 202
paniculatus 201
parviflorus 202
scariosus *ib.*
Scopa 202
simplex 201
spiciger *ib.*
tectorum *ib.*
tetragonus 202
thamnochortus *ib.*
triflorus 201
triticeus 202
umbellatus 201
vaginatus *ib.*
verticillaris *ib.*
vimineus *ib.*
virgatus 202
Reticularia 1287, 1471 *seq.*
alba 1472
angulata *ib.*
caesia 1471
cinerea *ib.*
complanata *ib.*
Epixylon *ib.*
fragilis *ib.*
hemisphaerica *ib.*
Lycogala *ib.*
Lycoperdon *ib.*
nigra 1472
ramosa 1471
sinuosa 1472
sphaeroidalis *ib.*
Ustilago *ib.*
utricularis 1471
Reynoutria 660, 702
japonica 702
Retzia 293, 333
spicata 333
Rhacoma 215, 255
Crossopetalum 255
Rhamnus 300, 398-401
Alaternus 400
alnifolius *ib.*
alpinus

Rhamnus
alpinus 399
buxifolius 398
carolinus 399
catharticus 398
circumscissus 401
colubrinus 399
crenulatus 398
cubensis 399
dauuricus 400
ellipticus 399
erythroxylon 400
Frangula 399
glandulosus *ib.*
heterogeneus 400
hybridus *ib.*
hydriensis 399
ignaneus 400
infectorius 398
Jusuba 401
latifolius 400
lineatus *ib.*
Lotus *ib.*
lycioides 398
micranthus 399
myrtinus *ib.*
myssacinus *ib.*
Napeca 401
Numularia *ib.*
Oenoplia *ib.*
oleoides 398
Paliurus 400
pentaphyllus 398
prinoides 400
pumilus 399
rupestris 400
Sarcomphalus 398
saxatilis *ib.*
scandens 399
sphaerospermos *ib.*
Spina Christi 400
surinamensis *ib.*
tetragonus 399
theezans 398
volubilis 399
Xylopyrus 401
Zizyphus 400
Rhepis 521, 568
arundinacea 568
flabelliformis *ib.*
Rheedia 774, 805
lateriflora 805
Rheum 648, 654
compactum 654
hybridum *ib.*
palmatum *ib.*
Rhabarbarum *ib.*
Rhaponticum *ib.*
Ribes *ib.*
tataricum *ib.*
Rhexia 599, 605, 606
Acisanthera 605
Alifanus 606
bicornis *ib.*
glutinosa *ib.*
jussieuoides *ib.*
lanceolata *ib.*
latifolia *ib.*
leucantha *ib.*
lutea *ib.*
mariana 605
petiolata 606
purpurea *ib.*
septemnervia *ib.*
trichotoma *ib.*
villosa *ib.*
virginica 605
Rhinanthus 888, 922, 923
Alectorolophus 923
capensis *ib.*
Crista galli 922
Elephas *ib.*
indicus 923
maximus *ib.*
orientalis 922
trifidus 923
Trixago *ib.*
versicolor *ib.*
virginicus *ib.*
Rhizobolus 779, 841
butyrosus 841
tuberculosus *ib.*
Rhizomorpha 1485
capillaris *ib.*
cinchonae *ib.*
fragilis *ib.*
Rhizophora 740, 746, 747
Agueras 747
Candel *ib.*
calceolaris *ib.*
conjugata 746
corniculata 747
cylindrica *ib.*
gymnorhiza *ib.*
Mangle *ib.*
Rhodiola 603, 645
rosea 645
Rhododendrum 659, 694
camtschaticum 694
caucasium *ib.*
Chamaecistus *ib.*
chrysanthum *ib.*
dauuricum *ib.*
ferrugineum *ib.*
hirsutum *ib.*
maximum *ib.*
ponticum *ib.*
Rhodora *ib.*
Rhus 311, 494-496
angustifolium 495
aromaticum *ib.*

atrum

Rhus
atrum 495
cirrhifolium *ib.*
Cobbe *ib.*
Cominia *ib.*
corallinum 494
Coriaria *ib.*
Cotinus 495
cuneifolium *ib.*
digitatum 494
elegans 495
glabrum 494
Hypselodendrum *ib.*
javanicum *ib.*
incisum 495
laevigatum *ib.*
lanceum *ib.*
lucidum *ib.*
Metopium 494
pauciflorum *ib.*
radicans *ib.*
Saenab 496
semialatum 494
suaveolens 495
succedaneum 494
tomentosum 495
Toxicodendron 494
tridentatum 495
typhinum 494
Vernix *ib.*
villosum 495
viminale *ib.*

Riana 396
gujanensis *ib.*

Ribes 302, 419, 420
alpinum 419
cynorbati 420
diacanthum 419
floridum *ib.*
Grossularia 420
nigrum 419
oxyacanthoides 420
petraeum 419
polycarpon 419
prostratum *ib.*
reclinatum 420
rubrum 419
Uva crispa 420

Riccia 1285, 1354 *sq.*
arachnoidea 1355
crystallina 1354
fluitans 1355
fruticulosa *ib.*
glauca *ib.*
minima *ib.*
natans 1354
pyramidata 1355
reticulata *ib.*
sinuata *ib.*

Richardia 522, 573
scabra 573

Ricinus 1001, 1074
communis 1074
dioicus *ib.*
inermis *ib.*
Mappa *ib.*
medius *ib.*
Tanarius *ib.*

Ricotia 968, 979
aegyptiaca 979

Rinorea 303, 396
gujanensis 396

Rivina 216, 278
humilis 278
laevis *ib.*
octandra *ib.*
paniculata *ib.*

Robergia 663, 729
frutescens 729

Robinia 1078, 1115, 1116
Caragena 1116
fruticens *ib.*
Halodendrum *ib.*
hispida 1116
mitis *ib.*
Nicu *ib.*
Panacoco *ib.*
Pseudacacia 1115
pygmaea 1116
sepium 1115
spinosa 1116
vesicaria *ib.*
violacea 1115

Robinsonia 771, 796
gujanensis 796

Rocama 305, 455
arabica 455

Rochefortia 307, 458
cuneata 458
ovata *ib.*

Roella 297, 353, 354
ciliata 353
decurrens 354
muscosa *ib.*
reticulata *ib.*
spicata *ib.*
squarrosa *ib.*

Rohria 83, 93
Schreberi 93
Tapura *ib.*

Rokejena 661, 703
deserti 703

Rotandra 1167, 1280
argentea 1280

Ronabea 298, 365
latifolia 365

Rondeletia 297, 359
americana 359
asiatica *ib.*
bistora *ib.*
disperma *ib.*
hirsuta *ib.*

Rondeletia
hirta 359
incana *ib.*
obovata *ib.*
piloſa *ib.*
thyrſoidea *ib.*
tomentoſa *ib.*
trifoliata *ib.*
umbellata *ib.*
virgata *ib.*
Ropala 215, 225
montana 225
Rorida 213, 260
arabica 260
Roridula 302, 422
dentata 422
Roſa 780, 853-855
alba 855
alpina *ib.*
arvenſis 853
blanda 854
canina 855
carolina 854
centifolia *ib.*
cinnamomea 853
collina 855
corymboſa *ib.*
Eglanteria 853
gallica 854
indica 855
moſchata 854
multiflora 855
pendulina 855
perſica *ib.*
pimpinellifolia 853
pumila 854
rubiginoſa *ib.*
rugoſa *ib.*
ſempervirens *ib.*
ſinica 855
ſpinoſiſſima 853
ſulphurea 854
turbinata *ib.*
Roſa
villoſa 854
virginiana *ib.*
Rosmarinus 20, 44
chilenſis 44
officinalis *ib.*
ROTALA 83, 105
verticillaris 105
ROTTBOELLIA 88, 196, 197
altiſſima 197
coelorhachis *ib.*
compreſſa 196
corymboſa 197
dimidiata 196
exaltata 197
hirſuta *ib.*
incurvata 196
laevis 197
muricata *ib.*
punctata *ib.*
repens *ib.*
ſanguinea *ib.*
Tranchelli *ib.*
Royena 661, 702
glabra 702
hirſuta *ib.*
lucida *ib.*
polyandra *ib.*
villoſa *ib.*
Rubentia 301, 408
olivina 408
Rubia 214, 242
anguſtifolia 242
Bocconi *ib.*
chilenſis *ib.*
cordifolia *ib.*
frutticoſa *ib.*
laevis *ib.*
lucida *ib.*
peregrina *ib.*
tinctorum *ib.*
Rubus 781, 855-857
arcticus 857
auſtralis 856
caeſius *ib.*
canadenſis 855
Chamaemorus 857
Dalibarda *ib.*
erectus 856
fruticoſus *ib.*
geoides 857
hiſpidus 856
jamaicenſis *ib.*
japonicus *ib.*
idaeus *ib.*
inciſus *ib.*
moluccanus *ib.*
occidentalis *ib.*
odoratus *ib.*
palmatus *ib.*
parvifolius *ib.*
ſanctus 857
ſaxatilis *ib.*
trifidus 856
triphyllus *ib.*
villoſus 857
Rudbeckia 1165, 1259 *ſq.*
anguſtifolia 1260
digitata 1259
fulgida 1260
hirta 1259
laciniata *ib.*
oppoſitifolia 1260
purpurea *ib.*
triloba 1259
Ruellia 889, 957-959
acaulis 959
adhaerens 957
alternata *ib.*
Anagallis *ib.*
anguſtifolia *ib.*
antipoda 959

balſa-

Ruellia
balſamica 958
biflora 959
blechioides 957
Blechum *ib.*
clandeſtina 958
criſpa 957
depreſſa 958
difformis 959
erecta 958
faſciculata *ib.*
fragrans *ib.*
guttata 957
japonica 958
imbricata 959
intruſa *ib.*
littoralis *ib.*
longiflora 958
paniculata *ib.*
patula *ib.*
piloſa *ib.*
repanda 957
repens *ib.*
reptans 958
ringens *ib.*
rubra 957
ſtrepens 958
tentaculata *ib.*
tuberoſa *ib.*
uliginoſa *ib.*
violacea 957

Ruitzia 1001, 1068
cordata 1068
laciniata *ib.*
lobata *ib.*
palmata *ib.*

Rumex 527, 584-586
Acetoſa 586
Acetoſella *ib.*
aculeatus *ib.*
acutus 585
aegyptius 584
alpinus 585
aquaticus 585
arifolius *ib.*
aureus *ib.*
bipinnatus 586
Britannica 584
bucephalophorus 585
conglomeratus 584
criſpus *ib.*
dentatus 585
digynus *ib.*
divaricatus *ib.*
glaber 586
glaucus 585
Hydrolapathum 584
lachenus *ib.*
Lunaria 585
luxurians 586
maritimus 585
multifidus 586
obtuſifolius 585
paludoſus 584
Patientia *ib.*
perſicarioides 585
pictus 586
pulcher 584
roſeus 585
ſanguineus 584
ſcutatus 585
ſpinoſus 586
tingitanus 585
tuberoſus 586
verticillatus 584
veſicarius 585

Rumpfia 83, 99
amboinenſis 99

Ruppia 220, 289
maritima 289

Ruſcus 81, 104, 105
aculeatus 104
androgynus 105
Hypogloſſum *ib.*
Hypophyllum 104
racemoſus 105

Ruſſea 214, 237
ſimplex 237

Russelia 463
capenſis *ib.*

Ruta 657, 676
chalepenſis 676
graveolens *ib.*
legitima *ib.*
linifolia *ib.*
patavina *ib.*
pinnata *ib.*
tuberculata *ib.*

Ruyschia 300, 407
cluſiaefolia 407
Surubea *ib.*

Sabicea 299, 367
aſpera 367
cinerea *ib.*
hirta *ib.*

Saccharum 86, 152, 153
arundinaceum 152
benghalenſe *ib.*
biflorum *ib.*
hirſutum 153
Koenigii 152
officinarum *ib.*
polyſtachyon *ib.*
Ravennae *ib.*
ſpicatum *ib.*
ſpontaneum *ib.*
Teneriffae *ib.*
Thunbergii *ib.*

Sagina 220, 289
apetala 289
erecta *ib.*

Sagina
procumbens 289
virginica *ib.*
Sagittaria 782, 884
acutifolia 884
natans *ib.*
obtusifolia *ib.*
sagittifolia *ib.*
trifolia *ib.*
Salacia 82, 107
finensis 107
Salicornia 2, 15, 16
arabica 15
caspica *ib.*
cruciata *ib.*
falcata *ib.*
fruticosa *ib.*
herbacea *ib.*
perfoliata 16
strobilacea 15
virginica *ib.*
Salix 22, 72-74
acuminata 74
aegyptiaca 72
alba 74
amygdalina 72
antifebrilis *ib.*
Arbuscula 73
arenaria *ib.*
aurita *ib.*
babylonica *ib.*
berberifolia 74
Caprea *ib.*
chilensis 73
cinerea 74
depressa 73
excelsa 74
fissa 73
flava 74
fragilis 72
fusca 74
glauca 73
haltata 72
herbacea 73
hermaphrodita 72
japonica *ib.*
incubacea 73
integra *ib.*
lanata *ib.*
lapponum *ib.*
mollissima 74
monandra 72
Myrsinites 73
myrtilloides *ib.*
nitida 74
pentandra 72
phylicifolia *ib.*
reticulata 73
retusa *ib.*
rosmarinifolia 74
serotina *ib.*
triandra 72
tristis 74
viminalis *ib.*
vitellina 72
Salmasia 311, 500
gujanensis 500
Salsola 306, 452-454
altissima 452
aphylla 453
arborescens *ib.*
Arbuscula *ib.*
articulata *ib.*
caroliniana 452
coquimbana 454
fruticosa 453
hirsuta 452
hyssopifolia *ib.*
imbricata 453
inermis *ib.*
Kali 452
laniflora 453
longiflora *ib.*
monandra 452
monobracteata 453
mucronata 453
muricata *ib.*
orientalis *ib.*
polyclonos 452
prostrata 453
rosacea 452
salsa *ib.*
sativa *ib.*
Soda *ib.*
tetrandra 453
Tragus 452
vermiculata 453
Salvadora 217, 280
persica 280
Salvia 20, 44-48
abyssinica 48
acetabulosa 47
aegyptiaca 44
Aethiopis 47
africana *ib.*
argentea *ib.*
aurea *ib.*
aurita 48
austriaca 45
canariensis 47
ceratophylla *ib.*
ceratophylloides *ib.*
clandestina 46
coccinea 47
colorata *ib.*
cretica 44
dentata *ib.*
disermas 46
dominica *ib.*
Forskahlii 47
glutinosa *ib.*
haematodes 45
hispanica 46
Horminum 45
japonica 48
indica 46

leonu-

Salvia
leonuroides 46
lyrata 45
Merjamia 48
mexicana 46
napifolia *ib.*
nemorosa 45
nilotica 46
nubia *ib.*
nutans 48
occidentalis *ib.*
officinalis 45
paniculata 47
phlomoides 45
pinnata 47
pomifera 45
pratensis *ib.*
pseudococcinea 48
pyrenaica 46
rosaefolia 48
rugosa 46
runcinata 48
scabra *ib.*
Sclarea 47
serotina 45
silvestris *ib.*
Spielmanni 48
spinosa 47
syriaca 45
tenella 48
triloba *ib.*
urticifolia 45
verbenaca 46
verticillata *ib.*
virgata 47
viridis 45
viscosa *ib.*

SAMARA 215, 257
coriacea 257
laeta *ib.*
pentandra *ib.*

Sambucus 310, 497, 498
canadensis 497
Ebulus *ib.*
japonica *ib.*
laciniata 498
nigra *ib.*
racemosa *ib.*

Samolus 297, 358
Valerandi 358

Samyda 660, 699, 700
glabrata 699
pubescens 700
serrulata *ib.*
spinescens 699
tomentosa *ib.*
villosa *ib.*
viridiflora *ib.*

Sandoricum 656, 680
indicum 680

Sanguinaria 776, 808
canadensis 808

Sanguisorba 213, 255
canadensis 255
media *ib.*
officinalis *ib.*

Sanicula 308, 468
canadensis 468
europaea *ib.*
marilandica *ib.*

Santalum 216, 276
album 276

Santolina 1162, 1205 *sq.*
alpina 1206
anthemoides *ib.*
Chamaecyparissus 1205
fragrantissima 1206
rosmarinifolia 1205
tinctoria *ib.*

Sapindus 603, 642
rigidus 642
Saponaria *ib.*
sinensis *ib.*
spinosus *ib.*
trifoliatus *ib.*

Saponaria 661, 709, 710
cretica 710
illyrica *ib.*
lutea *ib.*
ocymoides 709
officinalis *ib.*
orientalis 710
porrigens 709
Vaccaria 710

Sapota 742, 750
nigra 750

Saraca 1075, 1079
indica 1079

Sarothra 311, 507
gentianoides 507

Sarracenia 775, 811
flava 811
minor *ib.*
purpurea *ib.*
rubra *ib.*

Sassa 999, 1038
gummifera 1038

Sassia 599, 615
tinctoria 615

Satureja 885, 897, 898
capitata 897
graeca *ib.*
hortensis 898
juliana 897
montana *ib.*

Satureja
rupeſtris 897
ſpinoſa 898
Thymbra 897
thymifolia 898
viminea 897
Satyrium 21, 55, 56
aculeatum 55
adnatum 56
albidum 55
capenſe *ib.*
elatum 56
Epipogium 55
giganteum *ib.*
hians *ib.*
hircinum *ib.*
hirtellum *ib.*
nigrum *ib.*
orchioides 56
orobanchoides 55
pedicellatum 56
plantagineum 55
repens *ib.*
ſpirale 56
tabulare 55
triſte *ib.*
viride *ib.*
Saururus 594, 597
cernuus 597
Sauvageſia 302, 422
Adima 422
erecta *ib.*
Savaſtana 88, 177
hirta 177
Saxifraga 661, 704-707
adſcendens 707
ajugifolia 706
aizoides *ib.*
Aizoon 704
androſacea 705
aſpera 706
autumnalis *ib.*
Bellardi 707
biflora 705
bronchialis 704
bryoides 705
bulbifera 706
burſeriana 704
caeſia *ib.*
cernua *ib.*
ceſpitoſa 707
Cluſii 706
Cotyledon 704
craſſifolia 705
cuneifolia *ib.*
cymbalaria 707
exarata 706
geranioides 707
Geum 705
granulata 706
groenlandica *ib.*
hederacea 707
Hirculus 706
hirſuta 705
hypnoides 707
media 704
moſchata 707
muſcoides 705
mutata 704
nivalis 705
oppoſitifolia *ib.*
orientalis 707
pedemontana *ib.*
penſilvanica 705
petraea 707
punctata 705
retuſa 706
rivularis *ib.*
rotundifolia *ib.*
ſarmentoſa 705
ſedoides 704
ſibirica 706
ſtellaris 705
tenella 704
trichodes 705
tridactylites 707
umbroſa 706
Scabioſa 210, 228-230
africana 230
alba *ib.*
alpina 228
amplexicaulis *ib.*
argentea 230
arvenſis 229
atropurpurea 230
attenuata 228
columbaria 229
crenata *ib.*
cretica *ib.*
dubia 230
graminifolia *ib.*
gramuntia 229
grandiflora 230
heterophyllos 229
indurata 230
integrifolia 228
iſetenſis 230
leucontha 228
lyrata 230
maritima 229
monſpelienſis 230
ochroleuca *ib.*
palaeſtina *ib.*
pappoſa 229
prolifera *ib.*
pteroceephala *ib.*
pumila 230
rigida 228
ſcabra *ib.*
ſicula 230
ſilvatica 229
ſtellata *ib.*

Scabiosa
Succisa 228
syriaca ib.
tatarica ib.
tenuifolia 229
tomentosa ib.
transilvanica 228
Trenta 229
ucranica 230
uralensis 228
Scabrita 214, 233
scabra 233
SCAEVOLA 297, 361
Lobelia 361
Scandix 309, 486, 487
australis 487
Cerefolium ib.
chilensis ib.
gilanica 486
grandiflora 487
infesta ib.
nodosa ib.
odorata 486
Pecten 487
procumbens ib.
trichosperma ib.
Sceura 210, 260
marina 260
Schaefferia 219, 284
completa 284
lateriflora ib.
Schefflera 313, 520
digitata 520
Scheuchzeria 527, 586
palustris 586
Schinus 658, 683
Areira 683
Huygan ib.
Molle ib.
Schmidelia 602, 635
racemosa 635
Schoenus 84, 133-137
albus 136
Bobartiae ib.
bulbosus ib.
capillaris 137
Cladium ib.
compar 135
compressus 136
cuspidatus 135
cyperinus 136
cyperoides 137
deustus 135
effusus 137
Fribri 136
fasciatus ib.
ferrugineus 134
fuscus ib.
glomeratus 136
gracilis 137
incanus 136
Mariscus 135
mucronatus ib.
nigricans ib.
odoratus 137
paniculatus ib.
pusillus ib.
radiatus 136
restioides ib.
setaceus 137
stellatus 136
surinamensis 137
thermalis 136
tuberosus 137
umbellatus ib.
ustulatus 135
Schoepfia 299, 376
Schreberi 376
Schollera 599, 622
Oxycoccos 622
Schotia 657, 673
speciosa 673
Schranckia 313, 515
quinquefaria 515
Schrebera 307, 458
schinoides 458
Schwalbea 888, 925
americana 925
Schwenkia 20, 38
americana 38
Scilla 525, 552, 553
amoena 552
anthericoides ib.
autumnalis ib.
bifolia ib.
hyacinthoides ib.
Jacquini ib.
japonica ib.
italica ib.
Lilio-Hyacinthus ib.
lingulata ib.
lusitanica ib.
maritima ib.
numidica ib.
obtusifolia ib.
peruviana ib.
tetraphylla ib.
unifolia ib.
verna 553
Scirpus 84, 124-129
acicularis 125
aestivalis 128
annuus 124
anomalus 128
antarcticus 129
argenteus ib.
articulatus 124
arvensis 127
atropurpureus 125
autumnalis 126
australis 125
Baeothryon ib.

Scirpus
barbatus 129
capillaris 126
capitatus 124
caribaeus 125
cephalotes 129
ceſpitoſus 125
ciliaris 128
complanatus 126
corymboſus 128
cyperoides *ib.*
dichotomus *ib.*
diphyllos 127
dipſaceus 126
echinatus 127
ellychniarius 126
ferrugineus 127
fiſtuloſus 125
fluitans *ib.*
geniculatus 124
globiferus 126
glomeratus *ib.*
groſſus 128
Halleri 126
Holoſchoenus 125
hottentottus 129
intricatus 128
junceus 125
Kali 127
lacuſtris 125
lateralis 127
lateriflorus *ib.*
Luzulae 128
maritimus *ib.*
Michelianus 129
miliaceus 128
monander 126
mucronatus 127
mutatus 124
niloticus 126
nodoſus 127
nutans 125
paluſtris 124
plantagineus 124
polytrichoides 125
prolifer 126
retrofactus 127
Schoenoides 125
romanus 126
ſetaceus *ib.*
ſilvaticus 128
ſpadiceus 127
ſquarroſus 128
ſupinus 126
trigynus 124
triquater 127
triſpicatus *ib.*
Sciuris 21, 49
aromatica 49
Scleranthus 660, 708
annuus 708
perennis *ib.*
polycarpos *ib.*
Sclerocarpus 1165, 1262
africanus 1262
Sclerotium 1287, 1481 *ſq.*
complanatum 1482
immerſum 1481
Mucor *ib.*
purpureum 1481
radicatum *ib.*
Semen *ib.*
ſubterraneum 1482
villoſum *ib.*
Scolopia 770, 793
Schreberi 793
Scolymus 1184
angioſpermus 1184
hiſpanicus *ib.*
maculatus *ib.*
Scoparia 211, 254
arborea 254
Scoparia
dulcis 254
procumbens *ib.*
ternata *ib.*
SCOPOLIA 601, 630
compoſita 630
Scorpiurus 1075, 1077, 1120
muricata 1120
ſubvilloſa *ib.*
ſulcata *ib.*
vermiculata *ib.*
Scorzonera 1161, 1169, 1170
anguſtifolia 1170
carinifolia 1169
ciliata *ib.*
graminifolia 1170
hirſuta 1169
hiſpanica 1170
hiſpida 1169
humilis *ib.*
laciniata *ib.*
lanata *ib.*
parviflora *ib.*
picroides 1170
purpurea *ib.*
puſilla 1169
reſedifolia 1170
taraxacifolia *ib.*
tingitana *ib.*
tomentoſa 1169
tuberoſa 1170
Scrophularia 888, 937, 938
altaica 937
aquatica *ib.*
arguta *ib.*
auriculata *ib.*
betonicifolia *ib.*
canina 938
coccinea *ib.*

Scrophularia
frutescens 938
glabrata 937
lucida 938
marilandica 937
meridionalis 938
nodosa 937
orientalis 938
peregrina *ib.*
sambucifolia *ib.*
Scorodonia 937
sinensis 938
trifoliata *ib.*
vernalis 937
viridiflorae 938

Scutellaria 886, 919, 920
albida 919
alpina *ib.*
altissima *ib.*
caroliniana *ib.*
Columnae *ib.*
cretica *ib.*
galericulata *ib.*
hastifolia 920
havanensis 919
hyssopifolia *ib.*
indica 920
integrifolia *ib.*
lateriflora 919
lupulina *ib.*
minor *ib.*
orientalis *ib.*
ovata 920
peregrina 919
purpurascens *ib.*

Scytalia 598, 612
sinensis 612

Secale 88, 198
cereale 198
creticum *ib.*
orientale *ib.*
prostratum 198
villosum *ib.*

Securidaca 1075, 1083, 1084
erecta 1083
scandens 1084
virgata *ib.*

Securinega 996, 1008
durissima 1008

Sedum 662, 730-732
acre 732
aestivum *ib.*
Aizoon 731
album 732
alsinefolium 731
Anacampseros *ib.*
anglicum 732
annuum *ib.*
atratum *ib.*
caeruleum 731
Cepaea *ib.*
dasyphyllum 732
divaricatum 731
heptapetalum *ib.*
hirsutum 732
hispanicum *ib.*
hybridum 731
libanoticum *ib.*
lineare *ib.*
nicaeense 732
nudum *ib.*
populifolium 731
procumbens 732
quadrifolium *ib.*
reflexum *ib.*
rupestre *ib.*
saxatile 731
sexangulare 732
stellatum 731
stoloniferum *ib.*
Telephium *ib.*
verticillatum 730
villosum 731
virens 732

Seguieria 772, 827
americana 827

Sehima 87, 178
schaemoides 178

Selago 887, 948, 949
canescens 949
capitata *ib.*
ciliata *ib.*
cinerea 948
coccinea *ib.*
corymbosa *ib.*
divaricata 949
fasciculata 948
fruticosa 949
geniculata 948
hirta *ib.*
hispida *ib.*
polygaloides *ib.*
polystachya *ib.*
rapunculoides *ib.*
rotundifolia *ib.*
serrata *ib.*
spuria *ib.*
stricta *ib.*
triquetra *ib.*
verbenacea *ib.*

Selinum 309, 475, 476
austriacum 476
Carvifolia *ib.*
Chabraei *ib.*
Monnieri *ib.*
palustre *ib.*
Seguieri *ib.*
sibiricum *ib.*
silvestre 475

SEMECARPUS 311, 493
Anacardium 493

Sempervivum 744, 768, 769
arachnoideum 769
arboreum 768
canarienſe ib.
glandulosum ib.
globiferum 769
glutinosum 768
monanthes 769
montanum ib.
ſedoides ib.
tectorum ib.
tortuosum ib.
villosum ib.

Senecio 1164, 1226-1230
abrotanifolius 1228
aegyptius 1227
alpinus 1228
angulatus 1229
arabicus 1226
asper 1229
aureus 1228
auriculatus ib.
biflorus 1226
byzantinus 1229
canadenſis 1228
cernuus 1226
ciliatus 1230
cinerascens 1227
cordifolius 1230
cruciatus 1229
diffuſus 1228
divaricatus 1226
Doria 1229
Doronicum 1230
elegans 1228
erosus 1229
erubescens 1226
erucifolius 1228
glaſtifolius 1229
glaucus 1227
hadienſis ib.
halimifolius 1230
haſtatus 1228
hieracifolius 1226
Jacobaea 1228
japonicus 1226
iliciſolius 1229
incanus 1228
junceus 1229
juniperinus ib.
lanatus ib.
laniger 1227
leucanthemifolius ib.
linifolius 1228
lividus 1227
longifolius 1229
lyratus 1228
marginatus 1229
maritimus ib.
nebrodenſis 1227
nemorenſis 1229
paludoſus ib.
perſicifolius 1226
peucedanifolius ib.
populifolius 1230
Pſeudochina 1227
pubigerus ib.
purpureus 1226
reclinatus ib.
rigidus 1230
rosmarinifolius 1229
ſarracenicus ib.
ſibiricus 1230
ſilvaticus 1227
ſqualidus 1228
tenuifolius ib.
triſtorus 1227
trilobus ib.
tuſſilaginoides ib.
umbellatus 1228
varicoſus 1227
venuſtus 1228
virgatus 1226
viſcoſus 1227
vulgaris 1226

Septus 594, 597
capenſis 597

Serapias 21, 59, 60
capenſis 60
Caravata 59
cordigera 60
enſifolia 59
erecta 60
falcata ib.
flava 59
lancifolia ib.
latifolia ib.
Lingua ib.
longifolia ib.
Neottia ib.
polyſtachya ib.
regularis ib.
rubra ib.
ſpecioſa ib.

Seriola 1161, 1182
aethmenſis 1182
cretenſis ib.
laevigata ib.
urens ib.

Seriphium 297, 374
ambiguum 374
cinereum ib.
fuſcum ib.
plumoſum ib.

Serpicula 216, 276
repens 276
verticillata ib.

Serra 997, 1026
incana 1026

Serra-

Serratula 1162, 1184-1186
alpina 1185
amara ib.
arvenſis 1186
caſpia 1185
centauroides ib.
ciliata ib.
coronata ib.
glauca ib.
japonica ib.
multiflora ib.
noveboracenſis ib.
piloſa ib.
praealta ib.
ſalicifolia ib.
ſcarioſa ib.
ſpicata ib.
ſpinoſa ib.
ſquarroſa ib.
tinctoria 1184
Seſamum 890, 956
javanicum 956
indicum ib.
orientale ib.
proſtratum ib.
Seſeli 310, 488, 489
ammoides 489
annuum ib.
ariſtatum ib.
carvifolium ib.
elatum ib.
fragile ib.
glaucum ib.
Hippomaruthrum ib.
montanum 488
multicaule 489
pimpinelloides 488
pyrenaeum 489
ſaxifragum ib.
tortuoſum ib.
Turbith ib.
Seſuvium 778, 834
Portulacaſtrum 834
Shawia 299
SHEFFIELDIA 293, 336
repens 336
Sherardia 214, 234
arvenſis 234
fruticoſa ib.
muralis ib.
Sibbaldia 313, 520
altaica 520
erecta ib.
procumbens ib.
Sibthorpia 889, 953
africana 953
europaea ib.
Sicyos 81, 104
angulata 104
edulis ib.
Garcini ib.
laciniata ib.
Sida 1001, 1041-1050
Abutilon 1048
acuta 1044
alba 1045
alnifolia 1043
althaeifolia 1049
americana ib.
anguſtifolia 1044
arabica 1049
arborea ib.
aſiatica 1048
atro-ſanguinea 1042
bicuſpidata 1050
biflora 1049
bivalvis 1043
borbonica 1042
braſilienſis 1049
calycina 1042
calyptrata 1046
caneſcens 1045
capenſis ib.
carpinifolia 1044
ciliaris ib.
cordifolia 1045
coronata 1046
craſſifolia 1048
criſpa 1047
dumoſa 1049
excelſior 1046
exſtipularis 1048
exſtipulata 1046
flaveſcens 1043
foetida 1041
fragrans 1042
fruteſcens ib.
glomerata 1043
glutinoſa ib.
hederaefolia 1041
herbacea 1045
hernandioides 1046
hirta 1048
humilis 1041
jamaicenſis 1043
jatrophoides 1044
javenſis 1042
indica 1047
lanceolata 1049
lignoſa 1047
linifolia 1044
maculata 1045
mauritiana 1049
micans 1045
microphylla 1044
microſperma 1047
molliſſima ib.
morifolia 1042
multicaulis ib.
multifida 1046
multiflora 1045
obtuſa 1048

Sida
occidentalis 1046
orientalis 1045
ovata 1041
palmata 1044
paniculata 1049
periplocifolia 1046
perſica 1049
peruviana *ib.*
Phyllanthus 1050
piloſa 1042
planicaulis 1045
planiflora 1048
plumoſa 1041
populifolia 1048
procumbens 1049
proſtrata 1043
pubeſcens 1047
puſilla 1041
pyramidata 1042
radicans 1041
ramoſa 1047
reflexa 1048
repens 1041
retuſa 1045
Retzii 1042
rhombifolia 1045
ricinoides 1044
rotundifolia 1045
ſilvatica 1046
ſinenſis 1048
Sonnerati 1047
ſpicata 1046
ſpinoſa 1042
ſtellata 1046
ſtipulata 1044
ſuberoſa 1045
ſupina 1042
terminalis 1047
ternata 1050
tricuſpidata 1047
triloba 1044
triquetra 1046

Sida
truncata 1043
truncatula 1049
ulmifolia 1043
umbellata 1047
urens 1043
veronicaefolia 1041
verticillata 1043
veſicaria 1048
virgata 1049
viſcoſa 1043

Sideritis 885, 901, 902
canarienſis 901
candicans *ib.*
ciliata 902
cretica 901
elegans *ib.*
hirſuta 902
hyſſopifolia 901
incana *ib.*
lanata 902
montana 901
perfoliata *ib.*
romana *ib.*
ſcordioides *ib.*
ſpinoſa 902
ſyriaca 901

Siderodendrum 214, 242
ferreum 242

Sideroxylum 296, 396, 397
cymoſum 397
decumbens *ib.*
foetidiſſimum *ib.*
inerme *ib.*
laeve *ib.*
lycioides *ib.*
Maſtichodendrum *ib.*
melanophleum *ib.*
mite 396

Sideroxylum
ſericeum 397
ſpinoſum *ib.*
tenax *ib.*
Siegesbeckia 1165, 1255
floſculoſa 1255
occidentalis *ib.*
orientalis *ib.*
Silene 661, 713-717
acaulis 716
aegyptiaca 714
alpeſtris 716
amoena 714
anglica 713
anguſtifolia 717
antirrhina 716
Armeria 715
Atocion 716
Behen *ib.*
bellidifolia 715
bupleuroides *ib.*
caroliniana 717
Catesbaei *ib.*
ceraſtoides 713
chloraefolia 717
colorata 714
conica 715
conoidea *ib.*
cordifolia 717
craſſifolia 715
cretica 716
cuneifolia 714
elongata 716
exſcapa *ib.*
fruticoſa 715
gallica 714
gigantea 715
hirſuta 717
inaperta 716
involuta 714
latifolia *ib.*
luſitanica 713

Silene
Muſcipula 716
mutabilis 714
nicaeenſis 717
noctiflora 715
nocturna 714
nutans *ib.*
oppoſitifolia 717
orchidea 716
ornata 715
paradoxa *ib.*
pendula 716
polyphylla 717
portenſis 715
procumbens 717
pumilio 714
quinquevulnera *ib.*
rubella 716
rupeſtris *ib.*
Saxifraga *ib.*
ſedoides 714
ſericea 717
Smithii 714
ſtricta 716
ſucculenta 714
undulata 715
valleſia 716
veſpertina 715
villoſa 714
virginica 717
viridiflora 715
Siliquaria 523, 566
glanduloſa 566
Silphium 1166, 1269 *ſq.*
Aſteriſcus 1270
connatum *ib.*
laciniatum 1269
perfoliatum *ib.*
ſcabrum *ib.*
ſolidaginoides *ib.*
terebinthinaceum *ib.*
trifoliatum 1270
trilobatum *ib.*
Simaba 657, 700
gujanenſis 700
Simbuleta 214, 242
Forſkahlii 242
Simira 296, 371
tinctoria 371
Sinapis 968, 989, 990
alba 989
Allioni *ib.*
arvenſis *ib.*
braſſicata 990
cernua *ib.*
erucoides 989
fruteſcens 990
Harra *ib.*
hiſpanica *ib.*
japonica *ib.*
incana 989
juncea 990
laevigata 989
millefolia 990
nigra 989
orientalis *ib.*
pubeſcens *ib.*
pyrenaica *ib.*
tinenſis *ib.*
Siparuna 659, 701
gujanenſis 701
Siphonanthus 214, 243
indica 243
SIRIUM 218, 260
myrtifolium 260
Siſon 309, 483, 484
Ammi 483
Amomum *ib.*
canadenſe *ib.*
crinitum 484
inundatum *ib.*
falſum 484
ſegetum 483
verticillatum 484
Siſymbrium 968, 980-983
album 982
altiſſimum *ib.*
amphibium 980
arenoſum 982
aſperum *ib.*
Barbareae 983
Barrelieri 981
burſifolium *ib.*
catholicum 982
Columnae *ib.*
heterophyllum *ib.*
hiſpanicum 981
indicum 983
integrifolium 983
Irio 982
islandicum 980
lippizenſe 981
Loeſelii 982
molle 981
monenſe *ib.*
murale *ib.*
Naſturtium 980
orientale 982
paluſtre 981
pannonicum 982
Parra *ib.*
pinnatifidum *ib.*
polyceration 981
pyrenaicum *ib.*
ſagittatum *ib.*
ſalſugineum *ib.*
ſilveſtre 980
ſimpliciſſimum 982
ſinapios *ib.*
Sophia *ib.*
ſtrictiſſimum 983
ſupinum 981

tanace-

Sisymbrium
tanacetifolium 981
tenuifolium *ib.*
valentinum 982
vimineum 981
Sisyrinchium 81, 118, 119
anceps 118
Bermudiana *ib.*
grandiflorum *ib.*
ixioides 119
latifolium 118
micranthum *ib.*
narcissoides *ib.*
palmifolium *ib.*
Sium 309, 482, 483
angustifolium 483
Berula 482
cicutaefolium *ib.*
decumbens 483
Falcaria *ib.*
graecum *ib.*
japonicum *ib.*
lancifolium 482
latifolium *ib.*
Ninsi 483
nodiflorum *ib.*
repens *ib.*
rigidius *ib.*
siculum *ib.*
Sisarum *ib.*
suave *ib.*
Skimmia 215, 254
japonica 254
Sloanea 772, 813
dentata 813
emarginata *ib.*
Massoni *ib.*
sinemariensis *ib.*
Smilax 527, 582, 583
aspera 582
auriculata *ib.*
bona nox 583
caduca *ib.*
China 582
excelsa *ib.*
glauca *ib.*
herbacea 583
inermis *ib.*
lanceolata *ib.*
laurifolia *ib.*
mauritanica 582
oblongata *ib.*
Pseudo-China 583
pumila *ib.*
purpurata *ib.*
Ripogonum *ib.*
rotundifolia *ib.*
Sassaparilla 582
tamnoides 583
tetragona *ib.*
variegata 582
zeylanica *ib.*
Smithia 295, 388
Thouinia 388
Smyrnium 310, 490
aegyptiacum 490
aureum *ib.*
integerrimum *ib.*
nodiflorum *ib.*
Olus atrum *ib.*
perfoliatum *ib.*
Sodada 599, 615
decidua 615
Solandra 1000, 1050
lobata 1050
ternata *ib.*
Solanum 296, 382-387
aculeatissimum 386
aegyptiacum 385
aethiopicum 384
armatum 385
aviculare 383
bahamense 386
bombense 383
bonarienſe *ib.*
campechiense 385
capense 387
Cari 384
carolinense 385
coagulans *ib.*
coccineum 386
cordatum *ib.*
corymbiferum 384
corymbosum 383
diphyllum *ib.*
Dulcamara *ib.*
ferox 385
fuscatum 386
havanense 383
hybridum 386
igneum *ib.*
incanum 385
indicum 386
insanum 385
lanceaefolium *ib.*
laurifolium 382
lycioides 387
Lycopersicon 384
lyratum *ib.*
macrocarpon 383
mammosum 385
marginatum 386
mauritianum 383
Melongena 384
memphiticum 385
montanum 384
nigrum *ib.*
nodiflorum 383
paniculatum 385
peruvianum 384
pimpinellifolium *ib.*
Pseudo-capsicum 383

qua-

Solanum
quadrangulare 384
quercifolium ib.
racemoſum 383
radicans 384
repandum ib.
rubrum ib.
ſanctum 386
ſcandens 385
ſodomeum 386
ſpurium 384
ſtellatum 387
ſubinerme 383
Tagore ib.
terminale ib.
trifoliatum 386
trilobatum ib.
triſte 383
tuberoſum 384
verbaſcifolium 382
villoſum 385
virginianum ib.
zeylanicum 387

Soldanella 292, 328
alpina 328

Solidago 1164, 1235-1237
altiſſima 1236
ambigua 1237
arboreſcens ib.
arguta 1235
aſpera 1237
bicolor 1236
caeſia ib.
cambrica 1237
canadenſis 1236
dubia 1235
elliptica ib.
flexicaulis 1237
gigantea 1235
juncea ib.
laevigata 1236
lateriflora 1236
latifolia 1237
mexicana 1235
minuta 1236
multiradiata 1237
nemoralis 1236
noveboracenſis 1237
petiolaris 1236
piloſa 1235
proſera 1236
reflexa ib.
rigida 1237
ſempervirens 1235
ſera 1236
ſerotina 1235
ſtricta 1236
ſuaveolens 1235
vimínea ib.
Virgaurea 1237

Sonchus 1161, 1171
agreſtis 1171
alpinus ib.
arvenſis ib.
canadenſis ib.
floridanus ib.
fruticoſus ib.
maritimus ib.
oleraceus ib.
paluſtris ib.
pinnatus ib.
Plumieri ib.
radicatus ib.
ſibiricus ib.
tataricus ib.
tenerrimus ib.
tuberoſus ib.

SONNERATIA 656, 675

Sophora 655, 664, 665
alba 665
alopecuroides 664
auſtralis ib.
buxifolia 665
calyptrata ib.
capenſis 664
flaveſcens ib.
geniſtoides ib.
havanenſis ib.
heptaphylla ib.
hirſuta 665
japonica 664
lanceolata 665
lupinoides ib.
microphylla 664
monoſperma ib.
occidentalis ib.
Retzii 665
rotundifolia ib.
tetraptera 664
tinctoria ib.
tomentoſa ib.
villoſa 665

Soramia 775, 821
gujanenſis 821

Sorbus 778, 834
aucuparia 834
domeſtica ib.
hybrida ib.

Spananthe 309, 478
paniculata 478

Sparganium 85, 147
erectum 147
natans ib.
ſimplex ib.

SPARRMANNIA 774, 814
africana 814

Spartina 84, 123
Schreberi 123

Spar-

Spartium 1076, 1088, 1089
angulatum 1089
aphyllon 1088
complicatum 1089
contaminatum 1088
cytisoides 1089
ferox *ib.*
horridum *ib.*
junceum *ib.*
monospermum *ib.*
purgans *ib.*
radiatum *ib.*
scoparium *ib.*
Scorpius *ib.*
sepiarium 1088
sericeum 1089
sphaerocarpon *ib.*
spinosum *ib.*
supranubium *ib.*
villosum *ib.*

Spathelea 311, 498
simplex 498

Spergula 663, 738
arvensis 738
laricina *ib.*
nodosa *ib.*
pentandra *ib.*
saginoides *ib.*

Spermacoce 214, 233, 234
alata 234
articularis 233
aspera 234
caerulescens *ib.*
havanensis *ib.*
hirta 233
hispida *ib.*
latifolia 234
longifolia *ib.*
ocymoides 234
procumbens 233
prostrata 234
radicans *ib.*
scandens *ib.*
sexangularis *ib.*
spinosa 233
stricta *ib.*
sumatrensis *ib.*
tenuis *ib.*
verticillata *ib.*
villosa *ib.*

Spermodermia 1286, 1482
clandestina 1482

Sphaeranthus 1167, 1279 *sq.*
africanus 1280
indicus 1279
sinensis 1280

Sphaeria 1286, 1473-1480
minosa 1477
Acrospermum 1478
acuta 1479
aeruginosa 1474
agariciformis 1473
Artocreas 1478
atro-purpurea 1474
Bombarda 1477
bulbosa 1474
bullata 1476
byssacea 1479
byssina 1477
byssiseda 1479
calva 1479
cancellata 1477
Carcharias 1474
carpini 1476
castorea 1474
Ceratospermum 1476
cespitosa 1476
ciliaris 1480
cinnabarina 1479
cirrata 1477
comata 1480
complanata 1478
confluens *ib.*
conica 1478
convergens 1476
coronata 1477
Cucurbitula 1475
cylindrica 1478
decidua 1474
densa 1475
digitata 1474
disciformis 1476
dubia 1478
entomorhiza 1474
epiphylla 1479
episphaeria 1478
fissivela 1476
flexuosa 1474
fragifera 1475
fragiformis 1477
gelatinosa 1475
globularis 1477
Gnomon *ib.*
granulosa 1477
gregaria 1478
hemisphaerica 1479
hispida *ib.*
Hypoxylon 1474
Hystrix 1476
inquinans 1478
insitiva 1475
lenta *ib.*
Lingua 1477
macrostoma 1479
Macula 1475
melanogramma 1477
miliacea 1480
militaris 1474

mobilis

Sphaeria
mobilis 1479
mollis *ib.*
moriformis 1478
mucida 1479
mucosa *ib.*
natans 1475
nivea 1477
ophioglossoides 1474
papillata 1476
parabolica 1478
penetrans *ib.*
Peziza *ib.*
phoenicea 1480
Placenta 1475
porphyrogona 1479
pulvinata 1476
pustulata 1477
radians 1475
ribis 1474
rostrata 1479
rugosa *ib.*
sanguinaria 1475
sphincterica 1479
Stigma 1476
subulata 1478
succenturiata 1476
Talus 1475
tristis 1479
truncata 1474
tubaeformis 1477
tunicata 1475
virescens 1476

Sphaerobolus 1462
rosaceus *ib.*
stellatus *ib.*

Sphaerocarpus 1, 9
Hura 9

Sphagnum 1284, 1323
alpinum 1323
palustre *ib.*

Spigelia 293, 333
Anthelmia 333
marilandica *ib.*

Spilanthus 1163, 1193

Acmella 1193
atriplicifolia *ib.*
insipida *ib.*
oleracea *ib.*
Pseudo-acmella *ib.*
salivaria *ib.*
uliginosa *ib.*
urens *ib.*

Spinacia 312, 508
fera 508
oleracea *ib.*

SPINIFEX 87, 177
squarrosus 177

Spiraea 779, 849, 850
alba 849
alpina *ib.*
altaica *ib.*
argentea *ib.*
Aruncus 850
betulifolia 849
callosa *ib.*
camtschatica *ib.*
chamaedryfolia *ib.*
crenata *ib.*
Filipendula 850
hypericifolia 849
japonica *ib.*
incisa 850
laevigata 849
lobata 850
opulifolia *ib.*
palmata *ib.*
salicifolia 849
sorbifolia 850
thalictroides *ib.*
tomentosa 849
trifoliata 850

Spiraea
triloba 850
Ulmaria *ib.*

Splachnum 1284, 1325 *sq.*
ampullaceum 1325
angustatum *ib.*
Breweri *ib.*
longisetum *ib.*
luteum 1325
ovatum 1326
rubrum 1325
sphaericum *ib.*
tenue *ib.*
urceolatum *ib.*
vasculosum *ib.*

Spondias 663, 729
dulcis 729
Mombin *ib.*
Myrobalanus *ib.*

Spumaria 1466
Mucilago *ib.*

Stachys 885, 906-908
aethiopica 907
alpina 908
annua 907
arvensis *ib.*
canariensis *ib.*
circinata *ib.*
cretica *ib.*
germanica 908
glutinosa 906
heraclea 907
hirta *ib.*
intermedia *ib.*
lanata *ib.*
latifolia 908
lavandulifolia 907
maritima 906
orientalis 907
palaestina 906

palu-

Stachys
paluſtris 907
patens 906
recta 907
rugoſa *ib.*
ſilvatica *ib.*
ſpinoſa 906
Staehelina 1163, 1202
arboreſcens 1202
Chamaepeuce *ib.*
corymboſa *ib.*
dubia *ib.*
elegans *ib.*
fruticoſa *ib.*
gnaphalioides *ib.*
haſtata *ib.*
ilicifolia *ib.*
imbricata *ib.*
ſpinoſa *ib.*
Stalagmitis 774, 810
cambogioides 810
Stapelia 306, 447
articulata 447
hirſuta *ib.*
incarnata *ib.*
mammillaris *ib.*
pilifera *ib.*
pulla *ib.*
quadrangula *ib.*
variegata *ib.*
Staphylea 311, 498
occidentalis 498
pinnata *ib.*
trifolia *ib.*
Statice 313, 510-512
aphylla 511
Armeria 510
aurea 512
axillaris 512
caroliniana 511
Statice
cordata 511
cylindrifolia 512
echinus 511
echioides *ib.*
ferulacea 512
flexuoſa 511
graminifolia *ib.*
incana *ib.*
Limonium *ib.*
linifolia 512
lobata 511
minuta 512
monopetala *ib.*
mucronata *ib.*
pruinoſa 511
Pſeudarmeria 510
purpurata 511
ramoſiſſima *ib.*
reticulata *ib.*
rubella 512
ſinuata 511
ſpecioſa *ib.*
tatarica *ib.*
Steerbeckia 774, 820
gujanenſis 820
Stellaria 661, 717 *ſq.*
arenaria 718
biflora *ib.*
bulboſa *ib.*
ceraſtoides *ib.*
ciliata 719
craſſifolia 718
dichotoma *ib.*
Dilleniana *ib.*
graminea *ib.*
Holoſtea *ib.*
hypericifolia *ib.*
lateriflora *ib.*
nemorum 717
radians 718
rupeſtris 719
Stellaria
uliginoſa 718
undulata *ib.*
uniflora *ib.*
Stellera 600, 634
Chamaejaſme 634
Paſſerina *ib.*
Stemodia 889, 954
maritima 954
ruderalis *ib.*
Stemonitis 1286, 1467-1470
alba 1469
antiades *ib.*
argillacea *ib.*
aurantia *ib.*
bicolor *ib.*
bombacina 1470
botrytis 1468
cancellata *ib.*
cinerea 1467
cinnabarina 1469
coccinea 1468
crocea 1467
Embolus 1467
faſciculata 1468
favaginea 1470
ficoides 1469
flava 1468
floriformis 1469
fulva 1468
furfuracea *ib.*
fuſca 1467
globularis 1470
globulifera 1469
graniformis 1468
incarnata 1467
leucocephala *ib.*
leucopus 1470
lichenoides 1468
lumbricalis 1470
nigra 1467
nivea *ib.*

Stemonitis
nutans 1467
olivacea 1468
pomiformis 1469
pyriformis ib.
recutita 1467
rufa 1468
ſemitrichoides ib.
ſphaerocephala ib.
ſulphurea 1470
Trichia ib.
turbinata 1469
typhina 1467
varia 1470
veſparia ib.
veſiculoſa ib.
violacea 1469
viridis ib.
vitellina 1470
Stephanium 299, 368
gnjanenſe 368
Sterculia 998, 1034
Balenghas 1034
cordifolia ib.
Firmiana ib.
foetida ib.
Joira ib.
lanceolata ib.
platanifolia ib.
Steris 307, 454
javana 454
Stewartia 1001, 1068
virginica 1068
Stilago 82, 107
Bunius 107
STILBE 210, 226, 227
cernua 227
ericoides ib.
pinaſtra 226
Stilbum 1287, 1483
bulboſum 1483
minimum ib.
pubens ib.
rubicundum ib.
tuberinatum ib.
vulgare ib.
Stillingia 995, 1003
ſilvatica 1003
Stiloſanthes 1077, 1121
elatior 1121
gujanenſis ib.
procumbens ib.
viſcoſa ib.
Stipa 87, 191
arguens 191
Ariſtella ib.
avenacea ib.
capillata ib.
juncea ib.
membranacea ib.
paleacea ib.
pennata ib.
ſpicata ib.
tenaciſſima ib.
Stockeſia 1192
cyanea 1192
Stoebe 1167, 1281 *ſq.*
aethiopica 1281
diſticha ib.
ericoides ib.
gnaphaloides 1282
gomphrenoides ib.
proſtrata ib.
reflexa ib.
rhinocerotis ib
ſcabra ib.
Stratiotes 780, 852
acoroides 852
Stratiotes
alismorides 852
alooides ib.
Strigilia 659, 698
racemoſa 698
Strumpfia 302, 373
maritima 373
Struthiola 216, 277
erecta 277
juniperina ib.
lanceolata ib.
nana ib.
virgata ib.
Strychnos 296, 387
colubrina 387
Nux vomica ib.
potatorum ib.
Telancotta ib.
Styrax 659, 699
Benzoin 699
glabrum ib.
grandiflorum ib.
officinale ib.
Suaeda 311, 503
anonyma 503
baccata ib.
fruticoſa ib.
hortenſis ib.
monoica ib.
vera ib.
vermiculata ib.
Subularia 967, 970
aquatica 970
purpurea ib.
Suriana 733
maritima ib.
Sutherlandia 998, 1027
littoralis 1027
Swartſia 296, 360
grandiflora 360

Swertia 306, 459
carinthiaca 459
corniculata ib.
decumbens ib.
dichotoma ib.
difformis ib.
perennis ib.
rotata ib.
Swietenia 657, 680
Mahagoni 680
Syena 83, 121
Majaca 121
SYMPHONIA 996, 1009
globulifera 1009
Symphytum 291, 320
officinale 320
orientale ib.
regium ib.
secundum. ib.
tuberosum ib.
Symplocos 1150, 1155
martinicensis 1155
octopetala ib.
Syntherisma 86, 154
praecox 154
serotinum ib.
villosum ib.
Syringa 19, 26
capitata 26
persica ib.
suspensa ib.
vulgaris ib.

Tabernaemontana 294, 438, 439
alternifolia 439
Amlonia ib.
amygdalifolia 438
angustifolia ib.
citrifolia ib.
cymosa ib.
discolor ib.
echinata ib.
elliptica ib.
grandiflora ib.
laurifolia ib.
TACCA 743, 767
pinnatifolia 767
Tagetes 1164, 1245
erecta 1245
minuta ib.
patula ib.
Taligalea 887, 922
campestris 922
Talisia 598, 620
gujanensis 620
Tamarindes 82, 94
indica 94
Tamarix 311, 498, 499
africana 499
gallica 498
germanica 499
orientalis ib.
Tamburissa 3, 16
quadrifida 16
Tamonea 890, 965
mutica 965
Tamus 525, 570
communis 570
cretica ib.
elephantipes ib.
Tanacetum 1163, 1208 sq.
angulatum 1209
annuum 1208
argenteum 1208
Balsamita 1209
cotuloides ib.
flabelliforme ib.
incanum 1208
monanthon ib.
myriophyllon ib.
sibiricum ib.
suffruticosum 1209
vulgare 1208
Tanaecium 886, 943
Jaroba 943
parasiticum ib.
Tanibuca 660
Tapeinia 81, 108
magellanica 108
Tapura 300, 332
gujanensis 332
Taralea 1075, 1084
oppositifolia 1084
Tarchonanthus 1163, 1204
camphoratus 1204
ericoides ib.
glaber ib.
Targionia 1285, 1353
hypophylla 1353
Sphaerocarpos ib.
Tattia 778, 836
ignota 836
Taxus 1000, 1071
baccata 1071
elongata ib.
macrophylla ib.
nucifera ib.
verticillata ib.

TECTO-

TECTONA 337
grandis ib.
Telephium 312, 504
Imperati 504
oppositifolium ib.
Temus 777, 831
moschata 831
Terminalia 660, 701
angustifolia 701
arbuscula ib.
Catappa ib.
Chebula ib.
latifolia ib.
TERNSTROEMIA 773, 797, 798
dentata 798
elliptica 797
meridionalis 798
punctata ib.
Tetracera 779, 839
volubilis 839
Tetragonia 779, 842, 843
crystallina 843
echinata ib.
expansa ib.
fruticosa 842
herbacea 843
hirsuta ib.
japonica ib.
spicata ib.
Tetramnus 1076, 1094
uncinatus 1094
volubilis ib.
Tetranthus 1167, 1280
littoralis 1280
Teucrium 885, 892-897
abutiloides 896
Achaemenis 897
angustissimum 893
Arduini 894
arenarium 896
asiaticum ib.
aureum 895
betonicaefolium ib.
betonicum 896
Botrys 893
brevifolium 894
buxifolium 896
caelestе 893
campanulatum, 892
canadense 895
capitatum 896
chamaedrys 895
Chamaepitys 893
chium ib.
creticum ib.
cubense 895
flavescens 897
flavum 895
fruticans 894
gnaphalodes 897
heterophyllum 895
hircanicum 896
japonicum 894
inflatum 896
Iva 893
laevigatum ib.
latifolium 894
Laxmanni ib.
Libanitis 893
lucidum 894
lusitanicum 897
Marum 894
massiliense ib.
mauritanum 893
montanum 894
moschatum 893
multiflorum 894
nissolianum 893
nitidum 895
orientale 892
parviflorum ib.
Polium 896
Pseudhyssopus ib.
Pseudo-chamaepitys 893
pumilum ib.
pycnophyllum 897
pyrenaicum 895
quadratulum ib.
regium ib.
retundifolium ib.
salicifolium 894
Salviastrum 895
scordioides 896
Scordium ib.
Scorodonia ib.
sibiricum 894
spinosum 897
supinum 893
thymifolium 894
trifidum 896
trifoliatum 894
valentinum 897
villosum 895
virginicum 894
Thaelaephora 1285, 1440-1441
alutacea 1441
applanata ib.
carnea ib.
crocea ib.
ferruginosa ib.
fusca ib.
glabra ib.
hirsuta 1440
lilacea ib.
mesenterica ib.

Thaelaephora
meſenteriformis 1440
papyracea 1441
phylacteris *ib.*
rubiginoſa *ib.*
ſericea *ib.*
ſtricta *ib.*
undulata *ib.*
variegata *ib.*

Thalia 1, 9
cannaeformis 9
geniculata *ib.*

Thalictrum 782, 874, 875
alpinum 874
anguſtifolium *ib.*
aquilegifolium *ib.*
atro-purpureum *ib.*
carolinianum 875
contortum 874
Cornuti 875
dioicum *ib.*
elatum *ib.*
flavum 874
foetidum *ib.*
longifolium *ib.*
lucidum *ib.*
majus 875
medium *ib.*
minus *ib.*
nigricans 874
purpuraſcens 875
rugoſum *ib.*
ſibiricum *ib.*
ſimplex 874
ſtamineum 875
tuberoſum *ib.*

Thapſia 310, 489, 490
Aſclepium 489
foetida *ib.*

Thapſia
garganica 490
trifoliata *ib.*
villoſa 489

Thea 776, 821
Bohea 821
viridis *ib.*

Theleobolus 1286, 1461
ſtercorarius 1461

Theligonum 740, 745
Cynocrambe 745

Themeda 85, 149
polygama 149

Theobroma 1149, 1151
Cacao 1151
Guacuma *ib.*
gujanenſe *ib.*

Theophraſta 293, 333
americana 333

Theſium 304, 428, 429
alpinum 428
amplexicaule *ib.*
bavarum *ib.*
capitatum *ib.*
Colpoda 429
euphorbioides *ib.*
fragile *ib.*
Frilea 428
funale *ib.*
lineatum 429
Linophyllum 428
paniculatum *ib.*
ſcabrum 429
ſpicatum 428
ſpinoſum 429
ſquarroſum *ib.*

Theſium
ſtrictum 429
triflorum *ib.*
umbellatum *ib.*

Thlaſpi 967, 973, 974
alliaceum 973
alpeſtre 974
alpinum *ib.*
arvenſe 973
Burſa paſtoris 974
campeſtre *ib.*
ceratocarpon *ib.*
hirtum *ib.*
montanum *ib.*
peregrinum 973
perfoliatum 974
praecox *ib.*
ſaxatile 973
Schranckii 974

Thoa 772, 826
urens 826

Thottea 773, 798
grandiflora 798

THOUINIA 20, 49
liguſtrina 49
nutans *ib.*

Thrinax 526, 570
parviflora 570

Thryallis 658, 684
braſilienſis 684

Thuja 996, 1006
aphylla 1006
dolabrata *ib.*
occidentalis *ib.*
orientalis *ib.*

THUNBERGIA 891, 934
capenſis 934

Thuraria 661, 703
chilenſis 703

Thym-

Thymbra 886, 898
ſpicata 898
verticillata ib.
Thymus 886, 913, 914
Acinos 913
alpinus 914
Brownei ib.
cephalotes 913
filiformis 914
imbricatus ib.
indicus ib.
Maſtichina 913
numidicus ib.
pannonicus 914
Piperella ib.
Serpyllum 913
Tragoriganum ib.
villoſus ib.
virginicus ib.
vulgaris ib.
Zygis ib.
Tiarella 661, 708
cordifolia 708
trifolia ib.
unifolia ib.
Ticorea 996, 1009
foetida 1009
Tigarea 774, 813
aſpera 813
dentata ib.
Tilia 815
alba ib.
americana ib.
caroliniana ib.
cordata ib.
europaea ib.
pubeſcens ib.
tomentoſa ib.
Tillaea 220, 289
aquatica 289
capenſis ib.
Tillaea muſcoſa 290
perfoliata 289
Tillandſia 522, 530, 531
anguſtifolia 531
caneſcens ib.
decumbens ib.
faſciculata 530
flexuoſa ib.
lingulata 531
monoſtachya ib.
nutans 530
paniculata 531
polyſtachya 530
recurvata 531
ſerrata ib.
tenuifolia ib.
uſneoides ib.
utriculata 530
Timmia 524, 538
anguſtifolia 538
obliqua ib.
Tinus 647, 652
occidentalis 652
Tithonia 1165, 1259
uniflora 1259
Tocoyena 296, 330
longiflora 330
Tolvifera 655, 677
Balſamum 677
Tomex 260
glabra ib.
Tondin 602, 635
ſurinamenſe 635
Tonina 525, 570
fluviatilis 570
Tonſella 82, 106
ſcandens 106
Tontanea 213, 280
guianenſis 280
Topobea 741, 754
paraſitica 754
Tordylium 308, 472
apulum 472
maximum ib.
officinale ib.
peregrinum ib.
ſcifolium ib.
ſyriacum ib.
Torenia 887, 935
aſiaticum 935
Tormentilla 781, 860
erecta 860
reptans ib.
Tournefortia 295, 324
argentea 324
bicolor ib.
cymoſa ib.
foetidiſſima ib.
glabra ib.
hirſutiſſima ib.
humilis ib.
maculata ib.
ſerrata ib.
ſuffruticoſa ib.
volubilis ib.
Tourrettia 889, 940
volubilis 940
Tovomita 774, 808
guianenſis 803
Tozzia 888, 925
alpina 925
Trachelium 297, 358
caeruleum 358
diffuſum ib.
tenuifolium ib.

Tradescantia 522, 532, 533
- *Aubleti* 533
- axillaris *ib.*
- *cordifolia* *ib.*
- cristata *ib.*
- *discolor* *ib.*
- geniculata 532
- malabarica *ib.*
- *monandra* *ib.*
- *multiflora* 533
- nervosa 532
- papilionacea 533
- *spathacea* *ib.*
- *speciosa* *ib.*
- virginica 532

Tragia 83, 94
- *cannabina* 94
- Chamelaea *ib.*
- *innocua* *ib.*
- involucrata *ib.*
- Mercuriales *ib.*
- urens *ib.*
- volubilis *ib.*

Tragopogon 1161, 1168, 1169
- asper 1169
- *capensis* 1168
- crocifolius *ib.*
- Dalechampii 1169
- Dundelion *ib.*
- lanatus *ib.*
- major 1168
- mutabilis *ib.*
- orientalis *ib.*
- picroides 1169
- pomifolius 1168
- pratensis *ib.*
- ruber 1169
- undulatus 1168
- virginicus 1169
- villosus 1168

Trapa 216, 265
- *bicornis* 265
- natans *ib.*

Tremella 1286, 1446-1448
- adnata 1446
- *allii* 1447
- *annulata* 1448
- *arborea* 1446
- *atra* 1448
- *cavernosa* 1446
- *cerebrina* 1447
- *cinnabarina* *ib.*
- *clavariaeformis* 1446
- *coralloides* 1448
- *crispa* *ib.*
- *deliquescens* *ib.*
- difformis 1446
- *digitata* 1448
- *encephaloides* 1447
- *fucata* 1446
- *glandulosa* 1448
- *granulata* 1446
- hemisphaerica *ib.*
- *hydnoidea* 1448
- *intestinalis* 1447
- juniperina *ib.*
- *lithophila* *ib.*
- *mesenterica* *ib.*
- *meteorica* 1446
- *miliaris* 1448
- *moniliformis* 1446
- Nostoc 1447
- *orbicularis* 1446
- *persistens* 1447
- *Pisum* 1446
- *plana* 1447
- *pruniformis* 1446
- *punctiformis* *ib.*
- *rubella* 1448
- *ruberrima* 1447
- *rubra* 1448
- *rufa* 1446
- *Sagarum* 1447
- *sepincola* *ib.*
- *stipitata* 1446
- *torta* 1447
- *undulata* *ib.*
- *ustulata* *ib.*
- verrucosa 1448
- *verticalis* 1448
- *vesicaria* 1446
- *violacea* 1447
- *viridis* *ib.*

Trewia 772, 813
- nudiflora 813

Trianthema 660, 703
- *crystallinum* 703
- decandrum *ib.*
- *fruticosum* *ib.*
- monogynum *ib.*
- pentandrum *ib.*

Tribulus 657, 683, 684
- cistoides 684
- lanuginosus *ib.*
- maximus 683
- *pentandrus* 684
- terrestris *ib.*

Trichilia 657, 679
- *alliacea* 679
- glabra *ib.*
- hirta *ib.*
- *moschata* *ib.*
- *pallida* *ib.*
- *spectabilis* *ib.*
- *spondioides* *ib.*
- *terminalis* *ib.*
- trifolia *ib.*

Tricho-

Trichocarpus 777, 834
gujanenſis 834
Trichomanes 1283, 1318-1321
adiantoides 1319
aſplenioides 1318
bivalve 1320
canarienſe 1321
capillaceum *ib.*
ciliatum 1318
clavatum 1319
contiguum *ib.*
crinitum 1320
criſpum 1318
cuneiforme 1320
demiſſum *ib.*
dilatatum 1319
elatum 1321
epiphyllum 1320
flaccidum 1321
fucoides 1319
gibberoſum 1320
hirſutum *ib.*
humile 1318
japonicum 1321
lineares 1320
lucens 1319
membranaceum 1318
multifidum 1321
polyanthon 1319
polypodioides 1318
puſillum *ib.*
pyxidiferum 1320
reniforme 1318
ſeptans *ib.*
rigidum 1319
ſanguinolentum 1320
ſcandens 1321
ſericeum 1318
ſinenſe 1321
ſolidum *ib.*
ſquarroſum 1320
ſtrigoſum 1320
tamariſciforme *ib.*
tunbrigenſe 1319
undulatum *ib.*
Trichoſenthes 81, 102
amara 102
anguina *ib.*
cucumerina *ib.*
foetidiſſima *ib.*
nervifolia *ib.*
Trichoſtema 886, 918
brachiatum 918
dichotomum *ib.*
lineare *ib.*
Tridax 1165, 1254
procumbens 1254
Trientalis 593, 595
europaea 595
Trifolium 1075, 1077, 1140-1144
agrarium 1143
albidum 1142
alexandrinum 1141
alpeſtre 1142
alpinum 1141
anguſtifolium 1142
arvenſe *ib.*
aureum 1143
bicorne 1142
biflorum 1143
ceſpitoſum 1141
Cherleri *ib.*
clypeatum 1142
comoſum 1140
erectum 1143
filiforme *ib.*
flexuoſum 1142
fragiferum 1143
glaciale 1141
globoſum 1141
glomeratum *ib.*
gujanenſe 1143
hedyſarioides 1141
hybridum *ib.*
incarnatum 1142
laevigatum 1143
lappaceum 1142
Lupinaſter 1140
Melilotus *ib.*
caerulea *ib.*
cretica *ib.*
indica *ib.*
italica *ib.*
officinalis *ib.*
ornithopodioides *ib.*
polonica *ib.*
meſſanenſe *ib.*
montanum 1143
ochroleucum 1142
pannonicum *ib.*
pratenſe 1142
procumbens 1143
pſoraloides *ib.*
reflexum 1140
repens 1141
reſupinatum 1143
rubens 1142
ſcabrum 1141
ſimplicifolium 1144
ſpadiceum 1143
ſpumoſum *ib.*
ſquarroſum 1141
ſtellatum 1142
ſtriatum 1141
ſtrictum 1140
ſubterraneum 1141
ſuffocatum 1143
tomentoſum *ib.*
uniflorum 1142

Triglochin 527, 587
bulbosum 587
maritimum ib.
paluſtre ib.
Trigonella 1075, 1078, 1145, 1146
corniculata 1146
Foenum graecum ib.
hamoſa ib.
indica ib.
laciniata ib.
monſpeliaca ib.
platycarpos 1145
polycerata ib.
ruthenica ib.
ſpinoſa 1146
ſtellata ib.
ſtriata 1145
Trigonia 655, 673
laevis 673
villoſa ib.
Trigonis 598, 610
tomentoſa 610
Triguera 295, 338
baccata 338
TRILIX 774, 805
lutea 805
Trillium 527, 588
cernuum 588
erectum ib.
ſeſſile ib.
Triopteris 662, 725
citrifolia 725
jamaicenſis ib.
rigida ib.
Trioſteum 299, 369
angulſtifolium 369
perfoliatum ib.
Triplaris 743, 767
americana 767
ramiflora ib.
Tripſacum 87, 178
dactyloides 178
hermaphroditum ib.
Triſetaria 87, 177
Forſkahlii 177
Triſtemma 656, 693
mauritianum 693
Triticum 88, 199, 200
aeſtivum 199
bicorne 200
bromoides ib.
compoſitum ib.
hibernum 199
junceum 200
maritimum ib.
monococcum ib.
polonicum ib.
proſtratum ib.
pumilum ib.
repens ib.
Spelta ib.
tenellum ib.
turgidum ib.
unilaterale ib.
Triumfetta 740, 750
annua 750
Bartramia ib.
Lappula ib.
procumbens ib.
rhomboidea ib.
ſemitriloba ib.
Trixis 1166, 1271
aſpera 1271
eroſa ib.
terebinthinacea ib.
Trollius 782, 881
aſiaticus 881
europaeus ib.
Tropaeolum 598, 605
hybridum 605
majus ib.
minus ib.
peregrinum ib.
Trophis 217, 277
americana 272
Tſiana 1, 9
ſpecioſa ib.
Tubea 1286, 1481
album 1481
guloſorum ib.
oleraceum ib.
paraſiticum ib.
Tubercularia 1287, 1482
faſciculata 1482
nigricans ib.
ſulcata ib.
volvata ib.
vulgaris ib.
Tubifera 1472
cylindrica ib.
ferruginoſa ib.
fragiformis ib.
Tubiflora 19, 27
carolinenſis 27
TULBAGHIA 525, 535
alliacea 535
cepacea ib.
Tulipa 547
biflora 547
Breyniana ib.
Gesneriana ib.
ſilveſtris ib.
Tunatea 772, 820
gujanenſis 820

Turia 303, 403
cordata 403
cylindrica *ib.*
Gijef *ib.*
Leloja *ib.*
Moghada *ib.*
Turnera 311, 503, 504
ciltoides 504
gujanenſis *ib.*
fruteſcens *ib.*
Pumilea 503
racemoſa 504
rupeſtris 503
ſidoides *ib.*
ulmifolia *ib.*
TURRAEA 657, 679 680
glabra 679
lanceolata *ib.*
maculata 680
pubeſcens *ib.*
ſericea *ib.*
tomentoſa *ib.*
virens 679
Turritis 968, 987, 988
alpina 988
glabra 987
hirſuta 988
Tuſſilago 1164, 1224-1226
alba 1225
alpina *ib.*
Anandria 1224
dentata 1225
diſcolor *ib.*
Farfara *ib.*
frigida *ib.*
hybrida 1225
japonica *ib.*
lutea *ib.*
nana 1224
nutans 1225
palmata 1226
paradoxa 1225
Petaſites 1225
pumila 1224
radiata 1226
rubella 1225
ſibirica 1224
ſilveſtris 1225
ſpuria *ib.*
Tympanis 1285, 1460
ſaligna 1460
Typha 85, 147
anguſtifolia 147
latifolia *ib.*
Ubium 779, 839
quadrifarium 839
Ulex 1076, 1093
capenſis 1093
europaeus *ib.*
Ulmus 305, 456
americana 456
campeſtris *ib.*
effuſa *ib.*
hollandica *ib.*
nemoralis *ib.*
pubeſcens *ib.*
pumila *ib.*
Ulva 1285, 1390-1392
articulata 1391
codendutifolia 1392
compreſſa 1391
confervoides *ib.*
cuneata *ib.*
dichotoma *ib.*
glandiformis *ib.*
intestinalis 1391
labyrinthiformis *ib.*
Lactuca *ib.*
lanceolata 1390
latiſſima *ib.*
Linza 1391
lumbricalis *ib.*
moccana *ib.*
montana 1390
oryziformis 1391
papilloſa *ib.*
pavonia 1390
porrifolia 1392
Priapus 1391
purpurea 1390
ramoſa 1391
reticulata 1390
rugoſa 1391
Sagarum 1392
ſquamaria 1390
ſtellata 1391
umbilicalis 1390
vermicularis 1391
Uncaria 299, 370
gujanenſis 370
Uniola 88, 183
bipinnata 183
mucronata *ib.*
paniculata *ib.*
ſpicata *ib.*
Unona 282, 869
diſcreta 869
UNXIA 1161, 1249
camphorata 1249
Uratea 656, 677
gujanenſis 677
Urceolaria 296, 390
exotica 390
Urena 1000, 1058, 1059
americana 1058

Urena
leptocarpa 1058
lobata ib.
multifida ib.
procumbens ib.
reticulata ib.
sinuata ib.
tricuspis ib.
Typhalaea 1059
ziminea ib.

Urtica 217, 268-272
aestuans 271
alata 268
alienata 269
arborea 272
argentea 271
baccifera ib.
balearica 269
betulifolia 270
canadensis 271
cannabina ib.
capensis ib.
capitata ib.
ciliaris 269
ciliata ib.
cuneifolia 270
cylindrica 269
depressa 270
diffusa 269
dioica 268
divaricata 271
Dodartii 269
elongata ib.
ferox 270
filiformis 269
frutescens 272
gracilis 269
grandifolia ib.
herniarioides 270
japonica 271
iners 269
interrupta 271
lappulacea 271
laxa 268
lucida 271
macrophylla 270
microphylla 268
nivea 272
nudicaulis 268
numulariaefolia 270
palmata 271
parasitica ib.
Parietaria 270
pilulifera 269
pumila ib.
radicans 270
repens ib.
reticulata ib.
rhombea 270
ruderalis 271
rufa 270
rugosa 268
serrulata 270
sessiliflora 271
spicata 269
stimulans 272
stolonifera 268
trianthemoides 270
urens ib.
villosa 271
virgata 269

Utricularia 20, 39, 40
alpina 39
bifida 40
caerulea ib.
foliosa 39
fibrosa 40
gibba ib.
inflata ib.
inflexa ib.
minor ib.
obtusa ib.
pumila ib.
purpurea ib.
stellaris 40
subulata ib.
vulgaris ib.
Uvaria 782, 868
javanica 868
lanceolata ib.
longifolia ib.
zeylanica ib.
Uvularia 525, 546
amplexifolia 546
cirrhosa ib.
hirta ib.
lanceolata ib.
perfoliata ib.
sessiliflora ib.

Vaccinium 601, 620-622
album 621
amoenum ib.
angustifolium 620
Arctostaphylos 621
bracteatum ib.
cereum 620
ciliatum 621
corymbosum ib.
diffusum 620
frondosum 621
fuscatum ib.
hirtum 620
hispidulum 622
ligustrinum 621
macrocarpon 622
meridionale ib.
mucronatum 621
Myrtillus 620
pallidum 621
resinosum ib.
stamineum 620
tenellum 621
uliginosum 620

venu-

Vaccinium
venuſtum 621
virgatum *ib.*
virgineum 622
Vitis idaea 621
VAHLIA 307, 463
capenſis 463
Valantia 214, 240, 241
Aparina 241
articulata *ib.*
Cruciata *ib.*
Cucullaria *ib.*
filiformis 240
glabra 241
hiſpida 245
hypocarpa 241
muralis 240
Valentinia 601, 618
ilicifolia 618
Valeriana 81, 91, 92
Calcitrapa 91
celtica *ib.*
Cornucopiae *ib.*
dentata 92
dioica 91
echinata 92
elongata *ib.*
Locuſta *ib.*
mixta *ib.*
montana 91
officinalis *ib.*
Pha *ib.*
pyrenaica 92
rubra 91
ſaxatilis 92
ſcandens *ib.*
ſibirica *ib.*
ſinenſis *ib.*
ſupina *ib.*
tripteris 91
Valeriana
tuberoſa 91
villoſa 92
Vallaris 297, 391
indica 391
VALLEA 774, 814
ſtipularis 814
Vallisneria 22, 80
ſpiralis 80
Vandellia 953
diffuſa 953
Vangueria 299, 367
madagaſcarienſis 367
Varronia 295, 394
alba 394
bullata *ib.*
curaſſavica *ib.*
globoſa *ib.*
humilis *ib.*
lineata *ib.*
macroſtachya *ib.*
martinicenſis, *ib.*
mirabiloides *ib.*
Vatairea 1076, 1085
gujanenſis 1085
Vateria 775, 819
indica 819
VATICA 741, 748
ſinenſis 748
Velezia 307, 459
rigida 459
Vella 967, 969, 970
annua 969
Pſeudo-cytiſus 970
tenuiſſima *ib.*
Veratrum 527, 589
album 589
luteum *ib.*
nigrum *ib.*
Sabadilla *ib.*
viride *ib.*
Verbaſcum 294, 377, 378
bicolle 377
Blattaria 378
Boerhaavii *ib.*
Chaixi *ib.*
ferrugineum *ib.*
haemorrhoidale *ib.*
lychnitis *ib.*
Myconi *ib.*
nigrum *ib.*
Osbeckii *ib.*
phlomoides *ib.*
phoeniceum *ib.*
pulverulentum *ib.*
ſinuatum *ib.*
ſpinoſum *ib.*
thapſoides 377
Thapſus *ib.*
Verbena 20, 41, 42
Aubletia 41
bonarienſis *ib.*
capitata 42
caroliniana *ib.*
curaſſavica 41
globiflora 42
haſtata *ib.*
jamaicenſis 41
indica *ib.*
lappulacea *ib.*
mexicana *ib.*
mutabilis *ib.*
nodiflora *ib.*
officinalis 42
orubica 41
prismatica *ib.*
procumbens 42
ſpuria *ib.*
ſtoechadifolia 41
ſupina 42
triphylla *ib.*
urticifolia *ib.*

Verbe-

Verbesina 1165, 1255 sq.
alata 1255
biflora 1256
Bosvellea ib.
calendulacea ib.
dichotoma ib.
fruticosa ib.
gigantea ib.
laciniata ib.
Lavenia ib.
nodiflora ib.
pinnatifida ib.
sinensis ib.
virginica ib.

Vermicularia 1286, 1480
hispida 1480
Pseudo-sphaeria ib.
pubescens ib.

Veronica 19, 28-31
acinifolia 31
agrestis 30
alpina 29
Anagallis ib.
aphylla 28
arvensis 30
austriaca ib.
Beccabunga 29
Bellardi 31
bellidioides 29
biloba 31
camtschatica 29
carnea ib.
carolinensis 31
catarractae 29
Chamaedrys 30
decussata ib.
elliptica 29
fruticulosa ib.
hederaefolia 30
hybrida 28
incana ib.
incisa ib.
laciniata ib.
Lappago 30
latifolia ib.
longifolia 28
marilandica 31
maritima 28
montana 30
multifida ib.
numularia 31
officinalis 28
paniculata 30
pectinata ib.
peregrina 31
pilosa 30
pinnata 28
prostrata 30
pumila 29
romana 31
salicifolia 29
saxatilis ib.
scutellata ib.
serpyllifolia ib.
sibirica 28
spicata ib.
spuria ib.
succulenta 31
tenella 29
Teucrium ib.
triphylla 30
urticaefolia ib.
verna 31
virginica 28

Viburnum 310, 496, 497
acerifolium 496
cassinoides 497
cuspidatum ib.
dentatum 496
dilatatum 497
erosum 497
hirtum ib.
Lantana 496
Lentago ib.
macrophyllum 497
nitidum ib.
nudum 496
obovatum ib.
Opulus ib.
prunifolium ib.
scandens ib.
serratum ib.
tinoides ib.
Tinus ib.
tomentosum 497
villosum 496
virens 497

Vicia 1077, 1110-1112
angustifolia 1112
benghalensis 1111
biennis ib.
bithynica 1112
bohemica 1110
canescens 1111
caroliniana 1110
cassubica 1111
Clymenum 1112
Cracca 1111
dumetorum ib.
exstipulata ib.
Faba 1112
Gerardi 1111
globosa 1112
hybrida ib.
lathyroides ib.
lutea ib.
monantha 1111
multiflora ib.
narbonensis 1112
nissoliana 1111

Vicia
onobrychoides 1111
peregrina 1112
pisiformis 1110
sativa 1112
sepium 1111
serratifolia 1112
silvatica 1111
tenuifolia *ib.*
Villarsia 306, 447
aquatica 447
Vinca 294, 435
lutea 435
major *ib.*
minor *ib.*
pusilla *ib.*
rosea *ib.*
Viola 302, 412-414
arborescens 414
arvensis 413
biflora *ib.*
calcarata 414
Calceolaria *ib.*
canadensis 413
canina *ib.*
cenisia *ib.*
cordata 412
cornuta 414
cucullata 412
decumbens 413
diandra 414
enneasperma *ib.*
grandiflora *ib.*
hirta 412
Hybanthus 414
Ipecacuanha *ib.*
Itubu *ib.*
Krockeri 412
lanceolata *ib.*
mirabilis 413
montana *ib.*
nummularifolia 413
obliqua 412
Viola
odorata 412
oppositifolia 414
palmata 412
palustris *ib.*
parviflora 414
pedata 412
pinnata *ib.*
primulifolia *ib.*
procumbens 413
pubescens *ib.*
pumila *ib.*
riphaea *ib.*
sagittata 412
stipularis 414
stricta 413
suffruticosa 414
tricolor 413
uniflora *ib.*
villosa 412
Virea 1162, 1174
scabra 1174
VIRECTA 297, 334
biflora 334
Virola 526, 570
sebifera 570
Viscum 217, 273
album 273
antaroticum *ib.*
capense *ib.*
flavens *ib.*
macrostachyon *ib.*
opuntioides *ib.*
pauciflorum *ib.*
purpureum *ib.*
rotundifolium *ib.*
rubrum *ib.*
terrestre *ib.*
verticillatum *ib.*
VISNEA 740, 767
Mocanera 767
Vitex 890, 962, 963
Agnus castus 963
altissima 962
divaricata *ib.*
Leucoxylon 963
Negundo *ib.*
ovata 962
pinnata 963
sinuata *ib.*
trifolia 962
umbrosa 963
Vitis 301, 421
arborea *ib.*
heptaphylla *ib.*
heterophylla *ib.*
japonica *ib.*
indica *ib.*
Labrusca *ib.*
laciniosa *ib.*
pentaphylla *ib.*
trifolia *ib.*
vinifera *ib.*
vulpina *ib.*
Vogelia 81, 107
capitata 107
Volkameria 890, 961
aculeata 961
japonica *ib.*
inermis *ib.*
Kaempferi *ib.*
scandens *ib.*
serrata *ib.*
Volutella 647, 652, 1459 *sq.*
aphylla 652
nuda 1460
volvata 1459
Votomite 216, 278
guianensis 278
Voyria 293, 334
caerulea 334
rosea *ib.*

Wachen-

Wachendorfia 82, 120
graminifolia 120
paniculata ib.
thyrsiflora ib.
Walcuffa 998, 1029
torrida 1029
Wallenia 211, 246
laurifolia 246
Waltheria 996, 1008, 1009
americana 1008
anguſtifolia ib.
caroliniana 1009
elliptica ib.
indica ib.
ovata ib.
Webera 776, 820
quinquenervia 820
WEIGELA 291, 337
japonica 337
Weinmannia 602, 636
birta 636
parviflora ib.
pinnata ib.
racemoſa ib.
tomentoſa ib.
trifoliata ib.
Willdenovia 298, 362
Schreberi 362
WILLICHIA 82
repens ib.
Willugbeja 296, 434
acida 434
gujanenſis ib.
WINTERA 780, 852, 853
aromatica 853
axillaris 852
granadenſis 853
Wiſenia 312, 515
indica 515
Witheringia 211, 247
ſolanacea 247
WITSENIA 82, 107
maura 107
Worrnia 780, 851
triquetra 851
WULFERIA 20, 40
carinthiaca 40
WURMBEA 527, 587
capenſis 587
Xanthium 305, 464
americanum 464
echinatum ib.
fruticoſum ib.
orientale ib.
ſpinoſum ib.
ſtrumarium ib.
Xanthorhiza 604, 646
apiifolia 646
Xanthoxylum 312, 509
caribaeum 509
Clava ib.
trifoliatum ib.
Xeranthemum 1163, 1218 *ſq.*
annuum 1218
bellidioides 1218
caneſcens ib.
fulgidum 1219
imbricatum 1218
paniculatum 1219
proliferum 1218
recurvatum 1219
retortum 1218
ſeſamoides 1219
ſpecioſiſſimum 1218
ſpinoſum 1219
ſquamoſum ib.
Staehelina ib.
ſtoloniferum ib.
variegatum ib.
veſtitum 1218
virgatum 1219
Xerophyta 522, 530
madagaſcarienſis 530
Ximenia 615
americana 615
elliptica ib.
inermis ib.
Xiphidium 82, 119
floribundum 119
Xylocarpus 600, 611
Granatum 611
XYLOPHYLLA 311, 499
anguſtifolia 499
latifolia ib.
longifolia ib.
montana ib.
Xylopia 282, 866
glabra 866
inuricata ib.
Xylosma 771, 797
orbiculatum 797
ſuaveolens ib.

Xylo-

Xyloſtroma 1287, 1442
giganteum 1442
Xyris 83, 122
americana 122
indica *ib.*
Xyſtris 300, 390
Schreberi 390

Yucca 525, 562
aloifolia 562
Draconis *ib.*
filamentoſa *ib.*
Glorioſa *ib.*

Zamia 781, 863
anguſtifolia 863
Cycadis *ib.*
pumila *ib.*
Zannichellia 118
paluſtris *ib.*
Zanonia 310, 500
indica 500
Zea 85, 148
Curagua 148
Mays *ib.*
Zinnia 1165, 1246
Bidens 1246
multiflora *ib.*
pauciflora *ib.*
verticillata *ib.*
Zizania 526, 579
aquatica 579
paluſtris *ib.*
terreſtris *ib.*
Ziziphora 20, 43
acinoides 43
capitata *ib.*
hiſpanica *ib.*
tenuior *ib.*
Zoegea 1165, 1263
aleppica 1263
capenſis *ib.*
Leptaurea *ib.*
Zomia 1076, 1096
bracteata 1096

Zoſtera 781, 863
ciliata 863
marina *ib.*
oceanica *ib.*
ſtipulacea *ib.*
uninervis *ib.*

Zygophyllum 657, 681
aeſtuans 681
album *ib.*
arboreum *ib.*
coccineum *ib.*
cordifolium *ib.*
Fabago *ib.*
maculatum *ib.*
mierophyllum *ib.*
Morgſana *ib.*
ſeſſilifolium *ib.*
ſimplex *ib.*
ſpinoſum *ib.*

INDEX II.

INDEX II.

NOMINUM TRIVIALIUM ſ. PROPRIORUM, ET SYNONYMORUM.

Not. Quae literarum characteribus conſueris expreſſa leguntur, nomina Specierum trivialia indicant; quae vero curſivis, Synonyma ab aliis uſurpata

Abelmoſchus 1066
Abies 1073
Abrotanum 1209
Abſinthicum 1211
Abſus 668
Abutilon 1048
Acango 529
Acanthium 1190
Acarna *ib.*
Acetabulum 1365, 1459
Acetoſa 586
Acetoſella 734
Acetoſellus 586
Achaemenis 897
Achenia 1061
Achillea 1206, 1208
Achras 398
Achyrantha 427
Achyranthes 426
Acidoton 1036
Acinodendron 688
Acinos 913
Aciphylla 480
Aciſonthera 605
Acmella 1193
Acronychia 619
Acroſpermum 1478
Acroſtichum 1311, 1322
Acturus 938
Acuſi 443
Adenanthera 554
Adenoſtema 1256
Adhatota 32
Adiantum nigrum 1304
Adima 422
Aegagropila 1395
Aegiceras 747
Aegilops 644
Aegilops 196 *ſq.*
Aeginetia 955
Agallocha 203
Agara 1390
Agaricus 1430 *ſq.* 1440
Agarum 1390
Agaſtachys 145
Ageratoides 1200
Ageratum 1252
Ageria 31
Agnus caſtus 963
Agrimonia 1195
Agrimonoides 757
Agroſtis 163, 171 *ſq.*
Ahovai 433
Aira 157, 176
Aizoon 704, 731
Akara 814
Alaternus 400
Alcea 1055
Alectorolophus 923
Alhagi 1123
Alicaltrum 12
Alifanus 605
Alkekengi 381
Alliaria 983
Allovia 8
Alnus 282

Aloë

Altæ 561
Aloides 852
Alſinaſtrum 643
Alſine 17
Alypum 226
Alyſſon 908
Alyſſum 971
Alyxia 430
Amalago 76
Amalanchior 841
Amanitea 1400
Amarella 462
Amaryllis 537
Ambotai 869
Ambu 418
Amelloides 1239
Amellus 1205, 1237
Ammi 483
Ammodytes 1135
Amomum 483
Ampeloprafum 541
Amſonia 439
Anacampſeros 731, 752
Anacardium 493
Anagallis 29, 957
Anandria 1224
Ananas 529
Anaſtomoſis 1449
Anblatum 924
Andrachne 697
Andromeda 620, 622, 626
Andropogon 152, 194
Androſaemum 1157
Anemonoidae, 871
Anguina 102
Anguria 100
Anil 1129
Aniſum 492
Anſerina 858
Anthelmia 333
Anthemis 1248, 1261
Antheuphorbium 1195
Antholyza 107
Anthora 838
Anthriſcus 473
Antoſtaphylos 621
Apargia 1176
Aparine 240, 241
Aperemoa 869
Aphaca 1109
Apios 763, 1106
Apucuita 668
Aquifolium 287
Arbor toxicaria 389
Arbor triſtis 23
Arbuſcula 73, 204
Archangelica 482
Arctotoides 1275
Arcturus 938
Arçuma 8
Arcyriae 1467
Areira 683
Argemone 809
Arguzia 324
Aria 829
Ariboa 788
Ariſarum 865
Ariſtella 191
Armeria 510, 710, 715
Armeriaca 795
Armoracia 975
Artemiſia 374, 1250
Artocreas 1478
Aruncus 850
Arundo 171, 579
Arundo 172, 174, 195
Aſak 803
Aſarina 934
Aſchrek 668
Aſcidium 1484
Aſclepium 489
Aſellus 1102
Aſigron 1156
Aſpalathus 1087
Aſparagus 558
Aſpergillus 1487
Aſſa foetida 479
Aſter 1240
Aſteriſcoides 1261
Aſteriſcus 1270
Aſteroides 1262
Aſtragalus 1094, 1125
Atamuſco 539
Athamanta 486
Atocion 716
Atoto 762
Atraphaxoides 637
Aurantium 1153
Aubletia 41
Auricula 327, 1176, 1459
Auricularia 232, 902
Auricularia 1431, 1440 *ſq.*
Auriſcalpium 1439
Avellana 637, 966
Avena 171 *ſqq.*
Averrhea 287
Azadiracha 681
Azarolus 830
Azedarach 680

B

Baccabunga 29
Baducca 806
Baeothryon 125
Bailloviana 1386
Balanghas 1034
Balanus 1427
Balſamea 614, 1073
Balſamina 101, 415
Balſamita 1209, 1247
Balſamum 677
Bankſia 9, 24
Barba jovis 1099, 1440
Barbula 1335
Barometis 1312
Bartramia 750, 1335
Baſilicum 918
Baſtera 1386
Batata 574

Batatus 341
Batrachia 1015
Behan 1266
Behen 712, 716
Belladonna 381, 539
Bellidiastrum 1243
Benedicta 1268
Benghas 417
Bengoin 650, 699
Bergiana 628
Bergkia 651
Bermudiana 118
Bernardia 1036
Berula 482
Beryllus 1416
Betel 76
Betonica 32
Betulus 754
Beurreria 394
Bidens 1246, 1260
Bidens 1193
Bihai 423
Bilimbi 128
Bistortae 638
Blakea 820
Blattaria 378
Blechum 957
Blitum 205
Boæeformis 138
Boaria 25
Bohea 821
Bois cochon 614
Bois dentelle 632
Boldus 566
Boletus 1410
Bombarda 1477
Bona nox 346
Bonarota 31
Bonduc 672
Bonducella 672
Bonus Henricus 448
Borbonia 651
Borbonia 1113
Bosvallea 1256
Botrys 449, 893, 1018
Bourgati 467
Bovilta 1464
Brathys 1156
Breynia 807
Bryopteris 1289
Bryum 1326, 1328 *sq.*
Bubonium 1241
Buceras 702
Buchnera 41, 923
Bulbine 554
Bulbocastanum 475
Bulbocodium 108, 535
Bunius 107, 486
Buphthalmum 1279
Bupleurum 465
Burgoni 801
Bursa pastoris 474, 1383
Byssus 1356

Caapela 1006
Cacalioides 1276
Cacao 1151
Cacatin 688
Cachanlahuan 462
Cainito 395
Cakile 997
Calaba 814
Calabura 811
Calamintha 914
Calamus 568
Calceolaria 414
Calceolus 62, 1436
Calcitrapa 91
Calcitrapae 1268
Calcitrapoides *ib.*
Calendula 1273
Caliculus 1452
Calinea 805
Callicornia 1245
Callipteris 1311
Callorocca 393
Calyciflorae 770, 778 *sqq.*
Calyptranthae 792
Camara 945
Cammarum 838
Campanella 1431
Campanula 577
Camphora 650
Candel 747
Candelabrum 439
Canifolia 476
Cantharellus 1430
Capillus Veneris 1316
Capraria 947
Caprea 74
Caprifolium 368
Caput galli 1126
Caput Medusae 198, 759
Caput Medusae 1444
Caracalla 1102
Caragana 1116
Carambola 728
Carandas 806
Carcharias 1474
Cardamomum 5
Cardiaca 909
Cardinalis 356
Carduelis 1184
Carduncellus 1192
Carduncülus 1190, 1266
Cari 384
Carica 96
Carota 474
Carum 486
Carvata 59
Carvi 491
Caryophyllus 711
Cascarilla 1029
Cassapoa 96
Cassia 649
Cassine 287
Cassipurea 817

Caffitha 785
Caſtanea 757
Catalpa 940
Catappa 701
Cataria 899
Catechu 649, 804
Catianus 1105
Catinus atrum 495
Caucalis 474
Cauda felis 554
Cavenia 803
Cedrus 1073
Ceiba 1040
Celoſia 463
Cembra 1072
Centaurea 1202
Centaureum 1263
Centaurium 461
Centauroides 1268
Centella 468
Cepa 543
Cepaea 731
Cephalotes 1201
Ceraſus 795
Ceratonia 805
Ceratoſpermum 1476
Cerbarato 1252
Cerefolium 487
Cerei 784
Cereolus 1413
Cerris 644
Ceruana 1257
Cervaria 476
Ceroiana 505
Cervicaria 350
Ceterach 1301
Chaetophora 1392
Chairi 378
Chamaebuxus 1082
Chamadrys 895
Chamaeceraſa 368
Chamaeceraſus 795
Chamaeciſtus 694
Chamaecriſtas 671
Chamaecyparifſus 1205
Chamaedrys 30
Chamaejasma 634
Chamaelea 94
Chamaemeſpilus 841
Chamaemoly 544
Chamaemorus 857
Chamaepeuce 1202
Chamaepitys 893
Chamaelyce 761
Chamomilla 1249
Champaca 868
Chanas 97
Chaos 1472
Characias 766
Characera 946
Charantia 101
Chate 100
Cheiranthus 949
Cheiranthus 986
Chelonoides 942
China 582
Chionanthus 49
Chironia 618
Chironium 480
Chloroxylon 649
Chordorhiza 139
Chryſodon 1422
Chryſogonum 556
Chytraculia 792
Cicer 1134
Cicera 1109
Cicla 452
Cicutaria 488
Cineraria 1228, 1276
Cinna 170
Cinnamomum 649
Cipura 118
Citrullus 101
Cladium 137
Clathrus 1390
Clathrus 1467
Clava 760
Clava Herculis 509
Clavaria 1484
Clavaria 1474
Clavis 1421
Clavus 1420
Clavus 1405
Clematitis 591
Clematis 1244
Clinopodium 910
Cliffortiana 357
Cluſiana 859
Clymenum 1110, 1112
Clypeolus 66
Cneorum 344
Cobbe 495
Cocculus 756
Cochlearia 972
Cocoës 1367
Coeli roſa 735
Cojan 1114
Colocaſia 864
Colocynthis 100
Colpoon 429
Colubrina 387
Columa 637
Columella 1061
Coma aurea 1203
Cominia 495
Commelina 533
Commerſonia 799
Conami 203
Connati 253
Conomon 100
Conſolida 837
Contra 1210
Contragenea 265
Convallaria 266
Convallaria 558
Convolvulus 639
Convolvulus 347
Cookia 675
Copaja 942
Corallodendrum 1087
Coralloides 1376, 1444
Corallorhiza 56

Coriaria 494
Corindum 642
Coris 1159
Cornu Alces 1444
Cornu Cervi *ib.*
Cornucopiae 123
Cornuti 875
Coronaria 842
Coronopus 975
Cota 1251
Cotoneaster 841
Cotula 1251
Cotula 1248, 1255
Cotyledon 516, 704
Courbail 667
Cracca 1111
Craſſula 519
Crataeea 774
Crater 1452
Craterella *ib.*
Crista 671, 672
Crista caſtrenſis 1343
Crista galli 922, 1087, 1126
Crocodilia 1266 *ſq.*
Crocodilium 1267
Croſſopetalum 255
Crotalaria 665
Croton 94, 701
Cruciata 241, 462
Crucibulum 1454
Crupina 1264
Crus corvi 157
Crus Galli 829, 157
Crux Andreae 1160
Cubeba 77
Cucullaria 241, 1079
Cucurbitula 1475
Cuſavillus 786
Cujete 943
Culcita 1314
Cullilaban 649
Cumete 787
Cunonia 112
Cuphea 753
Cupula 1461
Curagua 148
Curandas 433
Curcas 1027
Curcuma 5
Cururu 641
Cyani 1264 *ſq.*
Cyathus 1430
Cycadis 863
Cydonia 842
Cymbalaria 930
Cyminum 484
Cynapium 486
Cynocrambe 745
Cynops 254
Cynoſurus 181
Cyparisſus 766
Cyphia 357
Cytiſus 1098, 1127

Daboecia 622
Daemia 444
Dahi 807
Dalea 1139, 1198
Dallbarda 857
Damaſconium 592
Dandelion 1169
Datora 379
Dens canis 546
Diadema 1455
Dicera 316
Dicranum 1328
Dictamnus 912
Didire 1104
Didymadon 1333
Diervilla 369
Digitalis 1428
Dilleniana 718, 1040
Dioſcoridis 965, 1180, 1220
Docha 173
Dolichos 1094, 1106
Dombeya 1037 *ſq.*
Donatia 207
Donax 194
Doria 1229
Doronicum 1230, 1242
Dortmanna 355
Doycnium 1145
Dorgonium 343
Draba 972
Draco 558, 1086
Dracontium 864
Dracunculus 864, 1212
Drakena 265
Droebachienſe 1224
Drymeja 143
Dryopteris 1313
Dudaim 100
Duhoon 287
Dulcamara 383
Duna 173

Ebenum 617
Ebenus 1087
Ebulus 497
Ecaſtaphyllum 1086
Ecbolium 32
Echinomelocacti 784
Echinus 511
Eglantaria 853
Elamifera 614
Elatine 931
Elatines 351
Elegia 201
Elengi 612
Elephas 922
Elliſia 960
Eluteria 505
Elvela 1440, 1442
Emblica 203
Embolus 1467
Emerus 1118
Endivia 1184
Endocarpon 1370

Enfete 567
Entada 801
Ephemerum 331
Epidendrum 1466
Epidendrum 60
Epigeios 172
Epipactis 469
Epiphyllanthus 499
Epipogium 55
Epithymum 285
Epixylon 1471
Eragroſtis 180, 183
Erianthos 1039
Erinacea 1100
Erinaceus 1439
Erinus 352, 357
Eriocephalus 1277
Eriopila 574
Eriſithales 1189
Erminea 836
Eruca 989
Erucago 991
Erucaria *ib.*
Erucaſtrum 989
Ervilia 1113
Eryſiphe 1486
Erythrina 1088
Erythroxylon 400, 1028
Eſculus 645
Eſula 766
Euonomis 545
Eugenia 792
Euodia 258
Eupatoria 757
Euphorbia 442
Euſtachiana 807
Euterpe 569

Faba 1112
Fabago 681
Faba indica 1104
Faba nigrita 1102
Faga 284
Fagopyrum 639
Falcaria 483
Falx 176
Farfara 1225
Farſetia 985
Faſciola 66
Favus 1436
Ferulago 478
Feſtuca 182
Fibula 1421
Ficaria 877
Ficoides 1195
Ficus indica 785
Filipendula 850
Filix 1370
Filix femina 1312
Filix mas *ib.*
Filum 1384
Fiorniana 1034
Fiſſidens 1338
Fiſtula 669
Flagellum 138, 1389
Flammula 873, 877
Flos aëris 63
Flos aquae 1396
Flos cobalti 1397
Flos cuculi 736
Flos jovis 735
Foeniculum 941
Foenum graecum 1146
Fragaria 361
Frangula 399
Friſea 428
Fructiflorae 772, 778 *ſqq.*
Fumana 823
Fumus 1421
Fumaria 1327
Fungoidaſter 1452
Fuſus 1408

Gaertnera 1386
Gaguedi 225
Galactia 1107
Galanga 8
Galatta 476
Galbanum 484
Gale 284
Galeobdolon 905
Galium 235
Gandaruſca 33
Garcini 104
Geaſter 1465
Geniſta 1089
Gentiana 618
Georgia 1327
Geraſcanthes 392
Gerbera 243
Gethyllis 564
Geum 705
Gheſperubilla 432
Gigas 1448
Gijef 403
Gingidium 474, 481
Githago 785
Glaucium 809
Glaux 1134
Globba 6
Glycina 1086
Gnaphalium 1220, 1282
Gnemon 1003
Gnidia 24
Gnidium 632
Gnomon 1477
Gorteria 1192
Goſſypium 1040
Granatum 98, 611, 793
Granum Paradiſi 5
Grimmia 1334
Groſſularia 420
Groſſulariae 419
Gryllus 165
Guaicuru 652
Guara 614
Guazuma 1151
Guidonia 816

Gutta 810
Gymnandra 922
Gymnoſtomum 1333

Haelava 932
Haemanthus 540
Haemaſtigma 1455
Haematomma 1361
Halicacabum 642
Hamcur 204
Hapalanthus 121
Harmala 750
Harra 990
Hartogia 409
Haſpan 136
Haſtile 1175
Hauponis 1198
Hedwigia 1331
Hedypnois 1182
Hedyſarum 1086, 1127 *ſq.*
Heiſteria 1082
Helenium 1240
Heleonaſter 139
Helianthemum 825
Helimus 450
Helix 420
Helix 72
Helminthochorton 1394
Helonias 548
Helvella 1430 *ſq.*
Helxine 639
Hemionitis 1301
Hepaticae 870
Herba venti 911
Hermannia 519
Heſperis 981
Hibiſcus 1060 *ſq.*
Hippocaſtanum 595
Hippocrepis 1310
Hippomarathrum 489
Hirculus 706
Hirundo 1452
Holodendron 1116
Holoſchoenus 125
Holoſtea 718
Horminum 45
Hoſpita 683
Hura 9
Huggan 683
Hyacinthus 1416
Hyacinthus 532
Hydnora 1005
Hydrolapathum 584
Hydropiper 638, 643
Hyleanthus 414
Hypericum 1069
Hypochaeris 1177
Hypociſtis 745
Hypogloſſum 105
Hypophylladendron 222
Hypophyllum 104
Hypopithys 685
Hypoxylon 1465, 1474
Hypſolodendron 494
Hyſſopifolia 753
Hyſterophorus 375
Hyſtrix 195, 198, 959 1092, 1476

Jabotapita 682
Jacea 1265
Faceae 1263 *ſq.*
Jacobaea 1228
Jalappa 342, 377
Jambos 787
Janipha 1027
Jaroba 943
Jatiauca 339
Iberis 973
Icaca 796
Idatimon 819
Jemadophila 1358
Jeminicus 132
Ilex 644
Ilex dodon 99
Illecebrum 1345
Illecebrum 427
Inaa 801
Infundibulum 1452
Inophyllum 814
Intybus 1184
Jolithus 1356
Jonquilla 536
Jonthlaſpi 977
Ipecacuanha 414
Iria 132
Irio 982
Iſchaemum 164
Isnardi 1267
Iſora 727
Ituba 414
Jujuba 401
Jungia 420
Juſſieua 768
Juſticia 960
Iva 893
Ivira 1034
Ixia 117, 119, 1005
Ixina 278

Kaki 617
Kali 127, 452
Kalmianum 1156
Kanki 612
Karetas 529
Karka 172
Karſtienſis 1147
Kataf 614
Kerere 941
Keule 830
Keura 12
Kleinia 1195
Koelpinia 1183
Koelreutera 517, 1327
Koetjape 681
Kopela 427

Labellum 1455
Lablab 1103
Labruſca 421
Laburnum 1115
Lacryma 149
Lactuca 1391
Ladanum 905
Lagetto 632
Lagopoda 1141 *ſq.*
Lagopus 221, 1008
Lampas 1064
Lampujeng 6
Lancea 1191, 1315, 1293
Lanceola 67
Lanceolaria 1084
Langaus 7
Languas 6
Lantana 496
Lapeironſia 108
Lappa 1184
Lappago 30
Lappula 315, 750
Larix 1072
Laſianthus 1069
Lathyris 763
Latus 617
Laurentia 357
Laureola 631
Lauroceraſus 794
Lavenia 1256
Lebbek 802
Leerſia 1331
Leloja 403
Lencea 110
Lens 1113
Lentago 496
Lentiſcus 457
Leonatis 910
Leonrica 767
Leontopetalon 556
Leontopodium 1278
Leonurus 6, 910
Leptaurea 1263
Leptoſtachyon 921
Leskea 1341
Leucadendron 1154
Leucadendron 221 *ſqq.*
Leucanthemum 1247
Leucoglochin 139
Leucoxylon 651, 942, 963
Leviſanus 224
Leviſticum 481
Libanitis 893
Libanotis 476, 478
Licaria 574
Ligta 564
Liguſtrum 26
Liliago 555
Lilia Agarinthus 552
Liliaſtrum 555
Liliifera 867
Lilium convallium 559
Lima 184, 456
Limonium 511
Linaria 931
Lineatus 1104
Lingua 59, 877, 1276, 1295, 1429, 1477
Linophyllon 428
Linolyris 1203
Linum 289
Linum ſtellatum 331
Linza 1391
Lobelia 361
Locuſta 92
Loeflingiana 192
Lomenia 112
Lonchitis 1309
Lonchophyllum 59
Lonicera 333
Lophantes 898
Lotoidea 1140 *ſq.*
Lotus 400, 812
Lotus 1097 *ſq.*
Lubia 1105
Lucidor 113
Luffa 101
Luma 790
Lunaria 585, 1292
Lupinaſter 1140
Lupulina 1143 *ſq.*
Lupulus 451
Luteola 758
Lychnidea 951
Lychitis 378, 910
Lycium 394
Lycogala 1471
Lycoperdon 1466, 1471
Lycoperdon 1459, 1470 *ſq.*, 1473, 1481
Lycopersicon 384
Lygiſtum 277
Lyſimachia 332

Macqui 751
Macucu 396
Macula 1475
Maeſia 1329
Magaca 121
Mahagoni 680
Mahaleb 795
Majeta 691
Majorana 913
Makal 792
Malus 842
Mammea 1039
Mancinella 1003
Mandragora 381
Manghas 433
Manghas 674
Mangle 747
Mangoſtana 748
Manihot 1027, 1067
Mapania 122
Mappa 1074, 1397
Mariſcus 135
Marmelos 774
Marmetos 749

Marototoni 466
Marrubiastrum 909
Marsilea 1297
Martagon 545
Maru 913
Marum 894
Mattichina 913
Mattichodendron 397
Matrella 169
Matricaria 1244, 1250
Max 1102
Mays 148
Meadia 328
Medica 1152
Medium 341, 350
Medulla panis 1438
Melanium 753
Melanocardium 943
Meleagris 545
Melhania 1028
Meliloba 566
Meliloti 1140
Melissophyllum 916
Melo 100
Melocactus 784
Melongena 384
Melopepo 101
Mercurialis 94
Mercurialis 468
Merjamia 48
Meriana 113
Merianella *ib.*
Metel 379
Metkan 634
Metopium 494
Meum 486
Mezereum 631
Michelianus 129
Micranthus 399
Microcos 818
Milium 160
Millefolium 1254
Mini 787
Mioga 6
Mitra 1450
Mitreola 333
Minium 1326, 1331, 1336, 1348 *sqq.*
Mocanera 767
Moghadd 403
Mokusin 1449
Molle 683
Mollugo 239, 506
Moly 544
Mombin 729
Monetaria 1084
Monnieria 37
Monorchis 57
Monsoniana 626
Moraea 114
Moringa 673
Morio 52
Morsus ranae 654
Morysana 681
Moschatellina 643
Moscheatos 1065
Moschus 1263
Mouriri 678
Mourocenia 497
Mucedo 1484, 1486
Mucilago 1466
Mucor 1425, 1481
Mucor 1357, 1462, 1466 *sqq.*, 1471, 1484, 1487
Mungo 1102
Mungos 333
Murcila 723
Murex 965
Murrubium 1198
Murucuja 501
Musa 423
Muscari 560
Muscipula 716
Mussaenda 433
Mutellina 485
Mutellina 1210
Myagrum 971
Myconis 1248
Myosuros 64
Myrica 1382
Myrobalanos 729
Myrrhina 1018
Myrthiphyllum 363
Myrtillus 620
Mystax 1014
Myxa 392

Nagi 284
Napeta 401
Napellus 838
Napus 988
Nardus 166
Narthecia 554
Nasturtium 980
Neckera 1340
Negando 616
Negundo 963
Nelumbo 812
Neoltia 59
Nepeta 914
Nepetella 900
Nepita 914
Nica 1116
Nidus 1301
Nidus avis 56
Nigellastrum 722
Nigrina 927
Nil 340
Ninsi 483
Niruri 203
Nissolia 1109
Noli tangere 415
Nostar 1447
Noucheli 811
Nuga 673
Nummularia 331
Nummularius 401
Nutrix 1098
Nux Vomica 387

Nyctan-

Nyctanthe 233
Nyctelea 1330

Occarium 1439
Ochrus 1108
Ostoblepharis 1331
Ostospermum 1453
Oculus Cati 1217
Oculus Christi 1240
Ocymum 902
Odontites 923
Oenoplia 401
Olfa 1404
Oleander 435
Ollária 818
Olus atrum 490
Onites 912
Onobrychis 1126, 1133
Ononides 768
Opobalsamum 614
Opopanax 490
Oporina 1242
Opulus 496
Opuntiae 785
Orellana 812
Oreoselinum 476
Orfo'a 803
Orchis 61
Ornithis 51
Ornus 75
Orontium 934
Orthotricha 1335
Orvala 904
Osmunda 1385
Ostruthium 488
Ostrya 754
Otites 713, 1307
Oxyacantha 830
Oxycedrus 1004
Oxycoccus 622

Padus 794
Pagapata 747
Paliurus 400
Pallas 1101
Pallor 1400
Palmetta 1388
Palmetto 569
Palove 1028
Panaces 480
Panacocco 1116
Pandacaki 434
Panicum 166, 196
Papaver 1053
Papaya 701
Papillaria 1377
Papiria 564
Papyrus 133
Pardalianches 1243
Pareira 1006
Parelias 764
Parellus 1364
Parietaria 268
Paronychia 427
Parqui 388
Parretaria 270
Parsonsia 753
Parterium 1135
Parthenium 1249
Passerina 633
Patagua 1026
Patientia 584
Patumo 812
Pavetta 364
Pavia 595
Payco 448
Pecan 755
Pecten 487
Pectis 1245
Pelecinus 1137
Peloria 931
Pemphis 753
Penaea 1082
Pentapetes 1038
Pentstamon 928
Peplis 761
Peplus 763
Pepo 101
Perado 287
Peragua 497
Perebea 96
Pereskia 785
Periclymena 368
Peripca 952
Periploca 439
Persea 650
Persica 793
Persicariae 637 *sq.*
Personata 1184
Pes capreae 244
Pes tigridis 347
Petasites 1225
Petesia 277
Petroselinum 493
Pettigerae 1373
Peziza 1478
Pezita 1431, 1450, 1461
Pharnaceum 105
Phegopteris 1310
Phellos 643
Phelypaea 924
Phlegmaria 1289
Phleum 75
Phlomidis 962
Phoenix 180, 190
Phocnopyrum 841
Pharmium 532
Phu 91
Phylica 410
Phyllanthos 785, 1050
Phyllanthus 499
Phyteuma 356, 758
Pica 1306
Picea 1073
Picris 1178
Pileolus 1458
Pilosella 1176
Pilularia 1383
Pimenta 792
Pinaster 1071

Pinaſtra 226
Pinea 1072
Pinguin 529
Piperella 914
Piperita 258
Piriri 746
Piſcidium 972
Piſtolochia 591
Piſum 1446
Pitajaya 784
Pithyuſa 764
Placenta 1419, 1475
Placomium 1385
Plantago 591
Plectanthrus 917
Pneumonanthe 460
Poa 174
Podagraria 493
Polemonium 345
Pohlia 1335
Polium 896
Pollveria 841
Polygonatum 550
Polygonatum 559
Polypodium 1316, 1321
Pomum 541
Pongelion 726
Ponteria 248
Porophyllum 1196
Portula 578
Portulacaſtrum 834
Poſopoſa 701
Praecox 862
Priapus 1391
Primula 325
Prinus 644
Prionitis 959
Prismatocuſpi 352
Proteus 1463
Protium 614
Pſeud Acacia 1115
Pſeudacorus 115
Pſeudarmeria 510
Pſeudhyſſopus 896
Pſeudoacmella 1193
Pſeudobraſilium 417
Pſeudocaſpicum 383
Pſeudochamaedrys 30
Pſeudochamaepitys 893
Pſeudo-China 583, 1227
Pſeudococcinea 48
Pſeudocyperus 146
Pſeudocytiſus 970
Pſeudodictamnus 909
Pſeudonarciſſus 535
Pſeudoplatanus 616
Pſeudopſidium 787
Pſeudoſphaeria 1480
Pſorae 1365
Pſoralea 1128
Pſyllium 254
Ptarmica 1252
Ptelea 618
Pteranthus 281
Pterococcus 767, 833
Pterota 258
Pulegium 903
Pulicaria 1241
Pulmonariae 1366
Pulſatillae 870
Pumilea 503
Pungam 1086
Pyracantha 840
Pyrethrum 1251

Quamoctil 345
Quapara 724
Quebitea 596
Quila 195
Quiviſia 682

Radula 945, 1234
Ramariae 1444
Rainoatchi 852
Rapa 988
Raphaniſtrum 990
Rapunculus 348
Rarania 485
Ratabulum 1344
Relbaniae 1207 *ſq.*
Remirea 122
Rete 1449
Reticularia 1466
Rhabarbarum 654
Rhagadiolus 1183
Rhapontica 1265 *ſq.*
Rhaponticum 654
Rhodora 694
Rhoeas 809
Ribes 654
Ribeſia 419
Ricinella 1036
Ricinocarpos 1031
Ripogonum 583
Ritero 1280
Robur 644
Rocella 1377
Rocoubea 836
Roſa marina 1381
Roſa ſinenſis 1065
Rotang 570
Rothmannia 434
Rotula 1424
Royoc 371
Ruellia 964
Rugi 195
Ruhamon 248
Ruſſula 1401
Ruta muraria 1304
Ruyſchiana 915

Sabadilla 589
Sabdariſſa 1066
Saelanthus 256
Saeneb 496
Sagarum 1392, 1447
Sagittifolia 812

Sagu 570
Salicaria 752
Salina 1004
Saljunca 91
Salſilla 564
Salſola 422
Salviaſtrum 895
Sambac 23
Sambucina 420
Samia 911
Samyda 700
Sanſeverina 561
Santolina 1253
Saphia 982
Saponaria 460, 642
Sapota 573
Sappan 672
Sarcocolla 249
Sarſaparilla 582
Saſanqua 1069
Saſſafras 651
Sauruus 597
Saxifraga 716
Scabioſa 1265
Scammonea 340
Scandix 473
Scariolo 1172
Sceptrum 222, 934, 1411
Sceptrum Carolinum 926
Schangini 1080
Schinoides 458
Schoenanthus 164
Schoenoides 125, 578
Schoenopraſum 543
Schoenus 75, 122, 132, 139
Sciadaphyllum 509
Scirpus 122
Sclarea 47
Scleriae 137
Scolopendium 1301
Scolymus 223, 1190
Scopa 202
Scoparia 449
Scopolia 380
Scordium 896
Scorodonia 896, 937
Scorodopraſum 542
Scorpiurus 1123
Scorpius 1089
Scurrule 575
Scutellariae 1362
Sebeſtena 392
Secamone 440
Sedum 517
Sejal 802
Selago 1289
Selago 27, 226 *ſq.*, 951
Semen 1481
Seminutum 1458
Semſek 1211
Senecio 1276
Senega 1083
Senejal 803
Senna 669
Sennae 667
Senſitiva 801
Sera 1236
Seraria 221
Seriana 641
Seriphium 1282
Serpentaria 590
Serpyllum 913
Serra 1307, 1385
Serraria 252
Serratula 1202, 1266
Seſban 1121
Sibthorpia 595
Sida 1040
Sideroxyloides 726
Sidoides 503
Silaus 477
Silene 709, 736
Siler 479
Siliqua 431
Siliquaſtrum 666
Simaruba 682
Simira 93
Sipho 591
Siriboa 76
Siſarum 483
Siſyrinchium 115
Smilax 559
Soda 452
Soja 1105
Solandra 468
Solandra 360
Solanum 381
Soldanella 343
Solidago 1204
Sonneratia 747
Sophera 670
Soryhum 173
Sparganophora 1197
Spartium 1094
Spartum 123
Speculum 352
Spelta 200
Sphaerocarpon 1089
Sphaerocephala 1468
Sphaerocarpus 1471
Sphaeroſpermos 399
Sphondilium 480
Spica 900
Spica venti 168
Spicanthus 1293
Spilanthus 1193
Spina Chriſti 400
Squamula 1430
Staehelina 1219
Staphis agria 837
Stelis 576
Stella 1134
Stewartia 1069
Stigma 1476
Stilbum 1484
Stipa 177
Stoebae 1267

Stoebe 1264
Stoechus 900
Stratiotes 565
Strathiopteris 1293
Styraciflua 832
Suber 644
Sunsub 668
Sur 97
Surubea 407
Swartzia 1321
Sycomorus 96
Symphoricarpos 369

Taab 98
Tabacum 380
Tabernaemontana 439
Tabularia 1443
Tachia 247
Taeda 1072
Tagera 668
Tagetes 1277
Tagore 383
Talus 1475
Tamaquarina 438
Tamonea 37, 689
Tanacetum 1207, 1277
Tanarius 1074
Tanacarvillea 60
Taniboa 689
Taonoba 798
Tapia 749
Tapogomea 372
Tapura 93
Taquari 746
Taraxacon 1175
Taraxacon 1174 *sq.*
Tartonraira 631
Tatavia 992
Tatula 329
Tazetta 536
Teff 174
Telankotta 387
Telephium 731
Tenagea 572
Tendo 1384
Terebinthus 457
Termis 1100
Tetragonotheca 1270
Tetrahit 905
Tetralix 627
Tetraphis 1327
Teucrium 29
Thaliana 987
Thamnia 816
Thapsi 939
Thapsus 377
Thelypteris 1311
Theodora 673
Thevetia 433
Thoninia 388
Thora 878
Thunung 6
Thunbergia 433
Thymbra 897
Thymethaea 631
Thymifolia 753
Thyrsine 745
Tibuchina 691
Tiburbu 812
Tiglium 1030
Timmia 1327
Timulu 1082
Tintinnabulum 1423
Tinus 496
Tiraculli 760
Tithymoloides 760
Tobira 407
Tococa 690
Toka 98
Tomex 246, 745
Tonxat 8
Toqueve 393
Tora 668
Tordylium 473
Tortula 1333
Totta 623
Toxicaria arbor 389
Toxicodendrum 494
Trachelium 350
Tradescanti 1233
Tragacantha 1135
Tragium 492
Tragoriganum 913
Tragus 452, 1272
Tremella 1369
Tremella 1459
Trenta 229
Trichia 1470
Trichia 1468
Trichomanes ramosum 1304
Trichomanis 1348
Trichostomum 1332
Tricticae 1468
Trifolium 1121, 1138
Trichosanthes 500
Trionum 1067
Triplium 843
Tripolium 1232
Trixago 923
Troglodytarum 567
Tscampaca 868
Tuba 1451
Tuberaria 824
Tubulifera 1472
Tulipifera 867
Tuna 785
Tupa 355
Turbith 489
Turpethum 341
Typhalaea 1059

Ulmaria 850
Ulva 1446
Umbilicariae 1374
Umbilicus 730
Umbraculum 1419
Umbros 32

Unedo 697
Ungi 790
Unguis Cati 800
Uregu 868
Urinaria 203
Urtica 267
Usnea 1379
Usneae 1378
Uſtilago 1472
Utea 93
Utimata 666
Uva criſpa 420
Uvaria 561
Uva urſi 697
Uvea 1448
Uvedelia 1270
Uvifera 640

Vaalac 918
Vacaria 710
Vaccinium 622
Valdivia 195
Valerandi 358
Vanilla 63
Venetum 1262
Verbaſcum 938
Verbeſina 1250
Verbeſina 1193
Vernix 494
Veſicaria 977
Veſicaria 1142 *ſq.*
Velpertilio 501, 642
Vincetoxicum 445
Viorna 873
Vira 1215
Virgaurea 1237
Vilcaria 736
Visnaga 474
Vitalba 873
Vitaliana 325
Viticella 873
Vitis idaea 621
Vochy 20
Volucris 57
Vourcapoa 1086
Vuapa 93
Vulneraria 1099
Vulvaria 449

Wampi 675
Watſonius 111
Webera 1330
Wedelia 1270
Weiſſia 1334
Winterania 749
Wolgericus 1114

Xanthocarpus 841
Xanthoxylum 283
Xeranthenoides 1191
Xiphium 114
Xylopyrus 401
Xyloſteum 369

Yervemora 455

Zabucajo 819
Zanoniae 121
Zatachendi 917
Zeocrithon 199
Zerumbet 5
Zeugiter 148
Zingiber 5
Zizyphus 400
Zuzygium 792
Zygia 913

FINIS.

RUDOLPHIPOLI,

LITTERIS BERGMANNIANIS.