

N 47
5096

192.5

Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,
AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

The gift of the *Naturforschende
Gesellschaft
Braubündens.*

No. 4772.
October 18, 1890 - December 11, 1891.

E
189

OCT 18 1890

4772.


Jahres-Bericht
der
Naturforschenden Gesellschaft
Graubündens.

Neue Folge. XXXIII. Jahrgang.

Beilage:

Killias, Verzeichniss der Käfer Graubündens Bogen 1 bis 3.

Vereinsjahr 1888 '89.



CHUR.

In Commission der Hitz'schen Buchhandlung.

1890.

Jahresbericht

der

Naturforschenden Gesellschaft

Graubünden's.

Neue Folge.

XXXIII. Jahrgang.

Vereinsjahr 1888-89.

CHUR.

In Commission bei der **Hitz'schen Buchhandlung.**

1890.

Druck von Gebrüder Casanova,

I.

Geschäftlicher Theil.

1.

Mitglieder-Verzeichniss.

(Januar 1890.)

Ordentliche Mitglieder.

a) In Chur.

Herr Aebli, Diet., Lehrer.	Herr Casanova, M., Passcomm.
= Albricci, Ingén.	= Casanova, J., Typogr.
= Bärtsch, Christian.	= Caviezel, Hartm., Major.
= Bazzighèr, L., Hauptm.	= Conrad, P., Seminaridir.
= Bazzighèr, Giov., Lieut.	= Conzetti, Ul., Hptm.
= Bener, Pet., Rathsherr.	= Corradini, J., Ingenieur.
= Bener, Paul, Hauptm.	= Davatz, Lehrer.
= Bosshard, E., Dr., Prof.	= Eblin, B., Rathsh.
= Branger, J., Kreispost- direktor.	= Fasold, Gärtner.
= Bridler, Prof.	= Florin, A., Prof.
= Brügger, Chr., Dr. Prof.	= Frey, J., Dr., Prof.
= Brügger, L., Dr.	= Gasser, J. J., Prof.
= Brüschi, Stadtschr.	= Gelzer, J. C., Stadtpräs.
= Bühler, Chr., Prof.	= Gilli, Bauinsp.
= Caffisch, L., Staatsanw.	= Hemmi, J. M., Hauptm.
= Capeder, M., R.-Rath.	= Herold, L., Dekan.
= Capeller, W., Bürgerm.	= Heuss, R., Apotheker.
	= Hitz, L., Buchhändler.

- | | |
|---|---|
| Herr Hörrmann, Dr., Prof. | Herr Planta, R. v., Oberstl. |
| = Hold, H., Oberst. | = Planta, Dr., P. C. v.,
Ständerath. |
| = Jäger, Nic., Sec.-Lehr. | = Plattner, Pl., R.-Rath. |
| = Jenatsch, U. v., Oberst. | = Poult, C., Prof. |
| = Isepponi, E., Kantons-
thierarzt. | = Risch, M., Oberstlt. |
| = Kaiser, J., Dr. | = Salis, H. v., Pulververw. |
| = Kellenberger, C., Dr. | = Salis, Fr. v., Ober-Ingén. |
| = Killias, Ed., Dr. | = Salis, Rob. v., Privatier. |
| = Killias, Wilh., Ingén. | = Salis, A. v., Bürgerm. |
| = Klaingutti, G., Privat. | = Salis, P. v., Telegraph.-
Inspector. |
| = Köhl, Carl, Organist. | = Sandri, Kaufmann. |
| = Köhl, Dr., Emil. | = Schlegel, A., Postadj. |
| = Lanicca, Stadtförster. | = Schlegel, G., Registrat. |
| = Leupin, J., Sec.-Lehr. | = Schönecker, J., Apoth. |
| = Lohr, J., Apotheker. | = Secchi, V., Bahnhofinsp. |
| = Lorenz, P., Dr. | = Sprecher, P. v., Rathsh. |
| = Loretz, J. Richter. | = Sprecher, A. v. Bürgerm. |
| = Mandel, L. Flaschnerm. | = Tarnuzzer, Chr., Dr., Red. |
| = Manni, Chr., Forstinsp. | = Tischhauser, J., Kaufm. |
| = Marchion, G., Kanzl.-Dir. | = Traber, Flaschnermstr. |
| = Mathis, Rentier. | = Trinkkeller, H., Coiffeur. |
| = Merz, F., Dr. | = Truog, M., Prof. |
| = Mettier, Peter, Lehrer. | = Versell, M., Mechaniker. |
| = Michel, J., Bankkass. | = Versell, A., Aidemajor. |
| = Montigel, Zahnarzt. | = Wild, Dr. |
| = Muoth, Jac., Professor. | = Willi, P., Agent. |
| = Nett, B., Dr., Reg.-R. | = Wunderli, J., Fabrikant. |
| = Planta-Reichenau, A. v.,
Dr. phil. | = Zuan, R., Rentier. |

Herr Zuan, U., Kaufm.		Herr Zink, A., Förster.
= Zuan, A., Kaufm.		(94.)

b) Im Kanton und Auswärts.

- Herr Am Stein, G., Dr., Zizers.
- = Badrutt, P., Hôtelier, St. Moritz.
 - = Bättschi, Joos, Dr. jur., Davos-Platz.
 - = Bernhard, A., Dr., Scansf.
 - = Bernhard, S., Jva-Fabrikant, Samaden.
 - = Berry, P., Dr., St. Moritz.
 - = Conrad Baldenstein, Fr., Reg.-Rath, Sils-Doml.
 - = Conradin, Fr., Kaufmann, Zürich.
 - = Courtin, A., Dr., Sils-Engadin.
 - = Darms, J. M., Pfarrer, Ilanz.
 - = Dormann, Dr. med., Mayenfeld.
 - = Egger, Dr. med., Arosa.
 - = Ganzoni, A., Dr., jur., Perosa (Piemont).
 - = Garbald, A., Zolleinnehmer, Castasegna.
 - = Hauri, J., Pfarrer, Davos-Dörfli.
 - = Heckel, P., Davos-Platz.
 - = Henni, J. P., Reg.-Statthalter, Obersaxen.
 - = Held, L., Geometer, Bern.
 - = Imhof, Ed., Reallehrer, Schiers.
 - = Kind, Paul, Pfarrer in Davos-Platz.
 - = Lechuer, E., Dr., Pfarrer, Thusis.
 - = Loretz, Chr., Polizeikommissär, St. Vittore.
 - = Maffei, G., Privatier, Castasegna.
 - = Marchioli, D., Dr., Bezirksarzt, Poschiavo.
 - = Mohr, A., Pfarrer, Schleins.
 - = Nagel, H., Davos-Dörfli.

- Herr Pernisch, J., Dr., Scansf.
- = Peters, E. O., Dr., Davos-Platz.
 - = Ragaz, L., Andeer.
 - = Richter, H., Buchhändler, Davos-Platz.
 - = Rzewuski, Alex., Davos-Platz.
 - = Saluz, P., Ingénieur, Bern.
 - = Saraz, J., Präsident, Pontresina.
 - = Spengler, Al., Dr., Davos-Platz.
 - = Spengler, Luc., Dr., Davos-Platz.
 - = Spengler, Carl, Dr., Davos-Platz.
 - = Simonett, Chr., Ingenieur, Bellinzona.
 - = Soldani, Reg.-Rath, Borgonovo.
 - = Sprecher v., Theophil, Maienfeld.
 - = Steffen, Apotheker, Bad Homburg v. d. H.
 - = Stoffel, A., Privatier, Fürstenau.
 - = Tramèr, Ulr., Bezirksingén., Zerneu.
 - = Ulrich, Aug., Lehrer, Schiers.
 - = Unger, Fr., Dr., Davos.
 - = Veraguth, Franz, Dr., Thusis.
 - = Veraguth, C., Med. Dr., St. Moritz.
 - = Volland, Med. Dr., Davos-Dörffi.
 - = Walser, Ed., Militärdirector, Seewis.
 - = Walz, J., Med. Dr., Davos-Platz.
 - = Wirz, Lehrer der Naturgeschichte, Schwanden.
 - = Witzenmann, H., Privatier, Pforzheim.
 - = Ziegler, Conr., Pfarrer, Davos-Platz. (52.)

Ehrenmitglieder.

- Herr Dr. Arnold Cloëtta, Prof., Zürich.
- = Dr. Victor Fatio, Genf.

Herr John Hitz, Washington.

- = Dr. A. Kerner, Prof., Wien.
- = Dr. Karl Müller, Naturforscher, Halle.
- = Dr. A. Pichler, Prof., Innsbruck.
- = Dr. Ludwig Rüttimeyer, Prof., Basel.
- = Dr. Gustav Stierlin, Bezirksarzt, Schaffhausen.
- = Dr. John Tyndall, Prof., London.
- = Dr. Bernhard Wartmann, Rector, St. Gallen.
- = Prof. Dr. Gümbel, Oberberggrath, München. (11.)

Correspondirende Mitglieder.

Herr Dr. Paul Ascherson, Prof. d. Botanik, Berlin.

- = Emil Bavier, Ingenieur, Rom.
- = Simon Bavier, Schweizerischer Minister, Rom.
- = Billwiller, R., Direktor der Meteorolog. Centralstation
Zürich.
- = Bruhin, Thom. A., Pfarrer, La Chaux-de-Fonds.
- = C. Bühler, Buenos Ayres.
- = Arthur Brun, Oberstltn., Bologna.
- = Dr. Giovanni Canestrini, Prof., Padua.
- = Caviezel, C., Dr., Schweiz. Consul, Riga.
- = Christ, H., Dr. jur., Basel.
- = Coaz, J., Eidg. Forstinspector, Bern.
- = Dr. Carl Cramer, Prof., Zürich.
- = Dr. Crepin, Dir. d. Botan. Gartens, Brüssel.
- = Dr. K. W. v. Dalla Torre, k. k. Professor, Innsbruck.
- = Prof. Dr. Alph. Favre, Genf.
- = E. Frey-Gessner, Conservator des Entomologischen
Museums, Genf.

- Herr Heim, Alb., Professor der Geologie, Zürich.
- = Dr. Othm. Em. Imhof, Docent, Zürich.
- = Lucas v. Heyden, k. preuss. Major, Dr. Phil. hon. e.,
Bockenheim bei Frankfurt a. M.
- = G. Hilzinger, Präparator, Buenos Ayres.
- = Chr. Holst, Secretär der Universität, Christiania.
- = Fr. Jaennike, Oberrevisor an der Ludwigsbahn in Mainz.
- = Friedrich Jasche, Bergmeister, Wernigerode.
- = Dr. Jaeggi, Conservator am Bot. Museum, Zürich.
- = Dr. A. Le Jolis, Secretair der Academie, Cherbourg.
- = Prof. Dr. Kanitz, Director des K. Bot. Gartens,
Klausenburg.
- = Dr. Kriechbaumer, Prof., München.
- = Ph. A. Largiadèr, Schulinspector, Basel.
- = Dr. Paul Magnus, Prof. der Botanik, Berlin.
- = Prof. Dr. Rich. Meyer, Braunschweig.
- = Dr. Gabriel de Mortillet, Geolog, Paris.
- = Müller, Fr., Dr. Med., Basel.
- = Dr. Carl Ochsenius, Geolog, Marburg.
- = G. Olgiati, Bundesrichter, Lausanne.
- = Prof. Omboni, Geolog, Padua.
- = Dr. Wilhelm Pfeffer, Professor der Bot., Leipzig.
- = Dr. Senoner, Bibliothekar, Wien.
- = Adolf v. Salis, Eidg. Ober-Bauinspector, Bern.
- = Dr. C. Schröter, Professor, Zürich.
- = Dr. J. G. Stebler, Prof. der Landwirthsch., Zürich.
- = C. W. Stein, Apotheker, St. Gallen.
- = Med. Dr. E. Stitzenberger, Konstanz.
- = Dr. R. A. Wolf, Prof., Zürich.
- = J. Wullschlegl, Rector, Lenzburg. (44.)

Mitgliederzahl.

Ordentliche Mitglieder (a und b) . . .	146
Ehrenmitglieder	11
Correspondirende Mitglieder	44

Gesammtzahl 201 Mitglieder.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft im abgelaufenen Vereinsjahre die nachstehenden Mitglieder:

- Herr J. Badrutt, Hotelier in St. Moritz, ordentl. Mitglied seit 1882.
- „ Dr. Med. H. Boner in Davos-Platz, ordentl. Mitglied seit 1867.
- „ Stadtpräsident J. Gamser in Chur, ordentl. Mitglied seit 1869.
- „ Reg.-Rath P. Janett in Chur, ordentl. Mitglied seit 1866.
- „ Med. Dr. M. Ludwig in Pontresina, ordentl. Mitglied seit 1879.
- „ Prof. J. G. Stocker in Zürich, correspondirendes Mitglied seit 1856.
- „ Nat.-Rath A. R. v. Planta, ordentliches Mitglied seit 1859.
- „ Cavaliere L. Torelli in Rom, zum Ehrenmitglied ernannt 1872.
- „ Oberst Rieter von Winterthur, Ehrenmitgl. seit 1874.
- = Prof. Dr. H. Frey, in Zürich, corresp Mitgl. seit 1875.

In Folge von Wegzug ausgetreten sind die HH.: Seminar-director Th. Wiget und Literat Fr. Machmer.



2.

Bericht

über die

Thätigkeit der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens
im Gesellschaftsjahre 1888/89.

(711. — 720. Sitzung.)

I. Sitzung. 28. November 1888. Vorstandswahlen

Präsident: Dr. Ed. Killias.
Vicepräsident: Dr. J. Kaiser.
Actuar: Dr. P. Lorenz.
Cassier: Rathsherr Peter Bener.
Bibliothekar: R. Zuan-Sand.
Assessoren: Prof. Dr. Chr. Brügger.
Obering. Fr. v. Salis.

Dr. Killias referirte über die neueste Literatur zur Bündnerischen Landeskunde (S. den vorjährl. Bericht).

II. Sitzung. 12. December.

Prof. *J. Gasser*: Die unterirdischen Gewässer unserer Epoche.

III. Sitzung. 9. Januar 1889.

Dr. Killias: Mittheilungen über Serbien.

IV. Sitzung. 23. Januar.

Dr. Killias: Ueber das Steppenhuhn (*Syrhaptus paradoxus*). Ueber Uebertragbarkeit des Tuberkelbacillus durch Stubenfliegen.

Prof. *Dr. Bosshardt*: Demonstration eines sehr einfachen und instructiven Telephonapparates.

V. Sitzung. 6. Februar.

Prof. *J. Gasser*: Die unterirdischen Gewässer früherer Epochen.

Prof. *Dr. Bosshardt*: Die Versuche von V. Meyer über Chlorstickstoff.

VI. Sitzung. 6. März.

Prof. *Dr. Bosshardt*: Ueber Lufterlektricität. Die Stickstoffversorgung der Pflanze nach Schulze in Zürich.

VII. Sitzung. 20. März.

Dr. C. Enderlin: Eine Reise nach Argentinien (mit Demonstrationen).

VIII. Sitzung. 22. Mai.

Dr. E. Killias: Die Naturwissenschaftlichen Verhältnisse des Poschiavinothales.

IX. Sitzung. 22. Mai.

Dr. Merz: Ueb. lichtentwickelnde Spaltpilze und deren Beziehungen zum Meeresleuchten.

Schluss des Vereinsjahres bei fröhlichem Zusammensitzen unter der hiebei üblich gewordenen Verbindung des feurigen Gottes Bacchus mit der lieblichen Waldjungfrau Asperula.



3.

Verzeichniss

der

vom 1. Jan. bis 31. Dec. eingeg. Schriftwerke.

Das nachstehende Verzeichniss wolle zugleich von Seite der geehrten
Zusender als **Empfangsbescheinigung** betrachtet werden.

Annaberg. VIII. Bericht des Annaberg-Buchholzer Vereins für Naturkunde. 1889.

Autun. Société d'histoire naturelle. Premier bulletin: 1888. Second: 1889.

Berlin. Verhandlungen des Botan. Vereins der Provinz Brandenburg. XXX. 1888.

Jahrbuch der k. Preuss. Geologischen Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin für das Jahr 1887 (1888).

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. XL.
3. 4. XLI. 1. 2.

Ergebnisse der Meteorolog. Beobachtungen 1887 vom königl. Preuss. Meteorolog. Institut.

Dieselben pro 1889.

Naturae Novitates 1888 (Schluss), 1889 No. 1 bis 23 (von der Friedländer'schen Verlagsbuchhandlung).

Bern. Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft. No. 1195—1214.

Der Lawinenschaden im Schweizer. Hochgebirge 1887 auf 1888 von *J. Coaz*, schweiz. Oberforstinspector. 1889. (Gesch. d. Verf.)

Bistritz. XIV. Jahresber. der Gewerbeschule. 1887/88.

Bonn. Verhandlungen des naturhist. Vereins der preussischen Rheinlande. 45. V. Folg. V. Jahrg. 2. 46. I.

Boston. Proceedings of the Boston Society of Natural History. XXIII. 1888.

Bremen. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins. X. 3. 1889.

Breslau. 66. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländ. Cultur 1889.

Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. XXIII. 1889.

Bruxelles. Bulletin de la Société Belge de Microscopie XV. 1—7.

Annales. Tome XII. XIII. I. 1889.

Von der Académie Royale: Annuaires 1888 et 1889. Bulletins: 1887. 1888. Tomes XIII—XVI.

Brünn. Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, Natur- und Landeskunde. 68. Jahrg. 1888.

Verhandlungen des Naturforsch. Vereins. XXVI. 1887 (1888).

Buenos-Aires. Boletín de la Academia nacional de ciencias en Córdoba. XI. 3.

Cambridge. Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy. XVI. 3—5. XVII. 3—5, XVIII.

Chur. Arosa, ein Führer für Fremde. 1889.

Der Thierfreund. No. 1—5 (Aarau). Gesch. d. Thier-
schutzvereines.

Dr. E. Heuss. Ueber das Vorkommen von Milchsäure
im menschlichen Harn. Sep.-Abdr. Gesch. d. Verf.

Danzig. Schriften der Naturforsch. Gesellschaft N. F.
VII. 2. 1889.

Darmstadt. Notizblatt des Ver. für Erdkunde. IV. F. 9.
1888.

Davos-Dörfli. Die Behandlung der Lungenschwindsucht
im Hochgebirge von *Dr. A. Volland* (Leipzig 1889). Gesch.
des Verf.

Dorpat. Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und Kur-
lands. IX. 5. 1889.

Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft. VIII. 3.
1888.

Dresden. Sitzungsberichte und Abhandlungen der Natur-
wissensch. Gesellschaft „Isis“. 1888. II.

Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
1888/89.

Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissensch.
Gesellschaft „Isis“ 1889. I.

Emden. 72. u. 73. Jahresbericht der Naturforschenden
Gesellschaft 1886/88.

Erlangen. Sitzungsberichte der Physikal. medicinischen
Societät. 1888.

Florenz. Memorie per servire alle descrizione della carta
geologica d'Italia. Voll. III. parte II,

Frankfurt a. d. O. Monatliche Mittheilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissensch. VI. 8—12. VII. 1—8.

Societatum Literae. 1888 II. 11, 12. 1889 III. 1—10.

Freiburg i. Br. Berichte der Naturf. Gesellsch. III. IV.

St. Gallen. Bericht über die Thätigkeit der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft pro 1886/87.

Genf. Mémoires de l'Institut Genèveois. Tome XVII. 86/89.

Bulletin de l'Institut National Genevois. XXIX. 1889.

Von Hrn. *Dr. Dorta*: Etude critique et experimentelle sur la température cérébrale à la suite d'irritations sensibles et sensorielles. 1889.

Giessen. 26. Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 1889.

Graz. Mittheilungen des Naturwissenschaftl. Vereins für Steiermark. 25. (1888.)

Mittheilungen des Vereines der Aerzte. XXV. 1888.

Greifswald. Mittheilung. des Naturwissenschaftl. Vereins für Neu-Vorpommern und Rügen. XX. 1888.

III. Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft.

Halle a. S. Mittheil. des Vereins für Erdkunde. 1889.

Zeitschr. für Naturwissensch. IV. Fg. VII. VIII. 1. 2.

Hanau. Bericht der Wetterauischen Gesellsch. für Naturkunde pro 1887—89. 1889.

Heidelberg. Verhandlungen des Naturhist. Medicin Vereins. N. F. IV. 2, 3. 1889.

Jena. Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft für Thüringen. III. 4. IV, V, VI, VII. 1. 2.

Igló. Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereins. XVI. 1889.

Kassel. XXXIV. und XXXV. Bericht des Vereins für Naturkunde. 1889.

Kharkow. Travaux de la Section médicale de la Société des Sciences expérimentales. 1889. (In russischer Sprache.)

Kiel. Schriften des Naturwissenschaftl. Vereins für Schleswig-Holstein. VII. 2. VIII. 1. 1889.

Kiew. Mémoires de la Société des Naturalistes X. 1.

Klagenfurt. Jahrbuch des naturhistor. Landes-Museums von Kärnten. 18. Heft. 1886. Diagramme der magnet. und meteorolog. Beobachtungen von *F. Seeland*. 1885 und 86.

Klausenburg. Magyar Növénytani Lapok. XII. 1888. (Ungar. botan. Zeitschrift, redig. von *Dr. Aug. Kanitz*.)

(Kolozsvárt.) Orvos-természet. Tudományi Ertesítő. 1888. XIII. Evfolyam. XIV. I. Orvosi Szak. I. Termesztett Szak I, II. 1889.

Königsberg i. Pr. Schriften der Physikal.-Oekonomischen Gesellschaft. XXIX. 1888.

Krakau. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften. 1889.

Lausanne. Eclogae Geologicae Helvetiae. 1888. III. 1889. IV.

Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles. 3. S. XXIV. No. 99. 1880.

Leipa. Mittheil. des Nordböhmischen Excursions-Clubs. XII. 1—4. 1889.

Leipzig. Berichte über die Verhandlungen der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Mathem. phys. Classe. 1888. I. II. 1889. I.

Linz. XVIII. Jahresbericht des Vereines für Naturkunde in Oesterreich ob der Enns. 1888.

St. Louis. Transactions of the Academy of Science. Vol. V.

Lyon. Annales de la Société d'Agriculture, histoire naturelle et arts utiles. V. Série IX. (1887.) X. (1888.) VI. Sér. I. 1889.

Annals de la Société Linnéenne. XXXII. 1886. XXXIII. 1887. XXXIV. 1888.

Mailand. Atti della Società Italiana di scienze naturali. Vol. XXXI.

Marburg. Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften. XII. 3. Sitzungsber. 1888.

Von *Dr. C. Oehsenius* als Gesch. d. Verf. (Sep.-Abdr.):

Ueber Salzlager, Mineralquellen, Salzseen etc.

Wirkung der Brandung an der chilenischen Küste.

Rechnungstrennung von Kieserit und Reichardtite.

Fabiana imbricata.

Boracit von Douglasshall.

Ueber Maqui.

Mannheim. 52.—55. Jahresb. des Vereins für Naturkunde.

Minneapolis. (Minn. U. S. A.) Durch Hrn. *H. Winchell* als Verfasser: The Geological Natural History Survey of Minnesota XVI. Annual report for the year 1887.

Moskau. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes. 1888. 4. 1889. 1. 2.

Meteorolog. Beobachtungen bei Moskau 1888. Zweite Hälfte.

Nouveaux Mémoires. XV. 6. *J. Setschenow*: Ueber die Constitution der Salzlösungen. 1889.

München. Sitzungsberichte der Mathem.-physikal. Classe der k. b. Academie der Wissenschaften, 1888. III. 1889. I.

Oberbayr. Archiv für vaterländische Geschichte. 45. B. 1888.

Bericht bei der Feier des 50jähr. Bestehens des hist. Vereins.

Nancy. Bulletin des séances de la Société des sciences. I. 1—3. 1889.

Bulletin derselben. 21. Jahrg. 1888.

Neuchâtel. Bulletin de la Société des Sciences naturelles. Tome XVI. 1888.

New-York. Food versus bacilli in consumption, an open letter from *E. Cutter M. D.* 1888.

Nürnberg. Jahresbericht der Naturhist. Gesellsch. 1888. Nebst Abhandlungen. VIII.

Odessa. Mémoires de la Société des Naturalistes de la Nouvelle Russie. 1889. (In russischer Sprache.)

Osnabrück. VII. Jahresbericht des Naturwissenschaftl. Vereins. 1889.

Padova. Atti della Società Veneto-Trentina di scienze naturali. X. 2.

Bulletino IV. 3. 1889.

Paris. Feuille des jeunes Naturalistes. XX. No. 220 bis 230. 1889.

Dr. Saint-Lager: Vicissitudes onomastiques de la Globulaire vulgaire. 1889.

Philadelphia. Proceedings of the Academy of Natural Sciences. 1888. II. 1889. I.

Pisa. Alla Memoria del Prof. Giuseppe Meneghini. 1889. Atti della Società Toscana di Scienze Naturali. Processi verbali. Vol. VI. 1889.

Pontresina. Von Herrn *Dr. O. Bernhard*: Beitrag zur Lehre von der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. Dissertation. Samaden 1888.

Prag. Von der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften: Sitzungsberichte 1885—1889.

Abhandlungen der mathemat.-naturwissensch. Classe. Folge VII. 1. 2.

Jahresberichte 1885—1888.

„Lotos“, Jahrbuch für Naturwissensch. N. F. X. 1890.

Jahresber. der Lese- und Redehalle der Deutschen Studenten für das Jahr 1888.

Raleigh N. C. Journal of the Elisha Mitchell scientific society. V. 2. 1888. 1889. I.

Reichenberg. Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde. XIX. 1888.

Festschrift zum 40jähr. Bestand des Vereins. XX. 1888.

Riga. Korrespondenzbl. des Naturforscher-Ver. XXXI. 1888.

Rom. Bollettino delle Opere moderne straniere acquistate dalle Biblioteche pubbliche governative del Regno d'Italia. III. 5. 6. IV. 1. 2. 3.

Atti della Reala Accademia dei Lincei. Rendiconti. IV. 6—12. V. 1—12.

Le Diatomee fossili della Via Aurelia e del Gianicolo Note del Dott. *M. Lanzi*. 1889. (Zwei Hefte.)

Bollettino del R. Comitato Geologico d'Italia. XIX. 1888.

Rovereto. Vom Museo civico: Note biologiche sugli Apidi *Chalicodoma muraria* etc. per il *Dr. R. Cobetti*. 1888.

Lettere inedite di Carlo Linneo a Giovanni Antonio Scopoli. 1889.

Santiago (Chile). Verhandlungen des deutschen wissenschaftlichen Vereins. 6. 1888.

Schaffhausen. Mittheilungen der Schweizer. Entomolog. Gesellschaft. VIII. 3. (Geschenk von Dr. Stierlin.)

Solothurn. Verhandlungen der Schweizer. Naturforsch. Gesellschaft vom 6.—8. August 1888 (71. Versammlung).

Stuttgart. Jahreshefte des Vereins für vaterländ. Naturkunde. 45. Jahrg. (1889).

Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. XI. 1888. XII. 1. 1889.

Triest. Bollettino della Società Adriatica di Scienze naturali. XI.

Tromsö. Tromsö Museums Aarsberetning for 1888.

Aarshefter XII. 1889.

Udine. *G. Marinelli*: Al Consiglio (Venetianische Alpen). Vortrag. 1883.

Ulm. Jahreshefte des Vereins für Mathematik und Naturwissenschaften. I. 1888.

„Münster Blätter“, herausg. von A. Beyer u. F. Pressel.
VI. Heft.

Venedig. „Notarisia“ Commentarium phycologicum. IV.
13—15. 1889.

Index generalis annorum I—III.

Washington. Annual Report of the Smithsonian Institution. 1886. 1.

Wernigerode. Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes. III. B. 1888.

Wien. Jahrbücher der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. XXXII. 1887.

Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft. Jahrg. 1888. 38. Bd. 3. 4. 39. 1. 2.

Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft. 1888. XXXI. Band.

Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1888. 15—18. 1889. 1—12.

Annalen des k. k. Naturhistor. Hofmuseums. III. 1. 3. 4. IV. 2. 3.

Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt. XXXVIII. 4. XXXIX. 1. 2.

Mittheilungen der Section für Naturkunde des Oesterr. Touristenclubs. I. No. 1—11. 1889.

Wiesbaden. Jahrbücher des Nassauischen Vereines für Naturkunde. Jahrg. 41. 1888. 42. 1889.

Würzburg. Sitzungsberichte der Physikal.-Medicinischen Gesellschaft. Jahrg. 1888.

Zürich. Das Schweizerische Dreiecknetz. IV. (Die Anschlussnetze der Grundlinien.) 1889.

Von Herrn *Fr. Rühl* als Redactor: „Societas Entomologica.“ IV. Jahrg. 1889. No. 1—20.

Astronomische Mittheilungen. LXXII. LXXIII. Von *Dr. P. Wolf*. Gesch. d. Verf.

Zwickau. Jahresber. des Vereins für Naturkunde, 1887. Ders. 1888.



II.

Wissenschaftliche Mittheilungen.



I.

Beiträge

zur

Mollusken - Fauna Graubünden's,

wie solche vom Herbst 1884 bis Herbst 1889
zur Kenntniss gelangt sind. *)

~~~~~  
Von Dr. G. Am Stein in Zizers.

#### A. Neue Arten, Varianten, Mutationen etc.

##### I. *Limax cinereo-niger* Wolf.

*var.* . . .

Herr Davaz fand das Stück in der Thalsohle von Puschlav bei circ. 1000 m. Höhe ü. M., also wenig abwärts vom Flecken Puschlav. 1888.<sup>1)</sup>

\*) Die Sammler sind:

- Herr Dr. Ed. Killias in Chur = Klls.  
„ Fl. Davaz, Lehrer in Chur = Dvz.  
„ Dr. Imhof in Zürich = Ihf.  
„ Dr. Graeser in Hamburg = Grs.  
„ Rev. S. Spencer Pearce, vid. Journal of Conchol.  
„ Rev. M. Christi, Sammelber. etc. im Jour. of Conch.  
April 1883.  
„ Dr. H. Loretz (Mitth. v. Dr. Böttger im Nachr. Blatt  
der Malac. Zool. Ges. Frankfurt a. M. 1880.)  
„ Roffiain, Belgien.  
„ Am Stein Dr. in Zizers.

<sup>1)</sup> Die unterschiedlichen Merkmale, soweit sie an vorliegendem Alcoholpraeparat bemerkbar, (der ausgeprägten Runzelung nach zu schliessen, ist das Thier ausgewachsen), sind folgende:

## 2. *Limax cinereus* Listr.

*var. albus.*

Zwei Exemplare, Alcoholpraeparate, die mir von H. Dr. Killias freundlichst zur Ansicht mitgetheilt worden und aus 2 verschiedenen Kellern der Stadt Chur stammen, sind dem Ansehen nach ausgewachsen und oberflächlich betrachtet schön weiss von Farbe mit tiefschwarzen Flecken und Streifen auf Schild und Körper.<sup>1)</sup>

Die Sculptur des Schildes ist unregelmässig fein runzlig, ohne concentrische Wellenlinien zu bilden.

Auf der rechten Seite nach vorn befindet sich am Schildrand ein kleiner, bogiger Ausschnitt, so dass bei zurückgezogenem Kopf der rechte Augenträger trefflich hineinpasst.

Dieser Ausschnitt ist keineswegs durch Verwundung entstanden, ob er jedoch anormal oder dieser Var. eigenthümlich zukommt, ist mir unbekannt, beschrieben habe ihn bisher nirgends gefunden.

Der Kiel nimmt den hintern Drittheil des Körpers ein und ist hell-bräunlich-gelb gefärbt.

Die Färbung von Schild und Körper ist ein graubraun, durch das eine röthliche Grundfarbe durchschimmert. Nach H. Davaz war das Thier beim Einfangen schön hellroth, ziegelroth, gefärbt.

Auf Schild und Körper sind weder Flecken noch Streifen bemerkbar. Die Sohle ist normal zweifarbig.

Das vorliegende Exemplar ist jedenfalls eine norditalische Var. Ob sie einen Namen hat u. welchen ist mir einstweilen unbekannt. Nap. Pini in seinen „Molluschi nel territorio di Esino“ führt eine mt. des *L. cinereo-niger* als „rossa-unicolore, senza macchie“ unter dem Namen *L. erythrus* Brgt. an. Ob der unserige hierher zu rechnen, ist mir noch ungewiss.

<sup>1)</sup> Es erscheint mir von Werth, die genauere Beschreibung obiger Stücke zu geben, da ich bis jetzt wenigstens eine derartige Var. nicht beschrieben gefunden.

Beide Thiere sind in ihrer Form normal gestaltet, halb stielrund, unten platt, nach vorn verschmälert, nach hinten in eine stumpfe Spitze ausgezogen. — Fühler und Augenträger sind jetzt gänzlich, Kopf und Nacken gegen den Schild bedeutend eingezogen.

No. 1. Das ganze Thier ist jetzt 78 mm. lang und 16 mm. hoch an der dicksten Stelle. — Kopf und Nacken ragen noch 2 mm. vor

den Schildrand. Der Schild vorn gerundet, hinten in stumpfe Spitze verschmälert und nach vorn, wahrscheinlich durch Druck, etwas herabgekrümmt, verkürzt, ist 23 mm. lang, das Athemloch in der rechten Hinterhälfte des Schildrandes oval. — Die Oberfläche erscheint fein gekörnt, Körner oben etwas abgeflacht und nicht in concentrische Reihen geordnet.

Der Hinterleib von der Schildspitze nach hinten ist 53 mm. lang, längs gerunzelt, die Runzeln fein in längliche Vierecke (Parallelogramme) quer getheilt, diejenigen auf dem Rücken mitunter wie schraubenartig gedreht, nach den Seiten hin kürzer werdend bis sie mehr wie körnerartige Reihen erscheinen.

Der Kamm ist 21 mm. lang, nicht stark ausgebildet.

Der Fussrand, 1 mm. hoch, ist in 2 Längsstreifen getheilt, von denen der obere mit schwärzlichen, rundlichen Körnern besetzt, der untere dagegen mit der Sohle gleichfarbig erscheint.

Färbung: Kopf und Nacken bis unter den Schild sind gelblich-röthlich; der Schild weiss-hellbräunlich mit vielen ungleich gestalteten, tief-schwarzen Flecken; Hinterleib ebenfalls mit weiss-r Grundfarbe und etwas stärker bräunlichem, zugleich ins röthliche spielendem Schimmer, zu Seiten des Rückenscheitels eine fortlaufende Reihe strichartiger Flecken, dieser parallel, durch helle Zone geschieden, ein ziemlich breites, nicht unterbrochenes Band und von diesem zum Fussrand mehr unregelmässig gelagerte, kleinere und grössere, verschieden gestaltete Flecken; alle diese Zeichnungen tief-schwarz.

Die Sohle dreifeldrig, weiss-bräunlich, Seitenfelder quer gerieft, Mittelfeld glatt.

No. 2. Das ganze Thier ist jetzt 63,5 mm. lang und 15 mm. hoch, an der dicksten Stelle. — Kopf und Nacken sind 3,5 mm. vom Schildrand hervorragend. — Der Schild von gewöhnlicher Form ist 23 mm. lang; Oberfläche sehr fein und platt gekörnt, ohne Reihenanordnung.

Der Hinterleib von der Schildspitze bis zu Ende ist 37 mm. lang, fein längs-gerunzelt, die Runzeln auf dem Rücken stumpf-quadratisch nach den Seiten hin rundlich, körnerreihenartig, quergetheilt.

Der Kamm, 15 mm. lang, ist niedrig.

Der Fussrand durch eine feine Längsline in 2 Streifen getheilt, deren oberer mit schwarzen Querstrichelchen geziert, der untere der Sohle gleichfarbig erscheint.

Färbung weiss-graulich mit einem Stich ins gelbliche. Ueber Nacken und Kopf ein vom Schildrand an nach vorn breiter werdender schwarzer Flecken. Schild mit grössern und kleinern, unregelmässigen, tiefschwarzen Flecken besät; vom hintern Schildrand an längs der Höhe des Rückens eine Linie von strichartigen Flecken; parallel

### 3. *Limax variegatus* Drap.

Bei Roveredo im untern Theil des Thals Misocco, Dr. Klls. lgt. 1886.<sup>1)</sup>

### 4. *Lehmannia marginata* Mllr.

(*Limax arborum* Bouch.)

Bei Promontogno im untern Theil des Bergell Sp. P. lgt.

### 5. *Limax (Agriolimax), agrestis* L.

var. *reticulatus* Mllr.

Bad Serneus, Prätigau, längs dem Fussweg nach den Wiesen gegen Klosters.

Findet sich sicher noch an anderwärtigen für die Species früher bezeichneten Fundorten Graubündens, wurde aber bisher nicht speciell unterschieden.

### 6. Zwei *Limax* Spec.

wovon der eine von Rev. Christi bei St. Moritz im Ober-Engadin, der andere von Rev. Sp. P. zwischen Casaccia und

diesen, durch eine helle Zone geschieden, ein Streifen von breitem und weiter gegen den Fussrand zerstreute kleine Flecken, die sich längs dem Letztern bis zum Kopf ausdehnen, alle tief schwarz.

Sohle dreifeldrig, weiss graulich gefärbt, die beiden Seitenfelder durch schwache Querfurchen bezeichnet, während das Mittelfeld ganz glatt. fig.

<sup>1)</sup> Das vorliegende Exemplar entspricht in Form des ganzen Körpers, wenn auch etwas klein, des Schildes, Kamms, der Maschen und der Sohle ganz der normalen Beschreibung.

Die Färbung jedoch, ob durch Alcohol modificirt, ist ein Graubraun, am Körper heller als am Schild und gegen den Fuss, noch mehr hellend; ein feiner, gelblicher Streifen über den Rücken der hintern Körperhälfte, keine andre Flecken.

Ein Exemplar aus russisch Armenien, von Hrn. Dr. O. Böttger bestimmt und bezogen, zeigt durchaus gleiche Färbung und zögere ich deshalb nicht länger, auch vorliegendes Stück als *L. variegatus* Drp. zu erklären.

Vicosoprano im Bergell gefunden worden, hatten von genannten Herrn nicht näher bestimmt werden können.

### 7. *Vitrina elongata* Drap.

Im Ober-Engadin häufig nach Rev. Sp. P.; gehe höher als irgend eine Art, *Hel. arbustorum* vielleicht ausgenommen. Oft in Gesellschaft von *Limax agrestis*, *Zonites fulvus*, *Zua lubrica* und *Helix rudrata*, gern an schattigen feuchten Orten.<sup>1)</sup>

### 8. *Vitrina pellucida* Mllr.

*mut. radiata m.*

Bad Serneus im Prätigau, in den Erlen-Auen rechts und links der Landquart, einzeln unter normalen Exempl.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Diese Species war von Studer schon für die östliche Schweiz angeführt worden; Hartmann dagegen behauptete, dass sie sich da selbst nicht vorfinde, in der Schweiz überhaupt selten vorkomme. Nach Obigem stellt sich nun heraus, dass Studer doch recht hatte, wenn man auch nicht weiss, woher er seine Kenntniss von diesem Vorkommen erhalten.

<sup>2)</sup> Bei einer wiederholten Durchsicht der um das Bad Serneus gesammelten Mollusken glaubte ich unter den Exemplaren von *Vitrina pellucida* bei einigen Stücken etwas Abweichendes zu sehen. In Form und Grösse ist nichts Besonderes zu bemerken. Die Fältchen an der Naht fehlen bei 6 der gesammelten Exemplaren, während dieselben bei 47 Stücken bestehen. Unter Letztern finden sich nun einige, bei denen von dem Kranz der Nahtfältchen an sehr feine, wellenförmige Radien höchst regelmässig und ziemlich enge über die Wölbung der letzten Windung bis auf die Unterseite ziehen. Diese Anordnung scheint den Gehäusen einen erhöhten und ruhigen Glanz zu verleihen, während bei den meisten Stücken durch kleinere und grössere flächenartige Ungleichheiten auf der Schalenoberfläche ein wechselndes Spiegeln entsteht, was wohl auch zu den Ausdrücken „*ziemlich glatt* bei Rossmäessler, *beinahe glatt* Gredler, *fast glatt* Lehmann“, Veranlassung gegeben hat; während Clessin sagt „Gehäuse glatt und glänzend“, was bei den von mir untersuchten 112 Stücken aus Bünden bei einigen wenigen auch zutrifft.

**9. Hyalina pura Ald.***var. viridula Mnke.*

Bad Serneus im Prätigau, in den Erlen-Auen längs der Landquart, Am St. 1886. Auf der LenzerHaide, Dvz. 1887 lgt.

**10. Arion Spec.**

Nicht selten (Ober-Engadin); ein Stück noch bei 6,000, auf Maloja getroffen; unterhalb des Passes (Bergell) häufiger, Rev. Sp. P. lgt. <sup>1)</sup>

**11. Helix angigyra Jan.**

Im untern Theil des Thals Misox, in 2 Stücken, Dvz. lgt. 1886. Sie sind etwas kleiner als solche um Mendrisio im Kt. Tessin. 10 mm. Durchm.

**12. Helix liberta Westrl.**

Herr Dr. Loretz hatte am Abhang des Mittenbergs bei Chur eine Fruticicola gesammelt, von der H. Dr. O. Böttger sagt, dass dieselbe aufs Haar mit der Helix liberta Westrl. form. minor übereinstimme. (vide Nachrechtsbltt. 1880 p. 57.)

**13. Helix sericea Drap.***var. corneola Cless.*

Im bündnerischen Vorderreinthal, Dr. Loretz lgt. und von Dr. Böttger bestimmt. Der obgenannten ähnlich, die Haarbekleidung jedoch stärker. (vid. Nachrechtsbltt. 1880 p. 57.)

---

<sup>1)</sup> In der Grösse ist dieser Arion zwischen ater und hortensis. Farbe chocoladebraun, zuweilen graulich, mit 2 schwarzen Streifen über Schild und Rücken, seitlich etwas blasser.

Der freilich sehr kurzen Beschreibung nach könnte es doch wohl Arion subfuscus Drap. sein.

**14. Helix sericea Drp.**

*var. dubia Cless.*

Im Tritt, Fuchssteig von Igis nach Valzeina; im Sattelwald von Valzeina und auf der Cresta von Schuders, Am St.; auf dem rechten Ufer der Rabiusa. Dvz. lgt. 1887. —

**15. Helix incarnata Mllr.**

*var. pallidula Moq. Tand.*

Um Chur Dr. Loretz leg. und von Dr. O. Böttger determin. (vid. Nchrechtsblt. 1880 p. 57.)

**16. Helix cisalpina Stabile.**

Bei Campocologno, am untern, südl. Ende des Puschlaver Thales ca. 530 M. ü. M. und von da thalaufwärts zum Flecken Puschlav, 1011 Met. ü. M., daselbst besonders an einem Mühlenwehr am Poschiavin, und selbst noch am Ausgang der Valle del Teo, an der Strasse nach dem Bernina Pass, in einer Höhe von ca. 1300 M. ü. M. Dvz. leg. 1887—89. <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> H. Major Adami, in: Contrib. alla Fauna malac. della valle del Adda, sagt von obiger Campylaea, die er als selbständige Species behandelt, dass er sie unter andern Orten auch bei Tirano, also unmittelbar vor der Ausmündung des Thals Puschlav in die Val Tellina und nur 3 Kilometer von Campocologno entfernt, in der *var. rhaetica Mousson* aufgefunden. In obgenannter Arbeit sowie im Elenco dei Moll. nella valle dell' Oglio des nämlichen Autors wird die *rhaetica* Mouss. als *var.* der *H. cisalpina Stab.*, aufgestellt u. ihr zur Seite auch noch als *var.* die *H. adelozona Parr.*, *H. Adami Kobelt*, *H. Orobia Adami* und *f. inornata* genannt.

*Stabile* selbst, in den Moll. terr. du Piemont erklärt, nach eingehenden Studien an Ort und Stelle, seine *cisalpina* als *var.* der nur in Hochthälern des Thales der Dranse in Unterwallis, am Mont-Catogne im Val Ferret und um St. Pierre (1500 M.) im Val d'Entremont vorkommenden, eigentlichen *H. foetens Stud.*, welche, in die südlichen Alpenthäler und Vorberge herabgestiegen, sich in die *cisalpina Stab.*, die *var. rhaetica* und *adelozona* umfassend, umgeformt, in der Hauptsache jedoch dem *typus* treu geblieben sei.

17. *Helix cisalpina* Stab.

*mut. inornata* Adami.

Am Mühlewhr beim Flecken Puschlav; mit fehlender Binde.

Weder Stabile, noch Adami, noch Pini in Moll. del territorio di Esino bringen *H. cisalpina* als var. mit der *echten*, im Wallis sehr verbreiteten *H. zonata* Studer in Verbindung, wenn auch Stabile sie mit der Stammform *foetens* Stud. in die *Gruppe* der *H. zonata* Stud. stellt. Clessin dagegen setzt die *rhaetica* wieder als var. zu *zonata* Stud. —

Nach den Exemplaren und den Beschreibungen, so weit mir solche zur Verfügung stehen, zu schliessen, erscheint es mir richtiger, den Erstgenannten zu folgen und die *rhaetica* sowie die *adelozona* als Variationen der *cisalpina* Stab. beizuordnen.

Zwei grosse um Campocologno gesammelte Stücke schliessen sich durch Stärke der Schale, Form und Färbung den von Tarasp mir vorliegenden Stücke an.

Die Exemplare vom Flecken Puschlav sind dünnchaliger, durchscheinender, matt oder wenig glänzend, eher etwas heller braun. die weisse Zone unter dem braunen Band fehlt, und die schiefen Streifen sind feiner, 11 mm. hoch, und 24 mm. grösster Durchm. —

Die zwei am Ausgang der Valle del Teo gefundene Stücke sind leider nicht vollends ausgewachsen, so dass der Mundsaum fehlt und die Masse nicht definitiv können angegeben werden. schliessen sich in Stärke der Schale denjenigen von Puschlav an, haben jedoch oben ein platteres Gewinde, unten dagegen aufgetriebeneren letzten Umgang, sehr feine Querstreifen, mehr Glanz und werden kleiner, bleiben, 10 mm. hoch und 18 mm. Durchm. —

Die Dünnchaligkeit der an den zwei letztgenannten Fundorten gesammelten Exemplare dürfte wohl, wenigstens zum Theil, den geognostischen Verhältnissen der Gegend, (crystallinische Formationen) zuzuschreiben sein. aber auch bei Vergleich ihrer übrigen Eigenschaften mit den von Variationen mir vorliegenden Beschreibungen will es mir nicht klappen sie einer derselben zuzuthemen und finde es gerathener mit einer speciellen Benennung noch zuzuwarten, um so mehr, als die Beschreibung von *H. rhaetica*, wie solche Stabile. *teste Strobel*, gibt mit den Exemplaren von Tarasp, die H. Professor Mousson in s. Bild des Unter-Engadins 1849, doch selbst als *rhaetica* M. aufzählt, nicht recht stimmt und eine Beschreibung der *rhaetica* von H. Prof. Mousson direct sehr erwünscht erscheinen lässt. —

**18. Helix cisalpina Stab.***mut. albina.*

Am Mühlewuhr beim Flecken Puschlav.

**19. Helix cisalpina Stab.***var. adelozona Parr.*

Nach Stabile, in Moll. terr. du Piemont etc. p. 54 Anmerkung c. hat H. Prof. Mousson diese Var. im Engadin gefunden; und H. Suter-Näf in Zürich schrieb mir im Juni 1885, dass er ein Exemplar von *Hel. adelozona Parr.* aus dem Unter-Engadin besitze das er von H. Prof. Mousson erhalten; dann Oct. 1886 „die *adelozona P.* ist wohl unterschieden von *H. zonata*, *foetens*, *rhaetica*, ist grösser als Letztere und schön hellbraun durchscheinend.“

**20. Helix ichthyomma Held.**

Tarasp im Unter-Engadin.

Stabile in Moll. terr. du Piemont 1864, pag. 54, Anmerkung d. sagt: D'après Mr. Blanchet de Lausanne, cette espèce, aurait été trouvée par Mr. Mousson à Tarasp, basse Engadine, c'est à dire peu loin des frontières du Tirol.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Hier dürfte wohl irgend eine Irrung oder Verwechslung vorliegen. Gredler in Tirol's Conchyl. sagt: *Helix zonata Stud.* in der Form des Oberinntals, mit niedergedrücktem Gewinde und mehr genäherten Ränden, der echten *foetens Stud.* zum Verwechseln nahe kommend, sei (teste Strob. in lit.) von Prof. Mousson im Oberinntal und von Strobel bei Pfunds und Finstermünz (also unmittelbar an der Unter-Engadiner Grenze) gesammelt worden.

Dies würde doch wohl ziemlich für die *Tarasper rhaetica* sprechen, während anderseits Stabile, Moll. du Piemont p. 62 das Unter-Engadin, und Clessin, Fauna II. Thl. p. 141, Tarasp speciell als Fundort von *H. ichthyomma* anführen, leider ohne ihre Gewährsmänner oder Quellen zu nennen.

**21. Helix zonata Studer.**

Im Bergell, unter Steinen; steigt bis zu den Strassenwindungen oberhalb Vicosoprano. Rev. Sp. P. leg. <sup>1)</sup>

**22. Helix arbustorum L.**

Nach Rev. Sp. P. häufig und hochgehend im Ober-Engadin; sehr häufig im Bergell, so besonders längs der Maira bei Vicosoprano. Die Bergeller Exemplare dünnschaliger als die Engadiner, aber satter gefärbt.

Von den HH. Roebuk und Taylor bestimmt, wurden noch folgende 4 Variationen hervorgehoben:

23. (*Helix arbustorum* L.)

*var. flavescens* Jeffr.

Maloja Pass und Vicosoprano.

24. (*Helix arbustorum* L.)

*var. marmorata* Roff.

Vicosoprano.

---

Auffallenderweise führt Professor Mousson in seiner oben schon citirten Arbeit „Ein Bild des Unter-Engadins 1849“ von Campylaea nur die *H. rhaetica* an und was ich seit 1857 aus dieser Gruppe in der Umgegend von Tarasp Gesammeltes gesehen, war durchwegs die gleiche Form.

<sup>1)</sup> Ausser dem Kant. Wallis, der eigentlichen Heimath der *Helix zonata* Stud. hat Thomas dieselbe an Granitfelsen des Gotthard, und Stabile, die Fundorte der piemontischen Alpen abgerechnet, oberhalb des Dazio Grande in der Val Leventina, in der Nähe des Gotthard gesammelt.

Das Bergell wäre nun der östlichste Wohnsitz dieser granitiches Felsgebilde liebende Campylaea, die *rhaetica* natürlich nicht zu *zonata* Stud. gerechnet. —

25. (*Helix arbustorum* L.)

*var. pallida* Taylor.

Am Fuss des Septiner-Passes und bei Vicosoprano im Bergell. Ueber Maloja bei circa 8000' = 2400 M. ü. M. und bei Sils-Maria im Ober-Engadin.

26. (*Helix arbustorum* L.)

*var. Poirertia* Moq. Tand.

Vom Maloja Pass.

27. (*Helix arbustorum* L.)

*var. icterina* Rssm.

Ein Stück von Vicosoprano wurde von H. Roebuk übereinstimmend mit genannter Var. gefunden.<sup>1)</sup>

**28. *Helix pomatia* L.**

*var. brunnea*.

Bergell, die gemeinste Form. Rev. Sp. P. lgt.

---

<sup>1)</sup> Diese *var. icterina* Rssm. habe ich in den *Icones* Bd. I.—III. 1835—59, trotz wiederholten Suchens, nicht finden können; ist vielleicht in der neuen von H. Kobelt besorgten Fortsetzung enthalten?

Die oben gegebenen Benennungen der Variationen, sind mir sämmtlich neu; sie betreffen alle die Färbung, die, wie schon Hartmann in *Gasterop. d. Schweiz* hervorhob, besonders im bündnerischen Rheinthal eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit zeigt, so dass er davon abstrahirte, Variationen daraus hervorzuheben.

Merkwürdigerweise andererseits wird in obererührtem Sammelergbniss von ständiger Variationen der Form und Gestalt keine Erwähnung gethan, während man doch annehmen sollte, dass z. B. *alpestrus* Zgl. im Ober-Engadin in charakteristischer Form und Grösse vorkommen dürfte.

Die dünnere Schale der Bergeller Stücke gegenüber den Engadiner, hängt jedenfalls mit dem geringen Kalkvorkommniss im Thal der Maira zusammen. —

**29. Pupa muscorum L.***mut. albina* Mnke.

Bei der Kirchenruine S. Gaudenzio oberhalb Casaccia im Bergell. Rev. Sp. P. lgt.

**30. Pupa edentula Drap.**

Häufig im Ober-Engadin an Wurzeln von Gras und namentlich der *Saxifraga aizoides* am Rand der Bergbäche. Rev. Sp. P. lgt.

**31. Pupa pygmaea Drap.***var. athesina* Gredler.

Oestlich vom Maloja-See unter feuchtem Moos. Rev. Sp. P. lgt.

**32. Pupa alpestris Ald.***var. elongata* Sterki.

Bei Truns im Bündner-Oberland. In der Sammlung von Prof. Mousson befindlich. (vid. Sterki Notizen etc. in Nachrichsblatt 1883 p. 74.)

**33. Succinea putris L.***var. parvula.*

Nahe bei Sils u. Maloja, Ober-Engadin und bei Casaccia im Bergell. Rev. Sp. P. lgt. <sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Ein Autor der Benennung dieser var. ist nicht genannt. — *Succinea putris* nicht allein, auch *Succinea Pfeifferi* kommt in Graubünden, so viel ich davon bis jetzt gesehen, nur klein, ja sehr klein vor, wie dies auch Hartmann schon beobachtet hatte, vid. mein Verzeichniss p. 80. Die var. *parva* Bakowsky wird wohl etwas anderes sein

Der Ausdruck *parvula* erscheint mir wohl zu allgemein,

**34. Succinea Pfeifferi Rossm.***var. albina.*

Seitene Abart. — Millemorti, unterhalb des Fleckens Puschlav. Dvz. lgt. 1888. <sup>1)</sup>

**35. Succinea elegans Risso.**

Ober-Engadin. Rev. Christy lgt.

**36. Paludina achatina Drap.**

Im See von Campfèr, im untern oder östlichen Theil, sehr häufig, von Hrn. Dr. O. E. Imhof, Zürich, gesammelt und brieflich bestätigt. <sup>2)</sup>

**37. Limnaea auricularia L.***var. alpina.*

Im Cauma-See bei Flims, Dr. Klls. 1884 und im Heid-See auf der Lenzer Haide F. Dvz. lgt.

<sup>1)</sup> Unter den in Millemorti gesammelten sehr schön goldgelben Stücken befindet sich ein Exemplar das sehr hell, bleich, gleichsam albin gefärbt erscheint, während es im Uebrigen alle Zeichen der Frische aufweist. Nach Clessin Fauna I. 1876, p. 289, sehr selten.

<sup>2)</sup> Die vorliegenden 2 Exemp'are mit ihren Deckeln sind in Gestalt und Färbung gleich solchen aus dem See von Lugano.

Es ist dies wohl eines der merkwürdigsten Vorkommnisse nicht allein in der Bündner sondern in der ganzen Schweizer Mollusken Fauna.

Eine Wasserschnecke, die bis jetzt auf Schweizer-Gebiet nur aus dem Lago maggiore bei Locarno, also von den wärmsten oberitalienischen Gegenden, bekannt war, findet sich plötzlich im Campfèr'er See, dem 3. der Ober-Engadiner Thalseen, 1794 M. ü. M. und zwar in Menge, also heimisch, eingebürgert und im Aussehen unverändert.

Der dem Ober-Engadin nächste der oberitalienischen Seen, der Comer-See, Lago di Como, liegt 1584 M., der Ceresio 1523 M. und der Lago maggiore gar 1597 M. tiefer als der Campfèr'er-See.

Wie und auf welchen Bedingungen basirend, sich diese Ueber-siedlung u. Acclimatisation gemacht, ob das betreffende Wasserbecken begünstigende Eigenschaften besitzt etc., bietet der weitem Forschung noch Gelegenheit zu gewiss interessanten Studien.

38. (*Limnaea auricularia* L.)*var. angulata* (Hartm.)

Im Silser-See, Ober-Engadin, Rev. Sp. P. lgt.

39. (*Limnaea auricularia* L.)*var. contracta* Cless.Im Laaxer-See, Bündner-Oberland, Dvz. lgt. 1887. <sup>1)</sup>40. *Limnaea peregra* Mllr.*var. curta* Cless.

Davos im Gross-See Am St., und bei Remüs, Unter-Engadin, Dr. Klls. lgt.

41. (*Limnaea peregra* Mllr.)*var. elongata* Cless.

Im Lenzer Haid-See, Fl. Dvz. lgt. 1887.

42. (*Limnaea peregra* Mllr.)*var. elongatissima* Grdlr.In der Sela, Zwischen- oder Vereinigungsarm des Silser- und Silvaplanner-Sees im Ober-Engadin. Rev. Sp. P. lgt. <sup>2)</sup>43. (*Limnaea peregra* Mllr.)*var. Heydeni* Koblt.

Engadin, Suter-Näf lgt.

<sup>1)</sup> Nach Clessin Fauna II. 1889, p. 530, ist *angulata* Hartm. syn. von *contracta* Cless. Ich habe die Ober-Engadinerin noch nicht gesehen und möchte mit der Zusammenschmelzung noch zuwarten. Warum wieder ein neuer Name wenn ein älterer bekannt ist; oder wenn Letzterer nicht passt, ist er auch nicht syn. Vielleicht hat der Autor auch etwas anderes vor sich gehabt. —

<sup>2)</sup> Wie mit *Limn. auric. v. contracta* verhält es sich auch mit *mn. peregr. var. elongata*. Cless. —

44. (*Limnaea peregra* Mllr.)

*var. excerpta* Hartm.

Im Puschlaver-See bei le Prese findet sich eine Form, die durch ihre gewölbten Umgänge sehr an *var. Tschapeki* aus dem Raibl-See, Ostalpen, mahnt nach Suter-Näf in lit. Dr. Klls. lgt 1858. Millemorti, bei Puschlav, D v z. lgt.<sup>1)</sup>

45. *Limnaea truncatula* Mllr.

*var. oblonga* (Puton).

Ober-Engadin. Rev. Sp. P. lgt.

46. (*Limnaea truncatula* Mllr.)

*var. minor* Jeffr.

Ober-Engadin. Rev. Sp. P. lgt.

47. *Planorbis rotundatus* Poir.

*var. gracilis* Grdler.

Beim St. Moritzer-See, Ober-Engadin. Suter-Näf 1877; bei Flims Dr. Klls. 1882 lgt.

48. *Planorbis spirorbis* L.

Bei Sils-Maria, Baselgia, Isola, Maloja und Silvaplana nicht selten in langsam fliessenden kleinern Gräben. Rev. Sp. P. lgt. —

<sup>1)</sup> Nach Clessin Fanna II. 1889, p. 551, ist *var. Tschapeki* Cless. syn. mit *var. excerpta* Hartm. in Gasterop. 1843 p. 83. — Die Oberfläche der Gehäuse von Millemorti sind sozusagen glatt, während diejenigen von Le Prese auf der ersten oder obern Hälfte des letzten Umgangs durch Querstreifen gegittert erscheinen. — Gredler sagt, diese *Var.* finde sich in den grössern Wasserbecken der Gebirge. Das Material jedoch, nachdem H. Hartmann die Variation aufgestellt, stammte zum Theil aus einem kaum 12 □M. grossen Tümpel bei Wiedikon unweit Zürich, wo ihn Prof. Mousson gesammelt, und theils

**49. Sphaerium corneum L.**

Im Laaxer-See, Bündner-Oberland, 1044 M. ü M.,  
10 mm. br., 8 mm. h u. 6 mm. dick. H. Dvz. lgt. 1889.<sup>1)</sup>

**50. Pisidium fontinale Drap.**

Bei Isola, am Silser-See, Ober-Engadin, in seichten Gräben.  
Rev. Sp. P. lgt.

**51. Pisidium pusillum Gmel.**

Bei den Ober-Engadiner Seen, so bei Maloja zahlreich  
in seichten Lachen und Gräben. Rev. Sp. P. lgt.

Der Sammler traf nie beide Arten zusammen (wohl zu  
beachten).<sup>2)</sup>

---

aus dem Bleicher-Weiher zu St. Leonhard bei St. Gallen, also weder  
grossen Wasserbecken, noch weniger im Gebirge; es widerspricht somit  
dem Vorkommen in Millemorti nicht, wenn auch diese Fundstelle  
nicht ein Seebecken aufweist, wie diejenige von Le Prese.

<sup>1)</sup> Es ist dies eine werthvolle Vermehrung der bis jetzt in der  
Bündner Mollusken-Fauna so spärlich vertretenen Zweischaler. Die  
Species scheint im Laaxer-See nicht eben selten zu sein; ausser einigen  
frischen Exemplaren hat H. Davaz eine Anzahl Phryganiden Gehäuse  
gesammelt, die vorzugsweise aus losen Schälchen des Sphyradiums  
aufgebaut sind, und ein ganz drolliges Aussehen bieten. —

<sup>2)</sup> *Pisidium fontinale Drap.* ist nach Clessin. dem Hauptdefinitor  
dieser kleinen Zweischaler, Fauna I. p. 520 syn. von *Pisidium pu-*  
*sillum Gmel.* Da nun das von Rev. Sp. aufgefundene *Pis. fontinale*  
mit dem Letztern nicht zusammen vorkommt, was noch besonders  
betont wird, können die beiden nicht wohl das Gleiche sein. Mög-  
licherweise ist das *P. fontinale* das in Bünden oft vorkommende *Pis.*  
*fossarium Cless.* Entscheiden kann nur eine neue Untersuchung. —

## B. Neue bündnerische Fundorte

für

die im Verzeichnisse von 1883 notirten Arten, Variationen etc.

### 1. *Limax cinereo-niger* Wolf.

Serneus-Bad im Prätigau, Umgebung.

### 2. *Limax cinereus* List.

Serneus-Bad; Auen längs der Lanquart und Mauer zunächst der Mineralquelle.

### 3. *Limax flavus* Mllr. (*tenellus* Nils.).

Serneus-Bad, Erlen-Auen längs der Lanquart; immer ganz gelb, ohne Seitenstreifen.

### 4. *Limax agrestis* L.

Serneus-Bad; Umgebung der Gebäude, Am St.; sehr häufig im Oher-Engadin selbst bis 7 und 8000', sehr häufig z. B. zur Fuorcla von Surlei, gegen den Lunghino-See. Stücke aus solcher Höhe sind sehr klein. — Unter Maloja und im Bergell selbst von gewöhnlicher Grösse. Rev. Sp. P.

### 5. *Amalia marginata* Drap.

In Menge bei Promontogno und Bondo. Weiter thalaufrwärts kam diese Art nicht mehr vor. Rev. Sp. P.

*Bemerkung.* Bondo 602 M. und Promontogno 820 M. ü. M. — Die *Amalia* geht daselbst somit immer noch etwas höher als sie bisher diessits der Alpen in unserem bündn. Rheinthal gefunden worden.

### 6. *Vitrina diaphana* Drap.

Serneus-Bad, in den Erlen-Auen beiderseits der Lanquart, Am St.; am Albula-Pass, Bergtiner Seite und in Puschlay, in einzelnen Exemplaren Dvz. 1888.

7. *Vitrina glacialis* Forbes.

Am Albula-Pass, Nordseite, bei 2340 M. ü. M. und am Bernina-Pass, ebenfalls Nordseite. Dvz. 1888.

8. *Vitrina pellucida* Müll.

Serneus-Bad, Umgebung nicht selten. Am St. 1885/86; hoch über dem Maloja, bei 7000', 1 Stk. Rev. Sp. P.

9. *Hyalina cellaria* Müll.

Audeer in Schams, Rofftain lgt.; Serneus-Bad, Umgebung, Am St.; im Bergell, Umgebung der Häuser unter Steinen. Die Exemplare bei Casaccia sind sehr klein, während sie bei Bondo und Promontogno grösser als gewöhnlich. Rev. Sp. P.; in Puschlav, zwischen Millemorti und Le Prese, Dvz. 1888. —

10. *Hyalina Draparnaldi* Buk.

Um Araschga bei Chur, Dvz.

11. *Hyalina glabra* Stud.

Serneus-Bad, Au rechts der Lanquart, Am St. 1885; am Mittenberg bei Chur, Dvz. 1887.

12. *Hyalina nitens* Mehl.

Serneus-Bad, Umgebung, Am St. 1885—86; an der Mittenberg-Halde bei Chur und längs dem Waldweg am Piz Okel, Dvz. 1887. —

13. *Hyalina nitidula* Drp.

Ein Stück bei Casaccia im Bergell, Rev. Sp. P.

14. *Hyalina pura* Ald.

Zwischen Pardisla und Seewis, Prätigau 1883, und Bad Serneus in den Erlen-Auen, Am St. 1885—86; auf der Lenzer Haide, Dvz. 1887.

15. *Hyalina radiatula* Ald.

Bad Serneus in der Au links der Lanquart, Am St. 1885; in Arosa unter feuchtem Holz, ca. 1800 M. ü. M., Dvz. 1888. —

16. *Hyalina Petronella* Charp.

Serneus-Bad, am Fussweg nach den südlichen Wiesen, Am St. 1886; zahlreich im Ober-Engadin und Bergell, am häufigsten zwischen 5000 und 6500'. Rev. Sp. P.

17. *Hyalina diaphana* Stud.

Am Felsenbach, Prätigauer Clus, Dvz. 1885.

18. *Hyalina crystallina* Müll.

Bad Serneus, Au links der Lanquart, Am St. 1886, auf der Lenzer Haide 1887 und um Campocologno, Puschlav, Dvz. 1888. —

19. *Hyalina fulva* Müll.

Bad Serneus, in den Auen beiderseits der Lanquart, Am St. 1885—86; auf der Lenzer Haide, Dvz. 1887; im Ober-Engadin und im Bergell, eine zahlreiche alpine Art bis 8000' ü. M. Rev. Sp. P.

20. *Hyalina (Zonitoides) nitida* Müll.

Am Rhein bei Chur (sog. Bettler-Küche) und im Vorder-Prätigau 1887, und im Puschlav, Dvz. 1887.

21. *Arion fuscum* Müll.

Bad Serneus, in der Au links der Lanquart, Am St. 1885—86. —

22. *Arion hortensis* Feruss.

Serneus-Bad, in der Au auf der linken Seite der Lanquart nicht selten 1885—86 Am St.; im Ober-Engadin bei Sils-Maria und Maloja klein, im Bergell bei Casaccia und Promontogno von gewöhnlicher Grösse. Rev. Sp. P.

23. *Helix rupestris* Drp. var. *rupicola* Stab.

Serneus-Bad, oberhalb dem Kurhaus an Steinen, selten, 1885—86 Am St.; häufig im Bergell, woselbst sie sich nach Taylor mehr der nach Bourguignat für Süd-Europa charakteristischen Form (vid. oben) nähert. Rev. Sp. P.

24. *Helix rupestris* Drp. var. *saxatilis* Hartm.

Bad Serneus, an Mauersteinen längs dem Waldrand häufig, Am St. 1885—86; im sogenannten Todtengut hinterhalb Chur, 1887; bei Milleinorti und häufig am Sassalbo in Puschlav, 1888, Dvz. und ebenfalls häufig im Ober-Engadin bis 7000' ü. M. Rev. Sp. P.

25. *Helix pygmaea* Drp.

An Maloja und um Casaccia im Bergell, unter Steinen mit *Vertigo pygmaea*, ist häufiger als gemeinhin angenommen (oder aufgefunden) wird. Rev. Sp. P.

26. *Helix ruderata* Stud.

Bad Serneus in der Au rechts der Lanquart, spärlich, Am St. 1886; auf der Lenzer Haide, Dvz. 1887; im

Ober-Engadin, wenn auch mehr stellenweise häufig, bis 7000'.  
Im Bergell vom Maloja bis Vicosoprano. Rev. Sp. P.

Am Albula-Pass, zwischen Bergün und Weissenstein, Dvz.  
1888. —

27. *Helix rudierata* Stud. mut. *albina*.

Valzeina, Rütliwald; Serneus-Bad, rechts der Lanquart,  
Am St. 1886. —

Bergell, häufig die hyaline var. Rev. Sp. P.

28. *Helix rotundata* Müll.

Serneus-Bad, vom Drostobel einwärts, Am St. 1886;  
Mittenberg-Halde-Waldweg und Waldweg am Piz Okel, auf  
der Lenzer Haide, Dvz.

29. *Helix obvoluta* Müll.

Auf Brambruesch und am Piz Okel bei Chur, Dvz. 1887;  
vom Maloja durch's Bergell nicht selten. Rev. Sp. P.

30. *Helix holoserica* Stud.

Auf der Lenzer Haide, 1887 und am Albula-Pass, zwi-  
schen Bergün und Weissenstein, 1888, Dvz.; unter grossen  
Steinen wenige Stücke bei der Kirchenruine (St. Gaudenzio)  
oberhalb Casaccia im Bergell. Rev. Sp. P.

31. *Helix personata* Lam.

Bad Serneus, in der Au auf der rechten Seite der Lanquart,  
Am St. 1885; auf der Lenzer Haide, Dvz. 1887.

32. *Helix costata* Müll.

Bad Serneus, in der Erlen-Au links der Lanquart, Am St.  
1885; südlich von Casaccia durch das Bergell hinab, Rev.  
Sp. P.; bei Millemorti in Puschlav, Dvz. 1888.

33. *Helix pulchella* Müll.

Bad Serneus in der Au rechts der Lanquart und am Fussweg gegen den Drosbach, Am St. 1886; in Puschlav Dvz. 1887. —

34. *Helix cobresiana* v. Alt.

Serneus-Bad, Umgebung, beiderseits der Lanquart etc., Am St. 1885—86; am Mühlerain bei Araschga, hinterhalb Chur und auf der Lenzer Haide, Dvz. 1887.

35. *Helix edentula* Drp.

Serneus-Bad, vom Drostobel thaleinwärts, Am St. 1885.

36. *Helix hispida* L.

Bei Andeer in Schams, Roffia in lgt. 1867; Serneus-Bad oberhalb dem Kurhaus, Am St. 1886; im Bergell vom Maloja-Pass an bis Vicosoprano häufig, weiter abwärts nicht mehr vorkommend. Rev. Sp. P.

37. *Helix sericea* Drap.

Am Wolfgang auf Davos, Dr. Klls. 1883; Bad Serneus, Au links der Lanquart, oberhalb dem Kurhaus und vom Drostobel thaleinwärts, Am St. 1885—86; am Mühlerain bei Araschga, am Piz Okel und auf der Lenzer Haide, Dvz. 1887; am Albula-Pass, zwischen Bergün und Weissenstein und bei Millemorti in Puschlav, Dvz. 1888.

38. *Helix sericea* Drp. *mut. albina*.

Am Albula, zwischen Bergün und Weissenstein, sehr schöne Exemplare, Dvz. 1885.

39. *Helix incarnata* Müll.

Halde am Mittenberg, am Marienbüchel bei Chur, am Mühlerain bei Araschga, Waldweg am Piz Okel und auf der Lenzer Haide, Dvz. 1887.

40. *Helix fruticum* Müll.

Bad Serneus, vom Drostobel einwärts nach Gulien, Am St. 1886; Friedau bei Chur auf Weissdorn und am Marienbüchel, Dvz. 1887. —

41. *Helix fruticum* Müll. *mut. albida*.

Bad Serneus, Auwiese gegenüber der Einmündung des Drosbachs in die Lanquart und in Gulien zunächst der Landquartbrücke, Am St. 1886.

42. *Helix strigella* Drap.

Am Marienbüchel und Waldweg am Piz Okel bei Chur, Dvz. 1887; bei Promontogno im Bergell, Dr. Graeser 1888; in Puschlav, auffallend kleine Form, Dvz. 1888

43. *Helix arbustorum* L.

Um Andeer in Schams, Roffia in 1867; Bad Serneus, Umgebung, 18858—86 Am St.; in Puschlav, etwas klein sonst normal, Dvz. 1887.

44. *Helix arbustorum* L. *var. trochoidalis* Roff.

Um Andeer in Schams, Roffia in 1867.

45. *Helix arbustorum* L. *var. subalpina* Hrtm.

Bad Serneus beiderseits der Lanquart, Am St. 1885 bis 1886; auf der Lenzer Haide, Dvz. 1887.

46. *Helix arbustorum* L. var. *alpestris* Zglr.

Höhen bei Ilanz im Vorderrheinthal. Auffallend kleine Form ohne Binde, 12 mm. a. und 15 mm. l., Dr. Loretz lgt. (vid. Dr. Böttgr. 1880, Nehrchtsblit pag. 58). Oberhalb dem Dorfe St. Bernhardin, am Pass nach Misox ca. 1600 M. ü. M. massenhaft, während weiter abwärts nichts mehr, Dr. Klls. lgt. 1885. Auf der Lenzer Haide und am Stäzer Horn 1887, am Albula-Pass und am Weisshorn in Arosa, letztere so klein wie von Sertig-Davos, Dvz. 1888.

46. *Helix nemoralis* L.

Misox von Lostallo abwärts durch das Thal hatte schon Scheuchzer (in den 30ger Jahren) diese Art gesammelt vide in sched. 18.. Im Bergell bei Promontogno, in sehr kleiner aber zweifelloser Form, Dr. Graeser lgt. 1887. In Puschlav, ganz in der Art des Vorkommens wie um Mendrisio, im Kant. Tessin, Dvz. 1887.

48. *Helix hortensis* Müll.

In Puschlav, die Binden durscheinend wie bei *nemoralis*, Dvz. 1887.

49. *Helix pomatia* L.

Um Flims im Bündner-Oberland, 1150—60 M. ü. M., 16 Stk. wovon 10 über mittlere Grösse, und 13 Stk. zu var. *Gessneri* Hartm. 1884, Dr. Klls. lgt.; Bad Serneus, Au und Wiesen links der Lanquart, von mittlerer Grösse, auch mit lebendem Thier meist verwittert und entfärbt aussehend, Am St. 1885—1886; auf der Lenzer Haide, H. Dvz. 1887 und im Bergell, wo sie die oberste Grenze an

der Basis der gewundenen Strasse oberhalb Vicosoprano er-  
reiche, Rev. Sp. P. und bei Promontogno im Untern Theil  
des Thales, Dr. L. Graeser 1888.

50. *Helix pomatia* L. mut. *albina* var. *albida*.

Ein Stk. bei Borgonovo im Bergell, Rev. Sp. P. lgt.

51. *Helix ericetorum* Müll.

Am Marienbüchel bei Chur und auf der Lenzer Haide,  
Dvz. 1887. —

52. *Helix candidula* Stud.

Am Mühlerain bei Araschga und von da aufwärts gegen  
Churwalden, ebenso auf der Lenzer Haide, Dvz. 1887.

53. *Buliminus detritus* Müll.

Am Mühlerain bei Araschga hinterhalb Chur, Dvz. 1887.

54. *Buliminus detritus* Müll. var. *radiatus* Brug.

Im Misox gemein, Klls. 1885.

55. *Buliminus montanus* Drp.

Bad Serneus, Umgebung, Am St. 1885—86; Mitten-  
berg-Halde, Marienbüchel und bei Araschga, Dvz. 1887.

56. *Buliminus montanus* Drp. var. *elongatus* Rssm.

Serneus-Bad, links der Lanquart, Am St. 1885.

57. *Buliminus montanus* Drp. var. *albinus*.

Bad Serneus, links der Lanquart, schön, Am St. 1885.

58. *Buliminus obscurus* Müll.

Bad Serneus, in den Erlen-Auen, rechts und links der Lanquart, Am St. 1885—86; bei Araschga hinterhalb Chur und um Churwalden, Dvz. 1887.

59. *Cionella lubrica* Müll.

Auf dem Wolfgang, Davos, Klls. 1883; Bad Serneus, Auen rechts und links der Lanquart, durchwegs klein, Am St. 1885—86. Häufig an feuchten Plätzen im Ober-Engadin, bis 7000' in gewöhnlicher Form; im Bergell auch häufig; eine kleine Form bei Vicosoprano, Stampa und Promontogno, Rev. Sp. P. lgt. In Puschlav, Dvz. 1887.

*Bemerkung.* Die kleine Form ist vielleicht *tubicella* Zgl. oder *pulchella* Hrtm.

60. *Cionella lubrica* Mllr. *mut. tubicella* Zglr.

Millemorti in Puschlav, Dvz. 1888.

61. *Cionella lubrica* Mllr. *var. pulchella* Hrtm.

Bad Serneus, in den Erlen-Auen längs der Lanquart, Am St. 1885—86.

62. *Cionella lubrica* Mllr. *mut. albina*.

Am Albula-Pass, 2330 M. ü. M., schön und klein nur 5 mm. l., Dvz. 1888.

63. *Pupa secale* Drap.

An der Mittenberg-Halde bei Chur, Dvz. 1887.

64. *Pupa avenacea* Brug.

Im Lürlebad bei Chur, Dvz. 1887.

65. *Pupa avenacea* Brg. var. *hordeum* Stud.

Im Zeller Weingarten bei Malans, südl. Mauer, Am St. 1883, (selten).

66. *Pupa muscorum* L. mut. *unidentata* Pfr.

In Puschlav, Dvz. 1 Stk. 1887.

67. *Pupa muscorum* L. mut. *edentula* Slav.

In Puschlav, Dvz. 1887.

68. *Pupa bigranata* Rssm.

In höhern Thälern Graubündens, namentlich im Engadin vorkommend, nach Prof. Mousson in: Ueber den Löss des St. Galler Rheinthals 1856.

69. *Pupa inornata* Michd.

Bad Serneus, in den Auen beiderseits der Lanquart an der Unterseite von *Asplenium filix femina*, Am St. 1886.

*Vertigo edentula* Drap. var. *columella* von Martens (ist nach Albers *Helic.* syn. von *inornata* Michd.). Wenige Stücke unter Steinen bei der Kirchenruine (St. Gaudenzio) oberhalb Casaccia, Rev. Sp. P.

70. *Pupa antivertigo* Drp.

In Puschlav, Dvz. 1887. —

71. *Pupa pygmaea* Drp.

Serneus-Bad, längs dem Spaziergange gegen die Wiesen, Am St. 1886. —

72. *Balia perversa* L. (wahrscheinlich *perversa*?).

Nahe beim Teleozgletscher ein einzelnes Fragment unter einem grossen Stein. Rev. Sp. P.

*Bemerkung.* Für Bünden kenne ich keine andre *Balia* Art.

73. *Clausilia laminata* Mtg.

Bei Misocco, Hauptort im obern Theil des Thals Misox, Dr. Klls. lgt. 1885; in Füllrain, einem Churer Maiensäss, Dvz. 1887. —

74. *Clausilia commutata* Rssm.

Bad Serneus, in der Au links der Lanquart und vom Drostobel thaleinwärts, Am St. 1885 - 86.

75. *Clausilia itala* G. v. Mrt.

In Puschlav von Campocologno bis Flecken Puschlav; von erstem Ort das kleinste Exemplar 14,5, das grösste 16,5 mm. lang; schön, Dvz. 1888.

76. *Clausilia plicata* Drap.

Um Andeer in Schams, Roffiain lgt. 1867; Bad Serneus, Umgebung nicht selten, 1885—86 Am St.; am Marienbüchel bei Chur, um Araschga, 1887, beim Flecken Puschlav in 1 Stk., Dvz. 1888.

77. *Clausilia plicatula* Drap.

Am Wolfgang auf Davos, Klls. 1883; Bad Serneus, Umgebung überhaupt, Am St. 1885—86; häufig bei Casaccia im Bergell, namentlich bei der Kirchenruine (St. Gau-

denzio) und dann den Strassenwindungen folgend bis oberhalb Vicosoprano. Rev. Sp. P.

*Anmerkung.* Auch noch weiter hinab, vid. Verzeichniß von 1883 bis 1884, pag. 76, bei Borgonovo, wo H. Dr. *Killias* 1 Stück fand, das auch H. Dr. *Stoll* durch seine Form auffiel. Näheres über dessen Untersuchung habe ich noch nicht erfahren. —

78. *Clausilia dubia* Drp.

Bad Serneus, Umgebung, 1885 — 86 A m St.; im Todten-  
gut hinterhalb Chur, 1887 und zwischen Tamins und Trins  
im Bündn.-Oberland, D v z. 1889.

79. *Clausilia cruciata* Stud.

Bad Serneus, an Buchenstämmen oberhalb dem Kurhaus,  
1885 — 86 A m St.; um Araschga bei Chur, D v z. 1887.

80. *Succinea putris* L.

Bad Serneus, um Quellabflüssen rechts der Lanquart;  
sehr klein, A m St.

81. *Succinea Pfeifferi* Rasm.

Bad Serneus, an Holzstückchen die im Wasser kleiner  
Quellen und deren Abflüssen liegen, bes. rechts der Lanquart,  
1886 A m St.; am Mittenberg bei Chur, in kleiner Form,  
Dr. Loretz; auf dem Wolfgang, Davos, Dr. Klls. 1883;  
am Rhein bei Chur (sogenannten Bettler-Küche) und auf der  
Lenzer Haide in einem Bergbächlein, 1887 und in Puschlav,  
an verschiedenen Localitäten, wie z. B. Costa del Pozzo und  
Millemorti, woselbst sehr schön gelb gefärbt, D v z. 1887  
und 1888. —

82. *Succinea oblonga* Drap.

Auf nassem Weideland bei Casaccia im Bergell. Rev. Sp. P.

83. *Carychium minimum* Müll.

An Graswurzeln bei Maloja und Casaccia im Bergell.  
Rev. Sp. P.

84. *Bythinina tentaculata* L.

In einer Sumpflache bei Roveredo im Misox. Klls. 1885.

85. *Limnaea auricularia* L.

In den grossen Seen des Ober-Engadins, Schale gross, gewöhnlich erodirt, Rev. Sp. P. 1876.; im Laaxer-See, ordentlich gross; im See auf der Lenzer Haide, ziemlich klein; und im See von Puschlav, Dvz. lgt. 1887.

86. *Limnaea peregra* Müll.

In sumpfigen Stellen bei Roveredo im Misox, Dr. Klls. 1885; in den seichten Gewässern des Ober-Engadins, so wie im Bergell reichlich, Rev. Sp. P. 1886 lgt.; Serneus-Bad, im Quellabfluss unterm Kurhausgarten ziemlich gross, Am St 1886; bei Dalvazza im Prätigau, im See auf der Lenzer Haide und in Puschlav, Dvz. 1887; im Schwarz-See bei Tarasp, Dr. Imhof 1887 lgt.; bei Malix, längs der Landstrasse in der Biegung gegen das Spundatscher-Tobel, und im Thal Puschlav bei Millemorti-Boschi, Ponte nuovo e Lago und alla Rösa am Bernina-Pass, ca. 1878 M. ü. M., Dvz. 1888.

*Anmerkung.* Bei oberwähnten so verschiedenen Fundorten ist wohl anzunehmen, dass auch verschiedene Var. und mt. darunter sich finden, aber welche?

87. *Limnaea truncatula* Müll.

Im Ober-Engadin sehr häufig, mit peregra vergesellschaftet, Rev. Sp. P. lgt.; Bad Serneus, in einem Quellabfluss rechts der Lanquart, auffallend klein, Am St. 1886; bei Dalvazza und Mezzaselva im Prätigau und in Puschlav, verschiedene Stücke, worunter eines besonders gross, Dvz. lgt. 1887; von Mortels am Piz Corvatsch, 2610 M. ü. M., ein ausgedehntes Alpgebiet mit vielen kleinen Wasserbecken, für diese Höhe auffallend grosse Exemplare, Dr. Imhof 1887; in Puschlav bei Costa del Pozzo nelle Boschi, bei Millemorti, bei Ponte nuovo und im Lago di Poschiavo, Dvz. 1888.

88. *Limnaea stagnalis* L.

Im Laaxer-See, Dvz 1887 und 1889. Das grösste Exemplar 62 mm. l. und 30 mm. br., Mündung 35 mm. l. und 23 mm. br. --

Das kleinste Stück 34 mm. l. und 13 br., Mündung 18 mm. l. und 7 mm. br. --

89. *Planorbis rotundatus* Poir. var. *gracilis* Grellr.

Puschlav, bei Millemorti in Sumpf zwischen Moos und Carex mit *Pisidium fossarinum*, Dvz. 1889.

Sämmtliche Stücke mit einem rothbraunen, okerigen Ueberzug bis zur Mündung bedeckt. Die grössten Exemplare haben nicht mehr wie 5 Windungen, 5 mm. Durchmesser 1 mm. dick. --

90. *Planorbis contortus* L.

Im Ober-Engadin, M. Christy.

91. *Pisidium fossarinum* Cless.

Im See auf der Lenzer Haide an Phryganiden-Gehäusen haftend, Dvz. lgt. 1887; im Schwarz-See von Tarasp ca. 1500 Met.; im See von Bitabergo in Bosco di Cavrile, südlich von Casaccia im Bergell, 1862 M. ü. M. und im oberen Splügen-See, Rheinwaldthal, 2270 M. ü. M., Dr. Imhof 1887; in Puschlav, Sumpfstellen bei Millemorti, 1888 und 1889 Dvz. —

Die beiden Verzeichnisse bieten einen ansehnlichen Anwachs der Mollusken-Fauna Graubündens, sowohl in Arten, Variationen und Mutationen als in neuen Fundorten. Erfreuliche Vermehrung ganz besonders erlangen die Local-Faunen unserer von den Alpen nach Süden sich absenkenden Thalschaften Puschlav, Bergell und Misox. — Besonders Interesse endlich bieten für die Fauna unseres Gebirgslandes einige erst in neuerer Zeit aufgefundene Arten. —

Die Zahl der Species ist nun von 112 im Verzeichniss von 1884 auf 126 und die der Variationen und Mutationen von 75 auf 110 angewachsen, wobei *Hyalina Petronella* Charp., im vorigen Verzeichniss als var. von *Hyal. radiatula* Ald. aufgeführt, neuern Ergebnissen gemäss als selbständige Art gezählt wird. —



## II.

# Ueber eine monströse *Gentiana excisa* Presl.

Von

**Prof. Dr. Chr. Brügger in Chur**

und

**Professor Dr. C. Cramer in Zürich.**

(Nebst einer Tafel.)

Der verstorbene Herr Pfarrer *A. Wyss* in Schiers, ein eifriger Botaniker, traf auf dem Plassegga-Pass (Rhätikon, hinter St. Antönien 2321 M.) am 25. Aug. 1878 an einer Stelle, wo eben alter Schnee abgeschmolzen war, vier Exemplare einer *Gentiana excisa*, welche wie gefüllt erschienen und wovon er zwei Exemplare nach Chur einsandte. Dieselben wurden zu näherer Untersuchung Hrn. Prof. Dr. *Chr. Brügger* vorgelegt, welcher unter dem 1. Jan. 1879 sich dahin aussprach: „Die zwei getrocknet mir vorliegenden Exemplare sind auffallend klein, kleinblättrig und kleinblüthig, die Blüten erscheinen gefüllt, mit vielfach zerschlitztem Saum von höchst fremdartigem Aussehen. Näher betrachtet bestehen die erlittenen Veränderungen der Blüthe:

- a) in einer Vervielfältigung der Kelchglieder, wovon die äusseren Zähne (5) ziemlich normal, die inneren corollinisch und vergrössert und als Uebergang zur Krone erscheinen;

- b) in einer Vervielfältigung der Kronglieder<sup>1)</sup> mit schmälern und längeren Zipfeln, wahrscheinlich auch
- c) in Folge corollinischer Beschaffenheit der Staubgefässe.

Um über letzteren Punkt und anderweitige Veränderungen der innersten Blüthentheile in's Klare zu kommen, ist ein Aufweichen der getrockneten und gepressten Exemplare unerlässlich, wozu ich vorderhand keine Befugniß habe. (Vergl. Analoge Missbildungen bei Primulaceen in Cramer's „Bildungsabweichungen S. 16—18.“)

Die beiden Gentianen wurden nun Herrn Prof. Dr. C. Cramer in Zürich übermittelt, dessen Untersuchungsergebnisse, durch von demselben angefertigte Zeichnungen erläutert, hiemit folgen.

„Von den 2 abnormen, von Hrn. Pfarrer A. Wyss am 25. Aug. 1878 auf dem Plassegga-Pass (Montafuner Seite) gefundenen Exemplaren von *Gentiana excisa* Presl., die Sie mir am 5. Januar 1879 zur Einsicht geschickt, habe ich schon im Febr. 1884 das eine, nach Aufnahme einer Skizze (Fig. 1), gemäss Ihrer schriftlichen Ermächtigung vom Jan. 1879 aufgeweicht und zergliedert, um insbesondere über den Bau der Blüthe besser in's Klare kommen zu können. Die Ergebnisse meiner in diesen Tagen bestätigten Untersuchung sind folgende:

Die in eine Blüthe endigende Achse trägt 4 Blattpaare, von denen 3 grundständig sind, das 4. wenig unter der Mitte eingefügt erscheint. In der Achsel des in Fig. 1

<sup>1)</sup> Ich zählte 15—17 corollinisch gefärbte und geformte Zipfel ohne die 5 normalen Kelchzähne!



Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 3.

*Gentiana excisa monstrosa*

Cramer, del.



hintern Blattes des 2. Paares steht eine deutlich 4blättrige Laubknospe (K), deren beide ersten, relativ kleinen Blätter in einer zum Stützblatt senkrechten Ebene liegen. (Vergl. Fig. 1 mit dem zugehörigen Diagramm Fig. 2.)

Die Blüthe besitzt einen annähernd normalen, 5zipfligen, von der Krone bis zum Grund vollständig getrennten Kelch (Fig. 3).

Die Krone (Fig. 4) besteht dagegen aus 3 successiven, jedoch bis auf halbe Höhe unter sich verwachsenen Blattkreisen. Die 6 Zipfel des ersten Kronblatt-Kreises waren zurückgeschlagen (ob von Anfang an, oder (?) nur in Folge des Trocknens, lasse ich dahingestellt), ferner relativ derbhäutig, etwas kelchähnlich, doch von blauen Rippen durchzogen. Die 5 Zipfel des mittlern und besonders die 6 des innersten Kreises waren hingegen aufrecht, zart, blumenblattartig gefärbt <sup>1)</sup>, dabei relativ lang und schmal.

Von Antheren war an sämtlichen Kronzipfeln keine Spur zu sehen, wie denn auch innerhalb der Krone keine Staubgefäße vorkamen.

Im Centrum der Blüthe befand sich ein stempelähnliches, jedoch 3griffeliges und 3narbiges Gebilde (Fig. 5), das aus 3 weit hinauf zusammenneigenden, aber bis zum Grund völlig getrennten, nach innen rinnenförmigen und je 2 Reihen abortirter Eier tragenden Blättern (offen- und freigebliebene Carpelle) bestand, und — wie sich bei Ausbreitung der 3 Carpelle mittels Praeparirnadeln ergab — im Innern noch 2 kleinere, rinnige, jedoch sterile und 2 sehr kleine Blattanlagen umfassende Carpelle barg (Fig. 6).

<sup>1)</sup> In Folge des Aufweichens ist die Farbe jetzt theilweise verblasst.

Soll ich das Wesen der Bildungsabweichung mehr nach Art von Freund Brügger angeben, so würde ich sagen:

- a) Kelch fast normal.
- b) Kronblatt-Kreis mehr weniger kelchartig geworden.
- c) Die normal mit der Kronbasis verschmolzenen Staubgefäße, so weit frei, petaloïdisch, überdies vermehrt. Die überzähligen Staubgefäße ebenfalls kronenartig, einen dritten, mit den zwei vorausgegangenen unten verwachsenen Kronblatt-Kreis darstellend.
- d) Carpelle gleichfalls vermehrt. Näheres s. oben.

Dass Freund Brügger, der die Blüten nur von aussen zu betrachten Gelegenheit hatte, Vervielfältigung der Kelchglieder vor sich zu haben glaubte, ist sehr begreiflich. Die Resultate der Zergliederung der Blüte, insbesondere das völlige Freisein des eigentlichen Kelches und die Verwachsung der 3 folgenden Kreise bis auf halbe Höhe, sind, wie ich glaube, für meine Darlegung entscheidend.“

*Zürich, den 24. Juni 1889.*



### III.

## Wein-Analysen.

Ausgeführt im chemischen Laboratorium der Kantons-  
schule in Chur.

---

Mitgetheilt von Dr. E. Bosshard.

---

Die bei diesen Analysen angewandten Methoden sind im Wesentlichen die vom Verein schweiz. analytischer Chemiker vereinbarten; es ist darüber nur Folgendes zu bemerken.

Die Alkoholbestimmung geschah durch Ermittlung des specifischen Gewichtes des Destillates mit der Mohr-Westphal'schen Waage, welche jedesmal zuvor auf destillirtes Wasser von 15° C. eingestellt war. Der Trockenrückstand (Extract) wurde direct bestimmt, durch Eindampfen in flachen Platinschalen und 2 $\frac{1}{2}$  stündiges Trocknen im Wassertrockenschranke. Bei den meisten Analysen wurde überdies zur Controle eine indirecte Extractbestimmung vorgenommen, durch Bestimmung des specifischen Gewichtes des entgeisteten und auf das ursprüngliche Volum aufgefüllten Weines. Die betreffenden Zahlen sind das arithmetische Mittel aus den Angaben der Extracttabellen von Hager und von Schultze.

Das Veraschen geschah bei dunkler Rothgluth.

Die Aciditæet (Gesammtsäuregehalt) ist wie üblich auf Weinsäure berechnet, die flüchtigen Säuren als Essigsäure. Gerb- und Farbstoff wurde nach der Neubauer-Löwenthal'schen

Methode (Borgmann, Analyse des Weins, 1884 pag. 99) bestimmt, Glycerin nach Borgmann.

Die Analysen wurden in Gemeinschaft mit meinem jeweiligen Assistenten ausgeführt.

Alle untersuchten Weine sind *Rothweine*.

Das Material zu den *Veltlinerwein-Analysen* verdanke ich zum grössten Theil Herrn Hauptm. U. Conzetti in Chur nämlich Nr. 3, 4, 7—14, 18—21, 23. Die Nummern 15—22 und 24 wurden mir von Herrn D. Hatz in Chur geliefert. Nr. 12—24 wurden speciell in der Absicht Normal-Analysen zu bekommen untersucht. Herkunft und Jahrgang dieser Weine wurde mir von den betreffenden Herren garantirt. Nr. 8—11 sollten als Krankenweine verwendet werden und sind ebenfalls garantirt ächt, ebenso Nr. 7.

Die Weine aus dem *Churer Rheinthal* wurden fast sämmtlich bei der kantonalen Lebensmittelcontrolle durch Herrn Bezirksarzt Dr. Franz in Maienfeld eingesandt. Ausgenommen sind Nr. 26, von Herrn J. Franz, Nr. 27 von Herrn J. P. Enderlin, Nr. 28 von Herrn Major Merz und Nr. 29 von Hrn. Reg.-Rath. v Salis, sämmtlich in Maienfeld. Diese Weine wurden mir als Vergleichsmaterial durch das Kreisamt Maienfeld unter Garantie der Aechtheit übersandt. Dass auch die übrigen Nummern dieser Gruppe ihrer Bezeichnung entsprechen, erhellt aus der auffallenden Gleichartigkeit ihrer Zusammensetzung; bestimmte Garantien in dieser Beziehung bestehen allerdings nicht.

Nr. 50—54 stammen aus dem Keller des Kurhauses Davos-Platz; Nr. 55—58 wurden mir von Herrn Hauptm. Conzetti in Chur übergeben.

# I. Veltliner - Weine.

| Nr. | Bezeichnung        | Jahr-<br>gang | Detail-<br>Preis<br>per Liter<br>fls. | Alkohol |        | Trockenrück-<br>stand |          | Gramm per Liter         |                                |                                                  |                           |                                                     | Specif.<br>Ge-<br>wicht | Bemerkungen | Datum<br>der<br>Analyse |
|-----|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|     |                    |               |                                       | Volum % | Rew. % | direct                | indirect | Miner-<br>al-<br>Stoffe | Acidität als<br>Weinsäure her. | Flüchtige Sä-<br>ren als Essig-<br>säure berech. | Farb-<br>und<br>Gerbstoff | Phosphor-<br>säure<br>P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |                         |             |                         |
| 1   | Veltliner, guter   | 1884          | 120                                   | 8,72    | 7,00   | 21,04                 | 2,44     | 6,40                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 85                   |
| 2   | Veltliner          | 1884          | 100                                   | 9,21    | 7,40   | 20,90                 | 2,28     | 7,30                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 85                   |
| 3   | Montagna           | 1884          | 120                                   | 9,45    | 7,60   | 24,09                 | 2,31     | 7,37                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 85                   |
| 4   | Veltliner          | 1884          | 70                                    | 7,83    | 6,28   | 20,36                 | 2,16     | 7,52                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 85                   |
| 5   | Veltliner          | 1885          | 90                                    | 8,72    | 7,00   | 22,30                 | 2,17     | 7,70                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 85                   |
| 6   | Veltliner          | 1885          | 90                                    | 10,30   | 8,29   | 24,90                 | 2,50     | 8,97                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 85                   |
| 7   | Veltliner          | 1885          | 90                                    | 9,04    | 7,27   | 17,24                 | 1,74     | 6,71                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 86                   |
| 8   | Sassella, hochfein | 1885          |                                       | 13,24   | 10,69  | 23,55                 | 2,25     | 6,69                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | V. 87                   |
| 9   | Grumello, hochfein | 1885          |                                       | 12,96   | 10,46  | 23,41                 | 2,23     | 6,84                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | V. 87                   |
| 10  | Sa-sella, fein     | 1885          |                                       | 11,96   | 9,64   | 21,48                 | 2,18     | 6,26                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | V. 87                   |
| 11  | Montagna, fein     | 1885          |                                       | 10,56   | 8,50   | 19,82                 | 2,37     | 5,93                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | V. 87                   |
| 12  | Sassella, fein     | 1886          | 150                                   | 12,13   | 9,79   | 23,40                 | 2,22     | 6,10                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 13  | Grumello, hochfein | 1886          | 180                                   | 12,31   | 9,93   | 22,79                 | 2,15     | 6,28                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 14  | Grumello, fein     | 1886          | 150                                   | 11,26   | 9,07   | 22,80                 | 2,14     | 6,14                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 15  | Castione           | 1886          | 85                                    | 9,62    | 7,73   | 19,34                 | 19,2     | 6,99                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 16  | Montagna           | 1886          | 140                                   | 12,49   | 10,08  | 25,15                 | 2,45     | 6,50                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 17  | Ponte              | 1886          | 75                                    | 9,62    | 7,73   | 18,89                 | 18,4     | 6,20                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 18  | Valgella, ordinär  | 1887          | 55                                    | 8,63    | 6,93   | 17,56                 | 16,9     | 5,71                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 19  | Valgella, gut      | 1887          | 100                                   | 12,05   | 9,71   | 21,78                 | 21,8     | 6,28                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 20  | Valgella, fein     | 1887          | 120                                   | 14,43   | 10,85  | 23,26                 | 22,3     | 6,92                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 21  | Sa-sella, fein     | 1887          | 120                                   | 13,05   | 10,54  | 20,45                 | 25,3     | 6,14                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 22  | Sassella, fein     | 1887          | 125                                   | 11,87   | 9,57   | 21,54                 | 20,0     | 6,26                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 23  | Grumello, fein     | 1887          | 130                                   | 13,05   | 10,54  | 25,76                 | 23,8     | 6,22                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
| 24  | Tresvivo           | 1887          | 80                                    | 10,73   | 8,64   | 22,30                 | 22,8     | 6,28                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
|     | Mittel             |               |                                       | 10,97   |        | 23,00                 | 2,30     | 6,76                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
|     | Minimum            |               |                                       | 7,83    |        | 17,24                 | 1,74     | 5,71                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |
|     | Maximum            |               |                                       | 14,43   |        | 26,45                 | 3,12     | 8,97                    |                                |                                                  |                           |                                                     |                         |             | W. 88                   |

# II. Weine aus dem Churer Rheinthal.

| Nr. | Bezeichnung              | Jahr-gang | Behältnis-Preis per liter (Vs.) | Alkohol     |          | Gramm per liter  |                    | Specific-Grav-wicht | Bemerkungen | Datum der Analyse |
|-----|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|     |                          |           |                                 | Volunt. o/o | gew. o/o | Trockenrückstand | Milch-trail-Stoffe |                     |             |                   |
| 25  | Churer                   | 1885      | 150                             | 9,62        | 7,73     | 23,10            | 2,20               | 8,10                |             | V. 86             |
| 26  | Maienfelder              | 1885      |                                 | 9,45        | 7,60     | 22,42            | 2,20               | 5,61                |             | V. 86             |
| 27  | Maienfelder Abzugwein    | 1885      |                                 | 9,45        | 7,60     | 21,79            | 2,24               | 6,11                |             | XI. 86            |
| 28  | Maienfelder Druckwein    | 1885      |                                 | 9,54        | 7,67     | 21,21            | 2,23               | 6,01                |             | XI. 86            |
| 29  | Maienfelder Abzugwein    | 1885      |                                 | 9,04        | 7,27     | 19,86            | 2,24               | 6,25                |             | XI. 86            |
| 30  | Maienfelder              | 1886      |                                 | 10,30       | 8,29     | 20,94            | 2,18               | 6,04                |             | III. 87           |
| 31  | Maienfelder              | 1886      |                                 | 9,95        | 8,00     | 22,10            | 2,03               | 6,70                |             | III. 87           |
| 32  | Maienfelder              | 1886      |                                 | 10,73       | 8,64     | 25,75            | 2,61               | 6,03                |             | III. 87           |
| 33  | Maienfelder              | 1886      |                                 | 9,70        | 7,80     | 25,34            | 2,58               | 6,80                |             | III. 87           |
| 34  | Maienfelder              | 1886      |                                 | 10,73       | 8,64     | 25,20            | 2,52               | 5,90                |             | III. 87           |
| 35  | Maienfelder              | 1886      |                                 | 11,44       | 9,21     | 26,32            | 2,66               | 5,45                |             | III. 87           |
| 36  | Jenuser                  | 1886      |                                 | 9,70        | 7,80     | 25,43            | 2,32               | 7,63                | 0,9972      | III. 87           |
| 37  | Jenuser                  | 1886      |                                 | 10,30       | 8,29     | 26,50            | 2,73               | 7,88                | 0,9975      | III. 87           |
| 38  | Jenuser                  | 1886      | 120                             | 10,73       | 8,64     | 25,66            | 2,37               | 7,79                | 0,9975      | III. 87           |
| 39  | Igls                     | 1886      |                                 | 10,30       | 8,29     | 27,61            | 2,17               | 8,80                |             | III. 87           |
| 40  | Igls                     | 1886      |                                 | 9,37        | 7,53     | 24,83            | 2,46               | 6,54                | 0,9995      | III. 87           |
| 41  | Igls                     | 1886      |                                 | 9,54        | 7,67     | 25,89            | 2,51               | 6,44                |             | III. 87           |
| 42  | Landw. ansug in Unteryaz | 1886      |                                 | 8,72        | 7,60     | 26,66            | 2,7,6              | 7,53                |             | III. 87           |
| 43  | Landwein "               | 1886      |                                 | 9,70        | 7,80     | 24,68            | 2,35               | 7,38                |             | V. 87             |
| 44  | Landwein " Mastriis      | 1886      |                                 | 8,45        | 6,78     | 23,85            | 2,31               | 7,37                |             | V. 87             |
| 45  | Landwein " Mastriis      | 1886      |                                 | 9,04        | 7,27     | 23,88            | 2,41               | 6,92                |             | V. 87             |
| 46  | Zizers                   | 1886      |                                 | 8,01        | 6,43     | 25,37            | 2,84               | 7,06                |             | V. 87             |
| 47  | Zizers                   | 1886      | 120                             | 9,86        | 7,93     | 20,24            | 2,20               | 6,04                |             | V. 87             |
| 48  | Zizers                   | 1886      |                                 | 9,04        | 7,27     | 25,20            | 2,86               | 5,89                |             | V. 87             |
| 49  | Zizers                   | 1886      |                                 | 10,56       | 8,50     | 21,28            | 2,96               | 5,96                |             | V. 87             |
|     | Mittel                   |           |                                 | 9,73        |          | 24,05            | 2,48               | 6,78                |             |                   |
|     | Minimum                  |           |                                 | 8,01        |          | 19,86            | 2,03               | 5,45                |             |                   |
|     | Maximum                  |           |                                 | 11,44       |          | 27,61            | 3,11               | 8,80                |             |                   |

### III. Bordeaux - Weine.

| Nr.                          | Bezeichnung                | Jahrgang | Detail-Preis per Liter (frs.) | Alkohol |          | Gramm per Liter  |          |                |                             |                 |               | Specif. Gewicht | Bemerkungen  | Datum der Analyse |
|------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------|----------|------------------|----------|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
|                              |                            |          |                               | Volum % | (bev. %) | Trockenrückstand |          | Mineral-Stoffe | Acidität als Weinsäure bet. | Eisigsäure bet. | Kalium-sulfat |                 |              |                   |
|                              |                            |          |                               |         |          | direct           | indirect |                |                             |                 |               |                 |              |                   |
| 50                           | Medoc                      | 1883     |                               | 10,50   | 8,50     | 21,68            | 21,5     | 2,58           | 6,6                         | 0,92            | 1,5           | 0,9952          |              | 1. 88             |
| 51                           | Medoc                      | 1884     |                               | 10,38   | 8,36     | 21,78            | 22,3     | 2,48           | 6,3                         | 0,97            | 1,2           | 0,9952          |              | 1. 88             |
| 52                           | Medoc                      | 1885     |                               | 11,00   | 8,86     | 23,60            | 22,0     | 2,34           | 5,8                         | 0,96            | 1,2           | 0,9946          |              | 1. 88             |
| 53                           | Medoc                      | 1886     |                               | 9,29    | 7,49     | 22,20            | 22,0     | 2,54           | 5,6                         | 1,06            | 1,2           | 0,9962          |              | 1. 88             |
| 54                           | Medoc                      | 1887     |                               | 10,47   | 8,43     | 21,16            | —        | 2,60           | 6,1                         | 0,98            | 1,3           | 0,9964          |              | 1. 88             |
| <b>IV. Toscaner - Weine.</b> |                            |          |                               |         |          |                  |          |                |                             |                 |               |                 |              |                   |
| 55                           | Chianti                    | 1888     | 75                            | 10,38   | 8,36     | 19,92            | 21,5     | 1,96           | 5,92                        | —               | weniger als 1 | 0,9946          | Glycerin 8,6 | 11. 89            |
| 56                           | Carmignano                 | 1888     | 65                            | 9,62    | 7,73     | 21,32            | 21,7     | 1,90           | 6,60                        | 2,22            | weniger als 1 | 0,9955          |              | 11. 89            |
| 57                           | Collina Toscana (Certaldo) | 1888     | 55                            | 9,04    | 7,27     | 20,38            | 20,4     | 2,12           | 6,32                        | 2,27            | weniger als 1 | 0,9966          |              | 11. 89            |
| 58                           | Toscaner                   | 1888     | 45                            | 8,54    | 6,86     | 23,75            | 22,8     | 2,20           | 6,97                        | —               | weniger als 1 | 0,9985          |              | 111. 89           |

Besonders charakteristische Kennzeichen für die *Veltlinerweine* ergeben sich auch aus dieser ausgedehnteren Analysenreihe nicht, wie schon aus den Analysen des Herrn Dr. R. Meyer<sup>1)</sup> eine auffallende Verschiedenheit dieser Weine von Rothweinen anderer Herkunft sich nicht erkennen liess. Die dort ausgesprochene Vermuthung, dass der Extractgehalt der Veltlinerweine nicht unter 2 % (20 gr. per Liter) herabsinke, hat sich nicht bestätigt. Der mittlere Extractgehalt der sich aus den hier mitgetheilten Zahlen berechnet, beträgt allerdings 23 gr. per Liter (2,3 %); das beobachtete Minimum indessen war 17,24 gr. (1,72 %).

Für die Beurtheilung der Veltlinerweine ist man auch fernerhin auf den Vergleich mit notorisch ächten Weinen gleicher Herkunft und gleichen Jahrganges angewiesen. Es wird daher auch in Zukunft nöthig sein möglichst viel Vergleichsmaterial, besonders auch geringerer Sorten und Jahrgänge zu sammeln.

Die *Weine des Churer Rheinthaales* stehen in ihrer Zusammensetzung, so weit es sich aus der Bestimmung der Hauptbestandtheile beurtheilen lässt, manchen Burgunderweinen im Allgemeinen nahe. Sie sind durchschnittlich etwas reicher an Extractstoffen als Veltlinerweine, aber etwas ärmer an Alkohol als die besseren Sorten dieser. Durch sorgfältigere Behandlung als sie ihnen gewöhnlich beim Vergähren zu Theil wird, dürfte sich, wenigstens in günstigen Jahrgängen, ihre Qualität noch erheblich verbessern lassen. Das Material ist gut und verdient ein besseres Schicksal als in Form von trübem Sauser getrunken zu werden bevor seine edlen Eigenschaften zum Vorschein gekommen sind.

<sup>1)</sup> Dieser Jahresbericht XXVIII. pag. 83.

#### IV.

## Beiträge

zur

# Kenntniss bündnerischer Trinkwasser.

Von Dr. E. Bosshard.

---

Die nachfolgend mitgetheilten Wasser-Analysen wurden in den Jahren 1885—1890 im chemischen Laboratorium des Kantons Graubünden ausgeführt, zumeist in der Absicht ein Urtheil über die Brauchbarkeit der betreffenden Wasser als Trinkwasser zu erlangen. Ueber die dabei befolgten Grundsätze und die Bedeutung der einzelnen Zahlenresultate sind folgende Angaben zu machen.

Von einer *vollständigen* Analyse d. h. Bestimmung der Menge sämtlicher vorkommenden Bestandtheile wurde in allen Fällen abgesehen. Die Kenntniss auch der in geringsten Mengen vorhandenen Mineralbestandtheile ist nur bei zu Heilzwecken verwendeten Mineralwassern von Nutzen, für die Beurtheilung eines Trinkwassers dagegen vollkommen unnütz, falls diese Stoffe nicht dem Wasser einen ausgesprochenen Geschmack verleihen. Für die Trinkwasser-Analyse kommen nur die Bestimmungen solcher Stoffe in Betracht, welche den Gebrauch des Wassers für Genusszwecke in irgend einer Weise bedenklich oder gar gefährlich erscheinen lassen, oder welche

in den Röhrenleitungen oder beim Kochen durch Bildung von Absätzen Unannehmlichkeiten verursachen.

Es ist also in erster Linie auf die *fäulnissfähigen, organischen Bestandtheile* des Wassers und auf die *Fäulnissprodukte* Rücksicht zu nehmen; in zweiter Reihe kommen dann die Gesamtmenge der im Wasser gelösten festen und mineralischen Körper und unter diesen das sich leicht ausscheidende kohlensaure Calcium (Kalk). Die Bestimmung der übrigen mineralischen Stoffe erfordert einen bedeutenden Zeitaufwand und verursacht grössere Kosten, ohne, wie oben angedeutet, einen entsprechenden Nutzen zu gewähren.

Die gewöhnlich ausgeführten Bestimmungen sind demnach:

**1. Feste Bestandtheile** (Trockenrückstand), sind ermittelt durch Eindampfen einer abgemessenen Menge des Wassers und Trocknen des Rückstandes bei der Temperatur des Siedepunktes.

**2. Glührückstand.** Der Trockenrückstand wird in einer Platinschale geglüht, wobei organische Substanzen verbrennen, Krystallwasser (aus dem Gyps) und (Kohlensäure aus den Carbonaten) entweichen. Um die Kohlensäure wieder zuzuführen wird die geglühte Substanz mit Ammoniumcarbonatlösung befeuchtet und dann bei etwa 150° getrocknet.

Die so erhaltenen Stoffe repräsentiren (annähernd) die Gesamtmenge der mineralischen Stoffe, also das was man als die „gesamnte Härte“ eines Wassers bezeichnet. Je 10 Milligramme im Liter sind = 1 Härtegrad zu setzen. „Weiches“ Wasser hat bis etwa 15 Härtegrade, „mittelhartes“ 15 bis 25, „hartes“ über 25 Härtegrade.

**3. Alkalinität,** die Menge der auf Säure neutralisirend wirkenden Stoffe, berechnet auf Kohlensaures Calcium ( $\text{Ca C O}_3$ ).

Zu dieser Bestimmung werden 100 oder 200 CC. des Wassers durch  $\frac{1}{10}$  Normalsäure titirt unter Zusatz von *Methylorange* als Indicator. Calcium- und Magnesiumcarbonat etc. färben Methylorange gelb, freie Mineralsäuren roth; Kohlensäure wirkt nicht darauf ein.

Diese Zahl ersetzt die früher übliche Bestimmung der „*vorübergehenden Härte*“ d. h. derjenigen Stoffe, welche beim Kochen des Wassers sich ausscheiden (Kohlens. Kalk und Kohlens. Magnesia). 10 Milligramme Calciumcarbonat pro Liter sind = 1 Härtegrad (französisch) zu setzen. Die in dieser Weise ermittelte Zahl ist viel genauer als die noch zuweilen ausgeführte Titirung mit Seifenlösung. Sie ist besonders brauchbar für die Beurtheilung des Wassers für technische Zwecke (Kesselspeisewasser etc.).

Auf die Brauchbarkeit des Wassers für Genusszwecke hat dagegen die Härte innerhalb sehr weiter Grenzen keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss.

Wenn das Wasser viel Magnesia enthält kann die auf Kohlens. Kalk berechnete Alkalinität höher ausfallen als der Glührückstand.

**4. Organische Substanzen.** Der Gehalt an solchen bildet einen Hauptanhaltspunkt für die Beurtheilung der Reinheit eines Wassers. Je mehr organische Stoffe dasselbe enthält, desto geeigneter wird es wohl im Allgemeinen für die Entwicklung von Mikroorganismen, besonders Fäulnisspilzen, *Bakterien*, sein; unter den letzteren befinden sich bekanntlich eine ganze Reihe von krankheitserzeugenden Arten, welche durch das Trinkwasser verbreitet werden können. Ein ganz von organischen Stoffen freies Wasser wäre nicht fäulnissfähig. Die Natur der im Wasser gelösten organischen Stoffe

kann sehr verschieden sein; *direct schädliche* Substanzen werden wohl selten vorhanden sein oder doch bei den geringen Mengen die hier in Betracht kommen, kaum eine unmittelbare Wirkung auf den menschlichen Organismus ausüben können.

Da eine genaue Bestimmung der Gesamtmenge der organischen Substanzen im Wasser eben wegen deren Vielgestaltigkeit nicht möglich ist, benutzt man jetzt fast ausschliesslich zu vergleichenden Bestimmungen die Methode von *Kubel und Tiemann*. Man bestimmt wie viel Kaliumpermanganat („Chamäleon“) nöthig ist um die organischen Stoffe bei 5 Minuten langem Kochen in saurer Lösung zu oxydiren.

Die in den Tabellen als organische Substanz bezeichneten Zahlen drücken die verbrauchte Menge Kaliumpermanganat aus, multipliziert mit 5.

Diese Bestimmung ist natürlich nur ausführbar wenn keine andere oxydirbaren Stoffe (z. B. Eisenoxydulverbindungen) vorhanden sind. Ein Gehalt von 50 Milligramm organ. Substanz im Liter gilt als oberste zulässige Grenze, doch sind schon 30—35 Milligramm verdächtig viel. Bei sonst guten Wassern lassen schon geringere Mengen auf zufällige Verunreinigungen schliessen. Wiederholte Bestimmungen in Wasser von der gleichen Quelle zeigen, dass der Gehalt an diesen organischen Stoffen oft ziemlich stark wechselt. Man vergleiche in dieser Beziehung die Analysen des Churer Leitungswassers.

**5. Albuminoïdes Ammoniak.** Nicht alle organischen Stoffe sind in gleichem Masse fäulnissfähig, also der Entwicklung von Mikroben gleich günstig. In dieser Beziehung stehen die eiweissähnlichen Substanzen, „*Albuminoïde*“ obenan.

Sie sind stickstoffhaltig und geben bei der Oxydation in alkalischer Lösung den Stickstoff in Form von Ammoniak ab. Dieses „albuminoïde Ammoniak“ ist demnach ein Maass für die Menge der am leichtesten in Fäulniss übergehenden Stoffe und ist für die Beurtheilung besonders wichtig. Die Bestimmung geschieht nach der Methode von *Wanklyn* durch Destillation des vom freien Ammoniak befreiten Wassers mit alkalischer Lösung von Kaliumpermanganat. Im Destillat wird das Ammoniak auf colorimetrischem Wege ermittelt, durch Vergleichen der Färbung, welche *Nessler's Reagens* (Jodkalium-Jodquecksilberlösung) hervorruft, mit derjenigen, welche in Ammoniaklösungen von bekanntem Gehalt erzeugt wird. Gutes Wasser sollte nicht über 0,05 Milligramm albuminoïdes Ammoniak pro Liter geben.

Bei fortlaufender Controle eines und desselben Wassers gibt diese Bestimmung ein sehr empfindliches Kennzeichen für die Schwankungen in dem Reinheitsgrade des Wassers. Leider ist sie bei den meisten von Laien ohne besondere Instruction gefassten Wasserproben nicht ausführbar, da man nur bei mit grosser Sorgfalt erhobenen Proben entscheidende Resultate erhält; sehr kleine Mengen in den Flaschen enthaltener, oder beim Einfüllen zufällig hineingerathender Unreinigkeiten vermehren die Zahl für Albuminoïdammoniak bedeutend.

**6. Freies Ammoniak** (Ammoniaksalze) sind Produkte der Fäulniss stickstoffhaltiger organischer Substanzen. Ihre Anwesenheit im Wasser in irgend erheblichen Mengen zeigt also an, dass Fäulniss vorgänge in dem Wasser stattgefunden haben oder dass eine Verunreinigung von Fäulnissherden aus vor sich gegangen ist. An und für sich sind sie durchaus

unschädlich. Minimale Mengen davon gerathen übrigens aus der Luft, in welcher Ammoniaksalze fast stets enthalten sind, in jedes Wasser. Die Bestimmung, betreffs deren Beweiskraft das beim Albuminoidammoniak Gesagte auch gilt, geschieht entweder durch directes „Nesslerisiren“ des Wassers oder, genauer, durch Nesslerisiren des Destillates in oben ange-deuteter Weise. Als Grenzzahl gilt 0,02 Milligramm im Liter. Bei reinem Wasser ist der Gehalt in der Regel viel niedriger.

**7. Salpetersaure Salze** sind ebenfalls Produkte vollendeteter Fäulniss und finden sich in schlechten Wassern vor. Der (qualitative) Nachweis geschieht durch die Blaufärbung, welche beim Vermischen des Wassers mit Diphenylamin und concentrirter Schwefelsäure erzeugt wird. Eine quantitative Bestimmung war nur bei einem der vorliegenden Fälle nöthig.

**8. Salpetrigsaure Salze** wurden nur in 4 Fällen gefunden und sind ein sehr schlechtes Zeichen, da sie nur in solchem Wasser vorkommen, in welchem Fäulnissvorgänge statthaben. Der Nachweis geschah mit Jodzink und Stärke.

**9. Chloride**, hauptsächlich Kochsalz, kommen im bündnerischen Boden nur in sehr geringen Mengen vor, in grosser Menge dagegen in thierischen Auswurfstoffen. Anwesenheit grösserer Quantitäten davon deutet daher auf Verunreinigungen schlimmster Art, wobei dann stets auch die übrigen Fäulnissstoffe vorhanden sind. Durch Vermischen mit saurer Silbernitratlösung sind Chloride leicht nachzuweisen, wurden aber meist nur in Spuren oder gar nicht und nur bei drei Wassern in grösserer Menge aufgefunden.

Die Auswahl dieser Methoden für die Zwecke der Trinkwasserbeurtheilung rührt von Herrn Prof. Dr. Lunge am

eidgen. Polytechnikum in Zürich her; sie sind seit 1888 auch vom Verein schweiz. analytischer Chemiker acceptirt worden.

Andere Bestimmungen, welche in einzelnen Fällen nöthig wurden, sind nach den allgemeinen üblichen Methoden ausgeführt.

Die *mikroskopische Untersuchung* ergänzt stets die chemische, ergab aber nur bei deutlich trüben Wasserproben ein erwähnenswerthes Resultat. Kleinere Mengen Bakterien sind in jedem Wasser enthalten.

Bei der seit Herbst 1889 regelmässig ausgeführten Controle des Churer Leitungswassers wird nun auch stets eine *Zählung des Gehaltes an Bakterien* vorgenommen, verbunden mit mikroskopischer Untersuchung der aus dem Wasser gezüchteten Spaltpilze. Zwei der erhaltenen „Bakterienzahlen“, die Anzahl der aus 1 CC. Wasser auf Nährgelatine zur Entwicklung gelangten Pilzkeime ausdrückend, sind in den Tabellen angegeben. Sie sind im Vergleich zum Keimgehalt anderer Quellwasser sehr günstig. Vermuthlich wird indessen in der warmen Jahreszeit der Gehalt auch ein grösserer werden. Derartige Bakterienzählungen sind nur in unter besonderen Vorsichtsmassregeln gefasstem und transportirtem Wasser mit Erfolg ausführbar. Eine Untersuchung verdächtigen Wassers speciell auf krankheitserzeugende Bakterien ist ebenfalls nur thunlich, wenn das Wasser unter besonderen Cautelen eigens zu diesem Zweck gefasst wurde.

Was die Verwendung von Analysen-Ergebnissen für die Beurtheilung der Brauchbarkeit eines Wassers betrifft, so ist zu betonen, dass eine nur einmalige chemische Untersuchung einer Quelle nur dann ein sicheres Urtheil erlaubt, wenn die Beschaffenheit des Sammelgebietes der Quelle die Mög-

lichkeit zufälliger Verunreinigungen ausschliesst. Wo, was meist der Fall ist, eine solche Gewähr nicht gegeben ist, sollten die Wasserproben für eine einmalige Analyse immer nur unter den für die Quelle ungünstigsten Verhältnissen, also bei andauernder regnerischer Witterung, nie aber bei gefrorenem Boden oder bei grosser Trockenheit geschöpft werden. Erweist sich dann unter solchen Umständen ein Wasser als genügend rein, so wird man meist annehmen dürfen, dass die betreffende Quelle auch bei günstigeren Verhältnissen reines Wasser geben wird.

Ein einziges ungünstiges Ergebniss dagegen wird auch durch viele gute Resultate nicht entkräftet. Die gleichen Faktoren, welche einmal das Wasser verunreinigten, können später wieder wirksam werden, auch wenn sie zwischenhinein lange Zeit keinen Einfluss hatten. Trinkwasser, welches sich einmal als stark verunreinigt erwies, bildet eine stete Gefahr für die Consumenten, wenn nicht die Ursachen der Verunreinigung beseitigt werden. Die chemische und mikroskopische Untersuchung sagt uns nur was für Stoffe und in welchen Mengen sie im Wasser enthalten sind. Auf welchem Wege sie dagegen hineingelangen, ist nur durch eine genaue (geologische) Untersuchung der Bodenbeschaffenheit des Quell- und Leitungs-Gebietes festzustellen. In dieser Beziehung sind häufige Temperaturmessungen sehr nützlich. Schwankt die Temperatur des Wassers nur innerhalb geringer Grenzen, so wird dies auf ein tiefes Einsickern des Wassers im Boden und daherige gründliche Filtration deuten. Derartige Quellen werden meist ein auch seiner Qualität nach gleichmässiges Wasser liefern.

# Analysen bündnerischer Trinkwasser.

(Ausgeführt im chemischen Laboratorium des Kantons Graubünden.)

| Nr. | Ort oder Gemeinde    | Name der Quelle oder des Brunnens  | Datum der Probe-nahme | Gesteinart aus der das Wasser kommt | Mikrogramme im Liter |              |                                                              |                       |                   |                 |             |              |          |             | Bemerkungen    |                                   |
|-----|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------------|
|     |                      |                                    |                       |                                     | Poly-Borax-Äquival.  | Wolframsäure | Mangan-Äquival. C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> O <sub>7</sub> | Organische Substanzen | Phosphor-Äquival. | Freies Ammoniak | Selenwasser | Silberwasser | Chloride | Gyps        |                |                                   |
| 1   | Alvens               | Noveins, Quelle Flogi              | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 217.0                | 190.0        | 182.0                                                        | 5.84                  | —                 | berüh. Spur     | Spur        | 0            | 0        | Spur        | Spur           | Viel Magnesia. (Ureline Flasche). |
| 2   | Alvans               | Oberer Quelle                      | IV. 88                | Kalk                                | 257.6                | 176.8        | 220.6                                                        | 69.00                 | —                 | Spur            | 0           | 0            | 0        | Spur        | Spur           |                                   |
| 3   | Alvans               | Quellbächen                        | IV. 88                | Kalk                                | 229.2                | 148.8        | 204.5                                                        | 7.50                  | —                 | Spur            | 0           | 0            | 0        | Spur        | Spur           |                                   |
| 4   | Alvans               | Leitung 5 Quellen                  | IV. 88                | Kalk                                | 196.0                | 144.8        | 193.7                                                        | 22.00                 | —                 | Spur            | 0           | 0            | 0        | Spur        | Spur           |                                   |
| 5   | Adler                | (Kesselsteinswasser)               | IX. 88                | Kalk                                | 373.0                | —            | —                                                            | 143.0                 | —                 | —               | —           | —            | —        | —           | —              |                                   |
| 6   | Adler                | Alle Dorfbrunnen                   | XI. 89                | Gneiss                              | 119.5                | 109.5        | 80.5                                                         | 19.00                 | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | 0           | 0              |                                   |
| 7   | Castasgna            | Quelle                             | VI. 89                | Gneiss                              | —                    | —            | —                                                            | 21.70                 | —                 | 0.06            | 0           | 0            | 0        | berüh. Spur | —              |                                   |
| 8   | Castasgna            | Brunnen I                          | VI. 89                | Gneiss                              | —                    | —            | —                                                            | 69.9                  | —                 | 0.04            | 0           | 0            | 0        | berüh. Spur | —              |                                   |
| 9   | Castasgna            | Brunnen II                         | VI. 89                | Gneiss                              | —                    | —            | —                                                            | 69.9                  | —                 | 0.04            | 0           | 0            | 0        | berüh. Spur | —              |                                   |
| 10  | Celerina             | ?                                  | X. 85                 | Verrucano?                          | 278.0                | 216.0        | 1200.0                                                       | 8.05                  | 0.007             | 0.02            | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 11  | Chr. Martinsplatz    | Brambrischer-Leitung               | XV. 85                | (Grundwasser)                       | 356.0                | 394.0        | 270.0                                                        | 30.5                  | 0.05              | 0.03            | 1.52        | 0            | 0        | 2.1         | —              |                                   |
| 12  | Chr. Poststrasse     | Rüschbachwasser                    | XI. 85                | (Fraser)                            | 200.0                | 132.0        | 180.0                                                        | 79.7                  | 0.17              | 0.12            | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 13  | Chr. Gänggeli        | Pamprensens                        | IX. 85                | (Grundwasser)                       | 36.0                 | 32.0         | 17.2                                                         | 31.2                  | —                 | —               | —           | —            | —        | 96.38       | —              |                                   |
| 14  | Chr. Wallweg         | Brunnen beim Pavillon              | IX. 87                | Bündnerschiefer                     | 308.0                | —            | 156.0                                                        | —                     | —                 | —               | —           | —            | —        | —           | —              |                                   |
| 15  | Chr. Sigenstrasse    | Parpner-Leitung                    | III. 88               | Bündnerschiefer                     | 116.0                | 133.0        | 133.78                                                       | 7.05                  | 0.07              | 0.03            | 0           | 0            | 0        | —           | —              |                                   |
| 16  | Chr. Sigenstrasse    | Parpner-Leitung                    | VII. 89               | Bündnerschiefer                     | 152.0                | 135.0        | 113.02                                                       | 9.33                  | 0.03              | 0.010           | 0           | 0            | 0        | —           | —              |                                   |
| 17  | Chr. Laboratorium    | Parpner-Leitung                    | X. 89                 | Bündnerschiefer                     | —                    | —            | —                                                            | 190.8                 | 32.48             | 0.008           | 0.010       | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 18  | Chr. Laboratorium    | Parpner-Leitung                    | XI. 89                | Bündnerschiefer                     | —                    | —            | —                                                            | 329.8                 | 14.13             | 0.018           | 0.010       | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 19  | Chr. Laboratorium    | Parpner-Leitung                    | XII. 89               | Bündnerschiefer                     | —                    | —            | —                                                            | 129.8                 | 10.14             | 0.02            | 0.008       | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 20  | Chr. Laboratorium    | Parpner-Leitung                    | II. 90                | Bündnerschiefer                     | —                    | —            | —                                                            | 120.8                 | 4.19              | 0.016           | 0.008       | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 21  | Chr. Laboratorium    | Städtisch-Leitung                  | III. 90               | Bündnerschiefer                     | —                    | —            | —                                                            | 137.9                 | 10.87             | 0.020           | 0.018       | Spur         | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 22  | Ems                  | Quelle I                           | X. 89                 | Bündnerschiefer                     | 294.0                | 273.5        | 261.8                                                        | —                     | —                 | —               | —           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 23  | Ems                  | Quelle II                          | X. 89                 | Bündnerschiefer                     | 240.5                | 235.5        | 181.2                                                        | —                     | —                 | —               | —           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 24  | Fileris              | (Kesselsteinswasser)               | IX. 88                | Bündnerschiefer                     | 521.0                | —            | —                                                            | 301.0                 | —                 | —               | —           | —            | —        | —           | —              |                                   |
| 25  | Inaz                 | Haupt-, obere Quelle               | VII. 88               | Verrucano                           | 280.0                | 215.0        | 204.4                                                        | 42.9                  | —                 | Spur            | Spur        | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 26  | Inaz                 | Rainn, untere Quelle               | VII. 88               | Verrucano                           | 240.0                | 222.0        | 204.4                                                        | 12.15                 | —                 | Spur            | Spur        | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 27  | Katzis, Valcina      | Quelle                             | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 272.0                | 251.0        | 225.0                                                        | 4.36                  | 0.36              | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 28  | Katzis, Lavoz        | Brunnen-Quelle                     | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 302.0                | 245.0        | 247.0                                                        | —                     | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 29  | Katzis, Vignolatobel | ?                                  | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 250.0                | 209.0        | 209.0                                                        | 14.6                  | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 30  | Katzis, Vignolatobel | Mühlbach-Quelle                    | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 256.0                | 180.0        | 195.0                                                        | 18.98                 | —                 | Spur            | Spur        | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 31  | Katzis, Savans       | Quelle Riedel                      | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 291.0                | 209.0        | 204.0                                                        | 11.12                 | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 32  | Katzis, Vignolwald   | Baria-Quelle                       | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 229.0                | 210.0        | 204.0                                                        | 2.92                  | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 33  | Katzis, Vignolwald   | Unterbrunnen                       | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 292.0                | 184.0        | 183.0                                                        | 7.30                  | —                 | Spur            | Spur        | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 34  | Landquart            | (Grundwasser)                      | XI. 89                | Bündnerschiefer                     | 248.0                | —            | —                                                            | 65.5                  | —                 | —               | —           | —            | —        | —           | 6.48           |                                   |
| 35  | Landquart            | Fardella-Leitung                   | V. 89                 | Bündnerschiefer                     | 228.0                | 197.0        | 177.8                                                        | 40.8                  | —                 | 0.3             | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 36  | Lenz, Saros I        | (für Alvaschein)                   | VI. 89                | Bündnerschiefer                     | 168.0                | 434.0        | 339.0                                                        | 14.98                 | —                 | 0.04            | 0           | 0            | 0        | 115.0       | Spur Magnesia. |                                   |
| 37  | Lenz, Saros II       | (für Alvaschein)                   | VI. 89                | Bündnerschiefer                     | 460.0                | 332.0        | 312.0                                                        | 19.78                 | —                 | 0.04            | 0           | 0            | 0        | Spur        | 119.8          |                                   |
| 38  | Lenz                 | Quelle Bernett Simoon              | III. 89               | Bündnerschiefer                     | 310.0                | 325.0        | 324.0                                                        | 17.35                 | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 39  | Lenz                 | Quelle Jae. Willi                  | III. 90               | Schiefer                            | 438.0                | 408.0        | 317.2                                                        | 21.89                 | —                 | 0               | Spur        | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 40  | Lenz                 | Quelle M. Nadig                    | III. 90               | Schiefer                            | 447.0                | 405.0        | 319.7                                                        | 19.57                 | —                 | 0               | Spur        | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 41  | Lenz                 | Quelle Erl. Simoon                 | III. 90               | Schiefer                            | 455.0                | 430.0        | 347.4                                                        | 20.97                 | —                 | 0               | Spur        | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 42  | Mascin               | Quelle Camastral im Maseiner Riedl | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 389.0                | 309.0        | 293.0                                                        | 1.46                  | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 43  | Mascin, Lochmühle    | Quelle Schreneloren                | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 280.0                | 245.0        | 211.0                                                        | 4.38                  | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 44  | Mascin, Lochmühle    | Crestafis-Quelle                   | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 216.0                | 171.0        | 182.0                                                        | 5.84                  | —                 | Spur            | Spur        | 0            | 0        | 0           | Spur           |                                   |
| 45  | Mona                 | Quelle bei Villa Inn               | VII. 87               | Bündnerschiefer                     | 320.0                | 280.0        | 240.0                                                        | 0                     | —                 | Spur            | 0           | 0            | 0        | 21.0        | Spur           |                                   |
| 46  | St. Moritz-Bad       | (Kesselsteinswasser)               | IX. 85                | Granit                              | 800.0                | 720.0        | 57.7                                                         | Spur                  | 0.116             | 0.006           | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 47  | St. Moritz-Bad       | (Kesselsteinswasser)               | IX. 88                | Granit                              | —                    | —            | —                                                            | 21.0                  | —                 | —               | —           | —            | —        | —           | —              |                                   |
| 48  | Parölla              | Quelle Hoshi                       | IX. 87                | Bündnerschiefer                     | 188.0                | 164.0        | 120.0                                                        | 10.50                 | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 49  | Paspels-Canova       | Van Andasse des Nees               | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 260.0                | 217.0        | 161.0                                                        | 7.30                  | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 50  | Paspels-Canova       | Gemeinde-Leitung                   | IX. 85                | Bündnerschiefer                     | 112.0                | 130.0        | 161.0                                                        | 51.89                 | 2.75              | 1.10            | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 51  | Paspels              | Gemeindebrunnen                    | IX. 85                | Bündnerschiefer                     | 222.0                | 160.0        | 111.0                                                        | 45.30                 | 1.95              | 1.40            | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 52  | Paspels              | Gemeindebrunnen                    | IX. 85                | Bündnerschiefer                     | 217.0                | 140.0        | 157.0                                                        | 42.10                 | 0.57              | 0.05            | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 53  | Rösch                | Quelle Jeklin                      | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 119.0                | 165.0        | 139.0                                                        | 4.38                  | —                 | 0               | Spur        | 0            | 0        | 0           | Spur           |                                   |
| 54  | Rothenbrannen        | Dorfbrunnen                        | IX. 88                | Bündnerschiefer                     | 521.0                | —            | —                                                            | 301.0                 | —                 | —               | —           | —            | —        | —           | —              |                                   |
| 55  | Sewis I. Pr.         | Isia-Quelle                        | V. 89                 | Bündnerschiefer                     | 222.0                | 200.0        | 188.4                                                        | 29.30                 | —                 | 0.06            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 56  | Spölin               | Brunnen Schmid                     | XI. 89                | Bündnerschiefer                     | 154.0                | 118.5        | 120.8                                                        | 28.80                 | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 57  | Spölin               | Brunnen Fessli                     | XI. 89                | Bündnerschiefer                     | 156.5                | 151.5        | 140.0                                                        | 21.60                 | —                 | 0.10            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 58  | Spölin               | Platzbrunnen                       | XI. 89                | Bündnerschiefer                     | 131.0                | 121.0        | 118.5                                                        | 15.40                 | —                 | 0.09            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 59  | Tanous               | Oberer Quelle                      | IX. 85                | Dolomit                             | 148.0                | 124.0        | 134.0                                                        | 10.10                 | 0.16              | Spur            | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 60  | Tanous               | Untere Quelle                      | IX. 85                | Dolomit                             | 178.0                | 141.0        | 139.0                                                        | 10.50                 | 0.165             | 0.012           | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 61  | Tanous               | Quelle der Braneri                 | IX. 85                | Dolomit                             | 148.0                | 141.0        | 139.0                                                        | 13.20                 | 0.41              | Spur            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 62  | Tarasp               | I Quelle in Val Pfafin             | IX. 86                | Kalk                                | 110.0                | 130.0        | 95.6                                                         | 45.00                 | Spur              | Spur            | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 63  | Tarasp               | II Quelle in Val Pfafin            | IX. 86                | Kalk                                | 106.0                | 74.0         | 95.6                                                         | 20.00                 | Spur              | Spur            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 64  | Tarasp               | ?                                  | IX. 86                | Kalk                                | 108.0                | 82.0         | 95.6                                                         | 30.10                 | 0.008             | Spur            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 65  | Tarasp               | (Kesselsteinswasser)               | IX. 86                | Kalk                                | 522.0                | 250.0        | 229.6                                                        | 35.00                 | 0.008             | Spur            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 66  | Tarasp               | (Kesselsteinswasser)               | IX. 88                | Schiefer                            | 141.0                | —            | 75.0                                                         | —                     | —                 | —               | —           | —            | —        | —           | —              |                                   |
| 67  | Tarasp               | Baya-Quelle                        | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 203.0                | 181.0        | 182.0                                                        | 2.92                  | —                 | 0               | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 68  | Tiefokasten          | Gyps?                              | X. 85                 | ?                                   | 732.0                | 590.0        | 161.0                                                        | 9.50                  | 0.024             | 0.008           | Spur        | 0            | 0        | 0           | 161.3          |                                   |
| 69  | Tiefokasten          | Quelle mhd. der vorigen            | X. 85                 | Gyps?                               | 732.0                | 614.0        | 137.0                                                        | —                     | —                 | —               | —           | —            | —        | —           | —              |                                   |
| 70  | Tiefokasten          | Quelle ml. der vorigen             | XI. 85                | ?                                   | 376.0                | 270.0        | 217.0                                                        | 8.40                  | 0.01              | Spur            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 71  | Thüsis               | Büdel-Quelle                       | V. 88                 | Bündnerschiefer                     | 229.0                | 194.0        | 177.0                                                        | 5.80                  | —                 | 0               | Spur        | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 72  | Val-Isina            | Im Loch                            | V. 89                 | Bündnerschiefer                     | 220.0                | 210.0        | 198.5                                                        | 21.40                 | —                 | 0.08            | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 73  | Zillis-Reischen      | Quelle bei Zillis                  | VII. 88               | Kalk u. H. Schiefer                 | —                    | —            | —                                                            | 24.30                 | —                 | Spur            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 74  | Zillis-Reischen      | Quelle bei Reischen                | VII. 88               | Kalk u. H. Schiefer                 | —                    | —            | —                                                            | 12.00                 | —                 | Spur            | 0           | 0            | 0        | 0           | —              |                                   |
| 75  | Zillis-Reischen      | Tor I                              | III. 89               | Kalkschiefer                        | 167.5                | 156.5        | 118.4                                                        | 25.88                 | 0.092             | 0.008           | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |
| 76  | Zillis-Reischen      | Tor II (nahe der vorigen)          | III. 89               | Kalkschiefer                        | 172.0                | 166.5        | 126.47                                                       | 18.20                 | 0.092             | 0.000           | 0           | 0            | 0        | Spur        | —              |                                   |

Bodensatz: Algen, Blattroste. Wasser als sehr verdühtig eingeasat.

Suspensierte Stufe 31 Mg. Bodensatz: Infusorienleiche, Sprosszelle, Bakterien in Masse. Janchenfraktion!

Vernureinigt! Temp.: I, VII, 12,6° C; II, VII, 13,4° 25; VII, 13,2° Temp.: 6,2° C.

Temp.: 5,6° C, Bakterienzahl am 5, XII, 8 in 1 CC. Temperatur: 5,3° C, Bakterienzahl 4 in 1 CC.

Mischung von Brambrischer Wasser mit Parpner; Temperatur: 4,9° C.

104 L. pr. M.; Temp. 5,5° C. Bodensatz wie b. Nr. 38. 50 L. pr. M.; Temperatur 7° C. Mehrere Quellen, das Wasser wurde beim Zusammenfluss derselben gefasst.

Bodensatz: Schlamm, Pflanzenreste, Algen, Baumwollfasern, Bakterien, Infusorien.

50 L. pr. M.; Temp. 5,6° C. Wasser etwa 6 m. unterhalb der Quelle gefasst; Bodensatz: Detritus, Baumwollfasern; wenig Bakterien, keine Infusorien.

Bodensatz: viel Detritus, Infusorien, Pflanzenreste. Durch einen Moorbrand vernureinigt.



V.

Meteorologische Beobachtungen in Granbünden.

---

Monats- und Jahresmittel

von

13 Beobachtungsstationen im Jahre 1888.

---

(Aus den Annalen der Schweiz. Meteorolog. Centralanstalt  
XXV. Jahrgang.)



# St. Vittore, 268 Met.

Beobachter: Chr. Lorez und B. Balzer.

| 1888                | Baromet.<br>auf 0 in<br>Millimet.<br>Mittel | Temperatur (C.) |         |         | Relative<br>Fchtigkeit.<br>in %.<br>Mittel | Bewölkg.<br>in %.<br>Mittel | Niederschlag.      |                       |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                     |                                             | Red. Mittel     | Minimum | Maximum |                                            |                             | Anzahl<br>der Tage | Höhe in<br>Millimeter |
|                     |                                             |                 |         |         |                                            |                             |                    |                       |
| Januar . . . . .    | 742.5                                       | — 0.2           | — 9.1   | 15.0    | 80                                         | 15                          | 0                  | 0                     |
| Februar . . . . .   | 732.8                                       | 1.3             | — 7.3   | 14.4    | 83                                         | 58                          | 10                 | 256                   |
| März . . . . .      | 731.5                                       | 3.3             | — 6.2   | 12.0    | 82                                         | 54                          | 14                 | 187                   |
| April . . . . .     | 733.8                                       | 9.4             | 1.1     | 20.6    | 72                                         | 56                          | 16                 | 189                   |
| Mai . . . . .       | 739.0                                       | 16.5            | 9.5     | 27.0    | 67                                         | 48                          | 11                 | 50                    |
| Juni . . . . .      | 736.8                                       | 19.0            | 10.0    | 30.5    | 74                                         | 50                          | 15                 | 286                   |
| Juli . . . . .      | 735.6                                       | 18.4            | 11.5    | 26.3    | 86                                         | 47                          | 13                 | 236                   |
| August . . . . .    | 738.9                                       | 18.3            | 10.1    | 29.1    | 84                                         | 36                          | 11                 | 210                   |
| September . . . . . | 740.5                                       | 16.3            | 9.7     | 24.1    | 86                                         | 51                          | 10                 | 229                   |
| October . . . . .   | 739.0                                       | 8.7             | 0.9     | 23.1    | 84                                         | 33                          | 10                 | 89                    |
| November . . . . .  | 739.6                                       | 5.4             | 0.3     | 14.5    | 88                                         | 63                          | 11                 | 145                   |
| December . . . . .  | 742.6                                       | 0.5             | — 5.9   | 6.7     | 93                                         | 37                          | 7                  | 92                    |
| Jahr . . . . .      | 737.7                                       | 9.7             | — 9.1   | 30.5    | 81.5                                       | 45                          | 128                | 1969                  |

Barometer. Min.: 718.7 29/XII. Gewitter: 24. Hagel: 1.  
 Max.: 753.5 14/III. Tage mit Schneefall: 18.  
 Rel. Feuchtigkeit: Min. 18% 10/V. Nebel an 4 Tagen.

**Braggio, 1284 Met.**

Beobachter: Cl. Rigassi und Manzoni.

| 1888                | Baromet.           |   | Temperatur (C.) |         |         | Relative Feuchtigt. |    | Bewölk. |      | Niederschlag.      |        |
|---------------------|--------------------|---|-----------------|---------|---------|---------------------|----|---------|------|--------------------|--------|
|                     | auf 0 in Millimet. |   | in %.           |         |         | in %.               |    | in %.   |      | Höhe in Millimeter |        |
|                     | Mittel             |   | bed. Mittel     | Minimum | Maximum | Mittel              |    | Mittel  |      | Anzahl der Tage    | Mittel |
| Januar . . . . .    | —                  | — | 1.1             | — 13.5  | 12.4    | 57                  | 18 | 2       | 7    |                    |        |
| Februar . . . . .   | —                  | — | 1.4             | — 11.8  | 9.3     | 74                  | 61 | 13      | 210  |                    |        |
| März . . . . .      | —                  | — | 0.6             | — 10.4  | 8.5     | 76                  | 60 | 17      | 215  |                    |        |
| April . . . . .     | —                  | — | 3.1             | — 3.5   | 18.7    | 73                  | 65 | 14      | 191  |                    |        |
| Mai . . . . .       | —                  | — | 10.2            | 4.0     | 18.8    | 64                  | 51 | 13      | 69   |                    |        |
| Juni . . . . .      | —                  | — | 13.2            | 3.7     | 23.8    | 67                  | 57 | 14      | 272  |                    |        |
| Juli . . . . .      | —                  | — | 12.6            | 5.5     | 22.6    | 69                  | 56 | 14      | 243  |                    |        |
| August . . . . .    | —                  | — | 13.7            | 6.2     | 24.8    | 64                  | 39 | 11      | 208  |                    |        |
| September . . . . . | —                  | — | 11.8            | 6.4     | 20.4    | 79                  | 61 | 12      | 237  |                    |        |
| October . . . . .   | —                  | — | 5.7             | — 1.2   | 15.0    | 66                  | 38 | 10      | 107  |                    |        |
| November . . . . .  | —                  | — | 2.1             | — 3.6   | 10.4    | 76                  | 61 | 10      | 157  |                    |        |
| December . . . . .  | —                  | — | 1.2             | — 9.0   | 10.5    | 67                  | 38 | 7       | 75   |                    |        |
| Jahr . . . . .      | —                  | — | 5.8             | — 13.5  | 24.8    | 69.3                | 50 | 137     | 1991 |                    |        |

Gewitter: 23. Hagel: 2.  
Tage mit Schneefall: 44.  
Nebel an 59 Tagen.

Rel. Feuchtigt.: Min. 12° 15/X.

# Castasegna, 700 Met.

Beobachter: A. Carbaldo.

| 1888                | Baromet.           |      | Temperatur (C.) |         |         | Relative Feuchtigt. in %. | Bewölkg. in %. | Niederschlag.   |                    |
|---------------------|--------------------|------|-----------------|---------|---------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|                     | auf 0 in Millimet. |      | Red. Mittel     | Minimum | Maximum |                           |                | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
|                     | Mittel             |      |                 |         |         | Mittel                    | Mittel         |                 |                    |
| Januar . . . . .    | 704.3              | 1.3  | --              | 8.8     | 13.6    | 47                        | 25             | 2               | 22                 |
| Februar . . . . .   | 695.0              | 0.8  | --              | 8.4     | 10.3    | 66                        | 62             | 12              | 130                |
| März . . . . .      | 694.1              | 2.5  | --              | 5.6     | 9.5     | 68                        | 63             | 16              | 189                |
| April . . . . .     | 696.9              | 7.2  | --              | 1.3     | 17.6    | 63                        | 68             | 16              | 227                |
| Mai . . . . .       | 702.6              | 14.6 | --              | 8.0     | 24.1    | 58                        | 50             | 10              | 54                 |
| Juni . . . . .      | 701.1              | 16.3 | --              | 8.8     | 26.8    | 67                        | 58             | 20              | 263                |
| Juli . . . . .      | 699.8              | 16.2 | --              | 10.7    | 24.0    | 68                        | 57             | 15              | 278                |
| August . . . . .    | 703.2              | 17.1 | --              | 11.4    | 27.0    | 64                        | 44             | 11              | 200                |
| September . . . . . | 704.3              | 14.7 | --              | 9.2     | 21.3    | 80                        | 72             | 14              | 355                |
| October . . . . .   | 702.0              | 8.2  | --              | 0.5     | 18.9    | 70                        | 41             | 10              | 214                |
| November . . . . .  | 702.0              | 4.6  | --              | 0.2     | 13.4    | 74                        | 70             | 11              | 118                |
| December . . . . .  | 704.4              | 2.0  | --              | 6.0     | 8.0     | 67                        | 39             | 6               | 44                 |
| Jahr . . . . .      | 700.8              | 8.8  | --              | 8.8     | 27.0    | 66.1                      | 54             | 143             | 2092               |

Barometer. Min.: 682.4 29/III.

Max.: 714.4 27. u. 28/X.

Relat. Feuchtigt.: Min. 6%! 14/I.

Gewitter: 8. Hagel: 2.

Tage mit Schneefall: 29.

Nebel an 9 Tagen.

## Chur, 610 Met.

Beobachter: D. Jäcklin.

| 1888                | Baromet.<br>auf 0 in<br>Millimet.<br>Mittel | Temperatur (C.) |         |         | Relative<br>Fchthgkt.<br>in %.<br>Mittel | Bewölkg.<br>in %.<br>Mittel | Niederschlag.      |                       |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                     |                                             | Red. Mittel     | Minimum | Maximum |                                          |                             | Anzahl<br>der Tage | Höhe in<br>Millimeter |
| Januar . . . . .    | —                                           | 2.9             | —16.3   | 5.1     | —                                        | 48                          | 5                  | 20                    |
| Februar . . . . .   | —                                           | 2.1             | —13.5   | 6.6     | —                                        | 60                          | 11                 | 87                    |
| März . . . . .      | —                                           | 2.3             | — 8.0   | 15.4    | —                                        | 67                          | 12                 | 79                    |
| April . . . . .     | —                                           | 6.2             | — 1.6   | 19.2    | —                                        | 68                          | 11                 | 66                    |
| Mai . . . . .       | —                                           | 13.7            | 3.0     | 24.7    | —                                        | 50                          | 3                  | 17                    |
| Juni . . . . .      | —                                           | 16.0            | 6.3     | 30.2    | —                                        | 57                          | 14                 | 93                    |
| Juli . . . . .      | —                                           | 14.8            | 7.4     | 28.0    | —                                        | 74                          | 17                 | 117                   |
| August . . . . .    | —                                           | 15.3            | 7.0     | 27.2    | —                                        | 59                          | 10                 | 117                   |
| September . . . . . | —                                           | 13.8            | 6.3     | 23.6    | —                                        | 64                          | 13                 | 137                   |
| October . . . . .   | —                                           | 5.9             | — 0.6   | 21.2    | —                                        | 46                          | 7                  | 105                   |
| November . . . . .  | —                                           | 4.1             | — 1.2   | 16.3    | —                                        | 60                          | 7                  | 54                    |
| December . . . . .  | —                                           | 2.2             | — 7.9   | 12.1    | —                                        | 28                          | 1                  | 1                     |
| Jahr . . . . .      | —                                           | 7.5             | —16.3   | 30.2    | —                                        | 57                          | 111                | 893                   |

Gewitter: 0 (?). Hagel 0.  
Tage mit Schneefall: 33.

Rel. Fchthgkt. Min.: 20% 24/VI.

# Reichenau, 597 Met.

Beobachter: J. Welz.

| 1888                | Baromet.<br>auf 0 in<br>Millimet.<br>Mittel | Temperatur (C.) |         |         | Relative<br>Fchtigkeit.<br>in %<br>Mittel | Bewölkg.<br>in %<br>Mittel | Niederschlag.      |                       |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                     |                                             | Red. Mittel     | Minimum | Maximum |                                           |                            | Anzahl<br>der Tage | Höhe in<br>Millimeter |
|                     |                                             |                 |         |         |                                           |                            |                    |                       |
| Januar . . . . .    | —                                           | 3.3             | —17.9   | 5.5     | —                                         | 45                         | 6                  | 52                    |
| Februar . . . . .   | —                                           | 2.2             | —16.8   | 5.7     | —                                         | 70                         | 13                 | 152                   |
| März . . . . .      | —                                           | 1.7             | —10.3   | 15.9    | —                                         | 70                         | 12                 | 166                   |
| April . . . . .     | —                                           | 6.1             | — 2.0   | 19.2    | —                                         | 75                         | 10                 | 137                   |
| Mai . . . . .       | —                                           | 13.5            | 4.9     | 23.7    | —                                         | 53                         | 3                  | 26                    |
| Juni . . . . .      | —                                           | 15.3            | 5.9     | 30.0    | —                                         | 63                         | 15                 | 134                   |
| Juli . . . . .      | —                                           | 14.5            | 7.3     | 25.7    | —                                         | 74                         | 19                 | 162                   |
| August . . . . .    | —                                           | 14.6            | 7.2     | 27.7    | —                                         | 58                         | 12                 | 153                   |
| September . . . . . | —                                           | 13.3            | 6.0     | 24.2    | —                                         | 65                         | 14                 | 187                   |
| October . . . . .   | —                                           | 5.2             | — 2.3   | 18.7    | —                                         | 49                         | 8                  | 156                   |
| November . . . . .  | —                                           | 4.0             | — 1.3   | 16.7    | —                                         | 63                         | 6                  | 94                    |
| December . . . . .  | —                                           | 2.3             | — 9.3   | 11.9    | —                                         | 35                         | 2                  | 4                     |
| Jahr . . . . .      | —                                           | 7.1             | —17.9   | 30.0    | —                                         | 60                         | 120                | 1423                  |

Gewitter: 0 (?). Hagel: 0.

Tage mit Schneefall: 27.

Nebel an 11 Tagen.

# Klosters, 1214 Met.

Beobachter: Ch. Rofler.

| 1888                | Baromet.<br>auf 0 in<br>Millimet.<br>Mittel | Temperatur (C.) |         |         | Relative<br>Fchtgkt.<br>in %<br>Mittel | Bewölkg.<br>in %<br>Mittel | Niederschlag.      |                       |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|---------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                     |                                             | Red. Mittel     | Minimum | Maximum |                                        |                            | Anzahl<br>der Tage | Höhe in<br>Millimeter |
|                     |                                             |                 |         |         |                                        |                            |                    |                       |
| Januar . . . . .    | 662.6                                       | — 5.6           | — 21.6  | 3.6     | 58                                     | 37                         | 7                  | 64                    |
| Februar . . . . .   | 652.9                                       | — 5.1           | — 18.2  | 5.3     | 55                                     | 60                         | 11                 | 160                   |
| März . . . . .      | 651.7                                       | — 1.7           | — 13.4  | 11.3    | 51                                     | 60                         | 15                 | 122                   |
| April . . . . .     | 655.4                                       | 1.6             | — 6.8   | 12.6    | 53                                     | 66                         | 13                 | 129                   |
| Mai . . . . .       | 661.5                                       | 9.7             | — 0.9   | 20.8    | 44                                     | 41                         | 7                  | 34                    |
| Juni . . . . .      | 660.3                                       | 12.5            | 3.2     | 26.2    | 40                                     | 49                         | 16                 | 141                   |
| Juli . . . . .      | 659.2                                       | 11.4            | 3.6     | 23.0    | 50                                     | 55                         | 20                 | 176                   |
| August . . . . .    | 662.9                                       | 11.8            | 1.6     | 25.2    | 50                                     | 51                         | 12                 | 159                   |
| September . . . . . | 663.3                                       | 10.6            | 1.2     | 19.8    | 60                                     | 54                         | 17                 | 207                   |
| October . . . . .   | 660.9                                       | 2.5             | ?       | ?       | —                                      | 30                         | ?                  | ?                     |
| November . . . . .  | 659.2                                       | 1.3             | — 9.3   | 13.7    | —                                      | 40                         | 7                  | 68                    |
| December . . . . .  | 661.2                                       | — 1.0           | — 14.3  | 8.2     | —                                      | 22                         | 1                  | 1                     |
| Jahr . . . . .      | 659.3                                       | 4.0             | — 21.6  | 26.2    | ?                                      | 47                         | ?                  | ?                     |

Barometer. Min.: 640.4 21/II.

Max.: 673.1 8/I.

## Schuls, 1234 Met.

Beobachter: B. Planta.

| 1888      | Baromet.<br>auf 0 in<br>Millimet.<br>Mittel | Temperatur (C.) |         |         | Relative<br>Fchthgk.<br>in %.<br>Mittel | Bewölkg.<br>in %.<br>Mittel | Niederschlag.      |                       |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                             | Red. Mittel     | Minimum | Maximum |                                         |                             | Anzahl<br>der Tage | Höhe in<br>Millimeter |
|           |                                             |                 |         |         |                                         |                             |                    |                       |
| Januar.   | 659.6                                       | 7.6             | -22.2   | 4.0     | —                                       | 19                          | 5                  | 23                    |
| Februar   | 649.7                                       | —               | -22.0   | 5.0     | —                                       | 48                          | 8                  | 53                    |
| März      | 648.3                                       | —               | -12.5   | 11.6    | —                                       | 49                          | 8                  | 66                    |
| April     | 651.6                                       | 4.2             | —       | 5.6     | —                                       | 50                          | 6                  | 65                    |
| Mai       | 658.1                                       | 11.5            | 3.4     | 21.2    | —                                       | 38                          | 1                  | 5                     |
| Juni      | 656.9                                       | 14.3            | 4.6     | 26.8    | —                                       | 49                          | 10                 | 78                    |
| Juli      | 655.6                                       | 13.3            | 6.0     | 24.2    | —                                       | 56                          | 12                 | 71                    |
| August    | 659.2                                       | 13.7            | 5.6     | 27.8    | —                                       | 46                          | 9                  | 55                    |
| September | 659.9                                       | 11.6            | 3.4     | 19.8    | —                                       | 60                          | 13                 | 204                   |
| October   | 657.6                                       | 3.2             | —       | 4.2     | —                                       | 30                          | 7                  | 72                    |
| November  | 656.4                                       | 0.6             | —       | 6.8     | —                                       | 39                          | 6                  | 54                    |
| December  | 659.1                                       | —               | 3.7     | -13.5   | —                                       | 19                          | 1                  | 1                     |
| Jahr      | 656.0                                       | 4.7             | -22.2   | 27.8    | —                                       | 42                          | 86                 | 747                   |

Gewitter: 2. Hagel: 0.  
Tage mit Schneefall: 24.  
Nebel 1.

Barometer. Min.: 637.8 29/III.  
Max.: 669.9 28/X.

# Platta (Medels), 1379 Met.

Beobachter: G. A. Simeon.

| 1888                | Baromet.           |   | Temperatur (C.) |         |         | Relative Fochtigt. |      | Bewölkg. |     | Niederschlag.   |                    |
|---------------------|--------------------|---|-----------------|---------|---------|--------------------|------|----------|-----|-----------------|--------------------|
|                     | auf 0 in Millimet. |   | Rel. Mittel     | Minimum | Maximum | in %.              |      | in %.    |     | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
|                     | Mittel             |   |                 |         |         | Mittel             |      |          |     |                 |                    |
| Januar . . . . .    | 649.6              | — | 5.0             | —       | 20.0    | 2.6                | 7.6  | 38       | 4   | 30              |                    |
| Februar . . . . .   | 640.1              | — | 5.3             | —       | 17.2    | 3.2                | 83   | 70       | 15  | 198             |                    |
| März . . . . .      | 639.0              | — | 2.4             | —       | 15.0    | 6.4                | 87   | 74       | 15  | 160             |                    |
| April . . . . .     | 642.6              | — | 0.9             | —       | 6.4     | 10.2               | 97   | 75       | 16  | 131             |                    |
| Mai . . . . .       | 649.2              | — | 8.2             | —       | 0.8     | 17.0               | 07   | 56       | 9   | 22              |                    |
| Juni . . . . .      | 648.2              | — | 10.9            | —       | 0.6     | 23.8               | 57   | 67       | 13  | 103             |                    |
| Juli . . . . .      | 647.0              | — | 10.5            | —       | 3.4     | 21.4               | 08   | 72       | 19  | 264             |                    |
| August . . . . .    | 650.6              | — | 10.9            | —       | 2.6     | 25.6               | 77   | 58       | 15  | 181             |                    |
| September . . . . . | 650.9              | — | 10.2            | —       | 2.0     | 21.2               | 81   | 76       | 15  | 157             |                    |
| October . . . . .   | 648.2              | — | 2.4             | —       | 4.8     | 15.0               | 78   | 48       | 10  | 131             |                    |
| November . . . . .  | 646.7              | — | 1.8             | —       | 4.0     | 10.6               | 71   | 59       | 7   | 74              |                    |
| December . . . . .  | 648.9              | — | 0.3             | —       | 9.6     | 7.8                | 63   | 38       | 4   | 24              |                    |
| Jahr . . . . .      | 646.8              | — | 3.7             | —       | 20.0    | 25.6               | 75.8 | 61       | 142 | 1475            |                    |

Barometer. Min.: 627.0 29/III.  
 Max.: 659.6 1/VIII.  
 Relat. Feuchtigt.: Min. 21 % 26/XI.  
 Gewitter: 3. Hagel: 0.  
 Tage mit Schneefall: 39.  
 Nebel an 204 Tagen.  
 (Hochnebel inbegriffen!).

# Davos-Platz, 1560 Met.

Beobachter: C. Wetzel.

| 1888                | Baromet.<br>auf 0 in<br>Millimet.<br>Mittel | Temperatur (C.) |                    | Relative<br>Fchthgkt.<br>in %.<br>Mittel | Bewölkg.<br>in %.<br>Mittel | Niederschlag.      |                       |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                     |                                             | Red. Mittel     | Minimum<br>Maximum |                                          |                             | Anzahl<br>der Tage | Höhe in<br>Millimeter |
| Januar . . . . .    | 633.2                                       | —               | 7.8 — 24.5         | 81                                       | 32                          | 6                  | 50                    |
| Februar . . . . .   | 623.8                                       | —               | 6.4 — 23.5         | 81                                       | 56                          | 13                 | 113                   |
| März . . . . .      | 623.1                                       | —               | 2.9 — 17.7         | 78                                       | 49                          | 14                 | 65                    |
| April . . . . .     | 626.4                                       | —               | 0.9 — 8.2          | 80                                       | 52                          | 14                 | 45                    |
| Mai . . . . .       | 633.3                                       | —               | 8.0 — 0.1          | 65                                       | 41                          | 6                  | 10                    |
| Juni . . . . .      | 632.5                                       | —               | 10.8 — 1.5         | 68                                       | 49                          | 13                 | 54                    |
| Juli . . . . .      | 631.3                                       | —               | 10.1 — 2.9         | 74                                       | 59                          | 19                 | 80                    |
| August . . . . .    | 634.8                                       | —               | 10.5 — 1.3         | 75                                       | 51                          | 13                 | 144                   |
| September . . . . . | 635.1                                       | —               | 9.3 — 1.6          | 81                                       | 59                          | 15                 | 160                   |
| October . . . . .   | 632.1                                       | —               | 1.8 — 7.0          | 78                                       | 37                          | 10                 | 76                    |
| November . . . . .  | 630.6                                       | —               | 0.8 — 9.8          | 78                                       | 46                          | 8                  | 77                    |
| December . . . . .  | 632.5                                       | —               | 2.9 — 16.0         | 78                                       | 27                          | 1                  | 2                     |
| Jahr . . . . .      | 630.7                                       | —               | 2.7 — 24.5         | 76.5                                     | 46                          | 132                | 876                   |

Barometer, Min.: 612.0 21/II.  
 Max.: 643.4 27/X.  
 Rel. Feuchthgkt.: Min. 11 % 21/X.

Gewitter: 4. Hagel: 1.  
 Tage mit Schneefall: 69.  
 Nebel an 36 Tagen.

## Scans, 1650 Met.

Beobachter: Pfarrer J. Tramér.

|                     | 1888 | Baromet.           |   | Temperatur (C.) |         |         | Relative Fchtigkeit. in %. | Bewölkg. in %. | Niederschlag. |        |
|---------------------|------|--------------------|---|-----------------|---------|---------|----------------------------|----------------|---------------|--------|
|                     |      | auf 0 in Millimet. |   | Red. Mittel     | Minimum | Maximum |                            |                | Mittel        | Mittel |
|                     |      | Mittel             |   |                 |         |         |                            |                |               |        |
| Januar . . . . .    |      | —                  | — | 11.9            | —31.9   | 3.0     | —                          | —              | 1             | —      |
| Februar . . . . .   |      | —                  | — | 8.4             | —28.7   | 1.2     | —                          | —              | 12            | —      |
| März . . . . .      |      | —                  | — | 4.6             | —25.0   | 5.6     | —                          | —              | 17            | —      |
| April . . . . .     |      | —                  | — | 0.4             | —11.2   | 7.5     | —                          | —              | 14            | —      |
| Mai . . . . .       |      | —                  | — | 7.0             | — 3.7   | 16.2    | —                          | —              | 4             | —      |
| Juni . . . . .      |      | —                  | — | 10.2            | — 1.2   | 21.2    | —                          | —              | 7             | —      |
| Juli . . . . .      |      | —                  | — | 10.3            | 1.2     | 18.7    | —                          | —              | 14            | —      |
| August . . . . .    |      | —                  | — | 10.7            | 0.0     | 25.0    | —                          | —              | 9             | —      |
| September . . . . . |      | —                  | — | 10.6            | 0.0     | 17.5    | —                          | —              | 12            | —      |
| October . . . . .   |      | —                  | — | 1.6             | — 6.2   | 11.2    | —                          | —              | 11            | —      |
| November . . . . .  |      | —                  | — | 1.4             | —12.5   | 11.0    | —                          | —              | 5             | —      |
| December . . . . .  |      | —                  | — | 8.5             | —21.2   | 1.0     | —                          | —              | 1             | —      |
| Jahr . . . . .      |      | —                  | — | 1.3             | —31.9   | 25.0    | —                          | —              | 107           | —      |

Gewitter: 6.

Schneefall an 56 Tagen.

# Begers, 1711 Met.

Beobachter: J. L. Krättli.

| 1888                | Baromet.<br>auf 0 in<br>Millimet.<br>Mittel | Temperatur (C.) |         |         | Relative<br>Fchtigkeit<br>in %.<br>Mittel | Bewölkg.<br>in %.<br>Mittel | Niederschlag.      |                       |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                     |                                             | Red. Mittel     | Minimum | Maximum |                                           |                             | Anzahl<br>der Tage | Höhe in<br>Millimeter |
|                     |                                             |                 |         |         |                                           |                             |                    |                       |
| Januar . . . . .    | 622.3                                       | -11.4           | -30.5   | 6.6     | 73                                        | 30                          | 3                  | 18                    |
| Februar . . . . .   | 613.1                                       | -8.7            | -30.0   | 1.9     | 77                                        | 58                          | 16                 | 75                    |
| März . . . . .      | 612.5                                       | -5.3            | -24.4   | 4.8     | 75                                        | 55                          | 13                 | 115                   |
| April . . . . .     | 616.1                                       | -0.8            | -9.9    | 9.4     | 76                                        | 60                          | 11                 | 109                   |
| Mai . . . . .       | 622.9                                       | 6.1             | -3.9    | 15.8    | 70                                        | 46                          | 5                  | 9                     |
| Juni . . . . .      | 622.3                                       | 9.5             | 0.8     | 22.6    | 71                                        | 56                          | 13                 | 105                   |
| Juli . . . . .      | 621.0                                       | 9.8             | 2.6     | 20.2    | 73                                        | 60                          | 15                 | 105                   |
| August . . . . .    | 624.4                                       | 9.8             | 0.4     | 24.2    | 74                                        | 47                          | 14                 | 94                    |
| September . . . . . | 625.0                                       | 8.1             | -1.4    | 19.1    | 84                                        | 65                          | 16                 | 290                   |
| October . . . . .   | 621.7                                       | 0.1             | -8.6    | 12.8    | 75                                        | 36                          | 10                 | 73                    |
| November . . . . .  | 620.6                                       | -2.4            | -12.6   | 7.8     | 81                                        | 49                          | 9                  | 66                    |
| December . . . . .  | 622.8                                       | -8.2            | -23.2   | 2.1     | 83                                        | 32                          | 2                  | 8                     |
| Jahr . . . . .      | 620.4                                       | 0.6             | -30.5   | 24.2    | 75.9                                      | 50                          | 127                | 1067                  |

Barometer. Min.: 602.2 21/II.

Max.: 633.2 27. 28/X.

Relat. Feuchtgkt. Min.: 18% 19/X.

Gewittier: 5. Hagel: 0.

Tage mit Schneefall: 57.

Nebel an 32 Tagen.

## Sils-Maria, 1810 Met.

Beobachter: J. Caviezel.

| 1888                | Baromet.<br>auf 0 in<br>Millimet.<br>Mittel | Temperatur (C.) |         |         | Relative<br>Fechtigt.<br>in %.<br>Mittel | Bewölkg.<br>in %.<br>Mittel | Niederschlag.      |                       |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                     |                                             | Rel. Mittel     | Minimum | Maximum |                                          |                             | Anzahl<br>der Tage | Höhe in<br>Millimeter |
|                     |                                             |                 |         |         |                                          |                             |                    |                       |
| Januar . . . . .    | 614.1                                       | — 8.5           | — 25.6  | 6.0     | 71                                       | 29                          | 3                  | 9                     |
| Februar . . . . .   | 605.1                                       | — 7.7           | — 24.0  | 2.5     | 78                                       | 70                          | 11                 | 124                   |
| März . . . . .      | 604.6                                       | — 5.2           | — 19.3  | 3.0     | 79                                       | 57                          | 13                 | 124                   |
| April . . . . .     | 608.1                                       | — 0.8           | — 9.1   | 8.8     | 75                                       | 67                          | 13                 | 122                   |
| Mai . . . . .       | 615.1                                       | 5.0             | — 2.0   | 12.9    | 72                                       | 50                          | 5                  | 12                    |
| Juni . . . . .      | 614.6                                       | 9.0             | 1.0     | 20.3    | 72                                       | 58                          | 13                 | 119                   |
| Juli . . . . .      | 613.4                                       | 9.2             | 3.7     | 17.7    | 74                                       | 60                          | 13                 | 139                   |
| August . . . . .    | 616.8                                       | 9.7             | 2.6     | 22.4    | 70                                       | 49                          | 12                 | 109                   |
| September . . . . . | 617.3                                       | 7.7             | — 0.1   | 16.6    | 83                                       | 68                          | 16                 | 249                   |
| October . . . . .   | 613.8                                       | 0.6             | — 9.4   | 11.2    | 71                                       | 36                          | 9                  | 127                   |
| November . . . . .  | 612.7                                       | — 1.6           | — 8.4   | 5.7     | 76                                       | 52                          | 8                  | 59                    |
| December . . . . .  | 614.8                                       | — 5.6           | — 17.2  | 3.4     | 77                                       | 35                          | 4                  | 25                    |
| Jahr . . . . .      | 612.5                                       | 1.0             | — 25.6  | 22.4    | 74.9                                     | 53                          | 120                | 1218                  |

Gewitter: 5. Hagel: 0.

Schneefall an 62 Tagen.

Nebel an 34 Tagen.

Barometer. Min.: 595.4 19/II.

Max.: 625.2 28/X.

Rel. Feuchtigt.: Min. 20% 20/X.

# St. Bernhard (Passhöhe), 2070 Met.

Beobachter: J. Stoffel-Bellig.

| 1888                | Baromet.           |  | Temperatur (C.) |         |         | Relative Fchtkgt. in %. | Bewölkg. in %. | Niederschlag. |                 |                    |
|---------------------|--------------------|--|-----------------|---------|---------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|
|                     | auf 0 in Millimet. |  | Red. Mittel     | Minimum | Maximum |                         |                | Mittel        | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
|                     | Mittel             |  |                 |         |         |                         |                |               |                 |                    |
| Januar . . . . .    | 593.7              |  | —               | 7.3     | —21.4   | 3.2                     | —              | 28            | 3               | 17                 |
| Februar . . . . .   | 584.8              |  | —               | 8.8     | —15.6   | 0.0                     | —              | 72            | 10              | 332                |
| März . . . . .      | 584.5              |  | —               | 6.6     | —18.4   | 1.8                     | —              | 68            | 20              | 498                |
| April . . . . .     | 588.4              |  | —               | 2.9     | —10.6   | 7.6                     | —              | 73            | 16              | 418                |
| Mai . . . . .       | 595.4              |  |                 | 3.3     | — 2.8   | 11.8                    | —              | 58            | 9               | 96                 |
| Juni . . . . .      | 595.5              |  |                 | 6.0     | — 1.8   | 15.0                    | —              | 68            | 13              | 211                |
| Juli . . . . .      | 594.1              |  |                 | 5.9     | — 0.5   | 13.2                    | —              | 72            | 17              | 357                |
| August . . . . .    | 597.7              |  |                 | 7.6     | — 0.1   | 19.0                    | —              | 56            | 10              | 229                |
| September . . . . . | 598.0              |  |                 | 5.9     | — 0.9   | 12.6                    | —              | 70            | 12              | 359                |
| October . . . . .   | 594.0              |  | —               | 0.4     | — 8.9   | 8.6                     | —              | 42            | 8               | 471                |
| November . . . . .  | 592.7              |  | —               | 2.2     | — 7.6   | 4.6                     | —              | 59            | 6               | 169                |
| December . . . . .  | 594.6              |  | —               | 3.9     | —12.6   | 5.0                     | —              | 38            | 7               | 186                |
| Jahr . . . . .      | 592.8              |  | —               | 0.3     | —21.4   | 19.0                    | —              | 59            | 131             | 3343               |

Gewitter: 0 (?). Hagel 0.  
Tage mit Schneefall: 70.  
Nebel an 124 Tagen.

Barometer. Min.: 573.8 19/II.  
Max.: 605.2 28/X.

## Aus der Naturechronik.

1888.

Die Chronik dieses Jahrganges ist eine Unglückschronik, da sie zweier in ihrem Umfange und in ihren Folgen von beträchtlichem Schaden begleiteter Naturereignissen zu gedenken hat. Wie im benachbarten österreichischen und im gesammten schweizerischen Alpengebiete waren im Winter 1887/88 vielfach unerhörte Schneemassen gefallen, in Folge deren eine ganz ungläubliche Menge von **Lawinen** allerseits zu Thal fuhr, Wälder, Strassen, Brücken, Gebäude unter ihrer Wucht verheerend und dabei manches Menschen- und Thierleben vernichtend. Am zahlreichsten waren die Fälle während des Februars, doch auch gegen Erde des Monates März lösten sich noch sehr beträchtliche Schneemassen los, einzelne sogar noch Mitte Mai. Der Schnee lag vielfach bis 1—3 M. hoch, also noch höher als in dem in neuerer Zeit schneereichsten Winter 1874/75. (Vergl. J. B. XX. p. 95). Um nur Einzelnes aufzuführen, so stürzte am 13./II. eine Lawine bei *Süs* herunter, mächtig genug, den Inn so zu stauen, dass sich eine seeartige Wassermasse gegen das Dorf drängte, und der Fluss nur mit äusserster Mühe wieder frei gemacht werden konnte. Am 26./II. kamen drei Lawinen nach *Selma* (Calanca) herunter; die stärkste brach sich zwar an der Kirche, immerhin wurden einzelne Häuser zerstört und andere geschädigt. Am 31./III. stürzten vollends im ganzen Thal so massenhaft Lawinen herunter, dass dasselbe nachgerade

„nur eine Lawine“ war, die Strasse an zahlreichen Stellen zerstört und namentlich auch der Wald in empfindlicher Weise verheert wurde. In den nämlichen Tagen kamen auch im ganzen *Engadin* zahlreiche Lawinen herunter, so allein ihrer sieben zwischen Ofen und Zernetz, dann von *Silvaplana* bis nach *Casaccia* hinüber. Aber nicht minder hatte man im *Oberland*, auf *Davos* im waldentblössten *Avers*, dessen 25jährige Schonung vernichtet wurde, im Kreise *Belfort* über den mannigfach angerichteten Schaden zu klagen, wie auch der Verkehr über unsere Bergpässe vielfache Unterbrechungen erlitt. Nebenbei wurde auch vielfach der Wildstand geschädigt, namentlich die Rehe; bei einer Davoser Villa fanden sich sogar nach Futter suchende Schneehühner ein. Anderwärts wurden Waldkulturen und Baumschulen durch Hasen benagt und geschält. Noch in der ersten Hälfte des April's gab es neuerdings einen starken Schneefall. Manche Lawinen blieben daher die längste Zeit liegen; so konnte diejenige in *Val Roseg* erst am 11. Juli für das Rad offen gemacht werden.

Im Auftrage des schweiz. Industrie- und Landwirthschaftsdepartements wurde durch Oberforstinspektor Coaz der Lawinenschaden im gesammten schweizerischen Hochgebirge aufgenommen. Für Graubünden ergaben sich darnach im Ganzen 574 Lawinen (48% Staublawinen, 42% Grundlawinen, und an 10% gemischte Formen, Schneerütsche u. s. w.) mit einem Waldschaden von 30,703 Festmeter Holz. An Gebäuden wurden 17 Wohnhäuser, 155 Ställe und 53 sonstige Gebäude zerstört; Personen wurden 29 verschüttet, davon nur 13 gerettet werden konnten; an Vieh gingen von 38 verschütteten Stücken 33 zu Grunde. Für die ganze Schweiz

ergaben sich: 1094 Lawinen, beschädigte Holzmasse 82,091 Festmeter, zerstörte Gebäulichkeiten 850, verschüttete Strassen und Wege 198, gestaute Gewässer 196; von 84 verschütteten Personen sind 49, ebenso von 752 Stücken Vieh 665 umgekommen. — Sehr bedenklich gestaltete sich nach anhaltenden Regengüssen von 10—12 Sept. der **Hochwasserstand** unserer Flüsse. Der *Rhein* erreichte nicht ganz die Höhe von 1868 (28,5', 1834 : 30') mit nur 25,5', aber immerhin wurden namentlich ob Ilanz viele Brücken weggeschwemmt und die Strassen geschädigt. Ganz enorm war jedoch die Verheerung von unserer Grenze weg im Rheinthal, sowohl linkerseits auf Gebiet des Kantons St. Gallen, als namentlich rechterseits im Lichtensteinischen und Voralbergischen, wo die Ueberschwemmung eine geradezu entsetzliche war. Die *Albula* schwemmte 5 Brücken weg und verheerte die Grundstücke bei Bellaluna, sowie einen Theil der Strasse, die seither auf das rechte Ufer verlegt werden musste. Besonders verheerend trat der *Inn* auf. Bei St. Moritz trat der See über und drang das Wasser in die unteren Stockwerke einzelner Hôtels; grosse Wubrbrüche bei Samaden und Bevers hatten eine seeartige Ueberschwemmung des Thales bis nach Ponte hin zur Folge. In Pontresina brach eine seit Menschengedenken ruhig gebliebene Rufe urplötzlich mit einer kolossalen Wassermasse am Schafberg herunter, wodurch grössere und kleinere Gebäulichkeiten momentan in dringendster Gefahr standen. Nicht minder erlitt das Unterengadin, namentlich vom Tarasper-Schulser und Fetaner Gebiet abwärts, sehr empfindlichen Schaden: bis nach Martinsbruck herunter wurden zahlreiche Brücken zerstört, ein fast Kilometer langes Stück der Strasse ob dem Tarasper Kurhause fortgerissen,

dieses selbst an Wuhren, Quellenleitungen u. s. w. empfindlich geschädigt. Endlich erprobten auch der wilde *Poschiavino* und seine Tobelzuflüsse ihre zerstörende Wuth an Dämmen und Strassen, so namentlich im Thal von *Brusio*, wo manche schöne, durch jahrelangen Fleiss und harte Arbeit der schmalen Thalsohle abgerungene Bodenparzelle sammt Strassenstrecken und Brücken von der Fluth verschlungen wurden. Zudem hatte sich über *Brusio* kurze Zeit vorher in der letzten Woche des August, ein gewaltig s **Hagelwetter** entladen, das in kürzester Zeit den zu erwartenden Ertrag an Korn, Tabak und Reben zerstörte. —

**Erdstösse** wurden, den Tagesblättern zufolge, nachstehende wahrgenommen: Am 2./I., Abends 5<sup>h</sup> 15<sup>m</sup> ein ziemlicher Stoss von SO — NW in *Wiesen*: ebenso um 5<sup>h</sup> 40<sup>m</sup> in *Obervatz* und 5<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> in *Alvneu-Bal*. Am 6./II. wurden Erdstösse von verschiedenen Gemeinden des *Engadin's* aus berichtet; ebenso am 9./II. Nachts um 1<sup>h</sup>, 1<sup>h</sup> 5<sup>m</sup>, und 2<sup>h</sup> aus dem *Unter-Engadin*. Am 1./IV. um 9<sup>h</sup> Vormittags spürte man eine Erschütterung bei *Küblis*; am 20./V. zwei ziemlich heftige Stösse bei *Ems*, und schliesslich am 3./VI. Abends nach 10<sup>h</sup> zwei solche in *Silvaplana*. — Am 28./VIII. erfolgte ein nicht unbedeutender **Felssturz** ob *Felsberg*, ohne jedoch dem Dorfe weiteren Schaden zu bringen. — Bei *Malans* wurde eine riesige **Rothanne** gefällt. Sie stand auf Bündnerschiefer in südwestlicher Exposition bei 1350 M. ü. M. Sie mass 151 M. Stammlänge und werden Jahresringen zufolge 162 Jahre alt; sie galt bei der Versteigerung 746 Fr. und 48 Cts. — In beiden *Engadinen* trat leider wieder die **Lärchenmotte** (*Steganoptycha pinicolana*) auf, ebenso im *Münsterthal* und *Poschiavo*. Von der traurigen Ent-

stellung des Lärchwaldes abgesehen, wo ältere Stämme leicht abgängig werden, ist namentlich auch der Schaden an jungen Arven, deren Gipfel geradezu verdorren, sehr zu beklagen. — Der **Bär** wird zusehends seltener; im Laufe des Jahres scheint nur ein Exemplar auf Gebiet von *Soazza* erlegt worden zu sein. Dagegen fielen in den Alpen des *Vorderprätigaus* drei **Hirsche** den Jägern zur Beute, darunter ein besonders stattlicher Zehnder; am Augstenberg ob Seewis wurde Anfang November sogar ein Rudel an acht Stücken beobachtet. Immer weiter breiten sich des ungenügenden Schutzes ungeachtet die **Rehe** in unseren Hochthälern aus; so kamen solche auch in Savien, sowie in beiden Engadinen zum Vorschein. Bei *Untervatz* wurde am 15./IV. als grosse Seltenheit ein **Schlangennadler** (*Circaëtus brachydactylus*) erlegt.

K.



## VI.

### Literatur zur physischen Landeskunde.

---

#### 1. Ethnologie.

Die Räto-Romanen der Schweizer-Alpen von *Franken*. (Neuphilolol. Centralblatt. 1888. No. 6). Die Abhandlung ist der Redaction leider nicht zugänglich gewesen.

Das Ober-Engadin und seine Bewohner. (Schweiz. Alpenzeitung. 1890. No. 2). Die Aufzeichnungen stammen von dem 1870 verstorbenen Förster *Emmermann*, der als politischer Flüchtling Ende der vierziger Jahre nach dem Ober-Engadin kam. Die Engadiner dürfen im Ganzen mit der über sie unterworfenen Charakteristik trotz einiger Schattenstriche, die ja zu jeder guten Skizze gehören, wohl zufrieden sein, um so mehr als der humoristische Verf. mit der Versicherung schliesst, dass wenn er nicht ein unverfälschter, in der Wolle gefärbter Deutscher wäre, er am liebsten ein Engadiner sein möchte.

#### 2. Medicin.

Ein Beitrag zur Lehre von der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft von Dr. *Oskar Bernhard*. (Inauguraldissertation. Samaden 1888).

**Etude critique et expérimentelle sur la température cérébrale à la suite d'irritations sensibles et sensorielles** par *T. Dorta* Doct. en Med (Genf 1889). Die einschlägigen Versuche wurden an Thieren angestellt, theils die Sinnesnerven durch entsprechende Eindrücke, theils die Nervencentren durch directe Verletzung gereizt, und die hiedurch hervorgerufene Wärmestörung durch einen galvanothermischen Apparat controllirt. Die Versuche sind jedoch noch keineswegs so abgeschlossen, um endgültige Resultate zu gewähren, und wird der Verf. die Frage weiter verfolgen.

**Wesen und Ursache der Alopecia areata** von Dr. *A. Plattner* (Inauguraldissertation) Chur. 1890. Auf ein wohl nahezu erschöpfendes Literaturmaterial gestützt hat der Verf. über dieses Leiden des Haarbodens („umschriebene Kahlheit“) eine sehr fleissige Monographie publicirt, in welcher wohl alles Bekannte über das Wesen, Krankheit sowie über deren Ursachen sich vereinigt finden, in letzterer Hinsicht sowohl was eine zu Grunde liegende Pilzbildung an den Haarwurzeln, als davon unabhängige neuropathologische Momente betrifft.

**Ueber die Behandlung der Magencatarrhe und Dyspepsien der Phthisiker mit der Tarasper Luciusquelle** von Dr. *Volland*. (Corr. Blatt für schweiz. Aerzte. XX. 1890). Vom Grundsatz ausgehend, dass die Hebung des Appetites und der Magenthätigkeit für die erfolgreiche Behandlung Schwindsüchtiger ein wesentliches Moment involvire, glaubt der Verf., auf günstige Erfahrungen gestützt, trotzdem dass derselbe zunächst contraindirect erscheinen möchte, dennoch den vorsichtigen Gebrauch der Luciusquelle bei Verdauungsstörungen von Phthisikern empfehlen zu dürfen.

**Weiteres über die Entstehung der Lungenspitzenanämie** von Dr. *Volland*. (Deutsche Medizinal-Zeitung 1889. No. 61. Berlin. Sep.-Abdr.). Der Verf wendet sich polemisirend gegen *Meissen*; es handelt sich hauptsächlich um die Frage über die Entstehung der Lungenspitzenanämie mit ihren Folgen, in welcher Hinsicht die Hochgebirgsluft bei zugleich individueller Behandlung des einzelnen Falles sich als das wirksamste Heilmittel bewähre.

**Casuistisch-statistische Beiträge zur operativen Behandlung des Empyem's der Pleura** von Dr. *B. Simonett*. (Inauguraldissertation). Basel 1889.

**Zur Behandlung der Hämatocele rectouterina** von Dr. *C. Spengler*. Inauguraldissertation. (Bern 1889).

### 3. Alpwirtschaft.

**Die Fürsten-Alp und die Futterbauversuche auf dem alpinen Versuchsfelde daselbst** von Dr. *F. G. Stebler* und Prof. Dr. *C. Schröter*. (Landwirthschaftl. Jahrb. d. Schweiz. III. 1889. Bern. p. 29—96). Schon 1875 hatte Prof. Dr. C. v. Nägeli in München ausgesprochen, dass die in den Alpen so sehr zurückstehende Cultur sich wesentliche Verbesserungen aneignen könnte,

- 1) durch Benützung der vorhandenen Vegetation,
- 2) durch die Erhaltung und Beförderung derselben, oder die bessere Verwendung der Düngstoffe, und
- 3) durch die Neuschaffung von Vegetation oder neue Anpflanzungen,

und gelangte damit zum Postulat der notwendigen Anlage von Alpengärten in einem rauhen Klima, um das Gebirge

mit neuen Culturvariatäten zu versehen. Auch Kasthofer hatte im Anfang unseres Jahrhunderts ein Versuchsfeld auf dem Abendberg bei Interlaken angelegt. Bei dem thatsächlich niedrigen Ertrag unserer Alpen, und da zunächst die Versuche zur Förderung des Futterbaues nur das Tiefland betrafen, wurde nun der Gedanke wach gerufen, solche Versuche in einer alpinen Lage vorzunehmen und als entsprechendes Versuchsfeld die Fürstenalp ob Trimmis ausersuchen. Die sehr einlässliche Arbeit zerfällt in drei Theile.

Die natürlichen Verhältnisse des Fürstenalpgebietes werden zunächst nach der geographischen Lage, dem geologischen Untergrund, den mannigfaltigen Vegetationsverhältnissen und nach den 1887 — 1888 angestellten meteorologischen Ergebnissen eingehend beschrieben. Hierauf folgen die wirtschaftlichen Verhältnisse, wie Bestellung der Alp, Erträgnisse, vorhandene Gebäulichkeiten u. s. w., dann als dritter Theil das Versuchsfeld, und zum Schluss die Resultate der Culturen. In dieser Hinsicht mögen hier die wichtigsten Schlussfolgerungen kurz angedeutet werden, indem sich das für den Botaniker wie für den Landwirth in hohem Masse interessante Detail dem Rahmen unserer summarischen Referate entzieht. Sonach ergäbe sich den HH. Verfassern zufolge: Dass es selbst in einer Höhenlage von 1800 M. und bei Nordexposition möglich ist, auf dem Fettboden eine Kunstwiese herzustellen, und zwar als rentable Anlage, die nothwendigen Umzäunungen vorausgesetzt; dass sich in nicht zu grosser Höhe (etwa 1400 M. ü. M.) die Samenzucht gewisser Pflanzen (Muttern, dunkler Süssklee, gemeiner Thaumantel etc.) empfiehlt, und dass endlich Schutzflächen, Rutschstellen, Steilabhänge, nackte Stelle auf Weiden

durch ebenfalls bestimmte Arten berast und ertragsfähig gemacht werden können.

Die Versuche werden fortgesetzt und stehen weitere Mittheilungen praktischen, wie rein wissenschaftlichen Inhaltes in Aussicht.

**Eine Tour in die Churer Alpen und Alpwaldungen** von Stadtschreib. *C. Brüschi* (Fr. Rhätier No. 245—252, Chur 1889). Die auf Gebiet von Arosa liegenden Alpen und Alpwaldungen der Stadt Chur gehören nicht nur zu den schönsten und umfangreichsten, sondern auch zu den bestgehaltenen unseres Kantons. Die eingehende Schilderung berücksichtigt die zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Weganlagen, Wiesencultur, alpwirtschaftliche Neubauten nicht nur vom landwirthschaftlichen, sondern auch von dem für Arosa überraschend schnell zur Bedeutung gelangten kurörtlichen Standpunkte aus.

#### 4. Chemie.

**Ueber das Vorkommen von Milchsäure im menschlichen Harn** von Dr. *E. Heuss*. (Archiv f. experimentelle Patholog. und Pharmakolog. 1889. Sep.-Abdr.). Nach den Untersuchungen des Verfassers ist im normalen Harn nach Muskelruhe keine Milchsäure nachweisbar; ob es nach anstrengender Muskelthätigkeit sich anders verhalte, scheint dem Verf. noch nicht ausgemacht und behält er sich bezügliche Untersuchungen vor. Ebenso wollte der Nachweis von Milchsäure im Harn auch in einer Reihe pathologischer Fälle nicht gelingen.

## 5. Meteorologie.

Der Lawinenschaden im schweizerischen Hochgebirge im Winter und Frühjahr 1887—88. Bearbeitet von *J. Coaz*, Oberforstinspektor, (Bern 1889). Ueber die unseren Kanton betreffenden Daten dieser sehr sorgfältigen und ausführlichen Darstellung vergl. bei der *Naturchronik* p. 67.

Ein Nebelbild auf dem Calanda von Dr. *E. Bosshard* (*Jahrb. XXIV. des S. A. C. 1889. p. 424*). Die Erscheinung dieses sog. Brocken- oder Rigi-Geistes gelangte am 16./VIII. Nachmittags unterhalb des Gipfels des Haldensteiner Calanda's in ausgezeichneter Weise zur Beobachtung: „Die Sonne stand im Südwesten, der Schatten der Beobachter zeigte sich auf der an der Ostseite dicht an den Grat herannahenden Nebelwand. Ueber uns war der klarste Himmel.“ Vom Schattenbilde war nur der Kopf deutlich ausgebildet, dasselbe hingegen von einem „Glorienschein“, der aus drei Farbenringen bestand, der innerste von der Intensität eines Regenbogens, umgeben. Die Beschreibung eines solchen Nebelbildes ist in unseren Berichten schon ein Mal von *J. Coaz* (*Jahrb. II. p. 58*) geliefert worden. Ueberhaupt scheint dieses Phänomen in unseren Alpen öfters beobachtet zu werden, und das Geisterhafte desselben hat wohl zu den Sagen des „Nebelmännchens“ Anlass gegeben.

## 6. Geologie, Bergbau.

Die Geologischen Bemerkungen über das Gebiet der Grauen Hörner von Prof. *Heim* (*Jahrb. des S. A. C. XXIV. p. 247*) erstrecken sich auch auf das anstossende graubündnerische Gebiet. Der Verf. bezeichnet die betreffende Region

als eines der allerzerknittersten Stücke der Erdrinde, woselbst die Schichten zusammengeschoben und verbogen erscheinen, auf die Gipfel wieder Gipfel übergeschoben seien, so dass zuoberst liege, was ursprünglich zu unterst gewesen. So sehen wir, was bekanntlich schon Escher und Theobald im höchsten Grade auffallen musste, die älteste Formation des Gebietes, den Verrucano oder Sernifit als Kuppe dem viel jüngeren Kalke aufgelagert. Die eingehende Darstellung dieses Gebietes soll im Text und den Profilen zur schon erschienenen, geologisch bearbeiteten Karte (Blatt XIV. des Dufour-Atlas) demnächst erscheinen.

**Aus der Geschichte des Bergbaues in den Kantonen Glarus und Graubünden** von *Chr. Walkmeister* (Jahresbericht der St. Gallischen Naturwissensch. Gesellschaft 1887/88). Unseren Kanton anbelangend hat der Verf. zunächst die bekannten Arbeiten von Salis-Marschlins, Prof. Brügger, Fr. Salis, Plattner, die Angaben in Theobald's Schriften u. A. benützt. Andererseits jedoch sind bisher noch nicht publizierte Quellen bearbeitet worden, so über die 1804 gebildete Gesellschaft zur Ausbeutung bündnerischer Erze in Tiefenkastels; an der Spitze derselben standen ein Spezereihändler Demenga aus Misox, zwei Schuhmacher, ein Fleischhacker, ein Grobschmied, und ein Probirmeister Namens Schnitzer. In Bezug auf den bergmännischen Betrieb kamen geradezu unglaubliche Tollheiten vor; trotz fortwährender Nachzahlungen auf die ursprünglichen 300 Actien ging Alles verloren und die Gesellschaft löste sich auf. Weniger bekannt ist das von Prof. *Deike* in St. Gallen hinterlassene Manuskript und Gutachten über einen in Seesvenna (Scarthal) vorgeschlagenen Bergbau auf Zink und Blei; es kam nur zu einigen Ver-

suchsbauten. Der Nämliche hatte auch ein weitläufiges Gutachten über das Goldbergwerk („Goldene Sonne“) am Calanda ausgearbeitet, das Theobald und Escher, richtigen Betrieb vorausgesetzt, ebenfalls für ertragsfähig hielten.

## 7. Botanik.

„Ins Engadin“ betitelt sich ein botanischer Reisebericht im Juli 1887 von Dr. *Winter*, welchen der Verf. in der deutschen botanischen Monatsschrift (VII. No. 2—12. Sondershausen 1889) publicirt hat. Die Reise ging von Chur aus über den Albula nach Pontresina, Val Fain und zur Bernina-Höhe. Die anziehend geschilderte Tour bringt ein ungemein reichhaltiges Pflanzenverzeichniss der verschiedenen abgesuchten Lokalitäten, das, wenn es auch, von einigen Standortsangaben abgesehen, aus dem so vielfach begangenen Gebiet keine neuen Formen mehr bezeichnet, doch anderseits immer wieder ein anregendes und erfreuliches Bild des reichen Blumen- und Kräuterschmuckes unserer Alpen aufrollt.

Ueber die Rosenformen um Chur, bei Flims, im Unter-Engadin und Münsterthal berichtet *Fr. Crepin*, der bekannte, hervorragende Rhodologe in: *Mes Excursions Rhodologiques dans les Alpes en 1889* (Sep.-Abdr. aus dem Bulletin der k. botan. Gesellschaft in Brüssel. Band 28. I. 1889). Von Chur aus besuchte Crepin noch weiterhin die Gebiete einerseits bis Churwalden, anderseits bis Flims; im Unter-Engadin wurde die Strecke von Boschia bis Tarasp und Schuls durchgenommen, wohl eines der reichsten Rosengebiete der Alpen. Indem überall die zahlreichen Funde mit einzelnen kritischen

Bemerkungen namhaft gemacht werden, unterzieht der Verf. speciell die Unter-Engadiner Formen unter Beziehung auf die von H. Christ in Basel (Rosen der Schweiz) die von demselben aufgestellten Beschreibungen einer sehr eingehenden Besprechung, und gelangt hiebei in manchen Punkten zu abweichender Ansicht. Als letztes räatisches Gebiet wurden noch die Umgebungen von St. Maria im Münsterthal und der Bäder von Bormio durchforscht

### 8. Zoologie.

**Entomologisches.** Die „Societas Entomologica“ (Zürich 1889) bringt zahlreiche und interessante Beobachtungen über die Käferfauna am Staller Berg und der Rocca Bella von *Fr. Rühl*, sodann von *Dürk* über Gross-Schmetterlinge im Gebiete des Stelvio. Eine neue Aberration von *Trochilium apiforme* aus Tarasp beschreibt *L. Caflisch* (in der deutschen Ent. Zeitschrift, Jahrg. 1889/90. II. Lepidopterolog. Heft).

### 9. Topographie.

Dem XXIV. Jahrg. des Jahrbuches des S. A. C. (Bern 1889) entnehmen wir folgende, unser Gebiet berührende Mittheilung:

**Die Pizzi di Sciora** von Dr. *Th. Curtins* (pag. 213). Der höchste Gipfel dieser zwischen dem Bondasca- und dem Albignathal gelegenen Spitzen misst 3225 M. Die Tour gieng (August 1887) von Maloja aus zum Monte Sissone, und zum Nachtquartier in die Val di Mello. Dann weiterhin von den Masino-Bädern nach dem Passo di Bondo. Die un-

günstigen Wetter und Schneeverhältnisse jedoch verhinderten die beabsichtigte Besteigung; dieselbe gelang erst 1888 nach 11stündigem Marsche von Promontogno aus. Der Ueberblick zunächst über die Bergeller Alpen wird als unbeschreiblich schön geschildert.

**Asensione del Pizzo Rotondo** (2829 M.) von *E. De-filippis* (Annuario del Club alpino Ticinese dell' anno 1887, Bellinzona 1878). Die genannte Spitze erhebt sich westlich vom Kurort St. Bernhardin, wie als Schlussstein zuhinterst vom Calancer Thale. Die Besteigung erfolgte am 15. Aug. 1887. Der Weg wurde über die auch botanisch lohnende Alp von Confine eingeschlagen zum Pass der Tre uomini hin mit seinem noch vereisten See. Die Spitze der P. Rotondo wurde nach einem Marsch von im Ganzen  $5\frac{3}{4}$  St. erreicht. Sie stellt einen sehr schmalen Sattel vor und eröffnet einen prachtvollen Ausblick von den Veltliner-Bergamasker Alpen bis zum Montblanc. Der Rückweg wurde in der nämlichen Richtung eingeschlagen. Zum Schluss folgt ein kurzes Pflanzenverzeichnis.

**Das Rheinwald-Horn** (3398 M.) von *W. Treichler* (Schweizer Alpenzeitung VIII. 7—9, Zürich 1890). Der Weg ging vom Hinterrhein aus durch die Zapportalp zur Klubbütte, wo übernachtet wurde, und weiterhin über den Paradiesgletscher zur Spitze des Rheinwald-Horns. Der Abstieg erfolgte in nördlicher Richtung durch das Lentathal nach Zervreila und das Valser Thal hinab. Die Spitze des Horns erscheint als eine zertrümmerte Fläche von 4—5 M<sup>2</sup>; neben den Bündner stellen sich namentlich die Berner und Walliser Alpen in besonderer Pracht dar.

**Der Six Madun** oder **Badus** (2931 M.) im Hintergrunde des Tavetscherthales wurde am 17. Aug. 1888 von Herrn *E. Deflippis* erstiegen. (Annuario del Club alpino Ticinese. III. Bellinzona 1888. p. 25—28). Der Weg ging von Andermatt aus über die Rossalp, dann über das Joch zwischen der Urner und Bündner Seite auf die letztere hinüber. Nach einem mühsamen Aufstieg über gefrorenen Schnee war die Spitze in 5 St. erreicht. Die Aussicht von den Tiroler Alpen bis zum M. Rosa hin soll derjenigen des Pizzo centrale nicht nachstehen. Der ungleich leichtere Abstieg erfolgte vom Toma-See über Tgietlems an die Oberalpstrasse und so nach Andermatt zurück.

**Aus der Silvretta-Gruppe** von *Hermine Tauscher* und *Heinr. Hess* (Mittheilungen des deutsch. und öster. Alpenvereins 1889. No. 5. 6. Wien). Nach einigen einleitenden Bemerkungen über der Charakter des Silvrettagebietes überhaupt, und insbesondere über die Wünschbarkeit, dass die Nomenclatur der verschiedenen Spitzen von schweizerischer wie von österreicher Seite in Uebereinstimmung gebracht und richtig gestellt würde, von Correcturen in der topographischen Darstellung abgesehen, beschreibt zunächst Frau Tauscher die Besteigung des Grossen Seehorns (3124 M.). Der Weg ging von der Alp Sardasca aus nördlich durch das Seethäli, unter Führung von Christ. Jann (August 1888), und wieder zur genannten Alp zurück. Den Gross-Litzner (3108 M.), den gewaltigen Nachbar des vorigen Berges, mit seinem ganz eigenthümlichen kegelförmigen Gipfel, erklimm H. Hess im folgenden September vom Madlener Hause im Hintergrund des Montafoner Klosterthales aus über den Klosterthalferner in nordwestlicher Rich-

ung. Der Gipfel wurde in nicht ganz 5 Stunden erreicht, und bietet der letzte Aufstieg am Kegel nach dem Verf. „wenn auch nicht ausserordentliche doch keine unerheblichen Schwierigkeiten.“ Der Rückweg ging wieder nach dem Madlener Hause. Den vorgefundenen Karten zufolge waren die HH. J. Jacot (1866), Hoffmann-Burkhard mit Landammann Brosi (1868), C. Mainzer aus Karlsruhe (1882) die ersten Besteiger. Eine beigegebene Zeichnung nach einer Photographie von A. Rzewuski gibt die Frontansicht von den kleinen Seehörnern bis zur Rothen Furka, zwischen welchen beiden die besprochenen, scheinbar unnahbaren Bergriesen emporragen.

**Haldenstein**, eine Federzeichnung seiner Natur, seiner Bevölkerung und seiner Geschichte von C. Brüschi. (Jahrb. des S. A. C. pag. 294). Der Verf. hat bei seiner Schilderung wohl kein Moment übergangen, das irgendwie von Interesse ist, und sind namentlich die geschichtlichen Daten zahlreich eingeflochten. Wie noch manche Punkte in unserem Kanton dürften zu solchen Schilderungen ein lohnendes Thema bieten! In Betreff solcher Beiträge zur Heimathskunde waren die Mitarbeiter des „Neuen Sammlers“ (1805 – 1812) viel thätiger und tritt nun der Werth solcher Monographien erst nachträglich vor Augen.

**St. Antonien i. Pr.** (Freier Rhätier No. 68 u. f. 1890). Der sich nicht nennende Verfasser (Kanzleidirector *Fient*) gibt in einer Reihe Schilderungen nach einem in der Section Rätia des S. A. C. gehaltenen Vortrage eine sehr eingehende und anziehende Schilderung seines obgenannten Heimatthales, seiner topographischen und naturhistorischen Verhältnisse, sowie der Bevölkerung, der Bauart, der Wohnungen und sonstiger

Eigenthümlichkeiten. Er schliesst mit einer reichlich bedachten Chronik der seit einigen hundert Jahren näher verzeichneten Verheerungen durch Natureignisse, und ansteckende Seuchen.

**Chur und Umgebung** von Dr. *E. Killias* II. Durchgesehene Auflage. (Zürich bei Orell, Füssli & Cie. 1889. Wanderbild No. 57—58). Vergl. J.-B. XXVII pag. 76.

### 10. Mineralbäder, Höhenkurorte.

**Analyse des neuen St. Moritzer Säuerlings** von *F. P. Treadwell*, Professor in Zürich. (In: Archiv der Pharmacie XXVI, 7. Berlin, Sep.-Abdr.). Diese neue, 1886 entdeckte und seither unter dem Namen „Funtauna Surpunt“ bekannt gewordene Quelle (wir entnehmen diese Angabe einem Prospectus über Gründung einer Actiengesellschaft zur Ausbeutung derselben), liegt ca. 400 M. nordöstlich von den alten Quellen, 1777 M. ü. M. Sie wurde in einer Tiefe von 6 M unter dem Boden gefunden und unter Anleitung von Prof. Heim gefasst. Analyse nach Treadurll:

Temperatur: 7° C. (Paracelsusquelle 5° 3).

Spec. Gewicht: 1,00220.

Wassermenge im Minimum: 160 Minuten-Liter.

In 10,000 Gramm Wasser sind enthalten:

#### **Surpuntquelle.**

#### **Paracelsusquelle.**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kaliumsulphat . . .    | 0,03455 |
| Natriumsulphat . . .   | 2,48539 |
| Ammoniumchlorid . . .  | 0,01810 |
| Magnesiumsulphat . . . | 0,80357 |
| Magnesiumbromid . . .  | 0,00120 |

| Surpuntquelle.          |          | Paracelsusquelle. |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Lithiumchlorid . . .    | 0,00630  |                   |
| Magnesiumchlorid . .    | 0,13744  |                   |
| Magnesiumborat . . .    | 0,02023  |                   |
| Magnesiumbicarbonat .   | 1,09252  |                   |
| Calciumfluorid . . .    | 0,00180  |                   |
| Calciumphosphat . . .   | 0,00151  |                   |
| Calciumbicarbonat . .   | 10,06124 | 13,01950          |
| Strontiumbicarbonat . . | 0,00065  |                   |
| Eisenbicarbonat . . .   | 0,50552  | 0,38648           |
| Manganbicarbonat . . .  | 0,02673  |                   |
| Aluminiumoxyd . . .     | 0,00635  |                   |
| Siliciumdioxyd . . .    | 0,62127  |                   |
| Organische Substanzen . | 0,01498  |                   |
| Summe                   | 15,83935 | 21,715494         |

Freie und halbgebundene CO<sup>2</sup>:

bei Quelltemperatur u. 615<sup>mm</sup> 18350,2 ccm. 19565.05 ccm.

Freie CO<sup>2</sup> ebenso 16003,8 „ 12828.10 „

Von den alten Quellen unterscheidet sich die Surpuntquelle namentlich durch ihre ausserordentliche Wassermenge und den höheren Eisengehalt; dagegen fehlen die Kohlensäuren Alkalien und das Chlornatrium, ebenso ist der Kalkgehalt ein geringerer, daher die Differenz in der Summe fester Bestandtheile.

**Adeer als Luftkurort und Eisenmoorbath** (Thusis 1889).

Der sich nicht nennende Verfasser (Prof. Dr. Goll in Zürich) hat schon früher das Adeerer Bad monographisch behandelt (1883). Die jetzige vierseitige Publication bezweckt zu Handen der Aerzte den speciellen Hinweis auf die Bedeutung

des Andeerer Klimas und seiner wirksamen, in Bünden bis dahin allein dastehenden Moorbäder. Gleichzeitig erschien von Dr. *Schmid*, Badearzt, ein Blatt in 4<sup>o</sup> über Wirkung und Gebrauch der Andeerer Kurmittel, (Mineralbad Andeer, Thuisis), deren Erfolg durch eine Reihe von Krankengeschichten illustriert wird.

Eine sehr eingehende Darstellung des **Fideriser Bades** hat *E. Trümpli* durch die Nummern 34—45 der illustrierten Wochenschrift die „Alpenwelt“ geliefert (II. B. 1889. St. Gallen). Alles bekannte Material erscheint zugleich auf Grund eigener Anschauung benützt und theilweise erweitert und werden auch der historische Theil, sowie die sich darbietenden näheren und weiteren Excursionsziele ausführlich bedacht.

**Führer für das Bad Tarasp-Schuls und Umgebung** mit Karte der Umgebung, II. Auflage (Würzburg, Leo Wörl, 1889).

**Führer durch Bad St. Moritz und Umgebung** mit Illustration und Karte. (Eben da). Beide Werkchen gehören zu der Suite der *Woerl'schen Reisehandbücher* und bieten in knapper Form das Wesentlichste zur Orientirung an beiden Kurplätzen.

**Die Kur- und Seebad-Anstalt Waldhaus-Flims** von Dr. *E. Killias*. (Mit Illustrationen von Weber. Zürich bei Orell Füssli & Cie. Zugleich als Wanderbild No. 160 publicirt. Dazu als Anhang: Historisches nach Prof. *Muoth*, und Geologisches von Prof. *Heim*, letzterer Sep.-Abdr. aus dem XVIII. Band des Jahrb. des S. A. C. Vergl. Jahrb. XXVII. p. 66. Chur bei Casanova. 1889). Der Inhalt der Schrift behandelt die allmälige Entstehung der gegenwärtig sehr in Aufnahme gekommenen Luftstation, ihre naturhisto-

rischen und klimatischen Verhältnisse, sowie die Bedeutung der Kurstation als solcher. Weiterhin folgen die Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung mit eingestreuten historischen und anderen Notizen. Die specielle Geschichte von Flims findet sich im obgenannten Anhang dargestellt.

**Arosa, ein Führer für die Fremden.** Herausgegeben vom Kurverein Arosa (Chur 1889. Mit 2 Karten). Verfasser sind die HH. Dr. *Egger* und *P. Mettier*. Das hübsch ausgestattete Schriftchen entwickelt in kurzen Zügen die hervorragendsten topographischen, historischen und naturgeschichtlichen Momente des jungen Kurortes, und knüpft daran die weiteren Angaben über die sich zunächst darbietenden Spaziergänge und Bergtouren. Das Hygienisch-Medicinische erscheint vorläufig kaum berührt, und ist wohl einer späteren Bearbeitung vorbehalten. Die in Reliefmanier und Farbendruck ausgeführte Karte der Umgebung von Arosa ist von Herrn *Fl. Davaz* hergestellt worden.

## 11. Karten, Panoramen.

**Karte des Kantons Graubünden** von *J. W. Mengold* (1 : 250000). V. Auflage. Revidirt von *Held*. (Chur bei Hitz. 1889).

**Karte des Kantons Graubünden** von *Ziegler* (1 : 25000). Neue revidirte Aufl. Chromolithogr. (Zürich, Wurster & Cie. 1889).

**Ober-Engadin**, im Maasstab von 1 : 50000, Ueberdruck mit Reliefton, zusammengestellt nach 6 Blättern des Siegfried-Atlas, 76 cm. : 53 cm. (Eidgen. topographisches Bureau in Bern. 1889). Die schöne, trotz des

Ueberdruckes sehr klare und deutliche Karte ist mit grossem Beifall aufgenommen worden, und sollen noch weitere Blätter in nämlicher Ausführung folgen.

**Die Kette der Ringelspitze vom Tschepp** (2943 M.)  
aus gesehen. Panorama, chromolithographisch, von *W. Benteli*. 70 : 12 cm. (Beilage zum XXIV. Jahrgang des Jahrb. des S. A. C. Bern. 1889).

*K.*



# Inhaltsverzeichnis.

## I. Geschäftlicher Theil.

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Mitgliederverzeichniss . . . . .                                                                              | V   |
| 2. Bericht über die Thätigkeit der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens in dem Geschäftsjahre 1888/89 . . . | XII |
| 3. Verzeichniss der eingegangenen Schriftwerke . . . . .                                                         | XIV |

## II. Wissenschaftliche Mittheilungen.

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Beiträge z. Mollusken-Fauna Graubündens v. Dr. G. Am Stein                                                       | 3  |
| II. Ueber eine monströse <i>Gentiana excisa</i> Presl. von Prof. Dr. Chr. Brügger und Prof. Dr. C. Cramer . . . . . | 35 |
| III. Wein-Analysen von Dr. E. Bosshard . . . . .                                                                    | 39 |
| IV. Beiträge zur Kenntniss bündnerischer Trinkwasser von Dr. E. Bosshard . . . . .                                  | 45 |
| V. Meteorologische Beobachtungen in Graubünden im Jahre 1888                                                        | 53 |
| VI. Literatur zur physischen Landeskunde:                                                                           |    |
| 1. Ethnologie . . . . .                                                                                             | 7  |
| 2. Medicin . . . . .                                                                                                | 72 |
| 3. Alpwirtschaft . . . . .                                                                                          | 74 |
| 4. Chemie . . . . .                                                                                                 | 76 |
| 5. Meteorologie . . . . .                                                                                           | 77 |
| 6. Geologie, Bergbau . . . . .                                                                                      | 77 |
| 7. Botanik . . . . .                                                                                                | 79 |
| 8. Zoologie . . . . .                                                                                               | 80 |
| 9. Topographie . . . . .                                                                                            | 80 |
| 10. Mineralbäder, Höhenkurorte . . . . .                                                                            | 84 |
| 11. Karten, Panoramen . . . . .                                                                                     | 87 |

Beilage: Killias, Verzeichniss der Käfer Graubündens. Bogen 1 bis 3.





Beilage.



Killias: Käfer Graubündens.

**Bogen 1-3.**



(Titel und Einleitung am Schlusse.)





## I. Cicindelidae.

### **Cicindela L.**

1. **campestris L.** *E.-A* An sonnigen, trockenen Wegen, Rainen u. s. w. von allgemeinsten Verbreitung in den herwärtigen, wie jenseitigen Thälern, bis ca. 2000 M. und darüber ansteigend; so in Val Fless (Heer), Oberalp u. Nufenen (Kriechb.), Avers (Brügg.) Val Plavna, Arosa (K.) u. s. w.

**var. connata Heer.** Engadin (Heer), Maladers, Savien, Rheinwald (Kriechb.), Zuoz (K.).

**var. affinis Fisch.** Selten mit der Stammform. (Sammlung Am St.).

**var. nigrescens Heer.** Meist alpin: Alp Fless (Heer), Oberalp (Brügg.), doch auch zuweilen tiefer, wie zwischen Ems und Reichenau (Kriechb.). Ebenso brachte Herr Stoffel ganz dunkle Ex. aus Misox.

2. **hybrida L.** *E.-A.* Wie die vorige verbreitet, doch mehr stellenweise in grösserer Häufigkeit, bis an 2000 M., vielfach variirend. (Vrgl. Heer l. c. p. 2).

**var. riparia Dej.** Namentlich an sandigen Bach- und Fluss-Ufern, schon von Füsslin 1775 angegeben; Rheinthal, Schanfigg, Davos, Unter-Engadin u. s. w.

**var. maculata Deg.** Malans, Engadin (Heer), Davos, Stürvis (Kriechb.).

3. **silvicola Dej.** *E.-A.* Gerne auf lichten, sonnigen Waldwegen und Hängen, durch alle Thäler verbreitet bis über die Baumgrenze: Avers (Stoffel), Arosa, Flüela (K.).

Heer (l. c. p. 3) hebt noch zwei Abänderungen hervor: eine Form mit feingekörnten Flügeldecken, bei Alveneu, durch ganz Ober-Engadin, Vals, und eine viel kleinere mit schmalen Halsschild bei Bevers.

4. *gallica* Brull. (*Chloris* Dej., *alpestris* Heer). *A.* Durch die ganze alpine Region bis zu 3000 M., gerne in der Nähe schmelzender Schneelager beim ersten kräftigen Erwachen der Vegetation. Im Ober-Engadin (Heer, Giebel), Schamser Alpen, Stürviser Berg, Oberalp (Kriechb.), Stätzer Horn, Piz Languard (Bugnion), Albula, Arosa (K.), Stelvio (Wocke).
5. *literata* Sulz. *E.* Am häufigsten längs des sandigen Rheinufers unter Chur und bei Haldenstein beobachtet (Kriechb., Cafl., K.), wo man das sehr flüchtige Thier am besten in den Morgenstunden erhascht; Malans, Ragaz (Heer), häufig bei Fürstenau (Stoffel).  
*var. lugdunensis* Dej. Bei Chur (Kriechb. Stett. Entomol. Zt. 1885, p. 215).  
*var. sinuata* F. Malans, Misox (Heer), Chur (Kriechb., Cafl.).
6. *germanica* L. *E.* Auf trockenen, sandigen Grasplätzen stellenweise durch das Rheinthal von der Herrschaft bis Fürstenau (Heer, Am St., Kriechb., Cafl., K.).

## II. Carabidae.

### Subfam. Carabidae.

#### **Cychrus Fabr.**

1. *angustatus* Hopp. *A.* (*C. Bovelinii* Heer). Bisher nur als Seltenheit in unseren Ostalpen bei 2000 M.

und darüber. Val Bevers (Heer 1834), Albula Passhöhe (Cafl.), Stelvio (Wocke).

2. **italicus** Bon. *E.* Südliche Species. Ich erhielt 1 Ex. von Grono; findet sich dann weiterhin im Kt. Tessin.
3. **caraboides** L. (*rostratus* L.) *E.-A.* Wohl die häufigste Art und von zahlreichen Standorten angegeben, besonders in den höheren Thälern. Chur (K), Domleschg (Stoffel), Alveneu (Brügger), Davos häufig (Nagel), Ober-Engadiner Seitenthäler und Pässe (Heer, v. Heyden, Stierl., Cafl. u. A.)  
**var. brevior, convexior.** Schaum. Chur am Piz Okel, Malixer, Haldensteiner und Aroser Alpen, Obersaxen (Kriechb.).
4. **attenuatus** F. *E.-A.* Minder häufig, doch in ähnlicher Verbreitung. Haldenstein, Zizers, Kurhaus Tarasp von einem Busche geklopft (K.), Davos selten (Nagel), Avers (Stoffel), Bergell (Bazz.).  
**var. intermedius** Heer *A.* Val Fless (Heer), Rheinwald (Stierl.), Ober-Engadin (Meyer), Lärchenwäldchen ob dem Bernina Wirthshaus (v. Heyden), bei Sils (Hnatek).
5. **cordicollis** Chaud. *A.* Sehr selten. Am Paradiesgletscher und Bernina (Heer). Hier, wie v. Heyden nach mündlicher Mittheilung angibt, im Lärchenwäldchen über dem Wirthshaus. Auch Giebel gibt das Bernina Wirthshaus an.

### **Calosoma Web.**

1. **sycophanta** L. *E.-M.* Auf Bäumen. Im Rheingebiet nur hin und wieder: Malans (Am St.), Schiers (Wirz). Um so häufiger in allen unseren Transalpinen Thä-

lern: Bergell (Forel u. A.), vielfach im untern Misox, an Lindenstämmen bei Canco am Puschlaver-See (965 M.) und tiefer bei Brusio (K.).

2. *inquisitor* L. E. Schon von Füsslin für Bünden angegeben, aber ungleich seltener als vorige Art. Gegend von Malans (Am St.), ein Mal bei Chur (Cafl.).

### **Procrustes Bon.**

1. *coriaceus* L. E.-*untere* A. Unser grösster Laufkäfer, gerne unter Steinen und abgefallenem Laube, noch über die montane Region hinauf. Churer Rheinthal; Savien (Gredig), Churer Maiensässe (Kriechb.), Monstein (Theob.), Arosa (K.), Le Prese (Davaz).

### **Plectes Fisch.**

1. *depressus* Bon. M.-A. Durch alle unsere Alpen vom Engadin bis zum Rheinwald und nach dem Calancathal hinüber verbreitet, meist in der alpinen Region, seltener tiefer wie: Nufenen (Heer), Dorf Misox (Stoffel), Davos gemein bis 2400 M. (Nagel) und hauptsächlich, wenn nicht ausschliesslich, in der
- var. intermedius* Heer (Heerianus Géhin) vom Autor speciell für Avers, Rheinwald u. Engadin angegeben.
- var. Bonellii* Dej. Ober-Engadin (Heer, v. Heyden, Giebel u. A.), Avers (Stoffel), Calanca (Brügger).

### **Platychrus Kol.**

1. *irregularis* F. A. Ob Flims nach der einzigen Angabe bei Heer. Ein Ex. in der Am Steinischen Sammlung.

## **Orinocarabus Kraatz.**

1. *hortensis* L. (*C. gemmatus* Fabr. Heer). *E.-A.* ziemlich verbreitet. Um Chur in sehr schönen Exemplaren (Kriechb., Cafl., K.), Churwalden, Zilliser Alpen, (Kriechb.), Ober-Mutten (Stoffel), Davos bis 1700 M. (Nagel), Staller Berg (Rühl), Nufenen, Lavin (Heer), Samnaun (K.).
2. *sylvestris* F. Panz. *M.-A.* An tieferen Standorten weniger bemerkt: Domleschg (Stoffel), Münster (Pernsteiner), in der alpinen Lage hingegen sehr verbreitet, stellenweise gemein: Engadin (Heer, Stierl., v. Heyden), Davos gemein (Nagel), Arosa (K.). Ebenso die *var. nivalis* Heer. So von allen Beobachtern für das Ober-Engadin aufgeführt. Flüela (Bugnion), Parpaner Augstberg, Oberalp, Piz Beverin, Stürviser Alp (Kriechb.).
3. *alpinus* Bon. Dej. *A.* Durch das Gebiet allgemein verbreitet: Val Fless, Val Bevers, Rheinwald, Splügen (Heer), Albula (Cafl.), Staller Berg (Rühl), Arosa (K.), Valletta-Pass, Malixer Alpen (Kriechb.), Dischma-Thal (Dietrich) u. s. w.

## **Chaetocarabus Thoms.**

1. *intricatus* L. *E.-A.* Unter Steinen, in den höheren Lagen jedoch ungleich spärlicher. Nicht selten bei Chur (Kriechb., Frei-G., Cafl., Brügg., K.) namentlich hinter St. Luzi; Felsberg, Disentis (K.), Domleschg (Stoffel), Via-mala (Cleric). Bei Bevers noch von Heer

beobachtet, am Staller Berg (Rühl). Ebenso in den transalpinen Thälern: Poschiavo, unteres Misox (K.).

### **Megadontus Sol.**

1. **purpurascens** F. *E.-M.* (*C. violaceus* L. var.). Nach Heer „in Bünden.“ In der Sammlung Am St; wohl aus der Herrschaft.
2. **violaceus** L. *E.-M.* Unter Steinen und faulenden Stöcken hie und da, eben nicht häufig. Chur (Caf., K.), Schuls (K.); häufiger erhielt ich die Art aus den transalpinen Thälern: Bergell, Poschiavo, Roveredo.
3. **Neesi Hoppe** Heer *A.* Von anderen Autoren als die gedrungenere, alpine Form der vorigen Art hingestellt. In unserem Hochgebirge allgemein verbreitet. Durch ganz Ober-Engadin und seine Seitenthäler (Heer, v. Heyden, Meyer-D. Forel) bis zum Bernina-Wirthshaus und der Albulahöhe (Kriechb.), Churer Spontisköpfe (derselb.), Obersaxen (Casanova).  
var. **Kunzei** Heer. „Bernina 7000' ü. M.“ (l. c. p. 27).

### **Melanocarabus Thoms.**

1. **glabratus** Payk. *E.-A.* Malans (Am St.), Chur (Schul-sammlung), Montelin u. St. (Kriechb.), Davos selten (Nagel), Glaris (Heer), Flims (Caf.), unterhalb Savien-Platz (Frei-G.), Avers über Juf (Bugnion, Stoffel), Obersaxen (Casanova), Rheinwald (Heer), Bernhardiner Alpen (Brügg.).

### **Mesocarabus Thoms.**

1. **catenulatus** Scop. *E.* Nach der Angabe bei Füssliu von Dr. Am St. d. Ä. in Bünden gefunden und dann

sicherlich in der Gegend der Herrschaft, wo die Landquart, wie in botanischer, so auch speciell in entomologischer Hinsicht für manche hier noch vereinzelt von der ebeneren Schweiz her auftretende Arten ihrem weiterem Vordringen rheinaufwärts eine Grenze zieht, während sich jedoch einzelne derselben dem rechten Ufer des genannten Flusses entlang bis in das Prätigau hinein nachweisen lassen.

### **Chrysocarabus Thoms.**

1. *auronitens* F. *E.-M.* Häufig unter Steinen namentlich im Gebiete des Rheines und seiner Zuflüsse, mehr in den mittleren und höheren Lagen. Maienfeld (K.), Chur und die anstehenden Berghöhen (Kriechb., Cafl.), Domleschg (Stoffel), Schiers (Wirz), Davos gemein (Nagel), Schams (Peyel). Ein Mal in der Tarasper Gegend getroffen, sonst ist mir für ganz Engadin keine Angabe bekannt.

var. *atratus* Heer. *A.* Piz Okel, Parpan nach dem Augstberg (Kriechb.).

### **Carabus L.**

1. *auratus* L. *E.-A.* Im Churer Rheinthal allenthalben, namentlich im Frühjahr auf sonnigen Wegen, frisch aufgearbeiteten Gartenbeeten u. s. w. Misox, im Unter-Engadin höchst selten (K.), Prätigau, Luzein, aber in Davos nicht mehr (Nagel), Langwies (Janett). Die Art soll nach gewöhnlichen Angaben nicht hoch gehen, doch hat sie Kriechbaumer in der Malixer Alp unter Steinen angetroffen, ebenso wurde sie mir von

Runggelier ob Chur und der Gegend der Spontisköpfe geöracht, also immerhin aus Standorten von 1600—1800 M. ü. M., und zwar in der typischen und nicht in der abweichenden Form *var. Honoratii*, welche Herr für die Glarner Alpen aufführt.

2. *clathratus* L. *E.* Die Angabe bei Füsslin, wornach Dr. Am Stein d. Ä. diese seltene Art bei Malans gefunden, ist auch seither (1775) die einzige für die ganze Schweiz geblieben.
3. *granulatus* L. *E.-M.* In den tieferen Thallagen allgemein verbreitet. Im ganzen Rheinthal bis Thusis, im Vorder-Prätigau (Wirz), Münsterthal, Misox u. s. w.
4. *arvensis* Herbst. *E.* Bei Malans und Pfäfers (Am St., Ex. in dessen Samml.). Auch von dieser Art gilt das vorhin (p. 7) bei *M. catenulatus* bemerkte.
5. *cancellatus* Jll. *E.* Sehr häufig, genau in der Verbreitung wie *C. granulatus*. Färbung variirend von erzfarbig bis grau-grün.  
*var. pedibus ferrugineis* Heer (l. c. p. 13). Von Freigessner, den Aufzeichnungen von Kriechbaumer zufolge, wohl in der Churer Gegend gefunden.
6. *monilis* F. *E.* Bei Malans (Am St.). Häufiger im untern Misox, Grono, Roveredo (K.).
7. *nemoralis* Müll. *E.-M.* Im Rheinthal sehr verbreitet, besonders im Frühling unter Steinen von Chur bis Fläsch überall getroffen.
8. *convexus* F. *E.-M.* Ziemlich verbreitet, aber nicht gemein. Malans und Jenaz (Am St.), Chur (Kriechb., K.), bei der Ruine Lichtenstein unter Steinen (Kriechb.),

Savien-Platz (Frei-G.), Domleschg (Stoffel), 1 Stück auf dem Davoser Seehorn ca. 1650 M. (Nagel).

**Subfam. Nebriitae.**

**Nebria Latr.**

1. **picicornis** Fabr. *E.-A.* Chur am Rhein mehrmals u. St. (Kriechb), Schiers (Wirz), Davos häufig (Nagel), Ober-Engadin bis zur Berninahöhe vielfach notirt (Heer, Meier-D., Kriechb., v. Heyden), Hinter-Rheinwald an Schneefeldern (Frei-G.), Bernhardiner Alpen (Brügg.).
2. **Jokischi** Sturm. *A.* Vielfach durch den ganzen Kanton von etwa 1600 M. an bis auf die Passhöhen verbreitet. Davos (Nagel), Arosa (K.), Val Bevers, Scalletta (Heer), und sonst noch im Oberengadin (Frei-G.), Albulapass (Cfl.), Nalps (Frei-G.), Misox und Calanca (K.), Stelvio (Bugnion).  
**var. nigricornis** Villa. (Höpfneri Dahl. Heer). Selten. Runggelier ob Chur (Kriechb), Oberengadin (Heer, Frei-G.).
3. **Gyllenbali** Schönh. *M.-A.*, sehr häufig. Viamala, Hinter- rhein (Kriechb.), Davos gemein (Nagel), Valser Berg (Stoffel), Ober-Engadin von zahlreichen Punkten an- gegeben (Heer, v. Heyden, Meyer-D. u. A.), Val Li- schanna (Stierl.), Misox (K.).  
**var. arctica** Dej. An den höheren Standorten zuweilen mit der Stammform. Bernina am schwarzen See (Stierl.), Bernhardin (Letzner).
4. **nivalis** Payk. *A.* (N. Gyllenh. var. c.). Nach Angabe des Stierlin'schen Cataloges von Frei-Gessner in Bün- den gefunden.

5. *laticollis* Dej. *A.* Als grosse Seltenheit von Heer vom Lukmanier angegeben.
6. *castanea* Bon. *M.-A.* Wohl die allerhäufigste Art in den herwärts gelegenen, wie in den transalpinen Thälern, so namentlich im Engadin sehr gemein; dann auf den Bergen und Alpen von Chur (Kriechb., K.), Hinterrhein, Piz Beverin (Frei-G.) u. s. w.
- var. *picea* Dej. Mit der Stammform, so auf Bernina (Heer), und sonst im Ober-Engadin, Staller Berg (Rühl) u. s. w.
- var. *umbrina* Germ. (*depressa* Heer). Nach Angabe von Heer von besonders hochalpinen Standorten: Zaportalp, Gletscherinsel Aguagliouls auf dem Rosegg, Berninakette in Schneelöchern, Val Urschai.
7. *Germari* Heer. *A.* Hochalpine Art. Canalpass, Scaradra, Zaportalp, Flüela, Scaletta (Heer), Minschunalp (Heer, K.), Valser Berg (Stoffel), Dischmathal (Dieterich), Alp Casons (Caf.), Staller Berg (Rühl).
- var. *Escheri* Heer. Bei Sedrun (Frei-G.).
8. *angustata* Dej. (*N. Chevrieri* Heer). *A.* In Höhen bis an 3000 M., selten. Mehrfach um die Quellen des Hinterrheins: Paradies, Scaradra, Canalpass, dann am Bernhardin (Heer, Stoffel), Zaportalp, Valettapass (Frei-G.), Piz Glüna, Arosa (K.).
- var. *pronoto angustiore*. Alp Urschai (Heer l. c. p. 39).
- var. *duplo minor*, *pronoto angustiore*. Scaradrapass (Heer *ibid.*).
9. *Bremii* Heer. *Germ. A.*
- var. *major*, *pronoto brevior*. Paradies (Heer l. c. p. 39).

var. *antennis nigro-maculatis*. Calanker Alpen  
(Heer *ibid.*).

### **Leistus Fröhlich.**

1. *spiniarbis* Fabr. (*L. coeruleus* Clairv. Heer). *E.-M.* Im Churer Rheinthal nicht so selten. Malans (Am St), um Chur (Mengold, Kriechb., Frei-G., K.), beim Untervatzer Steinbruch (Mengold, Kriechb.), unter Maladers (Kriechb.).
2. *montanus* Steph. var. *Räticus* Heer. *M.-A.* Selten, bisher nur im Engadin Val Camogasc (Heer), Val Canaria bei Samaden (Stierl., Bischof, Imhof), St. Moritz (Giebel), Ardez, Guarda (K.).
3. *nitidus* Duft. *A.* Nicht häufig. Im Rheinwald, Engadin (Heer), Val Campagna (Stierl.), ein Mal im zweitobersten Churer Maiensäss, und ebenso in den Malixer Alpen u. St. (Kriechb.).
4. *ferrugineus* L. (*L. spinilabris* Panz). (*E.*). *A.* Sehr selten. Am Bernhardin (Heer).
5. *picus* Fröl. *A.* Selten. Viunalp am Bernhardin (Heer), Bergell und Churer Alp (Theobald), Misox (K.), Staller Berg (Rühl).

(Subfam. Notiophilini.)

### **Notiophilus Duméril.**

1. *aquaticus* L. *E.-A.* An feuchten Stellen u. St. u. dgl. allgemein verbreitet; so im Churer Rheinthal, gemein auf Davos (Nagel) in beiden Engadinen bis über 3000 M., so auf dem Piz Surlei 3187 (Bugnion) Berninapass u. s. w. Am Bernina Wirthshaus traf Kriechb. ein stahlblaues Ex.

2. *palustris* Duft. *E.-A.* Chur und Umgebung (Kriechb., K.), Domleschg, Grono, Disentis, Unterengadin (K.), am Statzer See, Morteratsch, Bernina (Meyer-D.).
3. *biguttatus* Fabr. *E.-A.* Um Chur (Kriechb., K.), Maladers, Domleschg, Schiers, Grono, (K.). Im Ober-Engadin vielfach noch über 2000 M. angegeben (Heer, v. Heyden, Giebel).
- var. *semipunctatus* Fabr. Malans (Am St.), Chur und noch sonst mit der Stammform.

Subfam. Omophronitae.

**Omophron Latr.**

1. *limbatus* Fabr. *E.-M.* Als grösste Seltenheit ein Mal aus der Churer Gegend von einem Schüler gebracht. Bei Münster (Pernsteiner, bei Gredler Käfer Tirol's). Unersere reissenden und grobes Geschiebe ablagernden Bergwässer scheinen dieser wie noch manchen andern, an mehr ruhigen Sandufern sich ansiedelnden Arten, wenig günstig zu sein.

Subfam. Bembidiitae.

**Elaphrus Fabr.**

1. *uliginosus* Fbr. *E.* Ein mal aus Calanca erhalten.
2. *riparius* L. *E.-M.* In Bünden (Heer). Chur bei der Rheinsäge (K.), bei Haldenstein (Sch. Schällibaum), bei Fürstenau (Stoffel), Schiers (Wirz), beim Kurhaus Tarasp (K.).
3. *aureus* Müll. (*E. littoralis* Dej.) *E.* Selten. Kleine Au und am Rheinufer bei Chur (Kriechb.). Bei Zizers (Sch. Schällibaum).

## **Tachypus Laporte.**

1. **caraboides** Schrank. *E.-A.* an Flussufern. Malans (AmSt.), Chur mehrfach am Rheinufer (Kriechb., Frei-G.), Nufenen (Heer, Stierl.), am Roseggbach zahlreich (Meyer-D.), am Flatzbach bei Pontresina (Giebel).
2. **pallipes** Duft. (*F.*)-*A.* In der Am Stein'schen Sammlung. Bevers (Heer), am Roseggbach (Meyer-D.).
3. **flavipes** L. *E.* Die häufigste Art, geht jedoch kaum bis in die montane Region. Von der Herrschaft bis Thuisis hinauf vielfach verzeichnet (schon bei Füsslin als *Cicindela flavipes* leg. Dr. Am Stein). Bei Maladers (K.), Schiers (Wirz).

## **Bembidion Latr.**

### *Bracteon* Bed.

1. **striatum** F. *E.-A.* Selten. Wiederholt auf dem Sande des Rheinbettes bei Chur (Kriechb.), am Flatzbach und am St. Moritzer See (v. Heyden).
2. **foraminosum** Sturm. *E.* Selten. In der Kleinen Au bei Chur (Kriechb.)

### *Testedium* Mol.

3. **bipunctatum** L. *E.-A.* An tieferen Standorten anscheinend sehr selten; ich finde nur Malans bei Heer angegeben.  
**var. nivale.** Godet. Findet sich dafür durch die ganze alpine Region bis über 3000 M. im Gebiete unserer Central- und Ostalpen ganz allgemein verbreitet. Stätzerhorn (Bugnion), Davos gemein (Nagel), Engadiner Alpen (Heer, Stierl., Meyer-D., v. Heyden u. A.), Franzeshöhe an Schneeflecken (Gredler), ebenso traf ich die Art auf der Flüelähöhe über den Schnee laufend.

**var. sexpunctatum Heer.** Vom Autor aus Val Fless angegeben.

Noch führt Herr von Heyden eine *var. atrata* Heer auf (schwarzblau), die er am Berninapass antraf, wo schon früher Heer sie gefunden hatte.

4. **laticolle Duft.** *E.* Sehr selten. Befand sich nach Mittheilung von Prof. Kriechb. s. Z. in der Scheuchzer'schen Sammlung, zweifelsohne aus der Churer Gegend. Bei Ragaz (Huguenin).

*Bembidion Latr.*

5. **lampros Herbst.** (*B. celere* Heer). *E.-A.* Ganz allgemein in allen Thälern des Kantons verbreitet. Die *var. velox* Er. weniger häufig als die Stammart (Churer Rheinthal, Fläscherberg: Frei-G.) und *Felixianum* Heer, nach Heer sehr selten, von Nufenen angegeben, ferner von Prof. Kriechbaumer hinter Ems unter St. notirt, sind neuerdings wieder eingezogen worden. (Vergl. Schaum l. c. p. 718.)

6. **Sahlbergi Dej. var. raticum Heer** (*B. pyrenaenum* Dej. *var. ratic.* Heer). *A.* Bernina einzeln u. St. (v. Heyd.), ebenda, am Staller Berg und der Alp Fless (Heer), Morteratsch, Cambrena (Meyer-D.).

**var. glaciale Heer.** *A.* Ungleich häufiger als die vorige Form, bis zu 3000 M. Rheinwald, Avers (Heer), Ober-Engadiner Alpen, Bernina (Stierl., Meyer-D., v. Heyden), Malixer Alpen, Lückli bei Nufenen (Kriechbaumer), Piz Beverin (Frei-G.), Davos (Nagel), Spontisköpfe, Stätzerhorn, Arosa (K.), Stilsferjoch in Menge am Schnee (Eppelsh.).

*Neja* Mot.

7. *pygmaeum* F. *E.* In der Churer Au und am Rheinufer mehrfach n. St. (Frei-G., Kriechb.), Fürstenau (Stoffel).

*Euphaues* Mot.

8. *minimum* F. (B. *pusillum* Gyll.) *E.-A.* Am Rheinufer bei Chur (Frei-G., Kriechb.), in der Sammlung Am Stein. Pontresina (Meyer-D).

9. *tenellum* Er. *E.* Sehr selten. Bei Schiers (Wirz).

*Trepanes* Mot.

10. *articulatum* Panz. *E.-M.* Nicht häufig. Churer Au (Kriechb.), Flims (K.).

*Lopha* Steph.

11. *quadrinaculatum* L. (*E.-A.*) Für die ebene Schweiz als häufig bezeichnet, kenne ich für unser Gebiet nur die Angabe bei Heer (l. c. p.): Nufenen am Rhein nicht selten

12. *quadriguttatum* F. *E.* In der Am St. Sammlung. Chur hinter St. Luzi (Scheuchzer, K.), Domleschg (Stoffel).

*Synechostictus* Motsch.

13. *elongatum* Dej. *E.* Sehr selten. Bei Chur (Kriechb.).
14. *decoratum* Duft. (B. *albipes* Sturm, *crenatum* Dej.) *E.* Selten. Ein Mal bei Chur an der Plessur (Frei-G.).
15. *ruficornis* Sturm. *E.-A.* Selten. Chur am Plessurufer (Bugnion), auf Davos (Nagel).
16. *stomoides* Dej. *E.* Selten. Bei Chur (Frei-G.).

*Periphus* Steph.

17. *fulvipes* Sturm. (B. *distinctum* Dej.) *E.* Mehrfach im Churer Rheinthal gefunden. Malans (Heer), Chur am Rheinufer und Plessurufer (Kriechb., Bugnion, K.).

18. **decorum** Panz. *E.-M.* Vereinzelt. Chur, Tarasp am Innufer (K.).
19. **nitidulum** Marsch. (B. rufipes Gyll., brunripes Sturm.) *E.-A.* Churer Gegend (Kriechb., K.), Malans (Am St.), Haldensteiner Maiensässe, wiederholt bei Tarasp (K.), Davos (Nagel).  
**var. alpinum** Dej. (B. geniculatum Heer) In den Bündner Alpen nach Heer nicht selten, namentlich mehrfach für das Ober-Engadin angegeben (Meyer-D., von Heyden, Letzner, Pfeil «var. deletum Dej.»).
20. **fasciolatum** Duft. *E.-A.* Sehr vereinzelt. In der Am St. Sammlung. Von Sch. Casanova wahrscheinlich aus der Churer Gegend Herrn Kriechb. zugebracht. Bellaluna (K), Bevers (Heer), Münster (Prevost).
21. **tibiale** Duft. *E.-A.* Maienfeld, Castiel (K.), Chur (Kriechbaumer, Frei-G., K.), Rhäzüns, Saas, Malixer Alpen (Kriechb.). Rheinwald, Stürviser Alp (Frei-G.).  
**var. complanatum** Heer. Am See von St. Moritz (v. Heyden).
22. **tricolor** F. *E.-A.* In der Am St. Sammlung. Tarasp (K.), Davos (Nagel).
23. **ripicola** Duft. (B. scapulare Dej.) (*E.-A.*) Seltenheit. St. Moritz (v Heyden). Am Flimser See 1 Ex. (K.).
24. **testaceum** Duft. (B. obsoletum Dej.) *E.-M.* Auf dem Rheinkies bei Chur (Kriechb.), Le Prese (K.).
25. **saxatile** Gyll. *E.* Sehr selten. Kleine Au bei Chur unter Steinen (Kriechb.).
26. **Andreae** F. *E.-A.* Chur (K.), Münster (Prevost), Casaccia (Bugnion).

27. **femoratum** Sturm. *E.-A.* Chur am Rheinufer (Kriechb., Frei-G.), Schiers (Wirz), St. Moritz, Bevers (v. Heyd.), am Flatzbach (Giebel).
28. **ustulatum** L. (*B. littorale* Oliv., *rupestre* Gyll.) *E.-A.* Vielfach im Churer Rheinthal (Kriechb., Frei-G., K.), Flims, Unter-Engadin (K.), Schiers (Wirz), Disclmathal (Dieurich), Rheinwald (Brügger), Ober-Engadin häufig (Heer, v. Heyden, Meyer-D.).
29. **fluviatile** Dej. (*E.-A.*) Selten. Tarasp (K.), Davos (Nagel).
30. **lanatum** Duft. (*E.-A.*) St. Moritz, Val Bevers, am Flatzbach (v. Heyden, Giebel).

*Philochtus* Steph.

31. **assimile** Gyll. (*E.-A.*) Selten. Am Inn bei Bevers.

*Ocys* Steph.

32. **quinquestriatum** Gyll. *E.* Einige Male bei Chur getroffen (K.). Im Domleschg (Kriechb.).

**Tachys** Steph.

1. **sexstriatus** Duft. (*Bembid. angustatum* Heer). *E.-M.* In der Sammlung Am St., sowie in der Scheuchzer'schen nach Angabe von Kriechb. Wohl aus dem Churer Rheinthale.
- var. quadrisignatus** Duft. In der Churer Au (Kriechb.), und daher ein Ex. in der Sammlung Am St. Am Innufer bei Tarasp ein Ex. (K.).
2. **nanus** Gyll. *E.-A.* Via-mala unter Rinde (Frei-G.), Oberalp (Kriechb.).

**Trechus Clairv.**

1. *rubens* F. (Tr. *paludosus* Gyll.). (*E.*)-*A.* St. Moritz unter St. (v. Heyden), einige Male ebenso beim Kurhause Tarasp (K.).
2. *elegans* Putz. *A.* Am Piz Languard (Letzner), bisher sonst nur aus den Ostalpen bekannt.
3. *glacialis* Heer. *A.* Panixer Pass (Heer, Frei-G.).  
     var. *profundestriatus* Heer. Eben da (Heer).  
     var. *assimilis* Heer (mit *macrocephalus* Heer vereinigt, Cat. Weise III. Ed.). Urschai und Alp Fless (Heer).
4. *laevipennis* Heer. *A.* Lukmanier (Heer), Nufenen (Stierl.), Zaportalp, Calanda (Frei-G.).  
     var. *Pertyi* Heer. Alp Fless (Heer).
5. *quadristriatus* Schrank (Tr. *minutus* F.) *E.*-*A.* Ein Mal bei Chur und bei Parpan; mehrere Exemplare bei Disentis (Kriechb.).  
     var. *obtusus* Er. *E.*-(*A.*). Kleine Au bei Chur (Kriechb.).

**Patrobus Steph.**

1. *excavatus* Payk. *E.*-(*A.*). Im Gebiet höchst selten. Untervatz unter Steinen (Kriechb.).

**Brosicus Panz.**

1. *cephalotes* L. *E.*-*M.* Churer Rheinthal u. St., Malans (Am St.), Zizers (Sch. Schällibaum), öfters bei Chur. Am Ufer der Rabiusa in Savien (Frei-G.).

**Miscodera Esch.** (*Leiochiton* Curt.).

1. *arctica* Payk. *A.* Die seltene, hochalpine Art findet sich bisher fast nur aus der Berninagruppe angegeben.

Ob dem Wirthshaus, besonders bei den Seen (Heer, Stierl., Meyer-D., Bugnion), in Val Rosegg am Gletscher (Stierl.), Stelvio bei der IV. Cantoniera (Bugnion).

#### Scarititae.

### **Clivina Latr.**

1. **fossor** L. *E. untere A.* Churer Rheinthal und Domleschg nicht selten.  
*var. sanguinea* Leach. Ein Mal hoch auf Runkelier ob Chur (Kriechb.). Auch in Tirol geht die Art nach Gredler bis in Höhen von 5000 und 6000'.
2. **collaris** Herbst. *E.* Bei Untervatz zwei Mal unter Steinen getroffen (Kriechb.), bei Schiers (Wirz).  
*var. discipennis* Meg. In der kleinen Au bei Chur (Kriechb.).

### **Dyschirius Bon.**

1. **globosus** Herbst. *E.-A.* Zwischen Ems und Reichenau wiederholt u. St., dann zwischen Andeer und Splügen (Kriechb.), Schiers (Wirz), Davoser Seeufer im Sande (Pestalozzi), ebenso ein Mal am St. Moritzer See (v. Heyden).
2. **semistriatus** Dej. *E.* In der kleinen Au und am Rheinufer bei Chur mehrmals u. St. (Kriechb.).
3. **aeneus** Dej. *E.* In der Am Stein'schen Sammlung. Im Domleschg (Stoffel).

#### Loroceritae.

### **Lorocera Latr.**

1. **pilicornis** F. *E.-A.* In der Umgebung von Chur nicht selten. (K.), ebenso auf Davos (Nagel), dann mehr-

fach im Ober-Engadin von Meyer-D. notirt. Die var. *alpina* Heer vom Autor in Val Rosegg angetroffen; von eben da die Angabe von Giebel, die sich auf die nämliche var. beziehen mag. — Im Bergell und bei Tarasp (K.).

#### Harpalitae.

### **Panagaeus Latr.**

1. *erux major* L. *E.* Im Churer Rheinthal nicht selten (Am Stein, Kriechb., K.), Domleschg (Stoffel), Schiers (Wirz).
2. *bipustulatus* F. *E.* (*P. quadripustulatus* Sturm). In der Am Stein'schen Sammlung; bei Chur (K.), Zizers (Sch. Schällibaum).

### **Callistus Bon.**

1. *lunatus* F. *E.-M.* Malans (Am St.), nicht selten bei Chur bis zum Buol'schen Maiensäss (1342 M.) und gegen Maladers (Kriechb., K.), Domleschg (Stoffel), Schiers (Wirz).

### **Chlaenius Bon.**

1. *vestitus* Payk. *E.* Selten. Im Pol'schen Verz. aufgeföhrt. Felsberg (Theobald), Schiers (Wirz).
2. *nitidulus* Schrank. (*E.*)-*M.* (*Chl. Schranki* Duft). Münster (Prevost).  
 var. *tibialis* Dej. Wohl durch den ganzen Kanton verbreitet. Churer Rheinthal vielfach angegeben. Auf Runkalier ob Chur um 1300 M. (Frei-G.), Domleschg (Stoffel), Flims, Tarasp, Bergell (K.).

3. *nigricornis* F. *M.-A.* Viel seltener. Schiers (Wirz), Tarasp, Münsterthal, Ponte (K.), Davos (Dietrich).  
*var. melanocornis* Dej. Bei St. Moritz (Pfeil).

### **Licinus Latr.**

1. *cassideus* F. *E.* Höchst selten. Malans (Heer).  
 2. *depressus* Payk. *E.-A.* Um Chur bis in die Maiensässe und bei Langwies (Kriechb.), Savien bei 1660 und Albula bei 2000 M. (Frei-G.).

### **Badister Clairv.**

1. *bipustulatus* F. *E.-M.* Umgebung von Chur nicht so selten (Kriechb., Frei-G., K.), Zizers (K.), Luziensteig und Fläscher Berg (Frei-G.), Wiesen (Letzner), Schiers (Wirz), Vetan (K.), Davos (Letzner).  
 2. *sodalis* Duft. (*B. humeralis* Bon). *E.* Chur und Umgebung (Scheuchzer, Kriechb., K.), hinter Ems (Kriechb.), bei Zizers (K.).

### **Anisodactylus Dej.**

1. *birotatus* F. *E.-A.* Malans (Am St.), Schiers (Wirz), Chur vielfach (Kriechb., K.), Davos (Nagel), Langwies, Tarasp (K.).  
*var. spureaticornis* Dej. Chur, Runkalier (Kriechb., K.).  
 2. *nemorivagus* Duft. *E.-M.* Malans (Heer), Schiers (Wirz), unteres Misox (K.).

### **Diachromus Er.**

1. *germanus* L. *E.* Sehr vereinzelt. Erlenboden bei Malans (in der Samml. Am St.), Schiers (Wirz), Fürstenau (Stoffel).

### **Ophonus Steph.**

1. *sabulicola* Panz. *E.* Selten. Malans (Am St.), Brusio ein Stück mit grünen Flügeldecken, Grono (K.).
2. *obscurus* Fabr. (*O. monticola* Dej.). *E.-M.* Foral und Lürlibad bei Chur (Kriechb.), Runkalier (Frei-G.), Schiers (Wirz), Kurhaus Tarasp (K.).
3. *punctulatus* Duft. *E.-A.* Die Stammart scheint noch nicht nachgewiesen, sondern es vertritt sie im Gebiete die überall verbreitete  
     *var. laticollis* Maanh. Churer Umgebung bis gegen Malix (Kriechb.), Jenins (K.), Runkalier, Savien (Frei-G.), Nufenen (Heer), Davos am Seehorn (Pestalozzi), Engadin (Stierl.), Tarasp, Vetan, Arvigo (K.).
4. *azureus* Fbr. *E.-M.* Malans (Am St.), bei Chur vielfach notirt; Savien und Runkalier (Frei-G.), Schiers (Wirz), Flimser Waldhäuser, Tarasp, Misox (K.).
5. *cordatus* Duft. *E.-M.* Arvigo (K.).
6. *rupicola* Sturm. (*O. subcordatus* Dej.). *E.* Churer Au und gegen Maladers je ein Mal (Kriechb.), Schiers (Wirz).
7. *puncticollis* Payk. *E.-M.* Ebenfalls nicht gemein. Um Chur (Kriechb., K.), Schiers (Wirz), Tarasp, Splügen (K.).
8. *brevicollis* Serv. *E.-M.* Selten. Im Pol'schen Verz. ohne Angabe des Standortes. Chur, Tarasp, Poschiavo (K.), Schiers (Wirz).
9. *signaticornis* Duft. (*E.*)-*M.* Ein Mal bei Splügen (K.).

### **Pseudophonus Motsch.**

1. *pubescens* Müll. (*ruficornis* F.) *E.-M.* Durch das ganze Gebiet in häufigster Verbreitung, geht aber nicht so hoch, wie die folgende Art.

2. *griseus* Panz. *E.-A.* Nicht so häufig, so im Churer Rheinthal, Oberland, Unter-Engadin vielfach angegeben. In höheren Lagen, wie Nufenen (Heer) Ober-Engadin (Meyer-D.) schon seltener.

### **Platus Motsch.**

1. *calceatus* Duft. *E.-A.* Spärlich. Malans (Am St., Heer), ein Mal bei Chur (Kriechb.), Arosa (K.).

### **Harpalus Latr.**

1. *atratus* Latr. (H. Hottentotta Duft.) *E.-A.* Malans (Heer, Am St.), häufig bei Chur (Kriechb., K., Brügger), Schiers (Wirz), unteres Misox (K.); in höheren Lagen spärlich: Panixer Pass (Frei-G.), Staller Berg (Rühl.).
2. *laevicollis* Duft. *E.-A.* Namentlich von der montanen Zone an sehr häufig durch das ganze Gebiet. Als einige der höchsten Standorte über 2000 M. notiren wir beispielsweise: Stürviser Alp (Frei-G.), Bernina (Meyer-D.), Lischanna Schafalp (K.), Stelvio (Wocke).
- var. *Satyrus* Sturm. Malans, Chur (K), Malixer Alp (Kriechb.), Davos (Nagel), Nufenen (Heer).
- var. *nitens* Heer. Häufig bei Chur und Araschga (Kriechbaumer), Schiers (Wirz), Panixer Pass (Heer), Via-mala, Scesaplana, Savien (Frei-G.), Pontresina (Meyer-D.).
3. *ignavus* Duft. (H. *honestus* And.) *E.-A.* Sehr verbreitet in allen Thälern, Churer Rheinthal (Heer, Kriechb., Frei-G., K.), Prätigau, Unter-Engadin, Münsterthal, Misox (K.), Davos (Nagel), Ober-Engadin (Heer, Meyer-D., v. Heyden) u. s. w. Blaue Stücke sind häufig.

4. *distinguendus* Duft. *E.-M.* Chur (Kriechb., Frei-G., K.), Felsberg, Bonaduz (Frei-G.), Domleschg (Stoffel), Remüs, unteres Misox öfters (K.). Mitunter in glänzend grünen Exemplaren.
5. *aeneus* L. *E.-A.* gemein und in allen Thälern. Gehe bei uns höher als in den Waadtländer Alpen (Bugnion in lit.).  
*var. confusus* Dej. Hin und wieder. Davos (Nagel), Tarasp (K.), Ober-Engadin (Meyer-D.).
6. *smaragdinus* Duft. (*H. discoideus* Er.) *E.* Chur, unteres Misox (K.), Pfäfers (Meyer-D.).
7. *rubripes* Sturm. *E.-A.* Nicht selten. Churer Rheinthal bis nach Schams (Kriechb., Frei-G.), Rheinwald, noch einzeln am Paradies (Heer), Davos (Nagel), Unter-Engadin (Heer, K.), Nufenen, Calanda, Julier, Engadin (Heer, mit Einschluss von dessen *var. amoenus* und *azureus*), Staller Berg (Rühl).  
*var. marginellus* Dej. In Bünden (Catal. Stierlin).  
*var. sobrinus* Dej. (*alpestris* Redt.). Am Piz Languard (Letzner).
8. *latus* L. *E.-A.* Allgemein verbreitet; Churer Rheinthal, Prätigau, Davos, beide Engadine, vereinzelt noch bis an 2000 M., so auf dem Julier, Valettapass (Frei-G.).  
*var. rugulosus* Heer. Frela ob St. Giacomo, am Südabhang des Stelvio (Heer).
9. *luteicornis* Duft. *E.-A.* Weniger häufig. Oefters bei Chur (Kriechb., K.), Trins (K.), Davos (Nagel), Staller Berg (Rühl), am Bernina (Stierl.), St. Moritz einzeln unter Steinen (v. Heyden).

10. **quadripunctatus** Dej. *E.-M.* Selten. Chur und Umgebung (Kriechb., Stierl.), Disentiser Klosteralp (Kriechb.), Engadin (Stierl.), am Piz Languard (Letzner).
11. **fuliginosus** Duft. *M.-A.* Nicht häufig. Davos (Nagel), Nufenen, Lavin (Heer), Ober-Engadin mehrfach (Heer, v. Heyden) noch bis ob dem Bernina Wirthshaus (Frei-G.), Albula und Bernhardin (Letzner), Augstenpass ob Parpan (Kriechb.).
12. **tenebrosus** Dej. *E.* Selten. Hinter St. Luzi bei Chur und gegen Maladers hinauf einige Male (Kriechb.).
13. **litigiosus** Dej. „Rarissimus (Bünden)“ Heer l. c. p. 111 ohne nähere Angabe eines Standortes, und seither, wie es scheint nicht wieder gefunden.
14. **tardus** Gyll. *E.-A.* Chur und weiterhin im Rheinthal (Kriechb., Frei-G., K.), Domleschg (Stoffel), Prätigau (Kriechb., K.), Davos (Nagel), Unter-Engadin, Münsterthal (K.), Pontresina bei 2000 M. (Meyer-D.).
15. **Fröhlichii** Sturm. (*H. tardus* Panz) *E.-A.* Selten. Chur und Ems (Brügger, K.), Weissenstein, Tarasp (K.), einige Stücke auf Maloja (Meyer-D.), Roveredo (K.).
16. **serripes** Quens. *E.-M.* Vereinzelt. Domleschg, Misox (K.).
17. **caspicus** Stev. *E.-M.* Selten. Chur, Tarasp (K.), Domleschg (Stoffel).
18. **servus** Duft. *E.-M.* Selten. Schiers (Wirz), vom Abula (Caf.).
19. **auxius** Duft. *E.-A.* Selten. Chur, Ems, Domleschg, Haldenstein (Kriechb., K.), Tarasp (K.), Staller Berg (Rühl).
- var. **pumilus** Duft. St. Moritz u. St. (v. Heyden).

20. *flavitaris* Dej. (*H. modestus* Dej.). Sehr selten. Ein Mal bei Ems (Kriechb.).
21. *picipennis* Duft. (*E.*)-*M.* Ein Mal bei Tarasp (K.).

### **Bradycellus Er.**

1. *harpalinus* Dej. *E.*-*M.* Bisher nur ein Mal aus Calanca erhalten.
2. *collaris* Payk. *E.*-*A.* Sehr selten. St. Luzi bei Chur Maladers zu und hinter Ems je ein Mal getroffen (Kriechb.), Val Camogasc bei ca. 2300 M. (Heer).
3. *similis* Dej. *A.* Ebenso. Bisher für die schweizerische Fauna, wie es scheint, nur aus dem Engadin bekannt. Val Camogasc und Val Fless bei 2000 bis 2300 M. (Heer). Am Rosatsch zwei Ex. u. St., und ebenso eines am Morteratsch (v. Heyden).

### **Stenolophus Latr.**

1. *teutonus* Schruk. (*S. vaporariorum* F.) *E.* Für Graubünden eine Rarität. Bei Malans (Heer); wohl auch eine der sonst häufigen Arten des schweizerischen Tieflandes, welche nur noch spärlich in der Herrschaft jenseits des rechten Ufers der Landquart getroffen werden.

#### *Acupalpus Latr.*

2. *flavicollis* Sturm. *E.* Selten. Hinter St. Luzi ob Chur an einem Zaun (Kriechb.).
3. *meridianus* L. *E.* Auf schattigen Grasplätzen u. St., im Churer Rheinthal nicht selten; Landquart-Au (K.), Chur öfters (Kriechb., K.), Ems (Kriechb.), Domleschg (Stoffel), Schiers (Wirz).

## Zabrus Clairv.

1. *tenebrioides* Goeze. (*gibbus* F.). *E.* Im Churer Rheinthale ziemlich selten. Malans (Heer), Domleschg (Samml. Am St.), Ems (Sch. Riedi). Auch Dekan Pol hat den Käfer, wohl in der Herrschaft, getroffen, den ihm Clairville bestimmte (1809).

## Amara Bon.

### *Triaena* Lec.

1. *tricuspidata* Dej. (*E.*)-*A.* Ueber den ganzen Berninapass verbreitet (Meyer-D.). Die einzige Angabe, etwas auffällig, da sonst Keiner der zahlreichen Beobachter daselbst die Art erwähnt.
2. *plebeia* Gyll. *E.*-*A.* Selten. Savien (Frei-G.).  
     *var. lapidicola* Heer. Val Camogasc (Heer).  
     *var. varicolor* Heer. Lürlibad und St. Luzi bei Chur (Kriechb.), Engadin (v. Heyden).

### *Amara in sp.*

3. *similata* Gyll. *E.*-*M.* Chur und Umgebung mehrfach (Kriechb., K.), Ems, Flims, Unter-Engadin (K.), Münster (Prevost).
4. *ovata* F. (*A. obsoleta* Dej.) *E.*-*M.* Malans, Mastrilser Berg (Heer), Chur mehrfach (Kriechb.), ebenso im Unter-Engadin (K).
5. *montivaga* Sturm. *E.*-*M.* Chur bis in die unteren Maiensässe (Kriechb., K.), Zizers, Unter-Engadin, Poschiavo (K.), Münster (Prevost).
6. *communis* Panz. *E.*-*A.* Im ganzen Gebiet verbreitet.  
     *var. atrata* Heer. Rheinwald (Heer), Nufenen (Stierl.).  
     *var. alpicola* Heer. Nufenen (Heer, Stierl.).

7. **lunicollis** Schiödte. (*A. vulgaris* Heer). *E.-A.* Chur, Malans, Maiensässe (Kriechb., K.), Runkalier ob Chur (Frei-G.), Davoser Wolfgang (Dr. Am St.), Nufenen (Heer), Rocca bella (Rühl).
- var. **poeciloides** Heer. Val Camogasc (Heer), Via-mala (Frei-G.).
8. **curta** Dej. *E.-A.* Chur und Umgebung (Kriechb., K.), Runkalier ob Chur (Frei-G.), Domleschg (Stoffel), Davos (Nagel), Churer Alp, Unterengadin, Poschiavo, Grono (K.), Bernina (Meyer-D.).
9. **aenea** Degeer. (*A. trivialis* Gyll.) *E.-A.* In allen Thälern verbreitet bis zu 2000 M. So traf Frei-G. Ex. noch an Schneefeldern auf dem Piz Beverin.
10. **spretia** Dej. *E.M.* Ziemlich selten. Chur und Felsberg (Kriechb., Frei-G.), Tarasp (K.).
11. **eurynota** Panz. (*A. acuminata* Payk.) *E.-M.* Stellenweise. Um Chur öfters (Kriechb., K.), Rheinwald und Vetan (Heer), Davos (Nagel), Engadin (Kriechb.), Poschiavo (K.).
12. **familiaris** Duft. *E.-A.* Nicht selten. Malans (Heer), Chur und sonst im Rheinthal (Kriechb., K.), Schiers (Wirz), Davos (Nagel), bei St. Moritz (v. Heyden, Pfeil, Heer nebst dessen var. *atrata*), Poschiavo, Bergell (K.).
13. **lucida** Duft. (*A. gemina* Zimmerm.) *E.-A.* Ziemlich selten. Wiederholt bei Chur (Kriechb., K.), und bis Reichenau (Kriechb.), Arosa (K.), Avers (Rühl).
14. **tibialis** Payk. (*E.-M.*) Selten, Davos (Nagel).

*Celia Zimmerm.*

15. **ingenua** Duft. *E.-A.* Selten. Chur, Felsberg (Kriechb., Frei-G.), Avers (Rühl).
16. **municipalis** Duft. *E.-A.* Selten. Chur und gegen Felsberg (Kriechb.), Münster (Prevost), Misoxer Thal (K.), am Julier bei 2260 M. (Heer).
17. **erratica** Duft. *M.-A.* In tieferen Lagen vermisst, dafür in unseren montanen und alpinen Regionen bis an die Schneegrenze allgemein verbreitet.  
**var. graeculus** Heer. Am Südabhang des Vogelberges (Heer).
18. **Quenselii** Schönh. (*A. monticola* Zimm.) *M.-A.* In den höheren Alpenthälern bis auf die obersten Pässe überall zu treffen Eine *var. multo minor* von dieser überhaupt sehr variabeln Species führt Heer von der Zaportalp und dem Bernina an.
19. **livida** F. (*A. bifrons* Gyll.) *M.-A.* Selten. Disentis ein Mal (Kriechb.), Rheinwald, Alp Urschai, Bernina-kette (Heer), St. Moritz, Pontresina, am Morteratsch (v. Heyden), am St. Moritzer-See (Pfeil).
20. **rufocincta** Sahlb. (*A. grandicollis* Zimm.) *M.-A.* Besonders in der alpinen Zone verbreitet. Malixer und Disentiser Alpen, Urdenthal unter trockenem Kuhmist (Kriechb.), Schyn, Stürviser Alpen, Rheinwald (Frei-G.), Avers (Stoffel, Rühl), Davos (Nagel), besonders häufig in den Ober-Engadiner Alpen (Heer, Stierl., Meyer-D., Frei-G., v. Heyden u. A.), Poschiavo (K.). Von den Engadiner Alpen gibt Heer noch zwei Abänderungen an: *var. Seileri* und *oreophila*.

21. *infima* Duft. *E.* Chur, Grono (K.).

*Acrodon Zimmerm.*

22. *brunnea* Gyll. *M.-A.* Selten. Davos (Nagel), Arosa (K.), Franzenshöhe (Gredler).

*Leirides Putz.*

23. *cardui* Dej. *A.* Sehr selten. Ein Mal von Arosa erhalten.

*Cyrtanotus Steph.*

24. *aulica* Panz. (*A. picea* F.) *E.-A.* Verbreitet. Malans (Heer), Churer Umgegend und Schanfigg (Kriechb., K.), Runkalier, Versam (Frei-G.), Schams (Kriechb.), Dischma (Dietrich), Ober-Engadin (Frei-G., Meyer-D., v. Heyden), Unter-Engadin (Heer, K.), Münsterthal (Prevost), Puschlav (K.).

*Bradytus Zimmerm.*

25. *consularis* Duft. *E.-A.* Chur, Ems u. St. (Kriechb.), Disentis (Condrau), Davos (Nagel), St. Moritz (Heer), Schuls (Pestalozzi-H, K.), Münster (Prevost), Grono und Arvigo (K.), Franzenshöhe (Rosenhauer).
26. *fulva* Degeer. *E.* Selten. Malans (Am St.), Chur zwei Exemplare (Kriechb.).
27. *apricaria* Payk. *E.-A.* Chur, Maladers, Reichenau (Kriechb.), Bonaduz (Frei-G.), Langwies, Arosa (K.), Davos (Dr. Am Stein), Rocca bella (Rühl), St. Moritz, Berninagruppe (Heer, Kriechb., v. Heyden, Meyer-D., Bugnion), Unter-Engadin (K.), Münsterthal (Prevost).
- var. raetica* Heer. Val Camogasc, Rosegginsel, Alp Grüm (Heer).

*Percosia Zimmerm.*

28. *equestris* Duft (A. *patricia* Duft.) (*E.*)-*A.* Obersaxen (Casanova), Disentis (Condrau), Malixer Alpen (Kriechbaumer), Avers und Rocca bella (Rühl), St. Moritz, Pontresina, Bernina (v. Heyden, Meyer-D., Frei-G., Bugnion), Misox und Puschlav (K.).

var. *dilatata* Heer. Nach dem Autor sehr selten in Lärchwäldern u. St.: Rheinwald (Heer), Oberhalbstein und Bernina (Frei-G.).

**Abax Bon.**

1. *striola* F. *E.-M.* Im Churer Rheinthal nicht selten; von Malans (Heer, Pol, Am St.) bis Chur (Kriechbaumer, Theobald, K. u. A.), noch gegen Maladers und die Churer Maiensässe hinauf (Kriechb.); Puschlav, unteres Misox (K.).

2. *ovalis* Duft. *E.-unt. M.* Im Churer Rheinthal von Maienfeld bis in's Domleschg vielfach beobachtet, dann im Misox,

3. *parallelus* Duft. *E.-M.* Im Thal auch ziemlich häufig, wie die vorige Art; ob Chur noch bis gegen Maladers und in den Maiensässen (Kriechb.), Roveredo (K.).

**Molops Bon.**

1. *piceus* Panz (M. *terricola* F.) *E.-M.* Im Rheinthal hin und wieder: Malans (Heer, Am St.), Maienfeld (K.), Schiers (Wirz), um Chur mehrfach (Kriechb., K.).

var. *montanus* Heer. Schuders (K.), Savien (Frei-G.).

**Pterostichus.***Bryabius Chaud.*

1. *Xatarti* Dej. *A.* Sehr selten. Nach Heer im Engadin.
2. *Jurinei* Panz. *M.-A.* Namentlich in der alpinen Zone sehr verbreitet und aus allen Thälern notirt.  
     **var. Zahlbruckneri** Gyss. In den rätischen Alpen (Heer), auf dem Stelvio (Bugnion).

*Oreophilus Chaud.*

3. *maurus* Duft. *A.* In Bünden nur selten, während die Art in den Centralalpen sehr verbreitet ist. Panixer Pass (Heer), ein Mal auf dem Albula (K.).
4. *multipunctatus* Dej. *E.-A.* An tieferen Standorten: Chur, Maiensässe (Kriechb., K.), Flims (K.) nur ausnahmsweise; dagegen ganz allgemein und zuweilen sehr zahlreich in Höhen von 1500 bis über 2500 M. über den ganzen Kanton verbreitet.  
     **var. multo minor** Heer. Nach dem Autor hin und wieder in den Alpen des Engadins und Rheinwaldes.  
     **var. Spinolae** Heer. (Ganz schwarz). Ebenfalls vom Engadin, nicht mit *Pt. Spinolae* Dej. zu wechseln, welcher vielmehr den Westalpen angehört und unserem Gebiete gänzlich fehlt.
5. *Ziegleri* Duft. Von Calanca erhalten, und von Dr. Stierlin bestätigt. Neu für die Schweiz, in den österreichischen Alpen dagegen häufig.
6. *transversalis* Duft. *M.-A.* Selten. Im Engadin (Heer).
7. *dissimilis* Villa. *A.* Rätische Alpen, selten, (Heer).

*Cheporus Latr.*

8. **metallicus** F. *E.-M.* Ziemlich verbreitet, doch kaum über 1600 M., gerne auf schattigen Waldwegen. Malans (Am Stein), häufig un Chur (Kriechb., Casl., K.), Schanfigg, Oberland (Kriechb.), Domleschg (Stoffel), Davos nicht häufig (Nagel), Münsterthal, Brusio (K.).

*Pterostichus in sp.*

9. **eristatus** Duf. (*Pt. parumpunctatus* Grm.) *E.-M.* Spärlich. Chur, Poschiavo (K.).

*Arachnoidius Chd.*

10. **fasciatopunctatus** Cmtz. *E.* Sehr selten. Bei Chur (Schaum), Pfäfers (Frei-G.).

*Platypterus Chd.*

11. **Panzeri** Meg. *M.-A.* Domleschg (Stoffel), in der subnivalen Region des Calanda die Heer'sche var. *intermedius* (Kriechb.), Séesaplana ob der Seenhütte und auf dem Calanda (Frei-G.), Rocca bella (Rühl).
12. **externepunctatus** Schaum. *A.* Sehr selten. Ein Mal vom Albula (K.).
13. **cribratus** Dej. *A.* Selten am Bernhardin (Heer).

*Platysma Bon.*

14. **oblongopunctatus** F. *E.-A.* Oefters bei Chur (Kriechb., K.), Roffla, Nufenen (Kriechb., Frei-G.), Davos (Nagel), Braggio (K.).

*Lyperosomus Mot.*

15. **aterrius** Payk. (*E.-M.*) Poschiavo (K.).

*Steropus Steph.*

16. *aethiops* Panz. *E.-M.* Nicht gemein. Churer Waldungen mehrmals unter faulendem Holz und Steinen (Kriechb., K.), Davos selten (Nagel).

*Melanis Bon.*

17. *niger* Schall. *E.-M.* Chur, Untervatz in der var. *distinguendus* Heer (Kriechb.), Küblis (Nagel), Schams, Soazza, in Calanca (K.), Münster (Prevost).
18. *vulgaris* L. *E.-A.* In den diesseitigen wie jenseitigen Thälern bis über 2000 M. ganz allgemein verbreitet.
19. *nigritus* F. *E.-A.* In gleicher Verbreitung und fast eben so häufig.  
 var. *Räticus* Heer. Im Rheinwald (Heer), St. Moritz, Alp Giop (v. Heyden), Silvaplana (Bugnion).
20. *anthracinus* Ill. *M.* Viel seltener als in der Nord- und Westschweiz. Davos (Nagel), Soazza (K.).

*Argutor Steph.*

21. *strenuus* Panz. *E.-M.* Nicht häufig. Chur, Zizers (K.), Parpan (Kriechb.), Davos selten (Nagel). St. Vittore (K.).
22. *diligens* Sturm. (Pt. pullus Gyll.) (*E.-A.*) Selten. St. Moritz am See u. St., Alp Laret innerhalb der Baumgrenze (v. Heyden) sind die einzigen mir bekannten, zuverlässigen Angaben.

*Haptoderus Chd.*

23. *spadiceus* Dej. (*E.-A.*) Selten. Panixer Pass (Frei-G.), Rocca bella, Avers (Rühl).

*Pseudorthomus* Chd.

24. *unctulatus* Duft. (*Argutor alpestris* Heer). *M.-A.* In ziemlicher Verbreitung. Churer Maiensässe, darunter die var. *apennina* Heer, Malixer Alpen, am Lenzer See, Disentiser Klosteralp, Nufenen (Kriechbaumer), Runkalier ob Chur, Piz Beverin (Frei-G.), Ober-Engadiner Alpen (Heer, v. Heyden, Stierlin, Meyer-D., Bugnion), Flüela, Unter-Engadin (Heer, K.).
25. *subsinnuatus* Dej. *A.* Franzenshöhe (Rosenhauer bei Gredler).

**Pocillus** Bon.

1. *punctulatus* Er. *E.* Seltenheit. Aus dem untern Misox erhalten.
2. *Koyi* Germ. *E.-A.* Selten. Poschiavo und Misox (K.).
3. *lepidus* Leske. *E.-A.* Gemein durch das ganze Gebiet, vom Rheinthal bis in das Ober-Engadin, wie in allen transalpinen Thälern und von sehr wechselnder Färbung.
4. *eupreus* L. *E.-A.* Nicht ganz so häufig aber in der nämlichen Verbreitung, und mannigfach abändernd.  
 var. *versicolor* St. Häufig in den Bündner Alpen. Im Engadin (Heer).  
 var. *eupreoides* Aud. Rheinwald, Engadin (Heer).  
 var. *affinis* Sturm. Münster (Prevost).

**Lagarus** Chaud.

1. *vernalis* Pauz. *E.-A.* Nicht selten. Malans (Am St.), Chur und Umgebung (Kriechb., K.), Runkalier ob Chur, am Piz Beverin auf Schneefeldern (Frei-G.),

Schiers (Wirz), Davos (Letzner), Bevers (Heer), Misox (K.).

### **Stomis Clairv.**

1. *pumicatus* Panz. *E.-A.* Selten. In der Samml. Am St., auch im Pol'schen Verzeichniss nach Clairville's Bestimmung. Chur in der kleinen Au, im Lürlibad, Fürstenwald und Masans (Kriechbaumer), Chur, Zizers (K.), Avers (Rühl).

### **Sphodrus Clairv.**

1. *leucophthalmus* L. *E.* Einzig im Pol'schen Verzeichniss unter dem ursprünglichen Linnéischen Namen *Carabus leucophthalmus* aufgeführt. Seither scheint das verborgen lebende Thier keinem unserer Sammler mehr vorgekommen zu sein.

### **Lacmostenus Bon.**

1. *janthinus* Duft. var. *coeruleus* Dej. *A.* Sehr selten; nach Heer im Engadin.
2. *amethystinus* Dej. *A.* Bernina (Heer), Poschiavo, Misox je ein Mal getroffen (K.).

### **Calathus Bon.**

1. *fuscipes* Goeze. var. *eisteloides* Panz. *E.-A.* Unter Steinen verbreitet. Umgebung von Chur (Kriechb., K.), Disentis, Avers (Frei-G.), Unter-Engadin (K.), Rheinwalder Alpen, (Heer), Julier-Veduta (v. Heyd.) u. s. w.  
var. *punctipennis* Germ. Seltener. Haldenstein, Misox, Unter-Engadin (K.), Schiers (Wirz), Clavadel (Dr. Am Stein), Münsterthal (Gredler), Arosa (K.).

2. **erratus** Sahlb. (*C. flavipes* auct., *Lasserrei* Heer, *fulvipes* Gyll.) *E.-A.* Ganz allgemein verbreitet, von den tieferen Lagen wie im Churer Rheinthal, und dann häufiger in der montanen Region bis auf die Passhöhen des Bernina und Stelvio.
3. **ambiguus** Payk. (*C. fuscus* Fabr.) *E.-(M.)* Nicht gemein. Malans (Heer), gegen Reichenau (Kriechb.), Chur (Tester).
4. **mollis** Marsh. (*C. ochropterus* Dej.) *A.* Nicht häufig. Scaletta, Splügen, Stalla (Heer), Obersaxer Alpen (Casanova), Schams, Flüela (K.).
5. **melanocephalus** L. *E.-A.* Allgemein verbreitet bis zu den obersten Pässen.  
     *var. alpinus* Dej. Mit der Stammart durch die alpine Region.
6. **micropterus** Duft. *M.-A.* Im Gebiet nicht so selten. Lenzer Haide, Oberhalbstein (Frei-G.), Unter-Engadin (K.), Davos (Nagel), häufig im Ober-Engadin (Heer, Meyer-D., Stierlin, v. Heyden u. A.), Misox und Bergell (K.).

### **Synuchus Gyll.**

1. **nivalis** Panz. (*Taphria vivalis* Ill.) *E.-A.* Nicht häufig. Malans (Heer), Oberhalbstein, Tavetsch, Stürviser Alp (Frei-G.), Davos (Pestalozzi), Splügen, Rheinwald (Heer), mehrfach bei Tarasp (K.), Ober-Engadin (v. Heyden, Bugnion), Münster (Prevost), Misox (K.).

### **Platynus Bon.**

1. **complanatus** Bon. *A.* Seltenheit. Zaportalp (Frei-G.).

2. *assimilis* Payk. (*Anchom. angusticollis* F.) *E.-M.* Feuchte Plätze. Churer Rheinthal vielfach, Unter-Engadin und transalpine Thäler (K.), Münster (Prevost).
3. *ruficornis* Goeze (*Anchomenus albipes* Fabr.) *E.* Viel seltener als in der ebenen Schweiz. Ich kenne nur die Angabe von Letzner: Rheinthal bei Chur.

### **Agonum Bon.**

1. *marginatum* L. *E.* Höchst selten. Bei Malans (Heer). „Im Bünden Dr. Am Stein“ nach Füsslin 1775.
2. *sexpunctatum* L. *E.-A.* Allgemein verbreitet.
3. *ericeti* Panz. (*A. bifoveolatus* Sahlb.) *A.* Sehr selten. Bevers, Nufenen; dann die var. *bifoveolatus* Sahlb. in der Zaportalp (Heer).
4. *Mülleri* Hrbst. (*A. parumpunctatum* F.) *E.-A.* Allgemein in den herwärtigen wie in den transalpinen Thälern bis über 2000 M. verbreitet.
5. *gracilipes* Duft. *E.-M.* Selten, in Wäldern. Malans (Heer), Chur, hinter Ems (Kriechb.), Tarasp (K.).
6. *viridicarpum* Goeze (*A. modestum* St.) var. *austriacum* F. *E.* Ein Mal in der Churer Gegend von Theobald erbeutet.
7. *viduum* Panz. *E.-M.* Hin und wieder. Churer Rheinthal, Runkalier (Frei-G.), Malans (Am St.), Nufenen (Heer), Ardez am Teichufer in grosser Menge getroffen, Poschiavo (K.).
8. *antennarium* Duft. *M.-(A.)* Poschiavo (K.).

### **Cibaniarius Gozis.**

1. *dorsalis* Pontopp. (*Anchomenus prasinus* Thunb.) *E.-M.* Feuchte Plätze. Churer Rheinthal vielfach, Unter-Engadin und transalpine Thäler (K.), Münster (Prevost).

### **Olisthopus Dej.**

1. *rotundatus* Payk. (*E.-A.*) Im Gebiet als alpine Seltenheit. Avers (Rühl), aus Misox (K.).

### **Lebia Latr.**

1. *cyancephala* L. *E.-M.* Nicht selten. Churer Rheinthal, Vorderprätigau, Münsterthal und transalpine Thäler.
2. *chlorocephala* Hoffm. *E.-M.* Ungleich spärlicher. Ein Mal bei Chur (Cassisch), Münsterthal (K.).
3. *erux minor* L. *E.-A.* Zuweilen auf Dolden. Rheinthal (Am St., Kriechb., K.), Tarasp (K.), Davos (Nagel), Avers (Rühl).
4. *haemorrhoidalis* F. *E.* Höchst selten. Im Verzeichniss von Dekan L. Pol angegeben, wohl aus der Herrschaft.

### **Cymindis Latr.**

1. *humeralis* Fourer. *E.-A.* Felsberg (Kriechb.), Schiers (Wirz), Ober-Engadin und Bernina mehrfach angegeben (Heer, Kriechb., Meyer-D., Bugnion).
2. *axillaris* F. (*C. homagrica* Duft.) *E.* Selten. In Bünden unter Steinen (Heer), bei Zizers (Sch. Schälibaum).
3. *cingulata* Dej. *M.* Sehr selten. Ein Mal bei den Flimser Waldhäusern unter Steinen (K.).
4. *angularis* Gyll. *M.-A.* „Rarissima in Rätiae subalpinis“ (Heer), bei Vetan (Ders.).
5. *vaporariorum* L. (*C. punctata* Dej.) *M.-A.* Häufig; so durch die Alpen ob Chur und Malix; Strela, Davos, im Ober-Engadin besonders verbreitet bis auf die Passhöhen, Bernhardin u. s. w.

**Demetrius Bon.**

1. *atricapillus* L. (D. *confusus* Heer.) *E.* Im Gebiet sehr selten, bei Malans (Heer).

**Dromius Bon.**

1. *linearis* Ol. *E.-M.* Einige Male bei Chur u. St. (Kriechbaumer), Tarasp (K.).
2. *agilis* *E.-A.* Selten unter Rinden. Maladers (Manni), Davos (Pestalozzi), Pontresina (Meyer-D.), Brusio (K.).
3. *fenestratus* F. *E.-A.* Sehr selten. Sargans (Täschler), Pontresina (Meyer-D.).
4. *quadrinaculatus* L. *E.-M.* Hin und wieder unter Rinden. Chur (Kriechb., K.), Schiers (Wirz), Tarasp (K.).
5. *quadrirotatus* Panz. *E.-M.* Wie die vorige Art und auch von den nämlichen Fundstellen.
6. *quadrisignatus* Dej. *E.* Seltenheit. In der Sammlung Am Stein.
7. *nigriventris* Thoms. (D. *notatus* Steph. Schaum.) *E.-M.* Mehrmals bei Chur und bei Vetan (K.); Schiers (Wirz).
8. *sigma* Ross. (D. *fasciatus* F.) *E.* In Bündlen (Frei-G.), Chur bis Reichenau mehrfach u. St. (Kriechb.)
9. *melanocephalus* Dej. *E.* Selten. Chur (K.), Domleschg (Stoffel).

**Metabletus Schmidt-Göbel.**

1. *truncatellus* L. *E.-M.* Unter Rinde, nicht gemein. Chur, Maladers (K.).
2. *glabratus* Duft. (Blechrus Motsch.) *E.* Chur bis hinter Ems mehrfach u. St. (Kriechb., K.).

**Lionychus Wissm.**

1. *quadrillum* Duft. (*Apristus* Chaud.) *E.* Churer Au auf dem Rheinkies (Kriechb.), Malans (Am St.), Chur (K.).

**Brachynitae.****Brachynus Web.**

1. *crepitans* L. *E.-M.* Rheinthal von Malans bis Domleschg (Am St., Pol, Stoffel, K.), Schiers (Wirz), Schuls öfters (K.).
2. *explodens* Duft. *E.-M.* Mit der vorigen verbreitet, aber nicht so häufig.

## III. Haliplidae.

**Halipus Latr.**

1. *ruticollis* Degeer. *E.* Rheinthal in Tümpeln, Malans (Am St.), Churer Au (Kriechb.).
2. *lineaticollis* Marsh. *E.* Domleschg (Stoffel).

## IV. Dyticidae.

**Noterus Clairv.**

1. *crassicornis* Müll. *E.* Sammlung Am St., also wohl aus dem Rheinthal.
2. *clavicornis* Degeer. (*N. sparsus* Marsh.) *E.* Domleschg (Stoffel).

**Bidessus Sharp.**

1. *minimus* Scop. (*Hydroporus geminus* F.) *E.-M.* Rheinthal in Tümpeln (Am St., Kriechb.), Schiers (Wirz), Trinser See (K.).

### **Cocclambus Thoms.**

1. *impressopunctatus* Schll. (*Hydroporus picipes* F.) *E.* Von Zizers erhalten.

### **Deronectes Sharp.**

1. *assimilis* Payk. (*Hydroporus*) (*E.*)-*A.* Flimser See (K.), St. Moritzer See (Pfeil).
2. *griseostriatus* Deg. (*Hydroporus*) *A.* Rheinwald (Heer, Pf. Felix, teste Kriechb.), am Bernina (Stierl.), daselbst in einer schmelzenden Schneelache (Bugnion).

### **Hydroporus Clairv.**

1. *lineatus* F. (*H. alpinus* Payk.) *E.-M.* In Gräben bei Zizers, Domleschg, Remüs (K.).
2. *Davisi* Curt. (*E.*)-*A.* In einem Wassergraben bei Nairs-Tarasp (K.), Davoser See (Pestalozzi), Samaden (Bugnion), St. Moritzer See in Menge getroffen (v. Heyd).  
var. *borealis* Gyll. Val Rosegg (Stierlin), Bernina (Meyer-D.).
3. *septentrionalis* Gyll. (*H. fluviatilis* Sturm) *A.* Selten. Engadin, Rheinwald (Heer). Ebenso in der nächsten Umgebung von Nufenen (Kriechb., Pf. Felix).
4. *rivalis* Gyll. var. *Saunmarkii* Sahlb. *M.-A.* Ober-Engadin (Stierl.), Flimser See (K.).
5. *granularis* L. *E.* In Bünden nach Heer; auch im Verzeichniss von Füsslin.
6. *pietus* F. *E.* Im Domleschg (Stoffel).
7. *memnonius* Nicolai. (*E.*)-*A.* St. Moritz in Quellwasser (v. Heyden J.-B. XVI., pag. 33, wo die frühere

- Diagnose H. Gyllenhali Schiödte hiemit richtig gestellt wird). Bernina in einer Schneewasserlache (Bugnion).
8. **nigrita** F. *E.-A.* Nicht so selten, besonders in Quellwasser. Schiers (Wirz), Ober-Engadin (v. Heyden, Bugnion), Davos (Nagel), Tarasp, Bormio (K.).
  9. **neuter** Fairm. *M.* Via-mala in einem Bächlein ob dem verlorenen Loch in grosser Anzahl. 29./VI. 1868. Von Fairmaire bestimmt! (Bugnion). Neu für die Schweiz.
  10. **planus** F. *E.-A.* Malans (Heer, Samml. Am St.), Tarasp (K.), Nufenen (Heer).
  11. **marginatus** Duft. *E.-A.* Oefters: Chur bei der Rheinsäge, Zizers (K.), Domleschg (Stoffel), Schiers (Wirz), Lenzer Haide (Brügger), Ober-Engadin (v. Heyden, Meyer-D., Bugnion), Tarasp, Flimser See, Grono, Klosters (K.).
  12. **nivalis** Heer. *A.* Vom Ober-Engadin vielfach angegeben (v. Heyden, Stierl., Bugnion), auch bei Tarasp und im Misox (K.), Avers (Stoffel), Stätzerhorn (Bugnion).
  13. **palustris** L. *E.-A.* Domleschg (Stoffel), St. Moritz (v. Heyd.), Bernina-Pass in einer Schneewasserlache (Bugnion), Grono (K.).
  14. **erythrocephalus** L. (*E.-A.*) Eingang von Val Fain ein Mal (v. Heyden), sonst keine Angaben für das Gebiet.
  15. **ferrugineus** Steph. (H. Victor Aub.) *A.* St. Moritzer See (v. Heyd.); ebenso die einzige Angabe für die Schweiz.

### **Agabus Leach.**

1. **guttatus** Payk. *E.-A.*, verbreitet, so durch das ganze Rheinthal, Prätigau, Schanfigger Thal, beide Engadine in Gräben, Tümpeln und Brunnentrögen.

2. **biguttatus** Ol. (*A. nitidus* F.) *E.* Sehr selten. Ein Mal aus dem Domleschg erhalten; Poschiavo (K.).
3. **paludosus** F. *E.-A.* Chur, Zizers (K.), Lenzer-Haide See (Brügger).
4. **brunneus** F. *E.* Sehr selten. Von Herrn Justizrath Boie ein Mal beim Bad Pfäfers gefunden.
5. **congener** Payk. *E.-A.* In seichten Tümpeln und dergl. allgemein verbreitet namentlich in den höheren Lagen. Zizers, Davos (Nagel), Flüelähöhe, Tarasp (K.), Rheinwald (Heer), Lenzer Haide (Brügger), im Ober-Engadin von allen Beobachtern angegeben.  
**var. Thomsoni** Sahlb. Am Rosegg mit der Stammart (v. Heyden). Ich erhielt ein Ex. aus dem Misoxer Thal.
6. **nebulosus** Forster (*A. bipunctatus* F.) *E.* Ein Mal aus dem früheren Schlossweiher ob Chur (Kriechb.).
7. **femoralis** Payk. *E.* Eben so selten. Gegend von Chur (Sammlung der Kantonsschule).
8. **Sturmi** Gyll. (*E.-A.*) Bisher nur im Engadin nachgewiesen. Pontresina, Val Rosegg (Bugnion), beim Kurhaus Tarasp (K.).
9. **chaleonotus** Panz. *E.-A.* Einige Male in einem Wasserbehälter bei St. Luzi ob Chur; von Pf. Felix aus Nufenen erhalten (Kriechb.).
10. **bipustulatus** L. *E.-A.* Häufig: Churer Rheinthal, Schanfigg und Arosa; Prätigau, Unter-Engadin, Statzer See (K.), Arosa (Brügger), noch in einem Seelein am Rheinwalder Maschollhorn, über 2000 M., von einem Schüler gebracht,

var. **Solieri** Aub. (*A. alpestris* Heer.) *A.* In unsern kleinen Alpseen verbreitet (Heer), so im St. Moritzer See (Stiel.), Berninalhöhe (Bugnion), Alp Sassiglione in Poschiavo (K.), Nufenen (Pf. Felix), Stelvio (Wocke).

### **Platambus Thoms.**

1. **maculatus** L. (*Agabus pulchellus* Heer, früher als Art getrennt, neuerdings wieder vereinigt.) *E.-A.* Rodels (Stoffel), Zizers, Flimser Cauma-See, gemein am Seeufer bei Le Prese (K.), Ober-Engadiner Seen (Stierl., Bugnion, v. Heyden, Pfeil).

### **Hybius Er.**

1. **ater** Degeer. *E.* Malans (Heer), Chur (Sammlung der Kantonsschule).
2. **fuliginosus** F. *E.-M.* Häufiger als die vorige Art. Rheinthal (Am St., K.), Rodels (Stoffel), Lenzer Haide (Brügger), im Ausfluss des Vetaner Teiches (K.)

### **Rhantus Lacord.**

1. **punctatus** Fourer. (*Rh. pulverosus* Steph.) *E.* Nicht häufig. Chur, Zizers (K., Brügger), Domleschg (Stoffel).
2. **suturalis** Lacord. (*Rh. notatus* F., *roridus* Müll.) *E.-A.* Ebenso. Malans (Am St.), in Tümpeln am Morteratschgletscher (Meyer-D).

### **Dytiscus L.**

1. **punctulatus** F. *E.* Im Domleschg (Stoffel).
2. **marginalis** L. *E.-A.* In Teichen, Brunnentrögen u. s. w. im ganzen Land verbreitet, und bis zu 2000 M.

noch zu treffen, so im Vetaner Teich (K.), See von Silvaplana, nebst der Var. *conformis* Kunze ♀ (v. Heyden).

### **Aeilus Leach.**

1. *sulcatus* L. *E.-M.* Oeffers in der Umgebung von Chur, ein Mal im schwarzen See ob Tarasp (K.).

## V. Gyrinidae.

### **Gyrinus Geoffr.**

1. *minutus* F. (*E.*)-*M.* Bisher nur im Tarasper See angetroffen (K.).
2. *natator* L. *E.* Die häufigste Art, zunächst im ganzen Rheinthal bis Thusingen. Schiers (Wirz), Kästris (K.).
3. *marius* Gyll. (*E.*)-*M.* Tarasper See in Menge, im schwarzen See daselbst, dann im Laaxer See (K.).

## VI. Hydrophilidae.

### **Hydraena Kugelm.**

1. *gracilis* Germ. (*E.*)-*A.* Im Trefoibach u. St. (Eppelsheim). Die Art ist sicherlich noch im Gebiet zu finden.

### **Helophorus Fabr.**

1. *costatus* Goeze. (*H. nubilus* F.) (*E.*)-*A.* Auf der Höhe des Albula-Passes unter Steinen, im Lückli ob Nufenen (Kriechb.).
2. *alpinus* Heer. *A.* Sehr selten. Rheinwalder Alpen (Heer), am Seelein von Valletta (Frei-G.).

3. *aquaticus* L. (H. *grandis* Ill.) *E.-A* Verbreitet. Malans (Am St.) und sonst in der Herrschaft (Pol, Füsslin), Zizers, Haldenstein, Chur, Vulpèra, Arosa (K.), Domleschg (Stoffel), im Ober-Engadin (v. Heyd., Meyer-D.).
4. *frigidus* Graells. *A*. Sehr selten. Pontresina und am Stätzerhorn, von Herrn Bedel bestätigt (Bugnion).
5. *granularis* L. (H. *griseus* Hrbst.) *E*. Ehemals in der Scheuchzer'schen Sammlung, wahrscheinlich aus der Churer Gegend.
6. *glacialis* Villa. *M.-A*. Häufig in den hochalpinen Seen, so im Ober- und Unter-Engadin (Heer, Stierlin, v. Heyden, Meyer-D.), Albula, Urden-See, Nufencn (Kriechbaumer), Avers (Stoffel). Ich traf die Art in Pfützen bei Nairs-Tarasp, wie auch auf der Flüelalöhe über den Schnee laufend.  
var. *nivalis* Giraud. Val Bevers (Stierlin).

### **Spercheus Kugelann.**

1. *emarginatus* Schall. *E*. Sehr selten. An Pflanzenwurzeln in Gräben bei Malans (Heer). Das Exemplar findet sich in der Am Stein'schen Sammlung.

### **Berosus Leach.**

1. *signaticollis* Charp. (B. *aericeps* Curt.) *E*. Malans (Samml. Am St.). Eben sehr selten für unser Gebiet, wie noch so manche in den tieferen Kantonen häufig vorkommende Wasser-Käfer, denen unsere Gewässer zu hart und zu kühl zu sein scheinen.

### **Hydrophilus Geoffr.**

1. *piceus* L. *E*. In Gräben bei Malans (Am St., Verz. Po)

2. *aterrimus* Esch. *E.* Ragaz, Malans (Heer, Am Stein), ebenfalls höchst selten.

### **Hydrocharis Lec.**

1. *caraboides* L. *E.* Im Rheinthal bis nach dem Domleschg hinauf öfters in einzelnen Stücken (Am St., Stoffel, K. u. A.). Nach Gistel (cit. bei Gredler) soll im Lünser See die var. *scrobiculatus* Panz vorkommen.

### **Hydrobius Leach.**

1. *fuscipes* L. *E.-A.* Bei Malans (Heer), Domleschg (Stoffel), Zizers, Chur, Flims, Tarasp (K.), Ober-Engadin (Meyer-D.).

### **Creniphilus Motsch.**

1. *globulus* Payk. (*Hydrobius.*) *E.* Selten. Malans (Am St.), Domleschg (Stoffel).  
 2. *limbatus* F. *A.* Pontresina (Bugnion, von Herrn Bedel bestätigt).

### **Philydrus Sol.**

1. *testaceus* F. *E.* Bei Zizers (K.), Domleschg (Stoffel).

### **Melochares Muls.**

1. *lividus* Forst. *E.* Malans (Heer).

### **Laccobius Er.**

1. *minutus* L. (*L. globosus* Heer.) *E.-A.* In Pfützen und Tümpeln die verbreitetste Species. Rheinthal von Malans bis Nufenen (Heer), Flimser See, Unter-Engadin (K.), St. Moritz (v. Heyden), noch am Morteratschgletscher (Meyer-D.).







3 2044 106 306 913

