



[Blank rectangular area]



LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Given by the Author
1910

Sept 1899

R. W. Gibson Inv.

MINISTÈRE DES COLONIES

SYLLOGE
FLORAE CONGOLANAE

[PHANEROGAMAE]

PAR

Théophile DURAND

DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE
DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT, A BRUXELLES

ET

Hélène DURAND

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE

Ouvrage couronné par l'Académie Royale de Belgique

[Classe des Sciences]

(PRIX EMILE LAURENT, 1907-1908)

BRUXELLES
MAISON ALBERT DE BOECK
Rue Royale, 265

—
1909

SYLLOGE
FLORAE CONGOLANAE
[PHANEROGAMAE]

MINISTÈRE DES COLONIES

SYLLOGE
FLORAE CONGOLANAE

[PHANEROGAMAE]

PAR

Théophile DURAND

DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE
DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT, À BRUXELLES

ET

Hélène DURAND

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE

Ouvrage couronné par l'Académie royale de Belgique

Classe des Sciences

(PRIX ÉMILE LAURENT, 1907-1908)

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

BRUXELLES
MAISON ALBERT DE BOECK
RUE ROYALE, 265

—
1909

270
02

BRUXELLES
ALBERT DE BOECK, ÉDITEUR
265, Rue Royale

SYLLOGE FLORAE CONGOLANAE

Le SYLLOGE FLORAE CONGOLANAE présente un tableau complet des connaissances, définitivement acquises, sur la flore du Congo, à la fin de l'année 1908.

Le premier travail d'ensemble sur cette vaste contrée date de 1896 (1). La flore du Congo comprenait alors 957 espèces phanérogames.

En 1900, parut un second travail (2), montrant avec quelle ardeur l'étude de cette flore était poussée, notamment au Jardin botanique de Bruxelles, car il mentionnait 1928 espèces phanérogames (3).

Depuis, l'étude de la flore congolaise a été poursuivie, surtout à Bruxelles et à Berlin, avec une fiévreuse activité.

Le résultat de cet ensemble de recherches est extrêmement remarquable, puisque le chiffre des espèces phanérogames, connues à l'heure qu'il est dans notre grande colonie, est de 3546. Qu'il nous soit permis de souligner la part considérable qui revient à M. *Ém. De Wildeman* dans ce crescendo de nos connaissances botaniques.

La multiplicité même des travaux publiés sur la flore congolaise, depuis douze ans, ne permettait plus de se rendre compte des résultats obtenus. Il nous a fallu plusieurs années d'un travail soutenu pour terminer cette *mise au point*, que nous soumettons, aujourd'hui, au jugement du monde savant.

Les botanistes doivent une reconnaissance toute spéciale au Gouvernement de l'État Indépendant, qui a donné une impulsion remarquable aux recherches botaniques.

(1) *Th. Durand et H. Schinz* : Études sur la flore du Congo. — Bruxelles 1896: 368 pages.

(2) *Ém. De Wildeman et Th. Durand* : Censur plantarum congoleusium. — Paris 1900: 64 pages.

(3) Les chiffres que nous donnons sont un peu moins forts que ceux indiqués dans les ouvrages cités. Cela provient de la radiation d'un certain nombre d'espèces, que nous avons reconnu avoir été trouvées en dehors des limites du Congo belge. Il était nécessaire de ne pas en tenir compte pour bien marquer le progrès accompli.

Comment ne pas citer les noms du Baron *van Eetvelde*, ancien Secrétaire d'État honoraire, de MM. *Hub. Droogmans* et *Ch. Liebrechts*, respectivement anciens Secrétaires généraux des Départements des Finances et de l'Intérieur et de M. *N. Arnold*, placé à la tête du Service, si important, de l'Agriculture congolaise, depuis sa fondation.

Le Baron van Eetvelde rendit possible le voyage botanique, si fructueux, d'Alfred Dewèvre et les deux premières missions d'Émile Laurent et il fut le créateur des superbes *Annales du Musée du Congo*, dont les mémoires sont cités presque à chaque page dans le SYLLOGE, *Annales* que le major Liebrechts protégea, dans la suite, avec un soin jaloux.

Si l'Herbier du Congo, qui comptait 12 paquets en 1896, en comprend, à l'heure qu'il est, plus de douze cents, ce résultat est dû, dans une large mesure, au zèle éclairé de M. Droogmans, aujourd'hui Secrétaire général du Ministère des Colonies, et de M. Arnold, directeur général au même Ministère, qui n'ont reculé devant aucun effort pour stimuler le zèle de tous ceux qui pouvaient enrichir les collections du Jardin botanique (1).

Lorsque Émile Laurent voulut entreprendre un troisième voyage scientifique au Congo, ce sont encore ces hommes éminents qui aplanirent les difficultés et lui donnèrent toutes les facilités désirables pour que ses recherches fussent aussi fructueuses que possible, et quand notre génial ami fut si prématurément enlevé, c'est encore eux, qui assurèrent la publication de la *Mission Émile Laurent* (2) et apportèrent un précieux concours à la fondation du prix Laurent.

On a déjà deviné que c'est aussi à ce puissant appui que le SYLLOGE FLORAE CONGOLANAE, imprimé aux frais de l'État Indépendant, doit le grand honneur d'être le premier ouvrage de science édité sous les auspices du nouveau Ministère des Colonies.

(1) Voici, en chiffres ronds, les principales augmentations de l'Herbier du Congo, dues à des récoltes faites directement sous l'impulsion du Gouvernement de l'État Indépendant : ils feront mieux ressortir l'importance des résultats obtenus :

NOMBRE DE FEUILLES D'HERBIER

Just. Gillet	6000	Agost. Flamigni	700
Ém. et Marc. Laurent	3500	Edg. Verdict	600
L. Pynaert	3000	Ém. Laurent	500
Alfr. Dewèvre	2000	L. Gentil	500
Fél. Seret	2000	Alph. Cabra et L. Michel	400
Marc. Laurent	1500	F. Demeuse	300
A. Sapin	900	Alb. Bruneel	300
Hyc. Vanderyst	800	Solheid	300

(2) Émile De Wildeman, *Mission Émile Laurent*, vol. I, CCXXV-617 pages, vol. II, 185 planches.

Au lieu de développer longuement les progrès réalisés, nous avons condensé dans trois tableaux les données réunies dans le SYLLOGE FLORAE CONGOLANAE. Nous attirons notamment l'attention sur le tableau montrant la progression des connaissances relatives à la flore congolaise (1); il fait ressortir toute la part qui revient, soit à ceux qui ont succombé au champ d'honneur [*A. Dewèvre, Ém. Laurent, Gust. Debeerst, Éd. Leserauwact*, etc.] soit à ceux qui, aujourd'hui encore, comme le *Fr. Gillet*, poursuivent leurs recherches, en Afrique, ou sont rentrés dans la Mère-Patrie, après avoir apporté leur pierre à l'œuvre immense, poursuivie sous l'impulsion du Roi.

* * *

Si les Belges occupent le premier rang pour le nombre d'espèces, découvertes au Congo, il est juste de rappeler que la voie leur a été ouverte, au point de vue botanique, par les collecteurs étrangers. En effet, les premières collections de plantes congolaises furent rapportées par des Anglais (*Chr. Smith* 1816; *R. Burton* 1862; *H. Johnston* 1882-1883) et surtout par des Allemands (*G. Schweinfurth* 1870; *Fr. Naumann* 1874; *P. Pogge* 1875-1883; *Max Buchner* 1878-1880; *Al. von Mechow* et *E. Teusz* 1880-1882).

On connaissait 829 espèces au Congo, lorsque les premières plantes recueillies par un Belge (*C. Callewaert*, 1885) parvinrent en Belgique, puis ce furent les précieuses récoltes de *Fr. Hens* [1887-1888], de *Fern. Demcuse* [1888-1892], du capitaine [actuellement major] *G. Descamps* [1890-1896], de *Jul. Cornet* [1891-1893], de *Paul Briart* [1890-1893] etc. Nous avons montré plus haut combien les recherches botaniques s'étaient développées depuis 1895.

De 1885 à 1908, 2580 plantes nouvelles ont été découvertes au Congo, par des Belges.

Dans le tableau suivant, en laissant de côté 88 espèces, pour lesquelles les renseignements relatifs à la date de récolte ou au nom du collecteur font défaut, on trouvera la liste complète de ceux, grâce auxquels la connaissance de la flore du Congo a marché à pas de géant.

[1] Voir pages 13-16.

	Esp.	Var.		Esp.	Var.
Alfr. Dewèvre (1895-96)	426	35	Hyac. Vanderyst (1891; 1905-08).	12	3
Just. Gillet (1893-1908)	347	40	Éd. Lescauwet (1903-05)	12	4
Edg. Verdick (1899-1900)	301	26	Ém. Duchesne (1898-99)	12	
Chr. Smith (1816)	233	6	Paul Briart (1890-93)	11	1
P. Pogge (1875-76, 1-80-83)	236	14	Ad. Oddon (1901-04)	11	
Fr. Hens (1887-88)	211	21	E. Pechuel-Loesche 1874; 1882)	8	
Ém. et Marc. Laurent (1903-04)	150	24	Max Buchner (1878)	8	
Ém. Laurent (1893; 1895)	147	11	A. Sapin (1906-08)	7	1
Fern. Demeuse (1888-92)	142	9	Xav. Hendrickx (1903)	7	
G. Schweinfurth (1870-71)	128	5	Alb. Bruene (1905-06)	6	
Georg. Descamps (1890-92; 1893-96)	127	9	C. Callewaert (1885)	6	1
R. Buettner (1885-86)	102	7	A. Van Houtte (1902)	6	
Marc. Laurent (1905-06)	94	10	J. Monteiro (1892)	6	
Paul Dupuis (1893-95; 1896-98)	67	5	Jos. Duchesne (1892-93)	6	
L. Gentil (1897-1900; 1901-03)	50	3	Eug. Wilwerth (1896-98)	4	
Rud. Schlechter (1899)	49	1	S. Ledermann (1906-08)	4	
Gust. Debeerst (1894-95)	47	2	S. Bieler (1903-04)	4	
A. Cabra et Fr. Michel (1896-1903)	43	5	Knut Jespersen (1907)	4	
H. Johnston (1882-83)	42		A. Delpierre (1902-04)	3	
Fel. Seret (1905-07)	41	6	Ch. Gérard (1900-02)	3	
Rene Butaye (1895-1902)	35		Fr. Ledien (1887)	3	
Fr. Naumann (1874)	33		Aug. Linden (1885-86)	3	
Éd. Luja (1898-99; 1904-06)	33	3	A.-J. Marques 1885	3	
Fr. Thonner (1896)	30	4	Ern. Dewèvre (1895-98)	3	1
L. Pynaert (1903-07)	26	6	H. Tilman (1899)	2	1
G. A. von Goetzen et von Pritzwitz (1894)	22		P. Huyghe (1903)	2	
Alex. von Mechow et E. Teusz (1880-82)	11	24	R. Dubreucq 1898-1901	2	
L. Gentil et Just. Gillet (1902)	20	1	Gust. de Bronwer (1903-04)	2	
Rich. Burton (1862-63)	19	1	J. H. Camp (1888)	2	
Jul. Cornet (1891-93)	17		Cel. Hecq (1899)	2	
			Ag. st. Flamigni (1907)	2	2
			Ach. Durieux (1896)	2	
			Aug. Vermeulen (1903)	2	

Enfin, MM. Bastian, Chaltin, Curror, Jul. Chargeois, G. De Bauw, A. De Clercq, Norb. Diderich, Viet. Durant, J.-B. Hanquet, R. Kindt, Ch. Lemaire, P. Lemarinel, J.-F. Lopez, L. C. S. Malchair, H. Mardulier, H. Mueller, Guill. Van Kerkhoven, R. Vaux, Van Rysselberghe, G. Stuhlmann, Taymans, Witterwulzhe, ont chacun trouvé une espèce nouvelle.

Naturellement, dans ce tableau, il n'est question que des espèces *nouvelles* pour le Congo et seulement des *espèces phanérogames*; il est juste de souligner que plusieurs des collecteurs mentionnés, *peu favorisés à ce point de vue spécial*, ont réuni des collections fort

importantes et qui ont largement contribué à faire mieux ressortir la dispersion, dans l'ensemble du Congo, d'espèces déjà connues.

Les divers districts du Congo sont fort inégalement explorés, comme le montre le tableau suivant ainsi que celui des pages 658-661 :

		Nombre d'espèces phanérogames.
I	Banana	124
II	Boma	652
III	Matadi	86
IV	Cataractes	320
V	Stanley-Pool	1463
VI	Kwango	428
VII	Lac Léopold II.	298
VIII	Équateur	752
IX	Bangala	459
X	Ubangi	90
XI	Aruwimi	223
XII	Uele.	388
XIII	Province Orientale	357
XIV	Ruzizi-Kivu	53
XV	Kasai	885
XVI	Katanga	763

Quatre de ces districts sont, à leur tour, subdivisés en zones :

II Boma	}	II a : Mayumbe.
IX Bangala		IX a : Mongala.
XII Uele	}	XII a : Rubi.
		XII b : Uere-Bili.
		XII c : Bomokandi.
		XII d : Gurba-Dungu.
		XII e : enclave de Lado.
XIII Province Orientale	}	XIII a : Stanley-Falls.
		XIII b : Haut-Ituri.
		XIII c : Ponthierville.
		XIII d : Maniema.

Seule, la région de Kisantu, dans le district du Stanley-Pool commence à être connue, grâce aux recherches infatigables du Frère Justin Gillet qui l'explore depuis 1893, secondé par d'autres membres de la Mission, dont nous avons déjà cité les noms.

Cinq points du Congo ont été plus spécialement explorés :

- 1) *Kisantu* V, dont nous venons de parler.
- 2) *Eala* [VIII] (Marc. Laurent, L. Pynaert, etc.)
- 3) *Munza*, dans le pays des *Mangbettu* [XII c] (G. Schweinfurth).
- 4) *Mukenge* près *Luluabourg* [XV] (P. Pogge).
- 5) *Lukafu* [XVI] (Edg. Verdick).

Ces localités sont fort distantes l'une de l'autre; chacune d'elles possède une série d'espèces non observées dans les autres. On peut en conclure que la flore du Congo présente une grande variété.

Toute la région orientale du Congo, du lac Benguelo à l'enclave du Lado, possède une flore bien différente de celle du Congo proprement dit. La belle collection du C^t *Edg. Verdick*, les récoltes nombreuses de *G. Descamps*, de *P. G. Debeerst* et celles, faites au volcan Kirunga [au N. du lac Kivu] par le botaniste *von Prittwitz*, qui accompagnait le Comte *A. von Goetzen* dans sa traversée de l'Afrique [1894], le prouvent suffisamment.

Nous avons tout d'abord commencé à répartir dans le *Sylloge* les localités suivant les régions botaniques, adoptées par l'un de nous, dans des travaux précédents [*Études, Census*]. Nous avons cru préférable d'attendre que les matériaux fussent plus nombreux pour tracer les limites définitives de ces régions et nous avons réparti les habitations, suivant des divisions politiques.

Il ne nous a pas toujours été possible de retrouver la situation géographique des endroits où des plantes ont été récoltées : noms estropiés, mal orthographiés ou illisibles, villages disparus, sont surtout des causes d'inexactitude. Nous avons indiqué ces points douteux sous la rubrique : Indications non classées.

* * *

Le SYLLOGE présente le relevé complet de toutes les plantes, trouvées au Congo, à la fin de 1908 et de toutes les habitations de plantes indiquées. Pour chaque espèce, nous avons donné les indications permettant de trouver rapidement les renseignements les plus utiles. Si la plante a été figurée, nous l'avons indiqué; enfin, nous avons relevé tous les noms vernaculaires ou indigènes en les reprenant dans un répertoire alphabétique, placé à la fin de notre ouvrage.

Plus encore que pour les noms de localités, il y a lieu de faire des réserves sur l'orthographe des noms vernaculaires, qui, ainsi que les noms géographiques, ont été écrits souvent de deux et parfois de trois manières. Citons, comme exemples, les postes bien connus de *Pweto* et de *Toa* que l'on écrivit d'abord : *M'Pweto*, *M'Towa*, puis *Pweto* et *Towa*, enfin *Pweto* et *Toa* et les noms vernaculaires : *N'Gulu*,

Goulou, Gulu. En se servant du Répertoire, il faudra donc souvent chercher à plusieurs endroits, avant de conclure que le renseignement désiré ne s'y trouve pas.

* * *

Nous avons déjà dit tout ce que nous devons à MM. HUB. DROGMANS et N. ARNOLD.

En rédigeant le SYLLOGE, nous avons rencontré des difficultés de toutes natures : difficultés linguistiques, géographiques, botaniques. Nous aurions été souvent fort embarrassés si nous n'avions pu, sans cesse, recourir aux connaissances variées de M. L. GENTIL qui s'est montré d'une complaisance inépuisable.

M. AUG. LEYS, actuellement attaché au Ministère des Colonies, a bien voulu revoir et compléter le répertoire que nous avons dressé des localités du Congo. Sans son aimable collaboration, bien plus de localités seraient restées sous la rubrique : Indications non classées.

Les riches séries de fiches, dressées par M. P. VAN AERDSCHOT, bibliothécaire du Jardin botanique, nous ont rendu de grands services.

M. le Conservateur ÉM. DE WILDEMAN, dont le nom fait autorité dans toutes les questions relatives à la flore congolaise, nous a souvent aidés à résoudre des questions difficiles. L'Herbier africain du Jardin botanique, qu'il a soigneusement déterminé et classé, nous a aussi été d'un grand secours pour l'éclaircissement de points douteux.

Nous devons enfin une mention toute spéciale à notre ami M. le D^r ALFR. COGNIAUX, qui, non seulement a revu les épreuves de notre travail, page par page, mais nous a, maintes fois, fait profiter de ses vastes connaissances en botanique systématique et a amélioré notre ouvrage par ses observations et par ses critiques judicieuses.

Malgré tous ces efforts, nous sentons qu'il y a encore bien des détails à corriger, bien des points douteux à élucider. Nous recevrons avec reconnaissance toutes les observations nous permettant de rendre le SYLLOGE plus exact, en vue d'une nouvelle édition, que les découvertes ininterrompues, faites au Congo, rendront nécessaire dans quelques années.

TABLEAU MONTRANT, PAR FAMILLE, LA
PROGRESSION DES CONNAISSANCES SUR LA FLORE CONGOLAISE.

Dicotyledonae.	GENRES.			ESPÈCES.		
	1896	1900	1908	1896	1900	1908
Ranunculaceae	2	3	4	5	9	12
Dilleniaceae		1	1		4	8
Anonaceae	1	6	13	3	19	45
Menispermaceae	3	3	5	3	4	6
Nymphaeaceae	1	1	1	2	2	2
Cruciferaeae			2			3
Capparidaceae	3	6	11	5	11	33
Violaceae	3	3	4	3	3	13
Bixaceae	5	5	7	5	10	15
Polygalaceae	1	1	3	3	4	10
Caryophyllaceae	2	3	4	3	4	6
Portulacaceae	2	2	2	3	4	6
Hypericaceae	1	4	4	1	4	8
Guttiferaceae	2	3	5	3	5	14
Dipterocarpaceae			2			3
Malvaceae	10	12	13	29	47	57
Sterculiaceae	5	8	10	8	18	43
Scytopetalaceae			3			5
Tiliaceae	6	8	10	13	20	41
Linaceae		2	2		2	8
Malpighiaceae	2	3	3	3	5	7
Geraniaceae		1	1		1	1
Oxalidaceae	1	1	2	2	3	4
Balsaminaceae	1	1	1	1	6	14
Rutaceae	1	2	4	1	2	13
Simarubaceae	2	2	6	2	2	7
Ochnaceae	2	2	3	7	11	35
Burseraceae	2	1	2	3	4	2
Meliaceae	2	4	10	2	5	18
Dichapetalaceae	1	1	1	1	5	13
Olaceae	5	11	17	4	13	32
Celastraceae	1	1	1	1	1	2
Hippocrateaceae	2	3	3	2	8	24
Rhamnaceae	1	2	3	1	2	5
Ampelidaceae	3	4	4	10	16	34

Dicotyledoneae.	GENRES.			ESPÈCES.		
	1896	1900	1908	1896	1900	1908
	Sapindaceae	3	7	11	3	11
Anacardiaceae	5	6	10	6	7	18
Moriaceae			1			1
Connaraceae	5	5	5	19	35	41
Leguminosaceae	42	76	93	73	199	415
Rosaceae	4	5	6	5	12	23
Crassulaceae	1	2	3	1	4	5
Droseraceae		1	1		2	2
Rhizophoraceae	2	2	3	2	3	5
Combretaceae	2	3	4	5	24	42
Myrtaceae	3	3	5	3	8	10
Melastomataceae	6	11	14	19	30	65
Lythraceae	2	2	3	3	3	6
Onagraceae	1	2	2	4	5	5
Samydeae	2	2	3	2	5	13
Turneraceae	1	1	1	2	2	2
Passifloraceae	3	6	6	6	15	18
Cucurbitaceae	9	14	19	15	26	35
Begoniaceae	1	1	1	1	4	17
Cactaceae	1	1	1	1	1	1
Ficoideae	3	3	3	4	6	6
Umbelliferae	2	3	5	3	4	7
Araliaceae		2	2		2	4
Rubiaceae	36	48	56	75	154	299
Dipsaceae			2			2
Compositaceae	35	45	55	64	108	148
Campanulaceae (incl. Lobeliaceae).	3	4	5	3	4	7
Ericaceae			1			1
Plumbaginaceae	1	1	1	1	1	1
Myrsinaceae			2			2
Sapotaceae	1	3	7	1	3	18
Ebenaceae	3	3	3	3	3	7
Oleaceae		1	3		1	6
Apocynaceae	9	20	33	12	46	122
Asclepiadaceae	7	15	26	13	29	70
Loganiaceae	5	7	8	14	15	40
Gentianaceae	2	4	9	2	5	18

Dicotyledoneae.	GENRES.			ESPÈCES.		
	1896	1900	1908	1896	1900	1908
Hydrophyllaceae	1	1	1	1	1	1
Boraginaceae	3	5	5	3	6	13
Convolvulaceae	8	12	14	18	41	51
Solanaceae	4	6	6	10	15	39
Scrophulariaceae	13	13	17	21	31	46
Lentibulariaceae	1	1	1	3	3	10
Gesneraceae			1			1
Bignoniaceae	2	3	6	2	4	16
Pedaliaceae	1	1	1	2	4	7
Acanthaceae	17	31	34	20	77	119
Verbenaceae	4	8	8	12	36	49
Labiataceae	15	20	21	33	62	70
Nyctaginaceae	2	2	3	2	4	6
Amarantaceae	8	11	13	14	20	22
Chenopodiaceae		1	2		1	4
Phytolaccaceae		2	2		2	3
Polygonaceae	2	3	3	3	6	9
Podostemaceae	2	2	5	3	3	5
Cytinaceae			1			1
Aristolochiaceae		1	1		3	3
Piperaceae	1	2	2	4	6	6
Myristicaceae			1			1
Lauraceae	1	1	1	1	1	1
Proteaceae		1	2		1	5
Thymelaeaceae	2	2	3	9	9	11
Loranthaceae	1	1	2	5	16	32
Santalaceae			1			1
Balanophoraceae		1	1		1	1
Euphorbiaceae	19	36	40	36	81	144
Urticaceae	6	11	19	13	24	91
Ceratophyllaceae		1	1		1	1
	384	598	808	709	1490	2826

Monocotyledoneae.	GENRES.			ESPÈCES.		
	1896	1900	1908	1896	1900	1908
	Hydrocharitaceae		3	4		3
Burmanniaceae			1			2
Orchidaceae	6	18	26	11	59	152
Flagellariaceae			1			1
Zingiberaceae	2	4	7	6	18	28
Marantaceae	5	6	9	9	14	22
Cannaceae	1	1	1	1	1	1
Musaceae		1	1		2	4
Haemodoraceae	1	1	1	3	3	5
Iridaceae	3	4	5	4	8	16
Amaryllidaceae	4	5	8	7	14	24
Taccaceae		1	1		1	1
Dioscoreaceae	1	1	1	4	9	20
Liliaceae	9	12	20	16	28	64
Pontederiaceae			4			4
Xyridaceae	1	1	1	1	2	3
Commelinaceae	5	6	9	12	26	45
Palaœaceae	5	9	7	7	10	15
Pandanaceae	1	1	1	1	1	2
Araceae	6	10	12	9	14	25
Lemnaceae			2			2
Alismaceae			2			2
Eriocaulonaceae	1	1	2	1	1	2
Cyperaceae	13	15	15	85	104	139
Graminaceae	26	40	41	65	113	132
	90	140	180	242	431	717
Gymnospermeae						
Gnetaceae		1	1		1	1
Cycadaceae			1			2
		1	2		1	3
Dicotyledoneae	384	598	808	709	1490	2826
Monocotyledoneae	90	140	180	242	431	717
Gymnospermeae		1	2		1	3
	474	739	991	951	1922	3546

PHANEROGAMAE

DICOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

RANUNCULACEAE

CLEMATIS L.

Clematis chrysocarpa *Welw. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 5 et in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 25, t. 1; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 2; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 2; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 34.

C. villosa *DC.* subsp. — *O. Kuntze* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 174.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 280).

— — var. **Poggei** [*O. Kuntze*] *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 55 et l. c. I² 1895 (1898) 2.

C. villosa *DC.* subsp. *chrysocarpa* *O. Kuntze* var. — *O. Kuntze* l. c. XXVI (1885) 174.

1882 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg.); Lofoi (Verd.).

Clematis glaucescens *Fresen.* Mus. Senckenb. II (1837) 268; *Walp.* Repert. bot. I, 4; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 3.

C. orientalis *L.* var. — *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) 217.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Katanga (Desc.).

Clematis grandiflora DC. Syst. nat. I (1818) 151; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 7; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 3; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109].

C. pseudograndiflora O. Kuntze in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 128; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 4.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur. 1903; Ém. et M. Laur.).

Clematis Kirkii Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 5; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 4; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 243.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.); Lofoi : plateau près de Lukafu. — Nom vern. : **Kalundi-Kumi** (Verd.).

Clematis orientalis L. Sp. pl. ed. I (1753) 543; DC. Prodr. I, 3; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 3.

Le type croît dans l'Asie tropicale.

— — subsp. **Wightiana** [Wall.] O. Kuntze in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 125; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 180; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 244; II (1907) 35.

C. Wightiana Wall. List (1831) n. 4674.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1355). — XII : l'Uele (Delp.).

Clematis scabiosaefolia DC. Syst. nat. I (1818) 154 et Prodr. I, 7; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 56 et Consp. fl. Afr. I², 6; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109].

C. villosa DC. subsp. — O. Kuntze in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 174; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 2.

1880 (Max Buchner). — Congo (Buchn.). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Clematis simensis Fresen. Mus. Senckenb. II (1837) 267; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 6; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 180; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 6; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 738] et Reliq. Dewevr. (1901) 1.

C. orientalis L. var. — O. Kuntze in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 124; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 3.

1895 (P. Pogge). — II a : Shinganga (Dew. 1308). — V : Kisantu (Gill. 1355).

Clematis spathulaefolia (*O. Kuntze*) *Prantl* in *Engl. Jahrb.* IX (1888) 258; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* I², 6 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 56.

C. villosa DC. subsp. — *O. Kuntze* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXVI (1885) 174.

1882 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg.).

Clematis Thunbergii *Steud.* *Nomencl. bot.* ed. 2, I (1841) 380; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 6; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* I², 7.

Le type croît dans l'Afrique trop. et austr., mais n'a pas été indiqué au Congo.

— — var. **angustisecta** *Engl.* ex *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109].

1896 (G. Descamps). — XVI : Lac Kisali (Desc.).

THALICTRUM L.

Thalictrum rhynchocarpum *Delile* et *Rich.* in *Annal. sci. nat. Sér.* 2, XIV (1842) 262; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 8; *Lccoyer* in B. S. B. B. XXIV (1885) 148; *Engl.* *Hochgeb. trop. Afr.* 221; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* I², 9; *Engl.* in *von Goetzen* *Durch Afrika* (1895) 376.

1894 (G. A. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : rég. du Kirunga (Goetz. et Prittw.).

RANUNCULUS L.

Ranunculus sardous *Crantz* *Stirp. Austriac.* ed. 1, II (1763) 84; *Rouy* et *Fouc.* *Fl. de Fr.* I, 107; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* I², 23.

R. philonotis *Ehrh.* *Beitr. zur Naturk.* II (1788) 145; *DC.* *Prodr.* I, 41; *Fl. Danica*, t. 1459; *Dietr.* *Fl. Boruss.* X, t. 668; *Coss.* *Comp. fl. Atlant.* II, 33.

1901 (J. Gillet). — V : endr. humid. de la vallée de l'Inkisi (Gill.).

Obs. — Le *R. pinnatus* Poir. a été indiqué, avec doute, dans le Bas-Congo par M. H. Johnston.

DELPHINIUM L.

Delphinium dasycaulon *Fresen.* *Mus. Senckenb.* II (1837) 272; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 11; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* I², 29; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 34.

1892 (G. Descamps). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kavungu-Vungu (Verd. 176); vallée de Buleshi (Desc.).

DILLENIACEAE

TETRACERA L. (4)

Tetracera Demeusei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 290.

T. alnifolia Willd. var. — *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 1 [B. S. B. B. XXXIX², 53].

1891 (F. Demeuse). — IX : pays des Bangala (Dem. 330).

Tetracera Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 290 et Miss. Laurent (1907) 409.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 807).

Tetracera Masuiana *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 61, t. 31, Contr. fl. Cgo, I (1899) 1 et Reliq. Dewevr. (1901) 2; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 54; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 196.

1896 (A. Dewevre). — V : Lemfu (But. in Gill. 1207, 1210); Kisantu-Makela; Kisantu (Van Houtte); entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 3453, 3664). — XIII d : Lubunda (Dew. 1025).

Tetracera podotricha *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 200; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 291; II (1907) 54, (1908) 310.

T. alnifolia Auct. [non Willd.] *Schlechter* Westafr. Kautsch-Exped. (1900) 300; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 2 et Contr. fl. Cgo, II (1900) 1; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 61.

1899 (J. Gillet et R. Schlechter). — V : Lukolela (Schlt. 12646); Kimuenza; Kisantu (Gill. 1122, 2118). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1507). — XI : Limbutu (Pyn. 81). — XV : Lubi (Lescr. 193).

— — var. **glabrescens** *De Wild.* l. c. I (1906) 291; II (1908) 310.

1891 (F. Demeuse). — V : Lukolela (Dem. 456); env. de Sanda (Odd.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 79, 209, 1508; Pyn. 1042).

(1) Le *T. alnifolia* Willd. existe au Congo, voir Addit. et Correct. p. 651.

Tetracera Poggei *Gilg* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 71 et in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 198; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 55.

T. fragrans *De Wild.* et *Th. Dur.* III. fl. Cgo (1899) 55. t. 28; Contr. fl. Cgo, I (1899) I et Reliq. Dewevr. (1901) 1.

1881 (P. Pogge). — V : Kimuenza (Gill.); env. de Sanda (Odd.). — IX : Bumba. — Nom vern. : **Makolokosa** (Dew.). — XV : Mukenge (Pg.).

Tetracera roseiflora *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 199; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 292.

T. obtusata *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Planch.*] Pl. Gilletianae, I (1900) 2 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 2].

1900 (J. Gillet). — V : Kisautu (Gill. 1669).

Tetracera Stuhlmanniana *Gilg* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 272.

Le type croît dans l'Afrique or. allem.

— — var. **occidentalis** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 410, t. 123.

1904 (Aug. Krekels). — IV : district des Cataractes (Pyn. 85). — IX : rives de l'Imbiri (Ser.); Umangi (Krek.). — XII a : rives du Rubi (Ser. 41).

ANONACEAE

UVARIA L.

Uvaria brevistipitata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 38; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 473.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1733).

Uvaria Cabrae *De Wild.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, XI (1901) 2; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 37; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 472.

1896 (Alph. Cabra). — II a : la Lemba. — Nom vern. : **Mudembo** (Cabra).

Uvaria glabrata *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 28.

1883 (P. Pogge). — XV : loc. haud ind. [Pg. 683].

Uvaria latifolia [Scott-Elliot] *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 22.

Anona — Scott-Elliot in Journ. Linn. Soc. XXX (1895) 69.

Le type est indiqué dans la Haute-Guinée.

— — var. **luluensis** *Engl. et Diels l. c.* (1901) 23, t. 3, fig. A, a-h.
1883 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua, vers 6° (Pg.).

Uvaria Mocoli *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I* (1899) 3; Ill. fl. Cgo (1900) 115, t. 58 et Reliq. Dewevr. (1901) 2; *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 10.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Lukolela. — Nom vern. : **Mokoli** (Dew. 823 a, II).

Uvaria Poggei *Engl. et Diels in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II* (1899) 294 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 26, t. 7, fig. A, a-f.; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 241.

1882 (P. Pogge). — V : env. de Lemfu (But.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — XV : Mukenge (Pg. 622, 627, 1635).

Uvaria scabrida *Oliv. Fl. trop. Afr. I* (1868) 21; *Th. Dur. et Schinz Cosp. fl. Afr. I*, 35; *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 14; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 241.

1903 (J. Gillet). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.).

Uvaria Smithii *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 28.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Uvaria verrucosa *Engl. et Diels in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II* (1899) 294 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 20, t. 7, fl. B, a-c.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : ruisseau Kambele [entre Kapili et Kibali] (Schw. 3683).

CLEISTOPHOLIS Pierre.

Cleistopholis grandiflora *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1903) 39; *Diels in Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 475.

1900 (Ch. Gérard). — V : région de Kimuenza (Gér. in Gill. 1739).

ANONIDIUM Engl. et Diels.

Anonidium Laurentii [*Engl. et Diels*] *Engl. et Diels in Notizbl.*

bot. Gart. Berlin, III (1900) 56 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 37.

Anona Laurentii *Engl. et Diels* in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, II (1899) 300.
1893? (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

Anonidium Mannii [*Oliv.*] *Engl. et Diels* in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, III (1900) 56 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 37, t. 14; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 82.

Anona — *Oliv.* in *Hook.* *Icon. pl.* XI (1867) t. 1010 et *Fl. trop. Afr.* I, 17;
Th. Dur. et Schinz *Consp. fl. Afr.* I^o, 40; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo.* I (1899) 2 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 5.

1893 (Ém. Laurent). — *Ravius* boisés du Bas-Congo (Ém. Laur., Dew.). — VIII : *Lulanga* (Ém. Laur.). — XV : *Kamba* (Ém. Laur.).

UNONA L. F.

Unona glauca *Engl. et Diels* ex *Engl.* in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, II (1899) 296 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 40, t. 15, fig. D.

1895 (P. Dupuis). — II a : *Bingila* (Dup.).

POPOWIA Endl.

Popowia congensis [*Engl. et Diels*] *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 44, t. 17, fig. A, a-f.

Unoua — *Engl. et Diels* ex *Engl.* in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, II (1899) 296.
1895 (Ém. Laurent). — IX : *Bangala* (Ém. Laur.).

Popowia ferruginea [*Oliv.*] *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 46, t. 17, fig. D; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1906) 241.

Unona — *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I (1868) 35; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* I^o, 36; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 11.
U. Eminii *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* (1895) 172.

1903 (J. Gillet). — I : *Moauda* (Gill. 3188). — VI : *vallée de la Djuma* (Gent. ; Gill. 3803).

Popowia Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1906) 241; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 477.

1903 (J. Gillet). — V : *env. de Kisantu* (Gill. 3592).

Popowia Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 83, t. 19; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 477.

1903 (Ém. Laurent). — V : *Lukolela* (Ém. Laur.).

Popowia Schweinfurthii *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 51, t. 19, fig. E, a-g.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Mbrule (Schw.).

MONANTHOTAXIS Baill.

Monanthotaxis Poggei *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 53.

1876 (P. Pogge). — V : Kinshassa (Schlt. 12801). — XVI : Musumba, 8°5 (Pg.).

— — var. **latifolia** *Engl. et Diels l. c* (1901) 53.

1882 (P. Pogge). — XIII d : Lufubu (Pg. 638).

HEXALOBUS A. DC.

Hexalobus grandiflorus *Benth. in Trans. Linn. Soc. XXIII* (1862) 486, t. 40; *Oliv. Fl. trop. Afr. I*, 27; *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 57; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 84.

H. crispiflorus *Auct. [an A. Rich.] in Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*, (1898) 36; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo. II* (1900) 1 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 3.

1870 (G. Schweinfurth). — IX : Bangala. — Nom vern. : Ilumbe (Dew.). — XI : Basomelo (Ém. Laur.). — XV : la Lulua (Pg. 556, 1635).

XYLOPIA L.

Xylopiia aethiopica [*Dunal*] *A. Rich. Fl. de Cuba* (1853) 53 in adnot.; *Oliv. Fl. trop. Afr. I*, 39; *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 60, t. 21, fig. C, a-m.

Unona — *Dunal Anonac.* (1817) 113.

Xylopicum — *O. Kuntze Rev. Gener.* (1891) 8; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*, 42 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 57.

Xylopiia undulata *P. Beauv. Fl. d'Oware, I* (1804) t. 16 (fruct. sol.); *Hiern Cat. Welw. Pt. I*, 9.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Xylopiia Bokoli *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II* (1900) 2 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 6; *Diels in Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 481.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : Bokoli (Dew. 785).

Xylopiia Butayei *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 33; *Diels in Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 481.

1901 (R. Butaye). — II : Malela (But. in Gill. 2239).

Xylopia congolensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 41; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 480.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 812).

Xylopia De Keyzeriana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 43; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 481.

1902 (Aug. Van Houtte). — V : Sanda. — Nom vern. : **Mukwa** (Van Houtte in Gill. 2258).

Xylopia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 42; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 480.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 207).

Xylopia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 32; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 481.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Moingele** (Verd. 503).

Xylopia odoratissima *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 31 et in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 12; *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 66.

Xylopicum — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 8; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I^o, 43.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Xylopia oxypetala [*DC.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 31; *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 63, t. 22, fig. E, a-f.

Unona — *DC.* Syst. nat. I (1818) 496.

Coelocline — *A. DC.* Monog. Anon. (1832) 33.

X. Dunaliana *Vallot* in B. S. B. Fr. XXIX (1882) 219.

Xylopicum *Dunalianum* *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I^o (1895) 42 et Étud. fl. Cgo (1896) 58.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Xylopia parviflora [*Guill.* et *Perr.*] *Engl.* et *Diels* [non *Benth.*] in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 64.

Uvaria — *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1830-1831) 9, t. 3, fig. 1.

Coelocline — *A. DC.* Mém. Anon. (1832) 33.

Xylopicum — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 8; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I^o, 43.

X. longipetala *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 4; Ill. fl. Cgo (1900) 133, t. 67 et Reliq. Dewevr. (1901) 6; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 481.

X. acutiflora *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XVII (1841) 413; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 32.

1870 (G. Schweinfurth). — IX : Bangala (Dew.). — XII d : rive droite du Kibali [Mangbettu] Schw.).

Xylopia Poggeana *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 65.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 634).

Xylopiá Wilwerthii *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 5 et Ill. fl. Cgo (1900) 127, t. 64. *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 65; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 481.

1896 (Eug. Wilwerth). — IX : Upoto (Wilw.).

— — var. **cuneata** *De Wild.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, XI (1904) 63; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 44 et 243; *Diels* l. c. XXXIX (1907) 481.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2589); Kimuenza (Gill.).

STENANTHERA *Engl. et Diels.*

Stenanchera pluriflora *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 45, 243; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 482.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill. 168); Kisantu-Makela (Van Houtte); Kimuenza (Gill.); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3635).

ARTABOTRYS R. Br.

Artabotrys aurantiodorus [*De Wild. et Th. Dur.*] *Engl. ex Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 76; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 84.

Xylopia — *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 4 et Ill. fl. Cgo (1900) 137, t. 69.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

Artabotrys congolensis *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 2; Ill. fl. Cgo (1901) 145, t. 83 et *Reliq. Dewèvre.* (1901) 3; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 76.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.).

Artabotrys Thomsoni *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I (1868) 28; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* I^a, 30; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 34 [B. S. B. B. XXXVII, 109]; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* [Anon.] (1901) 72.

1881 (P. Pogge). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — XV : Mukeuge (Pg. 555, 624).

ANONA L.

Anona senegalensis Pers. Syn. pl. II (1807) 95; DC. Prodr. I (1824) 86; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 46; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 41; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 8; *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 78; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 2 et Reliq. Dewevr. (1901) 5.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Schimp.). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Shibolo** (Dew.); Cabra; Bingila (Ém. Laur.; Dup.); route de Shinganga à Zobe (Dew.). — IV : route des caravanes [rég. des Cataractes] CC. (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool; Léopoldville (Ém. Laur.); Kisantu. — Nom vern. : **Lolo** (Gill.). — VII : Lac Léopold II (Ém. Laur.). — IX : Olombo (Ém. Laur.). — XIII d : Nyangwe (Dew.). — XV : le Kasai; Dibebe (Ém. Laur.); Mukenge (Pg.). — Noms vern. : **Lolo** (Kasongo); **Mkando** [Taugauika] (Dew.).

— — var. **cuneata** *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 46; *Engl.* et *Diels* l. c. 80; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 243.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.). — VI : env. de Tumba-Mani (Cabra et Michel).

ISOLONA Engl. et Diels.

Isolona congolana [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 84.

Monodora — *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 5 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 13]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 3.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Lokandu [env. de Bena-Kamba] (Dew. 1103).

Isolona Dewevrei [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 83, t. B, a-d.

Monodora Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 3 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 11] et Reliq. Dewevr. (1901) 4; *Diels* in *Engl.* Jahrb. XXXIX (1907) 486.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Isolona pilosa *Diels* in *Engl.* Jahrb. XLI (1908) 328.

1906 (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm. 11).

Isolona Thonneri [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 83.

Monodora — *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 4 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 12] et Pl. Thonnerianae (1900) 16, t. 3.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Masanga; Bogola (Thonn. 104, 106).

MONODORA Dunal.

Monodora angolensis Welw. Apont. phyto-geogr. (1853) 587 et in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 10, t. 1; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 38; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 38; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 409] et Reliq. Dewevr. (1901) 3; *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 88, t. 29 c; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 123.

1896 (A. Dewèvre et Ém. Laurent). — Bas-Congo (Tilman). — II a : Tshoa. — Nom vern. : **Selufu** (Cabra). — VIII : env. d'Eala. — Noms vern. : **Mongangila** (M. Laur.); **Côquilhatville** (Dew.): Équateurville [Waugata] (Durieux). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.).

Monodora Cabrae De Wild. et Th. Dur. in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, XI (1900) 3 [B. S. B. B. XL², 64]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 40; *Diels* in *Engl.* Jahrb. XXXIX (1907) 486.

1896 (Alph. Cabra). — II a : Tshoa (Cabra, 2).

Monodora Durieuxii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 122; *Diels* in *Engl.* Jahrb. XXXIX (1907) 476.

1896 (Ach. Durieux). — VIII : Équateurville [Waugata] (Dur. in Dew. 613).

Monodora Myristica [Gaertn.] Dunal Monog. Anon. (1817) 80; *Cliv.* Fl. trop. Afr. I, 37; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 39; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 12; *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 86, t. 30, fig. A; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 29 et Miss. Laurent (1905) 84.

Anona — Gaertn. De fruct. et semin. III (1805) 194, t. 125, fig. 1.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo? (Ém. Laur.). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.).

MENISPERMACEAE

CHASMANTHERA Hochst.

Chasmanthera strigosa [Miers] Baill. in *Adansonia*, V (1864-1865) 364; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 45 et Étud. fl. Cgo (1896) 58.

Jateorhiza — Miers in *Hook.* Niger Fl. (1849) 213.

Cocculus (?) maeranthus *Hook.* f. l. c. (1849) 213, t. 18 (icon. mal.) et in *Hook.* Icon. pl. VIII, t. 759.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo? (Sm.).

DIOSCOREOPHYLLUM Engl.

Dioscoreophyllum strigosum Engl. in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 107, t. 11, fig. a-f; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 2. 1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra).

SYNCLISIA Benth.

Synclisia scabrida *Miers* in Ann. nat. Hist. Ser. 3, XX (1867) 171 et Contr. to Bot. III, 371; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 49; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 46 et Étud. fl. Cgo (1896) 59. 1816 Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

STEPHANIA Lour.

Stephania laetificata [*Miers*] *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. I (1865) 962; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 47; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 49; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 19; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 126.

Perichasma — *Miers* in Ann. nat. Hist. Ser. 3, XVIII (1866) 22 et Contr. to Bot. III, 249, t. 123.

1905 (Marc. Laurent). — VII : Efukwa-Kombe (M. Laur.).

CISSAMPELOS L.

Cissampelos Pareira L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1031; *DC.* Prodr. I, 100; *Descourtilz* Fl. des Antilles, III, t. 201; *Nees* Pl. officin. t. 365; *Spach* Hist. des végét. Atlas t. 87; *Hook. f.* et *Thoms.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 103; *Eichl.* in *Mart.* Fl. Brasil. XIII¹, 188; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 45; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 51; *Benth.* et *Trin.* Medic. Pl. I, t. 15.

Au Congo, cette espèce a été rencontrée sous les deux variétés suivantes :

— — var. *owariensis* *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1863) 45; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 51 et Étud. fl. Cgo (1896) 59; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 18; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 123; II (1908) 126.

C. Pareira L. subsp. — Engl. in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 696.

C. owariensis *P. Beaur.* ex *DC.* Prodr. I (1824) 100.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Kest.); Biugila (Dup.); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — IV : la Lufu; Banza-Puta (Dem.); Luozi (Luja). — V : Lukolela (Pyn.); env. de Kisantu, de Kimuenza et de Dembo (Gill.); env. de Sanda (Odd.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. de Coquilhatville; Eala et env. (M. Laur.); Bikoro; Bombimba (Pyn.). — XV : Mauge (Ém. et M. Laur.). — Ind. nou cl. : Soraba (Cabra).

C. Pareira var. **zairensis** *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 60 et 52 *Consp. fl. Afr.* I² (1898).

C. Pareira *L.* var. *transitoria* *Engl.* subvar. — *Engl.* l. c. XXXVI (1899) 395.

C. zairensis *Miers* *Contr. to Bot.* III (1871) 180.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Cissampelos tenuipes *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 399; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 35.

1881 (P. Pogge). — V : Sanda (De Brouw. in Gill. 3834); env. de Kisantu (Gill. 3766). — XV : la Lulua (Pg. 817, 818); le Sankuru (Ém. et M. Layr.).

NYMPHAEACEAE

NYMPHAEA L.

Nymphaea coerulea *Savign.* *Décad. pl. Égypt.* III (1799) 74; *Bot. Mag.* (1802) t. 552 et (1852) t. 4647; *Spach* *Hist. des végét. (Atlas)* t. 87; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* I², 55 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 60; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 7.

N. stellata *Willd.* *Sp. pl.* II (1800) 1153; *Bot. Mag.* (1819) t. 2088; *Wight* *Icon. pl. Ind. or.* I, t. 178; *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* I, 114; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.*

I, 52; *Wood* et *Erans* *Natal Pl.* t. 29 et 33; *Engl.* *Pl. Ost-Afr.* 178; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 245.

N. guineensis *Schumach.* et *Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 247.

1891 (G. Descamps). — II a : Biugila [form. *nana*] (Dup.). — V : Kisantu (Gill.); Kisanga (Vanderyst). — XII d : entre Dungu et Faradje (Ser.). — XV : entre Kabinda et Kisiuga (Cransh.). — XVI : Lac Mosolo; Toa (Desc.); Lac Moero; Lukafu. — Nom vera. : **Makuba** (Verd.).

— — var. **parviflora** *Hook. f.* et *Thoms.* *Fl. Ind.* I (1855) 243 et in *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* I, 114.

1896 (A. Dewèvre). — IV : env. de Monsumbi (Dew.).

— — var. **versicolor** (*Sims*) *Hook. f.* et *Thoms.* *ll. cc.*

N. versicolor *Sims* in *Bot. Mag.* (1809) t. 1189; *Rehb.* *Fl. exot.* t. 15.

1898 (Éd. Luja). — IV : Soua-Gongo (Luja).

Nymphaea Lotus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 511; *Bot. Mag.* (1810) t. 1280 et (1814) t. 1364; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 50, t. 88; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 52; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 56 et Étud. fl. Cgo (1896) 60; *Hiern* Cal. Welw. Pl. I, 22; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. 1901) 7; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 32; *Miss. Laurent* (1905) 82 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 245.

1874 (Fr. Maunann). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Ponta da Lenha [subv. *parcubescens* Casp.] (Naum.). — II a : Katala. — Nom vern. : **Make-tunkotu** (Dew.); Beza-Masola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Ser.). — VIII : Eala (Pyn.). — IX : pays des Bangala? (Hens); Meonge-sur l'itimbi (Ém. Laur.); Bumba (Pyn.). — XII a et d : entre Niangara et Dungu (Ser.). — XV : le Sankuru. — Nom vern. : **Madelemba** (Sap.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musanga** (Verd.). — Ind. non cl. : le Lomani (Desc.).

CRUCIFERACEAE

NASTURTIUM R. Br.

Nasturtium humifusum *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. (1831) 19; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 58; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 75; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 2 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 2].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 60).

BRASSICA L.

***Brassica juncea** [*L.*] *Coss.* in B. S. B. Fr. VI (1859) 609 et Comp. fl. Atlant. I. 181; *Boiss.* Fl. Orient. I. 390; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 116; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 39

Sinapis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 668; *Jacq.* Hort. Vindob. t. 171.

1888 (Fr. Hens). — Bas Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.). — V : Tamo [Stanley-Pool] (Hens); Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Dew.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.).

***Brassica oleracea** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 667; *Coss.* Comp. fl. Atlant. I, 182; *Rouy* et *Fouv.* Fl. de Fr. II, 52; *Rehb.* Icon. fl. Germ. II, t. 97; *Engl.* Pf. Ost-Afr. 183; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 117; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 380.

1903 (Ém. Laurent). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — IX : cultivé chez les Bangala (Ém. et M. Laur.); Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

CAPPARIDACEAE

CLEOME L.

Cleome ciliata *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 294; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 78; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 159 et Étud. fl. Cgo (1896) 61; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 27; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 7; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 86 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 245.

C. guineensis *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 218.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.); Shimbanza. — Nom vern. : **Mabunda** (Cabra). — IV : Lutete (Hens). — V : Dembo (Vanderyst). — VI : Bamdunda (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Lulanga (Ém. et M. Laur.). — XIII a : euv. de Kabanga (Dew.). — XIV : Uvira (Coll.?). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Noms vern. : **Lusada** (Tanganika); **Mohala** [Kasongo] (Dew.); **Musaka**; **Galagale** (Cabra).

Cleome Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 36.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Cleome monophylla *L.* Sp. pl. ed. 4 (1753) 672; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 76; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 159; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 4 [B. S. B. B. XXXVI², 50].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Cleome spinosa *Jacq.* Enum. pl. Carib. (1760) 26; *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) 939; *DC.* Prodr. I, 239; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 78; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 161 et Étud. fl. Cgo (1896) 61; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 36, (1905) 244; II (1908) 245.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Zambi (Dew.). — II a : le Mayumbe (Kest.). — V : le Stanley-Pool (Cabra); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Bolobo (Heus). — VIII : entre Lukolela et Équateurville (Buett.); Eala et euv. (M. Laur.). — XV : bassin du Kasai (Ém. et M. Laur.) et du Bas-Sankuru (Ém. Laur.).

Cleome thyrsoflora *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 6 [B. S. B. B. XXXIII², 14] et Reliq. Dewevr. (1901) 8.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 121).

POLANISIA Raf.

Polanisia hirta [Klotzsch] Pax in Engl. Jahrb. X (1888) 14; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 162; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 5. [B. S. B. B. XXXVI^a, 51].

Decastemon — Klotzsch in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 157.

Cleome — *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 81; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 246.

1895 (Gust. Debeerst). — VI : Kolomonja (Ém. Laur.). — XV : Lac Foa (Lescr.). — XVI : Pala (Deb.).

Polanisia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 264.

1905 (F. Seret). — XII : entre les villages des chefs Guago et Bo (Ser. 269).

PEDICELLARIA Schrank.

Pedicellaria pentaphylla [L.] Schrank in *Roem. et Usteri* Mag. f. d. Bot. III, St. VIII (1790) 11; *Gilt* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 184; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 62 et Consp. fl. Afr. I^a, 164; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 487; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 5 [B. S. B. B. XXXVI^a, 51]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 8; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 35; Miss. Laurent (1905) 86 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 36, (1904) 124, (1906) 241; II (1908) 245.

Cleome — *L. Sp. pl.* ed. 2 (1763) 963; *Bot. Mag.* (1814) t. 1640.

Gynandropsis — *DC. Prodr.* I (1824) 238; *A. Gray et Sprague* Gen. pl. Amer. bor.-or. t. 78; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 82.

C. acuta *Schumacher et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 82; *Hiern* Cat. Welw. Pl. II, 481.

1885 (R. Buettner). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dup.). — V : Lisha (M. Laur.); env. du Stanley-Pool (Dem.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Moe près Bolobo (Dew.); Suata (Buett.); env. de Lemfu (But.); Kimuenza (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill.); Muene-Putu-Kasongo (Buett.); entre Luauu et Lusubi (Lescr.); Madibi. — Nom vern. : *Mosapa*; *Mosalwa* (Sap.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Ikoko (Sap.). — IX : pays des Bangala (Hens); Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XII c : Niangara (Delp.). — XIV : Kalembe-Lemba. — Noms vern. : *Kalshongo*; *Kashongo* (Coll.). — XV : le Kasai; Koudue (Ém. et M. Laur.); Djoko-Punda (Lescr.). — XVI : Pweto. — Nom vern. : *Mobanga* (Cabra).

— — var. **hirsutissima** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 246.

1905 (Marc. Laurent). — IX : Lisha (M. Laur. 455). — XIV : Uvira (Cabra, 27).

MAERUA Forsk.

Maerua angolensis *DC. Prodr.* I (1824) 254; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 86; *Gilt* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 187; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 165; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 29; *Th. Dur. et De Wild.*

Mat. fl. Cgo, I (1897) 5 [B. S. B. B. XXXVI^a, 51]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 36.

1895 (G. Descamps). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kasausa** ; **Kalumu-Kulu** (Verd. 40, 79. 598); Albertville [Toa] (Desc.).

Maerua Aprevaliana *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 5 et Reliq. Dewevr. (1901) 9; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 37; II (1908) 252; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 225.

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2725); entre Kikwit et Boala (L.escr. I51). — VIII : env. de Bokakata (Dew. 784). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1478). — XIII a : Romée (M. Laur. 1025). — XV : le Bas-Sankuru (Dew.); le Sankuru (Sap.).

Maerua Descampsii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 180.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Maerua Gilgiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 180.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Maerua Kassakalla *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 179.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kasakalla** (Verd. 8).

CERCOPETALUM Gilg.

Cercopetalum dasyanthum *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 308, t. 3; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 9; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 252.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Eala (M. Laur. 689; Pyn. 397, 461, 617, 830); Ikeuge (Ém. Laur. : Pyu. 384); Basankusu (Brun.); Mozambi (Pyn. 353); Mousole (Huyghe et Ledoux). — XI : Yambuya (M. Laur. 148). — XII c : euv. de Surango (Ser. 393).

— — var. **longeacuminatum** *De Wild.* l. c. II (1908) 252.

1906 (F. Seret). — XII : Koroboro (Ser. 621).

BOSCIA Lam.

Boscia salicifolia *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 93; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 172; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 31; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 36.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musaisa** (Verd. 68).

Boscia Welwitschii *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1903) 218; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 252.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Midilla-Kuha** (Verd. 530).

BUCHHOLZIA Engl.

Buchholzia coriacea *Engl.* in Engl. Jahrb. VII (1886) 335; *Pax* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 300, t. 1; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 173; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 236 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 252.

(1903) Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kiri [Lac Léopold II] (Ém. et M. Laur.). — XI : Limbutu (M. Laur. 1476 ; Yambuya (M. Laur. 1477); Moudjo (Pyn. 340).

CAPPARIS L.

Capparis acuminata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 37; II (1908) 251.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — XII c : la Banka [entre Surango et Niangara] (Ser. 443). — XV : le Sankuru. — Nom vern. : **Infundu** (Sap.).

Capparis cerasifera *Gilg* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 179.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 1203).

Capparis Duchesnei *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 87 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 251.

1888 (F. Demeuse). — IX : Umaugi (Ém. Duch.). — X : Bonioka (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Romée (M. Laur. 1488, 1499). — XV : le Sankuru. — Nom vern. : **Lokwanta**; **Mosampo** (Sap.); Munuugu (Lescr. 259); le Kasai (Dem. 190).

Capparis erythrocarpa *Isert* in Ges. naturf. Fr. Berl. Schrift. IX (1789) 334. t. 9; *DC.* Prodr. I, 246; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 98; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 174 et Étud. fl. Cgo (1896) 62.

C. Afzelii *DC.* l. c. 1 (1824) 246.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Capparis Kirkii *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 98; *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 185; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 175; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 179.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : env. de Lukafu (Verd.). — Nom vern. : **Mubinga-Kisvoo** (Verd.).

Capparis Poggei *Pax* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 298; *Th. Dur.* et *Schinz* I², Étud. fl. Cgo (1896) 62 et Consp. fl. Afr. 175.

1882 (P. Pogge). — XV : Congo mérid. (Pg. 641).

Capparis Verdictii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 35.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kabanga** (Verd.).

CRATAEVA L.

Crataeva religiosa *Forst. f.* Fl. insul. Austral. prodr. (1786) 203; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 395; *DC.* Prodr. I, 243; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 99; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 177.

Le type, non encore trouvé au Congo, croît dans toute l'Afrique trop.

— — var. **brevistipitata** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 35.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kampaki** (Verd. 94).

Obs. — M. De Wildeman pense aujourd'hui que cette variété est plutôt un accident.

RITCHIEA R. Br.

Ritchiea ageleaeifolia *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 207; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 87 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 245.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 3182). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Ritchiea ealaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 248.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 908).

Ritchiea fragrans *R. Br.* in *Denh. et Clappert.* Narr. trav. Centr.-Afr. Append. (1826) 20 et ex *Walp.* Repert. bot. I (1842) 204; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 100; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 177; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 33; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 9; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 37.

R. erecta *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 216, t. 19-20.

R. polypetala *Hook. f.* in *Bot. Mag.* 1862 t. 5344.

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gent : Gill. 290). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 928). — Noms vern. : **Mwaba** [Kasongo]; **Wambala** [Tanganika]; **Lumbalumba** [Ikwangula] (Dew.).

Ritchiea immersa *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 248, t. 86.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Limbutu (M. Laur. 1475 b).

Ritchiea Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 250, t. 85.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Limbutu (M. Laur. 1475).

Ritchiea Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 247, t. 87.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 1203).

EUADENIA Oliv.

Euadenia alimensis *Hua* in B. S. Philom. Paris, Sér. 8, VII (1895) 81; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 3 et Reliq. Dewevr. (1901) 10.

Pteropetalum Klingii *Pax ex De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 40, t. 20.

1896 (A. Dewèvre). — IX : Ile en face de Umangi (Ém. Duch.). — XI : Lokandu [rive gauche]. — Nom veru. : **Kinokoto** (Dew. 1110 pr. p.). — XV : bords du Kasai (Lujā).

Euadenia trifoliata [*Schumach. et Thonn.*] *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. I (1867) 969; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 244; II (1908) 251 et Miss Laurent (1905) 87.

Stroemia — *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 114.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bolomba près d'Ikelemba (M. Laur. 64). — IX : Bumba (Pyn. 114). — XI : env. de Lokandu (Dew. 1110 pr. p.). — XII c : Rungu (Ser. 858).

VIOLACEAE

VIOLA L.

Viola abyssinica *Steud. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 105; *Baill.* Hist. pl. Madag. (1890) t. 143. *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 276 et in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 376; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 240.

1894 (G. A. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

IONIDIUM Vent.

Ionidium enneaspermum *Vent.* Pl. Jard. Malmaison (1803) sub t. 27; *Ging.* in *DC.* Prodr. I, 308; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 105; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 63 et Consp. fl. Afr. I^a, 207; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 63, II (1908) 314.

Calceolaria — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 41; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 34. *Viola guineensis* *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. pl. (1827) 133.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lukungu (Hens, A. 187). — V : Kwamouth (M. Laur. 432; Kisantu (Gill. 2328). — VI : vallée de la Djuma (Gent.: Gill. 2816).

— — var. **thesiifolium** [*DC.*] *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 3.

I. thesiifolium *DC. ex Ging.* in *DC.* Prodr. I (1824) 309.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

ALSODEIA Thou.

Alsodeia brachypetala Turcz. in Bull. Soc. Natur. Mosc. XXXVI (1863) I, 558; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 109; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 63.

Rinorea — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 42; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 209; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 4.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); Bingila (Dup.) — III : Tondea (Buett.). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — XV : Bena-Dibele [Kasai] (Éd. Luja); le Sankuru (Ém. Laur.).

Alsodeia congensis [Engl.] *Th. et Hél. Dur.*

Rinorea — *Engl.* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 3 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 138; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 10.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 265).

Alsodeia dentata P. Beauv. *Fl. d'Oware*, II (1807) 11. t. 65; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 110; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* A, 91.

Rinorea — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 42; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 209; *Hieron* Cat. Welw. Pl. I, 36; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 10.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : entre Irebu et Lukolela (Dew. 817). — Ind. non cl. : Tata (Dew. 1071 a).

Alsodeia Dewevrei [Engl.] *Th. et Hél. Dur.*

Rinorea — *Engl.* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 4 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 144; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 11.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 305).

Alsodeia Dupuisii [Engl.] *Th. et Hél. Dur.*

Rinorea — *Engl.* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 4 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 138.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

Alsodeia Engleriana *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 3 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 173].

Rinorea — *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 11.

1836 (A. Dewèvre). — XIII c : Rewa (Dew. 114).

Alsodeia Poggei [Engl.] *Th. et Hél. Dur.*

Rinorea — *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 137.

1883 (P. Pogge). — III : Tondoa (Buett. 492). — XV : la Lulua, vers le 6° o. (Pg. 646).

Alsodeia Welwitschii *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I (1868) 110.

Rinorea — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 42; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* I, 212; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 12.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 948). — Noms vern. : **Keurwe** [Kasongo]; **Kambiru** [Tanganika]; **Bongi-Bongi** [Ikwangula].

SAUVAGESIA L.**Sauvagesia congoensis** *Engl.* in *Schlechter* *Westafri. Kautsch.-Exp.* (1900) 301 [nom. fant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12443).

Sauvagesia erecta *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) 203; *DC. Prodr.* I, 315; *St-Hil.* *Pl. remarq. du Brésil*, t. 3; *Spach* *Hist. des végét.* [Atlas] t. 42; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 111; *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* 274; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 63 et *Consp. fl. Afr.* I, 212; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 6 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 12; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 63, (1904) 168; II (1908) 311.

S. nutans *Pers.* *Syn. pl.* I (1805) 253.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : rive N. du Kasai [dist. du Stanley-Pool] (Luja); entre Léopoldville et Mombasi; env. de Léopoldville; Kimuena env. de Dembo (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — Ind. non cl. : Ganga-Tshikamba [Gaugu?, II a] (Cabra).

BIXACEAE**BIXA L.**

***Bixa Orellana** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) 512; *DC. Prodr.* I, 259; *Des-courtilz* *Fl. des Antilles*, I, t. 4; *Bot. Mag.* (1812) t. 1:456; *Wight* *Illustr. Ind. Bot.* t. 41; *Spach* *Hist. des végét.* [Atlas] t. 44; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 61 et *Consp. fl. Afr.* I, 211; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 12; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 37; *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 5-19 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 314.

1888 (Fr. Heus). — II a : Zenze (Ém. Laur.). — IV : route des Caravanes; entre Tumba et Kitobola (Ém. Laur.). — V : Bolobo (Dew.); env. de Sanda (Gill.); Kinkosi; Kisango (Vanderyst). — VIII : Coquilhatville (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Upoto (Welw); Ukaturaka (Ém. Laur.). — XV : le Kasai (Lescr.); Kanda-Kanda (Gent.); Mokole (Lescr.); env. de Yoko-Punda (Ém. Laur.). — XVI : Lubile (Lescr.).

POGGEA Guerke.

Poggea alata *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 162, t. 7; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 65 et Consp. fl. Afr. I², 215; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 65 [B. S. B. XXXVII, 110]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 63; II (1908) 314 et Miss. Laurent (1905) 44.

1881 (P. Pogge). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2732). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Limbutu (M. Laur. 1900). — XV : Mukenge (Pg. 609, 1048, 1096); Luebo (Ém. Laur.); Butala; Mange (Ém. et M. Laur.).

ONCOBA Forsk. [s. str.]

Oncoba spinosa *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 103; *A. Rich.* Fl. Seneg. tent. I, 32, t. 10; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 115; *Warb.* in Engl. Pf. Ost-Afr. 277; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 216; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 3 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 3] et Reliq. Dewevr. (1901) 16; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 38; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 158 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 58 (1908) 315; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 454, in obs.

Ludia monacantha *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 231.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kolo [entre Kimpoko et Dolo] (M. Laur. 451); entre Kange et Zoma [près Lukungu] (Dew. 415); Kisantu; bords de l'Inkusi (Gill.). — XII : Ludibi (Lescr. 195). — XII c : Niangara (Ser. 833). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

CALONCOBA Gilg.

Caloncoba Crepiniana [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 460.

Oncoba — *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 7; III. fl. Cgo (1900) 123, t. 62 et Reliq. Dewevr. (1901) 12; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 157 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 58.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lokole. — Nom vern. : Longenge (Dew. 848; Ém. Laur.). — XI : Limbutu (M. Laur.); Lokandu (Dew. 1120). — XV : Lubi (Lescr. 183).

Caloncoba glauca [*P. Beauv.*] *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 459.

Ventenatia — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 30, t. 17.

Oncoba glauca *Planch.* in Hook. Lond. Journ. of Bot. VI (1817) 296 et Niger Fl. (1819) 220; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 117; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I, 215; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 67 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 739] et Reliq. Dewevr. (1901) 13; *De Wild.* Etud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II, (1907) 64, (1908) 310.

1896? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kimuenza (Hoebeker). — VI : Madibi (Sap.). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1895). — XV : la Loanje; Lusambo (Gent.).

***Caloncoba Schweinfurthii* Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 461.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3488).

Obs. — Les habitations suivantes ne sont pas, croyons-nous, dans le Congo : Nabambisso (Schw. 2964); le Juru (Schw. 2344).

***Caloncoba subtomentosa* Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 463.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3385).

***Caloncoba Welwitschii* [Oliv.] Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 462.

Oncoba — *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 117; *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 13, t. 3; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I, 217; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 4 [B. S. B. B. XXXVI, 50]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 28; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 38; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 5; Reliq. Dewevr. (1901) 14 et Pl. Gilletianae (1900) 3 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 3]; *De Wild.* Etud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 58, (1908) 315 et Miss. Laurent (1905) 158.

O. Laurentii *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 8.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Kwakwa** (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.); Shinganga (Dew. 309); Tshia. — Nom vern. : **Tshikwakwa** (Cabra) ; Bingila (Dup.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. et M. Laur.). — V : distr. du Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); Kisantu. — Nom vern. : **Kisania** (Gill.); env. de Dembo. — Nom vern. : **Kisani** (Gill.). — VI : Madibi (Lescr. 162). — VIII : Ikoko (Lescr. 168); Coquilhatville (Ém. Laur.); Eala (Pyn. 993). — IX : Mongo (Thonn.). — XI : Limbutu (M. Laur. 1901). — XIII a : La Romée (Ém. et M. Laur.).

LINDACKERIA Presl.

***Lindackeria cuneato-acuminata* [De Wild.] Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 465.

Oncoba dentata *Oliv.* var. — *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 246.

1903 (Ad. Odden). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Sanda (Odd. in Gill. 3013). — VI : Eïolo (Ém. et M. Laur.).

***Lindackeria dentata* [Oliv.] Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 465.

Oncoba — *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 119; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I, 217; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 5; Pl. Gilletianae, I (1900) 3 et Reliq. Dewevr. (1901) 13; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 39; *De Wild.* Etud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 58, (1908) 315 et Miss. Laurent (1905) 157.

1896 A. Dewèvre). — Bas Congo (Cabra). — II a : Shinganga (Dew. 337); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : rive N. du Kasai (Luja); Kisantu (Gill. 29). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (M. Laur. 72, 697, 1897, 1898, 1902); Bokakata (Dew. 785 a). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1896); env. de Yambuya (Solh.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.); Bandaka-Kole (Flam.).

Lindackeria Poggei [Guerke]. *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 466.

Oncoba — *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1893) 163; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 64 et Consp. fl. Afr. I², 216.

O. Demensei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* VII (1900) 2 [B. S. B. B. XXXIV², 51]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1903) 63; II (1907) 58 et Miss. Laurent (1905) 157, (1907) 411.

1881 (P. Pogge). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2526); env. de Lukolela (M. Laur. 510); Chenal (Ém. et M. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 1821). — IX : Bumba (Dem.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.); la Lulua (Pg. 571). — Ind. non cl. : Monothueri [Monshumi (?) VI] (Dew.).

Lindackeria Schweinfurthii *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 466.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Linduku (Schw. 3070).

BUCHNERODENDRON *Guerke*.

Buchnerodendron Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 411; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 467, in obs.

1903 (Ém. et M. Laurent). — XV : Ibaka; Munungu (Ém. et M. Laur.).

Buchnerodendron speciosum *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 161, t. 6; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 64 et Consp. fl. Afr. I², 214; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 29; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 112 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 57, (1908) 315; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 467.

1880 (Alex. von Mechow). — VI : bassin du Kwango (Mech. 526). — VIII : Ibaka (Ém. et M. Laur.). — IX : Bombati (Thonn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.); env. de Yambuya (Solh.). — XIII a : Romée (Kohl). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.; Sap.); lisière des bois du Kasai (Buch.); le Sankuru. — Nom vern. : **Difindo** (Sap.). — XVI : Katanga (Verd.).

PHYLLOCLINIUM *Baill.*

Phylloclinium paradoxum *Baill.* in B. S. Linn. Paris, II (1890) 870; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 64 et Consp. fl. Afr. I², 266; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 246, 294; II (1907) 59.

1891 (F. Demense). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VII : bassin de l'Ikata [Lukenie] (Dew. 1903; Ém. Laur.). — VIII : Ibaka (Ém. et M. Laur.). — XV : Luluabourg (V. Durant).

POLYGALACEAE

POLYGALA L.

Polygala acicularis *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 132 et in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 32; *Chodat* Monog. Polygal. II, 368, t. 29, fig. 8 et 9; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 65 et Consp. fl. Afr. I^a, 229; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 9 et Reliq. Deweyr. (1901) 14; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 273; II (1908) 266 et Miss. Laurent (1905) 126.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem. 91); Kisautu (Gill.); Kimuenza (Dew.); Dolo (Schlt.); Kinkosi (Vanderyst). — VI : env. de Bandundu (Em. et M. Laur.); route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — VII : la Fini (Em. et M. Laur.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser. 305). — XV : le Kasai (Em. et M. Laur.).

Polygala arenaria *Willd.* Sp. pl. III (1803) 880; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 128; *Chodat* Monog. Polygal. II, 337; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 66 et Consp. fl. Afr. I^a, 230; *Hieru* Cat. Welw. Pl. I, 43; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 5; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 78 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162; II (1908) 266.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.; Vanderyst). — XII c : Gombari (Ser. 262). — XVI : Lukafu (Verd.).

Polygala Cabrae *Chodat* in B. Herb. Boiss. VI (1898) 838; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 10 et Ill. fl. Cgo (1899) 87, t. 46.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra).

Polygala congoensis *Guerke* in *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exp. (1900) 295 [nom. tant.]

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12809).

Polygala Gomesiana *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 126 et in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 14, t. 4; *Chodat* Monog. Polygal. 336; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 66 et Consp. fl. Afr. I^a, 235; *Hieru* Cat. Welw. Pl. I, 43; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1904) 69 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 740]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162 (1906) 273; II (1907) 40.

1891 (G. Descamps). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.). — XV : Lambi (Desc.). — XVI : Lukafu — Nom. vern. : *Mafumbo* (Verd.); bords du Tanganika (Hecq.).

Polygala persicariaefolia *DC.* Prodr. I (1824) 326; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 129; *Hieru* Cat. Welw. Pl. I, 43; *Chodat* Monog. Polygal. II (1893) 331; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 243; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 51.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

Polygala sparsiflora *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 127; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 246; *Chodat* Mono. Polygal. II (1893) 491; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 47.

P. ukerensis *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XIV (1891) 310 et in *Engl. Pl. Ost.-Afr.* 234.

Le type est assez largement répandu dans l'Afrique trop., le Congo excepté.

— form. **robustior** *Chodat* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 14.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : entre Ikori et Kisanga-Sanga (Dew. 1675).

Polygala Verdickii *Guerke* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 205.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 556).

SECURIDACA L.

Securidaca longepedunculata *Fresen.* Mus. Senckenb. II (1837) 275; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 134; *Engl. Pl. Ost Afr.* 235; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 47; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 258; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 78 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 40.

1899 (Edg. Verdick). — V : rég. de Kisantu-Makela Van Houtte; env. de Lemfu (But.). — VI : Tumba-Mani (Cabra et Michel). — XVI : plateau des env. de Lukafu (Verd.).

— — var. **parvifolia** *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 134; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 47; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 68 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 740]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 78.

1899 (Edg. Verdick). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1525). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 116).

CARPOLOBIA G. Don.

Carpolobia alba *G. Don* Gen. Syst. Bot. I (1831) 370; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 135; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 48; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 259; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161, 273; II (1907) 40, (1908) 265.

1891 (F. Demeuse). — VI : vallée de la Djuma (Gill. et Gent.) — VII : env. de Zoka [Bolombo] (Brun.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Basankusu (Brun.) — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.).

Obs. — M. F. Demeuse a récolté cette espèce à Gunchu (?); il s'agit peut-être de Gaudshu [Congo français].

CARYOPHYLLACEAE

CERASTIUM L.

Cerastium africanum [*Hook. f.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 141; *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 375 et in Hochgeb. trop. Afr. (1892) 242.

Arenaria — *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 184.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

DRYMARIA Willd.

Drymaria cordata [*L.*] *Willd.* ex *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. V (1819) 406; *DC.* Prodr. I, 395; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 143; *De Willd.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 4 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 4].

Holosteum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 88; *Lam.* Pl. bot. Encycl. I, t. 51.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

POLYCARPON Loefl.

Polycarpon depressum [*L.*] *Rohrb.* in *Mart.* Fl. Brasil XIV² (1872) 257, t. 9; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exp. (1900) 289.

Pharnaceum — *L.* Mant. pl. alt. (1771) 562.

Polycarpon pusillum *Roxb.* ex *Wight* et *Arn.* Prodr. fl. Ind. or. (1834) 358; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 50 [Polycarpa].

Polycarpaea Loefflingii *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. I (1862) 153; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 144; *Th. Dur.* et *Schinz* Etud. fl. Cgo (1896) 66.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : îles du Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XV : bagnes de sable du Sankuru (V. Duraut); îlots du Sankuru en aval de Butala (Ém. et M. Laur.).

Polycarpon prostratum [*Forsk.*] *Pax* in *Engl.* et *Prantl* Natürl. Pflanzenfam. III, 1b (1889) 87.

Alsine — *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 207; *Delile* Fl. d'Égypte, 240, t. 14, fig. 2.

Arenaria — *Seringe* in *DC.* Prodr. I (1824) 400.

Polycarpaea prostrata *Decne* in *Annal. sci. nat.* Sér. 2, III (1835) 263; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 147.

1885 (R. Buettner). — VI : Kingunshi (Buett.).

POLYCARPAEA Lam.

Polycarpaea corymbosa [*L.*] *Lam.* Illust. genr. Encycl. II (1793) 129; *DC.* Prodr. I, 145; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 712; *Oliv.*

Fl. trop. Afr. I, 145; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 67; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 9, II (1900) 5; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 35.

Achyranthes corymbosa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 205.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dew.). — I : Moanda (Vanderyst). — IV : Goma (Hens). — V : Kisantu (Gill.); rég. de Lumene (Hendr.). — XV : Bombaie (Luja).

P. corymbosa var. **eriantha** [*Hochst.*] *Pax* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 65 [B. S. B. B. XXXVII, 10]; [*De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 14.

P. eriantha *Hochst.* ex A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 303.

1899 (Jul. Chargeois). — XVI : Pweto (Charg.).

— — var. **genuina** *Pax* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 589; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 67.

1888 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 557, 576).

Polycarphaea glabrifolia *DC.* Prodr. III (1828) 374 et Mém. Paronych. t. 5; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 146; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 235.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Eielo [Kasai] (Ém. et M. Laur.).

PORTULACACEAE

PORTULACA L.

***Portulaca grandiflora** *Hook.* in Bot. Mag. (1829) t. 2885; *Cambess.* in A. *St-Hil.* Fl. Bras. mér. II, 192; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 234.

1904 (Ém. Laurent). — IX a : en aval de Mobeka (Ém. Laur.).

» Probablement introduit ».

Portulaca oleracea L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 445; *Sibth.* et *Sm.* Fl. Graeca, t. 457; *DC.* Pl. grass. t. 123 et Prodr. III, 353; *Schinzl.* Iconogr. fam. nat. t. 206; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 149; *Dyer* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 246; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 67; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 52; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 4 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 4]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 234.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Ibaka (Ém. et M. Laur.).

OBS. — Très répandu et sans doute échappé des cultures (Ém. Laur.).

Portulaca quadrifida L. Mant. pl. I (1767) 73; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 149; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 9 et Pl. Thonneriana, 16; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 176; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 52; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 244.

1896 (A. Dewèvre). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimpoko (M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — IX a : Gongo : Mongo (Thonn.), env. de Mobeka (Dew.). — XII a : Amadis (Ser.). — XVI : le Katanga (Verd.).

TALINUM Adans.

Talinum crassifolium [Jacq.] Willd. Sp. pl. II (1800) 862; *Haw.* Syn. pl. succul. 123; *DC.* Prodr. III, 357; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 150; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 68.

Portulaca — *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) t. 52.

1891 (F. Demense). — Congo (Dem.).

Talinum cuneifolium Willd. Sp. pl. II (1800) 864; *DC.* Prodr. III, 357; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 150; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 54; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 68; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonneriana (1900) 15; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 234 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 244.

1888 (Fr. Heus). — V : Léopoldville (Ém. et M. Laur.). — VII : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Bangala (Hens); Upoto (Ém. Laur.); Liboko (Thonn.). — IX a : en aval de Mobeka (Ém. et M. Laur.).

Talinum patens [Jacq.] Willd. Sp. pl. II (1800) 863; *DC.* Prodr. III, 357; *Rohrb.* in *Mart.* Fl. Bras. XIV² (1872) 295, t. 67; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 4 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 4]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 244.

Portulaca — *Jacq.* Hort. Vindob. II (1785) t. 151.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — Cultivé à Gombari [XII c] (Ser. 479).

HYPERICACEAE

HYPERICUM L.

Hypericum lanceolatum Lam. Encycl. méth. bot. IV (1797) 45; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 156; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 274; *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 376.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

- Hypericum Quartinianum** A. Rich. Tent. fl. Abyss. I (1847) 97, t. 21; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 156; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 91. 1900 (Edg. Verdieck). — XVI : haut plateau du Katanga (Verd.).

VISMIA Vell.

- Vismia affinis** *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 161; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 65 [B. S. B. B. XXXVII, 110]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 311.

1895 (P. Dupuis). — I : Moanda (Gill.). — II a : Bingila (Dup.).

- Vismia Laurentii** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 311.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 2012).

- Vismia rubescens** *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 160; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 312.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — I : Moanda (Gill. 4062). — V : Léopoldville (Ém. et M. Laur.).

PSOROSPERMUM Spach.

- Psorospermum febrifugum** *Spach* in *Annal. sci. nat. Sér. 2, V* (1836) 163; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 271; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 158; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 688; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 57; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 65 [B. S. B. B. XXXVII, 110]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 10; II (1900) 5 et Reliq. Dewevr. (1901) 15; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 91, Miss. Laurent (1906) 245 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 55, (1908) 312.

P. ferrugineum *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 241.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : env. de Zobe (Dew.). — V : env. de Lukolela (Pyn. 337); route des cataractes vers le Stanley-Pool; Sabuka (Ém. et M. Laur.); env. de Léopoldville (Luja; Pyn.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — XVI : Lukafu (Verd.); Pala (Deb.).

- — form. **latifolium** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 91.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Moibanganga** (Verd. 39).

- Psorospermum tenuifolium** *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* VIII (1848) t. 771 et in *Hook. Niger Fl.* (1849) 242; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 159; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 15; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 245 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 55, (1908) 312.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn. 296, 364, 376, 517, 956, 1022, 1245, 1335, 1660). — IX : Bangala (Dew. 862g); Nouvelle-Auvers (Pyn. 5).

HARONGA Thou.

Haronga paniculata [Pers.] Lodd. ex Steud. Nomencl. bot. ed. 2, I (1841) 722; *Engl.* Pl. Ost-Afr. 274; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 65 [B. S. B. B. XXXVII, 110], *Confr.* fl. Cgo, I (1899) 10, Pl. Gillettianae, I (1900) 14 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 15; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 91, *Miss. Laurent* (1906) 245 et *Étud.* fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 55; II (1908) 312.

Harongana — Pers. Syn. pl. II (1807) 91; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 58.

Haronga madagascariensis *Choisy* Prodr. monog. Hyper. (1821) 34; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 160.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.) — II a : la Lemba. — Nom vern. : **Sasa** (Cabra); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — IV : Nord Manyanga (Cabra et Michel). — V : Kisantu (Gill.); Sanda — Nom vern. : **Tumu** (Odd.). — VI : Luanu (Lescr.); Madibi (Sap.). — VII : rég. du Lac Léopold II. — Nom vern. : **Monioni** (Body). — VIII : Coquilhatville; Equateurville [Wangata] (Dem.); Ikenge (Malchair); Eala et env. (M. Laur.; Pyn.). — Noms vern. : **Boloni**; **Bontone**. — XI : Isangi; Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Kanda-Kanda (Lescr.). — Noms vern. : **Bangwa** [Abaremba]; **Andjolia** [Mangbettu]; **Bukiret** [Asande]; **Muntoni** [Bangala] (Dew.).

GUTTIFERACEAE

SYMPHONIA L. f.

Symphonia globulifera L. f. Suppl. pl. (1781) 302; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 163; *Vesque* in *DC.* Monog. Phan. VIII, 227; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 110]; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Confr.* fl. Cgo, II (1900) 6 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 15; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I 1903, 62; II (1907) 56 et *Miss. Laurent* (1906) 245; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 59; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1906) 20-27.

1889 (F. Demeuse). — Haut-Congo Ib. a. 127. — IV : route des caravanes (Ém. Laur.). — V : Sanda. — Nom vern. : **Nsongia** (Gill.). — VII : Iboka (Gent.); Kutu (Ém. Laur.). — VIII : Eala. — Noms vern. : **Bolaka**; **Boloko** (Pyn.). — IX : Bangala (Ém. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.); Lokandu. — Nom vern. : **Kilungu** (Dem.). — XIII a : les Stanley-Falls (Ém. Laur.). — XV : Bombaie (Luja); AC. dans les forêts du Kasai et du Sankuru (Ém. Laur.); Luja. — Nom vern. : **Bokunge** (Équateur).

— — var. **africana** *Vesque* in *DC.* Monog. Phan. VIII (1893) 230; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 62.

1901 (J. Gillet). — V : Kiunenza (Gill.).

— — **gabonensis** [*Pierre* et *Vesque* in *DC.* l. c. VIII (1893) 291; *De Wild.* l. c. II (1908) 314.

S. gabonensis *Pierre* ex *Vesque*, l. c. VIII (1893) 230, in syn.

1904 (A. J. Odon). — I : Moanda. — Nom vern. : **Ki-Nsangia** (Gill. 4008). — V : rég. de Sanda (Odd.). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Bolongo** (Sap.). — VIII : Eala (Pyn. 1038).

PENTADESMA Sabine

Pentadesma butyracea *Sabine* in Trans. Hort. Soc. V (1824) 457; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 164; *Vesque* in DC. Monog. Phan. VIII, 247; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 59; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 57, (1908) 314.

1891 (F. Demeuse). — V : Sanda (Odd.). — XV : Pania-Mutombo (Lescr. 418) : Plantations Lacourt [Kasai]. — Nom vern. : **Kalonga-Longa** (Brisac); Muuungu (Sap.). — Ind. non cl. : le Lomami (Dem. 115). — Nom vern. : **Bonzo** [Baugala] (Sap.).

ALLANBLACKIA Oliv.

Allanblackia floribunda *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. X (1869) 43 et Fl. trop. Afr. I, 163; *Hook.* Icon. pl. XI, t. 1004; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 69; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 16; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 246 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 64; II (1907) 55, (1908) 312.

1891 (F. Demeuse) — Bas-Congo (Cabra). — VI : vallée de la Djuma (Gill.); Luanu (Gill et Gent.). — VII : Ganda (Ém. Laur.). — VIII : Basankusu; Coquilhatville (Dem.); Eala (M. Laur.; Pyn.). — XI : Limbuntu; Barumbu (M. Laur.); Isaugi (Ém. Laur.); env. de Lokandu (Dew.). — XVI : le Katanga (Verd.). — Ind. non cl. : Ikoto (Lescr.).

GARCINIA L.

Garcinia Giadidi *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 55.

1903 (A. Van Houtte). — V : env. de Sanda. — Nom vern. : **Giadidi** (Van Houtte in Gill. 3761).

Garcinia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 61; II (1907) 56.

1901 (J. Gillet). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Gadi** (Gill. 2208); Lemfu (But.); Sanda (Odd.; Van Houtte in Gill. 3756, 3761).

Garcinia longeacuminata *Engl.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 56 et in Engl. Jahrb. XL (1908) 569.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Bas-Congo orient. à Vuugu (Ém. Laur.). — VIII : Eala (Pyn.). — XV : le Sankuru (Lescr.).

Garcinia lualabensis *Engl.* in Engl. Jahrb. XL (1908) 558.

1906 (S. Ledermann). — XV : le Sankuru (Lederm. 28).

Garcinia Mannii *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 167; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 5.

1899 (Éd. Luja). — XV : Bena-Dibele [Kasai] (Luja).

Garcinia ovalifolia *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 166; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 6 et Reliq. Dewevr. (1904) 16.

1891 (F. Demeuse). — VIII : Bokakata (Dem. 797). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.).

Garcinia Pierreana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 212.

1900 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mufishu** (Verd. 533).

Garcinia punctata *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 167; *Vesque* in *DC.* Monog. Phan. VIII, 380; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 60; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 6 et Reliq. Dewevr. (1901) 16; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 44.

G. polyantha *Th. Dur.* et *Schinz* (non *Oliv.*) Étud. fl. Cgo (1896) 69; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 44.

1893 (Ém. Laurent). — Congo (Dew.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

Garcinia Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 312.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Pyn. 491, 935, 1484, 1765). — XI : env. de Mogandjo (M. Laur. 2611).

Garcinia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 313.

1907 (F. Seret). — XII c : env. de Nala (Ser. 764).

Obs. — *Vesque* [in *DC.* Monog. Phan. VIII, 339] indique vaguement, sur la foi de Kirk, le *G. Livingstonei* T. Anders. au Congo.

OCHROCARPUS Thou.

Ochrocarpus africanus *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 169; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 68 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I 740] et Reliq. Dewevr. (1901) 289.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 255). — V : Kimuenza (Gill. 1754).

DIPTEROCARPACEAE

VATICA L.

Vatica africana [A. *DC.*] *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 15; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 173 et Sert. Angol. 15, t. 5.

Monotes—A. *DC.* in *DC.* Prodr. XVI² (1868) 623; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 61.

Le type n'a pas été trouvé au Congo.

V. africana var. **hypoleuca** [Welw.] Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 193; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 92.

Vatica — Welw. Sert. Angol. (1869) 17, t. 5, fig. 12.

M. africana A. DC. var. — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 62.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 442).

Vatica katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 92.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Noms veru. : Kasolo; Musanga-Saya (Verd. 486, 548).

LOPHIRA Banks.

Lophira alata Banks in *Gaertn.* De fruct. et semin. III (1805-1807) 52, t. 188, fig. 2; *DC.* Prodr. XVI², 638; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I, 109, t. 4; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 174; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 88; *Gilg* in Bot. Jahrb. XXXIII (1902) 274.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

MALVACEAE

SIDA L.

Sida acuta *Burm. f.* Fl. Indica (1768) 147; *K. Schum.* in *Engl.* Pf. Ost-Afr. 266; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 63; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 165, 287 et *Miss. Laurent* (1905) 153.

S. carpinifolia L. f. Suppl. pl. I (1781) 307; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 180; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 5 [B. S. B. XXXVI³, 51]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 17.

S. stipulata Cav. Monadelph. cl. diss. I (1785) 22, t. 3, fig. 10; *Hook f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 231.

S. rugosa *Thonn.* in *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 311.

S. Vogelii *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 231.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — VI : Dima (Ém. Laur.). — XVI : Tea (Dew.).

Sida cordifolia L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 684; *Cav.* Monadelph. cl. diss. I, t. 3; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 181; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil. XII³, 330, t. 62; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 69; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 11 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 17; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 165, (1906) 287; II (1907) 47 et *Miss. Laurent* (1906) 153.

S. africana P. Beauv. Fl. d'Oware, II (1807) 87, t. 110.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — Brouse du Bas Congo (Em. Laur.). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — II : Boma (Schimp.). — III : Tounda (Buett.). — V : Stanley-Pool (Hens); Kinshassa (Dew.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.); Kiduma; Sonzo (Vanderyst). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel). — IX : Bumba; env. de Yaminga (Pyn.); Nouvelle-Anvers (M. Laur.). — XIII a : Romée (M. Laur.).

Sida humilis Cav. Monadelph. class. diss. V (1785-90) 277, t. 134; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 179 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 322; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 70; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 301.

S. veronicifolia Lam. var. — *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil. XII⁵ (1891) 320. *S. unilocularis* L'Hérit. Stirp. nov. 1784-85) t. 56.

1816 (Chr. Smith). — Congo (Burt.). — Bas-Congo (Sm.). — XVI : Toa (Desc.). — XII d : entre Vaukerkhovenville et Arebi (Ser. 721).

Sida linifolia Cav. Monadelph. class. diss. I (1785) 44, t. 2, fig. I; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 179; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil. XII⁵, 292, t. 57; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 70; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 165 et Miss. Laurent (1907) 388.

S. linearifolia Schumacher et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 303.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — V : Sanda (De Brouw.). — VIII : Gombe [Irebu] (M. Laur.). — XVI : Lutembue (Desc.). — Ind. uon cl. : Bulebu (Em. et M. Laur.).

Sida paniculata L. Amoen. acad., V (1760) 401; *DC.* Prodr. I, 465; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil, XII⁵, 294 t. 57; *E.-G. Bak.* in Journ. of Bot., XXX (1892) 294; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 301.

1902 (A. Delpierre). — XII c : Nala (Delp.); entre Gombari et Dungu (Ser. 745).

Obs. — C'est probablement le *S. Schweinfurthii* E.-G. Bak. [l. c. 265].

Sida rhombifolia L. Sp. pl. ed. I (1753) 684; Cav. Monadelph. class. diss. I, t. 3; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil. XII⁵, 337, t. 63 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 260; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 181; *Hierm* Cat. Welw. Pl. I, 64; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 17; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 143-45.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 48, 1908) 301.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Léopoldville (Schlt.); env. de Bokala (M. Laur.); env. de Kwamouth (Bieler). — VII : Kiri (Em. et M. Laur.). — VIII : Eala (Em. et M. Laur.). — IX : Boyenga [Ikelembu] (M. Laur.); Nouvelle-Anvers (Em. et M. Laur.). — XV : env. de Kabinga (Dew.). — Noms vern. : **Kafuta** [Kasongo]; **Kavenru** [Tanganika] (Dew.).

Sida spinosa L. Sp. pl. ed. I (1753) 683; Cav. Monadelph. class. diss. I, t. 1; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 180 et in *Hook. f.* Fl. Brit.

Ind. I. 323; *K. Schum.* in *Engl. Pl. Ost.-Afr.* 265; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 74; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 63; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 165 et *Miss. Laurent* (1906) 257.

S. scabra *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 305.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Schlt.). — XVI : Katangu (Desc.).

Sida urens *L.* Syst. nat. ed. 10 1758-59) 1145; *Cav.* Monadelph. class. diss. I, t. 2; Nov. Comm. Soc. Gott. III, t. 5; *DC.* Prodr. I, 465; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 179; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 71; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 4 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 4].

1816 (Chr. Smith). — Congo (Burt.). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XVI : Toa (Desc.).

Obs. — *K. Schumana* [in *Schlechter* West-Afr. Kautch. Exped. (1900) 299] a indiqué, d'après *Schlechter*, n^o 12562, un *Sida rotundifolia* *L.* à Léopoldville. — C'est probablement *S. cordifolia* *L.* qu'il faut lire.

WISSADULA Medic.

Wissadula hernandioides [*L'Hérit.*] *Guerke* in *Zeitschr. f. Naturw.* LXIII (1890) 122; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 11.

Sida — *L'Hérit.* Stirp. nov. (1784-85) 121 t. 58.

1891 (Hyas. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst).

Wissadula rostrata [*Schumach.* et *Thonn.*] *Planch.* in *Hook.* Niger Fl. (1839) 229; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 182 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 325; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 71; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 65; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 17; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 48 et *Miss. Laurent* (1905) 153.

Sida — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 306.

Abutilon laxiflorum *Gull.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 66.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); Yumbi (Em. Laur.). — VI : Madibi (Sap.). — IX : Lisala; Ukatoraka (Em. et M. Laur.). — XII c : env. d'Amudi (Ser.). — XV : le Kasai (Lescr.). — Ind. non cl. : Kibaka (Buett.); Yindu (Vanderyst).

ABUTILON Gaertn.

Abutilon angulatum [*Guill.* et *Perr.*] *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 183; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 72.

Bastardia angulata *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 65.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Abutilon Cabrae *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 8 [B. S. B. B. XXXVIII², 16] et *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 7; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 152 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 48, (1908) 300.

1897 (Alph. Cabra) — Bas-Congo (Cabra). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bala-Lundzi (Pyn. 239); Ikenge (Ém. et M. Laur.); Bobaugi (Ém. et M. Laur.); Fala et env. (Pyn. 932; M. Laur. 1208). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XII d : Duugu (Ser. 616). — XVI : Pala (Deb.); Albertville [Toa] (Decc.).

Abutilon Eetveldeanum *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 9 [B. S. B. B. XXXVIII², 17]; Ill. fl. Cgo (1900) 121 t. 61; *Reliq. Dewevr.* (1901) 18; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 301.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — XI : Barumbu (M. Laur. 1853).

Abutilon indicum [L.] *Sweet* Hort. Brit. ed. 1 (1827) 54; *G. Don* Gen. Syst. Bot. 1 (1831) 504; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 186; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51].

Sida — *L. Amoen. acad.* — IV (1760) 323; *DC. Prodr. I*, 471.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

Abutilon zanzibaricum *Boj. ex Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 186; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 72.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.).

MALACHRA L.

Malachra capitata *L.* Syst. nat. ed. 12 (1767) 458; *Cav.* Monadelph. class. diss. I, t. 33; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 580; *DC. Prodr. I*, 440; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 188 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 329.

M. hispida *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 47.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Malachra radiata *L.* Syst. nat. ed. 12 (1767) 458; *Cav.* Monadelph. class. diss. I, t. 33; *Lam.* Pl. bot. Encycl. III, t. 580; *DC. Prodr. I*, 440; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 188; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 73; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1905) 165.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

URENA L.

Urena lobata *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 692; *Dillen* Hort. Eltham. t. 319; *Cav.* Monadelph. class. diss. t. 185; *DC. Prodr. I*, 441; *Bot. Mag.*

(1831) t. 3043; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 189 et in *Hook.* / Fl. Brit. Ind. I, 329; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 73; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 42.

Urena americana L. Pl. Surinam. (1775) 11; *R. Br.* in *Tuckey* Narrat. Exped. riv. Zaïre, Append. V (1818) 484.

U. diversifolia *Schumacher* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 308.

U. obtusata et *virgata* *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 48.

1894 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.).

Obs. — Ces localités appartiennent sans doute à la variété suivante.

U. lobata var. **reticulata** *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 370; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 67; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 87 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 48, (1908) 301.

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Hens). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — II : Boma (Dup.); brousse et cultures : villages dans la partie occ. (Ém. Laur.). — II a : Biugila (Dup.). — V : Stanley-Pool (Buett.); Bokala (M. Laur.); Kwamouth (Flamigny, 90). — VI : Madibi (Sap.); entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra-Michel). — VII : Lac Léopold II (Body). — VIII : env. d'Eala. — Noms vern. : **Titchi**; **Ikola** (M. Laur.). — XII d : Dungu (Delp.). — XIII d : Nyangwe (Pg.). — XV : Mokole [Lubi] (Lescr.); Bas-Sankuru (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Caguibisa** (Verd.); Albertville [Toa] (Desc.). — Ind. non cl. : Luango (Cabra-Michel). — Noms vern. : **Bakuta** (Bangala); **Keongo** (Kwilu).

PAVONIA L.

Pavonia kilimandscharica *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XIX, Beibl. n. 47 (1894) 40 in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 384 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 260.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

KOSTELETZKYA Presl.

Kosteletzkya Buettneri *Guerke* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXXI (1890, 92; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 74.

1881 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett. 72).

Kosteletzkya Grantii [*Mast.*] *Garcke* in *Linnaea*, XXXVIII (1874) 697 et XLIII (1880-82) 53; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 49, (1908) 302.

Hibiscus — *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 203 et in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 36 t. 12.

1895 (G. Descamps). — XII : Ue'e (Delp.); Bozo (Ser. 279). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser. 213). — XVI : Toa (Desc.). — Nom vern. : **Cingusapo** [Amadij].

HIBISCUS L.

Hibiscus Abelmoschus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 696; *Car.* Monadelph. class. diss. t. 62; *Pescourtiz* Fl. des Antilles, V t. 361; *DC.* Prodr. I, 452; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 207 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 342; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 74; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 75; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 151; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 7; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 53, (1906) 288; II (1907) 48, (1908) 301 et *Miss Laurent* (1905) 151.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.: Ém. Laur.). — II a : le Mayombe (Cabra); Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.); Lula-Lumene (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Hendr.); route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel); Madibi (Sap.). — XII d : cult. à Dongu (Ser. 611). — XV : Bukila (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Bokaie**; **Bolinda** (Bangala); **Momlimi**; **Intsimi**; **Ndzimi** (Kwilu).

Hibiscus calyphyllus *Car.* Monadelph. class. diss. V (1788) 283 t. 140; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 72; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 99.

fl. calycinus *Willd.* Sp. pl. III (1801) 817; *DC.* Prodr. I, 448; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 202; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 74.
 H. calycosus A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 62 t. 14.
 ? H. owariensis P. *Beauv.* Fl d'Oware, II (1807) 88 t. 117.
 H. triumfettifolius *Schumach.* et *Thom.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 312.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

Hibiscus cannabinus L. Syst. nat. ed. 10 (1758-59) 1149; *Car.* Monadelph. class. diss. t. 52; *Roerb.* Corom. Pl. t. 190; *DC.* Prodr. I, 450; *Reichb.* Iconogr. bot. t. 164; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 204 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 339; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 74; *Guerke* in *Engl.* Pil. Ost-Afr. 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 72; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 114; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 11; II (1900) 71 et *Reliq.* Dewevr. (1901) 48; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 166, 288; II (1907) 48, (1908) 302 et *Miss. Laurent* (1905) 154.

H. congener *Schumach.* et *Thom.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 204.

H. verrucosus *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 87.

H. radiatus *Car.* Monadelph. class. diss. (1786-90) t. 54; *Bot. Mag.* (1817) t. 1911; *Benth.* Fl. Austral. I. 216.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Gill.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Piko (Ém. Duch.). — Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : env. de Coquilhatville (Ém. Laur.). — XII : Uele (Delp.). — XII c : Gombari (Ser.). — XVI : Toa (Desc.). — Noms vern. : **Angbeni** [Amadi]; **Dombu** [Asande et Abaremba]; **Pussa** [Maugbettu]; **Takalaka** [Kwilu]; **Bokaie** [Bangala].

Hibiscus crassinervis *Hochst.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 61; *Walp.* Annal. bot. II, 117; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 205; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 75; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 81.

H. crasinervis *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 205.

1892 (Jul. Cornet) — XVI : Katanga (Corn.).

Hibiscus Debeerstii *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 13 et X (1901) 6 [B. S. B. B. XXXVIII², 21 et XL, 12]; *Contr.* fl. Cgo, II (1900) 7 et III, fl. Cgo (1901) 135 t. 78; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 91.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.); env. d'Albertville [Toa] (Hecq.).

Hibiscus diversifolius *Jacq.* Icon. pl. rarior. III (1786-93) t. 551; *JC.* Prodr. I, 449; *Bot. Reg.* (1819) t. 381; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 449 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 339; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 75; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 119.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sta.). — III : Tondoa (Buett.). — V : Bolobo (Buett. 69). — XVI : Pala (Deb.).

Hibiscus Eetveldeanus *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 6 et X (1901) 5 [B. S. B. B. XXXVIII², 24 et XL, 11]; *Pl. Gillefianae*, I (1900) 5 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 5] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 19; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 154.

H. surattensis *L.* var. *furcatus* *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 112.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 697, 716, 868). — VIII : env. d'Équateurville [Wangata]. — Nom vern. : **Bonkaie** (Dew. 741 a). — IX : env. de Mombanga. — Nom vern. : **Bokai-Limpata** (Dew. 757). — X : Bobangi (Ëm. et M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 920 a). — Noms vern. : **Nea** [Manyanga]; **Casera** [Kasongo]; **Ikobulé** [Ikwangula]; **Bonkaie-itendo** [Équateur] (Dew.).

Hibiscus esculentus *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 676; *Tussac* Fl. des Antill. I t. 10; *Descourtilz* Fl. des Antill. IV, t. 269; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 207; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 75; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 75; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 150; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gillefianae*, II (1900) 5 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 19; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 48, (1908) 302.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett.); Kisantu (Gill. 967); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Sap.). — XVI : Congo supér. (Dew.). — Ind. uon cl. : **Pececondo** [Pasolonde (t) II a] — Noms vern. : **Ochio** (Dew.); **Kinkumi** [Kwilu]; **Molenda** [Bangala].

Hibiscus ferrugineus *Cav.* Monadelph. class. diss. III (1787) 162 t. 60, fig. 1; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, I (1900) 81.

H. gossypinus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. II (1800) 118; *DC.* Prodr. I, 453; *Hurv. et Smid.* Fl. Capens. I, 175; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 205; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo, I (1896) 76.

H. fuscus *Gauche* in Bot. Zeit. (1849) 854.

1891 G. Descamps. — XIV : volcan Kirauga (Goetz. et Prittw.). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Hibiscus Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 166.

1901 (J. Gillet). — V : Kimueza (Gill. 2057).

Hibiscus Guerkeanus *Hochreut.* in *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 3 [B. S. B. B. XL, 9].

1891 (G. Descamps). — XVI : Lutembue (Desc.).

Hibiscus lanceibracteatus *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 17 [B. S. B. B. XXXVIII², 25]; Ill. fl. Cgo (1901) 147 t. 84 et Reliq. Dewevr. (1901) 20; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 124 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 6 [B. S. B. B. XL, 12].

1895 (A. Dewèvre). — IX : env. de Mabanga [cult. dans les villages] (Dew.). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

Hibiscus Liebrechtsianus *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 14 [B. S. B. B. XXXVIII², 22]; Ill. fl. Cgo (1901) 141 t. 81 et Reliq. Dewevr. (1901) 21; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 79 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 6 [B. S. B. B. XL, 12].

1892 (Jul. Cornet). — IX : env. de Bumba (Dew. 900). — XVI : plaine de Musima [Lualaba supér.] (Corn.).

Hibiscus Masuianus *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 12 [B. S. B. B. XXXVIII², 20] et Reliq. Dewevr. (1901) 21; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 124.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma. Nom veru. : *Sete* (Dew.).

Hibiscus micranthus *L. f.* Suppl. pl. (1781) 308 et 310; *Cav.* Monadelph. class. diss. t. 66; *DC.* Prodr. I, 453; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 205 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 335; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 76; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 82.

H. clandestinus *Cav.* Icon. et descr. pl. I (1791) 2.

H. hastatus *Cav.* Monadelph. class. diss. III (1787) 143 t. 50 fig. 1.

H. versicolor *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 311.

1891 (G. Descamps). — XVI : vallée du Bulechi (Desc.); Musumba [Lualaba supér.] (Briart).

Hibiscus panduriformis *Burm.* Fl. Ind. (1768) 151 t. 47, fig. 2; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 203; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 72; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI^r, 52]; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 95; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1904) 241 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1906) 288.

1895 (Gust. Debeerst — XVI : Pala (Deb.)) : le Katanga. — Nom vern. : **Kiboga** (Verd. 95) ; Lukafu (Verd.).

Hibiscus physaloides *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 52; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 199; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo. 76; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 161; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo. I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI^r, 52]; Contr. fl. Cgo. II (1900) 7 et Reliq. Deweyr. (1901) 22; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 69; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 87; Miss. Laurent 1905) 151 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. II (1907) 48. (1908) 302.

1893 (Ém. Laurent). — Bas Congo (Ém. Laur.). — II a : la Lemba (Dew.) ; le Mayombe (Cabra) ; Bingila (Dup.). — VII : Kiri (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.) ; Coquillatville (Ém. Laur.) ; Bokakata ; Wanguta (Buyghe et Ledoux). — Nom vern. : **Bokaie-Itende** (Dew.). — XI : Yambuya (M. Laur.). — XV : Lac Foa (Leser). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lukosa** (Verd.).

Hibiscus rhodanthus *Guerke* ex *Schinz* in B. Herb. Boiss. III (1895) 405; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 91.

1891 (G. Descamps). — XVI : Lovoi (Desc. 71).

Hibiscus rostellatus *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 55; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 201; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo. 76; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 71; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 5; Contr. fl. Cgo. I (1899) 11 et Reliq. Deweyr. (1901) 22; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 151 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. II (1907) 49.

fl. surattensis *L.* var. — *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 113.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : la Lemba (Dew.). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Makaie** (M. Laur.). — IX : Ukatoraka (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XIII a : Tshopo ; env. de Stanleyville (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Bobangi [Boangi, VIII] (Ém. Laur.).

Hibiscus Sabdariffa *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 695; *DC.* Prodr. I, 453; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 204; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo. II (1900) 7; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, I (1900) 116.

H. digitatus *Car.* Moudelph. class. diss. III (1787) 151 t. 70 fig. 2; *Ker* in Bot. Reg. VIII t. 608.

1896 (Ém. Laurent). — VIII : env. de Coquilhatville (Ém. Laur.).

Hibiscus submonospermus *Hochreut.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 2 [B. S. B. B. XL, 8].

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Hibiscus surattensis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 696; *Bot. Mag.* (1813) t. 1356; *DC. Prodr.* I, 449; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I t. 197; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 201 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 334; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 267; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 77; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 71; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 7; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 5 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 22; *Hochreut.* in *Ann. Conserv. bot. Genève*, IV (1900) 110; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 288, II (1908) 302 et *Miss. Laurent* (1905) 154.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.); Zenze (Ém. Laur.). — II a : C. dans le Mayombe; Kibinga (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel); Madibi (Sap.). — VII : Lac Léopold II (Body) — IX : Yaminga (Ém. Laur.). — XV : Lubue (Luja : env. de Lie (Ém. et M. Laur.)). — Noms vern. : **Ekenienti** [Lac Léopold II]; **N'danana**, **Ndanan** [Kwilu].

Hibiscus tiliaceus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 694; *DC. Prodr.* I, 454; *Bot. Reg.* 34. 232; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 207; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 160; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 160, II (1908) 302; *Hochreut.* in *Ann. Conserv. bot. Genève*, IV (1900) 63.

1903 (J. Gillet). — I : env. de Moanda (Gill. 3984). — II : Boma (Gill. 3151).

Hibiscus vitifolius *L.* Sp. pl. ed. 1 (1733) 696; *Cav.* Monadelph. class. diss. t. 58; *DC. Prodr.* I, 450; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 197 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 338; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 267; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 77; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 68; *Hochreut.* in *Ann. Conserv. bot. Genève*, IV (1900) 168; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 88; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 22.

H. strigosus *Schumach. et Thonn.* (non *Lindl.*) *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 314.

1816 (Chr. Smith). — Congo. — Nom vern. : **Modi-Katala** (Dew. 148). — Bas-Congo (Sm.). — XVI : Lukafu (Verd. 135).

Hibiscus Welwitschii *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 75; *Hochreut.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 6 in obs. [B. S. B. B. XL, 12]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 88.

H. Cornetii *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 10; X (1901) 6 [B. S. B. B. XXXVIII, 12 et XL, 12]; III. fl. Cgo (1901) 129 t. LXXV.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba supér. (Corn.); vallée du Bulechi (Desc.); env. de Lukafu et du lac Moero (Verd. 13, 114).

THESPESIA Cav.

Thespesia Debeerstii *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 6.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Thespesia populnea [*L.*] *Soland.* ex *Correa* in Ann. Mus. Paris, IX (1807) 290; *DC.* Prodr. I, 456; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 209; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I, t. 8; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 49.

Hibiscus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 976; *Cav.* Monadelph. cl. diss. t. 56.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala [cult. ?] (M. Laur. 816).

GOSSYPIUM L. (1)

Gossypium arboreum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 693; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 391.

G. arborecens *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 693; *DC.* Prodr. I, 456; *Royle* Ill. Bot. Himal. t. 23; *Reichb.* Fl. exot. t. 150; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 211; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896 77; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 11.

1885 (R. Buettner). — IV : distr. des Cataractes (Em. Laur.). — IX : Suata (Buett. 80, 81). — XV : le Lualaba (Em. Laur.).

Gossypium barbadense *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 693; *Bot. Reg.* I (1816) t. 84; *DC.* Prodr. I, 456; *Reichb.* Fl. exot. III (1835) t. 450; *Wight* Illustr. Ind. Bot. t. 28 A et B; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 210 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 347; *Benth.* et *Trim.* Medic. Pl. I t. 37; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 77; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 268; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 42, 25; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 8 et Reliq. Dewevr. (1901) 28; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 391.

G. punctatum *Schumacher.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 210.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Briart). — II : Boma. — Nom vern. : **Mukoko** (Dew.). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba (Cabra). — V : le Stanley-Pool (Hens; Kisantu (Gill.); Bolobo (Dew.); Kinshassa (Em. Laur.). — VI : Madibi (Leser.). — VIII : Eala (Em. et M. Laur.). — IX : Ukatoraka (Em. et M. Laur.). — XII : l'Uele (Delpierre). — XII a : Suraugo (Ser.). — XVI : cult. sur les bords du Lualaba (Em. Laur.).

Gossypium hirsutum *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) 975; *DC.* Prodr. I, 456; *Cav.* Monadelph. cl. diss. VI t. 467; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 392.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

(1) conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 344-395.

ADANSONIA L.

Adansonia digitata L. Sp. pl. ed. I (1753) 1190; Bot. Mag. (1828) t. 2791 et 2792; DC. Prodr. I, 478; *Reichb.* Fl. exot. t. 350 et 350a; Belg. Hort. IX (1859) 75 t. 6-8; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 212 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 318; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 157-163, (1904) 298-302, (1905) 561-563; A. *Chevalier* in B. S. B. Fr., LIII (1906) 493.

Cette espèce a été indiquée dans II a : Bingila (Dup.). — II : Boma (Naum.; Ém. Laur.). — III : Vivi (Ledien). — V : Kimueza (Gill.), mais ces indications se rapportent peut-être à l'*A. sulcata* Chevalier. Pourtant il est bon d'ajouter que M. A. Chevalier a créé un *A. digitata* var. *congolensis* [B. S. B. Fr. LII (1906) 493] qu'il indique à Sau Thome et, avec doute, dans le Bas-Congo.

Adansonia sulcata A. *Chevalier* in B. S. B. Fr. LIII (1906) 494 t. VII fig. 5, 6; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 395 t. CXXXIX et fig. 64.

A. digitata Auct. pr. p.

1901 (Alb. Declercq). — V : env. de Kinshassa et de Dolo (Chev.).

(Obs. — *Pachira* sp. — Cult. à Bumba (Ém. Laur.). — [Conf. *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 42].

BOMBAX L.

Bombax aquaticum [Aubl.] *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 6 (1890) 62 fig. 30b; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr (1901) 23; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 155, (1897) 397.

Pachira — *Aubl.* Hist. pl. Guian. (1775) 725 t. 291-02; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Bras. XII, 233 t. XLVI fig. 11; *De Wild.* Etud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. II (1908) 301.

1895 (A. Dewèvre). — V : Sabuka (Ém. Laur.). — VIII : Équateur (Dew.).

Cette espèce est cultivée à Umangi [IX] (Ém. Laur.) et à Eala [VIII] (M. Laur. 1990).

Bombax Kimuenzae *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 68 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 710].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1618).

Bombax lukayense *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II, (1901) 69 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 741] et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 49.

1900 (J.-B. Hanquet). — V : bords de la Lukaya (Hanq. in Gill. 1748); bords de la Djili (Odd.).

CEIBA Gaertn.

Ceiba pentandrum [L.] *Gaertn.* De fruct. et semin. II (1791) 244 t. 133; *K. Schum.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 269.

Bombax pentandrum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 511.
Eriodendron aufractuosum DC. Prodr. I (1824) 479; *Wight* Icon. pl. Ind. or.
 II t. 400; Bot. Mag. (1864) t. 3360; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 212 et
 in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 349; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896)
 78; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 12.

B. guineense *Schumacher*. et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 302.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Kibinga (Dup.). — V : Kisantu
 (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.). — C. dans tout le bassin central du Congo
 (Ém. Laur.).

STERCULIACEAE

STERCULIA L.

Sterculia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 214.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Katanga (Verd. 383).

Sterculia pedunculata *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900)
 10 [B. S. B. XXXVIII², 180] et Reliq. Deweyr. (1901) 23.

1896 (A. Dewèvre). — Ind. non cl.; Mont Marioe [rég. de Lubunda] (Dew.
 1060). — Noms veru. : **Moko, Mapalo-Mopala** [Tanganika] (Dew.).

Sterculia quinqueloba [*Garcke*] *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892)
 135; in *Engl. Pil.* Ost-Afr. 271 et in Monog. Afr. Pil.-Fam. V
 [Stercul.] (1903) 104 t. 9, fig. D., a-c; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud.
 fl. Cgo (1896) 79; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 88 et Étud. fl. Bas-
 et Moy.-Cgo, II (1907) 52.

Cola — *Garcke* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 130; *Mast.* in *Oliv.* Fl.
 trop. Afr. I, 224.

1882 (P. Pogge). — V : entre Kisantu et le Kwango (Bat.). — XIII d. : riv.
 Lufubu [près Nyangwe] et près d'un village Kalebue (Pg. 596, 652). — XVI : env.
 de Pueti (Desc.); poste de Kilwa [Mulenga] (Verd.).

Sterculia Tragacantha *Lindl.* in Bot. Reg. XVI (1830) t. 1353; *Mast.*
 in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 216; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo
 (1896) 79; *K. Schum.* in Engl. Monog. Afr. Pil.-Fam. V [Stercul.]
 (1900) 102 t. 9, E, a-c.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II
 (1907) 52, (1908) 303.

S. pubescens *G. Don* ex *Loud.* Hort. Brit. (1830) 392 et Gen. Syst. Bot. I
 (1831) 615; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 81.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Kisantu (Gill. 3379) —
 XII c : env. de Nala (Ser. 767). — XV : entre le Lomami et le Lubilasch [près d'un
 village Kalebue] (Pg. 1001).

COLA Schott et Endl.

Cola acuminata [*P. Beauv.*] *Schott* et *Endl.* Meletem. (1832) 33;
Mast. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 220; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl.

Cgo (1896) 79; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr. B.* 252 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. V* [Stercul.] (1900) 125 fig 3; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 8 et Reliq. Dewevr. (1901) 24; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 43; Miss. Laurent (1905) 155 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1901) 167, 289; II (1907) 52, (1908) 304.

Sterculia acuminata P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 41 t. 24; Bot. Mag. (1868) t. 5699.

Edwardia lurida Rafin. Specch. d. Science. II n. 11 (1814) 158; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 84. [Cf. *Hachel*, Sur les Kolas afric. in Ann. Inst. colon. Marseille].

1893 (Ém. Laurent). — V : Sadi (Cabra-Michel, 30); Kisantu (Gill.). — VII : Ibali; Kiri (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew. 598; Pyn. 344); Bamania (Ém. Laur.). — XII c : env. de Nala (Ser. 750). — Nous vern : **Nangwec** [Mangbetu]; **Ligo** [Magogo]; **Soro** [Asande].

C. acuminata var. **Ballayi** [*Cornu*] *K. Schum.* in *Engl. l. e. V* [Stercul.] (1900) 127 et Pl. Laurentianae (1903) 43.

C. Ballayi *Cornu* ex *Heckel* in Mém. Inst. bot.-geol. Marseille, I (1893) t. 2 fig. 8-9 et 17-24; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 80; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 12.

C. acuminata *Griffon du Bellay* ex *Baill.* in *Adausonia*, X (1872) 169.

C. acuminata P. Beauv. var. *B Mast.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I (1868) 221.

Sterculia verticillata *Schumacher*, et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 240.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Zenze (Ém. Laur.). — XV : env. de Luebo (Martin). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.).

Obs. — Des officiers disent que ce *Cola* existerait dans l'Aruwimi (Ém. Laur.).

Cola Bruneelii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 305.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — Baringa-Yala (Bruneel). — XV : Ibaka? (Ém. et M. Laur.).

Cola caricifolia [*G. Don*] *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. V* [Stercul.] (1900) 111 t. XI, B, a-c.; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 70 [B. Herb. Boiss. Sér. 2. I, 742]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 156.

Sterculia — *G. Don* Gen. Syst. Bot. I (1831) 517.

Cola Afzelii *Mast.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I (1868) 224; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 79.

Edwardia — *O. Kuntze* Rev. Gener. I (1891) 79; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 84

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : entre Kisantu et Dembo (Gill. 1579). — VII : Kutu (Ém. Laur.).

Cola congolana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 11 [B. S. B. B. XXXVIII², 181 et Reliq. Dewevr. (1901) 24.

1896 (A. Dewèvre). — Ind. non cl. : entre Maïende et Kibala (Dew. 1061).

Cola cordifolia [Cav.] R. Br. in *Bennett* Pl. Jav. rarior. (1838) 237; K. Schum. in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* V [Stercul.] (1900) 133; fig. 4 et 6 t. 16, A; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 214 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 52, (1908) 304.

Sterculia — Car. Monad. cl. diss. V (1799) 286 t. 144; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I, 79 t. 15; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 217.

1870 (G. Schwenfurth). — XII c : Surango (Ser. 396). — XII d : Linduku (Schw. 3096). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutabu** (Verd.). — Nom vern. : **Boro** [Abarambo] (Schw.).

Cola Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 14 [B. S. B. B. XXXVIII². 184] et Reliq. Dewevr. (1901) 24; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 406 in obs. t. 127.

1895 (A. Dewèvre) — II a : la Lemba (Dew. 365).

Cola digitata *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 124; K. Schum. in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* V [Stercul.] (1900) 123 t. 15, D. a-b.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 52, t. 26 et 27 (1908) 304.

1900 (Marc. Laurent). — IX : Yambinga (M. Laur. 948). — XI : env. de Yambuya (Solh.).

Cola diversifolia *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 13 [B. S. B. B. XXXVIII², 183] et Reliq. Dewevr. (1901) 25; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 59; II (1907) 53, (1908) 304 et Miss. Laurent (1907) 408.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Kisantu et Kimueuza; entre Kisantu et Dembo (Gill. 1519); Kimueuza (Gill. 2132); Lukolela (Dew. 819 a); Yumbi (Pyn. 310). — VI : Madjibi (Sap.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Ikaie** (Dew.) : env. d'Eala. — Nom vern. : **Tera-Elungu** (Em. et M. Laur. 207, 742, 1130; Pyn. 523, 852, 874, 1056, 1339, 1431, 1495, 1557, 1654; Flamigny 55). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1847). — Noms vern. : **Ikaie** [Bangala]; **Nkwakuku** [Kwilu]; **Lulouga**. — Nom vern. : **lota** (Dew.).

Cola Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 58; II (1908) 304.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2792). — XV : le Sankuru (Sap.). — Noms veru. : **Skaie** [Bangala]; **Buse** [Sankuru].

Cola griseiflora *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 408 t. 126 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 304.

1906 (Marc. Laurent). — VI : Dinia (Sap.). — XI : Mogaudjo (M. Laur. 1845). — Bomaneh (M. Laur. 1002). — Noms vern. : **Mokekeri** [Bangala]; **Lusole** [Buluba].

Cola heterophylla *Schott* et *Endl.* Meletem. (1832) 33; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I. 233; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111] et Contr. fl. Cgo, I (1899) 12; K. Schum. in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* V [Stercul.] (1900) 118.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Zeuze (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Camp). — XV : Mokole (Leser.).

Cola Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 403 fig. 68, t. 135 et 136.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Sabuka (M. Laur. 528). — XV : Dibele : Koudue (Ém. et M. Laur.).

— — form. **integrifolia** *De Wild.* l. c. (1907) 405 t. 137 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 304.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XI : Yambuya (M. Laur. 1852).

— — form. **intermedia** *De Wild.* l. c. (1907) 405.

1903 (Ém. et M. Laurent). — IX : Yaminga (M. Laur. 1070). — XV : Koudue (Ém. et M. Laur.).

Cola longifolia *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 404.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1039).

Cola monponensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 304.

1906 (Alb. Bruneel). — VIII : Moupono (Bruneel 57).

Cola nalaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 307.

1907 (F. Seret). — XII c : Nala (Ser. 703).

Cola pachycarpa *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 137 t. 5, 6 et in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 122.

1874 (F. Naumann). — Bas-Congo (Naum.).

Cola Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 307.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 571).

Cola Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 308.

1907 (F. Seret). — XII c : env. de Nala (Ser. 166).

Cola subverticillata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 53 t. 31 et 32.

1905 (R. Butaye). — Ind. non cl. : Lindende (But. in Gill. 3594).

Cola urceolata *K. Schum.* in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 114.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munsu (Schw. 3451).

Cola variantifolia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 306.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Zenze! (Ém. Laur.). — VII : Lac Léopold II — Nom vern. : **Lokeke** [Bady]. — VIII : Boyenge [Ikelemba (M. Laur. 1848) : Eala (Pyn. 976, 1081, 1157, 1174, 1422)].

Cola yambuyaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 309.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Yambuya (M. Laur. 1849).

PTERYGOTA Endl.

Pterygota macrocarpa *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 135 et fig. 1 [pag. 101].

† (Coll. f.). — Congo [Herb. Brux. fide K. Schum.].

DOMBEYA Cav.

Dombeya Goetzenii *K. Schum.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 384, 387 et in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 24.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Makollé (Verd. 20).

Dombeya katangensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1907) 7 [B. S. B. B. XL, 13].

1894 (G. H. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga, 2500 m. (Goetz. et Prittw.).

Dombeya Kindtiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1904) 8 [B. S. B. B. XL, 14].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 342).

Dombeya myriantha *K. Schum.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 302 et in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 34.

1881 (Max Buchner). — XV : pays des Bashilange. — Nom vern. : Mundatu (Buchn. 527).

Dombeya niangaraensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 49 t. 11.

1906 (F. Seret). — XII a : entre Niangara et Gombari (Ser. 358).

Dombeya Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 50 t. 10.

1905 (F. Seret). — XII c : env. de Surango (Ser. 358).

MELOCHIA L.

Melochia corchorifolia *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 675; *Cav.* Monadelph. class. diss. t. 174; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. 1, 236; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 81; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 90; *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 42; *De Wild.* et

Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 8; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1906) 133 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 52, (1908) 303.

Riedleya corchorifolia DC. Prodr. I (1824) 491.

1885 (R. Buettner). — IV : Lutete (Ilens). — V : env. de Léopoldville (Ëm. Duch.); Suata (Buett.); Kwamouth (Flamigny); Sabuka (M. Laur.); env. de Kisantu (Gill.). — VIII : euv. d'Eala (M. Laur.). — XV : Lusambo (Ëm. Laur.).

Meloechia melissifolia Benth. in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 129; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 236; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 271; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo. II (1900) 8 et Reliq. Dewevr. (1901) 26; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 397 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 52, (1908) 301.

1891 (F. Demeuse). — Bas Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba (Dew.). — IV : Kitobola (Ëm et M. Laur.). — V : Stanley-Pool (Dew.); Léopoldville (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — XII c : entre Bambili et Amadi (Ser.). — XII d : entre Faradje et Vaukerkhovenille (Ser.). — XVI : Masange (Deb.).

— — var. **bracteosa** *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 43.

M. bracteosa *F. Hoffm.* Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 13.

1876 (P. Pogge). — XV : le Lulua (Pg. 12).

— — var. **mollis** *K. Schum.* l. c. (1900) 43.

1882 (P. Pogge). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 582).

WALTHERIA L.

Waltheria americana L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 673; *DC.* Prodr. I, 492; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 235; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 80; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 80; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 91; *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 45; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 27; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 167; II (1907) 47, (1908) 303 et Miss. Laurent (1907) 397.

W. indica L. l. c. ed. 1 (1753) 673; *DC.* l. c. I, 493; *Mast.* in *Hook.* f. Fl. Brit. Ind. I 347.

W. guineensis *Schumach.* et *Thonn.* l. c. (1827) 295.

W. arborescens *Cav.* Monadelph. class. diss. VI (1790) 316 t. 170; *Lam.* Pl. bot. Encycl. III t. 570.

W. africana *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 296.

1885 (R. Buettner). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.). — V : Dolo (M. Laur.); Stanley-Pool (Ilens, 88); Suata (Buett.); euv. de Kwamouth (But.); Kisantu (Gill.); Mayidis (Vanderyst).

HUA Pierre.

Hua Gabonii *Pierre* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 288 t. 65.

1903 (Ad. Oddou). — V : env. de Sauda (Odd. in Gill. 3551).

SCAPHOPETALUM Mast. (1)

Scaphopetalum Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IX (1901) 5 [B. S. B. B. XXXIX², 97] et Reliq. Dewevr. (1901) 26; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 167.

S. Thonneri *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 13 pr. p. t. VII, et Pl. Thonnerianae, 26 pr. p. t. XIX.

1896 (A. Dewevre). — XV : Kondue (Luja). — Ind. non cl. : Matchatcha (Dew. 1090).

Scaphopetalum Thonneri *De Wild.* et *Th. Dur.* in Bull. Herb. Boiss. V (M. Jun. 1897) 521 [non Ill. fl. Cgo t. VII, nec Pl. Thonner. t. 19] et Mat. fl. Cgo, IX (1900) 4 [B. S. B. B. XXXIX², 96] et *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 400-02 t. 141 et 142 fig. 66, 67.

S. monophysca *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl.* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV [m. Oct. 1897] 247 nomen; et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. V.* [Stercul.] (1900) 93 t. VII fig. A, a-i.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi près Gali (Thonn. 48). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XV : Ibaka, Kapinga (Ém. et M. Laur.).

LEPTONYCHIA Turcz.

Leptonychia chrysocarpa *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl.* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 241 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. V* [Stercul.] (1900) 97 t. 8, D. a-b.

1870 (G. Schweinfurth). — XII : Linduku (Schw. 3069).

Leptonychia multiflora *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl.* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 241; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 12 et Reliq. Dewevr. (1901) 26; *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. V* [Stercul.] (1900) 95 t. VIII. C.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 51, (1908) 303.

(1) Ici vient le *Theobroma Cacao* L. cultivé à Eala (M. Laur.) et sur plusieurs autres points du Congo [Conf. *De Wild.* et *Gentil.* in *Le Congo* (1904) n. 19-21 et *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 397; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil., XII³, 72 t. 16].

1892 (F. Demeuse). — V : Kisantu (Gill.); Lukolela (Dew.; Pyn.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Lulonga (Ém. Laur.); Bozoto [Eala] (M. Laur.); Eala (Pyn.); Yala [Maringa] (Bruneel); Injolo (M. Laur.). — IX : entre Nouvelle-Anvers et Mobeka (Pyn.). — IX a : la Mongalla (Dew.). — X : Ubangi (Ém. Laur.). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Ém. Laur.). — Ind. non cl. **Bama-Lecoula** (Dew.).

BUETTNERIA L.

Buettneria africana Mast. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 239; *Th. Dur.* et *Schin.* Étud. fl. Cgo (1896) 81; *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 90.

1816 (Chr. Smith.). — Bas-Congo (Sm.).

SCYTOPETALACEAE

SCYTOPETALUM Engl.

Scytopetalum Duchesnei Engl. in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 101.

1893 (Jos. Duchesne). — Bas-Congo (Duch.).

ERYTHROPYXIS Engl.

Erythropyxis Eetveldeana [*De Wild.* et *Th. Dur.*] Engl. in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 103.

Rhaptopetalum — *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 2 [B. S. B. B. XXXVIII⁴, 121]; *Reliq. Dewevr.* (1901) 43 et *Pl. Gilletianae*, I (1900) 8 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 8]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 243 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 42, (1908) 309.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 338); C. sur les bords de l'Inkisi. — Nom vern. : **Binsonculon** (Dew. 469). — VI : vallée de la Djuma (Gent.: Gill. 2821); Eielo (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. de Bokakata (Dew. 808); env. de Bamanian (M. Laur. 1834). — XI : Limbutu (M. Laur. 975). — XV : en aval de Butala (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Buchinda** [Boeka]; **Salu-salu** [Lulonga].

Obs. — Cette espèce a été indiquée par erreur à Bena-Kamba (Dew.).

OUBANGUIA Pierre

Oubanguia laurifolia [*Pierre*] *Pierre* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 150.

Egasse — *Pierre* in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 31 t. XVII.

1893 (Jos. Duchesne). — XV : Lusambo (Duch.).

Obs. — M. De Wildeman conserve des doutes sur cette détermination.

Oubanguia Laurentii [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.].

Egasse — *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 310.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 1120, 1174, 2032; Pyn 540, 562, 1782); Ikua (Lamb. in M. Laur. 921).

Oubanguia Pierreana [*De Wild.*] *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 150.

Egassea — *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 32 t. 18 : II (1908) 310.

1896 (A. Dewèvre). — VII : Fini (Èm. et M. Laur.). — VIII : env. de Wangala (Dew. 666) : Eala et env. (Pyn. 601, 1169. M. Laur. 2033) : Bula-Lundzi (Pyn. 323).

TILIACEAE

CHRISTIANIA DC.

Christiania africana DC. Prodr. I (1824) 516; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 241; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 81; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 26.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); à un jour de marche de Bolobo; Lukolela (Èm. Laur.); entre Tumba et Kimpese (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — IX : Bumba (Pyn.).

GREWIA L.

Grewia africana [*Hook. f.*] *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 253; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 81;

Omphacarpus — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 237.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Grewia batangensis C. H. Wright in Kew Bull. (1896) 158; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 5 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 5].

1900 (J. Gillet). — V : Kisautu (Gill. 825).

Grewia barombiensis K. Schum. in Engl. Jahrb. XV (1893) 124; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 298.

1906 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Grewia carpinifolia Juss. in Ann. Mus. Paris, IV (1804) 91 t. 51 fig. 1; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 251; K. Schum. in Engl. Pl. Ost-Afr. B, 210; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 95; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 164.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.).

Grewia coriacea *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 252; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 298.

1905 (Marc. Laurent). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Injolo (M. Laur. 1850, 1857, 2050; Huyghe et Ledoux, 37) : env. d'Eala (M. Laur. 1192). — Noms vern. : **Bofumbo** (Bangala); **Binganganan** (Kwilu).

Grewia floribunda Mast. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 262; *Hiern* Cal. Welw. Pl. I, 97; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111].

1887 (Fr. Hens). — III : Matadi (Hens).

— — var. **latifolia** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, I (1904) 164; II (1907) 46, (1908) 298 et Miss. Laurent (1905) 152.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 3199, 4041). — II : Boma (Pyn. 17). — III : Matadi (Eun. Laur.).

Grewia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 399 t. CXXV.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.).

Grewia malacocarpoides *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 298.

1905 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 590). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1861).

Grewia mollis *Juss.* in Ann. Mus. Paris, IV (1804) 91; *DC.* Prodr. I, 510; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 218; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 364; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 27.

1896 (A. Dewèvre). — Ind. non cl. : env. de Kabanga (Dew. 983) — Noms vern. : **Mochochia** (Kasongo); **Mochia** (Tanganika).

Grewia occidentalis *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 964; *Bot. Mag.* t. 422; *Lodd.* Bot. Cab. t. 1526; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 246; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Grewia pinnatifida *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 255; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 27; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 399 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 299.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Yambuya (Solh. 61). — XII c : env. de Nala (Ser. 801). — XIII a : Romée (M. Laur. 1059).

Grewia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 299.

1906 (F. Seret). — XII c : env. de Gombari (Ser. 814).

Grewia tetragastris *R. Br.* ex *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 252; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66.

1896 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Grewia venusta *Fresen.* Mus. Senckenb. II (1837) 159 l. 10; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 249; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1889) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

G. venusta var. **angustifolia** *K. Schum. ex De Wild. et Th. Dur.*
l. c. II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111].

1895 (Gust. Debeers). — XVI : Albertville [Toa] (Deb.).

GREWIELLA O. Kuntze

Grewiella Dewevrei [*De Wild. et Th. Dur.*] *Th. et Hél. Dur.*

Grewiopsis — *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 7 [B. S. B. B., XXXVIII^a, 177] et Reliq. Dewevr. (1901) 28; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 56; II (1907) 46, (1908) 300 et Miss. Laurent (1905) 152.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Léopoldville et Mombazi; Kisantu. — Nom vern. : **M'wanda-M'wanda** (Van Houtte); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1866); (Pyn. 643); Botomon [Ikelemba] (M. Laur. 1658); Lulonga (Ém. et M. Laur.). — IX : Lie (Ém. et M. Laur.); Bumba. — Nom vern. : **Ukambulu** (Dew. 901); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Monbatza** [Kwilu].

— — var. **subintegrifolia** [*De Wild. et Th. Dur.*] *Th. et Hél. Dur.*

Grewiopsis Dewevrei De Wild. et Th. Dur. var. — *De Wild. et Th. Dur.* l. c. VI (1900) 8 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 178] et Reliq. Dewevr. (1901) 28.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata (Dew. 803).

Grewiella globosa [*De Wild. et Th. Dur.*] *Th. et Hél. Dur.*

Grewiopsis — *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 8 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 178]; Contr. fl. Cgo, II (1900) 9 et Reliq. Dewevr. (1901) 28; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 58; II (1907) 46, (1908) 300.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : Madibi (Lescr. 105, 114). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Bofumbu** (Dew. 614). — XV : Bena-Dibele (Luja); le Sankuru (Sap.). — Nom vern. : **Bomonkolata** (Bangala).

TRIUMFETTA L.

Triumfetta Descampsii *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 3 [B. S. B. B. XXXIX^a, 95]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 81 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 164.

1891 (G. Descamps). — XVI : Haut-Marungu (Deb.); Lukafu (Verd. 344). — Ind. non cl. : Babondo [Lomami] (Desc.).

Triumfetta dubia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 54.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Triumfetta Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 55.

T. *setulosa* *De Wild. et Th. Dur.* [non *Mast.*] Pl. Gilletianae, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 6].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 531, 945).

Triumfetta heliocarpa *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 181;
Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 82.

1882 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua (Pg. 40).

Triumfetta Hensii *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 1
B. S. B. XXXIX², 93; III. fl. Cgo (1902) 189 t. 95; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 56.

1888 (Fr. Hens). — IV : Gombi-Lutete (Hens, A. 269). — V : Kimuenza (Gill. 2157).

Triumfetta intermedia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 56.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 531 b).

Triumfetta iomalla *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 134;
Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 82.

1882 (P. Pogge). — XV : Musumba [pays des Bashilange] (Pg. 21).

Triumfetta orthacantha *Welw. ex Mast.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I
(1868) 258; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 82.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Hens, A. 269).

Triumfetta pilosa *Roth* Nov. pl. sp. (1821) 223 : *Mast.* in *Oliv. Fl.*
trop. Afr. I, 257; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 265; *Hiern*
Cat. Welw. Pl. I, 98; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 87.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kilama** (Verd.).

Triumfetta rhomboidea *Jacq.* Enum. pl. Carib. (1760) 22 et Stirp.
Amer. hist. (1780) t. 134; *DC. Prodr.* I, 507; *Mast.* in *Oliv. Fl. trop.*
Afr. I, 257; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 82; *K. Schum.*
in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 265; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 98; *De Wild.*
et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 9 et Pl. Thonnerianae (1900) 25;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 47, (1908) 300.

T. velutina *Vahl* Symb. bot. III (1794) 62.

T. trilocularis *Guill. et Perr.* [non *Roxb.*] Fl. Seneg. tent. I (1831) 93.

1888 (Fr. Hens). — I : Banana (Dew.). — II : Boina (Wilw.). — II a : Chianzo;
Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Dew.); Bolobo (Hens); Lemfu (But.); Ki-
muingu; Kisunga (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (Em. Laur.). — IX :
Ukatoraka (Em. et M. Laur.); Upoto (Thonn.); Bangala (Dew.). — IX a : Boyangi
(Thonn.). — XV : Etolo (Em. et M. Laur.); le Sankuru (Sap.). — XVI : Albertville
[Toa] (Desc.; Heeg). — In l. non cl. : Mangauja (Dew.). — Noms vern. : **Ekalili**
[Mangbetu]; **Sibu** [Amadi]; **Zaira** [Abaremba; Asande]; **Mukonki** [Bangala]; **Mam-
bulinkanka** [Sankuru].

Triumfetta semitriloba *Jacq.* Enum. pl. Carib. (1760) 22 et Stirp.
Amer. hist. t. 133; *DC. Prodr.* I, 507; *Mast.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.*
I, 256; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 82; *K. Schum.*
in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 264; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 97; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 300.

T. cordifolia A. Rich. in *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 93 t. 18.
T. longiseta A. Rich. in *Guill. et Perr.* l. c., I (1831) 92.

1885 (R. Buettner). — II a : le Mayombe (Kest.). — V : Bolobo (Buett.): Boko (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Lac Léopold II. — Nom vern. : **Mokongi** (Body) — VIII : Équateur (Dew.); district de l'Équateur (Pyn.); IX : Bangala (Hens). — XII b : env. de Bumbili (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.); Lubue (Luja). — Ind. non cl. : Bulebu (Lescr.); Lusubi (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Lukonga** [Batetela et Bangala]; **Mokonki, Nikonki** [Bangala]; **Keongo, Kiungu** [Kwiln].

T. semitriloba var. **africana** K. Schum. in *Schlechter* West-Afr. Kautsch. Exped. (1900) 300.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt. 12611).

Triumfetta trachystoma K. Schum. in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 130; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 82.

1882 (P. Pogge). — XV : pays des Bashilange (Pg. 611).

Triumfetta Welwitschii Must. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 255; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 83; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 97; A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 98.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — XVI : savane du Katanga (Corn.).

CEPHALONEMA K. Schum.

Cephalonema polyandrum K. Schum. ex *Schlechter* West-Afr. Kautsch. Exped. (1900) 299; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 70 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 31; *De Wild.* Not. Pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 29; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 53, 164; II (1907) 45, (1908) 298 et *Miss. Laurent* (1905) 151.

1896 (A. Dewèvre). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu; Kimuenza. — Nom vern. : **Punga** (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : distr. du lac Léopold II. — Nom vern. : **Bekenge** (Gent.). — VIII : distr. de l'Équateur. — Noms vern. : **Belukonge; Bekonge; Lokonge** (Pyn.); Coquilhatville. — Nom vern. : **Djicota** (Dew.); Schlt. : Eala. — Nom vern. : **Lotiti** (M. Laur.); Lulonga (Ém. Laur.; Pyn. 764). — IX : Nouvelle-Anvers. — Nom vern. : **Makongi** (Duvivier).

SPARMANNIA L. f.

Sparmannia abyssinica Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. I (1847) 79 t. 20; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 261; K. Schum. ex *Engl.* in v. *Goetzen* Durch Afrika (1895) 384 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 262.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 35).

HONCKENYA Willd.

Honckenya ficifolia Willd. in *Usteri* Delect. opusc. bot. II (1793) 201 t. 4; *DC. Prodr.* I, 506; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 260; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 83; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 262; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 12; II (1900) 9; Pl. Gilletianae, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 6] et Reliq. Dewevr. (1901) 30; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 151 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 287; II (1907) 46, (1908) 297.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.): Congo, C (Ém. Laur.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Kouza (Dew.): distr. des Cataractes. — Nom vern. : **Panza-za-uenga** (Dew.): Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Heus) : Léopoldville (Camp); Kisantu (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — VI : Madibi; Dima (Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Dolo-Konge** (M. Laur.). — IX : Umangi (Krek.). — XII b : env. de Bambili [rive gauche] (Ser.). — XV : entre le Sankuru et le Luabala (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Lusubi (Leser.); le Lomami (Ém. Laur.); Golongo (Leser.). — Nom vern. : **N'Kongo** [Bangala].

CORCHORUS L. (1)

Corchorus acutangulus Lam. Encycl. méth. Bot. II (1786) 104; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III, t. 739; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 264; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 262; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 101; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 54; II (1907) 46.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.).

Corchorus capsularis L. Sp. pl. ed. I (1753) 529; *DC. Prodr.* I, 505; *Hook.* in Journ. of Bot. (1850) t. 3; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I, t. 311; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I 397; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 70 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 743].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

Corchorus lobatus *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 54 II (1907) 46.

1903 (J. Gillet). — V : entre Tumba et Kimpese (Gill.). — IX a : Mobeke (Pyn. 20).

Corchorus olitorius L. Sp. pl. ed. I (1753) 529; *Bot. Mag.* (1828) t. 2810; *DC. Prodr.* I, 504; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 262; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 83; *De Wild.* et *Th. Dur.*

(1) M. De Willeman a publié une étude détaillée sur les Corchorus [*Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 199-221].

Contr. fl. Cgo, II (1900) 9 et Reliq. Dewevr. (1901) 31; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 100.

1885 (R. Buettner). — V : env. de Lukolela (M. Laur.); Bolobo (Buett.); Kisantu (Gill.). — VII : Inongo (Ém. Laur.). — IX : Mukangani (Thonn.). — IX a : env. de Mobeka (Ém. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XVI : Albertville [Toa] (Hecq.). — Ind. non cl. : Boangi (Ém. Laur.).

C. olitorius form. **grandifolius** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 46.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : route d'Eala à Coquilbatville (M. Laur.).

Corchorus trilocularis *Burm.* Fl. Ind. (1768) 123 t. 37 fig. 2.

C. tridens *L.* Mant. pl. II (1771) 566; *DC.* Prodr. I, 505; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 264; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 83; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 6]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 297.

C. angustifolius *Schumacher.* et *Thonn.* Beskr. Gnin. Pl. (1827) 244.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett.); Kisantu (Gill.). — XIV : Uvira. — Nom vern. **Dendere** (Desc.).

CISTANTHERA K. Schum.

Cistanthera Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 4 [B. S. B. B. XXXVIII², 174]; Reliq. Dewevr. (1901) 30; Ill. fl. Cgo (1902) 173 t. 81; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 297.

1896 (A. Dewèvre). — IX : Monsembe (Dew. 1857); env. de Bumba (Pyn. 34).

Cistanthera kabingaensis *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1898) 234; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 5 in obs. et Reliq. Dewevr. (1901) 31; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 388.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : Stanley-Falls (Dew.). — XV : Dibele; Kabinga (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Monierecoula (Dew. 1155).

GLYPHAEA Hook. f.

Glyphaea grewioides *Hook. f.* in *Hook.* Icon. pl. VIII (1848) t. 760 et Niger Fl. (1849) 238 t. 22; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 267; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 262; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 84; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 102; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112] et Contr. fl. Cgo, I (1899) 12, 9; Pl. Gilletiana, I (1900) 9 et Reliq. Dewevr. (1901) 31; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 151 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 163, 287; II (1907) 45, (1908) 297.

G. Monteiroi *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1866) t. 5610.

1885 (Fr. Hens). — II a : Shimbete (Dew.). — IV : massif du Bangu (Dew.); nord Manyanga (Cabra-Michel); Gauda (Lescr.). — V : Lukolela (Ém. Laur.); Luvituku (Luja); Dembo (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VII : Nioki (Ém. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.); Coquilhatville (Dew.); Bamania (Ém. Laur.); Monzambi. — Nom vern. : **Itombo** [Bruneel]. — IX : Bangala (Hens); Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.); Suata (Buett.); Bolombo (Ém. Laur.); Mobeka (Pyn.); Upoto (Wilw.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII : village Zunee [Uele] (Ser.). — XIII a : Stanley-Falls (Dew.). — Ind. non cl. : Rewa (Dew.). — Noms vern. : **Intombo** [Coquilhatville]; **Adolim** [Amadi]; **Molobiola** [Asende]; **Pi** [Abarembo] (Dew.); **Lotombo** [Eala] (M. Laur.).

LINACEAE

HUGONIA L.

Hugonia obtusifolia C. H. Wright ex De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 38, (1908) 258.

1904 (L. Pynaert). — VIII : Bala-Lundzi (Pyn. 290, 386); Ikenge (Huyghe).

Hugonia platysepala Welw. ex Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 272; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112] et Reliq. Dewevr. (1901) 32; *Engl.* Pl. Ost Afr. 226; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 103; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 6]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158, 270; II (1907) 38, (1908) 258 et Miss. Laurent (1905) 124.

1895 (Ém. Laurent). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Kilonga** (Gill.); env. de Sanda (Odd.); Kitobola (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Baisandeko** (Dew.; Pyn. 272); env. d'Eala (M. Laur.; Ser. 768; Pyn. 1442); Irebu (M. Laur.); Bokakata (Dew.). — IX : Bumba (Pyn.); Umangi (Ém. Laur.). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1045). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Hugonia reticulata Engl. in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 107.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 654); Mukenge (Pg. 658).

— — form. **longifolia** Engl. l. c.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 659, 660).

Hugonia villosa Engl. ex Th. Dur. et De Wild. Pl. Gilletianae, II (1901) 70 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 742] et in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 105; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158.

1900 (J. Gillet). — V : le Stanley-Pool (Ém. Laur.); Kimuenza (Gill.).

PHYLLOCOSMUS Klotzsch.

Phyllocosmus congolensis [De Wild. et Th. Dur.] Th. et Hël. Dur.

Ochthocosmus — *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 9 [B. S. B. B. XXXVIII², 27] et Reliq. Dewevr. (1901) 32; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 124.

1895 (A. Dewèvre). — VIII : Équateur (Ém. et M. Laur.) : entre Équateurville et Léopoldville (Dew.).

Phyllocosmus Dewevrei Engl. in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 109; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 258.

Ochthocosmus africanus *De Wild. et Th. Dur.* [non *Hook. f.*] Pl. Gilletianae, II (1901) 71 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 743] et Reliq. Dewevr. (1901) 32; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158; II (1907) 38 et Miss. Laurent (1905) 124.

Phyllocosmus — *De Wild.* [non *Klotzsch*] Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 258.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza (Gill. 1767); env. de Lukolela (Gill.: Ém. et M. Laur. : Pyn. 249). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 812, 1137, 1183; Malchair in Pyn. 417b. 840, 926); Wangata [Équateurville] (Dew. 663; Pyn. 255).

Phyllocosmus Lemaireanus [De Wild. et Th. Dur.] Th. et Hël. Dur.

Ochthocosmus — *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) II [B. S. B. B. XL, 17].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 529).

Phyllocosmus senensis Klotzsch ex Engl. in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 110.

1870 (G. Schweinfurth). — XII : Bangua [pays des Mangbetu] (Schw. 3582). — XV : la Lulua, vers le 6° (Pg. 655, 656).

OBS. 1. — Le *Linum usitatissimum* L. est cultivé à Eala [VIII]. — Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 124.

OBS. 2. — L'*Erythroxylon Coca* Lam. se développe assez bien dans les jardins d'Eala [VIII] (Ém. Laur.) et de Kisantu [V] Gill.). [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52 et Miss. Laurent (1906) 237].

MALPIGHIACEAE

HETEROPTERIS Kunth.

Heteropteris africana A. Juss. in Arch. Mus. Paris, III (1843) 456 et Monog. Malpigh. (1843) 202; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 276; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 84; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 13 et Reliq. Dewevr. (1901) 33; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 270 et Miss. Laurent (1906) 238.

Banisteria Leona Cav. Monadelph. class. diss. IX (1790) 421 t. 247 (fruct. excl.); *Lam. Pl. bot. Encycl.* II t. 381.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — V : au N du Stanley-Pool; Lukolela et env. (Dew.; Èm. Laur.). — Ind. non cl. : Lone Island [Angola ?] (Buett.).

ACRIDOCARPUS Guill. et Perr.

Acridocarpus corymbosus *Hook. f.* in *Hook.* Icon. pl. VIII (1848) t. 774 et *Niger Fl.* (1849) 248 t. 24; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 247; *Th. Dur. et Schinz*; Étud. fl. Cgo (1896) 84.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Burton).

Acridocarpus katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 27.

1899 Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 136).

Acridocarpus Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 237.

1904 (Èm. et Marc. Laurent). — III : Matadi (Èm. et M. Laur.).

Acridocarpus rudis *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 2 [B. S. B. B. XXXVIII², 28] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 34.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 263). — V : bords de la Zili [env. de Sanda] (Odd. in Gill. 3677).

Acridocarpus Smeathmanni [*DC.*] *Guill. et Perr.* *Fl. Seneg.* tent. I (1831) 124 et in *Archiv. Mus. Paris*, III t. 15; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 278; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 85.

Heteropteris ? — *DC. Prodr.* I (1824) 592.

Acridocarpus guineensis *Juss. Monog. Malpigh.* (1843) 231.

A. longifolius *Hook. f.* in *Hook.* *Niger Fl.* (1849) 244.

1891 (Fr. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : forêts des bords du Stanley-Pool (Dew.).

FLABELLARIA Cav.

Flabellaria paniculata *Cav.* Monadelph. class. diss. (1790) 436 t. 264; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 282; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 232; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 104; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 10.

1896 (Eng. Wilwerth). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Upoto (Wilw.). — XIII a : Stanleyville (Pyn. 67).

GERANIACEAE

GERANIUM L.

Geranium aculeolatum *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 291; *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 384.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 39).

OXALIDACEAE

OXALIS L.

Oxalis Corneti A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII^a (1895) 98; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 85.

1892 (J. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Oxalis corniculata L. Sp. pl. ed. I (1753) 435; *Rehb.* Icon. fl. Germ. V t. 199; *Wright* Icon. pl. Ind. or. I, t. 18; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 296; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 225; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112; Contr. fl. Cgo, II (1900) 10 et Reliq. Dewevr. (1901) 33; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 109; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 138.

(1895) (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XVI : Masanze (Deb.); Toa (Desc.). — Ind. nou. cl. : Lubundo (Dew.).

Oxalis katangensis *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 12 [B. S. B. B. XL, 18],

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukatu (Verd. 346).

BIOPHYTUM DC.

Biophytum sensitivum [L.] DC. Prodr. I (1824) 690; *Edgew.* et *Hook. f.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 456; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, II (1907) 37.

Oxalis — L. Sp. pl. ed. I (1753) 434; *Jacq.* *Oxalis*, t. 78; Bot. Reg. XXXI (1845) t. 68; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I 297; *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 226; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 85; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 109; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 138.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.): Bas-Congo (Cabra). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Lutete (Hens); Luvituku (Luja); Lukungu (Hens). — V : le Stanley-Pool (Luja); Kisantu (Gill.). — XV : le Bas-Kasai; Kondue (Ém. Laur.). — XVI : Zilo (Briart).

BALSAMINACEAE

IMPATIENS L.

Impatiens bicolor *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. IV (1860) 138; Bot. Mag. (1863) t. 5366; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 23 et Reliq. Dewevr. (1901) 34; *Warb.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 252; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162; II (1907) 44, (1908) 297 et Miss. Laurent (1905) 147.

1896 (A. Dewèvre). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); env. de Basauksu. — Nom vern. : **Magnieri** (Dew.); Dikila-Yala (Bruneel). — IX a : Bobi (Thonn.). — XI : Watende (Gent.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII a : route de Buta à Bitna : entre Zobia et Buta (Ser.). — XV : Koudue (Ëm. et M. Laur.); Ibaka (Brisac).

— — var. **brevifolia** *Warb.* ex *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 384, 388 et in *Engl. Jahrb.* XXII (1895) 51.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga, 2500 m. (Goetz. et Prittw.).

Impatiens Briartii *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 15 [B. S. B. B. XXXVIII², 185].

1891 (Paul Briart). — XVI : Zilo (Briart).

Impatiens Declereqii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 384.

1901 (Alb. Declercq). — XV : grotte de la Rondue (Decl. in Gent. 23). — (retrouve en 1903 par Ëm. et Marc. Laurent).

Impatiens Eminii *Warb.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 254.

Le type a été trouvé dans l'Afrique orientale.

— — var. **lanceolata** *Warb.* ex *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1905) 384, 388 et in *Engl. Jahrb.* XXII (1895) 51.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 54).

Impatiens hians *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 7.

Le type n'est indiqué qu'à Fernando-Po et au Kamerun.

— — form. **glabra** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 383.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1136).

Impatiens Irvingii *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I (1868) 300; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 86; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 43; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52; II (1907) 44, (1908) 296.

1885 (R. Buettner). — II a : Bingila (Dup.). — IV : route des caravanes (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Schlt.); env. de Kisantu (Gill.); Dembo; Boko (Vanderyst, B. 259). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.); Madibi (Sap.). — IX a : Gali (Thonn.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XV : Loange (Gent.); Kondue (Lescr. 423); Lubefu (Lescr. 366). — XVI : Haut-Marungu (Deb.). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.).

Impatiens katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 82

1900 (Edg. Verdict). — XVI : le Katanga (Verd. 348).

Impatiens Kerckhoveana *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 385.

1906 (Guill. Vau Kerckhove). — XII d : village Bagba [Van Kerckhoveville] (Ser.).

Impatiens Kirkii *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 300; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 111; *Warb.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 252; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 6]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 83; Miss. Laurent (1907) 385 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 44, (1908) 297.

1899 (G. Descamps). — II a : entre Kabuluku et Shikongo (Lescr.). — V : env. de Léopoldville (Ém. et M. Laur.); Sabuka (M. Laur.); Kisantu (Gill.); Kinkosi (Vanderyst). — IX : env. de Nouvelle-Auvers (Ém. et M. Laur.). — XII c : Gombari (Delp.). — XV : Djoco-Punda (Lescr.). — XVI : Katanga (Verd.); Toa [Albertville] (Desc.).

Impatiens mayombensis *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 385 t. CXVII.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.).

Impatiens refracta *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 83.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : le Katanga. — Nom vern. : **Tumafumba** (Verd. 408).

Impatiens Sereti *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 386, t. CXVIII.

1906 (F. Seret). — XII d : village Bagba [Van Kerckhoveville] (Ser. 542).

— — form. **etentaculifera** *De Wild.* l. c. (1907) 387.

1906 (F. Seret). — XII d : village Bagba [Van Kerckhoveville] (Ser. 542).

Impatiens Thonneri *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 24, t. XI.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 24).

Impatiens Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 84.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : env. de Lukafu (Verd.).

RUTACEAE

FAGARA L.

Fagara Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 271 t. 62.

1903 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 3365).

Fagara Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 124.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VI : Eïolo (Ém. et M. Laur.).

Fagara macrophylla [*Oliv.*] *Engl. in Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 118.

Zanthoxylum? — *Oliv.* Fl. trop Afr. (1868) 304.

Le type n'a encore été trouvé qu'au Kamerun et dans la Haute-Guinée.

— — var. **Preussii** *Engl. ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 271.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Fagara pilosiuscula *Engl. in Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 112 et in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 150.

1882 (P. Pogge). — XV : Musumba vers 8° 1/2 (Pg. 513).

Fagara Poggei *Engl. in Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 118 et in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 146.

1882 (P. Pogge). — XV : pays des Bashilange (Pg. 670, 1234).

Fagara Welwitschii *Engl. in Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 118 et in *Engl. Jahrb.* XXIII (1897) 147; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112].

1892 (F. Demeuse). — V : Lukolela (Dem.). — XV : bords de la Lulua (Desc.).

TECLEA Delile.

Teclea Engleriana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 76.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lnkafu. — Nom vern. : Kimena (Verd. 365).

LIMONIA L.

Limonia Demeusei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 159 t. 41 et Miss. Laurent (1906) 238.

1891 (F. Demeuse). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.); Yaminga (Dem. 441). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanley-Falls (Dem. 399). — XV : en aval d'Ibaka (Ém. et M. Laur.).

Limonia Lacouriana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 159, t. 40 et *Miss. Laurent* (1906) 238.

1903 (L. Gentil). — V : rég. de Lumene (Hendr. in Gill. 3280). — XV : Bombaie (Gent. 9).

Limonia Poggei *Engl.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 190 et in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, I (1895) 29; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 86.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 668).

— — var. **latialata** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 160; II (1907) 38 et *Miss. Laurent* (1906) 238, t. 43.

1900 (L. Gentil). — X : Ubangi; Imese (Ém. Laur.); Inkongo (Gent.). — XV : rives du Sankuru (Brisac).

Limonia Schweinfurthii *Engl.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 190.

1870 (G. Schweinfurth). — XII f : env. d'Uando (Schw.).

Obs. — Cette habitation est peut-être en dehors des limites du Congo belge.

CLAUSENA Burm.

Clausena anisata *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 256; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 228; *Oliv.* Fl. trop. Afr., I, 308; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904). 159, 272; II (1907) 196, t. 42, 43, (1908) 258.

1902 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.). — V : Mombasi [Casier-St-Jean] (Gill.). — VI : embouch. du Kwango (Gill. 2668).

Clausena Bergeyckiana *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 743].

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1527).

CITRUS L.

***Citrus Aurantium** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 783; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 229; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 118; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161.

1900 (J. Gillet). — V : cultivé à Kisantu (Gill.).

***Citrus medica** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 782; *Risso* in *Ann. Mus. Paris*, XX (1813) 199, t. 2, fig. 2; *DC.* Prodr. I, 539; *Engl.* Pfl. Ost-Afr., 229; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 34.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.). — XIII d : cult. aux env. de Kabango (Dew.). — Ind. uou cl. : env. de Yambuli (Ém. Laur.).

Citrus medica L. subsp. *Limonum* [Risso] Hook. f. Fl. Brit. Ind. I (1875) 515; *De Wild. et Th. Dur.* l. c. 34.

C. *Limonum* Risso in Anu. Mus. Paris, XX (1813) 211; DC. t. 539. 1895 (A. Dewèvre). — IV : Lukuungu (Dew.).

SIMARUBACEAE

QUASSIA L.

Quassia africana Baill. in Adansonia, VIII (1867-68) 89, t. 8; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 86; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 10; Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112]; Pl. Gilletiana, II (1901) 72 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744]; Pl. Thouneriana (1900) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 35; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161, 272; II (1907) 39 et Miss. Laurent (1907) 380.

1880 (von Mechow). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe; Lukala (Brisac). — V : Kimuenza (Dew.); Sanda (Odd.). — VI : bord du Kwango (von Mechow); route de Lusali à Luano (Leser.) — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : **Bolumbo** (Dew.). — IX : Yambiuga (Pyn.). — IX a : Mondjerengi (Thonn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.); Lokandu. — Nom vern. : **Monie-cama** (Dew.). — XV : rives de la Lulua (Ém. Laur.); Bolongula; Olombo (Ém. et M. Laur.); Luebo (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Gauchu? (Dew.). — Nom vern. : **Vuda-Buadi**.

OBS. — A. Dewèvre a trouvé cette espèce au N. de Stanley-Pool (Congo français).

HANNOA Planch.

Hannoa gabonensis Pierre ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161.

1899 (H. Tilmann). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Dumbu-dumbu**. (Tilm. in Cabra, 49).

IRVINGIA Hook. f.

Irvingia Barteri Hook f. in Trans. Linn. Soc. XXIII (1860) 167; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 315; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 35.

Mangifera gabonensis Aubry Le Comte ex *O'Rorche* in Jouru. Pharm. et Chim. Sér. 3, XXXI (1837) 275.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata]. — Nom vern. : **Mombulu** (Dew.). — Ind. uou cl. : le Lomami (Dew.).

Irvingia Smithii Hook. *f.* in Trans. Linn. Soc. XXIII (1860) 167; *Baill.* in *Adansonia*, VII, 381; *Oliv.* Fl. trop. Afr., I, 314; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 86; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 35.

1816 (Chr. Smith). Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Lukungu (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — V : en amont du Stanley-Pool : Kinshassa (Schlt.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Irebu (Schlt.). — XV : le Kasai (Ém. Laur.).

KLAINEDOXA Pierre.

Klainedoxa gabonensis Pierre in B. S. Linn. Paris, I (1896) 1235.

Le type n'a été trouvé qu'au Gabon.

— — var. **oblongifolia** Engl. ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 239.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.).

Obs. — A Lukolela, A. Dewèvre a récolté une espèce appelée **Ekele**, rapportée, avec doute, à ce genre *Klainedoxa* {Conf. *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 35.

KIRKIA Oliv.

Kirkia acuminata Oliv. in Hook. Icon. pl. XI (1867) 26 t. 1036 et in Fl. trop. Afr. I (1868) 310; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 227.

Le type n'a été trouvé qu'au Mozambique.

— — var. **cordata** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 78.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafa. — Nom vern. : **Kipangu** (Verd.).

BALANITES Delile.

Balanites aegyptiaca Delile Fl. d'Égypte (1813) 211, t. 28 fig. 1; *DC.* Prodr. I, 708; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I, t. 274; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 315; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 50-54.

1891 (Chaltin). — Distr. de Lado. — Nom vern. : **Lalo**. (Chalt.).

OCHNACEAE

OCHNA Schreb.

Ochna arenaria *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 7 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 7].

Campylochnella — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 402. 1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill., 68).

Ochna Buettneri *Engl. et Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 242; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293.

Pleodiporochna — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1903) 58.
O. membranacea *Th. Dur. et Schinz* [non *Oliv.*]. Étud. fl. Cgo (1896) 87.

1885 (R. Buettner). — V : env. de Léopoldville (Buett. 33; Schl. 1252); Duchesne, 24; Tilu, 55); env. de Dembo (Gill); Kimuenza (Gill. 1661). — VI : vallée de la Djuma (Gent.).

Ochna congoensis *Gilg* ex *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat., Sér. 8, XVI 1902 349 in syn. et in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 239.

Polyochnella — *Van Tiegh.* l. c. (1902) 349.

1895 (Ém. Laurent). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : bords de la Sele (But.); Kimuenza (Gill.); entre Dembo et le Kwaugo (But. in Gill. 1483); entre Kisantu et Dembo (Gill. 592).

— — var. **microphylla** *Gilg* l. c. (1903) 240.

1889 (Gillet). — V : Kisantu (Gill. 153).

Ochna Debeerstii *De Wild.* ex *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 237; *De Wild.* Étud. fl. Kaf. (1903) 88.

Ochnella — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1903) 40.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kinkunga** (Verd.); Pala (Deb. 19).

Ochna Gilletiana *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 239; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 156 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293.

Polyochnella — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1903) 40.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Sauda (Odd. in Gill. 3556); Kisantu (Gill. 968). — XV : Batempa; Munnugn (Sankuru) (Em. et M. Laur.).

Ochna Hoffmanni-Otonis *Engl.* in Engl. Jahrb., XVII (1893) 78; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 87; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293.

Porochna — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 387.

O. pulchra O. Hoffm. [non *Hook.*] in Linnaea, XLIII (1880-82) 122.

1882 (P. Pg.). — V : rég. de la Lumene (Hendr. in Gill. 3236). — XV : Mukenge (Pg. 1685).

Ochna katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kaf. (1903) 89.

Campylochnella — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1903) 60.

O. Wildemaniana *Gilg* ex *De Wild.* l. c. (1903) 90, 212.

1899 (Edg. Verdick). — I : Haut plateau du Katanga (Verd.); Lukafu (Verd. 114). — Le fruit porte le nom de **Mulolo** (Verd.).

Ochna Laurentiana *Engl.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 72 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 744].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 153, 968).

Ochna membranacea *Oliv.* Fl. trop. Afr., I (1868) 316; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 36.

Diporochna — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 390.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Tchia (Dew. 402).

Ochna pulchra *Hook.* Icon. pl. VI (1843) t. 588; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 317; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 87.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens).

Ochna quangensis *Buettn.* in Verh. bot. Ver. Brandenb., XXXIII (1890) 49; *Th. Dur. et Schinz*, Étud. fl. Cgo (1896) 87.

Porochna — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1903) 57.

1885 (P. Pogge). — VI : Lulende au bord du Kwango (Pg.; Buett., 27).

Ochna Schweinfurthiana *Fr. Hoffm.* Beitr. Kenntn. Fl. Ost-Afr. (1889) 20; *Engl.* Pl. Ost-Afr. 273; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 90; *Gilg* in Engl. Jahrb., XXXIII (1903) 240.

Diporidium — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 356.

Ochnella — *Van Tiegh.* l. c. Sér. 8, XVIII (1903) 39.

1894 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Musafoi**; **Kitete** (Verd. 112, 313).

Ochna Welwitschii *Rolfe* in Bolet. Soc. Brot. XI (1893) 84; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 121; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 168.

Polyochnella — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1902) 348.

1891 (F. DeMeuse). — IV : rég. des Cataractes (Dem. 526).

OURATEA Aubl.

Ouratea affinis [*Hook. f.*] *Engl.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 79; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 87; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 122.

Gomphia — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 274; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 320.

Rhabdophyllum — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 321 et XVIII (1903) 34.

1885 (R. Buettner). — V : Léopoldville (Schlt.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — Ind. non cl. : Lone-Island [Angola ?] (Buett.).

Ouratea Arnoldiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 22 [B. S. B. XXXVIII², 30]; *Gilg* in Engl. Jahrb., XXXIII (1903) 257; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 156 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 292.

Rhabdophyllum Arnoldianum Van Tiegh. in *Annal. sci. nat. Sér. 8. XVI* (1902) 321 et. XVIII (1903) 34.

Ouratea affinis De Wild. et Th. Dur. [non *Engl.*] *Reliq. Dewevr.* (1901) 36 et *Pl. Gilletianae*, I (1900) 7 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 7].

1895 (A. Dewèvre). — V : Kisantu et env. (Gill. 3399) ; Kimuenza (Dew.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2827). — VII : Kntu (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukenge (Pg. 676, 681, 682).

Obs. 1. — L'habitation « au N. du Stanley-Pool » (Dew.) est dans le Congo français.

Obs. 2. — M. Gilg rapporte, avec doute, le n° 3075, récolté par G. Schweinfurth à Mbruole, [XII] à cette espèce.

Ouratea bracteata Gilg in *Engl. Jahrb. XXXIII* (1903) 264 ; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 292.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2722).

Ouratea Cabrae Gilg in *Engl. Jahrb. XXXIII* (1903) 262.

Exomicrum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8. XVIII* (1903) 38.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 33).

Ouratea coriacea De Wild. et Th. Dur. *Reliq. Dewevr.* (1901) 36 ; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 156 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 292 ; *Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII* (1903) 261.

Exomicrum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8. XVI* (1902) 339 et XVIII (1903) 38.

O. reticulata [*P. Beauv.*] *Engl. var. Schweinfurthii Engl.* in *Engl. Jahrb. XVII* (1893) 81.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2683) ; entre Lukolela et Gombi (Dew. 795). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2837). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XII d : Kusumba (Schw. 3169).

Ouratea densiflora De Wild. et Th. Dur. *Reliq. Dewevr.* (1901) 37 ; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 156.

Exomicrum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8. XVI* (1902) 339.

Monelasmum — *Van Tiegh.* l. c. XVIII (1903) 35.

1895? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — XIII c : Yakusu (Ém. et M. Laur.).

Ouratea Dewevrei De Wild. et Th. Dur. *Reliq. Dewevr.* (1901) 37 ; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 292 ; *Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII* (1903) 271.

Exomicrum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8. XVI* (1902) 339.

Monelasmum — *Van Tiegh.* l. c. XVIII (1903) 35.

1890 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 33). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 744).

Ouratea Dupuisii [*Van Tiegh.*] *Th. et Héll. Dur.*

Monelasmum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8. XVI* (1902) 328.

1893 ? (P. Dupuis). — Bas-Congo (Dup. fide Van Tiegh.).

Ouratea elongata [Oliv.] Engl. in Engl. Jahrb. XVII (1893) 80; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 7 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 7]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 157 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293, t. 67.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Dibebe (Ém. Laur.).

Ouratea febrifuga Engl. et Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 257; *De Wild.* Pl. Laurentianae (1903) 43.

Bisetaria — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 11.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

Ouratea laevis *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 26 [B. S. B. B. XXXVIII², 34]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 156 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293.

Monelasmum — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1903) 327.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — V : Kimuenza (Gill. 1907, 2205); Sanda (De Brouw. in Gill. 3024; Odd. in Gill. 3554). — XV : Isaka (Ém. et M. Laur.).

Ouratea laxiflora *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 25 [B. S. B. B. XXXVIII², 33] et Pl. Thonnerianae (1900) 37 t. 1; Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 262.

Campylospermum — Van Tiegh. in *Morot.* Journ. de Bot. (1902) 197.

Monelasmum — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 2, XVI (1902) 327 et XVIII (1903) 37.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 20).

Ouratea leptoneura Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 255.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12535, 12584) : Léopoldville (Luja, 15; Duchesne, 9).

Ouratea longipes [Van Tiegh.] Th. et Hél. Dur.

Rhabdophyllum — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 323.

1888 (Fr. Hensl.). — IX : pays des Bangala. (Hensl. 120).

? **Ouratea myrioneura** Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 255.

1885 (R. Buettner). — Ind. non cl. : rive gauche du Congo en aval de Lone-Island [Angola?] (Buett. 31).

M. Gilg [l. c.] conserve quelques doutes sur la détermination de cette espèce.

Ouratea pellucida *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 27 [B. S. B. B. XXXVIII², 35] et Reliq. Dewevr. (1901) 38; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 157; Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 261.

Exomicrum — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 339.

Monelasmum — Van Tiegh. l. c. XVIII (1903) 35.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew. 1159); retrouvé en 1904 (Ém. Laur.).

Ouratea Poggei [Engl.] *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 272.

Monelasmum — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 328.

O. reticulata Engl. var. — *Engl.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 81.

O. reticulata Engl. var. andongensis *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 122.

1881 *P. Pogge*. — XV : Mukenge (Pg. 683, 684, 686); forêts vierges de la Lolua (Pg. 673, 677, 678, 679); Muene-Muketela vers 6° 5' (Pg. 675).

Ouratea pseudospicata *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 263; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 292.

1891 (*H. Vanderyst*). — Bas Congo (*Gill.*). — I : Moanda (*Vanderyst*).

Ouratea refracta *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 23 [B. S. B. B. XXXVIII², 31] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 38; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 256.

Rhabdophyllum — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 321.

1896 *A. Dewèvre*. — XIII d : forêt de Rewa [rég. de Nyangwe] (*Dew.* 1140).

Ouratea reticulata *P. Beauv.* | *Engl.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 81; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 86; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 122; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 11 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 39; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 267.

Gomphia — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 22 t. 72; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 320.

Ochna [err. cal.] — *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 44.

G. flava *Schumacher* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 216.

1893 *Ém. Laurent*. — Bas-Congo (*Cabra*). — II a : le Mayumbe (*Ém. Laur.* 31), bassin de la Sele (*But.* in *Gill.* 1454).

Obs. — *A. Dewèvre* a récolté cette espèce au N. du Stanley-Pool, [n. 720] mais sur la rive française.

— — var. **Schweinfurthii** *Engl.* l. c. (1893) 81; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. 88.

Monelasmum *Schweinfurthii* *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 328.

1870 (*G. Schweinfurth*). — XIII d : Kusumba [pays des Mangbetu] (*Schw.* 3169).

Ouratea subumbellata *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 254; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 157 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293.

1880 (*von Mechow*). — V : env. de Leopoldville et de Lemfu (*Gill.*) ; Kimuenza (*Gill.* 1672); Sanda (*Odd.* in *Gill.* 3014, 3555); rég. de Lula-Lumene (*Hendr.* in *Gill.* 3064). — VI : le Kwango (*von Mech.*) ; Gango près Muene-Putu-Kasongo (*Buett.*);

vallée de la Djuma (Gent.). — VIII : Eala (M. Laur. 137). — XV : le Kasai (Ém. Laur.); Lubue (Gent. 34); Olombo; Mange; Dibele; Munungu (Ém. et M. Laur.). — Ind. noncl. : le Lomami (Desc.). — Nom vern. : **Mboyo** [Équateur] (Dew.).

VAUSAGESIA Baill.

Vausagesia africana Baill. in B. S. Linn. Paris, II (1890) 874; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 72 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 168.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1782).

BURSERACEAE

PACHYLOBUS G. Don.

Pachylobus edulis G. Don Gen. Syst. Bot. II (1832) 89; *Engl.* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 365.

Canarium — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 285; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 127.

— — var. **Mubafo** [*Ficalho*] *Engl.* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 365; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 72 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744] et Reliq. Dewevr. (1901) 39; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 125.

Canarium Mubafo *Ficalho* in Bol. Soc. geogr. Lisboa, Sér. 2 (ann.?) 611 et Pl. Uteis (1884) 115.

Pachylobus edulis - G. Don - *Hemsl.* in *Hook.* Icon. pl. XXVI t. 2566. 2567.

Canarium Sapbu *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 99 c. fig. in textu et t. 3;

Th. Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 89.

Pachylobus — *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 243. C. Safu - *Engl.* - *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 36.

1883 (P. Pogge). — Arbre fruitier planté dans les villages du Bas-Congo (Ém. Laur.) — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — IV : Lukungu (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1330). — VIII : Lilangi (Dew. 760); Bokakata (Dew. 796 a). — XV : Mukenge (Pg.).

CANARIUM L.

Canarium Schweinfurthii *Engl.* in DC. Monog. Phan. IV (1883) 101 et in Engl. Jahrb. XV (1893) 99; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 89; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 14 et Reliq. Dewevr. (1901) 40; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 36 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 272.

1883 (P. Pogge) — II a : le Mayumbe, (Em. Laur.). — IX : Bumba (Dew.). — XIII a : zone des Stanley-Falls. — Nom vern. : **Beli** (Coll.?) — XV : Mukenge (Pg.). — XVI : Urua. — Nom vern. : **Bafu** (Desc.).

MELIACEAE

TURRAEANTHUS Baill.

Turraeanthus Klainei *Pierre ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 272.

1904 (Ad. Odden). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3753).

TURRAEA L.

Turraea Cabrae *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 31 t. 16; Contr. fl. Cgo, I (1899) 13 et Reliq. Dewevr. (1901) 40; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 39 t. 33, (1908) 261.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Shinganga (Dew. 350); Shimbete (Dew. 316); Shimbanga [Haut-Shiloango] (Cabra-Michel). — V : env. de Léopoldville (Gill. 3889). — VI : Madibi (Sap.). — Noms vern. : **Munkanakana**; **Monganagana** [Kwilu] (Sap.).

Turraea Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 261 t. 88.

1891 (F. Demeuse). — VIII : entre Lulanga et Coquilhatville (Pyn. 797). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanley-Falls (Dem. 392). — Ind. non cl. : Busa (Ém. et M. Laur.).

Turraea Vogelii *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 253; *Walp.* Annal. bot. II, 227; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 330; *C. DC.* in *DC.* Monog. Phan. I, 141; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 130; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 31 [B. S. B. B. XXXVI², 77] et Contr. fl. Cgo, I (1899) 13; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 39.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Lukolela (Pyn.); Kisantu; entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Lemfu (De Brouw.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. Duch.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XII c : env. de Gombari (Ser.). XV : rives du Sankuru (Ém. Laur.); env. d'Idange; Bena Dibebe (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lac Moero (Desc.).

Obs. — Le *T. Vogelii* signalé dans *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 89, appartient probablement au *T. Cabrae*.

PYNÆRTIA De Wild.

Pynaertia ealaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 262 t. 84.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 1024).

MELIA L.

Melia Azedarach L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 384; Bot. Mag. (1807) t. 1066; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 332; *C. DC.* in *DC.* Monog. Phan. I, 451; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 231; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 31; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 15; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 130; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 37 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 42-49, (1905) 486-488; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 262.

M. angustifolia *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 214.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo. (Ém. Laur.). — I : Banana (Dup.). — III : Tondoa (Buet.). — V : Kinshassa (Ém. Laur.); Dembo; Kisantu (Gill.). — IX : Lie [introd.] (Ém. Laur.). — XV : Lonkala (Sap.). — XVI : Toa (Desc.).

Oss. — Cette espèce paraît répandue dans le bassin du Congo (Ém. Laur.).

GUAREA Allem.

Guarea Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 263.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Pyn. 369, 968). — XI : env. de Yambuya (M. Laur. 1935).

TRICHILIA L

Trichilia emetica *Vahl* Symb. bot. I (1796) 34; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 335 et in *Trans. Linn. Soc.* XXIX, t. 201; *C. DC.* in *DC.* Monog. Phan. I, 680; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 134; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 231; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 77.

Mafuireira oleifera *Bertol.* Misc. bot. IX (1850 ?) 6 t. 2.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu et env. — Nom vern. : **Musjikinsi** (Verd. 21, 173).

Trichilia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 50; II (1907) 40, (1908) 264.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza et env. (Gill. 1962, 2097, 2165; Van Houtte in Gill. 2032). — VIII : Injolo (M. Laur. 1940).

Trichilia Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 264.

1908 (Marc. Laurent). — XI : env. de Mogandjo (M. Laur. 1939).

Trichilia Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 265.

1906 (A. Sapin). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (Pyn. 1070). — Noms vern. : **Mpana** [Kwilu]; **Sobulolo** [Bangala].

Trichilia quadrivalvis *C. DC.* in B. Herb. Boiss. III (1895) 402.

1881 (von Mechow). — VI : bassin du Kwango (v. Mech.).

Trichilia retusa *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 658; *C. DC.* in *DC.* Monog. Phan. I, 658; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 232; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 51; II (1907) 40 et *Miss. Laurent* (1905) 126.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2787). — VIII : Coquilhatville (M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur. 947). — XV : le Kasai (Luja, 213).

CARAPA Aubl.

Carapa procera *DC.* Prodr. I (1824) 626; *C. DC.* in *DC.* Monog. Phan. I, 716; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 134; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 55-57; *Miss. Laurent* (1907) 380 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Congo, I (1904) 161; II (1908) 260.

C. guianensis *Oliv.* [non *Aubl.*] Fl. trop. Afr. I (1868) 339.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VIII : Iko (Lamb.); Eala (Ém. et M. Laur.). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.); Kasongo-Batetela (Sap.).

— — var. **Gentilii** *De Wild.* in Bull. Soc. étud. colon. (1903) 198; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 60 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161.

1902 (L. Gentil). — XV : Luluabourg (Gent.).

ENTANDROPHRAGMA C. DC.

Entandrophragma Candolleum *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 14; Ill. fl. Cgo (1899) 125 t. 63 et Reliq. Dewevr. (1901) 41.

1896 (A. Dewevre). — XIII a : rég. des Stanley-Falls (Dew.)

LEIOPTYX Pierre.

Leioptyx congoensis *Pierre* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 259 t. 76-77.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 367).

LOVOA Harms.

Lovoa Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 260.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 674, 1283).

Lovoa trichilioides *Harms* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 165
1885 (L. Marques). — XV : vallée de la Lovo (Marq., 232).

DICHAPETALACEAE

DICHAPETALUM Thou.

Dichapetalum adnatiflorum *Engl.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896)
142.

1882 (P. Pogge). — XV : Jambe [pays des Bashilaugé] vers 4° ¼ (Pg.).

Dichapetalum congoense *Engl. et Ruhland* in Engl. Jahrb. XXXIII
(1902) 78.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

Dichapetalum Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr.
(1901) 41.

1895 (A. Dewèvre). — II a : la Lemba (Dew. 1359).

Dichapetalum holopetalum *Ruhland* in Engl. Jahrb. XXXIII
(1902) 77.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Dichapetalum leucosepalum *Ruhland* in Engl. Jahrb. XXXIII
(1902) 81.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 1048).

Dichapetalum Lolo *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 42
et Ill. fl. Cgo (1902) 179 t. 90.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Basankusu. — Nom vern. : Lolo (Dew. 777).

Dichapetalum Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII
(1900) 3 [B. S. B. B. XXXIX², 55]; Pl. Gilletianae, I (1900) 8 [B. Herb.
Boiss. Sér. 2, I, 8]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906)
273; II (1907) 41 [Lujae] et Miss. Laurent (1906) 329.

1896 (A. Dewèvre). — V : le Stanley-Pool (Luja); Sanda et env. (De Brouw. in Gill.
3116; Vermeulen in Gill. 3408, 3568); Kimuenza (Gill. 1635); env. de Yumbi (Ém.
et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Dew. 1576) — IX :
Umangi (Ém. et M. Laur.).

Dichapetalum mombuttense *Engl.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896)
135; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 273; II (1907) 41
et Miss. Laurent (1906) 240.

1872 (G. Schweinfurth). — IX : env. de Yaminga (Pyy. 59). — XI : Basoko
(Ém. Laur.). — XII : Munsu (Schw. 3454).

Dichapetalum mundense *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 134.
1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 693).

Dichapetalum obliquifolium *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 87.
1896 (A. Dewèvre). — XIII c : Wabundu (Dew. 1143 b).

Dichapetalum patenti-hirsutum *Ruhland* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 86; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 273.
1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 841). — V : Kimuenuza (Gill.).

Dichapetalum Poggei *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 141 et XXXIII (1902) 85.
1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 626); pays des Bashilange (Pg. 1643).

Dichapetalum rufipile [*Turez.*] *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 90.
Chailletia — *Turez.* in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* XXXVI (1836) 611; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 342.
1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.).

SPECIES DUBIA.

Pittosporum? bicurium *Schinz* et *Th. Dur.* Étud. fl. Cgo (1896) 65; *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 46 t. 20.

1891 (F. Demeuse). — Ind. non cl. : Jawubu (Dem.).

Oss. — MM. Engler et Ruhland [in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 91] disent que cette planche représente certainement un *Dichapetalum* et peut-être le *D. floribundum* [Planch.] Engl.

OLACACEAE

APTANDRA Miers.

Aptandra Zenkeri *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 147 et in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, II (1899) 287; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 377 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 31.

1899 (Edg. Verdick). — VI : entre les chutes François-Joseph et Popokabaka (Gent.). — VIII : Coquilhatville (Ém. et M. Laur.). — IX : Yaminga (M. Laur.). — XV : Muuunga (Leser.): env. de Luluabourg (Verd.).

Aptandra Zenkeri var. **latifolia** *Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 287; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 289.

1896 (A. Dewèvre). — XI : entre Isangi et Basoko (Dew.).

COULA Baill.

Coula Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1898) 19 [B. S. B. B. XXXVIII², 189]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 231, (1907) 379.

1897 (A. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.).

HEISTERIA L.

Heisteria parvifolia *Smith* in *Rees Cyclop.* XVII (1811) n. 3; *DC.* Prodr. I, 533; *Oliv.* Fl. trop. Afr., I, 346; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 90; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 140; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 13; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 231.

Acrolobus — *Klotzsch* in Verh. Akad. Berlin (1856) 237, t. 3.

A. Schoenleinii *Klotzsch* l. c. (1856) 236, t. 3.

1888 (Fr. Hens). — II a : le Mayumbe (Dup.). — V : Galiema (Pyu.); Kisantu : env. de Sanda (Gill.). — VI : env. de Dima (Leser.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur (Pyu.); Coquilhatville (Dew.); Eala. — Nom vern. : **Etumdulu** (M. Laur.); Irebu; Bamaia (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Bolombo; Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — IX a : Bobi (Thonn.). — X : Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Lokandu (Dew.); Basoko (Ém. Laur.). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukundji; Munungu (Ém. et M. Laur.).

PTYCHOPETALUM Benth.

Ptychopetalum alliaceum *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 33.

1900 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.). — V : Kisantu (Gill.).

Ptychopetalum Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 231.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2816, 2825, 2931). — IX a : en aval de Mobeka (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Ptychopetalum nigricans *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 34; II (1907) 33 et Miss. Laurent (1906) 232.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1673); Kisantu : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Dima (Ém. et M. Laur.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

OLAX L.

Olax Aschersoniana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 46; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 91.

1885 R. Buettner. — VI : Muene-Putu-Kassongo (Buett. 613).

Olax Durandii *Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 287; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 176.

1896 (Em. Laurent). — XVI : Lukafu (Verd. 526). — Ind. non cl. : le Lonami (Em. Laur.).

Olax Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 32.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Olax macrocalyx *Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 285; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 35.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.); env. de Kimuenza (Dew. 72).

Olax obtusifolia *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 177.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Niyaro** (Verd. 156).

Olax Poggei *Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 285.

1881 (P. Pogge). — XV : Muene-Muketela, vers le 6° (Pg. 649).

Olax Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 32.

1905 (L. Pynaert). — IX : Bumba (Pyn. 110).

Olax viridis *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 349; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 8 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 8].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

LAVALLEOPSIS Van Tiegh.

Lavalleopsis longifolia *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) [B. S. B. B. XXXVIII², 486]; Pl. Gilletianae, II (1901) 72 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744] et Reliq. Dewevr. (1901) 44; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 232 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 32.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill. 1127, 2107); Tumba (Em. et M. Laur.). — VII : Kutu (Em. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 810). — IX : Bolombo (Em. et M. Laur.). — XIII c : Bamanga (Dew.).

STROMBOSIOPSIS Engl.

Strombosiopsis congolensis *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 17 [B. S. B. B. XXXVIII², 1877] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 43.
1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

SCHOEPFIANTHUS Engl.

Schoepfianthus Zenkeri *Engl. ex De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 377.
1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.).

RHOPALOPILIA Oliv.

Rhopalopilia patens *Pierre* in B. S. Linn. Paris, II (1896) 1263 ;
De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 61.
1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1952).
— — var. **angustifolia** *De Wild.* l. c. (1903) 61.
1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2053).

Rhopalopilia Poggei *Engl.* in *Engl. et Prantl.* et Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 143 et in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, I (1899) 282.
1882 (P. Pogge). — XV : Mukeuge (Pg. 1324).

LEPTAULUS Benth.

Leptaulus daphnoides *Benth.* in *Benth. et Hook. f.* *Gen. pl.* I (1862) 351 ; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.*, I, 354 et in *Hook. Icon. pl.* XXIV (1894) t. 2339 ; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 242 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 43.
1870 (G. Schweinfurth). — Bas-Congo (Odd. in Gill. 3640, 3641). — V : Dembo (Hendr. in Gill. 2102) ; Sanda (Odd. in Gill. 3697) (Vermeulen in Gill. 3426). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2771). — XII : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Lubi (Lescr. 172) ; Batempa (Ém. et M. Laur.).

APODYTES E. Mey.

Apodytes beninensis *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* VIII (1848) t. 778 et *Niger Fl.* (1849) 259 t. 28 ; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 355 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 290.
Raphiostylis — *Planch.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 259.

R. Heudelotii *Planch.* ex *Miers* in Ann. Nat. Hist. Ser. 2, IX (1852) 381 et Contrib. to Bot. 1, 60 t. 6.

1816 (Chr. Smith) — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : env. de Bokakata. — Nom vern. : **Bokoli** (Dow.).

ICACINA A. Juss.

Icacina Guessfeldtii *Aschers.* ex *Buettl.* in Mitth. Afr. Gesellsch. V (1889) 263 et ex *Engl.* et *Prantl.* Nat. Pflanzenfam. III, 5 (1893) 250 fig. 139; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo 1896) 263.

1885 (R. Buettner). — V : Lukolela (Buettl. 182).

Icacina Mannii *Oliv.* Fl. trop. Afr. 1 (1868) 357; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 290.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew. 687, 688).

ALSODEIOPSIS Oliv.

Alsodeiopsis Poggei *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 71; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 91.

1883 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg.).

Alsodeiopsis Oddoni *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 42.

1903 (Ad. Oddon). — V : rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3573).

PYRENACANTHA Hook.

Pyrenacantha Staudtii *Engl.* in *Schlechter* West-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 297.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt. 12061).

POLYCEPHALIUM Engl.

Polycephalum integrum *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 73 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 744].

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1546).

Polycephalum Poggei *Engl.* in *Engl.* et *Prantl.* Nat. Pflanzenfam. Nachr. zum II-IV (1897) 227 et in Engl. Jahrb. XXIV (1898) 484 t. 7; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 42.

1881 (P. Pogge). — V : Kisantu (Gill. 3781). — XV : Mukenge (Pg. 1360, 1371).

IODES Blume.

Iodes africana *Welw. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 358; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 143; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 283.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 651).

Iodes Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 384 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 295.

1905 (Marc. Laurent). — V : Lukoleia (Pyn 258). — VIII : env. de Coquilhatville (Malchair); Boyenge [Ikelemba] (M. Laur.); Eala et env. (M. Laur. 1117, 1524; Pyn. 401, 1343).

CELASTRACEAE

GYMNOSPORIA Wight et Arn.

Gymnosporia Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 8 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 8].

1899 (J. Gillet). — V : Kisautu (Gill. 1032, 1230).

Gymnosporia senegalensis [*Lam.*] *Loesen.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 541; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 145; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 92.

Celastrus — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) 661; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 361; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 81.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

— var. **inermis** [*A. Rich.*] *Loesen.* l. c. 542 et in *Engl. Pl.* Ost-Afr. 246; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 44.

Celastrus senegalensis *Lam.* var. — *A. Rich.* Teut. fl. Abyss. I (1847) 133.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kabanga [form. *macrocarpa* Loesen.].

HIPPOCRATEACEAE

CAMPYLOSTEMON Welw.

Campylostemon angolense *Welw. ex Oliv.* in Journ. Linn. Soc. X (1869) 44 et Fl. trop. Afr. I, 366; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 147; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 45.

1896 (A. Dewèvre). — XV : forêt de Bena-Luukala (Dew.).

Campylostemon Duchesnei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 5 [B. S. B. B. XXXIX², 57] et Ill. fl. Cgo (1900) 141 t. 71.
1892 (Jos. Duchesue). — XV : Lusambo (Duch.).

Campylostemon Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 240 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 292.
1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Pyn. 867); Monzambi (Pyn. 352). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Campylostemon Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 41.
1905 (L. Pynaert). — IX : entre Nouvelle-Anvers et Mobeka (Pyn.).

HIPPOCRATEA L.

Hippocratea apiculata *Wchb.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 369; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 745]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 294.
1900 (R. Butaye). — V : entre Dembo et le Kwango (But. in Gill. 1486). — XI : Mogandjo (M. Laur.).

Hippocratea bipindensis *Loesen.* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 102 fig. 13; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 293.
1907 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 4014).

Hippocratea Bruneelii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 292.
1906 (Alberic Bruneel). — VIII : Toka [riv. Baringa] (Bruneel, 30); Eala (Pyn. 537, 559, 1032); entre Coquilhatville et Lulanga (Pyn. 771).

Hippocratea clematides *Loesen.* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 109; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 41.
1906 (Marc. Laurent). — XV : Limbutu (M. Laur. 971).

Hippocratea cymosa *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 67 t. 34; Contr. fl. Cgo, I (1899) 15 et Reliq. Dewevr. (1901) 45; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 106; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 240.
H. obtusifolia *Schweinf.* var. obtusifolia *Loesen.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 237.
1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Lukolela (Dew. 827). — VIII : Lulanga (Ém. Laur.).

Hippocratea indica *Willd.* Sp. pl. I (1797) 193; *Roxb.* Corom. Pl. II, t. 139; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 368; *Brandis* For. Fl. of Ind. 83;

Laws. in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. 1, 624; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 148; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 293.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et euv. (M. Laur.; Pyn. 1350, 1474). — XI : Bonaneh (M. Laur. 1970); euv. de Mogandjo (M. Laur.).

Hippocratea isangiensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 293.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Isangi (M. Laur.).

Hippocratea myriantha *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 369; *Loesen.* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 106 fig. 1 D-F; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 293.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 802). — VIII : Eala (Pyn. 918, 1290, 1640); Waka [Maringa]; Ikenge (Bruneel); Mondjo (Pyn. 317); riv. Lulonga (Pyn. 763). — XI : Yambuya (M. Laur. 1906).

Hippocratea obtusifolia *Roxb.* Hort. Bengal. (1814) 5; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 369; *Engl. Pil.* Ost-Afr. 247; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 81.

Le type croit en Asie et en Australie trop.

— — var **Richardiana** *Loesen.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 236 et XXXIV (1904) 108.

H. *Richardiana* *Camb.* in *St-Hil.* Fl. Bras. mer. II (1829) 102 in adnot.; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. deut. I, 112 t. 26.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Boriri**, **Lubulukutu** (Verd. 78, 593).

Hippocratea Poggei *Loesen.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 238 et XXXIV (1904) 117; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 92.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1983).

Hippocratea Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 294.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 736, 1300, 1315, 1438).

Hippocratea velutina *Afzel.* Remed. guin. (1815) 33 et ex *Spreng.* Neue Endeck. III (1822) 234; *DC.* Prodr. I, 568; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 370; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 120, fig. III, a-c.; *Loesen.* in *Schlechter* West-Afr. Kautsch.-Exp. (1900) 297; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 295.

Salacia unguiculata *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 3 [B. S. B. B. XXXVIII², 80] et Reliq. Dewevr. (1901) 46.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 607; Schl.); env. d'Eala (M. Laur.).

Hippocratea Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 208.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 582).

SALACIA L.

Salacia alata *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 241.

1904 (S. Bieler). — VIII : Haut-Lepori (Biel.).

— — form. **gracilis** *De Wild.* l. c. (1906) 242.

1906 (L. Pynaert) — IX : Bumba (L. Pyn. 103).

Salacia congolensis *De Wild.* et *Th. Dur.* III. fl. Cgo (1899) 85, t. 43; *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 46 et *Pl. Thonnerianae* (1900) 23, t. 20.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Mongo (Thonn. 190).

Salacia Demeusei *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 11; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 41, (1908) 295.

1891 (F. Demeuse). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1139). — IX : pays des Baugala (Dem.).

Salacia Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 2 [B. S. B. XXXVIII², 79] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 46.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kisanga? [rég. de Nyangwe] (Dew. 1079).

Salacia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent. (1906) 241.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Lanr.).

Salacia Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 295.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 19, 1705).

Salacia senegalensis *DC.* *Prodr.* I (1824) 570; *Guill.* et *Perr.* *Fl. Seneg.* tent. I, 143 t. 27; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 374; *Th. Dur.* et *Schin.* Étud. fl. Cgo (1896) 92.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

RHAMNACEAE

VENTILAGO Gaertn.

Ventilago leiocarpa *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* V (1861) 77; *Hemsl.* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 378; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 47.

V. maderaspatana *Benth.* (non *Gaertn.*) in *Kew Journ. of Bot.* IV (1852) 42
Celastrus diffusa *G. Don.* *Gen. Syst. Bot.* II (1832) 6.

1896 (A. Dewèvre). — IX : env. de Lukasa? [rég. de Bumba] (Dew.).

ZIZYPHUS L.

Zizyphus espinosus *Buett.* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXXII (1890) 48; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 93.

1884 (R. Buettner). — III : Tondoa *Buett.* 493.

Zizyphus Jujuba *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* III (1789) 318; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 379; *Engl.* *Pl. Ost-Afr.* 255; *Hiern* *Cat. Welw.* Pl. I, 150.

Z. insularis *C. Sm.* in *Tuck.* *Congo Expéd., App.* (1818) 250.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

— — var. **obliquifolia** *Engl.* ex *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 54.

1895 (G. Descamps). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kankono**^o (*Verd.* 224); Pweto (Charg.); Albertville [Toa] (*Desc.*).

GOUANIA Jacq.

Gouania longipetala *Hemsl.* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I (1868) 383; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 20; *Pl. Gillelianae*, I (1900) 9 [B. *Herb. Boiss. Sér.* 2, I, 9] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 47; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 49 et *Miss. Laurent* (1907) 388.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Équateur (Dew.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Lubue (Luja). — Ind. non cl. : Mapumi (Ser.). — Noms vern. : **Ketendolo** [Kasongo]; **Puku-puku** [Ikwangula]; **Vanda-Makolo** [Tanganika] (Dew.).

Gouania Sereti *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 45.

1906 (F. Seret). — XII a : entre Niagara et Gombari (Ser. 448).

AMPELIDACEAE

AMPELOCISSUS Planch.

Ampelocissus abyssinica *Planch.* in *La Vigne améric.* (1885) 24 et in *DC.* *Monog. Phan.* V, 383; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gillelianae*, I (1900) 9 [B. *Herb. Boiss. Sér.* 2, I, 9].

Vitis — *Hochst.* ex *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* I (1847) 112.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Ampelocissus angolensis *Planch.* in *La Vigne améric.* (1885) 48 et in *DC.* *Monog. Phan.* V, 400; *Hiern* *Cat. Welw.* Pl. I, 156.

Le type n'a été trouvé que dans l'Angola.

Ampelocissus angolensis var. **congoensis** *Planch.* l. c. V (1887) 400; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 93.

1816 Chr. Smith. — Bas-Congo (Sm.).

Ampelocissus calophylla *Gilg* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 285.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Luozi (Luja, 150). — XI : Lokandu (Dew. 1124). — XII c : Nala (Pyn.).

Ampelocissus Chantinii (*Lécard*) *Planch.* in La Vigne améric. (1885) 27 et in *DC.* Monog. Phan. V, 389; *Gilg* in *Engl.* Pflanzenw. Ost-Afr. 257; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 47.

Vitis — *Lécard* ex *Planch.* l. c. V (1887) 389 in obs.

1896 (A. Dewèvre). — XV : le Haut-Lualaba (Dew. 1022, 1071). — Nom vern. : Kisangama [Tanganika].

CISSUS L.

Cissus adenocaulis *Steud.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 111; *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V, 586; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 162; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 163 et *Miss. Laurent* (1905) 147.

Vitis — *Miq.* in *Ann. Mus. Lugd.-Bat.* I (1863-64) 79; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 404; *De Wild.* : Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 147 [err. cal. *tenicacaulis*].

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — VII? Kiri (Ém. Laur.). — XII? : le Nabambisso (Schw.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Cissus aralioides [*Weber*.] *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 513; *Gilg* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 259; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 160; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 48.

Vitis — *Weber* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 411.
V. constricta *Bak.* l. c. I (1868) 409.

1895 (J. Gillet). — II a : Katala (Dew.). — V : Kisautu (Gill.); env. de Yumbi (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Ikenge (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — Nom vern. : **Mecece** [Coquilhatville] (Dew.).

Cissus articulata *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1830) 135; *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V, 588; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 18.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew.).

Cissus Bakeriana *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 599; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 94.

V. Thoningii *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 402 pr. p.

1870 G. Schweinfurth. — XII : pays des Mangbettu (Schw.).

Cissus Barbeyana *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 11 et Reliq. Dewevr. (1901) 48; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 163.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 339). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2713).

Cissus cornifolia [*Bak.*] *Planch.* in *DC.* Monog. V (1887) 492; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 209.

Vitis — *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 390; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 47 t. 22

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.). — Nom vern. : **Moganza**. — Ind. non cl. : Gumango [Congo?] (Schw.).

Cissus debilis *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 569; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 9 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 9]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 161; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52.

Vitis — *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 403.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Cissus Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 12 et Reliq. Dewevr. (1901) 48.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (But.). — V : Kisantu (Gill. 228); rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3624). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew. 1160); chutes de la Tshopo (Ém. Laur.).

Cissus diffusiflora [*Bak.*] *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 496; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 78 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 750]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 159.

Vitis — *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 390.

1900 (J. Gillet). — V : Lukolela (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.).

Cissus farinosa [*Welw.*] *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. (1887) 488; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 159; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 285 et Miss. Laurent (1905) 148.

Vitis — *Welw. ex Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 394.

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — XIII d : Lubunda [rég. de Niangwe] (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.); Munungu (Ém. Laur.).

Cissus Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 6 [B. S. B. B. XXXIX², 58]

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.) Samba. — XV : (Cabra).

Cissus Guerkeana (Buett.) Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 9; *Gilg* in *Schlecht.* West-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 298.

Vitis — Buett. in Verhandl. bot. Ver. Brandeb. XXXI (1889) 89.

1886 R. Buettner). — V : montagne entre Léopoldville et le Stanley-Pool (Buett.); Dolo (Schlt. 12463).

Cissus Haullevilleana De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 12 et Reliq. Dewevr. (1901) 49; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 53.

1896 A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.).

Cissus ibuensis Hook. f. in Hook. Niger Fl. (1849) 265; *Planch.* in DC. Monog. Phan. V, 567; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 95; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 149 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 285.

Vitis — Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 402.

1874 (Fr. Naumann). — II : env. de Boma (Dew.); Ponta da Lenha (Naum.). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — XIII a : Yakusu (Ém. Laur.).

Cissus Kakoma De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 240.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 158).

Cissus Laurentii De Wild. Miss. Laurent (1905) 148.

1904 (Ém. et Marc. Laur.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.).

Cissus Livingstoniana Welw. in Journ. Linn. Soc. VIII (1864) 159; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 158; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52 et 286.

Vitis rubiginosa Webe. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 394.

Cissus — *Planch.* in DC. Monog. Phan. V (1887) 485; *Gilg* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 258; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 95; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. 1901) 50; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 40.

1888 Fr. Hens. — Bas-Congo (Ém. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.); Luvituku (Dem. : Sona Gongo (Ém. Laur.); Lutete (Hens). — V : rég. de Kimuenza (Gerard); Kisantu (Gill). — XIII d : Lubunda (rég. de Nyangwe) (Dew.). — XV : Dibebe (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.) — Ind. non cl. : Mont Kiobo (Coll?). — Noms vern. : Tjabilonda [Lukafu]; Ilikiwagurla [Ikwangula]; Luanzu [Tanganika].

Obs. — Cette espèce paraît assez répandue dans le Congo belge (De Wild.).

Cissus mayombensis Gilg ex Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 95 [nom. tant.].

1893 Em. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur. 77).

Cissus Oliveriana (Engl.) Gilg in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 258; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 286.

C. arguta Hook. f. var. — *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) 295,

1898 (Ed. Luja). — IV : Tumba (Luja, 120).

Cissus polycymosa *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52.
1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2715).

Cissus producta [*Afzel.*] *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 493;
De Wild. Miss. Laurent (1905) 149.

Vitis — *Afzel.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 389; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 16 et Pl. Thonnerianae (1900) 24.

1896 (Fr. Thonner.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — IX a : Gali (Thonn. 18).

Cissus prostrata *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 13;
Reliq. Dewevr. (1901) 49 et Pl. Gilletianae, I (1900) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 74]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 149 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52, 163.

1895 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Dew. 487); Sabuka (Ém. Laur.): entre Dembo et le Kwango (But.); Kimuenza (Gill. 1724); Lemfu (But. in Gill. 3482); rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3019, 3578).

Cissus Smithiana [*Bak.*] *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 490; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 95.

Vitis — *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 391; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 25.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — IX a : Bogola (Thonn. 108).

Cissus suberosa [*Welw.*] *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 481; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 9 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 9]; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 40.

Vitis — *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 392.

1893 (Ém. Laurent). — II : Ile des Princes (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.) — VIII : Coquilhatville (Dew.). — IX : Bolombo; Umangi (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.).

Cissus tenuicaulis *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 266; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 95.

Vitis — *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 404.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johust.).

Cissus tillifolia *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 491; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 95.

1870 (G. Schweinfurth). — XII : Munza [pays des Mangbettu] (Schw. 3485).

Cissus trinervis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 210.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafa. — Nom vern. : **Lendja** (Verd. 181, 221).

RHOICISSUS Planch.

Rhoicissus edulis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 86 et 209 t. 41, fig. 6-10.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kasungana** (Verd. 302).

Rhoicissus Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 85, 209 t. 41 fig. 1-6.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kaluma-kalenda** (Verd. 364).

LEE A L.

Leea guineensis *G. Don* Gen. Syst. Bot. I (1831) 712; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 164; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 163, 286 et *Miss. Laurent* (1905) 150.

L. sambucina *Schumach. et Thonn.* [non *Willd.*] Beskr. Guin. Pl. (1827) 124; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 415; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 96. *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 16; II (1900) 13; *Pl. Gilletia-uae*, I (1900) 19; *Reliq. Dewevr.* (1901) 50 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 129.

1890 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Ern. Dew.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Banza-Putu (Dew.); Luvituku (Dem.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **liatamba** (Pyn.).

SAPINDACEAE

PAULLINIA Schum.

Paullinia pinnata *L.* Sp.-pl. ed. I (1753) 366; *Gaertn.* De fruct. et semin. I, t. 79; *DC.* Prodr. I, 604; *Lam.* Pl. bot. Encycl. II t. 318; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 419; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 249; *Radlk.* Monog. Paullinia (1895) 69; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 96; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 17 et Étud. fl. Kat. (1903) 82; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 116,

P. senegaleusis *Juss.* in *Ann. Mus. Paris*, IV (1804) 348; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I, 116.

P. uvata *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 195.

P. africana *G. Don* Gen. Syst. Bot. I (1831) 661.

1816 [Chr. Smith]. — Bas-Congo (Sm.). — II : Ile des Princes (Dup.). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba [plateau au S. de la Lukula] Cabra-Michel; le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : entre Tumba et Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kisantu. — Nom vern. : **Lubula-Kutu** (Gill.). —

VI : vallée de la Djuma (Gill. et Gent.); Ile en face de Dima (Leser.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Aug. Kreckels). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : bassin du Sankuru; Batempa (Ém. et M. Laur.); Lusambo (Ém. Laur.); Djoko-Punda (Leser.). — XVI : Lukafu (Verd.).

CARDIOSPERMUM L.

Cardiospermum grandiflorum Sw. Prodr. veget. Ind. occid. (1788) 64; *Radlk.* in Sitzungsab. Akad. Muench. VIII (1878) 260; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 166; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52].

1892 (F. Demeuse). — IV : Kitobola (Pyn.). — II a : bord de la Lulu (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — IX a : la Mongala (Dem.). — XV : embouchure du Luebo (Desc.).

— — form. **hirsutum** *Radlk.* in Sitzungsab. Akad. Muench. VIII (1878) 260 et in *Mart.* Fl. Bras. XIII² (1897) 436; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 14 et Reliq. Dewevr. (1901) 50; *Hiern*. Cat. Welw. Pl. I, 167.

C. barbicaule *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 418.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — IX : env. de Bumba. — Nom vern. : Doando (Dew.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Cardiospermum Halicacabum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 366; *Bot. Mag.* (1807) t. 1049; *DC.* Prodr. I, 601; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II t. 308; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 417; *Boiss.* Fl. Or. 1, 945; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 107; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 96; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 114-115.

C. glabrum *Schumacher* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 197.

C. microcarpum *Kunth* in *Humb.* et *Bonpl.* Nov. gen. et sp. pl. V (1821) 104; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 418.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukuugu (Hens). — V : env. de Bolobo (Dew.); Kisantu (Gill.). — VIII : Haut-Lopori (Bieler). — XII : entre Bima [XII a] et Buta [XII d] (Ser.). — XVI : Pala (Desc.).

ALLOPHYLUS L.

Allophylus africanus P. Beauv. Fl. d'Oware, II (1807) 74 t. 107; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 167; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 746].

Schmiedelia — *DC.* Prodr. I (1824) 610; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 421.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kimueenza; Kisantu; entre Kisantu et Dembo (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte); env. de Lemfu (But.); rég. de Sauda (Odd.). — VIII : env. d'Eala (Ém. Laur.). — IX : Baugala (Dew.); Nouvelle-Auvers (Pyn.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Allophylus congolanus *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 294.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Allophylus leptocaulos *Radlk.* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 17 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 51.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwo (Dew. 1046).

Allophylus longipetiolatus *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 286.

1872 (G. Schweinfurth). — XII d : bassin du Gadda [Mangbettu] (Schw. 3523).

Allophylus macrobotrys *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 288; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 51; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 383.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 650). — X : Ubangi (Ém. Laur.).

Allophylus Schweinfurthii *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 286.

1872 (G. Schweinfurth). — XII d : forêts au S. de Mbruoole (Schw. 3668).

DEINBOLLIA Schumach. et Thonn.

Deinbollia insignis *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 250; *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 431; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 97.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Deinbollia Laurentii *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 144.

1903 ? (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

LYCHNODISCUS Radlk.

Lychnodiscus cerospermus *Radlk.* in *Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam.* III, 5 (1890) 344; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 296.

1896 ? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

CHYTRANTHUS Hook. f.

Chytranthus Gerardi *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 283.

1902 (Ch. Gérard). — V : rég. de Kimueuza (Gér. in Gill. 2045).

Chytranthus Gilletii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 284.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

Chytranthus Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 146.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.).

Chytranthus stenophyllus *Gily* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 297 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 285.

1898 (J. H. Camp). — Bas-Congo (Camp). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1906, 2070).

RADLKOFERA Gilg.

Radlkofera calodendron *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 300 ;
De Wild. Miss. Laurent (1905) 144.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.).

PANCOVIA Willd.

Pancovia Harmsiana *Gily* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 302 t. 2
fig. G.

1885 (R. Buettner). — VI : Gauga près Muene-Putu-Kasongo (Buett. 498).

BLIGHEA Koen.

Blighea Wildemanniana *Gilg* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-
Cgo, II (1908) 296 [nom. tant.].

1900 (J. Gillet). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : env. de Kisantu (Gill. 1823).

ERIOCOELUM Hook. f.

Eriocoelum macrospermum *Gily* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et
Moy.-Cgo, II (1908) 296 [nom. tant.].

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.).

Eriocoelum microspermum *Radlk.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et
Moy.-Cgo, II (1908) 296 [nom. tant.].

1896 (A. Dewèvre). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 182).
— VIII : Coquilhatville (Dew. 608).

PHIALODISCUS Radlk.

Phialodiscus Dewevrei *Gily* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-
Cgo, II (1908) 296 [nom. tant.].

1896 † (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Phialodiscus plurijugatus *Radlk.* in Sitzungsab. Akad. Muench. XX (1890) 263 in obs.; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 171; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 51; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 44.

1895 ? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — IV : entre Tumba et Kimpessa (Gill.).

Phialodiscus unijugatus *Radlk.* in Sitzungsab. Akad. Muench. IX (1879) 655; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 14.

1896 (Ém. Laurent). — IX : pays des Bangala (Ém. Laur.).

ANACARDIACEAE

MANGIFERA L.

***Mangifera indica** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 200; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 442; *Engl.* Pil. Ost-Afr. 243; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 174; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 40 et *Miss. Laurent* (1905) 143.

1903 (Ém. Laurent). — Espèce cultivée à Tenso [II a], Lulanga [VIII], Eala [IX] et à Nyangwe [XIII d] (Ém. Laur.).

ANACARDIUM Rottb.

***Anacardium occidentale** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 383; *Jacq.* Stirp. Amer. hist. t. 121; *DC.* Prodr. II, 62; *Descourtiz* Fl. des Antilles VII, t. 507; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 443; *Beddome* Fl. Sylv. Ind. t. 163; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 20; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 97; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 175.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (Dem.). — II : Boma; Ponta da Lenha (Naum.). — III : Matadi (Ern. Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Équateur [Wangata] (Ém. et M. Laur.).

SPONDIAS L.

Spondias lutea *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 613; *DC.* Prodr. II, 75; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 448; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. IV, 244; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1899) 10 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 10]; et *Reliq. Dewevr.* (1901) 52; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 146-48.

? *S. Mombin* *L. l. c.* ed. 1 (1753) 371; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 175.

S. Myrobalanus *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) 1036.

S. aurantiaca *Schumacher* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 225.

S. dubia *A. Rich.* Fl. Seneg. tent. (1832) 153.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

PSEUDOSPONDIAS Engl.

Pseudospondias microcarpa [A. Rich.] Engl. in *DC.* Monog. Phan. IV (1883) 259; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 98; *Engl.* Pl. Ost-Afr. 244; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 176; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 14 et Pl. Gilletianae, I (1900) 10; *Reliq. Dewevr.* (1901) 52; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 144.

Spondias — A. Rich. in *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832), 151, t. 40; *Olib.* Fl. trop. Afr. I, 448.

S. angolensis O. Hoffm. in *Linnaea*, XLIII (1880-82) 125.

1895 (A. Dewèvre). — II : env. de Boma. — Nom vern. : **Suza** (Dew.). — II a : Shinganga. — Noms vern. : **Suza**; **Cucunia** (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.).

LANNEA A. Rich.

Lannea velutina A. Rich. in *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 154, t. 42; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 81.

Odina — *Endl.* ex *Walp.* Repert. bot. I (1842) 550.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mu-Bumbu** (Verd. 219).

Lannea Welwitschii [Hiern] Engl. in *Engl. Jahrb.* XXIV (1898) 498; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 52.

Calesium — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 179.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 837). — IX : Bumba (Dew.).

OBS. — *Lannea* [sp.] : M. De Wildeman [Étud. fl. Kat. (1903) 208] rapporte aussi à une espèce de ce genre, un arbre appelé **N'Bumbu** découvert à Lukafu, en août 1899 par M. Edg. Verdick.

THYRSODIUM Benth.

Thyrsodium africanum Engl. in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 106; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 98.

1882 (P. Pogge). — II a : Kalamu (Ém. Laur.). — XV : Mukenge (Pg. 717, 721) : bassin de la Lulua (Pg.).

SORINDEIA Thou.

Sorindeia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 281, t. 66.

1901 (Ch. Gérard). — V : bords de la Lukaya (Gér. in Gill. 1925).

Sorindeia juglandifolia *Planch. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 440; *Marchand* Révis. Anacard. 166; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. IV, 302; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 98.

Dupuisia - *Rich.* in *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 148, t. 38.

Sapindus simplicifolius - *Don* ex *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 286, in syn. 1863 (R. Burton). — Congo (Burt.).

Sorindeia Kimuenzae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 281 t. 72.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1935, 2185).

Sorindeia Poggei *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 107; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 98.

1882 ? (P. Pogge). — XV : Mukeage (Pg. 1729).

EMILIOMARCELIA *Th. et Hél. Dur.* (4).

Emiliomarcelia Braunii [*Engl.*] *Th. et Hél. Dur.*

Trichoscypha — *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1893) III; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 52.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Shinganga (Dew. 342).

Emiliomarcelia congoensis [*Engl.*] *Th. et Hél. Dur.*

Trichoscypha — *Engl.* in Engl. Jahrb. XXXVI (1905) 222.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

Emiliomarcelia Laurentii [*De Wild.*] *Th. et Hél. Dur.*

Trichoscypha — *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 144.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Ibali [Lac Léopold II] (Ém. et M. Laur.).

Emiliomarcelia Oddoni [*De Wild.*] *Th. et Hél. Dur.*

Trichoscypha — *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 282 t. 60.

1904 (Ad. Oddon). — V : rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3659).

HEERIA *Meissn.*

Heeria abyssinica [*Hochst.*] *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 152; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 245; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 180.

(1) Un genre *Trichoscypha* étant admis en cryptogamie, nous avons dû abandonner le nom du genre créé par Hooker. Nous sommes heureux de lui substituer un nom qui rappelle la belle mission scientifique Émile et Marcel Laurent.

Anaphrenium abyssinicum *Hochst.* in *Flora*, XXVII (1844) 32; *Engl.* in *DC. Monog. Phan.* IV, 357; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 99; *Hieru* *Cat. Welw. Pl. I.* 180.

Ozoroa insignis *Delile* in *Annal. sc. nat. Sér. 2, XX* (1843) 91, t. 1 fig. 3; *Ferret* et *Galvini* *Atlas. bot.* t. 9.

Rhus — *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I (1868) 437.

1899 (Edg. Verdick). — III : Matadi (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Non vern. : **Matwi-Kabula** (Verd.).

Heeria abyssinica var. **lanceolata** [*Engl.*] *Th. et Hél. Dur.*

Anaphrenium abyssinicum *Hochst.* var.—*Engl.* in *DC. Monog. Phan.* IV (1883) 357; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. 99.

1895 (G. Descamps). — V : Kapanga (Desc.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

— — var. **latifolia** [*Engl.*] *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* (1895) 245.

Anaphrenium abyssinicum *Hochst.* var.—*Engl.* l. c. 357; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. 99.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Heeria pulcherrima [*Schweinf.*] *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 152; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 207.

Anaphrenium — *Schweinf.* *Beitr. Fl. Aethiop.* (1867) 32; *Engl.* in *DC. Monog. Phan.* IV, 356.

Rhus — *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I (1868) 436.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 86).

RHUS L.

Rhus glaucescens *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* I (1847) 143; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 437; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

MORINGACEAE

MORINGA Juss

Moringa oleifera *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* I (1783) 398 et *Pl. bot. Encycl.* II, t. 337; *Engl.* *Pfl. Ost.-Afr.* 188; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 53.

M. pterygosperma *Gaertn.* *De fruct. et semin.* II (1791) 314, t. 147; *DC. Prodr.* II, 488; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 35.

Guilandina Moringa *L.* *Sp. pl. ed. I* (1753) 546.

Hyperanthera — *Vahl* *Symb. bot.* I (1790) 30.

1895 (A. Dewèvre). — II : env. de Boma (Dew.). — XII c : Suraugo (Ser.).

CONNARACEAE

AGELAEA Soland.

Agelaea Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 56.

1895 (A. Dewèvre). — IV : la Lufu (Dew. 1435).

Agelaea Duchesnei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 9 [B. S. B. B. XXXIX, 2, 61].

1899 (Ém. Duchesne). — IX : Umangi [Bangala] (Duch).

Agelaea obliqua [*P. Beauv.*] *Bak. in Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 454; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1901) 124 et Miss. Laurent (1905) 89.

Cnestis — *P. Beauv.* Fl. d'Oware. I (1804) 97, t. 59.

A. nitida *Soland. ex Planch.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 437; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 188.

A. Demeusei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1901) 9 [B. S. B. B. XXXIX, 61].

1891 (F. Demeuse). — V : Kimuenza (Gill.). — VII : Ibali; Kutu (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dem.).

Agelaea phaseolifolia *Gilg ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 246.

1902 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 2065). — : entre Tumba et Kimpesse (Gill.).

Agelaea Poggeana *Gilg* in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, I (1895) 65.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 737); Mukenge (Pg. 726, 734).

Agelaea rubiginosa *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XIV (1891) 319; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 99.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3537).

Agelaea Schweinfurthii *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XIV (1891) 319; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Uando; Mbruole (Schw. 3090, 3099).

PAXIA Gilg.

Paxia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 6 [B. S. B. B. XXXVIII, 83]; *Reliq. Dewevr.* (1901) 51 et *Pl. Gilletiana*, I (1900) 10 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 10].

1895 (A. Dewèvre). — II a : bords du Tshaf près Zobe (Dew. 237). — V : Kisantu (Gill.).

ROUREA Aubl.

Rourea adiantoides Gilg in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 243; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 15; Pl. Thonnerianae (1900) 17; Pl. Gilletianae, I (1900) 10 et Reliq. Dewevr. (1901) 53; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 91.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisanur (Gill. 703). — VIII : Eala. — Nom vern. : Lokaka (M. Laur.); env. de Bokakata (Dew. 772 a). — IX : route de Lisala [Umangi] (Ém. Duch.). — XV : Kapinga (Ém. et M. Laur.).

Rourea bamangaensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 62 [B. S. B. B. XXXVIII², 82] et Reliq. Dewevr. (1901) 53.

1896 (A. Dewèvre) — XIII c : Bamanga (Dew.).

Rourea chiliantha Gilg in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 242.

1883 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 727, 732, 739 a, 745, 746, 747, 757).

Rourea fasciculata Gilg in Engl. Jahrb. XIV (1891) 329; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100.

1883 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 731).

Rourea Foenum-graecum *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 18; Ill. fl. Cgo (1899) 75, t. 38 et Reliq. Dewevr. (1901) 54.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boina (Dew. 424).

Rourea inodora *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 71, t. 36; Contr. fl. Cgo, I (1899) 17 et Reliq. Dewevr. (1901) 54; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 98.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Kembo (Dew. 442). — V : Léopoldville (Ém. et M. Laur.).

Rourea olliquifoliolata Gilg in Engl. Jahrb. XIV (1891) 328; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 248.

1883 (P. Pogge). — V : Sanda (Gill.). — XV : le Kasai (Leser. 120); Mukenge (Pg. 3120, 3411).

Rourea ovalifoliolata Gilg in Engl. Jahrb. XIV (1891) 327 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 192; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 15 et Étud. fl. Kat. (1903) 182.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.) : Lukafu. — Nom vern. : Kansolo-solo (Verd. 1218).

Rourea Poggeana *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 326; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 748).

Rourea pseudobaccata *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 325; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 124, 248 et Miss. Laurent (1905) 91.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 3526); Uyole (Gill.). — IX : Umangi (Krek.). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Mabodebache [Congo ?] (Schw. 2969).

Rourea splendida *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 222; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 744).

Rourea unifoliolata *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 325; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100.

1882 (P. Pogge). — XVI : Mukeuge (Pg. 1426).

Rourea viridis *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 327; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 92 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 248.

1882 (P. Pogge). — V : env. de Kwamouth (Ém. et M. Laur.); Sanda (De Brouw, in Gill. 3032). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — IX : Lisala (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukenge (Pg. 750); Bolongula (Ém. et M. Laur.).

CONNARUS L.

Connarus Englerianus *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 316; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 752).

Connarus luluensis *Gilg* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 64.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua, vers le 6° lat. (Pg. 741).

Connarus Stuhlmanni *Planch.* in Linnaea, XXIII (1850) 4; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. 1, 458; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 124, (1906) 246.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Shinganga (Dew.).

MANOTES Soland.

Manotes Aschersoniana *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 331; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 751).

Manotes brevistyla Gilg in Engl. Jahrb. XIV (1891) 334; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1882 (P. Pogge). — XV : Musumba: la Lulua (Pg. 532, 739).

Manotes Cabrae De Wild. et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 10 [B. S. B. B. XXXIX², 62].

1897 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra, 30, 106). — V : bords de la Pioka (Ém. Laur.); env. de Sanda (Vermeulen). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Manotes Griffoniana Baill. in Adansonia, VII (1866-67) 244; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., I, 460; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 189; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113].

1816 (Chr. Smith). — Congo (Dew. 434). — Bas-Congo (Sm.).

Manotes Laurentii De Wild. Miss. Laurent (1905) 90.

1895 (Em. Laurent). — V : bords de la Pioka (Ém. Laur.); env. de Sanda (Vermeulen, in Gill. 3436; Odd. in Gill. 3533). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Manotes pruinosa Pax in Engl. Jahrb. XIV (1891) 332; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 14 et Reliq. Dewevr. (1901) 55 in obs.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 246.

M. sanguineo-arillata Gilg in Engl. Jahrb. XIV (1891) 333; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113].

1882 (P. Pogge) — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Lemfu (But.); Kisantu (Gill. 91, 628, 805); env. de Dembo (Gill.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); bords de la Pioka (Ém. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 1054). — XV : bords de la Lulua (Pg. 724); Isaka (Ém. et M. Laur.); Mukenge (Pg. 718, 749).

CNESTIS Juss.

Cnestis corniculata Lam. Encycl. méth. Bot. III (1789) 23; *DC.* Prodr., II, 87; *Planch.* in Linnaea, XXIII (1850) 440; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 461; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Burton).

Cnestis ferruginea DC. Prodr. II (1825) 87; *Planch.* in Linnaea, XXIII (1850) 440; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 462; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 102; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 56; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 190.

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (Gill.). — VI : rég. de Luanu (Lescr.). — VIII : Eala (Pyn.); Lac Tumba (Ém. Laur.); Coquilhatville. — Nom vern. : **Kutum-bulu** (Dew.). — IX : Lisala; Mobeka (Ém. Laur.). — XV : Kamba [Sankuru] (Ém. Laur.).

Cnestis ferruginea var. **pilosa** A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII⁵ (1894) 98; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 102.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

?**Cnestis grandiflora** *Gilg* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 70.

1886 (L. Marques). — XV ? : entre le fleuve Luaschim et la Chicapa (Marq. 268).

Obs. — Il est difficile de se rendre compte si cette plante a été réellement trouvée sur le territoire du Congo belge.

Cnestis grandifoliolata *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 74].

1900 (J. Gillet) — V : Kisantu (Gill. 1420).

Cnestis iomalla *Gilg* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 169; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 91 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 247.

C. emarginata *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 4. [B. S. B. B. XXXVIII⁵, 81]; Ill. fl. Cgo (1900) 129, t. 65 et Reliq. Dewevr. (1901) 125.

1888 (P. Pogge). — V : Galiema (Ém. Laur.); Léopoldville (Schlt.). — VI : Madibi (Lescr. 85). — XV : Mukenge (Pg. 930).

Obs. — En 1896, Dewèvre découvrit cette espèce sur la rive française du Stanley-Pool.

— — var. **grandifoliolata** *De Wild.* l. c. (1900) 247.

1904 (Éd. Lescrauwaet). — VI : Madibi (Lescr. 115).

Cnestis Lescrauwaetii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo (1906) 247.

1904 (Éd. Lescrauwaet). — VI : Madibi (Lescr. 88).

Cnestis oblongifolia *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 462; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 102; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 56; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 248.

1888 (Fr. Hens). — II a : brousse de la Lukula (Dew. 553). — V : Léopoldville (Schlt.); env. de Sanda (Old. in Gill. 3549). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 106).

Cnestis polyantha *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 215.

1882? (P. Pogge) — XV : Musumba, 8¹/₂° Pg. 147).

Cnestis setosa *Gilg* ex *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 102 et in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1896) 70; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113]; Contr. fl. Cgo, I (1899) 18; Reliq. Dewevr. (1901) 56 et Pl. Gilletianae, I (1900) 10 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 10].

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Cabra). — II a : la Lukula. — Nom vern. : **Teuze** (Ém. Laur.); Shimbete (Dew.); la Lemba (Dew. 160). — V : Kisantu (Gill. 150).

Cnestis urens Gilg in Engl. Jahrb., XIV (1891) 330; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 102.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu à Kusumba (Schw.).

LEGUMINOSACEAE

PAPILIONACEAE

CROTALARIA L.

Crotalaria aculeata De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 185.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kamima** (Verd. 106).

Crotalaria brevidens Benth. in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. II (1843) 585; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 37; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 3 [B. S. B. B. XXXVII, 46] et Reliq. Dewevr. (1901) 57; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 256; II (1907) 145.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambé. — Nom vern. : **Monwe-Monwe** (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Luana (Leser.); Eicolo (Krek.). — VII : Kutu; la Fini (Ém. et M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XII c : Gombari (Ser.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Abakusso** [Amadi]; **Asuroli** [Abarembo].

Crotalaria calycina Schrank Pl. rar. Hort. Monac. (1819) t. 12; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 15; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 197; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132, (1906) 256.

1898 (Ed. Luján) — IV : distr. des Cataractes (Luján). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.).

Crotalaria capensis Jacq. Hort. Vindob. III (1776) 36, t. 64; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 38; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 8 [B. S. B. B. 36^a, 54].

1894 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

Crotalaria comosa Bak. in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II (1871) 34; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 203; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

Crotalaria Cornetii *Taub.* et *A. Dewèvre* ex *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIV² (1895) 94; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 50; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 50.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.); Lukafu (Verd. 607).

Crotalaria cylindrocarpa *DC.* Prodr. II (1825) 133; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 40; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 8 [B. S. B. B. XXXVI², 54]; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1906) 256; II (1907) 145.

1895 (P. Dupuis). — I : Moanda (Gill.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Dolo (M. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.); Kisantu (Gill.); Tumba; Lukolela (Ém. Laur.). — VI : Eielo (Ém. Laur.). — VII : Lac Léopold II (Ém. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.); Nouvelle-Anvers (Ém. Laur.).

Crotalaria Descampsii *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVI², 53] et Ill. fl. Cgo (1899) 69, t. 35.

1891 (G. Descamps). — XVI : Haut Marungu (Desc.).

Crotalaria dubia *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 185.

1900 (Edg. Verdickl.). — XVI : Lukafu (Verd. 430).

Crotalaria filifolia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 256 t. 45, fig. 3-9.

1891 (G. Descamps). — XV : rég. du Lualaba ? (Desc.).

Crotalaria glauca *Willd.* Sp. pl. III (1800) 974; *DC.* Prodr. II, 127; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II, 12; *Hieron.* Cat. Welw. Pl. I, 195; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103.

1885 (R. Buettner). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool; entre Bolobo et Lukolela (Buett.); env. de Léopoldville; Kisantu; Kimuenza (Gill.). — VII : rives du Lac Léopold II (Ém. Laur.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.). — XVI : la Lofoi; Lukafu (Verd.).

Crotalaria globifera *E. Mey.* Comment. pl. Afr. austr. I (1835) 24; *Benth.* in Lond. Journ. of Bot. II (1843) 581; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 41; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103.

C. macrostachya *Sond.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 26.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

— — var. **stenophylla** *Taub.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 170.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 849).

Crotalaria Hildebrandtii *Valke* in Oest. Bot. Zeitschr. XXIX (1879)

220; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 207; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 145.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo, parfois plante près des villages (Ém. Laur.). — II a : Benza-Masola; Temvo (Ém. Laur.). — V : Kisantu et env. (Gill.); en aval de Tumba (Ém. Laur.).

Crotalaria intermedia *Kotschy* in Sitzb. Akad. Wien, Math.-Nat. L. Abth. 1 (1865) 362, t. 3; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 37; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103.

1893 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dup.).

Crotalaria katangensis A. *Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 99; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katauga (Corn.).

Crotalaria lanceolata *E. Mey.* Comm. pl. Afr. austr., I (1836) 24; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II, 36; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 8 [B. S. B. B. XXXVI², 54]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132; II (1907) 145.

1897 (Alph. Cabra). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Chenal-Kasai (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.); rég. de Lula-Lumeue (Hendr.). — XII c : Niangara (Delp.). — Iud. non cl. : Lombe (Cabra).

Crotalaria linearifolia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 257 t. 45 fig. 1 et 2.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Crotalaria longifoliolata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 187.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom veru. : *Kinkandja* (Verd. 362).

Crotalaria lukafuensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 184.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : *Kapumpo* (Verd. 469).

Crotalaria mesopontica *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 205 et ex *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 383.

1894 (G. A. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

Crotalaria oligostachya *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II (1871) 41; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 204; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132 et *Miss. Laurent* (1905) 107.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — XIII a : Stauleyville (Ém. Laur.).

Crotalaria ononoides *Benth.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot., II (1843) 572; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 22; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 29 [B. S. B. B. XXXVI², 75]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 199; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132; II (1907) 146.

C. ononoides [err. cal.] ex *Schlechter* West-Afr. Kautsch. Exped. (1900) 291.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Chenal [Léopoldville-Kwamouth] (Ém. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.); Kisantu; env. de Léopoldville (Gill.); Bulebu (Ém. et M. Laur.). — VI : Eielo (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Schlt.). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XV : env. de Kanda-Kanda (Lescr.); env. de Butala (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Crotalaria Poggei *Taub.* in Engl. Jahrb., XXIII (1896) 179.

1876? (P. Pogge). — VI : le Kwango, vers 10° 30' (Pg. 157).

Crotalaria polygaloides *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II (1871) 15; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 190.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1891).

Crotalaria polyantha *Taub.* in Engl. Jahrb., XXIII (1896) 179.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 845, 846).

Crotalaria quangensis *Taub.* in Engl. Jahrb., XXIII (1896) 177.

1876? (P. Pogge). — VI : le Kwango, vers 10° 30' (Pg.).

Crotalaria senegalensis *Bacle* in *DC.* Prodr. II (1825) 133; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. 165; *Benth.* in Lond. Journ. of Bot., II (1843) 582; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 31; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103.

C. macilenta *Delile* Cent. pl. Afr. (1826) 35, t. 3 fig. 2.

1882 (H. Johnston). — Cengo (Johnst.).

Crotalaria sertulifera *Taub.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 178.

1882? (P. Pogge). — XV : Musumba, 8° 30' (Pg.).

Crotalaria sessilis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 257, t. 49.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1560).

Crotalaria spartea *R. Br.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 12; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *Schinz* Mat. fl. Cgo, I (1897) 29 [B. S. B. B. XXXVI², 75]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 196. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 107.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Bulebu (Ém. et M. Laur.).

Crotalaria spinosa *Hochst.* in *Flora*, XXIV (1841) I, *Intell.* 32; *Bak.* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.*, II, 3; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVII, 46]; *Hiern* *Cat. Welw.* Pl. I, 197.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo. — Nouv. vern. : **Kaseniengue** (Dew.).

Crotalaria stenothyrsus *Taub.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 178.

1880 (von Mechow). — VI : Chasamango (Mech. 539).

Crotalaria striata *DC.* *Prodr.* II (1825) 131; *Bot. Mag.* (1832) t. 3200; *Bak.* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.*, II, 38 et in *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* II, 84; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 104; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 47, (1906) 258; II (1907) 147.

C. Saltiaua Andrews *Bot. Repos.* X (1811) t. 648.

C. pisiformis Guill. et Perr. *Fl. Seneg. tent.* (1832) 162.

C. Brownei Berth ex DC. *Prodr.* II (1825) 130; *Rehb.* *Hort. bot.* (1830) t. 232.

1893 (P. Dupuis). — II : Boma (Dup.). — II a : le Maynmbé (Dup.). — V : Léopoldville (M. Laur.); Dolo (Schlt.); env. de Dembo (Gill.); env. de Kwamouth (Biel.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Ind. non cl. : Lone Island [Angola?] (Buett.).

— — form. **latifoliolata** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 48, 258 et *Miss. Laurent* (1905) 107.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.). — VIII : Eula (Ém. Laur.).

Crotalaria subcapitata *De Wild.* *Étud. fl. Kat* (1903) 186.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 611).

TRIFOLIUM L.

Trifolium Goetzenii *Taub.* in *von Goetzen* *Durch Afrika* (1895) 384, 386, et in *Engl. Jahrb.*, XXIII (1896) 180.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

RHYNCHOTROPIS Harms.

Rhynchotropis Poggei [*Taub.*] *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXX (1901) 86.

Indigofera — *Taub.* in *Engl.* et *Prantl* *Nat Pflanzenfam.* III, 3 (1894) 260 fig. 115 H-K et ex *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 284.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango à 12 ½° lat. (Pg. 138).

INDIGOFERA L.

Indigofera astragalina DC. Prodr. II (1825) 228; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 89; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVII, 47] et Pl. Thonnerianae (1900) 18.

1895 (Ém. Laurent). — IX : Yabosumba près Dobo (Thon. 81). — XV : Luebo (Ém. Laur.).

Indigofera Bideri Kotschy in Sitzb. Acad. Wien, Math.-Nat. LI, Abth. II (1865) 364, t. 6b [Pl. Binderianae]; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 91; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa]; Pweto (Desc.).

Indigofera Butayei De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132, 258.

1900 (J. Gillet). — V : le Stauley-Pool (Camp); Kisantu (Gill. 960); Lemfu (But. in Gill. 1208).

Indigofera capitata Kotschy in Sitzb. Acad. Wien, Math.-Nat. LI, Abth. II (1865) 365 [Pl. Binderianae]; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 91; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Af. 209; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 104; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 208; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 58.

Anil — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 939.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : bords de l'Owali à Shinganga (Dew.); Bingila (Dup.). — V : env. du Stanley-Pool et de Léopoldville (Hens); Dolo (Schlt.); entre Bolobo et Lukolela (Buett.); Kisantu : env. de Dembo (Gill.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — VIII : Équateur (Pyn.). — XIII d : Nord-Maniema (Cabra-Michel). — XV : Butala (Ém. Laur.).

Indigofera congesta Welw. ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 70; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 206; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 811); Lemfu (But. in Gill. 1209); Kimuenza (Gill. 776).

Indigofera congolensis De Wild. et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 11 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 11] et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1732); Lemfu (But. in Gill. 1134).

Indigofera Dewevrei M. *Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 8 [B. S. B. B. XXXVI², 54]; *De Wild.* et *Th. Dur.*

Ill. fl. Cgo (1899) 59, t. 30 et Reliq. Dewevr. (1901) 58; Pl. Gilletianae, I (1900) 8 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 12] et *De Wild. Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 258.

1888 (Fr. Hens). — II : Zambi (Dew. 197). — IV : Lukungu (Hens, A. 275); Kisantu (Gill. 854, 877, 957). — XV : le Lualaba (Dew.).

Obs. — M. R. Schlechter [West.-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 291] croit que cette espèce n'est pas spécifiquement distincte de *Pl. polysphaera* Bak.

Indigofera Dupuisii M. Micheli in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 9 [B. S. B. B. XXXVI², 55] et in *De Wild. et Th. Dur. Ill. fl. Cgo* (1899) 97, t. 49.

1895 (P. Dupuis). — V : Bingila (Dup.).

Indigofera endecaphylla Jacq. Collect. bot. II (1788) 358 et Icon. pl. rar. t. 570 [hendecaphylla]; Bak. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 96; *Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 210; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56]; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 214; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 108 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 146.

Anil — O. Kuntze, *Rev. Gener.* (1891) 939.

1895? (G. Descamps). — VIII : Eala (Ém. Laur.). IX : Bolombo; Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.); Bumba (Pyn.).—XIII a : Romée (Van Goitsenhoven).—XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Masanze [Mazanze? XIV]. (Desc.).

Indigofera erythrogramma Welw. ex Bak. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 73; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 73; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 207; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 3 [B. S. B. B. XXXVII, 46]; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 15 et Reliq. Dewevr. (1901) 8.

1886 (R. Buettner).—Congo (Dem.).—V : le Stanley-Pool (Buett.); Mout Léopold (Luja); env. de Léopoldville (Luja); Dolo (Schlt.); Kisantu et env. (Gill.); Kismuenza. — Nom vern. : **Mcaca** (Dew.); entre Kisantu et le Kwaugo (But.).

Indigofera erythrogrammoides De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 133.

1903 (Xav. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Heudr. in Gill. 3063).

Indigofera Garckeana Vatke in *Oest. Bot. Zeitsch.* XXIX (1879) 221; *Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 135; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 135.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill. 1295).

Indigofera Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 12 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 12]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

1930 (J. Gillet). — V : rég. de Lula-Lumene (Heendr. in Gill. 3062); Kisantu (Gill. 583, 737. 881).

Indigofera Heudelotii *Benth. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1874) 85; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 108.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Indigofera hirsuta *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 751; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 88; *Hook.* Compan. Bot. Mag. t. 24; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 209; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo. (1896) 105; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 212; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 51 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

Anil — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 160.

1882 (H. Johnston). — Bas-Congo (Johnst.). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — V : Yumbi (Ém. et M. Laur.); Suata (Buett.); Kisantu (Gill.). — VII : Baseuge (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.). — XVI : env. de Lukafa (Verd.).

Indigofera kisantuensis *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 13 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 13].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 839).

Indigofera moeroensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 133.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lac Moero (Verd.).

Indigofera paucifolia *DC.* Prodr. II (1825) 234; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II (1874) 88; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56].

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Indigofera polysperma *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 14 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 14]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 108.

1893 (Ém. Laurent). — II a : la Lukula (Ém. Laur.). — V : env. de Kwamouth (Biel.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimpoko (M. Laur.); Kisantu (Gill. 656, 736, 919).

Indigofera procera *Schumacher et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 365; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 74; *Th. Dur. et De Wild.*

Mat. fl. Cgo, I (1897) 29 [B. S. B. B. XXXVI², 75]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 207; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 14 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 14] et *Confr. fl. Cgo*, II (1900) 15; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

Anil procerà *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 939.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); rive N. du Kasai (Luja); Kisantu (Gill.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — XII c : entre Niangara et Gombari (Ser.).

Indigofera Schimperii *Jaub. et Spach* Ill. pl. orient. V (1857) 94, t. 484; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II, 93; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

1891 (G. Descamps). — XVI : vallée du Lofoi (Desc.); Lukafu (Verd. 61).

Indigofera scopa *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 60.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Lusonga (Dew. 1027 b).

Obs. — Cult. autour des villages pour faire des balais (Dew.).

Indigofera secundiflora *Poir.* Encycl. méth. Suppl. III (1813) 148; *DC.* Prodr. II (1825) 228; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II, 94; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 210; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 59.

I. oligosperma *DC.* l. c. II (1825) 228; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 181; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I, 181.

I. glutinosa *Schumach. et Thonn.* [non *DC.*] Beskr. Guin. Pl. (1827) 370.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 90).

Indigofera tetraptera *Taub.* ex *Harms* in *Engl.* Jahrb. XXIII (1896) 181.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (P'g. 795).

Indigofera tetrasperma *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 365; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 75; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 8 et II (1898) 3 [B. S. B. B. XXXVI², 54 et XXXVII, 46].

1895 (G. Descamps). — V : Dolo (Schlt.). — XV : rives du Kasai (Ém. Laur.). — XVI : Toa (Desc.).

Indigofera trita *L. f.* Suppl. pl. (1781) 335; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 86; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 210; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVII, 47] et Reliq. Dewevr. (1901) 59.

1896 (A. Dewèvre: Eug. Wilwerth). — V : Kisantu (Gill. 938, 946). — IX : Upoto (Wilw.). — XI : Bena-Kamba. — Nom veru. : **Kommolobilo** (Dew. 1099 a).

Indigofera variabilis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 134.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 734).

TEPHROSIA Pers.

Tephrosia bracteolata *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 194; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 116; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 105; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 211; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 142, (1906) 261 et *Miss. Laurent* (1905) 111.

Cracca — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1901) 174; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 221.

1886 (R. Buettner). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Dolo (Schlt.); le Stanley-Pool (Buett.); Chenal : Mopolenge (Ém. et M. Laur.); rég. de Lula-Lunienc (Hendr.) : Kisantu : env. de Kimuena (Gill.). — VI : Etiolo (Ém. et M. Laur.). — XV : Bolombo; Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Tephrosia Butayei *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 75 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 747].

1900 (R. Butaye). — V : ravin de la Sele (But. in Gill. 1444).

Tephrosia curvata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 190.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kambalubala** (Verd. 403).

Tephrosia elegans *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 376; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 118; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 142, (1906) 261; II (1907) 149 et *Miss. Laurent* (1905) 111.

Cracca — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 175; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 221.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (But.). — II : Zambi (Dew.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : Dolo (Schlt.); Chenal [Leo-Kwamouth] (Ém. et M. Laur.); env. de Léopoldville (Gill.); Lula-Lumeue (Hendr.); Kisantu (Gill.).

Tephrosia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 192.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Tephrosia Kindu *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 191.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kakindu-kindu** (Verd. 439).

Tephrosia Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 111.

1895 (A. Dewèvre). — I : Banana (Dew. 155; M. Laur.).

Tephrosia linearis Pers. Syn. pl. II (1807) 330; *DC. Prodr.* II (1825) 254; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 130; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 211; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 19 et Reliq. Dewevr. (1901) 59; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 262.

Cracca — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 175; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 222.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — V : Bokala (M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.).

Tephrosia lupinifolia *DC. Prodr.* II (1825) 255; *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 204; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 107; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 211; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 105; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 142 et Miss. Laurent (1905) 111.

Cracca — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 175; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 219.

Rhynchosia Cienkowskii Schweinf. Reliq. Kotschyanae (1868) 31, t. 24-26.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kimuenza (Gill.); Bulebu (Ém. et M. Laur.).

— — var. **digitata** *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 107; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. 106.

T. digitata *DC. Prodr.* II (1825) 255

1885 (R. Bnetner). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buett.).

Tephrosia megalantha *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 11 [B. S. B. B. XXXVI², 57]; Ill. fl. Cgo (1899) 79 t. 40 et Reliq. Dewevr. (1901) 60.

1895 (A. Dewèvre). — V : env. de Kimuenza (Dew. 1520). — XV : Lusambo (Ém. Laur.). — Nom vern. : **Bongo** (Mobaugni).

Tephrosia nseleensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 141, t. 36.

1900 (R. Butaye). — V : bassin de la Sele (But. in Gill. 1448).

Tephrosia noctiflora *Boj.* Hort. Maurit. (1837) 93; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 112; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49].

1894 (Ém. Laurent). — V : Mont Léopold [Léopoldville] (Luja). — XV : brousse à l'E. de Lusambo (Ém. Laur.).

Obs. — Une forme [magis pubescens] croît sur les bords du Lomami [distr. ?] (Ém. Laur.).

Tephrosia villosa [L.] Pers. in DC. Prodr. II (1825) 213; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 132; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 55]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 149.

Cracca — L. Sp. pl. ed. I (1753) 752; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 223.

1891 (G. Descamps). — V : Léopoldville (Pyn.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XVI : Pala (Desc.). — Nom vern. : **Buka** [Kwilu]; **Luvanki** [Bangala] (Sap.).

Tephrosia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 192.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

Tephrosia Vogelii *Hook. f.* ex *Hook.* Niger Fl. (1819) 296; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 110; *Ficalho* Pl. Uleis (1884) 130; *Taub.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 211; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 106; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 15 et Reliq. Dewevr. 60; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 51; Miss. Laurent (1905) 112 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 262.

Cracca — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 175; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 220.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : Vungu-Singa (Dup.). — V : C. dans les villages près du Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. de Mobanga. — Noms vern. : **Lopangui-panga**; **Pophangue** (Dew.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : Wanje-Rukula (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kabala** (Verd.).

MILLETIA Wight et Arn.

Milletia Baptistarum *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 50; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 106; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 229.

1885 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett.).

Milletia breviflora *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 136.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2845).

Milletia brevistipellata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 193.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Solemosji** (Verd. 55).

Milletia Cabrae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 136.

1897 (Alph. Cabra). — Ind. non cl. : forêt d'Inteba (Cabra, 110).

Milletia congolensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 15 [B. S. B. B. Sér. 2, I, 15] et Reliq. Dewevr. (1901) 61; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 140, (1906) 259 et Miss. Laurent (1905) 109.

M. macrophylla *M. Micheli* [non *Hook. f.*] in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVII, 47]

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Léopoldville et Sabuka (Luja, 33); Sanda (De Brouw. in Gill. 3033, 3133); Kisantu (Gill. 87, 383; Sadi [Ikisi] (Cabra-Michel, 33). — VI : vallée de la Djuma (Geut. : Gill. 2852). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

***Milletia Demeusei* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 137.

1891 (F. Demeuse). — XI : Yamonongeri (Dem. 413).

***Milletia drastica* Welw.** ex *Bak* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 128; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 92; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 106; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 226; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 15] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 61; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 193

Phaseolodes — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 202.

1885 (R. Buettner). — V : le Stanley-Pool (Buett. 252); Kisantu (Gill. 99). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kafita**; **Dimanba** (Verd. 109, 290). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc. 681).

***Milletia dubia* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 137.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Geut. : Gill. 2875).

***Milletia Duchesnei* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 138.

1898 (Ém. Duchesne). — XIII a : route de la Tshopo à Stanleyville (Duch. 4).

***Milletia Gentilii* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 138, (1906) 258, t. 53.

1902 (L. Gentil). — V : rég. de Sanda (Verm. in Gill. 3433). — XV : vallée de la Loange (Geut. 29).

***Milletia Harmsiana* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 139, II (1907) 37.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kinuenza (Gill. 1919).

— — form. ***acuminata* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 147.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 454).

***Milletia Laurentii* De Wild.** in *La Belg. colon.* (1904) 378; *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1904) 341-42; *Miss. Laurent* (1905) 109 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 269; II (1907) 147.

1894 (J. Gillet). — V : Léopoldville (Ém. et M. Laur. : Dew. 523); Bolobo (Cell. 4); Kisantu. — Nom vern. : **Mbota** (Gill. 40); Kinuenza (Gill. 2164). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bokakata (Gent.).

Milletia ? macrourea Harms in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 289.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 828).

Milletia Mannii Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1874) 127; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 106; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 62 et Pl. Gilletianae, II (1901) 75 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 747]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 147.

1888 (Fr. Hens). — V : Leopoldville (Hens ; Lukolela (Pyn.) ; entre Kisantu et le Kwango (But.) ; env. de Sanda (Odd.). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : **Busembo** (Dew. 786) ; Equateur (Pyn.) ; Eala (M. Laur. ; Pyn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.).

Milletia Teuszii [Buett.] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 140, (1906) 260, t. 48 ; II (1907) 147 et Miss. Laurent (1905) 110.

Louchoecarpus — *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1891) 51.

1880 (von Mechow). — V : rég. de Kisantu (Gill. 605, 2527) ; env. de Kimuenza (Gill. 1677) ; rég. de Sanda (Verm. in Gill. 3833) ; env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VI : le Kwango (v. Mechow). — VIII : Ikenge (Malchair in M. Laur. 935) ; Injolo (M. Laur. 1884). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.) ; le Sankuru (Ém. Laur.).

Milletia Thonningii [Schumach. et Thonn.] Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1874) 128; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 128; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 18 et Reliq. Dewevr. (1901) 62; Pl. Gilletianae, II (1901) 75 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 747]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 140, (1906) 260; II (1907) 147.

Robinia — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 349.

Phaseolodes — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 202.

M. Griffoniana *Baill.* in Adansonia, VI (1866) 222; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 225.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens, 335). — II : env. de Boma (Dew. 180). — II a : bord de la Msafo (Dup.) ; le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2532) ; Lukolela (Pyn. 177) ; Kisantu (Gill. 1045, 1234 ; Kimuenza (Gill. 2192) ; Sanda (Odd. in Gill. 3308). — VI : riv. Inchina. — Nom vern. : **Bokinku** (Sap.). — VIII : env. d'Eala — Nom vern. : **M'Banza** (M. Laur. 1682, 1815) ; Irebu (Schlt.) ; Equateur (Pyn. 264). — IX : Umangi (Ém. Duch.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 963 a). — Noms vern. : **Alimne** [Ikwangula] ; **Nyangwe** [Kasongo] ; **Kasonswe** [Tanganika] (Dew.).

Milletia urophyloides *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 147.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 801, 1821).

Obs. — Cette espèce a été retrouvée au Congo français par M. A. Baudon (*De Wild.* l. c.)

Milletia versicolor *Wchbr.* ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1874) 129; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 227; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér.

du Cgo, I (1904) 343-45 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 260, t. 47; II (1907) 148.

Lonchocarpus Dewevrei M. *Micheli* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 23, t. 5 [B. S. B. B. XXXVI², 69]; *Pl. Gilletianae, I* (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 19]; *Contr. fl. Cgo, II* (1900) 17 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 72.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 413). — II a : le Mayumbe (Èm. et M. Laur.); la Lemba (Dew. 370, 841 a); *Zenze*. — Nom vern. : **Boio** (Èm. Laur.). — V : env. de Léopoldville (Dew. 524); rég. de Lukolela. — Nom vern. : **Mitoko** (Dew.); Kisantu. — Nom veru. : **M'Butu** (Gill. 41); Kimuenza (Gill. 2125); Tumba (Èm. et M. Laur.). — VII : la Fini; Noki (Èm. et M. Laur.). — IX : Bolombo (Èm. et M. Laur.); Luozi (Lujá). — XV : Luebo (Em. Laur.); Bukila (M. Laur.).

PLATYSEPALUM Welw.

***Platysepalum cuspidatum* Taub.** in *Engl. Jahrb. XXIII* (1896) 187.

1881 (P. Pogge). — XV : Samba à l'O. du Lualaba, 4° 15 (Pg. 766)

***Platysepalum ferrugineum* Taub.** in *Engl. Jahrb. XXIII* (1896) 186.

1881 (P. Pogge). — XV : bords du Lualaba vers 4° 15 (Pg. 799).

***Platysepalum hypoleucum* Taub.** in *Engl. Jahrb. XXIII* (1896) 186.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 816); village Kalebue, 5° 45 (Pg. 863).

***Platysepalum Poggei* Taub.** in *Engl. Jahrb. XXIII* (1896) 185; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 149.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 868, 901); Lubefu (Lescr. 367).

***Platysepalum Vanhouttei* De Wild.** *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 260.

1903 (Aug. Van Houtte). — V : rég. de Kisantu (Van Houtte in Gill. 3660).

***Platysepalum violaceum* Welw. ex Bak.** in *Oliv. Fl. trop. Afr. II* (1871) 131; *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 10, t. 6 et II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVI², 56 et XXXVII, 47]; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 230; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 63; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 110 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 149.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 413). — V : Léopoldville (Pyn. 157); Lukolela (Dew. 841). — VIII : Coquilhatville (Èm. Laur.); Wangata (Dew. 670); Lunga; Lac Tumba (Èm. et M. Laur.); Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala. — Nom vern. : **Moloko** (Dew. 864 a) — X : Ubangi (Èm. et M. Laur.). — XI : Bomaneh (M. Laur.). — XV : Limbutu (M. Laur.).

DEWEVREA M. Micheli.

Dewevrea bilabiata M. Micheli in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49]; *Ill. fl. Cgo* (1898) 3, t. 2; *Reliq. Dewevr.* (1901) 62; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 148.

1894 (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1687). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew. 1163); Stanley-Falls (Ém. Laur.).

SESBANIA Pers.

Sesbania aegyptiaca [Poir.] Pers. Syn. pl. II (1807) 316; *DC. Prodr.* II (1825) 264; *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 134; *Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 213; *M. Micheli in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 12, 29 [B. S. B. B. XXXVI², 58]; *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 15 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 63; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 141, (1906) 262; II (1907) 149 et *Miss. Laurent* (1905) 111.

Sesban aegypticus Poir. in *Lam. Encycl. méth. Bot.* VII (1806) 128; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 231.

Emerus *Sesban O. Kuntze Rev. Gener.* (1891) 180.

1888 (Fr. Hens). — II : Sisia (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (M. Laur.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Léopoldville (Dew.); en amont de Kinshassa (Camp); env. de Kisantu (Gill.). — VII : bords de la Fini (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Duch.). — XV : env. de Lusambo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. non cl. : Mout Angba (Ser.).

Sesbania affinis De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 141 et *Miss. Laurent* (1905) 112.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2626; Bokala (Ém. et M. Laur.).

Sesbania pubescens DC. *Prodr.* II (1825) 266; *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 135; *Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 213; *M. Micheli in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 63; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 263.

Sesban — *Hiern Cat. Welw. Pl.* I (1896) 231.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill. 3167); Bauana (Dew.). — II : Boma (Dew. 60, 70).

Sesbania punctata DC. *Prodr.* II (1825) 265; *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 133; *Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 213; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 107; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I

(1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 15]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 263; II (1907) 149.

Sesban punctatus Hiern Cat. Welw. Pl. I (1896) 230.

1874 (Fr. Naumaun). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — II : Sisia (Dup.). — V : Léopoldville (M. Laur.); Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3647); Dembo; Kisantu (Gill. 552).

CYCLOCARPA Afzel.

Cyclocarpa stellaris Afzel. ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 151 in nota; *Urban* in Jahrb. bot. Gart. Berlin, III (1884) 247 et ex *Taub.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 3 (1894) 320, fig. 112 M.; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 107; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 15]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 141, 263.

1883 (E. Teusz). — IV : Luvituku (Luja, 154). — V : le Stanley-Pool (Teusz); Dolo (Schlt.); Kimnenza (Gill. 2121); Kisantu (Gill. 340, 513, 526).

ORMOCARPUM P. Beauv.

Ormocarpum affine De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 197.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Boka** (Verd. 537).

Ormocarpum sennoides DC. Prodr. II (1825) 315; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 143; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 15]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 113 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 150.

O. sesamoides [err. cal.] *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49] et Reliq. Dewevr. (1901) 64.

Diphaca cochinchinensis Lowr. Fl. Cochinch. (1790) 454; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 233.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Lukolela [cult. dans les villages] (Pyn.); Kisantu (Gill.). — VIII : Irebu (M. Laur.). — XI : Yambuli (Em. et M. Laur.).

HERMINIERA Guill. et Perr.

Herminiera Elaphroxylon Guill. et *Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 201, t. 51; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II 144; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 107; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 233; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 19; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 51 et Miss. Laurent (1905) 113.

Aeschynomene — *Taub.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 3 (1894) 319; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 30 [B. S. B. B. XXXVI, 76]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 144.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool; Léopoldville (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Lukolela (Pyn.). — IX : Bangala (Ém. Laur.); Lisala (Ém. et M. Laur.) — XIII d : entre Nyangwe et Kasongo (Ém. et M. Laur.). — XV : Lubue [Kasai] (Gent.). — XVI : bords du Lac Moero. — Nom vern. : **Machila-Ambacha** (Verd.).

AESCHYNOMENE L.

Aeschynomene aspera L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 713; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 147; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 234; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 113

1903 (Ém. et M. Laurent). — XV : flots du Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Aeschynomene brachycarpa Harms in *Schlechter* Weslafr. Kautsch.-Exped. (1900) 292 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12524).

Aeschynomene Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 143.

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2236).

Aeschynomene Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 64.

1905 (Marc. Laurent). — V : Dolo (M. Laur. 473).

Aeschynomene Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 143.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2676).

Aeschynomene glandulosa *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 142.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Aeschynomene indica L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 713; *DC.* Prodr. II, 320; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 147 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 151; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 234; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 15].

A. sensitiva *P. Beauv.* [non *Sw.*] Fl. d'Oware I (1804) 89. t. 53.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Aeschynomene katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 188.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 229).

Aeschynomene lateritia Harms in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 292; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 144; II (1907) 150.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Kimuenza et de Kisantu (Gill. 2190, 2340); Boko (Pyn. 111).

Aeschynomene Schimperii *Hochst.* ex *A. Rich.* Tenl. fl. Abyss. I (1847) 202; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 146; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 214; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 52.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Dichilla** (Verd.).

Aeschynomene Schlechteri *Harms* in *Schlechter* West-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 293 [nom. tant.]

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12491).

Aeschynomene sensitiva *Sw.* Prodr. vegetal. Ind. occ. (1788) 107 et Fl. Ind. occ. III (1806) 1276; *DC.* Prodr. II, 147; *Benth.* in *Mart.* Fl. Brasil. XV¹, 58; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 147; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 107; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 144 et *Miss. Laurent* (1905) 113.

1888 (Fr. Hens). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : chute de Tamo (Hens); Dolo (Schlt.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.).

Aeschynomene uniflora *E. Mey.* Comm. fl. Afr. austr. I (1835) 123; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 226; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 146; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 64 et Pl. Gilletiana, I (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 15].

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

SMITHIA Ait.

Smithia Harmsiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 52.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kalemdu** (Verd. 620).

Smithia strobilantha *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 154; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 108; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 52.

Damapana — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 179; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 237.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : bords du Lac Moero (Verd.); le Katanga (Corn.).

Smithia uguenensis *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 215; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 12 [B. S. B. B. XXXVI², 58].

1893 (P. Dupuis). — II a : entre Bingila et Ki-Mpanana (Dup.).

GEISSASPIS Wight et Arn.

Geissaspis bifoliolata *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 12 [B. S. B. B. XXXVI², 58].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb. 74).

Geissaspis Descampsii *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 13 [B. S. B. B. XXXIX^a, 65].

1891 (G. Descamps). — XV : rég. des Samba (Desc.).

STYLOSANTHES Sw.

Stylosanthes erecta *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 28, t. 77; *DC.* Prodr. II, 317; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 204; *Vogel* in *Linnaea*, XII (1838) 68; *Baill.* in *Adansonia*, VI, 224; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 156; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 238, *Taub.* in *Verhandl. bot. Ver. Prov. Brandenb.* XXXII (1890) 23; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 108; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 63; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 263.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.); Banana (Dew. 56).

ARACHIS L.

Arachis hypogaea *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 741; *DC.* Prodr. II, 474; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 158; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 138; *Benth.* in *Mart.* Fl. Bras. XV^a, 86, t. 23; *Benth. et Trin.* Medic. Pl. I, t. 75; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 108; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 239; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 397-481.

1893 (Ém. Laurent). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Ifuta (Ém. et M. Laur.). — Espèce cultivée au Congo (Ém. Laur.).

ZORNIA Gmel.

Zornia diphylla *Pers.* Syn. pl. II (1807) 318; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 301; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 158; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 239 et Reliq. Dewevr. (1901) 65; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 263.

Z. glochidiata *Rehb.* ex *DC.* Prodr. II (1825) 316.

Z. gracilis *DC.* l. c. II (1825) 316.

Z. angustifolia *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 203; *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I, 43.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.).

DROOGMANSIA De Wild.

Droogmansia megalantha [*Taub.*] *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 56.

Desmodium — *Taub.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1896) 192.

Meibomia — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 243.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

OBS. — La plante du Katanga appartient à une forme que M. De Wildeman [l. c.] a appelée *longipedicellata*.

Droogmansia pteropus [Bak.] De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 54.

Dolichos — Bak. in Kew Bull. (1895) 66.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 199).

Droogmansia Stuhlmannii [Taub.] De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 55.

Desmodium — Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. (1895) 217.

Meibomia — Hiern Cat. Welw. Pl. I (1896) 244 in obs.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Pweto (Verd.).

DESMODIUM Desv.

Desmodium adscendens DC. Prodr. II (1825) 332; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 162; Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 216; M. Micheli in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I (1897) 13 [B. S. B. B. XXXVI*, 59]; De Wild. Miss. Laurent. (1905) 114.

Meibomia — O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 195; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 241.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala — Nom vern. : Ebake (M. Laur.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Desmodium barbatum Benth. et Oerst. in Kjob. Vidensk. Meddel. (1853) 18; Wall. Cat. n. 5724; Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 216; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 144.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 2018).

Desmodium dimorphum Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 161; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 16 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 16]; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 144.

1903 (Gust. De Brouwer). — V : Sanda (De Brouwer); Kisantu (Gill.).

Desmodium gangeticum DC. Prodr. II (1825) 327; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 161; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I (1897) 30 [B. S. B. B. XXXVI*, 7]; Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 216; De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 118-119.

Meibomia — O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 196; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 240.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 505). — V : Kisantu (Gill.).

Desmodium hirtum Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. (1833) 209; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 163; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo, (1896) 109.

D. setigerum E. Mey. Comm. pl. Afr. austr. (1843) 124; Harv. in Harv. et Sond. Fl. Capens. II, 229.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Hens, 360).

Desmodium lasiocarpum DC. Prodr. II (1825) 328; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 207; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 162; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 109; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 18; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 241; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 145, (1906) 263; II (1907) 150.

Meibomia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 241; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 241.

D. latifolium DC. l. c. II (1825) 327; *Bak.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 168.

Hedysarum deltoideum *Schumacher*, et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 361.

Anarthrosyne cordata *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 39, t. 7.

1882 (II. Johnston). — Congo (Johnst.); Bas-Congo (Cabra). — II a : *Bingila* (Dup.); *Benza-Masola* (Ém. Laur.); *la Lemba* (Dew.). — III : env. de *Matadi* (Ém. Laur.). — IV : *Lutete* (Hens); *Luvituku* (Dem.); *Kitobola* (Dem.). — V : *Dolo* (M. Laur.); env. de *Kwamouth* (Biel.); *Kisantu* (Gill.); *Lula-Lumene* (Hendr.); env. de *Tumba* (Ém. Laur.); *Sanda* (Odd.). — IX : *Upoto*; *Boyangi* (Thonn.); *Luozi* (Luja). — XII a et b : entre *Bima* et *Bambili* (Ser.). — XIV : *Ruzizi-Kivu*; *Luebo*. — Nom vern. : *Mutesa* (Lescr.). — XV : *Mukuudji* (Ém. Laur.); *Dibele* (Ém. et M. Laur.). — XVI : *Lukafu*. — Nom vern. : *Kindana* (Verd.). — Ind. nou. cl. : *Kibaka* [Angola?] (Buett. : brousse près du Loumami (Ém. Laur.).

Desmodium mauritianum DC. Prodr. II (1825) 334; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 162; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 109; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 216; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 65; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145, (1906) 264; II (1907) 151 et *Miss. Laurent* (1905) 114.

Meibomia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 198; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 242.

Hedysarum fruticosum *Schumacher*, et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 363.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens). — II : *Boma* (Schimp.). — II a : *Bingila* (Dup.); plateau au S. de la *Lukula* (Cabra). — III : *la Lufu* (Hens). — IV : *Madiata* (Van Houtte). — V : *Dolo* (M. Laur.); *Kisantu*; env. de *Dembo* (Gill.); *Bulebu* (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'*Eala*. — Nom vern. : *Bosasa* (M. Laur.). — IX : *Mobeka* (Ém. et M. Laur.). — XII : entre *Amadis* et *Surango* (Ser.). — XIII d : env. de *Kabanga* (Dew.). — XV : *Bukila* (Ém. et M. Laur.); — Noms vern. : *Mwandandone* [Ikwaugula]; *Yambonkolo* [Bakusu]; *Gomvonboza* [Tangauika].

Desmodium paleaceum *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1833) 209; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 166; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mal. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXX]; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 217; *Th. Dur.* et *De Wild.* Reliq. Dewevr. (1901) 66; *De Wild.* Étud. fl. Kal. (1902) 52; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145 et *Miss. Laurent* (1905) 114.

Meibomia — *O. Kuntze* [non *Kuntze*] Rev. Gener. (1891) 198.

D. oxybracteum DC. Prodr. II (1825) 334.

Meibomia — *O. Kuntze* l. c. (1891) 198; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 242.

1895 (A. Dewèvre). — II : *Boma* (Dew.). — V : env. de *Léopoldville*; *Kisantu* (Gill.). — IX : *Bolombo*; en aval de *Bumba* (Ém. et M. Laur.); env. de *Lie* (Ém. et M. Laur.). — XVI : bords du *Lukafu* dans les env. de *Lukafu* (Verd.). — XIV : *Mazanze* (Dew.). — Noms vern. : *Sonnda* [distr. des Cataractes] (Dew.).

Desmodium polygonoides *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1874) 161; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 13 [B. S. B. B. XXXVI², 59].

Meibomia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 240; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 240. 1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Desmodium tenuiflorum *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 13 [B. S. B. B. XXXVI², 59]; Ill. fl. Cgo (1899) 119, t. 60; Pl. Thonnerianae (1900) 18 et Pl. Gilletianae, I (1900) 16 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I. 16]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 264.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens, 340); rég. de Kisantu (Gill. 813, 3609). — IX a : Mundumba (Thonn. 83).

Desmodium triflorum [*L.*] *DC.* Prodr. II (1825) 334; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I, t. 291 et 292; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 110; *Taub.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 217; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 15; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145, (1906) 264.

Hedysarum — *L. Sp. pl.* ed. I (1753) 749.

H. granulatum *Schumacher* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 362.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Mout Léopold [Stanley-Pool] (Luja); le Stanley-Pool (Hens); env. de Lemfu et de Kisantu (But.); entre Kisantu et Popokabaka (But.); rég. de Lula-Lumène (Hendr.).

PSEUDARTHRIA *Wight et Arn.*

Pseudarthria confertiflora *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1874) 167; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145.

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Gill.). — XV : Mukenge (Pg.).

Pseudarthria Hookeri *Wight et Arn.* Prodr. fl. Ind. or. (1834) 209; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 168; *Taub.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 217; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 14 [B. S. B. B. XXXVI², 60]; Pl. Gilletianae, I (1900) 16; Pl. Thonnerianae (1901) 19 et Reliq. Dewevr. (1901) 66; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145, 264 et Miss. Laurent (1905) 115.

Desmodium lasiocarpum *De Wild.* [non *DC.*] Étud. fl. Kat. (1902) 53.

1891 (F. Demeuse). — IV : Kitobola (Pyu.); Luvituku (Dem.). — V : Dolo (M. Laur.); Kisantu (Gill.); Lula-Lumène; entre Kisantu et le Kwango (But.). — IX : env. de Yaminga (Pyn.); Yangula près Dobo (Thonn.); env. de Bumba (Ser.). — XIII d : Kasongo (Dew.); env. de Kabanga (Dew.). — XIV : Kalembalembe. — Nom vern. : *Kibaka* (Ser.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.); env. de Tshitadi (Leser.).

URARIA Desv.

Uraria picta [Jacq.] Desv. Journ. de Bot. I (1813) 123, t. 5, fig. 19; DC. Prodr. II, 324; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 169; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 110; Taub. in Engl. Pl. Ost-Afr. 217; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 245; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 66; De Wild. Miss. Laurent (1905) 115.

Hedysarum — Jacq. Icon. pl. rar. III (1786-93) t. 567 et Collect. bot. II, 260.

1884 (R. Buettner). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Boma (Dew.); Malela (Ém. Laur.). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba (Cabra). — III : Tondoa (Buett.); Matadi (Dem.). — IV : Banza-Mauteka (Heus). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kwamouth (Ém. Laur.); Dolo (Schlt.); env. de Sanda (Odl.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — IX : Umangi (Ém. Duch.); Luozi (Luja). — XII a et c : entre Bima et Amadis. — XII b : Bambili (Ser.). — Ind. non cl. : Lusubi (Lescr.).

ALYSICARPUS Neck.

Alysicarpus rugosus DC. Prodr. II (1825) 353; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 171; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 16 [B. Herb. Bois. Sér. 2, 1, 16]; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 246.

Fabricia — O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 182; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 246.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu; entre Kisantu et Dembo (Gill.).

Alysicarpus vaginalis [L.] DC. Prodr. II (1825) 353; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 170; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 110; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 66; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 261; II (1907) 151.

Hedysarum — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 746.

H. nummularifolium — L. l. c. ed. 1 (1753) 746.

Fabricia — O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 181; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 246.

Alysicarpus Harnieri Schucinf. Reliq. Kotschyanae (1868) 24, t. 19.

1885 (R. Buettner). — I : Bauana (Ém. Laur.). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — III : Tondoa (Buett.); Matadi (Ém. Laur.).

ABRUS L.

Abrus canescens Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 175; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 248; De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, I (1897) 14 [B. S. B. B. XXXVI², 60; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 150; II (1907) 153.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — V : rives du Kasai (Luja); Kwamouth et env. (Biel.; M. Laur.); Sanda (De Brouw.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XII a et b : entre Bima et Bambili (Ser.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kampanda-panda (Verd.).

Abrus precatorius L. Syst. veget. ed. 12 (1767) 472; *Descourtilz* Fl. des Antilles, IV, t. 275; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 608; *DC.* Prodr. II, 381; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 212; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 175; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 444; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 247; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 104-105.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naumann). — II a : Bingila (Dup.). — IV : distr. des Cataractes (Luja). — V : bords du Kasai (Luja). — VIII : Coquilhatville — Nom vern. : *Tensi* (Dew.); env. d'Eala (M. Laur.). — IX : en aval de Bumba (Luja).

Abrus pulchellus Wall. in *Thw.* Enum. pl. Zeyl. (1864) 91; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 175; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50].

1896 (A. Dewèvre). — V : Lemfu (But.); Kisautu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

— — var. **latifoliolatus** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 150, 267; II (1907) 453 et *Miss. Laurent* (1905) 168.

1900 (J. Gillet). — IV : Nord-Manyanga (Cabra-Michel). — V : Kisautu : Kimuenza (Gill. 828, 924, 1904, 2113). — VIII : Irebu (Ém. Laur.). — IX : Bumba (Pyn. 40); Imese (Ém. et M. Laur.).

CLITORIA L.

Clitoria Ternatea L. Sp. pl. ed. I (1753) 753; *DC.* Prodr. II, 223; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 177; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo. I (1897) 14 [B. S. B. B. XXXVI², 60]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 67; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 248.

1891 (F. Demense). — Congo (Dem.). — II : Boma (Dew.; Wilw.).

EMINIA Taub.

Eminia Harmsiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 198.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : *Munkago* (Verd. 528).

GLYCINE L.

Glycine Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 150; II (1907) 154.

1900 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Pyn. 41). — V : Kisautu (Gill. 675).

Glycine holophylla *Taub. ex De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 199.

Eriosema — *Bak.* in *Jouru.* of Bot. XXXIII (1895) 235.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 347).

Glycine javanica L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 754; DC. Prodr. II, 242; *Benth.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) 260; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 178 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 183; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 220; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 111; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 219; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 199; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 67; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 199 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 151; II (1907) 154.

G. micrantha *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 212.

G. moniliformis *Hochst.* ex *A. Rich.* l. c. I (1847) 211.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.) : Kibinga (Dup.), IV : Kitobola (Pyn.). — V : Kisantu (Gill.); Lukolela (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Muntangia** (Verd.); Albertville [Toa] (Desc.).

— — form. **glabrescens** *Buett.* in *Mitth. Afr. Gezell.* V (1889) 266; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 111.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett. 255).

Glycine kisantuensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 150 et 267 et *Miss. Laurent* (1905) 119.

1891 (F. Demeuse). — V : Chenal [Leo-Kwam.] Ém. et M. Laur.); le Stanley-Pool (Dew. 150); Tumba (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill. 269).

ERYTHRINA L.

Erythrina abyssinica *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) 392; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I, 214, t. 41; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 184 in obs.; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221; *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika 1895 383.

E. tomentosa *R. Br.* in *Salt* Voy to Abyss. Append. (1814) t. 65; *A. Rich.* l. c. 213; *Bak.* in *Olv.* l. c. II, 184; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 238; II (1907) 155.

1894 (A. G. von Goetzen et von Prittwitz). — XII : l'Uele (Delp.). — XII c : Bomo-kandi (Ser. 564). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 923). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.). — XV : Lubefu (Lescr. 374). — Noms vern. : **Kelobo** [Kasongo]; **Kisongwo** [Tanganika]; **Elonneli** [Ikwangula] (Dew.).

Erythrina Droogmansiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1921) 13 [B. S. B. B. XL, 19].

1898 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra. 74).

Erythrina Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, I (1904) 151.

1900 (J. Gillet). — V : Kinuenuza (Gill. 16, 106).

Erythrina huillensis Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 183; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 250; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 151.

1905 (Éd. Lescreauwaet). — XV : au S. de Tshitadi (Leser 321).

Erythrina Sereti De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 154.

1906 (Fél. Seret). — XII c : partie E. de la rive du Bomcoandi (Ser. 564).

Erythrina suberifera Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 183; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 748]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 250; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 59.

1893 (Edg. Verdick). — V : entre Dembo et le Kwango (But.); Kisanu (Gill.). — XVI : Lukafu et env. — Nom vern. : **Kitjipi** ou **Kiljipitjipi** (Verd. 82, 270).

MUCUNA Adans. (1)

Mucuna flagellipes Vogel ex Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 307; *Bak.* in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 185; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 67 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17.] et Reliq. Dewevr. (1901) 67; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 268; II (1907) 153 et Miss. Laurent (1905) 118.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Katala (Dew.). — V : Kisanu (Gill.); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Leser.). — VIII : Coquilhatville (Pyn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XV : Butala (Em. Laur.). — Noms vern. : **Poces** [Kasai]; **Tunga** [Katala] (Dew.).

Mucuna pruriens [Medic.] DC. Prodr. II (1825) 405; *Bak.* in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 187; *Taub.* in Engl. Pl. Ost-Afr. 221; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 19; Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17]; Contr. fl. Cgo, II (1900) 16 et Reliq. Dewevr. (1901) 68; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 135-36 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 153.

Stizolobium — *Medic.* in Vorlese Churpf. Phys. Ges. II (1787) 399; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 251.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Katala. — Nom vern. : **Maucundra** (Dew.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : Kisanu (Gill.); Yumbi (M. Laur.). — VIII : Eala [introd. de l'Uele (M. Laur.). — IX a : Mombauza (Thoum.). — XII : rég. orient. (Ser.). — XV : Lubue (Luja).

(1) *Mucuna Poggei* *Taub.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 194.

1885 ? (L. Marqués). — Ind. non cl. : vers le fleuve Luatschini (Marq. 279).

Cette habitatiou est peut-être dans le Congo belge.

Mucuna urens *Medic.* in Vorles. Churpf. Phys. Ges. II (1787) 399; *DC. Prodr.* II, 405; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 185; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 68 et Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17].

Stizolobium — *Pers. Syu.* pl. II (1807) 297; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 250.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilbatville (Dew.). — XV : env. de Bena-Mulegere (Dew.). — Noms vern. : **Pece** [Bakusu; Kasongo]; **Lwaga** [Tangauika] (Dew.).

DIOCLEA H. B et K.

Dioclea reflexa *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 306; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 189; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 254; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 68; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 37, 155.

1896 (A. Dewèvre). — II a : entre Shimbanza et Mangwala (Cabra). — V : Léopoldville (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Bondo [Kelemba] (Pyn.); Bokakata. — Nom vern. : **Msoko** (Dew.). — XIII a : Romée (Ém. Laur.). — XV : rives du Sankuru (Luja); Bamauia (M. Laur.).

CANAVALIA Adans.

Canavalia incurva *Thou.* in *Desv.* Journ. de Bot. I (1813) 80; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 254; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 268 in syn.

C. ensiformis *DC. Prodr.* II (1825) 404; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 190; *Taub.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 221; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155, (1906) 268; II, 155 et *Miss. Laureut* (1905) 119.

1891 (Hyc. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst). — III : Matadi (Sap.). — V : Kisantu et env. (Gill.); Lukolela (Ém. Laur.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.); Ikengo (Ém. Laur.). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — XI c : env. de Surango (Ser.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Mpsa** [Kwilu]; **Basesei**; **Basaka** [Bangala].

Canavalia obtusifolia [*Lam.*] *DC. Prodr.* II (1825) 404; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 190; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 68.

Dolichos — *Lam. Encycl. méth. Bot.* II (1789) 295.

C. maritima *Thou.* in *Desv.* Journ. de Bot. I (1813) 80; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 254.

D. obovatus *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 341.

D. ovalifolius *Schumach.* et *Thonn.* l. c. (1827) 341.

Canavalia emarginata *G. Don* Gard. Syst. Bot. II (1833) 362.

1895 (A. Dewèvre). — I : Banana (Dew.).

C. obtusifolia form. *macrophylla* *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, t. 1, 17].

1900 (J. Gillet) — V : Kisantu (Gill. 604).

PHYSOSTIGMA Balf.

Physostigma mesopotanicum *Taub.* in Ber. deutsch. bot. Gesellsch. XII (1894) 81; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 61.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu et de Pweto (Verd.).

Physostigma venenosum *Balf.* in Trans. roy. Soc. Edinb. XXII (1861) 310; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 191; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 748]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 156.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Luana (Leser. 21).

PHASEOLUS L.

Phaseolus adenanthus (*G. F. W. Mey.* Prim. fl. Esseq. (1818) 239; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 192; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. B. 141; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 255; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155 et *Miss. Laurent* (1905) 121.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — X : Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Phaseolus lunatus *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 724; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 192; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223, t. 24; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 56]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 255; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 68; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 268; II (1907) 156.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Limbutu (M. Laur.).

Obs. — A Eala [VIII] on en cultive une var. à graines blanches (Dew.).

Phaseolus Mungo *L.* Mant. pl. I (1767) 101; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 193; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155.

1900 (R. Butaye). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Lemfu (But.).

Phaseolus vulgaris *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 723; *Nees* Pl. offic. Suppl. t. 15; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 193; *Taub.* in *Engl.*

Pfl. Ost.-Afr. 223; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 255; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 122 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 268.

1903 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Hoko [Lac Tumba] [Ém. et M. Laur.]. — IX : Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.).

VIGNA Savi.

Vigna Afzelii *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 202; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155.

1900 (J. Gillet). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3094); Kisantu (Gill. 341); Sanda (De Brouw.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel, 18).

Vigna ambacensis *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 201; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 258; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 959). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel, 1).

Vigna capitata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 67.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : le Katauga; Lukafu. — Nom vern. : **Kengwalala** (Verd. 431).

Vigna esculenta [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.].

Liebrechtsia — *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 74.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kafoi** (Verd. 109 b. 110).

Vigna gracilis *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 311; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 205; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXVI², 63]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 20.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — IX : Boyangi près Dobo (Thonn.).

Vigna hastifolia *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 200; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155.

1903 (Xav. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3096).

Vigna katangensis [*De Wild.*] *Th.* et *Hél. Dur.* [non *De Wild.*].

Liebrechtsia — *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 72.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tjikundu-kundu** (Verd. 560).

Vigna Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 122.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Bulebu (Ém. et M. Laur.).

Vigna luteola *Benth.* in *Mart.* Fl. Bras. XV¹ (1859) 194, t. 50, fig. 2; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 205; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 123 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 269. II (1908) 256.

V. glabra *Savi* Mem. Phaseol. III (1825) 8; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 260; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 269

1896 (Eug. Wilwerth). — VI : Dima (Lescr. 7). — IX : Upoto (Wilw.). — XII c : entre Amadis et Surango (Ser.). — XV : Mukundji (Ém. Laur.).

— — var. **villosa** *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 17] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 69.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.).

Vigna micrantha *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 311 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 294; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 155; II (1908) 256.

1882 (P. Pogge). — V : entre Dolo et Kinshassa (Schlt. 12592); Bolobo (M. Laur.); Kisantu; Kimuenza (Gill. 2145). — IX : env. de Bumba (Ser.). — XV : Mukenge (Pg. 811, 834).

Vigna pubigera *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 199; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXI², 63].

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

Vigna reticulata *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1819) 310; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 198; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 112; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 256; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 69; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 156 (1906) 270; II (1908) 257.

1892 (Jul. Cornet). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Ém. Duch.; Lujá); Kwamouth (M. Laur.); Sanda (Odd.). — XVI : le Katanga (Coru.); Lukafu. — Nom vern. : **Komboi** (Verd.).

Vigna scabra [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.].

Liebrechtsia — *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 75.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 602).

Vigna sinensis [*L.*] *Endl.* ex *Hassk.* Pl. Jav. rarior. (1848) 386; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 386; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223, t. 24; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 112; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 259; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 156 et *Miss. Laurent* (1905) 123.

Dolichos sinensis L. Cent. pl. II (1756) 28; *DC.* Prodr. II, 399.

D. Catjang L. Mant. pl. II (1771) 259.

Vigna — *Walp.* in *Linnaea*, XIII (1839) 533; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I, 219;

Bak. in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 265; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 259.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Inkongo (Ém. et M. Laur.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Vigna triloba *Walp.* in *Linnaea*, XIII (1839) 534; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 204; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXVI², 63]; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 259; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 69; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 123 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 270.

1894 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Dew.). — II a : Biugila (Dup.). — V : cult. en champs aux env. de Kimuenza (Dew.); env. de Lemfu (But.). — IX : Umangi (Krek.).

Vigna venulosa *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 203; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 156.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 814).

Vigna vexillata [*L.*] *Benth.* in *Mart.* Fl. Brasil. XV¹ (1859) 103, t. 50, fig. 1; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 199; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens II, 240; *Th. Dur.* et *Schinz.* Étud. fl. Cgo (1896) 112; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXVI², 63]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 156, (1906) 270 et Miss. Laurent (1905) 123.

Phaseolus — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 724.

Plectrotropis hirsuta *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 338.

V. tuberosa *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 217, t. 42.

V. capensis *Walp.* in *Linnaea*, XIII (1839) 533; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 257.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Zambi (Dup.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — IX : Upoto (Ém. et M. Laur.); Bangala (Hens).

VIGNOPSIS De Wild.

Vignopsis lukafuensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 69.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 401).

SPHENOSTYLIS E. Mey.

Sphenostylis angustifolia [*Hook. f.*] *Sond.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 33; *Harms* in *Engl.* Jahrb. XXVI (1899) 309.

Vigna angustifolia *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 311; *Benth.* ex *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II (1861) 240; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155, (1906) 269.

V. vexillata *Benth.* var. *Bah.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 200.

1890 (F. Demeuse). — II : Sisia (Dup.). — V : Kisantu (Dem. : Gill.).

Sphenostylis katangensis [*De Wild.*] *Harms* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 177 in obs.

Vigna — *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 67.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom. vern. : **Malumboi** (Verd. 405).

Sphenostylis stenocarpa [*Hochst.*] *Harms* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 309.

Dolichos — *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 224; *Bah.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 213.

Vigna ornata *Welw.* ex *Bah.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 203; *Taub.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 223; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17]; *Horn* Cat. Welw. Pl. I, 258; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 156, (1906) 269; II (1908) 257 et *Miss. Laurent* (1905) 123.

1882? (P. Pogge). — IV : Tempo (Gill.). — V : env. de Léopoldville (Buett. 322; Gill.); Kisantu : Kimuenza (Gill.). — XII c : euv. d'Amadis et de Surango (Ser.). — XV : Lusambo : Dibele (Ém. et M. Laur.) : route de Luebo à Luluabourg (Gent.) : Mukenge (Pg. 779, 781); entre Luebo et Djoko-Punda (Lem.)

— — var. ***latifoliolata*** [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.].

V. ornata *Welw.* var. — *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 156, (1906) 270.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1124); rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3053).

ADENOLICHOS *Harms.*

Adenolichos grandifoliolatus *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 203.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 622).

Adenolichos Harmsianus *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 203.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 564).

Adenolichos punctatus [*M. Micheli*] *Harms* in Engl. Bot. Jahrb. XXXIII (1902) 480.

Vigna — *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 16 [B. S. B. B. XXXVI², 62] et *Ill.* fl. Cgo (1899) 91, t. 59.

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

VOANDZEIA Thou.

Voandzeia subterranea Thou. Gen. nov. Madag. (1806) 23; *DC.* Prodr. II, 207; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 254; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 207; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 115; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 223, t. 22; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 260; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 19; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 269 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 482-85.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbetu (Schw.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : cult. dans les bassins du Lualaba et du Kasai (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Mangasa** [Ikwaugula]; **Djokomaure** [Matam-Matam]; **Ibongo** [Kasai]; **Kazan** [Tanganika].

PACHYRHIZUS Rich.

Pachyrhizus bulbosus (L.) Kurz in Journ. As. Soc. Beng. XLV (1876) II, 246; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 115; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 121.

Dolichos — L. Sp. pl. ed. 2 (1763) 1020

P. angulatus Rich. ex DC. Prodr. II (1825) 402; *Benth.* in *Mart.* Fl. Brasil. XV, 199, t. 73; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 208 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 207; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 257.

Taeniocarpum articulatum Desv. in *Annal. sc. nat.* Ser. I, IX (1826) 421.

1893 Ém. Laurent. — Bas-Congo [cult.?] (Ém. Laur.). — VIII : Eala [cult.] (M. Laur.); Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Katanga (Desc.).

PSOPHOCARPUS Neck.

Psophocarpus longepedunculatus Hassk. in *Flora*. XXV (1842) II, Beibl. 75 et Pl. Jav. rarior. (1848) 388; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 113; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 113; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 224, t. 24; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 17 (B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17) et *Reliq. Dewevr.* (1901) 69; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 61; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158; (1908) 257 et *Miss. Laurent* (1905) 122.

Psophocarpus palustris Desv. in *Annal. sc. nat.* Ser. I, IX (1826) 420.

Botor — O. Kuntz — *Rev. Gener.* (1891) 163; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 261.

P. palmettorum Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. (1832) 221.

Diesingia scandens Eddl. *Atakta bot.* (1833) t. 1-2.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma. — Nom vern. : **Fumgatata** (Dew.). — V : entre Leopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Fpateuvville [Wangata] (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur.). — X : Bobungi (Ém. et M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Obs. — Dewevre, dans ses notes, dit que cette espèce est répandue dans tout le domaine de la flore du Congo (Dew.).

DOLICHOS L.

Dolichos biflorus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 727; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 210; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 224; *Harms* in *Engl.* Jahrb. XXVI (1899) 31; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 263; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158.

1882 (P. Pogge). — V : Kimuenza (Gill.); Sanda (Odd.); env. de Lemfu (But.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — XV : Mukeuge; Musumba (Pg.).

Dolichos dubius De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 64.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom. vern. : **Molundo-polo** (Verd. 178).

Dolichos esculentus De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 64.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom. vern. : **Muku** (Verd. 370).

Dolichos Gululu De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 65.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom. vern. : **Kisjima-wa-Gululu** (Verd. 236).

Dolichos Hendrickxii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 156, t. 39.

1903 (Xav. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3098).

Dolichos Katali De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 157.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom. vern. : **Katali-tali** (Verd. 437).

Dolichos Lablab L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 725; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 210; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 224; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 262; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 70.

1895 (A. Dewèvre). — II : Plante cultivée un peu partout et formant de grands champs a Zambézi [II] (Dew.).

Dolichos pseudopachyrhizus *Harms* in *Engl.* Jahrb. XXVI (1899) 320; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 202.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom. vern. : **Kafulo** (Verd. 239, 271).

Dolichos serpens De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 63.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 343).

Dolichos splendens Welw. ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 215; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXVI², 63].

1895 (G. Descamps). — XVI : Pala (Desc.).

Dolichos trinervis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 66.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : brousse de Lukafu (Verd. 272).

Dolichos Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 63.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : le Katanga (Verd.).

CAJANUS DC.

Cajanus indicus *Spreng.* Syst. veget. III (1826) 218; *Bak.* in *Oliv.*

Fl. trop. Afr. II, 216 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 217; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 115; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221, t. 21; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 119 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 155.

Cytisus *Cajan* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 739.

C. pseudo-Cajan *Jacq.* Hort. Vindob. II (1772) 54, t. 119.

C. guineensis *Schumacher* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 349.

C. bicolor *D.* Prodr. II (1825) 496; Bot. Reg. (1845) t. 31.

Cajanus inodorum *Medic.* in Vorles. Churpfl. Phys. Gesellsch. II (1787) 363;

Hiern Cat. Welw. Pl. I, 266.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — II : Boma; Ponta da Lenha (Naum.); Zambé. — Nom vern. : **Wandu** (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.); Kimpesse (Ém. Laur.); Bolobo (M. Laur.). — IX : Bumba [cult.]. (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.).

DISTRIB. : Origine douteuse (Inde ?); région tropicale du monde entier; cult. en grand.

RHYNCHOSIA Lour.

Rhynchosia affinis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 152.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lac Moero (Verd.).

Rhynchosia calycina *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 214;

Bak. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 217; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 116.

Cyanospermum — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 218.

Dolicholus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 267.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B, 86).

Rhynchosia caribaea *DC.* Prodr. II (1825) 384; *Bak.* in *Oliv.* Fl.

trop. Afr. II, 220; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51] et Reliq. Dewevr. (1901) 70.

Dolicholus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 267.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambé (Dew. 408).

Rhynchosia congensis *Bak* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 217; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 116; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 748].

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Stu.). — V : Kiantu (Gill. 1353).

— — var. **Gilletii** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 152.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2119).

Rhynchosia cyanosperma *Benth.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 218; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 60 et Miss. Laurent (1905) 119.

1900 (Edg. Verdict). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XVI : plateau du Katanga. — Nom vern. : **Mupakuma** : (Verd.) : Lukafu (Verd. 589).

Rhynchosia flavissima *Hochst.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 219; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 18 [B. S. B. XXXVI², 64].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Rhynchosia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 154.

1901 (Edg. Verdict). — XVI : le Katanga (Verd.).

Rhynchosia Mannii *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 217; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 116; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 25; Pl. Gilletianae, I (1900) 18 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 18] et Reliq. Dewevr. (1901) 70; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 267; II (1907) 155 et Miss. Laurent (1905) 119.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens). — II a : Shinganga (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX a : Mongo (Thonn.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XIII : Romée (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Lemboi-lo-Dianga** [Ikwangula] (Dew.).

Rhynchosia Memnonia [*Delile*] *DC.* Prodr. II (1825) 386; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 253; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 220; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 116.

Glycine — *Delile* Fl. Aegypt. Illustr. (1813) 100, t. 38, fig. 3.

Dolicholus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 267.

1885 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett. 244).

Rhynchosia minima *DC.* Prodr. II (1825) 385; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 219; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221; *De Wild.* et

Th. Dur. Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. XXXVII, 51] et Reliq. Dewevr. (1901) 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 120.

Dolicholus mininus *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 267.

1895 (A. Dewevre). — II : Zambi (Dew. 195). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.).

Rhynchosia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 199.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafa (Verd. 550).

ERIOSEMA DC.

Eriosema affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 200.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafa. — Nom vern. : **Kundjialealey**. (Verd. 97).

Eriosema cajanoides [*Guill. et Perr.*] *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 314; *Harv. et Sond.* Fl. Capens II, 261; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 227; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 222; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 113; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 61; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 154, (1906) 268; II (1907) 156 et *Miss. Laurent* (1905) 120.

Rhynchosia — *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 215.

E. psoraleoides *G. Don* Gen. Syst. Bot. II (1832) 348; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 273.

1862 (R. Burton). — II : Boma (Schimp.). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel); Bingila (Dup.); bords de la Lukula (Cabra); Zenze (Ém. Laur.) — III : Tondoa (Buet.); Matadi (Ém. et M. Laur.). — III-IV : la Lufu (Hens.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.); Luvituku (Dem.). — V : Cheual (Ém. et M. Laur.); Dolo (M. Laur.); env. de Kwamonth (But.); Lukolela (Ém. et M. Laur.); Sanda (Cabra); reg. de Lula-Luuene (Hendr.). — VI : env. de Dima (Lescr.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Luozi (Luj.). — XII c : entre Bumbili et Amadis (Ser.). — XV : brousse des bords du Kasai (Ém. et M. Laur.) et du Lubi (Lescr.). — XVI : Pala; Toa (Desc.); Lukafa et dans toute la région (Verd.). — Nom vern. : **Mutumbu-Tumbu** (Verd.).

Eriosema Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 18 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 18].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Eriosema glomeratum [*Guill. et Perr.*] *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 313; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 228; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 113; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 222; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 273; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 120 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 269; II (1907) 156.

Rhynchosia — *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 216.

Glycine rufa *Schumach. et Thonn.* (non *H. B.* et *K.*) Beskr. Guin. Pl. (1827) 344.

Eriosema — *Baill.* (non *E. Mey.*) in *Adausoma*, VI (1866) 226.

1862 (R. Burton). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : Kibinga; Bingila (Dup.). — III : Matali (Ém. Laur.). — V : Léopoldville; Dolo (Schlt.); Kinshassa (Heus 297); env. de Bokala (Ém. et M. Laur.); env. de Kwainoutb (But.); env. de Kisantu (Gill.); Tumba (Ém. Laur.). — VIII : la Fini (Ém. Laur.); Banga (Ém. et M. Laur.). — XV : Lusambo (Desc.).

E. glomeratum var. **elongatum** *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 229; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 114.

E. elongatum *Baill.* in *Adansonia*, VI (1866) 227.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo bor. (Ém. Laur. 65). — VI : Muene-Putu Kasongo (Buett. 236).

— — form. **microphyllum** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 154.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

Eriosema griseum *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 228; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 272; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51]; Pl. Gilletianae, I (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 19] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 70.

1895 (A. Dewèvre). — II a : brousse de Zobe (Dew. 251). — V : Kisantu (Gill. 175).

Eriosema Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 120.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IV : Songololo (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Yumbi; Sabuka (Ém. et M. Laur.). — XV : en amont de Butala (Ém. et M. Laur.).

Eriosema parviflorum *E. Mey.* *Comm. pl. Afr. austr.* (1835) 130; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 225; *Taub.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 222; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 154, (1906) 269.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu : entre Kisantu et Dembo (Gill. 1338, 1524, 3447, 3529).

Eriosema pulcherrimum *Taub.* in *Engl.* et *Prantl* *Nat. Pflanzenfam.* III, 3 (1894) 375; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 154, (1906) 269; II (1907) 150 et *Miss. Laurent* (1905) 121.

1893 (G. De-camps). — IV : env. de Kitobola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 50); Kisantu-Makela (Van Houtte in Gill. 3442). — XII c : Surango (Ser. 388). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Eriosema sericeum *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 226; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 19].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 577, 953).

Eriosema tuberosum *Hochst.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1817) 227; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 224; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 18 [B. S. B. B. XXXVI², 64].

1891? (G. Descamps). — XVI : Pala (Desc.).

Eriosema Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 201.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lofoi (Verd.).

DALBERGIA L.

Dalbergia ealaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 151.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 837). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1831).

Dalbergia florifera *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 146.

1900 (R. Butaye). — V : Dembo (Gill.); entre Dembo et le Kwango (But.).

— — var. **obscura** *De Wild.* l. c. (1904) 146.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1701).

Dalbergia Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 147.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gentil : Gill. 2853).

Dalbergia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 265.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2084).

Dalbergia glaucescens *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 147.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1702).

Dalbergia Harmsiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 194.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga. — Nom vern. : **Tjuja** (Verd. 102).

Dalbergia isangiensis *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 116.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.).

Dalbergia kisantuensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 748]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 148.

1900 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2598); Kisantu (Gill. 544).

Dalbergia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 116 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 152.

1903 (Marc. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 198). — VIII : Eala (M. Laur. 177, 778).

Dalbergia laxiflora *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 19, t. 4 et II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVI^t, 65 et XXXVII, 51]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 117 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 152.

1895 (A. Dewèvre). — V : entre Lukolela et Gombi (Dew. 550); en aval de Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1649); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.): Équateurville [Wangata] (Ém. Laur.).

Dalbergia luluensis *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 294.

1883 (P. Pogge). — XV : la Lulua vers 6° 5 (Pg. 876).

Dalbergia macrosperma *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 235.

Amerimnou — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 159; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 276.

1883 (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

— — var. **longipedicellata** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 263.

1903 (Ad. Odden). — V : env. de Sanda (Odd. in Gill. 3313).

Dalbergia medicinalis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 194.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Tjabilonda**; **Lupipi** (Verd. 22, 585).

Dalbergia Micheliana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 146, (1906) 266; II (1907) 153 et Miss. Laurent (1905) 115.

1896 (A. Dewèvre). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Sauda (Gill. 3615; Odd. in Gill. 3708). — VIII : Coquilhatville (Dew. 656).

Dalbergia saxatilis *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 314; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Af. II, 233; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51] et Reliq. Dewevr. (1901) 71; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 152.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — XI : Mogoudjo (M. Laur. 1647); Yambuya (M. Laur. 1646).

ECASTAPHYLLUM P. Browne.

Ecastaphyllum Brownei *Jacq.* *Pers.* Syn. pl. II (1807) 277; *DC.* Prodr. II, 420; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 232; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 236; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 114; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 264, II (1907) 151 et *Miss. Laurent* (1905) 117.

Hecastaphyllum — *Benth.* in *Mart.* Fl. Brasil. XV² (1862) 228.

Pterocarpus Ecastaphyllum *L.* (ubi?) fide *Auct.*; *Svensk Acad.* (1769) t. 4; *Descourtilz* Fl. des Antilles, IV, t. 258.

Amerimnon — *Jacq.* Enum. pl. Carib. (1760) 27; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 275.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — V : Bolobo; Lukolela Bulebu (Em. et M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Em. et M. Laur.).

Ecastaphyllum Monetaria *Pers.* Syn. pl. II (1807) 277; *DC.* Prodr. II (1825) 421; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 236; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51] et *Reliq. De wevr.* (1901) 71; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 117.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata]. — Noms vern. : **Bombobolu**; **Vombola** (Dew.). — IX : Umaugi (Krek.).

Ecastaphyllum pachycarpum *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 77 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 749].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 490, 1097, 1231).

DREPANOCARPUS G. F. W. Mey.

Drepanocarpus lunatus [*L. f.*] *G. F. W. Mey.* Prim. fl. Essequib. (1818) 238; *DC.* Prodr. II, 420; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 237; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 237; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 117; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 277; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 266.

Pterocarpus — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 317.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.).

PTEROCARPUS L.

Pterocarpus Cabrae *De Wild.* in La Belg. colon. (1902) 193 et in *Rev. cult. colon.* 1902] 43; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 48 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1904) 349-350.

1899 (H. Tilmán). — II a : le Mayumbe (Tilm. in Cabra, 50). — Noms vern. : **N'Kula**; **N'Gula** ou **Gula** (Tilm.).

Pterocarpus Dekindtianus *Harms* in Engl. Jahrb. XXX (1901) 89; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 148, (1906) 266.

P. erinaceus *Auct.* [non *Poir.*] *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 117; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 78 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 750]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 57.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Gill. 2299). — V : Boko [Kinanga] (But. in Gill. 3348); env. de Lemfu (But.). — VI : le Kwango (Buett.); env. de Tumba-Mani (Cabra-Michel. 55). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Mulembo** (Verd. 83, 497).

Pterocarpus grandiflorus *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 99 [B. S. B. B. XXXVI², 65] et in III. fl. Cgo (1904) 137, t. 79.

1896 (Ém. Laurent). — XIII a : les Stanley-Falls (Ém. Laur.).

Pterocarpus Mutondo *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 57.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutondo** (Verd. 16, 557).

Pterocarpus odoratus *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 58.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mubalakula** (Verd. 428, 493).

Pterocarpus tinctorius *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 584; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 239; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 277; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 48; II (1907) 152.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3752).

OSTRYOCARPUS Hook. f.

Ostryocarpus parvifolius *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 21 [B. S. B. B. XXXVI², 67] et Reliq. Dewevr. (1901) 71.

1896 (A. Dewèvre). VIII : Équateurville [Wangata]. — Nom vern. : **Boloko** (Dew. 640).

LONCHOCARPUS H. B. et K.

Lonchocarpus affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 196.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mwofi** (Verd. 115).

Lonchocarpus Barteri *Benth.* in Journ. Linn. Soc. IV (suppl.) (1860) 99; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 243; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 117; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 30; II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVI², 176; XXXVII, 51]; *De Wild.* et

Th. Dur. Pl. Gillelianae, I (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 19];
De Wild. Miss. Laurent (1905) 117.

L. Heudelotianus *Baill.* in *Adansonia*, VI (1866) 222.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill. 219). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Luina (Dem.).

Lonchocarpus comosus *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 23 [B. S. B. B. XXXVI², 69]; *Reliq. Dewevr.* (1901) 72 et Ill. fl. Cgo (1902) 183, t. 92.

1895 (A. Dewèvre). — II a : la Lemba (Dew. 362). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew. 1166).

Lonchocarpus dubius *De Wild.* Étud. fl. Kal. (1903) 196.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kibimbia** (Verd. 62).

Lonchocarpus Eetveldeanus *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 21 [B. S. B. B. XXXVI², 67] et Ill. fl. Cgo (1898) 17, l. 9; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 267.

1895 (Ém. Laurent). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — V : env. de Dembo (Gill.).

Lonchocarpus katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kal. (1903) 195.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mukutu** (Verd. 49).

Lonchocarpus Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 117.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Lonchocarpus sericeus [*Poir.*] *H. B. et K.* Nov. gen. et sp. VI (1823) 383; *DC.* Prodr. II, 260; *Benth.* in Journ. Linn. Soc. IV (suppl.) (1860) 88; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 241; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 117.

Robinia — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) 226.

R. violacea *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 28, t. 76.

R. argentiflora *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 352.

1862 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — III : Tondoa (Buett.).

Lonchocarpus ? subulidentatus *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 53; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 118.

1884 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett. 454).

Lonchocarpus Teuszii *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 51; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51] Pl. Gillelianae, I (1900) 19 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 73.

1898 (A. Dewèvre). — IV : Lukuugu. — Nom vern. : **Fontu** (Dew. 468). — V : Kisantu (Gill. 292, 605; — XV : le Kasai (Luja).

DERRIS Lour.

Derris brachyptera *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 246; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Congo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 73; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 149, (1906) 267; II (1907) 153.

Deguelia — *Taub.* in Bot. Centralbl. XLVII (1891) 386; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 183.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 3603); entre Kisantu et Popokabaka (But. in Gill. 2307). — VIII : Eala (M. Laur. 792); Équateurville [Wangata] (Dew. 668); Mondjo (Pyn. 314).

Derris congolensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 149, t. 38, (1906) 267; II (1907) 152.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.: Odd. in Gill. 625). — V : env. de Kisantu (Gill. 3646).

Derris nobilis *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 245; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 149.

Deguelia — *Taub.* in Bot. Centralbl. XLVII (1891) 387.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1631).

DALHOUSIEA Wall.

Dalhousiea africana *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 2; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 284; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1900) 78 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 759]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 131; II (1907) 145 et Miss. Laurent (1905) 106.

D. bracteata *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 247.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza (Gill.): entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill.); Madibi (Lescr.). — VIII : Coquilhatville (Dew.; Pyn.); Eala (M. Laur.). — IX : Dobo (Pyn.); Umaugi (Krek.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Lusambo; Butala (Ém. et M. Laur.); Kondue (Lederm.).

BAPHIA Afz. (1)

Baphia acuminata *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 104.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : eu aval de Basoko (Ém. Laur.). — XIII a : Wanie-Rukula (Ém. Laur.).

(1) **Baphia aurivellerea** *Taub.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 174.

1882? (P. Pogge). — XV? : entre Kimbundo et le Kwango vers 10° (Pg. 535).

Baphia angolensis Welw. ex Bak. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 249; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 74; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 285; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 143.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.; Pyn. 290); Kinshassa (M. Laur. 492). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 273 b). — VIII : env. d'Équateurville [Wungata]. — Nom vern. : **Bokongo-Bomponono** (Dew.); Coquilhatville (Pyn. 292); Eala (M. Laur. 842). — XI : Barumbu (M. Laur. 167); Mogandjo (M. Laur. 1669). Yambuza (M. Laur. 1668). — XV : Mokole [Lubi] (Lescr. 186); Djoko-Punda (Lescr. 288).

Baphia chrysophylla Taub. in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 175.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 798, 802, 852, 896, 898).

Baphia compacta De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 144.

1906 (L. Pynaert). — V : Lukolela (Pyn. 157).

Baphia congolensis Welw. ex Bak. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 249; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 285; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 105.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : Chenal; Bolobo; Tumba (Ém. et M. Laur.). — XV : Bombaie (Ém. Laur.).

Baphia crassifolia Harms ex De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 131.

1902 (L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — XV : Loango [Kasai-Lualaba] (Gent. 28).

Baphia densiflora Harms in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 280.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 819).

Baphia Laurentii De Wild. Miss. Laurent (1905) 105.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur. 40).

Baphia Lescrauwaetii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 143.

1905 (Éd. Lescrauwaet). — XV : Pania-Mutambo (Lescr. 386).

Baphia nitida Lodd. Bot. Cab. IV (1819) t. 367; *DC.* Prodr. II, 424; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 249; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 118.

Podalyria Haematoxylon *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 202.

Baphia — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 324.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Baphia pubescens *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 250; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 250; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 118; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 17 et Reliq. Dewevr. (1901) 74; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 255; II (1907) 143.

B. laurifolia *Baill.* in *Adansonia*, VI (1866) 213.

1863 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Bolobo (Dew.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); rég. de Luanu (Lescr.). — IX : Luozi (Luja). — XVI : Albertville [Foa] (Desc.).

Baphia Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 143.

1906 (L. Pynaert). — VIII : env. d'Eala (Pyn. 239).

Baphia racemosa *Hochst.* in *Flora*, XXIV (1841) II, 638; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 248; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII², 52]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 74.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : forêts au-dessus d'Elunga près de la Kusuku (Dew. 1061 a).

Baphia Schweinfurthii *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 175.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d ? : env. de Kubbi [riv. droite du Kibali] (Schw. 3551). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

Baphia spathacea *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 320; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 250; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 118; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 144.

1888 (Fr. Hensl.). — V : Lukolela (Ém. Laur.). — VIII : Irebu (M. Laur. 631); Bombimba (Pyn. 322). — IX : Bangala (Hensl.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

— — var. **scandens** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1907) 144.

1905 (L. Pynaert). — XI : Yambuya (Pyn. 58).

Baphia Vermeuleni *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 255, t. 51.

1903 (Aug. Vermeulen). — V : env. de Sanda (Verm. in Gill. 3409, 3432).

ANGYLOCALYX Taub.

Angylocalyx ramiflorus *Taub.* in *Engl. Jahrb.* XXVII (1897) 172; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 74.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata (Dew. 801). — XI : Lokandu (Dew. 1134 e).

Angylocalyx Schumannianus *Harms* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 499 et in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 278; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 131.

1903 (Ad. Oudou). — V : le Stanley-Pool (Camp) ; Sanda (Odd.).

Angylocalyx Vermeuleni *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 251, t. 55 ; II (1907) 141.

1903 (Ad. Oudou et Aug. Vermeulen). — V : Sanda (Odd. et Verm. in Gill. 3434, 3575). — XV : env. de Limbutu (M. Laur. 1801).

ORMOSIA Jack.

Ormosia Brasseuriana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 183.

O. angolensis *De Wild.* [non *Bak.*] Étud. fl. Kat. (1902) 50.

1899 (Edg. Verdict). — XV : env. de Lukafu. — Noms vern. : **Mulanga** ; **Mubanga** (Verd. 38, 180, 197).

CAMOENSIA Welw.

Camoensia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 103.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Camoensia maxima *Welw.* ex *Benth.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1866) 302, t. 36 ; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 252 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 119 ; *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1898) t. 7572 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 254 ; II (1907) 142.

Gigantemum scandens *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 585 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 285.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Sanda (Odd.). — IX : Bangala (Dup.) ; Upoto (Wilw.) ; Luozi (Luja). — XV : Pangu (Ém. Laur.).

SWARTZIA Schreb.

Swartzia madagascariensis *Desr.* in *Annal. sci. nat. Sér. 1, IX* (1826) 424 ; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 257 ; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 183.

Tournatea — *Taub.* in *Bot. Centralbl.* XI.VII (1891) 792 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 286.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **N'Dale** (Verd. 77, 233, 295).

CAESALPINIEAE

PELTOPHORUM Vogel.

Peltophorum africanum *Sondl.* in *Linnæa*, XXIII (1859) 35; *Oliv* Fl. trop. Afr. II, 260; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 287; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 102.

Brasilettia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1901) 164.

1903 (Ém. et Marc. Laurent. — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

MEZONEURON Desf.

Mezoneuron angolense *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 261; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 287; *M. Micheli* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 74.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

CAESALPINIA L.

Caesalpinia Bonducella *Fleming* in *Asiat. Res.* XI (1810) 159; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 262; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 289; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 202; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 254.

1900 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.).

Caesalpinia pulcherrima [*L.*] *Sw.* *Observ. bot.* (1791) 166; *Maunder* *The Botanist*, IV, t. 151; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 262 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 255; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 119; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 288; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 74.

Poinciana — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 380; *DC.* *Prodr.* II, 484; *Jacq.* *Stirp. Amer.* hist. t. 120; *Bot. Mag.* (1807) t. 995.

1893 (P. Dupuis). — II : Boma (Dup.). — II a Yema-Lianga (Cabra). — V : Léopoldville (Duch.). — XVI : Pala (Deb.). — XI : Yambuli (Ém. Laur.).

Obs. — Rob. Brown a indiqué dans le Bas-Congo, d'après C. Smith, le **Guilandina Bonduc** Ait. (*Caesalpinia* — Roxb.). Oliver dit qu'il n'a jamais vu d'échantillons africains de cette espèce et qu'il présume que tout ce que l'on a indiqué, sous ce nom, dans l'Afrique tropicale, appartient au *C. Bonducella* Roxb. (*Guilandina* — L.). *Benth.* et *Trim.* *Medic.* Pl. II, t. 85; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 262.

POINCIANIA L.

Poinciana regia *Boj.* ex *Hook.* in *Bot. Mag.* (1829) t. 2884; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 306; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 202; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 289; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 131 et *Miss. Laurent* (1905) 102.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Boma (Dew.). — V : Kimuenza (Gill. 1731). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.).

PARKINSONIA L.

Parkinsonia aculeata *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 375; *Jacq.* Stirp. Amer. hist. t. 119; *Descourtiz* Fl. des Antilles, I, t. 12; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 267; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 131, (1906) 254; II (1907) 140.

1903 L. Gentil). — II : Boma (Gill.). [cult.] (Pyn.). — VIII : Fala (M. Laur.). — XI : Yaisuli [Lomami] (Gent.).

OLIGOSTEMON Benth.

Oligostemon pictus *Benth.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1865) 305, t. 39; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 267; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 75.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 421).

CASSIA L.

Cassia Absus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 376; *Nees* Pl. officin. t. 348; *DC.* Prodr. II, 500; *Jacq.* Eclog. pl. (1811) t. 53; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 279; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 119; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 292; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 17 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 75; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 47 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 165; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 130; II (1907) 119 et *Miss. Laurent* (1905) 101.

C. viscosa *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 205.

C. Thouningii *D.*, I, c. II (1825) 500.

1888 (Fr. Hensl.). — II : Zambi (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hensl.); Kitobola (Pyn.). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Léopoldville (Gill.); Dolo (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.); Bandundu (Ém. Laur.). — XVI : Pala (Desc.); Lofoi (Verl.). — Noms veru. : **Galonga** [Kasongo]; **Gangale** [Ikwangula]; **Locoso** [Bakusus]; **Kisiwegue** [Tanganika] (Dew.).

Cassia alata L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 378; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 275; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 19]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 166-167; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 401 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 253; II (1907) 140.

C. reticulata M. *Micheli* [non Willd.] in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 18.

1896 (Ém. Laurent). — Bas-Congo, cult. dans diverses stations (Ém. Laur.). — V : env. de Dembo et de Kisantu (Gill.). — VI : rég. de Luana (Lescr.). — VIII : Eala (Pyn.). — XV : Isaka : (Ém. et M. Laur.).

Cassia Droogmansiana *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 48.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Musemjesji** (Verd. 126).

Cassia Kethulleana *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 48.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Muluta** (Verd. 562).

Cassia Kirkii *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 281; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 120; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 294; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 130; II (1907) 140 et Miss. Laurent (1905) 411.

1888 (Fr. Hens). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.); Sanda (De Brouw.). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser). — XIV : volcau Kirunga (v. Goetz. et v. Pritt.). — XV : Mukundji (Ém. Laur.); la Lulua vers 7° (Lescr.).

— — var. **microphylla** A. *Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 100.

1892 (Jul. Cornet) — XVI : le Katanga (Corn.).

Cassia Mannii *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 272; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 131, (1906) 253; Miss. Laurent (1905) 401 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 168.

1901 (J. Gillet). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.); Sanda (Van Houtte). — X : l'Ubangi; Busa (Ém. et M. Laur.).

— — var. **Van Houttei** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 168 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 253.

1902 (Aug. Van Houtte). — V : rég. de Sanda (Van Houtte; Odd.).

Cassia mimosoides L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 379; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 281; *Bak.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 266; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 120; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 293; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 19; II (1900) 18; Pl. Thonnerianae

(1900) 49; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 172-173; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 131, (1906) 253; II (1907) 140 et Miss. Laurent (1901) 101.

C. geminata *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 281.

C. gracillima *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1858) 590.

1885 (R. Buettner). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Ém. Laur.). — II : Boma (Schimp.). — II a : le Mayumbe à Bingila (Dup.); Ganda-Yanga (Cabra). — V : C. autour du Stanley-Pool (Buett.; Dem.); Leopoldville et env. (Hens; Em. Duch.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Dolo. — Nom vern. : **Bankause** (Biel.); Kinshassa (Dem.); env. de Kwamouth (Biel.); entre Bolobo et Lukolela (Buett.); Sabuka (Luja); Kisantu (Gill.); Dembo (Cabra); rég. de Lula-Lumene (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — IX : Yabasumba (Thonn.); Upoto (Wilw.). — X : Musima (Briart). — XV : Lusambo; Bukila (Ém. Laur.). — XVI : le Katanga (Corn.).

Cassia occidentalis L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 377; Bot. Reg. (1816) t. 83; *DC.* Prodr. II, 202; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 262; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 120; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 291; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 75; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 49; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 169-74; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 253; II (1907) 140 et Miss. Laurent (1905) 101.

Senna — *Roxb.* Fl. Ind. II (1832) 343.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : la Lemba (Gill.); Haut-Shiloango (Cabra-Michel); Bingila (Dup.). — III : Matadi (Sap.). — IV : rég. des Cataractes (Dem.). — V : Kisantu; env. de Lemfu; env. de Dembo (Gill.); env. de Yumbi (Ém. Laur.). — VI : Luana et env. (Leser.); Muene-Putu-Kasongo (Buett.); env. de Sanga (Cabra). — VII : Ibali (Ém. Laur.). — VIII : Équateurville (Buett.); Basankusu. — Nom vern. : **Kwantala** (Dew.). — IX : Bangala (Hens). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lukungu-Moka** (Verd.). — Noms vern. : **Tchungu-Tchungu** [Tauganika]; **Bao** [Ikwangula]; **Ikongolo** [Kasongo].

Cassia Tora L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 376; *DC.* Prodr. II, 263; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 275 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 263; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 121; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1906) 76; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 173-74; Miss. Laurent (1905) 102 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 140.

Senna — *Roxb.* Fl. Ind. II (1832) 340.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo, brousse près des villages (Ém. Laur.). — V : Dolo (Sap.); Kwamouth (M. Laur.); Bolobo (Dew.); Kisantu (Gill.); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Krek.). — XII a et b : entre Bima et Bambili (Ser.).

Cassia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 49.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kionga** (Verd. 590).

DIALIUM L.

Dialium acuminatum *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 139.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 797).

Dialium angolense *Welw. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 283; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 153; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 296; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 47.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kafungu-Kakoma** (Verd. 476).

Dialium guineense *Willd.* in Roem. Archiv. f. Bot. I (1796-98) 31, t. 6; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 283; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10 [B. S. B. B. XXXVII, 53]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 76; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 294; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 100 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 254; II (1907) 139.

Codarium acutifolium *Azél.* in Schrad. N. Journ. Bot. II (1807) 233.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Pyn.). — Nom vern. : **Djungu** (Dew.) : Kimuenza (Gill.) : rég. de Sauda (Odd.). — VII : Ibalé (Ém. Laur.). — VIII : Efukoi-Kombe [Ikelemba] (M. Laur.) : Eala (M. Laur.). — XI : Basoko (M. Laur.).

Dialium Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 100 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 145.

1904 (Ém. Laurent). — VIII : Lulanga (Ém. Laur.) : Eala (M. Laur. 1104).

BAUHINIA L.

Bauhinia Petersiana *Bolle* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 24; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 288; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 200; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 25 [B. S. B. B. XXXVI², 71].

1899 (G. Descamps). — XVI : Pala (Desc.) ; Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Kitololo** ; **Kifumbi** (Verd.).

Bauhinia reticulata *DC.* Mém. fam. Légumin. XIII (1825) 484 et Prodr. II (1825) 515; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. 266, t. 60; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 290 (err. cal. *articulata*) ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 121; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 296; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 76; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 47 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 253; II (1907) 138; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 112.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — III-IV : la Lufu. — Nom vern. : **Lolokemdamba** (Dew.). — V : Kisautu (Gill.). — IX : Luçoi (Luja). — XII : rég. bor. or. — Nom vern. : **Dopwa** (Ser.). — XV : entre Lusambo et le Lualaba (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kifumbi** (Verd.).

Bauhinia tomentosa *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 375; *DC.* Prodr. II, 514; Bot. Mag. (1866) t. 5560; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 290; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 121; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 296; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, t (1904) 130, (1906) 253; II (1907) 139.

Alvesia bauhinioides *Webc.* Apont. phyto-geogr. (1859) 587.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Ileus; Dew.). — IV : Luvituku (Dem.); Kito-bola (Ém. Laur.). — V : forêts entre Léopoldville et Luvituku (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : Mueue-Putu-Kasongo (Buett.); route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel). — VIII : Eala (M. Laur.). — XVI : le Katanga (Corn.).

BANDEIRAEA Welw.

Bandeiraea simplicifolia [*Vahl*] *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1866) 306 in nota; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 285; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 25 [B. S. B. B. XXXVI², 71].

Schotia — *Vahl* ex *DC.* Prodr. II (1825) 508.

1895 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Luebo (Ém. Laur.); Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Bandeiraea speciosa *Welw.* ex *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1865) 306, t. 40; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 284; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 138.

Griffonia — *Taub.* in *Éngl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 3 (1894) 147.

1903 (Marc. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 237). — XV : Lusambo (M. Laur.).

Bandeiraea tenuiflora *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1866) 307; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 285; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 17.

1899 (Éd. Luja). — V : Kimuenza (Gill.). — XV : Lubue [Kasai] (Luja).

MACROLOBIUM Schreb.

Macrolobium coeruleoides *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 137.

Vouapa coerulea *De Wild.* [non *Taub.*] Miss. Laurent (1905) 98.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 179); env. de Kisantu. — Nom vern. : **Lubeso** (Gill. 3784). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 734). — IX : Lisala (Ém. et M. Laur.).

Macrolobium Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 129.

1896 (A. Dewèvre). — V : la Lukaya (Gill. 205). — XII d : Vieux-Kasongo (Dew. 949). — Noms vern. : **Mooti** [Kasongo]; **Taulon** [Tanganika] (Dew.).

M. Dewevrei form. fol. **bijugis** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 129, t. 30; II (1907) 138.

1906 (Marc. Laurent). — XIII : kilom. 18 du chemin de fer des Grands Lacs (M. Laur. 1017).

— — form. fol. **trijugis** *De Wild.* l. c. I (1904) 129, t. 31; II (1907) 138 et Miss. Laurent (1905) 99.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Sanda (Odd.). — VIII : Efukoi-Kombe (M. Laur. 1267). — XIII a : Romée (M. Laur. 1679); Stanleyville. — Noms vern. : **Imbali**; **Bombali** (Pyu. 73); entre Djambo et Buta. — Nom vern. : **Limbo** (Ser. 31). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (Brisac); Lubi (Leser. 172). — Nom vern. : **Bombari** [Ikwangula].

Macrolobium Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 252, t. 46.

1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 3645).

Macrolobium Heudelotii *Planch.* ex *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1865) 308; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 298; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10 [B. S. B. B. XXXVII, 53] et Reliq. Dewevr. (1901) 77; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 252; II (1907) 138.

Vouapa macrophylla *Baill.* in *Adansonia*, VI (1865) 178 t. 3, fig. 6; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 299.

1895 (A. Dewèvre). — II a : rives du Loango (Dew. 281). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3307). — VIII : Mouzambi (Brun. in M. Laur. 1816). — XI : Megandjo (M. Laur. 1659).

Macrolobium Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 99.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Dibebe; bords du Sankuru (Ém. et M. Laur.).

OBS. — M. De Wildeman [l. c.] signale aussi à Dibebe, une forme très voisine de cette espèce.

Macrolobium Palisotii *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1865) 308; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 297; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10 [B. S. B. B. XXXVII, 53] et Reliq. Dewevr. (1901) 77; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 138.

Vouapa — *Baill.* in *Adansonia*, VI (1865) 178; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 299.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 1166). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

BERLINIA Soland.

Berlinia acuminata *Soland.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 326; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 293; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl.

Cgo, I (1897) 26 [B. S. B. B. XXXVI², 72] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 17; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 77; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 98 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 129, (1906) 251; II (1907) 134.

1896 (G. Descamps). — V : env. de Stanleyville (Dew.); env. de Sanda (Odd.); Lula-Lumeue (Hendr.). — VI : rég. du Kwango (But.); Eïolo (Ém. et M. Laur.) — VII : la Fiui (Ém. et M. Laur.). — VIII : le loug du Rubi (Lescr. 171). — IX : Pedza [Umangi] (Krek.). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.).

B. Acuminata var. **Bruneelii** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 135.

1904 (Éd. Lescrauwaet). — IX : la Baringa (Brun. 26). — XV : Lubi (Lescr. 158); Limbutu (M. Laur. 1003).

— — var. **pubescens** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 129.

1901 (Alph. Cabra et Michel). — lud. non cl. : Buete-Kimanga (Cabra-Michel, 1).

Berlinia bracteosa *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1866) 309; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 294; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 26 [B. S. B. B. XXXVI², 72].

1895 (G. Descamps). — Congo (Eru. Dew.). — II a : Biugila (Dup.). — XVI : Toa (Desc.).

Berlinia Eminii *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 98; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 30 [B. S. B. B. XXXVI², 76]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 46.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.); Lukafu. — Nom vern. : **Musamba** (Verd.).

Berlinia Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 135.

1906 (Marc. Laurent). — XIII a : Romée (M. Laur. 1661).

Berlinia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 136.

1905 (Fél. Seret). — XIII a : rives du Rubi depuis Kuti (Ser. 45).

AFZELIA Sm.

Afzelia africana *Sm.* in Trans. Linn. Soc. IV (1798) 224; *DC.* Prodr. II, 507; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. 263; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 302; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 122; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 77; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 109-110.

Intsia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 102; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 290.

1816 (Chr. Smith).— Bas-Congo (Sm.).— II a : le Mayumbe (Ëm. Laur.).—VIII : Coquilhatville (Dew.) ; Eala (M. Laur. : Pyn.) ; Bombimba [Ikelemba] (M. Laur.). — IX : Bumba (Pyn.). — XI : Yambuya (M. Laur.) ; Basoko (M. Laur.) ; Lokandu (Dew.). — XIII a : Stanleyville (M. Laur.). — XIII e : Yakusu (Ëm. Laur.). — XV : Bena-Dibele (Ëm. Laur.) ; Lubi (Leser.) ; Limbntu (M. Laur.) ; Lac Foa (Leser.) ; Kondue (Lederm.).

Afzelia cuanzensis Welw. Apont. phyto-geogr. (1859) 386 ; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 302 ; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 30 [B. S. B. B. XXXVI, 2, 76].

Intsia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 192 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 299.

1888 (Fr. Hens). — VIII : pays des Bangala (Hens, C. 141). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Mupapa** (Veid. 27).

TAMARINDUS L.

Tamarindus indica L. Sp. pl. ed. f (1753) 34 ; *Jacq.* Hist. stirp. Amer. t. 13 ; *DC.* Prodr. II, 488 ; *Bot. Mag.* (1851) t. 4563 ; *Descourtilz* Fl. des Antilles, II, t. 120 ; *Nees* Pl. officin. t. 341 ; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 308 ; *Bebdome* Fl. Sylv. Ind. t. 184 ; *Bak.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 273 ; *Benth.* et *Trim.* Medic. Pl. I, t. 92 ; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 122 ; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 28 [B. S. B. B. XXXVI², 74 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 191 ; *De Wild.* Not. pl. util. on intér. du Cgo, II (1906) 151-153, fig. 9.

1877? (J. F. Lopez). — Bords du Congo (Lop.). — IX : Bangala (Ëm. Laur.). — XIV : Uvira (Desc.).

BAIKIAEA Benth.

Baikiaea anomala M. *Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 25 [B. S. B. B. XXXVI², 72].

1895 (Ëm. Laurent). — XV : forêts près de Lusambo (Ëm. Laur.).

Baikiaea insignis *Benth.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1865) 314, t. 41 ; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 309 ; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10² [B. S. B. B. XXXVII, 54] ; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 102 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 254.

1895 (Ëm. Laurent). — Bas-Congo (Ëm. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Bombaie ; Bas-Kasai (Ëm. et M. Laur.) ; rives du Kasai (Ëm. Laur.).

Baikiaea Lescauwaeii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 141.

1905 (Éd. Lescranwaet). — VIII : Ikoko (Leser. 415).

Baikiaea minor *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 309; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 123; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 78; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 103 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 254; II (1907) 141.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Sanda (Odd.). — VI : Eïolo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Yambola** (M. Laur. 908); Ikoko (Lescr. 167); rives du Ruki (Gisseleire in Pyn. 288). — IX : Bangala (Hens).

SCHOTIA Jacq.

Schotia latifolia *Jacq.* Fragm. bot. (1809) 23, t. 15, fig. 1; *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 274; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10² [B. S. B. B. XXXVII, 54] et Reliq. Dewevr. (1901) 78.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Babuudu (Dew. 1146).

Schotia Romii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo; II (1907) 132, fig. 4.

1888 (F. Demeuse). — Congo (Dew.). — VIII : Mompono (Bruneel, 37). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1680); Yambuya (M. Laur. 1827). — XV : Limbutu (M. Laur. 1681); Idauga (L. Rom); rég. du Kasai (Lescr.). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. non cl. : le Lomami (Dem. 159).

BRACHYSTEGIA Benth.

Brachystegia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 204.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kisamba-Kwe-Kwe** (Verd. 117).

Brachystegia mpalensis *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 27 [B. S. B. B. XXXVI², 73] et Ill. fl. Cgo (1902) 175, t. 88; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 45.

1895 (G. Descamps). — XVI : Pala (Deb.); Toa (Desc. 27); Lukafu (Verd. 58).

— — var. **latifoliolata** *De Wild.* l. c. (1902) 45.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mukutu** (Verd. 64).

Brachystegia stipulata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 44.

B. appendiculata *De Wild.* [non *Benth.*] l. c. (1902) t. 12.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 18).

CRUDIA Schreb.

Crudia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 97.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

CRYPTOSEPALUM Benth.

Cryptosepalum Debeerstii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 40.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb. 32).

Cryptosepalum exfoliatum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 41.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Cryptosepalum maraviense *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 304; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 28 [B. S. B. B. XXXVI², 74].

1895? (G. Descamps). — Congo (Desc.)

— — var. **minus** *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII² (1895) 100; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 122.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Cryptosepalum Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 39.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd.).

DEWINDTIA De Wild.

Dewindtia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 43.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 118).

COPAIFERA L.

Copaifera Arnoldiana [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *Th.* et *Hél. Dur.*

Copaiba — *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 12 [B. S. B. B. XXXIX², 64] et in III. fl. Cgo (1901) 125, t. 73.

1899 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra, 136).

Copaifera Demeusei *Harms* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 264; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 128; II (1907) 132 et Miss. Laurent (1905) 97.

1892 (F. Demeuse). — V : Bolobo (Èm. et M. Laur.). — VI : Dima (Èm. et M. Laur.). — VII : Lac Léopold II (Dem.); luongo; Ibali (Èm. et M. Laur.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Baka** (M. Laur. 753). — X : C. le long de l'Ubangi (Èm. et M. Laur.). — XI : Basoko (Èm. et M. Laur.).

Copaifera Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 132.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1648, 1825).

HARDWICKIA Roxb.

Hardwickia Mannii Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 316; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10²; [B. S. B. B. XXXVII, 56] et Reliq. Dewevr. (1901) 78; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 132.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 667 a). — XV : Limbutu (M. Laur.).

CYNOMETRA L.

Cynometra congensis De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 127.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Cynometra ? djumaensis De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 128, t. 39.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

Cynometra Gilletii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 128; II (1907) 130 et Miss. Laurent (1905) 95.

1902 (J. Gillet). — V : Wombali (Gill. 2710). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.); Bala-Luudzi (Pyu. 334). — IX : Mouzambi (Pyu. 398). — XV : Limbutu (M. Laur. 1036).

Cynometra Laurentii De Wild. Miss. Laurent (1905) 96 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 130.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Coquilhatville (Pyu. 284); Eala (Pyu. 360, 406, 437); Yala [Baringa] (Bruu. 35). — IX : Busa (Ém. et M. Laur.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Lac Foa (Leser. 219).

Cynometra Lujae De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 250, t. 70.

1898 (Éd. Luja). — IX : Luozi (Luja, 147).

Cynometra Mannii Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 317; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 123; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI², 77] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 18; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 130.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sin.). — II : Boma (Dup.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — V : rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja); env. de Yumbi (M. Laur. 417); Lukolela (Pyu. 206). — VIII : Eala (M. Laur. 830, 1806).

Cynometra Oddoni De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 131.

1904 (Ad. Oddon). — V : Souda (Odd. in Gill. 3706).

Cynometra pedicellata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 131.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1807). — XV : Limbutu (M. Laur. 1670).

Cynometra Schlechteri *Harms* in *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. (1900) 290 [nom. tant.] et in *Engl. Jahrb.* XXX (1901) 77.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlecht. 12659).

Cynometra sessiliflora *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 262.

1898? (J. H. Camp). — V : le Stanley-Pool? (Camp).

Cynometra Vogelii *Hook f.* in *Hook.* Niger. Fl. (1849) 328; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 317; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 78.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga. — Nom vern. : **Banda-banda** (Dew. 290).

ERYTHROPHLEUM Afzel.

Erythrophleum guineense *Don* Gen. Syst. Bot. II (1832) 424; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 320; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 196; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 123; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1896) 127.

Fillaea suaveolens *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 242, t. 55.

E. ordale *Bolle* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 10.

Mavea judicialis *Bertol.* in *Mem. Acc. Sc. Bolog.* II (1850) 570, t. 39.

1882 (H. Johnston). — Bas-Congo (Decort, in Gill. 1542). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

MIMOSEAE

PENTACLETHRA Benth.

Pentaclethra Eetveldeana *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gillelianae, I (1900) 20 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 20]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 126; II (1907) 130, 250 et *Miss. Laurent* (1905) 95.

1900 (J. Gillet). — IV : Luvituku (Ém. Laur.) — V : Kisantu (Gill. 710) : Sanda et env. — Nom vern. : **Kinseka** (Odl.; Gill. 3657). — VI : vallée de la Djouna (Gent.). — VII : Ibali (Ém. Laur.). — VIII : Bikoro (Pyn. 371).

Pentaclethra macrophylla *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 330; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 322; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 196; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10² [B. S. B. XXXVII, 54] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 78; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 127; II (1907) 130.

1893 (Ém. Laurent). — II : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Panza** (Gill.); Sanda (Odl.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Madibi (Sap.). — VIII : Coquilhatville. — Noms vern. : **Boala**; **Mobala** (Dew.); Eala (M. Laur.).

PARKIA R. Br.

Parkia biglobosa *Benth.* in *Hook. Journ. of Bot.* IV (1842) 328; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 324; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild. Mal. fl. Cgo.* II (1898) 10² [B. S. B. B. XXXVII, 51] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 79; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo.* II (1906) 140-43. 1895 (A. Dewèvre). — V : l'Ikisi (Dew.).

Parkia flicoides *Welw.* ex *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 324; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 305; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1904) 126; II (1907) 129.

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2289). — VI : entre Popokabaka et les chutes François-Joseph (Gent. 103). — XV : Limbutu (M. Laur.).

Parkia Klainei *Pierre* ex *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 129 [nom. tant.].

1905 (Marc. Laurent). — XV : Limbutu (M. Laur. 1828).

ENTADA Adans.

Entada abyssinica *Steud.* in *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* I (1847) 234; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 327; *Th. Dur. et De Wild. Mal. fl. Cgo.* I (1897) 28 [B. S. B. B. XXXVI², 74]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 79 et *Pl. Gillelianae*, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 748]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1906) 249; II (1907) 129.

Gigalobium — *Hiern Cat. Welw. Pl.* I (1896) 305.

1891 (F. Demeuse). — IV : Luvituku (Dew.) — V : Kisantu (Gill.); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VIII : Coquilhatville (Dew. 606). — XV : le Sankuru (Ém. Laur.); Bena-Mulengere (Dew. 1009). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Noms vern. : **Niniki** [Kasongo]; **Onguikie** [Bakusu]; **Nicena** [Tangauika]. — Ind. non cl. : bords du Lomami (Ém. Laur.).

Entada africana *Guill. et Perr.* *Fl. Seneg. tent.* (1832) 233; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 326; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1904) 126.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Entada scandens *Benth.* in *Hook. Journ. of Bot.* IV (1842) 332; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 325; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 126, (1906) 249; II (1907) 129, 257, t. 75.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill. 1162). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1106). — XV : rég. de Mukenge (Pg.)

Entada sudanica *Schweinf.* *Reliq. Kotschyanae* (1868) 8, t. 8; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 327; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*. II (1907) 129.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 674, 712, 1290). — XII : Kiravungu (Ser. 175).

— — var. **pauciflora** *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 126 et *Miss. Laurent* (1905) 94.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

FILLAEOPSIS Harms.

Fillaeopsis discophora *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 259, t. 6; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 124; II (1907) 37, 129, t. 15, 16.

1896 (A. Dewèvre). — II a : Hant-Shiloango (Cabra-Michel). — VIII : env. de Bokakata. — Nom vern. : **Sonanaka** ou **Esonanaka** (Dew.). — XI : Basoko (M. Laur. 1053).

PIPTADENIA Benth.

Piptadenia africana *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 320; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 328; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 306; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 94 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 129.

1903 (Ém. Laurent). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville; Lulanga (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laurent); Limbutu (M. Laur.); Kondue (Lederm.).

ADENANTHERA Royen.

Adenantha Gilletii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 249.

1903 (J. Gillet). — V : Sanda (Gill. 3435, 3459).

TETRAPLEURA Benth.

Tetrapleura Thonningii *Benth.* in *Hook. Journ. of Bot.* IV (1842) 345; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 339; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl.*

Cgo, II (1898) 10⁴ [B. S. B. B. XXXVII, 54]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 307; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 79; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 91 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 129.

1895 (Ém. Laurent). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Ececi** (Dew.). — VI : env. de Madibi (Sap.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Yauongo (Ém. et M. Laur.). — XV : bords du Sankuru (Ém. Laur.); Kondue (Lederm.).

DICHROSTACHYS Wight et Arn.

Dichrostachys nutans *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 355; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 333; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 123; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 195; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 308; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 39; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 115 et Miss. Laurent (1905) 94.

1863 (R. Burton). — Congo (Burt.); brousse du Bas-Congo (Ém. Laur.). — III : vallée de la Ufwa [affl. de la Pozo] Cabra-Michel. — IV : Kitobola (Ém. Laur.); Lukungu (Hens). — V : le Stanley-Pool; entre Dembo et le Kwango (But.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Obs. — « Une des espèces les plus caractéristiques de la steppe, répandue dans toute l'Afrique tropicale » (Dew.).

Dichrostachys platyptera *Wehw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 576; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 333; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 308; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 94.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Umaugi (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.).

MIMOSA L.

Mimosa asperata *L.* Syst. veget. ed. 10 (1759) 1312; *DC.* Mém. fam. Légum. t. 63 et Prodr. II, 428; *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 400; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 335; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 195; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 124; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 79; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 126, (1906) 249; II (1907) 128 et Miss. Laurent (1905) 94.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (But.). — II : Boma (Dew.); Ponta da Lenha (Naum.). — II a : Bingila (Dup.). — III : Tondoa (Naum.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Léopoldville (Ém. Duch.); Suata (Buett.); Lukolela (Pyn.); Kisantu (Gill.). — VIII : Ikenge (Paulus); Équateurville [Wangata] (Dew.); Gombe (M. Laur.). — XV : bords du Kasai (Ém. et M. Laur.).

Mimosa pudica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 518; Bot. Reg. XI, t. 941; *Spach* Hist. des végét. [Atlas] t. 1; *Benth.* in *Mart.* Fl. Brasil. XV², 316; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 336 in obs.; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 195; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 128.

1903 (L. Pynaert). — V : Lukolela (Pyn.).

ACACIA Willd.

Acacia ataxacantha DC. Prodr. II (1825) 459; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 244; *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 511; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 343; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 125; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 79; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 39.

1872 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII d : entre Nyangwe et Kabanga (Dew.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Acacia Buchanani Harms in Engl. Jahrb. XXX (1901) 76; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 183.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kopunga-Umba** (Verd. 221).

Acacia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 80; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 125.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville; entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2578). — XIII d : env. de Kabanga. — Nom vern. : **Canga-Chicot** (Dew. 953).

On en rencontre des formes à feuilles uni- bi- et trijuguées.

Acacia Farnesiana [L.] Willd. Sp. pl. IV (1806) 1083; *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 496 et in *Mart.* Fl. Brasil. XV², 394; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 346; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 124; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 312; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 105-108 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 248; II (1907) 127.

Mimosa — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 521.

1885 (R. Buettner). — II : Boma (Gill.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — III : Tondoia (Buett.). — V : bords du Stanley-Pool (Heus). — VIII : Eala [cult.] (M. Laur.).

Acacia Lahai *Steud. et Hochst.* ex *Benth.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) 506; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 240; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 80.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Vieux-Kasongo (Dew.). — Noms veru. : **Kace-ngengui** [Kasongo]; **Pomboro** [Ikwangula]; **Ouban-Banguée** [Tanganika].

Acacia Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 8 [B. S. B. B. XXXIX², 99].

1899 (Éd. Luja). — Bena-Dibele [Kasai] (Luja).

Acacia pennata Willd. Sp. pl. IV (1805) 1090; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 345; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 312; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 194; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 93 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 127.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

Acacia Seyal Delile Deser. Égypte (1813) 286, t. 52, fig. 2; *DC.* Prodr. II, 460; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 351; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 195.

Le type existe dans tout le bassin du Nil.

— — var. **Lescrauwaetii** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 128.

1905 (Éd. Lescrauwaet). — XV : entre la Lulua et Kanda-kanda, au S. de 7° (Lescr.).

— — var. **Sereti** *De Wild.* l. c. II (1907) 128.

1905 (F. Seret). — XII : rég. du chef Guago (Ser. 290).

Acacia Sieberiana *DC.* Prodr. II (1825) 463; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 347; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 39 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo.* II (1906) 108-109.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Muesa** (Verd.).

Acacia tortilis *Hayne* *Arzneigew.* X (1836?) t. 31; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 352; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo.* I (1897) 28 [B. S. B. B. XXXVI², 74].

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

ALBIZZIA Durazz.

Albizzia Brownei [*Walp.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 362; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 317; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 37 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1906) 248.

Zygia — *Walp.* *Repert. bot.* I (1849) 928.

Feuilleea Zygia O. *Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 187.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kasongo (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kabumbu** (Verd.).

Albizzia ealaensis *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 126.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 665).

Albizzia fastigiata [*E. Mey.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 361; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 317; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1904) 78 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 750]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 111-112 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 125, (1906) 249; II (1907) 127.

Zygia — *E. Mey.* Comm. fl. Afr. austr. (1835) 165.

Feuilleea Sassa *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 186.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.); entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — XI : Bomaueh (M. Laur.). — XV : reg. de Mukenge (Pg.).

Albizzia intermedia *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1904) 79 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 750].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1986).

Albizzia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 37.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musase** (Verd. 66).

Albizzia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 92 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 127.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 240). — VIII : Eala (M. Laur. 793); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Bongo** [Eala] (M. Laur.).

Albizzia Lebbek [*Willd.*] *Benth.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. III (1844) 87; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 358; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 93 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 36, 127, t. 3.

Acacia — *Willd.* Sp. pl. IV (1805) 1066.

Feuilleea — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 183.

Albizzia latifolia *Boiv.* in Encycl. du XIX^e siècle, II, 33; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 315.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Galiema (Ém. et M. Laur.). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.).

Obs. — Cultivé comme ombrage dans la plupart des postes du Congo (Em. Laur.).

Albizzia versicolor *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 359; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 315; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 125; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 38 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 125, (1906) 248.

Feuilleea — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 189.

1890 (F. Demeuse). — Bas-Congo orient. (Ém. Laur.). — II : Boma (Dem.). — III : près de la riv. Pandi (Cabra-Michel). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Sakela-Gombo** (Verd.).

PITHECOLOBIUM Mart.

Pithecolobium altissimum [*Hook. f.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 364; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 24 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 21] et Reliq. Dewevr. (1901) 80; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 125, (1906) 248; II (1907) 126 et Miss. Laurent (1905) 92.

Albizzia — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 332.

1896 (A. Dewèvre). — V : bord de la Djili (Odd.); Kisantu (Gill.): Sanda (Odd.); Kimuenza (Verm.). — VI : entre Swinburn et Eiolo (Ém. Laur.). — VII : Kiri (Ém. Laur.). — VIII : Coquilbatville (Dew.); Ikenge (Ém. Laur.); Mondjo (Pyn.). — X : rive de l'Ubangi (Ém. Laur.).

ROSACEAE

CHRYSOBALANUS L.

Chrysobalanus ellipticus *Noland.* ex *Sabine* in Trans. Hort. Soc. V (1824) 453; *DC.* Prodr. II, 526; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 366; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 125; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 319.

C. Icaeo L. var. *ellipticus* *Hook. f.* in *Mart.* Fl. Brasil. XI² (1867) 7.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Chrysobalanus Icaeo L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 513; *Schnizl.* Iconogr. t. 274; *Descourtilz* Fl. des Antilles, II, t. 84; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 365; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 319; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 178; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113].

1893 (Eug. Wilwerth). — I : Moanda (Vanderyst); Banaua. — II : Ile des Princes (Wilw.).

PARINARIUM Juss.

Parinarium congense *F. Didr.* [Pl. nonnull. Mus. Holm. (1854) 16] in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 197.

Kigalaria? *paniculata* *Schumach.* ex *F. Didr.* l. c. in syn.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Parinarium congolanum *Th. et Hél. Dur.* [nom. nov.].

P. congoense *Engl.* [non *F. Didr.*] in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 377; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 18 et Reliq. Dewevr. (1901) 81; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 89 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 253.

P. excelsum *Th. Dur. et De Wild.* [non *Sabine*] *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113]; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 138-140.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Ém. Laur.; Camp). — V : le Stanley-Pool (Cabra); et aval de Lukolela (Ém. et M. Laur.); env. de Kwamouth (M. Laur.); C. entre Kwamouth et Bolobo (Dew.); Lisha (Dem.); env. de Yumbi (M. Laur. 429). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew. 691); îles sablonneuses en aval d'Trebu (Ém. Laur.). — Noms veru. : **Pompo** [Bangala]; **Mampombo** [Équateur] (Dew.).

Parinarium curatellifolium *Planch. ex Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 33; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 368; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 191; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 19 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 81; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 245; II (1908) 253.

1896 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Duch. et Luja); Sabuka (Ém. Laur.); Kisautu; Kimuenza (Gill.); Kisantu-Makela (Vau Houtte); Kinshassa (Schlt.). — VI : Eiolo (M. Laur.); le Kwilu (Sap.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Bukila (Ém. Laur.); Munungu (Lescr. 365).

Parinarium gabonense *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 87.

Le type a été trouvé au Gabou.

— — var. ***mayumbense*** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 89.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : Temvo (Ém. et M. Laur.).

Parinarium Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 245, t. 59.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2529).

Parinarium glabrum *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 370; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 81; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 254.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Sanda (Odd.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 9, 675; Pyn. 361, 1265). — IX : pays des Bangala (Dew. 864).

Parinarium Holstii *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 423.

P. salicifolium *Engl.* [non *Miq.*] l. c. (1895) 191.

Le type a été trouvé dans l'Afrique orient. allemande.

— — var. ***longifolium*** *Engl. ex De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 81.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Lokaudu (Dew. 1109 c).

Parinarium Mobola *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 368; *Ficalho Pl. Uteis* (1884) 178; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 191; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 125; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 37.

Ferolia Mobola O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 216.

Parinari — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 320.

1885 (R. Buettner). — VI : le Kwango (Buett.). — XVI : Toa (Desc.); Lukafu. — Nom vern. : **Mapunda** (Verd.).

Parinarium Poggei *Engl.* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 378.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukeunge? (Pg. 914).

Parinarium subcordatum *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 367; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 126; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 19; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 46; II (1908) 254.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : bords du Congo [distr. des Cataractes] (Luja). — V : le Stanley-Pool (Dem.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kinshassa (M. Laur. 493); Lukolela (Pyn. 320). — VIII : Eala : (Pyn. 1068).

Parinarium Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 182.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mupundu** (Verd. 568).

ACIOA Willd.

Acioa Buchneri *Engl.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 88; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 126.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.).

Acioa Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 19; Reliq. Dewevr. (1901) 81 et Ill. fl. Cgo (1902) 185, t. 93.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.).

Acioa Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 47.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Acioa Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 254.

1906 (F. Seret). — XII c : rive du Bende à Gombari (Ser. 807).

Acioa Vanhouttei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 255.

1906 (Aug. Van Houtte). — V : l'Inkisi (Van Houtte, in Gill. 3964).

GRIFFONIA Hook. f.

Griffonia Barteri *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 373; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 126.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.).

MAGNISTIPULA Engl.

Magnistipula Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 255.

1900 (R. Butaye). — V : bassin de la Sele (But.).

RUBUS L. (1)

Rubus Goetzenii *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 384, 385.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

Rubus kirungensis *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 385.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcau Kirunga (Goetz. et Prittw.).

Rubus pinatus *Willd.* Sp. pl. II (1799) 1084; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 190; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 322; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 80 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 752]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 245; II (1908) 253.

1900 (J. Gillet). — V : entre Kisantu et Dembo (Gill.). — XII a : Gombari (Delp.); entre Bima et Bambili (Ser. 144). — XIII d : le Maniema (Verd.).

CRASSULACEAE

CRASSULA L.

Crassula abyssinica *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 309; *Britten* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 388.

Le type a été trouvé en Abyssinie.

— — var. **vaginata** [*Eckl.* et *Zeyh.*] *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 189; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 326; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 20.

C. vaginata *Eckl.* et *Zeyh.* Enum. pl. Afr. austr. (1837) 238; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 341.

1896 (G. Descamps). — XVI : Kititema (Desc.).

(1) *L'Eriobotrya japonica* Lindl. a été introduit à Kisautu par le Fr. Gillet [conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 253].

BRYOPHYLLUM Salisb.

Bryophyllum calycinum *Salisb.* Parad. Londin. (1806) 3; *Britten* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 390; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 80 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 752]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 236.

Crassulia floripendia *Commers.* ex *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) 141;

Hiern Cat. Welw. Pl. I, 326.

Crassula floripendula *Sims* in Bot. Mag. (1811) t. 1409.

1900 (J. Gillet). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.).

KALANCHOE Adans.

Kalanchoe coccinea *Welw.* ex *Britten* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 375; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 189; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 328; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 236.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — X : Bobangi (Ém. et M. Laur.).

— — var. **subsessilis** *Britten* l. c. II (1871) 375; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 127.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Kalanchoe Cuisini *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 3 [B. S. B. B. XXXVIII², 122] et Reliq. Dewevr. (1901) 82.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Mokanga [Mobanga?]. — Nom vern. : Puta-Puta (Dew.).

Kalanchoe glandulosa *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 312; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 253.

1905 (F. Seret). — XII c : case Zala [Suraugo] (Ser. 403). — Noms vern. : Kuli-kuli [Abaremba]; Kula-kula [Amadi].

— — var. **benguelensis** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) 223; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 318; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 179.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kakungui (Verd.).

DROSERACEAE

DROSERA L.

Drosera Burkeana *Planch.* in Annal. sc. nat. Sér. 3, IX (1848) 318; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 402; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 330; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 31 [B. S. B. B. XXXVI², 77] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 20.

1897 (J. Gillet). — V : euv. de Léopoldville (Luja); Dembo (Gill.).

Drosera indica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 282; *Wight* Ill. of Ind. Bot. t. 20; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 402; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 330; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 20.

1898 (Éd. Luja). — V : env. de Léopoldville (Luja).

RHIZOPHORACEAE

RHIZOPHORA L.

Rhizophora Mangle *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 413; *DC.* Prodr. III, 32; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 408; *Spach* Hist. des végét. [Atlas] t. 34; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 181; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 333; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 127.

1882 (H. Johnston). — Congo (Dev.); Bas-Congo (Johnst.). — I : Moanda (Gill.).

Rhizophora racemosa *G. F. W. Mey.* Prim. fl. Esseq. (1818) 185; *DC.* Prodr. III, 32; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 408; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 127.

R. *Mangle* *L.* var. — *Engl.* in *Mart.* Fl. Brasil XII² (1876) 427.

1816 (Chr. Sm.th.). — Bas-Congo (Sm.).

WEIHEA Spreng.

Weihea africana [*Benth.*] *Benth.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 410; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 83; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 61.

Cassipourea — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 341.

1895 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville. - Nom vern. : **Kokoko** (Dew.53); entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2513). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew. 693).

ANISOPHYLLEA R. Br.

Anisophyllea laurina *R. Br.* ex *Sabine* in Trans. Hort. Soc. V (1824) 446; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 413; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 127.

Anisophyllum — *Don* ex *Benth. et Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 324.

1885 (R. Buettner). — VI : le Kwango (Buett.).

Anisophyllea Poggei *Engl.* ex *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 83 [nom. tant].

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Tshoa (Dew. 396).

COMBRETACEAE

TERMINALIA L. (1)

Terminalia Catappa L. Mant. pl. (1771) 519; *Nuttall* Amer. Sylv. I, t. 32; *DC.* Prodr. III, 11; *Bot. Mag.* (1830) t. 3004; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 416; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 182; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 338; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV* [Combret.] (1899) 9, fig. 4; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 21.

1896 (Ém. Laurent). — XI : Basoko (Ém. Laur.).

Terminalia Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 4 [B. S. B. B. XXXVIII², 123] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 84.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Terminalia superba *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV* [Combret.] (1899) 26, t. 14, B. a-c; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 84.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : Ngotto (Dew. 840).

CONOCARPUS Gaertn.

Conocarpus erectus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 147; *Jacq.* Stirp. Amer. hist. 78, t. 52; *DC.* Prodr. III, 16; *Descourtilz* Fl. des Antilles, VI, t. 399; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 417; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV* [Combret.] (1899) 32; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 297; II (1908) 245.

1873 (Bastian). — I : Moanda (Gill. 3163); Banana (Fr. Naum. : Ém. et M. Laur.). — II : Bona (Bast.).

COMBRETUM L.

Combretum angustifolium *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 213; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 506.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu — Nom vern. : Mulumbu. (Verd. 81).

(1) *Terminalia torulosa* *F. Hoffm.* Beitr. Kenntn. Fl. Centr.-Ost.-Afr. (1889) 27; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV* [Combret.] (1899) 15, t. 5 fig. A. a-c; *T. mollis* *Laws.* [non *Vidal*] in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 417. = Ober Kongo Gebiet = arbre de la savane entre Ruemb et Tshih 1880 (Buchn. 564).

Nous ne savons si cette habitation est dans le Congo belge; nous ne trouvons pas ces localités.

Combretum Bosoi *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 195; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 502.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : euv. d'Eala (M. Laur. 179).

Combretum Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 196; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 490.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.).

Combretum Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 8 [B. S. B. B. XXXIX², 100]; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 507.

1899 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 175).

Combretum camporum *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 62; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 19 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 84; *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 30, t. 8, fig. C, a g; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 296 et *Miss. Laurent* (1905) 161.

C. elaeagnoides *Th. Dur.* et *Schinz* [non *Klotzsch*] Étud. fl. Cgo (1896) 128.

C. polystictum *Welw.* ex *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 351.

1874 (F. Naumann). — Bas-Congo (Heus, B. 36). — II : Boma. — Nom vern. : **Taile**. — Nom du fruit : **Kingo** (Naum.; Gill. 116, 3261). — II a : le Mayumbe (Em. Laur. 27). — III : Matadi (Em. Laur.).

Combretum cinereopetalum *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 84, t. 23, fig. E, a-f; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 84; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 296.

C. racemosum *Hiern* [non *P. Beauv.*] Cat. Welw. Pl. I (1898) 343.

1885 (R. Buettner). — II a : Shimbete (Dew. 315). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett. 35); euv. de Boala (Lescr.). — XIII d : Nyangwe (Dew. 924 a). — XVI : Lovoi (Desc.). — Noms vern. : **Mombo-Koma** [Kasongo]; **Gonle** [Ikwangula]; **Né** [Tanganika] (Dew.).

Combretum confertum [*Benth.*] *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 422; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 128; *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 74, t. 22, fig. C, a-b; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 85; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 161.

Poivre — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 338.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ile voisine de Malela (Dew.). — VIII : Ikeuge (Em. et M. Laur.) — Ind. non cl. : **Pezo** [Pozo? III] (Krek.).

Combretum constrictum [Benth.] Laws. (1) ex Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 432; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 128.

Poivreia — Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 337.

P. mossambicensis *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 78, t. 13.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 36).

Combretum cordifolium Engl. ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 296.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2728, 2737).

Combretum exannulatum [O. Hoffm.] Engl. et *Diels* in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III [Combret.] (1899) 88; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 161.

Cacoucia — O. Hoffm. in *Linnaea*, XLIII (1881) 132.

Campylogyne — *Hemsl.* in Hook. Icon. pl. (1897) t. 2550; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 354.

Cacoucia bracteata *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 434 pr. p.

1903 (Ém. Laurent). — II a : Benza-Masola (Ém. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.).

Combretum Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 65, 197 et 296 et *Miss. Laurent* (1905) 161; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 509.

1902 (L. Gentil). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3315 ; rég. de Lumene (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2805, 2892). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.).

Combretum Haullevilleianum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 213; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 506.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Bulubu** (Verd. 9).

Combretum Hensii Engl. et *Diels* in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III [Combret.] (1899) 85, t. 25, fig. A, a c; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 85; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 161 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 296.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Dew. 481; Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 36) : Chenal (Ém. Laur.); Sanda (Odd. in Gill 3312) : Dembo (Gill.). — VI : Madibi (Lescr. 81).

Combretum hispidum *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 421; *Engl.* et *Diels* in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III [Combret.] (1899)

(1) Engl. et *Diels* [Monog. Afr. Pfl. Fam. III (Combret.) 98, 99] séparent le **C. constrictum** *Laws.* en *C. constrictum* *Laws.* pr. p. et *C. quangense* Engl. et *Diels.* — La plante du Congo devra donc être réétudiée.

89; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 85; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 162.

C. Klotzschii *Welw. ex Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 422; *Hiern.* Cat. Welw. Pl. I, 341.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : **Kelekese** (Dew. 806). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.).

Combretum Kamatutu *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 215; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 497.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kamatutu** (Verd.).

Combretum latialatum *Engl.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl. Fam.* III [Combret.] (1899) 86, t. 14, fig. C, a-f; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 85; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 162 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 197.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 229); lac Tumba (Ém. et M. Laur.); Équateurville [Wangata] (Dew. 642); Coquilhatville. — Nom vern. : **Bosol** (Dew. 636, 642). — IX : Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.).

— — var. **multibracteatum** *Engl.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 65.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1912).

Combretum Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 197 et Miss. Laurent (1905) 162; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 509.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 193)

Combretum Lawsonianum *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 101, t. 30, fig. a-b; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 30; Contr. fl. Cgo, I (1899) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 85; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 162.

Cacocucia paniculata *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 484.

1891 (F. Demeuse). — V : Léopoldville (Dew.). — IX : Umangi-Mbwela [route de Ndekij] (Ém. Duch.). — IX : Bangala (Dew.). — IX a : Monga (Thonu.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.).

Combretum laxiflorum *Welw. ex Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 428; *Hiern* Cat. Welw. pl. I, 348; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 12; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 96, t. 1, fig. D, a-f.

1880 (vou Mechow). — XV : pays des Majakalla (Mech. 286). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kasakala** (Verd. 53).

- Combretum longepilosum** *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 30; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 85.
1896 (A. Dewèvre). — IX : pays des Bangala (Dew. 880).
- Combretum lukafuense** *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 214; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 508.
1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lukondu-N'Bo** (Verd. 10).
- Combretum marginatum** *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 18.
1893 (Jos. Duchesne). — Congo (Duch.).
- Combretum mucronatum** *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 184; *DC. Prodr.* II, 20; *Laws.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 426; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 31, t. 6; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 86; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 162.
C. Smeathmanni *G. Don.* in *Trans. Linn. Soc.* XV (1827) 423.
1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 620). — IX : env. de Mobeka (Ém. et M. Laur.).
- Combretum mussaendiflorum** *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 87, t. 25, fig. E, a-b; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 86.
1895 (G. Descamps). — XI : Lokaudu (Dew. 1123). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Nom vern. : **Kakisa-Kissa** [Tanganika].
- Combretum nervosum** *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 101, t. 29, fig. A, a-c.
1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).
- Combretum odontopetalum** *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 60, t. 18, fig. E; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 216.
1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulama** (Verd. 90).
- Combretum olivaceum** *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* (1895) 288; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899); *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 216.
1901 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 406).
- Combretum paniculatum** *Vent.* *Choix de pl.* (1803) sub t. 58, in adnot.; *DC. Prodr.* III, 20; *Laws.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 425;

Hiern Cat. Welw. Pl. I, 314; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 70.

1891 (G. Descamps). — XV : rég. de Mukenge (Pg.). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Combretum Poggei *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 86, t. 25, fig. B, a-c; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 65 et Miss. Laurent (1905) 162.

1882 (P. Pogge). — V : Kimuenza (Gill. 2063). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukenge (Pg. 920, 923, 924, 926, 929).

Combretum porphyrobotrys *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 73; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 86; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 66 et Miss. Laurent (1905) 163.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 321). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1975). — VII : Ganda (Ém. et M. Laur.); Ibali; Inongo (Ém. et M. Laur.).

Combretum puetense *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 46.

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

Combretum pyriforme *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 296, t. 71; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 508.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Combretum racemosum *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 87, t. 118; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 285, t. 67; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 424; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 128; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 343; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 82; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 87; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 197, (1906) 297 et Miss. Laurent (1905) 163.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe; Shimbete (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); rég. de Lumene (Hendr.). — VI : Madibi (Lescr.); Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — VIII : Eala (M. Laur.); Équateurville [Wangata]. — Noms vern. : **Bosoi**; **Bosofe** (Dew.). — IX : Nouvelle-Anvers (Em. Duch.). — X : Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XV : rég. de Mukenze (Pg.).

— — var. **flammeum** *Welw.* ex *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 425; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 129.

C. **flammeum** *Welw.* ex *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 344.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo; entre Bungi et Kingushi (Buett. 36, 36 a).

Combretum sericogyne *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Combret.] (1899) 87; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 163.

1895 (Ém. Laurent). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.); Lusambo (Ém. Laur.).

Combretum sinuatipetalum *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 215; *Diels in Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 493.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kifula-Buta** (Verd. 193).

Combretum splendens *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 289; *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 37; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 216.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutuma** (Verd. 305).

Combretum towaense *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 11, t. 3, fig. A, a-c.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

QUISQUALIS L.

Quisqualis indica *L. Sp. pl. ed. 2* (1762) 556; *DC. Prodr. III*, 23; *Laws. in Oliv. Fl. trop. Afr. II*, 435; *Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. II*, 459; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 129; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 37; *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV* [Combret.] (1899) 5, fig. 3; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 297 et *Miss. Laurent* (1905) 163.

Q. ebracteata *P. Beauv. Fl. d'Oware, I* (1804) 57, t. 35.

1862 (R. Burton). — I : delta du Congo (Schimp.). — II : env. de Boma (Dew.). II a : Zeuze (Ém. Laur.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Chenal (Ém. et M. Laur.).

Cultivée dans toute la région tropicale de l'ancien monde, cette espèce paraît sauvage en Malaisie. (Clarke, l. c.).

MYRTACEAE

PSIDIUM L. (4)

Psidium Guajava *L. Sp. pl. ed. I* (1753) 470; *Ficaltho* *Pl. Uteis* (1884) 184; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 287; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 357; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I* (1900) 21 et *Reliq. Dewevr.*

(1) De Wildeman, *Les Goyaviers* in *Not. pl. util. et intér. du Cgo, I* (1904) 252-262.

(1901) 88; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 25 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 325.

P. pyriferum L. l. c. ed. 2 (1762) 672, Bot. Reg. XIII, t. 1079; *Descourlitz* Fl. des Antilles, II, t. 72.

P. pomiferum L. l. c.: *Laos*. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 436.

1899 (Éd. Luja). — II a : Kemba (Dew.). — V : Léopoldville (Luja). — VIII : Équateurville [Wangata] (Ém. et M. Laur.). — IX : Unangi [cult.] (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Yambuya (M. Laur.). — XV : Ifuta (Ém. et M. Laur.). —

EUGENIA L. (1)

Eugenia calophylloides DC. Prodr. III (1828) 272; *Laos*. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 437; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 130.

E. caryophylloides Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) 359.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Eugenia Demeusei De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 325.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Léopoldville (Gill. 2700). — VI : vallée de la Djunia (Gill. 3654).

— — form. **lukolelaensis** De Wild. l. c. I (1988) 325.

1906 (L. Pynaert). — V : Lukolela (Pyn. 204).

Eugenia Dewevrei De Wild. et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVIII²] et Reliq. Dewevr. (1901) 88.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.).

Eugenia Jambos L. Sp. pl. ed. I (1753) 470; *Willd.* Sp. pl. II², 959; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II, 81 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 753]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 364; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 324.

E. Jambosa Elliot in Journ. Linn. Soc. XXX (1894) 80.

Jambosa vulgaris DC. Prodr. III (1828) 286; Bot. Mag. (1824) t. 3356.

1898 (Ern. Dewèvre). — Congo (Ern. Dew.). — V : Kimuenza (Luja); Kisantu (Gill.).

Obs. — Cultivé à Galiema [V] (Pyn. 142).

Eugenia Laurentii Engl. in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 288; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 326.

1895 (Ém. Laurent). — Congo (Ém. Laur.). — V : entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 3716).

***Eugenia uniflora** L. Sp. pl. ed. I (1753) 470; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 359.

E. Michellii Lam. Encycl. méth. Bot. III (1789) 203; DC. Prodr. III 263; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 437; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 160 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 326.

Plinia pedunculata L. f. Mant. pl. (1767) 253; Bot. Mag. (1800) t. 473.

1904 (Ém. Laurent). — Cultivé en 1904 à Nouvelle-Anvers [IX] (Ém. et M. Laur.) et à Eala [VIII] (M. Laur. 1280).

SYZYGIIUM Gaertn.

Syzygium cordatum Hochst. ex Sond. in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. II (1862) 521; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 288; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 95.

Eugenia — *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 438; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 360.

S. cordifolium Klotzsch. in *Peters.* Reise n. Mossamb. (1862) 63, t. 11.

1892 (Jul. Cornet). — V : bassin de la Sele (But.). — XVI : plateau du Katanga (Corn.; Verd.).

Syzygium owariense [P. Beauv.] Benth. in *Hook. f.* Fl. Niger (1849) 359; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 278; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 88; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 95 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 326.

Eugenia — P. Beauv. Fl. d'Oware, II (1807) 20, t. 70; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 438; *Th. Dur.* et *Schin.* Étud. fl. Cgo (1896) 130; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 81 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 753].

Jambosa — DC. Prodr. III (1828) 287.

Zyzygium guineense Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. (1833) 315, t. 72.

Eugenia — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 359.

1863 (R. Burton). — Congo (Burt.). — I : Moanda (Gill.). — IV : Kitobola (Pyn.); Nord-Manyanga (Cabra-Michel). — V : Léopoldville (Gill.); Chenal (Ém. Laur.); Lemfu (But.); bassin de la Sele (Pyn.); Kisantu; env. de Kimueza (Gill.); Kisante, Makela (Van Houtte); Lukolela (Pyn.); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.); env. du Lac Léopold II (Body). — VIII : Eala et env. (M. Laur.); Coquilhatville (Dow.); Basankusu (Brun.); Mondjo (Pyn.). — IX : Bangala (Dew.). — XI : Basoko (M. Laur.). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XV : bord de La Lubi (Ém. et M. Laur.); Limbutu (M. Laur.); rég. de Mukenze (Pg.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.). — Noms vern. : Icasagne [Bangala] (Dew.); Iendu; Mukulumbi [Bangala] (Sap.); Mokulu; Mokulu [Kwilu] (Sap.); Mufinsa; Biabilondo; Mutanea-Gommo (Verd.).

PETERSIA Welw.

Petersia africana Welw. ex Benth. et Hook. f. Gen. pl. I (1865) 721; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 439; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 362; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 89; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 295.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.). — VI : Madibi (Lescr.). — Noms vern. : **Nimengu**; **Mombinxo** [Lukolela]; **Mompoco** [Lulanga] (Dew.).

Obs. 1. — Des essais de plantation d'*Eucalyptus globulus* ont été tentés dans le Bas-Congo (conf. *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 175-193.

Oas. 2. — L'*Eucalyptus robusta* Sm. a été introduit de semis à Boma (Pyn.). [conf. *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 326].

Obs. 3. — L'*Eucalyptus viminalis* Labill., introduit en 1895, commence à se répandre dans les villages autour de Kisantu (J. Gillet); *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 80 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 752].

NAPOLEONAEA P. Beauv.

Napoleonaea imperialis P. Beauv. ex *Fr. Fisch.* in *Mém. Soc. Natural. Mosc.* I (1806) 92; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 362.

Napoleonaea — P. Beauv. *Fl. d'Oware*, II (1807) 29, t. 78; *DC. Prodr.* VIII, 550; *Laws. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 439; *Miers* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, 1 (1875) 7, t. 1, fig. 1 et t. 3, fig. 1-24; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 130; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 21 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 89; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo* (1906) 295; II (1908) 324.

N. Heudelotii *Juss.* in *Annal. sci. nat. Sér. 3*, II (1854) 227, t. 4; *Miers* in *Trans. Linn. Soc. Sér. 2*, I (1875) 8, t. 3, fig. 25, 26.

N. Vogelii *Planch.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 361, t. 49, 50; *Miers* l. c. 9.

N. Whitfieldii *Decne* in *Rev. Hort.* (1853) 301, t. 10; *Miers* l. c., t. 1, fig. 2-7.

N. angolensis *Welw.* *Apont. phyto-geogr.* (1859) 571, 586; *Miers* l. c. 12, t. 1, fig. 8-12.

N. cuspidata *Miers* l. c. (1875) 10, t. 2, fig. 4-6.

N. Mannii *Miers* l. c. (1875) 11, t. 2, fig. 1-3.

1880 (von Mechow). — V : Kisantu et env. (Gill. 3388); Sanda (Odd.). — VI : bassin du Kwaugo (v. Mech.). — VIII : Eala (Pyn.). — XIII d : entre Matendi et Kibala (Dew.). — XV : Bena-Dibele (Luja); Koudue (Lederm.).

MELASTOMACEAE

OSBECKIA L.

Osbeckia albiflora *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 21 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 90.

1896 (A. Dewèvre). — XV : env. de Mokoanga (Dew.).

Osbeckia Brazzaei *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII (1891) 335; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 9; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 327.

1906 (Hyac. Vanderyst). — V : Boko; Dembo; Kisantu (Vanderyst).

Osbeckia congolensis *Cogn.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 95 et in *DC. Monog. Phan.* VII, 314; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 131; *De Wild. et Th. Dur.* III, fl. Cgo (1898) 23, t. 12, fig. 1-9 et Reliq. Dewevr. (1901) 90; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 6; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 171; II (1907) 196.

1885 (R. Buettner). — V : route de Léopoldville à l'Équateur [1^{re} halte.] (Dew.); Léopoldville (Schlt.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimuenza (Gill.); Sanda (De Brouw.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Haut-Lopori (Biel.). — XV : la Lulua, vers 6½° (Pg. 943); le Kasai, vers 6¾° (Pg. 911); pays des Bashilango, vers 9½° (Pg. 137); Butala (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Kibaka (Buett.); Goloung (Pyn.).

— — var. **robustior** *Cogn.* ll. cc. XXXI (1889) 95 et VII, 314, 1177; *Th. Dur. et Schinz* l. c. 131; *De Wild.* Miss. Laurent, (1906) 163 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 327 [*sphalm.* « robusta »].

1885 (R. Buettner). — V : Kwamouth (Ém. et M. Laur.); le Stanley-Pool (Hens); Ile de Bamon (Dem.); Léopoldville (Em. Duch.); entre Bolobo et Lukolela (Buett.); env. de Kisantu (Gill.). — VI : Dima (Sap.). — VII : euv. du Lac Léopold II (Body). — VIII : Eala (Pyn.).

Osbeckia Crepiniana *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur.* III, fl. Cgo (1898) 23, t. 23, fig. 10, 11; *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 21; *Pl. Gillelianae*, I (1900) 21 [B Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 21] et Reliq. Dewevr. (1901) 90; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 171.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.). — Ind. non cl. : Gambi [Gombi?, IV] (Dew.).

Osbeckia drepanosepala *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 7; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 302.

1874 (Fr. Naumann.). — II : Ponta de Leuha (Naum.). — V : Dolo (Schlt. 12468).

GUYONIA Naud.

Guyonia intermedia *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 30, t. 16.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn.).

TRISTEMMA Juss.

Tristemma Demeusei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 299.

1891 (F. Demeuse). — IV : Mout Baugu (Dem. 76).

Tristemma grandifolium [Cogn.] Gilg in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 26; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 165 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 329.

T. Schumacheri *Guill. et Perr.* var. — *Cogn.* in *DC. Monog. Phau.* VII (1891) 361.

T. incompletum *R. Br.* var. — *Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1893) 364.

1903 (Aug. Krekels). — VIII : Eala (M. Laur. 1931) — XI : env. de Yambuya (Sohl.). — XV : Isaka (Krek.).

— — var. **congolatum** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 329.

T. Schumacheri *Auct.; Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 132 pr. p.; *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114]; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 20 et *Reliq. Dewevr.* (1900) 91 pr. p.; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 165 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 197.

1888 (Fr. Heus). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.). — IV : Luteto (Hens). — V : Kimuenza (Gill. 1979). — VI : Nadibi. — Nom vern. : **Motantum** (Sap.). — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1926). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 181) : env. de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 938 a). — XV : Leké (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Ikaie** [Équateur]; **Ganga-Tibie** [Ikwangula]; **Kaido-Kom** [Kasongo] (Dew.).

Tristemma hirtum *Vent.* *Choix des pl.* (1803) 35 in adnot.; *P. Beauv.* *Fl. d'Oware*, I (1804) 94, t. 57; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* II, 446; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 361; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 26; *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114].

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

Tristemma incompletum *R. Br.* in *Tuck.* *Congo Exped. Append.* (1818) 435; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 25; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 364; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 329.

T. Schumacheri *Guill. et Perr.* *Fl. Seneg. tent.* (1833) 311; *Naud.* in *Annal. sci. nat. sér. 3*, XIII, 298 t. 6, fig. 6; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* 353; *Hook f.* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* II, 446; *Cogn.* in *DC. Monog. Phau.* VII, 361, 1180; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 132 pr. p.; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 91 pr. p.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Shinganga (Dew. 202). — V : Léopoldville? (Schlt.).

Tristemma leiocalyx *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, add. (1891) 1179; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 131; *De Wild. et Th. Dur.* *Ill. fl. Cgo* (1898) 27, t. 14 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 91; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 24; *De Wild.*

Miss. Laurent (1905) 165 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 300; II (1908) 330.

1887 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 13); Kinneuzza (Dew. 505; Gill. 1664); Sauda (Odd. in Gill. 3334). — IX a : entre Misa et Gongo (Ser. 302). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.).

Tristemma littorale *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 353; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 362; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 91; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 365; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 25.

T. Schumacheri *Guill. et Perr.* var. — *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 446.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kinshassa (Dew. 704).

Tristemma roseum *Gilg.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 24, t. 1, fig. J, a-b.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Kusumba [Maugbetu] (Schw. 3656).

Tristemma Verdickii *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1904) 219.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 621).

Tristemma vincoides *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 24.

1882? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 934, 936).

DINOPHORA *Benth.*

Dinophora spenneroides *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 555; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 381; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 27, t. 1 II, fig. a-c; *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114].

1882? (P. Pogge). — Bas-Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); Sauda (De Brouw.). — VI : Madibi; Motaula [Kwilu] (Sap.). — XI : env. de Mogandjo (M. Laur.). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XV : Mukenge (Pg. 942, 944).

PHAEONEURON *Gilg.*

Phaeoneuron dicellandroides *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 35, t. 8, fig. B, a-n; *De Wild. Miss. Laurent* (1904) 166 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1907) 197; II (1908) 332.

Dinophora Thonneri *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 70 [B. S. B. B. XXXVII, 115] et *Pl. Thonnerianae* (1900) 31, t. 18.

1870 (G. Schweinfurth). — Bas-Congo (But.). — V : Kimuenza (Gill.). — VIII : Eala (Pyn. 1225, 1389, 1417); Ikenge (Huyghe); Bombimba [*lapsu cal.* Bambula] (Pyn. 335; M. Laur. 1217). — IX a : Galj (Thonn. 26). — XII d : Kusumba [Maug-bettu] (Schw. 3166). — XII c : Yakusu (Ëm. et M. Laur.).

ANTHEROTOMA Hook. f.

Antherotoma Naudini *Hook. f.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. I (1862) 745; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 441; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 9; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 327.

Osbeckia Antherotoma Naud. in *Annal. sci. nat. Sér. 3, XIV* (1850) 66; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 330; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 363.

1904 (A. Delpierre). — XII c : Niangara. — Nom vern. : **Ninga** (Delp.).

DISSOTIS Benth.

Dissotis aquatica *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 217.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : haut plateau du Katanga (Dew.).

Dissotis Autraniana *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, add. (1891) 1180; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 89, t. 45; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 13; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 164.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 32 pr. p.). — VI : Eiolo (Ëm. et M. Laur.).

Dissotis Brazzaei *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII (1891) 371 et in *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 29, t. 15; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 132; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 69 [B. S. B. XXXVII, 114]; *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 20; II (1900) 22 et Pl. Gilletianae, II (1901) 21 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 21]; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 18 in syn.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 191, 278; II (1907) 197, (1908) 327.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — IV : route des Caravanes (Ëm. Laur.); Luvituku (Dem. 66); Lutete (Hens, A. 45). — V : Léopoldville et env. (Schlt.; Luja); env. de Sabuka (Ëm. et M. Laur.); env. de Dembo (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte in Gill. 3459); Kisantu (Gill. 684, 704); Maydis (Odd.); Kiduma (Vauderst). — VI : riv. Sanga (Cabra). — XII b : entre Bima et Bambili (Ser. 216).

Dissotis capitata [*Vahl*] *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 449; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 365; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 132; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I², 365; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 13; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 171; II (1907) 197, (1908) 171.

Melastoma capitatum Vahl Eclog. pl. (1796) 45.

Heterotis — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1819) 352.

Tristemma erectum Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. (1833) 312.

Melastomastrum — *Naud.* in *Annal. sc. nat.* Sér. 3. XIII (1819) 296, t. 5, fig. 4.

1882! (P. Pegge). — V : le Stanley Pool (Ém. Laur.); Kisanu; env. de Kimuenza (Gill); rég. de Lula-Lumene (Hendr.; Mayidis (Cd 1). — XV : Lusambo (Jos. Duch.); le Sankuru (Ém. Laur.); Musumba (P.g. 180). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.); Lupundi (Dem.).

D. capitata var. **Vogelii** [*Benth.*] *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 450; *Cogn.* l. c. VII, 335; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 20; *Gilg* in *Engl.* l. c. II, 13; *Hiern* l. c. 366.

1896 (Ém. Laurent). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.).

Dissotis cordata *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pl.-Fam. II [Melast.] (1898) 17, t. 3 fig. B.

1876! (P. Pegge). — XV : pays des Bashilange au bord de la Lulua, vers 9½° (Pg. 134).

Dissotis cornifolia [*Benth.*] *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 364; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 361; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pl.-Fam. II [Melast.] (1898) 13; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 327.

Heterotis — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1819) 351.

Tristemma — *Triana* in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII (1871) 57.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Efukwa-Kombi (M. Laur. 1930).

Dissotis debilis [*Sond.*] *Triana* in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII (1871) 58; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 367; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 20; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pl.-Fam. II [Melast.] (1898) 14.

Osbeckia — *Sond.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 47.

D. lanceolata *Copp.* in *DC.* l. c. VII (1891) 366; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1909) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2. I, 22]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 366; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 299.

D. villosa *Engl.* [non *Hook. f.*] in *Engl. Jahrb.* VIII (1887) 62; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 135.

1874 (Fr. Naumana). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : Kimuenza (Gill 70); Saada (Odd). — VI : route de Tumbuz-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel, 27). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Dissotis decumbens [*P. Beauv.*] *Triana* in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII (1871) 58; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 368; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898, 69) [B. S. B. B. XXXVII, 114]; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pl.-Fam. II [Melast.] (1898) 15; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 366; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1901) 171, (1906) 299; II (1907) 197, (1908) 327.

Melastoma decumbens P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 69, t. 41.

D. laevis Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 451; *Uern* Cat. Welw Pl. I, 366; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 299.

1895 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Cabra). — III : ravin du Diable (Dem. 36). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Dembo (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilbatville (Ém. Laur.); Eala (M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XII : route de Bambili à Amadis (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

D. decumbens var. *minor* Cogn. in *DC.* Monog. Phan. VII (1891) 369; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 133; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 21 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 21].

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (Gill. 609). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 164).

Dissotis falcipila Gilg in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 23, t. 3, fig. A, a-b.

1876? (P. Pogge). — XV : Musumba (Pg. 132).

Dissotis Gilgiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 217.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : haut plateau du Katanga, 1000^m d'alt. (Verd.).

— — var. *petiolata* *De Wild* l. c. (1903) 218.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Kaleala** (Verd. 113).

Dissotis Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1896) 298.

1900 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 1816). — V : Kinanga (Odd. in Gill. 1873).

Dissotis gracilis Cogn. in *DC.* Monog. Phan. VII (1891) 366; *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 302; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 14.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville; Dolo (Schlt.).

Dissotis Hensii Cogn. in *DC.* Monog. Phan. VII (1891) 372; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 133; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 92 et Ill. fl. Cgo (1898) 19, t. 10; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 19; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 164 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 171; II (1908) 328.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Gill. 1891). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi; riv. Kwilu (Sap.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur (Dew. 557); Eala et env. (M. Laur. 63, 723; Pyn. 731, 1093); Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : Bangala (Hens, C. 129). — XIII d : Eluugu (Dew. 1059 b). — Nomsvern. : **Losele** [Madibi]; **Motoalon** [Kwilu]; **Kondoku** [Bangala] (Sap.).

Dissotis incana [*E. Mey.*] *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) 58, t. 4, fig. 41 d; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 370; *Gilg* in *Engl. Pfl. Ost Afr.* 295 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 17; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 298; II (1908) 328.

Osbeckia — *E. Mey.* ex *Hochst.* in *Walp. Repert. bot.* V (1858) 708.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2320). — XV : au S. de Tshitadi (Lescr. 318).

Dissotis Irvingiana *Hook.* in Bot. Mag. (1859) t. 5149; *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58, t. 4, fig. 44 c; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 453; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 133; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 375; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 20.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

Dissotis macrocarpa *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 18; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 328.

1904 (Gust. Delpierre). — XII : l'Uele (Delp.). — XII b : route de Bima à Bam-bili (Ser. 229).

Dissotis multiflora [*Sm.*] *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 412; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 18, t. 2, fig. F, a-d; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 164 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 328.

Osbeckia — *Sm.* in *Rees Cyclop.* XXV (1814) n. 7; *DC. Prodr.* III, 143; *Hieru* Cat. Welw. Pl. I, 361; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 332 et in *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 31 [B. S. B. B. XXXVI¹, 17].

1870 (G. Schweinfurth). — Bords du Congo (Ern. Dew.). — V : Sabuka (Ëm. et M. Laur.). — VIII : Coquihatville; Irebu (Schlt.); Eala (Pyn. 1140); Lulanga (Ëm. et M. Laur.; Pyn. 75). — XII d : pays des Mangbettu, sur la rive gauche de l'Uele (Schw.). — XV : Musumba (Pg. 133, 139, 141).

Dissotis phaeotricha [*Hochst.*] *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 367; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 14 et in *Engl. Pfl. Ost Afr.* 295; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 299; II (1908) 328

Osbeckia — *Hochst.* in *Walp. Repert. bot.* V (1816) 708.

D. villosa *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 450; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 367; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 135.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 3731). — XV : Musumba (Pg. 131). — XVI : le Katanga (Verd.).

Dissotis rotundifolia [*Sm.*] *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 369; *Th. Dur.* et *Schinz*

Étud. fl. Cgo (1896) 131; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 15; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 328.

Osbeckia rotundifolia Sm. in *Rees Cyclop.* XXV (1822) n. 20.

Melastoma plumosum D. Don in *Mem. Wern. Soc.* IV (1823) 291; *DC. Prodr.* III, 147.

Heterotis — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 318.

Dissotis — *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 452.

D. prostrata *Triana* l. c. (1871) 58; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 452; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 73, t. 39; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 369; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 134; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 22].

Melastoma — *Schumacher* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 220.

Heterotis — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 349.

Osbeckia zanzibarensis *Naud.* in *Annal. sci. nat. Sér.* 3, XIV (1850) 55, t. 7, fig. 5.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 161). — XII a : route de Buta à Bima (Ser. 51). — XII d : Munza (Schw.). — Ind. non cl. : Lulunka (Dem.).

Dissotis Schweinfurthii *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 21.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3445).

Dissotis segregata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 350 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 448; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 134; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 363; *Gilg.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 12 (1); *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 22; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 164.

Heterotis — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 350.

Tristemma — *Triana* in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII (1871) 56.

1882 (P. Pogge). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Kisantu (Gill.); Suata (Buett.). — VII : Kiri (Em. et M. Laur.). — VIII : Équateur (Dew.). — XV : pays des Bashilange (Pg. 935).

Dissotis Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 328.

1906 (F. Seret). — XII d : territ. de Bokoyo (Ser. 587).

Dissotis Thollonii *Cogn.* ex *Buett.* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXXI (1889) 96 et in *DC. Monog. Phan.* VII (1891) 373 et 1180; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 134; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 19; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 165 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1901) 171, (1906) 298; II (1907) 197, (1908) 329.

(1) M. Gilg [l. c.] indique cette espèce comme ayant été récoltée à Vista, dans le Bas-Congo, par Chaves, en 1885. Cette localité nous est inconnue.

1885 (R. Buettner). — Bords du Congo (Buett.), — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 6); Sabuka (Lujā); Léopoldville (Ém. Laur.); Dolo (Schlt.); Sanda (De Brouw.); Boko (Vanderyst); Kimuenza (Ém. Laur.). — VI : Plateau de Kimbele (Cabra-Michel). — XV : Kapulumba (Lescr.).

Dissotis Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 218.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : haut plateau du Katanga (Verd.); Lukafu (Verd. 621 b).

CALVOA Hook. f.

Calvoa sessiliflora *Cogn.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 22 et Reliq. Dewevr. (1901) 92; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 172; II (1907) 198, (1908) 331 et Miss. Laurent (1905) 165, t. 43, 41.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala et env. (M. Laur.; Pyn. 1452). — XIII d : Kasuku (Dew. 1061). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : forêt de Giard (Body).

? **Calvoa orientalis** *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 296; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 32, t. 5, fig. D, a-c.

1870 (G. Schweinfurth). — XII ? : pays des Uando à Diagbe (Schw. 3116).

Cette localité est-elle réellement dans le Congo belge?

AMPHIBLEMMA Naud. (1)

Amphiblemma setosum *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 456; *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 79; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 527; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 135; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 29.

1882 ? (P. Pogge). — XIII d : Nyangwe (Pg.).

Amphiblemma Wildemannianum *Cogn.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 22; Ill. fl. Cgo (1900) 143, t. 72 et Reliq. Dewevr. (1901) 92; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 330, t. 79.

1891 (F. Demeuse). — V : Sadi (Dem.); Kisantu (Gill.).

Obs. 1. — Dewèvre a récolté cette espèce au N. du Stanley-Pool [Congo franç.] (Dew. 718).

Obs. 2. — L'*Amphiblemma ciliatum* *Cogn.* est signalé, avec doute, à Bingila [II a] (P. Dupuis) [*De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 92, in obs.].

(1) *Amphiblemma acaule* *Cogn.* in Bolet. Soc. Brot. XI (1892-93) 89, *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 29. — Pays des Bashitango [distr. de Lem-pangulu] (Seuz. Marq. 211). — Cette localité est-elle sur le territoire congolais?

CINCINNOBOTRYS Gilg.

Cincinnobotrys Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 330, t. 89.

1906 (F. Seret). — XII c : route de Runga à Poko (Ser. 645).

DICELLANDRA Hook. f.

Dicellandra Barteri *Hook. f.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. I (1865) 757 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 459; *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 168, t. 7, fig. 85 b; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 516 pr. p.; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 33; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 300; II (1907) 199, (1908) 332.

1902 (L. Gentil). — VIII : Eala (M. Laur. 1924, 1927); Lokelenge (Brun. 40). — XVI : route du Lomami au Lualaba (Gent.).

Obs. — M. Gilg [l. c.] rapporte le *D. Barteri* de Kusumba [Schw.] au *Phaeoneuron dicellandroides*.

— — var. **runcinata** *De Wild.* l. c. II (1908) 332.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 776).

SAKERSIA Hook. f.

Sakersia Laurentii *Cogn.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 23; III. fl. Cgo (1900) 135, t. 68 et Reliq. Dewevr. (1901) 93; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 172 (1906) 300; II (1907) 198, (1908) 331.

1896 (Ém. Laurent). — Cougo (Dew.). — V : entre Kisantu et le Kwango (But.). — VIII : Équateur (Pyn. 316); euv. d'Eala (M. Laur. 1933); euv. de Bamania (M. Laur. 1925). — IX : euv. de Bumba (Ém. Laur.: Ser. 10). — XV : rég. de la Loanje (Gent. 27).

— — var. **cuneata** *De Wild.* l. c. II (1908) 332.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 938; Pyn. 1051).

Sakersia strigosa *Cogn.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 23 et Reliq. Dewevr. (1901) 93; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 172, (1906) 300.

1895 (A. Dewèvre, Ém. Laurent). — V : le Stanley-Pool (Ém. Laur.); Kimuenza (Dew. 501; Gill. 638); Sanda (Odd.).

MEDINILLA Gaudich.

Medinilla africana *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 24.

1893 ? (Ém. Laurent). — Congo (Ém. Laur.).

MEMECYLON L.

Memecylon Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 172.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 895).

Memecylon jasminoides *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 39.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : village Bongwa [Mangbettu] (Schw. 3609).

Memecylon Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 332.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Botuma [Ikelemba] (M. Laur. 1929).

Memecylon leucocarpum *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 40; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 333.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1932).

Memecylon longicauda *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 40, t. 10 E.; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 166 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 333.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.).

Memecylon Mannii *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 461; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 24; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 1132; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 39; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 333.

1896 (Eug. Wilwerth). — VIII : Eala (Pyn. 602, 1114, 1258; M. Laur. 1201). — IX : Upoto (Wilw.).

Memecylon membranifolium *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 462; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 1135; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 136; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 41.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Zenze (Ém. Laurent).

Memecylon myrianthum *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 44 et in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 303; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 166 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 333.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12526); Léopoldville (Pyn.); en aval de Bolobo (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.; M. Laur. 967).

Memecylon Poggei *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 43.

1882? (P. Pogge). — XV : pays des Bashilange [entre la Lulua et le Kasai] (Pg. 1066).

Memecylon polyanthemos *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1874) 463; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* VII, 1160; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 44.

M. Afzelii *R. Br. ex Triana* in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII (1871) 156.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 940).

— — var. **grandifolium** *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII (1891) 1161; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 136.

1880 (von Mechow). — VI : rives du Kwango (Mech. 515).

Memecylon Pynaertii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 334.

1906 (L. Pynaert). — V : Lukolela (Pyn. 251).

Memecylon strychnoides *Bak.* in *Kew Bull.* (1895) 105; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 66.

M. Millenii *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 38.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Memecylon tamifolium *Gilg ex De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 94 (err. cal. *ternifolium*) [nom. tant.].

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga. — Nom vern. : Tidi-Tidi (Dew. 296).

Memecylon Vogelii *Naud.* in *Annal. sci. nat. Sér.* 3, XVIII (1852) 263, 282; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 462; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* VII, 1138; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II (1898) 43; *Engl.* in *Sitzb. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 829.

Spathandra memecyloides *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 357.

1882 ? (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

LYTHRACEÆ

ROOTALA L.

Rotala fontinalis Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 468; *Kochne* in Engl. Jahrb. I (1880) 172; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 136; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 372.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Obs. — La synonymie donnée dans *Th. Dur. et Schinz* [l. c.] doit être retranchée; elle se rapporte au *R. filiformis* Hiern.

AMMANIA Houst.

Ammania auriculata Willd. Hort. Berol. (1806) t. 7; *DC.* Prodr. III, 80; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 570; *Kochne* in Engl. Jahrb. I (1880) 244; *Engl.* Pl. Ost.-Afr. 285; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 94.

A. senegalensis L. var. — *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 477 et Cat. Welw. Pl. I, 373.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

Ammania multiflora Roxb. Hort. Bengal. (1814) 11 et Fl. Ind. I, 447; *Spreng.* Syst. veget. I, 444; *DC.* Prodr. III, 79; *Kochne* in Engl. Jahrb. I (1880) 247; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 137.

A. senegalensis Lam. var. — *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 477 et Cat. Welw. Pl. I, 373.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Naum.).

Ammania salicifolia Monti in Comm. Instit. Bonon. I (1767) 112 cum iconc; *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 478; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 569; *Engl.* Pl. Ost.-Afr. 28; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 137; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 374.

A. aegyptiaca Willd. Hort. Berol. (1803) t. 6; *DC.* Prodr. III, 78.

A. verticillata Lam. Encycl. méth. Bot. I (1783) 131 et Illustr. genr. Encycl. I, t. 77, fig. 3; *DC.* Prodr. III, 79.

1816 (Chr. Smith.). — Bas-Congo (Sm.).

Ammania senegalensis Lam. Encycl. méth. Bot. I (1791) 314, t. 77, fig. 2; *DC.* Prodr. III, 77; *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 477 et Cat. Welw. Pl. I, 373; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 259.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

LAWSONIA L.

Lawsonia inermis L. Sp. pl. ed. I (1753) 349; *Gilg* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 286.

L. alba Lam. Encycl. méth. Bot. III (1789) 106; *Sommer*. Voy. Haute- et Basse-Égypte, I (1798) 291, t. 4; *DC.* Prodr. III, 91; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 483; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 94.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — XIII d : Nyangwe (Dew.).

ONAGRARIACEAE

JUSSIEUA L.

Jussieua linifolia Vahl Eclog. Amer. II (1798) 32; *DC.* Prodr. III, 55; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 489; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 296; *M. Micheli* in *Mart. Fl. Brasil.* XIII², 163, t. 33; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 138; *Hiern* Cat. Welw Pl. I, 379; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 23 et Reliq. Dewevr. (1901) 95; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 259, (1907) 417 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 63, (1908) 334.

J. acuminata Benth. [non Sw.] in *Hook. Niger Fl.* (1849) 343; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 296; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 489; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 137.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — II : Boma (Dew.); Sisia (Dup.). — V : Léopoldville (Schlt.; Duch.); Sabuka (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : Kingunshi (Buett.). — VIII : Coquillhatville et env. (Dem.; M. Laur.). — IX : Busa (Em. et M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (P'yu.). — XV : Butala (Em. et M. Laur.).

Jussieua pilosa Kunth in *Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp.* VI (1823) 101, t. 532 b; *DC.* Prodr. III, 53; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 488; *M. Micheli* in *Mart. Fl. Brasil.* XIII², 164; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 296; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 138; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 379; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 95; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 259, (1907) 417 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 334.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II : Zambi (Dew.). — IV : Luvi-tuku (Em. et M. Laur.); Kikosi; Kinduma (Vanderyst). — V : Sabuka (M. Laur.); Tamo (Hens); Kisantu (Gill.). — VI : Kingunshi (Buett.). — VII : la Fini; Kutu (Em. et M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Em. et M. Laur.).

Jussieua repens L. Sp. pl. ed. I (1753) 388; *Ch. Martins* Mém. Juss.

Le **Punica granatum** L. [*Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 486] est cultivé à Kimuenza (Gill.) et aussi à Stanleyville, par les Arabes [*De Wild. Miss. Laurent* (1907) 416].

(1866) 22, t. 1-4; *Engl. Pl. Ost-Afr.* 296; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.* 379.

J. diffusa Forsk. *Fl. Aegypt.-Arab.* (1775) 210; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 488; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 416.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — IX : Itimbiri (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Jussieuia suffruticosa L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) 838; *DC. Prodr.* III, 58; *Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* I, 587; *M. Micheli in Mart. Fl. Brasil.* XIII^t, 169; *Engl. Pl. Ost-Afr.* 296; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 138; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.* 380; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* II (1900) 23 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 95.

J. villosa Lam. *Encycl. méth. Bot.* III (1789) 331 et *Illustr. gener. Encycl.* II, t. 280, fig. 3; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 489.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens). — II : Boma (Dew.). — V : Léopoldville (Luja). — XIV : Uvira (Deb.).

LUDWIGIA L.

Ludwigia prostrata Roxb. *Hort. Bengal.* (1814) 11 et *Fl. Ind.* II, 420; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 490; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 20; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 22] et *Pl. Thonnerianae* (1900) 32; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 259, (1907) 417 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 61, (1908) 334.

Isnardia — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 250; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.* 381.

1896 (Fr. Thonner). — IV : Gongolo (Vauderyst). — V : Léopoldville; Kinkosi (Vauderyst); Kisantu (Gill.). — VI : rives du Kwilu (Sap.). — VII : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — IX : Bobi (Thonn.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.).

SAMYDACEAE

CASEARIA Jacq.

Casearia congensis Gilg in *Engl. Jahrb.* XL (1908) 513.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Bolobo et Lukolela (Dew. 734).

HOMALIUM Jacq.

Homalium africanum [*Hook. f.*] *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* IV (1860) 35; *Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 497; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 133; *Gilg in Engl. Jahrb.* XL (1908) 488.

Blackwellia — *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* (1849) 361.

1862 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Homalium bullatum *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 492; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 316.

1904 (Éd. Lescreauwact). — XV : Kondue (Lederm.); Ikoka (Lescr. 342).

Homalium Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1899)
9 [B. S. B. B. XXXVIII², 128] et Reliq. Dewevr. (1901) 95; *Gilg* in
Engl. Jahrb. XL (1908) 489.

1896 (A. Dewèvre). — IX : Bangala (Dew. 861).

Homalium ealaense *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 413 et Étud.
Fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 316; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908)
490.

1893 (Marc. Laurent). — VIII : forêts des env. d'Eala (M. Laur. 81, 1100, 1132,
2017; Pyn. 461, 911, 1039, 1541, 1581); le long du Ruki. — Noms vern. : **Pongia**;
Lofandji-Joku (M. Laur. 139); entre Coquilhatville et Lulanga (Pyn. 775); **Basan-**
kusu (Bruu.).

Homalium Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903)
46; II (1907) 196; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 493.

1902 (L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2797).

Homalium Gilletii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 414 et Étud. fl.
Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 316; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 491.

1903 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 3396). — VIII : env. d'Eala (M.
Laur. 2015).

— — var. **sessile** *De Wild.* l. c. (1907) 415; *Gilg* l. c. (1908) 491.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Mondjo (Pyn. 309).

Homalium Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 412 et Étud.
Fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908)
490.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Pyn. 513). — XI : entre Basoko et Limputu
(M. Laur. 956).

Homalium molle *Stapf* in Journ. Linn. Soc. XXXVII (1905) 100;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 2016). — XV : rég. de Mukengo
(Pg.).

Homalium setulosum *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 497; *De*
Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317.

II. Abdessammadii *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Aschers.* et *Schweinf.*] Contr.
fl. Cgo, II (1900) 22.

1899 (Éd. Luja). — IX : Luezi (Luja, 428).

Homalium stipulaceum Welw. ex Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 498; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 381; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1909) 22; Pl. Gilletianae, II (1901) 81 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 753]; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 415 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 493.

1895 (A. Dewèvre). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1528); Zanza sur la Luzumu (Gill. 1096). — XV : Batempa (M. Laur.).

Homalium Wildemannianum Gilg in Engl. Jahrb. XL (1908) 497; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317.

H. Ablesammadii *De Wild.* [non *Aschers.* et *Schweinif.*]. Étud. fl. Kat. (1903) 93.

1899 (Édg. Verdick). — XVI : Lofoi (Verd. 130); Lukafu (Verd. 123). — Nom vern. : Munkwasa (Verd.).

BYRSANTHUS Guill.

Byrsanthus Brownii Guill. in *Deless.* Icon. select. pl. III (1837) 30, t. 52; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 487.

B. epigynus Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 499; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 133; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 96; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1903) 316.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu (Hens); env. de Gombi-Lutete (Dem.; Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Léopoldville et de Bolobo (Pyn); Lukolela (Hens; Pyn. 196); Kimuenza (Gill.). — IX : pays des Bangala (Dem. 2).

TURNERACEAE

WORMSKIOLDIA Schum. et Thonn.

Wormskioldia lobata Urban [Monog. Fam. Turner.] in Jahrb. bot. Gart. Berlin, II (1883) 52; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 139; *Engl.* Pl. Ost-Afr. 280; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 394; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 71 [B. S. B. B. XXXVII, 116] et Reliq. Dewevr. (1901) 96; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1901) 169 et Miss. Laurent (1901) 158.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Schit.); Kimuenza (Gill.); Sanda (Odd.). — XVI : Kapapa [Tanganika] (Desc.).

Wormskioldia pilosa [Willd.] Schweinf. ex Urban [Monog. Fam. Turner.] in Jahrb. bot. Gart. Berlin, II (1883) 54; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 139.

Raphanus pilosus Willd. Sp. pl. III (1801) 562.

W. heterophylla *Schumach.* et *Thonn.* in DC. Prodr. I (1824) 240 in syn. et Beskr. Guin. Pl. (1827) 165; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 562.

Cleome raphauoides DC. l. c. I (1824) 240.

1882 (H. Johnston). — Cougo (Johnst.).

PASSIFLORACEAE

PASSIFLORA L.

Passiflora foetida L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 959; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 530 in obs.; *De Willd.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 94; *De Willd.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 169.

1903 (J. Gillet). — II : Boma (Gill.); Ém. Laur.).

Passiflora quadrangularis L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 1248; *Jacq.* Stirp. Amer. hist. t. 218; Bot. Reg. I, t. 14; *Mast.* in *Mart.* Fl. Brasil. XIII¹, 595 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 520 in obs.; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 386; *De Willd.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 23; *De Willd.* Miss. Laurent (1905) 159.

1897? (Ern. Dewèvre). — Congo (Ern. Dew.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Ém. Laur.).

PAROPSIA Noronha.

Paropsia Brazzeana Baill. in B. S. Linn. Paris, I (1886) 614; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 472.

1882? (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg. 951).

Paropsia grewoides Welw. ex *Must.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 505; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 383; *De Willd.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 315; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 472.

P. Dewevrei *De Willd.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 21 [B. S. B. B. XXXVIII², 191]; Pl. Gilletiana, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 22] et Reliq. Dewevr. (1901) 97.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 271); Kimuenza (Dew. 497).

— — var. **condensata** [*De Willd.*] *Th.* et *Hél. Dur.*

P. Dewevrei *De Willd.* et *Th. Dur.* var. — *De Willd.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 64.

1901 (R. Butaya). — V : Lemfu (But. in Gill. 2267).

Paropsia reticulata *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XIV (1891) 391 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* III, 6a, 26, fig. D-F; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 24 et *Pl. Gilletianae*, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 22]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1903) 64, (1904) 169, (1906) 294; II (1908) 315.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (But. in Gill. 3538). — V : env. de Kwamouth (Biel.); env. de Lula-Lumene ? (Hendr. in Gill. 3100); Lisha (Dem.); Sanda (Odd. et de Brouw. in Gill. 3003, 3108); Kisantu (Gill. 70); entre Kisantu et le Kwango; entre Kisantu et Popokabaka (But. in Gill. 2296). — VI : plateau de Kimbali [entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra-Michel, 76); Madibi (Sap.). — Ind. non cl. : vallée du Lonami (Desc.). — Noms vern. : **Mokasi** [Bangala]. — Au Kwilu et chez les Bangala, les poils de la plante s'appellent **Mpoto** ou **Mputo**.

— — var. **ovatifolia** *Engl.* l. c. XIV (1891) 391; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo.* (1896) 140.

1882 ? (P. Pogge). — XV : loco haud indic. (Pg.).

BARTERIA Hook f.

Barteria Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 8 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 97; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 247-249 cum. xylogr. 32 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 316; *Gilg in Engl. Jahrb.* XL (1908) 480.

1896 (A. Dewèvre). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — IX : Baugala (Hens); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XV : falaises de Batempa; le Sankuru; Kondue; Bena-Dibebe; Olombo; Bombaie (Ém. et M. Laur.); Bena-Makima (Lescr. 270).

Barteria fistulosa *Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 511; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 250-258, t. 91, 92, fig. 33-36 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 57, (1908) 316.

1903 (Éd. Lesclapart). — Bas-Congo (Odd.). — V : Tumba (Ém. et M. Laur.). — VI : Madibi (Lescr. 109); Dima (Ém. et M. Laur.; Lescr.: Sap.). — VII : Lac Léopold II (Body); Ibali; Inongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Betutu (Brun.); Botomon (M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Romée (Kohl). — XV : Mauge; Lomkala; Olombo (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Bachi-Shombe (Lescr.). — Noms vern. : **Monkukono**; **MaKonkomo** [Bangala]; **Okakumbu** [Lac Léopold II].

— — var. **macrophylla** *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 98.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

Barteria nigritana *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* V (1860) 15, t. 2; *Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 510.

Le type habite la région du Niger.

B. nigritana var. **uniflora** *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 24 et Pl. Gilletianae, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 22]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 169.

1899 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (But.). — V : Kisantu (Gill.). — Ind. non cl. : forêt de Talavanje (Cabra).

ADENIA Forsk.

Adenia lobata [*Jacq.*] *Engl.* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 375; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 381; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 243, t. 59, 60, fig. 31 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 204.

Modecca — *Jacq.* Fragm. bot. (1809) 12, t. 131; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 516; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 153.

1889 (J. Gillet). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); Tshumbiri (Ém. et M. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.). — XV : Pangu (Ém. et M. Laur.).

— — var. **elegans** *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 394.

Modecca lobata *Jacq.* var. — *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 517; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 22] et Reliq. Dewevr. (1901) 98.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Kamba (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

Adenia panduriformis *Engl.* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 376; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 139.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Muuza (Schw.).

Adenia Schweinfurthii *Engl.* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 377; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 140.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Adenia venenata *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 77; *Engl.* in Engl. Jahrb. XIX (1891) 379; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 23.

Modecca abyssinica *Hochst.* in *Schimp.* Pl. Abyss. Sect. 3, n. 1572 et in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 197.

1896 (Ém. Laurent). — IX : Upoto (Ém. Laur.).

OPHIOCAULON Hook. f.

Ophiocaulon apiculatum *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 8 [B. S. B. XXXVIII², 86]; Pl. Gilletianae, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23] et Reliq. Dewevr. (1901) 99; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 258.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VII : Ibali (Ém. Laur.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew.).

Ophiocaulon cissampeloides [Planch.] Mast. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 518; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 140; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 385; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 258.

Modèca — Planch. in *Hook. Niger Fl.* (184) 365.

1883 (P. Pogge). — II a : Gandayanga (Cabra). — VII : Kutu (Èm. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XV : Mukenge (Pg.).

Ophiocaulon Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 8 [B. S. B. B. XXXVIII², 85] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 99; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 291.

1895 (A. Dewèvre). — V : env. de Bolobo (Dew.); env. de Sanda (Odd.).

Ophiocaulon lanceolatum *Engl. in Engl. Jahrb. XIV* (1891) 386; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 140.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).

Ophiocaulon Poggei *Engl. in Engl. Jahrb. XIV* (1891) 386; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 140.

1883 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).

Ophiocaulon reticulatum *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 9 [B. S. B. B. XXXVIII², 86] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 100; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 158.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Gombi (Dew.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Lac Tumba (Èm. et M. Laur.). — XV : Lusambo (Èm. et M. Laur.).

CARICA L.

Carica Papaya L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) 1036; *Lindl. in Bot. Reg. VI*, t. 459; *Hook. in Bot. Mag.* (1829) t. 2898-2899; *Ficalho Pl. Uteis*, 185; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 386; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 23; *De Wild. Nol. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1904) 229-250.

Papaya vulgaris DC. in *Lam. Encycl. méth. Bot. V* (1804) 2; A. DC. in DC. *Prodr. XV*, 414.

1893 (Èm. Laurent). — Très répandu, à l'état cultivé, dans tout le Congo (Èm. Laur.; Ed. Luja; Fr. Thonn.). — V : Kisantu (Gill.). — XI : Yambuli (Èm. Laur.).

CUCURBITACEAE

TELFAIREA Hook.

Telfairea pedata [Sm.] *Hook. in Bot. Mag.* (1827) t. 2751-2752; *Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 523; *Cogn. in DC. Monog. Phan.*

III, 350; *Muell. et Pax* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* B, 231; C, 397; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 387; *Heck.* in *Rev. cult. colon.* (1903) 107; *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 153-158, fig. 9 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 83, t. 35.

Feuillaea pedata *Sm. ex Sims* in *Bot. Mag.* (1826) t. 2681.

1904 (Ed. Lujua). — XV : rég. du Kasai (Lujua).

TROCHOMERIA Hook. f.

Trochomeria macrocarpa *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 524; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III, 398; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 388.

Le type croît dans l'Afrique australe.

— — var. **Welwitschii** *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 399; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 388; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 161.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 153).

ADENOPUS Benth.

Adenopus breviflorus *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 372; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 528 (excl. syn. *Lagen. mascarena*); *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III, 412; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 141; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 389; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo* II (1900) 24 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 101.

Lagenaria angolensis *Naud.* n *Annal. sci. nat. Sér. 5*, V (1866) 10.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II : Boma (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Dem.).

PEPONIA Naud.

Peponia bracteata *Cogn.* in *Bolet. Soc. Brot.* X (1893) 119; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 324.

1904 (Éd. Lescauwaet). — VI : env. de Dima [rive gauche du Kasai] (Lescr.).

— — var. **hirsuta** *Cogn.* ex *De Wild.* et *Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 26; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 210; II (1907) 205 et *Miss. Laurent* (1905) 188.

1896 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.); Benza-Masola (Ém. Laur.). — V : Léopoldville (Pyn.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.).

COGNIAUXIA Bail.

Cogniauxia cordifolia *Cogn.* in Bull. Acad. Belg. Sér. 3, XIV (1887) 350; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 141; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 24; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 304; II (1907) 205.

1885 (R. Buettner). — Congo (Cabra). — V : Kisantu; Dembo (Gill.). — VI : Madibi (Lescr.); Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — IX : Mouzambi (Brun. in M. Laur. 1497).

Cogniauxia podolaena *Baill.* in B. S. Linn. Paris, I (1884) 424; *Cogn.* in Bull. Acad. Belg. Sér. 3, XVI (1888) 236; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 141; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 24; Ill. fl. Cgo (1898) 11, t. 6 et Pl. Gilletianae, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 187 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 324; (1907) 82, 204.

Luffa ? *Batesii* C. H. Wright in *Hook.* Icon. pl. XXV (1896) t. 2490 et in Kew Bull. (1896) 161 [fide cl. Cogniaux].

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Cabra). — II a : forêts du Mayumbe (Ém. Laur.); Haut-Shiloango (Cabra-Michel); route de Poiti à Tshoa (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu. — Nom vern. : **Kasikamba** (Gill.). — VI : rég. de Luann (Lescr.); euv. de Tumba-Mani (Cabra-Michel). — XV : Lusambo (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Moijaenka** [Bangala]; **Mamonpete** [Kwilu]; **Bagayenga** [Morzambi].

Cogniauxia trilobata *Cogn.* in *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 141; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 24 et Ill. fl. Cgo (1898) 9, t. 5; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 187 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 324; II (1907) 205.

1888 (Fr. Hens). — VII : Isaka (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 275); env. d'Eala (M. Laur. 1492, 1494). — IX : pays des Bangala (Hens). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.). — XV : Lubue (Luja). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.).

Obs. — Cette espèce parait C. dans le bassin du Congo (Ém. Laur.).

LAGENARIA Ser.

Lagenaria vulgaris *Ser.* in Mém. Soc. Genève, III' (1825) 25, t. 2 et in *DC.* Prodr. III, 299; *Descourtilz* Fl. des Antilles, V, 85, t. 325; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 529; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 417; *Muell. et Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 398; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 144; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 391; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 101; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 83.

Cucurbita *Lagenaria* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1010 *Vell.* Fl. Flumin. X, t. 98.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kwamouth (M. Laur.) — XII : l'Uele (Ser.). — XIII d : env. de Kabauga et de Nyangwe (Dew.). — XV : Mukundji; Bolongula (Ém. et M. Laur.).

MOMORDICA L. (1)

Momordica Charantia L. Sp. pl. ed. 1 1753 1009; Bot. Mag. (1824) t. 2455; *Ser.* in *DC.* Prodr. III, 311; *Wright* Icon. pl. Ind. or. II, t. 504 et Illustr. Ind. Bot. I, t. 105¹⁴; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 537; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 616; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 436.

Le type, répandu sous les tropiques, n'a pas encore été trouvé au Congo belge.

— — var. **abbreviata** *Ser.* in *DC.* l. c. III (1828) 311; *Cogn.* l. c. III, 437; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 143; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 71 [B. S. B. B. XXXVII⁴, 116] et Pl. Thonnerianae (1900) 48; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 393; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 204.

M. anthelmintica *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 423.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Zambi. — Nom vern. : **Matudulu** (Dew.); **Sisia** (Dup.). — II a : **Bingila** (Dup.). — IV : **Kitobola** (Dew.). — V : **le Stanley-Pool** (Heuz.); **Kisantu** (Gill.). — IX : **Bobé** (Thonn.); **Upoto** (Wilw.); **Monzambi** (Brun.). — XII c : env. d'**Arebi** (Ser.). — XV : **Mauge** (Em. et M. Laur.).

Momordica cissoides *Planch.* ex *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 370; *Walp.* Annual. bot. II, 645; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 535; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 430; *Muell. et Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 397; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1891) 43; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 393; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 102; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 186, (1907) 449.

M. guttata *Planch.* ex *Benth.* l. c. (1849) 371.

M. maculata *Planch.* l. c.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : **Shiuganga** (Dew.). — V : **Chenal** (Em. et M. Laur.); **Bolebo** (Buett.); **Kisantu** (Gill.). — VIII : **Lulanga** (Em. Laur.). — X : **Bamoka** (Em. Laur.). — XII d : pays des **Mangbettu** (Schw.).

Momordica Cogniauxiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 160.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : **Lukafu** (Verd.).

Momordica foetida *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 426; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 451; *Muell. et Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 397; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 102; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 186.

M. Morkorra *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I 1847 292, t. 53; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 539.

(1) Le *M. pterocarpa* Hochst a été trouvé dans la région des Niamniam, par Schweinfurth, mais en dehors des limites du Congo [Conf. *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 144].

1896 (A. Dewèvre) — Congo (Dew. 1125) — VIII : Eala (M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.); Tielen-St-Jacques (Leser.); Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Momordica Gabonii *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 450; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* II (1900) 25 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 102; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 204.

1891 (F. Demense) — Congo (Dew.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Ile de Yaminga (Dem.).

Momordica gracilis *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 25.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

LUFFA L.

Luffa cylindrica [*L.*] *Roem. Synops. monogr. fasc. II* (1846) 63; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III. 156; *Muell. et Pav. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 390; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 144; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo.* II (1906) 130, fig. 8.

Momordica — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 1009.

L. aegyptiaca *Mill. Gard. Dict. ed. 8* (1768) n. 1; *Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 530; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.* 394.

L. pentandra *Roxb. Hort. Beng.* (1814) 70; *Wight Icon. pl. Ind. or.* II, t. 499 et *Illustr. Ind. Bot.* I, t. 105 b.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Welw.). — II a : Kibinga (Dup.); la Lemba (Dew.). — IV : Lutete (Hens). — V : cult. aux env. de Bolobo (Dew.); Kisantu (Gil.). — IX : Ukaturaka (Ém. Laur.). — XII c : Amadis. — Nom vern. : **Mdungu** (Ser.). — XV : Lac Foa (Leser.). — Ind. non cl. : Kapilumba (Leser.).

SPHAEROSICYOS Hook. f.

Sphaerosicyos sphaericus [*E. Mey.*] *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 466; *Muell. et Pav. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 398; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* II (1898) 71 [B. S. B. B. XXXVII, 116].

Lagenaria — *E. Mey. in Drege Zwei Pfl. Dozam.* (1843) 197.

S. Meyeri *Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 532.

1896 (Edg. Verdick). — XVI : env. du lac Moero (Verd.). — Ind. non cl. : Mwana-Bwene — Nom vern. : **Kalanda** (Dew.). — Nom vern. : **Otulu** [Busira] (Dew.).

CUCUMIS L.

Cucumis hirsutus *Sond.* in *Harr. et Sond. Fl. Capens.* II (1862) 497; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III. 489; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo.* (1896) 145.

1895 (Gust. Hebeerst). — XVI : Beaudoinville (Deb.).

Cucumis metuliferus *E. Mey. ex Schrad.* in *Linnaea*, XII (1838) 406; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 543; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 499; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 26; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 397.

1893 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dew.). — II a : Kibinga (Dup.).

CITRULLUS Neck.

***Citrullus vulgaris** *Schrad. ex Eckl. et Zeyh.* Enum. pl. Afr. austr. (1836) 279; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 549; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 508; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 190. *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 103; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 187.

Colocynthis amarissima *Schrad.* Ind. sem. Hort. Gotting. (1833) 2; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 397.

1895 (A. Dewèvre). — Plante cultivée. — I : Banana (Dew.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

DIMORPHOCHLAMYS Hook. f.

Dimorphochlamys Cabraei *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 24 et III. fl. Cgo (1900) 131, t. 66.

1897 (Alph. Cabra). — II a : entre Sombo et Ganda-Janga (Cabra).

Dimorphochlamys Crepiniana *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 25.

1897 (Alph. Cabra). — II a : Sombo (Cabra).

Dimorphochlamys Mannii *Hook. f.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. I (1867) 827, in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 515 et in *Hook.* Icon. pl. XIV (1880) t. 1322; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 515; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 82.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Fala (M. Laur.).

CUCUMEROPSIS Naud.

Cucumeropsis edulis [*Hook. f.*] *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III (1886) 518; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 145; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 188; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 399. *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 26 et Pl. Gilletianae, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23].

Cladosicyos — *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 518.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : Kibinga (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — XII d : pays des Mangbetu (Schw.).

PHYSEDRA Hook. f.

Phyzedra Barteri [*Hook. f.*] *Cogn.* in *DC* Monog. Phan. III (1884) 525; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 145; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 168 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 205.

Staphylosyce — *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. I (1867) 828 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 555.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Lukolela (Pyn. 187); Kisantu (Gill. 517). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : Umanzi (Krek.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Phyzedra heterophylla *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1874) 553; *Cogn.* in *DC* Monog. Phan. III, 524; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 399; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 103.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — Noms vern. : **Motalaci** [Kasongo]; **Mombina** [Ikwaugula]; **Mioba** [Tanganika] (Dew.).

RAPHIDIOCYSTIS Hook. f.

Raphidiocystis Welwitschii *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. I (1867) 828 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 554; *Cogn.* in *DC* Monog. PSan. III, 527; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 400.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 495).

CUCURBITA L.

Cucurbita maxima *Duchesne* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) 151; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 191; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 555; *Cogn.* in *DC* Monog. Phan. III, 544; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. XXXVII, 117] et Reliq. Dewevr. (1901) 103; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo (1906) 324; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 401.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala (M. Laur.). — XI : Haut-Aruwimi. — Nom vern. : **Euzambi** (Coll. ?); Basoko. — Nom vern. : **Eloko** (Coll. ?). — Ind. non cl. : Bena-Lecoula [Bena-Lunkula?, XV]. — Nom vern. : **Limoke** [Tanganika].

Cucurbita moschata *Duchesne ex Poir.* Dict. sci. nat. XI (1818) 334; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 556; *Cogn.* in *DC* Monog. Phan. III, 546; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. XXXVII, 117]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 401.

1895 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.).

Cucurbita Pepo *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1010; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 556; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 545; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 147]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 401; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 103; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 205.

1896 (A. Dewèvre. — VIII : Efukwa-Kombe (Brun.). — IX : en aval de Mobeka (Ém. Laur.). — XI : Moe [au N. de Bolobo] (Dew.).

MELOTHRIA L.

Melothria capillacea [*Schumach.* et *Thonn.*] *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 600; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 146.

Bryonia — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 430; *Walp.* Repert. bot. II, 198; *Roem.* Synops. monogr. II, 36.

M. triangularis *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 367; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 562.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Melothria deltoidea [*Schumach.* et *Thonn.*] *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 368; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 563; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 594; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 146.

Bryonia — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 420.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.).

Melothria maderaspatana [*L.*] *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 623; *Muell.* et *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 396; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 146; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 403; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 103.

Cucumis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1012.

Bryonia scabrella *L. f.* Suppl. pl. 1781, 424; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 501.

Mukia — *Arn.* in *Hook.* Jour. of Bot. III (1851) 276; *Wight* Illustr. Ind. Bot. II, t. 105; *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 489; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 561.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens); Kitobola (Ém. Laur.; Pyn.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kwamouth et env. (Biel.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Mukundji (Ém. Laur.).

Melothria tridactyla *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 562; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 596; *Muell.* et *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 396; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 147; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 402.

M. Thwaitesii *Schroef.* Reliq. Kotschyanae 1868] 44, t. 29 (excl. syn. et descr. fruct.).

1862 (R. Burton). — Congo Burt. — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); route de La Lemba à Poiti (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Hens). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : banc de sable du Sankuru (Ém. Laur.).

CAYAPONIA Manso.

Cayaponia latebrosa [Ait.] Cogn. in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 776; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 24 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 24].

Bryonia — Ait. *Hort. Kewensis*. III (1789) 384.

Trianosperma africana Hook. f. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 568.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

SICYOS L.

Sicyos australis Endl. *Prodr. fl. Norfolk* (1833) 67; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* III, 875; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 405; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 161.

S. Schimper Naud. in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. App.* (1867) 268.

S. angulatus Hook. f. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 568.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd.).

BEGONIACEAE

BEGONIA L.

Begonia Bruneelii De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 318, t. 78, fig. 1.

1906 (Albéric Bruneel). — VII : village Loka [rive gauche de la Bolombo] (Brun.).

Begonia duruensis De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 318.

1906 (F. Seret). — XII c : territ. de Mugdangba [Duru] (Ser. 544); territ. d'Arobi; env. de Nala; territ. de Sabona (Ser.).

Begonia elaeagnifolia Hook. f. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 579; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 25.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra)

Begonia Gentilii De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 294.

1902 (L. Gentil). — XV : route de Luluabourg; Kanda-Kanda (Gent.).

Begonia gracilipetiolata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 319.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1702).

Begonia Haullevilleana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 320.

1907 (F. Seret). — XII a et c : route entre Zobia et Buta (Ser. 866).

Begonia injoloensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 347.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1091, 1703). — [cultivé à Eala (Pyn. 428)].

Begonia Poggei *Warb.* in Engl. Jahrb. XXII (1895) 170; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 258, t. 82 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 320.

1883 (P. Pogge). — II a : route de Kabuluku à Tshikongo (Lescr.). — VII : Zoka [Bolombo] (Brun.). — VIII : Bombimba (M. Laur. 1224); [cult. à Eala (M. Laur. : Pyn. 429, 473)]; Bala-Luudzi (Pyn.); marais d'Ipeco (Huyghe et Ledoux). — IX a : Gongo (Ser. 294). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII c : Nala et env. (Van Ryss.; Ser. 802); Poka-Zobia (Ser. 118); Gombari (Ser.); Rungu (Ser. 619). — XIII c : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukenge (Pg.). — Ind. non cl. : entre frumu et Beui (Cabra, 8).

— — var. *albiflora* *Th. et Hél. Dur.*

B. *Poggei* *Warb.* var. flore albo; C. DC. ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 104.

1896 (A. Dewèvre). — XIII : forêts près de Mutumbe (Dew.).

Begonia quadrialata *Warb.* in Engl. Jahrb. XXII (1895) 43; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 25; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 321.

1897 (Alph. Cabra). — II a : entre Shindambo et la Lemba (Cabra). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1704). — XII c : entre Gombari et Rungu (Ser. 498).

Begonia romeensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 321, t. 78, fig. 2.

1906 (Marc. Laurent). — XI : forêt de Patalougo [Yambuya] (M. Laur. 1693). — XIII a : Romée (M. Laur. 1691).

Begonia rubronervata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 322.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1701); [cult. à Eala (Pyn. 534)].

Begonia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 59, t. 18.

1905 (F. Seret). — XII c : env. d'Arebi [village Adama] (Ser. 121 b). — Ind. non cl. : entre Manbanba et Gangara (Ser. 121).

Begonia subfalcata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 323.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 968). — XIII a : Romée (M. Laur. 1694).

Begonia subscutata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 322.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1700); [cult. à Eala (Pyn.)]. — XII c : entre Goubari et Rungu (Ser. 4997); entre Zobia et Buta (Ser. 499).

Begonia Sutherlandi *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1868) t. 5689; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 147.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katauga (Corn.).

Begonia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 93.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

Begonia zobiaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 324.

1907 (F. Seret). — XII c : entre Zobia et Buta (Ser. 882).

CACTACEAE

HARIOTA Adans.

Hariota parasitica [*L.*] *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 262; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 407.

Cactus — *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) 1054.

Rhipsalis aethiopica *Welw.* in *Journ. Linn. Soc.* III (1859) 152 [nom. tant.].

R. Cassytha *Gaertn.* De fruct. et semin. I (1788) 137, t. 28, fig. 1; *DC. Prodr.*

III, 476; *Bot. Mag.* (1858) t. 3080; *Hook. Exot. Fl.* t. 2; *Oliv. Fl. trop. Afr.*

II, 581; *Clarke* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* II, 658; *Th. Dur. et Schinz* Étud.

fl. Cgo (1896) 147; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 64, (1904)

168, (1906) 295; II (1907) 61 et *Miss. Laurent* (1905) 159.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Vungu (Ém. Laur.). — V : Kimueuza; plateau de l'Inkisi à Kilmango (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.). — VIII : Coquilbatville. — Nom vern. : **Pala-Pala** (Ém. Laur.); Eala (M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : forêt de l'Aruwimi (Coll.?). — XII c : Nala (Van Ryss.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.); le Lualaba; le Sankuru (Ém. Laur.).

Obs. — *L'Opuntia vulgaris* Mill. a été introduit à Kisantu par le Fr. Gillet [Couv. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 168].

FICOIDACEAE

SESUVIUM L.

Sesuvium crystallinum *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 586; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 27 et Reliq. Dewevr. (1901) 104.

S. mesembryanthemoides *Wavora* et *Peyr.* in Sitzb. Akad. Wien, XXXVIII (1860) 564.

Halimum — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 413.

1908 (J. Gillet). — I : Banana (Gill.).

MOLLUGO L.

Mollugo lotoides [*Loefl.*] *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II (1879) 776 [nom. tant.].

Glinus lotoides; *Loefl.* Iter Hisp. (1758) 145; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 275; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 76.

M. hirta *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1772) 24; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 415.

M. Glinus A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 48; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 590; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 148; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 84 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 754]; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 121.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Mollugo nudicaulis *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) 234; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 591; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 175; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 32 [B. S. B. B. XXXVI², 78]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 417; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 25; Pl. Gilletianae, I (1900) 24 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 24] et Reliq. Dewevr. (1901) 105; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 379.

M. bellidifolia *Ser.* in *DC.* Prodr. I (1824) 301.

1816 (Chr. Smith.). — Bas-Congo (Sta.). — II : Boma (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Dew.); Kisantu (Gill.). — X : Inese (Ém. et M. Laur.).

Mollugo oppositifolia *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 89; *Trim.* Fl. Ceyl. II (1894) 271; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 416.

M. Spergula *L.* Syst. veget. ed. 10 (1774) 881; *DC.* Prodr. I, 391; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 590; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 662; *Th. Dur.* et *Schinz*

Étud. fl. Cgo (1896) 148; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 25.

Glinus — *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, I (1840) 688; *Pax* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III. 1 b (1894) 40 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 175; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1903) 26, (1904) 121.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Dobo (Luja); bassin de la Sele (But.).

GIESEKIA L.

Giesekia Miltus *Fenzl* Nov. stirp. dec. Vind. X, 86; *DC.* Prodr. XIII², 28; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 594; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 148; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 420.

Miltus africanus *Lour.* Fl. Cochinch. (1790) 302.

Glinus mozambicensis *Spreng.* Syst. veget. II (1825) 467.

1885 (R. Buettner). — V : entre Suata et Bolobo (Buett.).

Giesekia pharnaceoides *L.* Mant. pl. II (1771) 562; *Wight* Icon. pl. Ind. or. t. 1167; *DC.* Prodr. XIII², 27; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 594; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 664; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 175; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 149; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 410; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 105; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 134 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 127.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Bauaua (Dew.). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : Léopoldville (Dew. ; Gill.) ; entre Léopoldville et Mombasi (Gill.) ; le Stanley-Pool (Hens. B. 309) ; Chenal (Ém. Laur.) ; Sanda. — Nom vern. : *Kekansu* (Odd.) ; env. de Kwamouth (Biel.) ; Kisanu (Gill.). — VIII : Équateur (Pyn.). — XV : entre le Sankuru et le Kasai (Ém. Laur.).

UMBELLIFERACEAE

HYDROCOTYLE L.

Hydrocotyle asiatica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 234; *DC.* Prodr. IV, 62; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 656; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 6; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 669; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 298; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 149; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 423; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 66.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville; Kisanu (Gill.). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).

PIMPINELLA L.

Pimpinella tomentosa *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXX (1901) 368; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 220.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

PEUCEDANUM L.

Peucedanum araliaceum [*Hochst.*] *Benth.* et *Hook. f.* *Gen. pl.* I (1865) 920; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 21; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 300; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 149; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 220.

Steganotaenia — *Hochst.* in *Flora*, XXVII (1844). Beil. 4.

1885 (R. Buettner). — Congo (Buett.). — XVI : le Katanga (Verd.).

Peucedanum fraxinifolium *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 22 et in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 79; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 149; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 427.

P. araliaceum *Benth.* et *Hook. f.* var. — *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 300.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kipanga** (Verd.).

Peucedanum muriculatum *Welw.* ex *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I (1898) 429; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 220.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : plateau de Lukafu. — Nom vern. : **Kikebe-Beteli** (Verd.).

LEFEBURIA A. Rich.

Lefeburia benguelensis *Welw.* ex *Engl.* *Hochgeb. trop. Afr.* (1892) 322; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 24 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 24]; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 166.

Lefeburea — *Welw.* ex *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I (1898) 430.

1900 (J. Gillet). — Entre Sonagongo [IV] et Tumba [V] (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 562).

Obs. — En 1900, M. le C^t Verdick a récolté à Lukafu [XVI] une espèce, probablement nouvelle, de ce genre [*Conf. De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 220].

MALABAILA Hoffm.

Malabaila Kirungae *Engl.* in *von Goetzen* *Durch Afrika* (1895) 380.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga 2500 m. (Goetz. et Prittw. 66).

ARALIACEAE

SCHEFFLERA Forst.

Schefflera Barteri *Harms* ex *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 334 (nom. tant.).

1905 (Marc. Laur.). — VIII : Bombimba (M. Laur. 1520; Pyn. 343).

Schefflera Goetzenii Harms in *Engl. Pfl. Ost-Afr. A* (1895) 134, in *von Goetzen Durch Afrika* (1895) 7 et in *Engl. Jahrb. XXVI* (1899) 242.

1894 (A. G. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcau Kirunga, 2500 m. (Goetz. et Prittw. 46).

CUSSONIA Forst.

Cussonia angolensis [Seem.] Hieron in *Oliv. Fl. trop. Afr. III* (1877) 32 et *Cat. Welw. Pl. I*, 432; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 335.

Sphaerodeudron — Seem. in *Journ. of Bot.* (1865) 34, t. 26 et *Rev. Heder.* 37, t. 1.

1903 (Aug. Van Houtte). — IV : Madiata. — Nom vern. : **Lembila** (Van Houtte in Gill. 3501).

Cussonia arborea Hochst. ex A. Rich. *Tent. fl. Abyss. I* (1847) 356; *Oliv. Fl. trop. Afr. III*, 31; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 32 [B. S. B. B. XXXVI¹, 78].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.); Lukafu. — Nom vern. : **Dikasa-ya-Tambu** (Verd.).

[GAMOPETALAE]

RUBIACEAE (1)

SARCOCEPHALUS Afzel.

Sarcocephalus Diderrichii De Wild. et Th. Dur. in *Th. Masui L'État Indép. à l'Exposit. de Brux.-Tervueren* (1897) 439 [nom. tant.]; *De Wild. in Rev. cult. colon. IX* (1901) 7 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 34-37.

1896 (Norb. Diderrich). — II a : le Mayumba. — Nom vern. : **N'Gulu-Maza** (Diderr.).

Sarcocephalus Gilletii De Wild. in *Rev. cult. colon. IX* (1901) 8; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 82 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 754]; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 38-41.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1069).

(1) Une Caprifoliacée, le **Sambucus nigra** L., est introduite à Kisantu [V] (Gill.) [*Conf. De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 24].

Sarcocephalus Russeggeri [*T. Winterb.*] *Kotschy* ex *Schweinf.* Reliq. Kotschyanae (1868) 49, t. 33 [excl. fig. 6-8, 9-12]; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 39; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 4 (1891) 59 et in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 879; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 150.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.),

Sarcocephalus sambucinus [*T. Winterb.*] *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 4 (1891) 59 et in *Schlechter Westafri. Kautsch.-Exped.* (1900) 319; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 25; II (1901) 82 et Reliq. Deweyr. (1901) 105; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 274 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 193.

Nauclea — *T. Winterb.* Account of Sierra Leone, II (1803) 45.

S. esculentus Afzel. ex *Sabine* in *Trans. Hort. Soc.* V (1824) 442, t. 18; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 38.

Cephaelis — *Schumacher et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 105.

1874 (Fr. Naumanu). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — II a : Kamba. — Nom vern. : **Borinalolo** (Dew.); Katala. — Nom vern. : **Majampa** (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kinshassa (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — IX : lleko [Maringa] (Brun.).

MITRAGYNE Korth.

Mitragyne africana [*Willd.*] *Korth.* Obs. Naocl. Ind. (1839) 19, in obs.; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 40.

Stephegyne — *Walp.* Repert. bot. II (1843) 513; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* 380, t. 37; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 150.

Nauclea — *Willd.* Sp. pl. I (1797) 929; *D.* Prodr. IV, 345.

Platanocarpum — *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) t. 37.

1874 (É. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pechuel-Loesche).

Mitragyne macrophylla [*Perr. et Leprieur*] *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 41; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 25 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 25].

Nauclea — *Perr. et Leprieur* ex *DC.* Prodr. IV (1830) 340, in syn..

N. stipulosa DC. l. c. IV (1830) 340.

Mamboga — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 435.

Mamb. stipulosa O. Kuntze Rev. Genér. (1891) 289; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 105.

Stephegyne [*an err. cal. stipulata*] *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. II (1873) 31; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 150.

1874 (É. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pechuel-Loesche). — II : Boma (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VII : bord de la Fini près Kuta (Ém. Laur.). — IX : Bangala (Dew.); Bolombo (Ém. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. Laur.). — XI : en aval de Basoko (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Malucu** [Bangala]; **Vuku** [Boma]; **Wuwoko** [Lulanga] (Dew.).

. **UNCARIA** Schreb.

Uncaria africana *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1831) 471; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 41; *Hook.* Icon. pl. VIII, t. 781; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 381, t. 42; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 25 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 25] et Reliq. Dewevr. (1901) 106; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 76; II (1907) 71, 192.

Nanclaea — *Walp.* (non *Willd.*) Reper. bot. II (1843) 512.

Ouroparia — *Baill.* in B. S. Linn. Paris. I (1879) 228; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 435.

Uruparia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 228; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 57 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 378.

1870 (*G. Schweinfurth*). — IV : bords de la Lukungu (*Dew.*). — V : env. de Kisantu (*Gill.*). — XII : savane [de l'Uele] (*Ser.*). — XII d : pays des Mangbettu (*Schw.*). — XV : Linkanda [Lubue-Kasai] (*Gent.*). — Nom vern. : **Magwadabirada** [Bakongo] (*Ser.*).

HYMENODICTYON Wall.

Hymenodictyon fimbriolatum *K. Schum.* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 225 [nom tant.].

1899 (*Edg. Verdick*). — XVI : le Katanga. — Nom vern. : **Kampululu** (*Verd.*).

CORYNANTHE Welw.

Corynanthe paniculata *Wclw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 37, t. 14; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 43 et Cat. Welw. Pl. I, 437; *Ficalho* Pl. Uteis, 194; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 152; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 27; II (1900) 26; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 113.

1816 (*Chr. Smith*). — Bas-Congo Sm. : Cabra. — II a : Shinon (Ém. Laur.). — XV : rég. de Mukenge (*Pg.*). — Noms vern. : **Saja**; **Sakala** (Ém. Laur.); **Sagna** (Cabra).

CROSSOPTERIX Fenzl.

Crossopteryx africana [*T. Winterb.*] *Baill.* Hist. des pl. VII (1879) 489; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 378; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 226.

Rondeletia febrifuga *Afzel.* ex *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1831) 516.

Crossopteryx — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 381; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 152; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 106.

C. Kotschyana *Fenzl* in *Endl.* et *Fenzl* Nov. stirp. decad. (1839) 46; *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinneanae, 32, t. 15 a et b; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 44 et Cat. Welw. Pl. I, 437; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 154.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — III : Matadi (Èm. Laur.). — IV : route des Caravanes (Èm. Laur.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kisautu (Gill.); env. de Sanda (Vern.). — VI : Madibi (Sap.). — Nom vern. : **Moala** [Kwilu] (Sap.). — XV : rég. de Mukenge (Pg.). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kububa**; **Sachi** (Verd.).

PENTAS Benth.

Pentas cleisostoma *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 419.

Le type croit dans l'Angola.

— — var. **Poggeana** *K. Schum.* l. c. (1896) 420.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1110).

Pentas Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 28 [B. S. B. B. XXXVIII, 199] et Reliq. Dewevr. (1901) 106; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 273.

1896 (A. Dewèvre). — XIII : Mutumbe (Dew. 1089). — XIII a : Stanleyville (Èm. Laur.).

Pentas Liebrechtsiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 153.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Luangane** (Verd. 391).

Pentas longiflora *Oliv.* in *H. Johnst.* Kilim.-Exped., Append. (1886) 341 et in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1887) 335.

Le type croit dans l'Afrique trop. orient.

— — var. **occidentalis** *K. Schum.* ex *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Pentas longituba *K. Schum.* in Engl. Pfl. Ost-Afr. (1895) 377; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117].

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Pentas zanzibarica [*Klotzsch*] *Vatke* in Oest. Bot. Zeitschr. XXV (1875) 232; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 154.

Pentania — *Klotzsch* ex *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 286.

Pentas purpurea *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 83; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 46.

Neurocarpaea — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 438

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mukulia** (Verd. 597).

OTOMERIA Benth.

- Otomeria dentata** *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 50; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117].
1891? (F. Demeuse). — Ind. non cl. : Lunfudi (Dem. 510).
- Otomeria dilatata** *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 50; *K. Schum.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 377; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 27; II (1900) 26 et Reliq. Dewevr. (1901) 107; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 440; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 273 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 99; II (1907) 71, 193, (1908) 343.
O. speciosa *S. Elliot* in Journ. Linn. Soc. XXXII (1896) 437.
1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Dew.); entre Léopoldville et Sabuka (Ém. Duch.); Dolo (Schlt.); Kimpoko (M. Laur.); Kisantu (Gill.); Sanda (De Brouw.); Boko; Dembo (Vanderyst); Lula-Lumene (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Eiolo (Ém. et M. Laur.). — XII d : de Vankerkhovenville à Faradjé (Ser.). — XVI : Pweto; le Katanga (Desc.). — Ind. non cl. : Lusubi (Lescr. 146).
- Otomeria graciliflora** *K. Schum.* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 274 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 343.
1904 (Ém. et Marc. Laurent). — I : Moanda (Vanderyst). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.).
- Otomeria guineensis** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 405; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 49; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 26 et Reliq. Dewevr. (1901) 107.
1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — V : Léopoldville (Schlt.); env. de Léopoldville et de Kwamouth (Luja).
- Otomeria lanceolata** *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 50; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 152; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 274 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 76; II (1907) 71, 192, (1908) 343.
1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Léopoldville (Pyn.); env. de Kwamouth (Biel.); Yindu (Vanderyst); Kisantu; Kimuenza (Gill.). — VI : Madiibi (Lescr.); vallée de la Djuma (Gent.); bord du Kwilu. — Nom vern. : **Mondondono** (Sap.). — VII : Ibali (Ém. Laur.). — VIII : Lulanga (Ém. Laur.). — XV : Lomkala (Ém. Laur.); Eala. — Nom vern. : **Bongolo** (M. Laur.). — Ind. non cl. : Bundaka (Flamigny).
- Otomeria madiensis** *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 83, t. 41; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 49; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 153.
1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

PENTODON Hochst.

Pentodon pentander [Schumach. et Thonn.] *Vatke* in *Oest. Bot. Zeitschr.* XXV (1875) 231; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 377; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 108; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 273 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 176.

Hedyotis — *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 71.

Hedyotis macrophylla *Leprieur et Perr.* ex *DC.* *Prodr.* IV (1830) 427.

Oldenlandia — *DC.* *Prodr.* IV (1830) 427; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 63 et *Cat. Welw. Pl.* I, 450.

1895 (P. Dupuis). — II : Sisia (Dup.). — II a : Zobe (Dew.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kisanu (Gill.). — VII : Kutu (Em. Lanr.). — XIII : saline de Piani-Lombe (Dew.).

OLDENLANDIA L.

Oldenlandia angolensis *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 412; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 449; *K. Schum.* in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 317; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 27; *Pl. Gilletianae*, II (1900) 82 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 754] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 108; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 175.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Léopoldville (Schlt.); Kimnzenza; entre Dembo et Kisanu (Gill.). — XIII a : env. de Nyangwe (Dew. 1052).

Oldenlandia asperuliflora *K. Schum.* in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 318 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt. 12597).

Oldenlandia Bojeri [*Klotzsch*] *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 23; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 153.

Agathisanthemum — *Klotzsch* in *Peters Reise n. Mossamb.* I (1862) 294.

Hedyotis — *Vatke* in *Oest. bot. Zeitschr.* XXV (1875) 252.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens).

Oldenlandia caffra *Eckl.* et *Zeyh.* *Enum. pl. Afr. austr.* (1836) 2291; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 58; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 153.

Hedyotis — *Steud.* *Nomencl. bot.* ed. 2, I (1840) 726.

Kohautia setifera *DC.* *Prodr.* IV (1830) 430.

Hedyotis — *Sond.* in *Harv. et Sond. Fl. Capens.* III (1864) 10.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Oldenlandia capensis *L. f.* Suppl. pl. (1781) 127; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 63; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 375; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 153; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 446; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 153; Miss. Laurent (1906) 271 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 191.

Hedyotis — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) 271; *Sond.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III. 9.

II. sabulosa *D. C.* Prodr. IV (1830) 424.

1899 (Edg. Verdieck). — II : Ponta da Lenba (Naum.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — VIII : Haut-Lopori (Biel.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Oldenlandia congensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 82 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 754]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 87); entre Dembo et Kisantu; Kimuenza (Gill, 1779). — VI : vallée de la Djuma (Gill, 1565).

Oldenlandia corymbosa *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 119; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 62; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 375; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 154; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 108; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 466; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 137 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 342.

Hedyotis — *Vatke* in *Oest. bnt. Zeitschr.* XXV (1875) 232.

O. herbacea *D. C.* Prodr. IV (1830) 425.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Banana (Dew.). — II : Boma (Dew.); Zambi (Dup.). — IV : Batongo (Luja). — V : env. de Léopoldville (Cabra); Suata (Buett.); Dembo (Gill.). — VIII : Équateur (Buett.). — XIII a : Stanley-Falls (Dem.). — XIV : Uvira (Cabra). — XV : entre le Sankuru et le Lualaba (Ém. Laur.). — XVI : Toa (Desc.).

Oldenlandia Crepiniana *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 55 et in *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. (1900) 319; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 83 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 755]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 271 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 342.

1899 (R. Schlechter). — V : entre Kisantu et Dembo (Gill, 1540). — VIII : Coquilhatville (Schlt.); Eala (M. Laur. 831, 840; Pyn. 838); Lulanga (Ém. et M. Laur.).

Oldenlandia Debeerstii *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 27.

1895 (Gust. Debeerst.). — XVI : rég. du Tanganika (Deb.).

Oldenlandia decumbens [*Hochst*] *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 55; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 376; *Th. Dur.* et

Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 154; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 108; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 442; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 271 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75; II (1907) 70, 191, (1908) 342.

Hedyotis decumbens *Hochst.* in Flora (1814) 552; *Sond.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. III, 11.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.); Zobe (Dew.). — IV : Lutete (Heus.). — V : Sabuka (M. Laur.); Kisantu; Kimuenza (Gill.); Galiema (Pyn.); Kinkosi (Vanderyst). — VI : Madibi (Sap.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.).

Oldenlandia florifera *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 271.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

Oldenlandia globosa [*Klotzsch*] *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 54; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 118]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 25 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 25].

Agathisanthemum — *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 94.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Heus.). — V : Kisantu (Gill.).

Oldenlandia herbacea [*L.*] *Roxb.* Hort. Bengal. (1814) 11; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 444.

Hedyotis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 103.

O. Heynei *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXXIX (1873) 84; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 59; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 375; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 155; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 27; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 199; II (1907) 191, (1908) 342 et Miss. Laurent (1906) 272.

Hedyotis dichotoma A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 361.

1899 (Éd. Luja). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — IV : Luozi (Luja). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill.); Boko; Yindu (Vaoderyst); Lula-Lumene (Hendr.). — VIII : Eala (Pyn.). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XV : Bas-Sankuru (Em. Laur.).

Oldenlandia Kimuenzae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2115).

Oldenlandia lancifolia [*Schumach.* et *Thonn.*] *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 61; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 375; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 155; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 42 et Reliq. Dewevr. (1901) 108; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 446; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 71 et Miss. Laurent (1906) 272, (1907) 449.

Hedyotis — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 72.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : env. de Zobe (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Équateur (Pyn.). — IX : Gali (Thonn.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : en aval d'Ifuta; Ibaka (Ém. et M. Laur.).

Oldenlandia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 272.

1905 (Marc. Laurent). — V : entre Bolobo et Mopolenge (M. Laur. 620).

Oldenlandia macrophylla *DC.* Prodr. IV (1830) 427; *Hiern in Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 63; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 155.

Hedyotis pentandra *Schumach.* et *Thom.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 71.

Oldenlandia — *DC.* (non *Retz.*) l. c. IV (1830) 427.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Oldenlandia microphylla *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 28 et Reliq. Dewevr. (1901) 108.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : rég. de l'Équateur (Dew. 365).

Oldenlandia moandensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 190, (1908) 342.

1903 (J. Gillet.). — I : Moanda (Gill. 3183, 4051).

VIRECTA Sm.

Virecta multiflora *Sm.* in *Rees* Cyclop. XXXVII (1817) n. 4; *Hiern in Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 48; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 25 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 25] et Reliq. Dewevr. (1901) 107; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 273 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 76, (1904) 199; II (1907) 192, (1908) 342.

Phyteumoides hirsuta *Smeathm.* ex *DC.* Prodr. IV (1830) 414

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Dew.); Luja; entre Léopoldville et Sabuka (Ém. Duch.); Kisantu; Kimuenza (Gill.); Yindu (Vanderyst). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew.); Coquilhatville (Schlt.); Eala (M. Laur.); Bamania; Boangi (Ém. Laur.); Mompoko [Lulanga] (Brun.); Ikenge (Huyghe). — IX : Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.).

Virecta procumbens *Smith* in *Rees* Cyclop. XXXVII (1817) n. 2; *Hiern in Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 48; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 152.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Léopoldville (Schlt.). — VIII : Eala et env. — Nom vern. : **Bolivo** (M. Laur. 37, 1195).

MUSSAENDA L.

Mussaenda arcuata Poir. in *Lam. Encycl. méth. Bot.* IV (1797) 392; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 68; *K. Schum.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 379; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 155; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 453; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 29 et Reliq. Dewevr. (1901) 109; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 76, (1904) 199; II (1907) 192, (1908) 341.

1885 (R. Buettner). — V : env. de Kisantu (Gill.); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Monkoso** (M. Laur.); entre Coquilhatville et Lulange (Pyn.). — XI : Isangi (Ém. Laur.); Mogandjo (M. Laur.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XV : rég. du Kasai (Luja; Gent.); C. brousse entre Lusambo et le Lomami (Ém. Laur.); Dibebe (Flam.); rég. de Mukenge (Pg.). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. non cl. : brousse du Lomami (Desc.); Lombolo † (Lescr.).

Mussaenda deburu Stapf ex H. Johnston G. Grenfell and the Congo, II (1908) 906 [nom. tant.].

Ann. ? (G. Grenfell). — X : Mubangi bor. (Grenf.).

Mussaenda elegans Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 117; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 70; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 156; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 42 et Reliq. Dewevr. (1901) 109; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 454; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 275 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 200; II (1907) 71, 192, (1908) 349.

Gardenia coccinea G. Don in *Edinb. Phil. Journ.* XI (1824) 343.

Bertiera — G. Don *Gen. Syst. Bot.* III (1834) 506.

M. discolor Thonn. ex DC. (non Thou.) *Prodr.* IV (1830) 372, in syn.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Johnst.); Bas-Congo (Gill.). — II a : le Mayumbe (Kest.); Katala. — Nom vern. : **Manicolo** (Dew.); Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.); Coquilhatville (Dew.). — IX : Ukatura-ka; Unangi (Ém. Laur.). — IX a : Bokapa (Thonn.). — XI : env. de Yanbuya (Sohl.). — XII a : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.). — XV : rég. de Mukenge (Pg.). — XVI : Lac Moero (Desc.).

— — var. **minor** De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I (1899) 27.

1896 (Alph. Cabra). — II a : la Lemba (Cabra).

Mussaenda erythrophylla Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 116; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 69; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 156; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 453; *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 126; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 28; II (1900) 29 et Reliq. Dewevr. (1901) 109; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 275 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 200; II (1907) 71, 198, (1908) 344.

M. splendida Welw. in Trans. Linn. Soc. XXVII (1867) 36, t. 13.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Johnst.); Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe (Kest.); Zenze (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : pays des Makalla (Mech.). — IX : env. de Ya ubinga (Pyn.). — X : l'Ubangi; Imese (Ém. Laur.). — XI : Lokandu (Dew.). — XII c : entre Poko et Rungu (Ser.). — XII d : Vankerkhovenville (Ser.); pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : Stanleyville (Dem.); env. d'Élungu (Dew.) — XV : le Loanje (Gent); Lubi (Lescr.); Bena-Dibele (Flam.); Ikoka (Sap.). — XVI : le Katanga (Verd.). — Nom vern. : **Manenobe** [Tanganika] (Dew.)

Mussaenda heinsioides Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 70; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 156.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Mussaenda hispida Engl. in Engl. Jahrb. VIII (1887) 66; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 156.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (Naum.).

Mussaenda luteola [Delile non Hochst.] Cent. pl. Méroé (1826) 65, t. 1, fig. I; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 71; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 156; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 118].

Vignaudia — *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 182.

1893 (P. Dupuis). — II : Boma (Dup.).

Mussaenda platyphylla Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 70; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 157.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Mussaenda polita Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 67; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 118]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 155.

1895 (Ém. Laurent). — Congo (Dew.). — XV : le Saokuru (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Mussaenda stenocarpa Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 68; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 157; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 28; II (1900) 29 et Reliq. Dewevr. (1901) 110; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 275 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 76, 1906 209; II (1907) 72, 198, (1908) 314.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Leopoldville (Dew.); Tshumbiri (M. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Bill; Gent; Madibi (Lescr.; Sap.); Eielo (Ém. et M. Laur.). — VII : Lac Leopold II : bords de la Fint (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); près Équateur (Pyn.); Eala (M. Laur.); Monzambi (Bruu.). — IX : Bumba (Dem.); Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XII a : route de Buta à Bima; route des Caravanes de Goo (Ser.). — XII c : Amadis et env. (Ser.).

— XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : Romée (Ém. Laur.). — XIII c : Yakoma (Ém. et M. Laur.). — XV : le Sankuru (Sap.); le Kasai (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Mopolambamba**; **Bobalabaneba** [Bangala] (Sap.); **Bopalabamba** [Eala] (M. Laur.); **Djaurbakessem**; **Kolo-Kolo** [Kwilu] (Sap.).

M. stenocarpa form. **congensis** Buett. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 83; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 157.

1885 (R. Buettner). — VIII : Équateurville (Buett.).

— — var. **latifolia** De Wild. et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1901) 43.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi (Thonn. 35).

Mussaenda tenuiflora Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) 392; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 69; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 379; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo. II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 418] et Reliq. Dewevr. (1901) 110; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 453; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 275 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 72, (1904) 193; II (1907) 200, (1908) 344.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu et env. (Gill.). — VI : le Kwilu (Sap.). — VII : la Funi (Ém. Laur.); Lac Léopold II (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Bala-Lundzi (Pyn.); env. de Bokakata (Dew.). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XIII a : les Stanley-Falls; Romée (Ém. Laur.). — XV : Idanga (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Tambo** [Eala] (M. Laur.); **Mtinku** [Sankuru] (Sap.).

UROPHYLLUM Wall.

Urophyllum callicarpoides *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 72; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 110; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 278 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 72; II (1907) 193.

1896 (A. Dewèvre). — Congo. — Nom vern. : **Ompampolo** (Dew. 753). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.). — VIII : Efuqua-Kombo (M. Laur.); Bombimba (Pyn.); env. de Lemfu (But.). — XIII a : Romée (Ém. et M. Laur.).

Urophyllum Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II, (1900) 30 et Reliq. Dewevr. (1901) 110; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 77; II (1907) 72, 193 et Miss. Laurent (1906) 278.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kwamouth (Ém. et M. Laur.); Kisantu et env. (Gill. 3522); env. de Dembo (Gill.); env. de Lemfu (But. in Gill. 3476); Kimuenza (Dew.); Suda (Odd.). — VII : Iballi (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bombimba (Pyn. 325); env. d'Eala (M. Laur. 1224); Équateur (Pyn.). — XIII c : env. de Ponthierville [Wabundu] (Dew.). — XV : Limbutu (M. Laur.); Butala (Ém. et M. Laur.).

Urophyllum Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 26 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 26]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 77; II (1907) 72, 193.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 402); rives de la Lukaya (Ch. Gérard; Gill. 1929). — VIII : Eala (Pyn. 467); Mozambi. — Nom vern. : **Oshampongo** (M. Laur. 1456). — IX : Bumba (Pyn. 49).

Urophyllum Liebrechtsianum *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 29 et Reliq. Dewevr. (1901) 111; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 77; II (1907) 194 et Miss. Laurent (1906) 278.

1896 (A. Dewèvre). — V : le Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); env. de Léopoldville (Gill. 12689); Lukolela (Pyn. 195). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1579). — IX : Bolombo (Dew. 799).

Urophyllum verticillatum *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 111.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 257).

Urophyllum viridiflorum *Schweinf. ex Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 74; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 157.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

SABICEA Aubl.

Sabicea affinis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 77; II (1907) 72 et Miss. Laurent (1906) 275.

1899 (J. Gillet). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill. 159, 357, 1390). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 1902). — IX : Bumba (Pyn.).

Sabicea calycina *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 399; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 76; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 276 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 194.

1903 (Ém. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 241). — XV : Kapinga (Ém. et M. Laur.).

Sabicea capitellata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 398; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 76; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 157; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 81 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 756]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 72.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : entre le Kwaugo et Dembo; bassin de la Sele (But.); env. de Kisantu; Kimmenza (Gill.); env. de Lemfu (But.; Gill.).

Sabicea Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 112; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 276 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 194.

1896 (A. Dewèvre), — VIII : Eala (M. Laur. 1597). — XIII c : Ponthierville [Wabundu] (Dew. 1143).

— — var. **latifolia** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 276.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Sabicea Dinklagei *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 428; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 31.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 139; Dem.).

Sabicea floribunda *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 428; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 71.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1749).

Sabicea Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 78 et Miss. Laurent (1906) 276.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1911, 2024). — XV : Lomkala; Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Sabicea Kolbeana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 78; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 157.

1885 (R. Buettner). — VI : bois des bords du Kwango (Buett. 440).

Sabicea Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 276.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. Laur. 902).

— — var. **Pynaertii** *De Wild.* l. c. (1906) 277 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 194.

1905 (L. Pynaert). — VIII : Nouvelle-Anvers (Pyn. 12); Eala (Pyn. 579).

— — var. **velutina** *De Wild.* l. c. (1906) 277.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.).

Sabicea longepetiolata *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 78 et Miss. Laurent (1906) 278.

1901 (J. Gillet). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kimuenza (Gill. 2179).

Sabicea Schumanniana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 76; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 157.

1885 (R. Buettner). — V : entre Lukolela et Bolobo (Buett.).

Sabicea venosa *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 399; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 77; *K. Schum.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 379; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 454; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 31; Pl. Gilletianae, I (1900) 27 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 27] et Reliq. Dewevr. (1901) 412.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Katala : Shinganga (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Dem.).

— — var. **villosa** *K. Schum.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 31; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 194.

1895 (P. Dupuis). — II a : Biugila (Dup.). — VIII : Eala (Pyu. 515).

Sabicea Vogelii *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 398; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 76; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 278.

1903 (Èm. et Marc. Laurent). — XV : Bukila (Èm. et M. Laur.).

STIPULARIA P. Beauv.

Stipularia africana *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 26, t. 75; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 80; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 84 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 756]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 79, (1904) 200 et Miss. Laurent (1906) 278.

1895 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Dew.); Yumbi (Èm. Laur.); Lukolela (Pyn.). — VII : Lac Leopold II (Body). — IX : Lie (Èm. Laur.). — XI : env. de Bena-Kamba (Dew.).

— — var. **hirsuta** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 194.

1906 (Alberic Bruneel). — VIII : Lokelenge (Brun. 41).

Stipularia elliptica *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 80; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 412 et Reliq. Dewevr. (1901) 102; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 278 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 195.

1900 (R. Butaye). — V : Dolo (Èm. Laur.); env. de Léopoldville (Gill.); bassin de la Sele (But.); Kimuenza (Gill.); Lula-Lumene (Hendr.); entre Kisantu et Popokabaka (But.).

— — var. **hirsuta** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 195.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 800).

HEINSIA DC.

Heinsia densiflora *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 81 ;
K. Schum. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 382.

Le type n'est indiqué que dans l'Afrique trop. orientale.

— — var. **occidentalis** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 289 et Étud.
fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 169.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bena-Dibele : Isaka ; Mokole (Ém. et M.
Laur.) : le Sankuru (Sap.).

Heinsia pulchella [*G. Don*] *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat.*
Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 84 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 382 ; *Th. Dur.*
et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 118] ; *Pl.*
Thonnerianae (1900) 43 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 113 ; *De Wild.*
Miss. Laurent (1906) 289 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 75,
169 ; (1908) 343.

Gardenia — *G. Don* in *Edinb. Phil. Journ.* XI (1824) 343.

G. crinita *Afzel.* Stirp. guin. medic. sp. nov. (1829) 13.

H. jasminiflora *DC.* Prodr. IV (1830) 390 ; *Bot. Mag.* (1846) t. 4207 ; *Hiern* in
Oliv. Fl. trop. Afr. III, 81 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 158 ;
Hiern Cat. Welw. Pl. I, 455.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Kest.) ;
la Lemba (Dew.) ; Bingila (Dup.). — IV : Luozi (Luja). — V : le Stanley-Pool
(Buett.) ; Léopoldville (Ém. Duch ; Schl.). : Sabuka ; Mopolenge (Ém. et M. Laur.) ;
Kisantu ; env. de Dembo. — Nom vern. : **Nscanuma** (Gill.) ; env. de Sanda (Odd.) ;
Dembo (Vanderyst). — VII : Malepie (Ém. Laur.). — VIII : Éala (M. Laur.) ;
Ikenge (Pyn.) ; Injolo (Ledoux et Huyghe) ; Bariuga-Yala [Boloambo] (Bruu.).
— IX : Umaugi (Krek.) ; Bokumbi (Thonn.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).
— XI : Isangi (Dem.) ; env. de Yambuya (Solh.). — XIII a : Romée (Ém. et M.
Laur.). — XV : le Saukuru (L. Rom.) ; Ifuta (Ém. et M. Laur.) ; Lusambo (Jos.
Duch.). — Ind. non cl. : Bena-Kusadi (Leser.) ; Kibaka (Buett.) ; Buuga [la Songo]
(Ern. Dew.).

OBS. — Espèce répandue dans la région du Stanley-Pool, de la Fini et du Lac
Léopold II (Ém. Laur.).

— — var. **hispidissima** *K. Schum.* ex *Th. Dur.* et *De Wild.*
Mat. fl. Cgo, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 119].

1895 (Ém. Laurent). — V : bords du Congo en amont du Stanley-Pool (Ém. Laur.).

— — var. **phylocalyx** *K. Schum.* ex *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat.
fl. Cgo, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 117] et *Contr. fl. Cgo*, I
(1899) 28 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 79.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : au S. de la Lukula (Cabra).
— IV : rives de la Lukungu (Gérard in Gill, 1930). — V : Kisantu (Gill.). — IX :
pays des Bangala (Hens, 376). — IX : Bokumbi (Thonn.).

BERTIERA Aubl.

Bertiera aethiopica *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 83; *Engl.* in *Schlecht.* Westafri. Kautsch.-Exp. (1900) 319.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilbatville (Schlt. 12607).

Bertiera capitata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 169, (1908) 344.

1903 (Marc. Laurent). — VII : Ibalé (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (Pyn. 41 a, 122, 628, 1023, 1163; M. Laur.); Boyenge [Ikelemba] (M. Laur. 1260).

Bertiera congolana *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo (1900) 28 et Reliq. Dewevr. (1901) 113; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 75, 170.

1895 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Dew.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kisantu et env. (Gill. 255, 661, 1833); env. de Sauda (Odd. in Gill. 3563). — XIII a : Stanleyville (Dew.).

Bertiera Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 27 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 27] et Reliq. Dewevr. (1901) 113; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 290 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 170.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Luvituku (Pyn. 86). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1582; Pyn. 514). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew.); Romée (Ém. et M. Laur.).

Bertiera gracilis *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 290.

1903 (Ém. et M. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — XV : Kapigua (Ém. et Laur.).

— — var. **latifolia** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 170.

1895 (F. Demeuse). — IX : pays des Bangala (Dem. 315); Romée (M. Laur. 1444). — XI : Yambuya (M. Laur. 1453).

Bertiera Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 290 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 76, t. 6-7, 171.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.); Eiolo (Ém. Laur.). — VII : bord des pièces d'eau dans les savanes du distr. du Lac Léopold II (Body).

Bertiera laxa *Benth* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 85; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 85; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 158.

1816 (Ch. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Bertiera macrocarpa *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 394; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 81 et *Cat. Welw. Pl.* I, 456; *Th. Dur.* et *De Wild. Mal. fl. Cgo*, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 117] et *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 29; II (1900) 29; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 291.

1893 (Ém. Laurent). — Congo (Dew); Bas-Congo (Ém. Laur.). — IX : Gali (Thonu.). — X : Inese (Ém. et M. Laur.).

Bertiera Thonneri *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 44, t. 13.

1896 (Fr. Thenuer). — IX a : Gali (Thonu. 19).

Obs. — *L'Alibertia edulis* A. Rich. [in *Mém. Soc. hist. nat. Paris*, V (1830) 234] a été introduit, en 1898, à Kisantu, par le Fr. J. Gillet [*De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 203].

DICTYANDRA Welw.

Dietyandra arborescens *Welw. ex Benth.* et *Hook. f. Gen. pl.* II (1873) 85; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 86 et *Cat. Welw. Pl.* I, 456; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 27 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 27]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 84, (1906) 201; II (1907) 196, (1908) 345 et *Miss. Laurent* (1906) 281.

1899 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu; env. de Kimuenza (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Pyn. 979, 1052, 1324). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XV : le Sankuru (Sap.; Mange (Ém. Laur.).

LEPTACTINIA Hook. f.

Leptactinia Arnoldiana *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 279, t. 96-97 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 157.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Liubutu (M. Laur. 974). — XV : Koudue (Ém. et M. Laur.).

Leptactinia formosa *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 431.

1882? (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1120); Mukenge (Pg. 1181, 1177).

Obs. — Pogge a aussi indiqué cette espèce entre Nyangwe et Kimbuudo (Pg. 1083, 1195).

Leptactinia Laurentiana A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 102 et XXXIV² (1895) 95; *Th. Dur.* et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 158.

1903 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur. 106).

Leptactinia Leopoldi II *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 75; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 158; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 72, 157, (1908) 344.

1885 (R. Buettner). — V : Lukolela (Dew. 849 a); entre Lukolela et Bolobo (Buett. 436, 448); Kisantu (Gill. 289); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3579). — VI : Kongo-Kwilu (Sap.); rég. de Luana (Lescr. 38); Dima (Sap.). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — VIII : Eala et env. — Nom vern. : **Jakoi-Loko** (M. Laur. 140, 1215; Pyn.). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 110). — XV : Mshenge (Lescr.); Bukila (Ém. et M. Laur. 504, 973, 978, 1142, 1243, 1358; Flam. 28); Kapilumba (Sap.). — Nom vern. : **Mompusu** [Bangala] (Sap.).

Leptactinia Liebrechtsiana *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 27 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 27]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 79, (1906) 200; II (1907) 73, 100.

1900 (J. Gillet). — V : entre le Kwango et Kisantu (But.); Kisantu (Gill. 182); Sanda et env. (Odd.; De Brouw. in Gill. 3002, 3109, 3119, 3416); rég. de Kimpenza (Gérard in Gill. 2042); Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3051, 3099).

Leptactinia Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 345.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimpenza (Gill. 1944). — VIII : Eala (Pyn. 916). — XI : Mogandjo (M. Laur. 577).

Leptactinia Sereti *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 280.

1896 (A. Dewèvre). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.).

Leptactinia surongaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 73.

1905 (F. Seret). — XII c : Surango (Ser. 422).

TARENNA Gaertn.

Tarenna congensis *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 91 et Cat. Welw. Pl. I, 457; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 159.

Chomelia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 278; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 121; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 157.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew. 97; Pyn. 24).

RANDIA L.

Randia acarophyta *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 158, (1908) 346.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Pyn. 397, 443, 837, 1647). — XI : Yam-buya (M. Laur. 1440).

Randia acuminata *G. Don* [*Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 385; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 95; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 159; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 114; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 281 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 158, (1908) 346.

Gardenia — *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1831) 499.

1870 (*G. Schweinfurth*). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Boandsu**; **Bondju** (*Dew.*). — VII : Ibal (Ém. et M. Laur.). — VIII : Irebu (*Schl.*); Coquilhatville (*Pyn.*); Eala (M. Laur. : *Pyn.* 532, 951, 1302; *Flam.* 54); Mompoko [Lulanga] (*Brun.*). — IX : Bolombo. — Nom vern. : **Etundulu** (Ém. et M. Laur.). — XII : Mapusi [rive gauche de l'Uele] (*Ser.*). — XII d : pays des Mangbettu (*Schw.*). — XIII c : Lokandu. — Nom vern. : **Kikiki** (*Dew.*). — XV : le Sankuru (*Sap.*). — Nom vern. : **Kilanga** [Tauganika] (*Dew.*).

Randia Bruneelii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 159, (1908) 346.

1906 (*Alberic Bruneel*). — VIII : Eala (*Pyn.* 1150); Basankusu; Momponou (*Brun.* 56).

Randia cladantha *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 62; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 114; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 159, (1908) 346.

1896 (*A. Dewèvre*). — V : env. de Lukolela. — Nom vern. : **Mocingate**; **Mompompolo** (*Dew.*). — VIII : Eala (M. Laur. 1102, 1274, 1572; *Pyn.* 882, 1041, 1760).

Randia congolana *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 28 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 28] et Reliq. Dewevr. (1901) 114; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 201, II (1907) 74, 159, (1908) 346 et *Miss. Laurent* (1906) 281.

1896 (*A. Dewèvre*). — V : Kisantu : env. de Sanda (*Gill.* 3418, 3429). — VI : vallee de la Djuma (*Gent.*). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 117 a); Bombimba (*Pyn.* 326); Ioko [Baringa] (*Brun.* 33). — XI : Lokandu et env. (*Dew.* 1105; *Gos. saert*); en aval de Basoko; Malema; Barumbu (Ém. et M. Laur.). — XII a : entre Buta et Bima (*Ser.* 102). — XIII a : Stanleyville (*Pyn.* 70). — XV : Batempa; Butala; Dibebe; Bolougula (Ém. et M. Laur.); le Sankuru. — Nom vern. : **Mokindu** (*Sap.*). — Ind. non cl. : Beua-Lecoula [XIII c ?] (*Dew.* 1150 a).

Randia Cuvelierana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 79, (1904) 201 et *Miss. Laurent* (1906) 282, fig. 39.

1902 (*L. Gentil* et *J. Gillet*). — VI : Tshimbane (*Gill.* 2485, 2906; *Gent.* 82). — VIII : Eala (M. Laur. 121). — XII : Danga. — Nom vern. : **Bienga** (M. Laur. 6). — XV : Libusha (Ém. et M. Laur.).

Randia Eetveldeana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 24 [B. S. B. B. XXXVII², 194]; *Reliq. Dewevr.* (1901) 115 et *Ill. fl. Cgo* (1902) 169, t. 85; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 283 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 74, (1908) 331.

1895 (A. Dewèvre) — II a : Shinganga (Dew.) — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 161). — IX : en aval de Bolombo : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XII c : Nala (Van Ryss.). — XV : Butala (Lescr. 260).

Randia Eetveldea var. **elongata** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 283.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : le Mayumbe [Bukula] (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Randia Lemairei *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 155.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mukonli** (Verd.).

Randia Liebrechtsiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 23 [B. S. B. B. XXXVIII², 193] et Reliq. Dewevr. (1901) 117.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Bowana-Panzi** (Dew. 826).

Randia longiflora [*Salisb.*] *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 159.

Rothmannia — *Salisb.* Parad. Londin. (1807) t. 65.

Randia maculata DC. Prodr. IV (1830) 388; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 96.

Gardenia speciosa A. Rich. in Mém. Soc. hist. nat. Paris. V (1834) 240.

G. Stauleyana *Hook.* ex *Lindl.* in Bot. Reg. (1845) t. 47; Bot. Mag. (1845) t. 4185.

Rothmannia — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 383.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Randia Lujae *De Wild.* in Comp.-rend. Acad. sci. Paris (1904) 913 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 283 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 159.

1903 (Éd. Luja). — VIII : Lokelenge (Brun. 28). — XV : forêts du Sankuru (Luja).

Randia malleifera [*Hook.*] *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. II (1873) 89; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 89; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 31; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 159; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 160.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila? (Dup.). — V : Upoto? (Wilw.). — XI : Yambuya (M. Laur.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Randia micrantha *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 438; *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.

1882 (P. Pogge). — XV : rog' de Mukenge (Pg.).

— — var. **Poggeana** *K. Schum.* l. c. (1896) 438.

1882 (P. Pogge). — XV : entre Kingenge et le Kasai (Pg. 977; Mukenge (Pg. 1051).

Randia Munsae Schweinf. ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 99; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 160.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Randia myrmecophita De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 160-163, fig. 5-8, t. 38-39, (1908) 346.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 822)

— — var. **glabra De Wild.** l. c. 163 et 346.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Coquilhatville (M. Laur.). — XI : env. de Yambuya (Solh. 44). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

— — var. **subglabra De Wild.** l. c. 163.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Yambuya (M. Laur. 1614, 1617).

— — var. **typica De Wild.** l. c. 160.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1616; Pyn. 445).

Randia nalaensis De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 347.

1907 (F. Seret). — XII c : env. de Nala (Ser. 805).

Randia octomeira [Hook.] Benth. et *Hook. f.* Gen. pl. II (1876) 89; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 98; *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 439; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 31 et Reliq. Dewevr. (1901) 117; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 80, (1906) 201; II (1907) 74, 164, (1908) 346 et Miss. Laurent (1906) 283.

1882 (P. Pogge). — V : Kimuenza; entre Dembo et le Kwaugo (Gill); Sanda (Odd.; De Brouw.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. et Gent.). — VII : Lac Léopold II (Body.). — VIII : Bokakata (Dew.); Ikenge (Krek.); Eala (M. Laur.; Pyn.). — IX : pays des Bangala (Dem.); Umangi (Krek.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XIII a : Stauleyville (Pyn.). — XV : Bolongula; le Sankuru (Ém. Laur.); Munungu (Lescr.); Mukenge (Pg.); Mukikamu (Ém. Laur.); Dibebe (Flam.). — Nom vern. : **Malalenko** [Sankuru] (Sap.).

Randia physophylla K. Schum. in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 64; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 81; II (1907) 74, 164.

1900 (R. Butaye). — V : env. de Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.); la Lukaya (Gill.). — VI : rég. du Kwango (But.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1557). — XV : Lubi (Lescr. 204).

Randia Pynaertil De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 164, (1908) 347.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 1440); Mondjo (Pyn. 310). — XV : le Sankuru (Sap.).

MORELIA A. Rich.

Morelia senegalensis A. Rich. in Mém. Soc. hist. nat. Paris, V (1834) 232; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 113; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 74 et Reliq. Dewevr. (1901) 117; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1901) 201; II (1907) 75, 167 et Miss. Laurent (1906) 285.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Zenze (Ém. Laur.); Shinganga (Dew.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Bolobo (Ém. et M. Laur.); Tshumbiri (M. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.). — VII : bassin de la Fini (Ém. Laur.); Lac Léopold II (Body). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Bala-Lundzi (Pyn.); XV : rég. de Mukenge (Pg.).

GARDENIA L.

Gardenia Jovis-tonantis *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 101 et Cat. Welw. Pl. I, 461; *Ficalho* Pl. Uteis, 461; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 348.

G. Thunbergia Auct. [non L.]. *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 160; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 283, t. 80 et fig. 40; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 124-126, t. 23 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 158.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Ém. Laur.). — II a : C. dans le Mayumbe (Ém. Laur.); Bingila (Dup.). — IV : route des Caravanes, C. [distr. des Cataractes] (Ém. Laur.); Luvituku (Pyn.). — V : C. dans le district (Ém. Laur.); le Stanley-Pool (Dem.); Léopoldville; Kisantu; Dembo (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — XII c : entre Guruga et Niangara (Ser.); entre Mapusi et Koko [Uele] (Ser.). — XV : Mission St-Joseph de Luluaubourg (Leser); Luluaubourg. — Nom vern. : **Kapulumba** (Sap.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kinkolela** (Yerd.). — Ind. non cl. : bords de la Luile (Desc.).

Gardenia Leopoldiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 28 et Reliq. Dewevr. (1901) 117; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 285.

1895 (A. Dewèvre). — II : env. de Boma (Ém. et M. Laur.). — II a : Shinganga (Dew. 286).

Gardenia Sereti [*De Wild.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 348.

Randia — *De Wild.* l. c. II (1907) 164 [sphalm.].

1905 (F. Seret). — XII : bord de la Giradi près de Duru-Mokra (Ser. 152).

Gardenia Vogelii *Hook. f.* in *Hook.* Icon. pl. VIII (1848) t. 782-783 et Niger Fl. 381, t. 38-39; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 103; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 160.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

AMARALIA Welw.

Amaralia calycina [*G. Don* | *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 78; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 32 et Reliq. Dewevr. (1901) 118; *De Wild.* Étud. fl. Bas et Moy.-Cgo, II (1907) 74, 165 et Miss. Laurent (1906) 285

Gardenia — *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 497.

G. bignoniiflora *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 585.

Amaralia — *Welw.* ex *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. II (1873) 91; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 112; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 160; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 201.

G. Sherbourniae *Hook.* in *Bot. Mag.* (1843) t. 4044.

Sherbournia foliosa *G. Don* in *Loud.* Enc. pl. Suppl. II (1855) 1322; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 466.

1870 (*G. Schweinfurth*). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.). — V : Bolobo (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); Banza-Boma (Luja). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.; Pyn.). — IX : Bangala (Dew.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Lubefu (Lescr.); rég. de Mukenge (Pg.).

OXYANTHUS DC.

Oxyanthus dubius *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 285.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Ganda [Lac Léopold II] (Ém. et M. Laur.).

Oxyanthus formosus *Hook. f.* in *Hook.* Icon. pl. (1848) t. 785-786; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 109; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 74 | B. S. B. B. XXXVII, 117; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 165.

1895 (Ém. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — XV : bords du Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Oxyanthus Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 165.

O. formosus *De Wild.* [ou *Hook. f.*] Miss. Laurent (1906) 286.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.).

Oxyanthus sankuruensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 166.

1896 (Ém. Laurent). — XV : bords du Sankuru (Ém. Laur. 1906; Sap.).

Oxyanthus Schumannianus *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 119; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 81 et Miss. Laurent (1906) 286.

1900 (*J. Gillet*). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); env. de Kisantu; entre Kisantu et Dembo (Gill. 1542); Kimuenza (Gill. 1671).

Obs. — A. Dewèvre, qui le premier découvrit cette espèce, en 1896, la récolta dans le Congo français au N. du Stanley-Pool, n. 700.

Oxyanthus Smithii *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 107; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 161.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Oxyanthus speciosus *DC.* in *Annal. Mus. Paris*, IX (1807) 218 et *Prodr.* IV, 376; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 108; *K. Schum.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 381; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 32; *Pl. Gillietianae*, I (1900) 28 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 28] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 119; *Hiern* *Cat. Welw.* Pl. I, 465; *De Wild.* Étud. fl. Bas et Moy.-Cgo, I (1904) 81; II (1907) 78, 116 et *Miss. Laurent* (1906) 286.

1895 (A. Dewevre; Ém. Laurent). — II a : Kemba (Dew.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Kitobola (Pyn.); Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Lukolela (Dew.); Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — IX : Yambiuga (M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur.); Yambuya (M. Laur.). — XV : Pangu (Ém. et M. Laur.).

Oxyanthus unilocularis *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 110; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 119] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 119; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 32; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 81 et *Miss. Laurent* (1906) 286.

1891 (F. Demeuse). — II a : Zenze. — Nom vern. : Ouku (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.); env. de Bokakata (Dew.). — IX : Bangala (Dem.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.).

POUCHETIA A. Rich.

Pouchetia africana *DC.* *Prodr.* IV (1830) 393; *A. Rich.* in *Mém. Soc. hist. nat. Paris*, V (1834) 117 et 251; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 117; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 161; *Hiern* *Cat. Welw.* Pl. I, 467.

Wendlandia virgata *G. Don* *Gen. Syst. Bot.* III (1834) 519.

1816 (Chr. Smith). — V : Bas-Congo (Sta.).

— — var. **cuneata** *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 117; *Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 161; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Mat. Th. fl. Cgo*, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 117] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 120.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.); Iles du Bas-Congo (Dew.). — II a : Zenze (Ém. Laur.).

Pouchetia Baumanniana *Buett.* in *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.* XXXI (1889) 89; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 161.

1884 (R. Buettner). — III : montagnes de Toudoa (Buett. 445).

FERETIA Delile,

Feretia apodanthera *Delile* in *Annal. sci. nat. Sér. 2, XX* (1843) 92, t. 1, fig. 4; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr. III*, 115; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 156.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kasa-Sanga** (Verd.).

TRICALYSIA A. Rich.

Tricalysia aurantiodora *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 157.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 569).

Tricalysia coriacea *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr. III* (1877) 120; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 161.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Tricalysia Crepiniana *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 120; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 286 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 167.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala (M. Laur. 1131, 1446); Équateurville [Wangata] (Dew. 740); Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.).

— — var. **elliptica** *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 287.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2690).

Tricalysia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, VI* (1900) 30 [B. S. B. B. XXXVIII², 200] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 120; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1904) 203.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 964). — Noms vern. : **Genia** [Kasongo]; **Mzinia** [Tanganika] (Dew.).

Tricalysia djumaensis *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1904) 202; II (1907) 167.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. : Gill. 2781). — XI : Limbutu (M. Laur. 1568).

Tricalysia Hensii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 167.

1888 (Fr. Hens). — V : Bolobo (Dem. 460); Lukolela Heus, C. 121; Pyu. 273).

Tricalysia katangensis *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 156.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. **Musongwa** (Verd. 538).

Tricalysia Laurentii *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 287, 354.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.).

Tricalysia longestipulata *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 84 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 756]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 203; II (1907) 168 et Miss. Laurent (1906) 288.

T. griseiflora *K. Schum.* var. — *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1901) 28 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 28].

1900 (J. Gillet). — V : Lukolela (Pyn. 253): env. de Kisantu. — Nom vern. : **Kibete-Kibele** (Gill. 238, 887, 1108, 3401); Lemfu (But. in Gill. 3276); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Lescr. 99). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); Eala et env. (M. Laur. 1171, 1564).

Tricalysia petiolata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 202; II (1907) 75; Miss. Laurent (1906) 289 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 281.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. : Gill. 2756, 2840). — VIII : Équateurville [Wangata] (Ém. et M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Tricalysia Pynaertii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 287, 354 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 75, t. 13, 168.

1891 (F. Demeuse). — VIII : Équateur (Pyn. 263); Mondombe (Dem. 468); Eala (Pyn. 395). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.).

Tricalysia reticulata [*Benth.*] *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 121; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 162.

Randia — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 386.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Tricalysia roseoides *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 85 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 825].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 454, 923, 1349).

Tricalysia Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 168.

1907 (A. Sapin). — VI : Madibi (Sap.).

Tricalysia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 168.

1907 (F. Seret). — XII c : Gombari (Ser. 559).

Tricalysia Welwitschii *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1897) 449; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 288 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 169.

1903 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Pyn. 40). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.): entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.).

Obs. — Cette espèce paraît répandre dans les districts des Cataractes [IV] et du Stanley-Pool [V] (Ém. et M. Laur.).

CHOMELIA Jacq.

Chomelia apiculata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 205.
1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Chomelia Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1901) 29
[B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 29]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo,
I (1906) 207; II (1907) 78.

Tareana — *De Wild.* et *Th. Dur.* l. c. in obs.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et
Moy.-Cgo, I (1904) 207. in syn.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu et env. : entre Tumba et Kimpesse (Gill. 149, 3442).

Chomelia Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1904)
206; II (1907) 78, 157 et Miss. Laurent (1906) 281.

1903 (Marc. Laurent). — V : env. de Lemfu (But.). — VII : Ibali (Ém. et M.
Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 167, 1199). — IX : Bumba (Pyn.); Bom-
bimba (M. Laur. 1155).

Chomelia longifolia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904)
206, t. 37; II (1907) 157.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.); Madibi. — Noms vern. : **Tua-
tua**; **Mopukabuko** (Sap.).

Chomelia nigrescens [*Hook. f.*] *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 126.

Coptosperma — *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. II (1873) 87.

Tareana — *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 92.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu (Verd. 266).

PENTANISIA Harv.

Pentania variabilis *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842)
21; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 384; *De Wild.* et *Th. Dur.*
Contr. fl. Cgo, I (1899) 32; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 158.

P. Schweinfurthii *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 131; *Th. Dur.* et
Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 162.

1891 (G. Descamps). — XVI : bords du Moero (Verd.); env. de Lukafu. — Nom
vern. : **Sjinko** (Verd.); le Katanga (Corn.); Musima (Briart); le Lualaba (Desc.).

CREMASPORA Benth.

Cremaspora triflora [*Schumach.* et *Thonn.*] *K. Schum.* in *Engl.* et
Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 88 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr.
383; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 162; *De Wild.* Étud.
fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162; II (1907) 171.

Psychotria triflora Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 128.

Coffea hirsuta G. Don Gen. Syst. Bot. III (1834) 581.

Cremaspora africana Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 412; *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 126 et Cat. Welw. Pl. I, 471; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 291.

1870 (G. Schweinfurth). — V : en aval de Bolobo (Krek.). — IX : Lie (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Krek.); — XI : env. de Bena-Kamba (Dew.); Mogandjo (M. Laur.); Mompono (Brun.); Bomaneh (M. Laur.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

POLYSPHAERIA Hook. f.

Polysphaeria pedunculata K. Schum. ex De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 226.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Katisa**; **Tsinkoliba** (Verd. 191, 293).

AULAGOCALYX Hook. f.

Aulacocalyx jasminiflora Hook. f. in Hook. Icon. pl. (1873) t. 1126; *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 129; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 82; II (1907) 171.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — V : Lukolela (Pyn.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.).

— — var. *latifolia* De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, VI (1899) 27 [B. S. B. B. XXXVIII², 197] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 32.

1898 (Éd. Luja). — V : forêt de Sabuka (Luja).

PLECTRONIA L.

Plectronia acarophyta De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 173.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Mondjo (Pyn. 317).

Plectronia Arnoldiana De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 29 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 29]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 82; II (1907) 76.

1900 (J. Gillet). — V : kisantu (Gill. 595); rég. de Sauda (Odd.).

Plectronia Barteri [*Hiern*] De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 33.

Canthium — *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 143.

1895 (Ém. Laurent). — XV : à l'est de Lusambo (Ém. Laur.).

Electronia brevifolia [Engl.] Engl. ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 33 et Reliq. Dewevr. (1901) 122; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo (1906) 204.

Canthium — Engl. in Engl. Jahrb. VIII (1886) 67; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 162.

1893 (Ém. Laurent). — bois du Bas-Congo, AC (Ém. Laur.). — II : Boma (Dew. 117). — V : env. de Kisantu (Gill. 2005, 3274). — Noms veru. : plante : **Fi lulolo**; fruit : **Diuka** (Dew.).

Electronia congensis [Hiern] *Th.* et *Hél. Dur.*

Canthium — *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 141 et Cat. Welw. Pl. I, 477; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 162.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Electronia connata *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 31 [B. S. B. B. XXXVIII², 201] et Reliq. Dewevr. (1901) 122; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 204.

1896 (A. Dewèvre). — V : bassin de la Sele (But. in Gill. 1476). — VIII : Bolenge. — Nom veru. : **Boka-Napombo** (M. Laur. 147). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc. 681).

Electronia cornelioides *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 159.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Noms vern. : **Mukwakasa**; **Kapekille** (Verd. 32, 124).

Electronia Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 203 et Miss. Laurent (1906) 293.

1891 (F. Demeuse). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — V : distr. du Stanley-Pool (Dem. 217); env. de Léopoldville (Gill.); Kimuenza (Gill. 784). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Electronia Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 83 et Miss. Laurent (1906) 294.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill. 2884), — IX : Busa (Ém. et M. Laur.).

Electronia Gilletii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 293 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 77, t. 4.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kwamouth : Kisantu (Gill. 1894); Kimueza (Gill. 1722).

Electronia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 294, t. 98-99 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 174, (1908) 348.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Bokala (M. Laur. 637); env. de Lukolela (Pyn. 231); Tshumbiri (M. Laur. 638). — VIII : Eala (M. Laur. 1607); Irebu ; Bolenge (M. Laur. 1450). — IX : Bolombo; Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XI : Malema (Ém. et M. Laurent). — XIII a : Ronée (Kohl).

- Plectronia Lualabae** *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 76.
1882 (P. Poggé). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).
- Plectronia lucida** *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 33
et *Reliq. Dewevr.* (1901) 122.
1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 657).
- Plectronia Oddoni** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907)
76, t. 5.
1903 (Ad. Odden). — V : env. de Kisantu (Odd. in Gill. 3651).
- Plectronia psychotrioides** *K. Schum. ex De Wild.* *Étud. fl. Kat.*
(1903) 228.
1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 312, 338).
- Plectronia pulchra** *K. Schum. ex De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 229.
1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mufula** (Verd. 381).
- Plectronia Pynaertii** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907)
174.
1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 403).
- Plectronia tomentosa** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903)
83 et *Miss. Laurent* (1906) 296.
1902 (J. Gillet). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Léopold-
ville (Gill. 2644).
- Plectronia venosa** *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 85, t. 49 ;
K. Schum. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 286 ; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.*
(1903) 160.
Cauthium — *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 144.
1900 (Edg. Verdick). — VI : Lukafu (Verd. 569).

VANGUERIA Juss.

- Vangueria brachytricha** *K. Schum.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 227.
1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).
- Vangueria canthioides** *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 408 ; *Hiern*
in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 149 et *Cat. Welw. Pl. I*, 480 ; *De Wild.*
Contr. fl. Cgo, II (1900) 34 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 82.
1891 (F. Demeuse). — V : Léopoldville (Schlt.) ; Kimuenza (Gill. 1745). — IX :
Bangala (Dem.).

Vangueria Demeusei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 172, t. 41.

1891 (F. Demeuse). — V : Kimuenza (Gill. 1745). — VIII : Eala (M. Laur. 1164; Pyu. 575). — IX : Bangala (Dem. 326).

Vangueria Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 15 [B. S. B. B. XXXVIII², 92] et Reliq. Dewevr. (1901) 123; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 292.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.); Shinganga (Dew. 307).

Vangueria infausta *Burch.* Trav. South Afr. II (1829) 258; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 147 et Cat. Welw. Pl. I, 480; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 384; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 159 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1907) 159.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mabolela** ou **Malolela** (Verd.).

Vangueria katangensis *K. Schum.* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 227.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : le Katanga (Verd.).

Vangueria Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 292.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.).

Vangueria rubiginosa *K. Schum.* in *Engl.* Jahrb. XXIII (1897) 457 et XXVIII (1899) 72.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1061).

Vangueria tristis *K. Schum.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 227.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Pweto (Verd.).

Vangueria Verdickii *K. Schum.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 228.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kibusji** (Verd. 350).

FADOGIA Schweinf.

Fadogia ancylantha *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 155; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 117].

1896 (G. Descamps). — XVI : Kapanga [Tanganika] (Desc.).

Fadogia Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 204.

1900 (K. Butaye). — V : entre Dembo et le Kwaugo (But.).

Fadogia Cienkowskii *Schweinf.* Reliq. Kotschyanae (1868) 47 ; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 151 ; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. II [1898] 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120] ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1903) 77.

1895 (Gust. Debeerst). — V : entre Kisantu et le Kwango (But.) ; vallée de la Lumene (Hendr.). — XVI : Beaudoinville (Deb.).

Fadogia fuchsoides *Welw.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 85, t. 54 ; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 155 et Cat. Welw. Pl. I, 482 ; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 160.

1899 (Edg. Verdick). — VI : rives du Kwango entre Popokabaka et les chutes François-Joseph (Geut). — XVI : Lukafu (Verd.).

Fadogia lactiflora *Welw.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 156 et Cat. Welw. Pl. I, 483 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 78.

1904 (Alph. Cabra et Michel). — VI : euv. de Kimbele (Cabra-Michel, 45).

Fadogia tomentosa *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 78, (1908) 348.

1900 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.). — V : Léopoldville (Gill.) ; Dembo (Vauderst.).

Fadogia Verdickii *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1901) 15 [B. S. B. B. XL, 21].

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 60)

CUVIERA DC.

Cuviera angolensis *Welw.* ex *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 94 fig. 33 J ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 483 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 86 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 826] et Reliq. Dewevr. (1901) 124 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 296-299, t. 106, fig. 41 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 205 ; II (1907) 78, 173, (1908) 348.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.) ; Kisantu (Gill.). — VI : Kikwite (Lescr.). — VII : rive gauche du Congo en aval de Bolombo (M. Laur.). — VIII : Irebu (Pyn.) ; Eala [Ikakemo] (M. Laur.). — XI : Malema ; env. de Lie (Ém. et M. Laur.). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XIII a : chutes de la Tsbopo (M. Laur.). — Ind. non cl. : Lifingula (Ser.).

ANCYLANTHUS Desf.

Ancylanthus fulgidus *Welw.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 158 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 484 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 76.

1902 (R. Butaye). — VI : rég. du Kwango (But.).

CRATERISPERMUM Benth.

Craterispermum angustifolium *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 13 [B. S. B. B. XXXVIII², 89] et Reliq. Dewevr. (1901) 124.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Buginda [Lulanga] (Dew. 811).

Craterispermum brachynematum *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 161; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 30 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 30]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 292 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 76, 171, (1908) 348.

1899 (J. Gillet). — V : env. de Bolobo (Ém. Laur.); env. de Sanda (Odd.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (Flam.). — IX : Upoto (Welw.). — XII : Gombari au bord de la riv. Buedet (Ser.). — XV : Lac Foa (Leser.).

— — var. **breviflorum** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 172.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1445).

Craterispermum congolanum *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo. IV (1899) 13 [B. S. B. B. XXXVIII², 90] et Reliq. Dewevr. (1901) 125; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1904) 204; II (1907) 76, 171, (1908) 348 et Miss. Laurent. (1906) 293.

1891 (F. Demeuse). — V : env. de Kisantu (Gill. 2003); Sanda (Odd.); entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur. 1197; Pyn. 1765). — IX : Bangala (Dem.); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1566); Isangi (Ém. et M. Laur.); Malema (Ém. et M. Laur.). — XII c : Gombari (Ser. 506 b); Bomaneh (M. Laur. 1567). — XIII c : Wabundu [Ponthieville] (Dew. 1144 c). — XV : entre Luluabourg et Kanda-Kanda (Gent.).

Craterispermum Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 14 [B. S. B. B. XXXVIII², 88]; Reliq. Dewevr. (1901) 125 et Pl. Gilletianae, II (1901) 86 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 826].

1896 (A. Dewèvre). — IV : Gombi (Dew.). — V : Bolobo (Dew. 697); Kisantu (Gill. 1074).

Craterispermum laurinum *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 411; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 30 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 30].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Craterispermum reticulatum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 158.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kibubia** (Verd. 122).

IXORA L. (1)

***Ixora enosmia* K. Schum.** in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 355; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 345.

1901 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : en aval de Bumba (Ém. et M. Laur.)

***Ixora Laurentii* De Wild.** Miss. Laurent (1906) 345, l. 93 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 177.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. Laur. 508; Pyn. 202). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.).

***Ixora longipedunculata* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 177.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1451); en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.).

— — var. ***Dewevrei* De Wild.** l. c. II (1907) 178, t. 37.

1896 (A. Dewèvre) — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew. 1157).

***Ixora odorata* Hook. f.** in Bot. Mag. (1845) t. 4191; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 163; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120]; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 387; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1906) 45 et Reliq. Dewevr. (1901) 126; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 346 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 83; II (1907) 178.

1891 (F. Demeuse). — V : env. de Léopoldville (Gill) : Chenal (Ém. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Gill). — IX : Ile du Cougo en aval d'Upoto (Ém. Laur.) : entre Gorima et Inkaea (Dew.); Bogali (Thoun.) — XII b : Bambili : Surango (Ser.). — XII a : chutes de la Tshopo (Ém. Laur.). — XV : Ibaka (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Guéchon [? Gunshu?, Congo franç.].

***Ixora radiata* Hiern** in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 163; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 178.

1904 (Ém. et Marc. Laurent.). — IX : Lie (Ém. et M. Laur.).

— — var. ***latifolia* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 83; II (1907) 79, 178 et Miss. Laurent (1906) 346.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2662). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2924). — VIII : env. d'Eala (Ém. et M. Laur.); Souda et env. Vermeul. in Gill. 3431; Odd. in Gill. 3008; Moupono [Maringa] (Brun. 43). — IX : env. de Bumba (Sér. 20). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1452). — XV : Lac Foa (Leser. 217).

(1) *Ixora coccinea* L. [*Hook f.* Fl. Brit. Ind. III, 145] espèce de l'Asie tropicale, est introduit à Matadi [III] et à Eala [VIII] (M. Laur.). [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 177].

Ixora Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 178.

1905 (F. Seret). — XII : case Koko [riv. gauche de l'Uele] (Ser. 381).

Ixora Soyauxii *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 163; *Th. Dur.* et *De Wild.*

Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. XXXVII, 120] et Reliq. Dewevr. (1901) 126; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 208; II (1907) 79, 179.

1888 (Fr. Hens). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens) : env. de Léopoldville (Gill.); Lukolela (Dew. : Pyn.). — VIII : Eala (M. Laur.) : bassin de la Maringa (Brun.).

PAVETTA L.

Pavetta Baconia *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 176; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 163; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 487; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 346 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. II (1907) 176.

Randia corymbosa DC. in Annal. Mus. Paris, IX (1807) 220.

Verulania — DC. in *Lam.* Encycl. meth. Bot. VIII (1808) 543.

Ixora nitida *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 77.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — II a : Zeuze (Ém. Laur.). — VIII : Équateur (Pyn.); Eala (M. Laur.). — XII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

— — var. **congolana** *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 126.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : rives de la Lamaba à Kasongo. — Nom vern. : **Kasilu** (Dew. 1000).

— — form. **puberulosa** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 346.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : la Lukula; Kalamu (Ém. et M. Laur.).

Pavetta canescens DC. Prodr. IV (1830) 492; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 178.

P. tomentosa A. Rich. [non *Roxb.*] in Mém. Soc. hist. nat. Paris, V (1834) 181.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech.-Loesche).

Pavetta crassipes K. *Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 389; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 229.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mobala** (Verd. 334).

Pavetta flammea K. *Schum.* in *Engl.* Jahrb. XXVIII (1899) 83.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1107).

Pavetta Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 176, t. 39.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1447).

Pavetta Lescrauwaetii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 79, t. 12.

1904 (Éd. Lescrauwaet). — XV : Muungu (Lescr. 247).

Pavetta longituba *K. Schum.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 207.

1899 (Cél. Hecq.). — XVI : zone du Tanganika (Hecq.).

Pavetta Warburgiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 127.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : près de Kisanga (Dew. 1080).

COFFEA L.

Coffea arabica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 172; Bot. Mag. (1810) 1303; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 180; *Bentl.* et *Trim.* Medic. Pl. II, t. 144; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 163; *Frochner* in Engl. Jahrb. XXV (1898) 26; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120] et Reliq. Dewevr. (1901) 127; *De Wild.* Les Caféiers (1901) 35.

1896 (A. Dewèvre et Ém. Laurent). — V : Ile entre Lukolela et Gombi (Dew.). — VIII : Équateur (Dew.). — X : distr. de l'Ubangi (Ém. Laur.). — " Caféier cultivé à la Lemba [II a] (Dew.); dans le Bas-Congo " (Ém. Laur.) et à Coquilhatville [VIII] (Ém. Laur.).

Coffea Arnoldiana *De Wild.* in Compte-rendu Congr. intern. bot. Paris (1900) 236 [Not. sur qlq. esp. de Coffea, 16] et Miss. Laurent (1906) 325, t. 74.

1904 (Ém. et Marc. Laur.). — XI : distr. de l'Aruwimi (Coll.?) — Caféier cultivé à Eala [VIII] (Ém. et M. Laur.).

Coffea aruwimiensis *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 321, t. 66 et fig. 51.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — X : Monga (Ém. et M. Laur.). — XI : distr. de l'Aruwimi (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Wanie-Rnkula (Ém. et M. Laur.). — Caféier cultivé à Siranga [X] et à Basoko [XI].

Coffea canephora *Pierre* ex *Frochner* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1897) 230, 237 et in Engl. Jahrb. XXV (1898) 269; *Lecomte* Le Café, 32, fig. 6; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75

[B. S. B. B. XXXVII, 120]; *De Wild.* Les Caféiers, I (1901) 37 et Miss. Laurent (1906) 329.

1895 (Ém. Laurent). — Ind. non cl. : le Lomami (Coll. *b.* — Cultivé à Lusambo [XV] (Ém. Laur.).

C. canephora var. **crassifolia** *Ém. Laurent ex De Wild.* Miss. Laurent (1906) 333, t. 76.

1903 (Ém. et Marc. Laurent) — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

— — var. **kouilouensis** *Pierre* in *De Wild.* Les Caféiers (1901) 21 et Miss. Laurent (1906) 334, t. 101.

1903 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — Cultivé à Luvituku [IV] (Ém. Laur.).

— — var. **sankuruensis** *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 330-333, t. 77, fig. 52-53.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Ibaka (Ém. Laur.). — Caféier cultivé à Lusambo [XV], à Dibebe [XV], à Idanga [XV], à Bombaie [XV] (Ém. Laur.) et à Ikongo [VII] (Ém. Laur.).

— — var. **Wildemanii** *Pierre ex De Wild.* Les Caféiers (1901) 25.

1906 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 976 a).

Coffea congensis *Froehner* in Notizbl. bot. Gart. Berlin (1897) 230 et in Engl. Jahrb. XXV (1898) 265; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120]; *Lecomte* Le Café, 27; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 335.

1896 (Ém. Laurent). — VIII : Ile en face de Coquilhatville (Ém. Laur.). — XIII c : Ile du Lualaba; Cougo près de Wabuudu [Ponthierville] (Ém. Laur.). — Cult. aux Stanley-Falls [XIII a] (Ém. Laur.).

— — var. **Chalottii** *Pierre* in *De Wild.* Les Caféiers (1901) 17 et Miss. Laurent (1906) 335, t. 71-72, fig. 54.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 737). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kinshassa, cult. (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur (L. Pyn.). — IX : Ukaturaka; Ile en aval de Bumba (Ém. et M. Laur.). — IX a : Bili [Mougo] (Kembrouck). — Cult. à Wangala [VIII] (Ém. et M. Laur.) et à Imese dans une Ile de l'Ubangi [X] (Ém. et M. Laur.).

— — var. **Froehneri** *Pierre ex De Wild.* Les Caféiers (1901) 15.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 736).

— — var. **subsessilis** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 337-338, t. 73.

1896 (Ém. Laurent). — XIII a : cult. aux Stanley-Falls, comme provenant de l'Ubangi, mais paraît indigène (Ém. Laur.). — XIII c : Ile du Lualaba près de Wabuudu [Ponthierville] (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Batekolela (Ém. et M. Laur.).

Coffea Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. Il. Cgo*, VI (1900) 32 [B. S. B. XXXVIII², 202] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 128; *De Wild. Les Caféiers* (1901) 38.

1896 (A. Dewèvre). — Ind. non cl. : Bena-Lecula (Dew. 1149).

Coffea divaricata *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1897) 461; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 33 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 126; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 345.

1891 (F. Demeuse). — VIII : Bokakata (Dew.). — IX : Upoto; Lisala (Ém. Laur.); pays des Bangala (Dem.).

Coffea jasminoides *Welw.* ex *Hiern* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I* (1876) 175; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 185; *Th. Dur. et Schinz. Étud. Il. Cgo* (1896) 164; *Froehner* in *Engl. Jahrb.* XXV (1898) 257; *Lecomte Le Cafè*, 15; *De Wild. Les Caféiers* (1901) 39; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 490.

1882 (P. Pogge). — VI : Gauga près Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — XV : Mukenge (Pg.).

— — var. **Trilesiana** *Pierre* ex *De Wild. Les Caféiers* (1901) 29 et *Étud. Il. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 81.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2849).

Coffea Laurentii *De Wild.* in *Act. Congr. intern. bot. Paris* (1900) 234 [Not. sur qlq. esp. de *Coffea*, 14]; *Les Caféiers* (1901) 28, 39 et *Miss. Laurent* (1896) 328.

1905 (Ém. Laurent). — XV : Café du Sankuru cultivé à Lusambo (Ém. Laur.); Bombaie (Gent.). — Cult. à Kasongo [XIII d] (Dew. 887).

Coffea liberica *Bull.* ex *Hiern* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I* (1876) 171, t. 24 et in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 181; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 4 (1891) 103, fig. 31; *Froehner* in *Engl. Jahrb.* XXV (1898) 269; *Lecomte Le Cafè*, 35; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 489; *De Wild. Les Caféiers*, I (1901) 18, 39 et *Miss. Laurent* (1906) 338, t. 104.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Nioki [la Fini] (Ém. et M. Laur.). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.); Malema (Ém. et M. Laur.).

Espèce cultivée à Lukolela et Leopoldville [V] (Conf. *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 339).

Coffea robusta *L. Linden* *Cat. pl. nouv. de l'Hortic. colon.* (1901) 11, 65, c. xyl.; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 328-329 in obs.

1900 (Ém. Duchesne et Ed. Luján). — Congo (Duch. et Luján).

Coffea Royauxii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 326-328, t. 78.

1891 (Royaux). — X : Bauzyville [Ubangi] (Royaux).

• Caféier importé de Bili [VII] et que l'on rencontre aussi en petite quantité dans la région ». [*De Wild.* Miss. Laurent (1906) 327].

Coffea spathicalyx *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1897) 464 ; *Froehner* in Engl. Jahrb. XXV (1898) 266 et in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1899) 232 ; *De Wild.* Les Caféciers I (1901) 41 et Miss. Laurent (1906) 344.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2693).

***Coffea stenophylla** *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 587 ; *Hiern* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1876) 172 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 182 ; Bot. Mag. (1896) t. 7475 ; *De Wild.* Les Caféciers, I (1901) 41 et Miss. Laurent (1906) 340, t. 62-64.

1905 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : cultivé à Eala (Ém. et M. Laur.).

• Cette espèce ne paraît pas exister à l'état indigène au Congo ».

Coffea subcordata *Hiern* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1876) 174 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 184 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 128 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 345.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.).

RUTIDEA DC.

Rutidea Dupuisii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 174.

R. rufipilis *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Hiern*] Contr. fl. Cgo, II (1900) 34.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — VIII : Injolo (M. Laur. 1439)

Rutidea hispida *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 189 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 31 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 31] ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84 ; II (1907) 80, 176 et Miss. Laurent (1906) 346.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.) ; entre Dembo et le Kwaungo (But.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur. ; Pyn.). — XI : Limbutu (M. Laur.).

Rutidea leucotricha *K. Schum.* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 346.

1903 (Ém. Laurent). — IV : Luvituku (Ém. Laur.).

Rutidea olenotricha *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 189 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 164.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

Rutidea Schlechteri *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Expéd. (1900) 320 [nom. inl.].

1899 (R. Schlechter). — VIII : Irebu (Schl. 12632).

Rutidea Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 175.

1906 (F. Seret). — XII c : euv. de Gombari (Ser. 559).

Rutidea Smithii *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 189; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 164; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 129; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 80.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Dew.); Congo (Dew. 168?). — V : Kisantu (Gill. 149, 3377). — VI : Madibi (Lescr. 197).

MORINDA L.

Morinda citrifolia *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 476; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III. 189; *K. Schum.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 394; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 161 [err. cal. *Morelia*]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 492; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 34 et Reliq. Dewevr. (1901) 129; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1906) 133-135 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 189, (1908) 349.

M. geminata *DC.* Prodr. IV (1830) 447.

M. quadrangularis *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 545.

M. lucida *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 406.

M. citrifolia *L.* var. — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 402.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu. — Nom vern. : **Siki** (Dew.). — V : Lukolela (Em. et M. Laur.); Kisantu ; Kimueoza (Gill.). — VI : Eiolo (Em. et M. Laur.); Madibi (Sap.). — VIII : Equateurville [Waugata] (Dew.); Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Pyn.); zone Malo (Brun.). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : Yauongo (Em. et M. Laur.); Romée (M. Laur.). — XV : Munungu ; Lusambo (Em. et M. Laur.); le Sankuru (Sap.); Baulaka-Kole (M. Laur.). — Ind. non cl. : le Lomami (Dew.); Yانبумби (Em. et M. Laur.). — Noms vern. : **Keaborina**; **Bokakate** [Kwilu] (Sap.); **Nlingu**; **Tchungu** [Sankuru] (Sap.).

Morinda longiflora *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 545; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 192; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165 [err. cal. *Morelia*]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120] et Reliq. Dewevr. (1901) 129; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 492; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 209; II (1907) 81, 190, (1908) 349 et Miss. Laurent (1906) 353.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Lescr.); route de Kikwite à Boala (Lescr.). — VIII : Equ-

teurville [Wangata] (Dew.); Eala et env. (M. Laur.); Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : U'poto (Ém. Laur.); env. de Bumba (Dew.); Umangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur.; Pyn.). — XII d : pays des Mangbetu (Schw.). — XIII d : Nyangwe (Dew.). — XV : Munungu (Sap.). — Noms vern. : **Lebwa** [Ikwangula]; **Kiue** [Kasongo] (Dew.). — Ind. non cl. : Lomami; Bas-Lualaba (Ém. Laur.).

GRUMILEA Gaertn.

Grumilea moninensis *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 496; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 229.

1899 (Edg. Verdecq.). — XVI : Lukafu (Verd. 311).

Grumilea psychotrioides *DC.* Prodr. IV (1830) 495; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 216; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 129.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Kamba (Dew.).

Grumilea venosa *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 217; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 130.

1895 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Dew. 482). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : **Dijito** (Dew. 800).

PSYCHOTRIA L.

Psychotria acamptopoda *K. Schum.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84; II (1907) 80.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2832, 2858; Gent.).

Psychotria Ansellii *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 214; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 24 et Reliq. Dewevr. (1901) 129; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 81.

Chasalia laxiflora *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 416.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Zenze (Ém. Laur.); Shinganga (Dew.). — V : Kisantu; Kimuenza; Dembo (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

Psychotria Bieleri *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 179, t. 64 [sphalm. l. 64 in text.].

1904 (S. Bieler). — VIII : Haut-Lopori (Biel.).

Psychotria brachyantha *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 196; *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kausch.-Exped. (1900) 321.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12566).

Psychotria brunnea Schweinf. ex Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 201; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : vallee du Kibali [Mangbettu] (Schw.).

Psychotria Butayei De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) I, 64.

1902 (R. Butaye). — V : env. de Kisantu (But.).

Psychotria Cabrae De Wild. Miss. Laurent (1906) 349.

1897 (Alph. Cabra) — Bas-Congo (Cabra, 117). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel); la Lukula (Em. et M. Laur.). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill. 596, 1121, 1163, 1352) — VII : Kutu (Em. et Laur.).

Psychotria cinerea De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 181, t. 13.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : forêt des env. d'Elungu [rég. de Nyangwe] (Dew. 1063).

Psychotria cristata Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 203; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 181.

Myrsiphyllum — *Hiern*. Cat. Welw. Pl. I (1898) 493.

1870 (G. Schweinfurth). — IX : Bangala (Dem. 305); Nouvelle-Anvers (Pyn. 2). — XII : Munza [Mangbettu] (Schw.).

Psychotria cyanopharynx K. Schum. in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 90.

1881? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 982).

Psychotria Dewevrei De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 208.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kasongo. — Nom vern. : **Kan** (Dew. 911). — Nom vern. : **Wangale** [Tanganika] Dew.

Psychotria djumaensis De Wild. Miss. Laurent (1906) 349.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2791).

Psychotria ealaensis De Wild. Miss. Laurent (1906) 348, t. 94 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 182.

1903 (Marc. Laurent). — V : Kisantu et env. (Gill. 362, 1071, 3246). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 224, 1105; Mondjo (Pyn. 312).

Psychotria Gilletii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 208; II (1907) 80, 182.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 251, 487, 889); entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Mayidis (Odd. in Gill. 1881); Sanda (Odd. in Gill. 3710). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 281); Eala (M. Laur. 1610; Pyn. 545, 599).

Psychotria gracilescens *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 182, t. 42.

1904 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1581).

Psychotria lamata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 183, t. 45.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Mobanga [rég. de Coquilhatville] (Dew. 760 b).

Psychotria Kimuenzae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 184.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu et env. (Gill. 664, 1154, 2355: Odd.); Kimuenza (Gill. 2199); Mayidis (Gill.).

Psychotria kisantuensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 185, t. 58.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 115).

Psychotria Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 307, t. 95.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2566); Tshumbiri (M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew. 690); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Psychotria longevaginalis *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 204; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : la Kapili [pays des Mangubetu] (Schw.).

Psychotria mogandjoensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 185, t. 46.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 982); Limbutu (M. Laur. 1442).

Psychotria nigropunctata *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 207; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 350 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 80, 186.

Myrsiphyllum — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 493.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Kitobola; Gongolo (Pyn.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Lemfu (But.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

Psychotria obovatifolia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 186, t. 49.

1900 (Marc. Laurent). — XI : Yambuya (M. Laur. 1563)

Psychotria Oddoni *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 187, t. 44.

1903 (Ad. Oddon). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3001, 3746).

Psychotria Poggei *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 97.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1039, 1095, 1251).

Psychotria potamophila *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 97.

1881 (P. Pogge) — XV : Mukenge (Pg. 1049).

Psychotria pygmaeodendron *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 98.

1876 (P. Pogge). — XV : entre Kimbundo et Ie Kwango (Pg. 534).

Psychotria stigmatophylla *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 100.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1078).

Psychotria Vogeliana *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 210; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 210; *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.

1881 (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

Psychotria Wildemaniana *Th. Dur.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 349 [nom. nov.].

P. djumaensis *De Wild.* l. c. II (1907) 182 [non Miss. Laurent].

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill. in Gill. 2738, 2762, 2768).

GEOPHILA D. Don.

Geophila Aschersoniana *Buettl.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 74; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 166.

1885 (R. Buettner). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buettl.)

Geophila hirsuta *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 422; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 221; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 188, (1908) 349.

1905 (Éd. Lescreauwaet). — VI : Madibi (Sap.). — XII a : entre Buta et Bima (Ser. 77). — XII b et c : entre Bambili et Amalis (Ser. 200). — XV : Batempa (Lescr.). — Noms vern. : **Malari** [Kwilu]; **Eaki** [Bangala] (Sap.).

— — var. **brevifolia** *De Wild.* l. c. II (1907) 189.

1905 (Albéric Bruneel). — VIII : Betutu sur la Loporé (Brun. 8).

— — var. **hirsutissima** *De Wild.* l. c. II (1907) 188, (1908) 349.

1902 (J. Gillet). — V : rég. de la Lumene (Hendr.). — VIII : env. de Léopoldville (Gill. 3080); Iajolo (Huyghe et Ledoux).

G. hirsuta var. **stricta** *De Wild.* l. c. II (1907) 188.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1578).

Geophila involucrata *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 222; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 166; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 34 et Reliq. Dewevr. (1901) 136; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84; II (1907) 189, (1908) 349 et Miss. Laurent (1906) 352.

1870 (G. Schweinfurth). — Cogo (Gill.). — Bas-Congo (Cabra). — IV : Luozi (Luja). — V : Kimuenza (Dew. 518); Dembo (Vanderyst). — XI d : Munza; riv. Mbruole (Schw.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.).

Geophila obvallata [*Schumach.* et *Thonn.*] *F. Didr.* in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 186; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 222; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 45; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 349.

Psychotria — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 111.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonu.). — XI : euv. de Yambuya (Solh.).

Geophila renaris *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 29; II (1900) 34; Pl. Thonnerianae (1900) 45, t. 2 et Pl. Gilletianae, I (1900) 31 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 31]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84, (1904) 209; II (1907) 81, 189 et Miss. Laurent (1906) 352.

1888 (F. Demense). — V : Kisantu (Gill.); Lula-Lumene (Hendr.); Sanda (Odd.). — VII : Inongo; Kiri (Ém. et M. Laur.); Ikata (Dem.). — VIII : Eala (M. Laur. 1213). — IX a : Gali (Thoun.). — XV : forêts du Sankuru (Ém. et M. Laur.); Bukila (Ém. et M. Laur.).

Geophila reniformis *D. Don* Prodr. fl. Nepal. (1825) 136; *Wight.* Icon. pl. Ind. or. I, t. 54; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. III, 178; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 220; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 31 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 31].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

TRICHOSTACHYS Hook. f.

Trichostachys Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 351.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.).

Trichostachys microcarpa *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 88; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 351 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 80, t. 14.

1881 (P. Pogge). — Cogo (Dem.). — V : env. de Kimuenza (Gill.) et de Sanda (Odd.); Tumba (Dem.). — XV : Mukenge (Pg. 1257).

URAGOGA L.

Uragoga ceratoloba *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 105.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukeuge (Pg. 1160).

Uragoga peduncularis [*Salisb.*] *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV. 4 (1891) 120; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120]; *Hiern* Cat. Weiw. Pl. I, 498; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 130; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 229; Miss. Laurent (1906) 353 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, II (1907) 81, 189.

Cephaelis — *Salisb.* Parad. Lond. (1808) t. 99; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 223.

1892 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — IV : env. de Gombi (Dew.). — V : Lukolela (Pyn.). — VI : Eïolo (Em. et M. Laur.). — VIII : Bikoro (Pyn.). — IX : Yaminga (Pyn.); Bolombo (Em. et M. Laur.). — XV : Ibauga; bords du Saukuru (Em. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Uragoga Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 46, t. 9.

1896 (Fr. Thouner). — IX : Bobi (Thonn.).

CEPHAELIS Sw.

Cephaelis congensis *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 226; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 166.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

LASIANTHUS Jack.

Lasianthus tortistilus *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 108; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 859.

1882 (P. Pogge). — XV : rég. de Mukeuge (Pg.).

OTIOPHORA Zucc.

Otiophora pulchella *K. Schum.* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 230.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga. — Nom vern. : **Kampumboi** (Verd. 320).

DIODIA L.

Diodia maritima Thonn. in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 75; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 231; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 166.

D. foliosa Wacra et Peyr. Sert. Benguel. (1860) 39.

1885 (R. Buettner). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buett. 474). — Ind. non cl. : Kibaka (Buett. 575).

Diodia scandens Sw. Prodr. fl. Ind. occ. (1788) 30; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 501.

D. breviseta Benth. in *Hook. Niger Fl.* (1849) 424; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 231; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 166; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 34; *Pl. Thonnerianae* (1900) 47 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 130; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 353 et *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1904) 85; II (1907) 81, 190.

Spermacoe serrulata P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 39, t. 23.

Diodia — *K. Schum. ex De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 47.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Kwamouth (Pyn.); Bolobo (Dew.); euv. de Lemfu (But.); Kimuenza; Kisantu (Gill.). — VI : Kongo [Kwilu] (Sap.). — VIII : Haut-Lopori (Biel.). — IX : Baugala (Dew.). — IX a : Boyangi (Thoun.).

BORRERIA G. F. W. Mey.

Borreria dibrachiata [Oliv.] K. Schum. in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 4 (1891) 141.

Spermacoe — *Oliv. in Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 87, t. 52 et *Fl. trop. Afr.* III, 239; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 35.

Tardavel — *Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1898) 507.

1891 (G. Descamps). — XVI : bords du Luwenbe [affl. du Lubilash] (Desc.).

Borreria hebecarpa A. Rich. Tent. fl. Abyss. I (1847) 347.

Spermacoe — *Oliv. [non DC.] in Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 89; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 236; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 167.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens).

Obs. — Peut-être faut-il rapporter à cette espèce le *B. neglecta* A. Rich. indiqué en 1885 par Buettner à Léopoldville [Conf. *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 167].

Borreria ocimoides [Burm.] DC. Prodr. IV (1830) 544.

Spermacoe — *Burm. Fl. Indica* (1768) 34, t. 13, fig. 1; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* III, 200; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII 121] et *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 35.

S. ramisperma Pohl ex DC. l. c. IV (1830) 544; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 238; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 167.

Borreria — DC. Prodr. IV (1830) 544.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Gombi (Hens).

Borreria scabra [Schumach. et Thonn.] *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 394.

Diodia — Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 76.

Tardavel — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 504.

Spermacoce *Ruelliae* DC. Prodr. IV (1830) 554; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 238; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 167.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Johnst.). — IV : Gombi-Lutete (Heus).

Borreria senensis [Klotzsch] *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 394; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 31 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 31].

Diodia — Klotzsch in *Peters* Reise u. Mossamb. I (1862) 289.

Spermacoce — *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 236; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121].

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.).

Borreria stricta [*L. f.*] DC. Prodr. IV (1830) 561; *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 143 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 394; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 30; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 354 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 85; II (1907) 81.

Spermacoce — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 120; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 236; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121] et Reliq. Dewevr. (1901) 130; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 190.

Tardavel — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 503.

1888 (Fr. Heus). — Congo (Dem.); Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Lutete (Heus). — V : entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Borreria tetraodon *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 322 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12499).

MITRACARPUM Zucc.

Mitracarpum scabrum Zucc. in *Schult.* Mant. pl. III (1827) 210; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 243; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 168; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 96 [B. S. B. B. XXXVII, 121]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 131; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 209; II (1907) 190.

Stanospermum verticillatum Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 73.

Mitracarpum — Vathe in Linnaea, XL (1876) 196.

M. seuegalense DC. Prodr. IV (1830) 572.

1816 (Chr. Smith).— Bas-Congo (Sm.).— II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Buett.); Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Yaba** (Sap). — XV : Bolungula (Em. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Kimbumbi (Dew.); Ile de Zobaka (Dew.). — Noms vern. : **Tomba-Tomba** [Bakusu]; **Tuyaie** [Tanganika] (Dew.).

GALIUM L.

Galium stenophyllum Bak. in Kew Bull. (1895) 58; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

— — var. *longifolium* *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 26.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

DIPSACEAE

CEPHALARIA Schrad.

Cephalaria attenuata [*L. f.*] Roem. et Schult. Syst. veget. III (1818) 44; DC. Prodr. IV, 649; *Sond.* in *Harr.* et *Sond.* Fl. Capens. III, 42.

Scabiosa — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 118.

Le type existe dans l'Afrique australe.

— — var. *longifolia* *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 164.

C. attenuata Roem. et Schult. var. b. *Sond.* in *Harr.* et *Sond.* Fl. Capens. III (1864) 42.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 577).

SCABIOSA L.

Scabiosa Columbaria L. Sp. pl. ed. I (1753) 99; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I, 368; *Rehb.* Pl. crit. IV, t. 534-535; *Hiern* in *Olv.* Fl. trop. Afr. III, 252 et *Cat. Welw.* Pl. I, 512; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 164.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : le Katanga (Verd.).

COMPOSITACEAE

SPARGANOPHORUS Gaertn.

Sparganophorus Vaillantii Gaertn. De fruct. et semin. II (1791) 396, t. 165; *DC. Prodr.* V, 12; *Oliv. et Hiern Fl. trop. Afr.* III, 262; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 168; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 131; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 205 et *Miss. Laurent* (1905) 189.

Struthium africanum P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 81, t. 48.

1816 (Chr. Smith). — Bas Congo (Sm.). — II a : Shinganga (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Ukaturaka; Lie (Em. et M. Laur.). — XII a : route de Bima à Bambili (Ser.). — XV : Ibaka (Em. Laur.).

HOEHNELIA Schweinf.

Hoehnelia vernonioides Schweinf. in *Hoehn.* Zum Rudolph See, App. (1892) 106; *O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 402; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 131; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 211.

1895 (A. Dewèvre). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2565); euv. de Yumbi (Pyn. 305). — VIII : Équateurville (Dew. 535 a).

ETHULIA L. (1)

Ethulia conyzoides L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1171; Bot. Reg. (1823) t. 695; *Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 262; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* III, 227; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 169; *O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 402; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 513; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 131; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 189 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 205.

E. gracilis DC. in *Delile. Voy. à Meroë* (1827) t. 64; *DC. Prodr.* V, 12.

1882 (H Johnston). — Congo (Johnst.). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — II a : Pasokonde (Dew.). — V : Goma; Bolobo (Heus); Kisantu (Gill.); Lukolela (Pyn.); le Stanley-Pool (Heus). — VII : la Fini (Em. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Heus); Nouvelle-Anvers (Em. Duch.); Bolombo (Em. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Em. Laur.); Lusambo (Jos. Duch.). — XVI : euv. d'Albertville [Toa] (Hecq.).

(1) M. F. Demeuse a trouvé le *Centratherum grande* [DC.] *Th. Dur. et Schinz* [Étud. fl. Cgo (1896) 169] sur les rives de l'Ambriz, mais cette localité doit être dans l'Angola.

BOTHRIOCLINE Oliv.

Bothriocline longipes *N.E.Br.* in *Kew Bull.* (1894) 389; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 169.

B. Schimperii Oliv. et *Hiern* var. — Oliv. et *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 266; *O. Hoffm.* in *Engl. Pf. Ost-Afr.* 402; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 131; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 208.

1870 (G. Schweinfurth). — XII c : env. d'Amadis (Ser.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII d : env. de Piani-Gongo (Dew. 1056). — Nom vern. : Kaluma [Tanganika] (Dew.).

Bothriocline misera [Oliv. et *Hiern*] *O. Hoffm.* in *Bolet. Soc. Bot.* XIII (1896) 41; *Schlecht.* Westaf. Kautsch.-Exped. (1900) 323.

Vernonia — Oliv. et *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 278; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 171.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Buett.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.).

VERNONIA Schreb.

Vernonia acrocephala *Klatt* in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, VII (1892) 100; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 30; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 325.

1891 (G. Descamps). — XII : Kansomme (Lescr.). — XV : Samba [Bashilange] (Desc.).

Vernonia amygdalina *Delile* *Cent. pl. Méroë* (1826) 41; *Oliv.* et *Hiern* Fl. trop. Afr. III, 284; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 32 [B. S. B. B. XXXVI², 78].

Decaneurum — *DC.* *Prodr.* V (1836) 68.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : C. au bord du Tanganika (Deb.).

Vernonia armerioides *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 462.

1876 (P. Pogge). — XV : pays de Muata-Jamvo, vers 10 1/2° (Pg. 182).

— — var. *tomentosa* *O. Hoffm.* l. c. (1897) 462.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1273).

Vernonia auriculifera *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I (1898) 539.

Le type croît dans l'Angola.

— — var. *auriculis deficientibus* *O. Hoffm.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 325.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1286).

Vernonia Burtoni *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 281; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 170.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.).

Vernonia Calvoana *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 199; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 293; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 206.

1905 (F. Seret). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser. 187).

Vernonia cinerea [L.] *Less.* in *Linnaea* (1829) 291 et (1831) 673; *DC. Prodr.* V, 24; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 275; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 170; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 405; *Hiern* *Cat. Welw.* Pl. I, 521; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 132; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 189 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 325.

Conyza — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 862.

Chrysocoma violacea *Schumacher et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 384.

1888 (Fr. Heus). — I : Moanda (Vauderyst). — II : Boma (Schimp.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Heus). — V : Dolo (Schlt.); Tumba (Em. et M. Laur.). — XIII d : Kasongo (Dew.).

Vernonia conferta *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 42; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III. 294; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 170; *Hiern* *Cat. Welw.* Pl. I, 537; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 132; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 211, (1906) 325; II (1907) 206.

V. arborea *Welw. ex O. Hoffm.* in *Bolet. Soc. Brot.* X (1893) 172.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.); Benza-Masola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VII : Isaka (Ém. et M. Laur.). — VIII : Basaukusu (Dew.); env. d'Eala (Pyn.; M. Laur.). — XIII a : Romée (Ém. Laur.). — XV : le Sankuru (Em. Laur.).

— — var. **Sereti** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 206.

1905 (F. Seret). — IX : env. de Bumba (Ser. 4).

Vernonia clinopodioides *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 465.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua, vers 9 1/2° (Pg. 234).

Vernonia cruda *Klatt* ex *Schinz* in *B. Herb. Boiss.* IV (1896) 456; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 206.

1891 (G. Descamps). — V : Kisantu (Gill. 1100); Boko-Sainte-Barbe (Vauderyst, B, 108). — XIII d : Lubunda [rég. de Nyangwe] (Desc. 28).

Vernonia Dupuisii Klatt in *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 171 et in B. Herb. Boiss. IV (1896) 825; *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79].

1893 (P. Dupuis). — II : env. de Boma (Dew. 15); Sisia (Dup.). — II a : Bingila (Dup. 39).

Vernonia gerberiformis Oliv. et Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 285; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 164 et *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 325.

1900 (Edg. Verdicq). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. : Gill. 3284). — XVI : plateau du Katanga (Verd.).

Vernonia glaberrima Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* XIII (1896) 15; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 537; *De Wild. Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1904) 210; II (1907) 206 et *Miss. Laurent* (1906) 190.

1890 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Pyn. 136); Dolo (Schlt.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Sanda (De Brouw. in Gill. 3031).

Vernonia grandis Boj. ex DC. *Prodr.* V (1836) 68, in syn.; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 30.

1891 (Hyac. Vauderyst). — I : Moanda (Vauderyst).

Vernonia Grantii Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 92; *Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 291; O. Hoffm. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 493; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 210.

1895 (G. Descamps). — Bas-Congo (Cabra et Michel). — XVI : Toa (Desc.).

Vernonia hamata Klatt ex Schinz in B. Herb. Boiss. IV (1896) 456.

1891 (G. Descamps). — XV : vallée de la Luile (Desc. 32).

Vernonia Hensii Klatt ex Schinz in B. Herb. Boiss. IV (1896) 828.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 24).

Vernonia iufundibularis Oliv. et Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 285; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79].

1891 (G. Descamps). — XV : Lusambo (Desc.).

Vernonia jugalis Oliv. et Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 270; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 171; O. Hoffm. in *Engl. Pfl.*

Vernonia Fischeri O. Hoffm. in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 221.

Obs. — P. Pogge a récolté cette espèce, en 1876, dans le pays de Muata-Yamvo (n. 269). Nous ne savons pas si c'est dans le Congo belge.

Ost-Afr. 404; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 516; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 32 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 32] et Reliq. Deweyr. (1901) 132.

1870 (G. Schweinfurth. — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Basankusu (Dew.). — XIII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Noms veru. : **Ikonga** [Basankusu]; **Momboka** [Kasongo]; **Katalumba** [Tanganika] (Dew.).

Vernonia jugalis var. **Dekindtii** [*O. Hoffm.*] *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 516; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 190 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, II (1907) 207.

V. Dekindtii *O. Hoffm.* in Bolet. Soc. Brot. XIII (1896) 18.

1903 (Ém. Laurent). — VI : entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel); Malibi (Sap.). — VIII : Eala et env. (Pyn. 311; M. Laur. 687, 1512). — XV : Lubefu (Lescr. 375); Kondue (Ém. et M. Laur.). — Noms veru. : **Moleama** [Kwilu]; **Pinkekokwa**; **Pingerokwa** [Bangala].

Vernonia katangensis *O. Hoffm.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) p. IX.

1901 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu (Verd. 74).

Vernonia lasiolepis *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1898) 464; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 210; II (1907) 207 et Miss. Laurent (1905) 190.

1876 (P. Pogge). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); rég. de la Lula-Lumene (Hendr.); Kiunenza; Kisantu (Gill.). — XV : Musumba (Pg. 192, 196, 273, 276); Mukenge (Pg. 787, 1269, 1312, 1317).

Vernonia Melleri *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 282; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 35.

1891 (G. Descamps). — XV : vallée du Lubudi (Desc.). — XVI : Toa (Desc.).

Vernonia Napus *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 463.

Le type croît dans l'Angola.

— — form. **angustifolia** *O. Hoffm.* l. c. 463.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1276).

— — form. **latifolia** *O. Hoffm.* l. c. 463.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1275).

Vernonia natalensis *Schultz-Bip.* ex *Walp.* Repert. bot. II (1843) 947; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 277; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. III, 51; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-

Afr. 405; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 522; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 171; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 35 et Reliq. Deweyr. (1904) 432; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 190 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 325; II (1907) 207.

Webbia aristata DC., Prodr. V (1836) 73.

Vernonia — *Schultz-Bip.* (non *Less.*) in Flora (1814) 667.

1888 (Fr. Hens.). — Congo (Duch.); Bas-Congo (Cabra). — II a : Temvo (Ém. et M. Laur.); la Lomba (Dew.). — IV : Lukungu (Hens.). — V : entre Léopoldville et Sabuka (Ém. Duch. et Lujal); Boko-Sainte-Barbe (Vanderyst). — VI : rég. de Luanu (Leser.). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.).

Vernonia pandurata *Link* Enum. pl. hort. Berol. II (1822) 276; *DC.* Prodr. V, 27; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 274; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Burt.).

Vernonia podocoma *Schultz-Bip.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 287; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 296; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172.

V. cylindrica A. Rich. (non *Schultz-Bip.*) Tent. fl. Abyss. I (1847) 374.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johust.).

Vernonia Foskeana *Vatke* et *Hildebr.* in Oest. bot. Zeitschr. (1875) 324; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 274; *O. Hoffm.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 404; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 593; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 325.

Crystallopollen angustifolium *Steetz* form. vulgaris *Steetz* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) 366.

1888 (Fr. Hens.). — V : env. du Stanley-Pool (Hens.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel).

— — var. ***chlorolepis*** [*Steetz*] *O. Hoffm.* in Bolet. Soc. Brot. X (1893) 174; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 520; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1907) 207.

1906 (A. Sapin). — VI : Madibi (Sap.).

Vernonia potamophila *Klatt* in Annal. naturh. Hofmus. Wien VII (1892) 100; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 30 et Pl. Gilletianae, I (1900) 32

? ***Vernonia Poggeana*** *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XX (1894) 221; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172.

1876 (P. Pogge). — XV : pays de Muata-Yamvo (Pg. 269).

Cette plante a-t-elle été trouvée dans le Congo belge ?

[B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 32]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 241, 325; II 1907 207 et Miss. Laurenl (1905) 190.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.) : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Mont Bangu (Dem 77) : Lutete (Hens, A. 241). — V : Kisantu (Gill. 518) : entre Kisantu et le Kwango (But.) : reg. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3041).

Vernonia quangensis *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 463.

Le type n'est indiqué que dans l'Angola.

— — var. **tomentosa** *O. Hoffm.* l. c. 463.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukeuge (Pg. 1273).

Vernonia senegalensis [*Pers.*] *Less.* {non *Desf.*} in *Linnaea*, IV, (1829) 265; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 283; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 173; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 405; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 528; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 33 et Reliq. Dewevr. (1901) 133; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 164 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326.

Baccharis — *Pers.* Syn. pl. II (1807) 421.

Decaneurum — *DC.* Prodr. V (1836) 68.

Chrysocoma amara *Schumach.* et *Thom.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 383.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — II a : brousse de Katala. — Nom vern. : **Manduli-Duli** (Dew.). — IV : Banza-Puta (Dem.). — XIII d : env. de Kasongo — Nom vern. : **Molonga** (Dew.). — XVI : Toa (Desc. : bords du Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Mululundja** [Tanganika]; **Bavoapanda** [Ikwangula] (Dew.).

Vernonia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 207.

1905 (F. Seret). — XII c : entre Niangara et Gombari (Ser. 438) ; entre Amadis et Surango (Ser. 344).

Vernonia sericolepis *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 466.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 236) ; Musumba (Pg. 249) ; Mukeuge (Pg. 1268, 1286, 1305, 1314).

Vernonia Smithiana *Less.* in *Linnaea*, V (1831) 638; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 276; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 173; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 405; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 522; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 133.

Webbia — *DC.* Prodr. V (1836) 72.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.) : env. de Kasongo (Dew. 995 a).

Vernonia suprafastigiata *Klatt* in B. Herb. Boiss. IV (1896) 458.

1891 (G. Descamps). — Ind. non cl. : Luengue (Desc. 29).

Vernonia Teuszii Klatt ex Schinz in. B. Herb. Boiss. III (1895) 424; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 164.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 471); Ilant-Marungu (Deb.).

Vernonia ulophylla O. Hoffm. in Bolet. Soc. Bot. XIII (1896) 13; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 534; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326; II (1907) 208 et Miss. Laurent (1905) 190.

1902 (L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Dima (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XII b : entre Bima et Bambili (Ser.).

Vernonia undulata Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 276; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 524; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1904) 133; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 165 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326; II (1907) 208.

1891 (F. Demeuse). — IV : distr. des Cataractes (Dem.). — V : Dolo (Schlt. : Sap.). — XII b : entre Bima et Bambili (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Bu-Kukuta** (Verd.); Kayumba [Tanganika-Moero]. — Nom vern. : **Koito** (Coll.?).

Vernonia Verdickii O. Hoffm. ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) p. IX.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 463).

Vernonia vernicata Klatt in Annal. naturh. Hofmus. Wien, VII (1892) 99; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 30.

1891 (G. Descamps). — XV : vallée de la Luile (Desc.).

Vernonia violacea Oliv. ex Hiern in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 94 et in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 275; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 33 [B. S. B. XXXVI², 79]; O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 404; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 33 [B. S. B. XXXVI², 79]; Contr. fl. Cgo, I (1899) 30 et Reliq. Dewevr. (1901) 133; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 190 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Ém. et M. Laur.). — II : Boma (Dew. 105). — II a : Bingila (Dup.).

DEWILDEMANIA O. Hoffm.

Dewildemaniania filifolia O. Hoffm. in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) p. X.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 415).

HERDERIA Cass.

Herderia lancifolia *O. Hoffm.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 17 [B. S. B. B. XL, 23].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb. 87).

Herderia stellulifera *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 425; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 298; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 540; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 173; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 32; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 190 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326.

1888 (Fr. Hens). — II : Sisia (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.).

ELEPHANTOPUS L.

Elephantopus multisetus *O. Hoffm.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 8 [B. S. B. B. XXXIX², 31].

1895 (Ém. Laurent). — XV : brousse à l'E. de Lusambo (Ém. Laur.).

Elephantopus scaber *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 814; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 299; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 406; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 540; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 86 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 826] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 37; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 211.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : euv. de Léopoldville (Gill.); Kisantu (Gill.).

ADENOSTEMMA Forst.

Adenostemma viscosum *Forst.* Char. gener. (1776) 90, t. 45; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 299; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 542; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 400; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 173; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 133; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 191.

1816 (Chr. Smith). — II a : Bingila (Dup.); Shinganga (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verl.). — Ind. nou cl. : Bocra. — Nom vern. : **lbongo** (Dew.).

AGERATUM L.

Ageratum conyzoides L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 839; *DC. Prodr.* V, 108; *Hook. Exot. Fl.* t. 15; *Wight Ill. of Ind. Bot.* II, t. 134; *Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 300; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 174; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 542; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 131; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 191 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 110-111.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); Zobe (Dew.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Luvituku (Dem.); Lukuugu (Heus). — V : Suata (Buett.); Kisantu (Vanderyst). — VI : Muene-Putu; Kasongo (Buett.). — IX : pays des Baugula (Ém. Laur.); Upoto (Wilw.). — XII : l'Uele (Delp.). — XIII d : Nyangwe (Dew.). — XV : Luebo (Ém. Laur.); Baraka (L. Dohet). — XVI : le Lualaba (Desc.); Pala (Deb.); Toa (Desc.). — Noms vern. : Lokasa [Équateur]; Kinongo [Tanganika]; Kasuku-Suku [Kasongo]; Eulu [Ikwangoula].

MSUATA O. Hoffm.

Msuata Buettneri O. Hoffm. in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 5 (1893) 388; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 219.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 19); entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2614); Yumbi (Pyn. 308). — VII : Lac Léopold II (Dem.).

EUPATORIUM L.

Eupatorium africanum Oliv. et Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 301; O. Hoffm. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 406; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 542; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 165 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326; II (1907) 209.

1900 (Edg. Verdict). — V : Kimuenza (Gill. 2117). — VI : au N. du Kaongo (Cabra et Michel 7). — XVI : le Katanga (Verd.).

MIKANIA Willd.

Mikania scandens [L.] Willd. Sp. pl. III (1804) 1743; *Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 301; O. Hoffm. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 406; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 174; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 37 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 134; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 211, (1906) 327; II (1907) 209 et *Miss. Laurent* (1905) 191.

Eupatorium — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 836.

Willoughbeyia — *Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1898) 543.

M. chenopodiifolia Willd. Sp. pl. III (1804) 1745; *R. Br. in Tuckey Congo Exped. App.* (1818) 128.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — II a : le Mayumbe; Zobe; Biugila (Dup.). — IV : Luvituku (Pyn.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.); env. de Kimuenza (Dew.); Lukolela (Ém. et M. Laur.); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Sap.); Eielo (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Équateur (Pyn.); Ikonge (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo. — Nom vern. : **Karici** (Dew.). — XV : le Sankuru (Luja); Lusambo (Desc.). — Noms vern. : **Kumu** [Kwilu]; **Kasal** [Bangala] (Sap.).

DICHROCEPHALA DC.

Dichrocephala chrysanthemifolia DC. Prodr. V (1836) 372; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 303; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 174.

D. macrocephala *Schultz-Bip.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 145.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens).

Dichrocephala latifolia DC. in *Guill.* Archiv. de bot. II (1833) 518 et Prodr. V, 372; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 303; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 134; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 406; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 544; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 209 et Miss. Laurent (1905) 191.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Haut-Lopori (Biel.). — IX : Bolombo (Ém. Laur.). — XIII d : Nyangwe; Elungu (Dew.). — XV : Lokandu, rive gauche (Dew.).

GRANGEA Adans.

Grangea maderaspatana [L.] *Poir.* Encycl. méth. Bot. XI (1813) 825; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III, t. 1097; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 304; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 406; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 175; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 134; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 545; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 192 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 327; II (1907) 209.

Artemisia — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 849.

Cotula Sphaeranthus *Link* Enum. pl. Hort. Berol. II (1822) 344.

Grangea — *C. Koch* in *Bot. Zeit.* (1843) I, 41.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.); Ponta da Lenha (Naum.); Sisa (Dew.). — IV : Kkobola (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Yumbi (Pyn.); Kwamouth (M. Laur.). — VI : Kingunshi (Buett.). — XVI : Lofoi (Verd.).

MICROGLOSSA DC.

Microglossa angolensis *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 309; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 549; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 135; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 165; Miss. Laurent (1905) 192 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 209.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : rég. de Luau (Lescr.). — VIII : env. de Bamania (M. Laur.). — XII c : entre Amadis et Surango (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Munnngu (Lescr.); Butala (Ém. et M. Laur.). — XVI : plateau du Katanga (Verd.).

— — form. fol. **grosse dentatis** *O. Hoffm.* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 192.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Microglossa volubilis [*Wall.*] *DC* Prodr. V (1836) 320; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 309; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 407; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 549; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 32 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 32] et Reliq. Dewevr. (1901) 135; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 192 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 209.

Conyza — *Wall.* Catal. (1831) n. 3057.

1896? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — II a : Banza-Masola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.; Pyn.).

CONYZA Less.

Conyza aegyptiaca [*L.*] *Dryand.* in *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, III (1789) 183; *DC* Prodr. V, 382; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 314; *Th. Dur.* et *Schin.* Étud. fl. Cgo (1896) 175; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 407; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 135; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 192 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 337; II (1907) 210.

Erigeron — *L.* Mant. pl. (1771) 112; *Jacq.* Hort. Vindob. III, t. 19.

Marsea — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 550.

Conyza echioides *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 388.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill.): Kisantu-Makela (Van Houtte); Kinshassa (Dew.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XII : pays des Mangbettn (Schw.). — XII c : Amadis. — Nom vern. : **Averu** (Ser.). — XIII d : Kasongo (Dew.). — Noms vern. : **Macumbu-Macumbu** [Ikwangula]; **Kafoine** [Kasoi]; **Karibululu** [Tanganika] (Dew.).

BLUMEA DC.

Blumea aurita [*L. f.*] *DC.* in *Wight* Contrib. Ind. Bot. (1834) 16 et Prodr. V, 449; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 322; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 176.

Couyza — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 367.

Erigeron stipulatum *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 385.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.).

Blumea lacera [*Burm.*] *DC.* in *Wight* Contr. Ind. Bot. (1834) 14 et Prodr. V (1836) 436; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 322; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 176; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 135; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 210.

Couyza — *Burm.* Fl. Ind. (1768) 180, t. 59.

Placus — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 356; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 555.

Erigeron stipitatum *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 385.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Zambi (Dew.). — III-IV : la Lufu (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : vallée du Stanley-Pool (Hens); env. de Kisantu (Gill.).

LAGGERA Schultz-Bip.

Laggera alata [*DC.*] *Schultz-Bip.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 94; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 326; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 176; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 408; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 556; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 135; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 210.

Blumea — *DC.* Prodr. V (1836) 448; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III, t. 1101 et Spicil. Neilgher. t. 109.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi. — Nom vern. : *Mosalata* (Sap.). — XIII d : brousse de Kasongo (Dew.). — Noms veru. : *Kifanga-Fanga* [Kasai]; *Kimonga* [Tanganika] (Dew.).

Laggera brevipes *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, (1877) 327; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 408; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 177; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 557; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 136; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 327.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : la Lemba (Dew. 387). — V : euv. de Léopoldville et de Kisantu (Gill. 2664, 3344).

Laggera oblonga *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 327; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 177.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Laggera pterodonta [DC.] *Schultz-Bip.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiöp.* (1867) 151; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 324; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 408; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 136; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 165.

Blumea — DC. Prodr. V (1836) 448.

L. purpurascens *Schultz-Bip.* ex *Hochst.* in *Flora*, XXIV (1841) I. Intell. 21, 95; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I, 393; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 556.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kasongo (Dew. 912 pr. p.). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 1171).

PLUCHEA Cass.

Pluchea Dioscoridis [L.] DC. Prodr. V (1836) 450; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 329; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 408; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 177; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 557; *De Wild.* Reliq. Dewevr. (1901) 136 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 210.

Baccharis — L. Amoen. acad. IV (1759) 289.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.); Banana (Dew.). — II : Boma (Pyn.); Sisia (Dup.). — III : Tondoa (Buett.).

SPHAERANTHUS L.

Sphaeranthus flexuosus *O. Hoffm.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) p. X.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 107).

Sphaeranthus polycephalus *Oliv. et Hiern* ex *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 95, t. 59 et in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 334; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 409; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 177; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 211.

1888 (Fr. Hens). — V : env. du Stanley-Pool (Hens); env. de Léopoldville (Gill.).

Sphaeranthus suaveolens DC. Prodr. V (1836) 370; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 333; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 409; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 166.

1900 (Edg. Verdick). — VI : Lukafu (Verd.).

BLEPHARISPERMUM Wight.

Blepharispermum spinulosum *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 335; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 177.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

ACHYROCLINE Less.

Achyrocline batocana *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 339; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 178.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

GNAPHALIUM L.

Gnaphalium luteo-album *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 851; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 343; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 409; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 559; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 327; II (1907) 210.

1999 (Cél. Hecq). — V : Kisantu-Makela (Vau Houtte); Lemfu (But.); Boko (Pyn.). — XIV : plateau du Kivu (Hecq).

HELICHRYSUM Gaertn.

Helichrysum argyrosphaerum *DC.* Prodr. VI (1837) 174; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 351; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 178.

Gnaphalium — *Schultz.-Bip.* in *Bot. Zeit.* III (1847) 170.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Congo (Pech.-Loesche; Johnst.).

Helichrysum auriculatum *Less.* Syn. Composit. (1832) 311; *DC.* Prodr. VI, 209; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 347; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 178.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.; Johnst.).

Helichrysum fulgidum [*L. f.*] *Willd.* Sp. pl. III (1804) 1904; *Less.* Syn. Composit. 286; *DC.* Prodr. VI, 187; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 187; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 178.

Xeranthemum — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 365; *Jacq.* Icon. pl. rar. I, t. 173; *Bot. Mag.* (1793) t. 414.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Helichrysum geminatum *Klatt* in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, VII (1892) 101; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 210.

1903 (Alph. Cabra et L. C. Michel). — VI : C. sur les collines au N. de Kaonga (Cabra et Michel, 5).

Helichrysum Mechowianum Klatt in Annal. naturh. Hofmus. Wien, VII (1892) 101; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 563 [*Elichrysum*]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 86 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 826]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 328.

1891 (F. Demeuse). — IV : Kinkanda (Dem.).

Helichrysum nudifolium [L.] Less. Syn. Composit. (1832) 299; *DC.* Prodr. VI, 200; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 410; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 36; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 564 [*Elichrysum*]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 211 et *Miss. Laurent* (1906) 193.

Gnaphalium — L. Pl. rar. Afr. (1760) 19.

1891 (F. Demeuse). — V : Kisantu : entre Kisantu et Dembo (Gill.). — Ind. non cl. : Belem (Dem.).

Helichrysum pachyrrhizum Harv. in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. III (1864-65) 222; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 346; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 179.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Helichrysum panduratum *O. Hoffm.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 87 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 827].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1293).

Helichrysum subglomeratum Less. Syn. Composit. (1832) 283; *DC.* Prodr. VI, 186; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. III, 236; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 179.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Helichrysum undatum Less. Syn. Composit. (1832) 298; *DC.* Prodr. VI, 198; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 353; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 179.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

INULA L. (4)

Inula Engleriana *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1898) 471.

1876 (P. Pogge). — XV : Lunda, vers 8 1/2° (Pg. 192).

(4) **Inula Poggeana** *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1898) 471.

1876 (P. Pogge). — VI : entre Kinabundo et le Kwango, vers 10 1/2° (Pg. 186).

Obs. — Cette habitation est-elle dans le Congo belge?

Inula Klingii *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1898) 472; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 328; II (1907) 211.

1891 (F. Demeuse). — IV : Luvituku (Dem.). — V : Kisautu (Gill. 3684); entre Kisantu et le Kwango (But.): Boko (Pyn. 114).

ANISOPAPPUS Hook. et Arn.

Anisopappus africanus [*Hook f.*] *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 369; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 166.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 501).

ZINNIA L.

Zinnia elegans *Jacq.* Collect. bot III (1789) 452 et Icon. pl. rar. III, t. 659; *Bot. Mag.* (1801) t. 527; *DC. Prodr.* V, 536; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 412; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 179.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — XI : Idanga (Ém. Laur.).

ENHYDRA Lour.

Enhydra fluctuans *Lour.* Fl. Cochinch. (1790) 511; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 373; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 136.

Cryphiospermum — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 25, t. 24.

E. longifolia *DC.* Prodr. V (1836) 637.

E. paludosa *DC.* l. c. 637.

E. Heloucha *DC.* l. c. 637.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Zobe (Dew.). — IX : Bobi près Gali (Thonn.).

ECLIPTA L.

Eclipta alba [*L.*] *Hassk.* Pl. Javan. rarior. (1848) 528; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 373; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. III, 305; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 179; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 136; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 125-126.

Verbesina — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 902.

Ecliptica — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 334.

E. erecta *L. Mant. pl. II* (1771) 296; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 585.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — V : entre Léopoldville et Mombasi : Kisantu (Gill.). — VI : Eïolo (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini (M. Laur.). — VIII : Équateur (Buett.); Eala (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Lie (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Prani Lombi : env. de Nyangwe (Dew.). — XVI : Toa (Desc.). — Noms vern. : **Kwanfa** [Nouvelle-Anvers] (Ém. Duch.); **Biolo** [Bakusu]; **Vungui** [Tanganika] (Dew.); **Lolimissa** [Eala]. (M. Laur.).

BLAINVILLEA Cass.

Blainvillea Priureana DC. Prodr. V (1836) 492; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 375; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 180.

1893 (P. Dupuis). — II : Sisia (Dup.)

ASPILIA Thou.

Aspilia Dewevrei O. Hoffm in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 9 [B. S. B. B. XXXIX², 22] et Reliq. Dewevr. (1901) 137.

1896 (A. Dewèvre). — IX : Bumba (Dew. 898). — XIII d : Kasongo (Dew.). — Noms vern. : Toki [Kasongo]; Malebumuki [Ikwangula]; Kaluangwe [Tanganika] (Dew.).

Aspilia latifolia *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 379; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 48; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 211.

1905 (Éd. Lescrauwaet). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser. 167). — XV : Kanda-Kanda (Lescr. 341).

Aspilia Kotschyi [Schultz-Bip.] Benth. et Hook. f. Gen. pl. II (1873) 372; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 98; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 381; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 180; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 579; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 137; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 328; II (1907) 211 et Miss. Laurent 1906) 193.

Dipterotheca — Schultz-Bip. in Flora (1842) 435.

Corouocarpus — Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 433.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Manda (Vanderyst). — II : Binginga (Dup.); Shinganga (Dew.); Haut-Shiloanga (Cabra-Michel). — III : entre Matadi [III] et Léopoldville [V] (Vanderyst). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Kitobola (Pyn.). — V : le Stanley-Pool (Dew.); env. de Kwamouth (Biel.); Kiushassa (M. Laur.); Boko-Sainte-Barbe (Vanderyst); Kisanu (Gill.); Suata (Buett.). — VI : reg. de Luanu (Lescr.), route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel). — VII : la Fini; le Léopold II (Ém. et M. Laur.). — IX : env. de Bumba (Ser.). — XII a : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XIII d : Nyanguwe (Dew.). — XV : le Kasai et le Sankuru (Ém. et M. Laur.). — XVI : village Bakondo; Toa (Desc.).

Aspilia Smithiana *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 380; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 180.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

OBS. — L'*Helianthus annuus* L. a été importé à Eala (M. Laur. 1514) [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 211].

MELANTHERA Rohr.

Melanthera Brownei DC. [*Schultz-Bip.* in *Flora*, XXVII (1844) 672; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* III, 382; *O. Hoffm.* in *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* 414; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 181; *Hiern* *Cat. Welw.* Pl. I, 579; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 137; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 194 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 328; II (1907) 211.

Lipotriche — DC. *Prodr.* V (1836) 544.

Buphthalmum scandens *Schumach.* et *Thom.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 392.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo. — Noms vern. : **Lurakasa**; **Manakasa** (Cabra). — II : Zambi (Dew.); Borna. — Nom vern. : **Mautunlu** (Dew.). — II a : Temvo (Ém. Laur.). — V : Leopoldville (Ém. Duch. et Luja); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — VII : Iboka (Ém. Laur.). — VIII : Bamania et env. (Ém. et M. Laur.); Coquilhatville (Pyn.). — IX : env. de Bumba (Dew.); Ukaturaka; Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.); Malema (Ém. Laur.). — XV : Batempa (Lescr.). — XVI : env. d'Albertville [Toa] (Desc.; Heccq; Lukafu (Verd.).

SPILANTHES L.

Spilanthes Acmella [L.] *Murr.* *Syst. veget.* ed. 13 (1774) 610; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* III, 384; *O. Hoffm.* in *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* 414; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 181; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 38; *Hiern* *Cat. Welw.* Pl. I, 584; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 328 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 328.

Verbesina — L. *Sp. pl.* ed. I (1753) 901.

E. africana et E. caulirhiza DC. *Prodr.* V (1836) 623.

? Eclipta filicaulis *Schumach.* et *Thom.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 390.

1884 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Yumbi (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Équateurville (Buett.). — IX : pays des Bangala (Hens); Nouvelle-Anvers. — Nom vern. : **Ebakomba** (Ém. Duch.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XVI : env. d'Albertville [Toa] (Heccq; Lukafu (Verd.).

— — var. **oleracea** [L.] *Clarke* *Compos. Ind.* (1879) 138; *O. Hoffm.* in *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* 414; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 138.

S. oleracea L. *Syst. nat.* ed. 12 (1767) 534; *Jacq.* *Hort. Vindob.* II (1772) 63 1. 135; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 194.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — XI : Lokandu [Riba-Riba] (Dew.); env. de Lie (Ém. et M. Laur.)

CALYPTROCARPUS Less.

Calyptracarpus africanus *O. Hoffm.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, II (1901) 87 [B. *Herb. Boiss. Sér. 2. I, 827*].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1382).

COREOPSIS L.

Coreopsis Grantii Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 98, t. 65; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 388; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 181; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 114; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 38 et Reliq. Dewevr. (1901) 138; Bot. Mag. (1906) t. 8110; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 194 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 212; II (1907) 212.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — Bas-Congo (Gill.). — V : env. du Stanley-Pool (Hens); Dolo (Sap.); Bolobo (M. Laur.); Kisantu et env. (Gill.); env. de Lemfu (But.). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Kolokoso** [Kwilu] (Sap.). — XV : Bombaie (Luja); E. de Lusambo; Kondue (Ém. Laur.); le Sankuru. — Nom vern. : **Sokomini** (Sap.); Mokole [Lubi] (Lescr.).

Coreopsis Sereti De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 212.

1905 (F. Seret). — XII d : sommet du Mont Angba [rive droite de l'Ucle] (Ser. 306).

BIDENS L.

Bidens pilosa L. Sp. pl. ed. I (1753) 832; *Dillen.* Hort. Eltham. t. 43; DC. Prodr. V, 597; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 392; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 182; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 587; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 31; II (1900) 38 et Reliq. Dewevr. (1901) 138; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 210, (1906) 329; II (1907) 212 et Miss. Laurent (1906) 194.

B. leucantha Willd. Sp. pl. III (1804) 1719.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.); Bas-Congo (Cabra). — II : Boma (Dew.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — IV : Kouzo (Dem.); Lutete (Hens). — V : Suata (Buett.); Kisantu (Gill.); l'Inkisi (Hens). — VIII : Équateurville (Buett.); env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.); Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XII b : Bambili (Ser.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XIV : Kalembe-Lemba [Ruzizi-Kivu] (Coll.?). — XV : Luebo (Ém. Laur.); Ikougo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lofoi (Verd.); env. d'Albertville [Toa] (Hecq); Lukonzolwa (Coll.?). — Noms vern. : **Ikatabao** [Eala] (M. Laur.); **Tobelengue** [Équateur]; **Ephidi** [Ikwangula]; **Ifuige** [Kasongo]; **Acisa** [Tangonika] (Dew.).

Bidens urceolata De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 167.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 464).

CHRYSANTHELLUM Rich.

Chrysanthellum procumbens Pers. Syn. pl. II (1807) 471; DC. Prodr. V, 630; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 394; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 588; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 138; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 213.

1896 (A. Dewèvre). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Noms vern. : **Kenia** [Bakusu]; **Bili** [Ikwangula]; **Kiomeome** [Tangauka].

JAUMEA Pers.

Jaumea compositarum [Steetz] *Benth.* et *Hook.* f. *Gen. pl.* II (1877) 397; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* III, 395; *O. Hoffm.* in *Engl.* *Pl. Ost-Afr.* 415; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 182; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI^e, 80]; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 167.

Hypericophyllum — *Steetz* in *Peters* *Reise n. Mossamb.* II (1864) 499, t. 50.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — XVI : Lukafu (Verd.); vallée du Lubudi et du Lovoi (Desc.).

Jaumea congensis *O. Hoffm.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, VII (1900) 10 [B. S. B. B. XXXIX^e, 33 et in *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 139; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 212; II (1907) 213 et *Miss. Laurent* (1906) 195, t. 46.

1895 (J. Gillet). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Sanda (De Brouw.; Gill. 1036 ; rég. de la Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3089). — VI : entre Kisantu et Popokabaka (But. in Gill. 2309, 2329). — XV : Lomkala (Ém. Laur.); route de Luebo à Luluabourg (Gent. 34); Pania-Mutambo (Leser. 417).

Obs. — A. Dewèvre a recolté cette espèce au N. du Stanley-Pool (Congo franç.).

TAGETES L.

Tagetes Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 213.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

***Tagetes patula** *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) 887; *Bol. Mag.* (1791) t. 150; *DC.* *Prodr.* V, 643; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 182; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gillelianae*, I (1900) 33 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 33].

1888 (Fr. Hensl.). — IV : Gombi-Lutete (Hensl. A. 256). — V : Kisantu (Gill.).

SCHISTOSTEPHIUM Less.

Schistostephium heptalobum [*DC.*] *Benth.* et *Hook.* f. ex *O. Hoffm.* in *Engl.* *Pl. Ost-Afr.* 1895 416; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 167.

Tanacetum — *DC.* *Prodr.* VI (1837) 133.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

GYNURA Cass.

Gynura cernua [*L. f.*] *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 437 [excl. syn., pr. p.]; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 402; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 183; *O. Hoffm.* in *Engl. Pl.* Ost-Afr. 416; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 139; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 166; Miss. Laurent (1905) 188 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 234; II (1907) 244.

Senecio — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 370.

Crassocephalum — *Moench* Meth. pl. Marb. (1794) 510; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 593.

1883 (H. Johnston). — II : Boma (Dew.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); Bingila (Dup.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Lutete (Heus); Luvituka (Dem.). — V : Léopoldville (Dew.); Suata (Buett.); Kisantu (Gill.); Maydis (Odd.); env. de Dembo (Gill.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.); Bokala (M. Laur.). — VI : riv. du Kwilu. — Nom ve. n. : Lemalema (Sap.); Muene-Putu-Kasongo (Buett.); Madibi (Sap.); route de Kikwit a Boala (Leser.); le Kasai a Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Ser.). — IX : l'Upoto (Wilw.). — XI : env. de Basoko (Ém. Laur.). — XII : prov. orient. Ser.; l'Uele (Delp.). — XIV : Ruzizi-Kivu (Coll. †); haut plateau du Kivu (Heccq.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.); CC. dans les villages à l'E. de Lusambo (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Katanga (Verd.).

— — var. **coerulea** [*O. Hoffm.*] *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 139; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 166; Miss. Laurent (1905) 189 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 324.

Gynura coerulea *O. Hoffm.* in B. Herb.-Boiss. I (1893) 86.

Crassocephalum cernuum *Moench* var. — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 594.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VI : entre Kikwit et Boala (Leser.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Koudue (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Gynura crepidioides *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 438; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 403; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 183; *O. Hoffm.* in *Engl. Pl.* Ost-Afr. 416; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 38; Pl. Thonnerianae (1900) 48 et Reliq. Dewevr. (1901) 139.

Senecio — *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 155.

S. diversifolius *A. Rich.* [non *Wall.*] Tent. fl. Abyss. I (1847) 437.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Zambi (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — IX a : Evankoyo (Thonn.). — XI : Lokandu (Dew.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Gynura vitellina *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 438; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 402; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 183.

Senecio — *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 286.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : le Mayumbe (Dup.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

EMILIA Cass.

Emilia caespitosa Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 100; *Oliv.*, et *Hiern* in *Oliv.* Fl. Irop. Afr. III, 406; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 181.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 2).

Emilia graminea DC. Prodr. VI (1837) 303; *De Wild.* et *Th. Dur.* Confr. fl. Cgo, I (1899) 31; II 1900 38 et Reliq. Deweyr. (1901) 140; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 195 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 329.

1895 Ém. Laurent. — V : env. de Kisantu et de Dembo (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Malepie (Ém. Laur.). — XIII : Mutumbe (Dew.). — XV : bords du Kasai (Ém. Laur.); Bena-Dibele (Lujā)

Emilia integrifolia Bak. in Kew Bull. (1895) 69; *O. Hoffm.* in *Schlechter* Westafri. Kautsch. Exped. (1900) 326.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Scht.).

Emilia sagittata [Vahl] DC. Prodr. VI (1837) 302; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. Irop. Afr. III, 405; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 184; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 416; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 167; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 140; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 195 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 329; II (1907) 204.

Cacalia — *Vahl* Symb. bot. III (1791) 91; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1901) 214

E. flammea Cass. in Diet. sci. nat. XIV (1819) 406; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 595.

1870 G. Schweinfurth. — Congo (Johnst.). — II : Malela (Gill.). — II a : le Mayumbe; Bingila (Dup.); Shunganga (Dew.); entre Yema-Lianga et Shimbanza (Cabra et Michel). — IV : Lukungu (Hens); Luvituku (Dem.); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Ém. Dur.); Léopoldville (Hens); entre Léopoldville et Sabuka (Lujā); Kisantu (Gill.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Burt.); entre Tumba-Maui et Popokabaka (Cabra et Michel); Eholo (Ém. et M. Laur.); Madibr. — Noms vern. : *Kofu*; *Monabata* (Sap.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.); Copuilhatville. — Nom vern. : **Elekeke-Adjico** (Dew.). — IX : Upoto (Wilw.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Lualaba (Desc.); Lukafu; le Lofoi (Verd.); Pweto (Desc.); Haut-Marungu (Deb.)

Emilia sonchifolia DC. Prodr. VI (1837) 302; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. Irop. Afr. III, 405; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 24 [B. S. B. B. XXXVI², 80].

1891 (F. Demense). — Congo (Dem.).

SENECIO L.

Senecio abyssinicus *Schultz-Bip.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 438; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 410; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 417; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 184; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gillelianae, I (1900) 33 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 33] et Reliq. Dewevr. (1901) 140.

S. *Quartinianus* *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 158; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 195; *O. Hoffm.* ex *Engl.* in *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. (1900) 326.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser. 205). — XII d : pays des Mangbetu (Schw.). — XIII a : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : *Lefide* [Ikwaungula]; *Katchilo* [Kasongo]; *Kolembe-Lembe* [Tanganika] (Dew.).

Senecio congolensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 86, (1906) 329.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1356); Kimbata près de Dembo (But. in Gill. 3350).

Senecio Dewevrei *O. Hoffm.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 12 [B. S. B. B. XXXIX², 33] et Reliq. Dewevr. (1901) 140.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 935). — Noms vern. : *Ducambutu* [Ikwaungula]; *Lololo*; *Matosa* [Tanganika]. (Dew.).

Senecio discifolius *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 100; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 440; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 417; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 214.

1906 (F. Seret). — XII c : entre Surango et Niaugara (Ser. 436).

Senecio katangensis *O. Hoffm.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) p. XI.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 340).

? **Senecio maritimus** *L. f.* Suppl. pl. (1781) 369; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult) 680; *DC.* Prodr. VI, 434; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. III, 351; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 184.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 293).

Ons. — Il reste quelques doutes sur la détermination de cette espèce.

KLEINIA L.

Kleinia fulgens *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1866) t. 5590; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI¹, 80].

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

OSTEOSPERMUM L.

Osteospermum sonchifolium *DC.* *Prodr.* VI (1837) 465; *Harv.* in *Harv. et Sond. Fl. Capens.* III, 440.

Le type croît dans l'Afrique australe.

— — var. **subpetiolatum** *Harv.* l. c. (1865) 440; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 141.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 124).

ECHINOPS L.

Echinops Korobori *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 216, t. 63.

1906 (F. Seret). — XII d : savane du territoire du chef Koroboro (Ser. 617).

Echinops Sereti *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 214, t. 62.

1906? (F. Seret). — XII d : rég. N.-E. du Congo (Ser.).

DICOMA Cass.

Dicoma anomala *Sond.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 71; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 443; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 420; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 614; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 168.

1900 (Edg. Verdick). — Bas-Congo (But.). — XVI : Lukafu (Verd.).

— — var. **karaguensis** *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 443; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 186.

D. karaguensis *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 103, t. 70.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua, 9°5 lat. S. (Pg. 200).

Dicoma Poggei *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 545; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 168.

1900 (Edg. Verdick). — XV : pays de Muata-Yamvo (Pg. 275). — XVI : Lukafu — Nom vern. : **Mulzianvo** (Verd.).

PLEIOTAXIS Steetz.

Pleiotaxis affinis *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 538; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1285).

Pleiotaxis Dewevrei *O. Hoffm.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 11 [B. S. B. B. XXXIX², 33] et Reliq. Dewevr. (1901) 141.

1896 (A. Dewèvre). — XVI : montagne Kitchina [Haut-Lualaba] (Dew. 1014).

Pleiotaxis eximia *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 539; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 31 et Pl. Gilletianae, I (1900) 33 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 33]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 216.

P. pulcherrima Klatt (non *Steetz*) in Ann. naturh. Hofmus. Wien, III (1892) 104.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 714); env. de Dembo (Gill.). — XV : pays de Muata-Yamvo [Congo belge?] (Pg. 263); plaines du Haut-Kasai (Lescr.).

Pleiotaxis pulcherrima *Steetz* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) 499; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 440; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pf. Ost-Afr. 420; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 610; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 168 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1901) 212, 1906 329; II (1907) 217.

1881 (P. Pogge). — V : la Lula-Lumene (Hendr.); bord de la Sele; entre Dembo et le Kwango (Gill.). — VI : plateau de Kimbele (Cabra et Michel). — XV : Kanda-Kanda (Geut.); Mukenge (Pg. 1270, 1279); Campine a l'O. du Lomami (Pg. 1266). — XVI : le Lofoi; env. de Lukafu. — Nom vern. : **Kabonga** (Verd.); Kayumba [Tanganika-Moero]. — Nom vern. : **Bombo** (Coll. ?).

— — var. **Poggeana** *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 537; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185.

1876? (P. Pogge). — XV? : pays de Muata-Yamvo (Pg. 203).

Pleiotaxis rugosa *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 538; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 610; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 329; II (1907) 217.

1892 (F. Demense). — V : entre Kisautu et le Kwango (But. in Gill. 3726). — XV : au S. de Tshitadi (Lescr. 322). — lud. non cl. : Belem (Dem. 513).

ERYTHROCEPHALUM Benth.

Erythrocephalum erectum Klatt ex Schinz in B. Herb. Boiss. IV (1896) 472; *De Wild* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 105, t. 53; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 168.

1891 (G. Descamps). — XV : pays des Samba (Desc.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tjikundi** (Verd.).

PASACARDOA O. Kuntze.

Pasacardoa Grantii [Benth.] O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 355; O. Hoffm. in Engl. Jahrb. XV (1893) 543; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI², 80].

Phyllactinia — Benth. ex Oliv. in Trans. Linu. Soc. XXIX (1873) 102, t. 68; Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 412.

1891 (G. Descamps). — Ind. non cl. : vallée de la Luile (Desc.).

— — var. **angustiligulata** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 169, in syn.

Phyllactinia Grantii Benth. var. — *De Wild.* l. c. 169.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Lofoi; Lukafu. — Nom vern. : **Musombe** (Verd. 360).

— — var. **reducta** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 169, in syn.

Phyllactinia Grantii Benth. var. — *De Wild.* l. c. 169.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 445).

GERBERA Gronov.

Gerbera piloselloides Cav. in Dict. sci. nat. XVIII (1820) 461; Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 445; O. Hoffm. in Engl. Pf. Ost-Afr. 420; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 212.

Perdicium — Hiern Cat. Welw. Pl. I (1898) 615.

1900 (J. Gillet). — V : Kisautu (Gill.).

CICHORIUM L.

***Cichorium Intybus** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 813; DC. Prodr. VII, 84; Rehb. Icon. fl. Germ. XIX, t. 1357; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 195 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 213.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XII c : Amadis (Ser.). — XV : Ibanga (Ém. et M. Laur.).

Obs. — La plante signalée, sous ce nom, dans les env. de Lusambo, par Ém. Laurent, appartient au genre *Lactuca* [De Wild.].

LACTUCA L.

Lactuca Cabrae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 217.

Lauanaea — *De Wild.* l. c. II (1907) 217.

1901 (Alph. Cabra et F. L. Michel). — III : crête du Vanda [bassin de la Pozo] (Cabra et Michel, 62). — V : rég. de la Lumene (Hendr. in Gill. 3278); Sabuka (Em. et M. Laur.); Sanda (Odd. in Gill. 3210).

Lactuca capensis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) 139; *DC.* Prodr. VII, 136; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 452; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. III, 526; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 621; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 141.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

— — var. **duruensis** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 217.

1906 (F. Seret). — XII c : poste de la Duru (Ser. 496).

Lactuca Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 86.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1588).

Lactuca longispicata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 87; II (1907) 219.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu et env. (Gill. 1509, 3887).

Lactuca Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 218.

1905 (F. Seret). — XII b : territoire du chef Misa (Ser. 273).

Lactuca taraxacifolia [*Willd.*] *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 380; *DC.* Prodr. VII, 138; *Schultz-Bip.* in *Flora* (1842) 422; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 451; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 186; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 31 [B. S. B. B. XXXVI², 80] et Contr. fl. Cgo, I (1899) 31; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 329; II (1907) 219.

Sonchus — *Willd.* Sp. pl. III (1804) 1511.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — II : Boma (Schimp.). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Dembo; Kisantu (Gill.); Boko-Sainte-Barbe (Vanderyst). — XV : pays de Kazembe-Mouba [bassin du Lualaba] (Desc.).

Lactuca tricostata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 88; II (1907) 219.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.); env. de Kisantu (Van Houtte in Gill. 3499).

Lactuca Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 170.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 139).

SONCHUS L.

Sonchus asper *Hill* Herb. Brit. I (1769) 47; *Dietr.* Fl. Boruss. VII, t. 503; *Rchb.* Icon. fl. Germ. XIX, t. 1410; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. II, 324; *Rouy* in *Rouy et Fouc.* Fl. de Fr. IX, 203.

S. spinosus *Lam.* Fl. Française, II (1778) 86; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 219.

S. oleraceus *L.* var. — *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 457.

1906 (F. Seret). — XII c : Gombari (Ser. 475).

Sonchus Dregeanus *DC.* Prodr. VII (1838) 184; *Harv.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 528; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 169; *Miss. Laurent* (1906) 196 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 219.

1900 (Edg. Verdick). — VIII : Baka [Ikelemba] (M. Laur.). — XI : Botmaneh (M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Èm. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.),

Sonchus oleraceus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 194; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 457; *Harv.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 528; *Rchb.* Icon. fl. Germ. XIX, t. 1410; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 622; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 88 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 828]; *Rouy* in *Rouy et Fouc.* Fl. de Fr. IX, 204.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Sonchus Schweinfurthii *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 458; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 421; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 186; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 623; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1904) 142; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. II (1907) 219.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill.). — XII d : pays des Mangbetu (Schw.). — XII c : entre Surango et Niangara (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga — Nom vern. : *Kokolola* (Dew.).

LOBELIACEAE (1)

LOBELIA L.

Lobelia fervens *Thunb.* Fl. Capens. II (1818) 46; *DC.* Prodr. VII, 385; *Sond.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 548; *Hemsl.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 468; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 186.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

(1) A. Dewèvre a récolté, en 1895, une Goodéniacée, le *Soaevoia* *Lobelia* *Murr.* mais à Landanu dans l'enclave portugaise de Kabinda.

Lobelia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 85.
1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill. 2802).

CYPHIA Berg.

Cyphia erecta *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 163.
1899 (Edg. Vordick). — XVI : Lukafu (Verd. 345).

Cyphia scandens *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 163.
1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kitjangulula** (Verd. 368).

CEPHALOSTIGMA A DC

Cephalostigma Perrottetii *A. DC.* in *DC.* Prodr. VII (1838) 420;
Deless. Icon. sel. pl. V, t. 15; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 472;
Th. Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 187; *Th. Dur.* et *De Wild.*
Mat. fl. Cgo, I (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI², 80]; *De Wild.* et *Th.*
Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 34] et
Contr. fl. Cgo, II (1900) 39.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.): Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Heus). — V : Kisantu (Gill.). — Ind. non cl. : Noki [Angola?] (Schlt.).

LIGHTFOOTIA L'Hérit.

Lightfootia napiformis *A. DC.* in *Annal. sci. nat.* Sér. 5, VI (1866)
328; *Hemsl.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 475; *Th. Dur.* et *De Wild.*
Mat. fl. Cgo, I (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI², 80] et *Reliq. Deweyr.*
(1901) 142; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 629; *De Wild.* Étud. fl. Kat.
(1903) 162 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 85, 210.

1895 (G. Descamps). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.); la Lula-Lumene (Gill.). — XIII d : au-delà de Nyangwe (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kanzanza** (Verd.); Toa (Desc.).

SPHENOCLEA Gaertn.

Sphenoclea zeylanica *Gaertn.* De fruct. et semin. I (1788) 113,
t. 24, fig. 25; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 481; *Hook. f.*
Fl. Brit. Ind. III, 438; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 400; *Th.*
Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 187; *De Wild.* Étud. fl. Kat.
(1903) 162 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 210; II (1908) 350.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Pyn.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — XVI : Lukafu (Verd.).

ERICACEAE

ERICINELLA Klotzsch.

Ericinella Mannii *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 16; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 484; Bot. Mag. (1866) t. 5569; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 303; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 96.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

PLUMBAGINACEAE

PLUMBAGO L.

Plumbago zeylanica *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 151; Bot. Reg. XXXII (1846) t. 23; *Wight* Illustr. Ind. Bot. t. 179; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 486; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 304; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 187; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 143; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 634; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 97 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 335.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — I : Moanda (Vauderyst). — II : Boma (Dew.). — V : Léopoldville (Pyn.); Dolo (Schlt.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — XVI : Lukafu (Verd.).

MYRSINACEAE

MAESA Forsk.

Maesa lanceolata *Forsk.* Fl. Aegypt-Arab. (1775) 106; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 303; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 492; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 637; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 221; *Mez* in *Engl.* Pflanzenreich, IV, n. 236 [Myrsin.] (1902) 26.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : plateau de Lukafu. — Nom vern. : Samba-Bululu (Verd.).

EMBELIA Burm.

Embelia retusa *Gilg* in Engl. Jahrb. XXX (1901) 95; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 335; *Mez* in *Engl.* Pflanzenreich, IV, n. 236 [Myrsin.] (1902) 330.

1870 (G. Schweinfurth). — VII : Kiri (Em. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 904). — XII d : le Kibali [Mangbettu] (Schw. 3550).

SAPOTACEAE

CHRYSOPHYLLUM L.

Chrysophyllum africanum A. DC. in DC. Prodr. VIII (1844) 163; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 500; *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII [Sapot.] (1904) 43, t. 15 A; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 425.

Gambeya — *Pierre* Not. bot. Sapot. (1890) 63.

1906 (Marc. Laurent). — XV : Limbutu (M. Laur. 980).

Chrysophyllum Lacourtianum *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 425, fig. 77-79, t. 138-140.

1903 (Guill. De Bauw). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VII : Ibali : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : distr. de l'Équateur (De Bauw); rég. de la Lomila (Jurgenen); Coquilhatville (De Bauw in Pyn. 336); Bikoro (De Bauw). — XV : Kondue (Luja). — Ind. nou cl. : le Lomami (De Bauw).

Chrysophyllum Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 429, t. 133.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Bamania (Ém. et M. Laur.).

Chrysophyllum longepedicellatum *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 431, t. 134.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Bombimba (M. Laur. 1160).

PACHYSTELE Radlk.

Pachystele cinerea [*Engl.*] *Pierre* ex *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII [Sapot.] (1904) 36, t. 12, fig. A, a-g.

Chrysophyllum — *Engl.* in *Eugl.* Jahrb. XII (1890) 522; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 640.

C. Stuhlmannii *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 306.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2874).

— — var. **cuneata** [*Radlk.*] *Engl.* l. c. VIII (1904) 37, t. 12, fig. C, a-h; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 173 et Miss. Laurent (1907) 425.

P. cuneata *Radlk.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 32 et *Reliq.* Dewevr. (1901) 144.

1895 (A. Dewèvre). — II a : bords du Tshaf à Zobe (Dew. 239). — IV : Luozi (Luja). — V : Kisantu (Gill. 398, 1299). — VII : Kiri; Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : la Lulanga. — Nom veru. : **Kloro** (Dew. 830). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.).

- P. cinerea** var. **undulata** *Engl.* l. c. VIII (1904) 36, t. 12, fig. B, a-d.
1881 ? (P. Pogge). — XV : Pumbale [rég. de la Lulua] (Pg.). — Ind. non cl. : Unayamba (Ém. Laur.).

SERSALISIA R. Br.

- Sersalisia Laurentii** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 432, t. 124.
1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 95).

OMPHALOCARPUM P. Beauv.

- Omphalocarpum bomanehense** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 422, fig. 74-76, t. 116.
1906 (Marc. Laurent). — XI : Bomanch (M. Laur. 1073).
- Omphalocarpum Cabrae** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 421, fig. 73, t. 128.
1896 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 2).
- Omphalocarpum Laurentii** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 417, fig. 69, t. 114-115.
1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).
- Omphalocarpum sankuruense** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 419, fig. 70-72, t. 112-113.
1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bolongula (Ém. et M. Laur.).

SYNSEPALUM Baill.

- Synsepalum dulcificum** [*Schumach. et Thonn.*] *Daniell* ex *S. Bell* in *Pharm. Journ.* VI, n. 10 (1852) 445; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 143; *Engl. Monog. Afr. Pl.-Fam.* VIII [Sapot.] (1904) 32, t. 7, c.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 173; II (1907) 62 et Miss. Laurent (1907) 433.
- Bumelia — *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 150.
Sideroxylon — A. DC. Prodr. VIII (1844) 183; *Bak. in Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 583.
- 1896 (A. Dewevre). — V : env. de Lukolela (Dew.) — VIII : Eala. — Nom vern. : **Bomanga** (Ém. et M. Laur.); le Haut-Lopori (Biel.). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Synsepalum stipulatum [Radlk.] Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII [Sapot.] (1904) 31, t. 7, fig. D, a-g.

Stironeuron — Radlk. ex De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I (1899) 32 et Reliq. Dewevr. (1901) 143.

1896? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

BAKERISIDEROXYLON Engl.

Bakerisideroxylon revolutum [Bak.] Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII [Sapot.] (1904) 34, t. 11, fig. B; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 62.

Sideroxylon — Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 563.

Vincentia — Pierre Not. bot. Sapot. (1891) 37.

1905 (F. Seret). — IX : env. de Bumba (Ser. 1).

MIMUSOPS L.

Mimusops affinis De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 224.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Munga-Gu** (Verd. 222).

Mimusops congolensis De Wild. Miss. Laurent (1907) 436, fig. 82-83.

Ann.? (Coll.?). — Bas-Congo (Coll.?).

Mimusops cuneifolia Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 506; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 188; Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII [Sapot.] (1904) 64.

1816 (Chr. Smith) — Bas-Congo (Sm.).

Mimusops ubangiensis De Wild. Miss. Laurent (1907) 433, fig. 84.

1903 (Ém. et Mare. Laurent). — X : rég. de l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Mimusops Welwitschii Engl. in Engl. Jahrb. XII (1890) 524, t. 21, fig. A et Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII [Sapot.] 58, t. 20, fig. A; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 645.

Le type croît dans l'Angola.

— — form. **grandifolia** De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 62.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent. : Gill. 2366, 2768).

EBENACEAE

EUCLEA L.

Euclea divinorum *Hiern* in Trans. Cambr. Phil. Soc. XII (1873) 79; Monog. Eben. 99 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 513; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 188.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Euclea katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 222.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Sakonnida** (Verd. 93).

MABA Forsk.

Maba buxifolia *Pers.* Syn. pl. II (1807) 606; *Hiern* Monog. Eben. 116 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 515.

Ferreola guineensis *Schumach.* et *Thom.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 448.

Maba — *A. DC.* Prodr. VIII (1844) 241.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

DIOSPYROS L.

Diospyros incarnata *Guerke* in *De Wild.* Étud. fl. Bas et Moy.-Cgo, II (1908) 335 [nom. tant.].

1907 (J. Gillet). — VIII : Mondjo [Ikelemba] (Gill.).

Diospyros Loureiriana *G. Don* Gen. Syst. Bot. IV (1837) 39; *Hiern* Monog. Eben. 194 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 322; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 188.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Obs. — M. Hiern (l. c.) rapporte la plante de Smith à la var. *heterotricha* Welw. ex *Hiern* in *Trimen* Journ. of Bot. (1875) 355.

Diospyros mespiliformis *Hochst.* ex *A. DC.* in *DC.* Prodr. VIII (1844) 672; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 651; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 222 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 119-123.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kasagola** (Verd.).

Diospyros monbuttensis *Guerke* in Engl. Jahrb. XXVI (1898) 66.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : l'Uele [pays des Mangbetta] (Schw. n. 3598)

OLEACEAE

JASMINUM L.

Jasminum dichotomum *Vahl* Symb. bot. I (1790) 26; *DC.* Prodr. VIII, 307; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 9; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 259 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 63.

J. guineense *G. Don* Gen. Syst. Bot. IV (1837) 61.

J. noctiflorum *Afzel.* Remed. Guin. (1813) 25; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 222.

J. ternum *Knobl.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 535.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gil) — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.); Bamibili (Ser. 12 b). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kisjinko** (Verd.). — Ind. non cl. : vallée du Lomami (Desc.).

Jasminum Schweinfurthii *Gilg* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 72; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 3.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Muuza (Schw. 1668).

Jasminum Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 63.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 279).

LINOCIERA Sw.

Linociera nilotica *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 106, t. 117; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 76 [B. S. B. XXXVII, 121]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 19.

Mayepea — *Knobl.* in Engl. Jahrb. XVII (1898) 528; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 62.

1896 (Ém. Laurent). — IX : île en aval d'Upoto (Ém. Laur.); Bumba (Pyn.).

SCHREBERA Roxb.

Schrebera trichoclada *Welw.* [Sertul. Angolense] in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 41; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXX (1901) 72; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 97; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 15.

Nathusia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 412; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 657. 1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kabale-Bale** (Verd.).

APOCYNACEAE

VAHADENIA Stapf.

Vahadenia Laurentii [De Wild.] Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 30, (1904) 589; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 451.

Landolphia — *De Wild.* in Rev. cult. colon. VIII (1901) 229; XI (1902) 76 et in Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 62-67; *De Wild. et Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1901) 94, t. 15; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 169.

1895 (Ém. Laurent). — II a : Mushipila (Ém. Laur.); la Lukuta. — Nom vern. : **Mpusa** (Kest.). — V : la Sele. — Nom vern. : **Malombo** (Coll.); Kimnenza (Gill. 1666). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Momponpo** (Sap.). — VIII : Eala (M. Laur. 1870); secteur de Mondongo; Tshuapa; Moma (Jesp.). — XII c : zone de Bomokandi. — Nom vern. : **Bobo** [Lamboray]. — XV : Kole; Dibebe-Kapepna (Flam. 306; route de Luebo à Luluabourg (Coll. ?); Galikoko-Luebo (Gent.); Koudue (Ém. et M. Laur.); Bena-Dibebe. — Nom vern. : **Oloankima** (Flam. ; Rossel. 18); Katak-Kombe. — Noms vern. : **Pongundeli**, **Muninga-Sendive** (Serm. 10, 11). — Incl. non cl. : Tshimbumbang. — Nom vern. : **Tshibobobo** (Sap.)

— — var. **grandiflora** [De Wild.] Stapf l. c. IV¹ 1904) 589; *De Wild.* l. c. (1907) 452.

Landolphia Laurentii *De Wild.* var. — *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 64; *De Wild. et Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 96.

1901 (L. Gentil). — II : Temvo (Ém. et M. Laur.). — V : Kimuenza (Gill.). — VII : Busenga [bassin de la Lukenie] (Gent.). — XV : Bena-Dibebe (Ém. et M. Laur.; Cransb.).

— — form. **obtusifolia** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 452.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 129).

LANDOLPHIA P. Beauv.

Landolphia Dewevrei Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 52, (1904) 592; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 73-77; Miss. Laurent (1907) 482, t. 147, 153 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 172-174.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Ibali. — Nom vern. : **Tentze** (Coll. ?). — VIII : Eala (M. Laur. 1871); Moma (Jesp.). — IX : Butaba et env. — Nom vern. : **Mosanganda** (Pyn. 92, 1045). — XI : Yambuya (Pyn. 52). — XII c : env. de Nala (Sap.). — XV : Kasongo-Baterela. — Nom vern. : **Lupembe** (Sap.); Lac Foa (Sap.); Batempa (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Walaralapira** [Asande].

Landolphia Droogmansiana *De Wild.* in *De Wild. et Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 59-60, t. 3; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 593; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 455-458, fig. 85-86.

1902 (L. Gentil). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Gungu-Bu-Dutu** (Coll. ?) — XV : Kanda-Kanda (Gentl.).

Landolphia Dubreucqiana *De Wild.* in *De Wild. et Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 92-93, t. 13-14; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 593; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 453 et Nol. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 174.

1896 (A. Dewèvre). — VII : Inongo; Isaka (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 251); Eala. — Nom vern. : **Matofe-Ampumba** (Pyn. 681, 714, 1288, 1623, 1631; M. Laur. 60, 1238, 1876, 1877, 1902); secteur de Mondombe (Jesp.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 1036 a). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.); Munungu (Lescr. 252); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Kela** (Rossel. 19; Flun.); le Kasai (Luja); Lubue (Gentl.); Kasongo-Batetela; Kapulumba (Sap.); env. de Lubefu; Kole (Flam.). — Nom vern. : **Musumbo** [Lulua].

OBS. — Cette espèce paraît assez répandue dans tout le domaine du Congo (De Wild. et Gentil).

Landolphia florida *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 444; *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinneanae, 30, t. 13 A; *Hallier* f. Kautschuklian. 89; *Jumelle* Pl. à caoutch. et à gutta, 54; *Warb.* in *Tropenpflanzer*, III (1899) 311, fig. 65 et Kautschukpil. 117, fig. 61; *Vilbouch.* Les pl. à caoutch. 221; *Henriq.* Kautschuk (1899) t. 3-4; *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. 67 et fig. p. 68; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 145; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 38, 590; *De Wild. et Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 87, 88, t. 11-12; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 64 et Miss. Laurent (1907) 482.

Vahea — *F. Muell.* in *Wittst.* Org. constit. Pl. (1880) 258.

Pacouria — *Horn* Cat. Welw. Pl. I (1898) 662.

L. comorensis *Boj.* var. — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 402-405, fig. 1 B et 2; in *Engl. Pil. Ost-Afr.* B, 456, fig. 19 et 458, fig. 20 et in *Engl. et Prant* Nat. Pflanzenfam. IV², 128 et 129 fig. 50 B et 51; *A. Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 18; *Kohler* Mediz. Pil. III, 13, cum xyl.; *Sadebech* Kulturgew. Deutsch. Kolon. 274, fig. 105.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Zambi (Dew.); Ile Mateba (Dew.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : Kisanu. — Nom vern. : **Dipumunu** (Gill.); Lukolela et env. (Dew.). — VI : Madibi (Lescr.; Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.; Ser. C. F. 195); Bodzura. — Nom vern. : **Songa** (Coll. ?). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Bolombobo** (Dew.); Eala (Flam. 52). — IX : Bumba (Dew.); Peza (Krek.). — X : l'Ubangi (Coll. ?); Imese. — Nom vern. : **Barakota** (Coll. ?); zone de Bomokandi (Lamboray). — XII d : pays des Mangbettu — Nom vern. : **Djgua** (Coll. ?). — XII e : Kagube (Coll. ?). — XIII c : Wabundu (Dew.). — XV : Kondue (Luja); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Doma** (Rossel. 1; Flam. 1); Munungu. — Nom vern. : **Naondongo** ? (Sap.); chutes du Lubi (Gentl.); env. de Lubefu (Coll. ?). — XVI : Bunkeya; Toa (Desc.). Haut-Marungu (Deb.). — Nom vern. : **Ilombo** [Lulanga]; **Mondongo** ? [Madibi] (Sap.); **Ponguendole** [Lubefu] (Flam.).

M. De Wildeman fait des réserves au sujet de l'exactitude de ces derniers noms [*Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 176].

L. florida var. **leiantha** Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1869) 107; *Hallier f.* Kautschuklian. 93; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 39; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo, 89-91; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 67; Miss. Laurent (1907) 481 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 176.

L. florida Hook. f. in Bot. Mag. (1887) t. 6963.

L. comorensis K. Schum. in Engl. Jahrb. XV (1892) 102; *Jumelle* Pl. à caoutch. et à gutta, 56; *Sadebeck* Kulturgew. Deutsch. Kolon. 276.

Vahea — *Boj.* Hort. Maurit. 1837: 207; *D.* Prodr. VIII, 328 et in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XXII, 2 (1850) t. 41, fig. 4-7.

L. comorensis K. Schum. var. *florida* K. Schum. in Sitz.-Ber. Berl. Akad. Wiss. XVI (1900) 195.

Willughbeia cordata Klotzsch in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 283.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela et env. (Dew. 830 a; Em. et M. Laur.); env. de Kisantu (Gill.). — VII : Eala et env. — Noms vern. : **Bolombola**; **Hombola** (M. Laur. 1873; Pyn. 1160); Coquilhatville (Dew. 584); env. de Bikoro (Coll.?). — X : l'Ubangi; Inese. — Nom vern. : **Inga** (Luja); au N. de Banzville. — Nom vern. : **Mokwa** (Coll.?). — XI : Limbutu (M. Laur. 1894). — XII : l'Ele. — Nom vern. : **Ndevre** (Delp.). — XII b : Bambili. — Nom vern. : **Pobiru** (Coll.?). — XIII a : Romée (Coll.?). — XV : env. de Lusambo (Flam.).

Landolphia Gentilii De Wild. Apoc. à latex recueilli par Gentil (1901) 20; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 61-64, t. 4; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 51, in obs.; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 473-474 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 177.

1900 (L. Gentil). — VII : entre le Lac Tumba et le Lac Léopold II (Coll.?). — VII : bassin du Ruki, de la Lopori et de la Maringa (Coll.?): secteur de Mondombe. — Nom vern. : **Bumuke** (Jesp.). — XI : entre la Lopori et le Barumbu (Coll.?). — XII c : env. de Nala (Ser. et Van Geersdael; Ser. 758, 846). — XV : Kanda-Kanda (Coll.?): env. de Kondue (Luja). — Nom vern. : **Walaralapira** [Asande].

OBS. — Postérieurement, M. Stapf [l. c. (1904) 590] a réuni le *L. Gentilii* au *L. ovariensis* P. Beauv.

Landolphia humilis K. Schum. in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 306, fig. p. 228; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 53, 592; *Ihuu* in Rev. cult. colon. XI, 322-328; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 124; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 453-455 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 178-181.

1899 R. Schlechter). — IV : distr. des Cataractes (Coll.?). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12544; Em. et M. Laur.); Léopoldville (Pyn. 137, 166); Chenal Léokwam (Em. et M. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.; Pyn. 309; Gent. 94 b); Dolo (M. Laur. 471); Sabuka (Coll.?). — VI : vallée de la Djuma (Gill.); Bandundu (Coll.?): Dima (Leser. 359; Sap.). — VII : Tollo (Coll.?): la Fini (Coll.?): Malepie (Em. Laur.). — XV : distr. du Lualaba-Kasai (Coll.?). — Nom vern. : **Bungu-Bungu** [Kwango or.].

Landolphia Klainei *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 13; *Jumelle* Pl. à caoutch. et à gutta, 40; *Hallier f.* Kautschuklian. 43, 79; *Warb.* Kautschukpfl. 119; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. 83, c. fig.; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 52, 591; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 67-77, t. 3; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 67-75, t. 5-7 et fig. 5-6; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 475-479, fig. 98-101 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 181-186.

L. owariensis A. *Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 36 pr. p.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Mayenga-Zambi (Coll. ?). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Madungu** (Kest.); la Lemba (Dew. 362); la Lukula (Cassart). — V : Léopoldville. — Nom vern. : **Zoko** (Gill. 2525; M. Laur. 411); Bokala. — Nom vern. : **Malemanso** (Ëm. et M. Laur.); Sabuka. — Nom vern. : **Zoko** (Coll. ?); Tua (Coll. ?). — VI : entre Dungu et Popokabaka (Coll. ?); env. de Dinga. — Nom vern. : **Bolombola** (Coll. ?); Muene-Dinga (Gent.). — VII : Mushio (Coll. ?). — VIII : bords de la Tshuapa [sect. de Mondombe] (Jesp.). — X : Imese. — Nom vern. : **Iboboro** (Coll. ?). — XI : Yambuya (Solh. 116). — XII : Poko (Coll. ?). — XII b : Bambili. — Nom vern. : **Biombio** (Coll. ?). — XII c : Gombari (Ser. 742). — XV : le Sankuru (Dem. 106); Lubefa (Cransh., 26, 37); Lusambo (Ëm. Laur.); Muungu (Lescr. 23); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Muemie** (Rossel. 6; **Flam.** 4, 284 et n. III); Pania-Mutombo; chutes Wolff (Gent.); Mokole. — Nom vern. : **Iboboro** (Coll. ?). — Ind. non cl. : Binm-Bium (Van Geersdael); env. de Boblo (Dew. 721 a). — Nom vern. : **Matoli** [Bangala] (Dew.).

Landolphia Lecomtei A. *Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 25; *Warb.* in Tropenpflanzer, III (1899) 312 et Kautschukpfl. 118; *Vilbouch.* et *Warb.* Pl. à caoutch. 228; *Hallier f.* Kautschuklian. 88; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 42; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 81-83 et Miss. Laurent (1907) 484-485, t. 148.

1903 (Ëm. et Marc. Laurent). — II a : Beuza-Masola (Ëm. et M. Laur.); la Lukula. — Nom vern. : **Mpusa** (Kest.).

Landolphia lucida *K. Schum.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 25; A. *Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. 32; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 189; *Henriq.* Kautschuk, t. 4; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 59.

Dictyophlebia — *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 93

1882 (P. Pegge). — XV : rég. du Kasai (Pg.); Mukeuge (Pg. 1038, 1236).

Landolphia ochracea *K. Schum.* ex *Hallier f.* Kautschuklian. (1899) 86, t. 1 [Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt, XVII (1899) 3, Beih. 86]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 40; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 187.

1905 (Coll. ?) — II a : le Mayumbe (Coll. ?). — V : Sabuka, en 1907 (Spanaro).

— — var. **breviflora** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 486 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 188.

L. ochracea *De Wild.* [non *K. Schum.*] *Miss. Laurent* (1907) 485, t. 151.

1904 (S. Bieler). — VIII : Iteko [Haut-Lopori]. — Noms vern. : **Ikele**; **Towagna**. (Biel.) — XII d : Bambili (Coll. ?). — Ind. non cl. : Makala. — Nom vern. : **Dambola**.

Landolphia owariensis *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 55, t. 31; *A. Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 36; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 189; *Jumelle* Pl. à caoutch. et à gutta, 42; *Sadebeck* Kulturgew. Deutsch. Kolon. 272; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 77 [B. S. B. XXXVII, 122]; *Hallier f.* in *Tropenpflanzer*, III (1899) 312 et *Kautschukpfl.* 118; *Warb.* *Kautschukpfl.* 42; *Henriq.* *Kautschuk*, L. 3-4; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewèvre. (1901) 146; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Expel. 229 [fig. p. 128; *De Wild.* Apoc. à latex recueilli par *Gentil* (1901) 11-19; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 49; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 51-58, t. 1, 2 et 17, fig. 5-8; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 459-473, t. 152 et fig. 87-97, 119 et *Not. pl. util.* ou *intér.* du Cgo, II (1908) 189-199.

Paederia — *Spreng.* *Syst. veget.* I (1825) 669.

Vahea — *F. Muell.* in *Wittl.* *Org. constit.* Pl. (1880) 258.

Pacouria — *Hiern* *Car. Welw.* Pl. I (1898) 661.

L. *Heudelotii* *Schlechter* [non *DC.*] *Westafr. Kautsch.-Expel.* (1900) 9.

Vahea elastica *Klotzsch* ex *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 50, in *syn.*

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); la Lemba (Dew. 362). — IV : Tumba (Ém. et M. Laur. — V : distr. du Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); env. de Leopoldville. — Noms vern. : **Bari**; **Akariabeti** (Gill. 2525; Sabuka. — Nom vern. : **Bikuli** ou **Bikule** (Coll. ?); Bolobo. — Noms vern. : **Botowe**; **Bituba** (Dew.). Tua. — Nom vern. : **Bikule** (Coll. ?); forêts de la Sele. — Noms vern. : **Makuku**; **Bikuli** (Coll. ?); Sanda. — Nom vern. : **Bikuri** (Odd. in Gill. 3748); env. de Lemfu Gossart); env. de Kisantu. — Nom vern. : **Lisuki** (Gill.). — VI : le Kwango orient. [part. mérid.] chutes François-Joseph (Coll. ?); Zovo [sur la haute Wamba] (Coll. ?); entre les rivières Inzia, Tungila et Wamba (Coll. ?); vallée de la Djuma (Gent.); Kundi-Dunga. — Nom vern. : **Kinkwite** (Coll. ?). — VII : Kundu. — Noms vern. : **Samba**, **Nsamba** (Coll. ?); env. d'Ila. — Nom vern. : **Botope** (Coll. ?); Kutu. — Nom vern. : **Bole** (Élskens; Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Coll. ?); Équateur (Coll. ?) env. d'Eala. — Nom vern. : **Matofe-Mongo** (M. Laur. 57, 127, 174, 175, 176, 216, 1872, 1891; Pyn. 1747; Mozambi (M. Laur. 1893); env. de Bikoro (Coll. ?); Ikenge. — Nom vern. : **Matofe-Mongo** Paulus; Lac Tumba. — Nom vern. : **Bomoke** (Ém. et M. Laur.); chenal de Monkero (Ém. et M. Laur.); bassin de la Lulanga (Dew. 811 a); secteur de Mondombe. C. — Nom vern. : **Kole** (Jesp.); Beet-Moma. — Nom vern. du fruit : **Baloma** (Jesp.). — IX : pays des Bangala. — Nom vern. : **Matoli** (Dew. 721 a) — X : P'Ubangi (Ém. et M. Laur.); Imese. — Noms vern. : **Ikekeke**; **Bolundu-Kete** (Coll. ?). — XI : P'Arwimi. — Noms vern. : **Ahangwila**; **Malola** (Coll. ?); Isangi (Ém. et M. Laur.); Yambuya (M. Laur. 1890). — XII : P'Ele. — Noms vern. : **Nikandi**; **Biombian** (Delp.); M'udele (Delp.). — XII b : Bambili. — Noms vern. : **Babetet**; **Asangia**; **Bomet** (Coll. ?). — XII c : Poko. — Nom vern. : **Angwanga** (Coll. ?); Gombari (Ser. 736; zone de Bomokandi [Lamboray]). — XIII a : Stanley-Falls (Dew. 1488). — XIII c : Le kandu (Gossart). — XV : Inkongo (Sap.); Kondue. — Nom vern. : **Kadjanga** (Lut.) ; Kole (Craensh. 24, 27); Bolongula (Ém. et M. Laur.); Mokolo. — Nom vern. : **Bolundu-Kete** (Coll. ?); Beua-Dibele. — Nom vern. : **Okonga**; **Dundu** (Ém. et M. Laur.; Flam. 285, et n. II); Mange; Munungu (Ém. et M. Laur.);

env. de Lubefu. — Noms vern. : **Oloma**; **Okango** (Coll.?) : rives du Lubi (Sap.); Lac Foa. — Nom vern. : **Kaiembe?** (Sap.) : Katak-Kombe (Serm. 1, 2, 3). — XVI : Toa (Desc.), — Ind non cl. : Bari [Bali ?, VII]. — Nom vern. : **Akariabeti** (Coll.?) ; Kikongi (Coll.?). — Nom vern. : **Nabo** [Maugbettu] (Coll.?)

Landolphia robusta [*Pierre*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1904) 43; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 487. t. 155, fig. 102-103 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 205.

Aphanostylis — *Pierre* in B. S. Linn. Paris. Nouv. Sér. (1893) 92.

L. Manuii *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 146.

1896 (A. Dewèvre). — VI : Madibi (Lescr. 96; Sap.). — VII : env. d'Ila (Coll.?). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 250); Eala (Pyn. 909, 1256, 1482, 1691; M. Laur. 896, 1288); Bala-Lundzi [Momboyo] (Pyn. 267); sect. de Mondombe. — Noms vern. : **Sjolongo**; **Omongemonge** (Jesp.). — IX : Bumba et env. (Dew. 885; Pyn. 82). — XII b : Baumbili. — Nom vern. : **Bobo** (Coll.?). — XV : Bena-Dibele. — Nom vern. : **Kelela** (Rossel.; Flam.); Dibele (Ém. et M. Laur.); le Saukuru (Ém. et M. Laur.); Katak-Kombe (Serm.); Kapulumba (Sap.); env. de Lubefu (Coll.?). — Noms vern. : **Lukunatchima** [Kwilu]; **Ditolo** [Lulua].

Landolphia scandens [*Schumach.* et *Thonn.*] *F. Didr.* [Pl. nonnull. Mus. Holm.] in Vidensk. Meddel. naturh. Kjob. (1855) 190; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 44; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 67; Miss. Laurent (1907) 489, fig. 104 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 206-207.

Strychnos — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 127; *DC.* Prodr. IX, 13.

L. Petersiana *Dyer* var. *crassifolia* *K. Schwa.* in Eugl. Jahrb. XV (1892) 402, t. 12, fig. A.

Pacouria *crassifolia* *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 663.

Aphanostylis *mammosa* *Pierre* var. — *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 92.

A. *mammosa* *Pierre* var. *mucronata* *Pierre*, l. c. (1898) 92.

L. Petersiana *Dyer* var. — A. *Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 30 pr. p.

L. *scandens* *F. Didr.* var. *gennina* *Hallier* f. *Kautschukian.* (1899) 80.

L. *scandens* *F. Didr.* var. *coriacea* *Hallier* f. l. c. (1899) 81.

L. *Welwitschii* — *Dyer* — ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 146.

L. Petersiana *Jumelle* Pl. a caoutch. et à gutta (1903) 57 pr. p.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill. 3232, 4052). — II a : route de Poiti à Tshoa (Dew. 393); la Lukula (Coll.?). — VII : Iballi (Ém. et M. Laur.); Ganda (Body). — VIII : secteur de Monia vers la Tshuapa; secteur de Mondombe (Jesp.); Équateur (Pyn. 380); Irebu (M. Laur. 636); Basankusu. — Nom vern. : **Monondongo** (Bruu.); Eala. — Nom vern. : **Mondonga** (M. Laur. 896; Pyn. 985, 1658, 1716); Iala [la Bariunga] (Brun.). — IX : Umanji (Krek.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.); Limbutu (M. Laur. 976). — XV : Lubue (Gent.); Kasongo-Batetela. — Nom vern. : **Fundiakima** (Sap.); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Olole** (Rossel. 25; Flam.). — Nom vern. : **Lokalia** [Kanda].

Landolphia Thollonii A. *Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 50; *Warb.* Kautschukpfl. 120; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr.

IV^a, 58; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 8, 93-96; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1901) 117-119, t. 25-26; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68, (1906) 301; Miss. Laurent (1907) 491-495, fig. 105-107 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 208.

L. owariensis *P. Beauv.* var. *parvifolia* *Hallier f.* Kautschuklian. (1899) 41, 74 pr. p.

L. *Kirkii* *Dyer* var. — *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 88 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 828].

1902 (J. Gillet). — IV : distr. des Cataractes (Gent.). — V : plaines du Stanley-Pool. — Nom vern. : **Lunda** (Rouy); env. de Léopoldville (Gill.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Dolo. — Nom vern. : **Botofi** (Sap.); CC. de Dolo à Kimpoko (M. Laur. 592); Kinshassa (Sap.); rég. de la Lula-Lumeue (Hendr. in Gill. 3071); Boko; Kisauntu (Gill. 69); Galiema [cult.] (Pyn. 116). — VI : plaines du Kwaugo (Rouy); env. de Popo-kabaka (Coll.?). — XV : la Kantscha; la Lubue; la Loange (Gent.); Babundu (Briart).

CLITANDRA Benth.

Clitandra Arnoldiana *De Wild.* in Compt.-Rend. Acad. sci. Paris, CXXXVI (1903) 399-400 et Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 20; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 80-82, t. 9-10, fig. 7; *Chevalier* in Rev. cult. colon. XV, 5; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 20-21; II (1908) 214-217; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 301 et Miss. Laurent (1907) 495-501, fig. 108-110.

C. Gilletti *De Wild.* Obs. Apoc. à latex recueilli par Gentil (1903) 37-38.

1904 (1) (Ed. Luja). — II a : zone du Mayumbe. — Nom vern. : **Fulu-M'Boa** (Coll.?). — IV : distr. des Cataractes. — Nom vern. : **Malumbo** (Coll.?). — V : Bokala (Coll.?): forêts de la Sele, de la Lumene, de la Lufutuu (Coll.?): Tua. — Noms vern. : **Makalanga**; **Mojon** (Coll.?): Malimba; Banza-Boma — Nom vern. : **Makalanga** (Coll.?). — VI : Malibi et env. (Sap.); entre Kundi et Popokabaka. — Nom vern. : **Kindinga** (Coll.?): route de Kundi-Dinga; env. de Faylela. — Nom vern. : **Kindinga** (Coll.?). — VII : Lac Léopold II. — Nom vern. : **Bitope** (Elsk.); Kutu (Coll.?): Ila. — Nom vern. : **Moloma** (Elsk.); env. de Ganda. — Nom vern. : **Zamba** (Body); Nioki. — Noms vern. : **Matoli**; **Malopi** (Coll.?). — VIII : secteur de Mondombe. — Noms vern. : **Setete**; **Mondongo** (Jesp.); Eala et env. (M. Laur. 1112, 1885, 1887, 1888); env. de Bikora (Coll.?): Ikenge (Paulus). — Nom vern. : **Mondongo** (Paulus). — X : Imese. — Nom vern. : **Barakota** (Ém. et M. Laur.); Yakoma. — Nom vern. : **Mokwaa** (Coll.?). — XI : l'Aruwimi. — Nom vern. : **Abodo** (Coll.?): Barumbu (Coll.?). — XII c : Poko (Coll.?): zone de Bomokandi (Lamboray). — XII d : rég. des Maugbettu. — Nom vern. : **Adjokosetamba** (Coll.?). — XV : Bena-Dibeje. — Nom vern. : **Dongetele** (Rosset 5, 23; Flam. 7 et 14); Bombaie; Munungu (Ém. et M. Laur.); Kondue. — Nom vern. : **Moloma**; **Bitopa** (Luja, 2); Katak-Kombe (Serin. 3, 4; Cransh. 30); Kole (Cransh. 29); env. de Lubefu (Coll.?): Mokole. — Nom vern. : **Barakota** (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : nom de la plante : **Undulu**; fruit : **Olva**; caoutchouc : **Lukata** [Lubefu]; **Kindandu** [Buluba]; **Sonko**; **Kaembe** [Lulua]; **Mumbumu** [Kwilu]; **Badongo** [Bangala]

(1) Un échantillon de cette espèce, avec la date de 1900, se trouve au Jardin Botanique de l'État, mais sans nom de collecteur.

Obs. — Dans la *Fl. of trop. Afr.* IV¹ 594, M. Stapf réunit cette espèce au *Cl. orientalis* K. Schum.

C. Arnoldiana var. **Sereti** *De Wild.* Miss. Laurent (1908) 500.

1906 (F. Seret). — XII c : Arebi (Ser.).

Clitandra cirrhosa *Radlk.* in Abhandl. naturhist. Ver. Bremen, VIII (1883) 400; *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 219; *Hallier f. Kautschuklian.* (1899) 129; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 67; *De Wild.* Miss. Laurent (1908) 501.

Carpodinus — *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 219.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3765). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Clitandra Gentilii *De Wild.* in Belg. colon. (1903) 137 et Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 25-26; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. Cgo (1904) 112; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 596.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuina (Gent.; Gill. 2857).

Clitandra Kabulu *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 219.

1907 (A. Sapin). — XV : Kapulumba. — Nom vern. : **Kabulu** (Sap.).

Clitandra Lacourtiana *De Wild.* in *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 110, t. 24; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 596; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 501, t. 163 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 220.

1902 (L. Gentil). — V : Tua. — Nom vern. : **Gamenkuye** (Coll.?). — VIII : env. de Bikoro (Coll.?): Eala (Pyn. 528). — XV : Kanda-Kanda sur les bords de la Luile (Gent. 64); Katako-Kombe (Serm. 5); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Kodolembe** (Kessel. 15); Lac Foa (Sap.). — Nom vern. : **Kaia** [Baluba] (Sap.).

Clitandra laxiflora [*K. Schum.*] *Hallier f.* Kautschuklian. (1899) 124 [Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt, XVII, 124]; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 502, fig. 111 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 221.

Carpodinus — *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 220.

Aphanostylis — *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 90.

Clit. cymulosa *Stapf* [non *Benth.*] in Journ. Linn. Soc. XXX (1894) 87.

Carp. incerta *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1897) 132.

1905 (Albéric Bruneel). — VIII : Basankusu (Bruu.). — XI : env. de Yambuya (Sobl.). — XV : env. de Bena-Dibele (Flam.).

Clitandra Mannii *Stapf* in Kew Bull. (1894) 20 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 69; *Jumelle* Pl. à caoutch. et à gutta, 62; *Hallier f.*

Kautschuklian. 125; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 503 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 222.

Aphanostylis Maunii Pierre in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 89.

Clit. exserrens K. Schum. in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 219.

Aphanostylis — Pierre l. c. II (1898) 90.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : entre Coquilhatville et Lulanga (Pyu, 806). — VIII : secteur de Mondombe: Moma (Jesp. 45, 62). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XI b : Bambili? — Nom vern. : **Mapeleko** (Coll.?). — XII c : Gombari (Ser. 733). — XV : Bena-Dibele. — Nom vern. : **Weloafu** (Rossel, 26). — Ind. non cl. : Poto [Poko?, XIII a] (Coll.?): Bari [Bali?, VII]. — Nom vern. : **Ekú** (Coll.?).

Clitandra Nzunde *De Wild.* in Belg. colon. (1903) 126 et in Not. Apoc. laticif. du Cgo, I (1903) 22; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 83; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ 595; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 222.

1901 (Coll.?). — X : Banzyville (Coll.?).

Clitandra parvifolia [Pierre] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 63; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 223.

Cylindropsis — Pierre in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 39; *Hallier* f. Kautschuklian. (1899) 132; K. Schum. in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. Ergauz I (1900) 55.

Carpodinus. — Pierre l. c. (1898) 39.

1904 (Éd. Luja). — VIII : euv. de Mondombe et de Moma (Jesp.). — XV : Bena-Dibele (Coll.?): Kondue. — Nom vern. : **Kindandu** (Luja). — Nom vern. : **Tokinda** [Basongo-Meno] (Sap.).

Clitandra robustior K. Schum. in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 130; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 71; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 224-226.

C. myriantha K. Schum. ex Pierre in B. Soc. Linn. Paris, II (1898) 40; *Hallier* f. Kautschuklian. (1899) 121.

Carpodinus — K. Schum. in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 221.

Landolphia Preussii K. Schum. ex A. *Devèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 56.

1907 (A. Sapin). — VI : env. de Madibi (Sap.). — VIII : Moma (Jesp.): Belo. — Nom vern. : **Itoli** (Jesp. 58); Mondombe (Jesp. 50). — XII c : zone de Bomokaudi. — Nom vern. : **M'Bitli** (Lamboray). — XV : Katakó-Kombe (Dobbelaere). — Noms vern. : **Sonko**; **Kaembe** [Lulua] (Sap.).

Clitandra Sereti *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 226.

1907 (F. Seret). — XII c : rives de l'Aruwimi sur la route de Gombari à la Duru (Ser. 731).

CARPODINUS R. Br.

Carpodinus Bruneelii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 504, t. 149 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 230.

1906 (Albéric Bruneel). — VIII : Yala (Brun. 36). — XV : Bena-Dibele? (Flam. 268).

Carpodinus congolensis *Stapf* in Kew Bull. (1898) 303; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 34 et Reliq. Dewevr. (1901) 146; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 76; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 505.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Bingila (Dup.): Shimbete. — Nom vern. : **Bolico-Bolico** (Dew. 311). — XV : le Kasai (V. Durand).

Carpodinus Eetveldeana *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 107, t. 23; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 597; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 506 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 231.

1902 (L. Gentil). — VIII : secteur de Mondombe. — Nom vern. : **Baloma** (Jesp.). — XV : entre Luebo et Luluabourg (Gent. 60); Dienga-Monene (Gent. 60); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Abutadjamba** (Rossel. 11; Flam.); Katakò-Kombe. — Nom vern. : **Akulshu-Aramba** (Serm. 8). — Ind. non cl. : Kolomoam (Flam.).

Carpodinus Gentilli *De Wild.* Apoc. à latex recueilli par Gentil (1901) 26-28; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 99, t. 16, 17, 19, fig. 4-7; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 88, 600; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 506-508, t. 161 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 232-233.

1905 (L. Gentil). — V : bord de la Sele; env. de Sabuka. — Nom vern. : **Mampoto** (Coll. ?); env. de Kisantu. — Nom vern. : **Masinja** (Gill.); Bokala. — Nom vern. : **Mosla, Manzenga** (Coll. ?). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Ganda [Lac Léopold II]. — Nom vern. : **Ezendja** (Body); env. d'Ila (Coll. ?). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); secteur de Mondombe, C. — Nom vern. : **Masindu** (Jesp.); env. de Bikoro. — Nom vern. : **Loliki** (Coll. ?); — XII c : Poko [Uele]. — Nom vern. : **Bapenongwala** (Coll. ?); zone de Bomokaudi (Lamboray). — XII d : Dungu (Ser. 4). — XIII : env. de Makola (Coll. ?). — XV : Djoko-Punda (Lescr. 292); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Ileka** (Rossel. : Flam. 108); le Sankuru (Sap.); Kondue. — Nom vern. : **Madimbi** (Luja); Katakò-Kombe. — Nom vern. : **Osindja** (Serm. 13); Lubefu et euv. (Flam.). — Noms vern. : **Masisi** [Kwilu]; **Businda** [Bangala].

Carpodinus gracilis *Stapf* in Kew Bull. (1898) 303 et in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 35; Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss Sér. 2, I, 34] et Reliq. Dewevr. (1901) 147; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 85, 599; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 43; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 129, t. 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 509.

Carpodinus camptoloba K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 132.

Clitandra gracilis Hallier f. Kautschuklian. (1899) 117.

1885 (R. Buttner). — IV : distr. des Cataractes (Gent.). — V : plaines du Stanley-Pool (Coll.); Léopoldville (Luja); entre Léopoldville et Sabuka (M. Laur. 548); entre Léopoldville et Kimuenza (Ém. Laur.); Kimuenza (Dew. 516); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kisantu et env. — Noms vern. : **Bungu-Bungu**; **Dinsona**; **Dinsonia** (Gill. 71, 2223, 3516, 3690); rég. de la Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3093). — VI : plaine du Kwango (Coll.); Muene-Putu-Kasongo (Buett. 480). — VIII : Eala [cult.] (Pyn. 648; M. Laur. 1190, 1892). — XV : rég. du Lac Dilolo (Questiaux, 1).

***Carpodinus Jesperseni* De Wild.** Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 235.

1907 (Knut Jespersen). — VIII : secteur de Mondombe (Jesp.).

***Carpodinus lanceolata* K. Schum.** in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 132; *Stapf* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 36; II (1900) 39 et Reliq. Dewevr. (1901) 148; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68, (1906) 304; *Warb.* in Zeitschr. trop. Landwirthsch. (1897) n. 6, 8 et in Tropenpfl. I (1897) 134, fig. A-D; *Henriq.* Kautschuk, 19, t. 1; *Hallier f.* Kautschuklian. 115, t. 3, fig. 5; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 85, 599; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo, (1903) 39, 56, 94; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 130-132; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 52, cum xylogr.; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 509, t. 148 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 236.

1882 (P. Pogge). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool; Dolo (Sap.; Schl. 12447; Pyn. 124); Léopoldville (Ém. Laur.; Dew. 489); Chenal (Ém. et M. Laur.); Kwamouth (M. Laur. 618; Flam.; Gent. 194); Tampa (Ém. Laur.); Selembao (Dew. 110); Chenal; Sabuka (Ém. et M. Laur.). — VI : Kinwanda près Tumba-Mani (Cabra et Michel. 142); Baija [Kwilu]. — Noms vern. : **Bagui**; **Botofi** (Sap.); Madibi. — Nom vern. : **Madiaka**; **Tshinchele**; Kimoko [Madibi] (Sap.). — VII : Tollo [sur la Lukenie] (Body). — XI : Basomelo (Ém. Laur.). — XIII d : entre la riv. Lufubu et Nyangwe (Pg. 1074). — XV : Mange [Kasai] (Briart); Bena-Dibele (Luja, 266; Flam.); Kikasa [Bashilange] (Pg. 1157); Bukila (Ém. et M. Laur.); entre Luebo et Djoko-Punda (Lescr. 272); Kole (Cransh.); env. de Lubefu. — Nom vern. du fruit : **Omokembulo** (Flam.). — Ind. non cl. : Mangbay (Flam.). — Noms vern. : **Maboki** [Popokabaka]; **Batshindji** [Sankuru-Lukenie]; **Dondecha** [Loange et la Lulua].

Obs. — Cette espèce paraît assez répandue dans les districts des Cataractes, du Stanley-Pool, du Kwango orient., du Lac Léopold II et dans la Province Orientale [zone du Manyena-Tanganika].

***Carpodinus leptantha* Stapf** [nou K. Schum.] in Kew Bull. (1898) 303; in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 34; II (1900) 39 et Reliq. Dewevr. (1901) 148; *Hallier f.* Kautschuklian. (1899) 114, t. 3; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 82; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 510 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 236.

2 Janv. 1896 (A. Dewèvre), 14 Février 1896 (Ém. Laurent). — V : Coquilhatville (Dew. 590). — VIII : secteur de Mondombe (Jesp.). — XI : Basomelo (Ém. Laur.). — XV : Bena-Dibele (Flam.); Katakò-Kombe. — Nom vern. du fruit : **Atridi na hima** (Serm. 9); env. de Lubefu (Coll.). — Noms vern. : **Oyongasolo**; **Oyongasudi** (Coll.).

Carpodinus ligustrifolia *Stapf* in Kew Bull. (1898) 304 et in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 149; *De Wild. et Gentil* Lian. cautch. du Cgo (1904) 104, t. 21 fig. 1-4; *Hallier f.* Kautschuklan. (1899) 112; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV', 83, 599; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 510-511 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 237-240.

C. gracilis *Stapf* l. c. 303 pr. min. pte [Conf. *Stapf* in *Dyer* l. c. 83]. 1901 (J. Gillet). — V : env. de Leopoldville (Gill.); Sanda (Odd. in Gill. 3410); Dembo (flendr. in Gill. 2023); Kisantu: Kimuenza (Gill. 171, 2184). — VI : entre le Kwango et Popokabaka (Coll.); env. de Madibi (Coll.). — VIII : Éala et env. — Nom vern. : **Bosere-Molani** (M. Laur. 186, 245, 1889; Pyn. 1375); sect. de Mondombe, C. (Jesp.); Ipeco (Pyn. 1583). — IX : Bumba (Pyn. 96). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1879); Bomaneh (M. Laur. 1878). — XV : Bena-Dibele; Kole (Coll.). — Nom vern. : **Motepa** (Rossel. 10; Flam.); env. de Lubefu (Coll.). — Nom vern. : **Autontongo** [Basongo-Meno] (Sap.).

— — var. **angusta** *De Wild.* in *De Wild. et Gentil* Lian. cautch. du Cgo (1904) 105.

1902 (L. Gentil). — XV : rives de la Lubue (Gent. 47); Mukanda-Monene (Gent. 47).

Carpodinus rufescens *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 241.

1907 (Knut Jespersen). — VIII : secteur de Mondombe (Jesp. 66).

— — var. **longeacuminata** *De Wild.* l. c. 241.

1907 (Agost. Flamigny). — XV : Dibele (Flam. 37).

Carpodinus Schlechteri *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 305, 306, cum xyl. [nom. tant.]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV', 75.

1899 (R. Schlechter). — V : Kinshassa (Schlt. 12804).

Carpodinus subrepanda *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 132; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV', 82; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 511.

C. friabilis *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 38.

C. lacteus *K. Schum.* ex *Stapf* l. c. IV' (1902) 132, in syn.

1903 (Coll.). — IX : pays des Bangala (Coll.).

Carpodinus turbinata *Stapf* in Kew Bull. (1898) 304, in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 35; Ill. fl. Cgo (1899) 57, t. 29 et

Reliq Dewevr. (1901) 119; *De Wild.* Apoc. à latex récol. par Genfil. 31, 33; *Hallier f.* Kantschuklian. (1899) 109, t. 3, fig. 2-4; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV, 83, 599; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 102 t. 18-19, fig. 1-3; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 512-515, fig. 513-515.

1895 (A. Dewèvre. — V : Sanda (Odd. in Gill. 3701); Tua. — Nom vern. : **Palenkima** (Coll.). — VI : Madib (Sap.). — VIII : Eala (M. Laur. 1874, 1889); Équateurville. — Noms vern. : **Okeba**; **Susu** (Dew. 311); Ikenge [Ruki] (Gent.); Injolo (M. Laur. 1875); Huyghe et Led.) : la Bolombo en aval de Dikila (Brun.). — XI : Isaugi (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange; Bolongula; Dibebe (Ém. et M. Laur.); Beua-Dibebe. — Nom vern. : **Olungu** Rossel. 9; Craush. 33; Katoko-Koube. — Nom vern. : **Momomo** (Serm. 14); Munungu (Sap.). : Kasongo-Batetela. — Nom vern. : **Olongu** (Sap.); forêts du Sankuru [Luja, 6; Brisac. — Nom vern. : **Mosere**; **Mosele**; **Bimba** [Kwilu]; **Mosere** [Bangala]; **Bosele-Molani** (Gent.).

Carpodinus verticillata *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 515, t. 156-157, fig. 116-118 et Not. pl. util. ou infér. du Cgo, II (1908) 243.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Leopoldville (Gill.); Tua (Coll.). — VI : Madibi ? (Sap.). — VII : rég. du La. Léopold II. — Nom vern. : **Tsenlse** (Body, 3). — VIII : Équateur (Gisseleire). — X : l'Ubang. — Nom vern. : **Bolundu** (Coll.); forêts au S. de Banzyville. — Nom vern. : **Mokwa** (Coll.); Imese. — Nom vern. : **Bolundu-Mabe** (Ém. et M. Laur.). — XII c : Niangara (Ser. 1275). — XIII d : Nyangwe. — **Kalombo-Lombo** (Coll.). — XV : rég. du Kasai. — Nom vern. : **Thibulu** (Sap.). — Nom vern. : **Munbalankube** [Kwilu].

CYCLOCOTYLA Stapf.

Cyclocotyla congolensis *Stapf* in *Kew Bull.* (1908) 260; *De Wild.* Not. pl. util. ou infér. du Cgo, II (1908) 168.

1905 (Agost. Flainigny). — VIII : secteur de Mondombe. — Nom vern. : **Lolika-koko** (Jesp.); Eala (Pyn. 1113, 1634). — XV : Bandaka-Kole (Flam.).

CARISSA L.

Carissa edulis *Vahl* Symb. bot. I (1790) 22; *Delile* Cent. pl. Meroë, 51, t. 2, fig. 1; *DC.* Prodr. VIII, 334; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII, 64; *Ficalho* Pl. Uleis, 221; *Lewin* in *Engl. Jahrb.* XVII, Beibl. n. 41 (1893) 44-51; *Planch.* Prodr. Apoc. 111, 256, 292; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 189; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV, 89; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 535.

Arduina — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 669; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 127 et in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 135.

Jasminonerium — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 415.

Curandos — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 664.

Carissa Richardiana *Jaub. et Spach* Ill. pl. Orient. V (1857) t. 496.

Carissa dulcis *Schumacher et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 116.

Jasminonerium — *O. Kuntze* l. c. (1891) 415.

1874 (Fr. Naumann). — I : embouchure du Cougo (Naum.). — XII d : entre Vankerkhovenville et Faradje (Ser. 553).

PICRALIMA Pierre.

Picralima nitida [Stapf] Th. et Hél. Dur.

Tabernaemontana — Stapf in Kew Bull. (1894) 22 et in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 30 et Reliq. Dewevr. (1901) 153.

P. Klaineana Pierre in B. S. Linn. Paris, I (1896) 1278; K. Schum in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV, 285 et Erganz. I, 60; Stapf in *Hook.* Icon. pl. XXVIII (1902) t. 2745 2746 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 95; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 244.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Dolo** (Dew. 847). — XI : Lokandu (Dew. 1113). — XII c : route de Poko à Zobia (Ser. 873).

PLEIOCERAS Baill.

Pleioceras Gilletii Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 167, 604; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 70 et Miss. Laurent (1907) 546.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — Bas-Congo (But. in Gill. 2230). — V : Kisantu (Gill. 3690). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill 537, 2812). — VIII : Bala-Ludzi (Pyn. 273).

PLEIOCARPA Benth.

Pleiocarpa bicarpellata Stapf in Kew Bull. (1894) 21 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 100; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 245.

Hunteria ambiens K. Schum. in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 223.

1907 (Agost. Flamigny). — VIII : Bokungu (Jesp.). — XV : Dibebe (Flam.).

Pleiocarpa tubicina Stapf in Kew Bull. (1898) 204 et in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 37; II (1900) 40; *De Wild. et Th. Dur.* III. fl. Cgo (1899) 91, t. 46 et Reliq. Dewevr. (1901) 150; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 107; Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 101, 600; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 535 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 245.

Hunteria pycnantha Hallier f. [non K. Schum] Kautschukian. (1899) 191, pr. p.

1891 (F. Demeusel). — XI : Basoko (Dem.); Barumbu (Êm. et M. Laur.). — XII c : route de Buta à Zobia (Ser. 893). — XIII d : Kasongo (Dew. 945). — XV : Idanga (Êm. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd. 594). — Noms vern. : **Mababalo** [Ikvangula]; **Motola** [Kasongo]; **Musabela** [Tanganika] (Dew.).

Pleiocarpa Welwitschii Stapf ex Hiern Cad. Welw. Pl. I (1898) 665 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ 100; *Engl.* in *Silzb.* Preuss. Akad. Wiss. XXVIII (1908) 827.

Hunteria pycnantha Hallier f. [non K. Schum.] Kautschukian. (1899) 191 pr. p.

1907 (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).

DIPLORHYNCHUS Welw. (1)

Diplorhynchus angolensis *Buett.* in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 85; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 189; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 106; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo, 33-31 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 302; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 33-31.

1885 (R. Buettner). — VI : Kinwenda près Tumba-Mani (Cabra et Michel); pays des Majakalla (Buett.)

Obs. — Suivant M. Stapf, le *D. angolensis* indiqué par M. De Wildeman comme récolté par le P. Butayo à Kisantu [Rev. cult. colon. X (1902) 140-142, ne serait pas le type].

Diplorhynchus mossambicensis *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. (1881) t. 1335; *K. Schum.* in *Engl.* Pil. Ost-Afr. 316; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 107, 600; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 101.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafa. — Nom vern. : **Moengue** (Verd.).

Obs. — M. De Wildeman [l. c.] décrit, sans nom, une forme peut-être spécifiquement distincte, récoltée aussi à Lukafa et appelée **Biejji**. (Verd.).

Diplorhynchus Welwitschii *Rolfe* in *Bolet. Soc. Bot.* XI (1893) 85; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 105.

D. Poggei *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 142, fig. 54 o; *De Wild.* in Rev. cult. colon. X (1902) 142.

D. angolensis *Britton* [non *Buett.*] in *Jour. of Bot.* (1895) 76, pr. p. : *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 667, pr. p.; *De Wild.* l. c. 141, pr. p.

1882? (P. Pogge). — Ind. non. cl. : le Lomani (Pg. 1002).

RAUWOLFIA L.

Rauwolfia caffra *Sond.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 77; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 110; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 102.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lac Moero; Lukafa. — Nom. vern. : **Mulimba-Limba** (Verd. 618).

Rauwolfia longecuminata *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1898) 35 [B. S. B. B. XXXVIII², 205]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 117.

1897 (Alph. Cabra). — V : Bas-Congo (Cabra).

(1) Une espèce d'un genre voisin, le *Thevetia neriifolia* Juss. originaire de l'Amérique, est cultivée, pour sa graine oléagineuse, à Wumbali [V] et à Eala [VIII] (M. Laur.). — [Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 536].

Rauwolfia Mannii *Stapf* In Kew Bull. (1894) 21 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 113; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 37 et Reliq. Dewevr. (1901) 150; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 536.

R. cardiocarpa *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 154, fig. 56 R.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : **Mbara** (Dew. 791) ; Basankusun (Brun.).

Rauwolfia obscura *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 154; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 117, 602. *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 12]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 69, 179; Miss. Laurent (1907) 536 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 245.

1882 ? (P. Pogge). — IV : Gombi-Lutete (Hens, A. 165). — V : Léopoldville (Schlt.); entre Dembo et Kisantu (Gill. 1583); Kimueuza (Gill. 770, 1652, 1661 b). — VI : le Kwilu, — Nom vern. : **Dimadini** (Sap.) ; Madibi (Sap.). — VIII : Ikenge (P. Huyghe). — IX : Upoto (Ém. Laur.). — XV : Mnkenge (Pg.) ; Bolongula ; Busongolo ; Lusambo ; Mukundji (Ém. et M. Laur.) ; le Sankuru. — Nom vern. : **Busangulatali** (Sap.). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.). — Nom vern. : **Lopundu** [Bangala].

Obs. — L'indication de Butala est erronée [*Couf. De Wild.* Miss. Laurent (1907) 536].

Rauwolfia vomitoria *Afzel.* Stirp. med. Guin. sp. nov. (1818); *Hook.* Niger Fl. (1849) 446; *Planch.* Prodr. Apocyn. 295; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 115, 601; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 70; Miss. Laurent (1907) 536 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 246.

R. seuegambica *A. DC.* in *DC.* Prodr. VIII (1844) 340; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 34] et Reliq. Dewevr. (1901) 150.

R. cougolana *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 34 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 304] et Reliq. Dewevr. (1901) 150.

1891 (F. Demense). — V : Kisantu (Gill. 496); Lemfu (But. in Gill. 2262). — VIII : Eala et env. (Pyn. 639, 1474, 1485; Leser. 30; M. Laur. 1138); env. de Mobauga (Dew.). — IX : Bangala (Dem.); Ukataraka (Ém. et M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1363). — XII : Deinge. — Nom vern. : **Nagomgami** (Ser.). — XIII d : Kibulu près Kasongo (Dew.). Ind. non cl. : Tombolo (Leser. 39).

ALLAMANDA L.

***Allamanda cathartica** *L.* Mant. pl. II (1771) 214; Bot. Mag. (1796) 1. 338; *Muell.-Arg.* in *Mart.* Fl. Brasil. VI¹, 40; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 315; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 33 et Reliq. Dewevr. (1901) 145; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr.

IV¹, 117; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 67 et Miss. Laurent (1907) 535.

A. Schottii *Hook.* [non *Pohl*] in Bot. Mag. (1848) t. 4351.

A. Aubletii *Pohl* Pl. Brasil. I (1827) 75; Bot. Mag. (1818) t. 4411.

Orelia grandiflora *Aubl.* Pl. Guian. I (1775) 271, t. 106.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 417). — V : entre Leopoldville et Mombasi (Gill. 2590).

Orig. — Plante originaire d'Amérique, cult. à Eala [VIII] (M. Laur. 1115, 1367).

LOCHNERA Rehb. (1)

Lochnera rosea [*L.*] *Rehb.* Consp. regn. veget. (1828) 134; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 316; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 190; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 39 et Reliq. Dewèvre. (1901) 151; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 118; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 179 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 246.

Vinca — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 302; Bot. Mag. (1794) 248; *DC.* Prodr. VIII, 382.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo, cult. et partout au bord des chemins dans les villages (Dup.). — I : Banana (Dew.). — II : Boma (Welw.). — V : Kimuenza (Gill.); Kisantu; Boko (Vauderyst).

ALSTONIA R. Br.

Alstonia congensis *Engl.* in *Engl.* Jahrb. VIII (1887) 64; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 190; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 121.

A. scholaris *Chevalier* [non *R. Br.*] in B. Mus. hist. nat. Paris, VI (1900) 423 et in Rev. cult. colon. VIII (1900) 492, 493, cum. xyl.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

Alstonia Gilletii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 537 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 246.

1904 (J. Gillet). — V : rég. de Kisantu (Gill. 353); Sanda (Odd. in Gill. 3751). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Lumpundu** (Sap.). — VIII : Eala (Pyn. 788).

— — var. *Laurentii* *De Wild.* l. c. (1907) 538, t. 162.

1904 (Étn. et M. Laurent). — VII : Bolombo (Étn. et M. Laur.).

(1) Deux espèces d'un genre voisin [*Plumeria*] originaires d'Amérique, ont été indiquées au Congo, mais n'y étaient que cultivées : le *P. alba* L. à Kimuenza (Gill.) et le *P. rubra* L. à Kisantu (Gill.). [*Conf. De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 80].

TABERNANTHE Bail.

Tabernanthe Bocca Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. 1V' (1902) 122.

T. *Iboga Oliv.* [non *Baill.*] in *Hook.* Icon. pl. (1894) t. 2337 [tab.; non text.]; Kew Bull. (1895) 37 cum tab. pr. p.

1883 (H. Mueller). — Bas-Congo. — Nom vern. : racine : **Bocca** (Muell.).

Tabernanthe Iboga Baill. in B. S. Linn. Paris, I (1889) 783; *Stapf* in Kew Bull. (1895) 38, cum ic.; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 122]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV', 124; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 223-228; II (1908) 247.

T. *albiflora* *Stapf* in Kew Bull. (1898) 305; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 38 et Reliq. Dewevr. (1901) 151

1895 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Dup.). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Sanda et env. (Vern. in Gill. 3437; Odd. in Gill. 3562); bassin de la Sele (But. in Gill. 1443). — VIII : Coquilhatville (Dew. 684); env. de Coquilhatville. — Nom vern. : **Lopundja** (Malchair); Eala et env. (M. Laur. 750, 1140, 1234; Pyn. 718, 1115, 1370, 1528). — IX : secteur de Moudombe (Jesp. 40). — XV : le Sankuru (Sap.); Bena-Dibele (Flam. 138). — Nom vern. : **Lopundu** [Bangala].

Tabernanthe tenuiflora *Stapf* in Kew Bull. (1898) 305; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 38; II (1900) 40 et Reliq. Dewevr. (1901) 152; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV', 124; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 538 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 247.

1891 (F. DeMeuse). — II a : la Lemba (Dew. 361). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 54, 166, 710; Pyn. 1235). — XIII a : Stanleyville (Dem.). — XV : Kapulumba (Sap.). — Nom vern. : **Makuntju** [la Lulua].

CALLICHILIA Stapf.

Callichilia Barteri [*Hook. f.*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV' (1902) 133; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 539 et Étud. il. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 338.

Taberaemontana — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1870) t. 5859; *Stapf* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 39 et Reliq. Dewevr. (1901) 153; *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Expéd. (1900) 306.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Lukolela et Gombi (Dew. 793). — VIII : Équateurville (Pyn. 341); Eala (Pyn. 582); env. de Monzambi (Pyn. 349).

CARVALHOA K. Schum.

Carvalhoa Ledermanni *Gilg ex Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXVIII (1908) 829 [nom. tant.].

1908 (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).

GABUNIA K. Schum.

Gabunia eglandulosa [Stapf] Stapf in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 138; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 543-545, fig. 124-125 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 247.

Tabernaemontana — Stapf in Kew Bull. (1894) 24 pr. p.

19: 3 (J. Gillet). — V : Sanda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2880). — VIII : Lokelenge; Basankusu (Brun.); env. d'Eala (M. Laur. 1373); secteur de Mondombe (Jesp. 25). — XII c : env. de Gombari (Ser. 684). — XV : Bolongula (Ém. et M. Laur.).

CONOPHARYNGIA Stapf.

Conopharyngia durissima [Stapf] Stapf in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 144.

Tabernaemontana — Stapf in Kew Bull. (1891) 24; K. Schum. in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 148.

T. durinervis [err. cal.] Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 190.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Obs. — M. Stapf, qui, en 1894, a créé l'espèce sur les échantillons de Christian Smith, ne l'indique plus en 1902 [l. c.] qu'au Kamerun et au Gabon. Est-ce une omission?

Conopharyngia Gentilii [De Wild.] *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 539.

Gabunia — *De Wild.* in Belg. colon. (1902) 508 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68; Stapf in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 602.

1902 (L. Gentil). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2528); Lukolela (Pyn. 261). — VIII : Eala (M. Laur. 901, 1378, 7300; Pyn. 261, 363, 942). — XI : Yambuya (M. Laur. 901, 1378). — XV : Lubue (Gent.).

Obs. — Une espèce, peut-être identique, a été récoltée par M. Vau Tichelen près de la-Lukula [Conf. *De Wild.* I, c. 69, in obs.].

Conopharyngia pachysiphon [Stapf] Stapf in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 146; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 540.

Tabernaemontana — Stapf in Kew Bull. (1894) 22 et in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 40 et Reliq. Dewevr. (1901) 153.

1896 (A. Dewèvre). — XII c : Gombari (Ser. 566). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 943). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Mongombe** [Kasongo]; **Kalungu** [Tanganika]; **Aguka** [Ikwangula] (Dew.).

Obs. — M. O. Stapf conserve quelques doutes sur la détermination de la plante des env. de Kasongo.

Conopharyngia penduliflora [*K. Schum.*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 149; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 248.

Tabernaemontana — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 225. 1902 (L. Gentil). — XII c : env. de Nala (Ser. 769). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Conopharyngia Smithii *Stapf* | *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 143.

Tabernaemontana — *Stapf* in *Kew Bull.* (1898) 305; *De Wild et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 39 et Reliq. Dewevr. (1901) 153.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Shinganga. — Nom vern. : **Benene** (Dew. 61). — V : Léopoldville (Ém. Laur.). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew. 1167 a). — XV : bassin du Sankuru (Ém. Laur.).

— — var. **brevituba** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 541.

1905 (Éd. Lescreauwaet). — XV : Mushenge (Lescr.).

Conopharyngia Thonneri [*De Wild. et Th. Dur.*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 148.

Tabernaemontana — *Th. Dur. et De Wild. ex Stapf* in *Kew Bull.* (1898) 306; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 39 et Pl. Thonnerianae (1900) 32, t. 7.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bogolo près de Businga (Thoum. 109).

Ons. — Le Fr. Gillet semble avoir retrouvé cette espèce à Dembo [distr. V].

— — var. **Demeusei** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 541.

1891 (F. Demeuse). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem. 440).

— — var. **Lescreauwaetii** *De Wild.* l. c. (1907) 542.

1899 (Éd. Luja). — VI : route de Lusubi à Luann (Lescr. 68). — XV : Munungu (Lescr. 265); Bena-Dubele (Luja, 264); le Sankuru. — Nom vern. : **Monkeka** (Sap.).

VOACANGA Thou.

Voacanga africana *Stapf* in *Journ. Linn. Soc.* XXX (1894) 87 pr. p et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. IV¹, 157; *De Wild.* Étud. fl. Kat. 1903 102 et Miss. Laurent (1907) 545; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 157, 603.

V. Schweinfurthii *Th. Dur. et De Wild.* [non *Stapf*] *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 77 [B. S. B. XXXVII, 120]; *De Wild. et Th. Dur.* III. fl. Cgo, (1899) 77 t. 39 [descr. excl.]; *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 40 et Reliq. Dewevr. (1901) 151.

V. glabra *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV. 2 (1897) 149.

1891 (F. Demeuse). — V : Léopoldville. — Nom vern. : **Sanga** (Dew. 483); Kisantu (Gill. 186). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — IX : Bangala (Dem.). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Kilimboi** (Verd. 46).

Voacanga angolensis *Stapf* in *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 668 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 155; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 545.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.)

Voacanga obtusa *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 149; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 34]; *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 226; *Scheffler* in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, III, 161; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 153, 603; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 69, (1906) 302 et *Miss. Laurent* (1907) 545.

V. obtusata *K. Schum.* ex *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 77 [B. S. R. B. XXXVII, 122].

1895 (Gust. Debeerst). — V : rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3570); rég. de la Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3070); Kisantu (Gill. 203, 1115). — VI : Etiolo (Ém. et M. Laur.). — XII d : env. de Vaukerkhoveville (Ser. 547). — XV : Lac Foa (Lescr. 210). — XVI : Kibanga [Tanganika] (Deb.).

Voacanga psilocalyx *Pierre* ex *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 159; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 545.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogaudo (M. Laur. 1000); Yambuya (Solh.).

Voacanga puberula *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 149; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 156; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 302; *Miss. Laurent* (1907) 545 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 248.

V. Schweinfurthii *De Wild. et Th. Dur.* [non *Stapf*] Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 34].

V. Klainei *Pierre* ex *Stapf* in *Dyer* l. c. IV¹ (1902) 156.

1903 (J. Gillet). — V : Leopoldville (Pyn. 144); env. de Kisantu (Gill. 186, 3506). — VIII : Eala (M. Laur. 670, 1374, 1375; Pyn. 507); Ikenge (Huyghe). — XII c : Gombari (Ser. 518). — XV : bords du Kasai (Ém. et M. Laur.).

HOLARRHENA R. Br.

Holarrhena congolensis *Stapf* in *Kew Bull.* (1898) 306; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 37 et *Pl. Gilletianae*, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 35]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 163.

1897 (Alph. Cabral). — II : entre Boma et Tschoa (Cabral). — II a : Boma-Sundi (Cabral). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Kembaki** (Gill. 155).

Holarrhena febrifuga *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 277; *K. Schum.* in *Engl. Pil. Ost-Afr.* A, 33, 76; C, 315; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 162, 604; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 101.

1899 (Edg. Verdrick). — XVI : Lukafu (Verd. 27).

H. febrifuga form. **grandiflora** Stapf ex *De Wild.* l. c. (1903) 101.
1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 133).

Holarrhena floribunda [*G. Don*] *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 190; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 77 [B. S. B. XXXVII, 122].

Rondeletia — *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 513.

H. africana *A. DC.* in *DC.* Prodr. VIII (1844) 414; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 459; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 164.

1895 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : route des Caravanes (Ém. Laur.).

Holarrhena Wulfsbergii *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 164, 604; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68.

H. africana *Wulfsberg* [non *A. DC.*] *Holarth.* Afr. Inaug. Diss. (1880) cum tab.; *K. Schum.* in *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. 306.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Geut. : Gill. 2758).

STROPHANTHUS. DC.

Strophanthus Arnoldianus *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 36 [B. S. B. XXXVIII², 206]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV, 164; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VII [Stroph.] (1903) 26, t. 5, fig. C. a-f et t. 10, fig. H; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 303 et *Miss. Laurent* (1907) 546, t. 145.

1899 (R. Kindt). — IV : Kitobola (Kindt); forêt de Zundu (P'yn. 72). — V : vallée du Kwilu près de Tumba (Cabra et Michel, 66).

Obs. — Cette espèce est cultivée à Éala [VIII] (M. Laur. 392; 1107).

Strophanthus Demeusei *A. Dewèvre* in *Journ. pharm.* Anvers (1894) 431 [extr. 8]; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 191; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1892) 152 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] (1903) 32, fig. 4; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 184.

1891 (F. Demeuse). — Ind. non cl. : Buaua (Dem.).

Strophanthus Dewevrei *De Wild.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 40 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 154; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 155; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] (1903) 25 t. 5, fig. A.

S. parviflorus *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Franck.*] *Contr. fl. Cgo.* I (1899) 41. 1895 (Ém. Laurent). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 1058). — XV : Luebo (Ém. Laur.). — Nom vern. : **Mubuta** [Tanganika] (Dew.).

Obs. — M. Stapf [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 607] admet le *S. parviflorus* *Frauch.* au nombre des espèces congolaises et lui donne, comme synonyme, le **S. Dewevrei** *De Wild.*

Strophanthus gardeniiflorus *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam* VII [Stroph.] (1903) 20; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 605, in add.

S Tholloni *De Wild.* [non *Franch.*] *Étud. fl. Kat.* (1903) 102.

1899 (Edg. Verdecq.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulembe** (Verd. 235, 236).

Strophanthus hispidus *DC.* in B. Soc. Phil. Paris, (1802) 123, t. 8; *A. DC.* in *DC. Prodr.* VIII, 419; *L. Planch.* *Prodr. Apocyn.* (1894) 33-44, 82, fig. 1-2; *Köhler* *Mediz. Pfl.* II, l. 194; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo.* I (1899) 41; II (1900) 40 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 155; *Payrau* *Stroph.* (1900) 47, 70, 163, c. fig.; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 34; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 155, in *Tropenpflanzen*, VI (1902) 556, 560 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] (1903) 35, l. 2, fig. a f et t. 10, fig. D; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 174; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 546 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo.* II (1908) 248.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo, AC. dans la partie N. (Cabra). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Muifu** (Cabra). — V : Kisantu (Gill. 83). — VIII : Haut-Lopori (Biel.) : Eala Pyn. 843, 1077; Mondombe (Jesp.). — IX : Nouvelle-Auvers [Bangala] (Dew. 866). — XII c : env. de Nala (Ser 773).

— — var. **Bosere** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 546.

1905 (L. C. E. Malchair). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **Bosere** (Malch. in *M. Laur.* 1273).

Strophanthus holosericeus *K. Schum.* et *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 157; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam* VII [Stroph.] (1893) 39, l. 1, fig. A; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 171.

1893 (G. Descamps). — XVI : Zimu sur le Tanganika (Desc.).

Strophanthus intermedius *Pax* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 375; *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V* (1893) 287; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 671; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 156 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] 31; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 185, 608.

Le type croît dans l'Angola.

— — var. **Bieleri** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 547.

1904 (S. Bieler). — VIII : le Haut-Lopori (Biel.).

Strophanthus Ledieni *Stein* in *Gartenfl.* XXXVI (1887) 145, l. 1241; *Christy* *New comtn. pl. and drugs* (1887) 28; *Pax* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 368, 383 et in *Ber. Deutsch. Pharm. Ges.* III (1893) 46; *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V* (1893) 270; *Th. Dur.*

et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 191; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXII (1892) 155 et in Monog. Afr. Pl.-Fam. VII [Stroph.] (1903) 35; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 171.

1887 (F. Ledien). — III : Vivi (Led.).

Strophanthus Preussii *Engl. et Pax* in Engl. Jahrb. XV (1892) 369; *Franch.* in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, XV (1893) 279; *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 230 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 307; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 670; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 41; Pl. Thonneriana (1900) 32 et Reliq. Dewevr. (1901) 154; *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 155; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 176, 606; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 548 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 249.

S. bracteatus *Franch.* in Morot. Journ. de Bot. VII (1892) 324 et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V (1893) 280; *Payrau* *Strophanthus* (1900) 104-106, 162 c. xyl.; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I. (1899) 41 et Reliq. Dewevr. (1901) 154; *Stapf* in *Dyer*, Fl. trop. Afr. IV¹, 177.

1896 (A. Dewèvre). — VII : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 676, 2038, 2039; Pyn. 393, 610, 746, 1020, 1342, 1391, 1761); Efu-kwa-Kombe (M. Laur. 1229); Bamania (Pyn. 916); Dikila-lala (Brun.); Bokakata (Dew. 809); env. de Mondombe (Jesp.); Ikenge (Huyghe). — IX : Bombati près Dobo (Thoun.). — X : Bomoka (Ém. et M. Laur.). — XI : Yambuya (M. Laur. 1458); Bomaneh (M. Laur. 2041). — XII c : env. de Nala (Ser. 783); village Belia (Ser. 501).

— — var. ***brevifolius*** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 249.

1907 (Agost. Flamigni). — XV : Bena-Dibele (Flam. 190).

Strophanthus sarmentosus *DC.* in B. S. Phil. Paris, III (1802) 123, t. 8, fig. 1 et in Annal. Mus. Hist. nat. Paris, I (1802) 410, t. 27, fig. 1; *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1892) 374; *Franch.* in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V (1893) 282 et in *Morot* Journ. de Bot. VIII (1894) 204; *L. Planch.* Prodr. Apocyn. (1894) 79; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 191; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 40; *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 307; *Payrau* *Strophanthus* (1900) 85-87, 163, cum fig.; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 156, 161 et in *Engl.* Monog. Afr. Pl.-Fam. VII [Stroph.] (1903) 29, t. 10, fig. K; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 180, 607; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 548 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, II (1908) 249 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 249.

S. Parioisii *Franch.* in Morot. Journ. de Bot. VII (1893) 320 et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V (1893) 290, t. 16; *L. Planch.* Prodr. Apocyn. (1894) 58, 83; *Payrau* *Strophanthus* (1900) 88-91, 163; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1901) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 35].

1891 (F. Demeuse).— Bas-Congo (Ém. Laur.).— II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); la Lemba (Dem.). — V : Kisantu et env. (Gill. 52, 194, 3388). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1032); env. de Mondombe (Jesp. 33). — XI : Yambuya (M. Laur. 1032); Bomanch (M. Laur. 1033). — XV : Bena-Dibele (Flam. 188).

Strophanthus Welwitschii [Baill.] K. Schum. in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* I, Ergänzt. (1900) 59; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 157, 162 et in *Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] (1903) 21.

Zygonerion — Baill. in B. S. Linn. Paris, I (1888) 758.

S. ecaudatus Rolfe in B. S. Brot. XI (1893) 85; *Hiern* Cat. Welw. Pl. III. 671; *Payson* Strophanthus (1900) 94-96, c. fig.: *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV (1902) 183, 608.

S. Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 105, t. 31.

S. Verdickii *De Wild.* l. c. 103 [incl. var. latisepalus *De Wild.* l. c. 104, t. 32].

1899 (Edg. Verdick). — V : Sanda (De Brouw. in Gill. 3017); Kimuenza (Gill. 2129); Kisantu (Vern.). — VI : env. de Tumba-Maui (Cabra et Michel, 32). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kasonga-Kabasji**; **Kandalupire** (Verd. 84, 146).

Strophanthus Wildemanianus *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 156-159 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] (1903) 26, t. 5, fig. A, a-b; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 179, 607.

1902 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2083).

ISONEMA R. Br.

Isonema infundibuliflorum *Stapf* in *Kew Bull.* (1898) 306 et in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 40; *Reliq. Dewevr.* (1901) 154 et *Ill. fl. Cgo* [1899] 103, t. 52; K. Schum. in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* 305; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 184; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 250.

1895 (A. Dewèvre). — VI : env. de Dima (Flam.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.); Eala (Pyy. 1462); Équateur. — Nom vern. : **Ngando** (Dew. 594). — XV : le Kasai (Flam.).

FUNTUMIA Stapf.

Funtumia elastica [Preuss] *Stapf* in *Proc. Linn. Soc.* (1900) 2 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 191, 609; *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 256; *Stapf* in *Hook. Icon. pl.* XXVII (1901) t. 2694-2695; *Luc* in *B. Jard. colon.* (1907) 4-25, cum ic.; *De Wild. Not. Apoc. laticif. du Cgo* (1903) 80-92 et *Miss. Laurent* (1907) 552-561 t. 170-174, 183, fig. 126-131.

Kickxia — *Preuss* in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, II (1899) 353-360, t. 1; *Warb. Kautschukpfl.* 112, 153; *Vilbouch.* in *Warb. Pl. a caoutch.* 204, fig. 15, 206, 207; *Schlechter* in *Tropenpfl.* IV (1900) 109-120; *De Wild.* in *Rev. cult. colon.* VII, 633-634, 743-747.

K. africana Stapf [non *Benth.*] in Kew Bull. (1895) 244 cum, ic.; *Lecomte* in Rev. cult. colon. I, 12-19, 41-47, fig. 2; *Thonn.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1901) p. XII.

K. congolana *De Wild.* in Rev. cult. colon. (Déc. 1900) 745; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829].

1898 (H. Marulier). — V : Kwamouth (Ém. et M. Laur.); Bokala. — Noms vern. : **Bole**; **Mobuli** (Coll.?). **Limu** (Gill.); **Bolle** (Lujia); Tua. — Nom vern. : **Mobuli** (Coll.?). Kisantu (Gill. 387, 3130). — VI : Madibi (Sap.); Luauu (Lescr. 29). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Osuma** (Coll.?). Eala et env. (M. Laur. 943, 1789, 1790, 1797; Pyn. 248); Lilangi (Marulier); Bolombo [la Baringa] (Coll.?): Ektntsh-Dikila. — Nom vern. : **Montone** (Coll.?). — IX : Nouvelle-Anvers [Bangala] et env. — Nom vern. : **Dembo**, **Mariguongo** (Ém. et M. Laur.; de Giorgi; am Rhy.); rég. de la Giri. — Noms vern. : **Ireh**; **Dembonagele**; **Musali** (de Giorgi). — IX a : Gali. — Nom vern. : **Ireh** [Hausa] (Thonn. 13). — X : l'Ubangi (M. Laur. 56); Imese. — Nom vern. : **Mosale** (Ém. et M. Laur.); Yakoma. — Nom vern. : **Bwombwo** (Coll.?): Banzyville. — Nom vern. : **Bwombwo** (Coll.?). — XII b : l'Uere-Bili (Coll.?). — XII c : env. de Gombari (Ser. 476); Poko. — Nom vern. : **Tondefere** (Coll.?). — XIII a : Romée (M. Laur. 1788); Bengamisa. — Nom vern. : **Bombwoke** (Coll.?): Kondelele. — Nom vern. : **Bwombwo** ou **Bongbwo** (Coll.?) — XIII b : le Haut-Ituri (Coll.?). — XV : Mange; Pangu (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Ingiri [Giri, IX] (M. Laur. 223). — Nom vern. : Mondembo (**Mondunga**) [Bangala].

Funtumia Gilletii [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.]

Kickxia — *De Wild.* in Rev. cult. colon. [Déc. 1900] 744; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Obs. — *M. Stapf* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 190, in syn.] réunit cette espèce au *Funtumia africana* Stapf; mais M. De Wildeman estime que les éléments manquent pour trancher cette question.

Funtumia latifolia [*Stapf*] *Stapf* ex *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 236; *Stapf* in *Hook.* Icon. pl. XXVII (1901) sub t. 2694-2695 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 192, 609; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 563-567.

Kickxia — *Stapf* in Kew Bull. (1898) 307; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo. I (1899) 43; II (1900) 41 et Reliq. Dewevr. (1901) 157; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 63, 64, 125, fig. 236, 307 et in Tropenpf. I, 30; *Preuss* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I, 353-359, fig. F. G. : *Warb.* Kautschukpf. 112; *De Wild.* in Rev. cult. colon. VII, 633, 634; *Vib. et Warb.* Pl. à caoutch. 205, 207, fig. 16.

K. congolana *De Wild.* in Rev. cult. colon. VII (1900) 745; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829].

1896 (A. Dewèvre). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Mupepe** (Coll.?). — V : Kisantu et env. — Nom vern. : **Bolle** (Gill. 387, 886, 2211, 2215, 2313, 3127); env. de Kimuenza (Gill. 1937, 2142); Dembo (Coll.?): Bokala (Ém. et M. Laur. 640); Kwamouth. — Nom vern. : **Bolle** (M. Laur. 641). — VI : Madibi; le Kwilu (Sap.); la Loange (Gill.); Lusubi (Lescr.). — VII : env. de Bumbuli. — Nom vern. : **Busumba** (Coll.?): Nioki. — Nom vern. : **Bobole** (Coll.?): Kutu (Bolle; Ém. et M. Laur.; Delhy); Ibali; la Kiri (Bolle). — VIII : distr. de l'Équateur (Coll.?): la Ba-

ringa (Coll.); la Momboyo (Pyn. 279); Coquilhatville et env. (Gent.); Bolombo (de Giorgi); rég. de Ékutshi. — Nom vern. : **Isote** (Coll.); Ikenge (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur. 124, 1775); Bolombo (de Giorgi). — IX : Bangala (Dew. 867); Nouvelle-Anvers. — Noms vern. : **Dembo**; **Mariguenge** (Ém. Duch. 14; de Giorgi); rég. de la Giri [au S. de Bomboma]. — Nom vern. : **Dembo-Mabe** (de Giorgi). — XI : Barumbu (M. Laur. 1074); Yambuya (Solh.); rég. de Yaboila, de Yamba et et de Mosaka. — Nom vern. : **Wembe** (Coll.). — XII c : Nala et env. (Van Rysselb. 2); Gombari et env. (Ser. 476 b). — XIII a : Romée. — Nom vern. : **Osuma** (M. Laur. 1791; Cransh.); Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XIII d : rég. des Mangbettu. — Nom vern. : **Bongen** (Coll.). — XV : Lusambo (Luja, 249, 308); Mobole (Coll.); Tielen-Saint-Jacques (Leser. 344); Olombo (Coll.); Kondue (Luja); rég. du Kasai (Leser. 30); Bena-Dibele (Coll.); Katak-Kombe (Seru.); la Lubi (Leser. 174); Mange (Ém. et M. Laur.); Babali (Gent.). — Ind. non cl. : rég. de Bodzuma (Coll.). — Noms vern. : **Boli** ou **M'Bole** [Bangala]; **Mobeli**; **Mobole** [Sankuru] (1).

MALOUETIA A. DC.

Malouetia Heudelotii A. DC. in DC. Prodr. VIII (1814) 380; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 450; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 195, 609; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68, (1906) 303 et Miss. Laurent (1907) 574.

M. africana K. Schum. in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 187.

1902 (L. Gentil). — Bas-Congo (Odd.). — V : env. de Sanda (Odd. in Gill. 3553); env. de Léopoldville (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2784); la Inzia (Gent.); la Wamba (Gent. 108). — VIII : le Haut-Lopori (Biel.). — XI : Yambuya (M. Laur. 1023).

ALAFIA Thou.

Alafia Benthami (Baill.) *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 199; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 302; Miss. Laurent (1907) 574, t. 143 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 250.

Ectinocladus — *Baill.* Hist. des pl. X (1888) 211; *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XXIV (1894) t. 2341; *Stapf* in Journ. Linn. Soc. XXX (1894) 88; K. Schum. in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 165.

1903 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Bamania [la Loliva]; Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); bords de la Tshuapa. — Nom vern. : **Mosasala** (Jesp.). — XI : Limbutu (M. Laur. 1035).

Alafia caudata *Stapf* in Kew Bull. (1894) 123 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 199; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 673; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 575.

1907 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 4021, 4052).

(1) Dans la Mission Laurent [pp. 550-574] M. De Wildeman a fait une étude très complète des *Funtumia* du Congo.

Alafia gracilis *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 196; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 575, fig. 436.

Tabernaemontana erythrophthalma *K. Schum.*, ex *Stapf* l. c. IV¹ (1902) 196, 1901 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 2009). — XII c : Nala (Ser. 749).

Alafia lucida *Stapf* in Kew Bull. (1894) 122 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 198; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 575 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 251.

A. cuneata *Stapf* l. c. (1894) 122; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 672.

A. reticulata *K. Schum.* in *Engl. Nat. Pl.-Fam.* IV, 2 (1897) 165.

Wrightia Stuhlmannii *K. Schum.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* (1895) 319.

1905 (Marc. Laurent). — V : env. de Kisantu (Gill. 4093). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 838; Pyn. 366, 870, 1415). — IX : secteur de Mondombe (Jesp.). — XII c : route de Tely à Poko, Fryant (Ser. 641).

HOLALAFIA Stapf.

Holalafia multiflora *Stapf* in Kew Bull. (1894) 123 et in *Hook.* Icon. pl. XXIV (1894) t. 2350; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 41; II (1900) 42 et Reliq. Dewevr. (1901) 157; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 201, 611; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 576 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 251.

Alafia major *Stapf* in Kew Bull. (1898) 307; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 41 et Reliq. Dewevr. (1901) 155; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 611, in obs.

1891 (F. Demeuse). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilbatville (Pyn. 298) : Eala (M. Laur. 8, 221 b; Pyn. 623, 1175); Équateurville [Wangata] (Dew. 673; Ém. et M. Laur.). — IX : secteur de Mondombe (Jesp.). — XI : Lokandu (Dew.). — XII c : entre Surango et Niangara (Ser. 816). — Noms vern. : **Loledja** [Équateur]; **Gluka** [Tanganika] (Dew.).

PYCNOBOTRYA Benth.

Pycnobotrya nitida *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XII (1876) t. 1183; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 202; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 251.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1050). — VIII : secteur de Mondombe. — Nom. vern. : **Mongongongo** (Jesp.). — XII c : route de Poko à Zobia (Ser. 856).

BAISSEA A. DC.

Baissea axillaris [*Benth.*] *Hua* in C. R. Acad. sci. Paris, CXXIV (1894) 887 et in B. Mus. Hist. nat. Paris, VIII (1902) 479; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 210, 611; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 577 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 252.

Zygodia axillaris Benth, in Hook. Icon. pl. XII (1878) t. 1184; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 673.

Guerkea Schumanniana De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, V (1899) 9 [B. S. B. XXXVIII, 128]; Reliq. Dewevr. (1901) 157 et Pl. Gill-tianae, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 35]; *Stapf* in *Dyer* l. c. IV¹, 217, 611.

1896 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Vanderyst); Kisantu (Gill.); env. de Lemfu (But.). — VIII : Équateur (Pyn. 581); Eala (M. Laur. 1369; Pyn. 1026, 1407, 1478); secteur de Mondombe (Jesp.). — IX : Bangala; Bumba (Dew.).

Baissea gracillima [K. Schum.] *Hua* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 12; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 216; *De Wild.* in Journ. d'agricult. colon. (1905) 106; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 96-97; (1908) 252 et Miss. Laurent (1907) 577, t. 158-159, fig. 137-138.

Guerkea — K. Schum. in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 228.

Baissea micrantha *Hua* l. c. (1898) 11.

1904 (S. Bieler). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 297); Efnkwa-Kombe (Biel.; Geisseler); Eala (Pyn. 1097). — IX : forêts de Mondombe. — Nom vern. : **Mosusulu** (Jesp.). — XV : Muungu. — Nom vern. : **Lobuma** (Sap.). — Noms vern. : **Ete** [Congo centr.]; **Budemba** [Balemba]; **Olembo** [Batetela; Bakula].

Baissea laxiflora *Stapf* in Kew Bull. (1894) 124, in Hook. Icon. pl. XXIV (1894) t. 2342 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 208; *Hua* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 10; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 580.

Guerkea — *De Wild.* et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, IV (1899) 17 [B. S. B. B. XXXVIII, 94]; *De Wild.* Not. Apocyn. laticif. du Cgo (1903) 12 [err. cal. 'congolensis'] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 611, in obs.

1897 (Alph. Cabra) — Bas-Congo (Cabra) — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel).

Baissea Laurentii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 253-254.

1906 (Marc. Laurent). — XII a : Romée (M. Laur. 1362).

Baissea major *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 675; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 210; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 580.

B. angolensis *Stapf* var. — *Stapf* in Kew Bull. (1894) 126.

1935 (L. Pynaert). — IX : Bumba (Pyn. 108).

Baissea tenuiloba *Stapf* in Kew Bull. (1894) 124 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV, 214; *Hua* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 10-11.

Guerkea uropetala K. Schum. in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 228; *De Wild.* et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 157.

1895 (A. Dewèvre). — VIII : Wangata (Dew.).

Baiſſea Tholloni Hua in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 10; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 209; *De Wild* Miss. Laurent (1907) 580 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 255.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 98, 1365; Pyn. 468, 917, 1001, 1536). — IX : Moma (Jesp.). — XI : Barumbu (M. Laur. 1371). — XII c : Gombari [la Benda] (Ser. 591). — XIII a : Stanleyville (M. Laur. 1361, 1364). — XV : Bandaka-Kole (Flam.).

ZYGODIA Benth.

Zygodia subsessilis Benth. in *Hook.* Icon. pl. XII (1876) 73; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 191; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 218.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

ONCINOTIS Benth.

Oncinotis glabrata Stapf ex *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 674 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 222; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 255.

1907 (Knut Jespersen). — VIII : Bokungu (Jesp. 85).

Oncinotis glandulosa Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 221; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 255.

1907 (L. Pynaert). — VII : Eala (Pyn. 1301, 1982).

Oncinotis hirta Oliv. in *Hook.* Icon. pl. XIII (1878) t. 1232; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 223; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 7-8 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 255.

1900 (J. Gillet). — V : rég. de Kisantu (Gill.). — VIII : Mondombe; Belo (Jesp.).

Oncinotis Jesperseni De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 256.

1907 (Knut Jespersen). — VIII : secteur de Mondombe (Jesp. 12).

Oncinotis tenuiloba Stapf in *Kew Bull.* (1898) 307, in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 41; *Reliq. Dewevr.* (1901) 156; III. fl. Cgo (1904) 131, t. 76 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 222; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 580 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 257.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisautu (Gill. 1269). — VIII : secteur de Mondombe (Jesp.); Eala (M. Laur. 673; Pyn. 533). — IX : env. de Lukasa (Dew. 883).

MOTANDRA A. DC. (1)

Motandra guineensis [Thonn.] A. DC. in DC. Prodr. VIII (1844) 423; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 672; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1893) 44 et Reliq. Dewevr. 1901 155; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 257.

1891 (F. Demense). — Congo (Dem.). — VIII : Mondombe et env. (Jesp.). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Dem.). — XIII d : env. de Kasouga (Ém. Laur.).

Motandra Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1898) 17 [B. S. B. B. XL, 23]; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 17; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 225, 613.

1899 (Ed. Luja). — XV : Luþua [Kasai] (Luja, 274, 287).

DEWEVRELLA De Wild.

Dewevrella cochliostema *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 549, t. 144, 145 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 250.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 587, 653 a); Eala et env. (Pyn. 398, 594, 733, 1119, 1674; M. Laur.); Bombimba (M. Laur. 1161). — IX : Bokungu [sect. de Mondombe] (Jesp.).

ASCLEPIADACEAE

CRYPTOLEPIS R. Br.

Cryptolepis Debeerstii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 180.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

Cryptolepis Hensii *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 246; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 180, (1906) 304 et Miss. Laurent (1906) 263.

1888 (Fr. Heus). — IV : la Tombi près Lutete (Heus). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimueza; env. de Kisantu (Gill.); bassin de la Sele (But.).

(1) *L'Urceola esculenta* *Benth.* [in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. III, 658] de l'Asie tropicale, est cultivé à Mango [XV] (Flam.) [Conf. *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo (1908) 257].

ECTADIOPSIS Benth.

Ectadiopsis Buettneri *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 219; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 252, in obs.

1885 (R. Buettner). — V : Léopoldville (Buett.).

Ectadiopsis scandens *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 219; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 108; *Stapf in Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 249, in obs.

Cryptolepis — *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 308; *Stapf in Dyer l. c.* 249.

1899 (Edg. Verdick). — V : Dolo (Schlt.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Obs. — M. Stapf [l. c.] croit que cet *Ectadiopsis* doit être réuni au *Cryptolepis Welwitschii* Hiern.

TACAZZEA Decne.

Tacazzea apiculata *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 108; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 320 et in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1900) 454; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 35]; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 267; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 180.

1899 (J. Gillet). — V : Kisautu (Gill. 259, 555, 1033, 2283).

Tacazzea pedicellata *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 115; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 192; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 262.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3483, 3488).

RAPHIONACME Harv.

Raphionacme Michelii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 181.

1900 (R. Butaye). — V : entre Kisautu et le Kwango (But.). — VI : plateau de Kimbele (Cabra et Michel): entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel, 172, 177).

Raphionacme splendens *Schlechter* in *Journ. of Bot.* XXXIII (1895) 301; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 271, 614; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 181.

Raphiacme — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 322.

R. macrostemou *K. Schum.* l. c. XXXIII (1903) 322, in obs.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.); Haut-Marungu (Deb.).

Raphionacme Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 182.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le long de la Lufira. — Nom vern. : **Kabutumpa** (Verd. 283).

CHLOROCODON Hook. f.

Chlorocodon Whitei *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1871) t. 5898; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 255; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 180, (1906) 304.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu; entre Tumba et Kimpesse (Gill.); env. de Sanda (Odd.).

PERIPLOCA L.

Periploca nigrescens *Azél.* *Stirp. guin. med. sp. nov.* I (1817) 2; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 681; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 35] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 158; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 258; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 180, (1906) 304; II (1907) 65, t. 34; *Miss. Laurent* (1906) 263-268, t. 86, 87, fig. 37-38 et *Not. pl. util. ou intér.* du Cgo, II (1906) 83-95, t. 21-22.

P. Preussii *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 117 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzefam.* IV, 2 (1895) 216, fig. 61 R-V; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 41.

P. nigricans *Schlechter* *Westafr. Kantsch.-Exped.* (1900) 308.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Cabra). — II a : entre Samba et Jangu (Cabra). — IV : Lukungu (Dew.). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Dipengo-Pungu** (Gill.; Gent.); env. de Kimuenza (Gill.). — VI : Madibi (Leser.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Eala et env. (M. Laur. : Pyn.); Wangata (Dew.). — IX : Umangi (Krek.). — X : Imese; Bamoko (Ém. et M. Laur.). — XII b : entre Bambili et Kirarunga (Ser.). — XIII : Motumbe (Dew.). — XV : rég. du Kasai (Sap.) : Lubue (Luja); Kamba (Ém. et M. Laur.); Kondue [concession de l'Abir]. — Nom vern. : **Kibemlése** (Leser.).

SECAMONE R. Br.

Secamone Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 191.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 602).

TOXOCARPUS Wight et Arn.

Toxocarpus Lujaei [*De Wild. et Th. Dur.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 191.

Rhynchostigma Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 38 [B. S. B. B. XXXVIII, 208].

1898 (Éd. Luja). — V : env. de Léopoldville; Kinuenza (Gill. 2124); Sabuka (Luja).

XYSMALOBIUM R. Br.

Xysmalobium decipiens *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 250 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 301; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 682.

X. Holubii *Scott-Elliott* in *Journ. of Bot.* XXVIII (1890) 365 pr. p.; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 302; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 182; *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 120 in obs.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1105).

Xysmalobium dissolutum *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 119 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 233; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 192.

Asclepias — *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 309; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 347.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1227).

Xysmalobium Holubii *Scott-Elliott* in *Journ. of Bot.* XXVIII (1890) 365 [pr. max. pte]; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 302; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1894) 182.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.).

Xysmalobium spathulatum [*K. Schum.*] *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 312.

Schizoglossum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 120; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 192; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 77 [B.S.B.B. XXXVII, 120].

1880 (von Mechow). — VI : Chasamango (Mech.). — XVI : Haut-Marugu (Deb.); Pweto (Desc.).

Xysmalobium tricorniculatum [*K. Schum.*] *Th. et Héll. Dur.*

Schizoglossum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 121 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 233; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 192.

X. andongense *Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1898) 682; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 309.

1876? (P. Pogge). — XV : Musumba (Pg. 379, 380).

SCHIZOGLOSSUM E. Mey.

Schizoglossum Cabrae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 182.

1896 (Alph. Cabra). — II a : la Lemba (Cabra, 129). — V : Kisantu (Gill. 701).

Schizoglossum Debeerstianum *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 323; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 518.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Buluba [Marungu] (Deb.).

Schizoglossum macroglossum *K. Schum. ex De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 158 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 323; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 618.

1905 (A. Dewèvre). — IV : Tumba-Lukuti (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Dem.).

GOMPHOCARPUS R. Br.

Gomphocarpus amoenus *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 124 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2, (1895) 236; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 122].

Asclepias Schumanniana *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* 1 (1898) 686; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ 346; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 188.

1895 (Gust. Debeerst). — V : env. de Kisautu (Gill.). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Gomphocarpus cristatus *Decne* in *Annal. sci. nat. Sér. 2*, IX (1838) 325, t. 52, fig. 3 et in *DC. Prodr.* VIII, 562; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV², (1895) 236.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Obs. — M. N. E. Brown [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ 350] réunit cette espèce à l'*Asclepias palustris* Schlechter *G. paluster* K. Schum.

Gomphocarpus dependens *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 125 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 236; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 193.

Asclepias — *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 352.

1882 (P. Pogge). — XV : Musumba (Pg.).

Gomphocarpus foliosus *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 126 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 237; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 193.

Asclepias — *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 349.

1882? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1130).

Obs. — Il faut peut-être rapporter à cette espèce un échantillon récolté entre Kingunshi et le Kasai [IV] (Pg. n. 975).

Gomphocarpus fruticosus [*L.*] *R. Br.* in *Mem. Wern. Soc.* I (1809) 38; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 120].

Asclepias fruticosa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 216; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 685; *S. Moore* in Journ. of Bot. XI, 1902, 255; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 330.

G. abyssinicus *Decne* in *DC.* Prodr. VIII (1844) 557.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : rég. du Tanganika (Deb.).

Gomphocarpus lineolatus *Decne* in *Annal. sci. nat. Sér. 2*, IV (1838) 326 et in *DC.* Prodr. VIII, 558; *K. Schum.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 322; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 193; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 41.

Asclepias — *Schlechter* in Journ. of Bot. XXXIII (1895) 336 et *Westaf.* Kautsch.-Exped. (1900) 308; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 685; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ 322.

G. bisacculatus *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, II (1887) 341.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Dolo (Schlt.); Kisantu (Gill.); rég. de la Lula-Lumene (Hendr.); Kinanga (Odl.); — VI : Bandundu (Ém. et M. Laur.). — IX : Luozu (Luja). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu : le Lofoi (Verd.); Toa (Desc.).

Gomphocarpus paluster *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 127; XXX (1901) 382.

Asclepias — *Schlechter* in Journ. of Bot. (1895) 336; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 319.

1901 (Alph. Cabra et F. Michel). — VI : vallée de la Tawa (sous-affl. du Kwango (Cabra et Michel).

Gomphocarpus roseus *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 127 et in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 237; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 193.

Asclepias rubens *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 348.

1876? (P. Pogge). — VI : bassin du Kwango à Kitamba (Pg. 614).

Gomphocarpus semiamplectens *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 128; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 193.

Asclepias — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 685; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 321.

1882? (P. Pogge). — Bas-Congo (But.). — V : Kimuenza (Gill.); bassin de la Sele (But.). — XV : Mukenge (Pg. 1006, 1077, 1141); entre le Lubilasch et le Lomami (Pg. 1037).

Gomphocarpus tomentosus *Burch.* Trav. South-Afr. I (1822) 543; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 B S. B. B. XXXVII, 123; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. 1901 157 et *Pl. Gillellianae*, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 35].

Asclepias Burchellii *Schlechter* in Journ. of Bot. XXXIII (1895) 336. in obs.; XXXIV (1896) 432; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 335.

1895 (Gust. Debeerst). — V : Kisautu (Gill). — XIII d : env. de Rabanga (Dew.).

Obs. — Cette plante cultivée à Pala [XVI] serait originaire de Kibanga [XVI] (Deb.).

STATHMOSTELMA K. Schum.

Stathmostelma chironioides *K. Schum.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.*
Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829]; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1906) 305.

1890 (F. Demcuse). — V : Kimpesse (Dem. 5); Kisautu (Gill.); env. de Lemfu (But.).

Stathmostelma incarnatum *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII (1893)
130 et in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 210; *Th. Dur.*
et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 193; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 686.

Asclepias coccinea *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 340.

1876? (P. Pogge). — VI : bassin du Kwango à Kitamba (Pg. 381, 382, 608).

Stathmostelma Laurentianum *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII²
(1894) 102; XXXIV² (1895) 87; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo
(1896) 194.

Asclepias — *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 312.

1893 (Ém. Laurent). — V : Bas-Congo (Em. Laur.).

Stathmostelma pedunculatum *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII
(1893) 132 et in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 322; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et
Moy.-Cgo, I (1904) 189.

Asclepias macrantha *Hochst.* in *Flora* (1844) 101; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop.
Afr. IV¹, 340.

1902 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Stathmostelma Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, I
(1904) 188 [non 305].

Asclepias — *De Wild.* l. c. I (1904) 188, in syn. [non 305].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulombo** (Verd. 361).

Stathmostelma Wildemanianum *Th.* et *Hél. Dur.*

S. Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 305, in syn. [non
188 ejusl. oper.].

Asclepias — *De Wild.* l. c. I (1904) 305 [non 188].

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Lofoi (Verd.).

ASCLEPIAS L.

Asclepias affinis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 184.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 184, in syn.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Vieux-Kasongo (Dew. 952 b).

Asclepias Buchwaldii [*Schlechter et K. Schum.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 185.

Gomphocarpus — *Schlechter et K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 324.

Le type croît dans l'Afrique orient. allem.

— — var. **angustifolia** *De Wild.* l. c. (1904) 185.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Vieux-Kasongo (Dew. 952).

Asclepias Cabrae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 185; II (1908) 384.

1902 (Alph. Cabra et F. Michel). — V : Kisantu-Makela (Van Houtte). — VI : vallée de la Tawa (Cabra et Michel, 52).

Asclepias congolensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 186.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 186, in syn.

1899 (J. Gillet). — Bas-Congo (But.). — V : Kisantu (Gill.).

Asclepias Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 186.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 187, in syn.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : brousse au delà du grand marais de Nyangwe (Dew. 1035).

Asclepias erecta *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 187.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 187, in syn.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.).

Asclepias katangensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 187.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 188, in syn.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

PENTARRHINUM E. Mey.

Pentarrhinum abyssinicum *Decne* in *DC.* Prodr. VIII (1844) 503; *Deless.* Icon. select. pl. V, 30, t. 70; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl.

Ost.-Afr. 323 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 234, fig. 68 K; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 379; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 42.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu sur les bords de l'Inkisi (Gill.).

P. abyssinicum var. **angolense** *N. E. Br.* l. c. IV¹ (1902) 379; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 189; *N. E. Br.* l. c. IV¹, 379.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.); Lemfu (But. in Gill. 1180).

MARGARETTA Oliv.

Margaretta Corneti *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIV² (1895) 90; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 108; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 376, 618.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.); Lukafu (Verd. 284).

— — var. **pallida** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 108; *Stapf* l. c. IV¹, 618.

1899 (Edg. Verdicke). — XVI : Lukafu (Verd. 133).

Margaretta Verdickii Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 183.

1899 (Edg. Verdicke). — XVI : Lukafu (Verd. 148 b).

CYNANCHUM L.

Cynanchum congolense *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 190.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. d'Équateurville [Wangata] Dew. 644.

Cynanchum Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 52; *Pl. Gillelianae*, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I. 35] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 159; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 400.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 955). — XIII d : env. de Kabanga [Dew. 976 a; Mwauana-Tumbwe Dew. 901. — Noms vern. : **Bulula** [Kasongo]; **Eletnelamba** [Ikwangula] (Dew.).

Cynanchum minutiflorum *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 252 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 28 [B. S. B. B. XXXVII, 423].

1888 (Fr. Hensl.). — V : le Stanley-Pool (Hensl. B. 77).

Obs. — M. N. E. Brown [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 396] réunit cette espèce au *C. schistoglossum* Schlechter.

Cynanchum polyanthum *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 253; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 393; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 190.

Vincetoxicum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 136; *Th. Dur et Schinz* Étud. fl. Congo (1896) 194.

C. obscurum *K. Schum.* in *Engl. et Prantl l. c.* IV, 2 (1895) 253; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 688.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill. 759, 942, 2212). — VI : env. de Bokakata (Dew. 767). — XII d : Munza (Schw. 3345).

Cynanchum schistoglossum *Schlechter* in *Journ. of Bot.* XXXII (1895) 274; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 688; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 395, pr. p.; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 309.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — V : Dolo (Schlt. 12484).

DAEMIA R. Br.

Daemia extensa [*Jacq.*] *R. Br.* in *Mem. Wern. Ser.* I (1809) 50; *Decne* in *DC. Prodr.* VIII, 544; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 35; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 33 et Reliq. Dewevr. (1901) 159; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 690; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 388; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 117-118; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 190 et *Miss. Laurent* (1906) 269.

Cynanchum — *Jacq.* Misc. bot. II (1781) 752 et *Icon. pl. rar.* I, t. 56.

Asclepias scandens *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1805) 93, t. 56.

1895 (A. Dewèvre). — II a : la Lemba (Dew.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VII : Kutu (Coll.). — IX : Yabosumba (Thonn. ?). — XV : Kondue; Mange; Munungu (Ém. et M. Laur.).

GYMNEMA R. Br.

Gymnema subvolubile [*Schumach. et Thonn.*] *Decne* in *Annal. sci. nat. Sér.* 2, IX (1838) 277 et in *DC. Prodr.* VIII, 621; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 159.

Cynanchum — *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 150.

1896 (A. Dewèvre). — V : village de Moe au-dessus de Bolobo (Dew.).

Obs. — M. N. E. Brown [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 414] réunit cette espèce à la précédente.

Gymnema sylvestre [*Retz.*] *R. Br.* in *Mem. Wern. Soc.* I (1809) 33; *Schum.* in *DC. Prodr.* VIII, 621; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 43; *K. Decne* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 325; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.*

IV¹, 414; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 193, 305 et Miss. Laurent (1906) 270.

Periploca sylvestris Retz, Observ. bot. II (1780) 15.

Gynemna rufescens Deene in Annal. sci. nat. Sér. 2, IX (1838) 277.

G. geminatum Hiern [non R. Br.] Cat. Welw. Pl. I (1898) 691.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

TYLOPHORA R. Br.

Tylophora congoensis *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. (1900) 309 [nom. tant.] et in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 51, fig. 9.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12551).

Tylophora Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 193.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1656).

Tylophora gracilis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 194.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 268, 572, 1710).

Tylophora sylvatica *Deene* in Annal. sci. nat. Sér. 2, IX (1838) 273; *K. Schum.* in Engl. Pfl. Ost-Afr. 325; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 691; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 407; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 269.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — XIII a : Romée (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.).

SPHAEROCODON Benth.

Sphaerocodon platypoda *K. Schum.* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 225.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Safoi** (Verd. 411).

MARSDENIA R. Br.

Marsdenia latifolia [*Benth.*] *R. Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. (1900) 270; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 270.

Gongronema — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 456; *Walp.* Annal. Bot. III, 62; *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 236; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 196.

M. racemosa *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 147; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 692; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 425; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 194.

1881 (P. Pogge). — IV : Kitobola (Luja), — V : Kisantu ; entre Kisantu et Dembo (Gill.). — VII : Ibalé (Ém. et M. Laur.). — XV : la Haut-Lulua (Pg. 1249).

PERGULARIA L.

Pergularia africana *N. E. Br.* in Kew Bull. (1895) 259 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 426; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 195 et Miss. Laurent (1906) 270.

P. sanguinolenta *Britten* [non *Lindl.*] in Traus. Linn. Soc. Ser. 2, IV, 29; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 326.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 174); Kimuenza (Gill. 1612, 1685). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Obs. — L'habitation signalée par A. Dewèvre, en 1896 [au N. du Stanley-Pool] est dans le Congo français.

FOCKEA Endl.

Fockea multiflora *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 145, in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 296, fig. 90 P-V et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 326; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 110; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 428.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kombodi**; **Bulembilimbu** (Verd.)

Obs. — M. N. E. Brown [l. c. IV¹, 620, in obs.] a ômis l'avis que cette espèce devrait probablement être réunie au *F. Schiensei* N. E. Br.

DREGEA E. Mey.

Dregea rubicunda *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 147 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 326, t. 29, fig. A-II; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 225 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 195.

Marsdenia — *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1903) 421.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tjama-Zebele** (Verd.).

CEROPEGIA L.

Ceropegia angustiloba *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 109; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 621.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutama** (Verd. 367).

Ceropegia Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 192.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.).

Ceropegia Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 192.

1895 (A. Dewevre). — II a : entre Tshoa et Tshia (Dew. 399).

Ceropegia Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo. III (1899) 98 [B. S. B. B. XXXVIII², 96]; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 452; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, (1904) 193.

1898 (J. Gillet). — V : Kisantu; env. de Dembo (Gill. 349. 706, 3026).

Ceropegia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 409; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 620.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom veru. : **Tumko** (Verd. 389).

BRACHYSTELMA R. Br.

Brachystelma nauseosum *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 191.

1901 (Alph. Cabra et F. Michel). — III : vallée de la Ufura [affl. de la Pozo] (Cabra et Michel).

LOGANIACEAE

MOSTUEA Fr. Didr.

Mostuea Brunonis *F. Didrichs.* [Pl. nonnull. Mus. Holm.] in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1855) 87; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 195; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 505.

1884 (R. Buettner). — III : Tondea (Buett. 400, 401).

Mostuea densiflora *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 198; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 195; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 508; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 63.

1893 (Èm. Laurent). — II a : Bingila (Dup.); le Mayumbe (Èm. Laur.); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — VI : env. de Madibi (Leser. 117).

Mostuea Duchesnei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 173; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 623.

1899 (Èm. Duchesne). — XIII a : Stanleyville (Èm. Duch. 16).

Mostuea Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 174; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 623.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. : Gill. 2914, 2928).

Mostuea Lujaei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 15 [B. S. B. B. XXXIX², 67]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 506; *De Wild.* Miss. Laurent 1906) 260 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 175, (1906) 307; II (1907) 63.

1898 (Éd. Luja). — V : Sabuka (Ém. Laur.); entre Dembo et le Kwango (But. in Gill. 1490); Kimuenza (Gill. 1902, 2197); Sanda (De Bronw. in Gill. 311) et env. (Odd. in Gill. 3567).

Mostuea penduliflora *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1898) 108; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 505.

1881 (P. Pogge). — XV : la Lulua [pays des Bashilange] (Pg. 886, 1129).

Mostuea Schumanniana *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 560; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 508; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 175 et Miss. Laurent (1906) 260.

1888 (F. Demeuse). — I : Moanda (Gill. 3230). — XV : le Sankuru (Dem. 21); Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Mostuea Taymansiana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 174; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 623.

1899 (Éd. Luja). — XV : Bena-Dibele (Luja, 252).

COINOCHLAMYS T. Anders.

Coinochlamys angolana *S. Moore* in Journ. of Bot. XIV (1876) 322; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123].

Mostuea — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 700; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ 510.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Baugala (Ém. Laur.). — XIII a : les Stanley-Falls (Ém. Laur.).

— — var. **Laurentii** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 260.

M. angolana *Hiern* var. — *De Wild.* l. c. (1906) 260, in syn.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : la Lukula (Ém. et M. Laur.). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

Coinochlamys congolana *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 197; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII,

123]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 42; Pl. Thonnerianae (1900) 42 et Reliq. Dewevr. (1901) 160.

Mostuea congolana *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1903) 509.

1888 (Fr. Hensl. — V : env. de Lukolela Dew. 743. — IX : Baugala (Hensl. C. 169); Upoto (Thonn.).

Coinochlamys Poggeana *Gily* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 559; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 196.

Mostuea — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1903) 510

1876? (P. Pogge) — XV : Mukeenge (Pg. 254).

NUXIA Lam.

Nuxia dentata *R. Br.* in *Salt* Voy. to Abyss. Append. (1814) 62; *Benth.* et *A. DC.* in *DC.* Prodr. X, 435; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 124; *Th. Dur. et De Wild.* Mal. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 700; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 513.

1891 (G. Descamps). — XVI : la Lufira (Desc.).

BUDDLEIA L.

Buddleia madagascariensis *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) 513; Bot. Mag. (1828) 1. 2824; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 447; *Bak.* Fl. of Maurit. 233; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 196; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 517, in obs.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech.-Loesche).

ANTHOCLEISTA Afzel.

Anthocleista Baertsiana *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1. 829]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 198; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 625.

1899 (J. Gillet). — V : env. de Leopoldville (Gill. 2543); Kisautu (Gill. 561).

Anthocleista Buchneri *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 576; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 194.

1880 (Max Buchner). — Ind. non cl. : Bassin du Luatschim (Buch. 618).

Obs. — M. Baker [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 539] rapporte cette espèce à l'*A. nobilis* G. Dou.

Anthocleista inermis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 63; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 191; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 541.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ile près de Ponta da Lenha (Naum.).

Anthocleista innocua *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1887) 63.

1874 (Fr. Naumann.). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

Obs. — Cette espèce n'est pas relevée dans la *Flora of tropical Africa*

Anthocleista Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 262.

1903 (Ém. et Marc Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.).

Anthocleista Liebrechtsiana *De Wild.* et *Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo.* IV (1899) 19 [B. S. B. B. XXXVIII², 96] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 160; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 540; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 262.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Eroke** (Dew. 829). — VII : la Kiri (Ém. et M. Laur.). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

Anthocleista Schweinfurthii *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 579; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 195; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 541.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Mbruele (Schw. 3726).

Anthocleista squamata *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gillelianae*, II (1901) 90 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 830]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 625; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 262 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 198.

1900 (J. Gillet). — V : Kimueuza (Gill. 1773) ; bords de la Lukaye (Gér. in Gill. 1921). — IX : Ile en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Anthocleista Vogelii *Planch.* in *Hook. Icon. pl.* VIII (1848) t. 793; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1887) 63.

1874 (Fr. Naumann.). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

USTERIA Willd.

Usteria guineensis *Willd.* in *Ges. Naturf. Fr. Berlin*, X (1792) 55; *A. DC.* in *DC. Prodr.* IX, 22; *Hook.* *Niger Fl.* (1849) 459, t. 45; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo.* II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123]; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 517; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.*

IV¹, 517; *De Wild.*, Miss. Laurent (1906) 261 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 66, (1904) 175; II (1907) 63.

U. vulgaris Afzel. Gen. pl. Guin. (1804) 27, c. fig.

1896 (Ém. Laurent). — V : env. de Leopoldville; Kimuenza (Gill); env. de Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Lescr.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — XI : Basoko (Em. Laur.).

STRYCHNOS L (1)

Strychnos congolana Gilg in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 120; *De Wild.*, et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 161; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 521.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo. — Nom vern. : **Golo** (Dew. 931).

Strychnos densiflora Baill. in *Adansonia*, XII (1879) 369; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 528; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 289-290.

S. suaveolens Gilg in Engl. Jahrb. XVII (1893) 566; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 196.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : bassin du Mbruoie [Mangbettu] (Schw. 3597).

Strychnos Dewevrei Gilg in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 119 et ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 91 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 831]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 161; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 551; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 175; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 291-297 et Miss. Laurent (1906) 261.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 845). — V : env. de Sabaka; Kwamouth (Dew.); Kisantu (Gill); Lukolela (Dew. 845). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.).

Strychnos floribunda Gilg in Engl. Jahrb. XVII (1893) 566; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 195; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 527.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Kapili, pays des Mangbettu (Schw. 3558).

Strychnos Gilletii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 176; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 624.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 134, 880).

(1) Voir l'article de M. Ém. De Wildeman, sur les *Strychnos* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 285-297).

Strychnos gracillima *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 573; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 97; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 536.

Le type croît dans le Bahr-el-Ghazal.

— — var. **paucispinosa** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 97.

1899 (Édg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kakunta-Puku** (Verd. 48).

Strychnos innocua *Delile* Cent. pl. Méroë (1826) 53; *DC.* Prodr. IX, 17; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo. (1896) 195; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 533.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech. Loesche).

Strychnos Kipapa *Gilg* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 256 et in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 118; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 521; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 291, in obs.

1876? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 630).

Strychnos longicaudata *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 570; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 196; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 527.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu à Bongwa (Schw. 3610).

Strychnos pungens *Solered.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 554 et in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 40; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 42; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 704; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 530; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 64.

S. occidentalis *Solered.* l. c. IV, 2 (1890) 40.

1876? (P. Pogge). — Bas-Congo (Gill. 3780). — V : brousse du distr. du Stanley-Pool (Ém. Laur.); Dolo (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XV : Musumba (Pg. 375). — Ind. non cl. : Punda (Pinda?, VI) (Lescr. 274).

Strychnos Schweinfurthii *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 568; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 196; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 525.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3509).

Strychnos suberosa *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 177, (1906) 300; II (1907) 64 et Miss. Laurent (1906) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 624.

1900 (J. Gillet). — V : Dolo (Coll.?) ; Chenal (Ém. et M. Laur.) ; Lemfu (But. in Gill. 2261) ; Kisantu ; entre Dembo et le Kwang (But. in Gill. 1505). — Nom vern. : **N'Konghi** [Stanley-Pool].

Strychnos Unguacha A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 52 et Atlas, t. 73. *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 562 et in *Engl. Fl. Ost Afr.* 310; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 534.

Le type croît en Abyssinie.

— — var. **obovata** De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 98.

1899 (Edg. Verdecq) — XVI : Lukafu — Nom vern. : **Munkollo-Kollo** (Verd.).

Strychnos variabilis D. Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 178; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 623.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Leopoldville (Gill.); Kisantu (Gill. 808); Kimuenza (Gill. 1726, 2081).

GAERTNERA Lam.

Gaertnera paniculata Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) 459; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 81; II (1907) 81, 189 et *Miss. Laurent* (1906) 352; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 513.

1902 (J. Gillet). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Leopoldville et env. (Gill.; Pyn.); Galiema (Pyn.); entre Leopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.); Madibi. — Nom vern. : **Munkaman** (Sap.); Leuano (Lescr.). — VII : Ganda (Body). — VIII : Eala (M. Laur.); la Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : Nouvelle-Anvers (Pyn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XV : le Kasai; Butala; Dibebe (Ém. et M. Laur.).

Gaertnera plagiocalyx K. Schum. in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 322 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool près Leopoldville (Schlt. 12586).

GENTIANACEAE

EXACHAENIUM Griseb.

Exachaenium chionanthum *Gilg* | *Schinz* in B. Herb. Boiss. Sér. 2, VI (1906) 806; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336.

Belmontia — *Gilg* in *Baum* Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 332; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 625.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1785).

Exachaenium Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336.

Belmontia — *De Wild.* l. c. II (1908) 336.

1902 (L. Gentil). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Exachaenium Teuszii [*Vatke*] *Schinz* in B. Herb. Boiss. Sér. 2, V (1906) 807; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336.

Belmontia — *Vatke* ex *Schinz* in Viertelj. Zureh. Nat. Ges. XXXVI (1891) 334; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 197; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 554.

Tachiaenus continentalis *Bak.* in Kew Bull. (1895) 70.

1891 (G. Descamps). — XV : la Muaba près Lima [afl. du Lubudj] (Desc.). — XVI : chutes de Zilo (Desc.).

Exachaenium Wildemanianum *Gilg* in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336 [nom. tant.].

1899 (Éd. Lujá). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Mombasi (Gill. 2564); env. de Sabuka (M. Laur. 554) — V : env. de Bokala (M. Laur. 607). — XV : le Kasai (Lujá, 222).

SEBAEA R Br.

Sebaea debilis [*Welw.*] *Schinz* in B. Herb. Boiss. Sér. 2, VI (1906) 734; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336.

Exachaenium — *Welw.* in Traus. Lin. Soc. XXVII (1869) 48

Belmontia — *Schinz* in Viertelj. Zureh. Nat. Ges. XXXVI (1891) 332; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 552.

Parasia — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898), 708

1880 (von Mechow). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Dolo (M. Laur. 534). — VI : bord du Kwango (Mech.).

Sebaea oligantha [*Gilg*] *Schinz* in B. Herb. Boiss. Sér. 2, VI (1906) 736.

Belmontia — *Gilg* in Engl. Jahrb. XXVI (1898) 102; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 552.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza Gill. 2141, 2338).

EXACUM L.

Exacum quinquenervium *Griseb.* in DC. Prodr. IX (1845) 46; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 546; *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 304; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 335.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt.). — VIII : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2585).

CHIRONIA L. (1)

Chironia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, II (1908) 338.

1899 (Edg. Verdick) — XVI : plateau de Lukafu (Verd. 446).

CANSCORA Lam.

Canscora decussata [Roxb.] Schult. Mant. pl. III (1827) 229; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 123]; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 557; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, II (1908) 337.

Pladera — *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) 478; *Bot. Mag.* (1831) t. 3066.

1895 (G. Descamps). — V : Kwamouth (M. Laur. 430). — XVI : Toa (Desc.).

FAROA Welw.

Faroa affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 99; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 567.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 536).

Faroa paradoxa *Gilg* in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 337 [nom. tant.].

1903 (Aug. Hendrickx). — V : rég. de la Lumene (Hendr. in Gill. 3299).

Faroa salutaris *Welw.* in *Trans. Linn. Soc.* XXVII (1869) 46, t. 17; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. 336; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 710; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 100; *Knobl.* in *Bot. Centralbl.* LX (1894) 330; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 569.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : entre Lukafu et le Tanganika : Lukafu (Verd. 120).

LEIPHAEMOS Cham. et Schlecht.

Leiphaemos primuloides [*Bak.* *Gilg* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 104, fig. 16.

Voyria — *Bak.* in *Kew Bull.* (1894) 25; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 569.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba (Desc.).

(1) MM. Baker et Brown [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 627] disent que Baum a récolté le *Chironia transvaalensis* Gilg, dans le Congo près de Kavanga sur le Kumbango. — Nous croyons que cette localité n'est pas dans le Congo belge.

NEUROTHECA Salisb.

Neurotheca congolana *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* IV (1899) 21 [B. S. B. B. XXXVIII², 98] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 162; *Hua* in B. S. B. Fr. XLVIII, 262, 265; 337; *Bak. et N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 562.

1896 (A. Dewevre). — V : entre Lukolela [V] et Équateur [VIII] (Buett. 575). — XIII : Oukumu (Dew. 1084).

Neurotheca densa *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 337.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : sables d'Inongo (Ém. et M. Laur.).

Neurotheca loeselioides [*Spruce*] *Benth.* in *Benth. et Hook. f. Gen. pl.* II (1873) 842; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 197; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 67, (1906) 301; II (1908) 337; *Bak. et N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 560.

Octopleura — *Spruce ex Prop.* in *Mart. Fl. Bras.* VI (1865) 212, t. 58, fig. 1.

1885 (R. Buettner). — V : env. de Léopoldville; entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Dolo (Schlt.; M. Laur. 569). — IX : Bangala (Hens); entre Amadis et Surango (Ser. 353).

Neurotheca longidens *N. E. Br. ex Bak. et N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1903) 560; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 337.

1888 (Fr. Hens). — V : Dembo (Vanderyst). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VIII : Eala (Pyn. 136). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 103). — XIII : Kasuku (Dew. 1068⁴).

LIMNANTHEMUM Gmel.

Limnanthemum indicum [*L. Griseb.* Gen. et sp. Gentian. (1839) 343; *Boiss. Fl. Or.* IV, 65; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 162; *Gilg.* in *Schlechter Westaf. Kautch.-Exped.* (1900) 304; *Bak. et N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 587 et *Confr. fl. Cgo*, II (1900) 42; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 101 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 67, (1905) 301.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Po d'Inongo; entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Lukolela (Schlt.) et env. — Nom vern. : **Etoko** (Dew.). — VI : en-bouch. du Kwango (Gill.). — XVI : Lac Moero (Verd.). — Ind. uoa. et. : Kipilia (Ém. Laur.).

HYDROPHYLLACEAE

HYDROLEA L.

Hydrolea guineensis *Choisy* in *Annal. sci. nat. Sér. 2, 1* (1834) 180;
DC. Prodr. X, 180; *Bak. et N. E. Br. in Dyer Fl. trop. Afr. IV¹, 3*

H. glabra *Schumacher, et Thomm. [non Sm.] Beskr. Guin. Pl. (1827) 161*; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 197.*

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lutete (Hens, A. 9).

BORAGINACEAE

CORDIA L.

Cordia aurantiaca *Bak.* in *Kew Bull. (1894) 24*; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 198*; *Hiern Cat. Welw. Pl. I, 715*; *Bak. et C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 10.*

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Cordia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo. III (1899) 29* [B. S. B. B. XXXVIII², 37]; *Pl. Gilleltianae, II (1901) 91* [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 831] et *Reliq. Dewevr. (1901) 163*; *Bak. et C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 9.*

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 1344). — XIII d : env. de Vieux-Kasongo (Dew. 915).

Cordia Gilletii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 72.*

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 1344. 1858).

Cordia Liebrechtsiana *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 39* [B. S. B. B. XXXVIII², 38] et *Reliq. Dewevr. (1901) 164*; *Bak. et C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 13*; *De Wild. Miss. Laurent (1905) 170.*

1895 (A. Dewèvre) — Congo (Dew.). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.).

EHRETIA L.

Ehretia abyssinica *R. Br. in Salt Voy. 10 Abyss. app. (1814) 64*; *Fresen. in Flora (1838) 698*; *DC. Prodr. IX, 506*; *A. Rich. Tent. fl.*

Abyss. II, 82; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 198; *Bak.* et *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 23.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Boma (Naum.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Ehretia Guerkeana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 223; *Bak.* et *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 21.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 308).

Ehretia longistyla *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 44 et Reliq. Dewevr. (1901) 164; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 309; *Bak.* et *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 22.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill. 3153). — II : Boma (Dew. 416). — III : Matadi (Gill.).

HELIOTROPIUM L.

Heliotropium indicum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 130; *Bot. Mag.* (1816) t. 1837; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 152; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 337; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 719; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 198; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 164; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 170 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 36, (1904) 198; *Bak.* et *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 32.

Tiaridium — *Lehm.* Asperifol (1818) 14; *Cham.* in *Linnaea* (1829) 152, t. 5, fig. 2.

Heliophytum — *DC.* Prodr. IX (1845) 556.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II : Boma. — Nom vern. : **Leco** (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — V : Kisautu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Baugala (Hens); Umangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.). — XII d : le Kibali (Schw.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Heliotropium katangense *Guerke* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 223; *Bak.* et *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 43.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kakabolo-Kampanga** (Verd. 141, 182).

Heliotropium ovalifolium *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 38; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 150; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 337; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 116; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 718; *Bak.* et *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 34.

H. coromandelianum *Retz.* Observ. bot. II (1781) 9; *Wight* Icon. pl. Ind. or. IV, t. 1388.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd.).

TRICHODESMA R. Br.

Trichodesma Droogmansianum *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 17 [B. S. B. B. XXXIX², 69]; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 47.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Trichodesma zeylanicum [*L.*] *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 496; *DC.* Prodr. X, 172; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 91; *Bot. Mag.* (1855) t. 1820; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 43; *Guerke* in *Engl. Pil.* Ost-Afr. 337; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 51.

Borago — *L. Mant.* pl. II (1771) 202; *Jacq.* Icon pl. var. II, t. 314.

1891 (G. Descamps). — XVI : la Luaba [affl. du Lubudi] (Desc.).

CYNOGLOSSUM L.

Cynoglossum lanceolatum *Forst.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 41; *DC.* Prodr. X, 155; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 721; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 54.

C. micranthum *Desf.* Tabl. Écol. bot. Mus. Paris, éd. 1 (1804) 220; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 43.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

CONVOLVULACEAE

EVOLVULUS L.

Evolvulus alsinoides [*L.*] *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 392; *Choisy* in *DC.* Prodr. IX, 447; *Hallier f.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVIII (1893) 85; *Dammer* in *Engl. Pil.* Ost-Afr. 328; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 204; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 198; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 724; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 67.

Convolvulus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 157.

1888 (Fr. Hensl.). — I : M'anda (Gill.). — III-IV : la Lufu (Hensl.). — XVI : Toa (Desc.).

— — var. **procumbens** *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 94; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 85; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 42 [B. S. B. B. XXXVII, 87].

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

E. alsinoides var. **strictus** *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 246; *Dammer* in *Engl. Pl. Ost-Afr* 318; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 42 [B. S. B. B. XXXVII, 87].

E. alsinoides L. var. *erectus* *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 94; *Hallier* f. in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 85; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 205.

E. linifolius L. Sp. pl. ed. 2 (1762) 399.

E. heterophyllus *Labill.* Sert. Austro-Caled. I (1824) 24, t. 29.

1888 (F. Hens). — IV : Lukungu (Hens).

BONAMIA Thou.

Bonamia minor *Hallier* f. in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 91 et in B. Herb. Boiss. V (1897) 999; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 205; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 80; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 43 [B. S. B. B. XXXVII, 88]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 110.

1882 (P. Pogge). — XVI : bassiu du Kazembe [tributaire du Lualaba] (Desc.); Lukafu. — Nom vern. : **Kisowa** (Verd. 592). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1214).

PREVOSTEA Choisy.

Prevostea breviflora *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 70.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2086, 2143).

Prevostea Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 18 [B. S. B. B. XXXIX², 70]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 83.

1897 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra, 88, 92).

Prevostea campanulata [*Bak.*] *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 a (1897) 17; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 44; *Hallier* f. in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 92; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 82.

Breweria — *Bak.* in *Kew Bull.* (1894) 68

1891 (G. Descamps). — XVI : le Luele [affl. du Buchi] (Desc. .

Prevostea Oddoni *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 306.

1904 (Ad. Odden). — V : rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3632).

Prevostea Poggei *Dammer* ex *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 43 [B. S. B. B. XXXVII, 88]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 84.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1090, 1172).

PORANA Burm.

Porana subrotundifolia *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 111.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 481, 525).

Obs. — MM. Baker et Readle [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV³, 189] rapportent ce *Porana* à *Ipomoea shirensis* Oliv.

JACQUEMONTIA Choisy.

Jacquemontia capitata [*Desv.*] *G. Don* Gen. Syst. Bot. IV (1837) 283; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 95; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 204; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV³, 85; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 200.

Convolvulus — *Desv.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) 351.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens); Sonagungu (Luja). — V : le Stanley-Pool (Hens); près de Kwamouth (Ém. Laur.); Kinshasa (Dem.); Kisautu; Dembo (Gill.). — XII d : Congo bor. or. (Ser.).

Obs. — Dewèvre dit que cette espèce est C. dans la brousse.

ANISEIA Choisy.

Aniseia martinicensis [*Jacq.*] *Choisy* in Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève, VIII (1838) 144 et in Prodr. IX (1845) 430; *Meisn.* in *Mart.* Fl. Brasil. VII (1869) 320, t. 115, fig. 2; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1893) 96 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 43 [B. S. B. B. XXXVII, 88].

Ipomoea — *Jacq.* Hist. stirp. Amer. (1780) 26, t. 17.

Aniseia uniflora *Choisy* in Mém. Soc. phys. et hist. nat. phys. Genève, VI (1834) 483 et in *DC.* Prodr. IX (1845) 431; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 203; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV³, 88.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

HEWITTIA Wight et Arn.

Hewittia sublobata [*L. f.*] *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 441; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 114; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 203; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 168.

Convolvulus — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 135.

C. bicolor *Vahl* Symb. bot. III (1794) 25.

Hewittia — *Walk.-Arn.* in Madras Journ. of sci. V (1837) 22; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III, t. 835; *Hallier f.* in B. Herb. Boiss. V (1897) 375, 379, 380, 1008 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 44 [B. S. B. B. XXXVII, 89]; *De Wild.*, et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 166; *Bak.*, et

Rendle in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 100; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308; II (1907) 199.

Shuterea bicolor *Choisy* in Mem. Soc. phys. et hist. nat. Genève, VI (1833) 486 et in *DC.* Prodr. IX, 435.

1816 (Chr. Smith). — Congo (But.); Bas-Congo (Sm.). — IV : Luvituku (Dem.); Lutete (Hens). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu (Gill.). — VI : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XIII d : Nyangwe (Pg.). — XV : Isaka (Ém. et M. Laur.). — XVI : entre le Lubilash et le Lomami (Pg.).

MERREMIA Dennst.

Merremia angustifolia [*Jacq.*] *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVI (1893) 552; XVIII (1894) 117; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 111; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1904) 200.

Ipomoea — *Jacq.* Collect. bot. II (1788) 367 et Icon. pl. rar. II (1786-1793) 10, t. 317; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 199 pr. p.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — V : env. de Kwamouth (Biel.).

— — var. ***ambigua*** *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 117; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38; II (1898) 46 [B. S. B. B. XXXVI², 82; XXXVII, 91]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 729; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 167; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 306.

Convolvulus filicanlis *Vahl* Symb. bot. III (1794) 24.

M. hastata *Hallier f.* l. c. XVIII (1893) 117 [quoad specim. afric.].

1891 (G. Descamps). — Bas-Congo, en plusieurs endroits (Cabra). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — II : Boma (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Banza-Manteka (Hens). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Bulebu (Dew.); Lemfu (But.); Kisantu (Gill.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — XVI : Lac Musolo (Desc.); Haut-Marungu (Deb.).

Merremia hederacea [*Burm.*] *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 118; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 205; *Hallier f.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 46 [B. S. B. B. XXXVII, 91] et Reliq. Dewevr. (1901) 167; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 309.

Evolvulus — *Burm.* Fl. Ind. (1768) 77, t. 30, fig. 2.

Ipomoea chryseides *Ker* in Bot. Reg. IV (1818) t. 270; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I (1840) t. 157.

M. convolvulacea *Dennst.* Schluess. Hort. Malab. (1818) 34; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 114.

1888 (Fr. Hens). — II a : Zobe (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.). — X : l'Ubangi (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Lone Island [Angola?] [Buett.].

Merremia pentaphylla [*L.*] *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVI (1894) 552; XVIII (1893) 115 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I

(1897) 36; II (1898) 46 [B. S. B. B. XXXVI², 82; XXXVII, 90] et Reliq. Deweyr. (1901) 167; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 728; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 108; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 309.

Convolvulus pentaphyllus L. Sp. pl. ed. 2 (1762) 223 pr. p.

Ipomoea — *Jacq.* [non *Cav.*] Collect. bot. III (1788) 297 et Icon. pl. rar. II (1786-1793) 10, t. 319.

Batatas — *Choisy* in Mem. Soc. phys. hist. nat. Genève, VI (1833) 436 et in DC. Prodr. IX, 339; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 834.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vauderyst). — II : Boma et env. (Dup.; Dew.; Pyn.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Kisantu (Gill.).

***Merremia pes-draconis* Hallier f.** in B. Herb. Boiss. VI (1898) 537; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 45 [B. S. B. B. XXXVII, 90]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 107.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lutembue [atfl. du Lubudi] (Desc.).

***Merremia pterygocaulos* [Choisy] Hallier f.** in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 113; *Dammer* in Engl. Pfl. Ost-Afr. 330; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 205; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 36; II (1898) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 82; XXXVII², 90] et Reliq. Deweyr. (1901) 167; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 727; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 105; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 116; Miss. Laurent (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 200.

Ipomoea — *Choisy* in DC. Prodr. IX (1845) 381.

1882 (P. Pogge). — II : Boma (Dup.). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.); Bingila (Dup.); la Lembá (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XII c : l'Uele; Gombari (Delp.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser.). — XV : territ. des Bena-Kabondo [Kasai] (Desc.). — XVI : Lukatu. — Nom vern. : **Malole** (Verd.). — Ind. non cl. : env. de Madji (Lescr.); le Lomam (Pyn.). — Nom vern. : **Monemena** (Dew.).

— — var. ***tomentosa* Hallier f.** in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 36; II (1898) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 90; XXXVII, 90]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* l. c. 106.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

ASTROCHLAENA Hallier f.

***Astrochlaena solanacea* Hallier f.** in Engl. Jahrb. XVIII (1893) 121; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 47 [B. S. B. B. XXXVII, 92]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 120.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

LEPISTEMON Blume.

Lepistemon owariense [*P. Beauv.*] *Hallier f.* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 112 et Étud. fl. Bas et Moy.-Cgo, I (1906) 306; II (1907) 198.

Ipomoea — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 41, t. 82.

L. africanum *Oliv.* in *Hook* Icon. pl. XIII (1878) 54, t. 1270; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 167; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 116

1900 (Edg. Verdick). — V : env. de Léopoldville (Gill.); env. de Mopolenge (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.); Coquillhatville (Pyn.). — IX : en aval de Bumba (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kubilonga** (Verd.).

IPOMOEA L.

Ipomoea amoena *Choisy* in *DC.* Prodr. IX (1845) 365; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 33; XXVIII (1899) 31; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 199; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 154; *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 48 [B. S. B. B. XXXVI², 84; XXXVII, 93] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 43; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 199.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : le Manyanga (Dem.). — V : Kisantu (Gill.); Boko (Pyn.). — IX : Upoto (Wilw.). — XIII d¹ : entre Nyangwe et Kimbundo (Pg.). — XVI : Toa (Desc.)

Ipomoea asclepiadea *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 142; XXVIII (1899) 43; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 199; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 167; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVII, 96].

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Nembé [le Kusambo] (Schw. 3141). — Ind. non cl. : le Iomani (Pg., 1213).

Ipomoea Barteri *Bak.* in Kew Bull. (1894) 70; *Hallier f.* in B. Herb. Boiss. VI (1898) 542; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 169; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 199.

1903 (Aug. Hendricks). — V : Sanda (De Brouw. in Gill. 3027; rég. de la Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3035).

— — var. **subsericea** *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVII, 96]; *Bak.* et *Rendle* l. c. 169; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 43.

1897 (Alph. Cabra). — Congo (Cabra). — V : Mont Léopold [le Stanley-Pool] (Luja).

***Ipomoea Batatas** [L.] Poir. Encycl. méth. Bot. VI (1804) 11; *Th. Dur.* et *Schinz*: Étud. fl. Cgo (1896) 199; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 138; XXVIII (1899) 35 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 50 [B. S. B. B. XXXVI¹, 81; XXXVII, 95]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 175; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 167 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 307; II (1907) 199.

Convolvulus — L. Amoen. acad. VI (1763) 121; *Kern.* Hort. semp. t. 340.

Batatas edulis Choisy Convolv. orient. (1833) 53 et in *DC.* Prodr. IX, 338.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — VII : Ibalé (Ém. et M. Laur.). — VIII : Wangata (Ém. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.). — XVI : bassiu du Tanganika (Desc.).

Cette espèce est cultivée au Congo.

Ipomoea Brasseuriana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 115; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 186.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. du Lac Moero (Verd.).

Ipomoea cairica [L.] Sweet. Hort. Brit. ed. 1 (1827) 287; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 148 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 53 [B. S. B. B. XXXVI¹, 81 et XXXVII, 98] et Reliq. Dewevr. (1901) 165; *De Wild.* Miss. Laurent (1904) 168 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 307.

Convolvulus — L. Syst. nat. ed. 10 (1759) 922.

I. palmata Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 43; *Choisy* in *DC.* Prodr. IX, 386; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 178.

I. stipulacea Jacq. Hort. Schoenbr. II (1797) 39, t. 199; *Meisn.* in *Mart.* Fl. Brasil, VII, 288, t. 105.

I. vesiculosa P. Beauv. Fl. d'Oware, II (1807) 73, t. 106

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : le voisine de Malela (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Bolobo (Buett.). — VIII : Coquilhatville (Ém. Laur.). — IX a : env. de Mobeka (Ém. Laur.) — XIII a : Nyangwe (Dew.). — XVI : le Luulaba (Pg.); Toa (Desc.).

Ipomoea chrysochaetia *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 133 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVI¹, 81; XXXVII, 93]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 156; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 199.

I. polytricha *Bak.* in Kew Bull. (1894) 12.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu et env. (Gill. 1125, 3764).

Ipomoea Dammeriana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1904) 116; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 182.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 252).

Ipomoea Debeerstii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 115; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 142.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb. 95).

Ipomoea elythrocephala *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 134; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 200; *Henriq.* in Bolet. Soc. Bot. XVI (1899) 68; *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 94]; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 157.

1882 (P. Pogge). — II a : Bingila (Dup.). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1142).

Ipomoea fimbriosepala *Choisy* in *DC.* Prodr. IX (1845) 359; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 143 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 52 [B. S. B. B. XXXVII, 97]; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 199.

I. *Smithii* *Bak.* in Kew Bull. (1894) 73.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Cougo (Sm.).

Ipomoea fulvicaulis [*Hochst.*] *Boiss.* ex *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 128; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 143.

Le type croit de l'Abyssinie au Nyassaland.

— — var. ***depauperata*** *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 48 [B. S. B. B. XXXVII, 93].

I. *hyoxantha* *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 128; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 200; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 144.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 334).

Ipomoea Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 36 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 36].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 419).

Ipomoea hispida [*Vahl*] *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. I (1819) 238; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 123; in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 47 [B. S. B. B. XXXVI², 81 et XXXVII, 93] et in Reliq. Dewevr. (1901) 165; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 307; II (1907) 199.

Convolvulus — *Vahl* Symb. bot. III (1794) 29.

I. *eriocarpa* *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 484; *Choisy* in *DC.* Prodr. IX, 369; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 136.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lutete (Heus). — V : euv. de Leifu (But.). — IX : Bumba (Dew.); Upoto (Wilw.). — XII : Fuele (Delp.). — XVI : Toa (Desc.); Pweto (Chargois).

Ipomoea involucrata P. Beauv. Fl. d'Oware, II (1807) 52, t. 89; *Choisy* in DC. Prodr. IX, 365; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 131; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 200; *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 94] et Reliq. Dewevr. (1901) 165; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 150; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 307; II (1907) 199.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — Noms vern. : **Nzizi** ou **Luzizi** (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); Zobe. — Nom vern. : **Teka** (Dew.). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Léopoldville (Luja); Suata (Buett.); Kisantu (Gill.); Bulebu (Ém. et M. Laur.). — VI : lé Kwilu [Djuma] (Sap.); Kingunshi (Buett.); entre Kingunshi et le Kasai (Pg.); Madibi (Leser.); route de Lumbi à Luanu (Leser.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala Heus. — XII c : Gombari (Delp.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser.). — XIII d : Nyangwe (Pg.). — XV : entre le Lubilash et le Lomami; Mukenge (Pg.); euv. de Luebo (Leser.); Bolongula (Ém. et M. Laur.); la Lubue (Luja); Leki (Ém. Laur.). — XVI : Lac Kenda (Desc.). — Noms vern. : **M'Ponbu** ou **Bpompo** [Bangala]; **Pongolowe** [Sankuru]; **N'Sombala** [Kwilu] (Sap.).

Ipomoea kentrocarpa Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 70; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 139; XXVIII (1899) 41; *Rendle* in Journ. of Bot. XXXIX (1901) 55; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 164; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XII c : Gombari [Uele] (Delp.).

Ipomoea lasiophylla *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVII, 94]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 156.

1882 (P. Pogge). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1215).

Ipomoea lilacina Blume Bijdr. Fl. Ned. Indië, II (1825) 716; *Choisy* in DC. Prodr. IX, 369; *Hallier f.* in B. Herb. Boiss. V (1897) 380 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 55 [B. S. B. B. XXXVII, 100] et Reliq. Dewevr. (1901) 165; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 187.

I. oxyphylla *Bak.* in Kew Bull. (1894) 71.

I. Stuhlmaunii *Dammer* in Engl. Pil. Ost.-Afr. (1895) 333.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.).

Ipomoea littoralis [L.] Boiss. Fl. Orient. IV (1879) 112; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 144 et in B. Herb. Boiss. V (1897) 376.

Convolvulus littoralis L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 924.
I. stolonifera Gmel. Syst. nat. II (1791) 315; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 738;
Bak. et Rendle in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 171.

1832 (J. Monteiro). — I : Banana (Mont.).

Ipomoea lukafuensis De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 112; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 184.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 342).

Ipomoea micrantha Hallier f. in B. Herb. Boiss. VI (1898) 541;
Bak. et Rendle in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 166.

Le type croît dans la Haute-Guinée.

— — var. ***hispida*** Hallier f. l. c. 542 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVII, 54]; Pl. Gilletianae, I (1900) 37 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 37] et Reliq. Dewevr. (1901) 165; *Bak. et Rendle* l. c. 466.

1895 (P. Dupuis) — II a : Bingila (Dup. 8). — V : la Lemba (Dew. 357); Kisantu (Gill. 899).

Ipomoea Nil [L.] Roth Catalecia bot. I (1796) 36; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 136 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVII, 94] et Reliq. Dewevr. (1901) 166.

Convolvulus — L. Sp. pl. ed. 2 (1762) 219; Bot. Mag. (1792) t. 188.

I. hederacea Jacq. Collect. bot. I (1786) 124 et Icon. pl. rar. I, t. 36; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 159.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 1021); Lemfu (But.). — XV : brousse de Bena-Moulengere (Dew.).

Ipomoea ochracea [Lindl.] G. Don Gen. Syst. Bot. IV (1838) 270;
Hallier f. in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 140, in B. Herb. Boiss. VI (1898) 540 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 50 [B. S. B. B. XXXVII, 95] et Reliq. Dewevr. (1901) 166; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 166.

Convolvulus — Lindl. in Bot. Reg. XIII (1827) t. 1060.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Cougo (Sm.). — II : Boma (Dew. 128).

Ipomoea ophthalmantha Hallier f. in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 141; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 201; *Hallier f.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVII, 96].

1882 (P. Pogge). — XVI : Samba [Lac Musolo] : Toa; vallée du Mukalue [affl. du Lubudi] (Desc.). — Ind. non cl. : le Louami (Pg.).

Obs. — MM. Baker et Rendle [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 163] réunissent cette espèce à *I. kentocarpa* Hochst.

Ipomoea paniculata [L.] R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 486; Bot. Reg. (1815) t. 62; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 149; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 201; *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 99]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308 et Miss. Laurent (1905) 168.

Convolvulus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 156.

I digitata L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 924; *Choisy* in DC. Prodr. IX, 389; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 189.

1832 (J. Monteiro). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Moba** (Cabra). — I : Banana (Monteiro). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.); Bingila (Dup.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — VI : Bandundu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Bosesere** (Malchair); **Eala** (M. Laur.); **Bolenga** (Geut.). — IX : Mobeka; Ukaturaka; Lie (Ém. et M. Laur.). — X : Bas-Ubaugi; (Ém. et M. Laur.). — XV : la Lulua (Pg.); CC. bassins du Kasai, du Saukuru et de la Lulua (Ém. Laur.); Bena-Makitua (Lescr.) — XVI : le Lofoi (Verd.); le Lualaba (Pg.). — Ind. non cl. : Gombe [Gombe?, VIII] I (Lambert).

— — var. **indivisa** *Hallier f.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 43.

1895 (Ern. Dewèvre). — Congo (Ern. Dew.).

Ipomoea Pes-Caprae [L.] Roth Nov. pl. sp. (1821) 109; *Choisy* in DC. Prodr. IX, 349; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35 [B. S. B. B. XXXVI¹, 81]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308.

Convolvulus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 159.

I. biloba *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 44; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 172.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.); Banana (Monteiro). — XVI : Toa (Desc.).

Ipomoea recta *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 114; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 141.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kamulofwa** (Verd. 306).

Ipomoea reptans [L.] *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. Suppl. III (1813) 460; *Choisy* in DC. Prodr. IX, 349; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 143, in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 52 [B. S. B. B. XXXVII, 97] et Reliq. Dewevr. (1901) 166; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 168 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308.

Convolvulus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 158.

I. aqnatica *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 44; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 170.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Boma (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — XV : banc de sable du Kasai (Ém. et M. Laur.).

Ipomoea tenuis *E. Mey.* in *Flora* (1843) Beig. 495; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 140; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 202; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 50 [B. S. B. B. XXXVII, 95].

I. fragilis Choisy in *DC. Prodr.* IX (1845) 140; *Hallier f.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 50 [B. S. B. B. XXXVIII, 95]; *Bak. et Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 165.

1863 (R. Burton). — Congo (Burt.).

Ipomoea velatipes *Welw.* ex *Rendle* in *Journ. of Bot.* XXXII (1894) 175; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 735; *Bak. et Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 155.

I. Verdickii De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 113.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 11).

CALONYCTION Choisy.

Calonyction bona-nox [*L.*] *Boj.* Hort. Maurit. (1837) 227; *Hallier f.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 56 [B. S. B. B. XXXVII, 101] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 165; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 307; II (1907) 198.

Ipomoea — *L. Sp. pl. ed. 2* (1762) 228.

C. speciosum Choisy in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève*, VI (1834) 441, t. I, fig. 4; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 742; *Bak. et Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 117.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kwamouth (Gent.); Kisautu (Gill.). — XII a et c : route de Bima à Amadis (Ser.). — XV : le long du Luebo (Desc.). — Ind. nou. cl. : Bena-Lecoula [Bena-Luukala?, XV] (Dew.).

QUAMOCLIT Moench.

Quamoclit pinnata [*Desr.*] *Boj.* Hort. Maurit. (1837) 224; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 151 et in *B. Herb. Boiss.* V (1897) 378, 379, 1042; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 56 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 101] et *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 44; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 167 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 307; II (1907) 198.

Convolvulus — *Desr.* in *Lam. Eucycl. meth. Bot.* III (1789) 567; *Descourtilz* Fl. des Antill. VI, t. 146.

Ipomoea Quamoclit L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 159 et ed. 2 (1762) 227; *Bot. Mag.* (1793) t. 244.

Q. vulgaris Choisy in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève*, VI (1834) 434; *Bak. et Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 128.

1893 (P. Dupuis). — II : Boma (Dup.). — V : Léopoldville (Ém. Duch.). — VIII : Eala [cult.] (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Umangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Luebo (Ém. Laur.).

STICTOCARDIA Hallier f.

Stictocardia beraviensis [Vatke] Hallier f. in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 159; Dammer in Engl. Pil. Ost-Afr. 334; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 57 [B. S. B. B. XXXVII, 102]; De Wild. Étud. fl. Kat. [1903] 224; Miss. Laurent (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 200.

Ipomoea — Vatke in Linnaea, XLIII (1882) 511.

Aigyrea — Bak. ex Bak. et Rendle in Dyer Fl. trop. Afr. IV² (1906) 201.

1882 (P. Pogge). — VI : env. de Lusubi (Lescr.). — IX : Bobangi (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Katingwe** (Verd.); vallée du Bulechi [riv. tribut. de la Luina] (Desc.). — Ind. non cl. : la Lomami (Pg.).

SOLANACEAE

SOLANUM L. (1)

Solanum acanthocalyx Klotzsch in Peters Reise n. Mossamb. I (1862) 232; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 44; C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 235; De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 173.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lofoi (Verd.); Bunkeya (Desc.).

Solanum aculeastrum Dunal in DC. Prodr. XIII¹ (1852) 366; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 167; C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 213; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 66.

1896 (A. Dewevr.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Nom vern. : **lbenge** (fruit : **Lcombe-Combe** [plante] [Kasongo]; **Kizango-Banza** [Tanganika] (Dew.).

Solanum aethiopicum L. Amoen. acad. IV (1759) 307; Dunal in DC. Prodr. XIII¹, 351; C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 217; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 44.

1897 (Alph. Cabra). — Yema Lianga (Cabra).

Solanum antidotum Dammer in Engl. Pil. Ost-Afr. (1895) 355; De Wild. Étud. fl. Kat. [1903] 173; C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 242.

1899 (Edg. Verdick.). — XVI : le Lofoi (Verd.).

(1) Le **Solanum Seaforthianum** Andrews [Bot. Repos. (1810) t. 514] est cultivé à Bolobo et à Mopolonge [V] (Ém. et M. Laur.). — [Conf. De Wild. Miss. Laurent (1907) 440].

Solanum congense *Link* Enum. pl. Hort. Berol. I (1821) 187; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 498; *Dammer* in *Engl. Jahrb.* XXXVIII (1906) 189; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 245.

1816? (Ch. Smith). — Congo (Sm. ?).

Obs. — Liuk n'a pas dit le nom du collecteur, mais il n'a pu décrire qu'une plante découverte par Chr. Smith.

Solanum Dewevrei *Dammer* in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 290.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 741).

Solanum duplosinuatum *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 233; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 244; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 750; *Medley* et *Wood* Natal Pl. I, 39, t. 49; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 436.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XII : distr. de l'Uele (Delp.).

Solanum Durandii *Dammer* in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 290 [nom. tant.].

1895 (A. Dewèvre). — II a : brousse de Zobe (Dew. 344).

Solanum edule *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 125; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 356; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 355; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 175.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Obs. — M. C. H. Wright [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 242] réunit cette espèce au *S. Melongena* L.

Solanum inconstans *C. H. Wright* in *Kew Bull.* (1894) 127 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 211.

S. symphyostemon *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 44; Ill. fl. Cgo (1899) 113, t. 57 et Pl. Thonnerianae (1900) 34, t. 22; *Dammer* in *Engl. Jahrb.* XXXVIII (1906) 184.

1882 (P. Pogge). — IX : Bolombo près Gali (Thonn.). — XV : Samba [à une journée de marche à l'O. du Lualaba (Pg. 1203)].

Solanum indicum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 187; *Wight* Icon. pl. Ind. or. 1, t. 346; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 309; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 206; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 232.

S. Anguivi *Hook.* Exot. Fl. III (1827) t. 199.

1884 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett.).

Solanum Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 176.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Katu (Ém. et M. Laur.).

Solanum Lescauwæetii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 438, t. 120.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : env. de Mushie (M. Laur. 616). — VIII : Bala-Lundzi (Pyn. 275). — XV : Luluabourg (Lescr. 310, 312) : lukongo (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Tombolo (Lescr.).

***Solanum macrocarpon** *L.* Mant. pl. II (1771) 205; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 353; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 214.

S. mors elephantum *Dammann* Catal. n. LXX. 100, fig. 81; Wien. Ill. Gart.-Zeit. (1894) 30, fig. 7.

Cette espèce croît de l'Uganda au Nyassaland.

* — — var. **hirsutum** *Dammer* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 290.

Plante cultivée dans tout le Congo. — Noms vern. : **Coco** [Bas-Congo]; **Elo** ; fruit : **Macumba** [Basankusu] (Dew.).

***Solanum Melongena** *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 186; *Wight* Illustr. Ind. Bot. t. 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 206; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 748; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 242; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 175, (1907) 435.

S. esculentum *Dunal* Solan. syn. (1816) 208, t. 3 et in *DC.* Prodr. XIII¹, 355

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II a : cult. dans le Mayumbe (Ém. Laur.). — VI : rég. de Lemano (Lescr.). — XV : Lusambo; Bolongula (Ém. et M. Laur.).

Solanum Monteiroi *C. H. Wright* in *Kew Bull.* (1894) 127 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 216.

1832 (J. Monteiro). — II : Boma (Mont.).

Solanum Naumannii *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 64; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 206; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 747; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 216.

1873 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.).

Solanum nigrum *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 186; *Mutel* Fl. de Fr. t. 39-40; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 50; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 37 et Reliq. Dewevr. (1901) 168; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 218; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 178 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 66.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Songololo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Biti** [Ikwangula]; **Moncagui** [Kasongo]; **Mumbu** [Manyanga]; **Kiloya-Kamono** [Tauganika] (Dew.). — XIII d : Nyangwe (Dew.).

Solanum nodiflorum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-1793) t. 326; *Dunal* in *Dal.* Prodr. XIII¹, 46; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 745; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 218.

S. guineense *Lam.* Ill. gener. Encycl. II (1793) 18; *Dammer* in Engl. Jahrb. XXXVIII (1906) 177.

1876 (P. Pogge). — II a : Bingila (Dup.). — XV : la Lulua vers 9 1/4°; Musumba (Pg.). — XVI : Toa (Desc.).

Solanum Preussii *Dammer* in Engl. Jahrb. XXXVIII (1906) 183.

1895 (Ém. Laurent). — XV : entre Lusambo et le Lomami (Ém. Laur.).

Solanum Pynaertii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 437, t. 119.

1903 (L. Pynaert). — II : Boma (Pyn. 302).

Solanum Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 341, t. 74.

1906 (A. Sapin). — VII : Ikongo (Sap.). — Noms veru. : **Dilomba** [Bangala]; **Kichilo-Kiabeto** [Sankuru].

Solanum Sereti *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 439, t. 122.

1905 (F. Seret). — XII a et b : route de Bima à Bambili (Ser. 166).

Solanum subcoriaceum *Th. et Hél. Dur.* [nom. nov.].

S. Laurentii *Dammer* [non *De Wild.*] in Engl. Jahrb. XXXVIII (1906) 182.

1893 ? (Ém. Laurent). — Congo (Ém. Laur. s. n.).

Solanum Welwitschii *C. H. Wright* in Kew Bull. (1894) 126; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 747; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322; II (1907) 66; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 747; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 231; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 440.

1904 (Gust. De Bronwer). — V : env. de Kisantu (Gill. 3779). — VI : rég. du Kwango (De Brouw. in Gill. 3601). — VIII : Eala (M. Laur.). — XII a : entre Buta et Bima (Ser. 67). — XII c : Gombari (Ser. 570). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

— — var. **strictum** *C. H. Wright* l. c. (1894) 126 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 243; *Hiern* l. c. 127; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 44 et Reliq. Dewevr. (1901) 168.

S. Lujaei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 40 [B. S. B. B. XXXVIII², 210] et Pl. Gilletianae, I (1900) 37 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 37].

1870 (G. Schweinfurth). — IV : Soua-Gongo (Luja). — V : Bolobo (Dem.); Kisantu (Gill. 717). — VIII : Équateur (Dew. 563). — XII d : Munza (Schw. 3198). — XIII c : Stanleyville (Ém. Duch.). : env. d'Olekwa (Dew. 1057 a). — Nom veru. : **Kalembelo** [Tanganika] (Dew.).

Solanum Wildemanii *Dammer* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 291; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 177. (1907) 440, t. 121 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 67.

1895 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 547). — VI : Bandundu (Ém. et M. Laur.). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Leser.); le Saukuru (Ém. et M. Laur.).

Solanum Zuccagnianum *Dammer* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 177 [nom. lanl.].

1903 (Ém. et Mare. Laurent). — VIII : env. d'Irebu (Ém. et M. Laur.).

LYCOPERSICUM Hill.

***Lycopersicum esculentum** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 2; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 26; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 744; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 411.

Solanum Lycopersicum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 185.

S. cerasiforme *Dunal* Hist. Solan. (1813) 113.

1903 (Ém. et Mare. Laurent) — V : env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.).

PHYSALIS L.

***Physalis aequata** *Jacq. f.* Eclog. pl. II (1844) t. 137; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 447; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II, (1900) 44 et Reliq. Dewevr. (1901) 168; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322; II (1907) 66.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Cabra). — I : Banana (Dew.). — II : Boma. Nom. vern. : **Mapolo** (Dew.). — IV : Luvituku (Dem.). — V : env. de Kwamouth (Biel.). Kisantu (Gill.). — VIII : Equateur (Pyu.).

***Physalis minima** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 183; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 445; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 206; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 217; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 168; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 198; II (1907) 66 et Miss. Laurent (1905) 178, (1907) 436.

1885 (R. Buettner). — II a : la Lemba (Dew.). — IV : Lutete (Hens); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Lukolela (Buett.); Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (M. Laur.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XII d : Vankerkhovenville (Ser.). — XV : Mmungu (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Beti**; **Buteke** [Ikwan-gula]; **Kalamandu** [Kasongo]; **Buki** [Tanganika] (Dew.).

***Physalis peruviana** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 183; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 440; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 238; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 218; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 44; II (1900) 15 et Reliq. Dewevr. (1901) 168.

P. edulis *Sims* in Bot. Mag. (1897) t. 1068.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Lem.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 97). — XVI : Albertville [Toa] (Hecq). — Cult. à Coquilhatville [VIII] et au pays des Bangala [IX] (Dew.; Ém. Laur.).

***Physalis pubescens** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 183; *Dunal* in *DC. Prodr.* XIII¹, 446; *Sendt.* in *Mart.* Fl. Brasil. X, 132; *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII (1904) 103; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilleltiana, I (1900) 38 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 38]; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 247; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 175.

P. *barbadensis* Jacq. Miscell. bot. II (1781) 159 et Icon. pl. rar. I, t. 59.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XIII a : Stanleyville : entre Stanleyville et les chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

CAPSICUM L.

***Capsicum cerasiferum** Willd. Enum. pl. Hort. Berol. I (1809) 242; *Dunal* in *DC. Prodr.* XIII¹, 422; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 751; *Fingerh.* Monog. Caps. 19, t. 5; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 175.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.).

***Capsicum conicum** Mey. Prim. fl. Essequib. (1818) 112; *Dunal* in *DC. Prodr.* XIII¹, 415; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 169.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

***Capsicum conoides** Mill. Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 1; *Dunal* in *DC. Prodr.* XIII¹, 414; *Dammer* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 351; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 33 et Miss. Laurent (1905) 175.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XII d : Munza (Schw.).

Obs. — M. C. II. Wright [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 252] réunit cette espèce au *C. annuum* L.

***Capsicum frutescens** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 189; *Dunal* in *DC. Prodr.* XIII¹, 413; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 251; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 67.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur.).

DATURA L.

***Datura fastuosa** L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 932; *Dunal* in *DC. Prodr.* XIII¹, 542; *Wight* Icon. pl. Ind. or. IV, t. 1396; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 122; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1901) 441.

1899 (Edg. Verdick). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu. —
Nom vern. : **Mupopo** (Verd.).

***Datura Stramonium** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 179; Engl. Bot. (1804)
t. 1288; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 540; *Bentl.* et *Trim.* Medic.
Pl. III, t. 192; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 753; *De Wild.* et *Th. Dur.*
Pl. Gilletianae, 1 (1900) 38 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 38]; *C. H. Wright*
in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 257; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 177,
(1907) 441.

1900 (J. Gillet). — V : Tumba (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — XV :
Kapinga (Ém. et M. Laur.).

* — var. **Tatula** *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹ (1852) 540; *Clarke*
in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV (1883) 212; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud.
fl. Cgo (1896) 207; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 45.

D. *Tatula* *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 256; *Sweet* Brit. Flow. Gard. t. 83.

1892 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — Cult. et subsp. dans le Mayumbe [II a]
(Ém. Laur.).

NICOTIANA L. (1)

***Nicotiana rustica** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 258; *Lehm.* Nicot. 34;
Dunal in *DC.* Prodr. XIII¹, 563; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo
(1896) 207; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 45; *Comes*
Monog. Nicotian. 20, fig. 2; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr.
IV², 260.

1870 (G. Schweinfurth). — XIII a : Romée (Ém. Laur.).

Obs. — Cultivé dans le Bas-Congo (Ém. Laur.; Dup.) et chez les Mangbettu
(Schw.).

***Nicotiana Tabacum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 180; *Dunal* in *DC.*
Prodr. XIII¹, 557; *Bentl.* et *Trim.* Medic. Pl. III, t. 191; *Th. Dur.*
et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 208; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 754;
De Wild. Miss. Laurent (1905) 177, (1907) 441-445; *Comes* Monog.
Nicotian. 7, fig. 1; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 253.

1885 (R. Buettner). — VIII : Équatenrville (Buett.); Coquilhatville (Dew.). —
IX : Bolombo; Yambinga (Ém. et M. Laur.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.). —
XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Lusanga (Dew.). — XV : env. de
Lusambo; Basongo (Ém. et M. Laur.).

(1) Conf. Ém. *De Willeman* Miss. Laurent (1907) 441-442.

M. R. Buettner a indiqué à Tondoa [III] le *Petunia nyctaginiflora* Juss. espèce de
l'Amérique méridionale [Conf. *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 208].

***N. Tabacum** var. **brasiliensis** *Comes* Monog. gen. *Nicotiana* (1899) 13, t. 1 et 6 et Della razze dei Tabacchi (1905) 19; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 344.

1901 (Ém. et Marc. Laurent) — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.). — Variété cultivée par les Asendé [XII] (Ser.).

* — var. **virginica** *Anastasia* Le var. tip. della *Nicotiana Tabacum* (1906) 106, t. 3, D; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 443-444.

N. Tabacum L. var. — *Comes* l. c. (1899) 13, t. 1, 5, et (1905) 19.

N. Tabacum L. var. *laucifolia* *Comes* l. c. (1899) 10, t. 1, 4 et (1905) 17.

1903 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

SCHWENKIA L.

Schwenkia americana L. Gen. pl. ed. 6 (1764) 567; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 194; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 208; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 754; *De Wild.* et *Th. Dur.* Coltr. fl. Cgo, II (1890) 44 et Reliq. Dewevr. (1901) 169; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 260; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 444 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 67.

1862 (R. Burton). — II : Boma (Dew.) — IV : Luvituku (Dem.); Lutete (Hens); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Buett.); env. de Kwamouth (But.); Kisautu (Gill.) — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.).

SCROPHULARIACEAE

HALLERIA L.

Halleria lucida L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 625; Bot. Mag. (1815) t. 1744; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 301; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 209; *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 295.

1883 (H. Johnston). — Cougo (Johnst.).

MIMULUS L.

Mimulus gracilis R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 439; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 369, 594 et Fl. Austral. IV, 482; *Hook. f.* Brit. Fl. Ind. IV, 259; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 109; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 758; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 310.

1883 (H. Johnston). — Cougo (Johnst.).

BACOPA Aubl.

Bacopa alternifolia *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313 [nom. tant.]; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 323, in obs.

1893 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12571).

Bacopa calycina [*Benth.*] *Engl.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 92 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 832]; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73.

Herpestis — *Benth.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) 57 et in *DC.* Prodr. X, 399; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 209.

Moniera — *Horn* Cat. Welw. Pl. I (1898) 760; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 320.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ile près de Ponta da Lenha (Naum.). — V : le Stanley-Pool; chutes de Leopoldville (Schlt. 12559); Tamo (Hens); entre Léopoldville et Mombasi; entre Dembo et Kisantu (Gill. 1556).

ARTANEMA G. Don.

Artanema Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 12 [B. S. B. B..XXXVIII², 131] et *Contr.* fl. Cgo, II (1900) 45.

1891 (F. Demense). — Bas-Congo (Cabra). — IX : Umangi (Ém. Duch.). — XI : Isangi (Dem.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.).

Artanema longifolium [*L.*] *Vatke* in *Linnaea*, XLIII (1880-1882) 307; *Engl.* Pl. Ost-Afr. 357 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *Wettst.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1891) 79.

Columnnea — *L.* Mant. pl. (1767) 90.

Diceros — *Pers.* Syn. pl. II (1807) 161.

Achimenes sesamoides *Vahl* Symb. bot. II (1791) 71.

Artanema — *Benth.* Scrophul. Ind. (1835) 39 et in *DC.* Prodr. X, 408; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr.* fl. Cgo, II (1900) 45 et *Reliq. Deweyr.* (1901) 169; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73; II (1907) 67 et *Miss. Laurent* (1907) 444.

1891 (F. Demense). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — IX : env. de Bumba (Dew.); Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.); Stanleyville (Pyn.). — XV : le Kasai et le Sankuru (Ém. et M. Laur.).

CRATEROSTIGMA Hochst.

Craterostigma latibracteatum [*Engl.*] *Skan* ex *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV² (1906) 333.

Lindernia — *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1906) 313.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt.).

TORENIA L.

Torenia affinis *De Wild.* Étud. fl. Kal. (1903) 122.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Katanga (Desc.); Lukafu. — Nom vern : **Musula-Kurri** (Verd. 387).

Torenia parviflora *Hamilt.* in *Wall.* List (1831) n. 3958; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 410; *Schmidt* in *Mart.* Fl. Brasil VIII, 322, t. 56, fig. 1; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 210; *Th. Dur.* et *De Wild.* Pl. Thonnerianae (1900) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 170; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 335.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Boma (Dew.) : Ile près de Ponta da Lenha (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Hens) : Lukolela (Buett.); Kisautu (Gill.) — VI : le Kwango (Buett.). — IX a : Bobi (Thonn.). — XII d : Muuza (Schw.).

— — var. **brevipedicellata** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73; II (1907) 67; *Hemsl.* et *Skan* l. c. 336.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2554); env. de Lemfu (But.).

VANDELLIA L.

Vandellia diffusa *L.* Mant. pl. I (1767) 89; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 416; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 210; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 45 et Reliq. Dewevr. (1901) 170; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 444.

Lindernia — *Wettst.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1891) 80; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 765; *Engl.* in *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 338; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 444.

1885 (R. Buettner). — V : le Stanley-Pool (Hens) : env. de Léopoldville (Dew.) Suata (Buett.); Kinshassa (Luja); Kisautu (Gill.). — VIII : Lac Tumba (Em. et M. Laur.).

ILYSANTHES Rafin.

Ilysanthes parviflora [*Roxb.*] *Benth.* in *DC.* Prodr. X (1846) 419; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 283; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 210; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 346.

Gratiola — *Roxb.* Pl. Coromand. III (1819) 3, t. 204.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

HYDRANTHELIUM H. B. et K.

Hydranthelium egense *Poepp. et Endl.* Nov. gen. et sp. III (1815) 75, t. 287; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 425; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 351

Herpestis Monnieria *Th. Dur. et Schinz* [non *H. B. et K.*] Étud. fl. Cgo (1896) 209 [syn. excl.].

1888 (Fr. Hensl. — V : embouch. du Kasai (Hensl., 119).

SCOPARIA L.

Scoparia dulcis *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 168; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 85, t. 115; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 211; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 766; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 355; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 45; II (1900) 45 et Reliq. Dewevr. (1901) 170; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 74; II (1907) 67 et *Miss. Laurent* (1907) 445.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — II : Boma (Dew.). — III : Toundo (Buett.). — V : le Stanley Pool (Buett.); Léopoldville (Ém. Duch. et Luja); Kiu-shassa (Dem.). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **Bompuru** (M. Laur.). — IX : env. de Mobeka (Ém. Laur.). — XV : le Kasai au poste de bois n° 6 (Ém. Laur.); Lusambo (Jos. Drech.).

MELASMA Berg.

Melasma indicum [*Benth.*, *Wettst.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1891) 91 et in *Engl.* Pil. Ost-Afr. 358; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 68.

Alectra — *Benth.* in *DC.* Prodr. X (1846) 339; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 297. 1904 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 3693, 3803).

HARVEYA Hook.

Harveya Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1906) 35, t. 6; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 436.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn.).

BUCHNERA L.

Buchnera affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 123; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 382.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : plateau des env. de Lukafu. — Nom vern. : **Sangala** (Verd. 42).

Buchnera Buettneri *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 72, t. 3 et in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 314.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12488).

Oss. — MM. Hemsley et Skan [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 414] réunissent cette espèce au *Striga macrantha* Benth.

Buchnera capitata *Burm.* *Fl. Capens. prodr.* (1768) 17; *Benth.* in *DC. Prodr.* X 495; *Engl.* in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 314; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* II (1900) 45; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 381; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 68.

1888 (Fr. Hens). — II a : Biugila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Dolo (Schlt.); Kimuenza; entre Dembo et Kisantu (Gill).

Buchnera inflata [*De Wild.*] *Skan ex Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV² (1906) 390.

Stellularia — *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 124.

1892 ? (P. Briart). — XVI : Manive [Lualaba supér.] (Briart).

Buchnera multicaulis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* (1894) 69; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 211; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 123; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 397.

1880 (Max Buchner). — XV : bassin de la Lulua à 9°5 lat. (Pg.): bassin du Kasai (Buchn.). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : Kasjinkamballa (Verd.); entre le Luapula et la Lufila (Desc.).

Buchnera quangensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 71; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 212; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 382.

1881 (E. Teusz). — VI : Chasamango (Teusz in *Mech.* 540).

Buchnera Reissiana *Buett. ex Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 68, t. 3, fig. 1 et in *Baum Kunene Samb.-Exped.* 366; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 212; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 386.

1885 (R. Buettner). — V : Lukolela (Buett.). — VIII : Équateurville (Buett.).

Buchnera subcapitata *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 71; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 212; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 383; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 122.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 275) : Lukafu. — Nom vern. : Kantu-
limtulu (Verd. 371).

Buchnera Verdickii *Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV² (1906) 388.

B. pusilla *De Wild.* [non *H. B.* et *K.*] *Étud. fl. Kat.* (1903) 123.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 574).

STRIGA Lour.

Striga Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 22 [B. S. B. B. XXXVIII², 99] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 170; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 74.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2687). — XIII : env. de Lubuudu (Dew. 1024). — Nom vern. : Kasikesike [Tanganika].

Obs. — D'après MM. Hemsley et Skau [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 411 in obs.] cette espèce est très voisine de *S. Forbesii* Benth.

Striga Forbesii *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1835) 364 et in *DC. Prodr.* X, 503; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 212; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 410; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 445 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 68.

1883 (H. Johnston). — VI : Eielo (Krek.). — XII c : Niangara (Delp.). — XII d : env. de Faradje (Ser. 528). — XV : bassin du Sankuru (Em. et M. Laur.).

Striga gesnerioides [*Willd.*] *Vatke* in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1875) 11; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 46.

Buchuera — *Willd. Sp. pl.* III (1800) 338.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst). — XVI : la Chama [entre le Tanganika et le Moero] (Desc.). — Ind. non cl. : Tambagadio (Dup.).

Obs. — MM. Hemsley et Skau [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 402] réunissent cette espèce au *S. orobanchoides* Benth.

Striga hermonthica [*Delile*] *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1835) 305 et in *DC. Prodr.* X, 502; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 46; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 361; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 407.

Buchnera — *Delile Fl. d'Égypte* (1812) 245, t. 34, fig. 3.

1891 (G. Descamps). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.).

Striga hirsuta *Benth.* in *DC. Prodr.* X (1846) 502; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 361; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 46 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 171.

1891 (Hyac. Vanderyst). — Bas-Congo (Cabra). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dup.). — IV : distr. des Cataractes (Luja). — XVI : Moliro (Desc.).

Obs. — MM. Hemsley et Skau [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 410] réunissent cette espèce au *S. Forbesii* Benth.

Striga lutea *Lour.* *Fl. Cochinch.* (1790) 22; *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I, 368; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* IV, 299; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 212; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 446 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 68; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 409.

Campuleia coccinea *Hook. Exot. Fl.* (1827) t. 203.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech.-Loesche). — II : Boma (Monteiro). — II a : Banza de Lemba (Dem.). — V : reg. de Lula-Lumene (Hendr.); Léopoldville (M. Laur.); env. de Kisantu (Gill); le Stanley-Pool (Callew.). — VI : Eiolo (Em. Laur.). — XII c : route de Bambili à Amadis, Surango (Ser.).

Striga orobanchoides *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1836) 361, t. 19 et in *DC. Prodr.* X, 501; *Hiern Cat. Welw.* Pl. I, 778; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 92 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 832]; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 402; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 445 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 68.

1832 (J. Monteiro). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Mont.). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Léopoldville; Kimuenza (Gill.); Sanda (De Brouw.); entre le Kwango et Dembo (But.). — VI : plateau de Kimbali [entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel)].

RHAMPHICARPA *Benth.*

Rhamphicarpa longiflora *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1835) 368; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 211; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1903) 74.

Macrosiphon fistulosum *Hochst.* in *Flora.* XXIV (1841) 374.

Rhamphicarpa - *Benth.* in *DC. Prodr.* X (1846) 504; *Engl. Pl. Ost-Afr.* 360; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* II (1900) 45; *Hiern Cat. Welw.* Pl. I, 778; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 420; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 446 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 74.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens; Schl.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); rochers de Tamo (Heus); env. de Bokala (M. Laur.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.).

CYCNIMUM *E. Mey.*

Cygnium adonense *E. Mey. ex Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1835) 368; *Benth.* in *DC. Prodr.* X, 505; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 122, t. 88; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 212; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1900) 479; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 431.

1885 (R. Buettner). — VI : le Kwango (Buett.).

Cygnium Buchneri *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 73; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 432.

1881 (E. Teusz). — VI : le Kwango (Teusz).

Cygnium camporum *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 73; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 213; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 432; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 446 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 69.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — III : vallée de l'Ufura [adj. de la Pozo] (Cabra et Michel). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XII c : route de Surango à Niangara (Ser.). — XV : Kaisome (Lescr.).

Cycnium Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mal. fl. Cgo, V (1899) 10 et Reliq. Dewevr. (1901) 171.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Tshia (Dew. 401).

— — var. **minus** *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 38 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 38] et Reliq. Dewevr. (1901) 171.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Dew. 423). — V : Kisantu (Gill. 59).

Cycnium Questieauxianum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 124; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 434.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 165).

Cycnium Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 125; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 432.

C. adonense *Hiern* [non *E. Mey.*] Cat. Welw. Pl. I 1898) 777.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : env. de Lukafu; plateau du Katanga (Verd. 216, 355).

SOPUBIA Ham.

Sopubia angolensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 67; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 453; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 69.

S. cana *Hiern* [non *Harv.*] Cat. Welw. Pl. I (1898) 774.

1903 (R. Butaye). — V : rég. de Lula-Lumene (But.).

— — var. **angustipetala** *Engl. ex De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 46 et Pl. Gilletianae, I (1900) 38 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 38].

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

Sopubia Buchneri *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 66; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 451.

1878 (Max Buchner). — VI : Kitamba sur le Kwaugo (Buch. 589).

Sopubia Dregeana [*Hochst.*] *Benth.* in *DC. Prodr.* X (1846) 522; *Engl.* Pl. OsI-Afr. 359; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 213; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 451.

Gerardia — *Hochst.* in *Flora*, XXV (1842) 420.

1892 (Jul. Cornet). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.: Dup.) env. de Tshoa (Dew.). — V : Kisantu (Gill); bassin de la Sele (But.): rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — XVI : le Kafanga (Corn.: Verd.: Deb.: Desc.): Toa (Desc.).

Sopubia karaguensis Oliv. ex Speke et Grant in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 123, t. 87; fig. B; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 126; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 448.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kausale** (Verd.).

Sopubia latifolia Engl. in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 66; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 213; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 449.

1881 (P. Pogge). — XVI : Mukenge (Pg. 1112).

Sopubia Monteiroi Skan ex *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV² (1906) 454.

1832 (J. Monteiro). — Ind. non cl. : Bembe (Mont.).

Sopubia ramosa (Hochst.) Hochst. in Flora XXVII (1844) 27; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 522; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 132; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 773; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 449.

Rhaphidophyllum — *Hochst.* in Flora. XXIV (1841) 668.

S. trifida *Hamilt.* var. — *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) 383. Pl. Ost-Afr. 359 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII (1894) 103.

1881? (P. Pogge). — V : Dolo (Schlt.); entre Bolobo et Lukolela (Buett.). — XV : la Lulua (Pg.).

Sopubia trifida *Hamilt.* in *D. Don* Prodr. fl. Nepal. (1825) 88; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 522; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 213; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 46; *Hiern* in *Dyer* Fl. Capens. IV², 388; *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 446.

1885 (R. Buettner). — IV : brousse du distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : Bolobo; Lukolela (Buett.). — XV : bassin de la Lulua (Pg.). — Ind. nou cl. Belem (Dem.).

LENTIBULARIACEAE

UTRICULARIA L.

Utricularia andongensis *Welw.* ex *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 104; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 787; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 481.

U. tortilis Welw. var. — *Kamrenski* l. c.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 74.

1898 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 12).

Utricularia conferta *Wight* in *Hook.* Kew Journ. I (1849) 372 et Icon. pl. Ind. or. IV, t. 1575; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 102; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 74.

1895 (Ém. Laurent). — Congo (Ém. Lanr.).

Obs. — M. Stapf ne mentionne pas cette espèce dans la *Flora of trop. Afr.*

Utricularia exoleta *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 430; *Coss.* Ill. fl. Atlant. I, 100, t. 162; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 214; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 786; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 112; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75; *Goeb.* in Annal. Jard. Buitenz. IX, 91-97; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 435.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.; Dew.); Bas-Congo (Gill.). — V : Kisantu (Gill.).

Utricularia flexuosa *Vahl* Enum. pl. I (1804) 198; *A. DC.* in *DC.* Prodr. VIII, 24; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 329.

Le type croît en Asie et en Australie trop.

— — var. ***flexuosa*** *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 110; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

M. Stapf n'indique pas cette espèce en Afrique trop.

Utricularia Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* Mal. fl. Cgo, III (1899) 32 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 40].

U. Benjaminiana *De Wild.* [an *Oliv.*?] Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1898 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill. 3).

Obs. — M. Stapf [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 490] croît que la plante d'Afrique est différente de l'espèce d'Oliver.

Utricularia obtusa *Sw.* Nov. gen. et sp. pl. (1788) 14; *DC.* Prodr. VIII, 10; *Benjam.* in *Mart.* Fl. Bras. X, 239; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 113; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 495.

U. obtusata *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) 41.

U. tricrenata *Bak.* in *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 785.

1898 (Ém. Duchesne). — V : le Stanley-Pool aux env. de Léopoldville (Duch.).

Utricularia reflexa *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) 146; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 214; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 785; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 110 pr. p.; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 492.

1883 (H. Johnston). — Cougo (Johnst.).

Utricularia subulata *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 18; *DC.* Prodr. VIII, 16; *Benjam.* in *Mart.* Fl. Bras. X, 213; *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) 148; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 105; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 485.

1898 (Ém. Duchesne). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12550); Léopoldville (Duch. 44).

— — var. **minuta** *Kamienski* l. c. XXXIII (1902) 105; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1896 (A. Dewèvre). — Cougo (Dew. f. — Bas-Congo (Gill. 1).

Utricularia Thoningii *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 12; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 487.

U. inflexa *Vahl* Enum. pl. I (1804) 196; *DC.* Prodr. VIII, 4; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 172.

U. stellaris *L.* f. var. — *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 219; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 46.

1885 (R. Buettner). — II a : Zobe (Dew.). — VI : Kingunshi (Buett.). — XV : Bombaie [Kasai] (Luja).

Utricularia tortilis *Walc.* ex *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) 150; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 787; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 104 [excl. var.]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 74; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 483.

1899 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 7).

GESNERACEAE

STREPTOCARPUS Lindl.

Streptocarpus katangensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 19 [B. S. B. B. XL, 25]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 127 [emend.]; *Bak.* et *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 507.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : euv. de Lukafu (Verd. 249).

BIGNONIACEAE

NEWBOULDIA Seem.

Newbouldia laevis [*P. Beauv.*] *Seem.* in Journ. of Bot. I (1863) 226; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79 [B. S. B. B. XXXVII, 121]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 45 et Reliq. Deweyr. (1901) 172; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 521; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 447 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 70

Spathodea — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1805) 48, t. 291; *Hook.* in Bot. Mag. (1850) t. 4537.

1895 (Ém. Laurent). — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel); Djema-Lianga (Cabra). — III : route de Matadi à Tumba (Ém. et M. Laur.). — IV : Lukungu (Ém. Laur.); Nord Manyanga (Cabra et Michel). — V : Léopoldville (M. Laur.); Kisantu (Gill.) — Ind. non cl. : Campi (Cabra).

SPATHODEA P. Beauv.

Spathodea campanulata *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 47, t. 27; *DC.* Prodr. X, 505; Bot. Mag. (1859) t. 5091; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 215; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 45; II (1900) 46 et Reliq. Deweyr. 1901) 172; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 145; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 529; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322; II (1907) 69.

1816 Chr. Smith]. — Bas-Congo (Sch.). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Kusu-Kusu** (Cabra). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Mombata** Dew. ; Kwamouth (M. Laur.); env. de Dembo (Gill.) ; entre Dembo et Kisantu (But.); Sanda (Odb.). — VI : Luauu [rive droite du Kwilu] (Leser.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.). — IX : Upoto (Wilw.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasui; le Sankuru (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Mukobue [affl. du Lubudi] (Desc.); le Luulaba (Ém. Laur.); le Katanga (Briart).

Spathodea nilotica *Seem.* in Journ. of Bot. III (1865) 333; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 45 et Pl. Thonnerianae (1900) 36; *Johnst.* The Uganda Protector. I, 68, cum tab.; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 535; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 177.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill.). — VI : route de Tumba-Maui à Popokabaka (Cabra et Michel). — IX : Upoto (Wilw.); Umanzi (Ém. Laur.). — IX a : Bokape (Thonn.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

DOLICHANDRONE Fenzl.

Dolichandrone tomentosa [Seem.] Benth. et Hook. f. Gen. pl. II (1876) 1046; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 245.

Mueunteria — Seem. in Journ. of Bot. III (1865) 330.

Markhamia — K. Schum. in Engl. et Prantl Nat Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 242.

1885 (R. Buettner). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — VI : Muene-Putu-Ka-songo (Buett.).

MARKHAMIA Seem.

Markhamia lanata K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 242; *Sprague* in Hook. Icon. pl. XXV, t. 2800, fig. 8 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 527, pr. p.

M. tomentosa K. Schum. in Engl. Glied veget. Usambara, 34 et 49 pr. p. et in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 480.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1094). — XV : Lulua-bourg; Munungu (Ém. et M. Laur.).

Markhamia lutea [Benth.] K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 242; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1904) 172; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 525; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 70.

Spathodea — Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 461, pr. p.

Dolichandrone — Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pl. II (1876) 1046.

Mueunteria — Seem. in Journ. of Bot. VIII (1870) 388, pr. p.

1896 (A. Dewèvre). — XII : entre Goo et Djamba (Ser.). — XIII c : Luama (Dew.). — Noms vern. : **Musum** Luama, **Musulidi** (Tanganika), **Eungu** (Ikwangula) (Dew.).

Markhamia paucifoliolata De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 131

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tenda-Kwari** (Verd. 54).

OBS. — M. Sprague [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 527] réunit cette espèce au *M. lanata* K. Schum.

Markhamia tomentosa [Benth.] K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 242; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 45; II (1900) 47; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 528; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 178 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322.

Spathodea — Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 462.

Dolichandrone — Benth. et Hook. f. Gen. pl. II (1876) 1046.

Mueunteria — Seem. in Journ. of Bot. III (1865) 330.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); la Milambi (Cabra). — V : env. de Kisantu (Gill); Galiema (Ém. Laur.).

M. tomentosa var. **acuminata** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 132 et Miss. Laurent (1905) 178.

M. tomentosa *De Will.* et *Th. Dur.* [non *K. Schum.*] Pl. Gilletianae, I (1900) 39 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 39].

1899 (J. Gillet) — V : env. de Leopoldville (Ém. Laur.) ; Kisantu (Gill.).

Markhamia sessilis *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV² (1906) 526 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 448 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 70.

Muenteria tomentosa *Seem.* [non *K. Schum.*] in Journ. of Bot. III (1865) 330, t. 35 [fig. et pl. angol. sed excl. syn.].

Markhamia — *Hiern* [non *K. Schum.*] Cat. Welw. Pl. I (1898) 792.

1816 (Chr. Smith) — Bas-Congo (Sm.).

Markhamia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 132.

1899 (Edg. Verdick) — XVI : le Katanga (Verd.).

M. Sprague [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 527] réunit cette espèce au *M. lanata* *K. Schum.*

STEREOSPERMUM Cham.

Stereospermum Arnoldianum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 128.

1899 (Edg. Verdick) — XVI : Lukafu et env. — Noms vern. : **Kayebule** ; **Kifulimijii** (Verd. 92).

Oss. — *M. Sprague* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 520] réunit les *S. Arnoldianum katangense* et *Verdickii* *De Wild.* au *S. Harmsianum* *K. Schum.*

Stereospermum katangense *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 130.

1899 (Edg. Verdick) — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kikoba-Koba** (Verd. 194).

Stereospermum Kunthianum (*Cham.* in *Linnaea*, VII (1832) 120 ; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 364 ; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 128 ; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 518.

S. dentatum *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 58 : *Bureau* in *Atlansonia*, II, 196, t. 1 et Monog. Bignon. t. 29.

1900 (Edg. Verdick) — I : rég. du Lac Moero (Verd.).

Stereospermum Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 129.

1899 (Edg. Verdick) — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kafungando** (Verd. 265).

KIGELIA DC.

Kigelia aethiopica (*Lam. Decne* in *Deless.* Icon. select. pl. V (1846) 39, t. 93 ; *Benth.* in *Hook. f. Niger* Fl. (1849) 463 ; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 364 ; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1904) 133 ; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 538.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kitwungele**. — Assez répandu dans le Katauga, mais généralement par pieds isolés (Verd.).

Kigelia africana [Lam.] Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 463; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gillelianae, I (1900) 39 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 39] et Reliq. Dewevr. (1901) 173; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 536; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 178.

Bignonia — Lam. Eucycl. méth. Bot. I (1783) 424.

1895 (A. Dewèvre). — II a : bords du Tshaf (Dew.). — V : env. de Kisantu (Gill.). — VI : Iuzia [vallée de la Djuma] (Gent.). — VIII : Bamania (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XII d : C. dans la savane des env. de Faradje à Gurba-Dungu (Ser.). — Noms vern. : **Yumba**. — Fl. et fruits : **Kisi** [Kasai] (Dew.). **Mayboli** [Bari]; **Zileni** [Bahul] (Ser.).

PEDALINACEAE

SESAMUM L.

Sesamum angolense Welw. Aponf. phyto-geogr. (1859) 588 et in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 51; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 215; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121] et Reliq. Dewevr. (1901) 173; *Hiern* Cal. Welw. Pl. I, 797; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 555.

S. macranthum Oliv. l. c. XXIX (1875) 131. t. 84; *De Wild.* Étud. fl. Kat (1903) 134 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 1323; II (1907) 200.

1875 (P. Pogge). — XII : vallée du Webai [Uele] (Coll.?). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : la Lulua, 9^{es} lat. S. (Pg.); à l'E. de la Lulua; Lubefu (Lescr.). — XVI : Lukafu (Verd.); le Lualaba près Goia-Kapopo (Pg.); Toa (Desc.); Pweto (Charg.).

Sesamum angustifolium [Oliv.] Engl. Pfl. Ost-Afr. (1895) 365; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 178 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 323; II (1907) 200 *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 554.

S. indicum L. var. — Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 131.

1892 (Jos. Duchesne). — VI : Eiolo (Krek.). — XII c : env. de Niangara (Ser.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.).

Sesamum calycinum Welw. in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 52; *Hiern* Cal. Welw. Pl. I, 797; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 173; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 555; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 133.

1892 (Jos. Duchesne). — VI : Eiolo (Krek.). — XII c : Niangara (Ser.). — XII d : Munza (Schw.). — XIII d : env. de Kasongo. — Nom vern. : **Cembe** (Dew.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulimdu** (Verd.). — Nom vern. : **Molenda** [Tanganika] (Dew.).

Sesamum indicum *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 631; *DC.* Prodr. IX, 250; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 386; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo. II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121] et Pl. Thonnerianae (1900) 36; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 558.

1891 (F. Demense). — II : Maléla (É. n. Laur.). — IV : Luvituku (Dem.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Evankoyo (Thonn.). — XV : env. de Lusambo; le Luulaba (É. n. Laur.).

— var. **integerrimum** *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 115.

1875 (P. Pogge). — XV : la Lulua, vers 9 1/2° (Pg. 310).

Sesamum mombanzense *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 36, t. 14; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 552.

1896 (Fr. Thonner). — IX : Mombanza près Businga (Thonn. 116 pr. p.).

Sesamum radiatum *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 56; *Webb* in *Hook.* Niger Fl. 150; *Engl.* Pl. Ost-Afr. 365; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 557.

S. occidentale *Rejzel* et *Heer* in Ind. sem. Hort. Turic. (1842) ex *DC.* Prodr. IX, 250.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Sesamum Thonneri *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 37, t. 15

1896 (Fr. Thonner). — IX : Mombanza près de Businga (Thonn. 116 pr. p.).

Obs. — M. Stapf. [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 553] croit que cette plante doit qu'elle être une forme anormale du *S. mombanzense*.

ACANTHACEAE

GILLETIELLA *De Wild.* et *Th. Dur.*

Gilletiella congolana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo. VIII (1900) 20 [B. S. B. B. XXXIX², 72]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1906) 312; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 506.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu : Kimuenza (Gill. 2055); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3539).

THUNBERGIA L. f. (1)

Thunbergia alata *Boj.* ex *Sims* in *Bot. Mag.* (1825) t. 2591; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 16; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 201.

1905 (F. Seret). — XII d : Congo bor.-or. (Ser. 301).

?**Thunbergia erecta** *T. Anders.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 18; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 12.

Meyenia — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 476; *Bot. Mag.* (1857) t. 5016.

Obs. — D'après M. Burkill (l. c.) le n° 3545, récolté par G. Schweinfurth, en 1870, dans le pays des Mangbettu [XII d] doit être cette espèce.

Thunbergia graminifolia *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 134.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Thunbergia katangensis *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 135.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 292).

Thunbergia lathyroides *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1899) 24; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 136.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 291).

Thunbergia Liebrechtsiana *De Wild.* et *Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo.* V (1899) 13 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 132] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 173; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 507.

1896 (A. Dewèvre). — IX : pas rare le long de la rive du Congo, a 2 ou 3 jours de marche de Bangala (Dew. 859).

Thunbergia longepedunculata *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 136.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga [entre Lukafu et le Tanganika (Verd.).

Thunbergia Michelana *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 136.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 318 pr. p.).

Thunbergia parvifolia *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 90; *Th. Dur.* et *Schinz*, *Étud. fl. Cgo* (1896) 216; *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII, 104; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 25.

1890 (Paul Briart). — XVI : le Katanga (Briart; Cornet).

Thunbergia proxima *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 137.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 318 pr. p.).

(1) Le *Thunbergia affinis* *S. Moore* [*Sprague* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 11] est cultivé à Bolobo (Em. et M. Laur.). [Conf. *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 182].

Thunbergia Stuhlmanniana *Lindau* in Bot. Jahrb. XVII (1893) 91.

1890 (G. Stuhlmann) — XIV : Butumbi au S. du lac Albert-Édouard (Stuhlmann). — 2181.

Thunbergia Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899)

33 [B. S. B. B. XXXVIII², 41] et Pl. Thonnerianae (1900) 38, t. 8; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 507.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi près Gali (Thonn. 34).

Thunbergia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 138.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Notu vern. : *Kausjapu* (Verd. 231).

Thunbergia Vogeliana *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 476 ;

Burkill in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 40; *De Wild. et Th. Dur.* Cont. fl. Cgo, II (1900) 47; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 314.

Meyenia — *Benth.* in Bot. Mag. (1862) t. 5389.

T. kamerunensis *Lindau* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 97.

1891 (G. Descamps). — V : rive du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja); env. de Léopoldville (Gill.). — XVI : vallée du Lualaba (Desc.).

Thunbergia Vossiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 134.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 28).

ELYTRARIA Vahl.

Elytraria crenata *Vahl* Enum. pl. I (1804) 106; *Nees* in *DC.* Prodr.

XI, 63; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 27; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 174; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 201.

E. marginata *Vahl* l. c. (1804) 108; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 58. t. 93 *Hook.* Niger Fl. 477.

Tubiflora acaulis *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 500; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 39 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, 1, 39]; *Lindau* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 365.

T. paucisquamosa *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 34 [B. S. B. B. XXXVIII², 42]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 50, in obs.

T. squamosa *Lindau* [non *O. Kuntze*] in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfaun. IV, 3 b (1897) 289 pr. p.; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgr, I (1897) 36 [B. S. B. B. XXXVI², 82]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 181.

1893 (P. Dupuis). — II a : Ganda-Janga (Cabra). — IV : la Gomoula (Dup.). — V : Lukolela (Pyn.); Kisantu (Gill.). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XV : Ibaka; Dibebe (Em. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Bena-Lekula [Bena-Lunkalaf, XV] (Dew.).

NELSONIA R. Br.

Nelsonia brunelloides [Lam.] O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 493; *Lindau* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 365; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 39; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 181 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 314; II (1907) 201.

Justicia — Lam. Eucycl. meth. Bot. I (1791) 40.

N. campestris R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 481; *Endl.* Iconogr. gen. pl. t. 79; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 216; *De Wild. et Th. Dur.*

Reliq. Dewevr. (1901) 174; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 141; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 805; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 28.

N. tomentosa Dietr. Sp. pl. I (1839) 449.

1888 (Fr. Hens). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Heus. Schlt.); env. de Kisantu (Gill.). — VII : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX a : Bogolo près Businga (Thonn.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser.). — XVI : Lukafu (Verd.).

HYGROPHILA R. Br. (4)

Hygrophila ciliata *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 35.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Hygrophila Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 314. t. 50.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2703).

Hygrophila katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 142.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : bord du Lac Moero (Verd.).

Hygrophila Lindaviana [*De Wild. et Th. Dur.*] *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 509.

Asteracantha — *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 23 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 100] et Pl. Thonnerianae (1900) 39, t. 5.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Evamkoyo (Thonn. 111, 112).

Hygrophila spinosa T. Anders. in *Thav.* Enum. pl. Zeyl. (1864) 225 et in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 22; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 31; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 201.

1905 (F. Seret). — XII : Guago (Ser. 280). — XII a : Bima (Ser. 134).

BRILLANTAISIA. P Browne.

Brillantaisia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De*

(1) A quelle espèce faut-il rapporter le *H. longifolia* Nees? indiqué au Congo, en 1882, par M. H. Johnston [Conf. *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 216]l.

Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 37 [B. S. B. B. XXXVIII², 45]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 174 et *Pl. Gilletianae*, II (1901) 93 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 833]; *Burkill in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 510.

1895 (A. Dewèvre). — V : entre Lukolela et Gombi (Dew.); env. de Lemfu (But. in Gill. 1176). — IX : Molanga. — Nom vern. : **Bolengue-Moïdi** (Dew. 751).

Brillantaisia Kirungae *Lindau in v. Goetzen* *Durch Afrika* (1895) 385; *Burkill in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 42.

1894 (G. A. von Goetzen et Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 48).

Brillantaisia Lamium [*Nees*] *Benth. in Hook. Niger Fl.* (1849) 479; *Burkill in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 38.

Leucorhaphis — *Nees in DC. Prodr.* XI (1847) 97.

B. owariensis Hook. [non *P. Beauv.*] in *Bot. Mag.* (1853) t. 4717, fig. 2.

B. Palisotii Lindau in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 99 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 3 b (1897) 296, fig. 119.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1123).

Brillantaisia owariensis *P. Beauv. Fl. d'Oware* II (1807) 67, t. 100; *Bot. Mag.* (1853) t. 4717, pr. p.; *Engl. in Engl. Jahrb.* VIII (1886) 65; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 217; *Burkill in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 40.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

Brillantaisia patula *T. Anders. in Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 21; *Burkill in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 45; *Horn Cat. Welw. Pl. I*, 807; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 143; *Burkill in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 41.

B. alata T. Anders. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 175, t. 124; *Th. Dur. et Schinz, Étud. fl. Cgo* (1896) 216; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 39 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 39] et *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 182 et *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 314.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.); C. dans le voisinage des villages (Ém. Laur.). — II : Sisia (Dem.). — II a : le Mayumbe; Benza-Masola (Ém. Laur.); Shionzo; Biugila (Dup.). — Nom vern. : **Bemba-Bemba** (Dup.). — V : Kisautu (Gill.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — XVI : C : dans les villages de la rég. de Lukafu. — Nom vern. : **Mulotte** (Verd.); Toa (Desc.); bords du Tanganika (Hecq).

Brillantaisia pubescens *T. Anders. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 125, t. 124; *Lindau in Engl. Pil. Ost-Afr.* 366; *Burkill in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 38; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 143.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

Brillantaisia subcordata *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 36; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 175; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 182 t. 45; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 510.

1891 (F. Demeuse). — VII: Coquilhatville (Em. et M. Laur.); brousse de Bokakata (Dew.). — IX: pays des Bangala (Dem.); en aval de Mobaka (Em. et M. Laur.).

— — var. **macrophylla** *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 47; *Clarke* in *Dyer l. c.* 510.

1899 (Em. Duchesne). — IX: Nouvelle-Anvers (Em. Duch.).

MELLERA S. Moore.

Mellera Briartii *De Wild. et Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo*, VI (1899) 40 [B. S. B. B. XXXVIII², 210]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 315; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 510.

1892 (Paul Briart). — XVI: rapides de Zilo [Katanga] (Briart); Lac Moero (Verd.).

Mellera lobulata *S. Moore* in *Journ. of Bot.* XVII (1879) 225, t. 203; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost Afr.* 367; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 50; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 143 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 315.

1891 (G. Descamps). — XVI: Lnkafu (Verd.); vallées de la Lukesi et du Buléchi (Desc.).

Mellera submutica *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1899) 51.

Pseudobarleria Lindani A. *Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII (1894) 104 [nom. tant.].

Le type croît dans le Nyassaland.

— — var. **grandiflora** *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 143.

1900 (Edg. Verdick). — XVI: plateau des environs de Lukafu (Verd. 566).

DYSCHORISTE Nees.

Dyschoriste Perrottetii [*Nees*] *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 486; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 45; *Lindau* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* 3 b (1895) 302, fig. 121 A-C; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 72; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 176; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 144; *Miss. Laurent* (1905) 182 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 201.

Calophanes — *Nees* in *DC. Prodr.* XI (1847) 111; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* (1892) 338.

1896 (Ém. Laurent). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Bokakata. — Nom vern. : **Molumba** (Dew.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.); Stanleyville (Pyn.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Dyschoriste Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 144.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Nikuminka** (Verd. 375).

Dyschoriste verticillaris [*T. Anders.*] *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 75; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 145.

Calophanes — *T. Anders.* ex *Olic.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 75.

Hygrophila glandulosa *Lindau* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* (1895) 367.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

RUELLIA L.

Ruellia patula *Jacq.* Miscell. Austr. II (1781) 358 et Icon. pl. rarior. I, 12, t. 119; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI¹, 83] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 47; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 45.

Dipteracanthus — *Nees* in *Wall.* Pl. Asiat. rarior. III (1832) 82 et in *DC.* Prodr. XI, 126; *Wight* Icon. pl. Ind. or. IV, t. 1505.

1894 (Paul Briart). — II a : le Mayumbe à Wa-Kionde (Dup.). — XVI : le Katinga (Briart).

PHAYLOPSIS Willd.

Phaylopsis imbricata [*Forsk.*] *Cordem.* Fl. ile Réunion (1895) 496.

Ruellia — *Forsk.* Fl. Aegypt. Arab. (1775) 113.

Aetheilema — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 478; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 480.

Micranthus — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 493; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 217; *De Wild.* Pl. Gilletianae, II (1901) 93 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 833].

P. oppositifolia *Lindau* in *Schlechter* Westaf. Kautsch. Exped. (1900) 315.

Micranthus longifolius *Wend.* Bot. Boabacht. 1798 39; *Lindau* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 298, fig. 229 et in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 367.

Phaylopsis Soms [non *Thoms.*] in *Bot. Mag.* (1823) t. 2433.

P. parviflora *Willd.* Sp. pl. III (1801) 342; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 83.

Phaulopsis — *Lindau* in *Engl.* et *Prantl* l. c. Nachtr. zum II IV (1897) 305.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens; Schl.) : Kisantu (Gill.).

Phaylopsis Lindaviana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 142.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 520).

Phayloopsis longifolia *Thoms.* [non *Sims*] in *Speke Nile*, Append. (1863) 643; *T. Anders.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 26; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 84; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 315.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

OBS. — Co *Phayloopsis*, considéré comme une esp. ce distincte par Clarke, n'est sans doute qu'une variété du *P. imbricata* [Forsk.] Cordem.

Phayloopsis obliqua *S. Moore* in *Journ. of Bot.* XVIII (1880) 229; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 86; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 315.

Micranthus — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 493; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 811; *Lindau* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 298.

Phaulopsis — *Lindau* in *Engl. et Prantl* l. c. Nachtr. zum II-IV (1897) 305.

M. *Hensii Lindau* in *Engl. Jahrb.* XXII (1895) 114; *De Wild. et Th. Dur.*

Reliq. Dewevr. (1901) 176; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 315.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Dew.). — II a : Shinganga (Dew. 271). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 29); Kisantu (Gill. 971, 1024, 1219; Kimuenza (Gill. 2166).

Phayloopsis Poggei [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1899) 85.

Micranthus — *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 168 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 298; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 218.

Phaulopsis — *Lindau* in *Engl. et Prantl* l. c. Nachtr. zum II-IV (1897) 305.

1882 (P. Pogge). — V : le Stanley-Pool (Hens, 52). — XIII d : Nyangwe (Pg. 975).

LANKESTERIA Lindl.

Lankesteria Barteri *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1865) t. 5533; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 46; II (1900) 47; Pl. Thonnerria-nae (1900) 41 et Reliq. Dewevr. (1901) 176; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 183 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 202.

1891 (F. Demeuse). — V : Lukolela (Èm. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Yaminga (M. Laur.); Bobi (Thonn.). — XI : Mogaudojo (M. Laur.). — XII b : entre Gongo et Bamburu (Ser.). — XII c : env. de Surango (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Dem.); Romée (M. Laur.); chutes de la Tshopo (Èm. et M. Laur.). — XIII c : Bamauga (Èm. et M. Laur.). — XV : Kapinga (Èm. Laur.); Ibaka (Èm. et M. Laur.).

Lankesteria elegans [*P. Beauv.*] *T. Anders.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 33; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 218; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 70.

Justicia elegans P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 84, t. 50.

Eranthemum - Roem. et Schult. Syst. veget. I (1817) 174; *Nees* in DC. Prodr. XI, 447.

1891 (F. Demeuse). — Cougo (Dem.).

WHITFIELDIA Hook.

Whitfieldia Arnoldiana De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, IV (1899) 32 [B. S. B. B. XXXVIII², 109]; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 48 et Reliq. Dewevr. 1901 176; De Wild. Miss. Laurent (1905) 182; Clarke in Dyer Fl. trop. Afr. V, 511.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : forêts des env. de Stanleyville (Dew. 1159 a); chutes de la Tshopo (Ém. Duch.).

Whitfieldia elongata [P. Beauv.] De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, IV (1899) 33 [B. S. B. B. XXXVIII², 110]; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 48; De Wild. Miss. Laurent (1905) 183 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 317.

Ruellia — P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 46.

W. longifolia T. Anders. in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 27, pr. p.; Lindau in Engl. Pfl. Ost-Afr. 307; Clarke in Dyer Fl. trop. Afr. V, 64.

W. longilora Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 218; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I (1897) 83 [B. S. B. B. XXXVI², 83].

1888 (Fr. Hensl. — Bas-Congo (But. in Gill. 2212). — V : Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2826). — VII : Bali (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Bolongula (Ém. et M. Laur.); Lubue (Luja); Bombaie (Ém. et M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.); Lac Kinda (Desc.). — Ind. non cl. : Liebu (Dem.).

— — var. **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. l. c. IV (1899) 34 [B. S. B. B. XXXVIII², 111] et Reliq. Dewevr. (1901) 177.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Mobanga (Dew. 747).

Whitfieldia Gilletii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 316; II (1907) 201.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Leopoldville (Gill.); Sanda (Odd. in Gill. 3339, 3759).

Whitfieldia lateritia Hook. in Bot. Mag. (1845) t. 4155; *Nees* in DC. Prodr. XI, 221; Lindau in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 306, fig. 110 A; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I (1897) 32 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; Clarke in Dyer Fl. trop. Afr. V, 67.

1891? (F. Demeuse). — Cougo (Dem. 448).

Whitfieldia Laurentii [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 68.

Stylarthropus Laurentii *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 317, 397; *De Wild.* et *Th. Dur.* III. fl. Cgo (1899) 65, t. 32.

1896 (Ém. Laurent). — XIII a : env. de Stanleyville (Ém. Laur.).

Whitfieldia Liebrechtsiana *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 31 [B. S. B. B. XXXVIII², 111]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 177; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 511.

1895 (A. Dewèvre). — II a : forêts des env. de Shinganga (Dew. 277).

Whitfieldia sylvatica *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 317.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville; Kimuenza (Gill.).

Whitfieldia Stuhlmannii [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 68.

Stylarthropus — *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 11 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 306 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 367.

1880 (P. Pogge). — XVI : le Lualaba (Pg. 1144).

Whitfieldia subviridis *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 66.

W. longifolia *T. Anders.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 27, pr. p.

W. longiflora *S. Moore* in *Journ. of Bot.* XVIII (1880) 229, pr. p.

1888 (Fr. Hens). — IX : Lisha (Hens, 343).

PHYSACANTHUS Benth.

Physacanthus batanganus [*J. Braun* et *K. Schum.*] *Th.* et *Hél. Dur.*

Ruellia — *J. Braun* et *K. Schum.* in *Mitth. Deutsch. Schutzgeb.* II (1889) 173.

Lankesteria — *Lindau* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 111.

P. inflatus *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 57; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 317; II (1907) 202.

1900 (L. Gentil). — VIII : Wema (Gent.); Eala (M. Laur. 1430); Haut-Lopori (Biel.).

BLEPHARIS Juss.

Blepharis boerhaaviaefolia *Pers.* Syn. pl. II (1807) 180; *Nees* in *DC. Prodr.* XI. 266; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 458; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 96; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 171.

B. rubiaefolia *Schumach.* in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin.* Pl. (1827) 292.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.).

B. boerhaaviaefolia var. **nigrovcnulosa** *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 46; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 145 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 202; *Clarke* in *Dyer* l. c. 512, in add.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst; Gill. 3200). — XVI : le Katinga. — Nom vern. : **Kolania-Lania** (Verd. 596).

Blepharis Buchneri *Lindau* in Engl. Jahrb. XX (1894) 30 et in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 318; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 218; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 101; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 48.

1882 (P. Pogge). — Ind. nou cl. : le Lomani (Pg. 1217).

— — var. **major** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 116, in obs.; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 319; II (1907) 203.

1891 (G. Descamps). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — XV : bords du Lubishi [Sankuru]; vallée du Luwembe [Sankuru] (Desc.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.; Recq).

Blepharis katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 146.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kusoi-Sanpuku** (Verd. 438).

Blepharis trinervis *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 104; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 218; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 105; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 147, in obs.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : plain. sablon. de la Busumba (Coru.).

Blepharis Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 147.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musasa** (Verd. 166, 595).

ACANTHUS L.

Acanthus arboreus *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 115; *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 37; *Engl.* Hochgeb. fl. trop.-Afr. 390 et in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 383; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 106.

A. arboreus *Forsk.* var. *pubescens* *T. Thoms.* in *Speke* Nile, App. (1863) 643; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 129, t. 86.
Cheilopsis — *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 272.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 24).

Acanthus mayaccanus *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1899) 37; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 108; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 219.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.).

A. mayaccanus var. **angustifolius** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 319.

1902 (J. Gillet). — V : Léopoldville (Gill.).

Acanthus montanus [*Nees*] *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 37; Bot. Mag. (1865) t. 5516; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 107; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 178; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 813; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 319; II (1907) 93.

Cheilopsis — *Nees* in *D.* Prodr. XI (1847) 272; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 481.

A. caudatus *Lindau* in Engl. Jahrb. XX (1894) 33.

1880? (P. Pogge). — II : Zambi (Dew.). — V : entre Léopoldville et Mombasi; env. de Léopoldville (Gill.); Sauda (Odd); Kisantu; vallée de la Sele (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VIII : île en face de Coquilhatville (Ém. Laur.); île de Bongenboi? (Dew.). — X : l'Ubaugi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Lusanga (Dem.). — XV : Lomkala (Ém. et M. Laur.); vallée de la Lulua (Pg.). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. non cl. : vallée du Lomami (Desc.)

Acanthus Villaeanus *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 148 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1906) 319; II (1907) 203.

1901 (R. Butaye). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu; entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 2243, 2273); Sauda (Odd. in Gill. 3325).

ACANTHOPALE Clarke.

Acanthopale pubescens [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 64.

Dischistocalyx — *Lindau* ex *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 385, 390.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga au N. du Lac Kivu, 2600^m (Goetz. et Prittw. 58).

SCLEROCHITON Harv.

Sclerochiton Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 318; II (1907) 202.

1902 (J. Gillet). — V : Léopoldville et env. (Gill. 2511; Pyu. 153).

L'*Acanthopsis horrida* *Nees*, indiqué comme ayant été trouvé au Congo par M. F. Demeuse [*Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 218] doit être réétudié.

BUTAYEA De Wild.

Butayea congolana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 150, t. 42 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 316; II (1907) 202.

1900 (J. Gillet) — V : le Stanley-Pool (Rouy); Kimuenza (Gill. 1933); entre Kisaute et Popokabaka But. in Gill. 2297; Sanda (De Brouw. in Gill. 3025).

CROSSANDRA Salisb.

Crossandra guineensis *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 281; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1878) t. 6346; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 41; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 203 et Miss. Laurent (1905) 184; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 117.

1903 (Ém. Laurent). — IX : Gali (Thonn.). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XV : grotte de Kondue (Ém. Laur.).

Crossandra nilotica *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 178; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 115; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 48; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 149.

1891 (G. Descamps). — XVI : Pala (Deb); Tou; vallée du Malondoï [afil. de la Luila] (Desc.); Lukafu. — Nom vern. : **Shikoka** (Verd.).

BARLERIA L.

Barleria affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 140.

1900 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu (Verd. 561).

Barleria Briartii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 42 [B. S. B. XXXVIII², 212]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 513.

1891 (Paul Briart). — XVI : gorges de Zilo (Briart).

Barleria Descampsii *Lindau* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 318; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 169.

1891 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

Barleria elegans *N. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 269; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 164; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 815; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 317.

B. pungens L. var. *macrophylla* *N.* in *DC.* Prodr. XI (1847) 237.

1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 3193).

Barleria lukafuensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 140.

1901 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 588).

Barleria opaca [*Vahl*] *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 230; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 480; *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 31; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 163; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 318.

Justicia — *Vahl* Enum. pl. I (1804) 123.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — X : Imese [Ubangi] (Ém. et M. Laur.).

Barleria ventricosa *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 230; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 143; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 164; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 318.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lovoi (Desc.).

Barleria Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 140.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulengroo** (Verd. 436).

Barleria villosa *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 267; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 164; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 817; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 318.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1394; rég. de Lumene (Hendr. in Gill. 3288); entre Dembo et le Kwango (But. in Gill. 1502).

CRABBEA Harv.

Crabbea nana *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 162; *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 32; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 118.

C. ovalifolia *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1881) 24; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI, 83].

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

THOMANDERSIA Baill.

Thomandersia Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, I (1906) 312.

1900 (R. Butaye). — V : entre Kisautu et le Kwango (But. in Gill. 1480).

Thomandersia congolana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 30 [B. S. B. B. XXXVIII, 107] et Reliq. Dewevr. (1901) 179; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 512; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 313.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Cabra, 35). — V : entre Selembao et Léopoldville (Dew. 472).

T *congolana* var. *grandifolia* De Wild. Miss. Laurent (1905) 179

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 1082). — V : Kimuenza (Gill. 2192); rég. de Sabelo (Gill. 357).

Thomandersia laurifolia (T. Anders.) Baill. Hist. des pl. X (1888) 456; *Chrysé* in *Dur.* Fl. trop. Afr. V, 120 et 512.

Seybothus — T. Anders. ex Benth. et Hook. f. Gen. pl. II (1876) 1093; *Hbk.* Foss. pl. XIII (1877) 1493; *Benth.* in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXII (1878) 43; *Wimmer et Schimper* Étud. fl. Cgo (1896) 219.

T. Hensli *De Wild. et Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 31 [B. S. B. V. XXX III, 108]; *De Wild. et Th. Dur.* III. fl. Cgo (1901) 133, t. 77 et Réq. Dewèvre (1901) 179 *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 179 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 313; II (1907) 200.

1888 (Fr. Hensl. — VIII : Cécilleville (Dew. 683); Eala (M. Laur. 130). — IX : Bangala (Hensl. C. 13; Dem. 303). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Ibange (Ém. et M. Laur.).

— — var. *latifolia* (De Wild.) Th. et Hél. Dur.

T. Hensli *De Wild. et Th. Dur.* var. — *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 180. 1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

— — var. *longipetiolata* (De Wild.) Th. et Hél. Dur.

T. Hensli *De Wild. et Th. Dur.* var. — *De Wild. l. c.* (1905) 179. 1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Kapinga (Ém. et M. Laur.).

Thomandersia Laurentii De Wild. Miss. Laurent (1905) 180 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 313, t. 69.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.): Chenal (Ém. et M. Laur.); Kimuenza (Gill. 1700).

LEPIDAGATHIS Willd.

Lepidagathis Laurentii De Wild. Miss. Laurent (1905) 183.

1894 (Ém. et Marc. Laurent.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

Lepidagathis Lindauiana De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 145.

1900 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kadi-Kungu (Verd. 520).

ASYSTASIA Blume.

Asystasia congensis Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 132.

1885 (C. Callawaert). — V : le Stanley-Pool (Call.).

Asystasia gangetica [L.] T. Anders. in *Thw.* Enum. pl. Zeyl. (1864) 235; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 370; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 41; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 320; II (1907) 203.

Justicia — L. Cent. pl. alt. (1756) 3.

A. coromandeliana Nees in *Wall.* Pl. Asiat. rarior. III (1832) 89; Nees in *DC.* Prodr. XI, 165; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 219; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 179; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 151 et *Miss. Laurent* (1905) 184; *Hierm* Cat. Welw. Pl. I, 817; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 131,

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra); Bingila (Dup.); Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : Mopolege (M. Laur.); Bolobo (Buett.); env. de Lemfu (But.); Kinuenza (Dew.); Tumba; Bulebu (Ém. et M. Laur.); env. de Kinanga (Odd.); Tshumbiri (Dem.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Ncolie-Akondo** (M. Laur.). — IX : Upoto (Thonn.); Bangala (Hens). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.). — XII : Liboyo (Ser.). — XV : la Lulua (Pg.). — Ind. non cf. : le Lomami (Desc.).

Asystasia longituba *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XXII (1895) 118; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 203, t. 57-58.

Ann. ? (Coll.?). — Congo (Coll.?).

Obs. — Cette espèce a été décrite puis figurée d'après des plantes, de provenance congolaise, élevées au Jardin botanique de Bruxelles.

PSEUDERANTHEMUM Radlk.

Pseuderanthemum Lindavianum *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 27 [B. S. B. B. XXXVIII², 104]; *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 49 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 180.

1891 (G. Descamps). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Shimbete (Dew. 317). — VIII : env. de Basaukus; Bamanga (Dew. 781, 1147). — Ind. non cf. : vallée du Lomami (Dew.).

Obs. — *Clarke* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 514] réunit cette espèce au *Rhinacanthus communis* Nees.

Pseuderanthemum Ludovicianum [Buett.] *Lindau* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 330; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 220; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 63, t. 32; *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 48 et *Pl. Thonnerianae* (1900) 41; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 203 et *Miss. Laurent* (1905) 185.

Eranthemum — *Buett.* in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* XXXII (1890) 41; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 172.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — VIII : Eala (J. Laur. 1121); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — IX : Bolombo (Thonn.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Dem.); Barumbu (M. Laur.); Mogandjo (M. Laur. 1411); Bomaneh (M. Laur. 1435). — XII a : Stanleyville (Ém. Duch.); Romée (M. Laur. 1027).

Pseuderanthemum nigritanum [*T. Anders.*] *Radlk.* in Sitz. Ber. Bayr. Akad. XIII 1883 286; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI¹, 83]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 46; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 818; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 320.

Eranthemum — *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 51; *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 308; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 171.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.); Sanda (Odd. in Gill. 3318). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2841 b, 2864). — IX : Ile en aval d'Upoto (Ém. Laur.).

JUSTICIA L.

Justicia Anselliana [*Nees*] *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 44; *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 341 et in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, IV, 32; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI¹, 83]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 208.

Adhatoda — *Nees* in DC. Prodr. XI (1847) 403.

Dianthera — *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. II (1876) 1114.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Justicia Emini *Lindau* in Engl. Jahrb. XX (1895) 68, in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 349 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 373; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI¹, 84]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 187.

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

Justicia Garekeana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 38; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 220; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gillelianac, II (1901) 93 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 833]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 321.

Rungia grandis *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 46; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 253.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : entre Léopoldville et Mombasi ; Kisantu (Gill. 1165, 1247, 2571). — VI : pays des Majakalla [Kwango] (Buett. 356); vallée de la Djuma (Gent.). — XIII a : Stanleyville (M. Laur. 1410). — Ind. non cl. : Langa (Dup.).

Justicia insularis *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 40; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 373; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 195.

J. Karschiana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 40; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 321.

1899 R. Schlechter. — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill. 582).

Justicia matammensis *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 130; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 209.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Muuza (Schw.). — XV : la Lulua (Pg.). — Iad. non cl. : le Lomami (Pg.).

Justicia palustris [*Hochst.*] *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 38; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 373; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 191; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI¹, 84]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 141.

Tyloglossa — *Hochst.* in Flora, XXV (1842) I, Beibl. 144; XXXVI (1843) 72. 1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.); Lukafa (Verd.).

Justicia Paxiana *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 63; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI¹, 84]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 181; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322.

Rungia — *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 253.

1888 (Fr. Hens). — II a : le Mayumbe (Dup.); Shinganga (Dew.). — IV : Lu-kungu (Hens). — V : entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.).

Justicia Poggei *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 61 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 350; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 220; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 211.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 304).

Justicia Rostellaria [*Nees*] *Lindau* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 349 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 373; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI¹, 84].

Adhatoda — *Nees* in DC. Prodr. XI (1847) 397.

J. calcarata *Hochst.* in Flora (1843) 73, in obs.; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 195.

1894 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dup.). — II a : Bingila; Kibinga (Dup.).

Justicia tenella [*Nees*] *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 40; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 187; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 321; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 820.

Rostellaria — *Nees* in DC. Prodr. XI (1847) 369; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 482.

1901 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 2224).

NICOTEBA *Lindau.*

Nicoteba Etonica [*L.*] *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1893) 56, 63, t. 2, fig. 56 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 370; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 320.

Justicia Betonica L. Sp. pl. ed. 1 1753) 21; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 184.

Adhatoda — *Nees* in *Wall.* Pl. Asiat. rarior. III (1832) 103.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

CHLAMYDOCARDIA Lindau.

Chlamydocardia Buettneri *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 39 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 329; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 234; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 184.

1902 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : grotte de Kondue (Ém. et M. Laur.).

DUVERNOYA E. Mey.

Duvernoya Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. IV (1899) 25 [B. S. B. B. XXXVII², 402]; *De Wild.* et *Th. Dur.* III. fl. Cgo (1901) 143, t. 82 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 181; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 185 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 205.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Basaukusu (Dew. 781); Eala (Ém. et M. Laur. 941).

Obs — D'après *Clarke* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 513] ce *Duvernoya* devrait rentrer dans le *Justicia extensa* T. Anders. = *D. extensa* Lindau.

Duvernoya haplostachya *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 324.

1891 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Obs — The description reads like that of a *Monechma*; but without any knowledge of the pistil it is vain to guess (*Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 224).

Duvernoya Verdickii *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 152.

Justicia — *De Wild.* l. c. (1903) 152, in obs.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kibala (Verd.).

RHINACANTHUS Nees.

Rhinacanthus Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. IV (1899) 28 [B. S. B. B. XXXVII², 105]; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 181; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1903) 321, t. 68 et *Miss. Laurent* (1905) 185.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. de Bokakata (Dew.); env. de Boeka. — Nom vern. : Bamandia (Dew. 804).

Obs. — *Clarke* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 224, 514] réunit le *R. Dewevrei* au *R. communis* Nees.

Rhinacanthus parviflorus *T. Anders. ex Th. Dur. et De Wild.*
Mat. fl. Cgo, IV (1899) 29; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I
(1906) 321.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

RUNGIA Nees.

Rungia Buettneri *Lindau* in Engl. Jahrb. XX (1894) 46 et in *Engl.*
et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 332; *Clarke* in *Dyer* Fl.
trop. Afr. V, 254.

1885 (R. Buettner). — VI : la Sanga près de Muene-Putu-Kasongo (Buett. 456).

Rungia congoensis *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 254.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu (Hens, 330).

DICLIPTERA Juss.

Dicliptera Elliotii *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 258.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Dicliptera katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 152.

1900 (Edg. Verdicke). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Sosoi-Sosoi** (Verd. 440).

Dicliptera umbellata [*Vahl*] *Juss.* in *Annal. Mus. Paris*, IX (1807)
268; *Nees* in *DC. Prodr.* XI, 484; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V,
259; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 141.

Justicia — *Vahl* Enum. pl. I (1804) 111.

Dipodium — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 485.

D. verticillaris *T. Anders.* [non *Juss.*] in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 47;

S. Moore in *Journ. of Bot.* XVIII (1880) 362.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Ind. non
cl. : Ieyanga; Poka (Burt.).

Dicliptera Welwitschii *S. Moore* in *Journ. of Bot.* XVIII (1880) 362;
Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 259.

1882? (P. Pegge). — Ind. non cl. : vallée du Lomami (Pg. 4218).

PERISTROPHE Nees.

Peristrophe bicalyculata [*Retz.*] *Nees* in *Wall.* Pl. Asiat. rarior.
III (1832) 113; *DC. Prodr.* XI, 496; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II,
160; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B.
XXXVI², 84]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 242, 514.

Dianthera bicalyculata Retz. in Act. Acad. Holm. (1775) 297, t. 9.

Justicia — *Vahl* Symb. bot. II (1791) 13.

1895 (G. Descamps). — XVI : *Tea* (Desc.).

Peristrophe Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 26 [B. S. B. B. XXXVIII², 103]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 93 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 833]; Ill. fl. Cgo (1901) 139, t. 80 et Reliq. Dewevr. (1901) 183.

1895 (A. Dewevr.). — II a : *Zobe* (Dew. 245). — V : *Kisantu* (Gill.).

Obs. — *Clarke* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 514] réunit cette espèce à la précédente.

Peristrophe Hensii [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 243.

Dicliptera — *Lindau* in Engl. Jahrb. XXII (1895) 120.

1888 (Fr. Hens). — V : le *Stauley-Pool* (Hens, B. 53).

HYPOESTES R. Br.

Hypoestes cancellata [*Willd.*] *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 505; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 246.

Justicia — *Willd.* ex *Nees* in *DC.* l. c. (1847) 506.

H. callicoma *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 41; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 46; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy-Cgo, I (1906) 320; II (1907) 204.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : *Bingila* (Dup.). — V : le *Stanley Pool* (Schlt.). — VI : route de *Tumba-Mani* à *Popokabaka* (*Cabra* et *Michel*). — XII a et b : route de *Bima* à *Bambili* (Ser.). — XII d : pays des *Mangbettu* (Schw.). — XV : *Mukenge* (Pg.).

Hypoestes latifolia *Hochst.* in *Flora*, XXIV (1841) 1, *Intell.* 43; *Nees* in *DC.* Prodr. XI, 509; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 371; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI¹, 84]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 183; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII, 111.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo, se montre souvent après l'incendie des herbes (*Cabra*). — II a : *Katala* (Dew.); *Bingila* (Dup.). — IV : *Lutete* (Hens). — V : le *Stanley-Pool* (Dem.).

Obs. — *Clarke* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 250] réunit cette espèce à l'*H. verticillaris* R. Br.

Hypoestes verticillaris [*L. f.*] *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 474, in obs.; *Nees* in *DC.* Prodr. XI, 507; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 250; *Lindau* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 333, fig. 134, A-C; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 183; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 152.

Justicia verticillaris L. f. Suppl. pl. (1781) 85.

Dicliptera — A. Juss. in Annal. Mus. Paris, IX (1807) 268.

H. mollis T. Anders. in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 49; *Th. Dur. et Schinz*

Étud. fl. Cgo (1896) 220; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38

[B. S. B. B. XXXVI¹, 84].

1816 (Chr. Smth'. — Bas-Congo (Sm.). — I a : Moanda (Gill.). — II a : Katala (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Heus); env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — IX : Bumba (Em. Laur.). — XII c : route de Nianguara à Gombari (Ser.). — XV : la Lulua (Pg.). — XVI : le Katanga (Corn.); Lukafu (Verd.); Toa (Desc.).

VERBENACEAE (1)

LANTANA L.

Lantana Camara L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 627; *Schauer* in DC. Prodr. XI, 598; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 183; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 276; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 309.

L. aculeata L. l. c. (1753) 627; Bot. Mag. (1789) t. 96.

L. scabrida Ait. Hort. Kew. ed. 1 (1789) 352; *Lodd.* Bot. Cab. (1822) t. 1171.

1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Lantana salvifolia Jacq. Hort. Schoenbr. III (1798) 18, t. 285; *Schauer* in DC. Prodr. XI, 615; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79 [B. S. B. B. XXXVII, 124]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 33; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 276; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 183; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 116, 223 et Miss. Laurent (1905) 170.

1891 (G. Descamps). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); Temvo (Em. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Mombanza (Thonn.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Munuugu (Em. Laur.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.; Heq.). — Ind non cl. : brousse du Lomami (Em. Laur.). — Noms vern. : **Lokopo** [Kasai]; **Malebunukai** [Ikwangula]; **Bulume** [Tauganika] (Dew.).

LIPPIA L.

Lippia adoensis Hochst. in Flora, XXIV (1841) 1, Intell. 23; DC. Prodr. XI, 558; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79

(1) A côté des Verbenaceae vient la petite famille des Selaginaceae. Deux espèces, les *Selago alopecuroides* et *Johnstonii* Rolfe, ont été indiquées vaguement au Congo, mais sans doute par erreur.

[B. S. B. B. XXXVII, 124]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 47; II (1900) 19 et Reliq. Dewevr. (1901) 181; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 170; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 280.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila; Wakiende (Dup.); Pouti (Dew.). — V : rive droite du Kasai (Laja); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — VIII : Eala. — Nom veru. : **Esisi**; Ikelemba (M. Laur.); env. de Mobanga (Dew.). — IX : Upoto (Wilw.).

Lippia asperifolia *Rich.* Cat. hort. med. Paris (ann. ?) 67; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 583; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79 [B. S. B. B. XXXVI, 121]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 280.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Lippia Burtonii *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 281.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.).

Lippia nodiflora [*Lam.*] *Michaux.* Fl. Bor.-Amer. II (1803) 15; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 585; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 279; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 47.

Zapania — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) 59.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : env. d'Albertville [Toa] (Hecq); Pala (Deb.).

STACHYTARPHETA Vahl.

Stachytarpheta angustifolia *Vahl* Enum. pl. I (1804) 265; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 563; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 284; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79 [B. S. B. B. XXXVII, 124]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 184; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 311.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool [Tamo] (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Dew.). — XII d : le Kibali (Schw.). — XV : banc de sable du Kasai (Ém. et M. Laur.); Lusambo (Jos. Duch.). — XVI : Toa (Desc.).

Stachytarpheta indica [*L.*] *Vahl* Enum. pl. I (1804) 206; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 564; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 284.

Verbena — *L.* Syst. nat. ed. 10 (1779) 821.

S. jamaicensis *Vahl* l. c. I (1804) 206; Bot. Mag. (1816) t. 1860; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 564.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens).

DURANTA L.

Duranta erecta L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 637; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 831.

D. Plumieri *Jacq.* Stirp. Amer. hist. (1780) 186, t. 176, fig. 76; Bot. Reg. III, t. 244; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 615; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 184; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 287; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 309.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Boma (Gill.). — V : Bolobo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XII d : Munza (Schw.). — XIII d : entre Kasongo et Kabanga (Dew.).

PREMNA L.

Premna angolensis *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 165; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 221; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 289.

1880 (von Mechow). — VI : pays des Majakalla [Kwango] (Mech.).

Premna quadrifolia *Schumach.* et *Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 273; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 633; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 94 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 834]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 289.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

VITEX L.

Vitex aesculifolia *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 325.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3442).

Vitex camporum *Buett.* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXXII (1890) 35; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 222; *Henriq.* in *Bolet. Soc. Brot.* XVI, 69; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Confr. fl. Cgo*, II (1900) 39 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 184; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 323; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 309.

V. madiensis *Oliv.* in *Trans. Liun. Soc.* XXIX (1875) 134, t. 131; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 834.

1884 (R. Buettner). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Boma (Schimp.) — II a : la Lemba (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Sanda (Verm.). — XVI : Lukafu; plateau de la Lufira. — Nom vern. : Mufutu (Verd.).

Vitex Cienkowskii *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinneanae (1867) 27, t. 12; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 328.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

- Vitex congolensis** *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 15 [B. S. B. B. XXXVIII², 134]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 50 et Reliq. Dewevr. (1901) 184.
1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata (Dew. 770 a). — XV : Beua-Dibele (Luja).
Obs. — M. Baker [in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 325] croit que cette espèce doit être réunie au *V. ferruginea* Schumach. et Thonn.
- Vitex Dewevrei** *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 14 [B. S. B. B. XXXVIII², 133]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 50 et Reliq. Dewevr. (1901) 185; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 198; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 327.
1891 (F. Demeuse). — IV : Lukungu. — Nom vern. : Filu (Dew. 409). — V : Kimueza (Gill. 1614). — XI : Yamoungeri (Dem.).
- Vitex ferruginea** *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 288; *Schauer* in *DC. Prodr.* XI, 695; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 324.
V. rufescens *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 169; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 222.
1882 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua (Pg.).
- Vitex Gilletii** *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 298 et in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 72; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171.
1876? (P. Pogge). — V : Kimuenza (Gill. 2163). — XV : Dibele (Ém. et M. Laur.); Mukenge (Pg. 698).
- Vitex lukafuensis** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 121.
1899 (Edg. Verdict). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : Mukasu (Verd. 63).
- Vitex lundensis** *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1893) 168; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 222; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 327.
1882 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua (Pg. 1260).
- Vitex Mombassae** *Valke* in *Linnaea*, XLIII (1880-1882) 533; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 121; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 326.
1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Lufuka (Verd. 70).
- Vitex Poggei** *Guerke* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVIII (1893) 168; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 222; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 323.
1881 (P. Pogge). — Congo (Pg. 1255).
Obs. — Le n° 1260, de la même collection, venant de la Lulua, il est plus que probable que le n° 1255 a été récolté dans la même région.

CLERODENDRON L.

Clerodendron Bakeri *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 175; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 297.

C. congense *Bak.* [non *Engl.*] in Kew Bull. (1892) 127.

1882 (H. Johnston). — V : le Stanley-Pool (Johust.).

Clerodendron Buchneri *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 173; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 222; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 305.

1881 (von Mechow). — VI : Quifocusa sur le Kwango (Mech. 557 a).

Clerodendron capitatum *Schumach.* et *Thonn.* in Dansk. Vid. Selsk. Afh. IV (1828) 61; *Schauer* in DC. Prodr. XI, 673; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1848) t. 4355; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 305, 518.

Le type est largement répandu dans l'Afrique trop.

— — var. **Butayei** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 117.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2245).

— — var. **subcordatum** *De Wild.* l. c. (1903) 117.

1900 (Edg. Verdicke). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kamiombo** (Verd. 422).

— — var. **subdentatum** *De Wild.* l. c. (1903) 117.

1900 (Edg. Verdicke). — XVI : plateau près de Lukafu (Verd. 409).

Clerodendron congense *Engl.* in Engl. Jahrb. VIII (1886) 65; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 223; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 301.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma ; Ponta da Lenha (Naum.).

Clerodendron formicarum *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 179; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 223; *Henriq.* in Bolet. Soc. Brot. XVI (1899) 69; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 298.

Siphouanthus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 843.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza ; Kusumba (Schw. 3483, 3641). — XVI : Musumba (Pg. 333).

Clerodendron fuscum *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 175 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 311; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 223; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 185; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 72, (1906) 310 et *Miss. Laurent* (1905) 172; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 313.

1876? (P. Pogge). — II a : Nanga (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu (Gill. 804); Kimuenza (Dew. 507); Sanda (Odd.); Tumba (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XV : Butala (Ém. Laur.); la Haut-Lulua vers 9°5 (Pg.) la Lulua (Preuss); Bolongula (Ém. et M. Laur.).

Clerodendron Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 36 [B. S. B. B. XXXVIII², 113]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 302.

1898 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.).

Clerodendron grandifolium *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 173; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 223; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 307.

1889 (von Mechow). — VI : pays des Majakalla (Mech. 530).

Clerodendron Kanichi *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 119.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Kanichi** (Verd. 323).

Clerodendron katangense *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 120.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : bords de la Mweua. — Nom vern. : **Kawsala** (Verd. 400).

Clerodendron longitubum *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, VIII (1898) 22 [B. S. B. B. XXXIX², 74]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 310; II (1907) 66; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 517, in add.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 3347). — XII c : route d'Amadis à Surango [Ser. 356].

Clerodendron Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, VI (1899) 43 [B. S. B. B. XXXVIII², 213] et *Pl. Gilletiana*, I (1900) 40 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 40]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 298, in obs.

1898 (Éd. Luja). — IV : Sona-Gongo [cataractes] (Luja). — V : Kisantu (Gill.).

Clerodendron myricoides *R. Br.* in *Salt Abyss. App.* (1814) p. LXV; *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1900) 298; *Vatke* in *Linnaea*, XLIII, 535; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 310.

Cyclonema — *Hochst.* in *Flora*, XXV (1812) 226; *Schauer* in *DC. Prodr.* XI, 675; *Bot. Mag.* (1870) t. 5838; *A. Rich.* *Teut. fl. Abyss.* II, 171.
Sephouanthus — *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I* (1900) 841.

1832 (J. Monteiro). — II : Boma (Mout.). — V : Bolobo (Johnst.).

— — **var. camporum** *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1900) 299.

1893 (G. Descamps). — Congo (Cabra). — XVI : Pala (Desc.).

C. myricoides var. **laxum** *Guerke* in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 299; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 120.

1891 (Hjac. Vanderyst). — Congo (Vanderyst). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Pulu** (Verd. 161).

Clerodendron Poggei *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 174; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 223; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 309.

1882 (P. Pogge). — XV : dans un village Kalebue (Pg. 1116).

Clerodendron Rehmanni *Guerke* in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 294; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 121.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Disjika-Bamuni** (Verd. 51).

Clerodendron scandens *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 52, t. 32; Bot. Mag. (1848) t. 4354; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 304; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 310 et Miss. Laurent (1905) 172.

1891 (F. Demeuse). — VI : route de Lusubi à Luanu (Lescr.). — VIII : Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Schlt.); Bangu [Momboyo] (Gent.). — IX : pays des Bangala (Dem.); Nouvelle-Anvers (Dew.).

Clerodendron Schlechteri *Guerke* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 310 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12504).

Clerodendron Schweinfurthii *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 177 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 341; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 296; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 310.

1902 (L. Gentil). — V : vallée de la Lumene (Hendr.). — VI : Kindunpolo; Tumba-Mani (Cabra et Michel). — XV : la Loauge (Gent.).

Clerodendron spinescens [*Oliv.*] *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 180; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 223; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 40 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 40; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 72, (1906) 310; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 313.

Cyclonema — *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 96 et in *Hook.* Icon. pl. XIII (1877) 18, t. 1221.

Kalaharia — *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 340.

K. spinipes *Baill.* Hist. des pl. XI (1892) 111.

Clerodendron Melanocrater *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 180; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 299. — Près de la riv. Itiri (Stuhlmann. 3322, 3650, 3720).

Obs. — Cette localité est peut-être dans le Congo belge.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.); rég. de Lumena (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — XVI : le Katanga (Corn.).

C. splnescens var. **parviflorum** *Schinz* ex *Guerke* l. c. (1894) 180; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. 224.

1888 (Fr. Hens.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 57).

Clerodendron splendens *D. Don* in *Edinb. Phil. Journ.* XI (1824) 349; *Schauer* in *DC. Prodr.* XI, 662; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 300.

Siphonanthus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 841.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew. 98). — II a : Biugila; Kibinga. — Nom vern. : *Lundula* [Mayuube] (Dup.). — V : Sabuka (Ém. Duch.); Sanda (Odd.); Kisantu (Gill.). — XIII a : Stanleyville; Yakusu (Ém. Laur.). — XV : Lubue [Kasai] [Luja].

Clerodendron subreniforme *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1900) 291; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 186; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 518, in add.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 917). — Noms vern. : *Gubia* (Kasongo); *Djague-Djague* (Ikwangula) (Dew.).

Clerodendron Thonneri *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1900) 292; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 517, in add.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Boyangi (Thonn. 69).

Clerodendron thyrsoides *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1900) 293; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 186; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 516; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 172 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 310.

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.). — VIII : Eala (M. Laur. 80); bord de la Lulanga (Dew. 812).

Clerodendron volubile *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 52, t. 32; *Schauer* in *DC. Prodr.* XI, 661; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 297; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 172 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 310.

Siphonanthus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 842.¹

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Meanda (Gill.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur. t.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Sauda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — IX : Umuangi (Ém. et M. Laur.).

Clerodendron yaundense *Guerke* in Engl. Jahrb. XXVIII (1900), 297; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 516; *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Irebu (Schlt. 12627).

AVICENNIA L.

Avicennia africana *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 80, t. 47; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 699; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 186; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 331.

1895 (P. Dupuis). — I : marais de Bauana (Dup.).

LABIATAEAE

OCIMUM L.

Ocimum canum *Sims* in Bot. Mag. (1823) t. 2452; *Benth.* in *DC.* Prodr. XII, 32; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1893) 224; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 186; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 337; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 179 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 312; II (1908) 341.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — II : Boma; Zobe (Dew.). — III : Tounda (Buett.). — IV : Kitobola (Em. et M. Laur.). — V : route de Tumba-Mani [VI] à Tumba [V] (Cabra et Michel); Boko (Vanderyst); Kisautu (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — XII c : Amadis (Ser.). — XII d : Munza (Schw.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Koudue; Luebo; entre Lusambo et le Lomami (Em. et M. Laur.). — Noms veru. : *Djumba-Djumba* [Bakusu]; *Lonengue* [Ikwangula]; *Lognie* [Kasongo]; *Lehani* [Matammatam]; *Katundula* [Tanguika] (Dew.).

Ocimum Descampsii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 38 [B. S. B. B. XXXVII, 83]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 343.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Ocimum filamentosum *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 108; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 177; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 343.

O. grandiflorum *L'Hérit.* Stirp. nov. (1784-1785) 89, t. 43.

Becium bicolor *Lindl.* in Bot. Reg. (1843) t. 15.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Lofoi (Verd.).

Ocimum glossophyllum Briq. in Engl. Jahrb. XIX (1894) 102; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 340.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg. 351).

Ocimum gratissimum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1197; *Jacq.* Icon. pl. rar. III, t. 495; *Benth.* in *DC.* Prodr. XII, 24 (excl. syn.); *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 339, in obs.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett.).

— — var. *macrophyllum* Briq. in B. Herb. Boiss. II (1894) 120 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 38 [B. S. B. B. XXXVII, 83]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 187.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Moçoçolo** (Dew. 624).

— — var. *mascarenarum* Briq. ll. cc.; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae. I (1900) 40 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 40]; et Reliq. Dewevr. (1901) 187; *De Wild.* Miss. Laurent (1900) 175 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 341.

1888 (Fr. Heus). — XVI : Congo (Desc.). — Bas-Congo (Cabra). — III : Matadi (Em. et M. Laur.). — IV : Luvituku (Em. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Heus); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Lac Léopold II (Body). — VIII : Bobangi (Em. Laur.); Coquilhatville [cult.] (Dew.); Lulanga (Dew.); Eala (M. Laur.); Monsole (Huyghe et Ledoux). — IX : Moleke (Em. et M. Laur.). — XIII a : Nyangwe (Dew.); Yanougo (Em. et M. Laur.). — XIV : Mazanze (Desc.). — XV : Ikongo; le Kasai [poste de bois n° 6] (Em. Laur.). — Noms vern. : **Lusu-Lusulo** [Bakusu]; **Ececi**; **Malumba** [Eala]; **Binga** [Tanganika] (Dew.); **Bojudjuma** (M. Laur.); **Moçoçole** [Baugala]; **Tshamtshakadi** [Sankuru].

Ocimum linearifolium Briq. in Engl. Jahrb. XIX (1894) 162; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 341.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg. 357).

Ocimum Poggeanum Briq. in Engl. Jahrb. XIX (1894) 163; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 225; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 341.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg. 355).

GENIOSPORUM Wall.

Geniosporum congoense Guerke in *Schlechter* Westafri. Kautsch.-Exped. (1900) 312 (nom. tant.).

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12469).

Genosporum scabridum *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 165; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 225; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 352.

1876 (P. Pogge). — XV : la Haut-Lulua (Pg. 347).

PLATOSTOMA P. Beauv.

Platostoma africanum *P. Beauv.* *Fl. d'Oware*, II (1807) 61, t. 95, fig. 2; *Henriq.* in *Bolet. Soc. Bot.* X, 149; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 225; *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 30 [B. S. B. B. XXXVII, 75]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 349 [Platystoma]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 341.

P. flaccidum *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 165; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 225.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Cabra). — II : Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — IV : Lutete (Heus). — V : Suata [*err. cal.* Ulsuata] (Buett.); Yindu; Dembo (Vanderyst). — VI : le Kwilu (Sap.). — VIII : Équateurville (Pyn.); Coquilhatville (Schlt.); Eala et env. (M. Laur.; Pyn.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser.). — XV : la Haut-Lulua (Pg. 363).

Platostoma Buettnerianum *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 225; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 350.

1886 (R. Buettner). — V : Léopoldville (Buett. 449).

MOSCHOSMA Rchb.

Moschosma polystachyum [*L.*] *Benth.* ex *Wall.* *Pl. Asiat. rarior.* II (1831) 13 et in *DC. Prodr.* XII, 48; *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* IV, 612; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 353.

Ocimum — *L. Mant. pl.* (1767) 567.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — XII d : le Kibali (Schw.).

— — var. **stereocladum** *Briq.* in *Engl.* et *Prantl Nat. Pflanzn-fam.* IV, 3 a (1895) 368 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 37 [B. S. B. B. XXXVII, 82] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 188.

1891 (G. Descamps). — II : Sisia (Dup.). — XIV : Uvira; Mazanze (Deb.). — XV : la Loange (Dew.). — XVI : Toa (Desc.).

ACROCEPHALUS Benth.

Acrocephalus campicola *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 67; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo, I (1896) 226; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 358.

1882 (P. Pogge). — XIII d : Nyaugwe (Pg. 1075 pr. p.).

Acrocephalus coeruleus *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 135, t. 133; *Guerke* in *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exp. (1900) 312; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 359.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12446).

— — var. **genuinus** *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 226.

1882 (P. Pogge). — XIII d : Nyangwe (Pg. 1073, pr. p.).

— — var. **trichosoma** *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 226.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua, 9^o5 (Pg. 358).

Acrocephalus cylindraceus *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 135; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 31 [B. S. B. B. XXXVII, 76]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 357; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 340.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kasongo (Dew. 993). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Acrocephalus Debeerstii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 31 [B. S. B. B. XL, 37].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : le Tanganika (Deb.).

Acrocephalus Descampsii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 33 [B. S. B. B. XL, 39].

1891 (G. Descamps). — XVI : vallée du Lutembne (Desc. 42).

Acrocephalus Dewevrei *Briq.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 187 [nom. tant.].

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Acrocephalus divaricatus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 31 [B. S. B. B. XXXVII, 76]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 188; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 364.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Acrocephalus elongatus *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 171; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 226; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 363.

1882 (P. Pogge). — XIII? : entre Nyangwe et Kimbundo (Pg. 1014).

Acrocephalus Hensii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 32 [B. S. B. B. XXXVII, 77]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 363.

1883 (Fr. Hens). — V : marais du Stanley-Pool (Hens, B. 42).

Acrocephalus iododermis *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 167; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 226; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 358.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1086).

Acrocephalus Laurentii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 34 [B. S. B. B. XXXVII, 79]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 361.

1895 (Ém. Laurent). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Acrocephalus Masuianus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 35 [B. S. B. B. XXXVII, 82]; *De Wild.* et *Th. Dur.* III. fl. Cgo (1898) 25, t. 13; *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 47 et Pl. *Gilletiana*, II (1901) 94 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, 1, 834]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 363; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy-Cgo, I (1906) 312.

1893 (P. Dupuis). — II a : forêts du Mayumbe (Dup.). — V : Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3039); Kisautu (Gill. 1109, 1144).

Acrocephalus paniculatus *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 172; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 226; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 364.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba, 8°5 lat. S. (Pg. 370).

Acrocephalus Poggeanus *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 170; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 226; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 358.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukeuge (Pg. 1086).

ORTHOSIPHON Benth.

Orthosiphon heterochrous *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 173; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 227; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 370.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwaugo (Pg. 566).

Orthosiphon iodocalyx *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 174; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 227; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 374.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg. 353).

Orthosiphon Liebrechtsianus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 40 [B. S. B. B. XXXVII, 85] et III. fl. Cgo (1899) 73, t. 37; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 374.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa : Mavunze (Desc.).

Orthosiphon retfuervis *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 175; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 227; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 367.

1881 (von Mechow). — VI : Cisacula (Mech. 553).

Orthosiphon Welwitschii *Rolfe* in *Bolet. Soc. Brot.* XI (1893) 88; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 576.

O. adornatus *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 176.

Le type n'a été trouvé que dans l'Angola.

— — var. **oblongifolius** [*Briq.*] *Th. et Héél. Dur.*

O. adornatus *Briq.* var. — *Briq.* l. c. (1894) 177; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 227.

1881 (R. Buettner). — IV : Lutete (Buett. 570).

HOSLUNDIA Vahl.

Hoslundia verticillata *Vahl* *Enum. pl.* I (1804) 213; *Benth.* in *DC. Prodr.* XII, 54; *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 30 [B. S. B. B. XXXVII, 75]; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 348; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 860; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 174 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 311; II (1908) 340.

H. opposita *Vahl* var. — *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1900) 377.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Schimp. : Pyn.). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XIII d : Romée (M. Laur.). — XVI : env. d'Albertville [Toa] (Hecq).

PLECTRANTHUS L'Hérit.

Plectranthus intrusus *Briq.* in *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, II (1901) 98 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 834].

1900 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.); Kisantu (Vanderyst).

Plectranthus miserabilis *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 180; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 227; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 405.

1881 (P. Pogge). — XVI : Mukenge (Pg. 1022).

Plectranthus phryxotrichus *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 21 [B. S. B. B. XXXVII, 66]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 129; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 407.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : la Lulanga (Dew. 862 d).

Plectranthus Schlechteri *Guerke* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 311 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12190).

SOLENOSTEMON Schumach. et Thonn.

Solenostemon monostachyus [*P. Beauv.*] *Briq.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 a (1897) 359 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 24 [B. S. B. B. XXXVII, 69]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 189; *De Wild.* Miss. Laurent (1901) 174.

Ocimum — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 60, t. 95, fig. 1.

S. ocimoides *Schumach. et Thonn.* var. — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 421.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Maydis (Vanderyst); env. de Léopoldville; Kimuenza (Dew.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eaia (M. Laur. 1943); Betutu (Braun.). — XII d : Kusumba (Schw.). — XV : Butala; Kondue; Lusambo (Ém. et M. Laur.).

— — var. **amplifrons** *Briq.* ex *Schinz* in B. Herb. Boiss. Sér. 2, VI (1906) 826.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens).

Solenostemon ocimoides *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 271; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 228; *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 22 [B. S. B. B. XXXVII, 67]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 420.

Colens africanus *Benth.* Labiat. (1832) 54 et in *DC.* Prodr. XII, 74.

Solenostemon — *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1891) 181, en obs.

1885 (R. Buettner). — II a : Bingila (Dup.). — VIII : Équateur (Buett.). — Ind. non cl. : Lone Island [Angola?] (Buett.).

AEOLANTHUS Mast.

Aeolanthus adenotrichus *Guerke* in *De Wild.* Étud. fl. Bas. et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

1891 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 377).

Aeolanthus Buchnerianus *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 187; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 392.

1881 (Max Buchner). — Haut-Congo [Baugo] (Buchn. 571).

Aeolanthus petasatus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 19 [B. S. B. B. XXXVII, 64]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 397.

1896 (G. Descamps). — XVI : Risobi (Desc.).

Aeolanthus Poggei *Guerke* in Engl. Jahrb. XXII (1895) 148; *De Wild.* et *Th. Dur.* Cens. pl. Congol. (1901) 45; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 397.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua vers 9 1/2° (Pg. 332).

Aeolanthus Pritzwitzianus *Guerke* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 383; *De Wild.* et *Th. Dur.* Cens. pl. Congol. (1901) 45; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 390.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcau Kiruuga (Goetz. et Prittw.),

COLEUS Lour.

Coleus bullulatus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 24 [B. S. B. B. XXXVII, 69]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 429.

Solenostemon — *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 180; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 227.

1876 (P. Pogge). — XV : la Haut-Lulua (Pg.).

Coleus Dewevrei *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 26 [B. S. B. B. XXXVII, 71]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1900) 190; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 428.

1896 (A. Dewèvre). — XIII : env. de Mutumbi (Dew. 1092 a).

Coleus Dupuisii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 25 [B. S. B. B. XXXVII, 90]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 51, t. 26; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 428.

1893 (P. Dupuis). — II a : forêts du Mayumbe (Dup.).

Coleus Eetveldeanus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 28 [B. S. B. B. XXXVII, 73]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 49, t. 25; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 442.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Coleus heterotrichus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 34 [B. S. B. B. XL, 40]; *De Wild.* Miss. Laurent (1908) 340.

1891 (F. Demeuse). — V : Bolobo (Dem. 1155). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1944).

Coleus membranaceus *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 183; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 28; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 442.

1881 (von Mechow). — VI : Cisacula (Mech. 554).

Coleus mirabilis *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 183; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 440.

Le type croît dans l'Angola.

— — var. **Poggeanus** *Briq.* l. c. 184; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 228.

1876 (P. Pogge). — XV : la Haut-Lulua, 9° 5 lat. S. (Pg.).

Coleus nervosus *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 185; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 437.

1882 (P. Pogge). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1034).

Coleus Poggeanus *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 182; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 228; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 438.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 364).

Coleus viridis *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 181; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 443.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 365).

ALVESIA Welw.

Alvesia rosmarinifolia *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 55, t. 19; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229; *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 83, t. 42; *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 50; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73, (1906) 312 et *Miss. Laurent* (1908) 339; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 378.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Luja; Pyn. 163); entre Léopoldville et Kimpoko (M. Laur. 653); Dolo (Schlt.); Kisantu (Gill.; Vanderyst); Sanda (Odd.); env. de Lula-Lumene (Hendr.); Sadi [Inkisi] (Cabra et Michel); Kisunga (Vanderyst); Boko (Pyn. 110). — VI : entre Tumba et Popokabaka (Cabra et Michel). — XV : entre Kabuluka et Kanda-Kanda (Leser. 231).

ANISOCHILUS Wall.

Anisochilus africanus *Bak.* ex *Scott Elliot* in Journ. Linn. Soc. XXX (1894) 94; *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 21

[B. S. B. B. XXXVII, 66]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 446; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 173. (1907) 339.

A. Engleri *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 190; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229.

1876 (P. Pogge). — Bas-Congo (But. in Gill. 2232); — V : marais du Stanley-Pool (Hens, B. 86); rég. de Lumene (Hendr. in Gill. 3290); Boko (Vanderyst, 313); Yindu (Vanderyst). — VI : rég. de Lusubi (Lescr. 41). — VII : la Flui (Ém. et M. Laur.). — XIII? : entre Nyangwe et Kimbundo (Pg. 1019). — XV : la Haut-Lulua, vers 9° 5 (Pg. 372).

PYCNOSTACHYS Hook.

***Pycnostachys congensis* Guerke** in B. Herb. Boiss. IV (1896) 819; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 380.

1891? (G. Descamps). — XV : Samba (Desc. 28); Lusambo (Desc. 27).

***Pycnostachys Descampsii* Briq.** in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 18 [B. S. B. B. XXXVII, 63]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 380.

1896 (G. Descamps). — XVI : Risobi (Desc.).

***Pycnostachys Goetzenii* Guerke** in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 885 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* A (1895) 135; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 385.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 98).

HYPTIS Jacq.

***Hyptis brevipes* Poit.** in *Annal. Mus. Paris*, VII (1806) 465; *Benth.* in *DC. Prodr.* XII, 107; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 447; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 16 [B. S. B. B. XXXVII, 61]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 190; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73, (1906) 311 et *Miss. Laurent* (1905) 173, (1908) 339.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Boma (Dew.); île près de Ponta da Lenha (Naum.). — II a : Bingila (Dup.); Temvo (Ém. et M. Laur.); Lianga-Jema (Cabra). — V : collines du Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.) Chenal (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Vanderyst). — VI : Kongo (Sap.). — VIII : env. d'Équateurville (Dew.); Coquilhatville; env. d'Eala (M. Laur.; Pyn.); Monsole (Huyghe et Ledoux). — XII b et c : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XII d : rég. des Mangbettu (Schw.).

— — var. ***elongata* De Wild. et Th. Dur.** Pl. Gilletianae II (1900) 40 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, Sér. 2, I, 40].

1899 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 271); Kisantu-Makela (Gill. 3461); Kisantu (Gill. 681). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.).

Hyptis pectinata [L.] *Poit.* in *Annal. Mus. Paris*, VII (1805) 474, t. 30; *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 16 [B. S. B. B. XXXVII, 61]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 191; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 418; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 173, (1906) 339; et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 311.

Nepeta — *L. Syst. nat.* ed. 10 (1759) 1076.

1870 (G. Schweinfurth). — I : Moanda (Gill.). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : marais du Stanley-Pool (Ilens); Dolo (Schlt.); Kinshassa (Ern. Dew.); M. Laur.). — XII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XII d : Kusumba (Schw.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : Djumba-Djumba [Bakusu]; Bonengue [Ikwaugula]; Kaiobo [Kasongo]; Katundula [Tanganika] (Dew.).

Hyptis spieigera *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* III (1789) 185; *Benth.* in *DC. Prodr.* XII, 87; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 230; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 17 [B. S. B. B. XXXVII, 62]; *De Wild.* et *Th. Dur.* et Reliq. Dewevr. (1901) 191; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 448; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1905) 73; *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1903) 16-21 et *Miss. Laurent* (1908) 339.

1870 (G. Schweinfurth). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : env. de Léopoldville (Schlt.; Gill.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.); Monsole (Huyghe et Ledoux). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XII c : env. d'Amadis [cult.] (Ser.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XVI : Toa (Desc.).

MENTHA L.

Mentha sylvestris *L.* *Sp. pl. ed.* 2 (1762) 804; *Benth.* in *DC. Prodr.* XII, 166; *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II, 187; *Rehb.* *Pl. crit.* X, t. 982-984; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 451.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Katinga (Verd.).

LEONOTIS R. Br.

Leonotis africana [*P. Beauv.*] *Th. et Hél. Dur.*

Phlomis — *P. Beauv.* *Fl. d'Oware*, II (1807) 82, t. 111.

L. pallida *Benth.* *Labiata.* (1832) 619 et in *DC. Prodr.* XII, 535; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 491; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 338.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 739). — XII c : env. d'Amadis (Ser. 209).

Leonotis Leonurus [L.] R. Br. in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, III (1814) 412; *Benth.* in DC. Prodr. XII, 536; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 492.

Phlomis — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 587; Bot. Mag. (1800) t. 478.

Le type est indiqué dans l'Afrique trop. or.

— — var. **vestita** Briq. in Engl. Jahrb. XIX (1894) 194; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 230.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 360).

Leonotis nepetaefolia [L.] R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 504; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 14 [B. S. B. B. XXXVII, 59]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 191; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 491; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 311; II (1908) 338.

Phlomis — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 586.

1888 Fr. Hens). — II : brousse de Boma. — Nom vern. : **Songo-Songo** (Dew.). — II a : Tshia (Dup.). — IV : Lukungu (Hens); Kitobola (Coll.?). Bauza-Putu. — Nom vern. : **Musonga-Songa** (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Kinselele** (Sap.). — VII : Kiri (Em. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville; Eala (M. Laur.). — IX : Bobangi (Em. et M. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XII c : entre Niangara et Gombari; env. d'Amadis (Ser.). — XIII a : Romée (M. Laur.). — XIII d : env. de Lusanga (Dew.). — XVI : Bunkeya; Toa (Desc.).

LEUCAS R. Br. (1)

Leucas Descampsii Briq. in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 14 [B. S. B. B. XXXVII, 59]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 485.

1896 (G. Descamps). — XVI : Moliro (Desc.).

ELSHOLTZIA Willd.

Elsholtzia Schimperii Hochst. ex *Walke* in *Linnaea*, XXXVII (1871-1873) 325; *Briq.* in B. Herb. Boiss. II (1894) 133; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 454; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 224.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 488).

(1) Le **Leucas Poggeana** Briq. [in Engl. Jahrb. XIX (1894) 193; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 470] trouvé au bord de la Lulua par Pogge [n. 1122], ne serait, d'après M. Gnerke [in Engl. Jahrb. XXII (1893) 132], qu'une forme pathologique de l'**Hyptis brevipes** Poit.

SCUTELLARIA L.

Scutellaria Debeerstii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 12 [B. S. B. B. XXXVII, 57]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 93, t. 47, fig. 1-7; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 462.
1894 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb. 42).

Scutellaria polyadena *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 11; X (1901) 29 [B. S. B. B. XXXVII, 56; XL, 35]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 93, t. 47, fig. 8-10; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 462.
1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb. 96).

TINNAEA Kotschy et Peyr.

Tinnaea platyphylla *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 194; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 230; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 498.
1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba, 8° 5 lat. S. (Pg. 346).

MONOCHLAMYDEAE.

NYCTAGINACEAE

MIRABILIS L.

Mirabilis Jalapa *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 177; *Bot. Mag.* (1797) t. 371; *Choisy* in *DC.* Prodr. XIII², 427; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 174; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 41 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 41] et *Reliq.* Dewevr. (1901) 191.
Nyctago — *DC.* Fl. Franç. III (1825) 425; *Spach* Hist. des végét. [Atlas] t. 146.
1895? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Dew.).

BOERHAAVIA L.

Boerhaavia ascendens *Willd.* Sp. pl. I (1797) 19; *Choisy* in *DC.* Prodr. XIII², 451; *Ficalho* Pl. Uteis, 242; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 882; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 53; II (1900) 51; Pl. Thonnerianae (1900) 14 et *Reliq.* Dewevr. (1901) 243; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 243.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — II : Sisia (Dem.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu; env. de Dembo (Gill); env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.); Maydis (Vanderyst). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (Pyn.); Isaka (Ém. et M. Laur.). — XII c : entre Zobia et Buta (Ser.). — XV : Lac Foa (Lescr.).

***Boerhaavia paniculata** Rich. in Act. Soc. hist. nat. Paris, I (1792) 105; *Choisy* in DC. Prodr. XIII², 450; *Griseb.* Fl. Brit. West-Ind. 69; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 231.

1885 (R. Buettner). — VIII : Équateurville (Buett.).

Boerhaavia plumbaginea Cav. Icon. et descr. pl. II (1793) 7, t. 112; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 883; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 192; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 121, (1906) 241.

B. dichotoma Vahl Enum. pl. I (1804) 290; *Choisy* in DC. Prodr. XIII², 454.

1895 (G. Descamps). — II : Zambezi (Desc.). — XVI : Pweto (Dew.); Duela (Desc.).

Boerhaavia repens L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 3; *Choisy* in DC. Prodr. XIII², 453; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 882; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 51.

B. diffusa L. l. c. ed. 1 (1753) 3; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 121, (1906) 240.

1893 (G. Descamps). — XVI : Moliro; Toa (Desc.); Masange [Haut-Marungu] (Deb.).

BOUGAINVILLAEA Juss.

***Bougainvillaea spectabilis** Willd. Sp. pl. II (1800) 348; *Choisy* in DC. Prodr. XIII², 437; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 231; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 192; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 121, (1906) 241; II (1908) 243.

Josephia augusta Vell. Fl. Flumin. (1825) 154 et IV (1826) t. 16.

1893 (P. Dupuis). — I : Banana (Dup.). — V : Léopoldville (Ém. Duch.); Kisautu (Gill.). — VIII : cult. à Eala (M. Laur.).

AMARANTACEAE

CELOSIA L. (1)

Celosia argentea L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 205; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1767; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 243; *Boiss.* Fl. Or. IV, 987; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 231; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 51 et Reliq. Dewevr. (1901) 192; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 30; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 885; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 28; II (1906) 116 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 124.

1881 (P. Pogge). — Bas-Congo (Hens). — V : Tampa (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.); Tumba (Luja). — VI : entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel). — VIII : Coquilhatville (Schlt.; Ém. Laur.); Eala. — Nom vern. : **Bosambi** (M. Laur.). — IX : Nouvelle-Anvers (Duvivier); eu aval de Mobeka (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Boja; Stanleyville (Ém. Duch.). — XIII d : Nyangwe (Dem.). — XV : env. de Djoko-Pundo (Lescr.); Mukenge (Pg.); Mange (Ém. et M. Laur.); Tshitadi (Lescr.). — XVI : Lukafu (Verd.); Toa (Desc.). — Ind. non cl. : Durga (Ser.); Kisimeme (Pg.). — Noms vern. : **Ikonana** [Ikwangula]; **Nomana-Mana** [Kasougo].

Celosia laxa *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 141; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 437; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 232; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. XXXVI², 88]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 885; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 27, (1906) 239; II (1907) 125 et Miss. Laurent (1905) 81.

C. loandensis *Bak.* in *Kew Bull.* (1897) 277.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.): AC. dans tout le Bas-Congo (Dup.) — II : Zambi (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Cheual [Leo-Kwamouth] (Ém. et M. Laur.); Kimueza; Kisantu (Gill.); env. de Dembo (Gill.). — VI : Mabibi (Sap.). — IX : pays des Bangala (Hens; Dem.); Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XII : Congo bor.-or. (Ser.). — XV : le Sankuru (Ém. et M. Laur.); Kanda-Kanda (Gent.); Ibaka (Ém. et M. Laur.).

Celosia leptostachya *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 494; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 232.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens).

Celosia trigyna L. Mant. pl. II (1771) 212; *Jacq.* Hort. Vindob. III, 12, t. 15; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 241; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I,

(1) A. Dewèvre a récolté, dans l'enclave de Kabinda, à Landana, un *Celosia* nouveau qui lui a été dédié [Conf. *Celosia Dewevreana* *Schinz* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1900) 10 [B. S. B. XXXIX², 102].

884; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 232; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI², 85]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 30; Miss. Laurent (1905) 81 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 27, (1906) 239; II (1907) 125.

1885 (R. Buettner). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Banza-puta (Dem.); Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Buett.); Léopoldville et env. (Luja); env. de Kwamouth (But.); Suata (Buett.); Sabuka. — Nom vern. : **Tangana** (Èm. Laur.); env. de Dembo (Gill.). — VII : Kutu (Èm. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Èm. et M. Laur.); le Haut-Lopori (Biel.). — XIII a : env. de Stanleyville (Èm. Duch.). — XIV : Kisimeme (Pg.). — XV : Lusambo (Èm. Laur.); Lac Fwa (Lescr.); Mukenge (Pg.); Bena-Dibele (Luja); Mokole [Lubi] (Lescr.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kananana** (Verd.); le Lualaba (Desc.); env. d'Albertville [Toa] (Hecq.).

DIGERA Forsk.

Digera arvensis Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 65; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 717; *Griff.* Icon. pl. Asiat. I. 527; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 717; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 232.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : Lisha (Hens).

AMARANTUS L.

Amarantus caudatus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 990; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 255; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 719; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 233; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 13 et Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 81 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 239.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Lukolela (Èm. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Èm. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dew.). — IX a : Mombanza (Thonn.). — XII c : Nala Van Ryss.). — XV : Bukila (Èm. et M. Laur.). — Noms vern. : **Bionuda-Ipeba** [Bangala]; **Ipea** [Bashensi]; **Ipeba** [Bolondo].

Amarantus paniculatus L. Sp. pl. ed. 2 (1763) 1406; *Willd.* Monog. Amar. 32, t. 4, fig. 2; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 257; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 718; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI², 85]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 53.

A. speciosus Sims in Bot. Mag. (1821) t. 2227.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — Ind. non cl. : brousse des bords du Lounam (Èm. Laur.).

Amarantus spinosus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 991; *Willd.* Monog. Amar. t. 4, fig. 8; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 260; *Wight* Icon. pl.

Ind. or. II, t. 513; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 718; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Miss. Laurent (1904) 81.

1896. (A. Dewèvre). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — Noms vern. : **Kitele** [Kasongo]; **Kibano-Bango** [Tanganika] (Dew.).

Amarantus viridis L. Sp. pl. ed. II (1763) 1405; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 720; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 233; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI², 85]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 81.

Euxolus — *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII² (1849) 274.

Chenopodium caudatum Jacq. Icon. pl. rar. II (1786-1793) t. 344.

Euxolus — *Moq.* in *DC.* l. c. XIII⁴ (1849) 274; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1773.

1884 (R. Buettner). — Bas-Congo, CC. sur les bords du fleuve (Ém. Laur.). — II Boma. — Nom vern. : **Mocombe** (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — IV : Vungu (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Lulanga ; Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Luufuudi (Dem.).

CYATHULA Lour.

Cyathula prostrata [L.] *Bl.* Bijdr. Fl. Nederl. Ind. II (1825) 549; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 226; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 233; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 194; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 28 et Miss. Laurent (1905) 81.

Achyranthes — L. Sp. pl. ed. 2 (1762) 296.

Desmochaeta — *DC.* Cat. Hort. Monspel. (1813) 102; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 733; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 890.

1888 (Fr. Hens). — V : euv. de Léopoldville (Luja) ; Lukungu ; Lutete (Hens). — V : Kimuenza ; Kisantu (Gill.). — VIII : Equateurville [Wangata]. — Nom vern. : **Ponluka** (Dew.). — IX : Bangala (Hens). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Kondue ; Bukila (Ém. et M. Laur.).

PUPALIA Juss.

Pupalia lappacea [L.] *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII² (1849) 331; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 724; *Gilg.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 174; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI¹, 85]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 178.

Achyranthes — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 204.

Pupal — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 891.

1895 (P. Dupuis). — I : brousse de Banana (Dew.). — II : Boma (Gill.). — II a : Bingila (Dup.). — XVI : Lukafu (Verd.).

MECHOWIA Schinz

Mechowia grandiflora Schinz in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* III, 1 (1893) 110; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI¹, 85].

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

AERUA Forsk.

Aerua lanata [L.] Juss. in *Annal. Mus. Paris*, XI (1808) 131; *Mog.* in *DC. Prodr.* XIII², 226; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* IV, 728; *Wight Icon. pl. Ind. or.* II, t. 723; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 234; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 194; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 239; II (1907) 125.

Achyranthes — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 296.

1890 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Banza-Puta (Dem.); Kito-bola (Pyn.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Equateur (Pyn.). — XI : Basoko (Dew.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XVI : Toa (Desc.). — Noms vern. : *Karikete* [Kasongo]; *Katingoko* [Tangauika] (Dew.).

ACHYRANTHES L.

Achyranthes angustifolia Benth. in *Hook. Niger Fl.* (1849) 492; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 234; *Gilg in Engl. Pf. Ost-Afr.* 174; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 52 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 194.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Goma (Hens); Kisantu; Kimunza (Gill. 2243). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.).

Achyranthes aspera L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) 204; *Wight Icon. pl. Ind. or.* V, t. 1780; *Mog. in DC. Prodr.* XIII², 314; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* IV, 730; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 234; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI¹, 85]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 194; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 125.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — IV : Kito-bola (Pyn.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.). — VI : le Kwilu (Sap.). — XIV : Kalamu (Coll. ?). — XVI : Toa (Desc.). — Noms veru. : *Kolokasi* [Kalemba-Lemba] (Sap.); *Konko-Koso* [Kwilu] (Sap.).

Achyranthes rubro-lutea Lopriore in *Engl. Jahrb.* XXVII (1899) 57.

1896 (G. Descamps). — XVI : Lumbarazi [Lualaba]; Pweto (Desc.).

PANDIAKA Moq.

Pandiaka Heudelotii [Moq.] Benth. et Hook. f. Gen. pl. III (1880) 36; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 234.

Achyranthes — Moq. in DC. Prodr. XIII^a (1849) 310.

1876 (P. Pogge). — XIV : Kisimeme (Pg.). — XV : Mukeuge (Pg. 226).

TELANTHERA R. Br.

Telanthera maritima [St-Hil.] Moq. in DC. Prodr. XIII^a (1849) 364; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 27; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V^a, 171.

Alternanthera — *St-Hil.* Voy. Brésil, II (1833) 437; *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 1 a (1903) 15; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 195; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 240.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.); Banana (Dew.; Wilw.).

ALTERNANTHERA Forsk.

Alternanthera repens [L.] Steud. Nomencl. bot. ed. 1, 1 (1821) 34; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 235; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 42; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 125.

Achyranthes — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 205.

Alternanthera Achyrautha R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 358; Moq. in DC. Prodr. XIII^a, 358; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V^a, 183, t. 55.

Alt. echinata Sm. in *Rees* Cyclop. Suppl. (1818) 10; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 896.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — IV : Lutete (Hens). — V : Léopoldville (M. Laur.); Kisantu (Gill.).

Alternanthera sessilis [L.] R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 417; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 627; Moq. in DC. Prodr. XIII^a, 357; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 731; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 235; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 195; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 29 et *Miss. Laurent* (1904) 82.

Gomphrena — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 300.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool; Tamo (Hens); Kisantu (Gill.). — IX : Mobeka (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Ind. non cl. : Lonesland [Angola] (Buett.). — Noms vern. : **Rakaba** [Bangala]; **Lokili** [Équateur].

GOMPHRENA L.

Gomphrena globosa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 224; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII, 409; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V¹, 218; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1784; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 53 et Pl. Gilletianae, I (1900) 42 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 42].

1896 (Ém. Laurent). — V : Kisautu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Ém. Laur.).

IRESINE L.

Iresine vermicularis [L.] *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII² (1849) 340; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V¹, 255; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 195; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 27.

Gomphrena — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 224.

Philoxerus — R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 410; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 65, t. 98, fig. 1.

1893 (P. Dupuis). — I : Banana (Dup.; Dew.).

CHENOPODIACEAE

CHENOPODIUM L.

Chenopodium ambrosioides L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 219; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1786; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 72; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V¹, 145; *Ficalho* Pl. Uteis, 243; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 898; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 53 et Reliq. Dewevr. (1901) 195; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1905) 80 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens); Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Kisautu; Dembo (Gill.). — VI : Tumba-Mani (Cabra et Michel). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XIII c : Pontbierville [Wabundu] (Dew.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Noms vern. : *Lungue* [Kasongo]; *Kabonguele*; *Vuma* [Tanganika] (Dew.).

**Chenopodium foetidum* *Schrad.* in *Mag. Ges. Natur. Freunde Berlin* (1808) 79; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 76; *Engl.* Pf. Ost-Afr. 171; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 196.

C. graveolens *Lag. et Rodr.* in *Annal. Cienc. Nat.* V (1802) 70, t. 5.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : cult. à Elungu (Dew.).

**Chenopodium opulifolium* *Schrad.* in *DC. Fl. Française*, V (1805) 372; *Moq.* in *DC. Prodr.* XIII^a, 67; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* V, 3; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 171; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 196.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : cult. à Nyangwe (Dew.). — Nom vern. : **Muisambague** [Tanganika] (Dew.).

OBS. — Cette espèce est figurée dans le *Bot. Parisiense* de Vaillant, t. 7, fig. 1.

BASELLA L.

Basella alba L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) 272; *Moq.* in *DC. Prodr.* XIII^a, 223; *Wight Icon. pl. Ind. or. III*, t. 896; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 196; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 233 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 244.

B. rubra L. l. c. ed. 1 (1753) 272.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Ikenge; Inkongo (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — Noms vern. : **Mantiri** [Lulanga]; **Krenda-Nameceka** [Kasongo].

PHYTOLACCACEAE

MOHLANA Mart.

Mohlana latifolia [*Lam.*] *Moq.* in *DC. Prodr.* XIII^a (1849) 16; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 15; *Pl. Thonnerianae* (1900) 14 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 196; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 120; II (1907) 34 et *Miss. Laurent*, I (1906) 233; II (1908) 244.

Rivina — *Lam. Ill. gener. Encycl.* 1 (1792) 324.

Hillieria elastica *Vell. Fl. Flumin.* (1825) 47; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 900.

R. inaequalis *Hook. Icon. pl. II* (1837) t. 130.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Lukolela (Dew.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (Pyn.; M. Laur.); Losombo [Lulauga]. — Nom vern. : **Montutu** (Dew.); Bala-Lundji. — Nom vern. : **Bompoto** (Pyn.). — IX a : Mombauza (Thonn.).

PHYTOLACCA L.

Phytolacca abyssinica *Hoffm.* in *Comm. Gott.* XII (1796) 25, t. 2; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 175; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 80 [B. S. B. XXXVII, 125]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 196; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 31; *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 34 et *Miss. Laurent* (1906) 233.

Pircunia abyssinica Moq. in DC. Prodr. XIII¹ (1849) 30.

Phyt. dodecandra L'Herit. Stirp. nov. (1789) 113, t. 69; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 901.

1896 (A. Dewèvre). — II a : route de Tshoa à Tshia (Dew.). — IV : Nord-Manyanga (Cabra et Michl.). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Tori** (Gill.); env. de Sanda (Old.); Dembo (Gill.). — VI : route de Kikwit à Boala (Leser.); Madibi (Sap.). — VII : rég. du Lac Léopold II. — Nom vern. : **Itu** (Body); Kiri (M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); Botacom [Ikelemba] (M. Laur.); Bombimba (M. Laur.). — IX : Upoto; Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XII a : Niangara (Ser.). — XIII a : Romée (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : le Kasai (Dem.); le Sankuru (Sap.). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Musenge** (Verd.).

P. abyssinica var. **macrophylla** De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae (1900) 15.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 33).

Phytolacca stricta Hoffm. in Comm. Gott. XII (1796) 27, t. 3; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 121.

Pircunia — Moq. in DC. Prodr. XIII¹ (1849) 30.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kimuenza (Gill. 2165).

POLYGONACEAE.

POLYGONUM L.

Polygonum acuminatum Kunth in H. et B. Nov. gen. et sp. pl.

II (1817) 178; Meisn. in DC. Prodr. XIV, 114 et in Mart. Fl. Brasil. V¹, 14, t. 4; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 235.

1885 (R. Buettner). — VI : Kingunshi (Buett.).

Polygonum barbatum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 518; Wight Icon. pl.

Ind. or. V, t. 1798; Meisn. in DC. Prodr. XIV, 104; Dammer in Engl. Pfl. Ost-Afr. 169; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 42 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 42]; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228; II (1908) 242.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill.); Lukolela (Pyn.). — VIII : Eala (Pyn.).

Polygonum lanigerum R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 419;

Meisn. in DC. Prodr. XIV, 117; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 35; Dammer in Engl. Pfl. Ost-Afr. 170; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 904; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 120.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — VIII : env. d'Eala (Ém. Laur.).

P. lanigerum var. **africanum** *Meisn.* l. c. XIV (1856) 117; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 170; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 904; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 53 et Reliq. Dewevr. (1901) 197; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 80 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 33.

P. lanigerum *Meisn.* in *Linnaea*, XIV (1840) 85.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew.). — V : Léopoldville (M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — IX : Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).

Polygonum senegalense *Meisn.* Monog. gen. Polyg. prodr. (1826) 54 et in *DC. Prodr.* XIV, 123; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 170; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 236; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 904; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 178 et Miss. Laurent (1905) 84.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Ém. et M. Laur.); Ponta da Leuba (Naum.). — III : env. de Matadi (Jos. Duch.). — XVI : Albertville; (Hecq); Lukafu. — Nom vern. : **Lobwe** (Verd.). — Ind. non cl. : Lone-Island [Angola?] (Buett.).

Polygonum serrulatum *Lag.* Gen. et sp. pl. nov. (1816) 14; *Meisn.* in *DC. Prodr.* XIV, 110; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 169; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 53 et Reliq. Dewevr. (1901) 197; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 238; II (1908) 243.

1895 (Gust. Debeerst). — II a : Shiuganga; bord du Tshaf à Zobe (Dew.). — V : Kisantu et env. C. (Gill.); Dembo; Kinkosi (Vanderyst). — XVI : rég. du Tanganika (Deb.).

Polygonum tomentosum *Willd.* Sp. pl. II (1799) 219; *Meisn.* in *DC. Prodr.* XIV, 124; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 38; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 176; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 905; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 43 [B Herb. Boiss. Sér. 2, I, 43]; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 80 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228; II (1907) 33, (1908) 243.

1900 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Lukolela (Pyn.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikeuge (Huyghe). — XII d : route de Vankerhovenville à Faradje (Ser.). — XV : entre Lubue et Kanda-Kanda (Lescr.).

RUMEX L.

Rumex abyssinicus Jacq. Hort. Vindob. III (1776) 48, t. 93; *Campd.* Monog. Rum. 67, 108, t. 3; *Meisn.* in DC. Prodr. XIV, 68; *Dammer* in Engl. Pl. Ost-Afr. 169; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1900) 95 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 835]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 905; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 79 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 242.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Ikenge (Ém. Laur.); Eala (M. Laur. : Pyn.).

BRUNNICHIA Banks.

Brunnichia africana Welw. in Trans. Linn. Soc. XXVII (1872) 64; *Hook.* Icon. pl. XIX (1881) 21, t. 1328; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 905; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 197; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 25; II (1908) 243.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Eala et env. (M. Laur. 732; 1967; Pyn. 543, 1380, 1400); le Haut-Lopori (Biel.); Mondjo (Pyn. 318). — IX : Bumba (Pyn.).

— — var. **glabra** *Dammer* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 230.

1900 (J. Krekels). — IX : Umangi (Krek.).

Brunnichia congoensis *Dammer* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 357.

B. africana Welw. var. *erecta* *Buett.* in Mitt. Afrik. Gesellsch. (1888) 257; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 236.

1885 (R. Buettner). — Entre Équateurville [VIII] et Lukolela [V] (Buett.).

PODOSTEMACEAE

TRISTICHA Thou.

Tristicha alternifolia [*Willd.*] *Thou.* ex *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 22; *Tul.* in Annal. sci. nat. Sér. 2, XI (1849) 111 et Monog. Podost. 180; *Wedd.* in DC. Prodr. XVII, 45; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 16.

Dufourea — *Willd.* in Ges. Nat. Freunde Mag. Berlin, VI (1814) 63.

1895 (A. Dewèvre). — XIII d : Lamba [Kasongo] (Dew. 997); rapides d'Ambani près Nyangwe (Dew. 902).

DICRAEA Thou.

Dicraea Warmingii *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 135; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 236.

1881? (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1379).

DICRAEANTHUS Engl.

Dicraeanthus africanus *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXVIII (1905) 96 [fig. 1, p. 95].

1882 (P. Pogge). — XV : ile Mopinga [la Lulua] (Pg. 1431).

LEIOCARPODICRAEA Engl.

Leiocarpodicraea quangensis [*Engl.*] *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXVIII (1905) 98.

Dicraea — *Engl.* l. c. XX (1894) 134; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 236.

1885 (E. Teusz). — VI : chutes Bismarck sur le Kwango (Teusz).

HYDROSTACHYS Thou.

Hydrostachys Bismarekii *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 137; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 236.

1880 (E. Teusz). — VI : chutes Bismarck sur le Kwango (Teusz in von Mechow. 506).

CYTINACEAE

PILOSTYLES Guill.

Pilostyles aethiopica *Welw.* in *Trans. Linn. Soc.* XXVII (1869) 67, t. 22; *Hook. f.* in *DC. Prodr.* XVII, 114; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I.*, 908; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 31.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 532).

ARISTOLOCHIACEAE

ARISTOLOCHIA L.

Aristolochia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo*, III (1899) 38 [B. S. B. B. XXXVIII², 46]; *Ill. fl. Cgo* (1899) 107, t. 54 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 197.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew. 201).

Aristolochia Schweinfurthii *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1898) 492.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3507).

Aristolochia triactina *Hook. f.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1865) 186; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 53; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 379.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Gumbumi (M. Laur. 632); Bombaie (Ém. et M. Laur.).

PIPERACEAE

PIPER L.

Piper guineense *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 19; *C. DC.* in *DC. Prodr.* XVI¹, 343; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 237; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 912; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 198; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 68 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 236.

Cubeba Clusii *Miq.* *Syst. Piperac.* (1844) 304.

Piper — *C. DC.* in *DC. Prodr.* XVI¹ (1869) 340; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 237.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : Sanda (De Brouw.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. Laur.). — XIII d : Kasongo (Dew.). — XV : le Sankuru; le Kasai (Dem.); Pinda (Cabra et Michel); le Lomami (Dem.). — Noms vern. : *Keleketon* [Ikwangula]; *Geto* [Kasongo]; *Monkengue* [Tanganika] (Dew.).

— — var. **Gilletii** *C. DC.* ex *De Wild.* in *Rev. cult. colon.* II (1901) 133; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, II (1901) 95 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 835].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1215). — Ind. non cl. : crête entre Nindikwilu et le Congo [au N. du Kaongo] (Cabra et Michel).

— — var. **Thomeanum** *C. DC.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 198; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 31.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Dew.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — Nom vern. : *Bopamputi*. — Ind. non cl. : crête entre Nindi et le Congo [au N. du Kaongo (Cabra et Michel)].

P. guineense var. **velutinum** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 30.

1904 (Éd. Lescreauwaet). — VI : Luauu (Lescr. 75). — XII a : route de Buta à Biuaa (Ser. 125).

Piper Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 229.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Injolo. — Nom vern. : **Boloko** (Lamb. in M. Laur. 918). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.).

Piper subpeltatum *Willd.* Sp. pl. I (1798) 166; *C. DC.* in *DC.* Prodr. XVI¹, 333; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 95; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 199; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 37; Miss. Laurent (1905) 68 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 240.

Pothomorphe — *Miq.* Syst. Piperac. (1843-1844) 213 et Illustr. Piperac. 29, t. 26; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1925.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.; Dew.). — V : Lukolela (Hens); Kisanu (Gill.). — Nom vern. : **Kame-Nene**. — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Baugala (Hens). — XIII d : Kasongo (Dew.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (Sap.). — XVI : env. de Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Kame-Nene** [Lukafu] (Verd.); **Lokuku** [Ikwaugula]; **Nomlo-Nomlo** [Bakusu]; **Ilotça** [Kasongo] (Dew.); **Dolombo** [Sankuru] (Sap.).

— — var. **parvifolium** *C. DC.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 54 et Reliq. Dewevr. (1901) 199.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 564). — V : Kisanu (Gill.). — VIII : env. d'Équatenville (Dew.).

Piper umbellatum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 30; *Jacq.* Icon. pl. rar. II, t. 216; *Descourtilz* Fl. des Antilles, I, 177, t. 37; *C. DC.* in *DC.* Prodr. XVI¹, 332; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 237.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Hens, 355).

***Piper unguiculatum** *Ruiz* et *Pav.* Fl. Peruv. et Chil. I (1794) 34, t. 37, fig. B; *C. DC.* in *DC.* Prodr., XVI¹, 249; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 230.

P. glaucescens *Jacq.* Eclog. pl. (1814-1816) t. 76.

1903 (Ém. et Marc. Laurent) — VI : mission de Wumbali (Ém. et M. Laur.). — Espèce probabl. introd.

PEPEROMIA R. et P.

Peperomia fernandopoana C. DC. in DC. Prodr. XVI¹ (1869) 397; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 913; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 119.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

MYRISTICACEAE

MYRISTICA L.

Myristica angolensis Welw. Synop. expl. (1862) 51; *Ficalho* Pl. Uteis, 246; *Christy* New comm. Pl. (1885) 26; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 913.

Pycnanthus Kombo Warb. var. — Warb. [Monog. Myrist.] in Nov. Act. Acad. Nat. Curios. LXVIII (1897) 257.

M. Kombo *Baill.* var. — *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 85.

1900 (J. Gillet). — II a : Benza-Masola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Bosenge** [Équateur]; **Elumba** (Ém. et M. Laur.).

LAURACEAE (1)

CASSYTHA L.

Cassytha filiformis L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 35; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1847; *Hook.* Exot. Fl. t. 167; *Meisn.* in DC. Prodr. XV¹, 255; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 188; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 238; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 116 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1906) 244.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sta.). — I : Moanda (Vanderyst). — V : env. de Lemfu (But.); Kisantu (Gill.).

— var. **guineensis** [*Schumach. et Thonn.*] *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 86.

C. guineensis *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 199.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.).

(1) Le *Persea gratissima* Gaertn. de l'Amérique trop. se rencontre cultivé ou échappé des cultures à Kisantu [V] (Gill.) et à Eala [VIII] (Ém. et M. Laur.) [Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 379].

PROTEACEAE

PROTEA L.

Protea angolensis *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 588; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI^a, 80].

Leucadendron — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 917; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 238.

1895 (Gust. Debeerst). — V : Kisantu-Makela (Van Houtte in Gill. 3462). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Protea ferruginea *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1891-1892) 197 [nom. tant.].

1880† (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1415).

Protea Lemairei *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 30.

1899 (Ch. Lemaire). — XVI : plateau entre le Nyassa et le Tanganika (Lem.) : Lukafu (Verd.).

Protea Poggei *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1891-1892) 197 [nom. tant.].

1880† (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 413).

FAUREA Harv.

Faurea saligna *Harv.* in Hook. Lond. Journ. of Bot. VI (1847) 373, t. 15 et Cat. Welw. Pl. I, 924; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 164; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

THYMELAEACEAE

GNIDIA L.

Gnidia apiculata *Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 263.

G. involucrata *Steud.* var. — *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 143.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Gnidia Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 170.

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 1989).

Gnidia flava *Lindl. ex Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, I (1840) 697; *Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 258; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 238.

1891 (G. Descamps). — XIII d : Kasongo (Desc.). — XVI : le Katanga (Desc.).

Gnidia katangensis *Gilg et A. Dewèvre* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 276; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 238.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : Katete [Katanga] (Corn.); Kitope (Desc.).

Gnidia Oliveriana *Engl. et Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 262; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 239.

Lasiosiphon Oliveri *Vatke ex Engl. et Gilg.* l. c. XIX (1894) 264, in syn.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1414).

Gnidia Poggei *Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 259; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 239.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg.).

Gnidia rubrocincta *Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 259; *Th. Dur. et Schinz.* Étud. fl. Cgo (1896) 259.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg.).

DICRANOLEPIS Planch.

Dicranolepis Baertsiana *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 54.

1899 (Alph. Cabra). — Ind. non cl. : forêt de Kabombo (Cabra). — Nom vern. : *Tesi* (Cabra).

Obs. — La Mission Cabra a trouvé une espèce fort voisine de celle-ci dans la forêt d'Inteba [Conf. *De Wild. et Th. Dur.* l. c. in obs.].

Dicranolepis convalliodora *Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 271; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 239; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 55 et Reliq. Dewevr. (1901) 199; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1904) 170.

1881 (P. Pogge). — Congo (Dem.). — V : env. de Lukolela (Dew. 1802); Sanda (Odd. in Gill. 3013). — XV : Mukenge (Pg. 1408).

Dicranolepis Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 37 [B. S. B. B. XXXVIII², 114]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 29, t. 10.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Boyangi (Thonn. 62).

PEDDIEA Harv

Peddiea longipedicellata Gilg in Engl. Jahrb. XIX (1894) 256 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 283.

Le type est indiqué dans le Nyassaland.

— — var. *multiflora* De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 94.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 565).

LORANTHACEAE

LORANTHUS L.

Loranthus alatus De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 175.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : *Kakobwoi-Kobwoi* (Verd. 498).

Loranthus Albizziae De Wild. Miss. Laurent (1905) 74.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.).

Loranthus Buchneri Engl. in Engl. Jahrb. XX (1894) 114, t. 2, fig. E; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 239.

1880 (Max Buchner). — I : Banana (Buchn. 506).

Loranthus Butayei De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 28.

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2248). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill.).

Loranthus capitatus [Spreng.] Engl. in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 131; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126].

Exostemma — *Spreng.* Neue Entdeck. II (1821) 143.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

— — var. *latifolius* Engl. ex *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126]; *De Wild* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 96 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 836] et Reliq.

? *Loranthus constrictiflorus* Engl. in Engl. Jahrb. XX (1894) 119, t. 3, fig. a; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 240.

1880 (P. Pogge). — Ind. non cl. : Bolama (Angola?) (Pg. 1322).

- Dewevr. (1901) 200; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 75 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 237; II (1907) 124.
- 1895 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Gill. 3618). — II a : Temvo; la Lukula (Ém. et M. Laur.). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Léopoldville (Dew. 479; M. Laur. 693); Kisantu (Gill. 1238; M. Laur. 404). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Malepie; Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Pyn. 405). — XV : Mushenge (Lescr. 388).
- Loranthus Cornetii** A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 106 et XXXIV² (1895) 92; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 240.
- 1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).
- Loranthus crassicaulis** Engl. in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 7 [B. S. B. B. XXXIX², 30]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 200; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 29.
- 1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Shinganga (Dew. 1278). — V : rég. de Kiumenza (Gill. 2036).
- Loranthus Demeusei** Engl. in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 6 [B. S. B. B. XXXVII², 29].
- 1891 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dem. 355).
- Loranthus Descampsii** Engl. in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachr. zum II-IV (1897) 132 [nom. tant.]; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 2 [B. S. B. B. XXXIX², 25].
- 1891 (G. Descamps). — Ind. non cl. : le Lomami, 8° 30 (Desc.).
- Loranthus discolor** Engl. in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachr. zum II-IV (1897) 131 [nom. tant.]; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 3 [B. S. B. B. XXXIX², 26]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 53; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 75.
- 1891 (Ém. Laurent). — V : le Stanley-Pool; route des Caravanes (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).
- Loranthus Durandii** Engl. in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 4 [B. S. B. B. XXXIX², 27]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 201; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 75.
- 1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala (M. Laur. 51, 203); Basankusu. — Nom vern. : Mpoi (Dew. 775 a : entre Lulanga [VIII] et Bangala [IX] (Dew. 858).
- Loranthus elongatus** *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 87, t. 34 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 124.
- 1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Irebu (M. Laur. 658). — XV : Bulebu (Ém. et M. Laur.).

Loranthus irebuensis *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 76, t. 35.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.).

Loranthus Kimuenzae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 29, (1906) 237, t. 54.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1665).

Loranthus kisantuensis *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 43 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 43].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 67).

Loranthus Laurentii *Engl.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 132 [nom. tant.]; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 3 [B. S. B. B. XXXIX², 26]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 54; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 77 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 237; II (1907) 124.

1896 (Ém. Laurent). — V : env. de Kisantu (Gill.); Sanda (Odd. in Gill. 384). — VIII : env. d'Eala (Ém. Laur. 1189); Bombinba (M. Laur. 1587). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XII : Guago (Ser. 278). — XII c : env. d'Amadis (Ser. 340).

Loranthus Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 55.

1899 (Éd. Luja). — XV : Bena-Dibele [Kasai] (Luja).

Loranthus luluensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 128, t. 3, fig. F; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 240.

1883 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1404).

Loranthus mangheensis *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 77, t. 36.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.).

Loranthus mayombensis *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 78.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : le Mayumbe; Benza-Masola (Ém. et M. Laur.).

Loranthus micrantherus *Engl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 5 [B. S. B. B. XXXIX², 28].

1895 (P. Dupuis). — IV : près de la Gomuela : bords de la Mangolu (Dup.).

Loranthus nigrescens *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1902) 177, t. 89; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 29, (1906) 237.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 3236). — VI : vallée de la Djuma (Gentil, et Gill. 2745).

Loranthus ogowensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 117; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 44 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 44] et Reliq. Dewevr. (1901) 201; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 79 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 237; II (1907) 124.

1896 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill. 3235). — V : Kisantu (Gill. 545); env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 646 a); Monzaubi (Brun. in M. Laur. 1581). — IX : Nouvelle-Anvers (De Giorgi, 5). — X : Inese (Ém. et M. Laur.).

Loranthus polygonifolius *Engl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 6 [B. S. B. B. XXXIX², 29]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 201.

1896 (A. Dewèvre). — IX : pays des Bangala (Dew. 875).

Loranthus Poggei *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 116; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 240.

1882 (P. Pogge). — XV : bassin du Kasai (Pg.).

Loranthus Pungu *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 175.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 388^s).

Loranthus rubiginosus *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 173.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lac Moero (Verd.).

— — var. **grandiflorus** *De Wild.* l. c. (1903) 174.

Cette variété, rapportée par M. G. Descamps, a-t-elle été récoltée dans le Congo ou au Nyassaland ?

Loranthus Thonneri *Engl.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 12, t. 23 et Reliq. Dewevr. (1901) 202; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 124.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Bulandaponda** (Dew.). — IX a : Bokape près Gali (Thonn. 61). — XI : Yambuya (M. Laur. 1847).

VISCUM L.

Viscum congolense *De Wild.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 44 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 44]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 79.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 382, 573). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.).

Viscum Gilletii *De Wild.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 44 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 44].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 485).

Viscum lenticellatum *De Wild.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 45 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 45].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 686).

Viscum obscurum *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1794) 31 ; *DC.* Prodr. IV, 285 ; *Harv.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. II, 579.

Le type croît dans l'Afrique australe.

— — var. **decurrens** *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 132 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 31, 237.

1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 3619). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

SANTALACEAE

THESIUM L.

Thesium doloense *Pilger* in *Engl. Jahrb.* XL (1907) 58.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt.).

BALANOPHORACEAE

THONNINGIA Vahl.

Thonningia sanguinea *Vahl* in *Dansk. Selsk. Skrift*, VI (1810) 124, t. 6 ; *Eichl.* in *DC.* Prodr. XVII, 142 ; *Engl.* Pl. Ost-Afr. 169 ; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126] ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 13 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 79 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 120 ; II (1907) 33.

1895 (Ém. Laurent). — V : Kiushassa (Schlt.) ; Kiraueza (Gill.) ; Bokala (M. Laur.). — VII : Malepie (Ém. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.) ; Bombimba (M. Laur.). — IX : forêts de Ia Lubefu (Ém. Laur.). — IX a : Bobi ; Kanga (Thonn.). — XV : Munungu ; Dibebe (Ém. et M. Laur.).

EUPHORBIAEAE

MONADENIUM Pax.

Monadenium Descampsii *Pax* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 63 [B. S. B. B. XXXVII, 108].

1891 (G. Descamps). — XVI : entre les lacs Tanganika et Moero, 8° 20 lat. S. (Desc.).

EUPHORBIA L.

† *Euphorbia cyparissioides* *Par* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 123; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 951; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 289.

1893 (G. Descamps). — Du Nyassaland au Congo (Desc.).

Euphorbia decumbens *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) p. CXII; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 940.

E. indica *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) 423; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 22; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 62 [B. S. B. B. XXXVII, 107]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 202; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 142, cum xyl. 23 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 279.

1891 (F. Demeuse). — I : Moanda (Gill.). — II : env. de Boma. — Nom vern. : *Vita-Kabele* (Dew.). — IV : Luvituku (Dem.); Kitobola (Ëm. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Kimuenza (Gill.). — VI : Madibi. — Nom vern. : *Moshin-shieli* (Sap.); Eïolo (Ëm. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ëm. et M. Laur.). — X : le Bas-Ubaugi (Ëm. et M. Laur.). — XV : le Sankuru. — Nom vern. : *Tshikolokose* (Sap.). — XVI : Toa (Desc.).

Euphorbia graminea *Jacq.* Stirp. Amer. hist. (1763) 151; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 54; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 63 [B. S. B. B. XXXVII, 108]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 204.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew.).

Euphorbia Grantii *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 144, t. 93; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 63 [B. S. B. B. XXXVII, 108].

1893 (G. Descamps). — XVI : Moliro (Desc.).

Euphorbia Hermentiana *Ch. Lem.* in Ill. hort. V (1858) misc. 63; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 82; *Johnst.* The River Congo, 245, cum xyl.; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 240; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 53; *Pav* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 72; *Berger* Sukkul. Euphorb. (1907) 50, fig. 13.

1883 (H. Johnston). — Ind. non cl. : Itamba (Johnst.).

Obs. — Euphorbe plantée partout dans les villages, formant des palissades (Ëm. Laur.).

Euphorbia hypericifolia *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 454; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 23; *Hook.* Exot. Fl. I, t. 36; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 249; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 241; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 142.

1888 (Fr. Hens). — I : Banana (Ëm. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens).

Euphorbia Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 289.

1905 (Marc. Laurent). — VII : Bamania (M. Laur. 803). — XII d : route de Bambili à Anadis (Ser. 251). — Espèce cultivée à Eala [VIII] (M. Laur. ; Pyn. 696).

Euphorbia pilulifera *L.* Atmoen. acad. III (1756) 114; *Jacq.* Icon. pl. rar. III, t. 478; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV^t, 21; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 241; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 52; II (1900) 56 et Reliq. Dewevr. (1901) 203; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 80; *Miss. Laurent* (1905) 142 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 280.

1884 (R. Buettner). — II : Boma (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); env. de Yumbi (Èm. et M. Laur.). — VII : Lac Léopold II (Dem.). — IX : Bangala (Hens); Upoto (Wilw.). — XV : Butala (Èm. et M. Laur.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.); Lukafu (Verd.).

Euphorbia Poggei *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 118; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 241; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 62; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 80.

1870 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua (Pg.). — XVI : Toa (Desc.); Lukafu (Verd.).

Euphorbia prostrata *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, II (1789) 139; *Boiss.* Icon. Euphorb. (1866) t. 17 et in *DC.* Prodr. XV^t, 47; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 942; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 142 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 280; II (1908) 289.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 4059). — II : Boma (Èm. et M. Laur. ; Pyn.).

Euphorbia Quintasii *Pax* in Bolet. Soc. Brot. X (1892) 156; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 46 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 46]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 291.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 28); Kisinga (Vanderyst).

Euphorbia Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 290, t. 80.

1906 (A. Sapiu). — VI : brousse de Madibi. — Noms vern. : **Kipanzua**; **Banzua**; **Maicle** (Sap.).

Euphorbia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 290.

1906 (F. Seret). — XII c : rocher de Goi [à 6 h. de Gombari] (Ser.).

***Euphorbia splendens** *Boj.* ex *Hook.* in Bot. Mag. (1829) t. 2902; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV^t, 79; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 280; *Berger* Sukkul. Euphorb. (1907) 31, fig. 6.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.); — Plante cultivée. ?

Euphorbia thymifolia *Burm.* Fl. Ind. (1768) 2; *J. Burm.* Thes. Zeylan. t. 105, fig. 2; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 47; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 252; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 142 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 280; II (1908) 291.

1902 (J. Gillet). — V : entre Leopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Yumbi (M. Laur.). — XV : le Kasai, au poste de bois n. 6 (Ém. Laur.).

Euphorbia Tirucalli *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 452; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV, 96; *Ficalho* Pl. Uteis, 218; *Brandis* Forest Fl. 439; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 254; *Pax* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 242; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 241; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 949; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 203; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 143; *Berger* Sukkul. Euphorb. (1907) 22.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech.-Loesche). — Planté dans tous les villages du Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.).

Euphorbia tumbaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1906) 29.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Euphorbia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 280.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 309).

BRIDELIA Willd.

Bridelia micrantha [*Hochst.*] *Baill.* in *Adansonia*, III (1862-1863) 164; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV² (1866) 498; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 200; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 275; II (1908) 276.

Candelaria — *Hochst.* in *Flora*, I (1843) 79.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.). — II : Ile près de Malela (Dew.). — V : rég. de l'Inkisi (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — IX a : Mobeka (Pyn.). — XII d : env. de Faradje (Ser.). — Ind. non cl. : Gambi (Dew.).

— — var. **ferruginea** [*Benth.*] *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV² (1866) 498; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 46 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 46]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 128 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 276.

B. *ferruginea* *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 511; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 954.

1900 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Pyn. 36). — V : env. de Kwamouth; env. de Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Katasukile** [Sankuru]; **Bolanga** [Bangala].

Bridelia scleroneura *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 515 et in *DC. Prodr.* XV², 496; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 46 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 46] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 200.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 419). — V : Kisantu (Gill. 135).

Bridelia stenocarpa *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 515 et in *DC. Prodr.* XV², 494; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 61; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 242.

1875 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

Bridelia tenuifolia *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* II (1864) 328 et in *DC. Prodr.* XV², 495; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 953; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 200.

1899 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 1171).

Bridelia Zenkeri *Pax* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 327; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 276.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 1252; Pyn. 1376, 1677).

PSEUDOLACHNOSTYLIS Pax.

Pseudolachnostylis Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 205.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musadi** (Verd. 33).

CLEISTANTHUS Hook. f.

Cleistanthus caudatus *Pax* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 49 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 203.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Bena-Kamba (Dew. 1099).

CROTON L.

Croton angolensis *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* II (1864) 339; *Ficalho* Pl. Uteis, 251; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 969; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 276.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 2012).

Croton congensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 276.

Ann. ? (Coll. ?). — Congo (Coll. ?).

Croton Draconopsis *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 338 et in *DC. Prodr.* XV², 522; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 970; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 377.

Ann.† (Coll.†). — IV : distr. des Cataractes. — Nour vern. : **Gula-Gwedi** (Coll.†).

Croton Mubango *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 338 et in *DC. Prodr.* XV², 514; *Ficalho* Pl. Uteis, 969; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 969; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 96 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 836] et Reliq. Dewevr. (1901) 208; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 128 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1706) 276; II (1908) 277.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Boala (Lescr.). — XV : Kanda-Kanda (Gent.); Lusambo (Ém. et M. Laur.); Kitebwa [Lulua] (Gent.). — Ind. non cl. : Bena-Lekula (Dew.). — Noms vern. : **Kalamato**; **Lusube** [Tanganika] (Dew.).

Croton oxypetalus *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 339 et in *DC. Prodr.* XV², 543; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 971; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 277.

1901 (J. Gillet). — V : Dembo (Gill. 2108) : env. de Kisantu. — Nom vern. : **Guba-Gwela** (Swannet); entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 3725). — XII c : entre Amadis et Poko (Ser. 843). — XV : Lubue (Ém. et M. Laur.).

Croton Poggei *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1893) 534; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 244.

1876 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1368).

Obs. — Le **Croton Tiglium** L. est cultivé à Eala [VIII] (Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 128).

Croton Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 277.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Yama-Yumbi** (Verd. 398).

Croton Welwitschianus *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 338 et in *DC. Prodr.* XV², 515; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 970.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 320).

Croton zambesiacus *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 483 et in *DC. Prodr.* XV², 515; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 278.

1906 (F. Seret). — XII d : village Donge [Dungu] (Ser. 594). — Nom vern. : **Rongi** [Mangbettu] (Ser.).

PHYLLANTHUS L.

Phyllanthus capillaris *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 417; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 338; *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 236; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 212; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 58 [B. S. B. B. XXXVI, I 103]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 127 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 196, t. 54; (1908) 266; Pl. Thonnerianae (1901) 22.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Cabra). — I : Moanda (Vanderyst). — II a : Biugila (Dup.); Shimbete (Dew.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. et M. Laur.). — V : Léopoldville (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.); Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Upoto (Thonn.); Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XIII c : Yakusu (M. Laur.). — XVI : Pala (Desc.). — Nom vern. : **Lofamdjola** (Ém. et M. Laur.).

Phyllanthus floribundus *Muell.-Arg.* in *Linnaea*, XXXII (1863) 14 et in *DC.* Prodr. XV², 343; *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 236 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 58 [B. S. B. B. XXXVII, 103]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 204; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 275; II (1908) 266.

1895 (G. Descamps). — II : Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : Kimuenza; Kisantu (Gill.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XVI : Toa (Desc.). — Noms vern. : **Kaifi** [Kasongo]; **Musunganene** [Tanganika] (Dew.).

Phyllanthus Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 226.

1906 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 3208, 4034).

Phyllanthus moeroensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I, (1906) 273, t. 64.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : bassin du Lac Moero (Verd.).

Phyllanthus Niruri *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) 981; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 426; *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 236 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 58 [B. S. B. B. XXXVII, 103]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 48 et Reliq. Dewevr. (1901) 204; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 127 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 266.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — V : Kimuenza; Dembo (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VI : Bandundu (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Phyllanthus niruroides *Muell.-Arg.* in *Scem. Journ. of Bot.* II (1864) 331 et in *DC.* Prodr. XV², 409; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 242.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Phyllanthus odontadenius *Muell.-Arg.* in *Scem. Journ. of Bot.* II (1864) 333 et in *DC. Prodr.* XV², 365; *Pax* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 48; II (1900) 56.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu; env. de Dembo (Gill.).

— — var. **micranthus** *Pax* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1897) 48 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 204.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dem. 262).

Phyllanthus pentandrus *Schumach. et Thonn.* in *Danske Vidensk. Selsk. Kjoeb.* IV (1829) 193; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 336; *Pax* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 236; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 957; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1906) 275.

1904 (R. Butaye). — V : entre le Kwango et Kisautu (But.).

Phyllanthus polyanthus *Pax* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 19; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 204.

1896 (A. Dewèvre). — IX : env. de Bumba. — Nom vern. : Mokolokaka (Dew.) 890.

Phyllanthus Pynaertii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 267.

1905 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 379, 1159). — IX : Bumba (Pyn. 25).

Phyllanthus reticulatus *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* V (1804) 298; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 314; *Pax* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 236; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* II (1898) 58 [B. S. B. B. XXXVII, 103]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 205; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 958; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 127 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1906) 275; II (1908) 268.

1895 (A. Dewèvre). — I : env. de Moanda (Gill. 3979) — II : Boma (Pyn. 191). — III : Matadi (Gill. 4045). — IV : Luango (Dew.). — V : env. de Léopoldville (Dew.); Chenal (Ém. et M. Laur.); Kisautu (Gill.); entre Kisautu et le Kwango (But.). — IX : Bobanga (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.)

Phyllanthus Verdickii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1906) 274, t. 63.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 407).

FLUEGGEA Willd.

Flueggea obovata [*Willd.*] *Wall. List* (1828) n. 7928; *Baill.* in *Adansonia*, II (1861-1862) 41; *Pax* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 235; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 48 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 205; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 79.

Xylophylla obovata Willd. Enum. pl. Hort. Berol. (1809) 329.

Securinega — *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV² 1866) 449.

F. microcarpa *Blome* Bijdr. Fl. Ned.-Indië (1825-1826) 580; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 328.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Katolle-Tolle** (Verd.). — Nom vern. : **Kakasalla** [Tanganika]; **Matotolo** [Kasongo] (Dew.).

ANTIDESMA L.

Antidesma laciniatum *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 529 et in *DC. Prodr.* XV², 260; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 270.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.). — XI : Yam-buya (M. Laur. 993). — XII c : env. de Nala (Ser. 806).

Antidesma membranaceum *Muell.-Arg.* in *Linnaea*, XXXIV, (1865-1866) 68 et in *DC. Prodr.* XV², 261; *Pax* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 49 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 206; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 270.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.) : Dembo (Vanderyst); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (Pyn. : M. Laur.). — IX : Mobeke (Pyn.). — XII c : Gombari (Ser.). — Nom vern. : **Mosalasala** [Kwilu] (Sap.).

Antidesma Schweinfurthii *Pax* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 530; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 242.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Maugbettu (Schw.).

Antidesma venosum *E. Mey.* ex *Tul.* in *Annal. sci. nat. Sér.* 3, XV (1851) 232; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 260; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 243; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 49 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 206; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 965; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 79 et *Miss. Laurent* (1905) 128.

A. = *nervosum* = [err. cal.] *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 270.

1885 (R. Buettner). — II : Boma (Dew.); ile des Princes (Ém. et M. Laur.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buett.); Yumbi (Dew.); Dembo (Vanderyst); entre Tumba et Kimpesse (But.). — VIII : Equateurville (Hens). — IX : Luozi (Luja). — XVI : env. de Lukafu (Verd.); Kibanga (Deb.). — Noms vern. : **Mushe-Tjifufia**; **Mulumbi-Lumba** [Katanga] (Verd.).

— — form. **glabrescens** *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 79.

1899 (Edg. Verdick). — XIII : Lukafu (Verd.).

UAPACA Baill.

Uapaca Bossenge *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 271, t. 70, fig. 1-4.

1903 (Ém. Laurent). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **Bosenge** (M. Laur. 128).

Uapaca ealaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 272, t. 70, fig. 5-8.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 813).

Uapaca Heudelotii *Baill.* in *Adansonia*, I (1860-1861) 81; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 128.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Bosenge** (M. Laur.).

Uapaca Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 272.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Uapaca Marquesii *Pax* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1897) 322.

1876 ? (P. Pogge). — XV : le Kasai (Pg. 298, 633, 674).

Obs. — La localité [bord du Quihumbo] où l'espèce a été découverte par L. Marquès, est dans l'Angola ; mais, postérieurement [in *Engl. Jahrb.* XXXIV (1904) 371] M. Pax a rapporté à cette espèce les n^{os} 298, 633 et 674 de la collection de Pogge. Ces deux derniers numéros ont, croyons-nous, été récoltés dans le district du Kasai [XV].

Uapaca microphylla *Pax* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1897) 523; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 206.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musokolobe** (Verd. 540).

— — var. **Hendrickxii** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 273.

1903 (Aug. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Heudr. in Gill. 3086).

Uapaca Mole *Pax* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 79; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 242.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1635).

Uapaca Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 274, t. 71.

1905 (L. Pynaert). — IX : Bumba (Pyn. 117).

Uapaca Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 274, t. 72.

1907 (F. Seretj). — XII c : env. de Nala (Ser. 778).

Uapaca Van Houttei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 275.

1903 (Aug. Van Houtte). — V : Kisantu-Makela (Van Houtte in Gill. 3454).

BACCAUREA Lour.

Baccaurea Staudtii *Pax* in Engl. Jahrb. XXIII (1897) 521; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 205.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — Ind. non cl. : Ukussu (Dew.).

MAESOBOTRYA Benth.

Maesobotrya Bertramiana *Buett.* in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 93; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 243.

1885 (R. Buettner). — IV : Mnen-Putu-Kasongo (Buett. 259).

Maesobotrya hirtella *Pax* in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 21; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 96 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 836] et Reliq. Dewevr. (1901) 206; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 127 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 275; II (1908) 268.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Gill. 2300). — V : Dolo (Pyn. 41); rég. de Sanda (Odd. 1478, 1970); Kimuenza et env. (Gérard; Gill. 1478, 1678, 1970, 2037, 2123); entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill. 2799, 2899). — VII : rég. du Lac Léopold II. — Nom vern. : **Kukuankuko** (Body). — VIII : Bikoro (Pyn.); Lulanga (Pyn. 743); env. de Bokakata. — Nom vern. : **Bonguete** (Dew. 763); Ikenge (Em. et M. Laur.); Coquilhatville (Dew. 632); Eala et env. — Nom vern. : **Ekakoloka** (M. Laur. 74; Pyn. 562, 1304, 1453). — IX : Bolombo (Em. et M. Laur.). — X : Imese (Em. et M. Laur.).

Maesobotrya Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 268.

Staphysora — *De Wild.* l. c. II (1908) 268 [nom. nov.].

1902 (L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma ? (Gent.); Madibi (Sap.). — Noms vern. : **Smanebuko** [Kwilu]; **Kimanabuka** [Kasai]; **Kakoloka** [Bangala].

— — var. **brevipetiolata** *De Wild.* l. c. II (1908) 269.

1907 (A. Sapin). — VI : Dima (Sap.).

HYMENOCARDIA Wall.

Hymenocardia acida *Tul.* in Annal. sci. nat. Sér. 3, XV (1851) 256; *Muell.-Arg.* in DC. Prodr. XV², 477; *Oliv.* et *Grant* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 145, t. 94 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 57 [B. S. B. B. XXXVII, 104]; *De Wild.* et *Th. Dur.*

Pl. Gilletianae, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47]; Contr. fl. Cgo, I (1899) 49; II (1900) 56 et Reliq. Dewevr. (1901) 207; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 269.

1893 (Ém. Laurent). — Ha : Zenze (Ém. Laur.); route de Shinganga à Zobe (Dew.). — V : Léopoldville (Luja; Pyn.); Kisantu (Gill.); Dembo (Vanderyst). — XV : Bena-Dibele (Luja); Bukila (Ém. et M. Laur.).

Hymenocardia Heudelotii *Muell.-Arg.* in Flora, XLVII (1864) 518; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 269.

1905 (Marc. Laurent). — V : env. de Yumbi (M. Laur. 427). — VIII : Eala (M. Laur. 1972; Pyn. 344).

Hymenocardia mollis *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1893) 528 et in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 237; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, (1906) 275.

1895 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 1027).

— — var. **glabra** *Pax* l. c. 528; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 243.

1882 (P. Pogge). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1349).

Hymenocardia Poggei *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1893) 528; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 243.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1351).

Hymenocardia ulmoides *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XII (1876) 29, t. 1131; *Pax* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 236 et in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 207; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 960; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 127 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 269.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Bolobo. — Nom vern. : **Mokengereke** (Dew.); Kisantu (Gill.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville; env. de Wangata (Dew.); Eala (M. Laur. 844). — XIII d : env. de Lusanga (Dew.).

PLAGIOSTYLES Pierre

Plagiostyles Klaineana *Pierre* in B. S. Linn. Paris, II (1897) 1327; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 96 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 836] et Reliq. Dewevr. (1901) 205; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 41, (1908) 279.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1716); marécages de Dembo (Gill. 1562); env. de Sanda (Odd.). — VI : vallée de la Djuina (Gent.). — VIII : la Lulanga (Dew. 855).

CYATHOGYNE Muell.-Arg.

Cyathogyne Dewevrei Pax in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 207.

1896 (A. Dewèvre). — XIII c : Wabundu (Dew. 1142).

Cyathogyne viridis Muell.-Arg. in Flora, XLVII (1864) 536 et in DC. Prodr. XV², 226; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae, (1901) 21; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II, (1908) 268.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.; Pyn 655).

MICRODESMIS Planch.

Microdesmis puberula Hook. f. in Hook. Icon. pl. (1848) t. 758 et in Niger Fl. (1849) 514, t. 26; *Muell.-Arg.* in DC. Prodr. XV², 1041; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 967; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 62 [B. S. B. XXXVII, 107] et Reliq. Dewevr. (1901) 207; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162, (1906) 279 et Miss. Laurent (1905) 140.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.) — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : Bin-gila (Dup.); Shuganga (Dew.). — V : Lukolela (Dew.); Sanda (De Brouw.; Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Madibi (Sap.). — VII : forêt de Gauda (Body). — VIII : Équateur (Dew.) : Eala et env. (M. Laur.; Pyn.); Coquilhatville. — Nom vern. : **Isike** (Dew.); **Ikoko** (Sap.) — XI c : Mogandjo (M. Laur.) — XIII c : env. de Ponthier-ville [Wabuudu]; la Lowa (Dew.). — XV : Dibebe (Ém. Laur.); Bombaie (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Seseké** [Équateur]; **Monkiso** [Lukolela]; (Dew.).

JATROPHA L. (1)

* *Jatropha Curcas* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1006; *Muell.-Arg.* in DC. Prodr. XV², 1080; *Ficalho* Pl. Uteis. 250; Pax in *Engl. Pfl. Ost.-Afr.* 240 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 61 [B. S. B. XXXVII, 106]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 52 et Reliq. Dewevr. (1901) 208; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 968; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 50; Miss. Laurent (1905) 133 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 278.

1891 (F. Demeuse). — IV : Banza-Putu (Dem.). — Nom vern. : **Puluka** (Dew.). — V : Kisautu (Gill.). — VI : le Kwango (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Inkongo (Ém. et M. Laur.). — IX : env. de Mabanga. — Nom vern. : **Inkoko** (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tondo-iwa-Niamba** (Verd.); Kibanga (Deb.).

(1) *L'Hevea brasiliensis* Muell.-Arg. est cultivé en grand à Wangata; Sisundi, Eala [VIII] etc. [Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 133 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 286].

* **Jatropha multifida** L. Sp. pl. ed. I (1753) 1006; *Salisb.* Hort. Paradis. t. 91; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 1089; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 243; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 63 [B. S. B. B. XXXVII, 107] et Pl. Gilletianae, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 47].

1883 (H. Johnston). — Congo (Johust.). — II : Boua (Wilw.). — V : Kisantu (Gill.).

RICINODENDRON Muell.-Arg.

Ricinodendron africanum *Muell.-Arg.* in Flora, XLVII (1864) 533 et in *DC.* Prodr. XV², 1114; *Ficalho* Pl. Uteis, 251; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 976; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 47; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 141 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 288.

1900 (J. Gillet). — II a : la Lukula (Ém. et M. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **Bofeko** (M. Laur.). — XV : forêt de Munungu (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Mongongome** [Kwilu] (Sap.).

MANNIOPHYTON Muell.-Arg.

Manniophyton africanum *Muell.-Arg.* in Flora, XLVII (1864) 531 et in *DC.* Prodr. XV², 720; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 59 [B. S. B. B. XXXVII, 104]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 31-32; Miss. Laurent (1905) 129 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 279.

1888 (Fr. Hens). — V : Lukolela (Pyn.). — VI : le Kwilu (Sap.). — VII : Iboka — Nom vern. : **Kosa** (Gent.). — VIII : distr. de l'Équateur, C (Gent. : Pyn.); Coquilhatville (Schlt.); Eala et env. — Nom vern. : **Nkosa** (M. Laur.); Bala-Lundzi (Pyn.). — IX : Bangala (Hens). — XI : env. de Basoko; Limbutu (M. Laur.). — XV : le Saukuru (Sap.); Bena-Dibele (Leser.; Flam.). — Noms vern. : **Caho** [Amadis]; **Ude** [Asende]; **Wii** [Abaremba]; **Kosa** [Limbutu]; **Lukusa**; **Lukosa** [Baugala]; **Mosamba**; **Lukosa**; **Nkoza** [Saukuru].

Manniophyton fulvum *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 332 et in *DC.* Prodr. XV², 720; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 244; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 972; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 208; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 32; Miss. Laurent (1905) 129 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 276.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Sonagougo (Luja). — V : Kisantu (Gill.); env. de Sauda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Équateur (Dew.). — XI : Isaugi (Ém. et M. Laur.) — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

POGGEOPHYTON Pax

Poggeophyton aculeatum Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 89; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 245.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1370).

CAPERONIA St-Hil.

Caperonia senegalensis Muell.-Arg. in *Linnaea*, XXXIV (1865-1866) 153 et in *DC. Prodr.* XV⁴, 756; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. II (1898) 59 [B. S. B. B. XXXVII, 104] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 210.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

CROTONOGYNE Muell.-Arg.

Crotonogyne Laurentii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 278, t. 73.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.).

— — var. *ikelebense* De Wild. l. c. II (1908) 278.

Ann. ? (Coll. ?). — VIII : Ikelebã (Coll. ?).

Crotonogyne Poggei Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 84; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 244.

1881 ? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1326).

MANIHOT Adans. (4)

**Manihot utilissima* Fohl Pl. Brasil. icon. et descr. I (1827) 32, t. 24; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV⁴, 1064; *Ficalho* Pl. Uteis, 251; *Kurz* Forest Fl. II, 402; *Engl.* in Engl. Jahrb. VIII (1886) 61; Pax in *Engl. Pf. Ost. Afr.* 240; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 244; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 973; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 140.

Jatropha Manihot L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1007.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Lescr.). — VIII : Eala (Ém. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.).

Obs. — Originaire de l'Amérique trop.; largement cultivé dans l'Afrique trop.

(1) Le *M. Glaziovii* Muell.-Arg. est une espèce du Brésil cultivée à Kisantu [V] (Gill.), à Eala [VIII] (Flam.) et dans un grand nombre de localités du Congo [Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 134-138, fig. 17-21 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1906) 278].

ERYTHROCOCCA Benth.

Erythrococca aculeata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 506; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 791; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 50 et Reliq. Dewevr. (1901) 209; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 129.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.).

HASSKARLIA Baill.

Hasskarlia didymostemon *Baill.* in *Adansonia*, I (1860) 52; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 774; *Ficalho* Pl. Uteis, 257; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 51; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 974; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 131 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 284.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville ; Kisantu (Gill.). — VII : Ibali ; la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Pyn. 811, 1786). — IX : Nouvelle-Anvers (Pyn. 10). — XIII c : rég. de Ponthierville (Dew.). — XV : Kondue ; Ifuta (Ém. et M. Laur.).

CLAOXYLON A. Juss.

Claoxylon africanum [*Baill.*] *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV² (1866) 777; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 47 (B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47) et Reliq. Dewevr. (1901) 209; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 130 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 279.

Trewia — *Baill.* in *Adansonia*, I (1860) 68.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza ; Kisantu (Gill.) ; Lukolela. — Nom vern. : **Musense** (Dew.). — VII : env. du Lac Léopold-II. — Nom vern. : **Ejendje** (Body). — VIII : Eala (Pyn.) ; Injolo (Huyghe et Ledoux). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XV : le Sankuru. — Noms vern. : **Masoha** (Sap.) ; **Ntenteké** [Bangala].

Claoxylon atrovirens *Pax* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 85; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 245.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu ; Kusumbo (Schw.).

Claoxylon Dewevrei *Pax* in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 209 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 283.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 947, 964 a). — Noms vern. : **Mondeka** [Kasongo] ; **Monsingisa** [Tanganika] ; **Mabaie** [Ikwangula] ; **Londgendje** [Équateur] ; **Mokoyole** [Kasongo] ; **Djalasingi** [Tanganika] ; **Likile** [Ikwangula] (Dew.).

Claoxylon flaccidum *Pax* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 87; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 245.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3355).

MICROCOCCA Benth.

Micrococca Mercurialis [L.] Benth. in *Hook. f. Niger Fl.* (1849) 503; *Pax* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 238 et in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 60 [B. S. B. B. XXXVII, 105] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 209; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 129 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 279.

Tragia — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 980.

Claoxylon — *Thoe. Enum. pl. Zeyl.* (1861) 271; *Muell.-Arg. in DC. Prodr.* XV², 790; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.*, 970.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Zambi (Dup.). — II a : le Mayumbe; Bingila (Dup.). — III : Matafi (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Yumbi (M. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.); Dembo et env. (Gill.; Vandercryst); Kisantu (Gill.). — VI : Ejiolo (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu; Kiri (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Bena-Kamba (Dew.); Limbutu (M. Laur.). — Nom vern. : **Kaie** [Tanganika] (Dew.).

ACALYPHA L.

Acalypha brachystachya Horn. *Hort. reg. bot. Hafn.* II (1815) 909; *Muell.-Arg. in DC. Prodr.* XV², 870; *Hiern Cat. Welw. Pl. Boiss.* I, 978; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 47 [B. Herb. Sér. 2, I, 47] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 210; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 131.

Ricinocarpus — *O. Kuntze Rev. Gener.* (1891) 617.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Boera. — Nom vern. : **Badjambota** (Dew.). — IX : Nouvelle-Anvers (Hens).

Acalypha Dewevrei Pax in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 24; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 210.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 1820).

Acalypha haplostyla Pax in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 98; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 284.

1876 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua, 9°5 lat. (Pg. 120). — XVI : Lukonzolwa. — Nom vern. : **Koloko** (Coll.?).

— — var. **longifolia** *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 277.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu — Nom vern. : **Kabuko-Pakana** (Verd. 256).

Acalypha indica L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) 1003; *Muell.-Arg. in DC. Prodr.* XV², 868; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.*, 978; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 106]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 210.

1893 (Ém. Laurent). — Congo (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Acalypha ornata *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 247; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 833; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 51 [B. S. B. B. XXXVII, 106]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 210.

1895 (G. Descamps). — XIII d : Vieux-Kasongo : Nyangwe (Dew.). — XVI : Toa (Desc.); Pala (Deb. 13d). — Noms vern. : **Yambokulu** [Ikwangula]; **Bototota** [Kasongo] (Dew.).

Acalypha paniculata *Miq.* Fl. Ind. Bat. I² (1859) 406; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 802; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 60 [B. S. B. B. XXXVII, 105]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 210; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 13 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 378; II (1908) 284.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba. — Nom vern. : **Vunga** (Cabra). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Tumba (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Pyn.).

Acalypha polymorpha *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* II (1864) 335 et in *DC. Prodr.* XV², 835; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gillelianae, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 284.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.); Yindu (Vanderyst).

Acalypha sessilis *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) 204; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gillelianae, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 131 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 284.

A. gemina *Spreng.* var. *genuina* *Muell.-Arg.* in *Linnaea*, XXXIV (1865-1866) 41 et in *DC. Prodr.* XV², 866.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Kanga-Nzo** (Gill.; Vanderyst). — XII c : env. de Surango (Ser. 890). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Acalypha vahliana *Muell.-Arg.* in *Linnaea*, XXXIV (1865-1866) 43 et in *DC. Prodr.* XV², 873; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 978; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 51; II (1900) 57 et Reliq. Dewevr. (1901) 211; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 131 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 284.

A. ciliata *Vahl* Symb. bot. I (1790) 77, t. 20.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Dew.). — IV : Sona-Gongo (Luja). — V : Kisantu (Gill.); Boko; Dembo; Maydis (Vanderyst). — VII : la Fiui; Kutu (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Kasongo. — Nom vern. : **Lotoloto** (Dew.). — XV : Kondue; Munungu (Ém. et M. Laur.).

MAREYA Baill.

Mareya mierantha [Benth.] Muell.-Arg. in DC. Prodr. XV¹ (1876) 792; Pax in De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I (1899) 51 et Reliq. Dewevr. (1901) 213; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 285.

Acalypha — Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 505.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Okanga; Lokaudu (Dew.). — XIII c : Rewa (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

ALCHORNEA Sw.

Alchornea cordifolia Muell.-Arg. in Linnaea, XXXIV (1865-1866) 176 et in DC. Prodr. XV², 908; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 60 [B. S. B. B. XXXVII, 105]; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1899) 57; De Wild. Miss. Laurent (1905) 129 et Etud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 276; II (1908) 280.

A. cordata Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 507; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 979.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Cabra). — II a : rives de la Vunzi (Dup.); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : Kisantu (Gill.); env. de Lemfu (But.); Lukolela (Pyn. 54). — VII : env. du Lac Léopold II (Body). — VIII : Ikeuge (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi; Lie (Ém. et M. Laur.). — XV : Kasougo-Batetela (Sap.); Mushenge (Lescr. 389). — Noms vern. : **Diorgi** [Batetela]; **Libunji** [Baugala].

Alchornea floribunda Muell.-Arg. in Scem. Journ. of Bot. I (1863) 336 et in DC. Prodr. XV², 905; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I (1900) 50; Pl. Thonnerianae (1900) 30 et Pl. Gilletianae, II (1901) 97 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 837]; De Wild. Etud. fl. Bas- et Moy.-Cgo II (1908) 280.

1899 (Fr. Thonner). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : env. de Kisantu (Gill. 3799); Sele (But.). — VIII : le Haut-Lopori (Biel.); Équateur (Pyn. 332); Eala (Pyn. 1426). — IX a : env. de Mobeka (Ém. et M. Laur.); Gali (Thonn.). — XI : env. de Yambuya (M. Laur.). — XII c : env. de Nala (Ser. 884).

Alchornea hirtella Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 507; Muell.-Arg. in DC. Prodr. XV², 904; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 280.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.).

Alchornea yambuyaensis De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1908) 280.

1906 (J. Solheid). — XI : env. de Yambuya (Solh. 55, 80, 160).

MALLOTUS Lour.

Mallotus oppositifolius [Geisel.] Muell.-Arg. in *Linnaea*, XXXIV (1865-1866) 170 et in *DC. Prodr.* XV², 976; *Pax in Engl. Pl. Ost.-Afr.* 238; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 60 [B. S. B. B. XXXVII, 105]; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 21 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 211; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 980; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 276 et *Miss. Laurent* (1905) 130.

Croton — *Geiseler Croton Monog.* (1807) 23.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Cabra). — II a : env. de Shinganga. — Nom vern. : **Kukuma-Suza** (Dew.); Bingila (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Gill.; Vanderyst); env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Bokakata. — Nom vern. : **Ebemba** (Dew.). — IX : Unangi; env. de Lie (Ém. et M. Laur.); env. de Bumba [îles du Congo] (Pyn.); Upoto (Thonn.). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Lokandu (Dew.); env. de Yambuya (Solh.); Malema (Ém. et M. Laur.). — XV : Luebo (Lescr.). — Noms vern. : **Mititi** [Lokandu]; **Bulekibanga Ngutu** [Tanganika] (Dew.); **Lobombo** (Ém. Laur.).

Mallotus subulatus Muell.-Arg. in *Linnaea*, XXXIV (1866) 970 et in *DC. Prodr.* XV², 970; *Pax in De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 50 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 211.

1895 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 545; Pyn. 170). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Ind. non cl. : Matenda (Dew.). — Noms vern. : **Kasakola** [Kasongo]; **Yambakulu** [Ikwangula]; **Kazitanda** [Tanganika] (Dew.).

ARGOMUELLERA Pax.

Argomuellera macrophylla Pax in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 90; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 246.

1883 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1376).

MACARANGA Thou.

Macaranga angolensis Muell.-Arg. in *DC. Prodr.* XV² (1866) 994; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 981; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 277; II (1908) 281.

1904 (J. Gillet). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Kisantu. — Noms vern. : **Mufu**; **Mlumfu** (Gill. 166).

Macaranga dibeleansis De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 281.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XV : Dibeles (Ém. et M. Laur.; Flam. 189).

Macaranga Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 276, t. 73.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1840).

Macaranga Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 282.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala. — Nom vern. : Wenge (M. Laur. 1304 ; Pyn. 1278).

Macaranga mollis *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 91 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1352).

Macaranga monandra *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 337 et in *DC. Prodr.* XV², 1012 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246 ; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 60 [B. S. B. B. XXXVII, 105].

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

Macaranga Poggei *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 94 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1387).

Macaranga Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 283.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala. — Nom vern. : Bosasa (Pyn.).

Macaranga rosea *Pax* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 328 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 283.

1907 (P. Huyghe). — VIII : Ikenge (Huyghe) ; Eala (Pyn. 1491).

Macaranga saccifera *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 93 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 57 et Reliq. Dewevr. (1901) 212 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 130, t. 39-41 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 283.

1881 (P. Pogge). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 1133 ; Pyn. 717, 1047) ; Bokakata (Dew. 788). — IX : env. de Bumba (Ser. 35) ; Injolo (M. Laur. 1288 ; Ser.). — XI : Patalbugo [Yambuya] (M. Laur.). — XV : Kondue ; Batempa ; entre Lusambo et le Lomami (Ém. et M. Laur.) ; Mukenge (Pg. 1335, 1363). — Noms vern. : Molukunkao [Kwilu] ; Kolokote [Bangala].

Macaranga Schweinfurthii *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 92, *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3500).

Macaranga Zenkeri *Pav.* in Engl. Jahrb. XXIII (1897) 526; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 50; II (1900) 87; Pl. Gillelianae, I (1900) 48 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 48] et Reliq. Dewevr. (1901) 212; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 277; II (1908) 284.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Gill.). — V : env. de Sanda (Odd.); Kisantu (Gill. 249). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XIII c : env. de Lokandu (Dew. 1134). — XVI : près du Tanganika (Coll.). — Nom vern. : **Pombura** [Mayogo] (Ser.).

MEGABARIA Pierre.

Megabaria Trillesii *Pierre* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 284. [nom. lant.].

1896 (A. Dewèvre). — VIII : fle dans la Lulanga (Dew. 856); Eala (M. Laur. 2035); Bolombo (Ém. et M. Laur.).

CHAETOCARPUS Thw.

Chaetocarpus africanus *Pav.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 113; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gillelianae, I (1900) 48 et Reliq. Dewevr. (1901) 212; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 141 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 288.

1876 (P. Pogge). — V : Bolobo (Ém. Laur.); Kinshassa (Schlt.); Léopoldville (Dew.); Kisantu et env. (Gill.); Kimueuza (Pyn. 115); Sanda (Vern. in Gill. 341); Dembo. — Nom vern. : **Kikungu** (Vanderyst). — VI : Dina (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — X : le Kasai (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (M. Laur.); Kamba; Kapinga; Butala; Mangba (Ém. et M. Laur.); Mukenge (Pg.). — XVI : Musumba. (Pg.).

PYCNOCOMA Benth.

Pycnocoma Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 285.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Pycnocoma macrophylla *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 508; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 278.

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gent. : Gill.). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew.).

Pycnocoma Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 285.

1906 (A. Sapin). — XV : le Sankuru (Sap.). — Nom vern. : **Montende** [Bangala]; **Montando** [Sankuru].

Pycnocomma Thonneri Pax in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, 1 (1899) 51; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 21, t. 11; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 286.

1896 (Fr. Thonner). — VIII : Efukwa-Kombe [Ikelemba] (M. Laur.). — IX a : Gali [Mongalla] (Thonn. 95 : Ém. Duch.). — XI : Patalongo [Yambuya] (M. Laur. 1046) : Yambuya et env. (Solh.).

Pycnocomma trilobata De Wild. Miss. Laurent (1905) 132, t. 28.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bolongula [Sankuru] (Ém. et M. Laur.).

TRAGIA L.

Tragia cordifolia Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) 501; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 944; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 984; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 61 [B. S. B. XXXVII, 106]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 80; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 132 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1905) 286.

1895 (Édg. Verdick). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); Mopolenge (M. Laur.). — VIII : Eala. — Nom vern. : Ifambalankoce (M. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Lusemgue (Verd.).

Tragia Descampsii De Wild. *Étud. fl. Kat.* (1903) 207.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Katanga (Desc.).

Tragia lukafuensis De Wild. *Étud. fl. Kat.* (1903) 206.

1899 (Édg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Luba-Langwo (Verd. 220).

Tragia tenuifolia Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) 502; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 945; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 52 et Pl. Thonnerianae (1900) 21.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi près de Gali (Thonn.).

Tragia volubilis L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 380; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 935; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 984; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 61 [B. S. B. XXXVII, 106]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 212.

1895 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.).

Tragia Zenkeri Pax in *Engl. Jahrb.* XXIII (1897) 528; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 52 et Reliq. Dewevr. (1901) 212.

1895 (A. Dewèvre) — III-IV : la Lufu (Dew. 437).

DALECHAMPIA L.

Dalechampia ipomoeaeifolia *Benth.* in *Hook. f. Niger Fl.* (1849) 500; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 1248; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 48 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 48]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 286.

1899 (J. Gillet). — II a : le Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VII : Ibalu (Em. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.).

Dalechampia scandens *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1054; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 1244; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 985; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 48 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 48]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 278; II (1908) 286.

1900 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.).

— — var. **cordofana** [*Hochst.*] *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 1245; *Pax* in *Engl. Pl. Ost Afr.* 210 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 61 [B. S. B. B. XXXVII, 106].

1896 (G. Descamps). — Bas-Congo (Cabra) — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XVI : Kapanga [Tanganika] (Desc.).

RICINUS L.

Ricinus communis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1007; *Bot. Mag.* (1821) t. 2209; *Benth. et Trim.* Medic. Pl. IV, t. 237; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 1017; *Pax* in *Engl. Pl. Ost Afr.* 210; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1893) 247; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 983; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 80; *Miss. Laurent* (1901) 133 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1905) 588 616.

1891 (F. Demeuse). — Espèce souvent introduite. — Bas-Congo (Dem.; Dup.). — II a : Biugila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — XIV : Kalembe-Lemba (Coll.). — XV : Bukila (Em. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

MAPROUNEA Aubl.

Maprounea africana *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², (1866) 4191; *Pax* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 62 [B. S. B. B. XXXVII, 107]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 985; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1902) 213; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 144 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 279, II (1908) 289.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — I : Moanda (Gill.). — II a : Biugila (Dup.). — IV : Kitobola (Pya.). — V : env. de Léopoldville (Gill.; Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (Pya.). — IX : Bangala (Dew.). — Nom vern. : **Bosu** [Kwilu] (Sap.).

M. africana var. **obtusa** Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 116 et in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 62 [B. S. B. B. XXXVII, 109]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 213.

1893 (Ém. Laurent). — Congo (Dew.). — II a : Shinon (Ém. Laur. 14); env. de Zobe (Dew. 346).

SAPIUM P. Br.

Sapium cornutum Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 114.

Le type croît dans l'Angola.

— — var. **coriaceum** Pax l. c. (1894) 115; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 247.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg 1407. 1411).

Sapium Mannianum [Muell.-Arg.] Benth. in *Benth. et Hook. f. Gen. pl.* III (1830) 335; Pax in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 62 [B. S. B. B. XXXVII, 107]; *Hiern. Cat. Welw. Pl. I*, 986; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 147 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 279; II (1908) 288.

Excoecaria—*Muell.-Arg.* in *Flora* (1864) 933 et in *DC. Prodr.* XV² (1868) 1217.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Temvo (Ém. et M. Laur.). — IV : Sona-Gongo (Luja); Kitobola (Ém. Laur.). — V : env. de Lukolela (Krek.); Kisantu (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1299). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.); Lubi (Sap.).

Sapium oblongifolium [Muell.-Arg.] Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 114; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 52; II (1900) 57 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 213; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 141 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 279; II (1908) 288.

Excoecaria — *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* II (1864) 337; *Hiern. Cat. Welw. Pl. I*, 986.

1891 (F. Demeuse). — V : Léopoldville (Dew.); Galiema (Pyn. 124); Dembo et env. (Gill.; Vanderyst); Sanda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Madibi (Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.); env. du Lac Léopold II (Body). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Ekongeli** [Lac Léopold II] (Body); **Mombatieke**; **Mbatieke**; **Batieke** [Kwilu] (Sap.).

Obs. — L'habitation, N. du Stanley-Pool (Dew.), est dans le Congo français.

Sapium Poggei Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 114; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 247.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg 1385).

Sapium xylocarpum Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 115; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 247.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1416).

URTICACEAE

CELTIS L.

Celtis Prantlii *Priemer* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, III (1900) 23;
De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 213.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

TREMA Lour.

Trema guineensis [*Schumach. et Thonn.*] *Ficalho* Pl. Uteis (1884)
261; *Buett.* in Mitth. Afr. Gesellsch. V, 257; *Th. Dur. et Schinz*
Étud. fl. Cgo (1896) 247; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr.
(1901) 213 et Pl. Thonnerianae (1901) 10; *De Wild.* Miss. Laurent
(1903) 68.

Celtis — *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 160.

Sponia — *Planch.* in DC. Prodr. XVII (1873) 197.

1893 (Ém. Laurent). — II : Zenze (Ém. Laur.). — V : Kisantu. — Nom vern. :
Gudia-Muni (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Krek.); env.
de Mobanga. — Nom vern. : **Eseka** (Dew.). — IX : Upoto (Thonn.). — XV : Bo-
longula (Ém. et M. Laur.).

— — form. **strigosa** *Buett.* in Mitth. Afr. Gesellsch. V, 257; *Th.*
Dur. et Schinz l. c. (1896) 248.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett. 249).

CHAETACME Planch.

Chaetacme aristata *Planch.* in Annal. sci. nat. Sér. 3, X (1848) 340;
Muell.-Arg. in DC. Prodr. XVII, 210; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 160.

Le type croît dans l'Afrique australe.

— — var. **longifolia** *Engl. ex De Wild. et Th. Dur.* Reliq. De-
wevr. (1901) 214.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 903). — Noms vern. :
Kekoko [Kasongo]; **Bawamauri**; **Mokoluko** [Ikwaugula]; **Lamata** [Tanganika]
(Dew.).

CANNABIS L.

Cannabis sativa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1027; *Rehb.* Icon. fl. Germ.
XII, t. 655; A. DC. Prodr. XVI¹, 30; *Bentl. et Trim.* Medic. Pl. IV,
t. 231; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 248; *Hiern* Cat.
Welw. Pl. I, 994; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 214;
De Wild. Miss. Laurent (1905) 73.

1816 (Chr. Smith — Ha: Bingila Dupl. — V: le Stanley-Pool (Buett.). — XII: C. dans la zone arabe (Dew.) — XV: le Kasai; le Sankuru; Lusambo; Mange; Butala (Ém. et M. Laur.). — Noms vern.: Bangui [Bakusu]; Kiamvu [Bingila]; Dzama [Lulanza], Kabangui, Kasongo; Kmoka [Tanganka] (Dew.).

- Le *Diantha* ou *Charre* est considéré comme indigène dans les endroits de l'intérieur de l'Afrique trop. occid. près du fleuve Congo ou Zaïre. (CLARKE in *Key Journ. of Bot.* III, 9).

CHLOROPHORA Gaudich.

Chlorophora excelsa [Welch.] Benth. et Hook. f. Gen. pl. III (1881) 363; *Engl. Pl. Ost-Afr.* 160; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 49 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 49] et Reliq. Dewevr. (1901) 214.

Morus — Welch. in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 69, t. 23.

Maclura — Bureau in DC. Prodr. XVII (1873) 231.

1896 (A. Dewèvre). — V: env. de Bolobo; Lukolela (Dew.); Kisantu (Gill.). — IX: Bumba (Dew.).

DORSTENIA L.

Dorstenia Debeerstii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 23 [B. S. B. B. XXXIX², 75].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI: le Haut-Marangu (Deb.).

Dorstenia Gilletii *De Wild.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 98 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 838]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 26.

1900 (J. Gillet). — V: Kisantu (Gill.).

Dorstenia Klainei *Pierre ex Heckel* in B. S. B. Fr. XLVII (1903) 260; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 69.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII: Eala (Ém. et M. Laur.).

Dorstenia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 69, t. 32.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV: Kondue (Ém. et M. Laur.).

Dorstenia Lujae *De Wild.* Pl. nov. Hort. Thenensis, I (1907) 221, t. 50 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 123, t. 59.

1904 (Éd. Luja). — XV: le Sankuru (Luja).

Dorstenia lukafuensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 28.

1899 (Edg. Verdick). — XVI: Lukafu (Verd. 319).

Dorstenia mogandjensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 241.

1908 (Marc. Laurent). — XI: Mogandjo (M. Laur. 1906).

Dorstenia Poggei *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 146 et *Monog. Afr. Pfl.-Fam.* I [Morac.] (1898) 26, t. 6.

1876! (P. Pogge). — VI : le Kwango, vers le 10 1/2° (Pg. 204).

Dorstenia Psilurus *Welw.* in *Trans. Linn. Soc.* XXVII (1869) 71; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 10; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 29 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1901) 119; II (1907) 123, t. 60; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.*, 1025; *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* I [Morac.] (1898) 20; *De Wild. Pl. nov. Hort. Thenensis*, I, 229, t. 53; *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1904) 119; II (1908) 31 et *Miss. Laurent* (1905) 70.

1896 (Fr. Thonner). — V : Lukolela (M. Laur.). — VIII : Eala; Ikeuge (Ém. et M. Laur.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — IX a : Bobi (Thonu.). — XV : Kondœ Mukundji; Pangu (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kabaye (Verd.).

Dorstenia scabra *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 132; *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 286.

1889 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt. 12607).

Dorstenia scaphigera *Bureau* in *B. Mus. Paris*, I (1895) 60; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* II (1900) 58 et *Pl. Thonnerianae* (1900) 11; *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* I [Morac.] (1898) 19.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi près Gali (Thonu.). — XV : Bena-Dibele (Luja).

Dorstenia Verdickii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* X (1901) 20 [B. S. B. B. XL, 26].

1899 (Edg. Verdick). — XV : Lukafu (Verd.).

Dorstenia yambuyaensis *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 241.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Brixhe; Pyn. 448). — XI : Yambuya (M. Laur. 1997); Mogandjo (M. Laur. 2000).

TRYMATOCOCCUS Poepp. et Endl.

Trymatococcus Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1904) 119, t. 26.

1901 (J. Gillet). — V : Kimueuza (Gill. 2194).

Trymatococcus kamerunianus [*Engl.*] *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* I [Morac.] (1898) 29, t. 11, fig B; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.*, 1024, *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1904) 119.

Dorstenia — *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1895) 142.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2841).

FICUS L.

Ficus ardisioides *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 172 et in *Warb.* et *De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 16, t. 24.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3382).

Ficus artocarpoides *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 23, t. 3.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 2014).

Ficus Bubu *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 3, t. 8; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 70.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1167). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Ficus Cabrae *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 9.

1896 (Alph. Cabra). — Ind. uou cl. : village de Sigmate (Cabra, 36).

Ficus capensis *Thunb.* *Diss. Fic. gen.* (1786) 13; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 161.

Le type croît dans l'Afrique austr. et trop.

— — var. **pubescens** *Warb.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 215.

1895 (A. Dewèvre). — IV : Lukungu (Dew. 465).

Ficus chlamydodora *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 163 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 161, t. 8; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 215; *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 12.

1896 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 129).

Ficus congensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 59; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 215; *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 8.

1874 (Fr. Naumaun). — II : Boma (Naum. 233); îles du Congo près de Malela. — Nom veru. : **Fumu** (Dew. 176).

Ficus corylifolia *Warb.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 215 et in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 27; *De Wild.* Miss. Laurent. (1905) 70 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 236.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill. 815, 1309) : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Itali** (Dew.). — XII d : pays des Maugbettu (Schw.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

- F. corylifolia** var. **glabrescens** *Warb.* in *Warb. et De Wild.*
Ficus du Cgo, I (1904) 28.
1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1259).
- Ficus crassica** *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I
(1904) 11, t. 21.
1891 (F. Demeuse). — V : Lukolela (Dem. 469).
- Ficus cyathistipula** *Warb.* in *Engl. Jahrb. XX* (1894) 173, in *Engl.*
Pfl. Ost-Afr. 104, t. 10 A-E et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo,
I (1904) 13, t. 27; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 70.
1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bombaie; Paugu (Ém. et M. Laur.).
- Ficus Demeusei** *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904)
20, t. 14.
1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 416).
- Ficus Dewevrei** *Warb.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr.
(1901) 215 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 18.
1896 (A. Dewèvre). — XI : Lokandu (Dew. 1102).
- Ficus Dusenii** *Warb.* in *Engl. Jahrb. XX* (1894) 168 et in *Warb. et*
De Wild. Ficus du Cgo, I (1904) 20.
1900 (J. Gillet). — V : Kisantu. — Nom vern. : Sanda (Gill. 741).
- Ficus erubescens** *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I
(1904) 29, t. 6; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 70.
1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : Bokala (Ém. et M. Laur.); Kisantu
(Gill. 440, 744a, 1146, 1321). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).
- Ficus exasperata** *Vahl* Enum. pl. II (1806) 197; *Hook.* in *Lond.*
Journ. of Bot. (1848) t. 14; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 161; *De Wild.*
et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 54.
1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).
- Ficus furcata** *Warb.* in *Engl. Jahrb. XX* (1894) 173; *Th. Dur.* et
Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 249; *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo,
I (1904) 17, t. 21; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 71.
1870 (G. Schweinfurth). — Congo. — Nom vern. : Itutangali; Onene (Dew.). —
XII d : Muuza (Schw.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.)
- Ficus Gilletii** *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904)
19, t. 1.
1904 (J. Gillet) — V : Kisantu (Gill. 1120).

Ficus inkasuensis Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 23.

1893 (Ém. Laurent). — IX : Inkasu [rég. de Bumba] ; plauté dans les villages (Ém. et M. Laur.).

Ficus kimuenzensis Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 23.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2170).

Ficus kisantuensis Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 22, t. 5 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 236.

1900 (J. Gillet). — V : Kisautu (Gill. 598).

Ficus Laurentii Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 21.

1895 (Ém. Laurent). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Obs. — Il faut peut-être rapporter à cette espèce, des échantillons récoltés par M. G. Schweinfurth à Muuza [XII d] (Warb. l. c.).

Ficus Lingua Warb. in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 24 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 71.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Lokandu (Dew. 1136). — XIII c : env. de la Lowa (Dew. 1136). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).

Ficus megalodisca Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 2, t. 2.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1747).

Ficus megaphylla Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 2.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Muuza : Kusumba (Schw.).

— — var. **glabra** Warb. l. c. 1 (1904) 2.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Liuduku (Schw.).

Ficus monbuttuensis Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 11, t. 25.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Muuza (Schw.).

Ficus Munsae Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 29, t. 17.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Muuza (Schw.).

Ficus Nekkuku *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 5, t. 4.

1900 (Witterwulgho). — XII : zone de Makrakra [distr. de l'Uelé] (Witterw.).

Ficus nianniamensis *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 14, t. 20; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 71.

F. syringaefolia *Warb.* [non *Kunth* et *Bouche*] in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 170 pr. p.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — XV : env. de Munungu; Munkundji (Ém. et M. Laur.); Bukila (Ém. et M. Laur.).

Ficus octomelifolia *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 1.

1896 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra).

Ficus pachypleura *Warb. ex De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 4; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 236.

1896 (A. Dewèvre). — II a : entre Shimbanza et Maugwala (Cabra, 93, 96). — VI : Tumba-Mani (Cabra et Michel). — VIII : Bokakata (Dew.).

Ficus paludicola *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 38, t. 12; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 236.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombazi (Gill.).

Ficus persicaefolia *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 162 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 15, t. 16.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3346, 3564).

— — var. **angustifolia** *Warb.* l. c. (1904) 15.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1534).

— — var. **glabripes** *Warb.* l. c. (1904) 15.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

Ficus platyphylla *Delile* Cent. pl. Méroë (1826) 62; *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 4.

1897 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra, 37, 62).

Ficus polybractea *Warb.* in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 7.

1895 (A. Dewèvre). — VIII : Équateur (Dew. 1168 a). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew.).

Ficus Preussli *Warb.* in Engl. Jahrb. XX (1894) 156 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) t. 18; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Dikanda** (Dew. 843).

Ficus pubicosta *Warb.* in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 16.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Katala (Dew. 141).

Ficus punctifera *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 35 t. 7; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 71 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 236.

1896 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 17). — II a : **Tomvo** (Ém. et M. Laur.). V : Kisantu (Gill. 236, 345, 648). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.); — Noms vern. : **Kuïa** [Tomvo]; **Lukuio** [Djabbir] (Dew.).

Ficus Rokko *Warb.* et *Schweinf.* in Engl. Jahrb. XX (1894) 164 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 162; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 249; *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 14; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 214.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : à l'E. et au S. de Shimbanza (Cabra, 67). — IV : Lukuugu. — Nom vern. : **Sanda** (Dew. 451). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3518, 3541, 3592, 3692). — XVI : Moliro (Desc.).

Ficus scolopophora *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 33.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1294).

Ficus stellulata *Warb.* in Engl. Jahrb. XX (1894) 152 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 26.

Le type croît au Kamerun.

— — var. **glabrescens** *Warb.* l. c. (1904) 27.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 447, 905).

Ficus subcalcarata *Warb.* et *Schweinf.* in Engl. Jahrb. XX (1894) 155; *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 9, t. 26.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Muuza (Schw. 3624).

Ficus syringaefolia *Warb.* [non *Kunth* et *Bouché*] in Engl. Jahrb. XX (1894) 170.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Linduku (Schw. 3134).

Ficus triangularis *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 174; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216.

1896 I (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Ficus Vallis-Choudae *Delile* in *Annal. sci. nat.* Sér. 2, XX (1843) 94; *Ferret et Galinier* *Voy. en Abyss.* t. 1; *Warb.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 161 et in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 26, t. 23; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 71.

1888 (Fr. Hens). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateurville [Wangata]. — Noms veru. : Itadje et Itedji (Dew.); Coquilhatville (Ém. et M. Laur.). — IX : Bangala (Hens); Mobeka (Ém. et M. Laur.).

Ficus variifolia *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 30.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Kibali [Mangbettu] (Schw.).

Ficus villosipes *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 28.

1895 (A. Dewèvre). — IV : env. de Lukungu (Dew. 465).

Ficus Wildemaniana *Warb.* in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 217 et in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 7; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 71.

1895 (A. Dewèvre). — VII : Kutu; Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur. — Nom vern. : *Sonkunu* (Dew. 562).

Ficus xiphophora *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 34, t. 9 et 10; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 71 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 236

1902 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 169, 433, 2337). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

SCYPHOSYCE Baill.

Scyphosyce Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 26.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

BOSQUIEA Thou.

Bosquiea angolensis [*Welw.*] *Ficalho* *Pl. Uteis* (1884) 271; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, II (1901) 99 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 839]; *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 5-10.

B. *Welwitschii* *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* [Morac.] (1898) 36; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 59 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 217; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 70.

1896 (A. Dewèvre). — II a : le Mayumbe (Fuchs). — IV : Luvituku (Luja); la Lemfu (Fuchs.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — Noms vern : **Sekene; Sekenia; Sakagna; Sekegna** (Fuchs).

BOSQUIEOPSIS De Wild. et Th. Dur.

Bosquieopsis Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 100 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 840].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1742).

TRECULIA Decne.

Treculia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 54; Ill. fl. Cgo (1900) 139, t. 70 et Reliq. Dewevr. (1901) 217; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 70.

1896 (A. Dewèvre). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — IX : Ile près de Umangi (Dew.).

Treculia Engleriana *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1900) 140 in obs. et Pl. Gilletianae, I (1900) 49 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 49].

T. africana *Engl.* [non *Decne*] Monog. Afr. Pfl.-Fam. I [Morac.] (1898) 32, t. 12-14.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu, aux bords de l'Inkisi (Gill. 20).

MYRIANTHUS P. Beauv.

Myrianthus arborea *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 16, t. 11, 12; *R. Br.* in Capt. Tuckey's Narrat. Append. 453; *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 162; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 54; II (1900) 58; *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. I [Morac.] (1898) 38, fig. 3; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 71, (1907) 377 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 31.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe, C. (Ém. Laur.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : distr. du Stanley-Pool (Ém. Laur.); Kisantu. — Nom vern. : **Muntusu** (Gill.). — VII : vallée de la Fini (Ém. Laur.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XII d : Kusumba (Schw.). — XV : le Sankuru (Dem.); Muunugu (Ém. et M. Laur.).

* **Artocarpus incisa** *L. f.* Suppl. pl. (1781) 411; Bot. Mag. (1828) t. 2869-2871; *T. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 249; *De Wild. et Th. Dur.* Cont. fl. Cgo, I (1899) 54.

Cultivé au pays des Bangala [IX] (Ém. Laur.) : à Boma [II] ; à Ponta da Lenha, etc. (Dup.).

MUSANGA R. Br.

Musanga Smithii R. Br. in Capt. Tuckey's Narrat. Append. (1818) 453 et in *Bennett* Pl. Javan. rarior. (1838) 49; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 250; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 49 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 49; *Engl. Monog. Afr. Pl.-Fam.* I [Morac.] 1898) 42, fig. 4, t. 18; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 11-15 et Miss. Laurent (1905) 72.

M. cecropioides R. Br. ex *Teddies* in *Bowdich* Miss. Ashant. (1819) 372; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 995.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Ém. Laur.). — II a : la Lukula (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XII : pays des Maugbettu (Schw.) et des Bajandi [Aruwimi] (Ém. Laur.). — XV : Mukenge (Pg.).

Obs. — Une des plantes caractéristiques de la forêt du Bas-Congo aux Grands Laes (De Wild.).

FLEURYA Gaudich.

Fleurya aestuans [L.] Gaudich. in *Freycin.* Voy. de l'Uranie (1826) 497; *Wedd.* in *DC.* Prodr. XVI¹, 71; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 250; *Engl. Pl. Ost-Afr.* 163; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) [B. S. B. B. XXXVI², 80]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I 988; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 218; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 31, t. 29.

Urera — L. Sp. pl. ed. 2 (1763) 1397.

1885 (R. Buettner). — II a : Biugila (Dup.); Shinganga (Dew.). — V : Suata (Buett.); Kisantu (Gill.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Lulanga. — Nom vern. : Lusaka (Dew.); Bokakata (Dew.). — IX : Baugala (Heus); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Gulumu-Kumba (Verd.); Albertville [Toa] (Hecq; Desc.).

Fleurya interrupta [L.] Gaudich in *Freycin.* Voy. de l'Uranie (1826) 497, in adl.; *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI, t. 1975; *Wedd.* in *DC.* Prodr. XVI¹, 74; *Schlechter* Westafri. Kautsch.-Expd. (1900) 286.

Urtica — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 985.

1889 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12537).

Fleurya podocarpa *Wedd.* in *DC.* Prodr. XVI¹ (1869) 76; *Engl. Pl. Ost-Afr.* 163; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 80]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 218; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 29 et Miss. Laurent (1903) 73.

1893 (P. Dupuis). — II a : Kibinga (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.) — VIII : Coquilhatville (Dew.); Ikenge; Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

URERA Gaudich.

Urera arborea *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 44 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 52]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 218.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 618).

Urera cameroonensis *Wedd.* in *DC. Prodr.* XVI¹ (1869) 97; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 250.

1893 (Ém. Laurent). — II : Ile des Princes (Ém. Laur.)

Urera congolensis *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 42 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 50]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 219.

1895 (A. Dewèvre). — XIII a : forêts des Stauley-Falls (Dew.).

Urera Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 41 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 49]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 219.

1896 (A. Dewèvre). — XI : forêts de Lokandu. — Nom vern. : Lusamba-Samba (Dew. 1116).

Urera Gilletii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 340.

1902 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 2312).

Urera Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 72, t. 20.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — X : Imese [Ubangi] (Ém. et M. Laur.).

Urera oblongifolia *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 515; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 73.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Urera Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 40 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 48]; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 11.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 29).

GIRARDINIA Gaudich.

Girardinia condensata [*Hochst.*] *Wedd.* in *Archiv. Mus. Paris*, VIII, (1855-1856) 169; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 163; *Wedd. in DC. Prodr.* XVI¹, 103.

Urtica — *Hochst. ex Steud.* in *Flora*, XXXIII (1850) 260.

Le type croît en Abyssinie.

G. condensata var. **adoensis** [Wedd.] Engl. ex De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 173.

M. adoensis Wedd. in Annal. sci. nat. Sér. 3, XVIII (1852) 203.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom. vern. : Kibonge-Makungi (Verd.).

BOEHMERIA Jacq.

Boehmeria platyphylla Don Prodr. fl. Nepal. (1825) 60; Wedd. Monog. Urtic. 364 et in DC. Prodr. XVI¹, 210; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 578; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 50].

1897 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

POUZOLZIA Gaudich.

Pouzolzia denudata De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 46 [B. S. B. B. XXXVIII², 54]; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 220; De Wild. Miss. Laurent (1905) 73.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew. 1164 a).

Pouzolzia Dewevrei De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 45 [B. S. B. B. XXXVIII², 53]; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 221.

1896 (A. Dewèvre). — V : village de Moe [env. de Bolobo] (Dew. 728).

Pouzolzia guineensis Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 518; Wedd. in DC. Prodr. XVI¹, 263; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 50] et Reliq. Dewevr. (1901) 221; De Wild. Miss. Laurent (1905) 73.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Lokaudu (Dew.). — Nom. vern. : Katakumba [Tanganika] (Dew.).

CERATOPHYLLACEAE

CERATOPHYLLUM L.

Ceratophyllum demersum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 992; DC. Prodr. III, 73; Fl. Danica, XII, t. 2000; Boiss. Fl. Orient. IV, 1202; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 639; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1899) 58; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 1031; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 122 et Miss. Laurent (1905) 20.

C. vulgare Schlechtendal in Linnaea, XI (1837) 540, t. 2.

1899 (Éd. Luja). — V : Kisantu ; Kimuenza (Gill.) ; le Kasai ; le Stanley-Pool (Luja). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XV : Isaka (Ém. et M. Laur.).

MONOCOTYLEDONEAE

HYDROCHARITACEAE

LAGAROSIPHON Harv.

Lagarosiphon Schweinfurthii *Casp.* in Bot. Zeit. XXVIII (1870) 88 ; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 3 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 101 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 841] ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 94.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1006).

VALLISNERIA L.

Vallisneria spiralis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1015 ; *Hook.* Bot. Miscell. III, 87, t. 23-24 ; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 5.

1885 (C. Callewaert). — V : le Stanley-Pool (Callew.).

OTTELIA Pers.

Ottelia halogena *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 48 [B. S. B. B. XXXVIII², 56] ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Recliq. Dewevr. (1901) 221.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d ; Kasongo (Dew.). — XIII e : env. de Nyangwe (Dew. 944). — Noms vern. : **Kolekole** [Ikwangula] ; **Kesekemeka** [Kasongo] ; **Monkwe** [Tauganika] (Dew.).

Ottelia lancifolia *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 280, t. 95 ; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 7.

Le type croît dans l'Afrique trop. or. et l'Angola.

— — var. **fluitans** *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) 238 ; *C. H. Wright* l. c. ; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 197.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Tumba (Ém. et M. Laur.).

Ottelia Verdickii *Guerke* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 171.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lac Moero (Verd.).

BOOTTIA Wall.

Boottia abyssinica *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) 239 ;
C. H. Wright in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 9.

1870 (G. Schweinfurth). — M. Wright (l. c.) croit pouvoir rapporter à cette espèce une forme à fl. blanches, le n. 3638 récolté dans le pays des Maugbetu [XII d] (Schw.).

BURMANNIACEAE

BURMANNIA L.

Burmattia bicolor *Mart.* Nov. gen. et sp. I (1824) 10, t. 5, fig. 1.

Le type croit dans l'Abyssinie.

— — var. **africana** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXV (1887) 85 ;
C. H. Wright in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 41 ; *De Wild.* Étud. fl.
 Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 122.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2596). — XIII :
 Prov. Orient. (Ser. 682).

Burmattia Braunii *Engl.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo
 II (1908) 234 [nom. tant.].

1893 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.).

ORCHIDACEAE

LIPARIS L. G. Rich.

Liparis guineensis *Lindl.* in Bot. Reg. (1834) t. 1671 ; *Ridl.* in Journ.
 Linn. Soc. XXII (1887) 260 ; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 20 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 111.

1902 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1794).

BULBOPHYLLUM Thou.

Bulbophyllum andongense *Rehb. f.* in Flora, XLVIII (1865) 184 ;
Rendle Cat. Welw. Pl. II, 3 ; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 31 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 115.

1903 (L. Gentil). — XIII c : Kinumbi (Gent.).

Bulbophyllum barbigerum *Lindl.* in Bot. Reg. XXIII (1837) t. 1942; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 34; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 115; II (1908) 237; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 309, t. 23 et Miss. Laurent (1905) 55, fig. 11, t. 26.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. : Pyn. 492, 566, 1161).

Bulbophyllum calamarium *Lindl.* in Bot. Reg. (1843) misc. 70; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 33; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 123; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 115; II (1908) 237 et Miss. Laurent (1905) 53.

1903 (L. Gentil). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 883; Pyn.). — XIII c : Kinumbi (Gent.).

Bulbophyllum flavidum *Lindl.* in Bot. Reg. (1840) misc. 83; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 30.

Le type croît à Sierra-Leone.

— — var. **elongatum** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 122 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.).

Bulbophyllum Kindtianum *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 309 et Miss. Laurent (1905) 53, t. 26.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : la Loliva (M. Laur.).

Bulbophyllum nanum *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 122 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1900 (Marc. Laurent). — VIII : Bokele [le Ruki] (M. Laur. 178).

Bulbophyllum platyrachis [*err. cal. platirachis*] *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 223, t. 55 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 237.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : le Ruki (M. Laur.); Injolo (M. Laur. 1766, 2055).

Bulbophyllum Schinzianum *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 49 [B. S. B. B. XXXVIII², 57]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 123 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116; II (1908) 237.

1892 (F. Demeuse). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 32, 830, 1747; Pyn. 1451). — X : l'Ubaugi (Dem.). — XV : Luebo (Ém. Laur.); Luluabourg (Lescr. 311).

ANCISTROCHILUS *Rolfe.*

Ancistrochilus Thomsonianus [*Rchb. f.*] *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 44.

Pachystoma Thomsonianum *Rehb. f.* in Gard. Chron. (1879) II, 582; *Rehb. f.* Xen. Orch. III, 35, t. 213; Bot. Mag. (1880) t. 6471.

Le type croît dans le Vieux-Calabas.

A. Thomsonianus var **Gentilii** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 128 cum xyl. et Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, I (1904) 117, (1906) 234.

1903 (L. Gentil). — VIII : rég. du Lopori (Biel.). — XIII c : Kinumbi (Gill.).

GENYORCHIS Schl.

Genyorchis pumila [*Sw.*] *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 280 et in Engl. Jahrb. XXXVIII (1907) 12, fig. 5; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113; II (1908) 237; Rev. hort. Belg. (1905) 61, cum ic.

Dendrobium — *Sw.* in *Schrad.* Neues Journ. f. Bot. I (1806) 97.

Bulbophyllum — *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1830) 51.

Polystachya bulbophylloïdes *Rolfe* in Kew. Bull. (1900) 199 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 131.

• 1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 33, 1716; Pyn. 580).

MEGACLINIUM Lindl. (1)

Megaclinium Arnoldianum *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 55.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.).

Megaclinium congolense *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 21, 117 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 127.

1892 (Ém. Laurent). — IV : route des caravanes (Ém. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.).

Megaclinium djumaense *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 124 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2900).

Megaclinium Gentilii *De Wild.* in Belg. colon. (1902) 425 et in Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 23.

1902 (L. Gentil). — XV : cbutes du Lubi à Kalala-Kafumba (Gent.).

Megaclinium Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 22.

1902 (J. Gillet) — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2773 b).

(1) M. R. Schlechter [Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 281] indique une nouvelle espèce, qu'il appelle *Bulbophyllum* [*Megaclinium*] *congolatum*, au Kamerun et au Congo français et il ajoute en observation « Ich habe diese Art im ganzen Flussgebete des Congo sehr häufig beobachtet ».

Megaclinium Laurentianum [*Kraenzl.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 22 in obs. 117; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 128 et Miss. Laurent (1905) 56.

Bulbophyllum — *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 50. 1895 (Ém. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.); Lac Léopold II (Ém. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 135). — XIII c : Kinumbi (Gent.).

Megaclinium maximum *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1830) 47; *Ridl.* in Journ. of Bot. XXIV (1886) 292; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 38; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2479).

Megaclinium minus [*err. cal. minor*] *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 125 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1903 (L. Gentil). — XIII c : Kinumbi [Haut-Lomami] (Gent.).

Megaclinium purpureorachis *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 126 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116, (1906) 235; II (1907) 123, t. 61; (1908) 237.

1903 (L. Gentil). — XII c : env. de Gombari (Ser. 566); Rungu (Ser. 866 b); Nala et env. (Van Ryss.; Ser.). — XIII c : Kinumbi [Haut-Lomami] (Gent.).

EULOPHIA R. Br.

Eulophia Bieleri *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1904) 311 et Miss. Laurent (1905) 51.

1903 (S. Bieler). — VIII : Coquilhatville; [cult. à Eala] (Biel. in M. Laur. 206).

Eulophia congoensis *Cogn.* in Journ. des Orchid. VI (1895) 155 et in *Lindenia*, XI (1895) 15, t. 486.

1895 (Coll.?). — Congo (Coll.?).

Eulophia cyrtosoides *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exp. (1900) 279 [nom. tant.] et in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 10.

1899 (R. Schlechter). — V : Lukolela (Schlt. 12643).

Eulophia gracilis *Lindl.* in Bot. Reg. IX (1823) t. 742; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 51; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 58; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 236 et Miss. Laurent (1905) 52.

1898 (Éd. Luja). — IV : Sona-Gongo (Luja). — V : Kinshasa (Schlt.); env. de Lukolela (M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XV : Batempa (M. Laur.).

Eulophia graciliscapa *Schlechter* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 418; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 569; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 234.

E. gracilis *De Wild.* [non *Lindl.*] Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1098, 2319, 3608).

Eulophia guineensis *Lindl.* in Bot. Reg. VIII (1822) t. 686; Bot. Mag. (1824) t. 2467; *Lodd.* Bot. Cab. IX (1824) t. 818; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 21; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40; II (1898) 52 [B. S. B. B. XXXVI², 80 et XXXVIII², 60] et Pl. Thonnerianae (1900) 9; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 69; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 24, (1904) 114; II (1908) 236.

1885 (C. Callewaert). — Bas-Congo (Cabra). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : le Stanley-Pool (Callew.); Kisantu (Van Houtte). — IX : Masanga près Monvedo (Thonn.). — XII c : Nala (Ser. 630).

Obs. — Espèce cultivée à Eala [VIII] (M. Laur. 1787; Pyn. 427).

Eulophia Laurentiana *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 52; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1904) 222 et Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 50].

1895 (Ém. Laurent). — IV : bords de la Pioka (Ém. Laur.); Kimuenza (Dew. 514); Kisantu (Gill. 211).

Obs. — M. R. Schlechter réunit cet *Eulophia* à l'*E. gracilis* *Lindl.*

Eulophia Leopoldi *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 45 [B. S. B. B. XXXVIII², 215]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 235.

1898 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.). — VI : Tumba-Mani et env. (Cabra et Michel).

Eulophia Lubbersiana *Ém. Laur.* et *De Wild.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 46; *Ém. Laur.* in Rev. Hort. Belge, XXVI (1900) 3, t. 1; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114.

1895 (Ém. Laurent). — XV : le Sankuru (Ém. Laur.); chutes du Lubi (Gent. 68).

Eulophia Lujaeana *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 47 [B. S. B. B. XXXVIII², 217]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114.

1898 (Éd. Luja). — Bas-Congo (But. in Gill. 1811). — V : env. de Léopoldville (Luja, 99 pr. p.); Kimuenza (Gill. 1778); bords de la Sele (But. in Gill. 1463).

Eulophia lurida [*Pers.*] *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1833) 182; in Bot. Reg. (1835) t. 1821 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 132; *Th. Dur.*

et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 54 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 59]; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 53; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114; II (1908) 236.

Limodorum luridum Pers. Syn. pl. II (1807) 521.

1893 (Ém. Laurent). — IV : route des caravanes (Ém. Laur.). — V : Sanda (Van Houtte). — XI : Yambuya (M. Laur. 1614 b, 1736). — XV : Gumbumi (M. Laur. 499).

E. lurida var. **latifolia** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 129; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114; II (1908) 236 et Miss. Laurent (1905) 53, t. 25.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2806). — VIII : env. d'Enla (M. Laur. 45); Baringa-Yala (Bruu.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XII c : Gombari (Ser. 732). — XIII a : Stanleyville (M. Laur. 1014).

Eulophia Smithii *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 54.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Eulophia speciosa *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 63; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 23.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : bords du Tanganika (Deb.); le Katanga (Verd. 1900).

Eulophia Tanganyikae *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 46 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 216].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Eulophia Walleri [*Rehb. f.*] *Kraenzl.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 157; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 67; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 23.

Cyrtopera — *Rehb. f.* Otia Hamb. II (1881) 117.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd.).

Eulophia Welwitschii *Rolfe* in Bolet. Soc. Brot. VII (1889) 236 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 61; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114, (1906) 235.

1895 (A. Dewèvre). — V : bord de la Sele (But. in Gill. 1472); entre Dembo et Kisautu (Gill. 1538); entre Dembo et le Kwango (But. in Gill. 1492, 1499). — VI : Kimbunga (Gent. 107). — Ind. non cl. : Kabembele (Cabra et Michel, 54).

EULOPHIDIUM Pfitz.

Eulophidium Ledieni [*Stein*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 115; II (1908) 237.

Eulophia Ledieni Stein in Verh. d. Schles. Gesellsch. vaterl. Kultur (1886) ex Stein in Gartentflora (1888) 609, in syn.; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 50. *Eulophia maculata* Auct. plur. [non Lindl.]: *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 23 pr. p. et Étud. fl. Cgo (1896) 251; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 50].

1887 (F. Ledieu) — Bas-Congo (Led.). — V : Kisantu (Gill. 431, 1101). — XII c. Rungu (Ser. 622); Wanga (Ser. 297). — XV : bassin du Lubi (Gent. 68); Gumbumi (M. Laur. 613). — Espèce cultivée à Eala [VIII] (M. Laur. 747; Pyn. 426).

LISSOCHILUS R. Br.

***Lissochilus antennisepalus* Rehb. f.** in Flora, LXV (1882) 533; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 77.

Eulophia — *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 279.

1898 (R. Schlechter). — V : Kinshasa (Schlt.).

***Lissochilus arenarius* Lindl.** in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 133; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 82, 578; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 236.

Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) 185.

1899 (Edg. Verdicke). — XII c : entre Vankerkhovenville et Faradje (Ser. 524). — XVI : Lukafu (Verd. 314).

***Lissochilus dilectus* Rehb. f.** Otia Hamb. I (1878) 62; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 28 et Étud. fl. Cgo (1896) 252; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 83; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 54 [B. S. B. B. XXXVIII², 62]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 223; Pl. Gilletianae, I (1900) 50; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 51 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 236.

Eulophia — *Schlechter* West-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 279.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Malela (Ém. Laur.). — II a : entre Tshoa et Boma-Sundi. — Nom vern. : **Kwisa** (Cabra). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : env. de Kwamouth (Biel.); le Stanley-Pool (Ém. Laur.); Léopoldville (Dew.); Kinshasa (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Maniema (Ém. Laur.). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.); Munungu (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Molowery (Leser. 199).

***Lissochilus elatus* Rolfe** in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 87.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

***Lissochilus giganteus* Welw. ex Rehb. f.** in Flora, XLVIII (1865) 187; *Rehb. f.* in Gard. Chron. (1888) I, 616, fig. 83; Ill. hort. (1888) 49, t. 53; Orchid Alb. X (1893) t. 457; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 28 et Étud. fl. Cgo (1896) 252; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 6; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 87; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 113, (1906) 235; II (1908) 236 et Miss. Laurent (1905) 51.

Eulophia — *N. E. Br.* in Kew Bull. (1889) 90.

1883 (H. Johnston). -- Bas-Congo (Johnst. Dem.). — II : env. de Boma (Dew. 173); Sisia (Dup.). — V : Kisantu (Gill. 1260); Dembo (Vanderyst); Sanda (Verm.). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 299); Eala et env. (M. Laur. 1208, 1760, 1763; Pyn. 627, 637, 1275); Ikenge (Ém. Laur.). — XII c : Nala (Van Ryss.). — XII d : entre Vankerkhovenville et Faradje (Ser. 533). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.). — Ind non cl. : Golongo (Lescr. 409).

Lissochilus Horsfallii Batem. in Bot. Mag. (1865) t. 5486 et Second Cent. Orchid. Pl. 1. 121; *Kraenzl.* in Engl. Jahrb. VIII (1886) 439; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 29 et Étud. fl. Cgo (1896) 252; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 84.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum. 157).

Lissochilus katangensis De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 22.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Lissochilus Leopoldi *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 53 [B. S. B. B. XXV VIII², 61].

1895 (Ém. Laurent). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.).

Lissochilus Lindleyanus *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) 65; *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo. III (1899) 54 [B. S. B. B. XXXVIII², 62]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 223; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 77; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 113 et Miss. Laurent (1905) 51.

Eulophia — *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 279, in obs.

L. longifolius *Lindl.* [non *Benth.*] in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 133.

1896 (Ém. Laurent). — V : env. de Léopoldville (Gill.); entre Léopoldville et Sabuka (Luja); Kimueza (Gill.); entre Dembo et le Kwango (But.); Lukolela (Ém. et M. Laur.). — XI : entre Ikora et Kisesenge-Sanga; entre Bena-Kamba et Lokandu [XIII c] (Dew.). — XIII c : plaine marécageuse sur la route de Kinumbi-Lekandu (Gent.). — XIII d : marais de Malela vers Nyangwe (Ém. Laur.). — XV : la Loanje (Gent.).

Lissochilus porphyroglossus *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) 61; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 30 et Étud. fl. Cgo (1896) 252; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 84.

Eulophia — *Bolus* in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) 133.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kiushasa (Schlt.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — XII d : Munza (Schw.).

Lissochilus purpuratus *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 331; *Rchb. f.* in Flora, XLV (1865) 188 et Otia Hamb. I, 63; II, 75, 114; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 79; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 22.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : rég. du Lac Tanganika (Deb.); le Katanga (Verd.).

Lissochilus pyrophilus *Rehb. f.* Otia Hamb. I (1878) 65; *Rolfé* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 74; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113.

Eulophia — *Schlechter* ex *De Wild.* l. c. I (1904) 113, in syn.

1900 (R. Butaye). — V : entre le Kwango et Dembo (But. in Gill. 2231).

Lissochilus roseus *Lindl.* in Bot. Reg. (1843) misc. 25, (1844) t. 12; *Kraenzl* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 54 [B. S. B. B. XXXVIII², 62]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 223; *Rolfé* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 85 et 578.

1895 (Ém. Laurent). — VIII : env. d'Équateurville. — Nom vern. : **Bokobele** (*Dew.* 572). — IX : Bangala (Ém. Laur.).

Lissochilus seleensis *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 13t et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114, (1906) 235, t. 52.

1900 (R. Butaye). — V : bassin de la Sele (But. in Gill. 1249). — VI : bassin de la Tawa [Kwilu] (Cabra et Michel).

Lissochilus stylites *Rehb. f.* Otia Hamb. I (1878) 61; II (1881) 75 et in Flora, LXV (1885) 379; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 31 et Étud. fl. Cgo (1896) 253; *Rolfé* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 83.

1900 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

ANSELLIA *Lindl.*

Ansellia africana *Lindl.* in Bot. Reg. XXVIII (1842) sub t. 12; Gartenfl. (1854) t. 95; Bot. Mag. (1857) t. 4965; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 251; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 55; *Rolfé* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 101; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113 et *Miss. Laurent* (1905) 65.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo orient. (Ém. Laur.). — V : Pese (G4r.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII c : bords de l'Obec, sur la route de Niangara à Gombari (Ser.). — XV : le Kasai; le Lualaba (Ém. Laur.); Ibaka; env. de Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Ansellia congoensis *Rodig.* in Ill. hort. XXXIII (1886) 143; *N. E. Br.* in *Lindenia*, II (1886) 35, t. 64; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 32 et Étud. fl. Cgo (1896) 252; *Rolfé* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 102; *Ém. Laur.* in Rev. hort. Belg. (1899) 193, t. 18; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 55.

1886 (Aug. Linden). — Bas-Congo (Aug. Linden). — II : Ile Mateba (Ém. Laur.)

POLYSTACHYA Hook.

Polystachya affinis Lindl. Gen. et sp. Orch. (1830) 73; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 126; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112, t. 42; II (1907) 122, fig. 3, (1908) 235; Miss. Laurent (1905) 65, fig. 13 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 314, t. 20.

P. bracteosa Lindl. Bot. Reg. (1840) misc. 48; Bot. Mag. (1845) t. 4161.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Irebu (M. Laur.); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — XII b : le Bekele près Bama (Ser.). — XII c : env. de Surango (Ser.).

Polystachya epiphytica De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 172.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Tintamoi (Verd. 261).

Polystachya Gilletii De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 313 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 231, t. 56.

1900 (L. Gentil). — Bas-Congo (Gill. 3105). — VIII : la Monboyo (Gent.).

Polystachya golungensis *Rchb.f.* in Flora, XLVIII (1865) 185 et Otia Hamb. I, 60; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 35 et Étud. fl. Cgo (1896) 253; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 118.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3450).

Polystachya gracilis De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 136; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113 et Miss. Laurent (1905) 67, fig. 16.

1903 (L. Gentil). — XV : Mukanda-Monene [Lubue] (Gent. 45 b).

Polystachya Huyghei De Wild. in Le Congo I, n. 23 (1904) 5, cum ic. et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 315, cum xyl.

1903 (P. Huyghe). — VIII : env. d'Eala (Huyghe).

Polystachya Kindtiana De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 21.

1901 (J. Gillet). — V : rég. de Kisantu (Gill. 2109).

Polystachya latifolia De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 138, (1904) 319, fig. 14; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113 et Miss. Laurent (1905) 65.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2087). — VII : Basenga [Lukenie] (Gent. 30 b). — VIII : Lac Tumba (Ém. Laur.). — XIII c : Kinumbi [Haut-Louami] (Gent.). — XV : Bas-Kasai (Ém. Laur.).

Polystachya Laurentii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 132; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112, 233 et Miss. Laurent (1905) 67, t. 29.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala : Bamania (M. Laur.).

Polystachya mayombensis *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 134, (1904) 317; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112' (1906) 233 et Miss. Laurent (1905) 67, t. 30.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : zoue du Mayumbe (Ém. et M. Laur.); rég. de Tshela (Coll. ?).

Polystachya mukandaensis *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 139 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113.

1902 (L. Gentil). — XV : Mukanda-Monene [le Lubue] (Gent. 45).

Polystachya mystacioides [*err. cal. mystacioides*] *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 133; *Gooss.* Dict. iconog. Orchid. (1905) [Polystachya] t. 2; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112, (1906) 233; II (1908) 255 et Miss. Laurent (1905) 67, t. 31.

1900 (L. Gentil). — VIII : Losenge [la Momboyo] (Gent.); rég. du Lopori (Biel.); Dikila-Yala (Brun.). — Espèce cultivée à Eala [VIII] (Pyn. 494).

Polystachya odorata *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 130; *Kraenzl.* in *Rehb. f.* Xen. Orchid. III, 90, t. 248, fig. 14-16, t. 249, fig. 4; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 113; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112.

1903 (L. Gentil). — XIII c : Kiunmbi (Haut-Lomami) (Gent.).

Polystachya polychaete *Kraenzl.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 50; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 120; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 25, t. 22 et Rev. Hortic. belg. et étrang. (1905) 63 [et xyl. p. 62].

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.; M. Laur. 1241; Pyn. 425, 653, 1320); Basankusu (Brun.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

Polystachya ramulosa *Lindl.* in Bot. Reg. (1838) misc. 76; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 118; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112 et Miss. Laurent (1905) 68.

1900 (L. Gentil). — VIII : Lolamanga [Monboyo] (Gent.); rég. du Haut-Lopori (Biel.); Injolo (M. Laur. 1786). — XIII c : rives du Bomokandi (Ser. 644).

Polystachya rhodoptera *Rehb. f.* in Hamb. Gartenzeit. XIV (1858) 214; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 109; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112.

1903 (P. Huyghe). — VIII : env. d'Eala (Huyghe).

Polystachya tessellata *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 130; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 7; *Rolfe* in *Dyer*. Fl. trop. Afr. VII, 114; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112.

1895 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Schlt.).

Polystachya Wahisiana *De Wild.* in Belg. colon. (1904) 183, c. xyl.; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 318, t. 21 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 233.

1900 (L. Gentil). — VIII : Bokatela (Gent.).

CYRTOPERA Lindl.

Cyrtopera flavo-purpurea *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) 68; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 38 et Étud. fl. Cgo (1896) 253.

Eulophia — *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 65.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3846).

SACCOLABIUM Bl.

Saccolabium oeonoides *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 54 [B. S. B. B. XXXVIII², 62]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 223; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 238.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 584); Basankusu (Brun.). — XI : env. de Yambuya (Solh. 103).

ANGRAECUM Thou.

Angraecum Arnoldianum *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 224, t. 56-58; in *Trib. hort.* (1906) 118, t. 6-8 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 27, t. 25, (1908) 238.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.; Pyn. 652); Baringa-Yala (Brun.). — IX : env. de Bumba (Pyu. 94). — XI : Yambuya et env. (M. Laur. 1067, 1785; Solh. 3). — XII a : route de Buta à Poko (Ser. 655). — XII c : Poko [territ. du chef Gaitu] (Ser. 655 b).

Angraecum biloboides *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 144 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109; II (1908) 238.

1901 (L. Gentil). — Bas-Congo (Gill.). — I : env. de Moanda (Gill.). — VII : Basenga [la Lukenie] (Gent.).

Angraecum bilobum *Lindl.* in Bot. Reg. (1840) misc. 69, (1841) t. 35; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. bot. VI, 904; *De Wild.* Étud. fl.

Bas- et Moy.-Cgo (1903) 24 et Miss. Laurent (1905) 59; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 138.

Listrostachys biloba *Kraenzl.* in Engl. Jahrb. XXII (1887) 28, in not.
A. apiculatum *Hook.* in Bot. Mag. (1845) t. 4159.

1899 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.).

Angraecum crinale *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 320 et Miss. Laurent (1905) 59.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.).

Angraecum Gentilii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 140 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109; II, 28, t. 30.

1903 (L. Gentil). — XIII c : Kinumbi [Haut-Lomami] (Gent.).

Angraecum imbricatum *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 137; *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 55 [B. S. B. B. XXXVIII², 63]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 224; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109; II (1907) 28, (1908) 238; Miss. Laurent (1903) 60 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 163; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 144.

1892 (G. Descamps). — V : Lukolela (Pyn.). — VI : la Djuma (Gill.); Madibi (Lescr.). — VII : Bolombo (Ém. Laur.). — VIII : Eala et env.; Irebu (M. Laur.). — XIII c : Lokaudu (Dew.). — XV : Lac Foa (Lescr.); chutes du Lubi (Gent.).

Angraecum Kindtianum [*De Wild.*]*De Wild.* Miss. Laurent (1906) 225, t. 81 et fig. 27.

Listrostachys — *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 148; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118 et Miss. Laurent (1906) 56.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Coquilhatville; la Loliva (M. Laur.); Eala (M. Laur. 1753, 1754; Pyn. 363, 1533); Iujolo (M. Laur. 2058). — XII c : Poko; bords du Bomokandi (Ser. 660). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Angraecum konduense *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 321 et Miss. Laurent (1905) 60.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Angraecum Laurentii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 322 et Miss. Laurent (1905) 60.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : entre Coquilhatville et Ikelemba (M. Laur.).

Angraecum lepidotum *Rehb. f.* in Gard. Chron. (1880) I, 806, in obs.; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 146; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109 et Miss. Laurent (1905) 61.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.); Eala (Ém. et M. Laur.). — XV : Kapinga (Ém. et M. Laur.).

Angraecum Lujaei *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 142 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109.

1899 (Éd. Luja). — XV : Bombaie (Luja, 272).

Angraecum ovalifolium *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 161 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 26.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 686).

Angraecum Pynaerti *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 160 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 25, t. 23-24.

1986 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn.).

Angraecum scandens *R. Schlechter* in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 24, fig. 8.

Le type croît au Kamerun.

— — var. **longifolium** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 26, t. 17, (1908) 238.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 824, 1211, 1775; Pyn. 1427); Ikoko (Brun.).

Angraecum stipulatum *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 225, t. 82, 83 et fig. 28.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : la Loliva (M. Laur.).

Angraecum Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 21.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 3, 328).

Angraecum viridescens *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 61, t. 28.

Mystacidium Laurentii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 152 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118.

1900 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 28).

Angraecum zigzag *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 143 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109.

1901 (L. Gentil). — Bas-Congo (Gill.). — VII : Basenga [la Lukenie] (Gent.).

LISTROSTACHYS Rchb. f.

Listrostachys Althoffii [*Kraenzl.*] *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 47; *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 56 [B. S. B. XXXVIII², 64]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 224.

Angraecum Althoffii Kraenzl. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. II (1889) 160;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 24.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Bokakata. — Nom vern. : **Boloko** (Dew.). —
XV : Bombaie (Luja).

Listrostachys ashantensis [Lindl.] Rehb. f. in Walp. Annal. bot.
VI (1864) 908; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 159.

Angraecum — Lindl. in Bot. Reg. (1843) misc. 56; *Schlechter* Westafr.
Kautsch.-Expéd. (1900) 2*3.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt.).

Listrostachys capitata [Lindl.] Rehb. f. in Flora, XLVIII (1865)
190; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 166; *De Wild.* Étud. fl. Bas-
et Moy.-Cgo, I (1904) 117; II (1907) 28, (1908) 238.

Angraecum — Lindl. in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 137; *Schlechter* Westafr.
Kautsch.-Expéd. (1900) 281.

1903 (L. Gentil). — V : Lukolela (M. Laur.); env. de Kisantu (Gill.). — VIII :
Eala; Injolo (M. Laur.); Irebu (Schlt.); env. d'Eala (Ém. Laur.). — XII : l'Uele
(Ser.). — XIII c : Kinumbi [Haut-Lomami] (Gent.).

Listrostachys caudata [Lindl.] Rehb. f. in Walp. Annal. bot. VI
(1864) 907; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 48; *Rolfe* in *Dyer*
Fl. trop. Afr. VII, 153; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I
(1904) 323, t. 22 et Miss. Laurent (1905) 56, fig. 12.

Angraecum — Lindl. in Bot. Reg. XXII (1836) t. 1844; Bot. Mag. (1848)
t. 4370; Reichenbachia, Ser. 1, t. 67.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Listrostachys Chailluana [Hook. f.] Rehb. f. in Flora, LXVIII
(1885) 381 in obs.; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 153; *Th. Dur.*
et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 56 [B. S. B. B. XXXVIII², 64];
De Wild. et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 9; *De Wild.* Étud.
fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 117.

Angraecum — Hook. f. in Bot. Mag. (1866) t. 5589.

1896 (Fr. Thonner). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX a : Gali (Thoun.). —
XIII c : Kinumbi (Gent.).

Listrostachys Dewevrei *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I
(1903) 145 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 117.

1895 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew.).

Listrostachys Droogmansiana *De Wild.* in La Belg. colon. (1902)
425 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 24.

1902 (L. Gentil). — XV : chutes du Lubi (Gent.).

Listrostachys Durandiana *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 57 [B. S. B. B. XXXVIII², 65]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 25.

1895 (Ém. Laurent). — IV : la Pioka (Ém. Laur.). — VII : Basenga [la Lukenie] (Gent.).

Listrostachys falcata *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 146 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 117; II (1908) 238.

1888 (F. Demeuse). — V : Sanda (Brielman in Gill. 5970); Tshumbiri (M. Laur. 695). — VI : vallée de la Djuma (Gill. et Gent.). — VII : l'Ikata [la Lukenie] (Dem. 24). — VIII : Eala (M. Laur. 1128, 1751). — XII c : Amadis (Ser. 116).

Listrostachys Gentilii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 147; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 117; II (1907) 28, (1908) 239 et Miss. Laurent (1906) 227, fig. 29, 30.

1900 (L. Gentil). — VIII : Eala (M. Laur. 752); Bomba [le Momboyo] (Gent.). — XI : Yambuya et env. (Schl.; M. Laur. 755). — XIII a : Stanleyville (Pyn.).

Listrostachys ichneumonea [*Lindl.*] *Rchb. f.* in Gard. Chron. (1887) II, 681, in obs.; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 163.

Augraecum — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 136; *Rchb. f.* in Gard. Chron. (1887) II, 681; *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. (1900) 282.

1899 (R. Schlechter). — V : Bokala (Schlt.).

Listrostachys linearifolia *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 149 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118; II (1908) 239.

1895 (Ém. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.; Pyn. 4775); Injolo (M. Laur. 1767); le Haut-Lopori (Biel.). — XII c : Amadis (Ser. 840). — XIII a : Romée (M. Laur. 1768). — Ind. non cl. : bords du Lomami (M. Laur.).

Listrostachys Margaritae *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 150 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118; II (1908) 239.

1901 (L. Gentil). — VII : Basenga [Lukenie] (Gent.). — VIII : Eala (M. Laur. 1193); Injolo (M. Laur. 1087 b). — XII c : env. de Poko (Ser. 661).

Listrostachys Monteiroae *Rchb. f.* in *Linnaea*, XLI (1877) 76; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 156; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 324; Miss. Laurent (1905) 56 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 235.

1901 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

Listrostachys pellucida [*Lindl.*] *Rchb. f.* in *Walp.* *Annal. bot.* VI (1864) 908; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 162; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118; II (1908) 239 et Miss. Laurent (1905) 58, t. 27.

Augraecum — *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1844) t. 2.

1888 (F. Demeuse). — VIII : Bala-Lundzi (M. Laur.); Wangata (Huyghe et Ledoux); Eala (M. Laur. 1734, 1743). — XII : Guago (Ser. 291). — XII a : entre Gangara et Libokwa et près de Ruta (Ser. 116 b). — XII a et b : entre Bima et Bambili (Ser. 116). — XII c : Amadis (Ser.). — XII d : rive du Wesec [rive droite de l'Uele] (Ser.). — XV : le Sankuru (Dera.).

Listrostachys Pynaertii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 164 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 28, fig. 1 et t. 1; II (1908) 239.

1905 (L. Pynaert). — VIII : Eala et env. (Pyn. 626; M. Laur. 1298, 1737).

Listrostachys subulata [*Lindl.*] *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. bot. VI (1864) 909; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 56 [B. S. B. XXXVIII, 64]; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 168.

Augraecum — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) 206; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 46.

1895 (Ém. Laurent). — VIII : Lougo [Ruki] (Gent.). — XIII a : env. des Stanley Falls (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.).

Obs. — M. De Wildeman rapporte, avec doute, à cette espèce des échantillons récoltés à Bombaie et à Kapinga par Ém. Laurent (Conf. Miss. Laurent, 58).

Listrostachys Thonneriana *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 56 [B. S. B. XXXVIII², 64]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 9, t. 4.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 193).

Listrostachys vesicata *Rchb. f.* in Flora, XLVII (1865) 190; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 163; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118; II (1907) 29, t. 2 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 166.

1900 (J. Gillet). — V : Bas-Congo; Kimuenza (Gill.).

MYSTACIDIUM Lindl.

Mystacidium congolense *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 151; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118 et Miss. Laurent (1905) 58.

1903 (L. Gentil). — VII : Basenga [Lukenie] (Gent. 30 b). — VIII : Coquilhatville (Ém. et M. Laur.).

Mystacidium distichum [*Lindl.*] *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) 337; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 52; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 175; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 25; II (1908) 239 et Miss. Laurent (1905) 58.

Angraecum distichum Lindl. in Bot. Reg. XXI (1835) t. 1781.

Aerantbus — *Rehb. f.* in *Walp. Annal. bot.* V (1834) 901; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 36].

1888 (F. Demeuse). — VII : Ibaka (Gent.); l'Ikata [la Lukenie] (Dem.); Kutu (Èm. et M. Laur.). — VIII : Eala (Èm. et M. Laur.; Pyn.); Baringa-Yala (Brun.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

M. distichum var. **grandifolium** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 240.

1895 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 724); Injolo (M. Laur. 1902).

Mystacidium infundibulare [Lindl.] *Rolfe* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII (1897) 170; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 240.

Angraecum — Lindl. in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 136.

1905 (Alph. Cabra et Fr. Michel). — Ind. non cl. : riv. Kilo (Cabra et Michel, 4).

Obs. — M. De Wildeman croit que la plante congolaise devra constituer une var. *brevifolium*.

Mystacidium xanthopollinium [*Rehb. f.*] *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 55; *Rolfe* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 173; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII², 66]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 11; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 163; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1904) 118; II (1907) 30 et Miss. Laurent (1905) 58.

Aeranthus — *Rehb. f.* in Flora, XLVIII (1865) 190.

A. erythropollinius *Rehb. f.* l. c. (1865) 190; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1903) 25; II (1908) 240.

Mystacidium — *Th. Dur. et Schinz* l. c. V (1895) 52; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 59 et Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 50].

1893 (Èm. Laurent). — Bas-Congo (Cabra). — II a : bords de la Lukula à Zeuze (Èm. Laur.); le Mayumbe (Cabra). — V : Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Èm. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Bikoro [Lac Tumba] (Gent.); Bombimba (M. Laur.). — IX : rivière de l'Imbiri (Ser.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII c : env. de Gombari (Ser.). — XV : le Sankuru (Èm. Laur.); Lusambo (Gent.).

VANILLA Sw.

Vanilla acuminata *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXXII (1896) 456; *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 66]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 224; *Rolfe* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 177; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 63.

1895? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — XIII : chutes de la Tshopo (Èm. et M. Laur.). — XV : Munungu (Èm. et M. Laur.).

Vanilla africana *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 137; *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 66]; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 176; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 63.

1895 ? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Vanilla cucullata *Kraenzl.* in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. II (1889) 161; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 55; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 66]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 224; *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXXII (1887) 456 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 177.

1895 (A. Dewèvre). — XI : Basoko (Dew.).

Vanilla grandifolia *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 138; *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXXII (1887) 458 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 179; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 66]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110; Miss. Laurent (1905) 63 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 327.

1899 (J. Gillet). — V : Dembo (Gill.); vallée de Kisantu (Ém. Laur.). — XV : plantations Lacourt (Taym.).

Vanilla Laurentiana *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 327 et Miss. Laurent (1905) 63.

1903 (Van Rysselberghe). — XII c : Nala (Van Ryss.).

— — var. **Gilletii** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 328 et Miss. Laurent (1905) 64.

1903 (J. Gillet). — V : ravin de Kimpesse [Kisantu] (Gill. 3362; Ém. et M. Laur.).

Vanilla Lujae *De Wild.* in Belg. colon. X (1904) 28, cum xyl. : Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 111 et 231, t. 42 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 327.

1903 (M. Taymans et Éd. Luja). — XV : Koudue (Taym. et Luja); la Lulua (de P. Sendens).

ZEUXINE Lindl.

Zeuxine elongata *Rolfe* in Bolet. Soc. Brot. IX (1891) 142 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 181; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 65 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 24.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Schlt.): entre Dembo et le Kwango (But.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

PLATYLEPIS A. Rich.

Platylepis glandulosa *Rchb. f.* in *Linnaea*, XLI (1877) 62; *Bolus* Icon. Orch. austro-afr. I, t. 11; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 181; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 20.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

MANNIELLA Rchb. f.

Manniella Gustavi *Rchb. f.* *Otia* Hamb. II (1881) 109; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 185.

Le type croît dans la Haute et la Basse-Guinée.

— — var. **picta** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 153; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 119 et *Miss. Laurent* (1905) 65.

1901 (L. Gentil). — XV : Kondue [Sankuru] (Gent. 7; Ém. et M. Laur.).

POGONIA Juss.

Pogonia umbrosa *Rchb. f.* in *Flora*, L (1867) 102; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 12; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 186; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 122, t. 55, 56.

1906 (Éd. Luja). — XV : rég. du Sankuru (Luja).

HABENARIA Willd.

Habenaria Debeerstiana *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marangu (Deb.).

Habenaria Guingangae *Rchb. f.* in *Flora* XLVIII (1865) 179; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 207.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

Habenaria Haullevilleana *De Wild.* Étud. fl. Kat. 1903) 172.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : *Songania* (Verd. 373).

Habenaria ichneumonea [*Sw.*] *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) 313; *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 136 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; *De*

Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 224; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 79; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 240; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 230; II (1908) 234.

Orchis ichneumonea *Sw.* in *Pers.* Syn. pl. II (1807) 506.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kidama (Van Tilborg); Kimuenza (Dew. 500). — XII c : entre Amadis et Surango (Ser. 656); Poko et env. (Van Ryss.; Ser. 656 c). — XV : route de Kabuluku à Kanda-Kanda (Lescr. 333). — XVI : Kapanga (Desc.).

Habenaria Kitondo *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 23.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kitondo** (Verd. 334).

Habenaria Laurentii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 325 et *Miss. Laurent* (1905) 62.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Habenaria macrura *Kraenzl.* in *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) 183 et in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 152; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 81; *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 225; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 229; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109, (1906) 230; II (1908) 234.

1885 (C. Callewaert). — V : le Stanley-Pool (Callew.); Léopoldville (Dew. 490); Luala-Lumene (Hendr.) : env. de Kisantu (Gill. 3514); rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3631). — Ind. non cl. : Golungo (Lescr. 407).

Habenaria Poggeana *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 207; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59; [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110, (1906) 230.

Platycoryne — *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 258.

1881? (P. Pogge). — Bas-Congo (But.). — V : env. de Kisantu et de Sanda (Gill.) ; entre Dembo et le Kwango (But.). — VII : Malepie (Ém. Laur.). — XV : la Lulua (Pg. 1443). — Ind. non cl. : Bakuimba (Dem.).

Habenaria procera [*Azel.*] *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1835) 318 et in *Bot. Reg.* (1836) t. 1858; *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 164; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 220; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110.

Orchis — *Azel.* ex *Sw.* in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* XXI (1800) 207; *Pers.* Syn. pl. II. 506.

1902 (L. Gentil). — XV : bord de la Loanje [atll. de la Lubue] (Gent.).

Habenaria zambesina *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) 96; *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 243 et in *Engl. Pf. Ost-Afr.* 153; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 241; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110, (1906) 230; II (1908) 234 et *Miss. Laurent* (1905) 63.

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2278). — V : Boko (Vanderyst). — XV : Batshoke (Lescr. 414); Kondue (Ëm. et M. Laur.); env. de Kabinda (V. Dur.). — Ind. nou cl. : Tshofe [la Tshopo f XIII a] (V. Dur.).

BONATEA Willd.

Bonatea Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 24.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lusepo** (Verd. 263).

SATYRIUM Sw.

Satyrium Gilletii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 153 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1822).

Satyrium Goetzenianum *Kraenzl.* in Engl. Jahrb. XXIV (1898) 506; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 574.

? S. brachypetalum *Engl.* [non A. Rich.] in v. *Goetz.* Durch Afrika (1895) 385.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga [N. du Lac Kivu] (Goetz. et Prittw.).

Satyrium riparium *Rehb. f.* in Flora, XLVIII (1865) 183; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 267; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut Marungu (Deb.).

DISA Berg.

Disa aurantiaca *Rehb. f.* in Flora, L (1867) 98; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 100; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 18; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 225.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza (Dew. 498).

Obs. — M. Rolfe [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 280] réunit cette espèce au *D. ochrostachya* *Rehb. f.*

Disa erubescens *Rendle* in *Britt.* Journ. of Bot. XXXIII (1895) 297; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 277.

D. Leopoldi *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 48 pr. p. [B. S. B. B. XXXVIII², 218]. — [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 24 in obs.].

1890 (Paul Briart). — XVI : Musima (Lualaba) (Briart).

Disa katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 25.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulongwe** (Verd. 418).

Disa ochrostachya *Rehb.* f. in Flora, XLVIII (1865) 181; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 279; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110.

D. aurantiaca *Rehb.* f. l. c. L (1867) 98; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 18.

1900 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 1805, 1835).

Disa Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 26.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 410).

Disa Walleri *Rehb.* f. Otia Hamb. II (1881) 105; *R. Schlechter* in Engl. Jahrb. XXXIII (1901) 238; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 24; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 282.

D. Leopoldi *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 48 pr. p. [B. S. B. B. XXXVIII², 218].

1890 (Paul Briart). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 419); Musima [Lualaba] (Briart pr. p.).

Disa Welwitschii *Rehb.* f. in Flora, XLVIII (1865) 181; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 280; *Hiern* Cat. Welw. Pl. II, 18; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 234.

1891 (F. Demeuse). — Mont Bangu [*err. cat.* Bundu]. — Nom vern. : **Iada Samba** (Dem.). — V : Kisantu et dans la région [But. in Gill. 3599; *Odd.* in Gill. 3042; *Vanderyst*, 65]; Boko; Dembo (*Vanderyst*). — XII d : Bokoyo (Ser. 595). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Shikololo** (Verd. 393); route de Kabinda à Tshopo (V. Dur.).

BRACHYCORYTHIS Lindl.

Brachycorythis Briartiana *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 49 [B. S. B. B. XXXVIII, 2, 419].

1890 (Paul Briart). — XVI : Musima [Haut-Lualaba] (Briart).

Brachycorythis pleistophylla *Rehb.* f. Otia Hamb. II (1881) 104; *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 80]; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 202; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110, (1906) 230; II (1908) 234.

Platanthera — *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. (1900) 274.

B. Leopoldi *Kraenzl.* Orch. gen. et sp. I (1898) 542 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 61 [B. S. B. B. XXXVIII², 69]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 59.

1891 (G. Descamps). — Bas-Congo (But.). — II a : le Mayumbe (Deleval). — IV : env. de Tumba (Cabra et Michel). — V : Kinshasa (Schlt.); Sanda (Verm.); Boko (*Vanderyst*); Lemfu (But.); Banza-Boma (Luja); — XV : le Lutembue (Desc.).

Brachycorythis pubescens *Harv.* Thes. Capens. I (1859) 35, t. 34; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 19; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 201; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110 et *Miss. Laurent* (1905) 63.

Platanthera Brachycorythis *Schlechter* in *Engl. Jahrb.* XX, Beibl. n. 50 (1895) 12.

1901 (L. Gentil). — VI : région du Kwango (But.). — XV : Kondue (Gent. 18; Ém. et M. Laur.).

Brachycorythis rhomboglossa *Kraenzl.* Orch. gen. et sp. I (1898) 544 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. III (1899) 60 [B. S. B. B. XXXVIII³, 219]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 225.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 980).

Brachycorythis Schweinfurthii *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) 59; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 115 et Étud. fl. Cgo (1896) 153; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 201.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3577).

DISPERIS Sw.

Disperis aphylla *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 63; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 225; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 230.

1896 (A. Dewèvre). — V : euv. de Kisantu (Gill. 3588) — XIII : entre Matende et Nikanga (Dow. 1085).

FLAGELLARIACEAE

FLAGELLARIA L.

Flagellaria guineensis *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 181; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 90; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 233.

F. indica *Thoms.* [non L.] in *Speke Nile*, Append. (1863) 650; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 436; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 64; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 99 et *Miss. Laurent* (1905) 24.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Gill.). — I : Moanda (Gill.). — II a : Temvo (Ém. et M. Laur.). — IV : Luwituku (Luja). — VII : Kutu; Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.; Pyn.). — Ind. non cl. : Foi (Dem.).

ZINGIBERACEAE

CURCUMA L.

**Curcuma longa* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 2; Bot. Reg. (1825) t. 886; *Benth.* et *Trim.* Medic. Pl. III, t. 269; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, 1 (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51] et Reliq. Dewevr. (1901) 227; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 108.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu et cultivé dans les villages (Gill.). — XIII c : la Lowa (Dew.).

KAEMPFERA L.

Kaempfera aethiopica [Solms] *Benth.* in *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. III (1883) 642; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 294; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 19; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 69, fig. 10.

Cienkowskia — *Solms* in Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin (1863) 7.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Lukafu (Verd. 277) ; Baudouinville (Deb.).

Obs. — Dans les *Matériaux pour la flore du Congo*. II (1898) 81, la plante récoltée à Baudouinville a été, a tort, rapportée au *K. pleiantha*.

Kaempfera Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 23 [B. S. B. B. XXXVIII², 142]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 226 ; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 71.

1896 (A. Dewèvre). — XIII c : env. de la Montagne Marie (Dew. 1021).

Kaempfera pallida *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 20.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 297).

Obs. — Espèce omise dans le *Pflanzenreich* d'Engler.

Kaempfera pleiantha *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 425; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V. 124; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 296; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 20 ; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 69.

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.); le Lofoi (Verd.).

CADALVENA Fenzl.

Cadalvena spectabilis Fenzl in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, Abt. II (1865) 140; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 297; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 20; *Bot. Mag.* (1905) t. 7092.

Costus spectabilis K. Schum. in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 422; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 129 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 255; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 230; K. Schum. in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 421; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 160.

1888 (Fr. Hens). — IV : Zeugeto (Cabra, 1, 58); Lukungu (Hens, 353; Dew. 163). — V : Kisautu; euv. de Dembo (Gill. 1152). — XVI : le Lofoi (Verd.); Albertville [Toa] (Desc.).

AFRAMOMUM K. Schum. (†)

Aframomum albo-violaceum [Ridl.] K. Schum. in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 207.

Amomum — *Ridl.* in *Britt. Jour. of Bot.* XXV (1887) 130; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 304.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 903).

Aframomum colosseum K. Schum. in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 206.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1472).

Aframomum Daniellii [Hook. f.] K. Schum. in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 218.

Amomum—*Hook. f.* in *Kew. Journ. of Bot.* IV (1854) [t. 5 sub nom. *A. Afzeli*] 129; *Bot. Mag.* (1884) t. 4764.

Am. angustifolium *Auct.* [non *Sonner.*]; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51] *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 308; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 106.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Cougo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2857).

Aframomum granum-paradisi [L.] K. Schum. in *Engl. Pflanzenreich*. [Zingib.] (1904) 213.

(1) **Aframomum luteo-album** [K. Schum.] K. Schum. in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 216.

Amomum — K. Schum. in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 413; *Bak.* in *Dyer*, Fl. trop. Afr. VII, 310.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d? : rég. des Uandos (Schw.).

Amomum granum Paradisi L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 2? *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1851) t. 4603; *Th. Dur.* et *Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 126; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 304; *Gagnepain* [Zingib. Afric. (1902) 28-33] in B. S. B. Fr. Sér. 4, III (1903) 371.

1881? (P. Poggel). — Ind. non cl. : Bolama (Pg. 1510).

Aframomum latifolium [*Afzel.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 209.

Amomum — *Afzel.* Remed. Guin. I (1813) 5; *Th. Dur.* et *Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 126 et *Étud. fl. Cgo.* (1896) 254; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 305.

Aun. ? (Coll. ?). — Congo (Coll. ? fide Roscoe).

Aframomum Laurentii [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 213.

Amomum — *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 1 [B. S. B. B. XXXVIII, 2, 137]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr (1901) 227.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : Shimbete (Dew.). — Nom vern. : **Mabole** [Kasai].

Aframomum Masuianum [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 212.

Amomum — *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 19 [B. S. B. B. XXXVIII, 2, 138]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 228.

1895 (A. Dewèvre). — II : Malela, CC. le long de l'eau et dans la forêt (Dew.).

Aframomum Melagueta [*Rosc.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich*. [Zingib.] (1904) 204.

Amomum — *Rosc.* Scitam. (1828) 29, t. 98: *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXV (1887) 130; *Th. Dur.* et *Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 127 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 254; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 221; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 303; *Bentl.* et *Trim.* Medic. Pl. III, t. 268.

Ind. vague, 1823 (fide Rosc.); ind. posit. 1895 (Dew.). — Du Congo Sierra-Leone (Rosc.). — VIII : Équateur. — Nom vern. : **Mondungu** (Dew.).

Aframomum sanguineum [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 219; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 218 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 23.

Amomum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 412; *Bak.* in *Dyer* Fl. Afr. VII, 310; *Th. Dur.* et *Schinz.* *Étud. fl. Cgo* (1896) 254; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 228.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — II a : la Lukula (Kest.); Temvo (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1123). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Aframomum polyanthum [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 207.

Amomum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 411; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 309.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Linduku (Schw. 3092).

Aframomum sceptrum [*Oliv. et Hanb.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 214.

Amomum — *Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1863) 109; *Hook.* in *Bot. Mag.* (1869) t. 5761; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 127 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 255; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 306.

1893 (Ém. Laurent). — Forêts du Bas-Congo (Ém. Laur.).

ZINGIBER Adans

***Zingiber officinale** *Rosc.* in *Trans. Linn. Soc.* VIII (1807) 348; *Bentl.* et *Trim.* *Medic. Pl.* III, t. 270; *Bak.* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI, 246; *De Wild.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51]; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 170, fig. 23.

Amomum Zingiber *L. Sp. pl. ed.* I (1753) 1.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

COSTUS L.

Costus afer *Ker* in *Bot. Reg.* VIII (1833) t. 683; *Hook.* in *Bot. Mag.* (1857) t. 4977; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 188 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 255; *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXVII, 126]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 229; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 299; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 292; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 217.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : brousse de Zobe. — Nom vern : Nkusu (Ém. Laur.); Shinganga. — Nom vern. : Ruisa (Dew.). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Ém. et M. Laur.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukundji (Ém. Laur.).

Costus Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, V (1899) 20 [B. S. B. B. XXXVIII², 139]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 229; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 387; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 218.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shiunganga (Dew.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Costus edulis *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, V (1899) 22 [B. S. B. B. XXXVIII², 141]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 229; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 395; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 218.

1896 (A. Dewèvre). — VII : Inougo (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 916 a).

Costus Lucanusianus *J. Braun et K. Schum.* in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. II (1889) 151; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 128 et Étud. fl. Cgo (1896) 255; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 230 et Pl. Gilletianae, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, 1, 51]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 299; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 65, cum xyl.; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 392, fig. 46.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : la Lemba (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

Costus phyllocephalus *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 420; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 60 et Reliq. Dewevr. (1901) 230; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 298; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 51]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 23; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 386.

1891 (F. Demeuse). — II a : Biugila (Dup.). — V : Kisantu (Gill. 343, 879). — VIII : Équateur. — Nom vern. : **Mosasanga** (Dew. 556). — IX : pays des Bangala (Dem.). — XV : Lac Foa (Leser. 233).

Costus trachyphyllus *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 420; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 256; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 300; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 409.

1870 (G. Schweinfurth). — XII c : le Mbruole (Schw.).

RENEALMIA L. f.

Renealmia bracteata *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 27 [B. S. B. B. XXXIX², 79].

1899 (F. Demeuse). — Ind. non cl. : le Lomani (Dem.).

Obs. — Espèce omise dans le *Pflanzenreich* d'Engler.

Renealmia Cabrae *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 26 [B. S. B. B. XXXVIII², 145]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 23; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 292.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel).

Renealmia congolana *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 25 [B. S. B. B. XXXVIII², 144]; *Th.*

Dur. et De Wild. Reliq. Dewevr. (1901) 230; De Wild. Miss. Laurent (1906) 218; K. Schum. in Engl. Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 293.

18821 (P. Pogge). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Boconambo** (Dew. 634). — XV : Dibeles (Ém. et M. Laur.); Mukenge (Pg.).

Renealmia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, V (1899) 24 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 143]; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 51; II (1901) 131 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51, 841] et Reliq. Dewevr. (1901) 231; K. Schum. in Engl. Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 293; De Wild. Miss. Laurent (1906) 218.*

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 825 b); en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); Lemfu (But in Gill. 1214). — Nom vern. : **Basasanga** [Lulanga] (Ém. Laur.).

MARANTACEAE

SARCOPHRYNIUM K. Schum. (4)

Sarcophrynum Arnoldianum *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 107; II (1907) 24; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 265-267, t. 13-15 et Miss. Laurent (1906) 219.*

1888 (F. Demeuse). — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel); Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — VI : Tumba-Mani. — Nom vern. : **Midiadi** (Cabra et Michel). — XI : env. de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.); les Stanley-Falls (Dem.). — XIII d : Lusanga (Dew.). — XV : Olombo; Koudue; Dibeles (Ém. et M. Laur.).

Sarcophrynum baccatum [*K. Schum.*] *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich. [Marant.] (1902) 39.*

Phrynium — *K. Schum. ex De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 233. Phyllodes — K. Schum. in Engl. Jahrb. XV (1892) 442; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 257; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127].*

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Ncongo** (Dew. 635). — XV : Mukeuge (Pg. 1439); le Sankuru; la Lulua (Ém. Laur.).

(1) K. Schumann dans le Pflanzenreich [Marant.] (1902) 37, indique le **S. bisubulatum** [*K. Schum.*] *K. Schum.* (Phyllodes — *K. Schum.* in Bolet. Soc. Bot. XI (1893) 83 = Phrynium — *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. VII (1898) 325*) dans le domaine du Congo entre le Luatschim et Quilombo. — Nous pensons que cette habitation découverte par Siz. Marques est dans l'Augola.

Sarcophrynium brachystachyum [*Koern.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 36; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 219 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 24.

Phrynium — *Koern.* in *B. S. Natur. Mosc.* XXXV, I (1862) 108; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 322; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewèvre. (1901) 34.

Maranta — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 531.

Phyllodes — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 445.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Kongo** (Dew. 511); env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XII a : Nyandu (Ser.).

Sarcophrynium leiogonium [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 39; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 108.

Phyllodes — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 442; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 257.

Phrynium — *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII (1898) 324.

1880 (P. Pogge). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : rives de la Djuma (Gill. 2742; Gent.). — XV ? : pays des Bashilange à Luatschim (Pg. 696).

Sarcophrynium oxycarpum [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 38; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 220 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 38.

Phyllodes — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 443.

Phrynium — *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII (1898) 324.

1897 (Alph. Cabra). — Congo (Cabra). — XV : Dibeles (Ém. et M. Laur.).

HALOPEGIA *K. Schum.*

Halopegia azurea [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 50.

Donax — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 434; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 316.

? *Maranta Lujaeana* *L. Linden* Cat. de l'Hort. colon. (1901) 21, cum icône (fide cl. *K. Schum.*).

1881 (P. Pogge). — XV : Mukeuge (Pg. 487).

THAUMATOCOCCUS *Benth.*

Thaumatococcus Daniellii [*Bennett*] *Benth.* in *Benth et Hook. f. Gen. pl.* III (1883) 652; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich*, [Marant.], (1904) 40, fig. 8; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 321; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 220.

Phrynium — *Bennett* in *Pharm. Journ.* XIV (1855) 161.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Dibeles (Ém. et M. Laur.).

HYBOPHRYNIUM K. Schum.

Hybophrinium Braunianum *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 428 cum. ic.; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 131 et Étud. fl. Cgo (1896) 257; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 59 et Reliq. Dewevr. (1901) 232; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 41; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 107; II (1907) 24 et Miss. Laurent (1906) 219.

Trachyphrynum — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 319.

Batururanta Arnoldiana *L. Linden* Cat. de l'Hort. colon. (1901) 20, cum ic.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Dem.). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Zobe. — Nom vern. : **Matete** (Dew. 241). — V : le Stanley-Pool (Callev.); Léopoldville (M. Laur. 650); Kisantu (Gill.). — VI : le Kwango (But.); vallée de la Djuma (Gent.); Eiolo (Ëm. et M. Laur.). — IX : Bangala (Dem.). — XII d : le Mbruole (Schw.). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.). — XV : Olombo (Ëm. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Kibaka [Angola?] (Buett.); rives du Lomami (Ëm. Laur.).

— — var. **violaceum** *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 30 [B. S. B. B. XXXVIII², 149]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 232.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza (Dew.).

TRACHYPHRYNIUM Benth.

Trachyphrynum Danckelmannianum *J. Braun* et *K. Schum.* in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. II (1889) et in Engl. Jahrb. XV (1892) 430; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 319; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 42; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 220 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 23.

1903 (Ëm. et Marc. Laurent; Ad. Odden). — II a : la Lukula (Ëm. et M. Laur.). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3420, 3572), — VII : Kutu (Ëm. et M. Laur.).

Trachyphrynum Liebrechtsianum *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 28 [B. S. B. B. XXXVIII², 147] et Reliq. Dewevr. (1901) 233; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 44; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 107 et Miss. Laurent (1906) 220.

1895 (A. Dewèvre). — II a : le Mayumbe (Kest.). — V : Lukolela (Dew. 546); Kimuenza (Dew. 512). — VIII : Équateur (P'yu.): Bolenge [le Ruki]. — Nom vern. : **Lokongo** (M. Laur. 148). — XV : Butala; Dibele (Ëm. et M. Laur.); Bena-Makima (Lescr. 267).

Trachyphrynium Poggeanum *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) 43t; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 257; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 320; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich [Marant.]* (1902) 45.

1881? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1492).

Trachyphrynium violaceum *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXV (1887) 133; *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) 432; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 132 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 258; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 320; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich [Marant.]* (1902) 44.

T. Preussianum *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 430, fig. N; *Bak.* l. c. VII, 318.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

PHRYNIUM Willd.

Phrynium confertum [*Benth.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich [Marant.]* (1902) 56; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 221, t. 54, fig. 25, 26 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 108.

Calathea — *Benth.* in *Benth. et Hook. f. Gen. pl.* III (1883) 653; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 327.

1900 (Éd. Luja). — Congo (Luja). — VI : vallée de la Djuma [Kwango] (Gent. et Gill. 2742). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.).

CLINOGYNE Salisb.

Clinogyne arillata [*K. Schum.*] *K. Schum.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 230 et in *Engl. Pflanzenreich [Marant.]* (1902) 62; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 223 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 108.

Donax — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 438; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 131; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 316; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 60; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 21.

1888 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VII : Lac Léopold II (Dem.). — VIII : Coquilhatville (Dew. 604 b; Gill. 2673); Eala. — Nom vern. : **Kokoloko** (M. Laur.). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Katauga (Verd.). — lud. nou. cl. : le Lomami (Desc.).

Clinogyne congensis [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich [Marrant.]* (1902) 67.

Donax — K. Schum. in Engl. Jahrb. XV (1892) 439; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 131 et Étud. fl. Cgo (1896) 256; *De Wild et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127 et Contr. fl. Cgo, I (1899) 55; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. afr. VII, 317.

1881 (P. Pogge). — Congo (Dem. 397). — II a : Bingila (Dup.); Zenze (Ém. Laur.). — V : Suata (Buett. 541). — XV : Mukenge (Pg.).

Clinogyne filipes *Benth.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. III (1883) 651; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 101 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 841] et Reliq. Dewevr. (1901) 232; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 67; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 24.

Phrynium — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 532.

Donax — *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 440; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 131; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 316.

1895 (A. Dewèvre). — V : entre Dembo et le Kwango (Gill.). — VI : vallée de la Djinna (Gill.). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew. 103 a).

Clinogyne Hensii [*Bak.*] *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 62.

Phrynium — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 323.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens, 140).

Clinogyne Schweinfurthiana [*O. Kuntze*] *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 62.

Arundastrum — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 684.

Donax — *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 437; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 131 et Étud. fl. Cgo (1896) 256.

D. cuspidata *Bak.* [non *K. Schum.*] in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 315.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

MARANTA L.

***Maranta arundinacea** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 2; *Rosc.* Scitam. 9, t. 25; *Reloué* Liliac. I, t. 57; *Bot. Mag.* (1822) t. 2307; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 130 et Étud. fl. Cgo (1896) 256; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1901) 125, fig. 16.

1891 (F. Demense). — Bas-Congo (Dem.).

Obs. — Espèce de l'Amérique mérid. naturalisée sur un grand nombre de points dans l'Afrique trop.

THALIA L.

Thalia coerulea *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXV (1887) 132; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 130; *Th. Dur.* et *De Wild.*

Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 231; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 314.

1892 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dup.). — VIII : Équateur (Dew. 552) ; Irebu (Dew.). — IX : la Mongala (Dem. 1691).

***Thalia geniculata* L.** Sp. pl. ed. 1 (1753) 3; *Peters.* in *Mart.* Fl. Bras. II^o, 112, t. 38, fig. 2; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 314; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 173; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 20.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.). — XV : rég. du Kasai (Gent.).

***Thalia Schumanniana* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 108 ; II (1907) 24 et Miss. Laurent (1906) 221.

1892 (L. Gentil). — Bas-Congo (Cabra, 125; But. in Gill 2233). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2720). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.) ; Équateur (Pyn.) ; Irebu (Dew. 552) — IX : bords de l'Itimbiri (Ser. 34). — IX a : la Mongala (Dew.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Mutomba-Kaboti [près des chutes du Luile] (Gent. 69).

Obs. — M. Ém. De Wildeman croit que cette espèce est répandue dans les marécages de la brousse.

CANNA L.

****Canna indica* L.** Sp. pl. ed. 1 (1753) 1 pr. p.; *Redouté* Liliac. IV, t. 201; *Rosc.* Scitam. t. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) 292; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 134 et Étud. fl. Cgo (1896) 258; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 60; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 106; II (1907) 123 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 113-114.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Lukolela (Buett.); Kisantu (Gill.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — VII : Plkata (Dem.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.). — XIV : Kalembe-Lemba. — Nom vern. : **Butshulu** (Coll.?) — Ind. non cl. : Shiauzo (Dup.).

* — subsp. ***orientalis* Bak.** in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 328; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51] et Miss. Laurent (1906) 219.

C. orientalis *Rosc.* Scitam. (1828) t. 12; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 24.

C. bidentata *Bertol.* Miscell. bot. XX, 9, t. 1.

1862 (R. Burton). — Bas-Congo (Burt.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.) ; env. de Lie (Ém. et M. Laur.). — XII d : Munza (Schw.). — XV : Dibebe ; Mange ; Kondue (Ém. et M. Laur.).

MUSA L. (1)

Musa Arnoldiana *De Wild.* in B. S. étud. colon. VIII (1901) 339; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 102 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 842]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 79-83, t. 1 4 et 7, fig. 3.

1900 (J. Gillet). — V : rég. de Dembo (Gill. 1850).

‡ **Musa Ensete** *Gmel.* Syst. nat. II (1767) 567; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1870) t. 5223-5224; *Bak.* in Kew Bull. (1894) 237 [cum xyl. p. 240] et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 329; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Musac.] (1900) 15, fig. 2.

Ensete edule *Horan.* Prodr. monog. Scitam (1862) 40.

Obs. — M. Baker [l. c.] dit que cette espèce a été indiquée dans le pays des Mangbettu [XII d].

Musa Gilletii *De Wild.* in Rev. cult. colon. (1901) 103; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 102 [B. S. B. B. Sér. 2, I, 842]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 73-79, t. 5, 6 et 7, fig. 1-2.

1900 (J. Gillet). — IV : Luvituku (Gill.). — V : rég. de Kisantu (Gill. 700).

Musa Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 371-374, t. 130 et fig. 61-62.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — Cult. à Isangi [XI] (L. Pyn. 89).

***Musa sapientum** *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) 1303; *Trew* Pl. select. t. 21-23; *Bak.* in Annals of Bot. VII, 211; in Kew Bull. (1894) 250 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 330.

M. paradisiaca *L.* subsp. — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 692; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Musac.] (1900) 29, fig. 4; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 374.

Le type est cultivé partout dans la zone tropicale.

— — var. **sanguinea** *Welw.* ex *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXV (1887) 134; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 52 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 52]; *Bak.* in *Dyer* l. c. VII, 331; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Musac.] (1900) 21; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 374, t. 131.

1899 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Obs. — Ém. Laurent a signalé la présence de ce *Musa* à Eala [VIII] où il a été probablement importé du Bas-Congo. La Mission Laurent l'a également remarqué à Coquilhatville [VIII] (Conf. *De Wild.* Miss. Laurent 374-375).

(1) M. De Wildemau a publié de nombreux détails, à divers points de vue, sur les *Musa* en général dans ses *Notices sur les plantes utiles ou intéressantes du Congo*. I (1903) 69-92 et 83-119.

HAEMODORACEAE

SANSEVIERIA Thunb. (1)

Sansevieria bracteata *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 253 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 333; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 25; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 234.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

Sansevieria cylindrica *Boj.* Hort. Maurit. (1837) 349; *Hook.* in Bot. Mag. (1859) t. 5093; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 140 et Étud. fl. Cgo (1896) 258; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 335; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 104; II (1907) 121, t. 50, 51.

S. angolensis *Welw.* ex *Hook.* in Rep. Paris Exhib. 1855, III (1856) 146; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 549; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 25.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.).

Sansevieria guineensis [*Jacq.*] *Willd.* Sp. pl. II (1800) 159; Bot. Mag. (1809) t. 1179; *Redouté* Liliac. VI, t. 330; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 141 et Étud. fl. Cgo (1896) 259; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 333; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 156 et Reliq. Dewevr. (1901) 234; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1905) 629.

Aletris — *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) 63, t. 84.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala; Upoto (Ém. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XIII : Kimbimbi (Dew.). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Kenge** [Ikwangula]; **Gulumgu** [Kasongo]; **Kibongi** [Tangauika] (Dew.).

Sansevieria Laurentii *De Wild.* in Rev. cult. colon. (1904) 131 et in Rev. Hort. belg. (1904) 169, t. 14-15; *Miss. Laurent* (1905) 45, fig. 9-10 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 628.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XIII a : euv. de Stanleyville (Ém. et M. Laur.).

L'Ananas sativus *Schult.* f. (Bromeliacée), originaire de l'Amérique trop. est naturalisé à Kisantu [V] (Gill.). — [Conf. *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1900) 102 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 842].

(1) Conf. *De Witleman*, Les *Sansevieria* africains in *Not. pl. util. ou intér. du Congo*, I (1905) 617-652, t. 30-32.

Sansevieria longiflora Sims in Bot. Mag. (1826) t. 2634; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 141, t. 5, fig. G-II; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 141 et Étud. fl. Cgo (1896) 258; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 334; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 630.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

IRIDACEAE

MORAEA L.

Moraea Arnoldiana De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 16.

1900 (Edg. Verdictk). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutobi-Tubi** (Desc. 606).

Moraea kitambensis Bak. in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 575.

1880 (Max Buchner). — VI : Kitamba, sur le Kwaugo (Buchn. 679).

Moraea textilis Bak. in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 270 et Handb. of Irid. 52; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* 173; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 153 et Étud. fl. Cgo (1896) 259; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 341.

1883 (H. Johnston). — Bas-Congo (Johnst.).

Moraea Verdickii De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 17.

1899 (Edg. Verdictk). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kulutu** (Verd. 281).

Moraea zambesiaca Bak. Syst. Irid. (1877) 130 et Handb. of Irid. 51; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 153 et Étud. fl. Cgo (1896) 259; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 339.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katauga (Corn.).

GEISSORHIZA Ker.

Geissorhiza Briartii De Wild. et *Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 13 [B. S. B. B. XXXIX², 105].

1890 (Paul Briart). — XVI : Musima [Haut Lualaba] (Briart).

LAPEYROUSIA Pourr.

Lapeyrouisia erythrantha [Klotzsch] Bak. Syst. Irid. (1877) 155 et Handb. of Irid. 168; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 190 et Étud. fl. Cgo (1896) 259; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 351.

Ovieda — *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 516, t. 58.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katauga (Corn.).

GLADIOLUS L.

Gladiolus Arnoldianus *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 22 [B. S. B. B. XL, 28].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutungwee** (Verd. 495).

Gladiolus brevicaulis *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, 1 (1887) 267 et Handb. of Irid. 211; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 214 et Étud. fl. Cgo (1896) 260; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 366.

1885 (R. Buettner). — V : le Stanley-Pool (Buett. 517).

Gladiolus corneus *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 155, t. 100; *Bak.* Handb. of Irid. 222; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 215; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 60; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 368.

1895 (Gust. Debeerst). — II : Malola (Ém. Laur.). — XVI : Pala (Deb.).

Gladiolus Quartinianus *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 306; *Bak.* in Bot. Mag. (1884) t. 673, Handb. of Irid. 213 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 371; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 52 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 52].

G. angolensis *Welw.* ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, 1 (1887) 269; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 213; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 60; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 29; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 217 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 22.

1885 (C. Callewaert). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Mont Bangu (Dem.); entre Tumba et Luvituku (Lujal). — V : le Stanley-Pool (Callew.); Kisautu (Gill.); euv. de Sabuka (M. Laur.).

Gladiolus Verdickii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 23 [B. S. B. B. XL, 29].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 612).

ANTHOLYZA L.

Antholyza Cabrae *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 15

1902 (Alph. Cabra). — VI : vallée de la Sanga à l'E. du plateau de Kimbele [Kwaugo] Cabra).

Antholyza Descampsii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 18.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Katanga (Desc.); le Lofoi (Verd.).

Une espèce d'*Eleutherine* [*E. plicata* Herbert] de l'Amérique trop., est cultivée à Eala [VII] (M. Laur. 934). — [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 22].

Antholyza Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 19 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 22.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1950); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3622).

Antholyza labiata *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1892) 156, t. 7, fig. 1-4; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 56; II (1900) 60 et Reliq. Dewevr. (1901) 234; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 374; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 106 et Miss. Laurent (1906) 217.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (But.). — II a : brousse de la Lemba (Dew.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : distr. du Stanley-Pool (Ém. Laur.); env. du Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); env. de Léopoldville (Luja); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); Tumba (Ém. et M. Laur.). — VI : Kimbunga [entre la Wamba et le Kwango] (Gent.). — VIII : entre Ikori et Kinanga-Sanga (Dew.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Ind. nou cl. : Sogo (Dem.).

AMARYLLIDACEAE

HYPOXIS L.

Hypoxis angustifolia *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) 182; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) 111; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 231 et Étud. fl. Cgo (1896) 260; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 378; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 31; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 61 et Pl. Gilletianae, I (1900) 52 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 52].

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens, A. 221). — V : Kisantu (Gill. 181).

CURCULIGO Gaertn.

Curculigo gallabatensis *Schweinf.* ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 266; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 236 et Étud. fl. Cgo (1896) 260; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 383; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 31; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 61 et Reliq. Dewevr. (1901) 235.

1888 (Fr. Hens). — II env. de Boma (Dew.). — II a : Kibinga (Dup. 352). — IV : Lutete (Hens).

CRINUM L.

Crinum congolense *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 370, t. 109-111 et fig. c.

1903? (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

Crinum giganteum *Andrews* Bot. Repos. (1804) t. 169; *Hook.* in Bot. Mag. (1809) l. 5205; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 404; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 35; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 18; II (1907) 21 et *Miss. Laurent* (1906) 215, t. 49-50 et fig. 24.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Ang. Linden). — VI : Sulu [vallée de la Djuma] (Gent.); Kougo [Kwilu] (Leser.). — XII d : Munza (Schw.).

Crinum Laurentii *Th. Dur.* et *De Wild.* in Rev. hort. belg. et étrang. XXIII (1897) 97, cum ic.; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI^a, 80]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 230; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 216, t. 47-48 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 21, t. 33; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 403.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : Shinganga (Dew.); C. sur les bords de la Lukula et du Lubusi (Ém. Laur.).

Crinum majakallense *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 399.

1880 (von Mechow.). — VI : pays des Majakalla près de la rivière Kwango (Mech.).

Crinum Massaianum [*L. Linden* et *Rodig.*] *N. E. Br.* in Kew Bull. (1888) 100; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 398.

Brunsvigia? — *L. Linden* et *Rodig.* in Illustr. hort. (1887) 55, t. 19.

1886 (Aug. Linden). — Congo (Lind.).

Crinum natans *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 396; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 235.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : CC. dans la Lulanga (Dew.). — Ind. non cl. : le Lomami (Dew.).

Crinum purpurascens *Herb.* Amaryll. (1837) 250; *Bak.* in Bot. Mag. (1880) t. 6525 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 396. pr. p.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 21.

1904 (Éd. Lescauwert). — VI : Kongo [Kwilu] (Leser. 141).

— — var. **angustifolium** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 18; II (1907) 120, t. 67-68.

1902 (Alph. Cabra). — II a : Boma-Vonde [Mayumbe] (Cabra). — Cette plante serait très répandue dans le Mayumbe, d'après M. Cabra.

Crinum scabrum *Sims* in Bot. Mag. (1820) t. 2180; *Bury* Hexandr. Pl. t. 32; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 251 et Étud. fl. Cgo (1896) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 401; *De Wild.* et

Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 238; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 13 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 21.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Bena-Kasadi (Lescr.). — XII c : Gombari (Delp.). — XIII d : Kasongo ; Pianilombe (Dew.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Crinum zeylanicum [L.] L. Syst. nat. ed. 12 (1766) 236; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 401.

Amaryllis — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 293.

A. ornata Ker (non Ait.) in Bot. Mag. (1809) t. 1171.

C. Herbertianum Wall. Pl. Asiat. rarior. II (1831) t. 145.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst. in *The River Congo*, cum xyl.).

HAEMANTHUS L.

Haemanthus angolensis Welw. ex *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* XVI (1878) 194 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 390; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 34; *De Wild.* Esp. genr. Haemanthus (1903) 34 et *Miss. Laurent* (1906) 214.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Munuuga (Ém. et M. Laur.).

Haemanthus Arnoldianus *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 24 [B. S. B. B. XL, 30]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 237.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 909). — Noms vern. : **Kiape** (Kasongo) ; **Luvungi-Vungi** (Tanganika) ; **llanga** (Ikwangula) (Dew.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Haemanthus Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 56.

1896 (Alph. Cabra). — II a : au S. de Boma-Vonde (Cabra).

Haemanthus cinnabarinus *Decne* in *Van Houtte* Fl. des Serres, II (1857) 27, t. 1195; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1862) t. 5314; *Bak.* Handl. Amaryll. 64 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 390; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 104.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : Moushuni; Inzia [Djuma] (Gent.; Gill., 2927).

Haemanthus diadema L. *Linden* Cat. ill. pl. nouv. Cgo, pour 1901, 27; *De Wild.* Esp. genr. Haemanthus (1903) 35, fig. 3 et *Miss. Laurent* (1906) 214, t. 79.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Sabuka (M. Laur.). — XV : Batempa [Sankuru]; Ibaka [Sankuru] (Ém. et M. Laur.).

Haemanthus Eetveldeanus *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 56 et Reliq. Dewevr. (1904) 235

1896 (Ach. Durieux) — VIII : à 4 heures de Bokakata (Ach. Dur.). — XIII : Elungu (Dew.).

Haemanthus Lescauwaetii *De Wild.* in Belg. colon. IX (1904) 91, cum xyl. et ex Gard. Chron. (1904) I, 274; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 104, t. 35, fig. 2 et Miss. Laurent (1906) 215.

1902 (Aug. Hendricks). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VII : rochers bordant la partie orient. du Lac Léopold II (Leser : M. Laur. 205). — XV : Olombe (Em. et M. Laur.).

Haemanthus Lindeni *N. E. Br.* in Gard. Chron. (1890) II, 436, fig. 85 et in Ill. hort. (1890) 89, t. 114; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 391.

1885 (Aug. Linden). — Congo (Lind.).

Haemanthus multiflorus *Martyn* Monogr. (ann ?) cum icone ex *Willd.* Sp. pl. II (1800) 25; Bot. Mag. (1806) t. 961; *Redouté* Liliac. IV, t. 204; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 265 et Étud. fl. Cgo (1896) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 388.

H. Kalbreyeri *Bak.* in Gard. Chron. (1878) II, 202; Illustr. hort. XXVI (1879) 120, t. 354; *Planch.* in Fl. des Serres, XXII (1820) 17, t. 2377.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

DEMEUSEA *De Wild. et Th. Dur.*

Demeusea longifolia *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 26 [B. S. B. B. XXXIX¹ 78]; *Dalla-Torre et Harms* Genera Siphonog. (1906) 595.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

BUPHANE *Herb.*

Buphane disticha [*L. f.*] *Herb.* in Bot. Mag. (1825) sub t. 2578; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 268; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 392; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 13 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 105.

Amaryllis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 195.

Haemanthus toxicarius *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1794) 59; *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1217.

Brunsvigia — *Ker* in Bot. Reg. (1821) t. 567.

Boophane — *Herb.* App. to Bot. Mag. (1821) 18; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 35.

1899 (Edg. Verdick). — VI : village de Kiwembo [entre Kapanga et Wanga] [Haute-Wamba] (Geut. — XVI : Lukafu (Verd.)).

HYMENOCALLIS Salisb.

Hymenocallis senegambica Kunth et Bouché Ind. sem. Hort. Berol. (1848) 12; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 408; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 216.

H. littoralis Salisb. in Trans. Linn. Soc. I (1812) 358; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 35.

1905 (Marc. Laurent). — II : Boma (M. Laur.).

Obs. — Cult. à Eala [VIII] d'échantillons provenant de Boma (M. Laur.).

VELLOZIA Vand.

Vellozia aequatorialis Rendle in Journ. Linn. Soc. XXX (1895) 409; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 412; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 13.

Barbacenia — Harms in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 146.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu, env. de la station et sur le plateau (Verd.).

TACCACEAE

TACCA Forst.

Tacca pinnatifida Forst. Char. gen. (1776) 70, t. 35; *Lodd.* Bot. Cab. (1822) t. 692; *Schinzl.* Icon. fam. nat. I, t. 58; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 36; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 18, (1904) 105, (1906) 229; Miss. Laurent (1905) 48 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 148-151; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 413.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill.). — VI : chutes de Kingunshi (Gent.). — XII d : le Kibali (Schw.). — XV : le Bas-Kasai (Ém. Laur.) : rég. de Dianama [route de Luluabourg à Kanda-Kanda] (Gent.).

DIOSCOREACEAE

DIOSCOREA L.

Dioscorea acarophyta *De Wild.* in Compt.-Rend. Acad. sci. Paris, CXXXIX (1904) 552; Miss. Laurent (1905) 49 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 121.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XII c : route de Amadis à Surango (Ser. 380). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.).

Dioscorea alata Willd. Sp. pl. IV (1805) 792; *Pers.* Syn. pl. II, 621; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI. 296; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 273 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 262; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 417.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

Obs. — Cette espèce, que l'on dit spontanée dans la Guinée, est cultivée au Congo et ne s'y rencontre peut-être que subspontanée.

Dioscorea apiculata De Wild. *Étud. fl. Kat.* (1902) 14.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kanseke** (Verd. 269).

Dioscorea Beccariana Martelli Fl. Bogos. (1886) 83; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 420; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 229.

D. pentaphylla A. Rich. [non L.] Tent. fl. Abyss. II (1851) 317.

1903 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 3678).

Dioscorea Costermansiana De Wild. in *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 52 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 52].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Dioscorea Demeusei De Wild. et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 238.

1891 (F. Demeuse). — II a : Shinganga (Dew.); Ma-Vungu-Singa (Dup.). — IX : pays des Bangala (Dem.). — Nom vern. : **Balatadi** (Dew. 329).

Dioscorea dumetorum [Kunth] Pax in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. II, 5 (1887) 134; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 274; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 419; *Th. Dur.* et *De Wild.* Reliq. Dewevr. (1901) 237; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 15; Miss. Laurent (1903) 48 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 121.

Helmia — *Kunth* Enum. pl. V (1850) 436.

D. triphylla A. Rich. [non L.] Tent. fl. Abyss. II (1851) 316, t. 96 B.

D. Quartiniana A. Rich. l. c. 316, t. 96 A; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 40.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : Yumbi et env. (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Elsk.); Ikongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Nipoko [Ikelemba] (M. Laur.). — XII a et b : entre Bima et Bambili (Ser.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Hela**, **Ilhuie** (Elsk.); **Tsana** (Tumba); **Kolongo** (Verd.).

Dioscorea Liebrechtsiana De Wild. in *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 53 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 53] et Miss. Laurent (1905) 49.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 384); Yumbi (Ém. et M. Laur.).

Dioscorea macroura Harms in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1897) 266; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 416; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 12 [B. S. B. B. XXXIX^a, 404]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 50 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 22, t. 28, 121.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Cabra). — Congo (Dem.). — V : près de Yumbi (Ém. Laur.). — XVI : Pweto (Desc.).

Dioscorea minutiflora Engl. in Engl. Jahrb. VII (1886) 332; *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1893) 146, t. 8 [*err. cal.* multiflora]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 39; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 105 et Miss. Laurent (1905) 51.

D. praehensilis Benth. var. — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 418.

1903 (Aug. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumeue (Hendr. in Gill. 3072). — X : Imese (Em. et M. Laur.).

Dioscorea odoratissima Pax in Engl. Jahrb. XV (1893) 146; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 274 et Étud. fl. Cgo (1896) 262.

1880 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1043).

Obs. — M. Baker [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 418] réunit cette espèce au *D. praehensilis* Benth.

Dioscorea praehensilis Benth. in *Hook* Niger Fl. (1849) 536; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 275 et Étud. fl. Cgo (1896) 262; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 418, pr. p.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — Cougo (Buett.). — IX : pays des Bangala (Hens).

Dioscorea Preussii Pax in Engl. Jahrb. XV (1892) 147; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 275; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 417; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 238.

1896? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Dioscorea pterocaulon *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 58 et Reliq. Dewevr. (1901) 238; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 121.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 825 a). — VIII : Eala (M. Laur. 1488).

Dioscorea sativa L. Sp. pl. ed. 4 (1753) 1033; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 263, in obs.; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 415; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 15 et Miss. Laurent (1905) 51.

1895 (Ém. Laurent). — II a : Bingila (Dup). — IV : Sona-Gougo (Ém. et M. Laur.). — V : Berghe-Ste-Marie (Ém. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Majilji** (Verd.). — Ind. non cl. : Nelle (Ém. Laur.).

Obs. — Fréquemment cultivée pour ses tubercules aériens (Ém. Laur.).

Dioscorea Schimperiana Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 317; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 273.

Le type est indiqué en Abyssinie et dans l'Angola.

— — var. **vestita** Pav. in Engl. Jahrb. XV (1892) 148; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. V, 274 et Étud. fl. Cgo (1896) 263; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 419.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1149).

Dioscorea Schlechteri Harms in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 273 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12548).

Dioscorea smilacifolia De Wild. et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 58 et Reliq. Dewevr. (1901) 239.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew.).

Dioscorea Thonneri De Wild. et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 7, t. 21 et Pl. Gilletianae, I (1900) 54 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 54]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 106, (1906) 230; II (1907) 121 et Miss. Laurent (1905) 51.

1896 (Fr. Thonner). — V : Yumbi (Ém. et M. Laur.): Sanda (Odd. in Gill. 3700); Kisantu (Gill.); rég. de Lula-Lumbe (Hendr. in Gill. 3072). — VII : Nioki (Ém. et M. Laur.; Gill. 591, 757). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 125, 1271). — IX : Upoto (Thonn. 9). — XII a et b : route de Bima à Bumbili (Ser. 172).

Dioscorea Verdickii De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 15.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 426).

LILIACEAE

SMILAX L.

Smilax Kraussiana Meisn. in Flora, XXVIII (1845) 312; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1875) 162, t. 106, A. DC. Monog. Phan. I, 171; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 279 et Étud. fl. Cgo

(1896) 263; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 424; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 240; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 12; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 104; II (1907) 21 et Miss. Laurent (1905) 95.

Smilax Morsaniana *Kunth* Enum. pl. V (1850) 241.

S. Kraussiaa *Metsn.* var. — *A. DC.* Monog. Phan. I (1878) 172; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 263.

1885 (R. Buettner). — IV : Lukungu. — Nom vern. : *Nzilla* (Dew.). — IV : Tumba (Luja); entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : le Stanley-Pool (Buett.); env. de Kwamouth (Biel.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala; Irebu (Ém. Laur.). — IX : Bolombo; eu aval de Bolombo (Ém. Laur.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. Laur.). — XIII c : Wabundu (Dew.). — XVI : plateau aux env. de Lukafu. — Nom vern. : *Mukosobola* (Verd.).

ASPARAGUS L.

Asparagus abyssinicus *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 319; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 620; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 280 et Étud. fl. Cgo (1896) 264.

A. retrofractus *Forsk.* [non *L.*] Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 93.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

Obs. — *M. Baker* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 433] réunit cette espèce à *A. africanus* *Lam.*

Asparagus africanus *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) 295; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 619; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 281 et Étud. fl. Cgo (1896) 264; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 42; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 433; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 86]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 248; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 104 et Miss. Laurent (1905) 44.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.); Bingila (Dup.); entre Lemba et Bidi (Cabra). — IV : Lukungu (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Léopoldville (Camp); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kwamouth (Gent.); Chenal (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — XVI : Toa (Desc.).

— — var. *biarticulatus* *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 31 [B. S. B. B. XL, 25].

1899 (H. Tilmann). — Savaues du Bas-Congo (Tilm.).

Asparagus drepanophyllus *Wehw.* ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1877) 254; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 284 et Étud. fl. Cgo (1896) 264; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 435; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 43; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59; II (1900) 61; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 229.

1882 (P. Pogge) — Bas-Congo occ. (Ëm. Laur.) — IV : Banza-Puta (Dem.); Sona-Gougo (Luja). — V : entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : Kitamba (Buch.). — XIII c : Lokandu [Riba-Riba] (Ëm. Laur.). — XIII d : env. de Nyaugwe (Dew.). — XV : le Saukuru (Ëm. Laur.); Kawango [la Lulua] (P'g.).

Asparagus Duchesnei *L. Lindl.* Cat. illust. pl. nouv. Cgo (1901) 7; *De Wild.* Miss. Laurent (1900) 44, t. 18.

1903 (Ëm. et Marc. Laurent). — IV : Kitobola (Ëm. et M. Laur.). — XV : Lomkala (Ëm. et M. Laur.).

Asparagus falcatus *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 313; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 284 et Étud. fl. Cgo (1896) 264; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 435.

A. aethiopicus *L.* var. *ternifolius* *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1871) t. 261 et in *Gard* Chron. (1872) 1537, cum ic.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Asparagus katangensis *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 26 [B. S. B. B. XL, 42].

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu (Verd. 201).

Asparagus laricinus *Burch.* Trav. inter. S. Afr. I (1862) 537; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 620 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 433.

Le type croît dans la région du Mozambique et dans l'Afrique austr.

— — var. **katangensis** *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 27 [B. S. B. B. XL, 33].

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu (Verd. 642).

Asparagus Pauli-Guilielmi *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 203; *Grant* et *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 161, t. 105; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 287; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 428.

Le type, largement dis-éminé dans l'Afrique trop., n'a pas été trouvé au Congo.

— — var. **katangensis** *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 27 [B. S. B. B. XL, 33].

1900 (Edg. Verdieck). — XVI : le Katanga (Verd.).

Asparagus plumosus *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 613; *Fl. des Serres.* XXIII, 117, t. 2413; *Ill. Hort.* XXVII, t. 314; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 287; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 86]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 430.

1895 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Dup.).

KNIPHOFIA Salisb.

Kniphofia dubia *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 10.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verl.).

ALOE L.

Aloe congolensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 61; Pl. Gilletianae, II (1901) 103 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 843] et Reliq. Dewevr. (1901) 240; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 102 et Miss. Laurent (1905) 39.

1895 (A. Dewèvre). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); Léopoldville; env. de Kinuenza (Dew.). — XV : la Loanje, rive gauche; route de Lusambo à Kanda-Kauda (Gent.).

Aloe venosa *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 471; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 313 et Étud. fl. Cgo (1896) 165; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 460.

1882 (P. Pogge). — XIII ? : entre Nyangwe et Kimbuudo (Pg. 1460).

DRACAENA L.

Dracaena arborea *Link* Enum. pl. Hort. Berol. I (1821) 341; *Regel* Revis. Drac. 36; *Bak.* in Journ. Linn. Ser. XIV (1875) 528 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 439; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 47; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 41.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — XV : Inkougo; Batempa; Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Dracaena Buettneri *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 478; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 447.

1896 (Ém. Laurent). — V : Lukolela (Ém. Laur.).

Dracaena Burkeana *Planch.* in Annal. sci. nat. Sér. 3, IX (1848) 192; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 402; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 88.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Kisantu (Ém. et M. Laur.).

Dracaena Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 16.

1901 (It. Butaye). — VI : Tumba-Mani But. in Gill. 23241.

Dracaena capitulifera *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59 et Reliq. Dewevr. (1901) 241; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 41 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 226.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Bolobo (Dew. 701). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2919; Gent.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Dracaena congensis *Engl. ex De Wild.* Miss. Laurent (1905) 42.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.) — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

Dracaena fragrans [*L.*] *Ker-Gawl.* in Bot. Mag. (1808) t. 1081; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 337; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 440; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 17; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 42.

Aletris — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 456; *Andræus* Bot. Repos. V, t. 306; *Redouté* Liliac. II, t. 117.

Sansevieria — *Jacq.* Fragm. bot. (1800) t. 2, fig. 6 et t. 33, fig. 1.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).

Obs. — Le *D. Lindeni* [Hl. Hort. XXVII (1880) t. 384] est, d'après M. Baker, [l. c.] une forme de cette espèce, à feuilles panachées de blanc.

Dracaena Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228.

1902 (L. Gentil). — XV : route de Luebo à Luluabourg (Gent. 51).

Dracaena Kindtiana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 119, fig. 2, t. 65-66.

Ann. ? (Coll. ?). — Congo (Coll. ?).

Obs. — Espèce introduite dans les serres du Jardin colonial de Laeken.

Dracaena Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1902) 42, t. 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 20.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Kisantu (Gill. 1654). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Dracaena laxissima *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 478; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 265; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 446.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1462).

Dracaena Odonii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 227, t. 57.

1903 (Ad. Odon). — V : env. de Sanda (Odd. in Gill. 3333).

Dracaena Poggei *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 478; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 455; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 229 et *Miss. Laurent* 1905] 42, (1906) 214.

1875 (P. Pogge). — IV : bord de la Pioka (Ém. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.); vallée de la Djuma (Gill. 2770). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.); en amont de Yanguli (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Laja); le Sankuru (Ém. et M. Laur.); Olombo; Lie (Ém. et M. Laur.); la Lulua (Pg.); pays de Muata-Jamvo (Pg. 275). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg.).

— — var. **elongata** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 43, t. 23.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

Dracaena reflexa *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* II (1786) 324; *Redouté* *Liliac.* II, t. 92; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1875) 530; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 329.

Le type, largement dispersé dans toutes les régions trop., serait originaire de l'île Maurice.

— — var. **Buchneri** *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 96.

1880 (Max Buchner). — VI : Dinga (Buett. 531). — XV? : Kehungula sur la Lovo ; Mukinsh [Congo?] (Buch. 684).

— — var. **nitens** {*Welw.*} *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII (1898) 441; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59 et *Reliq. De-wevr.* (1901) 242; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 44, t. 17.

D. nitens Welw. ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2.* I (1877) 252; *Rendle* *Cat. Welw. Pl.* II, 17.

D. Lacourtii Hort. ex *De Wild.* l. c. 1905] 44.

1891 (Hyc. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst). — II a : la Lemba (Dew.); Luki (Ém. et M. Laur.). — III-IV : la Lufu (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Léopoldville; Kimuenza (Gill. 1670). — VI : rég. de Luana (Lescr. 35). — VIII : Lulanga; Eala (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Yanongo (Ém. et M. Laur.). — XV : Mauge (Ém. et M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.). — Nom vern. : Ndala [rég. des Cataractes] (Dew.).

Dracaena rubro-aurantiaca *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo,* I (1906) 228, t. 58.

1895 (A. Dewèvre). — II : île du Congo dans les env. de Malela (Dew.).

Dracaena surculosa *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1828) t. 1169; *Bot. Mag.* (1867) t. 5662; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 330 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 266; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 440.

D. Godseffiana Hort. ex *Rev. Hort.* (1890) 201.

Ann.? (Coll.?). — Congo (Coll.?).

Obs. — M. Baker qui, en 1875, indiquait, d'après des échantillons de

Christian Smith, le *D. spicata* Roxb. et sa var. *aurantiaca* Bak. dans le Bas-Congo, n'en parle plus dans la *Flora of tropical Africa*. — [Conf. *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 532].

Dracaena thalloides *Ch. Morr.* in Belg. Hort. (1860) 348, cum ic.; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV 1875 534 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 445; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59 et Reliq. Deweyr. (1901) 242; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1906) 229 et Miss. Laurent (1905) 44.

D. Aubryana *Ad. Brongn.* in Fl. des Serres, XV (1862) 47, t. 1522-1523.

1893 (Ém. Laurent). — II : île voisine de Malela (Dew. 169). — II a : Zenze. — Nom vern. : *Gungowa* (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1166). — VI : rives du Kwango entre Popokabaka et les chutes François-Joseph (Gent.). — VIII : Coquilhatville (M. Laur. 200 b).

Dracaena ueleensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 20, t. 8, 9.

1905 (F. Seret). — XII c : bord de l'Uelô à Surango (Ser. 397).

Dracaena usambarensis *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 144.

Le type croît dans l'Afrique or. allem.

— — var. *longifolia* *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 43.

1898 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — VII : Ganda (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : Lisala (Ém. et M. Laur.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

BULBINE L

Bulbine asphodeloides [*L.*] *Spreng.* Syst. veget. II (1825) 85; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 336; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 62; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 475.

Authenticum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 311; *Jacq.* Hort. Vindob. II, t. 181.

B. abyssinica *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 334, t. 97.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.). — Ind. non cl. : Kamisamba [Congo belge ?] (Buch.).

— — var. *filifolioides* *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 8.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 230, 264).

ACROSPIRA Welw.

Acrospira asphodeloides *Welw.* ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Sér. 2, I (1878) 255, t. 34; *Rendle* Cat. Welw. Pl II, 50; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 447; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 38 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

1891 (F. Demense). — IV : Kikando-Luvituku (Dem.). V : voie ferrée entre Léopoldville et Tumba (Ém. et M. Laur.); vég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3044, 3287); Kisantu (Gill. 649, 1325, 3136). — VIII : Eala [cult.] (M. Laur. 132). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Acrospira Laurentii *De Wild.*, Miss. Laurent (1906) 211.

1905 (Marc. Laurent). — XV : Gumbumi (M. Laur.).

— — var. **variegata** *De Wild.*, l. c. (1906) 211.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur.).

ANTHERICUM L.

Anthericum congolense *De Wild. et Th. Dur.*, Contr. fl. Cgo, I (1899) 60 et Reliq. Dewevr. (1901) 242.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Lubunda (Dew. 1029).

Anthericum Laurentii *De Wild.*, Miss. Laurent (1905) 39.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : le Bas-Kasai (Ém. et M. Laur.).

Anthericum sphacelatum *Bak.*, in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 303 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 489; *De Wild. et Th. Dur.*, Contr. fl. Cgo, I (1899) 61 et Reliq. Dewevr. (1901) 243; *De Wild.*, Miss. Laurent (1903) 39.

1883 (H. Johnston). — II a : route de Tshoa à Tshia (Dew.); plateau de la Lemba (Cabré). — V : env. de Bolobo (Johnst.); euv. de Suata (Ém. et M. Laur.).

CHLOROPHYTUM Ker.

Chlorophytum Fuchsianum *De Wild.*, Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 102 et Miss. Laurent (1905) 38, 211, t. 16.

1896 (Ém. Laurent). — IV : route des caravanes (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1902). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur. 183). — IX : Bolombo; Umangi (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XV : Koudue (Ém. et M. Laur.).

Chlorophytum macrophyllum [*A. Rich.*] *Aschers. et Schweinf.*, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 294; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 53; *Bak.*, in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 498; *De Wild.*, Miss. Laurent (1904) 211.

Anthericum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 498.

1882? (P. Pogge). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.). — XVI : à FO. du Lualaba (Pg. 1479).

VERDICKIA De Wild.

Verdickia katangensis De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 7.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : euv. de Lukafu (Verd. 329).

DASYSTACHYS Bak.

Dasystachys africana [Bak.] Th. et Hél. Dur.

Caesia — Bak. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 160, t. 103 A.

Chlorophytum — Engl. in Engl. Jahrb. XV (1892) 470.

Dasystachys Grantii Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pl. III (1883) 789;

Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. VII, 513; De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 9.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu (Verd. 259, 296).

Dasystachys Verdickii De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 10.

1899 (Edg. Verdieck). — XVI : Lofoi (Verd.).

ALLIUM L.

Allium angolense Bak. in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 262 et in Dyer Fl. trop. Afr. VII, 517; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 56; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 16.

1902 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

DIPCADI Medic.

Dipcadi Mechowii Engl. in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 94.

1880 (Alex. von Mechow). — Congo [vraisemblablement du Kwango] (Mech. fide Engl.).

Dipcadi Thollonianum Hua Contr. fl. Congo franc. [Liliac.] (1898) 23; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. VII, 523; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 106.

1901 (R. Butaye) — V : Lemfu (But. in Gill. 2263).

ALBUCA L.

Albuca angolensis Welw. Apont. phyto-geogr. (1859) 591; Bak. in Saund. Refug. bot. t. 336 et in Dyer Fl. trop. Afr. VII, 534; De Wild. Miss. Laurent (1905) 10 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 225.

1902 (L. Gentil). — XV : Kanda-Kanda (Gent.). — XVI : Musumba, 8 ½° (Pg.). Cult. à Eala [VIII] Em. et M. Laur.].

A. angolensis var. *grandiflora* *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 40.
1903? (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

Albica Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 225.
1902 (L. Gentil). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Albica Gilletii *De Wild.* in La Belg.-colon. (1904) 42, cum ic. et Étud.
fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 103, (1906) 236, t. 35, fig. 1.
1903 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.); Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3105).

Albica katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 12, (1903) 226 et
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 226.
1891 (G. Descamps). — XV : le Lubi [affl. du Sankuru] (Desc.). — XVI : Lu-
kafu (Verd. 479).

Albica Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 92.
1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Albica variegata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 226.
1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.).

URGINEA Steinh.

Urginea altissima [L.] *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) 221 ;
Th. Dur. et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 380; *De Wild.* et *Th. Dur.*
Contr. fl. Cgo, II (1900) 62 et Reliq. Dewevr. (1901) 243; *Bak.* in
Dyer Fl. trop. Afr. VII, 538; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 211,
t. 85 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

Ornithogalum — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 199.

Drimia — *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1074.

O. giganteum *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 87.

1893 (Ém. Laurent). — II : env. de Boma (Schimp.). — II a : Zenze (Ém. Laur.);
Lemba (Dew.). — III : entre Matali et Tumba (Ém. Laur.). — IV : vallée de la
Gongo [env. de Tumba] (Ém. Laur.). — V : Leopoldville (Ém. Duch.); Kisantu
(Gill.). — VI : Tumba-Mani (Cabra et Michel).

Urginea micrantha [A. Rich.] *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop.
(1867) 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) 217; *Engl.* in Engl.
Jahrb. VIII (1887) 59; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. Fl. Afr. V, 385 et
Étud. fl. Cgo (1896) 266; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 537.

Scilla — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 328.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — II a : Zenze (Ém. Laur.).

Urginea viridula *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 538.
1885 (Coll. b). — Congo (Hort. Bull. fide cl. Bak.).

DRIMIOPSIS Lindl.

Drimiopsis Barteri *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III, App. (1870) 18;
in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) 228 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII,
543; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 213, t. 51.
1903† (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

SCILLA L.

Scilla camerooniana *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III App. (1870) 9 et
in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 554; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr.
V, 391; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 103 [B. Herb.
Boiss. Sér. 2, I, 843] et Reliq. Dewevr. (1901) 243; *De Wild.* Étud.
fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101.
1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (But.) — IV : Lukungu. — Nom vern. : **Malonga**
(Dew.).

Scilla Ledieni *Engl.* in Gartenfl. XXXVIII (1889) 153, 305, t. 1294;
Th. Dur. et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 394 et Étud. fl. Cgo (1896)
267; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 557.
1887 (F. Ledien). — IV : Musumbi [entre Lukungu et Palabala] (Ledien).

— — var. *Laurentii* *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 41.
1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Chenal (Ém. et M. Laur.).

— — var. *zebrina* *De Wild.* l. c. (1905) 213, t. 52.
1903† (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

ORNITHOGALUM L.

Ornithogalum caudatum *Ait.* Hort. Kew. I (1789) 442; *Jacq.* Icon.
pl. rar. II (1793) t. 423; Bot. Mag. (1805) t. 805; *Th. Dur.* et *Schinz*
Consp. fl. Afr. V, 400 et Étud. fl. Cgo (1896) 267; *Bak.* in *Dyer*
Fl. trop. Afr. VIII, 545.

Urophyllon — *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1871) t. 202.
1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

WALLERIA Kirk.

Walleria Mackenii T. Kirk in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 597, t. 52, fig. 2; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII, 459 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 507; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1906) 6.

W. angolensis *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 263; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 418.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 310).

GLORIOSA L.

Gloriosa simplex L. Mant. pl. (1767) 62; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 65; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

G. virescens *Lindl.* in Bot. Mag. (1825) t. 2539; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 417 et Étud. fl. Cgo (1896) 267; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 61; II (1900) 62; Pl. Thonnerianae (1900) 7 et Reliq. Dewevr. (1901) 243; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 38 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224; II (1907) 20; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 563.

Methonica — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) 277; *Hook.* in Bot. Mag. (1856) t. 4938.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo, AC. — Nom vern. : **Uegna** (Cabra). — V : le Stanley-Pool (Buett.) : entre le Stanley-Pool et Léopoldville (Ém. et M. Laur.) ; env. de Léopoldville (Luja; Dybowsky) ; env. de Kwainouth (Biel.) ; entre Dembo et Kisantu (Gill.) ; entre Tumba et le Kwango (Cabra et Michel). — VI : Lusubi (Lescr.). — IX : Upoto (Thonn.). — XII a : Nala (Van Ryss.). — XVI : le Katanga (Briart) Lofoi (Verd.) ; Pala (Deb.) ; Pweto (Chargeois) ; la Lufira (Hecq). — Ind. non cl. : Mutembele (Dew.). — Noms vern. : **Katongulu** [Kasongo] ; **Lokama-Kama** [Tanganika] (Dew.).

Gloriosa superba L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 305; *Andrews* Bot. Repos. II (1801) t. 129; Bot. Reg. (1816) t. 77; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 417; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 563; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 80] et Contr. fl. Cgo, I (1899) 61; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 127-128 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101, (1906) 224.

Methonica — *Crantz* Inst. rei herb. I (1766) 474; *Redouté* Liliac. I, t. 26.

1892 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe (Kest.). — VI : village Gulu [Djuma] (Gent.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.). — XV : entre Lusambo et le Loinani ; le Kasai (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Lumpundi (Dew.) ; le Lualaba-Kasai (V. Dur.).

LITTONIA Hook.

Littonia grandiflora *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 34 [B. S. B. B. XL, 34]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 7.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. **Sjimbadala** (Verd. 1288).

Littonia Lindenii *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 566.

1893 (G. Descamps). — XVI : Pweto [Lac Moero] (Desc.),

PONTEDERIACEAE

EICHORNIA Kunth.

Eichornia natans [*P. Beauv.*] *Solms* in *Brem. Abhandl.* VII (1882) 254 et in *DC. Monog. Phan.* IV, 526; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 418; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gillelianae*, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55]; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 4].

Pontederia — *P. Beauv.* *Fl. d'Oware*, II (1807) 18, t. 68, fig. 2.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 260, 1008).

CYANASTRUM Oliv.

Cyanastrum Verdickii *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 5.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 275).

XYRIDACEAE

XYRIS L.

Xyris angustifolia *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, V (1899) 30 [B. S. B. B. XXXVIII³, 149] et *Reliq. Dewv.* (1901) 243; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 20.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : entre Mokanga et Ikari (Dew. 1069).

Xyris capensis *Thunb.* *Prodr. pl. Capens.* (1794) 12; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 132; *Nilss.* [Stud. ueber Xyrid.] in *Svensk Vet. Akad. Handl.* XXIV, n. I-1 (1892) 40; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 13; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 13; *Rendle* *Cat. Welw.* Pl. II, 68; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 172.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : bords du Lac Moero (Verd.).

Xyris congensis *Buett.* in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* XXXI (1889) 71; *Nilss.* [Stud. ueber Xyrid.] in *Svensk Vet. Akad. Handl.* XXIV, n. 14 (1892) 29; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 420 et *Étud. fl. Cgo*

(1896) 268; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 214; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, I (1904) 99; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 23.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (But.). — VIII : entre Équateurville et Lukolela (Buett. 585). — XIII : env. de Matshatsha (Dew. 1091).

COMMELINACEAE

POLLIA Thunb.

Pollia condensata *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1884) 125; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 131; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 74; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 27; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 35.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : — Iuongo (Ém. et M. Laur.)

— — var. ***variegata*** *Hort.* ex *Th. Dur.* in *Rev. Hortic. Belg.* XXXIV (1908) 407, cum ic.

1907 (A. Sapin). — Cougo (Sap.).

PALISOTA Rehb. (1)

Palisota ambigua [*P. Beauv.*] *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 131, t. 5, fig. 3; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 421 et Étud. fl. Cgo (1896) 268; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41; II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVI^a, 81; XXXVII, 127] et Reliq. Dewevr. (1901) 244; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 31; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 36, (1906) 209.

Commelina — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 26, t. 15.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Kalandi** (Dew.); Eala (M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV : Lubue (Luja); Mukenge. — Nom vern. : **Vuuma** (Ém. Laur.).

Palisota Barteri *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1862) t. 5318; *Schoenl.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. II, 4 (1888) 62, fig. 31, A-E; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 132 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII,

(1) M. Schlechter [Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 273] a indiqué le n° 12613, récolté par lui à Coquilhatville [VIII], comme étant le *Pal. acuminata* Clarke. Ce nom est introuvable.

2.); *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 62; *Hua* in B. S. B. Fr. XLI (1900) p. LIV.

1891 (F. Demeuse). — XIII a : Stanley-Falls (Dem.).

Palisota hirsuta [*Thunb.*] *K. Schum.* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 210, in syn.

Dracaena — *Thunb.* Diss. de *Dracaena* (1808) 16.

P. thyrsoflora *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 544 (syn. excl.); *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 133; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422 et Étud. fl. Cgo (1896) 268; *Hua* in B. S. B. Fr. XLI (1900) p. LV; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 31; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62 et Pl. Thonnerianae (1901) 5; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 100, (1906) 222 et Miss. Laurent (1905) 35, (1906) 210.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Êm. Laur.). — III : Vivi (Johnst.). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : entre Dembo et le Kwango (But.); Kisantu; Sabuka (Êm. et M. Laur.); rég. de Sanda (Odl.). — VIII : Ikaw (Lamb.). — IX a : Gali (Thoun.). — XV : Bukila (Êm. et M. Laur.); le Kasai, le Sankuru et la Lulua (Êm. Laur.). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg.).

Palisota Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 210, t. 3.

1903 (Êm. et Marc. Laurent). — XV : Dibeles (Êm. et M. Laur.).

Palisota Mannii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 132 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 29; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 62 et Reliq. Dewevr. (1901) 244; *Hua* in B. S. B. Fr. XLI, p. IV.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — XIII c : Lokaudu. — Nom vern. : Teti-Teti (Dew.). — XIII d : Vieux Kasongo (Dew.).

Palisota Preussiana *K. Schum.* ex *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 30; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 36.

1903 (Êm. et Marc. Laurent). — VII : Kutu (Êm. et M. Laur.).

Palisota prionostachys *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 134; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422 et Étud. fl. Cgo (1896) 268; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62; II (1900) 63; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 35 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 18; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 32.

P. congolana *Hua* in B. S. B. Fr. XLI (1900) p. LIII.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Êm. Laur.). — XII d : pays des Mangbetu (Schw. 3622). — XV : forêts entre le Lomami et Lusambo ; Dibeles ; Butala ; Bukila (Êm. Laur.) ; Munungu (Lescr.). — Ind. non cl. : le Luatschium [Congo] (Buch.).

Palisota Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 100.

1902 (L. Pynaert). — VIII : env. d'Eala (Pyn.).

Palisota Schweinfurthii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 132 pr. p. et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 29; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVII, 128]; *Hua* in B. S. B. Fr. XLI (1900) p. 55; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 74.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Bingila (Dup.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3279, 3281). — XV : forêts de la Lulua, du Sankuru et du Kasai (Eln. Laur.).

COMMELINA L.

Commelina aethiopica *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 189; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 103 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 843]; *Clarke* in *Dyer* Pl. trop. Afr. VIII, 50; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1078).

Commelina africana *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 41; *Redouté* Liliac. IV (1808) t. 207; Bot. Mag. (1811) t. 1431; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 164; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422 et Étud. fl. Cgo (1896) 269; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 45.

1891 (G. Descamps). — V : Kisantu (Gill. 106, 997). — Ind. non cl. : Luala (Desc. 55).

Commelina aspera *G. Don* ex *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 542; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. VIII, 180; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 78; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55] et Pl. Thonnerianae (1901) 6; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 56; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 14.

1896 (Fr. Thonner). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Yabosumba près Dobo (Thonn.). — XV : route de Luebo-Luluaboury (Gent.).

Commelina benghalensis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 41; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 424; *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI, t. 2065; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41; II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVI², 87; XXXVII, 128]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 76; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 159 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 41; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 245; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 117 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 18.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Kwamouth (Biel.) — XII c : Nianagra (Delp.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Mokole [Lubi] (Leser.). — XVI : Albertville [Toa] Heeq. (Desc.). — Noms vern. : **Popivilla** [Ikwangula]; **Milesa** [Tangamka]; **Ignia** (Kasongo) (Dew.).

Commelina capitata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 541; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 176; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 424 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 269; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 78; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 54; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI², 87]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 245; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 36 et *Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo*, I (1906) 222; II (1907) 18.

1891 (F. Demense). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu et env. (Gill.); Sauda (Odd.); Kimueza (Gill.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Bolovo**; Irebu (Ém. et M. Laur.); Équateur [Wangata] (Dew.; Pyn.). — IX : pays de Bangala (Dew.). — XI : Isangi; Basoko (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.); env. de Stanleyville (Ém. Laur.). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Commelina Clarkeana *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 245; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 222.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Gill. 3253). — II a : Katala (Dew. 183).

Commelina condensata *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 190 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 436; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 421; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55] et Pl. Thonnerianae (1900) 6.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 932). — IX : Bobi (Thonn.). — IX a : Gali (Thonn. 22, 52).

Commelina Dammeriana *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 343, t. 6.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua, vers le 9° 4₂' (Pyn. 454).

Commelina Forskalaei *Vahl* Enum. pl. II (1806) 172; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 425; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 168 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 41; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 222.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimueza (Gill.).

Commelina latifolia *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 340; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 173, pr. p. et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 50; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 426; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVII, 128].

1893 (P. Dupuis). — II : Sisia (Dup.).

Commelina nudiflora L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 41; *Clarke* in *DC. Monog. Phan.* III, 144; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 427 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 269; *Rendle* *Cat. Welw. Pl.* II, 74; *Clarke* in *Dyer* *Fl. trop. Afr.* VIII, 36; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI², 87]; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Thonnerianae* (1900) 6 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 245; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 222.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Monteiro); Sisia (Dup.). — II a : Katala. — Nom vern. : Singa-Singa (Dew.); Bingila (Dup.). — IV : Lukungu (Hens); Kimpesse (Dem.). — V : Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — VI : entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel). — XV : env. de Lusambo. — Nom vern. : Bafwamfwa. — XVI : Pala (Deb.).

— — form. *agraria* [*Kunth*] *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 63, in obs.

C. agraria *Kunth* *Enum. pl. IV* (1843) 38; *Webb et Berth.* *Ilust. nat. Canar.* III, 356, t. 238.

1891 (F. Demeuse). — IX : pays des Baugala (Dem.).

Commelina scaposa *Clarke* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, VII (1900) 50 [B. S. B. B. XXXVIII², 220] et in *Dyer* *Fl. trop. Afr.* VIII, 38.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Commelina Schweinfurthii *Clarke* in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 158; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 428; *Clarke* in *Dyer* *Fl. trop. Afr.* VIII, 41; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 223.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lofoi (Verd.).

Commelina umbellata *Schumach.* et *Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 21; *Clarke* in *DC. Monog. Phan.* III, 179; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 428; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, II (1901) 103 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 843]; *Clarke* in *Dyer* *Fl. trop. Afr.* VIII, 55; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 101, (1906) 223; II (1907) 15.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu; entre Dembo et Kisantu; Kimuenza (Gill.). — VIII : le Haut-Lopori (Biel.).

Commelina Vogelii *Clarke* in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 189 et in *Dyer* *Fl. trop. Afr.* VII, 56; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 55].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

POLYSPATHA Benth.

Polyspatha paniculata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 543, t. 3; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 194 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 61; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 429; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 244; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 15 et *Miss. Laurent* (1905) 36.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.); env. de Beua-Kamba (Dew.). — XV : Munungu; Kondue (Ém. et M. Laur.).

ANEILEMA R. Br.

Anilema aequinoctiale [*P. Beauv.*] *Kunth* Enum. pl. IV (1843) 72; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 221; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 429 et Étud. fl. Cgo (1896) 271; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 60; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 79; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62; II (1900) 63 et Reliq. Dewevr. (1901) 246; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1901) 104, (1906) 223 et *Miss. Laurent* (1905) 36, (1906) 211.

Commelina — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 65, t. 38.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila; le Mayumbe (Dup.); Zobe (Dew.); Lemba. — Nom vern. : Matata (C. G. G.). — IV : Lukungu (Hens); Luvituku (Ém. Laur.). — V : Kimpoko (M. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.); Sanda (De Brouw.). — VI : env. de Dima (Leser.). — XII d : Baugwa [Mangbettu] (Schw.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.); Olombo (Ém. Laur.).

Anilema beniniense [*P. Beauv.*] *Kunth* Enum. pl. IV (1843) 73; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 224; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 430 et Étud. fl. Cgo (1896) 11; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 79; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 68; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62; II (1900) 67; Pl. Thonnerianae (1901) 6 et Reliq. Dewevr. (1901) 246; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 223 et *Miss. Laurent* (1905) 37; *Thonn.* Blütenpfl. Afrik. (1908) 128, t. 16.

Commelina — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 49, t. 87.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.); Zobe (Dew.); Temvo (Ém. Laur.). — IV : Bangu (Dem.). — V : le Stanley-Pool (Ém. Duch.); Lukolela (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — IX a : Gali (Thonn.). — XV : bords du Saukuru; env. de Lusambo (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Blakasi [Congo ?] (Burt.).

Anilema Lujaei *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 63 et Pl. Gilletianae, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 19.

1898 (Éd. Lujá). — V : marais entre Sabuka et Leopoldville [Stanley-Pool] (Lujá); env. de Kwamouth (Biel.); Lemfu (But.); Sanda (Odd.); Kisantu (Gill.).

Aneilema ovato-oblongum *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 71, t. 104; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 431 et Étud. fl. Cgo (1896) 270; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 69; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI¹, 87]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 223; II (1907) 19 et Miss. Laurent (1905) 37.

Commelina — *Roem.* et *Schult.* ex *Schult.* Mant. pl. I, Add. I (1822) 376.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens). — V : Léopoldville (Schlt.; Lujá); env. de Kwamouth (Biel.); Sanda (De Brouw.); Lukolela (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — XIII a : Yakusu (Ém. Laur.). — Ind. nou. cl. : Kibaka [Angola?] (Buett.).

Aneilema pedunculatum *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1884) 228; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 136; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 431; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 64; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 73.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : bords du Tanganika (Deb.).

Aneilema Schweinfurthii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1884) 227; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 136; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 432; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVII, 128]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 71.

Lamproditthys gracilis *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinneanae (1867) 47, t. 23, fig. A.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : C. sur tous les bords du Tanganika (Deb.).

Aneilema sinicum [*Roem.* et *Schult.*] *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1823) t. 695; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 212; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 432 et Étud. fl. Cgo (1896) 271; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 5; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 79; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 63; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41; II (1898) 38 [B. S. B. B. XXXVI¹, 87; XXXVII, 128]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 15, (1906) 223; II (1907) 19 et Miss. Laurent (1905) 37.

Commelina — *Roem.* et *Schult.* ex *Schult.* Mant. pl. I, Add. I (1822) 376.

A. secundum *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2075.

1883 (H. Johnston). — II a : Kwangila [plateau entre la Lukula et le Lubuzi] (Cabra); Bingila (Dup.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Bolobo (Johnst.); le Stanley-Pool (Dem.); Sanda (De Brouw.). — VI : Eielo (Ém. et M. Laur.); vallée de la Djúma (Gill.). — VII : Nioki (Ém. et M. Laur.). — IX : Yaminga (Pyn.). — IX a : Bokumba (Thoun.). — XV : Bas-Sankuru (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Katanga; Massima; le Lualaba (Briart); Lukafu. — Nom vern. : **Pingelema** (Verd.); Haut-Marungu (Deb.).

BUFORRESTIA Clarke.

Buforrestia imperforata Clarke in *DC. Monog. Phan.* III (1884) 234; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 433; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI^a, 87]; *Rendle* Cal. Welw. Pl. II, 80; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 76; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62; II (1900) 64 et Pl. Thonnerianae, 1900 7; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 19.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Sabuka (Luja et Em. Duch.); Kisautu (Gill.). — VIII : Equateurville (Pyn.). — IX a : Gali (Thonn.). — Ind. nou cl. : la Luaua (Cabral).

COLEOTRYPE Clarke.

Coleotrype Laurentii K. Schum. in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 377; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 37.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Munnugu (Em. et M. Laur.); bords de la Lulua, du Kasai et du Sankuru (Ém. Laur. fide K. Schum.).

CYANOTIS Don.

Cyanotis angusta Clarke in *DC. Monog. Phan.* III (1884) 260 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 70; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 840]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101.

1900 (J. Gillet). — V : Kisautu (Gill.).

Cyanotis caespitosa Kotschy et Peyr. Pl. Tinneanae (1867) 48; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 82; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 104 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 844]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101; II (1907) 19.

1900 (R. Butaye). — V : env. de Dembo (But. in Gill. 1473). — Ind. nou cl. : Kainomme [XII?] (Lescr. 162).

Cyanotis Dybowskyi Hua in B. Mus. Hist. nat. Paris, I (1895) 122; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 84; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 37 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 223; II (1907) 19.

1903 (Ém. Laurent). — IV : Tumba (Ém. et M. Laur.) — V : env. de Kwamouth (Biel.); Bokala (M. Laur. 609); Kisautu et env. (Ém. et M. Laur.); rog. de Lumene (Hendr.); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3322, 3560); env. de Lemfu (But.). — VI : entre Lusubi et Luauu (Lescr. 69).

Cyanotis lanata Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 542; *Clarke* in *DC. Monog. Phan.* III, 258; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V,

434; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63; *Rendle Cat.* Welw. Pl. II, 80; *Clarke in Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 80.

1898 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.).

Cyanotis longifolia *Benth.* (non *Wight*) in *Hook.* Niger Fl. (1849) 543; *Clarke in DC.* Monog. Phan. III, 259; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 434 et Étud. fl. Cgo (1896) 271; *Rendle Cat.* Welw. Pl. II, 80; *Clarke in Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 81.

Ann.? (Curror) — Congo (Curr.).

— — var. **Bakeriana** *Clarke* l. c. III (1881) 259; *Th. Dur. et Schinz* l. c. 271.

C. longifolia *Bak.* (non *Wight*) in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 163.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, C. 168).

Cyanotis somaliensis *Clarke* in *Kew Bull.* (1895) 229 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 83; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 19.

1904 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 3198); Sabuka (M. Laur. 524).

— — var. **uda** *Clarke* in *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 37 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 223.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 214). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.).

FLOSCOPA Lour.

Floscopa africana [*P. Beauv.*] *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 267; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 435 et Étud. fl. Cgo (1896) 271; *Hua* in B. Mus. Hist. nat. Paris, I, 122; *Clarke in Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 85; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI³, 47]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 104 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 844]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 15; II (1907) 19.

Anilema — *P. Beauv.* Fl. d'Ware, II (1807) 57, t. 93.

1885 (R. Buettner). — Congo (Buett.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Yumbi (M. Laur.); Lisha (Hens). — VI : vallée de la Djuma (Gent.).

Floscopa glomerata *Hassk.* Commel. Ind. (1870) 166; *Rendle Cat.*

Le Fr. Gillet a envoyé de Kisantu, le *Rhoeo discolor* Hance, espèce de l'Amérique centrale, certainement cultivée [Conf. *Th. Dur. et De Wild.* Pl. Gilletianae, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55].

Welw. Pl. II, 80; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 86; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Floscopa rivularis [A. Rich.] *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. LII (1881) 267 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 86; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 436; *Hua* in B. Mus. Hist. nat. Paris, I, 122; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 20.

Aneilema — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 312.

Lamprodithyros — Hassk. in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 211, 295.

1905 (Marc. Laurent). — V : Dolo (M. Laur.).

— — var. **minor** *Clarke* in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2628).

Floscopa Schweinfurthii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 269 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 87; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 5.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 463).

PALMACEAE

PHOENIX L. (1)

Phoenix reclinata *Jacq.* Fragm. bot. I (1800) 27, t. 24; *Mart.* Hist. Palm. III, 272, t. 164; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 82; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 103; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12, (1904) 95, (1906) 221 et *Miss. Laurent* (1905) 23.

P. spinosa *Thonn.* in *Hornem.* Obs. de indole pl. Guin. (1819) 11; *Mart.* l. c. III, 273; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 455 et Étud. fl. Cgo (1896) 272; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63.

1816 (Chr. Smith). — I : Moanda (Gill.). — I-II : estuaire du Congo jusqu'à l'île Mateba (Dupont; Roger : Bas-Congo Sm.). — II : ravin de la Kalamu (Ém. et M. Laur.). — II a : le Shiloango (Ém. Laur.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — VI : chutes François-Joseph. — Nom vern. : **Madibo** (Gent.). — XV : env. de Luluabourg; Lubue Verd.; Tetu. — Noms veru. : **Mansongo** (Hendr.); **Massongolo** (But.); **Lunda**; **Mushi-Brook** (Buchn.).

(1) Le *Phoenix dactylifera* L. a été indiqué vaguement au Congo par Martius.

CALAMUS L.

Calamus Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 97, t. 27, 28 et Miss. Laurent (1905) 24.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 126). — IX : Umaugi (Ém. et M. Laur.). — XV : le Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Calamus secundiflorus *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 15, t. 9, 10; *Mart.* Hist. Palm. III, 241, t. 116, fig. 12; *Mann et H. Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 432, t. 38 g, 41 d et 43 c; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 456 et Étud. fl. Cgo (1896) 272; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63 et Reliq. Dewevr. (1901) 246.

Aucistrophyllum — *Mann et H. Wendl.* ex *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) 230; *Hook. f.* in Kew Bull. Rep. (1882) 69; *Drude* in Engl. Jahrb. XXI (1895) 111; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 115.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew.) — XV : Lunda (Buchn.); le Sankuru (Ém. Laur.). — XVI : le Lualaba (Ém. Laur.).

RAPHIA P. Beauv. (2)

Raphia Gentiliana *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 29, t. 13, 14 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) t. 12, 13.

1903 (Ém. et M. Laurent). — VIII : env. d'Eala (Ém. et M. Laur.).

— — var. **Gilletii** *De Wild.* Il. cc. (1905) 30, t. 15 et (1906) 43, t. 14.

1900 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 1851).

Raphia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 26, t. 7-10, fig. 6 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 42-43, 49-56, t. 5-8.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Palmier vigoureux, répandu, semble-t-il, sur certains points des env. d'Eala (Ém. et M. Laur.).

Raphia monbuttorum *Drude* in Engl. Jahrb. XXI (1895) 111, 130; *Engl. Pfl. Ost.-Afr.* 131; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 105.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Muuza (Schw. 3357).

Raphia Sese *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 28, tt. 11, 12 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 43, t. 9-11.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.).

(2) *De Wildeman* Tuiles végétales [Raphia] in Not. pl. util. ou intér. du Congo, II (1906) 37-56.

Raphia vinifera *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 76, t. 44 fig. 1, 45 et 46, fig. 1; *Mart.* Hist. Palm. III, 216, t. 42 c; *Mann et H. Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 437, t. 42; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 457, et Étud. fl. Cgo (1896) 273; *C. H. Wright* in *Dyer*. Fl. trop. Afr. VIII, 106; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63.

Sagus — *Poir.* Eucycl. meth. Bot. XIII (1817) 13 et Pl. bot. Encycl. IV, t. 771, fig. 1.

1816 (Chr. Smith) — Bas-Congo (Sm.: Hens; Demeuse, etc.). — XV: le Lomami, le Kasai et le Saokura (Ém. Laur.). — XVI: le Lualaba (Ém. Laur.).

ONCOCALAMUS *Mann. et H. Wendl.*

Oncocalamus acanthocnemis *Drude* in Engl. Jahrb. XXI (1895) 111, 133; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 111.

1888 (Fr. Hens). — V: Bolobo (Hens, C. 170).

EREMOSPATHA *Wendl. et Mann.*

Eremospatha Cabrae [*De Wild. et Th. Dur.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 96, t. 32.

Calamus — *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 32 [B. S. B. B. XXXVII², 151]; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 110.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — V: Kimuenza (Gill. 2060).

Eremospatha cuspidata [*Mann et H. Wendl.*] *H. Wendl.* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) 244; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 113; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 23

Calamus — *Mann et H. Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 434, t. 41, fig. A.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VI: Eiolo (Ém. et M. Laur.) — VII: Kiri (Ém. et M. Laur.).

Eremospatha Haullevilleana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 96, t. 33-34, (1906) 231 et Miss. Laurent (1905) 24.

1900 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 3505). — V: Kisantu (Gill. 1385). — VIII: Isaka (Ém. et M. Laur.). — XIII a: Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV: Bosingo (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl.: Lubamba (Gill. 2026)

Eremospatha Hookeri [*Mann et H. Wendl.*] *H. Wendl.* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) 244; *Drude* in Engl. Jahrb. XXI (1895) 111; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 112.

Calamus Hookeri Mann et H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 434, t. 41, fig. c.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Kambele [pays des Maugbettu] (Schw. 3671).

BORASSUS L (1)

Borassus flabellifer L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1187 et ed. 2 (1763) 1657; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 459 et Étud. fl. Cgo (1896) 273.

B. flabelliformis L. Musa Clifflort. (1736) 13; *Mart.* Hist. Palm. III. 219, t. 108, 121 et 162; Fl. des Serres, VII (1851) 154, cum icone; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63 et Pl. Gilletianae, II (1901) 104 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 84].

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — XIII d : Nyangwe (Ém. Laur.); Maniema (Ém. Laur.). — XVI : le Lualaba (Ém. Laur.).

— — var. **aethiopum** [*Mart.*] *Warb.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. B (1895) 20, 21, cum xyl ; C (1895) 130, *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 117; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 24, t. 5 et fig. 5.

B. aethiopium *Mart.* l. c. III (1836-1850) 221; *Mann* et H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 439.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : entre Léopoldville et Kwamouth (Ém. et M. Laur.). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.).

ELAEIS Jacq.

Elaeis guineensis L. Mant. pl. I (1767) 137; *R. Br.* in *Tuckey* River Congo (1818) 455; *Mart.* Hist. Palm. I, 62, t. 54, 56 et III. 288; Fl. des Serres, XIV (1865) 265, t. 1492-1493; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 84; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 462 et Étud. fl. Cgo (1896) 274; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 125; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 31, fig. 7, 8.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Dup.; Ém. Laur.). — XI : l'Aruwimi

(1) Deux espèces d'un genre voisin [*Hyphaene*] les *H. guineensis* Schumach. et Thonn. et *H. ventricosa* Kirk ont été indiquées : la première dans l'île Mateba [II] par M. Éd. Dupont, la seconde au « Congo » par M. H. Johnston; mais ces indications demandent confirmation.

Le *Cocos nucifera* L., répandu dans la zone maritime tropicale du monde entier, est cultivé ou naturalisé à Boma [II] (Dup.) et sur d'autres points du Bas-Congo (Ém. Laur.). [Conf. *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 274; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 126].

(Lothaire). — XII : bassin de l'Éle (Schw.). — XII d : Munza [cult.]; pays des Mangbettu (Schw.) — XV : le Kasai; le Saukuru (Ém. Laur.).

M. Ed. Dupont [Lettres sur le Congo] indique cette espèce de Mousouk à Kinshasa. — M. Ém. De Wildeemann [l. c. p. 36] dit que cette espèce est « largement répandue dans tout le bassin du Congo » mais que « sa dispersion est loin d'être bien connue ».

PANDANACEAE

PANDANUS L. f.

Pandanus Butayi *De Wild.* in *Rev. cult. colon.* (1902) 15 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 22-27.

1902 (P. Butaye). — V : Lemfu (But.).

Pandanus Candelabrum *P. Beauv.* *Fl. d'Oware*, I (1804) 37, t. 21, 22; *Balf. f.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) 43; *Solms* in *Linnaea*, XLII (1878) 27; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 463 et *Étud. fl. Cgo* 1896 275; *Warb.* in *Engl. Pflanzenreich* [Pandanus.] (1900) 67; *C. H. Wright* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 132; *Thonn.* *Blütenpfl. Afrik.* (1908) 79, t. 3.

Tuckeya — *Gaudich.* *Atlas Voy. Bonite* (1846) t. 26, fig. 10-20.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe; bord du Shi-loango (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.).

ARACEAE

CULCASIA P. Beauv.

Culcasia angolensis *Welw.* ex *Schott* in *Seem. Journ. of Bot.* III (1865) 35; *Engl.* in *DC. Monog. Phan.* II, 102; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 471; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI^a, 88]; *Rendle Cat. Welw. Pl.* II, 90; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 178; *Engl. Pflanzenreich* [Arac.-Pothoid.] (1905) 300; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 98; II (1907) 16 et *Miss. Laurent* (1905) 32.

1882? (P. Pogge). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XII c : entre Anadis et Surango (Ser.). — XV : le Kasai; le Saukuru (Ém. Laur.); Kanda-Kanda (Gent.); la Lulua (Pg.).

Culcasia parviflora *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 176; *Engl.* Pflanzenreich [Arac.-Pothoid.] 299.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlt.).

Culcasia scandens *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 4, t. 3; *Schott* Gen. Aroid. t. 50; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. II, 102 et 637; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 471 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 275; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 247; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 90; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 174; *Engl.* Pflanzenreich [Arac.-Pothoid.] 302; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 98 et *Miss. Laurent* (1905) 33.

Caladium — *Willd.* Sp. pl. IV (1805) 489.

1816 (Chr. Smith). — II : Ile des Princes (Ém. Laur.). — II a : Shinganga (Dew.). — IV : Gombi. — Nom vern. : *Washense loshoto* (Dew.); Kitobola (Ém. Laur.); Luvituku (Luja). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Léopoldville et env. (Schlt. Gill.); Sanda (De Brouw.). — VII : Kiri (Ém. Laur.). — VIII : Bolombo (Ém. Laur.) — XV : le Sankuru (Ém. Laur.).

Culcasia striolata *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 417, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin* (1899) 281, in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 58 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 271; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 179; *Engl.* Pflanzenreich, IV, 23 B (1905) 297, fig. 83 A-H.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt.).

Culcasia tenuifolia *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautschuk-Exped. (1900) 271 et in *Pflanzenreich* [Arac.-Pothoid.] (1905) 299.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt.).

GONATOPUS Hook. f.

Gonatopus Bowini [*Decne*] *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1873) sub t. 6026; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. II, 209 et *Pflanzenreich* [Arac.-Pothoid.] (1905) 306, fig. 86; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 196.

Zamioculcas — *Decne* in *B. S. B. Fr.* XVII (1870) 321.

Le type croît dans l'Afrique trop. or.

— — var. **angustifoliolatus** [*De Wild.*] *Th. et Hél. Dur.*

Zamioculcas *Boivinii* *Decne* var. — *De Wild.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, XI (1901) 66 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 12.

1896 (A. Dewèvre). — XIII : Lubunda (Dew. 1023).

CYRTOSPERMA Schott.

Cyrtosperma Afzeli [*Schott*] *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. II (1879) 269; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 64.

Lasiomorpha Afzelii Schott Gen. Aroid. (1858) t. 85, fig. 11-20 et Prodr. Aroid. 405.

1888 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 1500). — VII : riv. Ikata [Lukenie] (Dem.).

Obs. — M. N. E. Brown [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 198] réunit cette espèce à la suivante.

Cyrtosperma senegalense [Schott] Engl. in DC. Monog. Phan. II (1879) 270; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1898) t. 7617; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 472; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56] et Reliq. Dewevr. (1901) 247; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 198; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1906) 222.

Lasiomorpha — Schott in Bouplandia, V (1857) 127 et Gen. Aroid. t. 86, fig. 1-10.

1896 (A. Dewèvre). — II a : la Lemba (Dew. 1373). — V : Coquilhatville. — Nom vern. : **Otolo** (Dew. 1609). — Kisantu (Gill. 647).

HYDROSME Schott.

Hydrosme Eichleri Engl. in Jahrb. bot. Gart. Berlin, II (1883) 285, t. 10 et in Engl. Jahrb. XV (1892) 458; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 474 et Étud. fl. Cgo (1896) 276.

Amorphophallus — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1889) t. 7071; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 154.

1880 (E. Teusz). — VI : Ile Bismarck [Kwaugo] (Teusz).

Hydrosme Léopoldiana Mast. in Gard. Chron. (1887) I, 642, 644, 645, fig. 122-123; Ill. Hort. XXXIV (1887) 65, t. 23; XLII (1895) 380, fig. 49; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 276.

Amorphophallus — *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 157.

Ann. ! (Coll. ?). — Congo (fide Mast.).

Hydrosme Teuszii Engl. in Gartenfl. XXIII (1884) 2, t. 1142 et in Bot. Jahrb. XV (1892) 458; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 495 et Étud. fl. Cgo (1896) 276; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 247.

Amorphophallus — *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 149.

1880 (E. Teusz). — VI : Ile Bismarck, 7° 35' (Teusz v. Mechow, 404). — XIII d : env. de Kabango (Dew. 994).

ANCHOMANES Schott.

Anchomanes giganteus Engl. in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 419; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 64; Pl. Gilletianae,

II (1901) 105 [B. H. Boiss. Sér. 2, I, 845] et Reliq. Dewevr. (1901) 247; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 142.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dem. 266). — V : Kisantu (Gill. 1267). — IX : Umangi (Ém. Laur.).

CERCESTIS Schott.

Cercestis congensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 448; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 181, *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65 et Reliq. Dewevr. (1901) 247; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 99, (1905) 222; II (1907) 16 et Miss. Laurent (1905) 33.

C. congensis [err. cal.] *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 475 et Étud. fl. Cgo (1896) 276.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm., Dem. 65). — II : Ile des Princes (Ém. Laur.); Zambi (Dew. 205). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Léopoldville (Gill. 2570); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2898); vallée du Kwilu (Gent.; Gill. 2739); Madibi; Luano (Lescr.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (Pyn. 18, 335). — XV : Bena-Dibele (Ém. et M. Laur.).

RHEKTOPHYLLUM N. E. Br.

Rhektophyllum congense *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 104 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 844]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 98 et Miss. Laurent (1905) 33.

1900 (J. Gillet). — V : entre Kisantu et et Dembo (Gill. 1529). — VI : vallée de la Djuma (Gent. 184). — XV : Muunugu ; Butala (Ém. et M. Laur.).

Rhektophyllum mirabile *N. E. Br.* in *Britt. Journ. of Bot.* XX (1882) 194, t. 230; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV, 450; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 475 et Étud. fl. Cgo (1896) 276; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 172.

Nephthytis picturata *N. E. Br.* in *Gard. Chron.* (1887) I, 476; *Th. Dur.* et *Schinz*, l. c. 276.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Coll.?). — XII d : Mbala au N. du Kibali (Schw.). — XIII a : Bamanga (Ém. Laur.).

NEPHTHYTIS Schott.

Nephthytis Afzelii *Schott* in *Oesterr. bot. Wochenbl.* (1857) 406 et *Gen. Aroid.* t. 51; *Engl.* in *DC. Monog. Phan.* II, 502; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 475; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 171; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 13.

Nephtytis liberica *N. E. Br.* in *Gard. Chron.* XV (1881) 790.

Oligogygium — *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 453.

1895 (A. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 48).

COLOCASIA Schott.

**Colocasia antiquorum* *Schott* *Meletem. bot.* (1832) 18 et *Gen. Aroid.* t. 37; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 478; *Engl.* in *DC. Monog. Phan.* II, 491; *Bot. Mag.* (1891) t. 7364; *Rendle Cat. Welw.* Pl. II, 88; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 165; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 99 et *Miss. Laurent* (1905) 34.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : Kolo (M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.). — Ind. nou cl. : Yamanga (Ém. et M. Laur.).

CALADIUM Vent.

**Caladium bicolor* [*Ait.*] *Vent. Descr. pl. nouv. Jard. Cels* (1800) t. 30; *Rendle Cat. Welw.* Pl. II, 89; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 166; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 34.

Arum — *Ait. Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 316.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.).

ANUBIAS Schott.

Anubias affinis *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 16, t. 21.

? (Coll. ?). — Congo (Coll. ?).

Anubias congensis *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII (1901) 184; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 17, t. 20.

A. heterophylla *N. E. Br.* (non *Engl.*) in *Gard. Chron.* (1889) 67.

? (Coll. ?) — II : Boma [Introd. par M. Bull.].

Anubias Engleri *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 17, t. 15.

A. Afzelii *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Schott*] *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 65.

1895 (Ém. Laurent). — IV : Pioka (Ém. Laur.).

Anubias Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae* II (1901) 105 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 815].

1900 (J. Gillet). — V : Kimueza (Gill., 1696).

Anubias hastaefolia *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 462; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 476; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 65; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 185.

1891 (F. Demeuse). — XV : cond. du Kasai et du Sankuru (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Coca (Dem.).

Anubias Haullevilleana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, 1 (1903) 13.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1993).

PISTIA L.

Pistia Stratiotes *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 963; *Rosb.* Pl. Corom. III, 63, t. 269; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1878) 159; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. II, 634; *Th. Dur.* et *Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 483 et Étud. fl. Cgo (1896) 277; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, 1 (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI^e, 88]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 85; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 140; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 34.

1888 (Fr. Hens.) — Bas-Congo (Hens. et M. Dem.). — V : le Stanley-Pool (Lujá); Bolobo (Ém. Laur.). — VI : embouch. du Kwango (Desc.). — XV : le Kasai (Lujá).

LEMNACEAE

SPIRODELA Schleid.

Spirodela polyrrhiza [*L.*] *Schleid.* in *Linnaea*, XIII (1839) 392; *Hegelm.* Monog. Lemn. 151, t. 13; *Th. Dur.* et *Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 201; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, 1 (1904) 99.

Lemna — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 970; *English Bot.* ed. 3, IX, t. 1897; *Rehb.* Icon. fl. Germ. VII, t. 15; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 201.

1900 (J. Gillet). — V : entre Kisantu et Dembo (Gill.).

LEMNA L.

Lemna aequinoctialis *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 578; *Hegelm.* Monog. Lemn. 142; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 91; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 203.

L. angolensis *Welw.* ex *Hegelm.* in *Scem.* Journ. of Bot. III (1865) 112; *Hegelm.* 141, t. 7, fig. 9-17; *Th. Dur.* et *Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 484.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Lukolela (M. Laur.). — IX : Yambinga (Ém. et M. Laur.).

ALISMACEAE

LIMNOPHYTON Mig.

Limnophyton obtusifolium [L.] *Miq.* Fl. Ind. Bot. III (1855) 242; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 487; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 5; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 209; *Buchen* in *Engl.* Pflanzenreich [Alism.] (1903) 22, fig. 10; *Thonn.* Blütenpfl. Afrik. (1908) 80, t. 6.

Sagittaria — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 993; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 157, t. 102.

1899 (Edg. Verdick). — XVI: Lukafu. — Nom. veru. : **Mudjian-Bubu** (Verd. 205).

ECHINODORUS L. C. Rich.

Echinodorus humilis [*Kunth*] *Buchen.* in *Pringsh.* Jahrb. VII (1865) 28; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 488; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 211; *Buchen.* in *Engl.* Pflanzenreich [Alism.] (1903) 26; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 197 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 9.

Alisma — *Kunth* Enum. pl. III (1841) 154.

1902 (L. Geutil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2836 et Gent.). — VIII : Eala (M. Laur. 832).

ERIOCAULONACEAE

SYNGONANTHUS Ruhland.

Syngonanthus Schlechteri *Ruhland* in *Schlechter* Westafri. Kautsch.-Exped. (1900) 272 [nom. tant.]; *Ruhland* in *Engl.* Pflanzenreich [Eriocaul.] (1903) 247.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12453).

MESANTHEMUM Koern.

Mesanthemum radicans [*Benth.*] *Koern.* in *Linnaea* XXXVII (1856) 573; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 504 et Étud. fl. Cgo (1896) 277; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 260; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 196 [B. Herb. Boiss.

Sér. 2, I, 846] et Reliq. Deweyr. (1901) 291; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo (1904) 99 et Miss. Laurent (1905) 35; *Thonn.* Blütenpfl. Afrik. (1908) 129, t. 15.

Eriocaulon radicans *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 547; *Steud.* Syn. pl. glum. II, 273.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Lukolela (Bnett.); Kisantu (Gill). — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — XIII d : près de Nyangwe (Dew.).

CYPERACEAE

RYNCHOSPORA Vahl.

***Rynchospora aurea* Vahl** Enum. pl. II (1806) 229; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 39, t. 81 fig. 2; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 653 et Étud. fl. Cgo (1896) 309; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 131; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 580; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 119.

Rynchospora — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 230.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.). — VI : Kongo [Kwilu] (Sap.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Haut-Lopori (Biel.). — XII d : Munza (Schw.). — XV : Lie (Ém. et M. Laur.).

***Rynchospora candida* [Boeck.] Clarke** in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 653; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 132; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 48.

Rynchospora — *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVII (1873) 605; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 119.

1899 (Éd. Lujá). — V : rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Dew.); env. de Léopoldville (Gill.); entre Léopoldville et Sabuka (M. Laur.); env. de Kimuenza : Bulebu (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Irebu (Pyn.).

SCLERIA Berg.

***Scleria Acriulus* Clarke** in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 509.

Acriulus madagascariensis *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) 336 et in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II, 266, t. 22, fig. 6-7; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 676.

Le type n'est connu que dans l'Uganda et à Madagascar.

— — form. ***Leopoldiana* Clarke** in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 221.

Acriulus Leopoldianus *Clarke*, l. c. in obs.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

Scleria Barteri *Bocck.* in *Linnaea*, XXXVIII (1874) 504; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 669; Étud. fl. Cgo (1896) 309 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 545; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 220.

1891 (F. Demense) — Congo (Dem.) — II a : Bingila (Dup.). — V : Léopoldville (Ém. Duch.) : Kisantu : Kimuenza (Gill.) ; env. de Sanda (Odd.). — VII : Ibalé (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.).

Scleria Buchanani *Bocck.* in *Linnaea*, XXXVII (1874) 504; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 669; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71.

1890 (Paul Briart). — XVI : plaine de Tenke (Briart).

Scleria canaliculato-triquetra *Bocck.* in *Flora*, LXII (1879) 573; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 670; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 59 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 59]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 135; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 505.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Scleria hirtella *Sw.* Prodr. fl. Ind. occ. (1788) 49; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 671 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 497; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 107 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 847] et Reliq. Dewevr. (1901) 252; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 221, II (1907) 118.

1888 (Fr. Heus). — V : le Stanley-Pool (Heus); Dolo (M. Laur.); Kisantu ; env. de Kimuenza (Gill.) ; entre Dembo et le Kwango (But.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : entre Ikori et Mokoauge [X ?] (Dew.).

Scleria melanomphala *Kunth* Enum. pl. II (1837) 345; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 672 et Étud. fl. Cgo (1896) 310; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 134; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 506.

1888 (Fr. Heus) — V : le Stanley-Pool (Heus); Kisantu (Gill.).

— — var. **macrantha** [*Bocck.*] *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1891) 672 et Étud. fl. Cgo (1896) 310; *Engl.* Pl. Ost-Afr. 429; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 252.

S. macrantha *Bocck.* in *Flora*, LXII (1879) 572 (enq. in *Flora*, XLII [1859] 647).

1888 (Fr. Heus) — V : le Stanley-Pool (Heus, 67).

Obs. — A. Dewèvre a récolté cette variété sur la rive N. du Stanley-Pool [Congo franç.] (Dew.).

S. melanomphala form. **oculo-albo** *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1901) 59 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 59].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.)

Scleria ovuligera *Nees* in *Linnaea*, IX (1834) 303; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVIII (1874) 497; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 673 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 310; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 135; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 507; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 252; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 23.

S. Naumanniana *Boeck.* in *Engl. Jahrb.* V (1883) 94.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Kimbanza** (Cabra). — II : Sisia (Dup.). — IV : Tombe (Hens). — V : env. de Leopoldville (Dew.) : **Kimnzenza** (Gill.). — VII : env. de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens).

Scleria racemosa *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VII (1806) 6; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 169, t. 3; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 674 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 310; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 135; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 588; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI¹, 90]; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 252; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 23.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.) : Bingila (Dup.). — V : Lemfu (But.) ; Kisantu (Gill.). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Noms vern. : **Kambete** [Kasongo]; **Kwonne** [Tanganika].

Scleria verrucosa *Willd.* Sp. pl. IV (1805) 313; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 675, *Étud. fl. Cgo* (1896) 311 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 509; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 253; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 23 et *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 221; II (1907) 22.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Katala. — Nom vern. : **Mambele-Bela** (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Johnst.) ; Kimuenza (Gill.). — VII : Chelal [la Fini] ; Kutu (Ém. et M. Laur.).

JUNCELLUS *Clarke.*

Juncellus laevigatus [*L.*] *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI (1893) 596 et in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 544; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI², 28]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 109; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 308.

Cyperus — *L.* *Mant. pl.* II (1771) 179; *Rotb.* *Descr. et icon. pl.* 19, t. 16, fig. 1; *Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) 282; XXI (1884) 77, t. 3, fig. 20-21.

1891 (G. Descamps). — XVI : rive droite du Lualaba (Desc.).

Juncellus pustulatus [Vahl] Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 546; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 66; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 109; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 307.

Cyperus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) 341.

1899 (Éd. Luja). — XV : rive droite du Kasai (Luja); le Kasai (Jos. Duch.); la Lulua (Pg.).

MARISCUS Vahl.

Mariscus Dregeanus *Kunth* Enum. pl. II (1837) 586; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 586 et *Étud.* fl. Cgo (1896) 295; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 120; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 380.

Cyperus dubius *Rottler* (non *Roth*) in *N. Schrift Ges. Nat. Freunde Berlin*, IV (1803) 193; *Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1833) 285; XXI (1834) 197.

1888 (Fr. Hens). — III : Matadi (Hens, A. 218).

Mariscus flabelliformis *H. B. et K.* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 215; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 588 et *Étud.* fl. Cgo (1896) 295; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 397; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 20.

1888 (Fr. Hens). — V : entre Kinshasa et Kwamouth (Luja) : Lukolela (Hens). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX a : Mobeka (Hens).

Mariscus flavus *Vahl* Enum. pl. II (1806) 374; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 588.

Cyperus — *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 384.

Didymia cyperomorpha Philippi in *Engl. Jahrb.* VIII (1887) 57, t. 1.

Le type croît dans l'Amérique trop. et temp.

— — var. **humilis** *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 588 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 393; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56].

C. flavus *Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) 196.

C. redolens Mawry in *Mém. Soc. phys. Genève*, XXXI (1890) 126, t. 36a.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 189). — V : Kisantu (Gill.).

Mariscus ligularis [L.] *Th.* et *Hél. Dur.*

Cyperus — *L.* *Amoen. acad.* V (1760) 391; *Rottb.* *Descr. et icon.* pl. 35, t. 11, fig. 2.

M. rufus *H. B. et K.* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 216, t. 67; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 592. *Étud.* fl. Cgo (1896) 297 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 396.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sin.).

Mariscus luridus *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 296 [nom. tant.] et *Étud. fl. Cgo* 1896 296; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 399.

1888 (Fr. Heus). — VIII : Lulanga (Hens, C. 155).

Mariscus nossibeensis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 63; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 590 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 297; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 391.

Cyperus — *K. Schum.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* (1895) 122.

1888 (Fr. Heus). — V : le Stanley-Pool (Hens)

Mariscus pseudo-pilosus *Clarke* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89] et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 402; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 418.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

— — var. **tenuior** *Clarke* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo (1900) 68.

1895 (Ém. Laurent). — IV : route des Caravaues [distr. des Cataractes] (Ém. Laur.).

Mariscus Sieberianus *Nees* in *Linnaea*, IX (1834) 286; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 593 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 297; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 388; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 81]; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 120 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 220, II (1907) 118.

Cyperus — *K. Schum.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* (1895) 122.

1883 (H. Johnston). — II : Zambi (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : le Stanley-Pool (Johnst.) — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens). — XIV : Kalamba-Lemba. — Nom vern. : **Kilengu-longue** (Coll.?). — XVI : Lukonzolwa. — Noms vern. : **Kalimbu** (Coll.); **Kiambi** [Tanganika-Moero]. — Nom vern. : **Kilao-Lao**.

— — var. **subcompositus** *Clarke* in *Hook f.* Fl. Brit. Ind. VI (1893) 622, in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 69 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 389.

1895 (G. Descamps). — XVI : Kibanga (Desc.).

Mariscus trinervis *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 505 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 399.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg 1582).

Mariscus umbellatus [Rottb.] Vahl Enum. pl. II (1806) 376 pr. p.; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 595 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 298; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 121; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 390; De Wild. et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65; II (1900) 68 et Reliq. Dewevr. (1901) 248; De Wild. *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 210.

Kyllinga — Rottb. Descr. et icon. pl. (1778) 15, t. 2, fig. 2.

Cyperus — Clarke in Journ. Linn. Soc. XX (1883) 293 (var. excl.); XXI (1884) 200, var. α pr. p.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe (Coll. ?); Zenze Ém. Laur.); Shinganga (Dew.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Luja); Kisantu : env. de Dembo (Gill.); Lukolela (Hens). — IX : pays des Bangala (Hens). — XV : Lusambo (Jos. Duch).

CYPERUS L.

Cyperus amabilis Vahl Enum. pl. II (1806) 318; Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 130; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 547 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 283; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 109; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 328.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (Naum.). — IV : Batanga (Luja). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Schlt.). — IX : pays des Bangala (Hens). — XV : la Lulua (Pg.).

— var. **macra** Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 328.

C. amabilis Vahl var. macer [err. cal.] Clarke in *Th. Dur. et Schinz* II. cc. V (1895) 547; (1896) 283.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm. 26).

Cyperus angolensis Boeck. in Flora (1880) 435; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 548, *Étud. fl. Cgo* (1896) 283 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 321; De Wild. et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 67 et Reliq. Dewevr. (1901) 243; De Wild. *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 217.

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Shinganga (Dew.); Zenze; Wakionde (Dup. 841). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.). — XV : Mukenge (Pg.). — XVI : Pala (Desc.).

Cyperus articulatus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 66; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 548 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 283; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 83 [B. S. B. XXXVII, 1287]; De Wild. et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 248; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 117; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 356; De Wild. *Étud. fl. Kat.* (1902) 4, *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 217, II (1907) 117 et Miss. Laurent (1905) 18.

C. niloticus Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 13; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 63, t. 97, fig. 2.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Ganda (Ém. et M. Laur.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kimuenza (Gill.); entre Kwanaouth et Bokala (M. Laur.). — VI : Eïolo (M. Laur.); entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur (Dem.); Eala (M. Laur.); Inkongo (Ém. et M. Laur.). — XII c : env. d'Amadis (Ser.). — XII d : Munza (Schw.). — XIII c : Lokandu (Dew.). — XV : le Sankuru (Dem.); env. de Lusambo (Ém. Laur.). — XVI : le Lualaba; le Lubeshi (Desc.); Lukafu (Verd.); Toa (Desc.).

***Cyperus auricomus* Sieb.** mss. ex *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 230; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 549 et Étud. fl. Cgo (1896) 284; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 418; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 373.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens).

***Cyperus bulbosus* Vahl** Enum. pl. II (1806) 342; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 550; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 418; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 352; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I, (1906) 217.

C. javanicus Retz. [non *Rotb.*] Obs. bot. IV (1786) 11; *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 175, t. 2, fig. 17-18 [excl. var. β].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

***Cyperus compactus* Lam.** Illustr. gener. Encycl. I (1791) 144; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 552 et Étud. fl. Cgo (1896) 284; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 412; *Clarke* in *Dyer* Fl. Capens. VII, 168 et Fl. trop. Afr. VIII, 319; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 21.

1816 (Chr. Smith). — Congo (Sm.). — V : Sanda (Odd.). — XVI : Lac Moero (Verd.).

***Cyperus congensis* Clarke** in *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 285 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1904) 354.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens, 391).

***Cyperus dichromenaeformis* Kunth** Enum. pl. II (1837) 26; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 525.

Le type croît au Brésil.

— — var. **major** *Boeck.* in *Flora*, LXII (1879) 549; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 556 et Étud. fl. Cgo (1896) 285; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 414; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 340; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56].

1870 (G. Schweinfurth). — V : le Stanley-Pool (Hens. B. 7, 69); Kisantu (Gill. 295). — XII d : Munza (Schw. 3401).

Cyperus difformis L. Amoen. acad. IV (1759) 302; *Rottb.* Descr. et icon. pl. 24, t. 9, fig. 2; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 556 et Étud. fl. Cgo (1896) 285; *Th. Dur.* et *De Wild.* Pl. Gillefianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 56 et Reliq. Dewevr. (1901) 249; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 48; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 115; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 330.

1816 (Chr. Smith). — V : le Stanley-Pool; Tamo (Hens); Kisantu (Gill.). — XIII d : Kasongo (Dew.). — XV : Baterapa (Em. et M. Laur.).

Cyperus diffusus Vahl Enum. pl. II (1806) 321; *Kunth* Enum. pl. II, 30; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 557 et Étud. fl. Cgo (1896) 286; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 113; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 343; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 48.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — XI : en aval de Basoko (Em. et M. Laur.).

— var. **angustifolius** *Clarke* in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 248.

C. Buettneri *Boeck.* Cyper. nov. I (1888) 3.

1888 (Fr. Hens). — IX : Baogala (Hens, C. 356).

Cyperus distans L. ex L. f. Suppl. pl. (1781) 103; *Jacq.* Icon. pl. rar. II, t. 492; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I, 35, t. 20; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 612; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 558 et Étud. fl. Cgo (1896) 286; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 249; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 116; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 349; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 48 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 417.

1870 (G. Schweinfurth). — IV : Lukusgu; Tombe [Lutete] (Hens). — V : Dolo. — Non vern. : **Lekambe** (Coll.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Em. et M. Laur.). — VIII : pays d'Idaka (M. Laur.); Ikonge (Em. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dew.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII d : Nyangwe (Pg.); Elungu. — Non vern. : **Kibenbele** (Dew.). — XVI : Albertville [Toa] (Hecq.). — Ind. non vern. : riv. Lukasi (Pg.).

Cyperus elatior *Boeck.* in *Flora*, LXII (1879) 553; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 559 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 361; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gillefianae, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 816]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 48.

1900 (R. Emswiler). — V : pays de Loulu (But.). — XV : Munungu (Em. et M. Laur.).

Cyperus esculentus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 67; *Host* Gramin. Austr. III, 50, t. 75; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 559 et Étud. fl. Cgo (1896) 287; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 117; *Clarke*

in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 355; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 249; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 218.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens) — II : Bomâ (Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : C. dans le Stanley-Pool (Dem. 58; env. de Léopoldville (Dew. 474); Kinshassa (Hens); Kisantu (Gill.). — Ind. non cl. : Busindi (Hens).

C. esculendus var. **acaulis** *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 560 et Étud. fl. Cgo (1896) 287.

1888 (Fr. Hens). — Bas Congo (Hens, 14).

— — var. **Buchanani** [*Boeck.*] *Clarke* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56].

C. Buchanani *Boeck.* Cyp. nov. I (1888) 4.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 177).

Cyperus exaltatus *Retz.* Observ. bot. V (1791) 11; *Clarke* in *Hook.* Fl. Brit. Ind. VI, 617 et in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 560.

Le type, largement répandu, existe en Asie, en Afrique et en Australie.

— — var. **dives** [*Delile*] *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 187 et in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 561; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 249.

C. dives *Delile* Fl. d'Égypte (1812) 5, t. 4, fig. 3; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 480.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Piani-Lombi (Dew. 1039).

Cyperus Fenzlianus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 33; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 562 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 368; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 48.

1904 (Ém. et M. Laurent). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.).

Cyperus fertilis *Boeck.* in Engl. Jahrb. V (1883) 90; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 562 et Étud. fl. Cgo (1896) 287; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 113; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 341; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 67; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 48 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 218; II (1907) 417.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Jos. Duch.); env. de Léopoldville (Gill.); Kinshasa (Luja); rive droite du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.); en aval de Bolombo (Krek.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Umuangi (Ém. Duch.). — IX a : Gali (Ém. Duch.). — XI : Goo (Ser.). — Ind. non cl. : Busindi (Hens).

Cyperus flabelliformis *Roth* Deser. et icon. pl. (1773) 42, t. 12, fig. 2; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 562 et Étud. fl. Cgo 1896) 287; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 114; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 335; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI¹, 88]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 19 et Étud. fl. Bas- et Moy. Cg. I (1906) 218.

1816: C^o: South. — II s: le Mayumbé (Em. Laur.); Bingila (Dup.). — III: Matadi (Em. Laur.). — V: Kasautu (Gill); env. de Kimuenza? (But.). — XI: Malena (Em. Laur.). — XVI: pres de Kazembe (Coll. ?); le Luulaba (Desc.).

Cyperus flavidus *Retz.* Observ. bot. V (1789) 13; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 563 et Étud. fl. Cgo (1896) 288; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 111; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 333.

C Haspan *Roth* (non L. Deser. et icon. pl. (1773) 36, t. 6, fig. 2.

1888 (Fr. Heus.). — IV: Lutete (Heus, A. 360).

Cyperus flexifolius *Boeck.* in Flora, LXII (1879) 540 et in Engl. Jahrb. V (1881) 90; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 288; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 375.

1874 (Fr. Naumann). — II: ile près de Ponta da Leuha (Naum. 143, 150).

Cyperus gracilinux *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 162; in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 564 et Étud. fl. Cgo (1896) 288; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 362.

C. tenuiculmis *Boeck.* in Flora, LXII (1879) 554.

1888 (Fr. Heus.). — V: le Stanley-Pool (Heus, B. 21). — VIII: Équateurville (Heus, C. 178).

Cyperus Haspan L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 45 pr. p.; *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) 287; XXI (1884) 119, in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 564 et Étud. fl. Cgo (1896) 289; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 114; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 332; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI¹, 89]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 119.

1816: C^o: South. — Bas Congo (Sou.). — II a: Bingila (Dup.). — IV: Lutete (Heus.). — V: Leopoldville; entre Saouka et Leopoldville (Laja); Kasautu (Gill). — VII: la Floue (Em. et M. Laur.). — IX: Bobangi (Em. et M. Laur.). — Ind. non et: Basodi (Heus.).

— — var. **laevinux** *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 605 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43.

1888 (Fr. Heus.). — IV: Lukuzi (Heus, A. 290).

Cyperus Hensii *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 289 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 335; *De Wild. et Th. Dur.* III. fl. Cgo (1898) 15, t. 8; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 19.

1888 (Fr. Hens). — IX : Lisha (Hens, C. 364). — XV : flot du Bas-Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Cyperus immensus *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) 294, in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 565, in *Dyer* Fl. Capens. VII, 184 et Fl. trop. Afr. VIII, 371; *De Wild.* Étud. fl. Kal. (1902) 4.

1900 (Edg. Verdecq). — XVI : Lukafa. — Nom vern. : **Malamboi** (Verd. 369).

Cyperus maculatus *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) 539; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 567 et Étud. fl. Cgo (1896) 289; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 67; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 363.

C. Naumannianus *Boeck.* in Flora, LXII (1879) 552 et in *Linnaea*, XXXV (1869-1870) 228.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool; Lukolela (Hens). — IX : Lisha (Hens). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. nou cl. : Busindi (Hens).

Cyperus mapanioides *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 568 et Étud. fl. Cgo (1896) 290; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 64 et III. fl. Cgo (1899) 47, t. 25; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 340; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 19 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 117.

1887 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens, A. 389); le Stanley-Pool (Hens, B. 7, 69). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Cyperus margaritaceus *Vahl* Enum. pl. II (1806) 307; *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 110 et in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 568 et Étud. fl. Cgo (1896) 290; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 112; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 321; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65; II (1900) 67; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 19.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — III : Matadi (Hens). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buett.). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.); Lusambo (Jos. Duch.).

Cyperus maritimus *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) 240; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 569 et Étud. fl. Cgo (1896) 290; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 113; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 326.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

C. maritimus var. **crassipes** [Vahl] Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 569 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 291; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 114; Clarke in *Dyer* l. c. VIII, 326.

C. *crassipes* Vahl Enum. pl. II (1806) 299; P. Beauv. Fl. d'Oware, II, 63, t. 97, fig. 1

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Cyperus nudicaulis Poir. in *Lam. Encycl. méth. Bot.* VII (1806) 240; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 570; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 112; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 310; De Wild. et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 250; De Wild. *Miss. Laurent* (1905) 17.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Zobe (Dew.). — V : Kisantu : entre Kisantu et Dembo (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

Cyperus ochrocephalus [Boeck.] Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 571 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 291; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 322.

Rhynchospora — Boeck. in *Flora*, LXII (1879) 568.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutote (Hens, B. 42).

Cyperus Papyrus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 47, pr. p.; *Parlat.* Mém. Papyrus (1853) 32, t. 2; Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 571 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 291; De Wild. *Reliq. Dewevr.* (1901) 250; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 118; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 374; De Wild. *Miss. Laurent* (1905) 19.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — XV : la Lulua (Pg.). — Ind. non cl. : le Lomani (Pg.).

Cyperus pratensis Boeck. in *Linnaea*, XXXVIII (1874) 364; Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 572 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 352.

Le type croît en Abyssinie.

— — var. **laxus** Clarke in De Wild. et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846] et in *Dyer* l. c. VIII, 352; De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 218.

1900 (J. Gillet). — V : Kinuenza (Gill. 1744).

Cyperus radiatus Vahl Enum. pl. II (1806) 369; Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 573 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 292; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 119; De Wild. et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II

(1901) 67 et Pl. Gilletianae, 1 (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 56]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 369.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Leopoldville (Luja, Schl.); chutes de Tamo (Hens); Kwamouth (Hens); Kisantu (Gill). — XI d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.). — Ind. non cl. : Noki (Schlt.).

Cyperus Reinschii *Boeck.* in Flora, LIV (1862) 41; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 573; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, 1 (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 57]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 413; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 345.

C. hylaenus *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 134 et in Bolet. Soc. Brot. V, 208, t. F, fig. A.

1881? (P. Pogge). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Mukenge (Pg.). — XVI : le Lualaba (Pg.).

Cyperus rotundus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 67; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 574 et Étud. fl. Cgo (1896) 292; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 416; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI¹, 89]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 69; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 364.

C. hexastachyus *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) 28, t. 14, fig. 2.

C. tetrastachyus *Desf.* Fl. Atlant. I (1798) 45, t. 8.

1891 (F. Demense). — Congo (Dem.). — II : Zambi (Dup.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.).

Cyperus Schweinfurthianus *Boeck.* in Flora, LXII (1879) 533; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 576; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, 1 (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 57]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 417; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 361.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 585).

Cyperus sphacelatus *Rottb.* Descr. et icon. pl. II (1773) 25; *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 183, in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 577 et Étud. fl. Cgo (1896) 293; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI¹, 89]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 417; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1904) 250; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 346; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 20.

1888 (Fr. Heus). — II : Boma (Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Leopoldville (Ém. Duch. et Éd. Luja). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Cyperus tenax *Boeck.* in Linnæa, XXXV (1867-1868) 504; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 578 et Étud. fl. Cgo (1896) 293; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 411; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII,

334; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gillefianae, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 219.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 360, pr. p.). — V : Kimuenza : Kisantu ; entre Kisantu et Dembo (Gill. 1584, 1739).

Cyperus tuberosus *Rotth.* Descr. et icon. pl. (1773) 28, t. 7, fig. 1 ; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 502 ; *Clarke* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI, 616 et in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 580 et Étud. fl. Cgo (1896) 294 ; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 68 ; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 368.

1885 (R. Buettner). — Bas Congo (Buett. 12 pr. p.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 21). — Ind non cl. : Mfoi (Desc.).

Cyperus uncinatus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) 247 ; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 502 ; *Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) 284 ; XXI (1884) 90 et in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 580 et Étud. fl. Cgo (1896) 294 ; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 63 [B. S. B. B. XXXVI¹, 89] ; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 110 ; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 328 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 20.

C. cuspidatus *H. B. et K.* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 204 ; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 496 ; *Clarke* l. c. XX (1883) 284, XXI (1884) 68.

1885 (R. Buettner). — II a : Bingila (Dup.). — III-IV : la Lufu (Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 68 : Bulebu (Ém. et M. Laur.) ; Léopoldville (Schlt.) ; Kinshasa (Luja) ; Kisantu (Gill. 502 : Snata (Buett. 12 pr. p.).

Cyperus Zollingeri *Steud.* in *Zoll* Vers. Ind. Archip II (1854) 62 ; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 332 ; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 581 et Étud. fl. Cgo (1896) 294 ; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI¹, 89] ; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 117 ; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 360 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 219.

C. tenuiculmis *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 285 et in *Engl. Gazelle* Reise, 15.

1882 (P. Pogge) — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens) ; Kimuenza : Kisantu (Hens). — XV : Lusambo (Jos. Duch.) ; Mukenge (Pg.).

— — form. **gracilis** *Clarke* ex *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gillefianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 257).

— — var. **parvus** *Clarke* in *Dyer* l. c. VIII (1901) 361.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 220).

PYCREUS P. Beauv.

Pycreus albo-marginatus Nees in *Mart.* Fl. Brasil, II', (1842) 9; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 534 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 280; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 107; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 305.

Cyperus — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 10.

1887 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens. C. 35). — IX : pays des Bangala (Hens, A. 392).

Pycreus flavescens [L.] *Rehb.* Fl. Germ. excurs. (1820-1832) 72; *Th. Nees* Gen. pl. fl. Germ. II, t. 22, fig. 14-16; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 537 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 281; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 290.

Cyperus — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 68; *Host* Gramin. Austr. III, 48, t. 72; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 438.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sta.). — V : Kwamouth (Hens, C. 117).

Pycreus globosus [All.] *Rehb.* Fl. Germ. excurs. Add. 1830-1832) 140; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 537.

Cyperus — *All.* Auctuar. fl. Pedem. (1789) 49.

Le type croît dans toutes les régions chaudes et trop. de l'Ancien Monde.

— — var. **nilagiricus** [*Hochst.* *Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) 49 et in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 299; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 66; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 299.

Cyperus nilagiricus *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 2; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 457.

1890 (Paul Briart). — XVI : plaine de Tenke (Briart).

Pycreus Mundtii Nees in *Linnaea*, IX (1834) 283; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 539 et in *Dyer* Fl. Capens. VII, 157; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 106; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 291; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 219.

Cyperus — *Kunth* Enum. pl. II (1837) 17; *K. Schum.* in *Engl. Pf. Ost-Afr.* 117.

1882 (P. Pogge). — V : euv. de Kisautu (Gill.). — XV : Mukeuge (Pg.).

Pycreus oakfortensis *Clarke* ex *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 20 [nom. tant.].

1893 (Em. et Marc. Laurent). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

Pycreus polystachyus *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 48, t. 86, fig. 2; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II¹, 10; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 540 et Étud. fl. Cgo (1896) 281; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 296; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 241.

Cyperus — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 214; *Boiss.* Fl. Orient. V. 365; *Kendle* Cat. Welw. Pl. II, 108.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Cougo (Sm.). — I : Banana (Dew.).

Pycreus propinquus [*Kunth*] *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II¹ (1842) 7; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 541 et Étud. fl. Cgo (1891) 281; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 300.

Cyperus *Olfersianus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) 10; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 439.

C. pycnocephalus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 5.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Su.). — Congo (But.). — IV : Tamo [Lutete] (Hens, A. 250). — V : Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 400).

Pycreus Smithianus [*Ridl.*] *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 542 et Étud. fl. Cgo (1896) 282; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI¹, 88]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1900) 248; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 301.

Cyperus — *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXII (1884) 15; *Schlecht.* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 270.

1888 (Fr. Hens). — V : Léopoldville (Luja); entre Kwamouth et Kinshasa (Luja); Kinshasa (Dew.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — IX : pays des Bangala; Lisha (Hens).

Pycreus subtrigonus *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 512 et Étud. fl. Cgo (1896) 282; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 64 et III. fl. Cgo (1899) 37, t. 19; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 293.

1888 (Fr. Hens). — IV : Tombi [Lutete] (Hens, A. 251). — VIII : Équateurville (Hens, C. 182).

Pycreus tremulus [*Poir.*] *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 542 et Étud. fl. Cgo (1896) 282; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 306.

Cyperus — *Poir.* in *Lam. Encycl. meth. Bot.* VII (1806) 264; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 469

1888 (Fr. Hens). — VIII : Équateurville (Hens, C. 358)

KYLLINGIA Rottb.

Kyllingia albiceps [Ridl.] Rendle Cat. Welw. Pl. II (1899) 106; Clarke in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65; Pl. Gilletianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57] et Reliq. Dewevr. (1901) 259; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 286.

Cyperus — Ridl. in *Britten Journ. of Bot.* XXII (1881) 16.

K. macrocephala A. Rich. var. *angustior* Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 529 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 279.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 14); Kisantu (Gill. 1442). — IX : env. de Bangala (Dew. 860). — XVI : Albertville [Toa] (Hecq; Desc.).

Kyllingia brevifolia Rottb. *Descr. et icon. pl.* (1773) 13, t. 4, fig. 3; *Kunth Enum. pl.* II, 130; *Boeck.* in *Linnaea*. XXXV (1867-1868) 424; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 527 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 277; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 273; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 117.

1885 (R. Buettner). — II a : marais de Sisia (Dnp. 21). — V : le Stanley-Pool (Baett.); entre Sabuka et Léopoldville (M. Laur.).

Kyllingia elatior *Kunth Enum. pl.* II (1837) 135; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 426; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 528 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 278; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 275.

K. aromatica Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, II (1884) 146.

1888 (Fr. Hens). — III : Matadi (Hens).

Kyllingia erecta *Schumach.* in *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin.* Pl. (1827) 42; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 528 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 278; *Rendle Cat. Welw.* Pl. II, 105; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 274; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 66.

K. aurata Nees in *Linnaea*, X (1835-1836) 139; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, II (1884) 146.

1870 (G. Schweinfurth). — V : le Stanley-Pool (Dem.); entre Kinshassa et Kwaniouth (Luja). — IX : pays des Bangala (Hens). — XII d : près de la Kibali (Schw.).

— — var. **Soyauxii** Clarke in *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 279.

K. Soyauxii *Boeck.* in *Flora*, LXII (1879) 515.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 305, pr. p.).

Kyllingia Filicula *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 526.

K. pumila *Mchx* var. — *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiauae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 57].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 459).

Kyllingia melanosperma *Nees* in *Linnaea*, IX (1834) 286 et in *Wight* Contrib. Ind. Bot. (1834) 91; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 123; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 64, II (1900) 66; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 277.

1892 (Ém. Duchesne). — II a : Bingila (Dup.). — XV : Lusambo (Ém. Duch. 11, 23).

Kyllingia nigritana *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 272; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 219.

1900 (J. Gillet). — V : Kimueza (Gill. 1624).

Kyllingia peruviana *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* III (1789) 366; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 530; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 250; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 278; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 117.

K. capitata *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) t. 31.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew. 211). — V : entre Kimpoko et Dolo (M. Laur.).

Kyllingia polyphylla *Willd.* ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) 134; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 123; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 531; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 276.

K. planiceps *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. V (1895) 531 et Étud. fl. Cgo (1896) 279.

1816 (Chr. Smith). — V : Bas-Congo (Sm.).

Kyllingia pumila *Mchx* Fl. Bor.-Amer. I (1803) 28; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 531 et Étud. fl. Cgo (1896) 279; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI¹, 88]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 103; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 282; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 43.

1870 (G. Schweinfurth). — Bas-Congo (Naum.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Heas). — V : Coquilhatville (Schlt.; Kimueza (Gill.). — XII d : Muuza (Schw.).

— — var. **rigidula** *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiauae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 57].

K. rigidula *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 74; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 64; II (1900) 66.

K. Naumanniana *Boeck.* in *Flora*, LXII (1879) 516.

1895 (P. Dupuis). — II : Boma (Naum.). — II a : Bingila (Dup.). — V : (Gill.).

Kyllingia pungens *Link* Enum. pl. Hort. Berol. I (1821) 326; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 532; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 104; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 277; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 20.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Yambinga; en aval de Mobeka (Em. et M. Laur.).

Kyllingia sphaerocephala *Boeck.* in Flora (1875) 258 et in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 532; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 66; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 274.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : bords du Tangauika (Deb.).

Kyllingia squamulata *Thonn.* ex *Vahl* Enum. pl. II (1806) 381; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 147; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 532 et Étud. fl. Cgo (1896) 280; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 270.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 305, pr. p. et 292 pr. p.).

Kyllingia teres *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 533 et Étud. fl. Cgo (1896) 280; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 66; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 276; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 88].

1891 (F. Demense). — IX : pays des Bangala (Dem. 336). — XIII a : Mbaja [près de Stanleyville, rive gauche] (Em. Duch.); Romée (Em. Laur.).

Kyllingia triceps *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) 14, t. 4, fig. 6; *Boeck.* in Linnaea XXXV (1867-1868) 413; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 533; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 270; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 280.

K. bulbosa *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 11, t. 8.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Équateur (Schlt.).

ELEOCHARIS R. Br.

Eleocharis atropurpurea [*Retz.*] *Kunth* Enum. pl. II (1837) 151; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 596; Étud. fl. Cgo (1896) 298 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 407.

Scirpus — *Retz.* Observ. bot. V (1789) 114.

Eleocharis — *Koch* Syn. fl. Germ. ed. 2 (1845) 853; *Boeck.* in Linnaea, XXXVI (1869-1870) 458 (var. 7 excl.).

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Eleocharis capitata [L.] R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 225; Clarke in Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 597; Étud. fl. Cgo (1896) 299 et in Dyer Fl. trop. Afr. VIII, 407; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 220.

Scirpus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 48

Heleocharis — Boeck. in Vidensk. Meddel. Kjob. 1868-1869) 159 et in Linnaea, XXXVI (1869-1870) 461; Boiss. Fl. Orient. V, 387.

S. caribaeus Rottb. Deser. et icon. pl. (1773) 46, t. 15, fig. 3.

1816 (Chr. Smith) — Bas-Congo (Sua.). — I : Moanda (Gill).

Eleocharis Chaetaria Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) 154; Kunth Enum. pl. II, 140; Clarke in Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 597 et in Dyer Fl. trop. Afr. VIII, 408; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae II (1900) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 846].

Heleocharis — Boeck. in Linnaea, XXXVI (1869-1870) 428.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill).

Eleocharis fistulosa Schult. Manl. pl. II (1821) 89; Clarke in Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 598 et in Dyer Fl. trop. Afr. VIII, 406; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, II (1901) 106; [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 846]; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 118.

Heleocharis — Boeck. in Linnaea, XXXVI (1869-1870) 472.

1900 (J. Gillet). — V : Dolo (M. Laur.); Kisantu (Gill).

BULBOSTYLIS L.

Bulbostylis abortiva [Steud.] Clarke in Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V (1895) 619 et Étud. fl. Cgo (1896) 304; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 124; Clarke in Dyer Fl. trop. Afr. VIII, 441.

Fimbristylis — Steud. Syn. pl. glum. II (1855) 111; K. Schum. in Engl. Pf. Ost-Afr. (1895) 125.

1888 (Fr. Hens). — V : rochers de Tamo [Stanley-Pool] (Hens, B. 9).

Bulbostylis audongensis [Ridl.] Clarke in Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V (1895) 443 et in Dyer Fl. trop. Afr. VIII, 443.

Fimbristylis — Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 153.

1883 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, B. 75).

Bulbostylis barbata [Rottb.] Kunth Enum. pl. II (1837) 208 [conf. 205]; Clarke in Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V (1894) 611 et Étud. fl. Cgo (1896) 304; De Wild. et Th. Dur. Confr. fl. Cgo, II (1900) 70 et Reliq. Dewevr. (1901) 250; Clarke in Dyer Fl. trop. Afr. VIII, 431.

Scirpus barbatus *Rotb.* *Döser.* et *icon.* pl. (1773) 52, t. 17, fig. 4; *K. Schum.* in *Schlecht.* *Westafr.* *Kautsch.-Expöbl.* (1900) 270.

Fimbristylis — *Leuth.* *Fl. Austral.* VII (1878) 321; *K. Schum.* in *Engl. Pf.* *Ost-Afr.* 125.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Banana (Dew.). — II : Boma (Dew.); Zambi (Dup.). — IV : Lutete (Hens.). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XVI : Albertville [Toa] (Heccq).

Bulbostylis capillaris [*L.*] *Nees* in *Mart.* *Fl. Brasil.* II¹ (1812) 81, in obs.; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 612 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 305; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 43 [B. S. B. XXXVI¹, 89]; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 57 [B. *Herb. Boiss. Sér.* 2, I, 57].

Scirpus — *L. Sp. pl.* ed. 1 (1753) 49, pr. p.

Isolepis — *Roem.* et *Schult.* *Syst. veget.* II (1817) 118; *Kunth* *Enum. pl.* II, 211 (conf. etiam 205).

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill. 820),

— — var. ***trifida*** [*Kunth*] *Clarke* in *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* VI (1894) 652; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V (1895) 612 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 305; *Rendle* *Cat. Welw. Pl.* II, 125; *Clarke* in *Dyer* *Fl. trop. Afr.* VIII, 438; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 58 [B. *Herb. Boiss. Sér.* 2, I, 58]; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 21.

Isolepis trifida *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) 213 (conf. etiam 205).

1888 (Fr. Hens.). — IV : Gombi-Lutete (Hens. A, 293). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Lulanga (Em. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens. C, 154). — Ind. non cl. : poste de bois n° 6 (Em. et M. Laur.).

Bulbostylis cardiocarpa [*Ridl.*] *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V (1895) 612 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 306; *Rendle* *Cat. Welw. Pl.* II, 124; *Clarke* in *Dyer* *Fl. trop. Afr.* VIII, 434; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 58; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 21 et *Étud. fl. Bas. et Moy.-Cgo*, II (1907) 117.

Fimbristylis — *Ridl.* in *Trans. Liun. Soc. Ser.* 2, II (1884) 154.

1885 (C. Callewaert). — III : Matadi (Em. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Callew.); Kimuenza; Kisantu (Gill. 622, 791). — VI : Eielo (Em. et M. Laur.).

Bulbostylis filamentosa [*Vahl*] *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) 210 [conf. 205]; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V (1895) 613 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 306; *Rendle* *Cat. Welw. Pl.* II, 124; *Clarke* in *Dyer* *Fl. trop. Afr.* VIII, 433; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 43 [B. S. B. XXXVI¹ 89]; *De Wild.* *Étud. fl. Bas. et Moy.-Cgo*, I (1904) 202.

Scirpus — *Vahl* *Enum. pl.* II (1806) 262.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lutete (Hens.). — V : Kimuenza (Gill.); Lemfu (But.). — XII d : riv. Welle [Uele] (Schw.).

Bulbostylis laniceps *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 614 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 306; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 21, t. 14; *Pl. Gilletianae*, II (1901) 107 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 817] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 251; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 433; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 220 et *Miss. Laurent* (1905) 21.

Fimbristylis — *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 125, in obs.

1888 (Fr. Hens). — II a : route de l'Ouali à Shinganga (Dew. 288). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 317); le Chenal (Ém. et M. Laur.); rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja); Kinnuena (Gill. 1780); entre Dembo et Kisantu; Kisantu (Gill. 159, 165); Lukolela (Hens, C. 163). — VII : bords de la Fiui; Inongo (Ém. et M. Laur.).

Bulbostylis lanifera *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 125; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 22.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XV : Butala; Munnungu (Ém. et M. Laur.).

Bulbostylis puberula [*Poir.*] *Kunth* *Enum. pl.* II (1837) 213 [conf. 205]; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 615; *Étud. fl. Cgo* (1896) 307 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 307; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 22.

Scirpus — *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) 767; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 767.

Isolepis — *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) 103.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lutete (Heus). — IX : Yaminga (Ém. et M. Laur.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.).

Bulbostylis pusilla [*Hochst.*] *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 615; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 58 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 58]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 440.

Fimbristylis — *Hochst.* ex *A. Rich.* *Teut. fl. Abyss.* II (1851) 506.

Scirpus gracillimus *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 761 [conf. XXXVIII, 408].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Bulbostylis trichobasis [*Bak.*] *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, (1895) 616 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 445; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 220.

Scirpus — *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) 298.

1890 (F. Demeuse). — V : ravin du Diable (Dem. 30).

— — var. *leptocaulis* *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 58 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 58].

Bulbostylis trichobasis *Clarke* var. *uniseriata* *Clarke* in *Th. Dur. et DeWidd.*
Mat. fl. Cgo, VII (1900) 14 [B. S. B. XXXIX², 37].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 179, 333).

FIMBRISTYLIS Vahl.

Fimbristylis Cioniana *P. Savi* in Mem. Valdarnese, III (1842) 98, cum icone; *Parlat.* Fl. Ital. II, 74; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 602, Étud. fl. Cgo (1896) 299 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 420.

F. hispidula *Kunth* var. — *Bocck.* in *Linnaea*, XXXVII (1871) 28.

F. Lioniana *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 112.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu; Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem. : Luja) ; Léopoldville (Luja). — XV : Lusambo (Jos. Duch.).

Fimbristylis complanata [*Retz.*] *Link* Hort. Berol. I (1827) 292; *Kunth* Enum. pl. II, 228; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 505; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 124; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 602 et Étud. fl. Cgo (1896) 300; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 123; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 422.

Scirpus — *Retz.* Observ. bot. V (1789) 14.

Trichelostylis — *Nees* in *Linnaea*, IX (1834) 290 et X (1835-1836) 146.

F. autumnalis *Bocck.* in *Linnaea*, XXXVII (1871) 38.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Lemfu (But.).

Fimbristylis dichotoma [*L.*] *Vahl* Enum. pl. II (1806) 287; *Rehb.* Icon. fl. Germ. XIII, 44, t. 315, fig. 733; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 602, Étud. fl. Cgo (1896) 300 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 413.

Scirpus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 40; *Rottb.* Descr. et icon. pl. 57, t. 13, fig. 1.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.) : entre Léopoldville et Mombasi; env. de Kimuenza (Gill.).

Fimbristylis diphylla [*Retz.*] *Vahl* Enum. pl. II (1806) 289; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 124; *Rendle* Cat. Welw. pl. II, 122; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 603; Étud. fl. Cgo, I (1896) 301 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 415.

Scirpus — *Retz.* Observ. bot. VI (1791).15.

1816 (Chr. Smith). — II : Boma (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lukungu (Hens). — V : le Stanley-Pool; Léopoldville; entre Kinshasa et Kwamouth (Luja); Kisantu (Gill.). — VIII : Équateurville (Hens; Pyn.). — XIII d : Nyangwe (Dew.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.). — XVI : le Katanga (Verd.).

Fimbristylis dipsacea [*Rottb.*] *Benth.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. III (1883) 1049; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 604, Étud. fl. Cgo (1896) 301 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 413.

Scirpus dipsacens *Rotth.* Descr. et icon. pl. (1773) 56, t. 12, fig. 1; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1809-1870) 735.

Echinolytrum — *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) 21, t. 1.

1883 (Fr. Hens). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kinshassa (Luja); Kwamouth (Hens).

Fimbristylis ferruginea [L.] *Vahl* Enum. pl. II (1806) 291; *Delile* Fl. d'Égypte, 10, t. 6, fig. 3; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 124; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 606, Étud. fl. Cgo (1896) 302 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 417; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 122.

Scirpus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 50.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Banana (Dup.); Moanda (Gill.). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.).

Fimbristylis Hensii *Clarke* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 69 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 419.

F. exilis *Roem.* et *Schult.* var. *levinux* *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 605 et Étud. fl. Cgo (1896) 302.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — IV : Batanga [err. cal. Bolongo] [distr. des Cataractes] (Luja, 134); Lutete (Hens, 62, 67, 74, 239). — V : le Stanley-Pool (Hens).

Fimbristylis hispida [*Vahl*] *Kunth* Enum. pl. II (1837) 227; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II, 545 et in *Linnaea*, XXXVII (1871) 27; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, II (1884) 152.

Scirpus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) 276.

Fimbristylis exilis *Koem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) 98; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 604, Étud. fl. Cgo (1896) 301 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 412; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 123.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Buett.); Kinshassa (Luja); Kisantu (Gill.). — VII : Inongo (Em. Laur.). — XV : Îlots du Sankuru (Em. Laur.); env. de Lusambo. — Noms vern. : **Bisloka**; **Tambwe** (Coll.?).

Fimbristylis monostachya [L.] *Hassk.* Pl. Javan. rarior. (1848) 61; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 607 et Étud. fl. Cgo (1896) 302; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 122; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 424.

Cyperus — *L.* Mant. pl. II (1771) 180; *Rotth.* Descr. et icon. pl. 18, t. 13, fig. 3. *Abildgaardia monostachya* *Vahl* Enum. pl. II [1806] 296; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 169, t. 109, fig. a.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila; Kibinga (Dup.).

Fimbristylis obtusifolia [*Lam.*] *Kunth* Enum. pl. II (1837) 240; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 608 et Étud. fl.

Cgo (1896) 303; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 123; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 423.

Scirpus obtusifolius Lam 111 genr. Enexcl. I (1791) 141.

Isolepis — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 38, t. 81, fig. 1.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Fimbristylis quinquangularis [*Vahl*] *Kunth* Enum. pl. II (1837) 229; *Bocck.* in *Linnaea*, XXXVII (1871) 42; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI, 644, in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 609 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 421; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gillettianae, II (1901) 107 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 847].

Scirpus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) 279.

1800 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Fimbristylis scabrida *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 32; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 609, Étud. fl. Cgo (1896) 303 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 422.

1870 (G. Schweinfurth). — V : env. de Léopoldville (Gill.); bassin de la Sele (But.); Kinshasa (Luja); Kisantu (Gill.). — XII d : riv. Welle [Uele] (Schw. 3517).

Fimbristylis splendida *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 527.

F. complanata *Retz.* var. — *Clarke* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gillettianae, I (1900) 58 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 58].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 818).

Fimbristylis squarrosa *Vahl* Enum. pl. II (1806) 289; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 609, Étud. fl. Cgo, (1896) 305 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 413; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 122.

Scirpus — *Poir.* [nou L.] Encycl. méth. Bot. V [Suppl.] (1817) 100.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Kinshasa (Luja); Kisantu (Gill.).

SCIRPUS L.

Scirpus Buettnerianus *Bocck.* Cyper. nov. I (1888) 20 et in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* XXXI, 71; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 618 et Étud. fl. Cgo (1896) 307.

1885 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett.).

Obs. — *Clarke* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 446] range cette plante, comme imparfaitement connue, à la suite du genre *Bulbostylis*.

Scirpus fluitans L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 71; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 125; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 621; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 70; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 419.

1891 (G. Descamps). — I : vallée du Lueshi (Desc.). — V : Kisantu (Gill.). — XI : env. de Mogandjo (M. Laur.).

FUIRENA Rottb.

Fuirena chlorocarpa *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 159; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 645, Étud. fl. Cgo, I (1896) 307 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 465.

1888 (Fr. Heus). — V : le Stanley-Pool (Heus, 373).

Fuirena umbellata *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) 19 (i. c. t. 18 altera) fig. 3; *Bocch.* in *Linnaea*, XXXVII (1871) 110; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 126; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 648, Étud. fl. Cgo (1896) 308 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 467.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Dolo (M. Laur.); Tombi-Lutete (Heus); Kisantu (Gill.); rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja). — VI : Dina (Sap.). — VII : la Fini (Em. et M. Laur.).

LIPOCARPHA R. Br.

Lipocarpus pulcherrima *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 162; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 650; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 70; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 129; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 473.

Hypaelyptum — *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 127.

1889 (Éd. Luja). — V : prairies marécag. de la rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja).

Lipocarpus senegalensis [*Lam.*] *Th. et Hél. Dur.*

Scirpus — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) 140.

L. argentea R. Br. in *Tuckey* Congo Exped. Append. (1818) 459; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 163; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 649 et Étud. fl. Cgo (1896) 308; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI, 90]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 129; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 470; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 116.

Hypaelyptum — *Vahl* Enum. pl. II (1806) 253.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : riv. Tombi-Lutete (Heus). — V : Kisantu (Gill.).

Lipocarpa triceps [Lam.] Nees in *Wight* Contr. Ind. Bot. (1834) 92; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 470; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 17.

Kyllingia Lam. Ill. gen. Encycl. I (1791) 148, t. 38, fig. 2.

L. sphacelata *Kunth* Enum. pl. II (1837) 267; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 650; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 129; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 70.

1899 (Ed. Luja). — V : le Stanley-Pool (Luja). — XV : en aval d'Ifuta (Ém. et M. Laur.); le Kasai (Luja).

ASCOLEPIS Nees.

Ascolepis pinguis *Clarke* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 69.

1894 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa]; Kitope (Desc.).

Ascolepis protea *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 75; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 130; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 474; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 217.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2593); entre Kisantu et Popokabaka (But. in Gill. 2303).

HYPOLYTRUM Rich.

Hypolytrum africanum *Nees* in *Linnaea*, IX (1834) 288; *K. Schum.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 127; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 666, Étud. fl. Cgo (1896) 309 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 488.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Dem. 412). — V : Kisantu (Gill. 1075). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Hypolytrum congense *Clarke* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 38 [B. S. B. B. XXXVIII^a, 115], in *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 251 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 487.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Bokakata (Dem. 106 b, 746); près de la Kasuku (Dem. 1061 b).

Hypolytrum nemorum *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 13, t. 67; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 666; *Th. Dur.* et *De Wild.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65 et Reliq. Dewevr. (1901) 252; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 487; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 219; II (1907) 116 et *Miss. Laurent* (1905) 17.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — IV : bord de la Pioka (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Luja); Léopoldville (Schlt.); Sabuka (Ém. Duch.; Luja); Kisantu (Gill.); Lemfu (But.); rég. de Lumene (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — XV : Olombo; Batempa (Ém. et M. Laur.).

GRAMINACEAE (1)

IMPERATA Cyrillo

Imperata cylindrica [L.] P. Beauv. Agrostogr. (1812) 5, t. 5, fig. 4; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 693 et Étud. fl. Cgo (1896) 311; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 59 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 59].

Lagurus — L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 878.

I. arundinacea *Cyrillo* Pl. rar. Neap. fasc. II (1792) 27, t. 11; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 92; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 135; *De Wild.* Miss. Laur. (1906) 198.

1899 (J. Gillet). — II a : Kalamu (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu. — Nom vern. : *Nianga* (Gill.). — VI : route de Kikwit à Boala (Leser.) — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XIV : Kalemba-Lemba. — Nom vern. : *Niazi* (Coll. ?).

— — var. *Thunbergii* [Retz.] *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI (1889) 94; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 693 et Étud. fl. Cgo (1896) 312; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 253; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 1.

Saccharum — Retz. Obs. bot. V (1789) 17.

Imperata — P. Beauv. in *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II (1817) 289.

I. arundinacea *Cyrillo* var. — *Rendle* Cat. Welw. II (1899) 135.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — II a : poste de la Lubusi (Dew.). — IV : Lutete (Hens). — XIII : Bena-Mulengere (Dew.). — XVI : brousse du Katanga (Verd.). — Nom vern. : *Kalemba-Kaluma* [Tanganika] (Dew.).

ROTTBOELLIA L. f.

Rottboellia exaltata L. f. Suppl. pl. (1781) 114; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 96; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 139; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 59 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 59]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 198 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 11.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.); Mushie (Ém. Laur.). — VII : Lulanga (Ém. et M. Laur.). — X : Mokoangi (Boucken.). — XIV : Ruzizi-Kivu (Coll. ?).

(1) *Le Zea Mays* L. est cultivé partout au Congo belge.

MANISURIS L.

Manisuris granularis [L.] L. f. Nov. Gram. gen. (1779) 37, fig. 4 7; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 700 et Étud. fl. Cgo (1896) 312; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 111; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 199 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 11.

Cenchrus — L. Mant. pl. II (1771) 575.

M. polystachya P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1801) 24, t. 14.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Dolo (M. Laur.); Kisantu (Gill.).

TRACHYPOGON Nees

Trachypogon polymorphus Hack. in *Mart.* Fl. Brasil. II³ (1883) 263 et in *DC.* Monog. Phan. VI, 323; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 701.

Espèce collective habitant presque toute l'Amérique bor. et austr. trop. et subtrop.

— — var. **Montufari** Hack. l. c. VI (1889) 325.

— — — subvar. **capensis** Hack. l. c. VI (1889) 326; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 314.

Stipa capensis Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794) 19 et Fl. Capens. ed. 1, I, 401; [ed. *Schult.*] 106.

Trachypogon — *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb. Sér. 6, II (1833) 257; *Nees* Fl. Afr. austr. 100.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 222).

URELYTRUM Hack.

Urelytrum giganteum Pilger in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 125.

1876 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.). — XVI : Musumba (Pg. 471).

VOSSIA Wall.

Vossia procera Wall. et Griff. in Journ. Asiat. Soc. Beng. V (1836) 573, t. 23; *Oliv.* ex *Grant.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) t. 116, fig. 4; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 270; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 701; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71 et Reliq. Dewevr. (1901) 252; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 94.

1892 (G. Descamps). — V : env. do Bolobo (Dew.); Kimuenza (Gill.). — XV : le Bas-Kasai (Desc.).

ELIONURUS Humb. et Bonpl.

Elionurus argenteus Nees Fl. Afr. austr. (1841) 95; ²Hack. in DC. Monog. Phan. VI, 333; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 702; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 97; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 199 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 10.

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (Gill. 3671); env. de Lemfu (But. in Gill. 3473), — XV : Bukila; Butala (Em. et M. Laur.).

Elionurus Hensii *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 326.

E. argenteus *Th. Dur.* et *Schinz* [uou *Nees*] *Étud. fl. Cgo* (1896) 313.

1888 (Fr. Hens). — IV : Kiengi-Lutete (Hens, 285).

RHYTACHNE Desv.

Rhytachne congoensis *Hack.* in DC. Monog. Phan. VI (1889) 277; *Th. Dur.* et *De Wild.* Consp. fl. Afr. V, 700 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 313; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71 et *Miss. Laurent* (1901) 198.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : entre Kinshasa et Kwamouth (Luja). — VII : la Fini (Em. et M. Laur.).

— — var. **incompleta** *Hack.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 114).

— — var. **polystachya** *Hack.* ex *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 313; *De Wild.* et *Th. Dur.* l. e. I (1899) 65.

1888 (Fr. Hens). — II : Boina (Hens, A. 323).

— — form. **submutica** *Hack.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* l. e. I (1899) 65.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 158).

Rhytachne gabonensis [*Steud.*] *Hack.* in DC. Monog. Phan. VI (1889) 276; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 313; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 11; II (1907) 10.

Jardinea — *Steud.* in *Flora* (1830) 229 et *Syn. pl. glum.* I, 360, pr. p.

1888 (Fr. Hens). — IV : Tombi-Lutete (Hens, A. 310). — V : env. de Kisantu (Gill. 3508); Lemfu (But. in Gill. 2256).

ANDROPOGON L.

Andropogon Afzelianus *Rendle* in *Britten Journ. of Bot.* XXXI (1893) 357; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 75.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 76).

Andropogon appendiculatus *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) 105; *Hack.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 436; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 706 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 314.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens).

Obs. — La plante du Congo appartient à la variété *genuinus* *Hack.*

Andropogon apricus *Trin.* in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. 6*, IV (1836) 83 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC. Monog. Phan.* VI, 356; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 706 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 314.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens).

Obs. — La plante du Congo appartient à la var. *africanus* *Hack.* l. c. 357.

Andropogon bipennatus *Hack.* in *Flora* (1885) 142 et in *DC. Monog. Phan.* VI (1889) 537; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 10.

1904 (Aug. Van Houtte). — V : Kisantu (Van Houtte in *Gill.* 3738).

Andropogon bracteatus *Willd.* Sp. pl. IV (1805) 914; *Hack.* in *Mart. Fl. Brasil.* II³, 279, t. 64 et in *DC. Monog. Phan.* VI, 643; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 315.

Cymbopogon Humboldtii *Spreng.* *Pugill. pl. nov.* II (1815) 15; *Rendle* *Cat. Welw. Pl.* II, 159.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu (Hens).

Andropogon Brazzae *Franch.* in *B. Soc. hist. nat. Autun.* VIII (1895) 326.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 319).

Andropogon brevifolius *Sw.* *Prodr. veget. Ind. occ.* (1788) 26 et *Fl. Ind. occ.* I, 209; *Kunth.* *Révis. Gramin.* II, t. 196; *Hack.* in *DC. Monog. Phan.* VI, 363; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 707 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 415; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gille-tianae*, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60].

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (*Gill.*) — IX : Lisha (Hens).

Andropogon contortus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1045; *Hack.* in *DC. Monog. Phan.* VI, 585; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 709;

De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 54; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 9.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Schlt.). — VIII : Équateur (Pyn.).

Obs. — La plante de Boma appartient à la var. *geminus* subvar. *typicus* Hack. l. c.

***Andropogon diplandrus* Hack.** in Flora (1885) 123 et in *DC.* Monog. Phan. VI, 627; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 710 et Étud. fl. Cgo (1896) 315; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 75.

1891 (Fr. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : Kisantu (Gill.); rive N. du Kasai (Lujala). — IX : Yaminga (Dem.).

***Andropogon distachyus* L.** Sp. pl. ed. I (1753) 1040; *Desf.* Fl. Atlant. II, 377; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. [Monoc.] 33; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 710; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI¹, 90]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 75 et Reliq. Dewevr. (1901) 254.

1895 (P. Dupuis). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.).

***Andropogon familiaris* Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) 385; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 636; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 711 et Étud. fl. Cgo (1896) 316; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 3.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — IX : Molanga près Dobo (Thonn.).

***Andropogon finitimus* Hochst.** ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 465; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 637; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 712 et Étud. fl. Cgo (1896) 316.

Cymbopogon — *Rendle* Cat. Welw. Pl. II (1899) 157.

1891 (Fr. Demeuse). — Congo (Dem.).

***Andropogon intermedius* R. Br.** Prodr. fl. N. Holl. (1810) 202; *Benth.* Fl. Austral. VII, 531; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 485; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 715 et Étud. fl. Cgo (1896) 316.

1884 (R. Buettner). — III : Tendoa (Buett.).

Obs. — La plante de Tendoa appartient à la var. *punctatus* subvar. *glaber* Hack. l. c. 487 (= A. *glaber* Roxb. Hort. Bengal. [1814] 7).

***Andropogon Lecomtei* Franch.** in B. S. hist. nat. Aulun, VIII (1895) 329.

1888 (F. Heus). — IV : Lukungu (Heus, 186).

Andropogon Schimperi *Hochst.* ex *A. Rich* Tent. fl. Abyss. II (1851) 466; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 623; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 724; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 198 et *Étud.* fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 10.

Cymbopogon — *Rendle* Cat. Welw. Pl. II (1899) 155.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Cheual entre Léopoldville et Kwamouth (Ém. Laur.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — VI : Lusubi (Lescr.). — IX : Bumba; Yaminga (Ém. Laur.).

Andropogon Schoenanthus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1046 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 609; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 722 et *Étud.* fl. Cgo (1896) 317.

Cymbopogon — *Rendle* Cat. Welw. Pl. II (1899) 154.

Le type, non indiqué au Congo, croît dans l'Asie, l'Afrique et l'Australie trop.

— — subsp. **densiflorus** [*Steud.*] *Hack.* l. c. VI (1889) 611; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c.; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 76 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 254; *De Wild.* *Étud.* fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 9.

A. densiflorus *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 386.

Cymbopogon *Schoenanthus* *Rendle* var. — *Rendle* l. c. II (1899) 154.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Cabra). — II : Malela (Ém. Laur.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem.: Dew.); Kisantu (Gill.). — XIII d : Stanleyville (Pyn.).

Andropogon Sorghum *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) 86 (sens. ampl.); *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 470; *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. I, 294; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 500; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud.* fl. Cgo (1896) 318; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1906) 531-536.

Obs. — Espèce présentant une multitude de sous-espèces et de variétés largement cultivée dans tous les pays chauds.

— — var. **effusus** *Hack.* l. c. VI (1889) 503; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 724 et *Étud.* fl. Cgo (1896) 318.

Sorghum *halepense* *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) 88.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — Cette variété est aussi indiquée dans le bassin du Tanganika [XVI] (Boehm.).

— — var. **halepensis** [*L.*] *Hack.* l. c. VI (1889) 502; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. V, 724; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 254; *De*

Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 1 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 94.

Holcus halepensis L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1047.

Andropogon — *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) 109 (sens. strict.).

Sorghum — *Pers.* Syn. pl. I (1805) 101.

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (Gill.); Bolobo (Dew.). — VII : Kutu (Coll. †).
— IX : pays des Bangala (Hens). — XVI : Lukafu (Verd.).

Andropogon squarrosus L. f. Suppl. pl. (1781) 433 (sens. ampl.);
Hack in *DC.* Monog. Phan. VI, 542; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 726.

Type largement répandu dans la région tropicale.

— — var. ***genuinus*** *Hack.* l. c. VI (1889) 544.

A. squarrosus L. f. l. c. (sens. str.).

A. muricatus Retz. Obs. bot. II (1781) 43.

Anatherum — *P. Beauv.* Essai Agrost. (1812) 150, t. 22, fig. 10; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 153.

1898 (J. Gillet et Eug. Wilwerth). — II : Boma (Gill.; Wilw.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.).

— — var. ***nigritanus*** [*Benth.*] *Hack.* l. c. VI (1889) 544; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. V, 727 et Étud. fl. Cgo (1896) 319; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 255.

Andropogon nigritanus *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 573.

1888 (Fr. Hens). — V : Lukolela (Hens); Bolobo (Dew.).

THEMEDA Forsk.

Themeda ciliata [*L. f.*] *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI (1889) 664;
Th. Dur. et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 730; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 255.

Anthistiria — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 113; *P. Beauv.* Agrost. 134, t. 23, fig. 7.

A. barbata Desf. in Journ. Phys. XL, 294, t. 2.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.).

Themeda Forskalii *Hack* in *DC.* Monog. Phan. VI (1889) 659; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 730.

Le type est largement disséminé dans la rég. trop. de l'Ancien Monde et dans l'Afrique austr.

— — var. ***glauca*** *Hack.* l. c. VI (1889) 663; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 16.

1904 (Coll. †). — XIV : Ruzizi-Kivu. — Nom vern. : **Mangué** (Coll. †). — XVI Lukafu. — Nom vern. : **Kapumpu** (Coll. †).

ANTHEPHORA Schreb.

Anthephora cristata [Doell.] Hack. ex De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60] et Reliq. Dewevr. (1901) 255; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 199 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 10.

A. elegans Schreb. var. — Doell in Mart. Fl. Brasil. II² (1877) 314; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 193.

A. elegans Schreb. var. africana Pilger in Engl. Jahrb. XXX (1901) 119.

A. elegans Th. Dur. et Schinz [non Schreb.] Étud. fl. Cgo (1896) 319.

1887 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Boma (Hens). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Kisantu ; Kimuenza (Gill.).

Anthephora elegans Schreb. Beschreib. d. Gräser, III (1810) t. 44 ; *Doell* in Mart. Fl. Brasil. II², 313; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 732; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 76.

1890 (Paul Briart). — XVI : Zilo (Briart).

Anthephora elongata De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 2.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 413).

PEROTIS Ait.

Perotis spicata [L. Th. et Hël. Dur.

Saccharum — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 54.

P. latifolia Ait. Hort. Kew. ed. 1, I (1789) 85 ; *Kunth* Révis. Gramin. I, 357, t. 92; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 176; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 734 et Étud. fl. Cgo (1896) 319; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 210; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 76; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 199.

1891 (F. Demense). — Congo (Dem.). — Bas-Congo (Cabra). — V : Dolo (M. Laur.); Kimuenza (Gill.).

THYSANOLAENA Nees.

Thysanolaena acarifera Nees in Nov. Act. Acad. nat. Cur. XVII, Suppl. I (1813) 180; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 738; *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1805) 338.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 258).

PASPALUM L.

Paspalum conjugatum Berg. in Act. Helv. VII (1772) 129, t. 8; *Trin.* Gram. icon. et descr. II, t. 102; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp.

fl. Afr. V, 736 et Étud. fl. Cgo (1896) 320; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71 et Reliq. Dewevr. (1901) 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 199; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 514 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 10.

P. ciliatum Lam. Illustr. geogr. Encycl. I (1791) 175; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 56, t. 92, fig. 2.

1888 (Fr. Hens). — II : Sisia (Dup.). — II a : Shiuganga (Dew.). — IV : Kiengi-Lutete (Hens). — V : Kisautu Gill.). — VI : Eielo (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — X : Mokoange (Boucken.). — XIII a : Romee (Van Goits.). — XV : le Kasai (Lescr.). — Noms vern. : **Nla-Ngombe** [Romée]; **Dili** [Songo]; **Nzamingo** [Bwaka] (Van Goitsenh.).

***Paspalum longiflorum* Retz.** [non *Trin.*] Observ. bot. IV (1786) 15; *Bak.* Fl. of Mauril. I, 431; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 737 et Étud. fl. Cgo (1896) 320; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI², 90].

1888 (Fr. Hens). — Congo (Hens, 209, 273). — II : Sisia (Dup.).

***Paspalum scrobiculatum* L.** Mant. pl. I (1767) 29; *Trin.* Gram. icon. et descr. II, t. 143; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 100; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 738 et Étud. fl. Cgo (1896) 320; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI², 90]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 162; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 518-519; Miss. Laurent (1896) 205 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 10.

P. Kora Willd. Sp. pl. I (1798) 332; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, t. 85.

1885 (R. Buettner). — IV : Banza-Manteka (Hens). — V : Chenal Leo-Kwam (Ém. et M. Laur.); Suata (Buett.); Kinshasa (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dem.). — XVI : Haut-Maruguu (Deb.). — Ind. non cl. : env. de Sende (Coll. ?).

ISACHNE R. Br.

***Isachne albens* Trin.** Gram. icon. et descr. (1823) 8, t. 83; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 100; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 200.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Dolo (M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Yaminga (Ém. et M. Laur.).

***Isachne australis* R. Br.** Prodr. fl. N. Holl. (1810) 196; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 200.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Kisantu (Ém. et M. Laur.).

***Isachne Buettneri* Hack.** in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1890) 69; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 739 et Étud. fl. Cgo (1896) 321.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

PANICUM L.

Panicum arborescens L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 59; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 176.

P. ovalifolium Poir. Encycl. méth. Bot. XII (1816) 279; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 79, t. 110, fig. 1; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 758 et Étud. fl. Cgo (1896) 323; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 79 et Reliq. Dewevr. (1901) 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabira). — II a : Shinganga (Dew.). — IV : Tombe [Lutete] (Hens); Kitobola (Em. et M. Laur.). — V : Dolo (Schlt.); Suata (Buett.); Kisaoutu (Gill.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Elulungu** (M. Laur.). — XV : le Kasai (Luja).

Panicum argyrotrichum Anderss. in *Peters* Reise n. Mossamb II (1864) 548; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 741 et Étud. fl. Cgo (1896) 321; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu; Lutete (Hens).

Panicum brizanthum Hochst. in Flora (1841) I, Intell. 19; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 363; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1885) 170, t. 112a, fig. 1 (var. *latifolium* Oliv.); *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 742 et Étud. fl. Cgo (1896) 321; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 168; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 11.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — XIV : Ruzizi-Kivu. — Nom vern. : **Mutechia** (Coll. ?).

— — var. **polystachyum** *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 3, Pl. Gilletianae, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60] et Contr. fl. Cgo, I (1900) 72; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 171 et Miss. Laurent (1906) 200.

1896 (Fr. Thonner). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Yabasumba (Thonn. 78); Bumba (Em. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd. 359).

Panicum colouum L. Syst. veget. ed. 10 (1759) 870; *Trin.* Gram. descr. et icon II, t. 160; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 46; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 742; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 73; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72.

1891 (G. Descamps). — XV : Lusambo (Desc.).

Panicum coloratum L. Mant. pl. I (1767) 30; *Jacq.* Icon. pl. rar. I, t. 12; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 73; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 743; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI, 90]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 178; *De Wild. et*

Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 256; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 94 et Miss. Laurent (1905) 201.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Dew.). — IV : Lutete (Hens). — V : entre Leopoldville et Sabuka (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — XV : flot du Sankuru (Ém. et M. Laur.)

Panicum Crus-galli L. Sp. pl. ed 1 (1753) 56; *Nees* Fl. Afr. austr. 58; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 47; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 744 et Étud. fl. Cgo (1896) 321; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 173; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 200 et Étud. fl. Bas- et Moy.- Cgo, II (1907) 11.

Echinochloa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 53.

Oplismenus — *Dmrt.* Agrostogr. Belg. (1823) 128.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Dem.). — I : Banaua (Ém. Laur.). — II : Sisia (Dup.). — II a : Temvo (Ém. Laur.). — V : Dolo. — Nom vern. : **Wasulu** (Lescr.); Galiema (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.); rég. de Lemfu; entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Bandundu (Ém. Laur.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Itimbiri (Ém. Laur.). — X : Yakoma. — Nom vern. : **Bowo** (Lescr.). — XIII d : Piani-Lombi (Dew.). — XV : Lac Foa (Lescr.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Yam-Yamve** (Verd.); Albertville (Desc.).

— — var. **Petiveri** [*Trin.*] *Hack.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72.

P. Petiveri *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829) t. 176; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60]; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 759.

1887 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens); Sisia (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Pweto (Desc.).

— — var. **polystachyum** *Munro* ex *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1867) 159; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 745 et Étud. fl. Cgo, I (1896) 322.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3497, 3790).

— — var. **submuticum** *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 347.

1888 (Fr. Hens). — V : Kwamouth (Hens, 176).

Panicum diagonale *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) 23; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 40; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 746; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 322.

Digitaria — *Stapf* in *Dyer* Fl. Capens. VII (1898) 381; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 163.

1905 (Marc. Laurent). — V : Dolo (M. Laur.).

P. diagonale var. **hirsutior** *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 4.

1896 (Fr. Thonner). — IX : Yabasumba (Thonn. 82).

— — var. **uniglume** [*Hochst/Hack.* in *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* (1892) 117; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 747 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 322; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72 et Pl. Gilletianae I (1900) 61 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 61].

P. uniglume *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 372.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Kisantu (Gill.).

Panicum distichophyllum *Trin.* De gramin. Panic. (1826) 147 et Gram. icon. et descr. II, t. 182; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 747 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 323; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI¹, 90].

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu (Hens). — V : Kutadi (Dup.).

Panicum elongatum *Mez* in *Engl. Jahrb.* XXXIV (1904) 132.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 102).

Panicum Griffonii *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 342.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 284).

Panicum Hensii *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 332.

1888 (Fr. Hens). — VIII : Lulanga (Hens, 101).

Panicum indutum *Steud.* Syn. pl. glum. 1 (1855) 64; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 751 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 323; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 5 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 11; II (1907) 12.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Zobe (Dew.). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — IV : Nord Manyanga (Cabra et Michel). — V : le Stanley-Pool. — Nom vern. : **Sambabala** (Dew.); Kisantu : Kimueza (Gill.); Sabuka (M. Laur.); Sanda (De Brouw.). — VI : route de Lusubi à Luanu (Leser.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.); Yabasumba (Thonn.). — X : Yakoma (Coll. ?). — XII d : l'Éle (Delp.). — XIII a : Romée (Van Goitsenh.). — XIV : Ruzizi-Kivu (Coll. ?). — XV : Munnugu; Olombo (Ém. et M. Laur.); env. de Lusambo. — Nom vern. : **Kolumbwa** (Gent.). — XVI : Lukonzolwa (Coll. ?).

Obs. — Autres noms vern. : **Tonsopola** [Lusambo]; **Sungu-Sungu** [Romée]; **Luseke** [Ruzizi-Kivu]; **Ngomo** [Lukonzolwa] (Coll. ?).

Panicum interruptum Willd. Sp. pl. I (1797) 344; *Steud. Syn. pl. glum.* I, 66; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 751; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 174; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201.

1903 (Ém. et Marc. Laurent) — VII : marais de la Fini (Ém. et M. Laur.).

Panicum lutetense K. Schum. in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 332.

1888 (Fr. Hens) — IV : Lutete (Hens, 194).

Panicum maximum Jacq. Leon. pl. rar. I (1781) t. 13; *Steud. Syn. pl. glum.* I, 72; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 753 et Étud. fl. Cgo (1896) 323; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. XXXVI², 90]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 181; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo I (1903) 63-68, (1905) 504-506 et Miss Laurent (1906) 201.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Sola** (Cabra). — I : Moanda (Vanderyst). — II : env. de Boma (Van Houtte). — II a : Bingila (Dup.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Luvituku (Dem.). — V : Dembo; Kisantu (Gill); Kutadi (Dup.). — VI : Eielo (Ém. Laur.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Wangata [Équateur] (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dem.); Upoto (Wilw.); Lisha (Hens). — XI : Basoko. — Nom vern. : **Guzu** (S. Doh.). — XV : Leki (Em. Laur.); route de Luluabourg (Gent.).

Panicum mayombense Branch. in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 343.

1888 (Fr. Hens). — VIII : Lulanga (Hens, 101).

Panicum nigritanum Hack. ex *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 756 et Étud. fl. Cgo (1896) 323.

1886 (R. Buettner). — V : le Stanley-Pool (Buett. 559).

Panicum nudiglume Hochst. in Flora, XXVII (1844) 253; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 756; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 170; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201.

P. *Robrechtii* Fourn. ex *Steud. Syn. pl. glum.* I (1855) 60.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Yutabi (Ém. et M. Laur.).

Obs. — Le **P. molle** Sw., de l'Amérique trop. a été introduit à Kisantu (Gill) et s'y développe à merveille [*De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) II et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 505-509].

Le **P. muticum** Forsk., indigée à Bingila (Dup.) [Mat. fl. Cgo, I (1897) 159] est probablement une plante introduite [Conf. etiam *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 109-111].

Panicum ogowense *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 344; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 61 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 61].

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 194). — V : Kisantu (Gill.).

Panicum plicatum *Lam.* Illustr. gener. Encycl. I (1794) 171; *Trin.* Gram. icon. et descr. II, t. 233; *Schrank* Pl. rar. Hort. Monac. t. 19; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 64; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 759; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI^a, 91]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 12.

Setaria mauritiana *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 305; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 167.

1896 (Ern. Dewèvre). — Congo (Ern. Dew.). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe, C. (Ëm. et M. Laur.). — V : distr. du Stauley-Pool, C. (Ëm. et M. Laur.); env. de Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ëm. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XV : la Lulua (Luja).

— — var. **costatum** [*Roxb.*] *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) 436; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 324.

P. costatum *Roxb.* Fl. Ind. I (1830) 415; *Kunth* Enum. pl. I, 93.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

Panicum polystachyum [*H. B. et K.*] *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 103; *De Wild.* Miss. Laurent (1900) 202.

Echinolaena — *H. B. et K.* Nov. gen. et sp. I (1815) 119.

1903 (Ëm. et Marc. Laurent). — X : Imese (Ëm. et M. Laur.).

Panicum sanguinale *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 57; Fl. Dan. (1768) t. 388; English Bot. (1801) t. 849; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 39; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 761 et Étud. fl. Cgo (1896) 324; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI^a, 94]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 202 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 14.

Digitaria — *Scop.* Fl. Carniol. ed. 2, I (1772) 52; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 163.

1888 (Fr. Hens). — II : Sisia (Dup.); Boma. — Nom vern. : **Singala-Vunxia** (Van Houtte). — IV : Kitobola (Ëm. Laur.). — V : Léopoldville (Dew.); Chenal Leo-Kwam; Mopolenge (Ëm. et M. Laur.); Suata (Buett.); Kisantu (Van Houtte). — VIII : Lac Tamba (Ëm. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dem.). — XII c : Nala (Delp.). — XV : îles du Sankuru en aval d'Ifuta (Ëm. et M. Laur.). — XVI : Lukonzolwa. — Nom vern. : **Kachukutu** (Van Houtte).

— — var. **cognatum** *Hack.* in B. Herb. Boiss. II, append. 2 (1894) 18; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 763 et Étud. fl. Cgo (1897) 325.

P. horizontale *Nees* [non *G. F. W. Mey.*] Fl. Afr. austr. (1841) 26.

1885 (R. Buettner). — V : Suata (Buett. 538).

P. sanguinale var. **horizontale** [G. F. W. Mey.] E. Mey. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 361; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 763; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 73.

P. horizontale G. F. W. Mey. Prim. fl. Esseq. (1818) 54.

1891 (G. Descamps). — XV : le Kasai (Desc.).

Panicum scabrum Lam. Ill. genr. Encycl. I (1791) 171; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 704; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 73.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.).

Panicum sulcatum Aubl. Pl. Guian. I (1775) 70; De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae (1900) 5.

1896 (Fr. Thonner). — IX : Moudumba (Thonn. 84).

Panicum Tholloni Franch. in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 351.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, 62).

Panicum Zenkeri K. Schum. in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 330.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 284).

Panicum zizanioides H. B. et K. Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 100; De Wild. Miss. Laurent (1906) 202.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur.).

TRICHOLAENA Schrad.

Tricholaena rosea Nees Fl. Afr. austr. (1841) 16; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 770 et Étud. fl. Cgo (1896) 325; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 194; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, II (1901) 108 [B. S. B. B. Sér. 2, I, 848] et Reliq. Dewevr. (1901) 257; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 11, (1904) 94; II (1907) 12.

Panicum — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) 92.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — I : Moanda (Vanderyst) — V : Léopoldville (Dew.); Mopolenge; Sabuka (Ém. et M. Laur. ; entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : Kinwanda (Cabra et Michel); Lusubi (Ém. et M. Laur.). — VII : Ikongo (Ém. et M. Laur.). — XV : Luluabourg (Gent.).

Tricholaena sphacelata Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 559; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 770 et Étud. fl. Cgo (1896) 325.

Panicum — Steud. Syn. pl. glum. I (1855) 92.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

SETARIA P. Beauv.

Setaria aurca [A. Rich.] Hochst. ex Walp. Annal. bot. III (1852) 721; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 772 et Étud. fl. Cgo (1896) 326; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 202 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 12.

Pennisetum — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 378.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Kisantu (Gill.); Kutadi (Dup.). — VII : Kutu (Em. Laur.). — XV : entre Kubuluku et Kanda-Kanda, au S. du 7° (Leser.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kansoki** (Verd.); **Mondoko**. — Nom vern. : **Lweo** (Leser.).

Setaria glauca [L.] P. Beauv. Agrostogr. (1812) 51; *Kunth* Enum. pl. I, 149, Suppl. 106; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 773 et Étud. fl. Cgo (1896) 326.

Panicum — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 56; *Host* Gramin. Austr. II, t. 16; *Trin.* Gram. icon. et descr. II, t. 195.

1887 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens; Em. Laur.). — XVI : le Katanga (Desc.).

Setaria verticillata [L.] P. Beauv. Agrostogr. (1812) 51; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 774; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. De-wevr. (1901) 257.

Panicum — L. Sp. pl. ed. 2 (1763) 82; *English Bot.* (1801) t. 874.

1895 ! (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

OPLISMENUS P. Beauv. (1)

Oplismenus africanus P. Beauv. Fl. d'Oware, II (1807) 15, t. 67, fig. 1; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 771 et Étud. fl. Cgo (1896) 325; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 184; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 73; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 21; II (1907) 14 et *Miss. Laurent* (1905) 203.

Panicum — *Pour.* Encycl. méth. Bot. Suppl. IV (1816) 275.

1888 (Fr. Hens). — V : Kinneuzza : Kisantu (Gill.); Tshumbiri (M. Laur.). — IX : Lisha (Hens). — Ind. non cl. : Gombi (Dem.).

CENCHRUS L.

Cenchrus barbatus Schumach. in Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 43; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 777; *De Wild.*

(1) M. Hackel (in sched.) rapporte avec doute à *O. compositus* P. Beauv. le n° 157 de la collection Hens.

et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 73 et Reliq. Dewevr. (1901) 257; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 202 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

1887 (Fr. Hens). — I : Banana (Dew.). — III : Matadi (Hens). — V : Dolo. — Nom vern. : **Bankusale** (Coll. ?); Kimuenza (Gill.). — XV : Isaka (Em. et M. Laur.); **Lusambo**. — Nom vern. : **Balwamwabadili** (Coll. ?).

PENNISETUM L.

Pennisetum Benthami *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 105; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 777 et Étud. fl. Cgo (1896) 327; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65 et Reliq. Dewevr. (1901) 257; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 3, Miss. Laurent (1906) 203 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

P. purpureum *Schumacher*. in *Danske Vidensk. Selsk. Kjoeb.* III (1828) 64; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 189.

P. macrostachyum *Benth.* [non *Trin.*] in *Hook.* Niger Fl. (1819) 563; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Em. Laur.). — II : Boma (Dew.). — V : Chenal [Leo-Kwam.] (Em. et M. Laur.); Kasantu (Gill.). — VII : la Fini (Em. et M. Laur.). — VIII : Ikoko (Leser.). — IX : pays des Bangala (Dem.); Nouvelle-Auvers (Em. et M. Laur.). — X : Mokoango. — Nom vern. : **Songo-Songo** (Bonck.); Yakoma — Nom vern. : **Aworo** (Coll. ?) — XII c : Nala (Delp.). — XIV : Ruzizi-Kivu. — Nom vern. : **Matele** (Coll. ?); Kalembe-Lemba (Coll. ?); Baraka. — Nom vern. : **Mabingobingo** (Doh.). — XV : le Sankura (Em. et M. Laur.).

Pennisetum dichotomum [*Forsk.*] *Delile* Fl. d'Égypte (1813) 15, t. 8, fig. 1; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 778; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI^a, 91]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 203.

Panicum — *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 20.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (M. Laur.).

Pennisetum dioicum [*Hochst.*] *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 380; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 778; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI^a, 91].

Beckera petiolaris *Hochst.* in *Flora*, XXVII (1814) 512; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1906) 60 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 60].

1893 (P. Dupuis). — II a : Bugda (Dup.). — V : env. de Loufu (But.).

Pennisetum hordeiforme *L.* *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 302; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 779; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 91 [B. S. B. B. XXXVI^a, 91]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1907) 7 et Reliq. Dewevr. (1901) 257.

1888 (Fr. Hens). — II : Zanze (Em. Laur.). — II a : brouse entre l'Owali et Shinganga (Dew.); Bugda (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens). — XIII c : **Bamanga** (Em. Laur.). — XV : Lusambo; Leki (Em. Laur.).

Pennisetum nodiflorum *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 363.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, 32).

Pennisetum parviflorum *Trin.* De Gramin. Panic. (1826) 64 et Gram. icon. et descr. III, t. 288; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 782; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 203 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — VI : la Sanga. — Nom vern. : **Kot-Koti** (Cabra). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Lolelengi** (M. Laur.). — Ind. non cl. : Haut-Luapula. — Nom vern. : **Mutemia** (M. Laur.).

Pennisetum Prieurii *Kunth* Revis. Gram. II (1829) 411, t. 119 et Enum. pl. I, 162; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 783; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74; *De Wild.* Miss. Laurent. (1906) 203 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Matulu** (Cabra). — V : Dolo (Lescr.); Kisantu (Gill.). — IX a : en aval de Mobeka (Em. Laur.). — XIII : Lambi (Lescr.). — Ind. non cl. : Bana (Dem.).

Pennisetum reversum *Hack.* ex *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 68; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 327.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.).

Pennisetum setosum [*Sw.*] *L. C. Rich.* in Pers. Syn. pl. I (1805) 72; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 784 et Étud. fl. Cgo (1896) 327; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 190; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 258.

Cenchrus — *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) 211.

P. purpurascens *H. B.* et *K.* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 113; *Kunth* Enum. pl. I, 160 et Suppl. 114; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 203 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

P. polystachyum *Schult.* Mant. pl. II (1824) 456; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 783; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74 et Reliq. Dewevr. (1901) 258.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Hens; Dup.). — V : env. de Kisantu (Van Houtte); Sabuka (M. Laur.). — XI : Isangi (Em. et M. Laur.). — XIII a : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Lubue (Luja).

Pennisetum spicatum [*L.*] *Koern.* in *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) 284; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 784 et Étud. fl. Cgo (1896) 328; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 91].

Holcus — *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) 1305.

Penicillaria — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) 1031; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. t. 13, fig. 3.

P. typhoideum L.C. Rich. in *Pers. Syn. pl.* I (1805) 72; *Delile* Fl. d'Égypte, 17, t. 8, fig. 3; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 198; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 202; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 320-322 et Miss. Laurent (1906) 204.

1893 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dup.).

Obs. — Espèce cultivée à Lusambo (XV) [type et form. *viviparum*] à Eiolo (VI), dans la tribu des Plani-Gongo (?) et près de Wabundu (Dew.).

P. spicatum var. **typicum** K. Schum. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 55.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

Pennisetum unisetum {Nees} Benth. in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1881) 47; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 786.

Gymnotrix — Nees *Fl. Afr. austr.* (1841) 66.

Beckera — Steud. *Syn. pl. glum.* I (1855) 118.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 291).

OLYRA L.

Olyra latifolia L. *Syst. nat. ed.* 10 (1759) 126; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 255; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 204.

O. brevifolia Schumach. in *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 402; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 328; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 66.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — II a : forêts du Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : entre Léopoldville et Sabuka (M. Laur.); Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — IX : Lisha (Hens); en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.). — XIII c : Bamanga (Ém. Laur.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Obs. — L'habitation « au N. du Stanley-Pool » (Dew.) est dans le Congo français [Reliq. Dewevr. (1901) 258].

LEPTASPIS R. Br.

Leptaspis cochleata Shw. *Enum. pl. Zeyl.* (1864) 357; *Rendle* Cat. Welw. II, 256.

L. conchifera Hack. in *Bolet. Soc. Brot.* I (1887) 211, t. G, fig. A; K. Schum. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 106; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 788; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVII, 128]; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 74; *De Wild.* *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1904) 95 et Miss. Laurent (1906) 204.

1891 (F. Demeuse). — II a : entre Shindamba et la Lemba (Cabra). — V : bassin de la Sele (But.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bamania (M. Laur.). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.). — XV : Kamba (Ém. et M. Laur.).

ORYZA L.

**Oryza sativa* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 336; *Kunth* Enum. pl. 1, 7; *Bentl. et Trin.* Medic. Pl. IV, t. 291; *K. Schum.* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 106; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 788; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 231; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 41. 1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

— — var. *aristata* De Wild. Miss. Laurent (1906) 205.

1902 (J. Gillet). — V : introd. à Kisantu (Gill.); Casier-Saint-Jean [Wumbali] (Gill.). — IX : Bobaugi (Ém. et M. Laur.).

— — var. *mutica* De Wild. Miss. Laurent (1906) 205.

1903 (Ém. et M. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Galiema [Léopoldville] (M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bamaia (Ém. et M. Laur.). — XIII a : entre Stanleyville et Tshopo (Ém. et M. Laur.).

LEERSIA Sw.

Leersia hexandra Sw. Prodr. veget. Ind. Occid. (1788) 24; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algèr. (Monoc.) 39; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 789 et Étud. fl. Cgo (1896) 329; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 61 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 61]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 12.

1888 (Fr. Heus). — IV : Tombe-Lutete (Hens.). — V : Kisantu-Makela (Van Houtte); Kisantu (Gill.).

ARISTIDA L.

Aristida amplissima Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. 6, V (1842) 155; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 800; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI¹, 91]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74, Pl. Gilletianae, I (1900) 62 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 62] et Reliq. Dewevr. (1901) 258.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — IV : Lutete (Hens.). — V : Kisantu (Gill.).

Aristida vestita Thunb. Prodr. fl. Cap. (1794) 49; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 810; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI¹, 91]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 62 [B. H. Boiss. Sér. 2, 1, 62] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 71.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens.). — V : Kisantu (Gill.).

SPOROBOLUS R. Br.

Sporobolus barbigerus *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 371; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 108 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 848] et Reliq. Dewevr. (1901) 258; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 94.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Tshia (Dew.). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.).

Sporobolus breviglumis *Hack. ex De Wild.* Miss. Laurent (1906) 205.

1890 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 50).

Sporobolus capensis [*Willd.*] *Kunth* Enum. pl. I (1833) 212; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 819; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI¹, 91].

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 16.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — Ind. non cl. : Suengi ; Goua (Hens).

Sporobolus indicus [*L.*] *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 170; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 820; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 205 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

Agrostis — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 63.

1903 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — IX a : env. de Mobeka (Ém. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. Laur.). — XVI : Kiambi. — Nom vern. : *Kokolwa* (Coll.?).

Sporobolus mayumbensis *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 367.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu (Hens, 212).

Sporobolus Molleri *Hack.* in Bolet. Soc. Brot. V (1887) 213; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 822 et Étud. fl. Cgo (1896) 329; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 209; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 75 et Reliq. Dewevr. (1901) 259; *De Wild.* Miss. Laurent (1901) 205 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

1888 (Fr. Hens). — IV : Batanga (Luja ; Lukungu (Hens). — V : le Stauley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VII : Isaka (Ém. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. Laur.). — XV : env. de Lusambo. — Nom vern. : *Kabwebwa* (Coll. ?). — XIII d : Elungu. — Nom vern. : *Kibembele* (Dew.).

Sporobolus robustus *Kunth* Revis. Gram. II (1829) 425, t. 126 et Enum. pl. I, 213; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.).

Sporobolus strictus *Franch.* ex *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 268.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlecht. 12448).

VILFA R. Br.

Vilfa capensis [*Willd.*] *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 16; *Nees* in *Linnaea*, VII (1832) 293; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 160; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 62 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 62]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

Agrostis — *Willd.* Sp. pl. ed. 1 (1798) 372.

Sporobolus — *Kunth* Enum. pl. 1 (1833) 212; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 819.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : reg. du Tanganika-Moero (Coll. ?).

TRICHOPTERYX Nees.

Trichopteryx arundinacea *Hack.* ex *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1891) 129; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 846; *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VII (1895) 372.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 281 pr. p.).

Trichopterix flammida *Benth.* in Journ. Linn. Soc. XIX (1881) 98; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 846; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 65 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 62]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 205 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

1888 (Fr. Hens). — IV : Kimbando-Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Lusubi (Lesef.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Bobaugi (Ém. et M. Laur.).

MICROCHLOA R. Br.

Microchloa setacea *R. Br.* Prodr. fl. Nov. Holl. (1810) 208; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost Afr. 110; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 856; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 268.

1899 (R. Schlechter). — V : Leopoldville (Schlt. 12385).

CYNODON Pers.

Cynodon Dactylon [*L.*] *Pers.* Syn. pl. I (1805) 85; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 212; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 856 et Étud. fl. Cgo (1896) 329; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 220; *De Wild.* et *Th.*

Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 75; *De Wild.* Nol. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 526-529 et Miss. Laurent (1906) 206.

Panicum Daecyton L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 58

1891 (Hyac. Vauderyst). — I : Moanda (Vauderyst). — II : Boma (Ém. Laur.). — V : Kisautu (Gill.; M. Laur.).

CTENIUM Panz.

Ctenium concinnum Nees Fl. Afr. austr. (1841) 237; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 859; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI¹, 91]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 259; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12 et Miss. Laurent (1906) 206.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Dew.); env. de Kimueza (Gill.); Sabuka (M. Laur.). — VII : la Fuii (Ém. et M. Laur.). — XV : Oloubo; Bukila (Ém. et M. Laur.).

Ctenium elegans Kunth Révis. Gramin. I (1829) 93; II, 295, t. 59; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 859; *Franch.* in B. S. hist. nat. Aulun, VIII (1895) 375.

1888 (Fr. Hens), — IV : Lutete (Hens, 201).

CHLORIS Sw.

Chloris Gayana Kunth Révis. Gramin. I (1829) 89; II, 293, t. 58; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 207; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 851 et Étud. fl. Cgo (1896) 330; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 66.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — II : Boma (Ém. Laur.).

Chloris polydaetyla Sw. Prodr. veget. Ind. occ. (1788) 26; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 259; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 206 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

1895 (A. Dewevre). — II : Boma (Dew.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Kisautu (Gill.). — VIII : Lulanga (Ém. Laur.). — XIII a : Yakusu. — Nom vern. : Ceka (Coll.). — XIV : Ruzizi-Kivu. — Nom vern. : Lembause (Coll.). — XV : env. de Lusambo. — Nom vern. : Dishinda-ja-Mulume (Coll.). — XVI : rég. du Tauganka-Moero. — Noms vern. : Kalolo; Kayoba (Coll.).

Chloris punctulata Hochst. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 265; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 862; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 46 [B. S. B. B. XXXVI¹, 92]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 66.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Eru. Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens). — XV : Leki [Lomami] (Ém. Laur.).

ELEUSINE Gaertn.

***Eleusine Coracana** [L.] Gaertn. De fruct. et semin. I (1788) 8, t. 1, fig. 11; *Trin.* Gram. icon. et descr. I, t. 70; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 866; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 224; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 62 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 62]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 3 et Miss. Laurent (1906) 207.

Cynosurus — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 107; *Schreb.* Besch. d. Graeser. II, t. 35. E. Luco *Webb.* Apont. phyto-geogr. (1859) 591.

1900 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : Lukafu (Verl.).

Eleusine indica [L.] Gaertn. De fruct. et semin. I (1788) 8; *Trin.* Gram. icon. et descr. I, t. 71; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 211; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 866 et Étud. fl. Cgo (1896) 350; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 46 [B. S. B. B. XXXVI¹, 92]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 224; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 259; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 3; Miss. Laurent (1906) 207 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 15.

Cynosurus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 72.

E. textilis *Webb.* in Murr. Journ. Trav. et Nat. Hist. I (1868) 31.

1887 (Fr. Hens. — I : Banana (Dew.). — II : Boma (Hens.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kiushasa (Coll. ?); Kisantu (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XIII a : Romée (Coll. ?). — XIV : Ruzizi-Kivu (Coll. ?); env. de Baraka (S. Doh.). — XV : env. de Lusambo. — Nom vern. : **Dishinda-par-Makaela**. — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lunsekwe** (Coll. ?); camp de Lukonzolwa (Coll. ?); rég. du Tanganika-Moero (Coll. ?); Pweto (S. Doh.). — Noms vern. : **Moto-Moto**; **Kasukutu** [Baraka]; **Kimbandji** [Kiushasa]; **Sinda** [Romée]; **Lingia-Rabacha** [Pweto].

DACTYLOCTENIUM Willd.

Dactyloctenium aegyptium [L.] Willd. Enum. pl. Hort. Berol. (1809) 1029; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 212; *Boiss.* Fl. Orient. V, 171; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 868; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 46 [B. S. B. B. XXXVI¹, 92]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 259.

Cynosurus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 72.

Eleusine cruciata *Lam.* Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 48, fig. 2.

1888 (Fr. Hens.). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — II : Boma (Wilw.). — IV : Lutete (Hens.). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : Kiambi [Tanganika-Moero] (Coll. ?). — Ind. non cl. : Kutadi (Dup.).

Dactyloctenium mpuetense *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 206.

Ann. ? (Coll. ?). — XVI : Pweto. — Nom vern. — **Kaloja** (Coll. ?).

LEPTOCHLOA P. Beauv.

Leptochloa coerulescens Steud. Syn. pl. glum. I (1855) 209; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 869; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 75 et Reliq. Dewevr. (1901) 260; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12 et Miss. Laurent (1906) 207.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Dew.); Sisa (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Laja); euv. de Leopoldville; Kisantu (Gill.). — XV : banc de sable en amont de Butala (Em. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Gandon (Dem.); Goma (Hens).

Leptochloa Laurentii De Wild. Miss. Laurent (1906) 207.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.).

ELYTROPHORUS P. Beauv.

Elytrophorus articulatus P. Beauv. Essai Agrostogr. (1812) 67, t. 14, fig. 2; *Kunth* Révis. Gramin. II, 481, t. 154; *Benth.* Fl. Austral. VII, 638; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 873 et Étud. fl. Cgo, (1896) 331.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

PHRAGMITES Trin.

Phragmites vulgaris [Lam.] Crép. Man. fl. Belg. éd. 2 (1866) 345; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 876; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 76; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12; II (1907) 15.

Arundo — Lam. Fl. Franç. III (1778) 615.

A. Phragmites L. Sp. pl. ed. I (1753) 81.

Trichodou — Rendle Cat. Welw. Pl. II (1899) 218.

P. communis Trin. Fund. Agrost. (1820) 134; *K. Schum.* in *Engl.* Fl. Ost-Afr. 113; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12; II (1907) 15 et Miss. Laurent (1906) 208.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Bokala (M. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XIV : Baraka. — Nom vern. : Metelele (S. Doh.). — XV : le Kasai (Gent.; Ém. et M. Laur.); le Bas-Kasai (Desc.).

ERAGROSTIS P. Beauv.

Eragrostis atrovirens Nees Fl. Afr. austr. (1841) 400; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 63 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 63]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 208.

1900 (J. Gillet). — V : Kinuenza (Gill.). — IX : Yambinga (Em. et M. Laur.).

Eragrostis Brownei [*P. Beauv.*] *Nees ex Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, I (1840) 562; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 279; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 881; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 76 et Reliq. Dewevr. (1901) 260.

Megastachya — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 71.

1888 (Fr. Hens). — IV : Gombi-Lutete (Hens, A. 306). — V : Suata (Hens, C. 161). — IX : Bumba (Dew. 891).

Eragrostis Chapellieri [*Kunth*] *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) 392; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 271; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 881 et Étud. fl. Cgo (1896) 331; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilleltianae, I (1900) 63.

Poa — *Kunth* Révis. Gramin. II (1829?) 513, t. 186.

E. patens *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 175, t. 113.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 223). — V : Kimuenza (Gill. 773).

Eragrostis ciliaris [*L.*] *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) 192; *Nees* Fl. Afr. austr. 413; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 265; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 884 et Étud. fl. Cgo (1896) 332; *Boiss.* Fl. Orient. V, 582; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 179 et Reliq. Dewevr. (1901) 260; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 208 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, II (1907) 15; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 232.

Poa — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 102; *Jacq.* Icon. pl. rar. I (1781) t. 18.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Kimbanza** (Cabra). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.). — IV : Lukuugu (Hens). — V : Léopoldville (Schlt.); Sabuka (M. Laur.); Kisantu et env. (Gill.). — IX : Yaminga (Éric. et M. Laur.). — XV : env. de Lusambo. — Noms vern. : **Zelo**; **Samba** (Coll.?).

Eragrostis fascicularis *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb. Sér. 6, I (1831) 405; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 269; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 883 et Étud. fl. Cgo (1896) 332.

Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) 389.

Ann. ? (Coll. ?). — Congo (Coll. ? fide Kunth).

Eragrostis multiflora [*Forsk.*] *Aschers. et Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 297, 310; *Richt.* Pl. Europ. I, 73; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 885 et Étud. fl. Cgo (1896) 332.

Poa — *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 21.

Briza *Eragrostis* *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 70.

E. major *Host* Gramin. Austr. IV (1809) 24; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 237; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 260.

Poa megastachya *Koel.* Deser. Gramin. (1802) 181; *Kunth* Enum. pl. I, 333; *Bak.* Fl. of Maurit. 380.

Eragrostis — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) 185; *Boiss.* Fl. Orient. V, 580.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Cabra). — II : Boma (Dup.). — XIII d : Kasongo (Dew.).

Eragrostis namaquensis Nees ex Schrad. in Linnaea, XII (1838) 452; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 208.

E. interrupta *P. Brav.* var. — *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 884; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 233.

1903 (Ém. et Mare. Laurent). — XV : banc de sable en aval d'Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Eragrostis nutans [Retz.] Roxb. Fl. Ind. (1820) 337; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 264; *Boiss.* Fl. Orient. V, 583; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 886.

Poa — *Retz.* Observ. bot. IV (1786) 19; *Kunth* Enum. pl. I, 332.

1883 (H. Johnston). — Cougo (Johnst.).

Eragrostis patens *Wir.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 175, t. 113.

Le type croît dans l'Afrique trop. or.

— — var. **congoensis** *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 354; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 63 [B. Herb. Boiss, Sér. 2, I, 63].

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 328). — V : Kisautu (Gill, 589, 720); env. de Lemfu (But. in Gill, 1172).

Eragrostis sabulicola *Pilger* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 15.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill, 3162); Banana (Dew. 61).

Eragrostis tremula [*Lam.*] *Hochst.* in Flora (1842) I, Beibl. 134; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 269; *Boiss.* Fl. Orient. V, 58; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 269; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 15.

Poa — *Lam.* Ill. gen. Encycl. I (1791) 185; *Kunth* Enum. pl. I, 332.

1899 (R. Schlechter). — I : Moanda (Gill). — V : Léopoldville (Schlt.).

Eragrostis tubiformis *Hack.* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 208 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 15.

1903 (Ém. et Mare. Laurent). — II : Boma (Pyu.). — V : env. de Léopoldville et de Bokala (M. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai ; îlot du Bas-Saukuru (Ém. et M. Laur.).

Eragrostis verticillata *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) 346; *Schweinf.* in B. Herb. Boiss. II, append. II, 35; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 867 et Étud. fl. Cgo (1896) 331.

Leptochloa? — *Kunth* Révis. Gramin. I (1829) 91 et Enum. pl. I, 272.

1893 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dup.).

CENTOTHECA Desv.

Centotheca lappacea Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. II (1810) 189; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 56; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 228; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 261; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 209.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Cabra). — V : Dolo (Schlt.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

Centotheca mucronata [*P. Beauv.*] *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* f. Gen. pl. III (1883) 1190; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 898 et Étud. fl. Cgo (1896) 333.

Poa — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 5, t. 4; *Kunth* Enum. pl. I, 334.

Megastachya — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 74; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II, 593.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Dem.).

Centotheca owariensis [*P. Beauv.*] *Hack.* ex *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 333.

Megastachya — *P. Beauv.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 269, in syn.

Eragrostis — *Steud.* l. c. I (1855) 269; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 887; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 77 et Reliq. Dewevr. (1901) 260; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 95; II (1907) 15 et Miss. Laurent (1906) 208.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.); le Mayumbe (Dup.). — V : Coquilhatville (Dew.); Sabuka (Luja); Kinshasa (Hens, B. 102); env. de Lemfu (Gill.); route des Caravanes (Ém. Laur.); Kimuenza (Gill.). — VII : luongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.); Coquilhatville (Dew.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.).

STREPTOGYNE P. Beauv.

Streptogyne crinita *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 80, t. 16, fig. 1; *Doell* in *Mart.* Fl. Brasil. II³, 171, t. 46; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 899 et Étud. fl. Cgo (1896) 333; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 77 et Reliq. Dewevr. (1901) 261; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 209.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : Lisha (Hens); Lukolela (Dew.); Kisantu (Gill.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV : Lomkala (Ém. et M. Laur.).

ARUNDINARIA Michx.

Arundinaria alpina *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. A. (1895) 129 et C, 116; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 223, t. 81-83.

Ann. ? (Coll. ?). — XIV : env. de Mja-Kibuti [secteur de Luvungi] (Coll. ?).

PUELIA Franch.

Puelia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 77 et Reliq. Dewevr. (1901) 261; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12; II (1907) 16 et Miss. Laurent (1906) 209.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Leopoldville et Sabuka (M. Laur. 544); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimuenza (Gill. 1947); euv. de Lemfu (But. in Gill. 3488). — XI : Lokandu (Dew. 1121). — XV : Lomkala; Ibaka (Ém. et M. Laur.).

EUCLASTE Franch.

Euclaste graminea *Franch.* in B. Soc. hist. nat. Autun, VII (1895) 335.

1895 (G. Descamps). — IX : Upoto (Wilw.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

GYMNOSPERMEAE

GNETACEAE

GNETUM L.

Gnetum africanum *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 73; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 948; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 257; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 92]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 262; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 10 et Miss. Laurent (1906) 197.

1891 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dup.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2871). — VII : Coquilhatville (Dew. 592). — VIII : Eala (M. Laur. 903). — IX : Bangala (Dem.).

CYCADACEAE

ENCEPHALARTOS Lehm. (1)

Encephalartos Laurentianus *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 10, t. 25; *L. Gentil* in Rev. Horticult. belg. (1904) 7 et

(1) De Wildeeman, *Les Encephalartos congolais* in Not. pl. util. ou intér. du Congo, I (1904) 386-396.

in Gard. Chron. (1904) I, 370, fig. 163; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1901) 392, t. 27 et 28, fig. 16 et Miss Laurent (1907) 367, fig. 58, 60.

1902 (L. Gentil). — VI : en aval de Kasougo (Gent. 98).

« Cette espèce paraît confinée sur les deux rives du Kwango » [riv. congol. et portug.] (Gent.).

Encephalartos Lemarinelianus *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 28 [B. S. B. B. XXXIX², 80]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 9, t. 23 et 24; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 386, t. 25-28; *L. Gentil* in Gard. Chron. (1904) I, 370, fig. 164; *Ét. André* in Rev. Hortic. (1904) 58, fig. 23; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 364, fig. 56, 57, 59.

1881 (P. Pogge); 1886 (G. Le Marinel). — XV : Beua-Kanza (Pg.); rive droite du Lobi, à quelques jours de Luluabourg (Le Marinel); entre Kanda-Kanda et Luluabourg (Gent.).

Obs. — Espèce introduite à Lusambo (Le Marinel).

ADDITIONS ET CORRECTIONS (1)

à FAIRE AUX PAGES INDIQUÉES.

Page

16 **Tetracera alnifolia** Willd. Sp. pl. II (1799) 1243; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 12; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 5; Bot. Centralbl. LXII (1895) 339; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829

1883? (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 632).

18 *Uvaria latifolia* ... XV : Mukenge (Pg.).

20 *Monanthes Poggei* ... XV : Mukenge (Pg.).

" *Hexalobus grandiflorus* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.).

31 *Capparis Poggei* ... XV : Mukenge (Pg.).

34 **Alsodeia ilicifolia** Welw. ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 108.

Rinorea — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 42; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 35; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. XXXVIII (1908) 827.

1906 (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).

35 *Alsodeia* [Rinorea] *Poggei* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).

36 *Poggea alata* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.).

" ***Oncoba spinosa*** Forsk. var. ***angolensis*** *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 116; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 38; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.

1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).

" *Calocoba* [*Oncoba*] *glauca* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).

37 — *Welwitschii* ... XV : Mukenge (Pg.).

" *Lindackeria dentata* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.); Mukenge (Pg.).

38 — *Poggei* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).

" *Buchnerodendron speciosum* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).

40 *Securidaca longepedunculata* ... XV : Mukenge (Pg.).

45 *Haronga pauciculata* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).

46 *Garcinia lougeacuminata* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.).

" — *lualabensis* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.).

(1) Nous avons cru que la localité de Munza, ou le célèbre voyageur G. Schweinfurth a recolté tant de plantes, était dans la zone Garba-Dungu [XII d]. M. De Hertogh, qui a parcouru toute cette région et visite l'emplacement de Munza, nous dit que ce village était au S. du Kibali, c'est-à-dire dans la zone Bomokandi [XII e]. Dans le *Sylloge*, il faut donc lire partout XII e et non XII d, là où Munza est cité.

Page

- 49 *Sida humilis* ... lire : XII c : entre Vankerkovenville et Arebi.
 " — *linifolia* ... *supprimer* : Ind. non cl. : ... *et mettre dans* V : Bulebu.
 50 *Wissadula rostrata* ... *au lieu de* Ind. non cl. lire : V : Yindu (Vanderyst).
 60 *Sterculia quinqueloba* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 63 **Cola Ledermannii** Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 827 [nom. tant].
 1906? (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).
- 67 *Leptonychia multiflora* ... lire : Beua-Lekula.
 71 *Triumfetta iomalla* ... lire : XVII [et non XV] : Msumba.
 75 *Hugonia platysepala* ... lire : IV : Kitobola (Ém. Laur.). — V : Kisantu ...
 76 *Phyllocosmus senensis* ... lire : XII c : Bangwa ...
 78 *Oxalis corniculata* ... lire : XIII d : Lubundu (Dew.).
 81 *Fagara pilosiuscula* ... lire : XVI [et non XV] : Musumba ...
 " — Poggei ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 85 *Ochna katangensis* ... *au lieu de* I lire : XVI : ...
- 89 **Ouratea Ledermanniana** Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 827 [nom. tant].
 1906? (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).
 " — *reticulata* ... lire : V : bassin de la Sele ...
 91 *Turraea Vogelii* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 93 *Carapa procera* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
- 95 [avant **COULA**] **ONGOKEA** Pierre
Ongokea Klaineana Pierre in B. S. Linn. Paris, I (1897) 1314;
Engl. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV,
 147 et in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
 1883? (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).
 " *Dichapetalum rufipile* ... XV : Mukenge (Pg.).
 97 *Olax Poggei* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 98 *Leptaulus daphnoides* ... lire : XII c : pays des Mangbettu ...
 99 *Alsodeiopsis Poggei* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 104- *Gouania longipetala* ... XV : *ajouter* : Kondue (Lederm.).
 105 *Ampelocissus calophylla* ... lire : IX [et non IV] Luozu ...
 " — *Chantinii* ... lire : XVI [et non XV] Musumba ...
 " *Cissus adenocaulis* ... lire : IV [et non V] entre Tumba et ...
 " — *Bakeriana* ... lire : XII c : pays des Mangbettu ...
 106 — *Gilletii* ... lire : XV : Samba (Cabra).
 107 — *Gnerkeana* ... XV : Mukenge (Pg.).
 " — *Livingstoniana Welw.* [syn. *C. rubiginosa* Planch.]... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 109 *Leea guineensis* ... XV : Mukenge (Pg.).
 " *Paullinia pinnata* ... XV : Mukenge (Pg.).
 110 *Allophylus africanus* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 111 — **Welwitschii Gilg** in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 287; *Engl. in*
 Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 827.
 1906? (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).
 " *Lychnodiscus cerospermus* ... XV : Kondue (Lederm.) ; Mukenge (Pg.).

- Page
 112 **Eriocoelum paniculatum** *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 428; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.
 1883! (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).
- 113 *Phialodiscus unijugatus* ... XV : Koudue (Lederm.).
- 117 *Agelaea obliqua* ... XV : Mukenge (Pg.).
 * — *phaseolifolia* ... lire : IV : entre Tumba et ...
- 118 **Byrsocarpus coccineus** *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 226; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 452; *Walp.* Annal. bot. II, 294.
Rourea — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 290; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
 1883! (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 119 *Connarus luluensis* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 120 *Manotes brevistyla* ... lire : XVI [et non XV] Musumba ...
 * *Cnestis ferruginea* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 121 — *polyantha* ... lire : XVI [et non XV] Musumba ...
- 134 *Milletia drastica* ... XV : Mukenge (Pg.).
 * — *versicolor* *Welw.* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 136 *Platysepalum ferrugineum* ... XV : Mukenge (Pg.). — XVI [et non XV] bords du Lualaba ...
 * — **Ledermanni** *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 827 [nom. tant].
 1906! (S. Ledermann). — XV : Koudue (Lederm.).
- 140 **Smithia strigosa** *Benth.* in *Miq.* Pl. Jungh. (1851-55) 211; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 154; *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
 1883! (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 147 *Erythriua abyssinica* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 162 **Dalbergia pubescens** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 315; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 234; *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
 1883! (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 164 **Ostryocarpus?** **Welwitschii** *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 240; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
 1883! (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 165 *Lonchocarpus Teuszii* ... *supprimer cette espèce et la rapporter comme synonyme ainsi que les habitations au* *Milletia Teuszii* *De Wild.* [Conf. supra pg. 134].
- 166 *Derris* [*Deguelia*] *brachyptera* ... XV : Mukenge (Pg.).
 * — [*Deguelia*] *nobilis* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 174 *Dialium guineense* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 177 *Berthua acuminata* ... au lieu de *Acuminata*.

- Page
177 **Berlinia auriculata** *Benth.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1806) 309; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 294; *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 828.
1883? (P. Poggé). — XV : Mukenge (Pg.).
- 212 *Dissotis segregata* ... *lire* : I : Vista (Chaves) et *supprimer la note au bas de la page.*
- 223 *Paropsia reticulata* ... *lire* : IX [et non V] Lisha (Dem.).
- 248 *Mussaenda elegans* ... XII c [et non XII a] pays des Mangbetta ...
- 255 *Bertiera gracilis* *De Widd.* var. *latifolia* ... *lire* : XIII a : Romée ...
- 263 *Oxyanthus speciosus* ... XV : *ajouter* : Kondue (Lederm.).
- 264 *Feretia apodanthera* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 269 *Plectronia Oddoni* ... *au lieu de* *Plectronia.*
" — *venosa* ... *lire* : XVI [et non VI] Lukafu.
- 272 *Craterispermum brachynematum* ... XII c : [et non XII] Gombari ...
- 274 *Pavetta Baconia* ... XIII d [non XII d] env. de Kasongo ...
- 278 *Coffea Royauxii* ... XII b [et non VII] Bili ...
- 281 *Psychotria cristata* ... *lire* : XII c : Munza ...
" — *Gilletii* ... *lire* : IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : Kisantu ...
- 284 *Geophila involucreta* ... IX [et non IV] Luozi ...
" *Trichostachys microcarpa* ... IV : Tumba (Dem.). — V : env. de Kimuenza ...
- 287 *Mitracarpum scabrum* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
- 320 *Pachystele cinerea* *Pierre* var. *euneata* ... IX [et non IV] Luozi ...
- 324 **Mayepea** [Linociera] **luluensis** *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 829 [nom. tant.].
1883? (P. Poggé). — XV : Mukenge (Pg.).
- 341 **Alstonia viscosa** *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 829 [nom. tant.].
1883? (P. Poggé). — XV : Mukenge (Pg.).
- 345 **Voacanga Thouarsii** *Roem. et Schult.* *Syst. veget.* IV (1819) 439; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 154; *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 829.
1883? (P. Poggé). — XV : Mukenge (Pg.).
- 346 *Strophanthus Dewevrei* ... XV : *ajouter* : Kondue (Lederm.).
- 352 **Baissea angolensis** *Stapf* in *Kew Bull.* (1894) 426 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 209, 614; *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 827.
1906? (S. Lederm.). — XV : Kondue (Lederm.).
- 354 *Oncinotis glandulosa* ... *au lieu de* VII, *lire* : VIII : Eala ...
- 368 **Mostuea hirsuta** [*T. Anders*] *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, (1902) 509.
Coinochlamys — *T. Anders.* ex *Benth.* et *Hook. f.* *Gen. pl.* II (1876) 1991; *S. Moore* in *Trin. Journ. of Bot.* (1876) 321, t. 182, fig. 2; *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 829.
1883? (P. Poggé). — XV : Mukenge (Pg.).
- 371 *Strychnos congolaua* ... et non *Stychnos.*

Page

- 391 *Solanum aethiopicum* ... lire II a : Yema-Lianga ...
- 396 *Capsicum couoides* ... lire : 1870 (G. Schweinfurth) et non 1901 (J. Gillet).
- 406 *Sopubia latifolia* ... XV [et non XVI] Mukenge ...
- 409 *Spathodea nilotica* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 410 *Markhamia tomentosa* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 411 *Stereospermum Kuntlianium* (*Cham.* ... 1851 ? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.). — XVI [et non I] : rég. du Lac Moero (Verd.).
- " — *Verdickii* ... au lieu de I lire : XVI : Lac Moero ...
- 427 *Lepidagathis Laurentii* ... lire : 1903 [et non 1894] ...
- 431 **Duvernoya extensa** [T. Anders.] *Limlau* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* (1895) 372; *Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII* (1908) 827.
Justicia — T. Anders. in *Journ. Linn. Soc. VII* (1864) 44; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr. V*, 206.
 1906? (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).
- 436 **Vitex Buchneri** *Guerke* in *Engl. Jahrb. XVIII* (1891) 166; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr. V*, 331; *Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII* (1908) 829.
 1881 ? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 437 *Vitex camporum* ... [err. cal. congorum] *Buett. ex Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII* (1908) 829.
 1883 ? (P. Pogge) ... XV : Mukenge (Pg.).
- 438 *Clerodendron capitatum* ... 1883 ? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 439 — *myricoides* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 440 — *scandens* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 441 — [*Kalaharia*] *spinescens* ... XV : Mukenge (Pg.).
- " — *volubile* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 447 *Plectranthus miserabilis* ... lire : XV [et non XVI] Mukenge (Pg.).
- 448 *Aeolanthus adenotrichus* ... lire : 1899 [et non 1891] ...
- 458 *Cyathula prostrata* ... lire : IV : Lukungu, Lutete (Heus). — V : euv. de Léopoldville (Luja).
- 467 *Aristolochia Schweinfurthii* ... XV : Kondue (Lederm.).
- " *Piper guineense* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 468 — *subpeltatum* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 477 **Euphorbia Candelabrum** *Trémaut* ex *Kotschy* in *Mitt. Geogr. Gesells. Wien, I* (1857) 169; *Boiss.* in *DC. Prodr. XV*?, 81; *Berger Sakkul. Euphorb.* (1907) 73; *Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII* (1908) 829.
 1881 ? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 479 *Bridelia micrantha* var. *ferruginea* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 484 *Antidesma venosum* form. *glabrescens* ... lire : XVI [et non XIII] : Lukafu ...
- 485 *Uapaca Marquesii* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 486 *Hymenocarum acida* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 487 — *ulmoides* ... XV : Kondue (Lederm.).
- 488 *Microdosmus puberula* ... XV : Kondue (Lederm.).
- 489 *Manniophyton africanum* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).

- Page
490 Poggeophyton aculeatum ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 491 **Claoxylon columnare** *Muell.-Arg.* in Flora, XLVII (1864) 437 et in *DC. Prodr.* XV¹, 776; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 494 Alchornea cordifolia ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 495 Argomuelleria macrophylla ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 499 Maprounea africana ... XV : Mukenge (Pg.).
- 500 **Sapium cornutum** var. **africanum** *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829 [nom. tant.].
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 501 **Chaetacme aristata** var. **kamerunensis** *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828 [nom. tant.].
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 502 Dorstenia mogandjoensis ... 1905 (Marc. Laurent) ... et non 1908.
- 503 — Verdickii ... lire : XVI [et non XV] Lukafu ...
" Trymatococcus kamerunianus... XV : Kondue (Lederm.)... [T. kamerunensis].
- 505 **Ficus Dreypondtlana** *L. Gentil* in Rev. Hort. belge, XXXII (1906) 85, cum ic.
1905 (Éd. Lesclapart). — C. dans la région du Lualaba-Kasai [XV-XVI] (Lescr.). — XV : Kondue (Declercq, Gent.). — XVI : Haut-Lualaba (Rom.).
- 509 **BOSQUIEA** Thou. *C'est a tort, croyons-nous, que les auteurs ont modifié ce nom que Thouars a écrit BOSQUEIA.*
" Bosqueia angolensis ... [B. Welwitschii *Engl.*] ... XV : Kondue (Lederm.).
- 510 **BOSQUEIOPSIS** *De Wild. et Th. Dur.* [et non BOSQUIEOPSIS].
" Myrianthus arborea ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 514 Ottelia halogena ... lire XIII c : [et non XIII e].
- 528 Angraecum Pynaertii ... lire : 1906 [et non 1986].
- 542 Renealmia bracteata ... lire : 1889 [et non 1899].
- 550 Avant **MUSA L.** intercaler **MUSACEAE**.
- 573 Eichornia natans ... ajouter : *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 233.
... V : rég. de Kisantu (Gill. 3800).

HETERANTHERA R. et P.

- 573 **Heteranthera Kotschyana** *Fenzl ex Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 205; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 3; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 232.
1902 (J. Gillet et L. Gentil). — IV : Kitobola; Tumba (Ém. et M. Laur.).
— VI : vallée de la Djuma (Geut. : Gill. 2902).

MONOCHORIA Presl.

Page

- 573 **Monochoria africana** [Solms] N. E. Br. in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1901) 5; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 233.
M. vaginalis Presl var. — Solms in A. et C. DC. Monog. Phau. IV (1883) 521.
 Anu. ? (V. Durant). — XV : rég. du Kasai (V. Dur.).
- 574 Lire **POLLIA** au lieu de **PCLLIA**.
- 589 *Hydrosme Leopoldiana* ...
Amorphophallus — N. E. Br. ... *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 233.
 ... VI : rive droite du Kwango (Gent.).
- 611 *Kyllingia pumila* var. *rigidula* Clarke ... au lieu de : 1895 (P. Dupuis)
 V : (Gillet) ... lire : 1874 (Fr. Naumann) ... V : Kisantu (Gill.)
- 633 *Panicum interruptum* et non *Paunicum* ...
-

TABLEAU MONTRANT, PAR FAMILLE,
LE NOMBRE D'ESPECES OBSERVEES DANS CHAQUE DISTRICT

Dicotylédonées	I. — BANANA.	II. — ROMA	III. — MATADI.	IV. — CATAKUMES.	V. — STANLEY-POOL.	VI. — KWANGU.	VII. — LAC LÉOPOLD II.	VIII. — ÉQUATEUR.	IX. — BANGALA.	X. — UBANGI.	XI. — ARUWIMI.	XII. — JELE.	XIII. — PROV. ORIENTALE.	XIV. — RUIZI KIVU.	XV. — KASAL.	XVI. — KATANGA.
Ranunculaceae	2			3	1											6
Dilleniaceae			1	5		1	3				1	1	1		3	
Anonaceae	1	7	1	15	2	2	6	8			3	3	1		11	1
Menispermaceae		1	1	2		1	1	1							2	
Nymphaeaceae		2	1	2	1		1	1				2			2	2
Cruciferaeeae		1		2			1	2					1		1	
Capparidaceae	3	3		1	6	5	7	4	3	1	6	2	2		6	6
Violaceae		6	2	1	4	1		2	1				3	1	2	
Bixaceae		3		2	9	6	2	5	4		6	4	2		10	2
Polygalaceae	1	1		6	4	2	2					2	1		4	5
Caryophyllaceae		1		1	4	2								1	2	1
Portulacaceae				4		1	2	3	1			2			1	1
Hypericaceae	2	3		1	3	1	1	3	1		1			1	1	3
Guttiferaceae	1	3		5	2	2	5	1			3	1	2		4	2
Dipterocarpaceae												1				2
Malvaceae	6	12	8	4	20	9	4	14	12	3	2	9	4	2	7	25
Sterculiaceae	1	6		2	13	3	3	6	4	1	6	10	5	1	14	6
Scytopetalaceae				1	1	2					1				2	
Tiliaceae	3	5	1	3	19	7	6	10	11	1	3	5	7	3	10	10
Linaceae				2	3		4	1			1				3	1
Malpighiaceae	1	1	1		4			1					1			1
Geraniaceae														1		
Oxalidaceae		2		2	2						1		2		1	4
Balsaminaceae		4		1	2	1		2	4		2	5		2	4	6
Rutaceae				6	2			2					1		4	2
Simarubaceae		2		1	2	1	2	3	1		1	1			2	1
Ochnaceae	1	2		2	17	7	1	2	4	1		1	4		8	3
Burséraceae		2		1	1		1	1					1		2	1
Meliaceae	1	2		6	4	1	11			1	3	1	2		4	3
Dichapetalaceae		3		2			2	2			1	1	1		4	
Oleaceae	1	2		1	15	7	2	9	5	1	2	1	1		9	2
Celastraceae				1									1		1	
Hippocrateaceae		1			3			10	4		5		1		5	2
Rhamnaceae		1		1	1			2	1				1		1	1

Dicotyledoneae.																
	I. BANANA.	II. — BOMA.	III. — MUTAPL.	IV. — CATAGAITES.	V. — STANLEY POOL.	VI. — KWANGD.	VII. — LAC (ÉPOULE) I.	VIII. — ÉQUATEUR.	IX. — BANGALA.	X. — UBANGI.	XI. — ARUWIMI.	XII. — UELE.	XIII. — PROV. ORIENTALE.	XIV. — RUIZI-KIVI.	XV. — KASAI.	XVI. — KATANGA.
Ampelidaceae	1	7		4	3	2	3	3	4	2	2	5	3		5	8
Sapindaceae		3		6	9	3	2	4	6	1	1	3	2		9	4
Anacardiaceae		6	2		8		1	2	1			1	1		2	4
Moringaceae		1														
Connaraceae		9		2	14	1	5	3	8	1		3	2		16	5
Leguminosaceae	17	71	18	19	199	39	22	97	38	8	20	27	28	7	106	130
Rosaceae	1	2		1	6	3		1	1		1		1	2	1	2
Crassulaceae				1	1			1	1						1	2
Droseraceae					2											
Rhizophoraceae	1	1			1	1		1								
Combretaceae	2	9	1	1	11	6	2	9	5		4		1		6	14
Myrtaceae	1	3		1	8	1	1	3	2		2	1	1		1	1
Melastomataceae	1	11	1	4	29	10	5	15	9		4	17	5		19	6
Lythraceae		2						1					1			
Onagrariaceae		3		2	5	3	2	2	3	1		1	1	1	2	
Samydeae		1		4	4			4	2		1				3	1
Turneraceae	1	1	1	1	1											1
Passifloraceae		3		1	8	4	4	6	5			1	1		9	
Cucurbitaceae	1	15	1	3	16	1	2	9	8	1	3	6	5		11	5
Begoniaceae		2				2	5	1			4	7	4		2	2
Cactaceae		1			1	1		1		1	1	1	1		1	
Ficoidaceae	2	1	1		5			1		1					1	1
Umbelliferaeae				1	3									1	1	4
Araliaceae														1		1
Rubiaceae	3	55	3	26	130	49	38	86	50	12	34	42	40	1	82	44
Dipsacaeae																2
Compositaceae	5	33	4	16	66	19	12	17	11	1	6	30	24	4	41	40
Campanulaceae		2		1	3	1		1				1				5
Ericaceae																1
Plumbaginaceae	1	1			1											1
Myrsinaceae							1	1				1				1
Sapotaceae		1			3	2	2	5	2	3	2				5	1
Ebenaceae								1				1				2
Oleaceae	1					1			1	1		2			1	3
Apocynaceae	4	22	1	8	55	26	21	61	24	9	23	33	15		54	12
Asclepiadaceae		5	2	5	36	11	3	4	3	1		3	7		12	21

Dicotyledoneae.	I. — BANANA.	II. — BOMA.	III. — MAYADI.	IV. — CATARACTES.	V. — STANLEY-POOL.	VI. — KWANGO.	VII. — LAC LÉOPOLD II.	VIII. — EQUATEUR.	IX. — BANGALA.	X. — UHANGI.	XI. — ARI WIMI.	XII. — TELE.	XIII. — PROV. ORIENTALE.	XIV. — RIZITI KIVU.	XV. — KASAI.	XVI. — KATANGA.
Loganiaceae	1	4	1		14	5	2	2	5		2	5	3		9	3
Geitaniaceae					10	3	1	3	2				2		3	7
Hydrophyllaceae				1												
Boraginaceae	1	3	2	1	4			1	2		1	2	1		1	6
Convolvulaceae	6	19	1	7	25	4	2	2	10	3		8	3		9	25
Solanaceae	1	12	2	5	10		5	13	5	2	2	6	5		12	5
Scrophulariaceae	3	9	3	3	22	8	1	3	5.		1	4	2		11	11
Lentibulariaceae		1			4	1		1							1	
Gesneraceae																1
Bigoniaceae		5	1	2	5	4		3	2	1	1	3	1		4	8
Pedaliaceae		1		1	2	2			3			3	2		4	2
Acanthaceae	2	18		10	42	11	2	12	15	3	4	9	11	4	15	52
Verbenaceae	2	9	2	3	20	7	3	6	3		1	5	3		16	15
Labiataceae	2	9	2	6	19	14	4	11	5	1	1	10	11	3	20	21
Nyctaginaceae	2	2		1	3	1		3								
Amarantaceae	6	8	1	8	3	3	2	6	7		1	3	5	3	7	8
Chenopodiaceae				1	1	1		1		1			4			1
Phytolaccaceae		1		1	3	1	2	2	3			1	1		1	1
Polygonaceae		3	1		6	2	2	6	1						2	2
Podostemaceae						2							1		2	
Cytinaceae																1
Aristolochiaceae		1			1							1			2	
Piperaceae		1			3	3	2	3	2		1	2	2		2	1
Myristicaceae		1			1			1			1					
Lauraceae	1		3		5											
Proteaceae					1										2	3
Thymelaeaceae					1	2		1					1		2	5
Leranthaceae	1	4		2	11	3	1	7	4	2	3	1			8	4
Santalaceae					1											
Balanophoraceae					1		1	1	1						1	
Euphorbiaceae	8	33	5	15	62	21	21	44	24	5	15	16	19	1	53	26
Urticaceae		17		5	36	4	10	17	8	2	8	11	11	1	23	10
Ceratophyllaceae					1			1							1	
	102	508	71	209	1133	359	226	609	379	73	198	328	277	41	731	647

Monocotyledoneae																
	I. — BAVANA.	II. — BOMA.	III. — MATUHI	IV. — CATACTES.	V. — STANLEY POOL.	VI. — KWANGU.	VII. — LAC LEOPOLD II	VIII. — EQUATEUR.	IX. — BANGALA	X. — UBRANGI	XI. — ARUWIMI	XII. — UELE	XIII. — PROV. ORIENTALE	XIV. — R. ZIZI K. VI	XV. — KASAI	XVI. — KATANGA.
Hydrocharitaceae					3							1				1
Burmanniaceae					2								1			
Orchidaceae	1	8	9	43	9	17	57	7	2	8	24	25	1	33	23	
Flagellariaceae	1	1	1			1	1									
Zingibetaceae		8	1	10	1	1	5	2	1		2	3		5	4	
Marantaceae		9		9	6	2	7	6	2	2	2			3	1	
Cannaceae		1		1	1	1	1	1			1	1	1	1		
Musaceae				1	2		1				1	1				
Haemodoraceae		1		1	1			1		1		2		1		
Iridaceae		3		2	4	3	1								10	
Amaryllidaceae		6		1	4	6	1	1		2		2	3	3	4	
Taccaceae				1	1							1		1		
Dioscoreaceae		2		2	11		2	3	4			3	3	2	5	
Liliaceae	2	8	1	11	20	10	4	9	6	2		3	5	20	20	
Pontederiaceae				1											1	
Nyctaginaceae							2					1			1	
Commelinaceae		13		7	30	6	4	6	8		4	3	7	16	8	
Palmaceae	1	4		5	2	1	7			1	3	2		6	3	
Pandanaceae		1		1												
Araceae		6		2	13	5	3	3	1		1	2	3		7	
Lemnaceae				2				1								
Alismaceae					1		1									
Eriocaulonaceae				2		1						1				
Cyperaceae	4	32	7	33	85	6	11	18	20		6	8	6	1	23	16
Graminaceae	13	40	7	41	80	10	22	19	22	8	2	4	15	9	32	19
	22	143	15	111	330	67	71	142	79	17	25	60	80	12	153	116
Gymnospermeae																
Gnetaceae		1			1	1	1	1							1	
Cycadaceae					1											
		1			2	1	1	1							1	
Dicotyledoneae	102	508	71	209	601	359	226	609	379	73	198	328	277	41	731	647
Monocotyledoneae	22	143	15	111	330	67	71	142	79	17	25	60	80	12	153	116
Gymnospermeae		1			2	1	1	1							1	
	124	652	86	320	1003	428	298	752	459	90	223	388	357	53	885	763

REPertoire DES NOMS VERNACULAIRES.

A		Bankase	173	Bobo	325, 330
Abakussi	122	Bankusale	637	Bobole	350
Abodo	331	Banzua	478	Bocca	342
Abutadjamba	334	Bao	173	Bocnambo	544
Acisa	308	Bapenogwala	334	Botoko	489
Ajoko setamba	331	Barakota	326, 33	Bofumbo	68
Adolimi	75	Bari	329	Bofumba	70
Afridi na hima	336	Basaka	149	Bojudjuma	443
Aguka	343	Basasanga	544	Boka	138
Ahangnila	329	Basesci	149	Boka-Napombo	268
Akarabeti	329, 330	Bati ke	500	Bokate	53
Akutsu-Aranba	334	Barshindji	335	Bokaie-Itende	56
Al'ine	135	Bavapanda	295	Bokar-Limpata	54
Andjolia	45	Bwamauri	501	Bokakate	279
Angbeni	53	Bekenge	72	Bokruku	135
Angwanga	329	Bekonge	72	Bokobele	523
Asangia	329	Beli	90	Bokoh	20, 99
Assureli	122	Belukonge	72	Bekongo-Bomponono	167
Autontongo	336	Bemba-Bemba	417	Bokunge	45
Averu	300	Benene	344	Bolaka	45
Aworo	637	Beti	397	Bojanga	479
B		Babilondo	203	Bole	329, 350
Babetet	329	Bienga	258	Bolengue-Moidi	417
Badjanbota	492	Bietji	339	Boli	351
Badjogo	331	Bikule	329	Bolico-Bolico	334
Bafu	90	Bikuri	329	Bolunda	53
Bafwamfwa	578	Bimba	337	Bolivo	247
Bafwamfwabaddi	637	Binga	443	Bolle	350
Bagayanga	227	Bingogatom	68	Boloko	45, 468, 529
Bagui	335	Binsonenlen	67	Bolombola	327, 328
Baisandeke	75	Bomban	329	Bolombolo	326
Baka	189	Riombio	328	Bolongo	45
Bakuta	52	Bounda Ipeba	457	Bolovo	577
Balatadi	559	Buto	305	Bolundu	337
Baloma	329, 334	Bustoka	617	Bolundu-Kete	329
Bamandia	431	Buti	309, 393	Bolundu-Mabe	347
Banda-Banda	182	Butopa	331	Bomanga	321
Bangui	562	Bitope	331	Bombah	176
Bangwa	45	Butuba	329	Bombari	176
		Boala	183	Bombo	314
		Boandou	258	Bombobolu	163
		Bobalabaneba	250	Bombwoke	350

F					
Filu	437	Ikoko	488	Kachukutu	631
Filulolo	2 38	Ikola	52	Kadi-Kuugu	427
Foutu	165	Ikonana	456	Kadjanga	329
Fulu-MBoa	331	Ikouga	293	Kaembe	331, 333
Fumgatata	155	Ikougolo	173	Kafasukile	479
Fumu	504	Ilaaga	556	Kafia	134
Fundiakima	330	Ilela	559	Kafoi	151
G					
Gadi	46	Ilikiwagurta	107	Kafoino	300
Galagale	28	Illuie	559	Kafulo	156
Galonga	171	Iombo	326	Kafungando	411
Gamenkuye	332	Iombola	327	Kafungu-Kakoma	174
Gaugale	171	Iotça	468	Kafuta	49
Ganga-Tibie	206	Iluembe	20	Kaia	332
Genia	264	Imbali	176	Kaido-Kom	206
Geto	467	Inga	327	Kaie	492
Giadidi	46	Inkoko	488	Kaiembe?	330
Gluka	352	Iufundu	31	Kaibo	452
Gofo	371	Iutomba	75	Kakabolo-Kampanga	378
Gomvonboza	143	Iutsimi	53	Kakasalla	484
Gonfe	196	Ipea	457	Kakiulu-Kindu	131
Guba-Gwela	481	Ireh	350	Kakissa-Kissa	199
Gubia	441	Isike	488	Kakobwoi-Kobwoi	472
Gudja-Muni	501	Isote	351	Kakoloka	486
Gula	163	Itadje	509	Kakungui	193
Gula-Gwedi	481	Itali	504	Kakunta-Puku	372
Gulumgu	551	Itatamba	109	Kalamaudu	395
Gulumu-Kumba	511	Itedji	509	Kalamato	481
Gungova	567	Ireka	331	Kaleala	210
Guugu-Bu-Dutu	326	Ito	463	Kalamba-Kaluma	621
Guzu	633	Itofi	333	Kalenbele	394
I					
Ibenge	391	Itombe	75	Kalemdu	140
Iboboro	328	Itutangali	505	Kalimbu	598
Ibongo	155, 297	J			
Icasagne	203	Jaba	288	Kuloja	614
Icota	62	Jada Samba	537	Kalolo	643
Iendu	203	Jakoi-Loko	257	Kalombo-Lombo	337
Ifambalankoce	498	K			
Ifuafua	24	Kabala	133	Kalanga-Louga	46
Ifuige	308	Kabale-Bale	324	Kaluangwe	306
Ignia	577	Kabanga	31	Kaluma	290
Ikaie	62, 206	Kabangui	562	Kaluma-Kalenda	109
Ikatabao	308	Kabaye	503	Kalumu-Kulu	30
Ikekeke	329	Kabonga	314	Kafundi-Kumi	14
Ikele	329	Kabonguele	461	Kalungu	343
Ikobuló	54	Kabuko-Pakana	492	Kamatutu	198
		Kabulu	332	Kambalubala	131
		Kabutumpa	357	Kambete	596
		Kabwebwa	641	Kambiru	35
		Kaceguengui	186	Kame-Nene	468
				Kamina	122
				Kamiombo	438
				Kampaki	32
				Kampanda panda	145
				Kampululu	241
				Kampumboi	285

Kamutofwa	389	Kausjapu	415	Kilonga	75
Kan	281	Kavenrou	49	Kilungu	45
Kananana	457	Kavungu-Vungu	15	Kimanabuka	486
Kandalupire	349	Kawsala	439	Kimbandji	644
Kanga-Nzo	493	Kayebule	411	Kiubanza	596, 646
Kanichi	439	Kayioba	643	Kinena	81
Kankomo	104	Kazau	155	Kinonga	301
Kanseke	559	Kazitanda	495	Kindana	143
Kansoki	636	Keaborina	279	Kindaudu	331, 332
Kansolo-solo	118	Kekansu	237	Kindinga	331
Kantu-lintulu	402	Kekoko	501	Kioug (fruit)	196
Kanzauga	318	Kela	326	Kinkandja	124
Kapekille	268	Kelekese	198	Kinkelela	261
Kapulumba	261	Keleketon	467	Kiakumi	54
Kapumpu	124	Kelela	330	Kiukwite	329
Kapumpu	627	Kelobo	147	Kiukoto	33
Karibululu	300	Kembaki	345	Kinongo	298
Karici	299	Kenge	551	Ki Nsangia	45
Karikete	459	Kengwalala	151	Kinseka	182
Kasagola	323	Kenia	309	Kinsel-le	453
Kasai	299	Keougo	52, 72	Kiomeome	309
Kasakala	198	Kesekemeka	514	Kioug	173
Kasakalla	30	Ketendolo	104	Kipauga	238
Kasakola	495	Keurwe	35	Kipangu	84
Kasa-Sanga	264	Kiamvu	502	Kipanua	478
Kasausa	30	Kiape	556	Kisanaba-Kwe-Kwe	179
Ka-seniague	125	Kibaka	144	Kisangama	105
Kashongo	29	Kibala	431	Kisani	37
Kasikamba	227	Kibano-Baugo	458	Kisania	37
Kasikesike	403	Kibembele	641	Kisi	412
Kasilu	274	Kibemlese	357	Kisiwegue	171
Kasjukamballa	402	Kibebele	601	Kisjima-wa-Gululu	156
Kasolo	48	Kibete-Kibete	265	Kisjinko	324
Kasonga-Kabasji	349	Kibimbia	165	Kisongwo	147
Kasonswe	135	Kiboga	56	Kisowa	380
Kasuku-Suku	298	Kibongi	551	Kitele	458
Kasukutu	644	Kibongo-Makungi	513	Kitefe	86
Kasungana	109	Kibubia	272	Kitjangulula	318
Katafumba	513	Kibusji	270	Kitjipi	148
Katali-tali	156	Kichilo-Kiabeto	394	Kitjipitjipi	148
Katanda	229	Kifauga-Fanga	301	Kitoudo	535
Katandi	574	Kifula-Buta	201	Kitotolo	174
Katatumba	293	Kifulimitjii	411	Kitoya-Kamono	393
Katelo	312	Kifumbi	174	Kitwangele	412
Katinga	452	Kikebe-Beteli	238	Kiungu	72
Katingeko	459	Kikiki	258	Kiupe	280
Katingwe	391	Kikoba-Koba	411	Kizango-Banza	391
Katisa	267	Kikuugu	497	Kloro	320
Katolle-Tolle	484	Kilama	71	Kmeka	502
Katongulu	572	Kilanga	258	Kedolemba	332
Katslongo	29	Kilao-Lao	508	Kofu	311
Katundula	442, 452	Kilengu-Longue	598	Koito	296
Kausale	406	Kilimboi	344	Kokoko	194

Kokoloko	517	Lekambe	601	Luba-Langwo	498
Kokolola	317	Lenalema	310	Lubeso	175
Kokotwa	641	Lembause	64.	Lubula-kutu	109
Kolauia-Lania	123	Lembila	239	Lubulukutu	102
Kole	329	Lembolo-Diango	158	Lufuka	437
Kolekole	511	Lendja	108	Lukata	331
Kolembe-Lembe	312	Lébungji	494	Lukondu-N'Bo	199
Kolokasi	459	Lago	61	Lukonga	72
Koloko	192	Lakilo	491	Lukosa	56, 489
Kolokoso	308	Lan boso	176	Lukono	508
Kolokote	496	Lamoko	231	Lukunatchima	330
Kolongo	559	Limu	350	Lukunga-Moka	173
Kolumbwa	632	Lingia-Rabasha	644	Lukusa	489
Kombodi	366	Lisuki	329	Lulul'alumba	32
Komboi	152	Lol' mbo	495	Lumpundu	341
Komolobilo	130	Lobuma	353	Lunda	331, 583
Kondoku	210	Lobwe	464	Lundula	441
Kongo	545	Loembe-Combe	391	lungue	461
Konko-k'oso	459	Logoso	171	Lunsekwe	644
Kopunga-Umba	186	Lofamdjola	482	Lupembe	325
Kosa	489	Lofandjii-Joku	220	Lupipt	162
Kot Koti	698	Logne	442	Lurakasa	307
Koto	591	Lokaka	118	Lusada	28
Koto-Koto	250	Lokalia	330	Lusaka	511
Kreinda-Naneceka	162	Lokama-Kama	572	Lusamba-Samba	512
Kubilonga	384	Lokasa	298	Luseke	622
Kububa	242	Lokeke	63	Lusemgue	498
Kuia	508	Lokili	466	Lusepo	536
Kukuankuko	4-6	Lokonge	72	Lusole	62
kukuma-Suzi	495	Lokongo	546	Lusube	481
Kuja-kula	193	Lokopo	434	Lusu-Lusulo	443
Kuli-kuli	193	Lokuku	468	Luvanki	133
Kulutu	552	Lokwanta	31	Luvungi-Vungi	556
Kumu	299	Loledja	352	Luzizi	387
Kupdjialealey	179	Lolelengi	638	Lwaga	149
Kusa-Kusa	469	Lolika-Ikolo	337	Lweo	636
Kusoi Saupuku	423	Loliki	334		
Kutumbulu	120	Lolmissa	305	M	
Kwakwa	37	Lolo	23, 94	Mababalo	338
Kwanta	205	Lolokeridamba	174	Mabale	491
Kwantala	175	Lololo	312	Mabingobingo	637
Kwisa	521	Londjende	491	Mabeki	335
Kwoune	596	Lonengue	412	Maole	511
		Lonenge	36	Ma'olela	270
L		Lopangni-panga	133	Mabunda	28
Lalo	84	Lopundja	342	Machila-Ambacha	139
Lamata	791	Lopundu	340, 342	Macumba	393
Lebwa	280	Lossle	210	Macumbu-Macumbu	300
Leco	378	Lotiti	72	Madelenba	27
Lefide	312	Lotoloto	193	Madhaka	335
Lehani	442	Lotoubo	75	Madibo	583
		Luangane	242		
		Luanzu	107		

Madimbi	334	Masisi	334	Moengue	339
Madungu	328	Masoha	491	Mogauza	106
Mafumbo	39	Massongolo	583	Mohala	28
Maguieri	79	Matata	579	Moibanganga	44
Magwadabirada	241	Matete	546, 637	Moijaenka	227
Maieie	478	Matjitji	561	Moiagele	21
Majampa	240	Matofe-Ampumba	326	Mojon	331
Makaie	56	Matofe-Mongo	329	Mokasi	223
Makalanga	331	Matoli	328, 329, 331	Moke-keri	62
Makolle	64	Matopi	331	Mokengereke	487
Makolokosa	17	Matosa	312	Mokengue	467
Makongi	72	Matotolo	481	Mokiudu	258
Makonkomo	223	Matudulu	228	Moko	60
Makotunkotu	27	Matulu	638	Mokoli	18
Makuba	26	Matwi-Kabula	116	Mokolokaka	483
Makuku	329	Maucundra	148	Mokoluko	501
Makuntju	342	Mautuntu	307	Mokongi	72
Malalenko	260	Maybole	412	Mokonki	72
Malambo	604	M'Banza	135	Mokoyole	491
Malari	283	M'ara	340	Mokulo	203
Malebumki	306	Mbatieke	500	Mokulu	203
Malebunukai	434	M'Bitti	333	Mokulumbu	203
Malemanso	328	M'Bole	351	Mokwa	327
Malola	329	Mbota	131	Mokwaa	331
Malole	383	Mboyo	90	Moleama	293
Malolela	270	M'Butu	136	Molenda	54, 412
Malombo	325	Mcaca	128	Molobiola	75
Malouga	571	Mdungu	229	Moloko	136
Malucu	240	Mecece	105	Moloma	331
Malumba	443	Metete	645	Molonga	295
Malumbo	331	Mfufu	495	Molumba	419
Malumboi	154	Mfumu	495	Molundo-polo	156
Mambele-Bela	596	Midiadi	544	Mombate	409
Mambulinkanka	71	Midilla-Kuha	30	Mombatieke	500
Mamonpete	227	Mioba	231	Mombina	231
Mampombo	190	Mitesa	577	Mombinxo	204
Mampoto	334	Mititi	495	Mombo-Koma	196
Mauakasa	307	Mitoko	136	Momboka	293
Manduli-Duli	295	Mkando	23	Mombulu	83
Manenobe	249	Moala	242	Momfimi	53
Mangasa	155	Moba	389	Momomo	337
Mangue	627	Mobala	183, 274	Mompoco	204
Manicolo	248	Mobanga	29	Mompompolo	258
Mansongo	583	Mobole	351	Momponpo	325
Mantiri	462	Moboli	351	Monopusu	257
Manzenga	334	Mobuli	350	Monabata	311
Mapalo-Mopala	60	Mochia	69	Monbatza	70
Mapeleko	333	Mochochia	69	Moncagui	393
Mapolo	395	Mociugate	258	Mondeka	491
Mapunda	191	Moçoçole	443	Mondembo	350
Mariguongo	350, 351	Moçoçolo	443	Mondondono	243
Masindu	334	Mocombe	458	Mondonga	330
Masinja	334	Modi-Katala	57	Mondongo (t)	326, 331

Mondunga	350	Mpusa	325, 328	Munkwasa	221
Mondungu	511	Mputo	223	Muntangia	147
Monemena	383	Msoko	149	Muntoni	45
Monganagama	91	Mtinku	250	Muntusu	510
Mongaugila	24	Mubalakula	161	Mupakuma	158
Mongombe	343	Mubanga	169	Mupapa	178
Mongongome	489	Mubinga-Kisvoo	31	Mupepe	350
Mongongongo	352	Mu-Bumbu	114	Mupopo	397
Monie-cama	83	Mubuta	346	Mupundu	191
Monkeka	314	Mudjian-Bubu	593	Musabefa	338
Monkiso	488	Muemie	328	Musadi	480
Monkoso	248	Muesa	187	Musafoi	86
Monkukono	223	Mufusa	203	Musaisa	30
Monkwe	514	Mufishu	17	Musaka	28
Monondongo	330	Mufula	269	Musali	350
Monsingisa	491	Mufutu	436	Musamba	177
Montende	497	Muilu	347	Musanga	27
Monteudo	497	Muisambague	462	Musanga-Saya	48
Montone	350	Mujikinsi	92	Musasa	423
Montoni	45	Mukasu	437	Musase	188
Montusu	510	Mukoko	58	Musenjesji	172
Montutu	462	Mukonki	71	Musenge	463
Mouwe-Monwe	122	Mukoufi	259	Museuse	491
Mooti	175	Mukosobola	562	Mushie-Tjifufia	484
Mopolambamba	250	Muku	156	Mushi Brook	583
Mopukabuko	266	Mukulia	242	Musokolobe	485
Mosafasala	484	Mukutu	165, 179	Musombele	315
Mosafata	301	Mukwa	21	Musonga-Souga	453
Mosale	350	Mukwakasa	268	Musongwa	264
Mosamba	489	Mulama	199	Musula-Kurri	400
Mosampo	31	Mulanga	169	Musulidi	410
Mosanganda	325	Mulembe	347	Musum	410
Mosapa	29	Mulembo	161	Musumbo	326
Mosasala	351	Mulemdu	412	Musuganene	482
Mosasanga	513	Muleogroo	426	Mutabu	62
Mosatwa	29	Mulinba-Limba	339	Mutama	366
Mosele	337	Mulumbu	195	Mutanea-Gommo	203
Mosere	337	Mulolo	85	Mutechia	630
Moshiushieli	477	Mulomba	361	Mutentia	638
Mosia	331	Mulongwe	537	Mutesa	143
Mosusulu	353	Mulotte	417	Mutobi-Tubi	552
Motalaci	231	Mululundja	295	Mutondo	164
Motantuu	206	Mufumbi-Lumba	484	Mutuma	201
Motepa	336	Munbu	393	Mutumbu-Tumbu	159
Motoaton	210	Mumbumu	331	Mutungwee	553
Motofa	338	Mundatu	64	Mututa	172
Moto-Moto	644	Muudembo	17	Mutziauvo	313
Motukunkao	496	Munga-Gu	322	Mwaba	32
Mpaua	92	Muninga-Sendive	325	M'wanda-M'wanda	70
Mpasa	149	Munkago	146	Mwandaudone	143
Mpoi	473	Munkaman	373	Mwofi	164
M'Ponbu	387	Munkanakaca	91	Mziuia	264
Mpoto	223	Munkollo-Kollo	373		

N	O		
Nabo	330	Ochio	54
Nagongami	340	Okakumbu	223
Nangwee	61	Okango	330
Naondongo (l).	326	Okeba	337
N'Bumbu	114	Okonga	329
Neohé-Akondo	428	Olembo	353
Ncongo	514	Olole	330
Ndala	566	Oloma	330
N'Dale	169	Olva	331
Ndanan	57	Omokembulo	335
N'danana	57	Omongemongo	330
Ndevre	327	Ompampolo	250
Ndzimi	53	Onene	505
Né	196	Ongukie	183
Nea	54	Oshampongo	251
Ngando	349	Osindja	334
Ngomo	632	Osuma	350, 351
Ngotto	195	Otoankima	325
N'Gula	163	Otolo	589
N'Gulu-Maza	239	Otungu	337
Niauga	621	Otutu	229
Niazi	621	Ouban-Banguée	186
Niéna	183	Ouku	263
Nikanda	329	Oyangasudi	336
Nikonki	72	Oyongasolo	336
Nikuminka	419		
Nimengu	204	P	
Ninga	208	Palenkina	337
Niniki	183	Pauza	183
Niyaro	97	Panza-za-uenga	73
N'Kongo	73	Pata-Pata	235
Nkosa	489	Pece	149
Nkoza	489	Pi	75
N'Kula	163	Pingelema	580
Nkusu	542	Puukekokwa	293
Nkwakuku	62	Pobiru	327
Nla Ngombe	629	Poces	148
Nomaua-Mana	456	Pomboro	186
Nomlo-Nomlo	468	Pombura	497
Nsamba	329	Pompo	190
Nscanuma	254	Pongia	220
N'Sombala	387	Pongolowe	387
Nsongia	45	Ponguendole	326
Nteuteke	491	Pongundeli	325
Ntiugu	279	Ponluka	458
Nyangwe	135	Pophangue	133
Nzamingo	629	Popivillo	577
Nzilla	562	Puku-puku	104
Nzizi	387	Puluka	488
		Punga	72
		Pussa	53
		Putu-Puta	193
		Putu	440
		R	
		Rakaba	460
		Rongi	481
		Ruisa	542
		S	
		Sachi	242
		Safoi	365
		Sagna	241
		Saja	241
		Sakagna	510
		Sakala	241
		Sakela-Gombo	188
		Sakonnida	323
		Samba	329, 646
		Samba-Bulubu	319
		Sambabala	632
		Sanda	505, 508
		Sanga	344
		Sangala	401
		Sasa	45
		Satu-satu	67
		Sekegua	510
		Sekene	510
		Sekeuia	510
		Selufo	24
		Seseke	488
		Sete	55
		Setete	331
		Shibolo	23
		Shikoka	425
		Shikololo	537
		Sibu	71
		Siki	279
		Sida	644
		Singala-Vunxia	634
		Singa-Singa	578
		Sjimbadala	572
		Sjinko	266
		Sjolongo	330
		Skaie	62
		Smaebuko	486
		Sobulolo	92
		Sokomni	308
		Sola	633
		Solemesji	133

Sonanaka	184	Tjikundu-Kundu	151	Vuda Buadi	83
Songa	326	Tjucja	161	Vuku	240
Songania	531	Tobelengue	308	Vuma	461
Songo-Songo	453, 637	Toki	306	Vunga	493
Sonko	331, 333	Tokuda	333	Vungui	305
Sonkuu	509	Tomba Tomba	288	Vuuma	574
Sonda	143	Tondefere	350		
Soro	61	Tondo-iwa-Niamba	488	W	
Sosoi-Sosoi	432	Tonopola	632	Walaralapira	325, 327
Sungu Sungu	632	Tori	463	Wambala	32
Susu	337	Towagna	329	Wandu	157
Suza	114	Tsana	559	Wangate	281
T		Tsentse	337	Washeuse Ioshoto	588
Taite	196	Tshamtshakadi	413	Wasulu	631
Takataka	53	Tshibobobo	325	Weloafu	333
Tambo	250	Tshikolokose	477	Wembe	351
Tambwe	617	Tshikwakwa	37	Wenge	496
Tangana	457	Tshiichele	335	Wii	489
Taulon	175	Tsinkoliba	267	Wuwoko	240
Tchunгу	279	Tua-tua	266		
Tchunгу-Tchunгу	173	Tumafumba	80	Y	
Teka	387	Tumko	367	Yama-Yumbi	481
Teuda-Kwari	410	Tumu	45	Yambakulu	495
Tensi	146	Tunga	148	Yambokulu	493
Teutze	325	Tuyaie	288	Yambola	179
Tera-Elungu	62	U		Yambenkolo	143
Tesi	471	Ude	489	Yam-Yauve	631
Teti-Teti	575	Uegna	572	Yumba	412
Teuze	122	Ukambulu	70		
Thibulu	337	Undulu	331	Z	
Tidi-Tidi	216			Zaira	71
Tintamoi	524	V		Zamba	331
Titchi	52	Vanda-Makolo	104	Zelo	616
Tjabilonda	107, 162	Vita-kabela	477	Zleni	412
Tjama-Zebele	366	Vombola	163	Zoko	328
Tjikundi	315				

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES, DES GENRES, DES ESPÈCES

ET DE LEURS SYNONYMES

[Les synonymes sont imprimés en italiques].

A

- Abildgaardia monostachya* Vahl. 617.
- Abrus** L. 145.
canescens Welb. 145.
precatorius L. 146.
pulchellus Wall. 146.
 — v. *latifoliolatus* D. W. 146.
- Abutilon** Gaertn. 50.
angulatum Must. 50.
Cabrae D. W. et T. D. 51.
Eiteldeanum D. W. et T. D. 51.
indicum Sweet. 51.
intermedium Hochst. 51.
laziflorum G. et P. 50.
zanzibaricum Boj. 51.
- Acacia** W. 186.
ataxacantha DC. 186.
Buchanani Harms. 186.
Dewevrei D. W. et T. D. 186.
Farnesiana W. 186.
Lahai St. 186.
Lebbek W. 188.
Lujaei D. W. et T. D. 186.
pennata W. 187.
Seyal Del. 187.
 — v. *Lesrauwaei* D. W. 187.
 — v. *Sereti* D. W. 187.
Siberiana DC. 187.
tortilis Hayne. 187.
- Acalypha** L. 492.
brachystachya Hornem. 492.
ciliata Vahl. 493.
Dewevrei Par. 492.
gemina Spreng. 493.
haplostyla Pac. 492
 — v. *longifolia* D. W. 492.
indica L. 492.
- Acalypha**
ornata A. Rich. 493.
paniculata Miq. 493.
polymorpha M.-A. 493.
sessilis Poir. 493.
Vahlhana M.-A. 493.
- ACANTHACEAE**, 413.
- Acanthopale** Cl. 424.
pubescens Cl. 424.
- Acanthopsis** Nees, 424.
horrida Nees, 424.
- Acanthus** L. 423.
arboreus Forsh. 423.
 — v. *pubescens* T. Thom. 423.
caudatus Lindau. 424
mayaceanus Buett. 423.
 — v. *angustifolius* D. W. 423.
montanus T. And. 424.
Villaeus D. W. 424.
- Achimenes** *sesamoides* Vahl, 399.
- Achyranthes** L. 459.
angustifolia Bth. 459.
aspera L. 459.
corymbosa L. 42.
Heudelotii Moq. 460.
lanata L. 459.
lappa-ea L. 458.
prostrata L. 458.
repens L. 460.
rubro-lutea Loopr. 459.
- Achyrocline** Less. 303.
batocana O. et H. 303.
- Acioa** Willd. 191.
Buchneri Engl. 191.
Dewevrei D. W. et T. D. 191.
Gilletii D. W. 191.
Sereti D. W. 191.
Vanhouttei D. W. 191.
- Acridocarpus** G. et P. 77.
corymbosus H. f. 77.
- Acridocarpus**
gunneensis Juss. 77.
katangensis D. W. 77.
Laurentii D. W. 77.
longifolius H. f. 77.
rudis D. W. et T. D. 77.
Smeathmauni G. et P. 77.
- Acridius** *Leopoldianus* Cl. 594.
madagascariensis Ridl. 594.
- Acrocephalus** Bth. 444.
campicola Briq. 444.
coeruleus Oliv. 445.
 — v. *genuinus* Briq. 445.
 — v. *trichosoma* Briq. 445.
cylindraceus Oliv. 445.
Debeerstii Briq. 445.
Descampsii Briq. 445.
Dewevrei Briq. 445.
divaricatus Briq. 445.
elongatus Briq. 445.
Hensii Briq. 445.
iododeris Briq. 446.
Laurentii Briq. 446.
Masuanus Briq. 446.
paniculatus Briq. 446.
Poggeanus Briq. 446.
- Acrolobus** *parvifolius* Kl. 96.
Schoenleinii Kl. 96.
- Acrospha** *Welb.* 567.
asphodeloides Welb. 567.
 — v. *Laurentii* D. W. 567.
 — v. *variegata* D. W. 568.
- Adansonia** L. 59.
digitata L. 59.
 — v. *congolensis* A. Chev. 59.
digitata Auct. 59.
sulcata A. Chev. 59.

- Adenanthera** *Royen*, 181.
Gilletii *D. W.* 184.
- Adenia** *Forsk.* 224.
lobata *Engl.* 224.
 — *v. elegans* *Hiern*, 224.
panduriformis *Engl.* 224.
Schweinfurthii *Engl.* 224.
venenata *Forsk.* 224.
- Adenolichos** *Harms*, 154.
grandifoliolatus *D. W.* 154.
Harmsianus *D. W.* 154.
punctatus *Harms*, 154.
- Adenopus** *Bth.* 226.
breviflorus *Bth.* 226.
- Adenostemma** *Forst.* 297.
viscosum *Forst.* 297.
- Adhatoda** *Anselliana* *Nees*, 429.
Betonica *Nees*, 431.
Rostellaria *Nees*, 430.
- Aeolanthus** *Mart.* 448.
adenotrichus *Guerke*, 448, 655.
Buchnerianus *Brig.* 448.
petasatus *Brig.* 449.
Poggei *Guerke*, 449.
Pritzwitzianus *Guerke*, 449.
- Aeranthus** *distichus* *R. f.* 532.
erythropollinius *R. f.* 532.
xanthopollinius *R. f.* 532.
- Aerua** *Forsk.* 459.
lanata *Juss.* 459.
- Aeschynomene** *L.* 139.
aspera *L.* 139.
brachycarpa *Harms*, 139.
Butayi *D. W.* 139.
Deweyrei *D. W.* et *T. D.* 139.
Elaphroxylon *Taub.* 138.
Gilletii *D. W.* 139.
glandulosa *D. W.* 139.
indica *L.* 139.
katangensis *D. W.* 139.
lateritia *Harms*, 139.
Schumperi *Hochst.* 140.
Schlechteri *Harms*, 140.
sensitiva *Sto.* 140.
sensitiva *P. B.* 139.
uniflora *E. Mey.* 140.
- Aethelena** *imbricatum* *R. Br.* 419.
- Aframomum** *K. Sch.* 540.
albo-violaceum *K. Sch.* 540.
colosseum *K. Sch.* 540.
Danielii *K. Sch.* 540.
- Aframomum**
granum-paradisi *K. Sch.* 540.
latifolium *K. Sch.* 541.
Laurentii *K. Sch.* 541.
luteo album *K. Sch.* 540.
Maslianum *K. Sch.* 541.
Melaguetta *K. Sch.* 541.
polyanthum *K. Sch.* 542.
sanguineum *K. Sch.* 541.
scepterum *K. Sch.* 542.
- Afzelia** *Sm.* 177.
africana *Sm.* 177.
cuauzensis *Webb.* 178.
- Agathisanthemum** *Bojeri* *Kl.* 244.
globosum *Kl.* 246.
- Agelaea** *Soland.* 117.
Demensii *D. W.* et *T. D.* 117.
Deweyrei *D. W.* et *T. D.* 117.
Duchesnei *D. W.* et *T. D.* 117.
nitida *Soland.* 117.
obliqua *Bth.* 117, 653.
phaseolifolia *Gilg.* 117, 653.
Poggeana *Gilg.* 117.
rubiginosa *Gilg.* 117.
Schweinfurthii *Gilg.* 117.
- Ageratum** *L.* 298.
conyzoides *L.* 298.
- Agrostis** *capensis* *W.* 642.
- Alafia** *Thou.* 351.
Benthami *Stapf.* 351.
caudata *Stapf.* 351.
cuneata *Stapf.* 352.
gracilis *Stapf.* 351.
lucida *Stapf.* 351.
major *Stapf.* 352.
reticulata *K. Sch.* 352.
- Albizzia** *Duraz.* 187.
altissima *Il. f.* 189.
Brownei *Oliv.* 187.
ealaensis *D. W.* 187.
fastigiata *Oliv.* 188.
intermedia *D. W.* et *T. D.* 188.
katangensis *D. W.* 188.
latifolia *Boiv.* 188.
Laurentii *D. W.* 188.
Lebbeek *Bth.* 188.
versicolor *Webb.* 188.
- Albuca** *L.* 569.
augolensis *Webb.* 569.
 — *v. grandiflora* *D. W.* 570.
Gentilii *D. W.* 570.
Gilletii *D. W.* 570.
katangensis *D. W.* 570.
Laurentii *D. W.* 570.
variegata *D. W.* 570.
- Alchornea** *Sto.* 494.
cordata *Bth.* 494.
cordifolia *M.-A.* 494, 656.
- Alchornea**
floribunda *M.-A.* 494
hirtella *Bth.* 494.
yambuyanensis *D. W.* 494.
- Alcitra** *indica* *Bth.* 401.
- Alcitra fragrans** *L.* 565.
guineensis *Jacq.* 551.
- Alibertia** *edulis* *A. Rich.* 256.
Alisma humilis *Kth.* 593.
- ALISMACEAE**, 593.
- Allamanda** *L.* 340.
Aubletii *Pohl.* 341.
catartica *L.* 340.
Schottii *Hook.* 341.
- Allanblackia** *Oliv.* 46
floribunda *Oliv.* 46.
- Allium** *L.* 569.
angolense *Bth.* 569.
- Alliophylus** *L.* 110
africanus *P. B.* 110, 652.
congolans *Gilg.* 111.
leptocaulos *Rdlk.* 111.
longipetiolatus *Gilg.* 111.
macrobotrys *Gilg.* 111.
Schweinfurthii *Gilg.* 111.
Welwitschii *Gilg.* 652.
- Aloe** *L.* 564.
congolensis *D. W.* et *T. D.* 561.
venosus *Engl.* 564.
- Alsine prostrata** *Forsk.* 41.
- Alsodeia** *Thou.* 34.
brachypetalata *Turez.* 34.
congensis *Th.* et *Hél.* *Dur.* 34.
dentata *P. B.* 34.
Deweyrei *Th.* et *Hél.* *Dur.* 34.
Dupuisii *Th.* et *Hél.* *Dur.* 34.
Engleriana *D. W.* et *T. D.* 34.
ilicifolia *Webb.* 651.
Poggei *Th.* et *Hél.* *Dur.* 35, 651.
viscosa *Engl.* 654.
Welwitschii *Oliv.* 35.
- Alsodeiopsis** *Oliv.* 99.
Oddou *D. W.* 99.
Poggei *Engl.* 99, 652.
- Alistonia** *R. Br.* 341.
congensis *Engl.* 341.
Gilletii *D. W.* 341.
 — *v. Laurentii* *D. W.* 341.
scholaris *A. Chev.* 341.
viscosa *Engl.* 654.
- Alternanthera** *Forsk.* 460.
Achyrantha *R. Br.* 460.
echinata *Sm.* 460.
maritima *St.-Hil.* 460.
repens *St.* 460.
sessilis *R. Br.* 460.

- Alvesia** *Weber*. 450.
bachinioides *Welw.* 175.
rosmarinifolia *Weber*. 450.
- Alysicarpus** *Neske*. 145.
Harmeni *Schw.* 145.
rugosus *DC.* 145.
vaginalis *DC.* 145.
- Amaralia** *Walt.* 262.
bigoniaciflora *Welw.* 262.
calycina *K. Sch.* 262.
- AMARANTACEAE**. 156.
- Amarantus** *L.* 457.
caudatus *L.* 457.
paniculatus *L.* 457.
speciosus *Simms*. 457.
spinosus *L.* 457.
viridis *L.* 458.
- AMARYLLIDACEAE**. 551.
- Amaryllis** *disticha* *L. f.* 557.
ornata *Ker.* 556.
zylauca *L.* 556.
- Amerimonon** *Engstr. & Phyll.*
lum *Jacq.* 163.
macrosperrum *O. K.* 162.
- Ammannia** *Hust.* 217.
aegyptiaca *W.* 217.
auriculata *W.* 217.
multiflora *Roeb.* 217.
salicifolia *Muti.* 217.
senegalensis *Lam.* 217.
 — *v. auriculata* *Hieru.* 217.
 — *v. multiflora* *Hieru.* 217.
verticillata *Lam.* 217.
- Amonium** *albo-violaceum* *Röll.* 540.
angustifolium *Auct.* 540.
Daniellii *H. f.* 540.
gronium-parvifolii *L.* 541.
latifolium *Afel.* 541.
Laurentii *D. W. et T. D.* 541.
luteo-album *K. Sch.* 540.
Masaniunum *D. W. et T. D.* 541.
Melapeta *Rosc.* 541.
polyanthum *K. Sch.* 542.
sanguineum *K. Sch.* 541.
sceptrum *Ohw. et Haub.* 542.
Zingiber *L.* 542.
- Amorphophallus** *Eichleri* *H. f.* 539.
Leopoldianus *N. E. Br.* 539, 657.
Teuszii *N. E. Br.* 539.
- AMPELIDACEAE**. 101.
- Ampelocissus** *Pl.* 104.
abysinnica *Pl.* 104.
- Ampelocissus**
angolensis *Pl.* 104.
 — *v. congoensis* *Pl.* 105.
calophylla *Gilg.* 105, 652.
Chaetium *Pl.* 105, 652.
- Amphibtemma** *Naud.* 213.
acaule *Cogn.* 213.
chatum *Cogn.* 213.
setosum *H. f.* 213.
Wildenaniaum *Cogn.* 213.
- ANACARDIACEAE**. 113.
- Anacardium** *Roth* 113.
occidentale *L.* 113.
- Ananas** *Adans.* 551.
sativus *Schult. f.* 551.
- Anaphreoson** *abyssinicum* *Hochst.* 116.
 — *v. laevolat* *in Engl.* 116.
 — *v. latifolium* *Engl.* 116.
pulcherrimum *Schw.* 116.
- Anaethrosyne** *cordata* *Kl.* 113.
- Anatherum** *muricatum* *P. B.* 627.
- Anchoinanus** *Schott.* 589.
giganteus *Engl.* 589.
- Ancistrochilus** *Rolfe.* 56.
Thomsonianus *Rolfe.* 516.
 — *v. Gentili* *D. W.* 517.
- Ancistraptyllon** *secundiflorum* *M. et W.* 584.
- Ancylanthus** *Desf.* 271.
uliginosus *Weber* 271.
- Andropogon** *L.* 621.
Azelianus *Rendle.* 624.
appendiculatus *Nees.* 624.
 — *v. genuinus* *Hack.* 624.
apricus *Trin.* 624.
 — *v. africanus* *Hack.* 624.
bipennatus *Hack.* 624.
bracteatus *W.* 621.
Brazzavie *F. v. Nieh.* 624.
brevifolius *Sw.* 624.
contortus *L.* 624.
 — *v. genuinus* *Hack.* 624.
 — *subv. typicus* *Hack.* 625.
densiflorus *St.* 626.
dipandrus *Hack.* 625.
distachyus *L.* 625.
familiaris *St.* 625.
finitimus *Hochst.* 625.
halpensis *Boott.* 627.
intermedius *R. Br.* 625.
- Andropogon**
intermedius *v. punctatus* *Hack.* 625.
 — *subv. glaber* *Hack.* 625.
Locomtei *Franch.* 625.
muricatus *R. Br.* 627.
nigriticus *Rth.* 627.
Schimperi *Hochst.* 626.
Schoenanthus *L.* 626.
 — *subsp. densiflorus* *Hack.* 626.
Sorghum *Boott.* 626.
 — *v. effusus* *Hack.* 626.
 — *v. halpensis* *Hack.* 626.
squarrosus *L. f.* 627.
 — *v. genuinus* *Hack.* 627.
 — *v. nigriticus* *Hack.* 627.
squarrosus *L. f.* 627.
- Anilema** *R. Br.* 579.
aequinoctiale *Kth.* 579.
africanum *P. B.* 582.
beniense *Kth.* 579.
Lujaii *D. W. et T. D.* 579.
ovato-oblongum *P. B.* 580.
pedunculatum *L.* 580.
viridare *A. Rich.* 583.
Schwenfurthii *L.* 580.
secundum *Wight.* 580.
sinicum *Ldl.* 580.
- Angraecum** *Thou.* 526.
Althoffii *Krzel.* 580.
apiculatum *H.* 527.
Arnoldianum *D. W.* 526.
ashwinense *Ldl.* 524.
bilobatum *D. W.* 526.
bilobum *Ldl.* 526.
capitatum *Ldl.* 529.
caudatum *Ldl.* 529.
Chaillanum *H. f.* 529.
crinale *D. W.* 527.
distichum *Ldl.* 532.
Gentili *D. W.* 527.
ichneumonaeum *Ldl.* 530.
imbriatum *Ldl.* 527.
infundibulare *Ldl.* 532.
Kindianum *D. W.* 527.
kondense *D. W.* 527.
Laurentii *D. W.* 527.
lepidotum *Rehb. f.* 527.
Lujaii *D. W.* 528.
ovalifolium *D. W.* 528.
pellucidum *Ldl.* 530.
Pyraeum *D. W.* 528, 656.
scandens *Schltz.* 528.
 — *v. longifolium* *D. W.* 528.
stipulatum *D. W.* 528.
subulatum *Ldl.* 531.
Verdehni *D. W.* 528.
viridescens *D. W.* 528.

- Angraecum**
zigzag D. W. 528.
- Angylocalyx** Taub. 168
ramiflorus Taub. 168.
Schumannianus Harms.
169.
Vermeulenii D. W. 169.
- Anil capitata** O. K. 127.
endecaphylla O. K. 128.
hirsuta O. K. 129.
procera O. K. 130.
- Aniseia** Choisy, 381.
martiniensis Choisy,
381.
uniflora Choisy, 381.
- Anisochilus** Wall. 450.
africanus Bak. 450.
Engleri Briq. 451.
- Anisopappus** H. et A.
305.
africanus O. et H. 305.
- Anisophyllea** R. Br. 194.
laurina R. Br. 194.
Poggei Engl. 194.
- Anisophyllum** *laurinum*
R. Br. 194.
- Anona** L. 23.
latifolia Scott-Elliott, 18.
Laurentii Engl. et Diels,
19.
Mannii Oliv. 19.
Myristica Gaertn. 24.
senegalensis Pers. 23
— v. *cuneata* Pers. 23.
- ANONACEAE, 1
- Anonidium** Engl. et Diels,
18.
Laurentii Engl. et Diels,
18.
Mannii Engl. et Diels, 19.
- Ansellia** Ldl. 523.
africana Ldl. 523.
congoensis Rodig. 523.
- Anthephora** Schreb. 628.
cristata Hack. 628.
elegans Schreb. 628.
— v. *africana* Pilger, 628.
— v. *cristata* Doell, 628.
elegans T. D. et Sch. 628.
elongata D. W. 628.
- Anthericum** L. 568.
asphodeloides L. 568.
congolense D. W. et T. D.
568.
Laurentii D. W. 568.
macrophyllum A. Rich.
568.
sphacelatum Bak. 568.
- Antherotoma** H. f. 208.
Naudinii H. f. 208.
- Anthistiria** *barbata* Desf.
627.
ciliata L. f. 627.
- Anthocleista** Afzel. 369.
Baertsiiana D. W. et T. D.
369.
- Anthocleista**
Buchneri Gilg. 369.
inermis Engl. 370.
innocua Fingl. 370.
Laurentii D. W. 370.
Liebrechtsiana D. W. et
T. D. 370.
nobilis G. Don. 369.
Schweinfurthii Gilg,
370.
squamata D. W. et T. D.
370.
Vogelii Pl. 370.
- Antholyza** L. 553.
Cabrae D. W. 553.
Descampsii D. W. 553.
Gilletii D. W. 554.
labiata Paz. 554.
- Antidesma** L. 484.
laciniatum M.-A. 484
membranaceum M.-A.
484.
nerosum D. W. 484.
Schweinfurthii Paz,
484.
venosum E. Mey. 484,
655
— f. *glabrescens* D. W.
484.
- Anubias** Schott. 591.
affinis D. W. 591.
Afzelii D. W. et T. D.
591.
congolensis N. E. Br. 591.
Engleri D. W. 591.
Gilletii D. W. 591.
hastata Engl. 591.
Hautlevilleana D. W.
591.
heterophylla N. E. Br.
591.
- Aphanostylis** *exserrens*
Pierre, 333.
laxiflora Pierre, 332.
mammosa Pierre, v. *cras-*
sifolia Pierre, 330.
— v. *mucronata* Pierre,
330.
Mannii Pierre, 333.
robusta Pierre, 330.
- APOCYNACEAE, 325.
- Apodytes** E. Mey. 98.
beninensis H. f. 98.
- Aptandra** Miers. 95.
Zeuikeri Engl. 95.
— v. *latifolia* Engl. 96.
- ARACEAE, 587.
- Arachis** L. 141.
hypogaea L. 141.
- ARALIACEAE, 238.
- Ardunia** *edulis* Spreng.
337.
- Arenaria** *africana* H. f.
41.
prostrata Ser. 41.
- Argomuellera** Paz. 495.
macrophylla Paz. 495,
656.
- Argyria** *beraviensis* Bak.
391.
- Aristida** L. 640.
amplissima Trin. et
Repr. 640.
vestita Thunb. 640.
- Aristolochia** L. 466.
Dewevrei D. W. et T. D.
466.
Schweinfurthii Engl.
467, 655.
triactina H. f. 467.
- ARISTOLOCHIACEAE,
466
- Artabotrys** R. Br. 22.
aurantiodorus Engl. 22.
congolensis D. W. et
T. D. 22.
Thomsonii Oliv. 22.
- Artanema** D. Don, 399.
Cabrae D. W. et T. D.
399.
longifolium Vath. 399
longifolium Bth. 399.
- Artemisia** *maderaspata-*
na Poir. 299.
- Artocarpus** Forst. 510.
incisa L. f. 510.
Aricia *bicolor* Ait. 591.
- Arundostrum** *Schwein-*
furthianum O. K. 548.
- Arundinaria** *Vichz.* 648.
alpina K. Sch. 648.
- Arundo** *Phragmites* L.
645.
vulgaris Lam. 645.
- ASCLEPIADACEAE,
355.
- Asclepias** L. 362.
affinis D. W. 362.
Buchwaldii D. W. 362.
— v. *angustifolia* D. W.
362.
Burchellii Schl. 360.
Cabrae D. W. 362.
coccinea N. E. Br. 361.
congolensis D. W. 362.
dependens N. E. Br. 359.
Dewevrei D. W. 362.
dissoluta Schl. 358.
erecta D. W. 362.
foliosa N. E. Br. 359.
fruticosa L. 360.
katangensis D. W. 362.
Laurentiana N. E. Br.
361.
lineolata Schl. 360.
macrantha Hochst. 361.
palustris Schl. 359, 360.
rubens N. E. Br. 360.
scandens P. B. 364.
Schumanniana Hiern,
359.

Asclepias

semitampectens Hieron. 360.

Verdecii D. W. 361.

Asclepiis Nees, 620.

pinguis Cl. 620.

protea Welch 620.

Asparagus L. 562.

abyssinicus Hochst. 562

aethiopicus L. 562.

— v. *ternifolius* Bak. 563.

africanus Lam. 562.

— v. *biarticulatus* D. W. et T. D. 562.

drepanophyllus Welw. 562.

Duchesnei L. Lind 563.

falcatus L. 563.

katangensis D. W. et T. D. 563.

laricinus Burch. 563.

— v. *katangensis* D. W. et T. D. 563.

Pauli-Gulielmi Solms, 563.

— v. *katangensis* D. W. et T. D. 563.

plumosus Bak. 563.

retrofractus Forsk. 562.

Aspilia Thou. 306.

Dewevrei O. Hoffm. 306

Kotschyi B. et H. f. 306.

latifolia O. et H. 306.

Smithiana O. et H. 306.

Asterocaulis Lindaviana

D. W. et T. D. 416.

Astrochlaena Hallier f. 383.

solanacea Hallier f. 383.

Asystasia Bl. 427.

congenis Cl. 427

coromandeliana Nees, 428.

gangetica T. And. 428.

longituba Lindau, 428.

Aulacocalyx H. f. 267.

jasmiflora H. f. 267.

— v. *latifolia* D. W. et T. D. 267.

Avicennia L. 442

africana P. B. 442.

B**Baccaurea** Lour. 466.

Staudtii Pax. 466.

Baccharis Dioscoridis L. 302.

senegalensis Pers. 295.

Bacopa Aubl. 39.

alternifolia Engl. 399.

calycina Engl. 399.

Baikiaea Bth. 178.

anomala M. Mich. 178.

insignis Bth. 178.

Baikiaea

Leserawaetii D. W. 178.

minor Olin. 179.

Baïssea A. DC. 352.

angolensis Stapf. 354.

— v. *major* Stapf. 353

axillaris Hua. 352.

gracillima Hua. 353

Laurentii D. W. 353.

laxiflora Stapf. 353.

major Hieron. 353

micrantha Hua. 353.

tenniloba Stapf. 353.

Tholloni Hua. 354.

Bakerisideroxylon

Engl. 322.

revolutum Engl. 322.

Balarites Del. 84.

aegyptiaca Del. 84

BALANOPHORACEAE.

476

BALSAMINACEAE.

79.

Bamburantha Arnoldia-

na L. Linden, 546.

Bandeiraea Welw. 175

simplicifolia Bth. 175.

speciosa Welw. 175.

tenniflora Bth. 175.

Banisteria Leona Cav. 77.**Baphia** Afz. 166.

acuminata D. W. 166.

angolensis Welw. 167.

avicellera Tamb. 166.

chrysophylla Taub. 167.

compacta D. W. 167.

congolensis Welw. 167

crassifolia Harms, 167.

densiflora Harms, 167

Haematoxylon H. f. 167.

Laurentii D. W. 167.

laurifolia Baill. 168.

Leserawaetii D. W.

167.

nitida Lodd. 167.

pubescens H. f. 168.

Pynaertii D. W. 168.

racemosa Hochst. 168.

Schweinfurthii Harms.

168.

spathacea H. f. 168.

— v. *scandens* D. W.

168.

Vermeulenii D. W. 168.

Barbaceenia acuatorialis

Harms, 558.

Barleria L. 425.

affinis D. W. 425.

Briartii D. W. et T. D.

425.

Descampsii Lindau, 425.

elegans S. Moore, 425.

lukaluensis D. W. 426.

opara Nees, 426.

pungens L. v. *macro-*

phylla Nees, 425.

ventricosa Nees, 426.

Barleria

Verdecii D. W. 426.

villosa S. Moore, 426.

Bateria H. f. 223.

Dewevrei D. W. et T. D.

223.

fistulosa Mast. 223.

— v. *macrophylla* D. W.

et T. D. 223.

nigritana H. f. 223.

— v. *uniflora* D. W. et

T. D. 224.

Basella L. 462.

alba L. 462.

rubra L. 462.

Bastardii angulata G. et

P. 51.

Batatas edulis Choisy, 385.

pentaphylla Choisy, 383.

Bauhinia L. 174.

Petersiana Bolle, 174

reticulata D. 174.

tonnentosa L. 175.

Bechiam Inedlor Ldl. 412.

Bechevpetiolaris Hochst.

637.

wauseta St. 639.

Begonia L. 233.

Bruneelii D. W. 233.

dunensis D. W. 233.

elaeagnifolia H. f. 233.

Gentilii D. W. 233.

gracilipetiolata D. W.

233.

Hauvilleleana D. W.

233.

injoloensis D. W. 233.

Poggei Warb. 233.

— v. *abuliora* Th. et

Hdt. Flor. 233.

— v. *flor. albo* C. DC.

231.

quadriolata Warb. 234.

romensis D. W. 231.

rubronervata D. W. 234.

Sereti D. W. 231.

subfalcata D. W. 235.

subscutata D. W. 235.

Sutherlandii H. f. 235.

Verdecii D. W. 235.

zobianensis D. W. 235.

BEGONIACEAE.

233.

Belmontia chionantha

Gilg. 373.

dehlsii Schinz. 374.

Gentilii D. W. 373.

olupantha Gilg. 374.

Thunzii Vatke. 374.

Berlinia Sol. 176.

acuminata Sol. 176. 653.

— v. *Bruneelii* D. W.

177.

— v. *pubescens* D. W.

177.

auriculata Bth. 651.

bracteosa Bth. 177.

- Berlinia**
 Eminii *Taub.* 177
 Laurentii *D. W.* 177.
 Soreti *D. W.* 177.
Bertiera *Aubl.* 255.
 aethiopica *Horn.* 255.
 capitata *D. W.* 255.
 coccinea *G. Don.* 248.
 congolana *D. W. et T. D.*
 255.
 Deweyrei *D. W. et T. D.*
 255
 gracilis *D. W.* 255, 654
 — v. latifolia *D. W.* 255.
 Laurentii *D. W.* 255.
 laxa *Bth.* 255.
 macrocarpa *Bth.* 256.
 Thouneri *D. W. et T. D.*
 256.
Bidens *L.* 308
 leucantha *W.* 308.
 pilosa *L.* 308.
 urceolata *D. W.* 308.
Bignonia africana *Lam.*
 412.
 BIGNONIACEAE, 409.
Biophytum *DC.* 78.
 sensitivum *DC.* 78.
Bisetaria febrifuga *V.*
 Tgh. 88.
Bixa *L.* 35.
 Orellana *L.* 35.
 BIXACEAE, 35.
Blackvoellia africana *II. f.*
 219.
Blainvillea *Cass.* 306.
 Priureana *DC.* 306.
Blepharis *Juss.* 422.
 boerhaaviaefolia *Pers.*
 422.
 — v. nigrovenulosa
D. W. et T. D. 423
 Buchneri *Lindau.* 423.
 — v. major *D. W.* 423.
 katangensis *D. W.* 423.
 rubiaefolia *Schum.* 422.
 trinervis *A. DC.* 423.
 Verdickii *D. W.* 423.
Blepharispermum
 Wight, 303.
 spinulosum *O. et H.* 303.
Blighia *Koen.* 112.
 Wildemaniana *Gilg.* 112.
Blumea *DC.* 301.
 alata *DC.* 301.
 aurita *DC.* 301.
 lacera *DC.* 301.
 pterodonta *DC.* 302.
Boehmeria *Jacq.* 513.
 platyphylla *Don.* 513.
Boerhaavia *L.* 456.
 ascendens *Willd.* 454.
 dichotoma *Vahl.* 455.
 diffusa *L.* 455.
 paniculata *Rich.* 455.
 plumbaginea *Car.* 455.
Boerhaavia
 repens *L.* 455.
Bombax *L.* 59.
 aquaticum *K. Sch.* 59.
 guineense *S. et T.* 60.
 kimmense *D. W. et T. D.*
 59.
 lukayense *D. W. et T. D.*
 59.
 pentandrum *L.* 60.
Bonamia *Thou.* 380.
 minor *Hall. f.* 380.
Bonatea *W.* 536.
 Verdickii *D. W.* 536.
Bosphane toxicarius *Herb.*
 557.
Boottia *Wall.* 515.
 abyssinica *Ridl.* 515.
 BORAGINACEAE, 377.
Borago zeilanica *L.* 379.
Borassus *L.* 586.
 aethiopicum *Mart.* 586.
 flabellifer *L.* 586.
 — v. aethiopicum *Warb.*
 586.
 flabelliformis *L.* 586.
Borreria *G. F. W. Mey.*
 286.
 dibrachiata *K. Sch.* 286.
 hebecarpa *A. Rich.* 286.
 neglecta *A. Rich.* 286.
 ocnoides *DC.* 286.
 ramisperma *DC.* 286.
 scabra *K. Sch.* 287.
 senensis *K. Sch.* 287.
 stricta *DC.* 287
 tetradon *K. Sch.* 287.
Boscia *Lam.* 30.
 salicifolia *Oliv.* 30.
 Welwitschii *Gilg.* 30.
Bosqueia *Thou.* 509, 656.
 angolensis *Ficatho.* 509,
 656.
 Welwitschii *Engl.* 509.
Bosqueiopsis *D. W. et*
T. D. 510, 656.
 Gilletii *D. W. et T. D.*
 510.
 Bosqueia *Thou.* 509, 656.
 Bosqueiopsis *D. W. et T. D.*
 510, 656.
Bothriocline *Oliv.* 290.
 longipes *N. E. Br.* 290.
 misera *O. Hoffm.* 290.
 Schimperii *O. et H.* 290.
Botor palustris *O. K.* 155.
Bougainvillea *Juss.*
 455.
 spectabilis *W.* 455.
Brachycorythis *Hdl.*
 537.
 Briartiana *Krzl.* 537.
 Leopoldi *Krzl.* 537.
 pleistophylla *Rehb. f.*
 537.
 pubescens *Haw.* 538.
Brachycorythis
 rhomboglossa *Krzl.* 538.
 Schwinfurthii *Rehb. f.*
 538.
Brachystegia *Bth.* 179.
 appendiculata *D. W.* 179.
 katangensis *D. W.* 179.
 mpalensis *M. Mich.* 179.
 — v. latifoliolata *D. W.*
 179.
 stipulata *D. W.* 179.
Brachystelma *R. Br.*
 367.
 nauseosum *D. W.* 367.
Brasilletta africana *O. K.*
 170.
Brassica *L.* 27.
 juncea *Coss.* 27.
 oleracea *L.* 27.
Brevocria campanulata
 Bak. 380.
Bridelia *W.* 479.
 ferruginea *Bth.* 479.
 micrantha *Baill.* 479.
 — v. ferruginea *M.-A.*
 479, 655.
 scleroneura *M.-A.* 480.
 stenocarpa *M.-A.* 480.
 tenuifolia *M.-A.* 480.
 Zenkeri *Par.* 480.
Brillantaisia *P. B.* 416.
 alata *T. And.* 417.
 Deweyrei *D. W. et T. D.*
 416.
 Kirungae *Lindau.* 417.
 Lamium *Bth.* 417.
 owariensis *P. B.* 417.
 ovariensis *Hook.* 417.
 Palisotii *Lindau.* 417.
 patula *T. And.* 417.
 pubescens *T. And.* 417.
 subcordata *D. W. et*
T. D. 418.
 — v. macrophylla *D. W.*
 et *T. D.* 418.
Briza Eragrostis *L.* 646.
Brunnichia *Banks.* 465.
 africana *Welw.* 465.
 — v. erecta *Buett.* 465.
 — v. glabra *Damm.* 465.
 congolensis *Damm.* 465.
Brunsvigia Massaiana
L. Lind. 555.
 tozcarica *Ker.* 557.
Bryonia capillacea *S. et T.*
 232.
 deltoidea *S. et T.* 232.
 latobrosa *Ait.* 233.
 scabrella *L. f.* 232.
Bryophyllum *Salisb.* 193.
 calycinum *Salisb.* 193.
Buchholzia *Engl.* 31.
 coriacea *Engl.* 31.
Buchnera *L.* 401.
 affinis *D. W.* 401.
 Buettneri *Engl.* 402.
 capitata *Burm.* 402.

- Buchnera**
gesnerioides W. 403.
hermonthica Delile, 403.
inflata Skan, 402.
multicaulis Engl. 402.
pusilla D. W. 402.
quangensis Engl. 402
Reissiana Huett. 402.
subcapitata Engl. 402.
Verdiecki Skan, 402.
- Buchnerodendron**
Guerke, 38.
Laurentii D. W. 38.
speciosum *Guerke*, 38, 651.
- Buddleia** L. 369.
madagascariensis Lam. 369.
- Buettneria** L. 67.
africana Mast. 67.
- Buforrestia** Cl. 581.
imperforata Cl. 581.
- Bulbine** L. 567
abyssinica A. Rich. 567.
asphodeloides *Schult. f.* 567.
 — v. *filifolioides* D. W. 567.
- Bulbophyllum** Thon, 515.
andongense R. f. 515.
barbigerum Ldl. 516.
calamarium Ldl. 516.
conopseum *Schl.* 517.
flavidum Ldl. 516.
 — v. *elongatum* D. W. 516.
Kundianum D. W. 516.
Lawrentianum Krzl. 518.
nanum D. W. 516.
platyrachys D. W. 516.
pumilum Ldl. 517.
Schinianum Krzl. 516.
- Bulbostylis** L. 613.
abortiva Cl. 613.
andongensis Bl. 613.
barbata Cl. 613.
capillaris *Nees*, 614.
 — v. *trifida* Cl. 614.
cardiocalpa Cl. 614.
filamentosa Cl. 614.
laniceps Cl. 615.
lanifera K. Sch. 615.
puberula Cl. 615.
pusilla Cl. 615
trichobasis Cl. 615.
 — v. *leptocaulis* Cl. 615.
 — v. *unseriata* Cl. 616.
- Bumelia dulcifera* S. et T. 321.
- Buphane** Herb. 557.
disticha Herb. 557.
- Bupthalamon scandens* S. et T. 307.
- Burmanna** L. 515.
bicolor *Mart.* 515.
 — v. *africana* *Koll.* 515.
Brantii *Engl.* 515.
- BI RMANNIACEAE, 515.
 BI RSERACEAE, 90.
- Butayea** D. W. 427.
congolana D. W. 425.
- Byrsanthus** *Groll* 221.
Browni *Groll* 221.
epiphytus *Mast.* 221.
- Byrsocarpus**. S. et T. 653.
coccineus S. et T. 653.
- C
- Cacalia sapitata* Vahl. 311
- Cacoucia bracteata* Laws. 197.
exannulata Engl. 197.
paucolata Laws. 198.
- CACTACEAE, 235.
Cactus praeinitus L. 235.
- Cadalvena** *Fenzl*, 540.
spectabilis *Fenzl*, 540.
- Caesalpinia** L. 170.
Bonduecella Fleming, 170
Bonduecella *Roxb.* 170.
puleherrina *St.* 170.
- CAESALPINIACEAE, 170.
Cnesia africana *Bak.* 569.
Cujan indorum *Medic.* 157.
- Cajanus** DC. 157.
indicus *Spreng.* 157.
- Caladium** *Vent.* 591.
bicolor *Vent.* 591.
scandens W. 588.
- Calamus** L. 584.
Cubrac D. W. et T. D. 585.
cuspidatus M. et W. 585.
Hookeri M. et W. 586.
Laurentii D. W. 584.
secundiflorus P. B. 584.
- Calathea conferta* Bth. 547.
Calceolaria enncasperma O. K. 33.
- Calosium Welwitschii* Hiern. 114.
- Callichilia** *Stapf*, 342.
Barteri *Stapf*, 342.
- Caloncoba** *Gilg*, 36.
Creptana *Gilg*, 36.
glauca *Gilg*, 36, 651.
Schwefurthii *Gilg*, 37.
subtomentosa *Gilg*, 37.
Welwitschii *Gilg*, 37, 651.
- Calonyction** *Choisy*, 390.
bona-nox *Boj.* 390.
speciosum *Choisy*, 390.
Calophanes Perrottetii *Nees*, 418.
verticillaris T. And. 419.
- Calvoa** H. f. 213.
orientalis *Taub.* 213.
sessiliflora *Cogn.* 213.
- Calyptracarpus** *Less.* 307.
africana O. Hoffm. 307.
- Camoensia** *Weber.* 169.
Laurentii D. W. 169.
maxima *Weber.* 169.
- Campanula coccinea* *Hook.* 403.
- Campylochnella arenaria* V. Tgh. 84.
katangensis V. Tgh. 85.
- Campylopyne exannulata* *Hemsl.* 197.
- Canaptylospernum laxiflorum* V. Tgh. 88.
- Campylostemon** *Weber.* 100.
angolense *Weber.* 100.
Duchesnei D. W. et T. D. 101
Laurentii D. W. 101.
Pynaertii D. W. 101.
- Canarium** L. 90.
edule *Hook.* 90.
Mubafo *Ficalho*, 90.
Safu D. W. 90.
Saphu *Engl.* 90.
Schwefurthii *Engl.* 90.
- Canavalia** *Adans.* 149.
emarginata G. Don, 149.
ensiformis DC. 149, 156.
incurva *Thou.* 149.
maritima *Thou.* 149.
obtusifolia DC. 149.
 — f. *macrophylla* D. W. et T. D. 150.
- Canalaria micrantha* *Hochst.* 479.
- Canna** L. 549.
bidentata *Bert.* 549.
indica L. 549.
 — subsp. *orientalis* *Bak.* 549.
orientalis *Rosc.* 549.
- Cannabis** L. 501.
sativa L. 501.
- Canscora** *Lam.* 375.
decussata *Schult.* 375.
- Canthium** *Barteri* *Hiern.* 267.
brexifolium *Engl.* 268.
congrue *Hiern.* 268.
venosum *Hiern.* 269.
- Capersonia** *St-Hil.* 490.
sengalensis *M.-A.* 490.
- CAPPARIDACEAE, 28.
- Capparis** L. 31.
acuminata D. W. 31.
Azefii DC. 31.
cerasifera *Gilg*, 31.
Duchesnei D. W. 31.
erythrocarpa *Iserl.* 31.

- Capparis**
 Kirkii *Oliv.* 31.
 Pogzei *Pax.* 31, 651.
 Verdickii *D. W.* 31.
- Capsicum** *L.* 396.
 annuum *L.* 396.
 cerasiferum *W.* 396.
 conicum *Mey.* 396.
 conoides *Mill.* 396, 655.
 frutescens *L.* 396.
- Carapa** *Aubl.* 93.
 guianensis *Oliv.* 93.
 provera *DC.* 93, 652.
 — v. *Gentilii* *D. W.* 93.
- Cardiospermum** *L.* 110.
 barbicaulis *Bak.* 110.
 glabrum *S.* et *T.* 110.
 grandiflorum *Sco.* 110.
 — f. *hirsutum* *Rd.k.* 110.
 Halicacabum *L.* 110.
 microcarpum *Kth.* 110.
- Carica** *L.* 225.
 Papaya *L.* 225.
- Carissa** *L.* 337.
 dulcis *S.* et *T.* 337.
 edulis *Vahl.* 337.
 Richardiana *J.* et *S.* 337.
- Carpodinus** *R. Br.* 334.
 Brunellii *D. W.* 334.
 campulosa *K. Sch.* 335.
 cirrhosa *K. Sch.* 332.
 congolensis *Stapp.* 334.
 Eetveldeana *D. W.* 334.
 friabilis *Pierre.* 336.
 Gentilii *D. W.* 334.
 gracilis *Stapp.* 334.
 incerta *K. Sch.* 332.
 Jasperseni *D. W.* 335.
 lactea *K. Sch.* 336.
 lanceolata *K. Sch.* 335.
 laxiflora *K. Sch.* 333.
 leptantha *Stapp.* 335.
 ligustrifolia *Stapp.* 336.
 — v. *angusta* *D. W.* 334.
 myriantha *K. Sch.* 333.
 parvifolia *Pierre.* 333.
 rufescens *D. W.* 336.
 — v. *longeacuminata* *D. W.* 326.
 Schlechteri *K. Sch.* 336.
 subrepanda *K. Sch.* 336.
 turbinata *Stapp.* 336.
 verticillata *D. W.* 337.
- Carpolobia** *G. Don.* 40.
 alba *G. Don.* 40.
- Carvalhoa** *K. Sch.* 342.
 Ledermanni *Gilg.* 342.
- CARYOPHYLLACEAE**, 41.
- Casearia** *Jacq.* 219.
 congensis *Gilg.* 219.
- Cassia** *L.* 171.
 Absus *L.* 171.
 alata *L.* 172.
 Droogmausiana *D. W.* 172.
 geminata *S.* et *T.* 173.
 gracillima *Welw.* 173.
 Kethulleana *D. W.* 172.
 Kirkii *Oliv.* 172.
 — v. *microphylla* *A. Dew.* 172.
 Manni *Oliv.* 172.
 — v. *Van Houttei* *D. W.* 172.
 mimosoides *L.* 172.
 occidentalis *L.* 173.
 reticulata *M. Mich.* 172.
 Thonningii *DC.* 171.
 Tora *L.* 173.
 Verdickii *D. W.* 173.
 viscosa *S.* et *T.* 171.
 Cassipourea africana *Bth.* 194.
- Cassytia** *L.* 469.
 filiformis *L.* 469.
 — v. *guineensis* *D. W.* 469.
 guineensis *S.* et *T.* 469.
- Cayaponia** *Manso.* 233.
 latebrosa *Cogn.* 233.
- Ceiba** *Gaertn.* 59.
 pentandrum *Gaertn.* 59.
- CELASTRACEAE**, 100.
 Celastrus diffusa *G. Don.* 103.
 senegalensis *Lam.* 100.
 — v. *mermis* *A. Rich.* 100.
- Celosia** *L.* 456.
 argentea *L.* 456.
 Deweyana *Schinz.* 456.
 laxa *S.* et *T.* 456.
 leptostachya *Bth.* 456.
 laudensis *Bak.* 456.
 trigyna *L.* 456.
- Celtis** *L.* 501.
 guineensis *S.* et *T.* 501.
 Prantlii *Priemer.* 501.
- Cenchrus** *L.* 636.
 barbatus *Schum.* 636.
 granularis *L.* 632.
 setosus *Sw.* 638.
- Centotheca** *Desv.* 648.
 lappacea *Desv.* 648.
 mucronata *Bth.* 648.
 owariensis *Hack.* 648.
- Centratherum** *Cass.* 289.
 grande *DC.* 289.
- Cephaelis** *Sco.* 285.
 congensis *Hiern.* 285.
 esculenta *S.* et *T.* 240.
 pedunculata *Salisb.* 285.
- Cephalaria** *Schrad.* 288.
 attenuata *R.* et *S.* 288.
 — v. *b. R.* et *S.* 288.
 — v. *longifolia* *D. W.* 288.
- Cephalonema** *K. Sch.* 72.
 polyandrum *K. Sch.* 72.
- Cephalostigma** *A. DC.* 318.
 Perrottetii *A. DC.* 318.
- Cerastium** *L.* 41.
 africanum *Oliv.* 41.
- CERATOPHYLLACEAE**, 513.
- Ceratophyllum** *L.* 513.
 demersum *L.* 513.
 vulgare *Schl.* 514.
- Cercestis** *Schott.* 590.
 congensis *Engl.* 590.
 congoensis *T. D.* et *Sch.* 590.
- Cercopetalum** *Gilg.* 30.
 dasyanthum *Gilg.* 30.
 — v. *longeacuminatum* *D. W.* 30.
- Ceropegia** *L.* 366.
 angustiloba *D. W.* 366.
 Butayi *D. W.* 366.
 Deweyi *D. W.* 367.
 Gilletii *D. W.* 367.
 Verdickii *D. W.* 367.
- Chaetacme** *Pl.* 501.
 aristata *Pl.* 501.
 — v. *kamerunensis* *Engl.* 656.
 — v. *longifolia* *Engl.* 501.
- Chaetocarpus** *Thunb.* 497.
 africanus *Pax.* 497.
- Chailletia rufipilis* *Turcz.* 95.
Chasalia laxiflora *Bth.* 280.
- Chasmanthera** *Hochst.* 24.
 strigosa *Baill.* 24.
- Chelopsis arborea* *Nees.* 423.
 montana *Nees.* 424.
- CHENOPODIACEAE**, 461.
- Chenopodium** *L.* 461.
 ambrosioides *L.* 461.
 caudatum *Jacq.* 458.
 foetidum *Schrad.* 461.
 graveolens *Lag.* et *Rodr.* 461.
 opulifolium *Schrad.* 462.
- Chironia** *L.* 375.
 transvaalensis *Gilg.* 375.
 Verdickii *D. W.* 375.
- Chlamydocardia** *Link.* 431.
 Buettneri *Link.* 431.
- Chloris** *Sco.* 643.
 Gayana *Kth.* 643.
 polydactyla *Sco.* 643.
 punctata *Hochst.* 643.
- Chlorocodon** *H. f.* 357.
 Whitei *H. f.* 357.
- Chlorophora** *Gaud.* 502.
 excelsa *Bth.* 502.

- Chlorophytum** Ker. 568.
africanum Engl. 569.
Fuchsianum D. W. 568.
macrophyllum Aschers. 568.
- Chomelia** Jacq. 266.
apiculata D. W. 266.
congensis O. K. 257.
Gilletii D. W. et T. D. 266.
Laurentii D. W. 266.
longifolia D. W. 266.
nigrescens D. W. 266.
- Christiania** DC. 68.
africana DC. 68.
- Chrysanthellum** Rich. 308.
procumbens Pers. 308.
- Chrysobalanus** L. 189.
ellipticus Sol. 189.
leaco L. 189.
 — v. *ellipticus* Hook. f. 189.
- Chrysocoma** amara S. et T. 295.
violacea S. et T. 291.
- Chrysophyllum** L. 320.
africanum A. DC. 320.
cinereum Engl. 320.
Lacourtiannum D. W. 320.
Laurentii D. W. 320.
longepedunculatum D. W. 320.
Stuhlmanni Engl. 320.
- Chytranthus** H. f. 111.
Gerardi D. W. 111.
Gilletii D. W. 111.
Laurentii D. W. 111.
stenophyllum Gilg. 111.
- Cichorium** L. 315.
luteus L. 315.
- Cienhoeskia** *arhioptica* Solms. 539.
- Cincinnatiotrys** Gilg. 214.
Sereti D. W. 211.
- Cissampelos** L. 25.
ocariensis P. B. 25.
Pareira L. 25.
 — subsp. *ocariensis* Engl. 25.
 — v. *owariensis* Oliv. 25.
 — v. *transitoria* Engl. 26.
 — v. *zairiensis* T. D. et Sch. 26.
tenipes Engl. 26.
zairiensis Moys. 26.
- Cissus** L. 105.
adenocaulis St. 105, 652.
aralioides Pl. 105.
arguta H. f. v. *Oliveriana* Engl. 107.
articulata G. et P. 105.
Bakeriana Pl. 105, 652.
- Cissus**
Barbeyana D. W. et T. D. 106.
cornifolia Pl. 106.
dobilis Pl. 106.
Deweyrei D. W. et T. D. 106.
diffusiflora Pl. 106.
farinosa Pl. 106.
Gilletii D. W. et T. D. 106, 652.
Guerkeana T. D. et Sch. 107, 652.
Hautlevilleana D. W. et T. D. 107.
ibneensis H. f. 107.
Kakoma D. W. 107.
Laurentii D. W. 107.
Livingstoniana Welh. 107, 652.
mayombensis Gilg. 107.
Oliveriana Gilg. 107.
polyxymosa D. W. 108.
producta Pl. 108.
prostrata D. W. et T. D. 108.
rubinnosa Pl. 107.
Smithiana Pl. 108.
suberosa Pl. 108.
tonnucalis H. f. 108.
tiliaefolia Pl. 108.
trinervis D. W. 108.
- Cistanthera** K. Sch. 74.
Deweyrei D. W. et T. D. 74.
kabingensis K. Sch. 74.
- Citrullus** Neck. 230.
vulgaris Schrad. 230.
- Citrus** L. 82.
Aurantium L. 82.
Limonium Risso, 83.
medica L. 82.
 — subsp. *Limonium* H. f. 83.
- Clausolegyos** *edulis* H. f. 230.
- Claoxylon** A. Juss. 491.
africanum M. A. 491.
atrovirens Pax. 491.
columnare M. A. 656.
Deweyrei Pax. 491.
flaccidum Pax. 491.
Mercurialis Thw. 492.
- Clausena** Burm. 82.
anisata H. f. 82.
Bergoyekiana D. W. et T. D. 82.
- Cleistanthus** H. f. 480.
candatus Pax. 480.
- Cleistopholis** *Pierrei* 187.
grandiflora D. W. 18.
- Clematis** L. 13.
chrysocarpa Welh. 13.
 — v. *Poggei* T. D. et Sch. 13.
glaucescens Fresen. 13.
- Clematis**
grandiflora DC. 14.
Kirkii Oliv. 14.
orientalis L. 14.
 — v. *glaucescens* Engl. 13.
 — v. *simensis* O. K. 14.
 — subsp. *Wightiana* O. K. 14.
pseudograndiflora O. K. 14.
scabiosaefolia DC. 14.
simensis Fresen. 14.
spathulaefolia Prandl. 15.
Thunbergii Steud. 15.
 — v. *angustisecta* Engl. 15.
villosa DC. subsp. *chrysocarpa* O. K. 13.
 — v. *Poggei* O. K. 13.
 — subsp. *scabiosaefolia* O. K. 11.
 — subsp. *spathulaefolia* O. K. 15.
Wightiana Wall. 14.
- Cleome** L. 28.
acuta S. et T. 29.
ciliata S. et T. 28.
Gilletii D. W. 28.
guineensis H. f. 28.
hirta Oliv. 29.
monophylla L. 28.
pentaphylla L. 29.
raphanoides DC. 222.
spinosa Jacq. 28.
thyrsiflora D. W. et T. D. 28.
- Clerodendron** L. 438.
Bakeri *Guerke*. 438.
Buchneri *Guerke*. 438.
capitatum S. et T. 438, 655.
 — v. *Butayei* D. W. 438.
 — v. *subcordatum* D. W. 438.
 — v. *subdentatum* D. W. 438.
congensis Engl. 438.
congensis Bak. 438.
formicarum *Guerke*. 438.
fuscum *Guerke*. 438.
Gilletii D. W. et T. D. 439.
grandifolium *Guerke*. 439.
Kanchi D. W. 439.
katangense D. W. 439.
longitubum D. W. et T. D. 439.
Lujaii D. W. et T. D. 439.
Melinochrater *Guerke*. 440.
myricoides R. Br. 439, 655.

Clerodendron

- myricoides v. camporum *Guerke*, 439.
 — v. laxum *Guerke*, 440.
Poggei Guerke, 440.
Rehmanni Guerke, 440.
scandens P. B. 440, 655.
Schlechteri Guerke, 440.
Schweinfurthii Guerke, 440.
spinescens Guerke, 440, 655.
 — v. parviflorum *Schinz*, 441.
splendens D. Don, 441.
subreniforme Guerke, 441.
Thouneri Guerke, 441.
thyrsoideum Guerke, 441.
volubile P. B. 441, 655.
yannense Guerke, 441.
- Clitogyne Salisb.** 547.
arillata K. Sch. 547.
congensis K. Sch. 547.
filipes Bth. 548.
Hensii K. Sch. 548.
Schweinfurthiana K. Sch. 548.
- Clitandra Bth.** 331.
Arnoldiana D. W. 331.
 — v. *Sereti D. W.* 331.
cirrhuosa Rth. 332.
cymluosa Stapf. 332.
caeserrens K. Sch. 332.
Gentili D. W. 332.
Gilletii D. W. 331.
gracilis Hall. f. 335.
Kabulu D. W. 332.
Lacourtiaua D. W. 332.
laxiflora Hall. f. 332.
Mannii Stapf. 332.
myriantha K. Sch. 333.
Nzunde D. W. 333.
orientalis K. Sch. 332.
parvifolia Stapf. 333.
robustior K. Sch. 333.
Sereti D. W. 333.
- Clitoria L.** 146.
Ternatea L. 146.
- Cnestis Juss.** 120.
corniculata Lam. 120.
emarginata D. W. et *T. D.* 121.
ferruginea DC. 120, 653.
 — v. *pilosa A. DC.* 121.
grandiflora Gilg. 121.
grandifoliolata D. W. et *T. D.* 121.
ionalla Gilg. 121.
 — v. *grandifoliolata D. W.* 121.
Lescauwactii D. W. 121.
obliqua P. B. 117.
oblongifolia Bak. 121.

Cnestis

- polyantha Gilg.* 121, 653.
setosa Gilg. 121.
urens Gilg. 121.
Cocculus macranthus H. f. 24.
- Cocos L.** 586.
nucifera L. 586.
- Codarium acutifolium**
Afz. 174.
- Coccoline oxypetala A.**
DC. 21.
parviflora A. DC. 21.
- Coffea L.** 275.
arabica L. 275.
Arnoldiana D. W. 275.
aruwimensis D. W. 275.
canephora Pierre. 275.
 — v. *crassifolia Etn.*
Laur. 276.
 — v. *kouilouensis Pierre.* 276.
 — v. *sankuruensis D. W.* 276.
 — v. *Wildemanii Pierre.* 276.
congensis Froehner. 276.
 — v. *Chalottii Pierre.* 276.
 — v. *Froehneri Pierre.* 276.
 — v. *subsessilis D. W.* 276.
Deweyrei D. W. et *T. D.* 277.
divaricata K. Sch. 277.
hirsuta G. Don. 267.
jasminoides Welch. 277.
 — v. *Trilesiana Pierre.* 277.
Laurentii D. W. 277.
liberica Bull. 277.
robusta J. Lind. 277.
Royauxii D. W. 278, 654.
spathicalyx K. Sch. 278.
stenophylla G. Don. 278.
subcordata Horn. 278.
- Cogniauxia Baill.** 227.
cordifolia Cogn. 227.
podolana Baill. 227.
trilobata Cogn. 227.
- Coinochlamys T. And.** 368.
augolana S. Moore. 368.
 — v. *Laurentii D. W.* 368.
congolana Gilg. 368.
hirsuta T. And. 654.
Poggeana Gilg. 369.
- Cola S. et E.** 60.
acuminata S. et E. 60.
acuminata Griffon du Bell. 61.
 — v. *Ballayi K. Sch.* 61.
 — v. *Ballayi Mast.* 61.

Cola

- Afzelii Mast.* 61.
Ballayi Cornu. 61.
Bruneelii D. W. 61.
caricifolia K. Sch. 61.
congolana D. W. et *T. D.* 61.
cordifolia R. Br. 62.
Deweyrei D. W. et *T. D.* 62.
digitata Mast. 62.
diversifolia D. W. et *T. D.* 62.
Gilletii D. W. 62.
griseiflora D. W. 62.
heterophylla S. et E. 62.
Laurentii D. W. 62.
 — form. *integrifolia D. W.* 62.
 — form. *intermedia D. W.* 62.
Ledermannii Engl. 652.
longifolia D. W. 62.
monpouensis D. W. 62.
nalacensis D. W. 62.
pachycarpa K. Sch. 62.
Pynaertii D. W. 62.
quinqueloba Garcke. 60.
Sereti D. W. 63.
subverticillata D. W. 63.
ureolata K. Sch. 63.
varianteifolia D. W. 63.
yambuyaensis D. W. 64.
- Coleotrype Cl.** 581.
Laurentii K. Sch. 581.
- Coleus Lour.** 449.
africanus Bth. 448.
bullulatus Briq. 449.
Deweyrei Briq. 449.
Dupuisii Briq. 449.
Eetveldeanus Briq. 449.
heterotrichus Briq. 449.
membranaceus Briq. 450.
mirabilis Briq. 450.
 — v. *Poggeanus Briq.* 450.
nervosus Briq. 450.
Poggeanus Briq. 450.
viridis Briq. 450.
- Colocasia Schott.** 591.
antiquorum Schott. 591.
- Colocythis amarissima**
Schrad. 230.
Columnea longifolia L. 399.
- COMBRETACEAE, 195.**
Combretum L. 195.
augustifolium D. W. 195.
Bosoi D. W. 196.
Butayei D. W. 196.
Cabrae D. W. et *T. D.* 196.
camporum Engl. 196.
cineopetalum Engl. et *Diels.* 196.

Combretum

- confertum *Laes.* 196.
 constrictum *Laes.* 197.
 cordifolium *Engl.* 197.
 elacagnoides *T. D.* et
Sch. 196.
 exannulatum *Engl.* et
D. W. 197.
 flammeum *Welw.* 200.
 Gentilii *D. W.* 197.
 Haullevilleannum *D. W.*
 197.
 Hensii *Engl.* et *Diels.*
 197.
 hispidum *Laes.* 197.
 Kamatutu *D. W.* 198.
 Klotschii *Welw.* 198.
 latialatum *Engl.* 198.
 — v. multifractatum
Engl. 198.
 Laurentii *D. W.* 198.
 lawsonianum *Engl.* et
Diels. 198.
 laxiflorum *Welw.* 198.
 longepilosum *Engl.* et
Diels. 199.
 lukauense *D. W.* 199.
 marginatum *Engl.* et
Diels. 199.
 mucronatum *Sch.* et *Th.*
 199.
 mussaendiflorum *Engl.*
 et *Diels.* 199.
 nervosum *Engl.* et *Diels.*
 199.
 odontopetalum *Engl.* et
Diels. 199.
 olivaceum *Engl.* 199.
 paniculatum *Vent.* 189.
 Poggei *Engl.* et *Diels.*
 199.
 polystictum *Welw.* 196.
 porphyrobtrys *Engl.* et
Diels. 200.
 puetense *Engl.* et *Diels.*
 200.
 pyriforme *D. W.* 200.
 quangense *Engl.* et
Diels. 197.
 racemosum *P. Beauv.*
 200.
 — v. flammeum *Welw.*
 200.
 racemosum *Hiera.* 186.
 sericeogyne *Engl.* et
Diels. 201.
 sinuatipetalum *D. W.*
 201.
 Smeathmanni *G. Don.*
 199.
 splendens *Engl.* 201.
 towaense *Engl.* et *Diels.*
 201.

Commelina *L.* 576.

- acquinortalis *P. B.* 579.
 aethiopia *Cl.* 576.

Commelina

- africana *L.* 576.
 aquatica *Kth.* 578.
 ambigua *P. B.* 574.
 aspera *G. Don.* 576.
 bearghalensis *L.* 576.
 bicolor *P. B.* 579.
 caninata *Bth.* 577.
 Clarkeana *D. W.* et *T.*
D. 577.
 condensata *Cl.* 577.
 Dammerniana *K. Sch.*
 577.
 Forskalaei *Vahl.* 577.
 latifolia *Hochst.* 577.
 nudiflora *L.* 578.
 — f. araria *D. W.* et
T. D. 578.
 ovata *oblonga* *R.* et *S.*
 580.
 scaposa *Cl.* 578.
 Schweinfurthii *Cl.* 578.
 siamensis *R.* et *S.* 580.
 umbellata *S.* et *T.* 578.
 Vogelii *Cl.* 578.
 COMMELINACEAE. 574.
 CONNARACEAE. 117.
 Connaeus *L.* 119.
 Englerianus *Gilg.* 119.
 luluenensis *Gilg.* 119. 653.
 Stuhlmanni *Pl.* 119.
 Gonocarpus *trautii* 195.
 erectus *L.* 135.
 Conopharyngia *Stapf.*
 343.
 durissima *Stapf.* 343.
 Gentilii *D. W.* 343.
 pachysiphon *Stapf.* 343.
 penduliflora *Stapf.* 344.
 Smithii *Stapf.* 344.
 — v. brevituba *D. W.*
 344.
 Thounetii *Stapf.* 344.
 — v. De-neusei *D. W.*
 314.
 — v. Les-rauwaetii *D.*
W. 314.
 CONVOLVULACEAE.
 379.
 Convolvulus *alsinoides* *L.*
 379.
 Batatas *L.* 385.
 bicolor *Vahl.* 381.
 curvatus *L.* 385.
 capitatus *Desf.* 381.
 filiculis *Vahl.* 382.
 hispidus *Vahl.* 386.
 littoralis *L.* 388.
 Nil *L.* 388.
 ochraceus *Lill.* 388.
 paniculatus *L.* 389.
 pentaphyllus *L.* 383.
 Per-Carpus *L.* 383.
 pinnatus *Desf.* 390.
 reptans *L.* 389.
 sublobatus *L. f.* 381.

Conyza *Less.* 300.

- aegyptiaca *Dryand.* 300.
 aurita *L. f.* 301.
 cinerea *L.* 291.
 echinoides *A. Rich.* 300.
 lacera *Burm.* 301.
 rotabilis *Wall.* 300.
 Copaiba *Arnoldiana* *D. W.*
 189.
 Copaifera *L.* 180.
 Arnoldiana *Th.* et *Hell.*
Dor. 180.
 Demeusei *Harms.* 180.
 Laurentii *D. W.* 180.
 Coptosperma *nigrescens*
 II *f.* 266.
 Corchorus *L.* 73.
 acutangulus *Lam.* 73.
 amplexifolius *S.* et *T.* 74.
 capsularis *L.* 73.
 lobatus *D. W.* 73.
 olitorius *L.* 73.
 — f. grandifolius *D. W.*
 74.
 trilobus *L.* 74.
 trilobularis *Burm.* 74.
 Cordia *L.* 377.
 aurantiaca *Bak.* 377.
 Dewevrei *D. W.* et *T. D.*
 377.
 Gillatii *D. W.* 377.
 Liebrechtsiana *D. W.* et
T. D. 377.
 Coreopsis *L.* 308.
 Grantii *Oliv.* 308.
 Sereti *D. W.* 308.
 Coronacarpus *Kotschy*
Bth. 306.
 Corynanthe *Welw.* 241.
 paniculata *Welw.* 241.
 Costus *L.* 542.
 afer *Ker.* 542.
 Dewevrei *D. W.* et *T. D.*
 542.
 edulis *D. W.* et *T. D.* 542.
 Lucanusianus *J. Br.* et
K. Sch. 543.
 phyllocephalus *K. Sch.*
 543.
 spectabilis *K. Sch.* 540.
 trachyphyllus *K. Sch.*
 543.
 Cotula *Sphaeranthus* *Lk.*
 299.
 Coula *Baill.* 96.
 Cabrae *D. W.* et *T. D.* 96.
 Crabbea *Harv.* 426.
 nana *Nees.* 426.
 ovalifolia *Fic.* et *Hiera.*
 426.
 Cravena *bracteolata* *O.*
K. 131.
 elegans *O. K.* 131.
 linearis *O. K.* 132.
 lupinifolia *O. K.* 132.
 villosa *L.* 133.

- Cracca**
Vogelii O. K. 133.
Crasscephalum cernuum
 Moench, 310.
 — *v. coerulescens* Hiern,
 310.
- Crassula** L. 192.
abyssiunica A. Rich. 192.
 — *v. vaginata* Engl. 192.
floripendula Sims, 193.
vaginata E. et Z. 192.
- CRASSULACEAE**, 192.
Crassulia floripendula
 Comm. 193.
- Crataeva** L. 32.
religiosa Forst. 32.
 — *v. brevistipitata* D.
 W. 32.
- Craterispermum** Bth.
 272.
angustifolium D. W. et
 T. D. 272.
brachyematum Hiern,
 272, 654.
 — *v. breviflorum* D. W.
 272.
congolatum D. W. et
 T. D. 272.
Dewevrei D. W. et T. D.
 272.
laurinum Bth. 272.
reticulatum D. W. 272.
- Craterostigma** Hochst.
 399.
latibracteatum Skan,
 399.
- CreMASpora** Bth. 266.
africana Bth. 267.
triflora K. Sch. 266.
- Crinum** L. 554.
congolense D. W. 554.
giganteum Andr. 555.
Herbertianum Wall.
 556.
Laurentii T. D. et D. W.
 555.
majakallense Bak. 555.
Masalianum N. E. Br.
 555.
natans Bak. 555.
purpurascens Herb. 555.
 — *v. angustifolium* D.
 W. 555.
scabrum Sims, 555.
zeylanicum L. 556.
- Crossandra** Salisb. 425.
guineensis Nees, 425.
nilotica Olin. 425.
- Crossopterix** Fenzl, 241.
africana Baill. 241.
febrifuga Bth. 241.
Kotschyana Fenzl, 241.
- Crotalaria** L. 122.
aculeata D. W. 122.
brevidens Bth. 122.
Browni Berth. 126.
- Crotalaria**
calveina Schrank, 122.
capensis Jacq. 122.
comosa Bak. 122.
Cornetii Taub. et Dew.
 123.
cythodrocarpa DC. 123.
Descampsii M. Mich.
 123.
dubia D. W. 123.
filifolia D. W. 123.
glauca W. 123.
globifera E. Mey. 123.
 — *v. stenophylla* Taub.
 123.
Hildebrandtii Vatke,
 123.
intermedia Kotschy, 124.
katangensis A. Dew.
 124.
lanceolata E. Mey. 124.
linearifolia D. W. 124.
longifololata D. W. 124.
lukafuensis D. W. 124.
maculata Delile, 125.
macrostachya Sond 123.
mesopotamica Taub. 124.
oligostachya Bak. 124.
ouonoides Bth. 125.
ononocipes Schl. 125.
pisiformis G. et P. 126.
Poggei Taub. 125.
polyantha Taub. 125.
polygaloides Welw. 125.
quangensis Taub. 125.
Saltiana Andr. 126.
senegalensis Bacle, 125.
serotifera Taub. 125.
sessilis D. W. 125.
spartea R. Br. 125.
spinosa Hochst. 126.
stenothyrsus Taub. 126.
striata DC. 126.
 — *f. latifoliolata* D. W.
 126.
subcapitata D. W. 126.
- Croton** L. 480.
angolensis M.-A. 480.
congeusis D. W. 480.
Draconopsis M.-A. 481.
Mubango M.-A. 481.
oppositifolius Geis. 495.
orypetalus M.-A. 481.
Poggei Pax, 481.
Tiglion L. 481.
Verdickii D. W. 481.
Welwitschianus M.-A.
 481.
zambesiacus M.-A. 481.
- Crotonogyne** M.-A. 490.
Laurentii D. W. 490.
 — *v. ikelembense* D. W.
 490.
Poggei Pax, 490.
- CRUCIFERACEAE**, 27.
Crudia Schreb. 179.
- Crudia**
Laurentii D. W. 179.
Cryphiospermum fluctuans
 P. B. 305.
Cryptolepis R. Br. 355.
Debeerstii D. W. 355.
Hensii Y. E. Br. 355.
scandens Schl. 356.
Welwitschii Hiern. 356.
- Cryptosepalum** Bth.
 180.
Debeerstii D. W. 180.
exfoliatum D. W. 180.
maraviense Olin. 180.
 — *v. minus* A. Dew.
 180.
Verdickii D. W. 180.
- Crystallopollen angustifolium**
 Steetz. 294.
- Ctenium** Panz., 643.
concinnum Nees, 643.
elegans Kth. 643.
- Cubea Clusii** Miq. 467.
- Cucumeropsis** Naud.
 239.
edulis Cogn. 230.
- Cucumis** L. 229.
hirsutus Sond. 229.
maderaspatanus L. 232.
metuliferus E. Mey. 230.
- Cucurbita** L. 231.
Lagenaria L. 227.
maxima Duchesne, 231.
moschata Duchesne, 231.
Pepo L. 231.
- CUCURBITACEAE**, 225.
Culcasia P. B. 587.
angolensis Welw. 587.
parviflora Y. E. Br. 588.
scandens P. B. 588.
striolata Engl. 588.
tenuifolia Engl. 588.
- Curandos edulis** Hiern,
 337.
- Curculigo Gaertn.** 554.
galabateusis Schum. 554.
- Curcuma** L. 539.
longa L. 539.
- Cussonia** Forst. 239.
angolensis Hiern. 239.
arboorea Hochst. 239.
- Cuviera** DC. 271.
angolensis Welw. 271.
- Cyanastrum** Oliv. 573.
Verdickii D. W. 573.
- Cyanospermum calycinum**
 H. f. 157.
- Cyanotis** Don. 531.
angusta Cl. 581.
caespitosa Kotschy et
 Pryn. 581.
Dybowskii Hua, 581.
lanata Bth. 581.
longifolia Bth. 582.
 — *v. Bakeriana* Cl. 582.
longifolia Bak. 582.

Cyanotis

- sonaliensis *Cl* 582.
— v. *uda* *Cl* 582.
Cyathogyne *M.-A.* 488.
Dewevrei *Paz.* 488.
viridis *M.-A.* 488.
Cyathula *Lour.* 458.
prostrata *Bl* 458, 655
CYCADACEAE, 619.
Cyclocarpa *Afz.* 138.
stellaris *Afz.* 138.
Cyclocotyla *Stapp.* 337
congolensis *Stapp.* 337.
Cyclonema *myricoides*
Hochst. 439.
spinescens *Oliv.* 410.
Cyenum *E. Mey.* 404.
adonense *E. Mey.* 404.
adonense *Hiern.* 405.
Buchneri *Engl.* 404
camporum *Engl.* 404.
Dewevrei *D. W.* et *T. D.*
405.
— v. *minus* *D. W.* et
T. D. 405
Questieauxianum *D. W.*
405.
Verdickii *D. W.* 405.
Cylindropsis *parvifolia*
Pierre. 333.
Cymbopogon *finitimus*
Rendle, 625.
Humboldtii *Spreng.* 624.
Schimperii *Rendle.* 626.
Schoenanthus *Rendle.*
626.
— v. *densiflorus* *Rendle.*
626.
Cynanchum *L.* 363.
congoleuse *D. W.* 363.
Dewevrei *D. W.* et *T. D.*
363
extensum *Jacq.* 361.
minutiflorum *K. Sch.*
363.
obscurum *K. Sch.* 361.
polyanthum *K. Sch.* 362.
schistoglossum *Schlt.*
363, 364.
subvolvibile *S.* et *T.* 364.
Cynodon *Pers.* 642.
Dactylon *Pers.* 642.
Cynoglossum *L.* 379
lauceolatum *Forsk.* 379.
micranthum *Desf.* 379.
Cynometra *L.* 181
congolensis *D. W.* 181
djamaensis *D. W.* 181.
Gilletii *D. W.* 181.
Laurentii *D. W.* 181.
Lujæ *D. W.* 181.
Manuii *Obri.* 181.
Oddoni *D. W.* 181.
pedicellata *D. W.* 182.

Cynometra

- Schlechteri *Harms.* 182.
sessiliflora *Harms.* 182.
Vogelii *H.* f. 182
Cynosuavius *aegyptius* *L.*
614
iribicus *L.* 641.
Coccoloba *L.* 611
CYPERACEAE, 594.
Cyperus *L.* 599.
albiceps *Rull.* 610.
albo-marginatus *Steud.*
608
amabilis *Vahl.* 599.
— v. *macer* *Cl.* 599.
— v. *maera* *Cl.* 599.
angolensis *Boeck.* 599.
aristulatus *L.* 599.
auricomus *Stieb.* 600.
Buchananii *Boeck.* 602.
Buettneri *Boeck.* 601.
bulbosus *Vahl.* 600.
compactus *Lam.* 600.
congolensis *Cl.* 600.
crassipes *Vahl.* 605.
cuspidatus *H. B.* et *K.*
607.
dichromenaeformis
Kth. 600.
— v. *major* *Boeck.* 600.
difformis *L.* 601
diffusus *Vahl.* 601.
— v. *angustifolius* *Cl.*
601
distans *L.* 601.
dives *Del.* 602.
dubius *Rottb.* 597.
elator *Boeck.* 601.
esculentus *L.* 601.
— v. *acaulis* *Cl.* 602.
— v. *Buchananii* *Cl.* 602
exaltatus *Retz.* 602.
— v. *dives* *L.* 602.
Fenzhauns *St.* 602.
fertilis *Boeck.* 602
flabelliformis *Rottb.* 603.
flavescens *L.* 608.
flavus *Retz.* 603.
flavus *Boeck.* 597.
flavus *Cl.* 597.
flexifolius *Boeck.* 603.
globosus *All.* 608.
gracilimum *L.* 603.
Haspan *L.* 603.
— v. *harvianus* *Cl.* 603.
Haspan *Rottb.* 603.
Hensii *Cl.* 601.
hexistachyus *Rottb.*
606.
hylaenus *Rull.* 606.
immutatus *Cl.* 604.
javanicus *Retz.* 600.
laevipilus *L.* 596.
ligularis *L.* 597.
maculatus *Boeck.* 604.
mapauoides *Cl.* 604.

Cyperus

- margaritaceus* *Vahl.* 604.
maritimus *Poir.* 604.
— v. *crassipes* *Cl.* 605.
monostachyus *L.* 617.
Mundtii *Kth.* 608.
Nummantiatus *Boeck.*
604
nilaviricus *Hochst.* 608.
nitens *Forsk.* 600.
nassobensis *K. Sch.* 598.
nudicaulis *Poir.* 605.
ochrocephalus *Cl.* 605.
Olfersianus *Kth.* 609.
Papyrus *L.* 605.
polystachyus *R. Br.* 609.
pratensis *Boeck.* 605.
— v. *laxus* *Cl.* 605.
pustulatus *Vahl.* 597.
pyenocephalus *Steud.*
609.
radiatus *Vahl.* 605.
redolens *Maury.* 597.
Reinshii *Boeck.* 606.
rotundus *L.* 606
Schweinfurthianus
Boeck. 605.
Sieberianus *K. Sch.* 598.
Smithianus *Rull.* 609.
sphaecelatus *Rottb.* 606.
tenax *Boeck.* 606.
tenwendinis *Boeck.* 603,
607.
tetrastachyus *Desf.* 606.
tremulus *Poir.* 609.
tuberosus *Rottb.* 607.
umbellatus *Cl.* 599.
uncinatus *Poir.* 607.
Zollingeri *St.* 607.
— v. *gracilis* *Cl.* 607.
— v. *parvus* *Cl.* 607.
Cyphia *Berg.* 318.
erecta *D. W.* 318.
scandens *D. W.* 318
Cyrtopera *Lindl.* 526.
flavo-purpurea *Rehb. f.*
526.
Walleri *Rehb. f.* 520.
Cyrtosperma *Schott.* 588.
Azeli *Engl.* 588.
senegalense *Engl.* 589.
CYTINACEAE, 466.
Cytisus *bicolor* *DC.* 157.
Cajan *L.* 157.
guineensis *S.* et *T.* 157.
pseudo-Cajan *Jacq.* 157.

D

- Dactyloctenium** *W.* 644.
aegyptium *W.* 614.
mpuetsense *D. W.* 644.
Daemia *R. Br.* 364.
extensa *R. Br.* 364.
Dalbergia *L.* 161.
ealaensis *D. W.* 161.
florifera *D. W.* 161.

- Dalbergia**
florifera Bth. v. *obscura* D. W. 161.
Gentilii D. W. 161.
Gilletii D. W. 161.
glaucescens D. W. 161.
Harmsiana D. W. 161.
isangiensis D. W. 161.
kisanuensis D. W. et T. D. 161.
Laurentii D. W. 162.
laxiflora M. Mich. 162.
luluensis Harms, 162.
macrosperna Welch. 162.
 — v. *longipedicellata* D. W. 162.
medicinalis D. W. 162.
Michelliana D. W. 162.
pubescens Bth. 653.
saxatilis H. f. 162.
- Dalechampia** L. 499.
ipomoeaeifolia Bth. 499.
scandens L. 499.
 — v. *cordofana* M.-A. 499.
- Dalhousiea** Wall. 166.
africana S. Moore, 166.
bracteata Bak. 166.
- Damapma** *strobilantha* O. K. 140.
- Dasystachys** Bak. 569.
africana Th. et Hel. Dur. 569.
Grantii Bth. 569.
Verdecikii D. W. 569.
- Datura** L. 396.
fastuosa L. 396.
Stramonium L. 397.
 — v. *Tatula* Dunal, 397.
Tatula L. 397.
- Decasuron** *amygdalinum* DC. 290.
senegalense DC. 295.
- Decastemon** *hirtum* Kl. 29.
- Dequila** *brachyptera* Taub. 166.
nobilis Taub. 166.
- Deinbollia** S. et T. 111.
insignis H. f. 111.
Laurentii D. W. 111.
- Delphinium** L. 15.
dasycaulon Fresen. 15.
- Demeusea** D. W. et T. D. 557.
longifolia D. W. et T. D. 557.
- Dendrobium** *pumilum* Sw. 517.
- Derris** Lour. 166.
brachyptera Bak. 166, 653.
congolensis D. W. 166.
nobilis Welch. 166, 653.
- Desmochaeta** *prostrata* DC. 458.
- Desmodium** Desv. 142.
adscendens DC. 142.
- Desmodium**
barbatum Bth. et Oerst. 142.
dimorphum Welch. 142.
gangeticum DC. 142.
hirtum G. et P. 142.
lasiocarpum DC. 142.
lasiocarpum D. W. 144.
latifolium DC. 143.
mauritanium DC. 142.
megalanthum D. W. 141.
oxybracteum DC. 143.
paleaceum G. et P. 143.
polygonoides Welch. 144.
setigerum E. Mey. 142.
Stuhlmannii D. W. 142.
tenuiflorum M. Mich. 144.
trillorum DC. 144.
- Dewevrea** M. Mich. 137.
bilabiata M. Mich. 137.
- Dewevrella** D. W. 355.
cochliostema D. W. 355.
- Dewildemanina** O. Hoffm. 296.
filifolia O. Hoffm. 296.
- Dewindtia** D. W. 180.
katangensis D. W. 180.
- Dialium** L. 174.
acuminatum D. W. 174.
angolense Welch. 174.
guineense W. 174, 653.
Laurentii D. W. 171.
- Dianthera** *Australiana* B. et H. f. 429.
ovaliculata Retz. 433.
- Dicellandra** H. f. 214
Barteri H. f. 214.
 — v. *runcinata* D. W. 214.
- Diceros** *longifolium* Pers. 399.
- DICHAPETALACEAE**, 94
- Dichapetalum** Thun. 94.
adnatilorum Engl. 94.
congoense Engl. 94.
Dewevrei D. W. et T. D. 94.
floribundum Engl. 95.
olepetalum Ruhl. 94.
leucosepalum. Ruhl. 94.
Lolo D. W. et T. D. 94.
Lujaei D. W. et T. D. 94.
mombutense Engl. 94.
mundense Engl. 95.
obliquifolium Engl. 95, 652.
patenti-hirsutum Ruhl. 95.
Poggei Engl. 95.
rupile T. D. et Sch. 95, 652.
- Dichrocephala** DC. 299.
chrysanthemifolia DC. 299.
- Dichrocephala**
latifolia DC. 299.
macrocephala Sz-B. 299.
- Dichrostachys** W. et A. 185.
nutans Bth. 185.
platyptera Welch. 185.
- Dicliptera** Juss. 432.
Elliotii Cl. 432.
Hensii Lindau, 433.
katangensis D. W. 432.
umbellata Juss. 432.
verticillaris T. And. 432.
verticillaris A. Juss. 434.
Welwitschii S. Moore, 432.
- Dicoma** Cass. 313.
anomala Sond. 313.
 — v. *karaguensis* O. et H. 313.
karaguensis Oliv. 313.
Poggei O. Hoffm. 313.
- Dicraea** Thun. 466.
guangensis Engl. 466.
Warungii Engl. 466.
- Dicraeanthus** Engl. 466.
africanus Engl. 466.
- Dicranolepis** Pl. 471.
Baertsiana D. W. et T. D. 471
convalliflora Gilg. 471.
Thonneri D. W. et T. D. 471.
- Dictyandra** Welch. 256.
arborescens Welch. 256.
- Dictyophlebium** *lucida* Pierre, 328.
- Didymia** *cyperomorpha* Phil. 597.
- Diesingia** *scandens* Endl. 155.
- Digera** Forsk. 457.
avensis Forsk. 457.
- Digitaria** *diagonalis* Stapf, 631.
sanguinalis Scop. 634.
- DILLENIACEAE**, 16.
- Dimorphochlamys** H. f. 230.
Cabraei Cogn. 230.
Crepiniana Cogn. 230.
Mannii H. f. 230.
- Dinophora** Bth. 207.
spenneroides Bth. 207.
Thonneri Cogn. 207.
- Diolea** H. B. et K. 149.
reflexa H. f. 149.
- Diodia** L. 286.
breviseta Bth. 286.
foliosa W. et P. 286.
maritima Thom. 286.
scabra S. et T. 287.
scandens Ste. 286.
senensis Kl. 287.
serrulata K. Sch. 286.

- Dioscorea** L. 558.
 acrophyta D. W. 538.
 alata Willd. 559.
 apiculata D. W. 559.
 Beccariana Martelli, 559.
 Costermansiana D. W. 559.
 Demensei D. W. et T. D. 559.
 dumetorum Pax, 559.
 Liebrechtsiana D. W. 559.
 macroura Harms, 560.
 minutiflora Engl. 560.
 odoratissima Pax, 560.
 pentaphylla A. Rich. 559.
 praehensilis Bth. 560.
 — v. *minutiflora* Bak. 560.
 Preussii Pax, 560.
 petrocaulon D. W. et T. D. 560.
 Quartiniana A. Rich. 559.
 sativa L. 560.
 Schimperiana Hochst. 561.
 — v. *vestita* Pax, 561.
 Schlechteri Harms, 561.
 smilacifolia D. W. et T. D. 561.
 Thouneri D. W. et T. D. 561.
 triphylla A. Rich. 559.
 Verdickii D. W. 561.
DIOSCOREACEAE, 558.
Dioscoreophyllum Engl. 25.
 strigosum Engl. 25.
Diospyros L. 323.
 iucanata G. Don, 323.
 Loureriana G. Don, 323.
 — v. *heterotricha* Welch. 323.
 mespiliformis Hochst. 323.
 monbutensis Guerke, 323.
Dipcadi Medic. 569.
 Mechoan Engl. 569.
 Thollomanum Hua, 569.
Diphaca cochinchinensis Lour. 138.
Diplorhynchus Welch. 339.
 angolensis Bth. 339.
 angolensis Britten, 339.
 mossambicensis Bth. 339.
 Poggei K. Sch. 339.
 Welwitschii Rolfe, 339.
 Dipodium umbellatum O. K. 432.
 Diporidium Schweinfurthianum V. Tgh. 86.
 Diprochona membranacea V. Tgh. 86.
DIPSACEAE, 288.
Dipteracanthus patulus Nees, 419.
DIPTEROCARPACEAE, 47.
Dipterthea Kotschyi Sz Bip. 306.
Disa Berg. 536.
 aurantiaca R. f. 536.
 erubescens Rendle, 536.
 katangensis D. W. 537.
 Leopoldii Kizl. 536, 537.
 ochrostachya Rehb. f. 536, 537.
 Verdickii D. W. 537.
 Walleri Rehb. f. 537.
 Welwitschii R. f. 537.
Dischistostylis pubescens Lindau, 424.
Disperis Nic. 538.
 aphylla Krzl. 538.
Dissotis Bth. 208.
 aquatica D. W. 208.
 Antraniana Copi. 208.
 Brazzaei Copi. 208.
 capitata H. f. 208.
 — v. *Vogelii* H. f. 208.
 cordata Gilg, 208.
 cornifolia H. f. 209.
 debilis Triana, 209.
 decumbens Triana, 209.
 — v. *minor* Copi. 209.
 falcipila Gilg, 210.
 Gilgiana D. W. 210.
 Gilletii D. W. 210.
 gracilis Copi. 210.
 Heussii Copi. 210.
 incana Triana, 211.
 Irvingiana Hook. 211.
 laevis H. f. 210.
 lanceolata Cogn. 209.
 macrocarpa Gilg, 211.
 multiflora Triana, 211.
 phaeotricha Triana, 211.
 plumosa H. f. 212.
 prostrata Triana, 212.
 rotundifolia Triana, 211.
 Schweinfurthii Gilg, 212.
 segregata Bth. 212, 654.
 Serei D. W. 212.
 Thollonii Copi. 212.
 Verdickii D. W. 213.
 villosa Engl. 209.
 villosa H. f. 211.
Dolichandrone Fenzl, 410.
 lutea Bth. 410.
 tomentosa Bth. 410, 716.
Dolicholus calycinus Hieron, 157.
caribaeus Hieron, 157.
Dolicholus Memnonia, Hieron, 158.
 minimus Hieron, 159.
Dolichos L. 156.
 bilobus L. 156.
 bulbosus L. 155.
 Catjang L. 153.
 dubius D. W. 156.
 esculentus D. W. 156.
 Gulu D. W. 156.
 Hendrickxii D. W. 156.
 Katab D. W. 156.
 Lalab L. 156.
 obovatus S. et T. 149.
 obtusifolius Lam. 149.
 ovalifolius S. et T. 149.
 pseudopachyrhizus Harms, 156.
 pteropus Bak. 142.
 serpens D. W. 156.
 sinensis L. 153.
 splendens Welch. 156.
 stenoearpa Hochst. 154.
 trinervis D. W. 157.
 Verdickii D. W. 157.
Dombeya Cav. 64.
 Goetzei K. Sch. 64.
 katangensis D. W. et T. D. 64.
 Kindiana D. W. et T. D. 64.
 myriantha K. Sch. 64.
 niangaraensis D. W. 64.
 Serei D. W. 61.
Donax arillata K. Sch. 547.
 azurea K. Sch. 545.
 congensis K. Sch. 548.
 cuspidata Bak. 548.
 filipes K. Sch. 548.
 Schweinfurthiana K. Sch. 548.
Dorstenia L. 502.
 Deboersta D. W. et T. D. 502.
 Gilletii D. W. 502.
 kameruniana Engl. 503.
 Klainei Pierre, 502.
 Laurentii D. W. 502.
 Lujae D. W. 502.
 lukafuensis D. W. 502.
 mozambicensis D. W. 502, 656.
 Poggei Engl. 503.
 Psilurus Welch. 503.
 scabra Engl. 503.
 scaphigera Bur. 503.
 Verdickii D. W. et T. D. 503, 656.
 yambuyaensis D. W. 503.
Dracaena L. 561.
 arborea Lk. 554.
 Aubryana Ad. Brongn. 567.
 Buettneri Engl. 564.

- Dracaena**
Burkeana Pl. 564.
Butayei D. W. 564.
capitulifera D. W. et T. D. 565.
congensis Engl. 565.
fragrans Ker. 565.
Gentili D. W. 565.
Godseffiana Hort. 566.
hirsuta Thunb. 575.
Lacourtii Hort. 566.
Kindtiana D. W. 565.
Laurentii D. W. 565.
laxissima Engl. 565.
Liudeni Hort. 565.
nitens Welw. 566.
Oddouii D. W. 565.
Poggei Engl. 566.
 — v. *elongata* D. W. 566.
reflexa Lam. 566.
 — v. *Buchneri* Engl. 566.
 — v. *nitens* Bak. 566.
rubro-aurantiaca D. W. 566.
spicata Roxb. 567.
 — v. *aurantiaca* Bak. 567.
surculosa Ldl. 566.
thalioides Ch. Morr. 567.
ueleensis D. W. 567.
usambarensis Engl. 567.
 — v. *longifolia* D. W. 567.
- Dregea** E. Mey. 366
rubicunda K. Sch. 366.
- Drepanocarpus** G. Mey. 163.
lunatus G. Mey. 163.
- Drimys** *altissima* Ker. 570.
- Drimiopsis** Ldl. 571.
Barteri Bak. 571.
- Droogmansia** D. W. 141.
longipedicellata D. W. 141.
megalantha D. W. 141.
pteropus D. W. 142.
Stuhlmannii D. W. 142.
- Drosera** L. 193.
Burkeana Pl. 193.
indica L. 191.
- DROSERACEAE**, 193
- Drymaria** W. 41.
cordata W. 41.
Dufourea alternifolia W. 465.
Dupuista juglandifolia Rich. 115.
- Duranta** L. 436.
erecta L. 436.
Plumieri Jacq. 436.
- Duvernoya** E. Mey. 431.
Dewevrei D. W. et T. D. 431.
- Duvernoya**
extensa Lindau, 655.
haplostachya Lindau, 431.
Verdickii D. W. 431.
- Dyschoriste** N. es. 418.
Peroutetii O. K. 418.
Verdickii D. W. 419.
verticillaris Cl. 419.
- E**
- EBENACEAE**, 323.
- Ecataphyllum** P. Br. 163.
Brownii Pers. 163.
Mouetaria Pers. 163.
pachycarpum D. W. et T. D. 163.
- Echinochloa* *Crus-galli* P. B. 631.
- Echinodorus** L. C. Rich. 593.
humilis Buchen. 593.
- Echinolaena polystachya* H. B. et K. 634.
- Echinolytrum dipsaceum* Desv. 617.
- Echinops** L. 313.
Korobori D. W. 313.
Sereti D. W. 313.
- Eclipta** L. 305.
africana DC. 307
alba Hassk. 305.
cantirhiza DC. 307.
erecta L. 305.
filicantis S. et T. 307.
Ecliptica alba O. K. 305.
- Ectadiopsis** Bth. 356.
Buettneri K. Sch. 356.
scandens K. Sch. 356.
- Ectinocladius** *Benthani* Baill. 351.
- Edwardia Afzelii* O. K. 61.
lurida Raf. 61.
- Ecassia** *Laurentii* D. W. 67.
laurifolia Fierre, 67.
Pierreana D. W. 68.
- Ehretia** L. 377.
abyssiunica R. Br. 377.
Guerkeana D. W. 378.
longistyla D. W. et T. D. 378.
- Eichornia** *Kth.* 573.
natans Solms, 573, 656.
- Elaeis** *Jacq.* 586.
guineensis L. 586.
- Eleocharis** R. Br. 612.
atropurpurea *Kth.* 612.
capitata R. Br. 613.
Chartaeia R. et S. 613.
fistulosa *Schult.* 613.
- Elephantopus** L. 297.
multisetus O. Hoffm. 297.
- Elephantopus**
scaber L. 297.
- Eleusine** *Gaertn.* 644.
Coracana *Gaertn.* 644.
eruciata Lam. 644.
indica *Gaertn.* 644.
Luco Welw 614.
textilis Welw 644.
- Eleutherine** *Herb.* 553.
plicata *Herb.* 553.
- Elionurus** H. et B. 623.
argenteus Nees, 623.
argenteus T. D. et Schunz, 623.
Hensii K. Sch. 623.
- Elsholtzia** W. 453.
Schimperi *Hochst.* 453.
- Elytraria** *Vahl.* 415.
arenata *Vahl.* 415.
marginata *Vahl.* 415.
- Elytrophorus** P. B. 645.
articulatus P. B. 645.
- Embelia** *Burm.* 319.
retusa *Gilg.* 319.
- Emerus** *Sesban* O. K. 137.
- Emilia** *tass.* 311.
caespitosa *Oliv.* 311.
flammea *Cass.* 311.
graminea *DC.* 311.
integrifolia *Bak.* 311.
sagittata *DC.* 311.
sonchifolia *DC.* 311.
- Emiliomarcelia** *Th.* et *Hél.* *Dur.* 115.
Braunii *Th.* et *Hél.* *Dur.* 115.
congensis *Th.* et *Hél.* *Dur.* 115.
Laurentii *Th.* et *Hél.* *Dur.* 115.
Oddoni *Th.* et *Hél.* *Dur.* 115.
- Eminia** *Taub.* 146.
Harmsiana D. W. 146.
- Enephalartos** *Lehm.* 649.
Laurentianus D. W. 649.
Lemariellianus D. W. et T. D. 649.
- Enhydra** *Lour.* 305.
fluctuans *Lour.* 305.
Helon *ha* *DC.* 305.
longifolia *DC.* 305.
patulosa *DC.* 305.
Ensete edulis *Horan.* 550.
- Entada** *Adans.* 183.
abyssiunica *St.* 183.
africana *G.* et *P.* 183.
scandens *Bth.* 184.
scandens *Schw.* 184.
 — v. *pauciflora* D. W. 184.
- Entandrophragma** C. D. C. 93.
Candolleianum D. W. et T. D. 93.

- Eragrostis** *P. B.* 615.
atrovirens Nees, 645.
Brownei *P. B.* 616.
Chapellieri Nees, 646.
ciliaris Lk, 646.
fasciculata Trin 646.
interrupta *P. B.* var
namaquensis T. D. et
 Schinz. 647.
major Host, 646.
megastachya Lk, 646.
multiflora Asche's, 646.
namaquensis Nees, 647.
nutans Roxb. 647.
oariensis St. 648.
patens Oliv. 646, 647.
 — *v.* *congoensis* Franch.
 647.
sabulicola Pilg. 647.
tremula Hochst. 647.
tubiformis Hack. 647.
verticillata Roxb. 647.
Eranthemum *elegantis* R.
 et S. 421.
Ludoricium Buett.
 428.
nigrilatum T. And. 429.
Eremospatha *W. et M.*
 585.
Cabrae D. W. 585.
cuspidata Wendl. 585.
Hauilvilleana D. W.
 585.
Hookeri Wendl. 585.
 ERICACEAE, 319.
Ericinella *Kl.* 319.
Mannii *H. f.* 319.
Eriperon *aegyptiacum* L.
 300.
stipitatum Sch. et Th.
 301.
Eriobotrya japonica Ldl.
 192.
Eriocaulon radicans Bth.
 594.
 ERIOCAULONACEAE,
 593.
Eriocoelum *H. f.* 112.
macrosperrum Gilg,
 112.
microsperrum Rdlk.
 112.
pauciculatum Bak. 653.
*Eriolindron anfractu-
 osum* DC. 60.
Eriosema *DC.* 159.
adniss D. W. 159.
cajanoides *H. f.* 159.
elongatum Baill. 160.
Gilletii D. W. et T. D.
 159.
glomerata Baill. 159.
glomeratum *H. f.* 159.
 — *v.* *elongatum* Bak.
 160.
 — *f.* *microphyllum* D.
 W. 160.
- Eriosema**
griseum Bak. 160.
hollophyllum Bak. 116.
Laurentii D. W. 160.
parviflorum E. Mey.
 160.
psoratoides G. Don, 159.
pulcherrimum Taub.
 160.
sericeum Bak. 160.
tuberosum Hochst. 161.
Verduckii D. W. 161
- Erythrina** *L.* 147
abyssinica Lam. 147,
 653.
Droogmansiana D. W.
 et T. D. 147.
Gilletii D. W. 147.
huillensis Wehr. 148.
Sereti D. W. 148.
suberifera Wehr. 148.
tomentosa R. Br. 147.
- Erythrocephalum** *Bth.*
 315.
erectum Klatt, 315.
- Erythrococca** *Bth.* 491.
aculeata Bth. 491
- Erythropleum** *Afz.*
 182.
guineense Don, 182.
ordale Bolle, 182
- Erythropyxis** *Pierre* 67.
Eetvilleana D. W. et T.
 D. 67.
- Erythroxylo** *L.* 76.
Coca Lam. 76.
- Ethulia** *L.* 289.
conyzoides *L.* 289.
gracilis DC. 289.
- Euaenia** *Oliv.* 33.
alimensis Hua, 33.
trifoliata B. et H. f. 33.
- Eucalyptus** *L'Hér.* 206.
globulus L'Hér. 204.
robustus Sm. 201.
viminialis Lab. 204.
- Euclaste** *Franch.* 649.
graminea Franch. 649.
- Euclea** *L.* 323.
divinorum Hiern, 323.
katangensis D. W. 323.
- Eugenia** *L.* 202.
calophylloides D. C. 202.
caryophylloides Bth.
 202.
cordata Laws. 203.
Demensei D. W. 202.
 — *f.* *lukolelaensis* D. W.
 202.
Dewevrei D. W. et T. D.
 202.
guineensis Hiern, 203.
Jambos L. 202.
Jambosa Elliott, 202.
Laurentii Engl. 202.
Micheli Lam. 203.
oariensis P. B. 203.
- Eugenia**
umbiflora *L.* 203.
- Eulophia** *R. Br.* 518.
antemusepala Schlt.
 521.
arenaria Bolus, 521.
Bieleri D. W. 518.
congoensis Cogn. 518.
cyrtosoides Schlt. 518.
diloba Schltr, 521.
flavo purpurea Rolfe,
 526.
gigantea N. E. Br. 521.
gracilis Ldl. 518.
gracilis D. W. 519.
graciliscapa Schltr, 519.
guineensis Ldl. 519.
Laurentiana Krzl. 519.
Lehoni Stein, 521.
Leopoldi Krzl. 519.
Lindleyana Schltr, 522.
Lubbersiana Em. Laver.
 519.
Lujacana Krzl. 519.
lurida Ldl. 519.
 — *v.* *latifolia* D. W. 520.
maculata Auct. 521.
porphyroglossa Bolus,
 522.
pyrophila Schltr, 523.
Smithii Rolfe, 520.
speciosa Rolfe, 520.
Tanganika Krzl. 520.
Walleri Krzl. 520.
Welwitschii Rolfe, 520.
- Eulophidium** *Pritz.* 520.
Ledenii D. W. 520.
- Eupatorium** *L.* 298.
aficanum O. et H. 298.
scandens L. 298.
- Euphorbia** *L.* 477.
Candelabrum Trém. 655.
cyprisoides Pax. 477.
decumbens Forsk. 477.
graminea Jacq. 477.
Grantii Oliv. 477.
Heriortiana Ch. Lcm.
 477.
hypericifolia L. 477.
indica Lam. 477.
Laurentii D. W. 478.
pilulifera L. 478.
Poggei Pax, 478.
prostrata Ait. 478.
Quintasii Pax, 478.
Sapini D. W. 478.
Sereti D. W. 478.
splendens Boj. 478.
thymifolia Borna. 479.
Tirucalli L. 479.
tumbaensis D. W. 479.
Verduckii D. W. 479.
- EUPHORBACEAE.** 476.
Euxolus caudatus Moq.
 458.
viridis Moq. 458.

Evolvulus L. 379.
 alsuoides
 — v. *erectus* Schw. 380.
 — v. *procumbens* Schreb. 379.
 — v. *strictus* Kl. 380.
hederaceus Burm. 382.
heterophyllus Lab. 380.
linifolius L. 380.

Exacum L. 374.
 quinquevium Griseb. 374.

Excoccaria Manniana M.-A. 500.

Exochaeum Griseb. 373.

chionanthum Schinz, 373.
debile Welw. 374.
Genitii D. W. 373.
Teuszii Schinz, 374.
Wildemanianum Gilg. 374.

Exomicrum *Cabrae* V. Tgl. 87.
coriaceum V. Tgl. 87.
densiflorum V. Tgl. 87.
Dewevrei V. Tgl. 87.
pellucidum V. Tgl. 88.
Exostemma capitatum Spreng. 472.

F

Fabricia *nunmularifolia* O. K. 145.

Fadogia Schreb. 270.
ancylantha Schreb. 270.
Butayi D. W. 270.
Cienkowskii Schreb. 270.
fuchsioides Welw. 271.
lactiflora Welw. 271.
tomentosa D. W. 271.
Verdiekii D. W. et T.D. 271.

Fagara L. 81.
Gilletii D. W. 81.
Laurentii D. W. 81.
macrophylla Engl. 81.
 — v. *Preussii* Engl. 81.
pilosiuscula Engl. 81.
Poggei Engl. 81.
Welwitschii Engl. 81.

Fara Welw. 375.
affinis D. W. 375.
paradoxa Gilg. 375.
salutaris Welw. 375.

Faurea Harv. 470.
saligua Harv. 470.

Feretia Del. 264.
apodanthera Del. 264, 654.

Ferrolia *Mobola* O. K. 191.
Ferreola guineensis S. et T. 323.

Feuillea pedata Sin 226.
Feuillea Lebbek O. K. 188.

Nassa O. K. 188.
versicolor O. K. 188
Zygia O. K. 187

FICOIDACEAE. 236.

Ficus L. 504.
ardisioides Warb. 504.
artocarpoides Warb. 504.
Bubu Warb. 504.
Cabrae Warb. 504.
capensis Thunb. 504.
 — v. *pubescens* Warb. 505.

chlamydodora Warb. 504.

congeusis Engl. 504.
corylifolia Warb. 504.
 — v. *glabrescens* Warb. 505.

crassicocta Warb. 505
cyathistipula Warb. 505.

Demeusei Warb. 505.
Dewevrei Warb. 505.

Dreypondtiana Gent. 656.

Dusenii Warb. 505.
erubescens Warb. 505.

exasperata Vahl, 505.
furcata Warb. 505.
Gilletii Warb. 505.

iukasuensis Warb. 506.
kinuuzensis Warb. 506.

kisantuensis Warb. 506.
Laurentii Warb. 506.

Liugua Warb. 506.
megalodisca Warb. 506.

megaphylla Warb. 506.
 — v. *glabra* Warb. 506.

monbuttuensis Warb. 506.

Munsae Warb. 506.
Nekbuda Warb. 507.

niamniameensis Warb. 507.

octomelifolia Warb. 507.
pachypleura Warb. 507.

paludicola Warb. 507.
persicaefolia Warb. 507.
 — v. *angustifolia* Warb. 507.

— v. *glabripes* Warb. 507.

platyphylla Delile, 507.
polybractea Warb. 507.

Preussii Warb. 508.
pubicocta Warb. 508.

punctifera Warb. 508.
Rokko Warb. et Schreb. 508.

scolopophora Warb. 508.
stellulata Warb. 508.

Ficus stellulata v. *glabrescens* Warb. 508

subcalcarata Warb. et Schreb. 508.

syringaeifolia Warb. 508.
syringaeifolia Warb. 507.

triangularis Warb. 509.
Vallis-Choudae Delile, 509.

variifolia Warb. 509.
villosipes Warb. 509.

Wildeamaniana Warb. 509.

xiphophora Warb. 509.
Fillaea suaveolens G. et P. 182.

Fillaecopsis *Harms*, 184.
discophora *Harms*, 184.

Fimbristylis *Vahl*, 613.
abortiva Steud. 613.

andongense Cl. 613.
autumnalis Boeck. 616.

barbata Bth. 614.
cardiocalpa Ridl. 614.

Cioniana P. Savi, 616.
complanata Lh. 616.

complanata Retz. v. *splendida* Cl. 618.

dichotoma Vahl, 616.
diphylla Vahl, 616.

dipsacea Bth. 616.
exilis R. et S. 617.

— v. *lexinuz* Cl. 616.
ferruginea Vahl, 617.

Hensii Cl. 617.
hispidula Kth, 617.

hispidula Kth, v. *Lioniana* Boeck. 616.

laniceps K. Sch. 615.
Lioniana Steud. 616.

monostachya Hassk. 617.
obtusifolia Kth, 617.

pusilla A. Rich. 615.
quinquangularis Kth, 618.

scabrida Schum. 618.
splendida Cl. 618.

squarrosa Vahl, 618.
Flabellaria *Cav.* 77.

paniculata *Cav.* 77.
Flagellaria L. 538.

guineensis S. et T. 538.
indica Thoms. 538.

FLAGELLARIACEAE, 538.

Fleurya *Gaud.* 511.
aestuans *Gaud.* 511.

interrupta *Gaud.* 511.
podocarpa *Wedd.* 511.

Floscopa *Lour.* 582.
africana Cl. 582.

glomerata *Hassk.* 582.
rivularis Cl. 583.
 — v. *minor* Cl. 583.

- Floscopa**
Schwinfurthii *Cl.* 583.
- Flueggea** *Waldl.* 483.
microcarpa Bl. no. 484.
obovata *Wall.* 483.
- Fockea** *Eddl.* 366.
multiflora *K. Sch.* 66.
Schinzii *N. E. Br.* 366.
- Fuirena** *Rottb.* 619.
chlorocarpa *Kidl.* 619.
umbellata *Rottb.* 619.
- Funtumia** *Stapf.* 349.
africana *Stapf.* 350.
elastica *Stapf.* 349.
Gilletii *D. W.* 350.
latifolia *Stapf.* 350.
- G**
- Gabunia** *K. Sch.* 313.
eglandulosa *Stapf.* 313.
Gentlii *D. W.* 343.
- Gaertnera** *Lam.* 373.
paniculata *Bth.* 373.
plagiocalyx *K. Sch.* 373.
- Galium** *L.* 288.
stenophyllum *Bak.* 288.
— *v. longifolium* *D. W.*
et *T. D.* 288.
Gambeya africana *Pierre,*
320.
- Garcinia** *L.* 46.
Giadidi *D. W.* 46.
Gilletii *D. W.* 46.
Livingstonii *T. And.* 47.
longeacuminata *Engl.*
46, 651.
Inalabensis *Engl.* 46,
651.
Mannii *Oliv.* 46.
ovalifolia *Oliv.* 47.
Pierreana *D. W.* 47.
polyantha *T. D.* et *Sch.*
47.
punctata *Oliv.* 47.
Pynaertii *D. W.* 47.
Seuretii *D. W.* 47.
- Gardenia** *L.* 261.
acuminata *G. Don,* 258.
bigonniiflora *Welw.*
262.
calycina *G. Don,* 262.
coccinea *G. Don,* 248.
crinita *Alz.* 254.
Jovis-tonantii *Hiern,*
261.
Leopoldiana *D. W.* et *T.*
D. 261.
pulchella *G. Don,* 254.
Seuretii *D. W.* 261.
Sherbourniae *Hock* 262.
speciosa *A. Rich.* 259.
Stanleyana *Hook.* 259.
Thunbergia *Auct.* 261.
Vogelii *H. f.* 261.
- Geissaspis** *W. et A.* 140.
bifoliolata *M. Bieb.* 140.
Descampsii *D. W.* et *T.*
D. 141.
- Geissorhiza** *Ker.* 552.
Briartii *D. W.* et *T. D.*
552.
- Geniosporum** *Wall.* 443.
congoense *Gussone,* 413.
scabridula *Brig.* 444.
- GERANIACEAE, 373.
- Genyorchis** *Schltr.* 517.
pumila *Schltr.* 517.
- Geophila** *D. Don,* 283.
Aschersoniana *Buett.*
283
hirsuta *Bth.* 283.
— *v. brevifolia* *D. W.* 283.
— *v. hirsutissima* *D. W.*
283.
— *v. stricta* *D. W.* 284.
involuta *Schw.* 281.
654
obvallata *F. Didr.* 284.
renaris *D. W.* et *T. D.*
284.
reniformis *D. Don,* 284.
- GERANIACEAE, 78.
- Geranium** *L.* 78.
aculeolatum *Oliv.* 78
- Gerardia** *Bregeana*
Hochst. 105.
- Gerbera** *Gronov.* 315.
piloselloides *Cav.* 315.
- GESNERACEAE, 408.
- Giesekia** *L.* 237.
Miltus *Fenzl.* 237.
pharnaceoides *L.* 237.
- Gigalobium abyssinicum**
Hiern, 183.
- Gigantimum scandens**
Welw. 169.
- Gilletiella** *D. W.* et *T. D.*
413.
congolana *D. W.* et *T.*
D. 413.
- Girardinia** *Gaud.* 512.
condensata *Weidl.* 512.
— *v. adoensis* *Engl.* 513.
- Gladiolus** *L.* 553.
angolensis *Welw.* 553.
Arnoldianus *D. W.* et *T.*
D. 553.
brevicaulis *Bak.* 553.
cornuus *Oliv.* 553.
Quartinius *A. Rich.*
553.
Verdickii *D. W.* et *T.*
D. 553.
- Glins lotoides** *Loeff.* 236.
mozambicensis *Spreng.*
237
Sprengii *Steud.* 236.
- Gloriosa** *L.* 572.
simplex *L.* 572.
superba *L.* 572.
- Gloriosa**
rirescens *Ldl.* 572.
- Glycine** *L.* 146.
Gilletii *D. W.* 146.
holophylla *Taub.* 146.
javanica *L.* 147.
— *f. glabrescens* *Buett.*
147.
kisantucensis *D. W.* 147.
memnonia *Del.* 158.
nücrantha *Hochst.* 147.
nombiflorais *Hochst.*
147
rufa *S.* et *T.* 159.
- Glyphaea** *H. f.* 74.
grewioides *H. f.* 74.
Monteiroi *H. f.* 74.
- Gnaphalium** *L.* 303.
argyrosphaerum *Sz-B.*
303.
luteo-album *L.* 303.
nudifolium *L.* 304.
- GNETACEAE, 649.
- Gnetum** *L.* 649.
africanum *Welw.* 619.
- Gnidia** *L.* 470.
apiculata *Gilg.* 470.
Butayei *D. W.* 470
flava *Ldl.* 471.
involuta *St. v. apiculata*
Oliv. 470.
katangensis *Gilg.* 471.
Olivieriana *Engl.* et *Gilg.*
471.
Poggei *Gilg.* 471.
rubro-cincta *Gilg.* 471.
- Gomphia affinis** *H. f.* 86.
flava *S.* et *T.* 89.
reticulata *P. B.* 89.
- Gomphocarpus** *R. Br.*
359.
abyssinicus *Decne.* 360.
affinis *D. W.* 362.
amoensis *K. Sch.* 359.
bissaculatus *Oliv.* 360.
Buchwaldii *Schltr.* 362.
congolensis *D. W.* 362.
cristatus *Decne.* 359.
dependens *K. Sch.* 359.
Deccreyi *D. W.* 362.
erectus *D. W.* 362.
foliosus *K. Sch.* 359.
fruticosus *R. Br.* 359.
katangensis *D. W.* 362.
lineolatus *Decne.* 360.
paluster *K. Sch.* 359, 360.
roseus *K. Sch.* 360.
semiamplectens *K. Sch.*
360.
tommentosus *Burch.* 360.
- Gomphrena** *L.* 461.
globosa *L.* 461
sessilis *L.* 460
rennueclaris *L.* 461.
- Gonatopus** *H. f.* 588.
Boivini *H. f.* 588.

Gonatopus

Boivini v. angustifolius Th. et Hel. Dur. 588.

Gongronema latifolium Bth. 365.

Gossypium L. 58.

arborescens L. 58.
arborescens L. 58.
barbadense L. 58.
hirsutum L. 58.
punctatum S. et T. 58.

Gouania Jacq. 104.

longipetala Hemsl. 104, 652.

Sereti D. W. 104.

GRAMINACEAE, 621.

Grangea Adans. 299.

maderaspatana Poir. 299.

Sphaeranthus C. Koch. 400.

Gratiola parviflora Roxb. 400.

Grewia L. 68.

africana Mast. 68.
barombiensis K. Sch. 68.

batangensis C. H. Wright. 68.

carpinifolia Juss. 68.
coriacea Mast. 68.

floribunda Mast. 69.
— v. *latifolia* D. W. 69.

Laurentii D. W. 69.
malacocarpoides D. W. 69.

mollis Juss. 69.
occidentalis L. 69.

pinnatifida Mast. 69.
Sereti D. W. 69.

tetragastris R. Br. 69.
venusta Fresen. 69.

— v. *angustifolia* K. Sch. 70.

Grewiella O. K. 70.

Dewevrei Th. et Hel. Dur. 70.

— v. *subintegrifolia* Th. et Hel. Dur. 70.

globosa Th. et Hel. Dur. 70.

Grewiopsis Dewevrei D. W. et T. D. 70.

— v. *subintegrifolia* D. W. et T. D. 70.

globosa D. W. et T. D. 70.

Griffonia speciosa Tanb. 175

Grumilea Gaertn. 280.

moninensis Hiern. 280.
psychotrioides DC. 280.

venosa Hiern. 280.

Guaeca L. 92.

Laurentii D. W. 92.

Guercia gracillima K. Sch. 353.

Guercia laxiflora D. W. et T. D. 353.

Schumammiana D. W. et T. D. 353.

wropatala K. Sch. 353.

Guitandina Bonduc Ait. 170.

Moringa L. 116.

GUTTIFERACEAE, 45.

Guyopia Naud. 205.

intermedia Cogn. 205.

Gymnema R. Br. 364.

geminatum Hiern. 365.

rufescens Decne. 365.

subvolubile Decne. 364.

sylvestre R. Br. 364.

Gymnosporia W. et A. 100.

Gilletii D. W. et T. D. 100.

senegalensis Loes. 100.

— v. *mermis* Loes. 100.

Gymnotrix uniseta Nees. 639.

Gynandropsis pentaphylla DC. 29.

Gynura Cass. 310.

cernua Bth. 310.

— v. *coerulea* D. W. et T. D. 310.

coerulea O. Hoffm. 310.

crepidioides Bth. 310.

vitellina Bth. 310.

H

Habenaria Willd. 534.

Debeerstiana Krzl. 534.

Guingangae R. f. 534.

Haullevilleana D. W. 534.

ichneuimouea Ldl. 534.

Kitondo D. W. 535.

Laurentii D. W. 535.

macrura Krzl. 535.

Poggeana Krzl. 535.

procera Ldl. 535.

zambesina R. f. 535.

Haemanthus L. 556.

angolensis Welw. 556.

Arnoldianus D. W. et T. D. 556.

Cabrae D. W. et T. D. 556.

cinnabarinus Decne. 556.

diadema L. Linden. 556.

Eetveldeanus D. W. et T. D. 557.

Kalbreyeri Bak. 557.

Lescauwaeitii D. W. 557.

Lindeni N. E. Br. 557.

multiflorus Martyn. 557.

toxicarius Thunb. 557.

HAEMODORACEAE, 551

Halimum mosenbryanthemoides Hiern. 236.

Halleria L. 398.

lucida L. 398.

Halopegia K. Sch. 545.

azurea K. Sch. 545.

Hannoa Pl. 83.

gabonensis Pierre. 83.

Hardwickia Roxb. 181.

Mannii Oliv. 181.

Hariota Adans. 235.

parasitica O. K. 235.

Haronga Thou. 15.

madagascariensis Choisy. 45.

paniculata Lodd. 45, 651.

Harongana paniculata Pers. 45.

Harveya Hook. 401.

Thonneri D. W. et T. D. 401.

Hasskaria Baill. 491.

didymostemon Baill. 491.

Hecastaphyllum Brownei Benth. 163.

Hedyotis Bojeri Vatke. 244.

caffra St. 244.

capensis Lam. 245.

corymbosa Vatke. 245.

decumbens Hochst. 246.

dichotoma A. Rich. 246.

herbacea L. 246.

lanceifolia S. et T. 246.

macrophylla Leprieur et Perr. 244.

pentandra S. et T. 244 et 247.

sabulosa DC. 245.

setifera Sond. 244.

Hedysarum deltoideum S. et T. 143.

fruticulosum S. et T. 143.

granulatum S. et T. 144.

nummularifolium L. 145.

pictum Jacq. 145.

triflorum L. 144.

vaginale L. 145.

Heeria Meissn. 115.

abyssinica O. K. 115.

— v. *lanceolata* Th. et Hel. Dur. 116.

— v. *latifolia* Engl. 116.

pulcherrima O. K. 116.

Heinsia DC. 254.

densiflora Hiern. 254.

— v. *occidentalis* D. W. 254.

jasminiflora DC. 254.

pulchella K. Sch. 254.

— v. *hispidissima* K. Sch. 254.

- Heinsia**
pulchella v. phyllocalyx
K. Sch. 254.
- Heisteria** L. 96.
parvifolia Sm. 96.
- Helleocharis atropurpurea**
Koch. 612.
capitata Boeck. 613.
Chaetaria Boeck. 613.
fistulosa Boeck. 613.
- Helianthus** L. 306.
annuus L. 306.
- Helichrysum** Gaertn.
303.
argyrosphaerum DC.
303.
auriculatum Less. 303.
fulgidum W. 303.
geminatum Klatt. 303.
Mechowianum Klatt.
304.
nudifolium Less. 304.
pachyrhizum Harv. 304.
panduratum O. Hoffm.
304.
subglomeratum Less.
304.
undatum Less. 304.
- Heliophyllum indicum**
DC. 378.
- Heliotropium** L. 378.
coromandelianum Retz.
378.
indicum L. 378.
kataugense Guerke,
378.
ovalifolium Forsk. 378.
- Helmia diometorum** Kth.
559.
- Herderia** Cass. 297.
lanceifolia O. Hoffm. 297.
stellulifera Bth. 297.
- Herniniera** G. et P. 138.
Elaphroxylon G. et P.
138.
- Herpestis calycina** Bth
399.
Monnieria T. D. et Sch.
401.
- Heteranthera** R. et P.
656
Kotschyana Fenzl. 656.
- Heteropteris** Kth. 76.
africana A. Juss. 76.
Smeathmanni DC. 77.
- Heterotis capitata** Bth.
209.
cornifolia Bth. 209.
plumosa Bth. 212.
prostrata Bth. 212.
sepre-pita Bth. 212.
- Hevea brasiliensis** M.-A.
488.
- Hewittia** W. et A. 381.
bicolor Walk.-Arn. 381.
sublobata O. K. 381.
- Hexalobus** A. DC. 20.
crispiflorus Auct. 20.
grandiflorus Bth. 20,
651
- Hibiscus** L. 53.
Abelmoschus L. 53.
calycinus W. 53.
calycosus A. Rich. 53.
calyphyllus Cav. 53.
cannabinus L. 53.
clandestinus Cav. 55.
congener S. et T. 53.
Cornetii D. W. et T. D.
57.
crassinervis Mast. 54.
crassinervis Hochst. 54
Debeerstii D. W. et T. D.
54.
digitatus Cav. 56.
diversifolius Jacq. 54.
Eetveldeanus D. W. et
T. D. 54.
esculentus L. 54.
ferrugineus Cav. 55.
fuscus Garcke, 55.
Gilletii D. W. 55.
gossypinus Thuub. 55.
Grantii Mast. 52.
Guerkeanus Hochreut.
55
hastatus Cav. 55.
laevisbracteatus D. W. et
T. D. 55.
Liebrechtsianus D. W.
et T. D. 55.
Masuianus D. W. et T.
D. 55.
micranthus L. 55.
ovariensis P. B. 53.
panduriformis Burm. 55.
physaloides G. et P. 53.
populneus L. 58.
radiatus Cav. 53.
rhodanthus Guerke, 56.
rostellatus G. et P. 56.
Sabdurilla L. 56.
strigosus S. et T. 57
submonospermus Hoch-
reut. 57.
surattensis L. 57
— v. *farccatus* Hochreut.
51.
— v. *rostellatus* Hoch-
reut. 56.
tiliaceus L. 57.
triumfettifolius S. et T.
53.
verrucosus G. et P. 53.
versicolor S. et T. 55.
virifolius L. 57.
Welwitschii Hieron. 57.
- Hillera elastica** Vell. 462.
- Hippocratea** L. 101.
apiculata Wcho. 101.
bipindensis Loes. 101.
Bruneelii D. W. 101.
- Hippocratea**
clematides Loes. 101.
cymosa D. W. et T. D. 101.
indica Willd. 101.
isangiensis D. W. 102.
myriaulha Oliv. 102.
obtusifolia Roxb. 102.
— v. *Richardiana* Loes.
102.
obtusifolia Schw. v. ob-
tusifolia Loes. 101.
Poggei Loes. 102.
Pynaertii D. W. 102.
Richardiana Camb. 102.
velutina Afz. 102.
Verdikii D. W. 103.
- HIPPOCRATEACEAE**,
100.
- Hoehnelia** Schno. 289.
vernonioides Schno. 289.
- Holalafia** Stapf. 352.
multiflora Stapf. 352.
- Holarrhena** R. Br. 345.
africana A. DC. 346.
africana Wulfsb. 346.
congolensis Stapf. 345.
febrifuga Kl. 345.
— f. *grandiflora* Stapf,
346.
floribunda T. D. et
Sch. 346.
Wulfsbergii Stapf. 346.
- Holcus halepensis** L. 627.
spicatus L. 638.
- Holosteum cordatum** L.
41.
- Homalium** Jacq. 219.
Abdessammadii D. W.
221.
Abdessammadii D. W.
et T. D. 220.
africanum Bth. 219.
bullatum Gilg. 220.
beweyrei D. W. et T. D.
220.
ealaense D. W. 220.
Gentilii D. W. 220.
Gilletii D. W. 220.
— v. *sessile* D. W. 220.
Laurentii D. W. 220.
nolle Stapf. 220.
setulosum Gilg. 220.
stipulaceum Wcho. 221.
Wildemanianum Gilg,
221.
- Honckenia** W. 73.
ficifolia W. 73.
- Hoslundia** Vahl, 447.
opposita Vahl, v. *verti-
cillata* Bak. 447.
verticillata Vahl, 447.
- Hua** Pierre, 66.
Gabonii Pierre, 66.
- Hugonia** L. 75.
obtusifolia C. H. Wright,
75.

Hugonia
platysepala Welw. 75, 652.
reticulata Engl. 75.
 — *f. longifolia* Engl. 75.
villosa Engl. 75.
Hunteria ambiens K. Sch. 338.
pycnantha Hall. f. 338.
Hybophrinum K. Sch. 546.
Braunianum K. Sch. 546.
 — *v. violaceum* D. W. et T. D. 546.
Hydrantheium H. B. et K. 401.
egense Poepp. 401.
HYDROCHARITA—
 CEAE. 514.
Hydrocotyle L. 237.
asiatica L. 237.
Hydrolea L. 377.
glabra S. et T. 377.
guineensis Choisy. 377.
HYDROPHYLLEA—
 CEAE. 377.
Hydrosme Schott. 589.
Eichleri Engl. 589.
Leopoldiana Mast. 589, 657.
Tenzii Engl. 589.
Hydrostachys Thou. 466.
Bismarckii Engl. 466.
Hygrophila R. Br. 416.
ciliata Burkill. 416.
Gilletii D. W. 416.
glandulosa Lindau. 419.
kataugensis D. W. 416.
Liudaviana Burkill. 416.
longifolia Nees. 416.
spinosa T. And. 416.
Hymenocallis Salisb. 558.
littoralis Salisb. 558.
seueganbica Kth et Bouché. 558.
Hymenocardia Wall. 486.
acida Tul. 486, 655.
Hendelotii M.-A. 487.
mollis Pax. 487.
 — *v. glabra* Pax. 487.
Poggei Par. 487.
ulmoides Oliv. 487, 655.
Hymenodyctyon Wall. 241.
fimbriolatum K. Sch. 241.
Hypalytrum argenteum Vahl. 619.
pulcherrimum K. Sch. 619.
Hyperanthera Moringa Vahl. 116.
HYPERICACEAE, 43.

Hypericophyllum compositarium Steetz. 309.
Hypericum L. 43.
laucolatum Lam. 43.
Quartinianum A. Rich. 44.
Hyphaene Gaertn. 586.
guineensis S. et T. 586.
ventricosa Kirk. 586.
Hypoestes R. Br. 433.
callicoma S. Moore. 433.
cancellata Nees. 433.
latifolia Hochst. 433.
mollis T. And. 431.
verticillaris R. Br. 433.
Hypolytrum Rich. 620.
africanum Nees. 620.
congensis Cl. 620.
neurum P. B. 620.
Hypoxis L. 554.
angustifolia Lam. 554.
Hyptis Jacq. 451.
brevipes Vait. 451, 453.
 — *v. elongata* D. W. et T. D. 451.
pectinata Poit. 452.
spicigera Lam. 452.

I

Icacina A. Juss. 99.
Guessfeldtii Aschers. 99.
Mannii Oliv. 99.
Ilysanthes Raf. 400.
parviflora Bth. 400.
Impatiens L. 79.
bicolor H. f. 79.
 — *v. brevifolia* Warb. 79.
Briartii D. W. et T. D. 79.
Declercqii D. W. 79.
Eminii Warb. 79.
 — *v. lanceolata* Warb. 79.
hians H. f. 79.
 — *f. glabra* D. W. 79.
Irvingii H. f. 79.
kataugensis D. W. 80.
Kerekhoveana D. W. 80.
Kirkii H. f. 80.
mayombensis D. W. 80.
refracta D. W. 80.
Sereti D. W. 80.
 — *f. tetrauculifera* D. W. 80.
Thonneri D. W. et T. D. 80.
Verdiekii D. W. 80.
Imperata Cyr. 621.
arundinacea Cyr. 621.
 — *v. Thunbergii* Rendle. 621.
cylindrica P. B. 621.
 — *v. Thunbergii* Hack. 621.
Thunbergii P. B. 621.

Indigofera L. 127.
astragalina DC. 127.
Binderi Kotschy. 127.
Butayei D. W. 127.
capitata Kotschy. 127.
congesta Welw. 127.
congolensis D. W. et T. D. 127.
Dewevei M. Mich. 127.
Dupuisii M. Mich. 128.
endecephylla Jacq. 128.
erythrogramma Welw. 128.
erythrogrammoides D. W. 128.
Garckeana Vatke. 128.
Gilletii D. W. et T. D. 129.
glutinosa S. et T. 130.
Hendelotii Bth. 129.
hirsuta L. 129.
kisantuensis D. W. et T. D. 129.
moerensis D. W. 129.
oligosperma DC. 130.
paucifolia DC. 129.
Poggei Taub. 126.
polysperma D. W. et T. D. 129.
polysphaera Bak. 128.
procera S. et T. 129.
Schimperi Jaub. 130.
scopa D. W. et T. D. 130.
secundiflora Poir. 130.
tetraptera Taub. 130.
tetrasperma S. et T. 130.
trita L. 130.
variabilis D. W. 131.
Indica africana O. K. 177.
ciuanensis Welw. 178.
Inula L. 304.
Engleriana O. Hoffm. 304.
Klingii O. Hoffm. 305.
Poggeana O. Hoffm. 304.
Iodes Bl. 100.
africana Welw. 100.
Laurentii D. W. 100.
Ionidium Vent. 33.
aneaspermum Vent. 33.
 — *v. thesiifolium* D. W. et T. D. 33.
thesiifolium DC. 33.
Ipomoea L. 384.
amoena Choisy. 384.
angustifolia Jacq. 382.
agustica Forsk. 389.
asclepiadea Hallier f. 381.
Barteri Bak. 384.
 — *v. subsericea* Hallier f. 384.
Batatas Poir. 385.

Ipomoea

- berariensis* Vatke, 391.
biloba Forsk. 389
bona-nox L. 390.
Brasseuriana D. W. 385.
cairica Sieber, 385
chryscides Ker, 382
chrysochaetia Hallier f. 385.
Dammeriana D. W. 386.
Debeerstii D. W. 386.
digitata L. 389.
elythrocephala Hallier f. 386.
eritocarpa R. Br. 385.
fimbriosepala Choisy, 386.
fragilis Choisy, 390.
fulvicaulis Boiss. 386
 — v. *depauperata* Hallier f. 386.
Gilletii D. W. et T. D. 386.
hederacea Jacq. 388
hispidula R. et N. 386.
hypoxantha Hallier f. 386.
involverata P. B. 387.
kenrocarpa Hochst. 388.
kenrocarpa Hochst. 387.
lasiophylla Hallier f. 387
lilacina Bl. 387.
littoralis Boiss. 387.
lukafuensis D. W. 388.
martiniensis Jacq. 381.
micrantha Hallier f. 388.
 — v. *hispidula* Hallier f. 388.
Nil Roth, 388.
ochracea G. Don, 388.
ophthalmantha Hallier f. 388.
ovariensis P. B. 384.
oxyphylla Bak. 387.
palmata Forsk. 385.
paniculata R. Br. 389
 — v. *indivisa* Hallier f. 389.
pentaphylla L. 383.
pes-caprae Roth, 389.
pes-draconis Choisy, 383.
polytricha Bak. 385.
Quamochil L. 390.
recta D. W. 389.
reptans Poir. 389.
shirensis Oliv. 381.
Smithii Bak. 386.
stipulacea Jacq. 385.
stolonifera Gmel. 383.
Stuehmannii Dammer, 387.
tenuis E. Mey 390.
velatipes Welw. 390.

Ipomoea

- Verdickii* D. W. 390.
vesiculosa P. B. 385.
Iresine L. 461.
vermicularis Moq. 461.
 IRIDACEAE, 552.
Irvingia L. f. 83.
Barteri H. f. 83.
Smithii H. f. 84.
Isachne R. Br. 629.
albena Trm. 629.
australis R. Br. 629
Buettneri Hack 629.
Isuarbia prostrata O. K. 219.
Isolepis capillaris Roem. 614
obtusifolia P. B. 618.
puberula St. 615.
trifida Kth. 614.
Isoloma Engl. et Diels. 23.
congolana Engl. et Diels, 23.
Deweyrei Engl. et Diels, 23.
pilosa Diels, 23.
Thouneri Engl. et Diels, 23.
Isonema R. Br. 349.
infundibuliflorum Stapf, 349.
Ixora L. 273.
coccinea L. 273.
euosmia K. Sch. 273.
Laurentii D. W. 273.
longipedunculata D. W. 273.
 — v. *Deweyrei* D. W. 273.
nitida S. et T. 274.
odorata H. f. 273.
radiata Hiern. 273.
 — v. *latifolia* D. W. 273.
Sereti D. W. 274.
Soyauxii Hiern. 274.

J

- Jacquemontia** (Choisy), 381.
capitata G. Don, 381.
Jambosa ovariensis DC. 203.
vulgaris DC. 202.
Jardinea *gabonensis* Steud. 623
Jasminomerium dulce O. K. 337.
edule O. K. 337.
Jasminum L. 324.
dichotomum Vahl, 324
guineense G. Don, 324.
noctiflorum Afz. 324.
Schweinfurthii Gilg. 324.
ternum Kth. 324.

Jasminum

- Verdickii* D. W. 324.
Jateorhiza strigosa Miers, 21.
Jatropha L. 488.
Cucias L. 488.
Manihot L. 490.
multifida L. 489.
Jaumea Pers. 309.
compositarum B. et H f. 309.
congensis O. Hoffm. 309.
Josephia augusta Vell. 455.
Juncellus Cl. 596.
laevigatus Cl. 596.
pustulatus Cl. 597.
Jussieua L. 218.
acuminata Bth. 218.
diffusa Forsk. 219.
limfolia Vahl, 218.
pilosa Kth. 218.
repens L. 218.
suffruticosa L. 219.
villosa Lam. 219.
Justicia L. 429.
Antelliana T. And. 429.
Betonica L. 431.
hicalyculata Vahl, 433.
brunellodes Lam. 416.
calcarata Hochst. 430.
cancellata V. 433.
elegans P. B. 421.
Emuii Lindau, 429.
extensa T. And. 431, 655.
gangetica L. 428.
Garckeana Buett. 429.
insularis T. And. 429.
Karschiana Buett. 429.
matamensis Oliv. 430.
opaca Vahl, 426.
palustris T. And. 430.
Paxiana Lindau, 430.
Poggii Lindau, 430.
Rostellaria Lindau, 430.
tenella T. And. 430.
umbellata Vahl, 432.
Verdickii D. W. 431.
verticillaris L. f. 434.

K

- Kaempferia** L. 539.
aethiopica Bth. 539.
Deweyrei D. W. et T. D. 539.
pallida D. W. 539.
pleiantha K. Sch. 539.
Kalaharia spinescens Guerke, 440.
spines Baill. 440.
Kalanchoe Adams 193.
coccinea Welw. 193.
 — v. *subsessilis* Britton, 193.
Cuisini D. W. et T. D. 193.

Kalanchoe

glandulosa Hochst. 193.
— *v. benguelensis* Engl. 193.

Kickxia africana Stapf. 350.

congolana D. W. 350
elastica Preuss. 349.
Gilletii D. W. 350.
latifolia Stapf. 350.

Kigelia D. C. 411.

aethiopica Decne. 411.
africana Bth. 412.

Kiggelaria paniculata Sch. 189.

Kirkia Oliv. 84.

acuminata Oliv. 84.
— *v. cordata* D. W. 84.

Klainedoxa Pierre. 84.

gabonensis Pierre. 84.
— *v. oblongifolia* Engl. 84.

Kleinia L. 313.

fulgens H. f. 313.

Kniphofia Salisb. 564.

dubia D. W. 564.

Kohautia scvferu DC. 244.

Kosteletzkya Presl. 52.

Buettneri Guerke. 52.

Grantii Garcke. 52.

Kyllinga umbellata Rottb. 599.

Kyllinga Rottb. 610.

albiceps Cl. 610.

aromatica Ridl. 610.

aurata Nees. 610.

brevifolia Rottb. 610.

bulbosa P. B. 612.

capitata P. B. 611.

elatior Kth. 610.

erecta Schumacher. 610.

— *v. Soyauxii* Cl. 610.

Filicula Cl. 611.

macrocephala A. Rich. 610.

melanosperma Nees. 611.

Naumanoviana Boeck. 611.

nigritana Cl. 611.

peruviana Lam. 611.

planiceps Cl. 611.

polyphylla W. 611.

pumila Mchx. 611.

— *v. Filicula* Cl. 611.

— *v. rigidula* Cl. 611.

657.

pungens Lh. 612.

rigidula St. 611.

Soyauxii Boeck. 610.

sphaerocephala Boeck. 612.

squamulata Thom. 612.

teres Cl. 612.

triceps Rottb. 612.

triceps Lam. 620.

L

LABIATACEAE. 442.

Lactuca L. 316.

Cabrae D. W. 316.

capensis Thunb. 316.

— *v. durnensis* D. W.

316.

Gilletii D. W. 316.

longispicata D. W. 316.

Seteti D. W. 316.

taraxacifolia S. et T. 316.

tricostata D. W. 316.

Verheekii D. W. 316.

Lagarosiphon Harv.

514.

Schweinfurthii Casp.

511.

Lagenaria Ser. 227.

angolensis Naud. 226.

sphaerica E. Mey. 229.

vulgaris Ser. 227.

Laggera Sz-B. 301.

alata Sz-B. 301.

brevipes O. et H. 301.

oblonga O. et H. 302.

pterodonta Sz-B. 302.

purpurascens Sz-B. 302.

Lagurus cylindricus L.

621.

Lamprodithyros gracilis

K. et P. 580.

rivularis Hassk. 583.

Landolphia P. B. 325.

comorensis K. Sch. 327.

— var. *florida* K. Sch.

326.

Dewevrei Stapf. 325.

Droogmansiana D. W.

326.

Dubreucqiana D. W.

326.

florida Bth. 326.

florida H. f. 327.

— *v. leiantha* Oliv. 327.

Gentilii D. W. 327.

Heudelottii Schltr. 329.

humilis K. Sch. 327.

Kirkii Dyer *v. ovariensis*

D. W. et T. D. 331.

Klainei Pierre. 328.

Laurentii D. W. 325.

— *v. grandiflora*

D. W. 325.

Lecomtei A. Dew. 328.

Incida K. Sch. 328.

Mammii D. W. et T. D.

330.

ochracea K. Sch. 328.

— *v. breviflora* D. W.

328.

ochracea D. W. 329.

owariensis P. B. 327.

329.

owariensis A. Dew. 328.

Landolphia

owariensis v. parvifolia

Hallier f. 331.

Petersiana Dyer. 330.

Petersiana Junelle. 330.

— *v. mucronata* A.

Dew. 330.

Preussii K. Sch. 333.

robusta Stapf. 330.

scandens F. Didr. 330.

— *v. coriacea* Hallier

f. 330.

— *v. gemina* Hallier

f. 330.

Thollonii A. Dew. 330.

Welwitschii Dyer. 330

Lankesteria Ldl. 420.

Barteri H. f. 420.

batangwana Lindau. 422.

elegans T. And. 420.

Lannea A. Rich. 114.

velutina A. Rich. 114.

Welwitschii Engl. 114.

Lantana L. 434.

aculeata L. 434.

Camara L. 434.

salvifolia Jacq. 434.

scabrada Ait. 431.

Lapeyrousia Pourr. 552.

erythrantha Bak. 552.

Lasianthus Jack. 285.

to-tistilus K. Sch. 285.

Lasiomorpha Afzelii

Schott. 589.

senegalensis Engl. 589.

Lasiophylon Oliveri Vatke,

471.

Lauanaca Cabrac D. W.

316.

LAURACEAE. 469.

Lavalleopsis V. Tiegh.

97.

longifolia D. W. et T. D.

97.

Lawsonia L. 218.

alba Lam. 218.

iuernis L. 218.

Leea L. 109.

guineensis G. Don. 109.

652.

sambucina S. et T. 109.

Leersia Nic. 610

hexandra Nic. 640.

Lefeburea benguelensis

Welw. 238.

Lefeburea A. Rich. 238.

benguelensis Welw. 238.

LEGUMINOSACEAE.

122.

Leiocarpodiceaea

Engl. 466

quangensis Engl. 466.

Leoptyx Pierre. 93.

congensis Pierre. 93.

Leiphaimos Ch. et

Schldt. 375.

- Leiphalms**
 primuloides *Gilg*, 375.
- Lemna** *L.* 592
 aequinoctialis *Wetw.*
 592.
 angolensis *Welw* 592.
 polyrrhiza *L.* 592.
- LEMNACEAE**, 592.
- LENTIBULARIACEAE**,
 406.
- Leonotis** *R. Br.* 452.
 africana *Th. et Hel.*
Dur. 452
 Leonurus *R. Br.* 453.
 — *v.* vestita *Briq.* 453.
 nepetaefolia *R. Br.* 453.
 pallida *Bth.* 452.
- Lepidagathis** *Willd.*
 427.
 Laurentii *D. W.* 427.
 655.
 Lindauiana *D. W.* 427.
- Lepistemon** *Bth.* 384.
 africanus *Oliv.* 384
 ovariense *Hall.* f. 384.
- Leptactinia** *H. f.* 256.
 Arnoldiana *D. W.* 256.
 formosa *K. Sch.* 256.
 Laurentiana *A. Dc.*
 256.
 Leopoldi *H. Buett.* 257.
 Liebrechtiana *D. W. et*
T. D. 257.
 Pynaertii *D. W.* 257.
 Seretti *D. W.* 257.
 surongensis *D. W.* 257.
- Leptaspis** *R. Br.* 639.
 coelileata *Thuc.* 639.
 conchifera *Haack.* 639.
- Leptaulus** *Bth.* 98
 daphnoides *Bth.* 98, 652.
- Leptochloa** *P. B.* 645.
 coerulescens *St.* 645.
 Laurentii *D. W.* 645.
 verticillata *Kth.* 647.
- Leptonychia** *Tourz.* 66.
 chrysoarpa *K. Sch.* 66.
 multiflora *K. Sch.* 66,
 652.
- Leucadendron angolensis**
Hiern. 479.
- Leucas** *R. Br.* 453.
 Descampsi *Briq.* 453.
 Poggeana *Briq.* 453
- Leucorhaphis Lamium**
Nees. 417.
- Liebrechtia esculenta**
D. W. 151.
 katangensis *D. W.* 151.
 scabra *D. W.* 152.
- Lightfootia L'Hér.** 318.
 napiformis *A. DC.* 318.
- LILIACEAE**, 561.
- Linnanthemum Gmel.**
 376.
 indicum *Griseb.* 376.
- Limnophyton Miq.** 593.
 obtusifolium *Miq.* 593.
Limnolobos luridum
Pers. 520.
- Limonia L.** 81.
 Demoussi *D. W.* 81
 Lacouriana *D. W.* 82.
 Poggei *Engl.* 82.
 — *v.* latialata *D. W.* 82.
 Schweinfurthii *Engl.* 82.
- LINACEAE**, 75.
- Lindackeria Presl.** 37.
 cuneato-acuminata
Gilg. 37.
 dentata *Gilg.* 37, 651.
 Poggei *Gilg.* 38, 651.
 Schweinfurthii *Gilg.* 38.
Lindernia diffusa *Wettst.*
 40.
 latibracteata *Engl.* 399.
- Linociera Sic.** 324.
 nilotica *Oliv.* 324.
- Linum L.** 76.
 usitatissimum *L.* 76.
- Liparis L. C. Rich.** 515.
 gumeensis *Ldl.* 515.
- Lipocarpa R. Br.** 619.
 argentea *R. Br.* 619.
 pulcherrima *Ridl.* 619.
 senegalensis *Th. et Hel.*
Dur. 619.
 sphaerolata *Kth.* 620.
 triceps *Nees.* 620.
- Lipotriche Brownei DC.**
 307.
- Lippia L.** 434.
 adoensis *Hochst.* 434.
 asperifolia *Rich.* 435.
 Burtonii *Bok.* 435.
 nodiflora *Mchz.* 435.
- Lissochilus R. Br.** 521.
 antennisepalus *R. f.*
 521.
 anenarius *Ldl.* 521.
 ciliatus *R. f.* 521
 elatus *Rolfe.* 521.
 giganteus *Wetw.* 521.
 Horstallii *Bat.* 522.
 katangensis *D. W.* 522.
 Leopoldi *Krzt.* 522.
 Lindleyanus *R. f.* 522.
 longifolius *Ldl.* 522.
 polyphytroglossus *R. f.*
 522.
 purpuratus *Ldl.* 522.
 pyrophilus *Rehb.* 523.
 roseus *Ldl.* 523.
 selousii *D. W.* 523.
 stylis *R. f.* 523.
- Listrostachys Rehb. f.**
 528
 Althoffii *T. D. et Sch.*
 528
 ashantensis *R. f.* 529.
 biloba *Krzt.* 527.
- Listrostachys**
 capitata *R. f.* 529.
 caudata *R. f.* 529.
 Chailluana *R. f.* 529.
 Dewevrei *D. W.* 529.
 Drogmansiana *D. W.*
 529.
 Durandiana *Krzt.* 530.
 falcata *D. W.* 530.
 Gentilii *D. W.* 530.
 ichneuonea *Rehb. f.*
 530
 Kindiana *D. W.* 527.
 linearifolia *D. W.* 530.
 Margaritae *D. W.* 530.
 Monteirae *R. f.* 530.
 pellucida *R. f.* 530.
 Pynaertii *D. W.* 531.
 subulata *R. f.* 531.
 Thonneriana *Krzt.* 531.
 vesicata *R. f.* 531.
- Littonia Hook.** 572.
 grandiflora *D. W. et T.*
 D 572.
 Lindenii *Bak.* 573.
- Lobelia L.** 317.
 fervens *Thunb.* 317.
 Gilletii *D. W.* 318.
- LOBELIACEAE**, 317.
- Lochnera Rehb.** 341.
 rosea *Rehb.* 341.
- LOGANIACEAE**, 367.
- Lonchocarpus H. B. et**
K. 161.
 affinis *D. W.* 164.
 Barteri *Bth.* 164.
 comosus *M. Mich.* 165.
 Dewevrei *M. Mich.* 136.
 dubius *D. W.* 165.
 Eetvaldeanus *M. Mich.*
 165.
 Heudelotianus *Baill.*
 165.
 katangensis *D. W.* 165.
 Laurentii *D. W.* 165.
 sericeus *H. B. et K.* 165.
 subulidentatus *Buett.*
 165.
 Tenzi *Buett.* 135, 165,
 653.
- Lophira Banks.** 48.
 alata *Banks.* 48.
- LORANTHACEAE**, 472.
- Loranthus L.** 472.
 alatus *D. W.* 472
 Albizziae *D. W.* 472.
 Buchneri *Engl.* 472.
 Butayi *D. W.* 472.
 capitatus *Engl.* 472.
 — *v.* latifolius *Engl.*
 472.
 constrictiflorus *Engl.*
 472.
 Cornetti *A. Dero.* 473.
 crassicaulis *Engl.* 473.
 Deuensei *Engl.* 473.

Loranthus

- Descampsii *Engl.* 473.
 discolor *Engl.* 473.
 Durandi *Engl.* 473.
 elongatus *D. W.* 473.
 irebuenis *D. W.* 474.
 Kimuenzae *D. W.* 474.
 kisantuensis *D. W.* et
T. D. 474.
 Laurentii *Engl.* 474.
 Lujaei *D. W.* et *T. D.*
 474.
 luluensis *Engl.* 474
 mangheensis *D. W.* 474
 mayombensis *D. W.* 474.
 micrantherus *Engl.* 474.
 nigrescens *D. W.* et *T.*
D. 474.
 ogowensis *Engl.* 475.
 Poggei *Engl.* 475.
 polygonifolius *Engl.*
 475.
 Pungu *D. W.* 475.
 rubiginosus *D. W.* 475.
 — v. grandiflorus *D. W.*
 475.
 Thonneri *Engl.* 475
Lovoa *Harms.* 93.
 Pynaertii *D. W.* 93.
 trichilioides *Harms.* 94.
Ludwigia *L.* 219.
 prostrata *Roxb.* 219.
Luffa *L.* 229.
 aegyptiaca *Mill.* 229.
 Batesii *C. H. Wright,*
 227.
 cylindrica *Roem.* 229.
 pentandra *Roxb.* 229.
Lundia monacantha *S.* et
T. 36.
Lychnodiscus *Radlk.*
 111.
 cerospermus *Radlk.*
 111, 652.
Lycopersicum *Hill.* 395.
 esculentum *Mill.* 395.
LYTHRACEAE, 217.

M

- Maba** *Forsk.* 323.
 buxifolia *Pers.* 323.
 guineensis *A. DC.* 323.
Macaranga *Thou.* 495.
 angoleusis *M.-A.* 495.
 dibeleensis *D. W.* 495.
 Gilletii *D. W.* 496.
 Laurentii *D. W.* 496.
 mollis *Pax.* 496.
 monandra *M.-A.* 496.
 Poggei *Pax.* 496.
 Pynaertii *D. W.* 496.
 rosea *Pax.* 496.
 saecifera *Pax.* 496.
 Schweinfurthii *Pax.*
 496.

Macaranga

- Zenkeri *Pax.* 497.
Maclura excelsa *Bureau,*
 502.
Macrolobium *Schreb.*
 175.
 coerulescoides *D. W.* 175.
 Deweyrei *D. W.* 175.
 — f. fol. bijugis *D. W.*
 176.
 — f. fol. trijugis *D. W.*
 176.
 Gilletii *D. W.* 176.
 Heudelotii *Pl.* 176.
 Laurentii *D. W.* 176.
 Palisotii *Bth.* 176.
Macrosiphon fistulosum
 Hochst 404.
Maerua *Forsk.* 29.
 angolensis *DC.* 29.
 Aprevaliana *D. W.* et
T. D. 30.
 Descampsii *D. W.* 30.
 Gilgiana *D. W.* 30.
 Kassakalla *D. W.* 30.
Maesa *Forsk.* 319.
 lanceolata *Forsk.* 319.
Maesobotrya *Bth.* 486.
 Bertramiana *Buett* 486.
 hirtella *Pax.* 486
 Sapini *D. W.* 486.
 — v. brevipedicelata *D.*
W. 486.
Mafurcira oleifera *Bertol.*
 92.
Magnistipula *Engl.* 192.
 Butayei *D. W.* 192.
Malabaila *Hoffm.* 238.
 Kirungae *Engl.* 238.
Malachra *L.* 51.
 capitata *L.* 51.
 hispida *G.* et *P.* 51.
 radiata *L.* 51.
Mallotus *Lour.* 495.
 oppositifolius *M.-A.* 495.
 subulatus *M.-A.* 495.
Malouetia *A. DC.* 351.
 africana *K. Sch.* 351.
 Heudelotii *A. DC.* 351.
MALPIGHIACEAE, 76.
MALVACEAE, 48.
Mamboga macrophylla
 Hiern, 240.
 stipulosa *O. K.* 240.
Mangifera *L.* 113.
 gabonensis *A. Lec.* 83.
 indica *L.* 113.
Manibot *Adans.* 490.
 Glaziovii *M.-A.* 490.
 utilissima *Pohl.* 490.
Manisuris *L.* 622.
 granularis *L. f.* 622.
 polystachya *P. B.* 622.
Manniella *R. f.* 534.
 Gustavi *R. f.* 534.
 — v. picta *D. W.* 534.

Manniophyton *M.-A.*

489.
 africanum *M.-A.* 489,
 655.
 fulvum *M.-A.* 489.
Manotes *Soland.* 119.
 Aschersonianana *Gilg.* 119.
 brevistyla *Gilg.* 120, 653.
 Cabrae *D. W.* et *T. D.*
 120.
 Griffouiana *Baill.* 120.
 Laurentii *D. W.* 120.
 pruinosa *Pax.* 120.
 sanguineo-arillata *Gilg.*
 120.
Maprounea *Aubl.* 499.
 africana *M.-A.* 499, 656.
 — v. obtusa *Pax.* 500.
Maranta *L.* 548.
 arundinacea *L.* 548.
 brachystachya *Bth.* 545.
 Lujaeana *L. Linden,*
 545.

MARANTACEAE, 544.

- Mareya** *Baill.* 494.
 micrantha *M.-A.* 494.
Margaretta *Oliv.* 363.
 Corneti *A. Dew.* 363.
 — v. pallida *D. W.* 363.
 Verdicikii *D. W.* 363.
Mariscus *Vahl.* 597.
 Dregeanus *Kth.* 597.
 flabelliformis *H. B.* et
K. 597.
 flavus *Vahl.* 597.
 — v. humilis *Cl.* 597.
 ligularis *Th.* et *Hel.*
Dur. 597.
 luridus *Cl.* 598.
 nossibeensis *St.* 598.
 pseudo-pilosus *Cl.* 598.
 — v. tenuis *Cl.* 598.
 rufus *H. B.* et *K.* 597.
 Sieberianus *Nees.* 598.
 — v. subcompositus *Cl.*
 598.
 trinervis *Cl.* 598.
 umbellatus *Vahl.* 598.
Markhamia *Seem.* 410.
 lanata *K. Sch.* 410, 411.
 lutea *K. Sch.* 410.
 paucifoliolata *D. W.* 410.
 tomentosa *K. Sch.* 410,
 655, 716.
 — v. acuminata *D. W.*
 411.
 tomentose *D. W.* et *T. D.*
 411.
 tomentose *Hiern.* 411.
 sessilis *Sprague.* 411.
 Verdicikii *D. W.* 411.
Marsdenia *R. Br.* 365.
 latifolia *Schl.* 365.

Marsdenia

- racemosa* K. Sch. 365.
rubicunda N. E. Br. 366.
Marsaea aegyptiaca Hieron.
 300
Maya judicifolia Bert. 182.
Mayepea *Aubl.* 324, 654.
luluensis *Engl.* 651.
nibatica *Knobl.* 324.
Mechowia *Schinz.* 459.
grandiflora *Schinz.* 459.
Medinilla *Gaud.* 215.
africana *Cogn.* 215.
Megabaria *Pierre.* 497.
Trillesii *Pierre.* 497.
Megacynium *Lall.* 517.
Arnoldianum *D. W.* 517.
congolanum *Th. et Hel.*
Dur. 517.
congolense *D. W.* 517.
djumaense *D. W.* 517.
Gentili *D. W.* 517.
Gilletii *D. W.* 517.
Laurentianum *D. W.*
 518.
maximum *Lall.* 518.
minus *D. W.* 518.
purpureorachis *D. W.*
 518
Megastachya *Brocni* *P.*
B. 646.
micronata *P. B.* 648.
ocariensis *P. B.* 648.
Methomia *ascendens* *O.*
K. 142.
gangetica *O. K.* 142.
lasiocarpa *O. K.* 143.
mauritiana *O. K.* 143.
megalantha *Hieron.* 141.
oxybractea *O. K.* 143.
palacra *O. K.* 143
polygones *O. K.* 144.
Stuhlmannii *Hieron.* 142.
Melanthera *Rohr.* 307.
Brownii *Sz.-B.* 307.
Melasma *Bryg.* 401.
indicum *Weinst.* 401.
Melastoma capitatum
Vahl. 209.
decumbens *P. B.* 210.
plumosa *D. Dou.* 212.
prostratum *S. et T.* 212.
MELASTOMACEAE,
 204
Melastomastrum erectum
Naud. 209
Melia *L.* 92.
angustifolia *Sch. et Th.*
 92
Azelarach *L.* 92
MELIACEAE. 91.
Mellera *S. Moore.* 418
Briartii *D. W. et T. D.*
 418.
lobulata *S. Moore.* 418.
subnutica *Cl.* 418.

Mellera

- subnutica* v. *grandi-*
flora *D. W.* 418.
Melochia *L.* 61.
corchorifolia *L.* 61.
melissifolia *Bth.* 65.
 — v. *bracteosa* *K. Sch.* 65.
 — v. *mollis* *K. Sch.* 65.
Melothria *L.* 232
capillacea *Cogn.* 232.
deltoides *Bth.* 232.
maderaspatana *Cogn.*
 232.
tri-laetyla *H. f.* 232.
tr. angularis *Bth.* 232
Thuralesii *Schw.* 232.
Memecylon *L.* 215.
Azclii *R. Br.* 216.
Gilletii *D. W.* 215.
jasminoideis *Gilg.* 215.
Laurentii *D. W.* 215.
leucocarpum *Gilg.* 215.
longicauda *Gilg.* 215.
Mannii *Hook. f.* 215.
membranifolium *Hook.*
f. 215.
Milleni *Gilg.* 216.
myrianthum *Gilg.* 216.
Poggei *Gilg.* 216.
polyanthemos *Hook. f.*
 216.
 — v. *grandifolium*
Cogn. 216.
Pynaertii *D. W.* 216.
strychnoides *Bak.* 216.
tamifolium *Gilg.* 216.
Vogelii *Naud.* 216.
MENISPERMACEAE,
 24.
Mentha *L.* 452.
sylvestris *L.* 452.
Merremia *Dennst.* 382.
angustifolia *Hall. f.* 382.
 — v. *ambigua* *Hall. f.*
 382;
convolvulacea *Dennst.*
 382.
hastata *Hall. f.* 382.
hederacea *Hall. f.* 382.
pentaphylla *Hall. f.* 382.
pes-draconis *Hall. f.* 383.
pterygocaulos *Hall. f.*
 383.
 — v. *tomentosa* *Hall. f.*
 383.
Mesanthemum *Koern.*
 593.
radicans *Koern.* 593.
Methonica superba *Cr.* 572.
virescens *Kth.* 572.
Mopania erecta *Bth.* 414.
Vog. lina *Bth.* 415.
Mezoneuron *Desf.* 170.
angolense *Wetw.* 170.
Micranthus Hensli *Liu-*
dau. 420.

Micranthus imbricatus

- O. K.* 419.
longifolius *Wendl.* 419.
obliquus *O. K.* 420.
Poggei *Lindau.* 420.
Microchloa *R. Br.* 642.
setacea *R. Br.* 642.
Micrococca *Bth.* 492.
Mercunahs *Bth.* 492.
Microdesmis *Pl.* 488.
puberula *H. f.* 488, 655.
Microglossa *DC.* 300.
angolensis *O. et H.* 300.
 — *f. fol. gr. dent. O.*
Hoffm. 300.
volubilis *DC.* 300.
Mikania *W.* 298.
chenopodiifolia *W.* 298.
scandens *W.* 298.
Milletia *W. et A.* 133.
Baptistarum *Buett.* 133.
breviflora *D. W.* 133.
brevistipellata *D. W.* 133.
Cabrae *D. W.* 133.
congolensis *D. W. et T.*
D. 133.
Demusei *D. W.* 134.
drastica *Wetw.* 134, 653.
hubia *D. W.* 134.
Duchesnei *D. W.* 134.
Gentilii *D. W.* 134.
Griffonia *Baill.* 135.
Harniana *D. W.* 134.
 — *f. acuminata* *D. W.*
 134.
Laurentii *D. W.* 134.
macrophylla *M. Mich.*
 134.
macroura *Harms.* 134.
Mannii *Bak.* 135.
Teuszi *D. W.* 135, 653.
Thouningii *Bak.* 135.
urophyllodes *D. W.* 135.
versicolor *Wetw.* 135,
 653.
Miltus africanus *Lour.*
 237.
Mimosa *L.* 185.
asperata *L.* 185.
Farnesiana *L.* 186.
pubica *L.* 185.
MIMOSEAE, 182.
Mimulus *L.* 398.
gracilis *R. Br.* 398.
Mimusops *L.* 322.
alpinis *D. W.* 322.
congolensis *D. W.* 322.
cuneifolia *Bak.* 322.
ubangiensis *D. W.* 322.
Welwitschii *Engl.* 322.
 — *f. grandifolia* *D. W.*
 322.
Mirabilis *L.* 454.
Jalapa *L.* 454.
Mitracarpum *Zucc.* 287.
scabrum *Zucc.* 287, 654.

Mitracarpum

senegalense DC. 288.
verticillatum Vatke, 288.

Mitragyne Korth. 240.

africana Korth. 240
macrophylla Hiern, 240.

Modecca abyssinica

Hochst. 224.
cissampeloides Planch.
225.

lobata Jacq. 224.
— *v. elegans* Mast. 224.

Mohlana Mart. 462.

latifolia Moq. 462.

Mollugo L. 236.

bellidifolia Ser. 236.
Glinus A. Rich. 236.
hirta Thunb. 236.
lotoides Cl. 236.
nudicaulis Lam. 236.
oppositifolia L. 236.
Spergula L. 236.

Moroidica L. 228.

anthelmintica S. et T.
228

Charantia L. 228.
— *v. abbreviata* Ser. 228.

cissoides Planch. 228.
cyathodica L. 229.

Cogniauxiana D. W. 228.
foetida S. et T. 228.

Gabonii Cogn. 229.
gracilis Cogn. 229.

guttata Pl. 228.
maculata Pl. 228.

Morkorra A. Rich. 228.
pteroearpa Hochst. 228.

Monadenium Pax. 476.

Descampsii Pax. 476.

Monanthotaxis Baill.

20.
Poggei Engl. et Diels,
20, 651.

— *v. latifolia* Engl. et
Diels, 20.

Monelasium densiflorum

V. Tgh. 87.
Droevrei V. Tgh. 87.

Dupontii V. Tgh. 87.
laeve V. Tgh. 88.

laxiflorum V. Tgh. 88.
pellucidum V. Tgh. 88.

Poggei V. Tgh. 89.
Schweinfurthii V. Tgh.
89.

Moniera calycina Hiern,
399.

Monochoria Presl. 657.

africana N. E. Br. 657.

vaginalis Presl, *v. afri-*
cana Solms, 657.

Monodora Dun. 24.

angolensis Welw. 24.
Calbrae D. W. et T. D. 24.

congolana D. W. et T.
D. 23.

Monodora

Droevrei D. W. et T. D.
23.

Durieuxii D. W. 24.

Myristica Dun. 24.

Thonneri D. W. et T. D.
23.

Monotes africana A. DC.

47.
— *v. hypoleuca* Hiern,
48.

Moraea L. 552.

Arnoldiana D. W. 552.
kitambensis Bak. 552.

textilis Bak. 552.

Verdickii D. W. 552.

zambesiaca Bak. 552.

Morelia A. Rich. 261.

senegalensis A. Rich.
261.

Morinda L. 279.

citrifolia L. 279.
— *v. lucida* Hiern, 279.

geminata DC. 282.
longiflora G. Don, 279.

lucida Bth. 279.
pterygosperma Gaertn.
116.

quadrangularis G. Don,
279.

Moringa Juss. 116.

oleifera Lam. 116.

MORINGACEAE, 116.

Morus excelsa Welw. 502.

Moschosma Rehb. 444.
polystachyum Bth. 444.

— *v. stercoradum* Briq.
444.

Mostuea Fr. Didr. 367.

angolana Hiern, 368.
— *v. Laurentii* D. W.
368.

Brunonis F. Didr. 367.
congolana Bak. 369.

densiflora Gilg. 367.
Duchesuei D. W. 367.

Gilletii D. W. 368.
hirsuta Bak. 654.

Lujaei D. W. et T. D.
368

penduliflora Gilg. 368.
Poggeana Bak. 369.

Schumanniana Gilg,
368.

Taymansiana D. W. 368.

Motandra A. DC. 355.

guitensis A. DC. 355.

Lujaei D. W. et T. D. 355.

Msuata O. Hoffm. 298.

Buettneri O. Hoffm. 298.

Mucuna Adams. 148.

flagellipes Vogel. 148.
Poggei Taub. 148.

pruriens DC. 148.
urens Medic. 149.

Muenteria lutea Seem. 410.**Muenteria tomentosa**

Seem. 410, 411.

Mukia scabrella Arn. 232.

Musa L. 550, 656.

Arnoldiana D. W. 550.

Ensete Gmel. 550.
Gilletii D. W. 550.

Laurentii D. W. 550.
paradisiaca L. subsp.

sapientum O. K. 550.
sapientum L. 550.

— *v. sanguinea* Welw.
550.

MUSACEAE, 550, 656.**Musanga** R. Br. 511.

cecropioides R. Br. 511.
Smithii R. Br. 511.

Mussaenda L. 248.

arcuata Poir. 248.
deburu Stapf. 248.

discolor Thoun. 248.
elegans S. et T. 248, 654.

— *v. minor* D. W. et
T. D. 248.

erythrophylla Sch. et
Th. 248.

heinsioides Hiern, 249.
hispidula Engl. 249.

luteola DeLile. 249.
phatylphylla Hiern, 249.

polita Hiern, 249.
splendida Welw. 249.

steuocarpa Hiern, 249.
— *f. congensis* Buett.
250.

— *v. latifolia* D. W. et
T. D. 250.

tenuiflora Bth. 250.

Myrianthus P. B. 510.

arbores P. B. 510, 656.

Myristica L. 469.

angolensis Welw. 469.
Kombo Baill. *v. angol-*
ensis D. W. 469.

MYRISTICACEAE, 469.**MYRSINACEAE**, 319.**Myrsiphyllum cristatum**

Hiern, 281.
nigropunctatum Hiern,
282.

MYRTACEAE, 201.**Mystacidium** Lindl.

531.
congolense D. W. 531.

distichum Bth. 531.
— *v. grandifolium* D.
W. 532.

erythropollinicum T. D.
et Schinz, 532.

infundibulare Rolfe, 532.
— *v. brevifolium* D. W.
532

Laurentii D. W. 528.

xanthopoliium T. D. et
Schinz, 533.

N

- Napoleona angolensis* P. B. 201.
cuspidata Miers, 204.
Heudelotii Juss. 204.
imperialis P. B. 204.
Maimii Miers, 204.
Vogeli Pl. 204.
Whitfieldii Decne. 204.
Napoleonaea P. B. 204.
imperialis P. B. 204.
Nasturtium R. Br. 27.
humifusum G. et P. 27.
Nathusia trichocladia O. K. 324.
Nauclea africana W. 240.
africana Walp. 241.
macrophylla Perr. et Lepr. 240.
sambucina T. Wint. 240.
stipulosa DC. 240.
Nelsonia R. Br. 416.
brunelloides O. K. 416.
campestris R. Br. 416.
tomentosa Luetr. 416.
Nepeta pectinata L. 152.
Nephtytis Schott, 500.
Azeliit Schott, 590.
iberica N. E. Br. 591.
picturata N. E. Br. 590.
Neurocarpaea purpurea Hiern, 242.
Neurotheca Salisb. 376.
congolana D. W. et T. D. 376.
densa D. W. 376.
loeselioides Bth. 376.
longidens N. E. Br. 376.
Newbouldia Seem. 409.
laevis Seem. 409.
Nicotia Lindau, 430.
Betonica Lindau, 430.
Nicotiana L. 397.
rustica L. 397.
Tabacum L. 397.
 — v. *brasiliensis* Comes, 398.
 — v. *lanceifolia* Comes, 398.
 — v. *virginica* Anast. 398.
 — v. *virginica* Comes, 398.
Nuxia Lam. 369.
dentata R. Br. 369.
 NYCTAGINACEAE, 454.
Nyctago Jalapa DC. 454.
Nymphæa L. 26.
coerulea Savign. 26.
 — v. *parviflora* H. f. et T. 26.
 — v. *versicolor*. H. f. et Thoms. 26.
guineensis S. et T. 26.
Lotus L. 27.
stellata W. 26.

Nymphæa

versicolor Roxb. 26.

NYMPHÆACEAE, 26.

O

Ochna Schreb. 84.

arenaria D. W. et T. D. 84*Buettneri* Engl. 85.*congoensis* Gilg. 85.— v. *microphylla* Gilg. 85.*Debeerstii* D. W. 85.*Gilletiana* Gilg. 85.*Hoffmanni-Ottomii* Engl. 85.*kataungensis* D. W. 85.

652.

Laurentiana Engl. 85*membranacea* Oliv. 86.*membranacea* T. D. et Sch. 85.*pulehra* Hook. 86.*pulchra* O. Hoffm. 85.*quangensis* Buett. 86.*reticulata* D. W. 89.*Schweinfurthiana* Fr. Hoffm. 86.*Welwitschii* Rolfe, 86.*Wildemaniana* Gilg. 85.

OCHNACEAE, 84

Ochnella Debeerstii V. Tgh. 85.*Schweinfurthiana* V. Tgh. 86.

Ochrocarpus Thou. 47.

africana Oliv. 47.*Ochthocosmus africanus* D. W. et T. D. 76.*congolensis* D. W. et T. D. 76.*Lemaireanus* D. W. et T. D. 76.

Ocimum L. 442:

cauum Sims, 442.*Descampsii* Briq. 442.*filamentosum* Forsk. 443.*glossophyllum* Briq. 443.*grandiflorum* L'Herit. 442.*gratissimum* L. 443.— v. *macrophyllum* Briq. 443.— v. *mascareuarum* Briq. 443.*linearifolium* Briq. 443.*monostachyum* P. B. 443.*Poggeanum* Briq. 443.*polystachyum* L. 444.*Octopleura loeselioides* Spruce, 376*Otina velutina* Endl. 114.

OLACACEAE, 95.

Olix L. 97.

Aschersouana Buett. 97.*Durandi* Engl. 97.

Olix

Gilletii D. W. 97.*macrocalyx* Engl. 97.*obtusifolia* D. W. 97.*Poggei* Engl. 97, 652.*Pynaortii* D. W. 97.*viridis* Oliv. 97.

Oldenlandia L. 244

angolensis K. Sch. 244.*asperniflora* K. Sch. 244.*Bojeri* Hiern, 244.*calfra* E. et Z. 244.*capensis* L. f. 245.*congolensis* D. W. et T. D. 245.*corymbosa* L. 245.*Crepiniana* K. Sch. 245.*Debeerstii* D. W. et T. D. 245.*decumbens* Hiern, 245.*florifera* D. W. 246.*globosa* Hiern, 246.*heracea* Roeb. 246.*herbacea* DC. 245.*Heynei* Oliv. 246.*kimuensis* D. W. 246.*lanceifolia* Schott. 246.*Laurentii* D. W. 247.*macrophylla* DC. 244, 245, 746.*microphylla* D. W. et T. D. 247.*moaundensis* D. W. 247.*picata* Bth. 171.

OLEACEAE, 324.

Oligopygium libericum Engl. 591.**Oligostemon** Bth. 171.*pentandra* DC. 247**Olyra** L. 639.*brevifolia* S. et T. 639.*latifolia* L. 639.*Omphacarpus africanus* Hook. 68.

Omphacarpum P. B. 321.

bomanehense D. W. 321.*Cabrae* D. W. 321.*Laurentii* D. W. 321.*sankuruense* D. W. 321.

ONAGRARIACEAE, 218.

Oncinotis Bth. 354.

glabrata Stapf, 354.*glaudivosa* Stapf, 354, 654.*hirta* Oliv. 354.*Jespersenii* D. W. 354.*tenulosa* Stapf, 354.

Oncoba Forsk. (s. str.) 36.

Crepiniana D. W. et T. D. 36.*Domeusei* D. W. et T. D. 38.*dentata* Oliv. 37.— v. *cuneato-acuminata* D. W. 37.

- Oncoba**
glauca Pl. 37.
Laurentii D.W. et T. D. 37.
Poggei Guerke, 38.
spinosa Forsh. 36.
 — v. *angolensis* Oliv. 651.
Welwitschii Oliv. 37.
- Oncocalamus** M. et W. 585.
acanthocneuis Drude, 585.
- Ongokea** *l'ierre*, 652.
Klaineana Pierre, 652.
- Ophiocaulon** H. f. 224.
apiculatum D. W. et T. D. 224.
cissampeloides Mast. 225
Dewevrei D. W. et T. D. 225.
lanceolatum Engl. 225
Poggei Engl. 225.
reticulatum D. W. et T. D. 225.
- Oplismenus** P. B. 636.
africanus P. B. 636.
compositus P. B. 636.
Crus galli Dmrt. 631.
- Opuntia** L. 235.
vulgaris Mill. 235.
- ORCHIDACEAE, 515.
Orchis iclinemonea Sw. 535.
procera Afz. 535.
Orcelia grandiflora Aubl. 341.
- Ormocarpum** P. B. 138.
affine D. W. 138.
sennoides DC. 138.
sesamoides M. Mich. 138.
- Ormosia** Jack. 169.
angolensis D. W. 169.
Brasseuriana D. W. 169.
- Ornithogalum** L. 571.
altissimum L. 570.
caudatum Ait. 571.
giganteum Jacq. 570.
- Orthosiphon** Bth. 446.
adornatus Briq. 447.
 — v. *oblongifolius* Briq. 447.
heterochrous Briq. 446.
iodocalyx Briq. 446.
Liebrechtsianus Briq. 446.
retinervis Briq. 447.
Welwitschii Rolfe, 447.
 — v. *oblongifolius* Th. et Hét. Dur. 447.
- Oryza** L. 640.
sativa L. 640.
 — v. *aristata* D. W. 640.
 — v. *mutica* D. W. 640.
- Osbeckia** L. 204.
albiflora Cogn. 204.
Antherotonia Naud. 208.
Brazzaei Cogn. 204.
congolensis Cogn. 205.
 — v. *robustior* Cogn. 205.
Crepiniiana Cogn. 205.
debilis Sond. 209.
drepanosepala Gilg, 205.
incana E. Mey. 211.
multiflora Sm. 211.
phacotricha Hochst. 211.
rotundifolia Sm. 212.
zanzibarensis Naud. 212.
- Osteospermum** L. 313.
souchifolium DC. 313.
 — v. *subpetiolatum* Harv. 313.
- Ostryocarpus** H. f. 164.
parvifolius M. Mich. 164.
Welwitschii Bak. 653.
- Otiophora** Zucc. 285.
pulchella K. Sch. 285.
- Otomeria** Bth. 243.
dentata Hiern, 243.
dilatata Hiern, 243.
gracilliflora K. Sch. 243
guineensis Bth. 243.
lanceolata Hiern, 243.
madiensis Oliv. 243.
speciosa S. Elliot, 243.
- Ottelia** Pers. 514.
halogena D. W. et T. D. 514, 656.
laucifolia A. Rich. 514.
 — v. *fluitans* Ridl. 514.
Verdickii Guerke, 514.
- Oubanguia** Baill. 67.
laurifolia Pierre, 67.
Laurentii D. W. 67.
Pierreana D. W. 68.
- Ouratea** Aubl. 86.
affinis Engl. 86.
affinis D. W. et T. D. 87.
Arnoldiana D. W. et T. D. 86.
bracteata Gilg, 87.
Cabrae Gilg, 87.
coriacea D. W. et T. D. 87.
densiflora D. W. et T. D. 87.
Dewevrei D. W. et T. D. 87.
Dupuisii Th. et Hét. Dur. 87.
elongata Engl. 88.
febrifuga Engl. 88.
laevis D. W. et T. D. 88.
laxillora D. W. et T. D. 88.
Ledermauniana Engl. 652.
- Ouratea**
leptoneura Gilg, 88.
longipes Th. et Hét. Dur. 88.
myroneura Gilg, 88.
pellucida D. W. et T. D. 88.
Poggei Gilg, 89.
pseudospicata Gilg, 89.
refracta D. W. et T. D. 89.
reticulata Engl. 89, 652.
 — v. *andongensis* Hiern, 89.
 — v. *Poggei* Engl. 89.
 — v. *Schweinfurthii* Engl. 89.
subumbellata Gilg, 89.
Owronaria africana Baill. 211.
Oviada erythrantha Kl. 552.
- OXALIDACEAE, 78.
Oxalis L. 78.
Corneti A. Dev. 78.
corniculata L. 78, 652.
katagensis D. W. et T. D. 78.
sensitiva L. 78.
- Oxyanthus** DC. 262.
dubius D. W. 262.
formosus H. f. 262.
formosus D. W. 262.
Laurentii D. W. 262.
sankuruensis D. W. 262.
Schumaunianus D. W. et T. D. 262.
Smithii Hiern, 263.
speciosus DC. 263, 654.
uilocularis Hiern, 263.
- Ozoroa insignis* Delile. 116.

P

- Pachira aquatica* Aubl. 59.
Pachylobus G. Don, 90.
edulis G. Don, 90.
 — v. *Mubafo* Engl. 90.
edulis Hiemsl. 90.
Saphu Engl. 90.
Pachyrhizus Rich. 155.
angulatus Rich. 155.
bulbosus Kuntz. 155.
Pachystele Ridlk 320.
cinerea Pierre, 320.
 — v. *cuveata* Engl. 320, 654.
 — v. *undulata* Engl. 321.
cuveata Ridlk. 320.
Pachystoma Thomsoniana Rehb. f. 517.
Pacouira crassifolia Hiern. 330.
florida Hieru, 326.

- Pacouria ouariensis* Hiern, 329.
Paederia ouariensis Spreng, 329.
- Palisota** *Rehb.* 574.
acuminata *Cl.* 574.
ambigua *Cl.* 574.
Barteri *H. f.* 574.
congolana *Hua.* 575.
hirsuta *K. Sch.* 575.
Laurentii *D. W.* 575.
Mauitii *Cl.* 575.
Preussiana *K. Sch.* 575.
prionostachys *Cl.* 575.
Pynaertii *D. W.* 576.
Schweinfurthii *Cl.* 576.
thyrsiflora *Bth.* 575.
- PALMACEAE**, 583.
- Pancovia** *W.* 112.
Harmsiana *Gilg.* 112.
- PANDANACEAE**, 587.
- Pandanus** *L. f.* 587.
Butayi *D. W.* 587.
Caudelabrum *P. B.* 587.
- Pandiaka** *Mog.* 460.
Hendelotii *Bth.* 460.
- Panicum** *L.* 630.
africanum *Poir.* 636.
arborescens *L.* 630.
argyrotrichum *And.* 630.
brizanthum *Hochst.* 630.
 — *v.* *polystachyum* *D. W.* et *T. D.* 630.
colomum *L.* 630.
coloratum *L.* 630.
costatum *Roxb.* 634.
Crus-galli *L.* 631.
 — *v.* *Petiveri* *Hack.* 631.
 — *v.* *polystachyum* *Munro.* 631.
 — *v.* *submuticum* *Franch.* 631.
Dactylon *L.* 643.
diagonale *Nees.* 631.
 — *v.* *hirsutum* *D. W.* et *T. D.* 632.
 — *v.* *uniglume* *Hack.* 632.
dichotomum *Forsk.* 637.
distichophyllum *Trin.* 632.
elongatum *Mez.* 632.
glaucum *L.* 636.
Griffonii *Franch.* 632.
Hensii *K. Sch.* 632.
horizontale *G. F. W. Mey.* 635.
horizontale *Nees.* 634.
indutum *St.* 632.
interruptum *W.* 633.
 657.
lutense *K. Sch.* 633.
- Panicum**
maximum *Jacq.* 633.
mayombense *Franch.* 633.
molle *Sw.* 633.
muticum *Forsk.* 633.
nigritanum *Hack.* 633.
nudiglume *Hochst.* 633.
ogowense *Franch.* 634.
ovalifolium *Poir.* 630.
Petiveri *Trin.* 631.
plicatum *Lam.* 634.
 — *v.* *costatum* *Bth.* 634.
polystachyum *K. Sch.* 634.
roseum *St.* 635.
Ruprechtii *Fourn.* 633.
sanguinale *L.* 631.
 — *v.* *cognatum* *Hack.* 634.
 — *v.* *horizontale* *E. Mey.* 635.
scabrum *Lam.* 635.
sphaelatum *St.* 635.
sulcatum *Aubl.* 635.
Tholloni *Franch.* 635.
uniglume *Hochst.* 632.
verticillatum *L.* 636.
Zenkeri *K. Sch.* 635.
zizanioides *H. B.* et *K.* 635.
- Papaya vulgaris* *DC.* 225.
Parasia debilis *Hiern.* 374.
- Parinari* *Mobola* *Hiern.* 191.
- Parinarium** *Juss.* 189.
congense *F. Dibr.* 189.
congoense *Engl.* 189.
congolanaum *Th.* et *Hél. Dur.* 189.
curatellifolium *Planch.* 190.
excelsum *T. D.* et *D. W.* 190.
gabonense *Engl.* 190.
 — *v.* *mayumbense* *D. W.* 190.
Gilletii *D. W.* 190.
glabrum *Obr.* 190.
Holstii *Engl.* 190.
 — *v.* *longifolium* *Engl.* 190.
Mobola *Oliv.* 190.
Pogoni *Engl.* 191.
salicifolium *Engl.* 190.
subcordatum *Obr.* 191.
Verheckii *D. W.* 191.
- Parkia** *R. Br.* 183.
biglobosa *Bth.* 183.
filicoides *W. & A.* 183.
Klauei *Pierre.* 183.
- Parkinsonia** *L.* 171.
aculeata *L.* 171.
- Paropsia** *Noronha.* 222.
Brazzeana *Baill.* 222.
Deioverei *D. W.* et *T. D.* 222.
 — *v.* *condensata* *D. W.* 222.
grewioides *Walto* 222.
 — *v.* *condensata* *Th.* et *Hél. Dur.* 222.
reticulata *Engl.* 223, 654.
 — *v.* *ovalifolia* *Engl.* 223.
- Pasacardoa** *O. K.* 315.
Grantii *O. K.* 315.
 — *v.* *angustiligulata* *D. W.* 315.
 — *v.* *reducta* *D. W.* 315.
- Paspalum** *L.* 628.
ciliatum *Lam.* 629.
conjugatum *Berg.* 628.
Kora *W.* 629.
longilorum *Retz.* 629.
serobiculatum *L.* 629.
- Passiflora** *L.* 222.
foetida *L.* 222.
quadrangularis *L.* 222.
- PASSIFLORACEAE**, 222.
- Paulinia** *Schum.* 109.
africana *G. Don.* 109.
pinnata *L.* 109, 652.
senegalensis *Juss.* 109.
urata *S.* et *T.* 109.
- Pavetta** *L.* 274.
Bacoma *Hiern.* 274, 654.
 — *v.* *congolana* *D. W.* et *T. D.* 274.
 — *f.* *puberulosa* *D. W.* 274.
canescens *DC.* 274.
crassipes *K. Sch.* 274.
flammea *K. Sch.* 274.
Laurentii *D. W.* 275.
Lescauwaeii *D. W.* 275.
longituba *K. Sch.* 275.
tomantosa *A. Rich.* 274.
Warburziana *D. W.* et *T. D.* 275.
- Pavonia** *L.* 52.
kilimandscharica *Guerke.* 52.
Paxii *Deioverei* *D. W.* et *T. D.* 116, 117.
- PEDALINACEAE**, 412.
- Peddiea** *Harv.* 472.
longepedunculata *Gilg.* 472.
 — *v.* *multiflora* *D. W.* 472.
- Pedicellaria** *Schrk.* 29.
pentaphylla *Schrk.* 29.
 — *v.* *hirsutissima* *D. W.* 29.

(1) *Paxia Deioverei* est syn. de *Rourea pseudo-baccata* *Gilg* [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I, 245].

- Peltophorum** Vog. 170.
africanum *Sond.* 170.
Penicillaria *spicata* W. 638.
Pennisetum *Pers.* 637.
aurum A. Rich. 636.
Benthani *St.* 637.
dichotomum *Del.* 637.
dioicum A. Rich. 637.
hordeiforme *Spreng.* 637.
macrostachyum *Bth.* 637.
nodiflorum *Franch.* 638.
parviflorum *Trin.* 638.
polystachyum *Schult.* 638.
Priurii *Kth.* 638.
purpurascens H. B. et K. 638.
purpureum *Schum.* 637.
reversum *Hack.* 638.
setosum A. Rich. 638.
spicatum *Koern.* 638.
— v. typicum *K. Sch.* 639.
— f. viviparum *Auct.* 639.
typhoideum A. Rich. 639.
unisetum *Bth.* 639.
Pentaclethra *Bth.* 182.
Eetveldeana *D. W.* et *T. D.* 182.
macrophylla *Bth.* 182.
Pentadesma *Sabine.* 46.
butyracea *Sabine.* 46.
Pentanisia *Hav.* 266.
Schroefii *Hiern.* 266.
variabilis *Hav.* 266.
zanzibarica *Kl.* 242.
Pentarrhinum *E. Mey.* 362.
abyssinicum *Decne.* 362.
— v. angolense *N. E. Br.* 363.
Pentas *Bth.* 242.
cleistostoma *K. Sch.* 242.
— v. Poggeana *K. Sch.* 242.
Dewevrei *D. W.* et *T. D.* 242.
Liebrechtsiana *D. W.* 242.
longiflora *Oliv.* 242.
— v. occidentalis *K. Sch.* 242.
longituba *K. Sch.* 242.
purpurea *Oliv.* 242.
zanzibarica *Vatke.* 242.
Pentodon *Hochst.* 244.
pentander *Vatke.* 244.
Peperomia *R.* et *P.* 469.
fernandopoana *DC.* 469.
Peponia *Naud.* 226.
bracteata *Cogn.* 226.
— v. hirsuta *Cogn.* 226.
Perdicium piloselloides *Hiern.* 315.
Perularia *L.* 366.
africana *N. E. Br.* 366.
sanguinolenta *Britten.* 366.
Perichasma lactificata *Miers.* 25.
Periploca *L.* 357.
nigrescens *A/z.* 357.
nigricans *Schl.* 357.
Preussii *K. Sch.* 357.
sylvestris *Retz.* 365.
Peristrophe *Nees.* 432.
Dewevrei *D. W.* et *T. D.* 433.
Heusii *Cl.* 433.
Perotis *Ait.* 628.
latifolia *Ait.* 628.
spicata *Th.* et *Hel. Dur.* 628.
Persea *Gaertn.* 469.
gratissima *Gaertn.* 469.
Petersia *Welw.* 203.
africana *Welw.* 203.
Petunia *Juss.* 397.
nyctaginiiflora *Juss.* 397.
Peucedanum *L.* 238.
araliaceum *Bth.* 238.
— v. fraxinifolium *Engl.* 238.
fraxinifolium *Hiern.* 238.
muriculatum *Welw.* 238.
Phaeoneuron *Gilg.* 207.
dicellandroides *Gilg.* 207. 214.
Pharnaceum depressum *L.* 41.
Phaseolodes drastica *O. K.* 134.
Thomlingii *O. K.* 134.
Phaseolus *L.* 150.
adenanthus *G. F. W. Mey.* 150.
lunatus *L.* 150.
Mungo *L.* 150.
vexillatus *L.* 153.
vulgaris *L.* 150.
Phaulopsis longifolia *Liudau.* 419.
obliqua *Liudau.* 420.
Poggei *Liudau.* 420.
Phaylopsis *W.* 419.
imbricata *Cordem.* 419. 420.
Lindaviana *D. W.* 419.
longifolia *Thoms.* 420.
longifolia *Sims.* 419.
obliqua *S. Moore.* 420.
oppositifolia *Liudau.* 419.
Phaylopsis
parviflora *W.* 419.
Poggei *Cl.* 420.
Phialodiscus *Rdlh.* 112.
Dewevrei *Gilg.* 112.
plurijugatus *Rdlh.* 112.
unijugatus *Rdlh.* 112. 653.
Philozerus vermicularis *R. Br.* 461.
Phlomis africana *P. B.* 452.
Leonurus *L.* 453.
nepetaefolia *L.* 453.
Phoenix *L.* 583.
dactylifera *L.* 583.
reclinata *Jacq.* 583.
spinosa *Thonn.* 583.
Phragmites *Trin.* 645.
communis *Trin.* 645.
vulgaris *Crép.* 645.
Phrynium *W.* 547.
baccatum *K. Sch.* 544.
brachystachyum *Koern.* 545.
confertum *K. Sch.* 547.
Daniellii *Bth.* 545.
filipes *Bth.* 548.
Heusii *Bak.* 548.
leiogonium *Bak.* 545.
oxyzarpum *Bak.* 545.
Phylactinia Grantii *Bth.* 315.
— v. angustiligulata *D. W.* 315.
— v. reducta *D. W.* 315.
Phyllanthus *L.* 482.
capillaris *S.* et *T.* 482.
floribundus *M.-A.* 482.
Gillettii *D. W.* 482.
moorensis *D. W.* 482.
Niruri *L.* 482.
niruroides *M.-A.* 482.
odontadenius *M.-A.* 483.
— v. micranthus *Pax.* 483.
pentandrus *S.* et *T.* 483.
polyanthus *Pax.* 483.
Pynaertii *D. W.* 483.
reticulatus *Poir.* 483.
Verdiecki *D. W.* 483.
Phylloclinum *Baill.* 38.
paradoxum *Baill.* 38.
Phyllocosinus *Kl.* 76.
africanus *D. W.* 76.
congolensis *Th.* et *Hel. Dur.* 76.
Dewevrei *Engl.* 76.
Lemaireanus *Th.* et *Hel. Dur.* 76.
seuensis *Kl.* 76. 652.
Phylloides baccatum *K. Sch.* 544.
brachystachyum *K. Sch.* 545.
leiogonium *K. Sch.* 545.
oxyzarpum *K. Sch.* 545.

- Physacanthus** Bth. 422.
batauganus Th. et Hel. Dur. 422.
inflatus Cl. 422.
- Physalis** L. 395.
aequata Jacq. 395.
barbadensis Jacq. 396.
edulis Sims. 395.
miuima L. 395.
peruviana L. 395.
pubescens L. 396.
- Physedra** H. f. 231.
Barteri Cogn. 231.
heterophylla H. f. 231.
- Physostigma** Balf. 150.
mesopotanicum Taub. 150.
venenosum Balf. 150.
- Phyteumoides hirsuta* Smeathm. 247.
- Phytolacca** L. 462.
abyssiaca Hoffm. 462.
 — v. *macrophylla* D. W. et T. D. 463.
dodecandra L'Her. 463.
stricta Hoffm. 463.
- PHYTOLACCACEAE, 462.
- Picalima** Pierre, 338.
Klaineana Pierre, 338.
nitida Th. et Hel. Dur. 338.
- Pilostyles** Guill. 466.
aethiopia Welw. 466.
- Pimpinella** L. 237.
tomentosa Engl. 237.
- Piper** L. 467.
Clusii C. DC. 467.
glaucescens Jacq. 468.
guineense S. et T. 467, 655.
 — v. *Gilletii* C. DC. 467.
 — v. *Thomeanum* C. DC. 467.
 — v. *velutinum* D. W. 468.
Laurentii D. W. 468.
subpeltatum W. 468, 655.
 — v. *parvifolium* C. DC. 468.
umbellatum L. 468.
unguiculatum R. et P. 468.
- PIPERACEAE, 467.
- Piptadenia** Bth. 184.
africana H. f. 184.
- Piroucia abyssinica* Moq. 463.
stricta Moq. 463.
- Pistia** L. 592.
Stratiotes L. 592.
- Pithecolobium** Mart. 189.
altissimum Oliv. 189.
Pittosporum bicuratum Schinz et T. D. 94.
- Placua lacora* O. K. 301.
Pladera decussata Roxb. 375.
- Plagiostyles** Pierre, 487.
Klaineana Pierre, 487.
- Platanocarpum africanum* H. L. 240.
Platanthera Brachycorythis Schltr. 538.
pleistophylla Schltr. 537.
- Platostoma** P. B. 444.
africanum P. B. 444.
Buettnerianum Briq. 444.
flaccidum Briq. 444.
Platycoryne Poggeana Rolfe. 535.
- Platylepis** A. Rich. 534.
glandulosa R. f. 534.
- Platysepalum** Welw. 136.
cuspidatum Taub. 136.
ferrugineum Taub. 136, 653.
hypoleucum Taub. 136.
Ledermanni Engl. 653.
Pogge Taub. 136.
Vanhouttei D. W. 136.
violaceum Welw. 136.
- Plectranthus** L'Her. 447.
intrusus Briq. 447.
miserabilis Briq. 447, 655.
phryxotrichus Briq. 447.
Schlechteri Guerke, 448.
- Plectronia** L. 267.
acarophyta D. W. 267.
Arnoldiana D. W. et T. D. 267.
Barteri D. W. et T. D. 267.
brevifolia Engl. 268.
congensis Th. et Hel. Dur. 268.
connata D. W. et T. D. 268.
cornelioides D. W. 268.
Deweyrei D. W. 268.
Geutlii D. W. 268.
Gilletii D. W. 268.
Laurentii D. W. 268.
Lualabae K. Sch. 269.
lucida D. W. et T. D. 269.
Oddoni D. W. 269, 654.
psychotrioides K. Sch. 269.
pulchra K. Sch. 269.
Pynaertii D. W. 269.
tomentosa D. W. 269.
venosa Oliv. 269, 654.
- Plectrotropis hirsuta* S. et T. 153.
- Pleiocarpa** Bth. 338.
bicarpellata Stapf, 338.
tubicina Stapf, 338.
- Pleiocarpa**
Welwitschii Stapf, 338.
- Pleioceras** Baill. 338.
Gilletii Stapf, 338.
- Pleiotaxis** Steetz, 314.
affinis O. Hoffm. 314.
Deweyrei O. Hoffm. 314.
eximia O. Hoffm. 311.
pulcherrima Steetz, 314.
pulcherrima Klatt, 314.
 — v. *Poggeana* O. Hoffm. 314.
rugosa O. Hoffm. 314.
- Pleodiporochna Buettneri* V. Tgh. 85.
- Plinia pedunculata* L. f. 203.
- Pluchea** Cass. 302.
Dioscoridis DC. 302.
- PLUMBAGINACEAE, 319.
- Plumbago** L. 319.
zeylanica L. 319.
- Plumeria** L. 341.
alba L. 341.
rubra L. 341.
- Poa Chapellieri* Kth, 646.
ciliaris L. 646.
fascicularis Kth, 646.
megastachya Koel. 646.
micronata P. B. 648.
multiflora Forsk. 646.
nutas Retz. 647.
tremula Lam. 647.
- Podalyria Haematoxylon* S. et T. 167.
- PODOSTEMACEAE, 465.
- Podostemum** Guerke, 36.
alat a Guerke, 36, 651.
- Poggeophyton** Pax, 490.
aculeatum Pax, 490, 656.
- Pogonia** Juss. 534.
umbrosa R. f. 534.
- Poinciana** L. 171.
pulcherrima L. 170.
regia Boj. 171.
- Poirrea conferta* Bth. 196.
constricta Bth. 197.
mosambicensis Kl. 197.
- Polanisia** Raf. 29.
hirta Pax, 29.
Sereti D. W. 29.
- Pollia** Thuob. 574, 657.
condensata Cl. 574.
 — v. *variegata* Hort. 574.
- Polycarpaea** Lam. 41.
corymbosa Lam. 41.
 — v. *eriantha* Pax, 42.
 — v. *genuina* Pax, 42.
eriantha Hochst. 42.
glabrifolia DC. 42.
Loefflingii B. et H. f. 41.
prostrata Decne. 41.
- Polycarpon** Loeffl. 41.
depressum Rohrb. 41.

- Polycarpon**
 prostratum Pax, 41.
 pusillum Roxb. 41.
- Polycephalum** Engl. 99.
 integrum D. W. et T. D. 99.
 Poggei Engl. 99.
- Polygala** L. 39.
 acicularis Oliv. 39.
 arenaria W. 39.
 Cabrae Chod. 39.
 congoensis Guerke, 39.
 Goumesiana Weltr. 39.
 piscicariaefolia DC. 39.
 sparsiflora Olin. 40.
 — f. robustior Chod. 40.
 ukerensis Guerke, 40.
 Verdickii Guerke, 40.
- POLYGALACEAE**, 39.
- POLYGNACEAE**, 463.
- Polygonum** L. 463.
 acuminatum Kth. 463.
 barbatum L. 463.
 lanigerum R. Br. 463.
 — v. africanum Meisn. 464.
 lanigerum Meisn. 464.
 senegalense Meisn. 464.
 serrulatum Lag. 464.
 tomentosum W. 464.
- Polyochnella** congoensis V. Tgh. 85.
 Gilletiana V. Tgh. 85.
 Welwitschii V. Tgh. 86.
- Polyspatha** Bth. 579.
 paniculata Bth. 579.
- Polysphaeria** H. f. 267.
 pedunculata K. Sch. 267.
- Polystachya** Hook. 524.
 affinis Ldl. 524.
 bracteosa Ldl. 524.
 bulbophylloides Rolfe, 517.
 epiphytica D. W. 524.
 Gilletii D. W. 524.
 gologensis R. f. 524.
 gracilis D. W. 524.
 Huygheii D. W. 524.
 Kindtiana D. W. 524.
 latifolia D. W. 524.
 Laurentii D. W. 525.
 mayombensis D. W. 525.
 mukandaensis D. W. 525.
 mystacioides D. W. 525.
 odorata Ldl. 525.
 polychaete Krzl. 525.
 ramulosa Ldl. 525.
 rhodoptera R. f. 525.
 tessellata Ldl. 526.
 Walhiana D. W. 526.
- Pontederia natans** P. B. 573.
- PONTEDERIACEAE**, 573.
- Popowia** Endl. 19.
 congoensis Engl. et Diels, 19.
 ferruginea Engl. et Diels, 19.
 Gilletii D. W. 19.
 Laurentii D. W. 19.
 Schweinfurthii Engl. et Diels, 20.
- Porana** Burm. 381.
 subrotundifolia D. W. 381.
 Porochma Hoffmanni-Otonis V. Tgh. 85.
 quangenensis V. Tgh. 86.
- Portulaca** L. 42.
 crassifolia Jacq. 43.
 grandiflora Hook. 42.
 oleracea L. 42.
 patens Jacq. 43.
 quadrifida L. 43.
- PORTULACACEAE**, 42.
 Pothomorphe subpeltatum Miq. 468.
- Pouchetia** A. Rich. 263.
 africana DC. 263.
 — v. cuneata Hiern, 263.
 Baumanniana Buett. 263.
- Pouzolzia** Gaud. 513
 denudata D. W. et T. D. 513.
 Dewevrei D. W. et T. D. 513.
 guineensis Bth. 513.
- Premna** L. 436.
 angolensis Guerke, 436.
 quadrifolia S. et T. 436.
- Prevostea** Choisy, 380.
 breviflora D. W. 380.
 Cabrae D. W. et T. D. 380.
 campanulata K. Sch. 380.
 Oddoni D. W. 380.
 Poggei Damn. 380.
- Protea** L. 470.
 angolensis Weltr. 470.
 ferruginea Engl. 470.
 Lemairei D. W. 470.
 Poggei Engl. 470.
- PROTEACEAE**, 470.
- Pseudarthria** W. et A. 144.
 confertiflora Bak. 144.
 Hookeri W. et A. 144.
- Pseudanthemum** Rdlk. 428.
 Lindavianum D. W. et T. D. 428.
 Ludovicianum Lindau, 428.
 nigritanum Rdlk. 429.
- Pseudobarleria** Lindau A. Dew. 418.
- Pseudolachnostylis** Pxa, 480.
- Pseudolachnostylis** Verdickii D. W. 480.
- Pseudospondias** Engl. 114.
 microcarpa Engl. 114.
- Psidium** L. 201.
 Guajava L. 201.
 pomiferum L. 202.
 pyriferum L. 202.
- Psophocarpus** Neck. 155.
 longepedunculatus Hassk. 155.
 palmatorum G. et P. 155.
 palustris Desv. 155.
- Psorospermum** Spach, 44.
 febrifugum Spach, 44.
 — f. latifolium D. W. 44.
 ferrugineum H. f. 44.
 tenuifolium H. f. 44.
- Psychotria** L. 280.
 acaemtopoda K. Sch. 280.
 Ansellii Hiern, 280.
 Bieleri D. W. 280.
 brachyantha Hiern, 280.
 brunnea Schob. 281.
 Butayi D. W. 281.
 Cabrae D. W. 281.
 cinerea D. W. 281.
 cristata Hiern, 281, 654.
 cyanopharynx K. Sch. 281.
 Dewevrei D. W. 281.
 djumaensis D. W. 281.
 djumaensis D. W. 283.
 ealaensis D. W. 281.
 Gilletii D. W. 281, 654.
 gracilescens D. W. 282.
 hamata D. W. 282.
 Kimuenzae D. W. 282.
 kisantuensis D. W. 282.
 Laurentii D. W. 282.
 longevaginalis Schw. 282.
 mogandjoensis D. W. 282.
 nigropunctata Hiern, 282.
 obovatifolia D. W. 282.
 obvallata S. et T. 284.
 Oddoni D. W. 282.
 Poggei K. Sch. 283.
 potamophila K. Sch. 283.
 pygmaeodendron K. Sch. 283.
 stigmatophylla K. Sch. 283.
 triflora S. et T. 267.
 Vogeliana Bth. 283.
 Wildemaniana T. D. 283.
- Pterocarpus** L. 163.
 Cabrae D. W. 163.
 Dekindtianus Harms, 164.

Pterocarpus

Eastaphyllum L. 163.
crinaceus Auct. 164.
grandiflorus M. Mich. 164.
humilis L. 163.
Mutondo D. W. 164.
odoratus D. W. 164.
tiuctorius Welw. 164.
Pteropetalum Klingii Pax. 33

Pterygota Endl. 64.
macrocarpa K. Sch. 64.

Psychopetalum Bth. 96.
alliaceum D. W. 96.
Laurentii D. W. 96.
uirgicans D. W. 96.

Puelia Franch. 648.
Dewevrei D. W. et T. D. 648.

Punica L. 218.
grauatum L. 218.
Pupal lappacea Hiern, 453

Pupalia Juss. 458.
lappacea Moq. 458.
Pycnanthus Kombo Warb. v. *angolensis* Warb. 469.

Pycnobotrya Bth. 352.
nifida Bth. 352.

Pycnocoma Bth. 497.
Laurentii D. W. 497.
macrophylla Bth. 497.
Sapiui D. W. 497.
Thonneri Pax, 498.
trilobata D. W. 498.

Pycnostachys Hook. 451.
congensis Guerke, 451.
Descampsii Briq. 451.
Goatzenii Guerke, 451.

Pycneus P. B. 608.
albo-marginatus Nees, 608.
flavescens Rehb. 608.
globosus Rehb. 608.
 — v. *nilagiricus* Cl. 608.
Mundtii Nees, 608.
oakfortensis Cl. 608.
polystachyus P. B. 609.
propinquus Nees, 609.
Smithianus Cl. 609.
subtrigonus Cl. 609.
tremulus Cl. 609.

Pynaertia D. W. 91.
ealaensis D. W. 91.

Pyrenacantha Hook. 99.
Staudtii Engl. 99.

Q

Quamoclit Moench, 390.
pinnata Hoj. 390.
vulgaris Choisy, 390.

Quassia L. 83.
africana Baill. 83.
Quisqualis L. 201.
ebracteata P. B. 201.
indica L. 201.

R

Radlkofera Gilg, 112.
calodendron Gilg, 112.

Randia L. 257.
acarophyta D. W. 257.
acuminata Bth. 258.
Bruneelii D. W. 258.
clalantha K. Sch. 258.
congolana D. W. et T. D. 258.

corymbosa DC. 274.
Cuvellierana D. W. 258.
Eetveldeana D. W. et T. D. 258.
 — v. *elongata* D. W. 258.

Lemairi D. W. 259.
Liebrechtsiana D. W. et T. D. 259.
longiflora T. D. et Sch. 259.

Lujae D. W. 259.
maculata DC. 259.
malleifera B. et H. f. 259.
micrantha K. Sch. 259.
 — v. *Poggeana* K. Sch. 259.

Muusae Schw. 260.
myrmecophyta D. W. 260.
 — v. *glabra* D. W. 260.
 — v. *subglabra* D. W. 260.

— v. *typica* D. W. 260.
nalaensis D. W. 260.
octomera B. et H. f. 260.
physophylla K. Sch. 260.
Pynaertii D. W. 260.
reticulata Bth. 265.
Sereti D. W. 261.

RANUNCULACEAE, 13.

Ranunculus L. 15.
philonotis Ehrh. 15.
pinatus Poir. 15.
sardous Cr. 15.
Raphanus pilosus W. 222.

Raphia P. B. 584.
Gentiliana D. W. 584.
 — v. *Gilletii* D. W. 584.
Laurentii D. W. 584.
monbuttorum Drude, 584.
Sese D. W. 584.
vinitera P. B. 584.
Raphiacme macrostemon K. Sch. 356.
splendens K. Sch. 356.

Raphidiocystis H. f. 231.
Welwitschii H. f. 231.

Raphionacme Harv. 356.
Michelii D. W. 356.
splendens Schlt. 356.
Verdiekii D. W. 357.
Raphiostylis beunensis Pl. 98.

Heudelottii Pl. 99.

Rauwolfia L. 339.
castra Sond. 339.
cardiocarpa K. Sch. 340.
congolana D. W. et T. D. 340.
longeacuminata D. W. et T. D. 339.

Mannii Stapf, 340.
obscura K. Sch. 340.
senegambica A. DC. 340.
vomitaria Afz. 340.

Reaemia L. f. 543.
bracteata D. W. et T. D. 543, 656.
Cabrae D. W. et T. D. 543.
congolana D. W. et T. D. 543.
Dewevrei D. W. et T. D. 544.

Rhabdophyllum affine V. Tgh. 86.
Arnoldianum V. Tgh. 87.

longipes V. Tgh. 88.
refractum V. Tgh. 89.

RHAMNACEAE, 103.

Rhamphicarpa Bth. 404.
fistulosa Bth. 404.
longiflora Bth. 404.

Rhaphidophyllum ramosum Hochst. 406.

Rhaptopetalum Eetveldeanum D. W. et T. D. 67.

Rhektophyllum N. E. Br. 590.

congensis D. W. et T. D. 590.
mirabile N. E. Br. 590.

Rhinacanthus Nees, 431.
coumuis Nees, 428, 431.

Dewevrei D. W. et T. D. 431.

parviflorus T. And. 432.

Rhipsalis aethiopica Welw. 235.

Cassytha Gaertn. 235.

Rhizophora L. 194.
Mangle L. 194.
 — v. *racemosa* Engl. 194.

racemosa G. F. W. Mey. 194.

RHIZOPHORACEAE, 194.

- Rhoeo** *Hance*, 582.
discolor Hance, 582.
- Rhoicissus** *Pl.* 109.
edulis D. W. 109.
Verdecikii D. W. 109.
- Rhopalopilina** *Oliv.* 98.
patens Pierre, 98.
 — *v. angustifolia D. W.* 98.
Poggei Engl. 98.
Rhus insignis Oliv. 116.
pulcherrima Oliv. 116.
- Rhynchosia** *Lour.* 157.
affinis D. W. 157.
cajanoides G. et P. 159.
calycina G. et P. 157.
caribaea DC. 157.
Cienhoueskii Schw. 132.
congensis Bak. 158.
 — *v. Gilletii D. W.* 158.
cyanosperma Bth. 158.
flavissima Hochst. 158.
glomerata G. et P. 159.
katangensis D. W. 158.
Manni Bak. 158.
Memnonia DC. 158.
miniata DC. 158.
Verdecikii D. W. 159.
- Rhynchospora** *aurca R.* Br. 594.
candida Boeck. 594.
ochrocephala Boeck. 605.
- Rhynchostigma** *Lujaei D. W. et T. D.* 358.
- Rhynchotropis** *Harms.* 126.
Poggei Harms. 126.
- Rhytachne** *Desv.* 623.
congoensis Hack. 623.
 — *v. incompleta Hack.* 623.
 — *v. polystachya Hack.* 623.
 — *f. submutica Hack.* 623.
gabonensis Hack. 623.
- Ricinocarpus** *brachystachyus O. K.* 492.
- Ricinodendron** *M.-A.* 489.
africanum M.-A. 489.
- Ricinus** *L.* 499.
communis L. 499.
- Riedleya** *corchorifolia DC.* 65.
- Rinorea** *brachypetala O. K.* 34.
congensis Engl. 34.
dentata O. K. 34.
Demourei Engl. 34.
Dupuisii Engl. 34.
Engleriana D. W. et T. D. 34.
ilicifolia O. K.
Poggei Engl. 35.
Welwitschii O. K. 35.
- Ritchiea** *R. Br.* 32.
ageleaeifolia Gilg. 32.
ealaensis D. W. 32.
erecta H. f. 32.
fragrans R. Br. 32.
immersa D. W. 32.
Laurentii D. W. 32.
polypetala H. f. 32.
Pynaertii D. W. 32.
- Rivina** *inaequalis Hook.* 462.
latifolia Lam. 462.
- Robinia** *argentiflora S. et T.* 165.
sericea Poir. 165.
Thonningii S. et T. 135.
violacea P. B. 165.
- Rondeletia** *febrifuga Afz.* 211.
floribunda G. Don. 346.
- ROSACEAE, 189.
Rostellaria tenella Nees. 430.
- Rotala** *L.* 217.
filiformis Hiern. 217.
fontinalis Hiern. 217.
- Rothmannia** *longiflora Salisb.* 259.
Stanleyana H. f. 259.
- Rottboellia** *L. f.* 621.
exaltata L. f. 621.
- Rourea** *Aubl.* 118.
adiantoides Gilg. 118.
bamangaensis D. W. et T. D. 118.
chiliantha Gilg. 118.
coccinea Hook. f. 653.
fasciculata Gilg. 118.
Foenum-graecum D. W. et T. D. 118.
inodora D. W. et T. D. 118.
obliquifoliolata Gilg. 118.
ovalifoliolata Gilg. 118.
Poggeana Gilg. 119.
pseudobaccata Gilg. 119.
splendida Gilg. 119.
unifoliolata Gilg. 119.
viridis Gilg. 119.
- RUBIACEAE, 239.
- Rubus** *L.* 192.
Goetzenii Engl. 192.
kirungensis Engl. 192.
pinnatus W. 192.
- Ruellia** *L.* 419.
batayana J. Br. et K. Sch. 422.
elongata P. B. 421.
imbricata Forsk. 419.
patula Jacq. 419.
- Rumex** *L.* 465.
abyssinicus Jacq. 465.
- Rungia** *Nees.* 432.
Buettneri Lindau. 432.
congoensis Cl. 432.
- Rungia**
grandis T. And. 429.
Paxiana Cl. 430.
- RUTACEAE, 81.
- Rutidea** *DC.* 278.
Dupuisii D. W. 278.
hispida Hiern. 278.
leucotricha K. Sch. 278.
olenotricha Hiern. 278.
russpilis D. W. et T. D. 278.
Schlechteri K. Sch. 279.
Sereti D. W. 279.
Smitthii Hiern. 279.
- Rynchospora** *Vahl.* 594.
aurca Vahl. 594.
candida Boeck. 594.
- S
- Sabicea** *Aubl.* 251.
affinis D. W. 251.
calycina Bth. 251.
capitellata Bth. 251.
Deweyrei D. W. et T. D. 252.
 — *v. latifolia D. W.* 252.
Dinklagei K. Sch. 252.
floribunda K. Sch. 252.
Gilletii D. W. 252.
Kolbeana Bth. 252.
Laurentii D. W. 252.
 — *v. Pynaertii D. W.* 252.
 — *v. velutina D. W.* 252.
longepetiolata D. W. 252.
Schumanniana Buett. 252.
venosa Bth. 253.
 — *v. villosa K. Sch.* 253.
Vogelii Bth. 253.
- Saccharum** *spicatum L.* 628.
Thunbergii Hack. 621.
- Saccolabium** *Bl.* 526.
oenioides Krztl. 526.
- Sagittaria** *obtusifolia L.* 593.
Sagis vinifera Poir. 585.
- Sakersia** *H. f.* 214.
Laurentii Cogn. 214.
 — *v. cuneata D. W.* 214.
strigosa Cogn. 214.
- Salacia** *L.* 103.
alata D. W. 103.
 — *f. gracilis D. W.* 103.
congolensis D. W. et T. D. 103.
Demourei D. W. et T. D. 103.
Deweyrei D. W. et T. D. 103.
Laurentii D. W. 103.
Pynaertii D. W. 103.
senegalensis DC. 103.

Salacia

unipunctata D. W. et T. D. 102.

Sambucus L. 229.

nigra L. 239.

SAMYDACEAE, 219.

Sauseveria Thunb. 551.

angolensis Welw. 551.

bracteata Bah 551.

cylindrica Boj. 551.

fragrans Jacq. 565.

guineensis Willd. 551.

Laurentii D. W. 551.

longiflora Sims, 551.

SANTALACEAE, 476.

SAPINDACEAE, 109.

Sapindus simplicifolia

Don, 115.

Sapium P. Br. 500.

cornutum Pax, 500.

— *v. africanum* Engl. 656.

— *v. coriaceum* Pax, 500.

Mannianum Bth. 500.

oblongifolium Pax, 500.

Poggei Pax, 500.

xylocarpum Pax, 500.

SAPOTACEAE, 320.

Sarcocephalus Afz. 239.

Diderrichii D. W. et T. D. 239.

esculentus Afz. 240.

Gilletii D. W. 239.

Russseggeri Kotschy, 239.

sambucinum K. Sch. 239.

Sarcophrynium K. Sch. 544.

Arnoldianum D. W. 511.

baccatum K. Sch. 544.

bisubulatum K. Sch. 544.

brachystachyum K. Sch. 545.

leionomium K. Sch. 545.

oxycarpum K. Sch. 545.

Satyrium Sw. 536.

brachypetalum Engl. 536.

Gilletii D. W. 536.

Goetzenianum Krzl. 536.

riparium R. f. 536.

Sauvagesia L. 35.

congolensis Engl. 35.

erecta L. 35.

nutans Pers. 35.

Scabiosa L. 288.

attenuata L. f. 288.

Columbaria L. 288.

Scaevola L. 317.

Lobelia Moer. 317.

Scaphopetalum Mast. 66.

Dewevrei D. W. et T. D. 66.

monophysca K. Sch. 66.

Thouneri D. W. et T. D. 66.

Scaphopetalum

Thouneri D. W. et T. D. 66.

Schefflera Forst. 238.

Barteri Harms, 238.

Goetzianii Harms, 238.

Schistostephium Less. 309.

heptalobum Bth. 309.

Schizoglossum E. Mey. 358.

Cabrae D. W. 358.

Debeerstianum K. Sch. 359.

macroglossum K. Sch. 359.

spathulatum K. Sch. 358.

tricorniculatum K. Sch. 358.

Schmidelia africana DC. 110.**Schoepfianthus Engl. 98.**

Zenkeri Engl. 98.

Schotia Jacq. 179.

latifolia Jacq. 179.

Romii D. W. 179.

simplicifolia Vahl. 175.

Schrebera Roxb. 324.

trichoclada Welw. 324.

Schwenkia L. 398.

americana L. 398.

Scilla L. 571.

camerooniana Bak. 571.

Ledieni Engl. 571.

— *v. Laurentii* D. W. 571.

— *v. zebrina* D. W. 571.

mierantha A. Rich. 570.

Scirpus L. 618.

atropurpureus Retz. 612.

barbatus Rottb. 614.

Buettnerianus Boeck. 618.

capillaris L. 614.

capitatus L. 613.

complanatus Retz. 616.

dichotomus L. 616.

diphyllus Retz. 616.

dipsaceus Rottb. 617.

ferruginus L. 617.

filamentosus Vahl. 614.

fluitans L. 619.

gracillimus Boeck. 615.

hispidus Vahl, 617.

obtusifolius Lam. 618.

puberulus Poir. 615.

quadrangularis Kth. 618.

senegalensis Lam. 619.

squarrosus Poir. 618.

trichobasis Bak. 615.

Scleria Berg. 594.

Acriulus Cl. 594.

— *f. Leopoldiana* Cl. 594.

Scleria

Barteri Boeck. 595.

Buchananii Boeck. 595.

canaliculato-triquetra Boeck. 595.

hirtella Sw. 595.

macrantha Boeck. 595.

— *v. melanophala* Kth. 595.

— *v. macrantha* Cl. 595.

— *f. oculo-albo* Cl. 596.

Naiomanniana Boeck. 596.

ovnligera Nees, 596.

racemosa Poir. 596.

verrucosa Willd. 596.

Sclerochiton Harv. 424.

Gilletii D. W. 424.

Scoparia L. 401.

dulcis L. 401.

SCROPHULARIACEAE, 398.

Scutellaria L. 454.

Debeerstii Briq. 454.

polyadena Briq. 454.

Scyphosyce Baill. 509.

Gilletii D. W. 509.

Scytanthus laurifolius T. Aud. 427.

SCYTOPETALACEAE, 67.

Scytopetalum Pierre, 67.

Duchesnei Engl. 67.

Sebaea R. Br. 374.

debilis Schinz, 374.

oligantha Schinz, 374.

Secamone R. Br. 357.

Dewevrei D. W. 357.

Securidaca L. 40.

longepedunculata Fres. 40. 651.

— *v. parvifolia* Oliv. 40.

Securinea obovata M.-A. 484.**Selago L. 434.**

alopocuroides Rolfe, 434.

Johnstonii Rolfe, 434.

Senecio L. 312.

abyssinicus Sz-B. 312.

cernuus L. f. 310.

congolensis D. W. 312.

crepidioides Aschers. 310.

Dewevrei O. Hoffm. 312.

discifolius Oliv. 312.

diversifolius A. Rich. 310.

katangensis O. Hoffm. 312.

maritimus L. f. 312.

Quartinius Aschers. 312.

vitellinus Aschers. 310.

Senna occidentalis Roxb. 173.

Tora Roxb. 173.

Sersalisia R. Br. 321

Sersalisia

- Laurentii D. W. 321.
Sesamum L. 412.
 angolense Welw. 412.
 angustifolium Engl. 112.
 calycinum Welw. 412.
 indicum L. 413.
 — v. *angustifolium* Oliv. 412.
 — v. *integerrimum* Engl. 413.
macranthum Oliv. 412.
 mombanense D. W. et T. D. 413.
occidentale Regel et Heer, 413.
radiatum S. et T. 413.
 Thouneri D. W. et T. D. 413.

Sesban aegyptiacus Poir. 137.

- pubescens* Hiern, 137.
punctatus Hiern, 137.

Sesbania Pers. 137.

- aegyptiaca* Pers. 137.
affinis D. W. 137.
pubescens DC. 137.
punctata DC. 137.

Sesuvium L. 236.

- crystallinum* Welw. 236.
mesembryanthemoides Wawra et Peyr, 236.

Setaria P. B. 636.

- aurea* Hochst. 636.
glauca P. B. 636.
mauritiana Spreng. 634.
verticillata P. B. 636.

Sherbournia foliosa G. Dou, 262.**Shuteia bicolor** Choisy, 382.**Sicyos** L. 233.

- angulatus* H. f. 233.
australis Endl. 233.

Schimperi Naud. 233.**Sida** L. 48.

- acuta* Burm. f. 48.
carpinifolia L. f. 48.
cordifolia L. 48.
hernandioides L'Hér. 50.
humilis Cav. 49, 652.
indica L. 51.
linearifolia S. et T. 49.
linifolia Cav. 49, 652.
paniculata L. 49.
rhombifolia L. 49.
rostrata S. et T. 50.
rotundifolia K. Sch. 50.
rugosa Thoms. 48.
scabra S. et T. 50.
spinosa L. 49.
stipulata Cav. 48.
unilocularis L'Hér. 49.
urens L. 50.
veronicifolia Lam. v. *humilis* K. Sch. 49.

Sida

- Vogelii* H. f. 48.
Sideroxylon dulcificum A. DC. 321.
revolutum Bak. 322.
 SIMARUBACEAE, 83.
Sinapis juncea L. 27.
Siphonanthus formicarum Hiern, 438.
myricoides Hiern, 439.
splendens Hiern, 441.
volubilis Hiern, 441.

Smilax L. 561.

- Kraussiana* Meisn. 561.
 — v. *Morsoniana* A. DC. 562.
Morsoniana Kth, 562.

Smithia Ait. 140.

- Harmsiana* D. W. 140.
strigosa Bth. 653.
strobilantha Welw. 140.
uguenensis Taub. 140.

SOLANACEAE, 391.

Solanum L. 391.

- acanthocalyx* Kl. 391.
aculeastrum Dur. 391.
aethiopicum L. 391, 655.
Anguivi Hook. 392.
antidotum Damm, 391.
cerasiforme DuRoi. 395.
congense Lk. 392.
Dewevrei Damm, 392.
duplosinuatum Kl. 392.
Durandi Damm, 392.
edule S. et T. 392.
esculentum Dun. 393.
guineense Lam. 394.
inconstans C. H. Wright, 392.
judicum L. 392.
Laurentii D. W. 393.
Laurentii Damm, 394.
Lescauwaei D. W. 393.
Lujaei D. W. et T. D. 394.
Lycopersicum L. 395.
macrocarpon L. 393.
 — v. *hirsutum* Damm, 393.

Melongoia L. 393.

- Monteiroi* C. H. Wright, 393.
mors-elephantum Damm, 393.

Naumannii Engl. 393.

- nigrum* L. 393.
nodiflorum Jacq. 394.
Preussii Damm, 394.
Pynaertii D. W. 394.
Sapini D. W. 394.

Seafortianum Andrews, 391.

- Sereti* D. W. 394.
subcoriaceum Th. et Hdl. Dur. 394.

Solanum

- symphyostemon* D. W. et T. D. 392.
Welwitschii C. H. Wright, 394.
 — v. *strictum* C. H. Wright, 394.
Wildemaii Damm, 395.
Zuccagnianum Damm, 395.

Solenostemon S. et T. 448.

- bullulatus* Briq. 449.
monostachyus Briq. 448.

amplifrons Briq. 448.

- ocimoides* S. et T. 448.
 — v. *monostachyus* Bak. 448.

ocimoides Briq. 448.**Sonchus** L. 317.

- asper* Hill, 317.
Dregeanus DC. 317.
oleraceus L. 317.
 — v. *spinosus* O. et H. 317.

Schweinfurthii O. et H. 317.

- spinosus* Lam. 317.
taraxacifolius S. et T. 316.

Sopubia Ham. 405.

- angolensis* Engl. 405.
 — v. *angustipetala* Engl. 405.

Buchneri Engl. 405.

- cana* Hiern, 405.
Dregeana Bth. 405.
karaguensis Oliv. 405.

latifolia Engl. 406, 655.

- Monteiroi* Skan, 406.
ramosa Hochst. 406.
trifida Ham. 406.

— v. ramosa Engl. 406.**Sorghum halepense** Nees, 626.**halepense** Pers. 627.**Sorindeia** Thou. 114.

- Gilletii* D. W. 114.
juglaudifolia Pl. 115.
Kimuenzae D. W. 115.
Poggei Engl. 115.

Sparganophorus

- Gaertn.* 289.
Vaillantii Gaertn. 289.

Sparmannia L. f. 72.

- abyssinica* Hochst. 72.
Spathandra memecyloides Bth. 216.

Spathodea P. B. 409.

- campanulata* P. B. 409.
lacvis P. B. 409.
lutea Bth. 410.
nilotica Seem. 409, 655.
tomentosa Bth. 410.

- Spermacoce dibrachiata* Oliv. 286.
hebecarpa Oliv. 286.
ocimoides Burm. 286.
ramisperma Pohl. 286.
Ruelliae DC. 287.
senensis Hieru. 287.
scrrulata P. B. 286.
stricta L. f. 287.
- Sphaeranthus** L. 302.
flexuosus O. Hoffm. 302.
polycephalus O. et H. 302.
suaveolens DC. 302.
- Sphaerocodon** Bth. 365.
platypoda K. Sch. 365.
- Sphaerodendron angolense* Seem. 239.
- Sphaerosicyos** H. f. 229.
Meyeri H. f. 229.
sphaericus Cogn. 229.
- Sphenoclea** Gaertn. 318.
zeylanica Gaertn. 318.
- Sphenostylis** E. Mey. 153.
angustifolia Sond. 153.
katangensis Harms, 153.
stenocarpa Harms, 154.
 — v. *latifoliolata* D. W. 154.
- Spilanthes** L. 307.
Acemella Murr. 307.
 — v. *oleracea* Cl. 307.
oleracea L. 307.
- Spirodela** Schleid. 592.
polyrrhiza Schleid. 592.
- Spondias** L. 113.
angolensis O. Hoffm. 114.
aurantiaca S. et T. 113.
dubia A. Rich. 113.
lutea L. 113.
microcarpa A. Rich. 114.
Mombin L. 113.
Myrobalanus L. 113.
- Sponia guineensis* Planch. 501.
- Sporobolus** R. Br. 641.
barbigerus Franch. 641.
breviglumis Hack. 641.
capensis Kth. 642.
indicus R. Br. 641.
mayumbensis Franch. 641.
Molleri Hack. 641.
robustus Kth. 641.
strictus Franch. 642.
- Stachytarpheta** Vahl. 435.
angustifolia Vahl. 435.
indica Vahl. 435.
jamaicensis Vahl. 435.
- Staphylosyce* Barteri H. f. 231.
- Staphysora Sapini* D. W. 486.
- Stathmostelma** K. Sch. 361.
chironioides K. Sch. 361.
incarnatum K. Sch. 361.
Laurentianum A. Desv. 361.
pedunculatum K. Sch. 361.
Verdickii D. W. 361.
Verdickii D. W. 361.
Wildemanianum Th. et Hel. Dur. 361.
- Staurospermum verticillatum* S. et T. 288.
- Steganotaenia araliacea* Hochst 238.
- Stelularia inflata* D. W. 402.
- Stenantha** Engl. et Diels. 22.
pluriflora D. W. 22.
- Stephania** Lour. 25
laetiflora B. et H. f. 25.
- Stephegyne africana* Walp. 240.
stipulata B. et H. f. 240.
- Sterculia** L. 60.
acuminata P. B. 61.
caricifolia G. Don. 61.
cordifolia Cav. 62.
katangensis D. W. 60.
pedunculata D. W. et T. D. 60.
pubescens G. Don. 60.
quinqueloba K. Sch. 60, 652.
Tragacantha Ldl. 60.
verticillata S. et T. 61.
- STERCULIACEAE, 60.
- Stereospermum** Cham. 411.
Arnoldianum D. W. 411.
dentatum A. Rich. 411.
Harmsianum K. Sch. 411.
katangense D. W. 411.
Kunthianum Cham. 411, 655.
Verdickii D. W. 411, 655.
- Stictocardia** Hall. f. 391.
beraviensis Hall. f. 391.
- Stipa capensis* Thuub. 622.
- Stipularia** P. B. 253.
africana P. B. 253.
 — v. *hirsuta* D. W. 253.
elliptica Schwe 253.
 — v. *hisuta* D. W. 253.
- Stironcuron stipulatum* Rdlk. 322.
- Stizolobium pruriens* Medic. 148.
urens Pers. 149.
- Streptocarpus** Ldl. 408.
katangensis D. W. et T. D. 408.
- Streptogyne crintata* P. B. 618.
- Striga** Lour. 403.
Dewevrei D. W. et T. D. 403.
Forbesii Bth. 403.
gesnerioides Vatka, 403.
hermonthica Bth. 403.
hirsuta Bth. 403.
lutea Lour. 403.
macrantha Bth. 402.
orobanchoides Bth. 403, 404.
- Strychnia trifoliata* S. et T. 33.
- Strombosiopsis** Engl. 98.
congolensis D. W. et T. D. 98.
- Strophanthus** DC. 346.
Arnoldianus D. W. et T. D. 346.
bracteatus Franch. 348.
Demeusei A. Desv. 346.
Dewevrei D. W. 346, 654.
ecaudatus Rolfe, 349.
gardeniiflorus Gilg, 347.
Gillottii D. W. 349.
hispidus DC. 347.
 — v. *Bosere* D. W. 347.
holosericeus K. Sch. 347.
intermedius Pax, 347.
 v. *Bieleri* D. W. 347.
Ledieni Stein, 347.
Paroissei Franch. 348.
parviflorus Franch. 346.
parviflorus D. W. et T. D. 346.
Preussii Engl. et Pax, 348.
 — v. *brevifolius* D. W. 348.
sarmentosus DC. 348.
Tholloni D. W. 347.
Verdickii D. W. 349.
Welwitschii K. Sch. 349.
Wildemaianus Gilg, 349.
- Struthium africanum* P. B. 289.
- Strychnos** L. 371.
congolana Gilg, 371, 654.
densiflora Baill. 371.
Dewevrei Gilg, 371.
floribunda Gilg, 371.
Gilletii D. W. 371.
gracillima Gilg, 372.
 — v. *pancispinosa* D. W. 372.
innocua Del. 372.
Kipapa Gilg, 372.
longicauda Gilg, 372.

- Strychnos**
occidentalis Solered. 372.
pungens Solered. 372.
scandens S. et T. 330.
 Schweinfurthii Gilg,
 372.
suavcolens Gilg, 371.
 suberosa D. W. 372.
 Unguncha A. Rich. 373.
 — v. obovata D. W. 373.
 variabilis D. W. 373.
Stylarthropus Laurentii
 Lindau, 422.
Stuhlmannii Lindau,
 422.
Stylosanthes Sw. 141.
 erecta P. B. 141.
Swartzia Schreb. 169.
 madagascariensis Desv.
 169.
Symphonia L. f. 45.
 gabonensis Pierre, 45.
 globulifera L. f. 45.
 — v. africana Vesq. 45.
 — v. gabonensis Vesq.
 45.
Synclisia Bth. 25.
 scabrida Miers, 25.
Syngonanthus Ruhl.
 593.
 Schlechteri Ruhl. 593.
Synsepalum Baill. 321.
 dulcificum Daniell, 321.
 stipulatum Engl. 321.
Syzygium Gaertn. 203.
 cordatum Hochst. 203.
 cordifolium Kl. 203.
 owariense Bth. 203.
- T**
- Tabernaemontana** Barteri
 H. f. 342.
durinervis T.D. et
 Schinz, 343.
durissima Stapf, 343.
eglandulosa Stapf, 343
erythrophthalma K.
 Sch. 352.
nitida Stapf, 338.
pachysiphon Stapf, 338
penduliflora K. Sch.
 344.
Smithii Stapf, 344.
Thonneri T.D. et D.W.
 344.
Tabernanthe Baill. 342.
albiflora Stapf, 342.
Bocca Stapf, 342.
Iboga Baill. 342.
Iboga Oliv. 342.
tenuiflora Stapf, 342.
Tacazzea Decne, 356.
apiculata Oliv. 356.
pedicellata K. Sch. 356.
- Tacca** Forst., 558.
 pinnatifida Forst., 558.
TACCACEAE, 558.
Tachiadenus continentalis
 Bak. 374.
Taeniocarpum articulatum
 Desv. 155.
Tagetes L. 309.
 Gilletii D. W. 309.
 patula L. 309.
Talinum Adans. 43.
 crassifolium W. 43.
 cuneifolium W. 43.
 patens W. 33.
Tamarindus L. 178.
 indica L. 178.
Tanacetum heptalobum
 DC. 309.
Tardaxyl dibrachiatum
 Hiern, 286.
 scabra Hiern, 287.
 stricta Hiern, 287.
Tarenna Gaertn. 257.
 congensis Hiern. 257.
 Gilletii D.W. et T.D.
 266.
 nigrescens Hiern, 266.
Teclea Del. 81.
 Engleriana D. W. 81.
Telanthera R. Br. 460.
 maritima Moq. 460.
Telfairea Hook. 225.
 pedata Hook. 225.
Tephrosia Pers. 131.
 bracteolata G. et P. 131.
 Butayi D. W. et T.D.
 131.
 curvata D. W. 131.
 digitata DC. 132.
 elegans Sch. 131.
 katangensis D. W. 131.
 Kindu D. W. 131.
 Laurentii D. W. 131.
 linearis Pers. 132.
 lupiniifolia DC. 132.
 — v. digitata Bak. 132.
 megalantha M. Mich.
 132.
 nseleensis D. W. 132.
 noctiflora Roj. 132.
 Verdickii D. W. 133.
 villosa Pers. 133.
 Vogelii H. f. 133.
Terminalia L. 195.
 Catappa L. 195.
 Dewevrei D. W. et T.D.
 195.
 superba Engl. 195.
 torulosa F. Hoffm. 195.
Tetracera L. 16.
 aluifolia W. 16, 651.
 alnifolia Auct. 16.
 — v. Demeusei D.W. 16.
 Demeusei D. W. 16.
 fragrans D.W. et T.D. 17.
 Gilletii D. W. 16.
- Tetracera**
 Masuiana D. W. et T.D.
 16.
obtusata D.W. et T.D.
 17.
 podotricha Gilg, 16.
 — v. glabrescens D. W.
 16.
 Pogzei Gilg, 17.
 rosiflora Gilg, 17.
 Stuhlmanniana Gilg, 17.
 — v. occidentalis D. W.
 17.
Tetrapleura Bth. 184.
 Thonningii Bth. 184.
Thalia L. 548.
 coerulea Ridl. 548.
 geniculata L. 549.
 Schumanniana D. W.
 549.
Thalictrum L. 15.
 rhynocharpum Del. et
 Rich. 15.
Thaumatooccus Bth.
 545.
 Daniellii Bth. 545.
Themeda Forsk. 627.
 ciliata Hack. 627.
 ForskahlII Hack. 627.
 — v. glauca Hack. 627.
Theobroma L. 66.
 Cacao L. 66.
Thesium L. 476.
 doloseum Pilger, 476.
Thespesia Cav. 58.
 Debeerstii D. W. et T.D.
 58.
 populnea Soland. 58.
Thevetia L. 339.
 neriifolia Juss. 339.
Thomandersia Baill.
 426.
 Butayi D. W. 426.
 congolana D. W. et T.
 D. 426.
 — v. grandifolia D. W.
 427.
 Hensii D.W. et T.D.
 427.
 — v. latifolia D.W. 427.
 — v. longipetiolata D.
 W. 427.
 Laurentii D. W. 427.
 laurifolia Baill. 427.
 — v. latifolia Th. et
 HéL. Dur. 427.
 — v. longipetiolata Th.
 et HéL. Dur. 427.
Thonningia Vahl, 476.
 sanguinea Vahl, 576.
Thunbergia L. f. 414.
 affinis S. Moore, 414.
 alata Boj. 414.
 erecta T. And. 414.
 graminifolia D. W. 414.
 kamerunensis Lindau,
 415.

Thunbergia

- katangensis *D. W.* 414.
 lathyroides *Burkill*, 414.
 Liebrechtsiana *D. W.* et
T. D. 414.
 longepedunculata *D. W.*
 414.
 Michelana *D. W.* 414.
 parvifolia *Lindau*, 414.
 proxima *D. W.* 414.
 Stuhlmanniana *Lindau*,
 415.
 Thonneri *D. W.* et *T. D.*
 415.
 Verdickii *D. W.* 415.
 Vogeliana *Bth.* 415.
 Vossiana *D. W.* 415.

THYMELACACEAE. 470.**Thyrsodium** *Bth.* 114.

- africanum *Engl.* 114.
Thysanolaena *Nees*,
 628

acarifera *Nees*, 628.*Tiaridium indicum*

Lehm. 378.

TILIACEAE. 68.**Tinuaea** *K.* et *P.* 454.platyphylla *Brig.* 454.**Torenia** *L.* 400.affinis *D. W.* 400.parviflora *Ham.* 400.— *v.* brevipedicellata*D. W.* 400.*Toumatea madagascariensis**Taub.* 169.**Toxocarpus** *W.* et *A.* 357.Lujaei *D. W.* 357.**Trachyphrynium** *Bth.*

546.

Braunianum *Bak.* 546.*Dauck-linauanum* *J.**Br.* et *K.* *Sch.* 546.*Liebrechtsianum* *D. W.*et *T. D.* 546.*Poggeanum* *K.* *Sch.* 517.*Prussianum* *K.* *Sch.*

547.

violaceum *Ridl.* 547.**Trachypogon** *Nees*, 622.capensis *Triu.* 622.polymorphus *Hack.* *v.**Montufari* *Hack.* 622.— *subv.* capensis *Hack.*

622.

Tragia *L.* 498.cordifolia *Bth.* 498.Descampsii *D. W.* 498.lukafuensis *D. W.* 498.*Mercuiriatis* *L.* 492.tenuifolia *Bth.* 498.volubilis *L.* 498.*Zenkeri* *Pax*, 498.**Treculia** *Decne.* 510.africana *Engl.* 510.*Dewevrei* *D. W.* et *T. D.*

510.

Treculia*Engletiana* *D. W.* et
T. D. 510.**Trema** *Lour.* 501.guineensis *Ficalho*, 501.— *f.* strigosa *Luett.* 501*Treulia africana* *Baill.* 491.*Treulosperma africanum**H. f.* 233.**Tricalysia** *A. Rich.* 264.aurantiodora *D. W.* 261.coriacea *Hiern.* 264.*Crepiniant* *D. W.* 264.— *v.* elliptica *D. W.* 264.*Dewevrei* *D. W.* et *T. D.*

264.

djumaensis *D. W.* 264.griseiflora *K. Sch.* *v.*longestipulata *D. W.* et*T. D.* 265.*Hensii* *D. W.* 264.katangensis *D. W.* 261.*Laurentii* *D. W.* 264.longestipulata *D. W.* et*T. D.* 265.petiola a *D. W.* 265*Pynaertii* *D. W.* 265.reticulata *Hiern.* 265.roseoides *D. W.* et *T. D.*

265.

Sapini *D. W.* 265.*Sereti* *D. W.* 265.*Welwitschii* *K. Sch.* 265.*Trichelostylis complanata**Nees*, 616.**Trichilia** *L.* 92.emetica *Vahl.* 92.*Gilletii* *D. W.* 92.*Laurentii* *D. W.* 92*Pynaertii* *D. W.* 92quadri-valvis *C. DC.* 93.retusa *Oliv.* 93.**Trichodesma** *R. Br.* 379.*Droogmansianum* *D. W.*et *T. D.* 379.*zeylaucum* *R. Br.* 379.*Trichodon Phragmites**Rendle*, 645.**Tricholaena** *Schrad.*

635.

rosea *Nees*, 635.sphaelata *Bth.* 635.**Trichopteryx** *Nees*, 642.arundinacea *Hack* 642.flammda *Bth.* 642.*Trichoscypha Braunii**Engl.* 115.congoensis *Engl.* 115*Laurentii* *D. W.* 115.*Odiloni* *D. W.* 115.**Trichostachys** *H. f.* 284.*Laurentii* *D. W.* 284.microcarpa *K. Sch.* 284.

654.

Trifolium *L.* 126.**Trifolium***Goetzonii Taub.* 126.**Tristemma** *Juss.* 205.cornifolium *Triana*, 209.*Demeusei* *D. W.* 205.erectum *G.* et *P.* 209.grandifolium *Gily.* 206.— *v.* conzolanum *D. W.*

206.

hirtum *Vent.* 206.incompletum *R. Br.* 206.— *v.* grandifolium*Hiern.* 206.leucalyx *Cogn.* 206.litorale *Bth.* 207.roseum *Gily.* 207.*Schumacheri* *Auct.* 206.*Schumacheri* *G.* et *P.*

206.

— *v.* *g.* andifolium *Cogn.*

206.

— *v.* litorale *H. f.* 207.scopriatum *Triana*, 212.vircoodes *Gily.* 207.**Tristicha**, *Thou.* 465.alternifolia *Thou.* 465.**Triumfetta** *L.* 70.cordifolia *A. Rich.* 72.*Descampsii* *D. W.* et*T. D.* 70.dubia *D. W.* 70.*Gilletii* *D. W.* 70.heliocarpa *K. Sch.* 71.*Hensii* *D. W.* et *T. D.* 71.intermedia *D. W.* 71.ionalla *K. Sch.* 71, 651.longiseta *A. Rich.* 72.orthacantha *Wehe.* 71.pilosa *Roth.* 71.rhomboidea *Jacq.* 71.semitriloba *Jacq.* 71.— *v.* africana *K. Sch.* 72.setulosa *D. W.* et *T. D.*

70.

trachystoma *K. Sch.* 72.trifoculare *G.* et *P.* 71.velutina *Vahl.* 71.*Welwitschii* *Mast.* 72.**Trochomeria** *H. f.* 226.macrocarpa *H. f.* 226.— *v.* *Welwitschii* *Cogn.*

226.

Trymanococcus *Poepp.*et *Endl.* 503.*Gilletii* *D. W.* 503.kamerunianus *Engl.*

503, 676.

kamerunensis *Engl.* 656.*Tubiflora acandis* *O. K.*

415.

paucisquamosa *D. W.* et*T. D.* 415.squamosa *Lindau*, 415.*Tuckeya Candelabrum**Gaud.* 587.**TURNERACEAE**, 221.

- Turraea** *L.* 91.
Cabrae *D. W.* et *T. D.* 91.
Laurentii *D. W.* 91.
Vogelii *H. f.* 91, 652.
- Turraeanthus** *Baill.* 91.
Klainei *Pierre*, 91.
Tyloflossa palustris
Hochst. 430.
- Tylophora** *R. Br.* 365.
congoensis *Schll.* 365.
Gilletii *D. W.* 365.
gracilis *D. W.* 365.
sylvatica *Decne.* 365.
- U**
- Upaca** *Baill.* 485.
Bossenge *D. W.* 485.
ealaensis *D. W.* 485.
Heudelotii *Baill.* 485.
Laurentii *D. W.* 485.
Marquesii *Pax.* 485, 655.
microphylla *Pax.* 485.
 — *v.* *Hendrickxii* *D. W.* 485.
Mile *Pax.* 485
Pynaectii *D. W.* 485.
Sereti *D. W.* 485.
Vau Houettei *D. W.* 486.
- UMBELLIFERACEAE.**
 237
- Uncaria** *Schreb.* 241.
aricana *G. Don.* 241.
- Urena** *L. F.* 19.
aethiopica *Dunal.* 20.
congoensis *Engl.* et *Diels.*
 19.
Emmii *Engl.* 19.
ferruginea *Oliv.* 19.
glauca *Engl.* et *Diels.*
 19.
ozypetala *DC.* 21.
- Uragoga** *L.* 285.
ceratoloba *K. Sch.* 285.
peduncularis *K. Sch.* 285.
Thonneri *D. W.* et *T. D.*
 285
- Urania** *Desv.* 145.
picta *Desv.* 145.
- Urceola** *Roxb.* 355.
osculenta *Bth.* 355.
- Urelytrum** *Hark.* 622.
giganteum *Pilger.* 622.
- Urena** *L.* 51.
americana *L.* 52.
diversifolia *S.* et *T.* 52.
lobata *L.* 51.
 — *v.* *reticulata* *Guerke.*
 52.
obtusata *G.* et *P.* 52.
virgata *G.* et *P.* 52.
- Urea** *Gaud.* 512.
aestivans *L.* 511.
arbores *P. W.* et *T. D.*
 512.
- Urera**
cameroonensis *Wedd.*
 512.
congoensis *D. W.* et
T. D. 512.
Dewevrei *D. W.* et *T. D.*
 512.
Gilletii *D. W.* 512.
Laurentii *D. W.* 512.
oblongifolia *Bth.* 512.
Thonneri *D. W.* et *T. D.*
 512.
- Urginea** *Steinh.* 570.
altissima *Bak.* 570
micrantha *Solms.* 570.
viridula *Bak.* 571.
- Urophyllum** *Wall.* 250.
callicarpoides *Hiern.*
 250
caudatum *Bak.* 571.
Dewevrei *D. W.* et *T. D.*
 250.
Gilletii *D. W.* et *T. D.*
 251.
Liebrechtsianum *D. W.*
 et *T. D.* 251.
verticillatum *D. W.* et
T. D. 251.
viridiflorum *Schro.* 251.
Urtica condensata *Hochst.*
 512
interrupta *L.* 511.
- URTICACEAE.** 501.
Uruparia africana *O. K.*
 241.
- Usteria** *W.* 370.
gunneensis *W.* 370.
vulgaris *Aiz.* 371.
- Utricularia** *L.* 406.
andongensis *Welw.* 406
Benjaminiana *D. W.*
 407.
conferta *Wight.* 407.
exoleta *R. Br.* 407.
flexuosa *Vahl.* 407.
 — *v.* *flexuosa* *Kam.* 407.
Gilletii *D. W.* 407.
inflexa *Vahl.* 408.
obtusata *Sw.* 407.
obtusata *Sw.* 407.
reflexa *Oliv.* 408.
stellaris *L. f.* *v.* *inflexa*
T. D. et *Sch.* 408.
subulata *L.* 408.
 — *v.* *minuta* *Kam.* 408.
Thonningii *Sch.* 408.
tortilis *Welw.* 408.
 — *v.* *andongensis* *Kam.*
 407.
tricornata *Bak.* 407.
- Uvaria** *L.* 17.
brevistipitata *D. W.* 17.
Cabrae *D. W.* 17.
glabrata *Engl.* et *Diels.*
 17.
- Uvaria**
latifolia *Engl.* et *Diels.*
 18, 651.
 — *v.* *luluensis* *Engl.* et
Diels. 18.
Mocoli *D. W.* et *T. D.* 18.
parviflora *G.* et *P.* 21.
Poggei *Engl.* et *Diels.* 18.
scabrata *Oliv.* 18.
Smithii *Engl.* et *Diels.*
 18.
verrucosa *Engl.* et *Diels.*
 18.
- V**
- Vahadenia** *Stapf.* 325.
Laurentii *Stapf.* 325.
 — *v.* *grandiflora* *Stapf.*
 325.
 — *f.* *obtusifolia* *D. W.*
 325.
- Vahea comorensis* *Boj.*
 327.
clastica *Kl.* 329.
florida *F. Muell.* 326.
ovariensis *F. Muell.* 329.
- Vallisneria** *L.* 514.
spiralis *L.* 514.
- Vandellia** *L.* 400.
diffusa *L.* 400.
- Vangueria** *Juss.* 269.
brachytricha *K. Sch.*
 269.
cantlioides *Bth.* 269.
Demusei *D. W.* 270.
Dewevrei *D. W.* et *T. D.*
 270.
infausta *Burch.* 270.
katangensis *K. Sch.* 270.
Laurentii *D. W.* 270.
rubiginosa *K. Sch.* 270.
tristis *K. Sch.* 270.
Verdiekii *K. Sch.* 270.
- Vanilla** *Sw.* 532.
acuminata *Rolfe.* 532.
africana *Ldl.* 533.
cucullata *Krsz.* 533.
grandifolia *Ldl.* 533.
Laurentiana *D. W.* 533.
 — *v.* *Gilletii* *D. W.* 533.
Lujae *D. W.* 533.
- Vatica** *L.* 47.
africana *Welw.* 47.
 — *v.* *hypoleuca* *Oliv.* 48.
hypoleuca *Welw.* 48.
katangensis *D. W.* 48.
tortilis *Engl.* et *Diels.* 90.
- Vausagesia** *Baill.* 90.
africana *Baill.* 90.
- Vellozia** *Vand.* 558.
aequatorialis *Rendle.*
 558.
- Ventenatia glauca** *P. B.* 36.
Ventilago *Gaertn.* 103.
leiocarpa *Bth.* 103.
maderaspata *Bth.* 103.

- Verbena indica* L. 435.
VERBENACEAE. 434.
Verbesina Acmella L. 307.
alba L. 305.
Verdiekia D. W. 569.
kataungensis D. W. 569.
Vernonia Schreb. 290.
acrocephala Klatt, 290.
amygdalina Delile, 290.
arborescens Welw. 291.
aristata Sch. et B. 294.
armerioides O. Hoffm. 290.
 — *v. tomentosa O. Hoffm.* 290.
auriculifera Hiern, 290.
 — *v. auric. defici. O. Hoffm.* 290.
Butoni O. et H. 291
Calvoana H. f. 291.
cinerea Less. 291.
conferta Bth. 291.
 — *v. Sereti D. W.* 291.
clinopodioides O. Hoffm. 291.
cruda Klatt, 291.
cylindrica A. Rich. 294.
Dekindtii O. Hoffm. 293.
Dupuisii Klatt. 292.
Fischeri O. Hoffm. 292.
gerberiformis O. et H. 292.
glaberrima Welw. 292.
grandis Buj. 292.
Grantii Oliv. 292.
hamata Klatt. 292.
Hensii Klatt. 292.
infundibularis O. et H. 292.
jugalis O. et H. 292.
 — *v. Dekindtii Hiern*, 293.
kataungensis O. Hoffm. 293.
lasiolepis O. Hoffm. 293.
Melleri O. et H. 293.
miseria O. et H. 290.
Napus O. Hoffm. 293.
 — *f. angustifolia O. Hoffm.* 293.
 — *f. latifolia O. Hoffm.* 293.
natalensis Sz-B. 293.
pandurata Link. 294.
podocoma Sz-B. 294.
Poggeana O. Hoffm. 294.
Poskeana Vatke et Hildebr. 294.
 — *v. chlorolepis O. Hoffm.* 294.
potamophila Klatt. 294.
quangensis O. Hoffm. 295.
 — *v. tomentosa O. Hoffm.* 295.
Vernonia
senegalensis Less. 295.
Sereti D. W. 295.
sericolepis O. Hoffm. 295.
Smithiana Less. 295.
suprafastigiata Klatt. 295.
Teuszi Klatt. 296.
ulophylla O. Hoffm. 296.
undulata O. et H. 296.
Verdiekii O. Hoffm. 296.
vernicea Klatt. 296.
violacea Oliv. 296.
Verulania corymbosa DC. 274.
Vigna Savi, 151.
Aizelii Bak. 151.
ambacensis Welch. 151.
angustifolia H. f. 154.
capensis Walp. 153.
capitata D. W. 151.
Catjang L. 153.
esculenta D. W. 151.
glabra Savi. 152.
gracilis H. f. 151.
hastifolia Bak. 151.
kataungensis Th. et Hel. Dur. 151.
kataungensis D. W. 154.
Laurentii D. W. 151.
luteola Bth. 152.
 — *v. villosa M. Mich.* 152.
micrantha Harms. 152.
ornata Welw. 154.
 — *v. latifoliolata D. W.* 154.
pubigera Bak. 152.
pucciata M. Mich. 154.
reticulata H. f. 152.
scabra D. W. 152.
sinensis Endl. 152.
triloba Walp. 153.
tuberosa A. Rich. 153.
venulosa Bak. 153.
vexillata Bth. 153.
 — *v. angustifolia Bak.* 154.
Vignaudia luteola Schw. 249.
Vignopsis D. W. 153.
lukafuensis D. W. 153.
Vilfacapensis P. B. 642, 716
Vinca rosea L. 341.
Vincentia revoluta Pierre. 322.
Vincetoxicum polyanthum K. Sch. 364.
Viola L. 33.
abyssinica St. 33.
guineensis Schum. et Thonn. 33.
VIOLA (EAE). 33.
Virecia Savi, 247.
multiflora Sm. 247.
procumbens Sm. 247.
Viscum L. 475.
congolense D. W. 475.
Gilletii D. W. 475.
lenticellatum D. W. 476.
obscurum Thunb. 476.
 — *v. decurrens Engl.* 476.
Vismia Vell. 44.
allinis Oliv. 44.
Laurentii D. W. 44
rubescens Oliv. 44
Vitex L. 436
aeschnifolia Bak. 436.
Baehneri Guerke. 655.
camporum Buett. 436, 655.
Cienkowski K. et P. 436.
congolensis D. W. et T. 436.
congruan Buett. 655.
De-wewrei D. W. et T. D. 437.
ferruginea S. et T. 437.
Gilletii Guerke. 437.
lukafuensis D. W. 437.
lundensis Guerke. 437.
mediensis Oliv. 436.
Mombassae Vatke. 437.
Poggei Guerke. 437.
rufescens Guerke. 437.
Vitis abyssinica Hochst. 104.
adenocaulis Miq. 105.
aralioides Welw. 105.
Chontini Lecard. 105.
contracta Bak. 105.
cornifolia Bak. 106.
dehbilis Bak. 106.
diffusiflora Bak. 106.
firmosa Welw. 106.
Guerkiana Buett. 107.
ibuenis Bak. 107.
producta Afz. 108.
robignosa Welw. 107.
Smithiana Bak. 108.
suberosa Welw. 108.
truncatilis Bak. 108.
Thomlingii Bak. 105.
Voacanga Thou, 341.
africana Stapf. 344.
angolensis Stapf. 345.
glabra K. Sch. 344.
obtusata K. Sch. 345.
psilocalyx Pierre. 345.
puberula K. Sch. 345.
Schweinfurthii T. D. et D. W. 344.
Schweinfurthii D. W. et T. D. 345.
Thouarsii R. et S. 654.
Voandzeia Thou, 155.
subterranea Thou. 155.
Vossia Wall. 622.
procera Wall. et Griff. 622.

Vouapa coerulea D. W. 175.
macrophylla Baill. 176.
Palisotii Baill. 175.
Voyria primuloides Bak.
 375.

W

Walleria *Kirk*, 572.
angolensis *Bak.*, 572.
Mackeni *T. Kirk*, 572.
Walteria *L.*, 65.
africana *S.* et *T.*, 65.
americana *L.*, 65.
arborescens *Cav.*, 65.
guineensis *S.* et *T.*, 65.
indica *L.*, 65.
virgata *G. Don.*, 263.
Webbii aristata *DC.*, 294.
Smithiana *DC.*, 295.
Weihia *Spreng.*, 194.
africana *Bth.*, 194.
Whitfieldia *Hook.*, 421.
Arnoldiana *D. W.* et
T. D., 421.
elongata *D. W.* et *T. D.*
 421.
 — *v.* *Dewevrei* *D. W.* et
T. D., 421.
Gilletii *D. W.*, 421.
laterita *Hook.*, 421.
Laurentii *Cl.*, 422.
Liebrechtsiana *D. W.* et
T. D., 422.
longiflora *TD.* et *Sch.*
 241.
longiflora *S. Moore*, 422.
longifolia *T. And.*, 421.
 422.
Stuhlmannii *Cl.*, 422.
subviridis *Cl.*, 422.
sylvatica *D. W.*, 422.
Willoughbeyi scandens
Hiern., 298.
Willoughbeia cordata *Kl.*
 327.
Wissadula *Medic.*, 50.
hernandioides *Guerke*,
 50.
rostrata *Planch.*, 50, 652.

Wormskioldia *S.* et *T.*
 221.
heterophylla *S.* et *T.*, 222.
lobata *Urban.*, 221.
pilosa *Schw.*, 222.
Wrightii Stuhlmannii *K.*
Sch., 352.

X

Xeranthemum fulgidum
L., f. 303.
Xylophylla obovata *W.*
 484.
Xylopia *L.*, 20.
acutiflora *Bth.*, 21.
aethiopica *A. Rich.*, 20.
aurantiodora *D. W.* et
T. D., 22.
Bokoli *D. W.* et *T. D.*, 20.
Butayei *D. W.*, 20.
congolensis *D. W.*, 21.
De Keyzeriana *D. W.*, 21.
Dumalana *Vallot*, 21.
Gilletii *D. W.*, 21.
kataugensis *D. W.*, 21.
longipetala *D. W.* et *T.*
D., 21.
odoratissima *Welw.*, 21.
oxypetala *Oliv.*, 21.
parviflora *Engl.* et *Diels*,
 21.
Poggeana *Engl.* et *Diels*,
 22.
undulata *P. B.*, 20.
Wilwerthii *D. W.* et *T.*
D., 22.
 — *v.* *cuneata* *D. W.*, 22.
Xylopicion aethiopicum
O. K., 20.
Dumalium *T. D.* et
Sch., 21.
odoratissimum *O. K.*, 21.
parviflorum *O. K.*, 21.
 XYRIDACEAE, 573.
Xyris *L.*, 573.
angustifolia *D. W.* et *T.*
D., 573.
capensis *Thunb.*, 573.
congensis *Bth.*, 573.

Xysmalobium *R. Br.*
 358.
antlongense *Hiern.*, 358.
decipiens *N. E. Br.*, 358.
dissolutum *K. Sch.*, 358.
Holubii *S.-Elliott.*, 358.
Holubii *S.-Elliott.*, 358.
spatulatum *N. E. Br.*
 358.
tricorniculatum *Th.* et
Hél. Dur., 358.

Z

Zamioculcas Boivinii
Decne., 588.
 — *v.* *angustifoliolatus* *D.*
W. et *T. D.*, 588.
Zanthoxylum macrophyll-
um *Oliv.*, 81.
Zapania nodiflora *Lam.*
 435.
Zea *L.*, 621.
Mays *L.*, 621.
Zeuxine *Ldl.*, 533.
elongata *Rolf.*, 533.
Zingiber *Adams.*, 542.
officinale *Rosc.*, 542.
 ZINGIBERACEAE, 539.
elegans *Jacq.*, 305.
Zizyphus *L.*, 104.
espinosus *Buett.*, 104.
insularis *C. Sm.*, 104.
Jujuba *Lam.*, 104.
 — *v.* *obliquifolia* *Engl.*
 104.
Zornia *Gmel.*, 141.
angustifolia *G.* et *P.*, 141.
diphylla *Pers.*, 141.
glochidiata *Rehb.*, 141.
gracilis *DC.*, 141.
Zygia Broenei *Walp.*, 187.
fastigiata *E. Mey.*, 188.
Zygodon *Bth.*, 354.
acillaris *Bth.*, 353.
subsessilis *Bth.*, 354.
Zygoneri-n *Welwitschii*
Baill., 349.
Zuzypium guineense *G.* et
P., 203.

CORRECTIONS.

Page 245, *Oldenlandia macrophylla* DC., supprimer cette espèce et la rapporter avec les habitations au *Pentodon pentander* Vatke.

Page 410, *Dolichandrone tomentosa* Benth., même observation et la réunir au *Markhamia tomentosa* K. Schum.

Page 507, *Ficus Nekbudu*... et non *Nekbuku*.


Page 642, *Vilfa capensis* P. B., même observation et la réunir au *Sporobolus capensis* Kunth.

New York Botanical Garden Library

QK 407 .D86 c.2

gen

Durand, Theophile/Syloges florae congois



3 5185 00062 6125

