

# 广西植物名录

## 第二册 双子叶植物



广西植物研究所编

1971.12



13007  
58.VI

# 毛主席語录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。  
指导我们思想的理论基础是马克思列宁  
主义。

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次  
会议开幕词(一九五四年九月十五日),一九五  
四年九月十六日《人民日报》

备战、备荒、为人民。

转摘自《中国共产党第八届中央委员会第十一次  
全体会议公报》(一九六六年八月十二日)

自然科学是人们争取自由的一种武装。  
人们为着要在社会上得到自由,就要用社会科学来了解社会,改造社会进行社会革命。人们  
为着要在自然界里得到自由,就要用自然科学来了解自然,克服自然和改造自然,从自然里  
得到自由。

在边区自然科学研究会成立大会上的讲话(一九  
四〇年二月五日),一九四〇年三月十五日  
《新中华报》


人类总得不断地总结经验,有所发现,  
有所发明,有所创造,有所前进。

转摘自《周恩来总理在第三届全国人民代表大会  
第一次会议上的政府工作报告》,一九六四年  
十二月三十一日《人民日报》

中科院植物所图书馆



S0050188



贈閱

中国科学院  
植物研究所草本植物室



## 說 明

遵照伟大领袖毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大教导，为了进一步开发和利用祖国丰富的植物资源，更好地为社会主义建设服务，我们将多年来野外调查采集的标本和收集的资料重新整理，编写成《广西植物名录》，供医药、工、农、林、牧、副等部门，在开发利用广西丰富的植物资源时参考。

本册是《广西植物名录》的第二册，收载已知的广西双子叶植物188科，1200属，4463种（其中包括亚种11、变种358、和变型38），绝大部分是分布在广西的植物，少数是从我国各省、区或国外引进广西的种类。

每种植物依次记载：中名，别名，学名，分布，用途。

我们一定要解放我国神圣领土台湾省。为了坚决粉碎帝国主义制造“两个中国”的阴谋，绝不许将台湾省称作“Formosa（福摩萨）”。因此在学名中，凡有用“Formosa”称台湾省作为植物种名语根的，本书一律将“Formosa（福摩萨）”改为“Taiwan（台湾）”。

中名的左上角有“\*”号的，是栽培植物。旧有中名不恰当需要更改，或未有中名的植物，我们都拟出新名。在名后有“☆”号的，为新拟名。

分布仅指该植物在广西的分布（产地）。因资料不够完整，就是在广西的分布也没有全部写上，故在两地（县）之间，或相邻地区，虽然本书未有记录，也可能有这种植物的

分布。书中的大瑶山、大苗山等，是指各该山脉和相邻的地区。

科的排列系按《有花植物科志》的系统（1926年版）。每个科中的属、种、亚种和变种等，则按拉丁文字母顺序排列。同属植物的属名，除该属第一个种的属名全写外，其余只写属名的第一个字母代之，但在每页的上方，有全写的属名。

为了节省篇幅和便于应用，对学名中的一部分命名人，采用比通常使用的缩写更简略的缩写。例如：L.=Linn., Thb.=Thunb., Hk.=Hook., H-M.=Hand.-Mzt., Gagn.=Gagnep., W. et A.=Wight et Arn., R. et W.=Rehd. et Wils., S. et Z.=Sieb. et Zucc., M.-A.=Muell.-Arg.

书末有中名索引、拉丁文科名、属名索引，以便检索。

由于我们学习毛泽东思想不够，水平有限，错误之处，请同志们批评指正。

在编写过程中，承兄弟单位热情支持，提供了一些标本、资料，借此致以衷心感谢和革命敬礼！

广西植物研究所  
一九七一年十二月

## 《广西植物名录》第二册勘误表

页	行	误	正
43	4	Naravalia	Naravelia
44	倒10	小蘖碱	小蘖碱
45	倒12	莲荷	莲 荷
59	倒8	苧叶萎	苧叶萎
61	倒7	Houttynia	Houttuynia
104	倒10	酢醬草科	酢浆草科
105	5,13,17, 21,22	酢醬草	酢浆草
110	14	Duabunga	Duabanga
113	倒5	小二仙科	小二仙草科
131	倒8	Gymnostemma	Gynostemma
131	倒12	Gymnopetatum	Gymnopetalum
135	3	Gymnostemma	Gynostemma
146	左上角	Camellia	Camellia-Cleyera
146	13	concarpa	conocarpa
147	右上角	Camellia-Eurya	Cleyera-Eurya
191	7	柑橄果	柑榄果
208	11,15,20	黃花稔	黃花稔
209	1,5,12, 18,23	黃花稔	黃花稔

页	行	误	正
348	倒10	十	十万大山
356	6	锦楮	绵楮
375	9	seneu	sensu
476	倒2	Roiptelea	Rhoiptelea
517	倒7	C.B.Clarks	C.B.Clarke
517	倒11	var. dielsii (Lévl.)	var. dielsii (Lévl.) Walk.
529	倒5	macrothyrsas	macrothyrsus
539	10	急性腹炎	急性肠炎
666	倒12	缩萼	宿萼
684	2	腹炎腹泻	肠炎腹泻
729	6	Goniosporum	Geniosporum
763	中5	白鼓钉…58	白鼓钉…85
763	右8	鸟袱草	包袱草
763	右10	包不宿	鸟不宿
769	左13	似铁屎木	似铁屎米
786	左8	柑橄果	柑榄果
788	右30	狭叶山黄麻…392	狭叶山黄麻…367
818	右8,10	198A	198B
832	左8	…183…431	…183…413
835	左3	…232…592	…232…593
840	右14	Viburnnm	Viburnum

# 目 录

被子植物亚门 ANGIOSPERMAE

双子叶植物纲 DICOTYLEDONEAE

1. 木 兰 科	Magnoliaceae.....	1
2A. 八 角 科	Illiciaceae .....	6
3. 五 味 子 科	Schizandraceae .....	8
8. 番 荔 枝 科	Annonaceae .....	10
11. 樟 科	Lauraceae .....	15
13A. 青 藤 科	Illigeraceae .....	35
14. 肉 豆 蔻 科	Myristicaceae .....	36
15. 毛 莖 科	Ranunculaceae .....	36
17. 金 鱼 藻 科	Ceratophyllaceae .....	45
18. 睡 莲 科	Nymphaeaceae .....	45
19. 小 蘸 科	Berberidaceae .....	46
21. 木 通 科	Lardizabalaceae .....	48
22. 大 血 藤 科	Sargentodoxaccae .....	50
23. 防 已 科	Menispermaceae .....	50
24. 马 兜 铃 科	Aristolochiaceae .....	56
27. 猪 笼 草 科	Nepenthaceae .....	58
28. 胡 椒 科	Piperaceae.....	59
29. 三 白 草 科	Saururaceae .....	61

30.	金粟兰科	<i>Chloranthaceae</i> .....	62
32.	罂粟科	<i>Papaveraceae</i> .....	63
33.	紫堇科	<i>Fumariaceae</i> .....	64
36.	白花菜科	<i>Capparidaceae</i> .....	65
39.	十字花科	<i>Cruciferae</i> .....	68
40.	堇菜科	<i>Violaceae</i> .....	72
42.	远志科	<i>Polygalaceae</i> .....	75
45.	景天科	<i>Crassulaceae</i> .....	79
47.	虎耳草科	<i>Saxifragaceae</i> .....	80
48.	茅膏菜科	<i>Droseraceae</i> .....	82
52.	沟繁缕科	<i>Elatinaceae</i> .....	83
53.	石竹科	<i>Caryophyllaceae</i> .....	83
54.	粟米草科	<i>Molluginaceae</i> .....	86
56.	马齿苋科	<i>Portulacaceae</i> .....	87
57.	蓼科	<i>Polygonaceae</i> .....	87
59.	商陆科	<i>Phytolaccaceae</i> .....	96
61.	藜科	<i>Chenopodiaceae</i> .....	97
63.	苋科	<i>Amaranthaceae</i> .....	98
64.	落葵科	<i>Basellaceae</i> .....	102
65.	亚麻科	<i>Linaceae</i> .....	102
66.	蒺藜科	<i>Zygophyllaceae</i> .....	103
67.	牻牛儿苗科	<i>Geraniaceae</i> .....	103
69.	酢浆草科	<i>Oxalidaceae</i> .....	104
70.	金莲花科	<i>Tropaeolaceae</i> .....	106
71.	凤仙花科	<i>Balsaminaceae</i> .....	106
72.	千屈菜科	<i>Lythraceae</i> .....	107
74.	海桑科	<i>Sonneratiaceae</i> .....	110

75.	安石榴科	Punicaceae.....	110
77.	柳叶菜科	Onagraceae .....	111
77A.	菱科	Hydrocaryaceae.....	113
78.	豆瓣草科☆	Haloragaceae.....	113
79.	水马齿科	Callitrichaceae .....	114
81.	瑞香科	Thymelaeaceae .....	114
83.	紫茉莉科	Nyctaginaceae .....	117
84.	山龙眼科	Proteaceae .....	117
85.	五桠果科	Dilleniaceae .....	120
87.	马桑科	Coriariaceae .....	120
88.	海桐花科	Pittosporaceae .....	121
91.	红木科	Bixaceae .....	123
93.	大风子科	Flacourtiaceae .....	124
94.	天料木科	Samydaceae .....	126
98.	桎柳科	Tamaricaceae.....	128
101.	转心莲科☆	Passifloraceae .....	128
103.	葫芦科	Cucurbitaceae .....	129
104.	秋海棠科	Begoniaceae .....	137
106.	木瓜科	Caricaceae .....	139
107.	仙人掌科	Cactaceae .....	139
108.	茶科	Theaceae .....	140
108A.	五列木科	Pentaphylacaceae .....	158
112.	猕猴桃科	Actinidiaceae .....	158
113.	水东哥科	Saurauiaceae .....	161
114.	金莲木科	Ochnaceae .....	162
116.	龙脑香科	Dipterocarpaceae .....	162
118.	桃金娘科	Myrtaceae .....	163

120.	野牡丹科	Melastomaceae .....	172
121.	使君子科	Combretaceae .....	180
122.	红树科	Rhizophoraceae.....	182
123.	金丝桃科	Hypericaceae .....	183
126.	山竹子科	Guttiferae.....	185
128.	椴树科	Tiliaceae .....	186
128A.	杜英科	Elaeocarpaceae .....	191
130.	梧桐科	Sterculiaceae.....	195
131.	木棉科	Bombacaceae .....	202
132.	锦葵科	Malvaceae .....	203
133.	金虎尾科	Malpighiaceae .....	210
135.	古柯科	Erythroxylaceae .....	211
135A.	粘木科	Ixonanthaceae .....	212
136.	大戟科	Euphorbiaceae .....	212
136A.	虎皮楠科	Daphniphyllaceae .....	238
139.	鼠刺科	Escalloniaceae .....	239
141.	醋栗科	Grossulariaceae .....	241
142.	绣球花科	Hydrangeaceae .....	241
143.	蔷薇科	Rosaceae .....	246
144.	毒鼠子科	Dichapetalaceae .....	274
145.	蜡梅科	Calycanthaceae.....	275
146.	含羞草科	Mimosaceae .....	275
147.	苏木科	Caesalpiniaceae.....	281
148.	蝶形花科	Papilionaceae .....	291
150.	通条木科☆	Stachyuraceae .....	334
151.	金缕梅科	Hamamelidaceae .....	335
152.	杜仲科	Eucommiaceae .....	339

154.	黄 杨 科	Buxaceae .....	340
155.	悬 铃 木 科	Platanaceae .....	341
156.	杨 柳 科	Salicaceae .....	341
159.	杨 梅 科	Myricaceae .....	343
161.	桦 木 科	Betulaceae .....	343
162.	榛 木 科	Corylaceae .....	345
163.	壳 斗 科	Fagaceae .....	346
164.	木 麻 黄 科	Casuarinaceae .....	364
165.	榆 科	Ulmaceae .....	365
167.	桑 科	Moraceae .....	369
169.	蕁 麻 科	Urticaceae .....	382
170.	大 麻 科	Cannabinaceae .....	392
171.	冬 青 科	Aquifoliaceae .....	393
173.	卫 矛 科	Celastraceae .....	403
178.	翅 子 藤 科	Hippocrateaceae .....	410
179.	茶 茉 莖 科	Icacinaceae .....	411
182.	青 皮 木 科	Olacaceae .....	412
183.	山 柑 科	Opiliaceae .....	413
185.	桑 寄 生 科	Loranthaceae .....	414
186.	檀 香 科	Santalaceae .....	417
189.	蛇 茜 科	Balanophoraceae .....	418
190.	鼠 李 科	Rhamnaceae .....	419
191.	胡 颠 子 科	Elaeagnaceae .....	425
193.	葡 萄 科	Vitaceae .....	426
194.	柑 桔 科	Rutaceae .....	434
195.	苦 木 科	Simarubaceae .....	447
196.	橄 榄 科	Burseraceae .....	447

197.	棟    科	Meliaceae .....	448
198.	无患子科	Sapindaceae .....	453
198A.	七叶树科	Hippocastanaceae .....	457
198B.	南华木科	Bretschneideraceae .....	458
200.	槭    树    科	Aceraceae .....	459
201.	清风藤科	Sabiaceae .....	464
204.	省沽油科	Staphyleaceae .....	468
205.	漆    树    科	Anacardiaceae .....	469
206.	牛栓藤科	Connaraceae .....	473
207.	胡桃科	Juglandaceae .....	474
207A.	马尾树科	Rhoipteleaceae .....	476
209.	山茱萸科	Cornaceae .....	477
210.	八角枫科	Alangiaceae .....	479
211.	紫    树    科	Nyssaceae .....	480
212.	五加科	Araliaceae .....	481
212A.	烂泥树科	Torricelliaceae .....	491
213.	伞形科	Umbelliferae .....	491
214.	山柳科	Clethraceae .....	498
215.	杜鹃花科	Ericaceae .....	499
215A.	鹿蹄草科	Pyrolaceae .....	508
216.	乌饭树科	Vacciniaceae .....	508
218.	水晶兰科	Monotropaceae .....	511
221.	柿    科	Ebenaceae .....	511
222.	山榄科	Sapotaceae .....	513
222A.	肉实科	Sarcospermaceae .....	515
223.	紫金牛科	Myrsinaceae .....	515
224.	安息香科	Styracaceae .....	525

225.	山 砻 科	<i>Symplocaceae</i> .....	531
228.	马 钱 科	<i>Loganiaceae</i> .....	538
229.	木 犀 科	<i>Oleaceae</i> .....	542
230.	夹 竹 桃 科	<i>Apocynaceae</i> .....	550
231.	萝 蔓 科	<i>Asclepiadaceae</i> .....	562
232.	茜 草 科	<i>Rubiaceae</i> .....	574
233.	忍 冬 科	<i>Caprifoliaceae</i> .....	603
235.	败 酱 科	<i>Valerianaceae</i> .....	610
236.	续 断 科	<i>Dipsacaceae</i> .....	612
238.	菊 科	<i>Compositae</i> .....	612
239.	龙 胆 科	<i>Gentianaceae</i> .....	646
239A.	睡 菜 科	<i>Menyanthaceae</i> .....	649
240.	报 春 花 科	<i>Primulaceae</i> .....	649
241.	蓝 雪 科	<i>Plumbaginaceae</i> .....	653
242.	车 前 草 科	<i>Plantaginaceae</i> .....	654
243.	桔 梗 科	<i>Campanulaceae</i> .....	654
243A.	五 脐 草 科	<i>Pentaphragmataceae</i> .....	657
243B.	楔 瓣 花 科	<i>Sphenocleaceae</i> .....	657
244.	半 边 莲 科	<i>Lobeliaceae</i> .....	657
247.	花 葱 科	<i>Polemoniaceae</i> .....	659
248.	田 基 麻 科	<i>Hydrophyllaceae</i> .....	659
249.	紫 草 科	<i>Boraginaceae</i> .....	659
250.	茄 科	<i>Solanaceae</i> .....	662
251.	旋 花 科	<i>Convolvulaceae</i> .....	670
252.	玄 参 科	<i>Scrophulariaceae</i> .....	676
253.	列 当 科	<i>Orobanchaceae</i> .....	686
254.	狸 藻 科	<i>Lentibulariaceae</i> .....	687

256.	苦苣苔科	Gesneriaceae.....	687
257.	紫葳科	Bignoniaceae.....	695
258.	芝麻科	Pedaliaceae .....	698
259.	爵床科	Acanthaceae .....	698
261.	苦槛蓝科	Myoporaceae.....	705
263.	马鞭草科	Verbenaceae .....	705
263A.	透骨草科	Phrymaceae .....	719
264.	唇形科	Labiate.....	719

## 附录

中名索引 .....	741
拉丁文科名、属名索引 .....	815

種子植物門	SPERMATOPHYTA
被子植物亞門	ANGIOSPERMAE
双子叶植物纲	DICOTYLEDONEAE

## 1 木 兰 科 MAGNOLIACEAE

细蕊木兰

*Kmeria septentrionalis* Dandy

罗城。

鹅掌楸 马褂木

*Liriodendron chinense* Sarg.

大苗山、临桂、龙胜、兴安、资源、灌阳。

绿化树种。木材供建筑、家具等用。

庐山厚朴 凹叶厚朴

*Magnolia biloba* (R. et W.) Cheng

临桂、灵川、兴安、龙胜、资源、全州、大瑶山、大苗山、富川、钟山。

树皮、根皮温中理气，消积散满；治腹痛胀满，气逆咳嗽。芽、叶、花、果、种子均可入药。造林及材用树种。种子可榨油。

香港木兰

*M. championi* Benth.

十万大山。

\*夜香木兰 夜合花

*M. coco* (Lour.) DC.

Magnolia

栽培花木。

花香气浓郁，可提香精，亦可薰茶。

\*荷花玉兰 广玉兰

*M. grandiflora* L.

栽培花木。

花芳香，大而美，为绿化、行道及材用树种。叶、花治高血压。

叶、嫩枝、花可提芳香油。

\*白玉兰 玉兰、应春花、望春花

*M. heptapeta* (Buchoz) Dandy

(*M. denudata* Desr.)

栽培花木。

绿化及材用树种。花瓣可食，亦可薰茶。种子可榨油。

光叶玉兰

*M. nitida* W.W.Sm.

武鸣、大明山、大瑶山、象州、大苗山、临桂、灵川、龙胜、灌阳。

厚朴

*M. officinalis* R. et W.

大瑶山、灵川、贺县。

树皮、根皮温中理气，消积散满，燥湿健脾；治腹闷胀满，气逆咳嗽。芽、叶、花、果及种子均可入药。造林和材用树种。亦可供绿化。种子可榨油。

长叶玉兰

*M. paenetaluma* Dandy

龙州、扶绥、大明山、十万大山、靖西。

\*木兰 辛夷、木笔、紫玉兰

*M. quinquepetala* (Buchoz) Dandy

(*M. liliiflora* Desr.)

栽培花木。

树皮、叶、花散上焦风热，镇痛；治头痛，鼻炎。花可提取香精。绿化灌木，亦可作白兰砧木。

小花木兰 天女花

*M. sieboldii* K.Koch

(*M. parviflora* S. et Z.)

兴安、全州、资源。

绿化树种。

桂南木莲☆

*Manglietia chingii* Dandy

十万大山、武鸣、大瑶山、大苗山、玉林、容县、贺县、荔浦、

临桂、灵川、兴安、资源、全州、龙胜。

材用及绿化树种。

木莲

*M. fordiana* (Hemsl.) Oliv.

大苗山、大瑶山、临桂、灌阳、全州、龙胜、贺县、苍梧、蒙山、昭平、十万大山、玉林、龙州、田林、德保。

材用及绿化树种。

滇桂木莲☆

*M. forrestii* W.W.Sm. ex Dandy

大苗山。

球果木莲

*M. globosa* H.T.Chang

十万大山。

缅甸木莲☆

*M. hookeri* Cubitt. ex W.W.Sm.

容县。

Manglietia-Michelia

美木莲 大木莲、红花木莲

*M. insignis* (Wall.) Bl.

全州、十万大山。

广东木莲

*M. kwangtungensis* (Merr.) Dandy

苍梧、龙州。

大叶木莲 米弄

*M. megaphylla* Hu et Cheng

靖西、那坡。

毛桃木莲 毛桃、牛心树

*M. moto* Dandy

贺县、苍梧、凌云。

细工用材树种。

锈毛木莲

*M. rufibarbata* Dandy

东兰。

广西木莲 小木莲

*M. tenuipes* Dandy

上思、凌云、乐业、靖西、那坡、田林、百色、隆林、大瑶山。

材用树种。

\*白兰

*Michelia alba* DC.

栽培花木。

花行气化浊，止咳；治白浊，白带，咳嗽；又可提芳香油及薰茶。行道及绿化树种。

苦梓

*M. balansae* (A.DC.) Dandy

东兴、上思、那坡、靖西、阳朔。

花可提芳香油。

\*黄兰

*M. champaca* L.

栽培花木。

花香浓郁，可提芳香油及薰茶。叶可养蚕。木材优良，可供造船。绿化树种。

灰绒白兰花☆

*M. fallax* Dandy

全州、资源、大苗山、田林。

材用树种。

含笑花

*M. figo* (Lour.) Spreng.

(*M. fuscata* Bl.)

三江、大苗山、大瑶山、龙胜、临桂、桂林、永福、恭城、兴安；亦多有栽培。

花可提芳香油及薰茶。庭园绿化树种。

野木兰 火力楠、牛耳楠、香糊楠、大兰树

*M. foveolata* Merr. ex Dandy

临桂、龙胜、兴安、全州、恭城、宁明、靖西、那坡、德保、田林、十万大山、大瑶山、容县、贺县。

材用树种，木材耐水湿。

火力楠 楠木、棉毛含笑、醉香含笑

*M. macclurei* Dandy var. *sublanea* Dandy

东兴、浦北、十万大山、容县、北流、博白、陆川、玉林、岑溪、苍梧、崇左、龙州。

桂南速生及优良用材树种。花可提芳香油。

深山含笑 大叶楠、光叶白兰花

*M. maudiae* Dunn

全州、兴安、龙胜、灌阳、恭城、灵川、临桂、宜山、大瑶山、

Michelia-Illicium

大苗山、容县、大明山、宁明、贺县。

花有水果香，可提芳香油。优良用材及绿化树种。

白花含笑 苦梓

**M. mediocris Dandy**

藤县、昭平、宁明。

材用树种。

阔瓣白兰花

**M. platypetala H.-M.**

全州、资源、灌阳、灵川、临桂、大苗山、大瑶山。

材用树种。

广东含笑

**M. tsoi Dandy**

灵川、临桂、恭城、贺县、德保。

香木莲 嘉采

**Paramanglietia aromatica (Dandy) Hu et Cheng**

**(Manglietia aromatica Dandy)**

龙州。

全株有香气，花、叶及木材均可提芳香油。

香花木 香花楠

**Tsoongiodendron odorum Chun**

龙州、大新、崇左、田林、德保、靖西、那坡、都安、苍梧、大

苗山、阳朔、永福、临桂、桂林、龙胜。

优良用材树种。花可提芳香油。种子可榨油。

## 2A 八 角 科 ILLICIACEAE

短柱八角

**Illicium brevistylum A.C.Sm.**

大瑶山、蒙山、昭平。

红花八角 红花荷树、山八角、野八角

I. *dunnianum* Tutch.

龙胜、兴安、临桂、大瑶山、大苗山、上思、南宁、大新、苍梧、贺县。

果有大毒，可作农药。根仅外用，治风湿腰痛。

红茴香

I. *henryi* Diels

大苗山、龙胜。

叶、果可提芳香油。果镇呕行气；治胃寒作吐。

大八角 野八角、神仙果

I. *majus* Hk.f. et Thoms.

全州、兴安、资源、龙胜、灌阳、阳朔、灵川、昭平、大苗山、

大瑶山、宜山、大明山、那坡、凌云、乐业。

果有大毒，可作农药，亦可醉鱼。

小花八角 野八角

I. *micranthum* Dunn

(I. *wangii* Hu)

大新、宁明、藤县、苍梧、大瑶山、大苗山、龙胜。

果有毒，可作农药。

山八角

I. *oligandrum* Merr. et Chun

大瑶山、大明山。

厚叶八角

I. *pachyphyllum* A.C Sm.

大瑶山、十万大山。

花可提芳香油。

灰木叶八角

I. *symplocifolium* How, ined.

## Illicium-Kadsura

龙胜、大苗山。

### \*八角

#### I. verum Hk.f.

百色、南宁、钦州、梧州、柳州等地区均有栽培。

果、叶含八角茴香油，为香料和制药原料；果作调味香料；又温中开胃，治胃寒呕吐，脘腹胀满。

## 3 五味子科 SCHIZANDRACEAE

冷饭团 大钻、酒饭团、大钻骨风

#### Kadsura coccinea (Lem.) Sm.

(K. chinensis Hance,

K. hainanensis Merr.)

区内各地。

根、藤祛风止痛，行气活血；治风湿关节炎，跌打肿痛，刀伤，胃痛。果可食。

风藤 梅花钻、海风藤

#### K. heteroclita (Roxb.) Craib

陆川、玉林、十万大山、富川、钟山、大瑶山、大苗山、靖西、田林、隆林、凌云、永福、灵川、恭城、灌阳、龙胜、资源。藤祛风散寒，舒筋活络；治腰腿痛，风湿痛，跌打。果可食。

披针叶南五味子

#### K. lancilimba How

隆林、龙胜、大瑶山、大苗山。

果可食。

小钻 长序南五味子、入地麝香、小钻骨风、春头草、血头果

#### K. longipedunculata Fin. et Gagn.

(K. peltigera R. et W.)

资源、全州、龙胜、兴安、临桂、永福、三江、大苗山、大瑶山、凤山、十万大山、大明山、玉林、博白、北流。

根祛风活血，散瘀止痛；治风湿关节炎，跌打，胃痛，经痛。种子止咳。果可食。茎皮纤维可结绳。

### 多籽南五味子

*K. polysperma* Yang

龙胜。

罗裙子 峨眉五味子、小血藤

*Schizandra henryi* Clarke

隆林、那坡、凌云、乐业、大瑶山、大苗山、全州、兴安、资源、龙胜。

根、藤通经活血，祛风除湿；治筋骨酸痛，跌打，月经不调。果敛肺止咳，滋肾固精；治肺虚喘咳，遗精；亦可食用。茎皮可制纤维。

### 边缘罗裙子

*S. henryi* Clarke

*var. marginalis* A.C.Sm.

全州、龙胜、灵川、大苗山、大瑶山、南丹、凌云、乐业、贺县、大明山。

果可食。

### 过山风

*S. viridis* A.C.Sm.

全州、资源、兴安、龙胜、恭城、临桂、荔浦、罗城、都安、大苗山、大瑶山、凌云、乐业。

根、藤祛风除湿；治风湿骨痛。花可提芳香油。果可食。

8 番荔枝科 ANNONACEAE

毛叶阿芳

*Alphonsea mollis* Dunn

龙州大青山。

单果阿芳 嫩

*A. monogyna* Merr. et Chun

龙州、那坡、平南。

木材坚硬，可作支柱等用。

\*牛心果 圆滑番荔枝

*Annona glabra* L.

南宁。

木材轻，可作瓶塞及鱼网浮子。

\*番荔枝 嫩螺陀

*A. squamosa* L.

桂南、桂西有栽培。

热带果树。

香港鹰爪

*Artobotrys hongkongensis* Hance

十万大山、龙州、靖西、凌云、乐业、临桂、富川、钟山。

鹰爪 鹰爪花

*A. uncinatus* (Lam.) Merr.

(*A. odoratissimus* R.Br.)

靖西、龙州、大新、灵山、藤县；也有栽培。

花极香，可作香精原料，亦可薰茶。

喙果皂帽花

*Dasymaschalon rostratum* Merr. et Chun

(*D. glaucum* Merr. et Chun)

十万大山、宁明、那坡、大瑶山、临桂、龙胜。

皂帽花

*D. trichophorum* Merr.

博白、北流、大瑶山。

假鹰爪 酒饼叶、鸡爪风

*Desmos cochinchinensis* Lour.

钦州、南宁、玉林、梧州地区以及百色、河池、柳州、桂林四地区南部。

全株有小毒，祛风止痛；治风湿骨痛，产后腹痛，跌打，皮癣。

茎皮纤维为人造棉及高级纸原料，亦可代麻。叶可制酒饼。花香，供观赏。

云南假鹰爪☆ 云南山指甲

*D. dumosus* (Roxb.) Safford

大瑶山。广西新纪录。

独山瓜馥木

*Fissistigma cavaleriei* (Lévl.) Rehd.

(*Uvaria cavaleriei* Lévl.)

田林。

阔叶瓜馥木

*F. chloroneurum* (H.-M.) Tsiang

宁明、龙州、那坡。

金果瓜馥木

*F. cupreonitens* Merr. et Chun

东兴、十万大山。

白叶瓜馥木

*F. glaucescens* (Hance) Merr.

Fissistigma

十万大山、龙州、宁明、大瑶山、大苗山。

广西瓜馥木

*F. kwangsiensis* Tsiang et P.T.Li

龙州大青山、十万大山。

毛瓜馥木

*F. maclarei* Merr.

(*Melodorum maclarei* Ast)

扶绥。

瓜馥木 铁钻、降香藤、小香藤、香藤风

*F. oldhami* (Hemsl.) Merr.

区内各地。

藤治跌打风湿。茎皮纤维可造纸及代麻。鲜花含芳香油，为香精原料。种子可榨油，供工业用。

长柄瓜馥木

*F. oldhami* (Hemsl.) Merr.

var. *longistipitatum* Tsiang

大苗山。

多花瓜馥木

*F. polyanthum* (HK.f. et Thoms.) Merr.

玉林、横县、宁明、上林、龙州、那坡、百色、凌云、都安、巴马、东兰、大瑶山、昭平、平乐。

根祛风除湿；治风湿跌打。

凹叶瓜馥木

*F. retusum* (Lévl.) Rehd.

(*F. capitatum* Merr. ex Li)

龙州、那坡、百色、隆林、凌云、乐业、罗城。

上思瓜馥木

*F. shangtzeense* Tsiang et P.T.Li

东兴、十万大山。

容县瓜馥木☆ 天堂瓜馥木

*F. tientangense* Tsiang et P.T.Li

容县天堂山。

香港瓜馥木 大香藤、大酒饼子

*F. uonicum* (Dunn) Merr.

十万大山、博白、容县、平南、苍梧、藤县、贺县、昭平、大瑶山、大苗山、三江、荔浦、阳朔、永福、龙胜。

叶可制酒饼。果甜，可食。

木瓣瓜馥木

*F. xylopetalum* Tsiang et P.T.Li

宁明。

红叶哥纳香

*Goniothalamus rufus* Tsiang, ined.

龙州、上思。

密榴木

*Miliusa chunii* W.T.Wang

(*M. filipes* Merr. et Chun)

大新、宁明、龙州、那坡、靖西、百色、都安、柳城、荔浦、阳朔、永福、桂林。

算盘子密榴木

*M. glochidiooides* H.-M.

宁明、龙州、德保、靖西、河池、阳朔。

Miliusa-Uvaria

中华密榴木

*M. sinensis* Finet et Gagnep.

德保、靖西、田林、田阳、百色、凌云、隆林、天峨、东兰。

山蕉

*Mitraphora maingayi* Hk.f. et Thoms.

大新、龙州、靖西、田阳、都安、河池、凤山。

斜叶澄广花 米得洗

*Orophea anceps* Pierre

大新、龙州、靖西、东兰。

茎皮纤维可造纸，代麻。木材供细工用。

斜脉暗罗 九层皮

*Polyalthia plagioneura* Diels

龙州、大瑶山、大苗山。

茎皮纤维可造纸，代麻。木材供细工用。

光叶紫玉盘

*Uvaria boniana* Fin. et Gagn.

十万大山、苍梧、昭平。

刺果紫玉盘

*U. calamistrata* Hance

横县、陆川。

那大紫玉盘

*U. macclurei* Diels

龙州、隆林、天峨。

紫玉盘 酒饼子

*U. macrophylla* Roxb. var. *microcarpa*

(Champ.) Fin. et Gagn.

(*U. microcarpa* Champ.)

陆川、博白、北流、贵县、岑溪、苍梧、藤县、贺县、十万大山、宁明、龙州、平果、田阳、河池。

花紫红色，可供庭园栽植。叶可制酒饼。果可食。

越南紫玉盘 乌藤、扣匹

*U. tonkinensis* Fin. et Gagn.

龙州。

## 11 樟 科 LAURACEAE

尖叶黄肉楠☆ 尖叶六驳

*Actinodaphne acuminata* Meissn.

苍梧、十万大山、凌云、大苗山、龙胜、全州。

红果黄肉楠☆ 红果楠

*A. cupularis* (Hemsl.) Gamble

(*Litsea cupularis* Hemsl.)

龙胜。

毛黄肉楠 毛六驳、茶胶树、阿婆胶、胶木、刨花树

*A. pilosa* (Lour.) Merr.

(*A. cochinchinensis* Meissn.)

合浦、十万大山、博白、容县、岑溪、南宁、宁明、龙州。

木材刨成薄片，泡水后得透明粘液，可供粘布、粘鱼网、作造纸胶和作发胶用。叶可治跌打。

滇印琼楠

*Beilschmiedia assamica* Nees

十万大山。

圆果琼楠

*B. balansae* H.Lec.

十万大山。

短序琼楠

*B. brevipaniculata* Allen

十万大山、贺县。

广东琼楠

*B. fordii* Dunn

武鸣、永福、大苗山。

木材可供建筑、车辆、枕木、家具用。

糠秕琼楠

*B. furfuracea* Chun ex H.D.Chang

十万大山。

二色琼楠

*B. intermedia* Allen

(*B. discolor* Allen,

*B. grandiosa* Allen)

十万大山、宁明。

木材可作梁、柱、桁、板和较好的家具。

长果琼楠☆

*B. longicarpa* Chun et S.Lee, ined.

田阳。

瘤果琼楠

*B. muricata* H.D.Chang

十万大山。

倒卵叶琼楠

*B. obovalifolia* H.Lec.

十万大山。

种子油供工业用。

隐脉琼楠

*B. obscurinervia* H.D.Chang

十万大山。

厚叶琼楠

*B. percoriacea* Allen

陆川、大瑶山、扶绥、宁明。

纸叶琼楠

*B. pergamantacea* Allen

(*B. atrata* Allen)

十万大山。

椆琼楠

*B. roxburghiana* Nees

(*B. fagifolia* Nees)

大瑶山、龙州。

网脉琼楠

*B. tsangii* Merr.

苍梧、蒙山。

滇琼楠

*B. yunnanensis* Hu

那坡、大瑶山、容县天堂山。

无根藤      无头藤

*Cassytha filiformis* L.

玉林、容县、贵县、梧州、邕宁、南宁、崇左、龙州、十万大山等地。

全株化湿消肿，通淋利尿；治肾炎水肿，尿路结石，尿路感染，跌打，疖肿，湿疹。全株作造纸糊料。

Cinnamomum

毛桂 山桂皮、香桂子

**Cinnamomum appelianum Schewe**

全州、兴安、龙胜、临桂、灵川、永福、大苗山、凌云、大明山、苍梧。

树皮可代肉桂。木材作一般用材。造纸糊料。

阴香 小桂皮

**C. burmanni (Nees) Bl.**

(*C. pedunculatum* auct. plur., non Nees)

玉林、梧州、南宁、柳州、桂林等地区。

树皮祛风止痛；治寒性胃痛，腹泻，风湿腰腿痛，跌打，疮疖。

根、树皮、叶可提芳香油。种子可榨脂肪油，供制肥皂等。木材适作细工用材。绿化树种，可作行道树等。可作肉桂砧木。

硬叶樟 米槁、米瓜、沟厚(均壮音)

**C. calcarea S.Lee, ined.**

大新、龙州、靖西、那坡、平果、凌云、都安、河池、阳朔。

材质坚硬，供建筑，板材作家具用。

樟树

**C. camphora (L.) Sieb.**

区内各地。

根、皮、叶祛风散寒，消肿止痛，开窍辟秽；治风湿腰腿痛，扭挫伤，感冒头痛，胃寒腹痛。木材、根、叶可蒸取樟脑和樟油，是医药(中枢神经兴奋剂)、化工、香料、防腐原料。种子油可代椰子油，制高级肥皂。树皮和叶可提栲胶。叶为樟蚕饲料和土农药。材质优良，供建筑、车、船、家具、乐器等用。优良绿化树种，公路树种。

\*肉桂 筒桂

**C. cassia (Nees) Nees et Eberm. ex Bl.**

梧州、玉林、钦州、南宁等地区、大瑶山、临桂、桂林。

树皮加工即肉桂，温中补肾，散寒止痛；治腰膝冷痛，虚寒胃痛，慢性消化不良，腹痛吐泻，受寒经闭。嫩枝即桂枝，发汗解肌，温通经脉；治外感，风寒，肩臂肢节酸痛，桂枝煎剂对金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌和人型结核杆菌有显著抗菌作用。果实(桂子)治虚寒胃痛。肉桂油祛风健胃；治风湿，皮肤搔痒。枝、叶、果、花梗可蒸取桂油，为合成桂酸等重要香料的原料，亦为香烟和巧克力配料以及其他日用品香料，工业原料。叶研粉，可制熏香原料。

### 云南樟

*C. glanduliferum* (Wall.) Nees

大明山、大瑶山。

枝、叶可提取樟脑和樟油，是医药、化工、香料、防腐等重要原料。木材是很好的建筑、家具用材。种子脂肪油供工业用。

### 八角樟

*C. ilicoides* A.Chev.

十万大山、凌云。

### 野黄桂

*C. jensenianum* H.-M.

龙胜、大苗山。

嫩叶可代茶。

### 海南樟

*C. liangii* Allen

龙州、大苗山。

### 钝叶樟

*C. obtusifolium* Nees

靖西、龙州、武鸣、大瑶山。

叶、根、皮可蒸取芳香油。木材供建筑用。

Cinnamomum-Cryptocarya

黄樟

*C. parthenoxylon* (Jack) Nees

十万大山、百色、罗城、融安、大苗山、大瑶山、灌阳、阳朔、贺县、容县。

叶、根、皮、木材可蒸取芳香油，是重要香精原料。种子含脂肪油，供工业用。叶可饲养天蚕和作土农药。木材是优良家具材。

越桂樟

*C. simondii* H Lec.

十万大山、龙州。

粗脉樟

*C. validinerve* Hance

十万大山、宁明。

川桂

*C. wilsonii* Gamble

乐业、罗城。

树皮补肾，散寒祛湿；治风湿筋骨痛，跌打，腹痛吐泻。树皮、枝、叶、果可蒸取芳香油。

厚壳桂

*Cryptocarya chinensis* (Hance) Hemsl.

苍梧、大瑶山、桂林。

木材轻软致密，供建筑、家具用，又是枕木、杆柱上等木料。

平阳厚壳桂

*C. chingii* Cheng

苍梧、蒙山、贺县、富川、十万大山、大明山、宁明、龙州、大瑶山、大苗山、三江、阳朔、永福、临桂、龙胜、灵川、恭城。

木材可作建筑、门、窗和一般家具用材；刨片浸水所得粘液，可作发胶。叶含樟油。

黄果厚壳桂      香港厚壳桂

**C. concinna Hance**

钦州、十万大山、宁明、大明山、大瑶山、苍梧。

木材坚硬耐湿，可供建筑，制家具、桶、架等。

丛花厚壳桂

**C. densiflora Bl.**

合浦、钦州、十万大山、靖西、大瑶山、罗城。

木材可作建筑、车辆、家具和桁板等用材。

海南厚壳桂

**C. hainanensis Merr.**

龙州、那坡、田林、隆林、天峨。

白背厚壳桂      白叶厚壳桂

**C. maclarei Merr.**

(*C. merrilliana* Allen)

十万大山、大瑶山。

狭叶山胡椒

**Lindera angustifolia Cheng**

临桂。

叶含芳香油，可供食品、肥皂等日用品香精用。果核脂肪油，供工业用。

尾叶山胡椒      尾叶钓樟

**L. caudata Benth.**

十万大山、宁明、田林、凌云。

枝、叶、鲜果可提芳香油。种子油供工业用。

鼎湖钓樟☆      白胶木、耙齿钩、木香子

**L. chunii Merr.**

十万大山、陆川、容县、苍梧、贺县。

## Lindera

根可代乌药，止痛消肿，行气健胃；治跌打，风湿骨痛，胃肠胀气。根亦供香料用，又可提取淀粉。

### 香叶树

*L. communis* Hemsl.

桂林地区、大苗山、柳城、柳州、大瑶山、贵县、苍梧、梧州、岑溪、贺县、大明山、扶绥、十万大山、钦州等地。

果、叶含芳香油，可提取香精。枝、叶研粉，可作熏香。种子油可制肥皂、油墨等。木材供家具、细工等用。

### 网叶山胡椒 网脉钓樟

*L. dictyophylla* Allen

凌云。

### 红果山胡椒 红果钓樟

*L. erythrocarpa* Mak.

临桂、兴安、全州。

### 矮香叶树

*L. fruticosa* Hemsl.

(*Litsea fruticosa* Gamble)

龙胜。

叶可提芳香油，供调制香料、香精用。种子油供工业用。

### 峨眉山胡椒☆

*L. gambleana* Allen

### 山胡椒 见风消、见风干

*L. glauca* Bl.

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、桂林、大苗山、罗城、南丹。

鲜叶和果皮含芳香油，可供肥皂香精等用。种子油可供制皂等用。叶入药，祛风消肿。根、枝、叶可作兽药。枝、叶可作造纸糊料。

尖叶乌药

*L. hemsleyana* (Diels) Allen

(*L. strychnifolia* F.-Vill.

var. *hemsleyana* Diels)

南丹、凌云、乐业、那坡。

广西山胡椒 广西钓樟、唛榜

*L. kwangsiensis* Chun

龙州、靖西、那坡。

果可提取芳香油。种子油供工业用。

广东山胡椒 广东钓樟、猪母楠

*L. kwangtungensis* (Liou) Allen

十万大山、宁明、大明山、容县、苍梧、大瑶山、大苗山、环江、永福、临桂、龙胜。

种子油可供制香皂、油墨等用。叶、果可提芳香油。木材适作建筑、水工、桩木、桥梁、造船等用。

龙胜钓樟☆

*L. lungshengensis* S. Lee, ined.

龙胜。

黑壳楠

*L. megaphylla* Hemsl.

全州、兴安、临桂、灵川、永福、阳朔、乐业、大瑶山。

果、叶含芳香油。种子油是香皂的优良原料。木材供建筑、造船和制优良家具用。

山钓樟

*L. metcalfiana* Allen

十万大山、大明山、龙州、田林、隆林、凌云、大瑶山、大苗山、临桂、永福。

Lindera

华南山胡椒

*L. nacusua* (D.Don) Merr.

(*L. bifaria* Benth. ex Hk.f.)

容县、大瑶山、灵川七分山。

小叶钓樟 吹风散

*L. playfairii* (Hemsl.) Allen

(*Litsea playfairii* Hemsl.,

*Neolitsea playfairii* (Hemsl.) Chun,

*Litsea alongensis* Lec.)

灵山、钦州、合浦、北海、博白、陆川、玉林、梧州。

种子油可供制皂、印色油、鞣皮用油等用。鲜果皮含芳香油。

粉背山胡椒☆

*L. prattii* Gamble

龙胜。

美丽山胡椒 美丽钓樟

*L. pulcherrima* (Wall.) Hk. f.

龙胜。

尾叶美丽山胡椒 香粉叶、尾叶美丽钓樟

*L. pulcherrima* (Wall.) Hk. f.

*var. attenuata* Allen

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、灵川、大苗山、东兰、乐业、

贺县、容县。

山姜

*L. reflexa* Hemsl.

全州、资源、兴安、龙胜、凌云。

种子油可供工业用。枝、叶可驱蚊。

凌云山胡椒☆

**L. stewardiana** Allen

靖西、田林、凌云、大苗山、大瑶山。

乌药

**L. strychnifolia** F.-Vill.

梧州、陆川、博白、玉林、南宁等地。

根祛风止痛，消肿散瘀；治胸腹胀痛，风湿性腰腿痛，跌打外伤，充血性头痛，寒症阴囊肿痛，小便频数。又治牛臌胀症。

果、根、叶含芳香油，可作调配皂用香精等原料。种子油供制皂等用。根、种子研粉作农药，可防治地下害虫、蚜虫、小麦叶锈病，马铃薯晚疫病。

三股筋香

**L. thomsonii** Allen

那坡。

枝、叶、果含芳香油，可作皂用香精等用。种子油可供制皂等用。

越南山胡椒

**L. tonkinensis** H.Lec.

十万大山、宁明、龙州、那坡。

尖脉木姜

**Litsea acutivena** Hay.

十万大山。

黑木姜

**L. atrata** S.Lee

大瑶山、扶绥、龙州、隆林。

大萼木姜

**L. baviensis** H.Lec.

(**L. maclarei** Merr.)

大瑶山、隆林。

木材干燥后少开裂，不变形，适作家具及细工用材。种子油可制肥皂。

**木姜子** 山鸡椒、山苍子、鸡骨香、豆豉姜

*L. cubeba* (Lour.) Pers.

区内各地。

全株供药用，祛风散寒，行气止痛；治外感头痛，风湿骨痛，跌打，胃痛。果可治血吸虫病。果、叶、花可提山苍子油，是香料和医药工业原料。子榨油治牛癩，根治牛痢。种子油可供制皂等用。油麸可作肥料，枝、叶可提造纸糊料。研粉，可作蚊香原料。叶水煮液作农药，可防治稻螟和棉蚜。

**毛叶木姜** 黄壳楠、红刨楠

*L. elongata* (Wall. ex Nees) Benth. et Hk. f.

区内各地。

木材供建筑、水工、造船、车辆、家具等用。种子油供工业用。

**驱蚊树** 清香木姜子、水苍树

*L. euosma* W.W.Sm.

全州、灌阳、龙胜、灵川、临桂、大苗山、大瑶山、罗城、龙州、十万大山、贺县。

果祛寒止痛，顺气止呕；治胃寒痛，呕吐，疝气痛。果可提芳香油，供作皂用、食用香精原料，又可驱蚊。

**潺槁树** 潺槁木姜、山槁树、胶木(潺音婵)

*L. glutinosa* (Lour.) C.B.Rob.

博白、玉林、灵山、十万大山、邕宁、大新、宁明、凭祥、龙州、田阳、德保、大瑶山、柳城。

根、皮、叶散瘀消肿止痛；治跌打损伤，疮疖。根皮粘性大，可作粘合剂和赋形剂。木材可作家具；刨成薄片，浸出粘液，可

作发胶。种子油可代椰子油，制高级肥皂等用。

### 白野槁树

*L. glutinosa* (Lour.) C.B.Rob.

var. *brideliifolia* (Hay.) Merr.

钦州、百色。

用途参阅槁树。

### 华南木姜☆

*L. greenmaniana* Allen

大苗山。

### 鼠刺木姜

*L. iteodaphne* (Nees) Hk f.

forma *chinensis* Allen

东兴、十万大山、邕宁、扶绥、宁明、龙州、大明山、大瑶山。

### 大果木姜

*L. lancilimba* Merr.

十万大山、大明山、容县、大苗山。

木材可供板材、家具、建筑等用。种子油供工业用。

### 资源木姜☆

*L. merrilliana* Allen

兴安、灵川、龙胜、资源、大苗山、大瑶山、罗城。

### 柿叶木姜

*L. monopetala* (Roxb.) Pers.

(*L. polyantha* Juss.)

博白、大明山、龙州、凭祥、那坡、靖西、德保、田林、隆林、河池、罗城、融水、大瑶山。

木材可制家具。紫胶虫寄主植物。

少脉木姜

*L. oligophlebia* H.T.Chang

钦州。

竹叶木姜☆

*L. pseudoelongata* Liou

宁明。

豺皮木姜

*L. rotundifolia* (Nees) Hemsl.

龙州、大新、博白。

椭圆豺皮木姜 豺皮樟

*L. rotundifolia* (Nees) Hemsl.

*var. oblongifolia* (Nees) Allen

(*L. chinensis* Bl.,

*Actinodaphne chinensis* Nees)

钦州、灵山、十万大山、博白、玉林、苍梧、藤县、贺县。

根祛风除湿，行气止痛；治风湿关节炎，胃痛。果、叶含芳香油。种子油可代椰子油，供制高级肥皂及印刷油等用。

黄椿木姜 大烂花

*L. variabilis* Hemsl.

十万大山、大明山、宁明、龙州、田阳、大瑶山。

木材供建筑、家具用。

槁树 轮叶木姜、过山风

*L. verticillata* Hance

东兴、十万大山、陆川、博白、北流、容县、贵县、藤县、岑溪、苍梧、大瑶山、桂林。

根祛风除湿；治风湿关节炎，腰腿痛，跌打，蛇伤。

短序润楠(注) 狹叶楠、狭叶香港楠

*Machilus breviflora* (Benth.) Hemsl.

十万大山、隆林、东兰、南丹。

猪脚楠

*M. cathayensis* Chun ex H.D.Chang

田阳、大苗山、灵川、临桂。

木材供建筑、家具等用。

华润楠 香港楠木、华桢楠

*M. chinensis* (Champ.) Hemsl.

(*Alseodaphne chinensis* Champ.)

玉林、大明山。

木材供建筑、造船、板料、家具等用。

基脉润楠

*M. decurvinervis* Chun

大瑶山、灵川、大苗山。

蒙国润楠

*M. gracillima* Chun

南丹、大瑶山。

华东润楠

*M. leptophylla* H.-M.

灵川、临桂、全州、大苗山、大瑶山。

木材供建筑等用。种子油供工业用。

---

注：过去将桢楠归入 *Machilus* 属，故叫桢楠属。但桢楠 现已归入楠属(*Phoebe*，也叫桢楠属)，为避免两属属名混淆，现采纳以润楠属为 *Machilus* 的属名，以楠属(桢楠属)为 *Phoebe*的属名。

Machilus

两广润楠

*M. liangkwangensis* Chun

苍梧、大瑶山、扶绥、田阳、隆林。

灵川润楠☆

*M. lichingii* Chun, ined.

灵川七分山、龙胜。

长梗润楠

*M. longipedicellata* H. Lec.

龙胜、贺县。

多脉润楠

*M. multinervia* Liou

龙州。

纳稿润楠

*M. nakao* S. Lee

扶绥、陆川。

建楠

*M. oreophila* Hance

灵川。

赛短序润楠

*M. parabreviflora* H T. Chang

东兴、十万大山。

刨花润楠 泡花、泡花楠

*M. pauhoi* Kaneh.

宜山、扶绥。

木材刨成薄片浸水，可得粘液，可用作粘合剂。木材供建筑、家具等用。种子油可制皂、烛；油麸可作肥料。

孔雀润楠

*M. phoenicis* Dunn

大瑶山、宁明。

扁果润楠

*M. platycarpa* Chun

兴安、东兴、十万大山。

柳叶润楠 柳楠

*M. salicina* Hance

东兴、十万大山、大瑶山、大苗山、罗城、龙胜、兴安、全州、

灵川、临桂、永福等地。

可作固堤树种。

十万大山润楠

*M. shiwandashanica* H T. Chang

十万大山。

红润楠 红楠

*M. thunbergii* S. et Z.

大苗山、容县。

木材供建筑、家具用。叶可提芳香油，又可浸汁取胶料。树皮可提栲胶。种子油可制肥皂及润滑油等用。

绒润楠 绒楠

*M. velutina* Champ.

博白、合浦、十万大山、大瑶山、大苗山、龙胜、兴安、桂林、  
临桂、阳朔、昭平等地。

木材可制家具。种子油可作润滑油等用。

信宜润楠☆

*M. wangchiana* Chun

东兴、十万大山、容县、凌云、罗城。

Machilus-Neolitsea

云南润楠

*M. yunnanensis* H.Lec.

隆林。

海南新樟

*Neocinnamomum hainanense* Allen

龙州、扶绥。

新木姜子

*Neolitsea aurata* (Hay.) Merr.

大瑶山、大苗山、龙胜、兴安、资源、全州。

大新木姜

*N. chuii* Merr.

容县、苍梧、贺县、恭城、阳朔、永福、灵川、临桂、龙胜、

大苗山、大瑶山、大明山、宁明、龙州、十万大山、隆林。

种子油可供制皂等用。

香果新木姜

*N. ellipsoidea* Allen

灵川、大苗山。

根治刀伤。种子油可作制皂、油墨等原料。木材宜作高级家具、

胶合板、门板、乐器。

锈叶新木姜

*N. ferruginea* Merr.

十万大山、宁明、大明山、容县、苍梧、贺县、大瑶山、永福、

恭城、全州。

香港新木姜 辣鸡树

*N. hongkongensis* (Chun) Allen

(*Actinodaphne hongkongensis* Chun,

*N. cambodiana* Lec. var. *glabra* Liou)

大明山、百色、东兰、南丹、大苗山。

### 广西新木姜

*N. kwangsiensis* Liou

凌云、贺县、大明山。

### 假肉桂

*N. levinei* Merr.

容县、贺县、蒙山、临桂、灵川、兴安、龙胜、全州、大瑶山、  
大苗山、凌云、那坡、隆林。

木材可造家具等。

### 长圆叶新木姜

*N. oblongifolia* Merr. et Chun

宁明。

### 显脉新木姜

*N. phanerophlebia* Merr.

十万大山、那坡、隆林金钟山、武鸣、玉林大容山、大瑶山、  
大苗山、永福。

### 光叶显脉木姜

*N. phanerophlebia* Merr.

*forma glabra* Liou

钦州、十万大山、大明山、宁明、大新、龙州、德保、大瑶山。  
木材作水工、枕木、桩木、桁条、板料、家具等用。

### 美新木姜

*N. pulchella* (Meissn.) Merr.

(*Litsea pulchella* Meissn.,

*L. zeylanica* Nees

*var. chinensis* Benth.)

Neolitsea-Pseudosassafras

十万大山、宁明、大瑶山、永福。

种子油可代椰子油，制高级肥皂等用。

**小新木姜**

*N. umbrosa* (Meissn.) Merr.

十万大山、龙州、宁明、隆林金钟山、大瑶山、大苗山、永福、灌阳、龙胜。

**\*鳄梨 油梨、樟梨**

*Persea americana* Mill.

桂林、南宁。

果营养价值高，供生食和作蔬菜，果肉又可榨油供食用、医药用。

**楠木 兴安楠木**

*Phoebe blepharopus* H.-M.

兴安、大苗山。

木材材质优良，供建筑和高级家具等用。木屑可作熏香。

**广西楠**

*P. kwangsiensis* Liou

桂黔交界山区。

**白楠**

*P. neurantha* (Hemsl.) Gamble

大苗山、凌云、田林。

**紫楠**

*P. sheareri* (Hemsl.) Gamble

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、富川。

根、枝、叶可提芳香油。种子油可供制皂等用。木材优良，供上等家具等用。

**檫木 半枫樟**

*Pseudosassafras tzumu* (Hemsl.) H.Lec.

(*Sassafras tzumu* Hemsl.,

*Pseudosassafras laxiflora* Nakai)

兴安、龙胜、融安、大苗山、大瑶山、隆林、大明山、贺县。  
根、树皮活血散瘀；治扭挫伤，腰肌劳损。材质优良，用于造船、水车、上等家具等。种子和根含芳香油。

### 山油樟

*Syndiclis montana* Chun et S. Lee, ined.

十万大山、那坡。

## 13A 青 藤 科 ILLIGERACEAE

### 心叶青藤

*Illigera cordata* Dunn

隆林、天峨、龙州、上林、贵县、桂平、平南、容县、北流、岑溪、苍梧。

根、茎驱风除湿，散瘀止痛；治风湿骨痛，跌打。

### 贵州青藤☆

*I. dunniana* Lévl.

那坡、田林、凌云。

### 小花青藤 黑九牛

*I. parviflora* Dunn

十万大山、宁明、龙州、马山、平南、容县、大瑶山、大苗山、河池、临桂。

根驱风除湿；治风湿骨痛。

### 大青藤

*I. platyandra* Dunn

(*I. yaoshanensis* Hao)

## IIIgera-Aconitum

容县、大瑶山、龙州、西林、隆林。

毛青藤

I. *rhodantha* Hance

博白、容县、十万大山、扶绥、宁明、龙州、那坡、靖西、田阳、百色、田林、凤山、都安、柳城、阳朔。

## 14 肉豆蔻科 MYRISTICACEAE

风吹楠 霍而飞

*Horsfieldia amydalina* (Wall.) Ward.

东兴、宁明、崇左、龙州。

木材轻软，可作家具。

海南风吹楠☆ 海南霍而飞

*H. hainanensis* Merr.

东兴、宁明、龙州、靖西、田林、巴马。

\*肉豆蔻 肉果、玉果

*Myristica fragrans* Houtt.

著名香料和药物，治虚泻冷痢，脘腹冷痛，呕吐。广东有引种，我区可考虑试种。

## 15 毛茛科 RANUNCULACEAE

乌头 川乌、附子

*Aconitum carmichaeli* Debx.

灵川、临桂、资源、全州；亦有栽培。

根有毒，温中回阳，散寒止痛；治风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，浮肿尿少；根磨酒外敷治鸡眼。

草乌

*A. chinensis* Paxt.

var. *bodinieri* (Lévl. et Van.)

W.T.Wang et Hsiao, ms.

根有毒，祛风湿，止痛；治风湿痛，神经痛。

打破碗花花 野棉花

*Anemone hupehensis* Lemoine

全州、资源、兴安、龙胜、大苗山、南丹、凤山、都安、乐业、  
靖西。

全株有小毒，可杀虫；新鲜茎、叶除四害，杀蛆虫和农业害虫；  
又治顽癣、疥癣，痢疾。

溪畔银莲花 五倍叶

*A. rivularis* Buch.-Ham.

隆林、西林、靖西、乐业。

全株供土农药用。根治狗咬伤。

野棉花

*A. vitifolia* Buch. -Ham.

那坡。

全株供土农药用。根杀虫；治痢疾。

鸭脚黄连

*Asteropyrum cavaleriei* (Lévl. et Van.)

Drumm et Hutch.

全州、资源、兴安、龙胜。

根清热解毒；治痢疾。

茴芹美花草

*Beesia calthaefolia* (Maxim.) Ulbrich

(*Cimicifuga calthaefolia* Maxim.,

*Beesia cordata* Balf.f. et W.W.Sm.)

全州宝顶山。

Clematis

芹叶铁线莲 女萎

*Clematis apiifolia* DC.

全州、临桂。

有毒植物。茎、叶消食止痢；治肠鸣，泄痢。根皮及茎皮为人造棉及造纸原料。

钝齿芹叶铁线莲

*C. apiifolia* DC.

*var. obtusidentata* R. et W.

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、永福、大苗山、大瑶山、东兰、乐业、武鸣。

有毒植物。茎、叶消食止痢；治肠鸣泄痢。

黄藤通

*C. argentilucida* (Lévl. et Van.) R. et W.

(*C. grata* Wall.

*var. argentilucida* Lévl. et Van.)

临桂、大苗山、那坡。

茎、叶杀虫解毒；治痈疮溃疡。

山木通 小木通

*C. armandi* Fr.

临桂、柳城、柳州、凌云、乐业、上林。

根止痛活血；治跌打劳伤。

类山木通☆

*C. armandi* Fr.

*var. biondiana* (Paval.) Rehd.

扶绥。

香铁线莲☆

*C. buchananiana* DC.

那坡、乐业。

威灵仙 铁脚威灵仙

*C. chinensis* Osb.

区内各地。

根、藤通经络，祛风湿，行气利尿；治跌打，风湿痛，腰背酸痛，小便不利，骨哽咽喉；亦可作土农药，除四害。

百色威灵仙☆

*C. chingii* W.T.Wang

百色、桂林。

厚叶铁线莲

*C. crassifolia* Benth.

兴安、大瑶山、十万大山。

粗柄铁线莲

*C. crassipes* Chun et How

龙州。

丝铁线莲

*C. filamentosa* Dunn

龙胜。

拟威灵仙☆

*C. finetiana* Lévl. et Van.

柳城、宜山。

铁线莲

*C. florida* Thb.

乐业、阳朔、临桂、桂林、梧州。

根通经络，解毒；治痛风，虫蛇咬伤。

小叶铁线莲

*C. gouriana* Roxb.

Clematis

百色、阳朔、富川、钟山。

贵州有将此种代木通用。

毛叶铁线莲

*C. gratopsis* W.T.Wang

(*C. grata* Wall.

*var. lobulata* R. et W.)

临桂、南丹、大瑶山。

宜昌铁线莲☆

*C. henryi* Oliv.

隆林、灵川、龙胜、资源、贺县。

根祛风止痛；治风湿痛。

金盏藤 齿叶铁线莲

*C. leschenaultiana* DC.

恭城、灵川、临桂、阳朔、融安、百色。

细齿金盏藤 毛齿叶铁线莲

*C. leschenaultiana* DC.

*var. denticulata* Merr.

三江、大瑶山、百色。

菱葵叶铁线莲

*C. loureiriana* DC

大明山、百色。

毛柱铁线莲 老虎须藤

*C. meyeniana* Walp.

钦州、南宁、玉林、梧州、柳州、桂林等地区。

茎皮纤维供造纸，搓绳。根、茎散瘀消肿；治跌打。

沙叶毛柱铁线莲

*C. meyeniana* Walp.

var. *granulata* Fin. et Gagn.

容县、玉林、大瑶山、龙州。

山铁线莲 川木通、花木通

*C. montana* Buch.-Ham.

兴安。

茎利水清热，降火通乳；治肾病水肿，湿热淋症，尿急尿频，妇女经闭，乳汁不通。

苦瓜藤通

*C. parviflora* Gardn. et Champ.

大瑶山、靖西。

似小叶铁线莲☆

*C. peterae* H.-M.

桂林。

老虎须 千斤藤、淮木通

*C. uncinata* Champ. ex Benth.

区内各地。

根祛风止痛；治风湿骨痛。

尾叶铁线莲

*C. urophylla* Fr.

大瑶山、那坡。

\*飞燕草

*Consolida ajacis* (L.) Schur

(*Delphinium ajacis* L.)

栽培花卉。

有毒；家禽食之能致命；种子催吐，泻下。

Coptis-Dichocarpum

黄连

*Coptis chinensis* Fr.

全州、大苗山。

根茎清热泻火，解毒，抗菌；治热性病，发热、菌痢、赤眼肿痛，热疖疮毒、烧伤。

短萼黄连

*C. chinensis* Fr.

var. *brevisepala* W.T.Wang et Hsiao

兴安、龙胜、富川、钟山、大瑶山、凌云、田林。

功能、主治参阅黄连。

走茎黄连

*C. chinensis* Fr.

var. *stolonifera* D.Fang et N.K.Liang ined.

临桂、龙胜、兴安、资源。

功能、主治参阅黄连。

野彩雀 还亮草

*Delphinium anthriscifolium* Hance

兴安、临桂、天峨、梧州、融安。

蕨叶人字果

*Dichocarpum dalzielii* (Drumm. et

Hutch.) W.T.Wang et Hsiao

(*Isopyrum pteridifolium* H.-M.,

I. *flaccidum* Ulbs.)

全州、兴安、龙胜、临桂、灵川、大瑶山、贺县。

根消肿散毒；治红肿疮毒。

小花人字果

*D. franchetii* (Fin. et Gagn.)

W.T.Wang et Hsiao

(*Isopyrum franchetii* Fin. et Gagn.)

龙胜。

拿拉藤 锡兰莲

*Naravalia pilulifera* Hance

大新、宁明、龙州、百色。

根行气止痛。茎、叶治刀伤。

\*芍药 白芍

*Paeonia lactiflora* Pall.

栽培。

根养血敛阴，柔肝止痛；治月经不调，痛经，泻痢腹痛，肝旺头痛。栽培花卉。

小回回蒜 梅花草、翳子草、自扣草

*Ranunculus cantoniensis* DC.

武鸣、百色、隆林、凌云、东兰、天峨、大瑶山、龙胜、临桂、桂林。

全草有毒，去翳，截疟，杀虫；外敷治角膜翳，疟疾。又可灭蛆虫和孑孓。

华毛茛

*R. chinensis* Bunge

田阳、隆林。

毛茛 小梅花草

*R. japonicus* Thb.

梧州、南宁、百色、河池、柳州、桂林地区。

全株有毒，皮肤发泡药，外敷治疟疾。全草可作土农药杀稻螟、蚜虫和蚊、蝇幼虫。

石龙芮

*R. scleratus* L.

凌云。

Ranunculus-Thalictrum

种子、根皮含白头翁素，治风寒湿痹，恶疮痈肿。

半匍匐毛茛☆

*R. sieboldii* Miq.

桂林。

有毒。

猫爪草 小毛茛

*R. zuccharinii* Miq.

(*R. ternatus* Thb.)

恭城、灵川、临桂、桂林、阳朔、融安。

根去火，散痰结；治淋巴腺结核，急性结合膜炎。

天葵 夏无踪、老鼠屎

*Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Mak.

临桂、柳州。

有小毒，块根散结消肿；治淋巴结核，疣子。

尖叶唐松草

*Thalictrum acutifolium* (Boivin) H.-M.

全州、龙胜、大苗山。

根含小蘖碱，代黄连用。

盾叶唐松草 连钱草

*T. ichangensis* Lecoyer ex Oliv.

临桂。

全草清湿热，散风寒；治腹痛泻痢，头昏目痛，身发黄。

多枝唐松草

*T. ramosum* Boivin

凤山。

唐松草

*T. umbricola* Ulbr.

(*T. guegenii* Boivin)

大瑶山、灵川。

## 17 金鱼藻科 CERATOPHYLLACEAE

金鱼藻

*Ceratophyllum demersum* L.

各地水塘中。

作饲养热带鱼、金鱼及其他鱼用。

## 18 睡莲科 NYMPHAEACEAE

芡

*Euryale ferox* Salisb.

常生于沼泽、池塘中。

根茎、种仁可食，种子名芡实，健脾益肾，镇痛收敛；治慢性泄泻，小便失禁，遗精，带浊，腰腿关节痛。

\*莲荷

*Nelumbo nucifera* Gaertn.

栽培作物。

地下茎（莲藕）供食用并可提淀粉。藕节止血；治吐血，衄血等出血。种子（莲子）健脾止泻；治脾虚食少。种胚（莲心）清心火，去火除烦。雄蕊（莲须）止血固精；治遗精，白带。花托（莲蓬）消瘀止血；治妇女血崩，尿血等。荷叶消暑解热；治夏、秋暑热。荷花可供观赏。

萍蓬草 水面一盏灯

*Nuphar pumilum* Smith

临桂、资源。

根、茎调经，止痛；治月经不调，腰腿痛。

19 小 蕺 科 BERBERIDACEAE

苗山小蘖

*Berberis impedita* Schneid.

大苗山。

蚝猪刺

*B. julianae* Schneid.

龙胜、临桂、兴安、灌阳、资源、象州、大瑶山。

根、茎含小蘖碱、非洲防已碱等，清热解毒，抗菌；治菌痢，胃  
肠炎，扁桃腺炎。

小蘖

*B. mingetensis* Hay.

大瑶山、罗城、全州。

白粉小蘖

*B. pruinosa* Fr.

罗城、大苗山、龙胜。

刺黄连

*B. virgetorum* Schneid.

兴安。

根、茎清热解毒抗菌；治菌痢，胃肠炎。

八角莲

*Dysosma chengii* (Chien) Keng f.

(*Podophyllum chengii* Chien)

富川、贺县、资源。

功能、主治参阅毛八角莲。

毛八角莲 独脚莲、八角莲

*D. hispida* (Hao) Chun

(*Podophyllum hispida* Hao)

大瑶山、大苗山。

地下茎散瘀消肿，止痛；治跌打，筋骨疼痛，蛇伤，痈疖，恶疮及枪伤。

六角莲 八角莲、花叶八角莲

*D. pleiantha* (Hance) Woods.

(*Podophyllum pleianthum* Hance,

*P. veitchii* Hemsl. et Wils.,

*P. versipelle* Hance)

玉林、容县、富川、贺县、大瑶山、临桂、灵川、兴安、龙胜、全州、资源、凌云、乐业、德保。

功能、主治参阅毛八角莲。

箭叶淫羊藿

*Epimedium sagittatum*

(S. et Z.) Maxim.

临桂、龙胜、资源、全州。

全株补精壮阳，祛风除湿；治阳痿，目眩耳鸣，腰痛。

阔叶十大功劳 鸟不宿

*Mahonia bealei* Carr.

兴安、龙胜、全州、灵川、临桂、桂林、资源、阳朔、昭平、凤山、靖西、凌云、乐业。

根、茎含小檗碱，可作黄连代用品。

十大功劳

*M. fordii* Schneid.

龙胜、天峨。

根、茎可作黄连代用品。

Mahonia-Akebia

细叶十大功劳 土黄连

**M. fortunei** Mouill.

兴安、临桂、马山、隆林。

根、茎清热解毒抗菌；治火眼，菌痢，水火烫伤，枪伤，预防流感；可作黄连代用品。

北江十大功劳☆

**M. shenii** Chun

兴安、阳朔、富川、钟山、贺县、罗城、大苗山、大瑶山。

根、茎功能、主治参阅上种。

半覆瓦十大功劳

**M. subimbricata** Chun et F.Chun

靖西。

南天竹

**Nandina domestica** Thb.

全州、临桂、桂林、柳城、柳州、罗城、南丹、隆林、马山。

根、茎、叶解热镇咳；治感冒，支气管炎，咳嗽；果镇咳，但有毒，服用宜慎。

## 21 木通科 LARDIZABALACEAE

三叶木通

**Akebia trifoliata** (Thb.) Koidz.

(**A. lobata** Decne.)

凌云、乐业、南丹、临桂、龙胜、兴安、资源、全州。

果叫预知子，可食和酿酒；入药，利尿通乳，催生，杀虫；主治小便不利，水肿，亦治难产，乳汁不通，月经痛，腰痛。藤可代绳，入药舒筋活络；治风湿关节痛。种子可榨脂肪油。

甜果木通 八月瓜、预知子

*A. trifoliata* (Thb.) Koidz.

*var. australis* (Diels) Rehd.

隆林、罗城、大瑶山、平乐、临桂、兴安、龙胜、资源、全州、富川、钟山。

用途参阅三叶木通。

大酸藤

*Stauntonia alata* Merr.

大瑶山、平南、蒙山、德保。

短药野木瓜

*S. brachyanthera* H.-M.

龙胜。

西南野木瓜

*S. cavalerieana* Gagn.

大苗山、龙胜、兴安、全州、临桂、永福、昭平。

野木瓜 假荔枝

*S. chinensis* DC.

大瑶山、大苗山、永福、临桂、兴安、恭城、龙胜、资源、全州。

果味甜，可生食和制果酱、酿酒。种子可榨油。

瑶山野木瓜

*S. dielsiana* Wu

大瑶山。

椭圆野木瓜☆

*S. elliptica* Hance

荔浦、大苗山。

七姐妹藤 那藤、牛藤

*S. hexaphylla* Decne.

Sauvontonia - Cocculus

荔浦、临桂、龙胜、资源、大苗山、大瑶山、上思、梧州。  
藤止痛；藤及根利尿。果可食。

假野木瓜

*S. leucantha* Wu

兴安、大苗山、大瑶山、大明山、那坡。

22 大血藤科 SARGENTODOXACEAE

大血藤 槟榔钻、大活血、红藤、血藤

*Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) R. et W.

全州、资源、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、马山、那坡、  
隆林、博白等地。

根、藤活血祛风，散瘀止痛，驱虫；治风寒湿痹，筋骨痛，经  
痛，小儿惊风，疖肿。兽医治蚂蟥入牛鼻。茎皮为造纸等原  
料。藤可供编物和提栲胶。叶可杀孑孓。根、茎煎水可毒蚜虫。

23 防已科 MENISPERMACEAE

崖藤

*Albertisia laurifolia* Yamamoto

(*A. peryana* H.L.Li)

十万大山。

樟叶木防已

*Cocculus laurifolius* DC.

全州、桂林、阳朔、梧州、大新、龙州。

根散瘀消肿，祛风止痛；治风湿腰腿痛，跌打。

木防已 青藤、毛木防已

*C. trilobus* (Thb.) DC.

(*C. sarmentosus* (Lour.) Diels,

*C. sarmentosus* (Lour.) Diels

var. *pauciflorus* Wu,

*C. mollis* Wall.)

临桂、桂林、永福、罗城、隆林、龙州、凭祥、宁明、大明山。  
全株祛风除湿，通经活络，利尿清肿；治筋骨酸软，腰膝冷痛，  
肾病水肿，淋病，无名肿毒，蛇虫伤。藤坚韧柔软，可供编  
物。茎皮纤维可作人造棉原料，根含淀粉，可酿酒。

### 毛叶轮环藤 金线风

*Cyclea barbata* (Wall.) Miers

苍梧、贵县、邕宁、桂林、临桂，  
用途参阅百解藤。

### 密花轮环藤

*C. densiflora* (Yamamoto)

Y.C Tang et S.L.Lo

(*Paracyclea densiflora* Yamamoto)

桂南、隆林。

### 海南轮环藤

*C. hainanensis* Merr.

龙州大青山。

### 百解藤 钝叶轮环藤、山豆根、凉粉藤、金锁匙

*C. hypoglauca* (Schauer) Diels

区内各地。

根清热解毒，利咽镇痛，利水；治咽喉肿痛，牙痛，蛇虫伤，疮  
疖，小便不利。叶可制凉粉。

### 轮环藤

*C. racemosa* Oliv.

隆林、灵川。

Cyclea - Fibraurea

根顺气止痛，解毒；治发痧腹痛，胃痛，蛇伤。

四川轮环藤

*C. sutchuenensis* Gagn.

(*Paracyclea sutchuenensis* Yamamoto)

全州、兴安、龙胜、临桂、大瑶山。

广西轮环藤

*C. sutchuenensis* Gagn.

*var. sessilis* Wu

(*Paracyclea sutchuenensis* Yamamoto

*var. sessilis* (Wu) Yamamoto)

大瑶山。

花防已

*Diplocisia affinis* (Oliv.) Diels

龙州。

老茎作兽药，治牛小便不利。茎可编家具、用具。

秤钩风

*D. chinensis* Merr.

兴安、田阳。

苍白秤钩风 茎花防已、粉绿秤钩风

*D. glaucescens* (Bl.) Diels

凌云、乐业、凤山、天峨、河池、柳城、兴安、龙胜、玉林、博白。

根茎解毒；治蛇伤效好。

藤黄连 黄藤

*Fibraurea tinctoria* Lour.

上思、宁明、龙州、崇左、大新、武鸣、上林、天等、马山、南宁、靖西、凌云、乐业、大瑶山、平南、陆川、博白。

根、茎有小毒，清热解毒；治咽喉炎，结合膜炎，扁桃腺炎，疮

疖，烫火伤。延胡索乙素原料。

细红藤

*Hypserpa nitida* Miers

十万大山、龙州、富川、钟山、凌云、乐业。

广西粉绿藤☆

*Pachygone sinica* Diels

大瑶山、兴安。

连蕊藤

*Parabaena sagittata* Miers

隆林。

细圆藤 车线藤

*Pericampylus glaucus* (Lam.) Merr.

横县、龙州大青山、大瑶山、那坡、田林、隆林、河池。

藤可取纤维和编物。根可止咳。

防已

*Sinomenium acutum* (Thb.) R. et W.

龙胜。

根、茎通经络，利尿；治神经痛，关节痛，水肿，膀胱热。藤可编用具。

毛防已

*S. acutum* (Thb.) R. et W.

var. *cinerereum* (Diels) R. et W.

龙胜、乐业。

用途参阅防已。

白线薯

*Stephania brachyandra* Diels

Stephania

扶绥、田林、田阳、隆林、凌云、龙胜。  
块根活血散瘀；治跌打，疮疖。

金线吊乌龟      扣子藤、盘花地不容

*S. cepharantha* Hay.

(*S. disciflora* H.-M.,

*S. tetrandra* S. Moore

var. *glabra* Maxim.)

全州、资源、大苗山、罗城、凌云、乐业、龙州、梧州。

块根解毒消肿；治蛇伤，结核病，吐血，无名肿毒。块根含淀粉  
可酿酒。根，叶作土农药。

黔桂千金藤☆

*S. dielsiana* Wu

大瑶山。

雅丽千金藤

*S. elegans* Hk.f. et Thoms.

西林。

千金藤

*S. hernandifolia* (Willd.) Walp.

靖西、凌云、乐业。

根有小毒，散血解毒，祛风除湿；治风湿关节炎，痈疖疮毒。

粗毛千金藤

*S. hispidula* (Yamamoto) Yamamoto

河池。

粪箕笃      蛇头藤

*S. longa* Lour.

(*S. japonica* sensu Merr., non Miers)

区内各地。

全株祛风活络，利尿消肿；治风湿关节炎，肾盂肾炎，疮疖痈肿，蛇伤，疟疾。

**总状千金藤**

**S. racemosa Oliv.**

南丹。

**华千金藤** 金不换，假散血薯

**S. sinica Diels**

恭城、临桂、永福、大苗山、大瑶山、平南、凌云、乐业、十万大山、龙州。

块根含延胡索乙素，止痛镇静，消肿解毒；治内外伤疼痛，胃痛，疮疖痈肿。

**山乌龟** 石蟾蜍、粉防已、大回魂

**S. tetrandra S. Moore**

梧州、武鸣、大瑶山、大苗山、全州、恭城、龙胜、临桂、凌云、乐业。

块根祛风镇痛，利尿，泻湿热；治风湿痹痛，关节痛，水肿，风肿，痈疖疮肿，蛇伤。

**大叶藤** 越南大叶藤

**Tinomiscium tonkinensis Gagn.**

扶绥、靖西、田林。

根散瘀止痛；治跌打损伤。

**圆角金果榄**

**Tinospora capillipes Gagn.**

龙州。

用途参阅金果榄。

**复耳金果榄☆**

**T. imbricata S.Y.Hu**

临桂、龙胜、三江、大瑶山。

Tinospora-Aristolochia

用途参阅金果榄。

发冷藤

*T. mastersii* Diels

(*T. crispa* Miers)

龙州有栽培。

茎、叶退烧。

金果榄 青牛胆、山慈姑、地苦胆、九龙胆、金狗胆。

*T. sagittata* (Oliv.) Gagn.

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、桂林、大苗山、大瑶山、乐业、岑溪、苍梧、大新。

块根清热解毒，消炎止痛；治咽喉肿痛，热咳失音，外敷疮疖痈疽，接触性皮炎，蛇伤。茎叶敷烫伤。

宽筋藤 松筋藤、伸筋藤、打不死

*T. sinensis* (Lour.) Merr.

(*Campylus sinensis* Lour.,

*Tinospora malabarica* (Lam.) Miers)

靖西、凌云、田林、巴马、龙州、武鸣、临桂、灵川、贵县。

藤舒筋活络，除湿祛风；治风湿痹痛，肌腱挛缩，腰腿痛。

## 24 马兜铃科 ARISTOLOCHIACEAE

三筒管

*Aristolochia championii* Merr. et Chun

来宾、大瑶山。

根治蛇伤；作兽药，治猪瘟。

马兜铃 青木香、土青木香、万丈龙、天仙藤

*A. debilis* S. et Z.

全州、临桂、桂林、兴安、灵川、南宁。

有毒。根行气止痛，解蛇毒；治中暑发痧，胃痛，蛇伤。用油调敷，治皮肤湿疹。藤利尿；治妊娠水肿。果镇咳除痰；治肺热喘咳，气管炎。根、茎可提芳香油。

### 防已马兜铃

*A. fangchi* Wu, in herb.

玉林、容县、博白、陆川、大瑶山、昭平。

根祛风除湿；治风湿。果止咳。

### 通城虎 五虎通城

*A. fordiana* Hemsl.

桂林、苍梧等地。

有小毒，根开窍，镇痛消肿；治小儿惊风，蛇伤，胃痛，关节痛。

### 海南马兜铃

*A. hainanensis* Merr.

上思。

### 大叶马兜铃☆

*A. shukangii* Chun et How, ined.

龙州、靖西。

有小毒。根块止痛；治喉痛，胃痛，蛇伤。

### 耳叶马兜铃 假通城虎

*A. tagala* Champ.

钦州、南宁、玉林、梧州等地区，靖西。

根清热解毒；治瘰疬，痈疖，疔疮，蛇伤。

### 清藤香 广防己

*A. westlandi* Hemsl.

大瑶山、扶绥、靖西。

根祛风利水，泻湿热；水肿，小便不利，痈肿湿疮。

Asarum-Nepenthes

圆叶细辛

*Asarum caudigerum* Hance

桂林、柳州、河池、百色、南宁、苍梧、玉林地区等地。

根表散风寒，祛痰，止痛；治感冒风寒，头痛，牙痛，咳喘痰多，

口舌生疮，蛇伤。

花叶细辛

*A. geophillum* Hemsl.

桂林。

用途参阅圆叶细辛。

土细辛

*A. insigne* Diels

龙胜、全州、兴安、临桂、阳朔、昭平、三江、大瑶山、桂平、武鸣、宁明、龙州、德保、靖西、百色。

有小毒，全株发汗，祛痰，止痛；治感冒头痛，龋齿痛，咳嗽痰多。

金耳环 一块瓦、长梗细辛

*A. longipedunculatum* O.C. Schmidt

大苗山、大瑶山。

有小毒，全草祛风散寒，解毒止痛；治蛇伤，小儿抽搐，感冒，跌打肿痛；对葡萄球菌有抑制作用。

粗根细辛☆

*A. thunbergii* A.Br.

梧州、玉林、大瑶山。

全草祛风止痛；治跌打，蛇伤。

## 27 猪笼草科 NEPENTHACEAE

猪笼草

*Nepenthes mirabilis* (Lour.) Druce

玉林。

全草清热利尿，化石止咳；治尿路结石，百日咳，咳血，胃溃疡疼痛。食虫植物。

## 28 胡 椒 科 PIPERACEAE

石蝉草

*Peperomia dindygulensis* Miq.

天峨、乐业、百色、隆林、靖西、龙州、大瑶山。

全株治水火烫伤，疮疖，小儿疳积。

豆瓣菜 圆叶瓜子菜

*P. reflexa* (L.f.) A.Dietr.

平南、大瑶山、南丹、百色。

用途同上种。

\*青蒌 蒌叶、槟榔蒌

*Piper betle* L.

梧州、武鸣、龙州等地，栽培。

茎、叶祛风散寒，行气化痰，消肿止痒；治胃寒痛，风寒咳嗽，疮疖，湿疹。叶可提芳香油。

苧叶蒌 野胡椒

*P. boehmeriaefolium* Wall.

龙州、扶绥、宾阳、靖西、那坡、田阳、凤山、罗城、大瑶山、大苗山。

全株祛风除湿；治风湿，跌打。

海南蒌

*P. hainanense* Hemsl.

宁明、那坡等地。

Piper

山萎 石南藤、爬岩香

*P. hancei* Maxim.

区内各地。

全株行气止痛，祛风消肿；治跌打损伤，风湿关节痛，腰膝无力，咳嗽，蛇伤，止呕。

细叶青蒌藤

*P. kadsura* (Choisy) Ohwi

陆川。

全株祛风止痛；治跌打。

两广萎☆

*P. matthewii* Dunn

容县、藤县、大瑶山、龙州、靖西。

全株祛风止痛；治风湿骨痛，跌打。

尼泊尔胡椒

*P. nepalense* Miq.

邕宁。

\*胡椒

*P. nigrum* L.

桂南栽培。

果为调味香料。果、茎、叶健胃祛风，治胃寒痛，呕吐，消化不良，腹胀。

毛萎

*P. puberulum* (Benth.) Maxim.

(*Chavica puberula* Benth.,

*P. hongkongense* C.DC.)

邕宁、马山、大明山、靖西、德保、那坡、乐业、罗城、大苗山、大瑶山、贺县、梧州、玉林、容县、博白。

全株止痛行气，活血祛风；治胃痛，外伤疼痛，牙痛，风湿痛等。

止痛效好，亦治蛇伤，产后风痛，水肿。叶可制酒饼。

### 假萎

**P. sarmentosum Roxb.**

钦州、博白、玉林、苍梧、大瑶山、南宁、邕宁、武鸣、宁明、大新、龙州、靖西、那坡、百色、凌云、天峨。

全株行气止痛，祛湿消肿；治跌打肿痛，腰腿痛，牙痛，疝气痛，蛇伤。水提液对葡萄球菌、福氏痢疾杆菌有抑制作用。叶切碎生食，为调味香料。

### 华山萎☆

**P. sinense C.DC.**

大瑶山。

### 齐头绒

**Zippelia begoniaefolia Bl.**

龙州大青山。

## 29 三白草科 SAURURACEAE

### 狗笠耳 土细辛

**Gymnotheca chinensis Decne.**

隆林、凌云、乐业。

全株治跌打。

### 鱼腥草 蕺菜、臭菜、侧耳根、狗贴耳

**Houttynia cordata Thb.**

区内各地。

全株清热解毒，排脓消肿，利尿；治肺炎，肺脓疡，百日咳，肺热咳嗽，痈疖，痔疮，尿路感染。又预防蚕豆黄病。叶可供蔬食。全株作农药，能毒杀棉蚜、红蜘蛛和各种青虫。

### 三白草 塘边藕、过塘藕、白莲藕

**Saururus chinensis (Lour.) Baill.**

## **Chloranthus**

区内各地。

有小毒。全株清热解毒，利尿消肿；治白带，尿路感染及结石，水肿，疮疖，前列腺炎。亦可作农药。

## **30 金粟兰科 CHLORANTHACEAE**

银线金粟兰 四块瓦、四子莲

***Chloranthus fortunei* (A.Gray) Solms**

龙胜、兴安、临桂、桂林、贺县。

有小毒。全株祛风止痛；治风湿关节痛，蛇伤，跌打，疖肿。

长梗金粟兰 四块瓦

***C. henryi* Hemsl.**

龙胜、全州。

全株消肿止痛；治五步蛇咬伤，跌打。

西南金粟兰

***C. holostegius* (H.-M.) Pei et Sen**

西林、隆林、田林、田阳、天峨、资源。

多穗金粟兰 大四块瓦

***C. multistachys* (H.-M.) Pei**

隆林、东兰、南丹、大苗山、龙胜、兴安、临桂、全州、资源。

滇桂金粟兰

***C. officinalis* Bl.**

凌云。

卵苞金粟兰

***C. oldhami* Solms**

乐业、南丹、临桂、兴安、全州。

全株散瘀活血；治跌打，蛇伤。

及己 四大金刚

**C. serratus (Thb.) Roem. et Schult.**

临桂、桂林、全州、大苗山、柳州、马山、藤县、玉林。

有毒。全株舒筋活络，祛风止痛；治疖肿，恶疮，搔痒，跌伤，

扭伤，骨折。又可杀孑孓、蛆。

\*金粟兰 珍珠兰、珠兰

**C. spicatus (Thb.) Mak.**

龙州、靖西、田林、凤山、桂林。

鲜花、根、茎可提芳香油。花可薰茶，或掺入茶叶，叫珠兰茶。

根茎外敷治疗疮。多有栽培供观赏。

九节风 接骨金粟兰、草珊瑚、九节茶、鹧鸪茶

**Sarcandra glabra (Thb.) Nakai**

(*Chloranthus glaber* Thb.,

*C. brachystachys* Bl.)

区内各地。

全株续筋接骨，止痛退热；治骨折，跌打肿痛，风湿腰腿痛，高热不退，腹胀，偏头痛。也可代茶。

海南草珊瑚

**S. hainanensis (Pei) Swamy et Bail.**

龙州、靖西、乐业、凤山。

## 32 罂粟科 PAPAVERACEAE

血水草 兜蓬菜、雪花罂粟

**Eomecon chionantha Hance**

全州、资源、兴安、临桂、桂林、永福。

全草有毒，清热解毒；治小儿癫痫和胎毒。

Eschscholtzia-Corydalis

\*花菱草 金英草

*Eschscholtzia californica* Champ.

栽培花卉。

博落迴

*Macleaya cordata* (Willd.) R.Br.

全州、兴安、龙胜、临桂、桂林、鹿寨、柳州、容县。

全草有毒，麻醉镇痛，消肿；治跌打损伤，关节炎，汗斑，恶疮，蜂蛰伤。作农药可防治稻椿象、稻苞虫、钉螺等。

\*丽春花 赛牡丹、虞美人

*Papaver rhoeas* L.

栽培花卉。

果有毒，镇痛，止咳，止泻；治咳嗽，痛症，水泻。

\*罂粟 鸦片

*P. somniferum* L.

栽培药物或花卉。

乳汁干燥后即鸦片，麻醉止痛，催眠镇静，止泻止咳；用于各种痛症，咳嗽，腹泻。果壳亦可用。

### 33 紫堇科 FUMARIACEAE

深山黄堇 黄花鸡距草

*Corydalis pallida* Pers.

龙胜、桂林、凌云、凤山、扶绥。

根止痛消肿，拔毒；治疗疮肿毒。

黄堇

*C. racemosa* (Thb.) Pers.

桂林。

根清热利尿；治目赤肿痛。

红花鸡距草 护心胆

*C. suaveolens* Hance

全州、龙胜、兴安、临桂、桂林、阳朔、永福、柳城、融安、大苗山。

根有小毒，解毒止痛，消肿；治毒蛇咬伤，跌打损伤，风湿关节痛，坐骨神经痛。

多花指蒴草

*Dactylicapnos multiflora* Hu

凌云。

指叶紫堇 倒劈藤

*D. scandens* D. Don

百色、凌云。

根茎止痛，止血收敛；治胃痛，关节痛，外伤出血。

## 36 白花菜科 CAPPARIDACEAE

黔桂槌果藤☆(注)

*Capparis bodinieri* Lévl.

隆林。

叶、花、果治毒蛇咬伤。

广州槌果藤

*C. cantoniensis* (Lour.) Merr.

(*C. pumila* Champ.)

梧州、陆川、北流、桂平、平南、大瑶山、临桂、龙胜。

茎、叶作土农药，又治疥癬。

凤山槌果藤☆

*C. chingiana* B.S.Sun

注：本属多数种类的果和种子有毒，不宜多食。

Capparis

凤山。

保亭楂果藤☆ 屈头鸡、犸瘤橙

*C. koi* Merr. et Chun

十万大山、北流、陆川、昭平、龙胜。

种子清热止渴；治喉炎，喉痛。

马槟榔 水槟榔

*C. masakai* Lévl.

天峨、南丹、凤山、都安、凌云、乐业、隆林、靖西、那坡、德保、龙州、容县、平乐。

种子入药，能解渴；治喉炎，去斑痧，醒酒。

膜叶楂果藤

*C. membranacea* Gardn. et Champ.

龙州。

根散瘀消肿；治跌打。

翅果楂果藤 水槟榔

*C. pterocarpa* F.Chun

隆林。

种子清热止渴；治喉痛。

曲枝楂果藤

*C. sepiaria* L.

龙州。

无柄楂果藤☆ 无柄山柑

*C. subsessilis* B.S.Sun

龙州。

尾叶楂果藤☆ 尾叶马槟榔

*C. urophylla* Chun et F.Chun

横县、扶绥、荔浦、永福、阳朔、临桂、桂林、恭城、兴安、大

苗山、融安。

纤枝槌果藤 假黄皮、柳枝山柑

*C. viminea* Hk.f. et Thoms.

梧州、贵县、大瑶山、南丹、平果、百色、隆林、龙州。

锈色纤枝槌果藤☆ 锈色柳枝山柑

*C. viminea* Hk.f. et Thoms.

*var. ferruginea* B.S.Sun

浦北、扶绥、田阳、西林。

白花菜

*Cleome gynandra* L.

(*Gynandropsis gynandra* (L.) Briq.)

龙州、南宁、百色。

种子有小毒，含脂肪油和芳香油；外用消肿止痛；治痔疮，风湿痹痛。

\*紫龙须 醉蝶花

*C. spinosa* L.

(*C. pungens* Willd.)

梧州、南宁、桂林。

栽培花卉，蜜源植物。

毛龙须 臭矢菜

*C. viscosa* L.

(*C. iconandra* L., *Polanisia iconandra* (L.) W. et A.)

十万大山、博白、贵县、梧州、钟山、平乐、临桂、南宁、武鸣、大新、宁明、龙州、田阳、百色。

赤果鱼木

*Crataeva erythrocarpa* Gagn.

镰叶鱼木

*C. falcata* (Lour.) DC.

桂林、阳朔、南丹、上林、钦州、合浦。

刺籽鱼木

*C. nurvala* Buch.-Ham.

(*C. lophosperma* Kurz)

大青山、那坡、昭平。

鱼木

*C. religiosa* Forst.f.

龙州、武鸣、桂平。

行道树；干材用，但易蛀蚀。果有毒，又可为胶粘剂；果皮为染料。

罗志藤

*Stixis suaveolens* (Roxb.) Pierre

那坡。

## 39 十字花科 CRUCIFERAE

\*芥兰 芥蓝

*Brassica alboglabra* Bail.

栽培蔬菜。

\*芥蓝头 球茎甘蓝、擘蓝

*B. caulorapa* Pasq.

栽培蔬菜。

\*青菜 白菜、小白菜

*B. chinensis* L.

栽培蔬菜。

\*油菜 芸苔

*B. chinensis* L.

var. *oleifera* Mak.

栽培油料作物和蔬菜。种子散瘀消肿；治产后血瘀，热肿。

\*全叶芥 苦芥

*B. integrifolia* (West) O.E.Schulz

栽培蔬菜。

\*芥菜

*B. juncea* (L.) Coss.

栽培蔬菜。种子可榨油和制芥辣粉；入药，作皮肤发赤剂、局部刺激剂；内服可发汗散寒。

\*皱叶芥

*B. juncea* (L.) Coss.

var. *crispifolia* Bail.

栽培蔬菜。

\*多裂叶芥

*B. juncea* (L.) Coss.

var. *multisecta* Bail.

栽培蔬菜。

\*大头菜

*B. juncea* (L.) Coss.

var. *napiformis* Paill. et Bois

(*B. napiformis* Bail.)

栽培蔬菜。

\*榨菜 菱角菜、羊角菜

*B. juncea* (L.) Coss.

var. *tsatsai* Mao

栽培蔬菜。

Brassica-Cardamine

\*花椰菜

*B. oleracea* L.

var. *botrytis* L.

栽培蔬菜。

\*包菜 椰菜、莲花白

*B. oleracea* L.

var. *capitata* L.

栽培蔬菜。

\*高脚白菜

*B. parachinensis* Bail.

栽培蔬菜。

\*大白菜 黄芽白

*B. pekinensis* Rupr.

栽培蔬菜。

\*芜青

*B. rapa* L.

栽培蔬菜。

芥 芥菜

*Capsella bursa-pastoris* Medic.

区内各地。

全草清热利尿，凉血止血；治尿血，子宫出血，月经过多，视网膜出血，乳糜尿。野菜。

喜钙碎米芥

*Cardamine calcicola* W.W.Sm.

龙胜。

弯曲碎米芥

*C. flexuosa* With.

(*C. silvatica* L.)

龙胜、临桂。

**碎米荠**

*C. hirsuta* L.

临桂、龙胜。

野菜。全草祛风热毒；治痢疾腹胀。

**琴叶碎米荠**

*C. lyrata* Bunge

临桂。

全草治妇女月经不调。

**堇叶碎米荠**

*C. violifolia* O.E.Schulz

临桂。

**水田芥 西洋菜、豆瓣菜**

*Nasturtium officinale* R. Br.

(*Roripa nasturtium-aquaticum* Hayek)

龙胜、临桂。

西江流域、柳州、桂林等地常栽培作蔬菜。

**\*萝卜 莱菔**

*Raphanus sativus* L.

var. *longipinnatus* Bail.

栽培蔬菜。根作蔬菜；又利尿消肿，治浮肿尿少；煮熟外敷，治冻疮。种子消食化痰，下气定喘；治食积腹泻，腹胀，咳嗽痰喘。

**\*茹菜 满园花**

*R. sativus* L.

var. *oleiferus* Mak.

绿肥作物。种子可榨油。

Roripa-Viola

圆果蔊菜

*Roripa globosa* (Turcz.) Thellg.

(*Nasturtium globosum* Turcz.)

南宁、隆林等地。

青蓝菜 印度蔊菜

*R. indica* (L.) Bail.

(*Nasturtium indicum* (L.) DC.,

*Sisymbrium indicum* L.)

临桂、南宁等地。

微子蔊菜

*R. microsperma* (DC.) H.-M.

(*Nasturtium microspermum* DC.)

临桂等地。

蔊菜 塘葛菜

*R. montana* (Wall.) Small

(*Nasturtium montanum* Wall.)

临桂、东兰、凤山、凌云、乐业、大瑶山、梧州等地。

全草清热利尿，凉血解毒，消肿退黄；治感冒发热，咽喉肿痛，小便不利，黄疸，疔疮痈肿，漆疮。

40 茜 菜 科 VIOLACEAE

三角车

*Rinorea bengalensis* (Wall.) O.Ktze.

龙州、大新。

堇菜

*Viola alata* Burgsb.

(*V. verecunda* Gr.)

临桂、桂林、龙胜、柳江、大瑶山、桂平、陆川、博白、北流、梧州。

全草拔毒去脓，散瘀消肿；治鼠瘘，瘰疬，蛇伤。

北堇菜

*V. alisoviana* Kiss.

临桂、柳州、河池、隆林。

全草拔毒消肿；治疮疖。

小叶犁头草

*V. betonicifolia* Beck.

全草生肌，清火；外敷疮疖，跌打。

戟叶犁头草

*V. betonicifolia* Beck.

*subsp. nepalensis* (Ging) Beck.

隆林、临桂、梧州。

全草拔毒消肿；治疮疖，跌打。

毛堇菜

*V. confusa* Champ.

临桂、桂林、龙胜。

全草拔毒生肌；治疮疖。

深圆齿堇菜

*V. davidi* Fr.

(*V. smithiana* W. Beck.)

龙胜。

蔓茎堇菜 白花犁头草、黄瓜香、匐伏堇

*V. diffusa* Ging

上思、容县、平南、大瑶山、大苗山、凌云、乐业、阳朔、临桂、

Viola

桂林、龙胜、兴安、全州。

全株清热消肿，生肌拔毒；治结合膜炎，蛇伤，疮毒红肿，巴骨癀。

紫花堇

*V. grypoceras* A.Gr.

临桂。

全草清热消肿；治疮毒，跌打损伤，火眼。

犁头草 紫花地丁、长萼堇菜

*V. inconspicua* Bl.

区内各地。

全草消炎止痛，清热解毒；治急性结合膜炎，咽喉炎，乳腺炎，疮疖肿毒，食积饱胀。

地丁草

*V. japonica* Langsd.

柳州。

全草清热解毒，消肿；治疮疖肿毒。鲜全草捣汁两酒杯，解盐卤中毒。

江西堇菜 高脚犁头草

*V. kiangsiensis* W.Beck.

南丹。

浅圆齿堇菜

*V. schneideri* W.Beck.

(*V. mucronulifera* H.-M.)

凌云、龙胜、平南、上林。

蔓地犁

*V. triangulifolia* W.Beck.

龙胜、大瑶山。

全草清热消炎；治结合膜炎。

\*三色堇

*V. tricolor* L.

var. *hortensis* DC.

栽培花卉。全株清热解毒；治皮肤病。

大叶堇☆ 蔷(音还)

*V. vaginata* Max.

龙胜、全州、隆林。

## 42 远志科 POLYGALACEAE

### 黄花远志

*Polygala arillata*

Buch.-Ham. ex D.Don

大瑶山、大苗山、乐业。

根炖肉，滋补强壮；治病后虚弱。树皮泡酒，通经活血。又供观赏。

### 黄花倒水莲 倒水莲、倒吊黄、白马胎、鸡仔树

*P. aureocauda* Dunn

上思、十万大山、大明山、马山、玉林、容县、平南、苍梧、贺县、富川、昭平、大瑶山、大苗山、阳朔、荔浦、永福、临桂、灵川、龙胜、兴安、恭城、凤山、隆林。

根滋补强壮，祛风湿，舒筋络；治病后和产后体虚，腰肌劳损，风湿关节痛，跌打损伤，急慢性肝炎，子宫下垂，月经不调。

### 尾叶远志

*P. caudata* R. et W.

阳朔、灵川、乐业。

Polygala

大金不换 紫背金牛、肥儿草、节节花、桧膜草

*P. chinensis* L.

(*P. glomerata* Lour.)

博白、玉林、容县、苍梧、昭平、十万大山、邕宁、大明山、马山、龙州、田林、百色、凌云、融安、大瑶山、平乐、阳朔、永福、恭城。

全草活血散瘀，止咳祛痰，清热解毒；治肺结核，百日咳，支气管炎，小儿麻痹后遗症，小儿疳积，跌打损伤，急性结合膜炎，蛇伤。

密花远志☆

*P. congesta* R. et W.

大苗山、那坡。

贵州远志☆

*P. dunniana* Lévl.

龙胜、全州、大瑶山、大明山。

小远志 瓜子金、小金不换、过路蛇、蓝花草

*P. japonica* Houtt.

全州、龙胜、临桂、桂林、永福、柳州、大苗山、梧州、横县、马山、凌云、乐业、隆林金钟山。

全草止咳祛痰，安神，强心利尿；治支气管炎，神经衰弱，蛇伤，骨髓炎及脓肿，痈疖疮肿，刀伤。

曲江远志☆

*P. koi* Merr.

全州、龙胜、临桂。

全株止咳；治咳嗽，又治小儿疳积。

大叶金牛 红背蓝

*P. latouchei* Fr.

大苗山、大瑶山、大明山、宁明、那坡。

山鼠尾

*P. longifolia* Poir.

龙州。

长尾远志☆

*P. mariesii* Hemsl.

灵川、靖西。

辣味根

*P. persicariifolia* DC.

百色。

岩生远志

*P. saxicola* Dunn

大瑶山、十万大山。

卵叶远志 西伯利亚远志

*P. sibirica* L.

龙胜、柳州、马山。

全草镇静安神，化痰，消痈肿；治咳嗽，支气管炎，惊悸，健忘，疮肿，蛇伤。

小花远志

*P. telephiooides* Willd.

贺县、昭平、临桂、三江、罗城。

全株解毒，祛痰；治蛇伤，风痰。

远志

*P. tenuifolia* Willd.

全州、资源、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、河池。

根祛痰，镇静安神；治咳嗽痰多，支气管炎，心悸不眠，健忘。

Polygala-Xanthophyllum

天星吊红

*P. triphylla* Buch.-Ham.

(*P. furcata* Royle)

恭城、龙胜、临桂、大苗山。

西南远志☆

*P. wattersii* Hance

大瑶山、临桂、南丹。

树皮舒筋活络；治跌打损伤。

一碗泡 斩蛇剑、过山蛇

*Salomonia cantoniensis* Lour.

十万大山、龙州、苍梧、昭平、大瑶山、大苗山、临桂、桂林、

龙胜、灌阳。

全株解毒，消肿，止痛；治毒蛇咬伤，无名肿毒。

缘毛一碗泡☆

*S. ciliata* (L.) DC.

(*Polygala ciliata* L.,

*S. oblongifolia* DC.)

龙胜、桂林、临桂、昭平、罗城。

蝉翼藤

*Securidaca inappendiculata* Hassk.

(*S. tavoyana* Wall. ex Benn.,

*S. yaoshanensis* Hao)

十万大山、北流、玉林、苍梧、南宁、大明山、大瑶山、那坡、凌云、乐业。

茎皮纤维坚韧，可代麻和作造纸、人造棉原料。

黄叶树 青蓝木

*Xanthophyllum hainanensis* Hu

钦州、东兴、浦北、十万大山、南宁、宁明、大瑶山。  
木材硬重，可供建筑、板材、家具、农具、织布机木棍用。

## 45 景天科 CRASSULACEAE

\*伽蓝菜 鸡爪三七、五爪三七

*Kalanchoe laciniata* DC.

栽培。

鲜茎、叶清热解毒，散瘀消肿，止血止痛；治跌打，外伤出血，烫火伤，毒蛇咬伤，疮疖脓肿。

\*落地生根

*K. pinnata* Pers.

(*Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Oken)

各地常有盆栽。

用途参阅伽蓝菜。

匙叶伽蓝菜 白背子草

*K. spathulata* DC.

扶绥、凌云、乐业。

鸭仔虫菜

*Sedum alfredi* Hance

大苗山、龙胜、临桂。

繁缕叶景天☆

*S. drymarioides* Hance

var. *stellariaefolium* (Fr.) Hamet

柳州。

树枝草

*S. grammophyllum* Fröd.

容县天堂山、龙胜。

Sedum-Astilbe

深山佛甲草

*S. japonicum* Sieb.

全州。

\*佛甲草 禾雀脚

*S. lineare* Thb.

栽培花草。

全草清热解毒，散瘀止痛，止血；治烫火伤，疮疖肿毒，咽喉口舌肿，急性结合膜炎、跌打损伤、外伤出血，犬虎咬伤。

黄山景天☆

*S. mingjiniana* Fu

阳朔。

垂盆草 虎茎佛甲草

*S. sarmentosum* Bunge

临桂、桂林。

全草止血生肌，散瘀消肿；治烫火伤，刀伤，跌打，疮疖肿痛，咽喉红肿，鸡眼。

印度石莲花 蛇舌莲

*Sinocrassula indica* (Decne.) Berger

(*Crassula indica* Decne.,

*Sedum indicum* (Decne.) Hamet)

南宁。

全草活血散瘀，止血生肌；治跌打，蛇伤，刀伤。

## 47 虎耳草科 SAXIFRAGACEAE

华南落新妇☆ 华南升麻(注)

*Astilbe austrosinensis* H.-M.

全州、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山。

注：中药升麻，在我国多数地区用毛茛科升麻，华南地区则用菊科升麻。

大叶猫眼草

*Chrysosplenium macrophyllum* Oliv.

龙胜。

厚叶梅花草

*Parnassia crassifolia* Fr.

资源、兴安。

半边碟

*P. davidi* Fr.

大瑶山。

苍耳七

*P. wightiana* Wall.

龙胜、兴安。

全草浸酒服，明目补肾；治腰痛，白带。花浸酒或煎水服，治眼翳。

扯根菜

*Penthorum chinense* Pursh.

临桂。

全草消肿利水，散瘀行气；治水肿，跌打肿痛。野菜。

卵心叶虎耳草

*Saxifraga ovatocordata* H.-M.

龙胜、大瑶山。

虎耳草 金线吊芙蓉、耳聋草

*S. stolonifera* Meerb.

(*S. sarmentosa* L.f.)

全州、兴安、龙胜、临桂、桂林、灵川、融水、大苗山、罗城等地。

全草有小毒，清热解毒，凉血止血；治急慢性中耳炎，耳内流脓

Tiarella-Drosera

(捣汁滴耳)，外伤出血，疮疖脓肿，风丹，瘤肿，皮肤红疹，冻疮，痔疮，毒虫刺伤。

紫背金钱

*Tiarella polyphylla* D.Don

龙胜、兴安、全州。

全草活血去瘀；治跌打损伤。

48 茅膏菜科 DROSERACEAE

锦地罗 落地金钱

*Drosera burmanni* Vahl

钦州、邕宁。

本属植物是有名的食虫植物。

长叶茅膏菜

*D. indica* L.

合浦。

茅膏菜 一粒金丹、地下明珠

*D. peltata* Sm.

var. *lunata* (Buch.-Ham.) C.B.Clarke

龙胜、兴安、临桂、桂林、罗城、大苗山、大瑶山、大明山、梧州。

叶有毒，含腐蚀性色素和氢氰酸。球茎祛风除湿，止痛；外敷治风湿性腰腿痛，跌打损伤，颈淋巴结核，但久敷起泡。全株煎水洗；治身痒。

圆叶茅膏菜

*D. rotundifolia* L.

桂林。

52 沟繁缕科 ELATINACEAE

田繁缕 蜂刺草

*Bergia ammannoides* Roxb.

区内各地。

倍蕊田繁缕

*B. serrata* Blanco

柳州、大瑶山。

53 石竹科 CARYOPHYLLACEAE

细枝蚬壳草

*Arenaria leptoclados* Guss.

柳州。

蚕缀 鹅不食(注)

*A. serpyllifolia* L.

十万大山、凌云、乐业、临桂。

短瓣石竹 松筋藤

*Brachystemma calycinum* D.Don

凌云、乐业、田林、那坡、百色、德保、靖西、龙州。

根舒筋活络；治远年风湿，跌打损伤，白喉。

婆婆指甲菜

*Cerastium viscosum* L.

桂林。

狗筋蔓 抽筋菜

*Cucubalus baccifer* L.

注：中草药常用的鹅不食草，是菊科植物，和本种不同。

Dianthus-Drymaria

隆林、凌云、乐业、临桂。  
全株活血；治筋骨疼痛。

\*五彩石竹

*Dianthus barbatus* L.

栽培花卉。

\*大花石竹 洋丁香

*D. caryophyllus* L.

栽培花卉。

石竹

*D. chinensis* L.

各地常有栽培。

全草作瞿麦用。花含芳香油，可调配高级香精。庭园花卉。

\*洛阳花 虹石竹

*D. chinensis* L.

var. *heddewigii* Regel

栽培花卉。

\*繫石竹

*D. chinensis* L.

var. *laciniata* Regel

栽培花卉。

瞿麦

*D. superbus* L.

桂林。

全草清热利尿，破血通经；治水肿，血淋，痈肿，孕妇忌用。种子可榨油，供制皂用，亦可食用。花卉。

荷莲豆 水蓝青、水冰片、穿线蛇

*Drymaria cordata* (L.) Willd.

龙胜、临桂、大瑶山、苍梧、藤县、昭平、凌云、百色、天峨、宁明、龙州。

全株消肿解毒，退热止痛；治急性皮炎并发溃疡，疖肿，痈疽，毒蛇咬伤，骨髓炎等。常作外用。

星色草 白鼓钉

*Polycarpea corymbosa* (L.) Lam.

(*Achyranthes corymbosa* L.)

合浦。

全草清热利尿，解毒除湿；治急性菌痢，肠炎，实症腹水，消化不良。

多莢草

*Polycarpon indicum* (Retz.) Merr.

邕宁。

漆姑草

*Sagina maxima* A.Gr.

(*S. sinensis* Hance)

临桂。

\*高雪轮 捕虫瞿麦

*Silene armeria* L.

栽培花卉。

苍蝇花 野蚊子草、银柴胡

*S. fortunei* Vis

(*S. argyi* Lévl.)

桂林。

根清热，凉血；治虚劳发热，小儿疳积，消瘦发热，心火。

\*矮雪轮

*S. pendula* L.

Stellaria-Mollugo

栽培花卉。

雀舌草 天蓬菜

*Stellaria alsine* Grimm.

(*S. uliginosa* Murr.)

大苗山。

牛繁缕

*S. aquatica* (L.) Scop.

临桂、龙胜、全州等地。

繁缕 鹅肠菜

*S. media* (L.) Cyr.

区内各地多有分布。

全草治疮疥。野菜。

竹枝草

*S. saxatilis* Buch.-Ham.

临桂、南丹、隆林。

鸡肉菜

*S. wushanensis* Wils.

龙胜、大苗山、大瑶山、平南、隆林、凌云、乐业。

野菜。

## 54 粟米草科 MOLLUGINACEAE

粟米草

*Mollugo pentaphylla* L.

(*M. stricta* L.)

兴安、临桂、桂林、大苗山、柳州、苍梧、十万大山、龙州。  
全草抗菌消炎。

## 56 马齿苋科 PORTULACACEAE

\*半枝莲 松叶牡丹

*Portulaca grandiflora* Hk.

区内城市。

美丽花卉。常用于花坛、花径、盆花。

马齿苋 瓜子菜

*P. oleracea* L.

区内各地。

全草清热去湿；治菌痢，肠炎，百日咳，急性睾丸炎，乳腺炎，疟疾，急性关节炎。可作蔬菜，家畜饲料，含维生素甲、乙、丙和脂肪等。亦可作农药，防治蚜虫。

多毛马齿苋

*P. pilosa* L.

贵县。

全株止血消炎；治刀伤，狗咬伤，水火烫伤。

土人参

*Talinum patens* (L.) Willd.

(*T. paniculatum* Gaertn.)

区内各地。

全株补中益气，润肺生津；治病后体弱，肺燥咳嗽，遗尿，月经不调。鲜叶外敷疮疖。可作蔬菜。

## 57 蕺科 POLYGONACEAE

\*珊瑚藤

*Antigonum leptopus* Hk. et Arn.

## Homalocladium-polygonum

通常栽培。

庭园花卉。

### \*竹节蓼 扁竹花、飞天蜈蚣、蜈蚣草

*Homalocladium platycladum* (F.-Muell.) Bail.

(*Muehlenbeckia platyclados* Meissn.)

栽培。

茎、叶拔毒消肿；治毒蛇及蜈蚣咬伤。

### 萹蓄

*Polygonum aviculare* L.

全州、桂林、阳朔。

全草利尿通淋，清热，驱虫；治小便不利，湿热淋症，血崩，黄疸，小儿蛔虫。作农药，可防治椿象、菜青虫，灭蛆。

### 毛蓼

*P. barbatum* L.

钟山、平乐、柳州、大苗山、都安、南宁、武鸣、宁明、十万大山。

全草拔毒生肌；治疮疖痈肿。

### 细刺毛蓼 小毛蓼

*P. barbatum* L.

var. *gracile* (Dans.) (Stew.)

十万大山、龙州、藤县、桂林。

全草散寒活血；捣绒熨胸背部，治麻疹不退，跌伤后受寒。

### 簇蓼 红辣蓼

*P. caespitosum* Bl.

(*P. posumbu* Ham.)

区内各地。

全草治跌打，关节炎，头疮和脚癣。

球花蓼

*P. caespitosum* Bl.

var. *longisetum* (De Bruyn) Stew.

贺县、大瑶山、平南。

头花蓼 沙滩子、石莽草、石辣蓼

*P. capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don

贺县、兴安、龙胜、灵川、临桂、桂林、大瑶山、大苗山、罗城、凌云、隆林、靖西。

全草利尿，清热解毒；治尿路感染，尿布皮炎，湿疹，黄水疮。

火炭母

*P. chinense* L.

区内各地。

全草清热利湿，消肿毒，去腐生肌；治痈疖溃烂，皮炎，湿疹，肠炎，痢疾，感冒，咽喉炎，跌打扭伤，蛇伤。

伴蛇莲 拳参、革叶蓼

*P. coriaceum* Sam.

全州、兴安、灌阳、恭城、凌云、乐业。

全草解毒，收敛，生肌；治毒蛇咬伤，烫火伤，痢疾，腹泻。

蓼子草

*P. criopolitanum* Hance

临桂、昭平、梧州、南宁、龙州。

虎杖 阴阳莲、黄干头、红莲、酸筒杆、马鹿角

*P. cuspidatum* S. et Z.

区内各地。

根清热解毒，活血散瘀，利尿消肿；治急性风湿性关节炎，跌打骨折，烫火伤(抗绿脓杆菌)，肝炎，肋膜炎，支气管炎，血热经闭，狂犬病，毒蛇咬伤。作兽药，治牛臌胀病，黄蜂胃等。

Polygonum

作土农药，防治螟虫、蚜虫、青虫。野菜。

野荞麦 酸荞麦、荞麦七

*P. cymosum* Meissn.

资源、兴安、龙胜、灵川、临桂、大瑶山、忻城、梧州、南宁、武鸣。

根和全草消肿解毒，健脾胃，收敛；治乳腺炎，食欲不振，小儿消化不良，痢疾，腹泻，毒蛇咬伤，跌打损伤，痈疖。叶可作菜。

二歧蓼 大蓼

*P. dichotomum* Bl.

(*P. strigosum* R.Br.

var. *pedunculare* (Wall.) Stew.)

苍梧、南宁等地。

疏花蓼

*P. dissitiflorum* Hemsl.

大瑶山。

\*荞麦 三角麦、甜荞麦

*P. fagopyrum* L.

(*Fagopyrum esculentum* Moench.)

区内各地。

栽培粮食作物。果益气止汗；治盗汗，自汗。根、叶外敷，治无名肿毒，蜜源植物。

光蓼

*P. glabrum* Willd.

南宁、柳州、桂林。

箭叶蓼

*P. hastato-sagittatum* Mak.

平南、大瑶山、大苗山、昭平、临桂、龙胜、兴安、资源、恭城、乐业、那坡、横县、龙州。

全草治蛇伤。

**水蓼 辣蓼、蓼、蓼芽菜、柳蓼草**

**P. hydropiper L.**

区内各地。

全草止泻，利尿消肿，止痛；治肠炎，腹泻，跌打，风湿，疮疖，蛇伤，水肿。作土农药，防治稻飞虱、稻苞虫等，又可灭蛆、孑孓。全草含甲氧基蒽醌、凝血性甙，具降血压作用的揮发油，对家畜有毒。

**软水蓼**

**P. hydropiper L.**

**var. flaccidum (Meissn.) Stew.**

**(P. flaccidum Meissn.)**

梧州、贵县、南宁、柳州等地。

用途参阅水蓼。

**粗毛水蓼 小辣蓼**

**P. hydropiper L.**

**var. hispidum (Meissn.) Stew.**

**(P. hispidum Meissn.)**

龙州等地。

**蚕茧草**

**P. japonicum Meissn.**

天峨。

**山蓼 愉悦蓼**

**P. jucundum Meissn.**

桂林、柳州、河池、南宁、梧州等地区。

Polygonum

全草作农药。

大马蓼

*P. lapathifolium* L.

钟山、阳朔、天峨、乐业。

果清肺化痰，降气通便，透疹；治咳嗽痰喘，便秘，麻疹不透。

全草作农药，防治稻飞虱、稻苞虫、浮尘子等，亦可灭孑孓和蛆。

柳叶蓼

*P. lapathifolium* L.

*var. salicifolium* Sibth.

梧州、大瑶山、大苗山、临桂、天峨、隆林。

用途参阅大马蓼。

小蓼

*P. minus* Huds.

临桂、柳州。

何首乌 首乌、多花蓼、马肝石

*P. multiflorum* Thb.

区内各地。

块根生用，通大便，解疮毒；治便秘，肿毒，颈淋巴腺炎。制熟则补肝肾，益气血；治贫血，衰弱，血虚发白，头昏目花，腰膝酸软，肝肾阴亏。首乌藤（夜交藤）养心安神；治虚烦不眠，多梦。叶拔浓；外敷疮疖肿痛。茎、叶煎汤，洗疮疖作痒。

小花蓼

*P. muricatum* Meissn.

临桂、龙胜、大苗山、罗城。

山谷蓼☆ 尼泊尔蓼

*P. nepalense* Meissn.

(*P. alatum* Buch.-Ham., mss.)

桂林地区、昭平、容县、大瑶山、大苗山、融安、罗城、东兰、横县、大新、凌云、隆林。

莼草 天蓼、大蓼、木蓼、东方蓼

*P. orientale* L.

兴安、龙胜、桂林、大苗山、昭平、梧州、南宁、宁明、龙州、马山、灵山。

果(水红花子)清肺化痰，降气通便，软坚消痞；治咳嗽痰喘，便秘，麻疹不透，烦渴，颈淋巴腺炎，痞块腹胀。花散血，消食，止痛。叶、根治毒疮。根治风疹块。种子含淀粉，可制饴糖和酿酒。果序烤熟，可食。

掌叶蓼 屈草

*P. palmatum* Dunn

大瑶山、十万大山、那坡。

高山蓼

*P. paniculatum* Bl.

隆林、田林。

毛高山蓼

*P. paniculatum* Bl.

var. *molle* (Don) Dans

凌云、那坡。

扛板归 大蜢脚、蛇不过、老虎崩、贯叶蓼、青蛇尾、河白草

*P. perfoliatum* L.

区内各地。全草清热解毒，去腐生肌，利尿消肿；治毒蛇咬伤，疮疖溃疡，皮肤湿疹，腹泻，尿路结石。可作农药防治蔬菜害虫，可熏壁虱。

Polygonum

米子蓼 习见蓼

*P. plebeium* R Br.

区内各地。

鸭脚蓼☆

*P. pseudopalmatum* Hoo

博白、北流、岑溪、苍梧。

赤胫散 蛇头蓼、九龙盘、缺腰叶蓼

*P. runcinatum* D. Don

全州、资源、灌阳、龙胜、大苗山、凌云。

全草消肿解毒；外用治蛇伤，痈疖，无名肿毒。

华赤胫散☆

*P. runcinatum* D. Don

*var. sinense* Hemsl.

全州、资源、龙胜。

用途参阅赤胫散。

戟叶扛板归

*P. sagittifolium* Lévl.

(*P. darrissi* Lévl.)

兴安、平乐、乐业、隆林。

廊茵 刺蓼、红花蛇不过

*P. senticosum* (Meissn) Fr. et Sav.

平乐、桂林。

全草清热解毒；治顽固性痈疖，蛇头疮，蛇咬伤。

糙刺蓼☆ 水湿蓼

*P. strigosum* R.Br.

柳州、柳城。

载叶蓼 苦荞麦

*P. thunbergii* S. et Z.

凌云、大瑶山、藤县。

蓝蓼 蓝

*P. tinctorium* Ait.

藤县、平南、大瑶山、阳朔、都安、南丹、凤山等地。

叶清热解毒，凉血；治急性热病，喉痛，口舌生疮，痈肿恶疮。

可制蓝色染料。

金线草 九龙盘

*P. virginianum* L.

(*P. filiforme* Thb., *Tovara virginiana* (L.) Rafin.

var. *filiformis* (Thb.) Stew.)

区内各地。

全草止血；治咳血，崩漏。亦可供观赏。

香蓼

*P. viscosum* D.Don

大明山、扶绥、宁明。

全草有香气；治风湿。

酸模 莫菜、癣草

*Rumex acetosa* L.

资源、全州、凌云。

根或全草消炎止血，通便，杀虫；治外伤出血，皮肤病，疥癣，汗斑，疔疮，五淋，便秘。嫩叶可食，可作猪饲料。全株可作农药。

皱叶酸模 野当归、羊蹄

*R. crispus* L.

全州、融安、苍梧、玉林、扶绥、靖西。

Rumex-Phytolacca

根清热通便，杀虫；治便秘，醋磨或酒浸，外搽各种顽癣，疮疡肿痛，白秃，跌打损伤。茎、叶可作猪饲料。

羊蹄

*R. japonicus* Meissn.

凌云、龙胜、桂林、贺县、玉林、南宁。

根治疥癣，便秘；又含淀粉和单宁。嫩叶可作蔬菜和猪饲料。

土大黄

*R. madaio* Mak.

(*R. daiwoo* Mak.)

大瑶山、苍梧。

根清热通便，杀虫止痒；治便秘，皮肤慢性溃疡，疥疮，无名肿毒。

假菠菜 长刺酸模、连明子

*R. maritimus* L.

凌云、凤山、梧州、南宁、合浦。

大叶酸模☆

*R. nepalensis* Spreng.

(*R. esquirolii* Lévl.)

隆林、龙胜。

绿萼酸模

*R. wallichii* Meissn.

凌云、河池。

59 商 陆 科 PHYTOLACCACEAE

商陆

*Phytolacca acinosa* Roxb.

(*P. esculenta* van Houtte)

区内各地。

全株有毒，根最毒，含商陆毒素、羟蔻酸、皂甙等。根逐水利尿，消肿毒；治水肿，腹水，脚气；外敷痈疖疮毒。孕妇忌服。可作农药。作兽药，外敷，治无名肿毒。

## 61 藜 科 CHENOPODIACEAE

\*莙荙菜 猪乸菜、甜菜、芥菜、牛皮菜

*Beta vulgaris* L.

var. *cicla* L.

区内各地。

蔬菜。叶带红色的品种，可栽培供观赏。

盐巴米 红盐菜

*Chenopodium amaranticolor* Coste et Reyn.

凌云、乐业、隆林。

常有栽培。种子含淀粉，可食；嫩苗可作菜。

土荆芥(注) 沙塘香草、鹅脚草、臭藜藿、钩虫草

*C. ambrosioides* L.

区内各地。

全草有毒，驱虫，止痒；驱钩虫、蛔虫，治脚癣，皮肤湿疹，搔痒，小儿麻痘脱痂(外洗)，毒虫咬伤。

藜 小藜、沙苋菜

*C. serotinum* L.

(*C. album* sensu Merr. et Chun, non L.)

区内各地。

嫩苗、叶可作蔬菜和猪饲料。外洗疮疖疥癣。

注：本种和唇形科的“土荆芥”不同，不可混用。

Kochia-Achyranthes

地肤 扫帚菜

*Kochia scoparia* (L.) Schrad.

柳州、百色。

果利尿通淋，清湿热；治小便不利，湿热淋症，皮肤热毒，搔痒流水。又供观赏。

\*菠菜 菠菜、角菜

*Spinacia oleracea* L.

区内各地。

栽培蔬菜。

南方碱蓬

*Suaeda australis* (R.Br.) Moq.

潮湿海滩上或粘性盐积土上。

盐土指示植物。

## 63 篦 科 AMARANTHACEAE

土牛膝(注) 倒刺草

*Achyranthes aspera* L.

区内各地。

全株清热发表，利水通淋，强筋散血；治感冒发热，暑热头痛，

尿路结石，肾炎水肿，风湿腰腿痛。

牛膝

*A. bidentata* Bl.

区内各地。

根生用，活血通经；治产后腹痛，月经不调，经闭，鼻血，虚火

牙痛，脚气水肿；熟用，补肝肾，强腰膝；治腰膝酸痛，肝肾亏虚，跌打瘀痛。

注：苋科的芒草亦有称作土牛膝，为治白喉良药，但不能作牛膝用。

长叶牛膝 柳叶牛膝

*A. longifolia* Mak.

龙胜。

用途和牛膝相同，但功效较次。

无毛白花苋

*Aerva glabrata* Hk.f.

河池、梧州。

白花苋

*A. sanguinolenta* (L.) Bl.

(*Achyranthes sanguinolenta* L.,

*Aerva scandens* (Roxb.) Wall.)

龙州、平果、靖西、那坡、田林、隆林、都安、东兰、河池、天峨、柳州、贵县。

全草可供药用。

虾钳菜 莲子草、节节花、米子草、白花仔

*Alternanthera sessilis* (L.) R.Br.

区内各地。

全草清热解毒，散瘀止痒，催乳；治蛇伤，疖肿，湿疹，皮炎，热结便秘，乳汁不足，跌打。嫩叶可食和作猪饲料。

\*红草 红绿草

*A. versicolor* Hort. ex Regel

公园或花坛栽培的观赏植物。

水苋菜 老枪谷、红米菜

*Amaranthus caudatus* L.

都安、隆林、凌云、乐业、桂林、永福。

嫩叶可作蔬菜。又为观赏植物。根滋补强壮；治虚损。

Amaranthus

\*白花老枪谷

*A. caudatus* L.

var. *albiflorus* Hort.

草本花卉。

\*红叶老枪谷

*A. caudatus* L.

var. *atropurpureus* Hort.

草本花卉。

反枝苋

*A. retroflexus* L.

梧州。

华北地区有将本种作青葙子用。

刺苋 翅苋菜

*A. spinosus* L.

区内各地。

全草清热除湿，凉血解毒；治急性菌痢，腹泻，痔疮出血，溶血性毒蛇咬伤，疖肿，预防麻疹等。孕妇忌服。亦可作猪饲料和野菜。

\*苋 莠菜

*A. tricolor* L.

(*A. gangeticus* L.)

栽培蔬菜。

全株清热明目，利大小便。

野苋

*A. viridis* L.

区内各地。

根治菌痢，蛇伤。茎、叶可作猪饲料和野菜。

青葙 野鸡冠

*Celosia argentea* L.

区内各地。

种子清肝明目；治眼红肿痛，怕光流泪，急性结膜炎，眼睛生翳，支气管哮喘，皮肤搔痒；煎汁滴鼻，治鼻出血。嫩茎、叶煮去苦味，可作菜和猪饲料。种子含油，可供食用。

\*鸡冠花

*C. argentea* L.

var. *cristata* (L.) Ktze.

(*C. cristata* L.)

栽培花卉。

种子亦作青葙子用。花序、种子止血，收敛止泻；治赤白痢，痔疮出血，肠出血，吐血，衄血，子宫出血。

杯苋

*Cyathula prostrata* (L.) Bl.

(*Achyranthes prostrata* L.)

梧州、大瑶山、宁明、那坡。

全草治跌打，驳骨。

地灵苋

*Deeringia amaranthoides* (Lam.) Merr.

南宁、龙州、靖西、那坡、百色、隆林、凌云、凤山、河池。

全株祛风除湿，通经活络；治风湿性关节炎，风湿腰腿痛等；炖猪肉吃，治夜盲。

\*千日红 火球花

*Gomphrena globosa* L.

栽培花卉。

花序治咳嗽，气喘。

\*血苋

*Iresine herbstii* Hk.f.

栽培花卉，花坛植物。

茎、叶治吐血，桂西农民，有用其叶染红糯米饭。

64 落葵科 BASELLACEAE

落葵 藤菜、红藤菜、豆腐菜

*Basella rubra* L.

桂林、灵山、梧州、贵县、宁明、那坡、百色；桂南也有栽培。

药用全草和珠芽，滋补强壮，清热润肠，消肿散瘀；治久病体弱，便秘，疖肿，跌打损伤，骨折。花汁清热解毒，解痘毒，治乳头破裂。常栽作蔬菜。本品含维生素A<sub>3</sub>、P<sub>2</sub>，皂素及胶质。

65 亚麻科 LINACEAE

\*亚麻

*Linum usitatissimum* L.

纤维和油料作物。种子油供食用或作油漆、涂料和油墨原料。种子入药，治肠燥便秘，病后虚弱，眩晕等症。亚麻油内服为滑润剂，缓泻，可作软膏基质。亚麻纤维长，拉力强，供纺织等用。

\*石海椒

*Reinwardtia indica* Dum.

(*R. trigyna* Pl.)

桂林有栽培。

木本花卉。

米念芭

*Tirpitzia ovoidea* Chun et How, ined.

柳州、罗城、巴马、凤山、藤县、武鸣、上林、龙州、大新、靖西、德保。

茎、叶治跌打。

青篱柴 梯芭木、青皮柴

*T. sinensis* (Hemsl.) Hall.

(*Reinwardtia sinensis* Hemsl.)

临桂、平乐、灵山、天峨、南丹、都安、河池、东兰、凌云、靖西、那坡、德保、田林、隆林。

## 66 瑞藜科 ZYGOPHYLLACEAE

蒺藜

*Tribulus terrestris* L.

百色、柳州。

果平肝开郁，散风明目，通乳通经；治肝旺头晕头痛，风火眼红多泪，白㾗风，催乳。种子可榨油，供工业用。茎皮纤维可造纸。

## 67 牻牛儿苗科 GERANIACEAE

华中老鹳草☆

*Geranium franchetii* Knuth

隆林、田林、凌云、东兰。

用途参阅南老鹳草。

南老鹳草☆ 老鹳草、尼泊尔老鹳草

*G. nepalense* Sweet

Geranium-Biophytum

隆林、田林、凌云、那坡、南丹、大苗山。  
全草舒筋活络，消肿接骨，抗菌消炎；治风湿麻痺，风湿关节炎，跌打，骨折，外伤出血，久年烂疮，口腔炎，支气管炎。

鼠掌老鹳草☆ 西伯利亚老鹳草

*G. sibiricum* L.

全州、资源、兴安。

用途参阅南老鹳草。

\*香叶

*Pelargonium graveolens* L.Her.

栽培芳香、药用，观赏植物。

全株含芳香油，可供调配食用、皂用等香精。全草治风湿，阴囊湿疹，疥癣。

\*天竺葵 木海棠

*P. hortorum* Bail.

花卉。

## 69 醋 酱 草 科 OXALIDACEAE

\*阳桃

*Averrhoa carambola* L.

梧州、藤县、平南、桂平、容县、都安、宁明、龙州、田阳、百色、桂林等地，以桂平、平南、藤县较多。

华南有名水果之一。实生苗的果极酸，可供腌渍或蜜饯。叶利尿，外敷能止痛，散热毒，止血，拔毒生肌；治疮疖。

分枝感应草

*Biophytum esquirolii* Lévl.

隆林、天峨。

感应草

**B. sensitivum (L.) DC.**

贵县、邕宁、扶绥、龙州、东兰。

全株消肿；治水肿。

酢酱草 酸味草、黄花酢酱草

**Oxalis corniculata L.**

(*O. repens* Thb.)

区内各地。

全株清热解毒，利尿，活血，散瘀消肿；治感冒，咽喉肿痛，肠炎腹泻，尿路感染，风湿性关节炎，跌打扭伤肿痛，烫火伤，过敏性皮炎，漆疮，皮肤湿疹，脚痒，疖肿。茎叶含草酸，可擦镜和铜器。

粘酢酱草

**O. corniculata L.**

*var. viscidula* Wieg.

罗城。

红花酢酱草 大酸味草

**O. corymbosa DC.**

(*O. maritima* Zucc.)

区内各地。

用途参阅酢酱草。

三角叶酢酱草

**O. griffithii Edgew. et Hk.f.**

全州、龙胜、大苗山、田林、凌云。

全草治毒疮，拔子弹。

70 金莲花科 TROPAEOLACEAE

\*金莲花

*Tropaeolum majus* L.

栽培花卉。

71 凤仙花科 BALSAMINACEAE

密齿凤仙

*Impatiens amabilis* Hk f.

大瑶山。

\*凤仙花      急性子、指甲花、灯盏花

*I. balsamina* L.

栽培花卉。

种子(急性子)降气散瘀，软骨哽；治经闭，积块，骨哽卡喉。

根、叶有小毒，也可治骨哽卡喉。花解毒；治蛇伤。

华凤仙

*I. chinensis* L.

南宁、大明山、马山、柳州等地。

全株清热解毒，消肿；治毒疮。

棒凤仙

*I. claviger* Hk.f.

凌云、十万大山。

茎、叶治热疮。

杯花凤仙

*I. cyathiflora* Hk.f.

容县。

毛凤仙

I. lasiophyton Hk.f.

大苗山。

水猪菜

I. mengtiana Hk.f.

容县、阳朔、大苗山、凌云。

红纹凤仙

I. rubro-striata Hk.f.

大瑶山。

水指甲

I. siculifer Hk.f.

罗城。

大叶水指甲

I. siculifer Hk.f.

var. porphyrea Hk.f.

大苗山、龙胜、阳朔、凌云。

## 72 千屈菜科 LYTHRACEAE

浆果水苋 细叶水苋

Ammannia baccifera L.

南宁、钟山、昭平、阳朔、临桂。

尾叶紫薇

Lagerstroemia caudata Chun et How, ined.

全州、灵川、桂林、临桂、阳朔。

木材供家具和建筑用。

Lagerstroemia-lawsonia

紫薇 紫金花

*L. indica* L.

区内各地。

花美丽，供庭园绿化。叶治产后吐血下血，外洗湿疹；根水煎服，解黄藤毒。

桂林紫薇

*L. kweilinensis* S.Lee et L.Lau, ined.

桂林、平乐。

庭园绿化植物。

\*大花紫薇 大叶紫薇

*L. speciosa* (L.) Pers.

梧州。

根、叶收敛解热。花美丽，供庭园绿化。木材坚硬耐腐，为家具、建筑用材。其经济价值足与柚木比拟。

狭瓣紫薇

*L. stenoptera* Chun

临桂。

南紫薇

*L. subcostata* Koehne

临桂、灵川、永福、大瑶山、平南、贵县。

花败毒散瘀。木材供建筑、枕木等用。

网脉紫薇☆

*L. suprareticulata* S.Lee et L.Lau, ined.

大明山、龙州。

\*散沫花 指甲花

*Lawsonia inermis* L.

宁明、龙州。

花极香，可供绿化。叶可取红色染料。

绒毛千屈菜

*Lythrum salicaria* L.

var. *tomentosum* DC.

灵川、桂林、临桂。

草本花卉。

普通千屈菜

*L. salicaria* L.

var. *vulgare* DC.

阳朔、桂林。

草本花卉。

异叶节节菜

*Rotala diversifolia* Koehne

桂林。

节节菜 碌耳草

*R. indica* (Willd.) Koehne

(*Ammannia peploides* Spreng.)

宁明、龙州、隆林、大苗山、昭平、苍梧、平南。

全草治热疮。嫩苗可食，又可作猪饲料。

海滨薄瓣节节菜

*R. leptopetala* Koehne

var. *littorea* Miq.

柳州。

五数薄瓣节节菜

*R. leptopetala* Koehne

var. *pentamera* Koehne

平南、南宁、百色。

圆叶节节菜 水瓜子、过塘蛇

**R. rotundifolia** (Buch.-Ham.) Koehne

(*Ammannia rotundifolia* Buch-Ham.)

区内各地。

全草解毒；治蛇伤。

\***虾子花**

**Woodfordia fruticosa** (L.) Kurz

隆林、凌云、东兰。

花收敛；治痢疾，月经不调。树皮可提取栲胶。又可供庭园绿化用。

## 74 海桑科 SONNERATIACEAE

八宝树 米达栋

**Duabunga grandiflora** (Roxb. ex DC.) Walp.

(*D. sonneratioides* Buch-Ham.)

宁明、那坡。

## 75 安石榴科 PUNICACEAE

\***石榴** 安石榴

**Punica granatum** L.

灌阳、全州较多。

果皮、根皮收敛，止泻，驱虫；治久泻久痢，便血，脱肛，驱蛲虫，又可治遗精，白带。花可治吐血，衄血，中耳炎。亦为果树和庭园绿化树木。

\*白石榴 白石榴花

*P. granatum* L.

var. *albescens* DC.

供庭园绿化。

\*千瓣白石榴

*P. granatum* L.

var. *multiplex* Sweet

供庭园绿化。

\*千瓣红石榴

*P. granatum* L.

var. *pleniflora* Hayne

供庭园绿化。

## 77 柳叶菜科 ONAGRACEAE

露珠草

*Circaeа cordata* Royle

(*C. cardiophylla* Mak.)

全州。

水珠草 虬子草

*C. mollis* S. et Z.

(*C. quadrисulcata* Fr. et Sav.)

龙胜、大苗山、凌云。

光华柳叶菜

*Epilobium cephalostigma* Hsskn.

兴安、龙胜、大苗山。

Epilobium-Ludwigia

柳叶菜

*E. hirsutum* L.

灌阳、兴安、灵川、大苗山、东兰。

苗、叶可作蔬菜。

草龙 假水瓜

*Jussiaea linifolia* Vahl

区内各地。

全株清热拔毒，凉血消肿；治感冒发热，咽喉肿痛，口腔炎，疮疖。

过塘蛇 水龙、鱼泡菜

*J. repens* L.

区内各地。

全株清热利尿，拔毒消肿；治感冒发热，热淋，疮疖，带状疱疹，蛇伤，狗咬伤。可作鱼饲料。

毛草龙 扫锅草

*J. suffruticosa* L.

(*J. erecta* L.)

区内各地。

全株清热解毒，凉血消肿；治咽喉肿痛，口腔炎，乳腺炎，天泡疮，发烧。

细花丁香蓼

*Ludwigia caryophylla* (Lam.) Merr. et Metc.

(*Jussiaea caryophylla* Lam.,

*L. parviflora* Roxb.)

苍梧、贵县、容县、三江、巴马等地。

丁香蓼

*L. prostrata Roxb.*

邕宁、南宁、柳州、柳城等地。

全草清热利水；治湿热腹泻，淋病，水肿。

\*月见草

*Oenanthera biennis L.*

草本花卉。根和嫩叶可作蔬菜。

\*待霄草 夜来香

*O. odorata Jacq.*

种子含油，可供食用。花含芳香油，为香精原料。茎皮纤维可作人造棉原料。草本花卉。

77A 菱 科 HYDROCARYACEAE

\*菱 菱角

*Trapa bicornis Osb.*

(*T. bispinosa Roxb.*)

区内各地。

果益肾利水；治白浊，遗精，带下，小便失禁。果含淀粉丰富，可生食或熟食，提取的淀粉即“菱粉”，供制糕点，酿酒，熬糖或浆纱。果壳可提取鞣料。全株可作猪饲料。

78 豆瓣草科☆(小二仙科) HALORAGACEAE

黄花船板草☆

*Haloragis chinensis (Lour.) Merr.*

十万大山、陆川。

全株驳骨。

Haloragis-Aquilaria

船板草 小二仙草、豆办草

*H. micrantha* (Thb.) R.Br. ex S. et Z.

容县、十万大山、武鸣、龙州、昭平、临桂、桂林、龙胜、全州、罗城、大苗山、大瑶山等地。

全草清热解毒，利水除湿，散瘀消肿；治疗痈，疖，水肿，烫伤，跌打，蛇伤。羊的好饲料。

菜

*Myriophyllum spicatum* L.

区内各地，常生水塘中。

全草清凉解毒；治慢性下痢。

79 水马齿科 CALLITRICHACEAE

水马齿

*Callitricha stagnalis* Scop.

散见水塘中。

81 瑞香科 THYMELAEACEAE

白木香 沉香、土沉香、牙香树、莞香

*Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg.

陆川、博白、北流、南宁、崇左、东兴、浦北。

老干或树根受伤后，分泌树脂，日久沉积而成沉香。沉香降气，温中，暖肾；治心腹痞满疼痛，老年虚寒气逆，呕吐，腰膝虚冷；又可提芳香油，作调香原料。茎皮温中理气，降逆；治百日咳，支气管炎，胃胀气痛。枝皮纤维韧性强，可制人造棉、打字蜡纸、钞票纸。花含芳香油，可制浸膏。种子油供制肥皂、鞣皮油、润滑油。

小叶瑞香

*Daphne championi* Benth.

三江、大苗山、融安、贵县。

茎皮纤维柔韧，为打字蜡纸、复写纸等高级纸原料，又可制人造棉。

瑞香

*D. odora* Thb.

*var. atrocaulis* Rehd

龙胜、临桂、桂林、阳朔、三江、百色。

根、皮、叶祛风除湿，活血止痛；治风湿关节痛，坐骨神经痛，

跌打，眼痛。枝、叶、花可作农药。茎皮纤维为打字、复写纸等高级纸和人造棉原料。鲜花含芳香油，是名贵香料之一。

白瑞香

*D. papyracea* Wall.

(*D. cannabina* Wall.)

全州、资源、龙胜、灵川、临桂、桂林、大苗山、大瑶山、宜山、凌云、乐业等地。

根祛风除湿，活血止痛；治风湿关节痛，跌打。茎皮纤维可制打字、复写纸等高级纸，又可制人造棉。

\*结香 萝花、三叉树、蒙花(注)

*Edgeworthia chrysanthia* Lindl.

资源、桂林、灵川、融水等地。各地有少量栽培。

根治跌打损伤。茎皮纤维可制打字、复写纸等高级纸，也可制人造棉。剥皮后的枝条，可制提篮等用具。花、叶作兽药，治牛跌打损伤，瘤胃等症。又供观赏。

注：四川、湖北一些地区所叫的“蜜蒙花”为本种的花蕾，也称新蒙花、蒙花珠。但现全国大部分地区用的是本草纲目所载的蜜蒙花（又称老蒙花），是马钱科植物，和本种不同。

Wikstroemia

了哥王 南岭荛花、地棉皮

**Wikstroemia indica (L.) C A. Mey.**

区内各地。

全株有毒。药用根、茎、叶，清热解毒，消肿散结；外敷治疗疮，痈疖，指头蜂窝组织炎，跌打损伤；根久煎减低毒性后内服，治风湿骨痛，跌打，支气管哮喘，百日咳，腮腺炎，扁桃体炎。茎皮富含纤维，可制打字、复写纸等高级纸和人造棉。根、叶水煮液或粉剂可防治稻螟、蚜虫、地老虎、天牛等害虫和孑孓、蝇、蛆；又可毒鱼。种子含油，可供制皂。

北江荛花 山棉皮

**W. monnula Hce.**

(**W. stenantha Hemsl.**)

全州、龙胜、罗城、大瑶山。

茎皮纤维可制打字、复写纸、浇版纸等高级纸和人造棉。

细轴荛花 地棉麻

**W. nutans Champ.**

钦州、十万大山、博白、容县、邕宁、大新、宾阳、宁明、德保、柳州。

茎皮纤维可制打字、复写纸、钞票纸和人造棉。

厚轴荛花

**W. pachyrachis S. L Tsai**

宁明。

茎皮纤维可制高级用纸和人造棉。

圆锥荛花

**W. paniculata H.L Li**

靖西、德保。

茎皮纤维可制纸和人造棉。

83 紫茉莉科 NYCTAGINACEAE

黄细心

*Boerhaavia diffusa* L.

田林、西林。

\*九重葛 宝巾、簕杜鹃、三角花、叶子花

*Bougainvillea glabra* Choisy

南宁。

花卉。

\*美丽叶子花 毛宝巾

*B. spectabilis* Willd.

南宁。

花卉。

\*紫茉莉 脑脂花

*Mirabilis jalapa* L.

南宁、桂林等地。

花卉。全草有毒。根清热利湿，消肿解毒，活血调经；治尿路感染，前列腺炎，白带，糖尿病，跌打损伤，闭经；根、叶捣烂外敷，治疮疖，乳腺炎，跌打。果实内粉末调水涂抹，治葡萄疮（皮肤起水泡，溃破流黄水）。根、茎和种子均有泻下作用。孕妇忌服。

84 山龙眼科 PROTEACEAE

\*银桦

*Grevillea robusta* Cunn.

原产澳洲，区内各地有少量栽培。

花红美丽，可作行道树或庭园树。木材适作车辆、家具、细工用材。

Helicia

红叶树 越南山龙眼、羊屎果

*Helicia cochinchinensis* Lour.

区内各地林区。

种子含脂肪油，可提取供食用或制肥皂、润滑油等。又富含淀粉，但有毒，含有氢氰酸，用水浸泡去毒后，才可食。木材可制家具，又是优良薪炭材和蜜源树木。

海南山龙眼

*H. hainanensis* Hayata

东兴、十万大山、邕宁、靖西、凌云、乐业。

种皮可作染料原料。

长柄山龙眼

*H. longipetiolata* Merr. et Chun

十万大山。

倒卵叶山龙眼

*H. obovatifolia* Merr. et Chun

(*H. vestita* W.W.Sm.

var. *mixta* Li, p.p.)

十万大山。

果含淀粉，可供酿酒或提取淀粉供糊料等用。

长倒卵叶山龙眼

*H. obovatifolia* Merr. et Chun

var. *mixta* (Li) Sleum.

(*H. vestita* W.W.Sm.

var. *mixta* Li, quoad typ.,

*H. vestita* Li, non W.W.Sm.)

十万大山、大瑶山。

果含淀粉，可供酿酒和提取淀粉供糊料等用。

网脉山龙眼

*H. reticulata* W.T.Wang

区内各地林区。

果含淀粉，但有毒，含氢氰酸，用水浸泡去毒后，才可食。木材可制家具，亦是薪炭材。

小叶网脉山龙眼

*H. reticulata* W.T.Wang

var. *parvifolia* W.T.Wang

玉林、十万大山、上林、大瑶山、融安、大苗山、永福、临桂、桂林。

用途参阅网脉山龙眼。

山龙眼

*H. taiwaniana* Hemsl.

(*H. tsangii* H.L.Li,

*H. silvicola* auct. non W.W.Sm.,

*H. taiwaniana* Hemsl.

var. *oblanceolata* Sleum.)

东兴、十万大山、龙州大青山、那坡。

种子含淀粉，但有毒，用水浸泡去毒后，才可食用。

顶序山龙眼

*H. terminalis* Kurz

十万大山。

假山龙眼

*Heliciopsis henryi* (Diels) W.T.Wang

(*Helicia henryi* Diels)

百色、十万大山。

Heliciopsis-Coriaria

调羹树

*H. lobata* (Merr.) Sleum.

(*Helicia lobata* Merr.,

*H. caulifloroides* W.T.Wang)

十万大山、龙州。

85 五桠果科(第伦桃科) DILLENIACEAE

大花五桠果 山枇杷、大花第伦桃

*Dillenia turbinata* Fin. et Gagn.

(*D. heterosepala* Fin. et Gagn.)

东兴、浦北、上思、灵山、陆川、博白、北流、玉林、桂平、邕宁、马山、大新、龙州、那坡、田林。

木材稍软而重，适作桩木、矿柱、建筑和家具。果酸甜可食。树皮和叶含单宁，可作鞣料原料。

锡叶藤 涩叶藤、涩沙藤、水车藤

*Tetracera asiatica* (Lour.) Hoogl.

(*T. scandens* sensu Merr., non Merr.)

灵山、合浦、十万大山、苍梧、梧州、陆川、博白、贵县、横县、邕宁、宁明、龙州等地。

全株收敛止泻，消肿止痛；治肠炎，菌痢，风湿关节痛，子宫脱垂，白带。叶可磨光锡器。茎皮纤维可制绳索，耐水坚韧，常用以捆扎水车和作船缆等。

87 马桑科 CORIARIACEAE

马桑 马鞍子、黑果果

*Coriaria sinica* Maxim.

河池、天峨、凌云、乐业、隆林、田林、龙胜。

全株有毒，嫩叶、果和种子更毒(注)。根祛风，燥湿，止痒；治风湿麻木，瘰疬。叶收敛，杀虫；干叶研粉调油敷，治烧伤，湿疹，疥癣，毒疮。全株作土农药，水浸液防治蚜虫、螟虫、红蜘蛛、水稻负泥虫、稻螟、稻青虫等，又可杀孑孓和蛆。茎、叶含单宁，可提制栲胶。种子油可制油漆、油墨等。

## 88 海桐花科 PITTOSPORACEAE

绗叶海桐 辣椒木

*Pittosporum baileyanum* Gowda

十万大山。

短萼海桐

*P. brevicalyx* (Oliv.) Gagn.

凌云。

光叶海桐 一朵云、崖花子、长果满天香

*P. glabratum* Lindl.

区内各地。

根祛风活络，消肿解毒，活血止痛；治风湿性关节炎，跌打骨折，产后风瘫，胃痛，毒蛇咬伤，疮疖肿毒。叶研粉外敷，治外伤出血。茎皮纤维可制纸。种子油可制肥皂。

狭叶崖花子☆ 夹竹桃叶崖花子

*P. glabratum* Lindl.

*var. neriifolium* R. et W.

隆林、乐业、大苗山、兴安。

用途参阅光叶海桐。

---

注：寄生在马桑上的桑寄生等植物也因马桑有毒而变为有毒，用时宜慎！

Pittosporum

少果海桐

*P. illicioides* Mak.

(*P. oligocarpum* Hay.,

*P. oligospermum* Hay.,

*P. sahnianum* Gowda)

全州、大瑶山。

根活血散瘀；治跌打。

滇桂海桐☆

*P. johnstonianum* Gowda

大苗山。

西南海桐☆

*P. kobuskianum* Gowda

全州、兴安、大苗山、大瑶山。

细萼海桐

*P. leptosepalum* Gowda

全州、临桂、十万大山。

根皮祛风湿；治风湿骨痛。

卵叶海桐

*P. ovoideum* Gowda

阳朔、永福、临桂、桂林、罗城、大瑶山。

疏花海桐

*P. pauciflorum* Hk. et Arn.

全州、恭城、兴安、龙胜、临桂、罗城、凌云、大瑶山、宁明。

黄珠子

*P. perryanum* Gowda

大苗山、河池、凌云。

柄果海桐

*P. podocarpum* Gagn

凌云、那坡。

狭叶柄果海桐

*P. podocarpum* Gagn.

var. *angustatum* Gowda

全州。

四子海桐花

*P. tetraspermum* W. et A.

罗城、南丹、东兰、乐业。

海桐花

*P. tobira* (Thb.) Ait.

梧州、南宁、柳州、桂林等地有少量栽培。

庭园观赏树木，蜜源植物。

三角果海桐

*P. trigonocarpum* Lévl.

平头海桐花

*P. truncatum* Pritz.

南丹。

## 91 红木科 BIXACEAE

\*红木

*Bixa orellana* L.

南宁、梧州。原产热带美洲。

供观赏用。包裹种子的果瓤含黄色素，即安那多黄，可作糖果等的染料。

## 93 大风子科 FLACOURTIACEAE

山桂花☆ 短柄本勒木

*Bennettiodendron brevipes* Merr.

容县、横县、宁明、龙州、田林、河池、南丹、东兰、凤山、阳朔、临桂、恭城。

长柄山桂花☆ 长柄本勒木

*B. longipes* (Oliv.) Merr.

河池。

疏花山桂花☆ 疏花本勒木

*B. pauciflorum* C.Y.Wu, ined.

十万大山、宁明、龙州。

刺篱木

*Flacourtia indica* (Burm.f.) Merr.

(*Gmelina indica* Burm.f.,

*Flacourtia parvifolia* Merr.)

合浦。

大叶刺篱木 山桩、牛牙果

*F. rukam* Zoll. et Mor.

邕宁、大新、宁明、龙州、靖西、那坡、百色、天峨、大瑶山、蒙山。

果可食，宜制果酱或蜜饯。木材坚硬，可作杵及农具柄。

海南大风子 米尾加、米亨加、青兰木

*Hydnocarpus hainanensis* (Merr.) Sleum.

(*Taraktogenos hainanensis* Merr.)

龙州、宁明。

种子有毒，燥湿杀虫，可制成大风子油，治麻风，疥癣，梅毒。

木材可供建筑、桥梁、车辆、造船、家具等用。

广西大风子

*H. kwangsiensis* Tsiang et Ling

(*H. merrillianus* Li, non Sleum.,

*Taraktogenos merrillianus* (Li) C.Y.Wu)

龙州、宁明、扶绥、凭祥大青山。

木材可供建筑、车船、家具等用。

山桐子 椅、商木

*Idesia polycarpa* Maxim.

全州、资源、恭城、兴安、龙胜、临桂、桂林、贺县、大瑶山、

大苗山、南丹、凌云、乐业、田林、隆林、扶绥。

韧皮可取纤维。种子油可代桐油。优良庭园树和行道树。木材较软，易加工，供板料、器具、板鞋等用。

伊桐 米稔怀、牛眼果、白身树、嚙当鸣、弄七

*Itoa orientalis* Hemsl.

恭城、阳朔、蒙山、巴马、龙州、德保、靖西、那坡、百色、田林、隆林。

可作行道树、庭园树。

鲁花 黄杨刺柊

*Scolopia buxifolia* Gagn.

大瑶山。

莉柊 土乌药

*S. chinensis* (Lour.) Clos

合浦、十万大山、贵县、博白、玉林、容县、北流、藤县、邕宁、南宁、上林、武鸣、那坡。

全株活血散瘀；治跌打。

Scolopia-Casearia

白皮 广东刺柊

*S. saeva* Hance

德保。

良好材用树种。

柞木 刺凿

*Xylosma congestum* (Lour.) Merr.

(*X. racemosum* (S. et Z.) Miq.,

*X. japonicum* (Walp.) A. Gray,

*Flacourtie chinensis* Clos)

资源、兴安、临桂、灵川、桂林、阳朔、永福、平乐等地。

叶散瘀消肿；治跌打扭伤，骨折，脱臼。树皮可治黄疸。木材坚硬，可作油榨楔子、车轴等。种子油可制肥皂。

南岭柞木 米多鸡

*X. controversum* Clos

桂林专区、大苗山、罗城、东兰、凤山、天峨、南丹、凌云、乐业、百色、平果、那坡、德保、龙州、大明山、十万大山。

长叶柞木

*X. longifolium* Clos

合浦、灵山、梧州、邕宁、南宁、那坡。

用途参阅柞木。

## 94 天料木科 SAMYDACEAE

嘉赐树 鲔鱼腩(苍梧)

*Casearia glomerata* Roxb.

十万大山、梧州、邕宁、南宁、扶绥、百色。  
根、叶治跌打。木材可作箱板、建筑用材。

毛脉嘉赐树

*C. glomerata* Roxb.

*forma pubinervis* How et Ko

东兴。

用途参阅嘉赐树。

红花木 母生、膜叶嘉赐树

*C. membranacea* Hance

东兴、十万大山、大瑶山、扶绥。

木材为建筑、板料、器具用材。

毛嘉赐树 脚骨脆

*C. villilimba* Merr.

东兴、合浦、浦北、十万大山、大瑶山、大明山、扶绥、崇左、

大新、罗城、平果、靖西、那坡、田阳、凌云、大苗山。

短萼天料木

*Homalium brevisepalum* How et Ko

东兴。

天料木

*H. cochinchinense* (Lour.) Druce

(*H. fagifolium* Lindl.)

大瑶山、临桂、兴安。

木材可供建筑、造船、制家具等用。

广西天料木

*H. kwangsiense* How et Ko

龙州。

木材可作家具用材。

柳叶天料木

*H. sabiaeefolium* How et Ko

Tamarix-Passiflora

龙州。

98 桤柳科 TAMARICACEAE

\*桎柳

*Tamarix chinensis* Lour.

桂林。

嫩枝和叶含槲皮黄硷素等，透表解热，利尿解毒；治感冒，麻疹未透，水痘，解酒毒。亦供观赏。

101 转心莲科(西番莲科) PASSIFLORACEAE

蒴莲

*Adenia chevalieri* Gagn.

马山、龙州、靖西、都安。

\*转心莲 西番莲、转枝莲、时计草

*Passiflora caerulea* L.

叶祛风清热；治风热头昏，鼻塞流涕。花卉。

杯叶转心莲☆ 杯叶西番莲、羊蹄草、半截叶、四方台

*P. cupiformis* Mast.

(*P. franchetiana* Hemsl.,

*P. kwangsiensis* Li,

*P. sequinii* Lévl. et Van.)

天峨、南丹、宜山、东兰、凤山、凌云、田林、隆林。

全草和根解毒，散瘀活血；治蛇伤，跌打损伤。

\*鸡蛋果

*P. edulis* Sims

桂林、南宁、龙州。

果瓤多汁，可生食，亦作蔬菜，饲料，又可加糖等制成芳香饮料。种子油可食，可制皂，制油漆。花美丽，供观赏。

龙珠果

*P. foetida* L.

北流、南宁、宁明、龙州、田阳、百色。

果味甜，可食。

广东转心莲 广东西番莲

*P. kwangtungensis* Merr.

全州、罗城、大瑶山。

蝴蝶藤

*P. papilio* H L.Li

贵县、来宾、武鸣、龙州、乐业。

全草解毒；治蛇伤。

\*大转心莲☆ 大西番莲、日本瓜

*P. quadrangularis* L.

龙州。

果肉可生食或作蔬菜、猪饲料，亦可制成饮料或调味品。

毛蛇王藤☆ 泰国西番莲

*P. siamica* Craib

桂平十八山。

## 103 葫 芦 科 CUCURBITACEAE

盒子草

*Actinostemma lobatum* (Maxim.) Maxim.

邕宁、南宁、龙州。

种子油可供食用、制皂用。

\*冬瓜

*Benincasa hispida* Cogn.

区内各地。

Benincasa-Cucumis

蔬菜。冬瓜皮清热止渴，利尿消肿；治水肿。冬瓜子清热利水，止咳，润肠；治小便淋痛，白浊，白带，水肿，咳嗽。鲜瓜瓢治火药伤。

\*苦瓜

*B. hispida* Cogn.

var. *chieh-qua* How

区内各地。

蔬菜。

\*西瓜

*Citrullus vulgaris* Schrad.

区内各地。

水果。西瓜翠(果皮)清热利水，解暑；治肾炎浮肿，小便不利，暑热烦渴，解酒毒。瓜藤可作造纸及人造丝原料。种子食用。

\*香瓜 甜瓜

*Cucumis melo* L.

区内各地。

水果。种子油供食用、制皂用。

\*白瓜 梢瓜、越瓜

*C. melo* L.

var. *conomon* (Thb.) Mak.

区内各地。

蔬菜。

\*黄瓜 胡瓜

*C. sativus* L.

区内各地。

蔬菜。

\*南瓜

*Cucurbita moschata* Duch.

区内各地。

蔬菜。南瓜子能驱虫、杀虫；治虫积腹痛，对血吸虫有抑制和杀灭作用；和槟榔同用，治绦虫。南瓜蒂外用治疗疮。南瓜子油供食用、制皂用。叶可提取食用绿色素；叶制土农药，可杀蚜虫。瓜藤纤维为人造棉原料。

毒瓜

*Diplocyclos palmatus* (L.) C.Jeffr.

(*Bryonopsis laciniosa* sensu Merr.,  
non Naud. sensu stricto)

龙胜。

果和根有毒，果含秋葵甙。

金瓜 越南裸瓣瓜

*Gymnopetatum cochinchinensis* (Lour.) Kurz

(*G. chinense* (Lour.) Merr.)

博白、苍梧、龙州、都安、凌云。

三叶绞股蓝

*Gymnostemma laxum* (Wall.) Cogn.

龙州、大瑶山。

绞股蓝

*G. pentaphyllum* (Thb.) Mak.

龙州、那坡、都安、大瑶山、大苗山、临桂、灵川、龙胜。

金龟莲 金盆

*Hemsleya amabilis* Diels

环江。

Hemsleya-Luffa

块根清热解毒，消炎；治咽喉肿痛，虚火牙痛，菌痢，肠炎。

地糍粑 大五月五

*H. elongata* Kuang, ined.

全州、资源、龙胜、大苗山。

块根含丰富淀粉，可取淀粉和酿酒。

纤花金盆☆

*H. graciliflora* (Harms) Cogn. vel aff.

百色。

三叶金盆☆

*H. trifoliolata* Cogn.

容县。

油渣果 油瓜、猪油果

*Hodgsonia macrocarpa* (Bl.) Cogn.

南宁、百色两地区，凤山、东兰、上思、博白。桂林、柳州等地有栽培。

种子含油丰富，供食用。

\*葫芦

*Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.

(*L. leucantha* Rusby,

*L. vulgaris* Ser.)

区内各地。

嫩果供食用。果壳、种子利尿消肿；治水肿，口渴烦热。坚硬的老果壳可作饮器、容器、瓢等。种子油可制皂。

\*丝瓜 棱角丝瓜

*Luffa acutangula* Roxb.

区内各地。

嫩果供食用。老果除去果肉剩下的网状纤维即丝瓜络，清凉利

尿、凉血，通经络，解毒；治便血，血气作痛，崩漏，浮肿，痈疮，又能通乳汁。瓜络又可作鞋、帽衬垫物及供洗擦器物用。种子润燥；治便秘，腰痛。种子油供食用，制皂用。

\*水瓜 普通丝瓜（《中国蔬菜栽培学》）

*L. cylindrica* (L.) Roem.

区内各地。

用途同丝瓜。鲜藤或鲜叶可治气管炎。

茅瓜

*Melothria heterophylla* (Lour.) Cogn.

博白、苍梧、横县、宾阳、邕宁、上林、武鸣、大新、宁明、龙州、百色、田林、隆林、天峨、巴马、都安、柳州。

用途同老鼠拉冬瓜。块根含淀粉。

老鼠拉冬瓜 马躄儿

*M. indica* Lour.

博白、玉林、容县、贺县、昭平、大瑶山、邕宁、南宁、龙州、桂林、阳朔、永福、兴安。

根或全草清热拔毒，消肿散结；治咽喉肿痛，腮腺炎，结膜炎，睾丸炎；外用鲜根、叶捣烂或干根研粉调敷，治蜂窝组织炎，皮肤湿疹，淋巴结核。

山冬瓜

*M. javanica* (Miq.) Cogn.

容县、龙州。

毛花马躄儿

*M. maderaspatana* (L.) Cogn.

富川、南宁、宁明、龙州、靖西、百色、隆林、都安。

野杜瓜 钮子瓜

*M. maysorensis* (W. et A.) Chang

Momordica

(*Bryonia maysorensis* W. et A.,

*M. mucronata* sensu Merr. non

(L.) Cogn., p.p.)

龙州、靖西、凌云、隆林、大苗山。

\*苦瓜

*Momordica charantia* L.

区内各地。

果供蔬食，又清热止渴；治烦热口渴，疮疖；鲜花、根治痢疾；叶治疮疖。

木鳖(注)

*M. cochinchinensis* (Lour.) Spreng.

区内各地有栽培，亦有野生。

种子即中药木鳖子，有毒，散血热，消痈肿；治痈疮，乳腺炎，痔疮，淋巴结核；鲜根捣烂外敷，治痈疮，无名肿毒，淋巴结核。作农药，能杀棉蚜、红蜘蛛、金花虫、菜青虫等，可毒鼠。种子油有毒，可掺和干性油使用。种子含木鳖子素和皂甙。

凹萼木鳖

*M. eberhardtii* Gagn.

邕宁、南丹、凌云。

\*罗汉果

*M. grosvenori* Swingle

桂林、永福、龙胜、兴安、资源、全州、融安、大瑶山、蒙山、马山、南宁、苍梧、梧州、玉林。栽培或野生。

果清热止渴，润肺止咳；治咳嗽，喉痛。鲜叶治癣。

---

注：番木鳖为馬錢科植物，与木鳖子不同。

棒槌瓜

*Neoalsomitra integrifoliola* (Cogn.) Hutch.

(*Gymnostemma integrifoliola* Cogn.,

*Alsomitra integrifoliola* (Cogn.) Hay.)

宁明。

\*手瓜☆ 佛手瓜、準人瓜

*Sechium edule* Sw.

(*Chayota edulis* Jacq.)

区内各地。

果、嫩苗和块根供蔬食，果亦可作蜜饯。

大苞赤瓈

*Thladiantha calcarata* (Wall.) C.B.CI.

大苗山。

野西瓜

*T. henryi* Hemsl.

龙胜、龙州。

裸花赤瓈

*T. nudiflora* Hemsl.

龙胜。

蛇瓜

*Trichosanthes anguina* L.

南宁。

大苞栝楼

*T. bracteata* (Lam.) Voigt

龙州、凌云、乐业、隆林、天峨、凤山、南丹、河池、阳朔、富川。

Trichosanthes

天花公 意敬(瑶音)、野金瓜

**T. chingiana H.-M.**

凌云、田林、隆林、东兰、大明山、龙州、大瑶山、大苗山、  
龙胜、资源、灵川、临桂、贺县、富川。

假括楼 王瓜、山丝瓜藤、鸭屎瓜

**T. cucumeroides (Ser.) Maxim.**

永福、龙胜、兴安、大瑶山、大苗山、罗城、百色、隆林。  
根有小毒(具催吐作用，用量不宜过大)，清热解毒，活血散瘀；  
治毒蛇咬伤，咽喉肿痛，疮疖，跌打。

括楼 瓜蒌

**T. kirilowii Maxim.**

博白、玉林、容县、贺县、富川、永福、临桂、龙胜、全州、大  
瑶山、大苗山、南宁、马山、龙州、靖西、东兰等地。  
括楼皮清热化痰，润肺止咳，开胸散结；治肺热咳嗽，胸膈痞  
闷，胸痹胁痛，咽喉肿痛，乳腺炎。种子(括楼仁)润肠通便；  
治大便燥结。根(天花粉)清热生津，解毒消肿；治消渴，黄疸，  
热病口渴，痈肿疮疡，乳腺炎。

多裂括楼 多裂瓜蒌

**T. multiloba Miq.**

天峨、大瑶山、龙州。

果和种子可作药用，但质量较次。

叉指叶括楼 土花粉、山苦瓜、石蟾蜍

**T. pedata Merr. et Chun**

博白、玉林、梧州、昭平、阳朔、大苗山、龙州、宁明。  
块根或全草清凉散毒；治疮疖。

104 秋海棠科 BEGONIACEAE

石上海棠 石上莲

*Begonia bretschneideriana* Hemsl.

苍梧、宁明、龙州、那坡、大瑶山、阳朔、兴安。

全株解毒；治疮疖，蛇伤。

昌感秋海棠

*B. cavaleriei* Lévl.

(*B. esquirolii* Lévl.)

龙州。

野海棠

*B. circumlobata* Hance

陆川、大瑶山、都安、凤山、乐业。

粗喙秋海棠 大半边莲、红半边莲

*B. crassirostris* Irmsch.

(*B. aptera* sensu Merr. non Bl.)

博白、玉林、横县、龙州、梧州、藤县、永福、恭城、大瑶山、罗城、河池、都安、凌云、田林、百色。

根和全草清肿止痛，清热解毒；治咽喉炎症，淋巴结核，疮疖，跌打，蛇伤，烧伤。

三色秋海棠

*B. dichroa* Chun et F. Chun

南丹、靖西。

\*秋海棠

*B. evansiana* Andr.

花卉。叶敷疮疖；根治蛇伤。

Begonia

紫背天葵 散血子、红叶

*B. fimbriatipula* Hance

贺县、阳朔、临桂、兴安、灵川、龙胜、大瑶山、大苗山、大明山、马山、凌云。

全草清热解毒，润燥止咳，散瘀消肿；治外感发热，肺热咳嗽，跌打肿痛，疮疖。

香秋海棠 短茎秋海棠

*B. handelii* Irmsch.

大瑶山、东兰、凤山、凌云。

全草治疮疖。花很香，可供观赏。

掌叶秋海棠

*B. hemsleyana* Hk. f.

龙州、那坡。

保亭秋海棠

*B. howii* Merr. et Chun

裂叶秋海棠 红天葵

*B. lacinata* Roxb.

区内各地。

全草清热解毒，润肺止咳，散瘀消肿；治感冒，急性支气管炎，肺炎，外敷跌打肿痛，疮疖。

\*竹节秋海棠 竹节海棠

*B. maculata* Radde

桂林、南宁。

观赏花卉，公园、花圃常见栽培。

天葵海棠

*B. membranifera* Chun et F.Chun

容县、大瑶山。

全草清热润肺；治咳嗽。

睡莲叶秋海棠

*B. nymphaeafolia* Yü

那坡。

全草清热润肺；治咳嗽。

\*蚬肉秋海棠 蚬肉海棠、四季海棠

*B. semperflorens* Link et Otto

观赏花卉，公园、花圃常有栽培。

七指莲

*B. tetragona* Chun et F.Chun

乐业。

根消肿毒；治疮疖。

## 106 木瓜科(万寿果科、番木瓜科)

CARICACEAE

\*木瓜 番木瓜、万寿果

*Carica papaya* L.

桂南。

水果或蔬菜。果助消化，催乳；治产妇乳少，消化不良。干、叶、青果的乳汁可作橡皮糖原料；又可提取木瓜蛋白酶，供药用。

## 107 仙人掌科 CACTACEAE

\*昙花

*Epiphyllum oxypetalum* Haw.

城镇公园。

Hylocereus-Adinandra

栽培花卉。

\*量天尺 霸王鞭、霸王花

*Hylocereus undatus* (Haw.) Britt. et Rose

桂南。

花清热润肺，止咳；治肺结核，支气管炎，颈淋巴结核，腮腺炎。常栽作绿篱。花卉。

\*仙人掌

*Opuntia dillenii* (Ker-Gawl.) Haw.

各地有栽培，南部亦有野生。

茎有小毒，消肿解毒，消炎止泻，镇咳；外用治腮腺炎，乳腺炎，汤火伤，疮疡肿毒，蛇伤；内服治急性菌痢，咳嗽，胃痛。果肉可食，从果肉榨出的红紫色汁液，可染糍粑。绿篱。花卉。

\*蟹爪兰 锦上添花

*Zygocactus truncatus* (Haw.) K.Schum.

各地常有栽培。

花卉，常用扦插在量天尺或仙人掌等植物上的方法来繁殖。

108 茶 科 THEACEAE(注)

四川杨桐

*Adinandra bockiana* Pritz ex Diels

龙州、兴安、大苗山。

木材可作桁条、桷子等。韧皮纤维可代麻，人造棉原料。

注：科名亦有用Camelliaceae 或 Ternstroemiacaceae

湖南杨桐

A. bockiana Pritz ex Diels  
 var. acutifolia (H.-M.) Kob.  
 (A. acutifolia H.-M.)

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、临桂、兴安、龙胜。  
 木材可供建筑、枕木、车船、家具等用。韧皮纤维可代麻，人造  
 棉原料。

细柄杨桐

A. filipes Merr. ex Kob.  
 凌云。

毛杨桐

A. glischroloma H.-M.  
 容县、大明山、大瑶山、大苗山、罗城、东兰。

海南杨桐 黄板木

A. hainanensis Hay.  
 东兴、钦州、上思、浦北、陆川、苍梧、龙州。  
 木材可供建筑等用。

大叶杨桐

A. megaphylla Hu  
 那坡、靖西、田林、凌云。

杨桐 黄端木、鸡仔茶、黄板叉木

A. millettii (Hk. et Arn.) Benth. et Hk.  
 十万大山、大瑶山、融安、永福、临桂、兴安。  
 木材可作建筑、枕木、车船、家具等用。

亮叶杨桐

A. nitida Merr. ex H.L.Li

Adinandra-Camellia

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山。

木材可作建筑、枕木、车船、家具等用。

灰木杨桐☆

*A. symplocina* Chun in Sched.

大瑶山。

红楣 胖婆茶、米勿友(壮音)

*Anneslea fragrans* Wall.

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、龙胜、灌阳。

木材可供建筑、家具、铅笔杆等用，但不宜作室外用材。

海南红楣

*A. hainanensis* (Kob.) Hu

十万大山。

木材可供建筑、家具、铅笔杆等用，但忌湿，不宜作室外用材。

尾叶山茶 野山茶子

*Camellia caudata* Wall.

(*Theopsis caudata* Hu)

容县、苍梧、十万大山、邕宁、宁明、龙州、大瑶山、大苗山、

临桂、龙胜、兴安、东兰等地。

本属植物的种子含油可供利用。

心叶茶

*C. cordifolia* (Metc.) Nakai

(*Thea cordifolia* Metc.)

蒙山、阳朔、临桂、灵川、大瑶山、三江、东兰、凤山、乐业、

隆林。

黔茶

*C. costei* Lévl.

凌云、乐业、大苗山、兴安、临桂。

尖叶山茶

*C. cuspidata* (Kochs) Coh.-Stuart

临桂、桂林、龙胜、大苗山、罗城、凌云等地。

博白油茶

*C. drupifera* Lour.

博白、陆川。

种子油供食用和工业等用。

伶叶油茶☆

*C. euryoides* Lindl.

阳朔。

昭平山茶 水泡茶、野茶子

*C. fluviatilis* H.-M.

(*Thea fluviatilis* (H.-M.) Merr.)

昭平。

糙果山茶 博白大果茶

*C. furfuracea* (Merr.) Coh.-Stuart

(*Thea furfuracea* Merr.)

贺县。

种子油供食用、工业用。

博白大果油茶

*C. gigantocarpa* Hu et T.C.Huang

博白。

种子油供食用、工业用。

\*山茶 茶花

*C. japonica* L.

(*Thea japonica* Baill.)

花凉血散瘀；治吐血，衄血，便血。种子油可供食用和作润发、

Camellia

钟表油用。观赏树木。

落瓣油茶

*C. kissi* Wall.

十万大山、大瑶山。

窄叶落瓣油茶

*C. kissi* Wall.

*var. stenophylla* (Kob.) Sealy

大瑶山。

石果山茶

*C. mairei* (Lévl.) Melch.

*var. lapidea* (Wu) Sealy

(*C. lapidea* Wu)

十万大山、大明山、大瑶山、融安。

\*小叶油茶 小果油茶

*C. meiocarpa* Hu, ms.

桂北栽培。

用途参阅油茶。

\*油茶 茶油树、中果油茶、普通油茶

*C. oleifera* Abel

(*C. oleosa* (Lour.) Rehd.)

区内各地有栽培。

种子油供食用、润发、制皂、润滑油等用。茶麸可作肥料，又可作农药，防治蛴螬、甘薯小象鼻虫、稻食根金花虫、棉蚜、红蜘蛛、钉螺等，又可醉鱼。果壳可作栲胶、制碱、糠醛、提皂素等原料。木材可作农具柄等。根皮散瘀消肿；治骨折，扭挫伤。

皱果油茶

*C. paratuberculata* Hu, ms.

龙胜。

平伐山茶☆

*C. pitardii* Coh.-Stuart

凌云、乐业、大苗山、临桂、灵川、龙胜、全州。

宛田红花油茶

*C. polyodonta* Chun et How

临桂、龙胜、兴安、灌阳。

种子油可供食用。木材可作农具柄等。

柳叶茶

*C. salicifolia* Champ. ex Benth.

大瑶山、玉林大容山。

\*茶梅

*C. sasanqua* Thb.

各地公园有栽培。

栽培花木。种子亦可榨取茶油。

岩茶

*C. saxaticola* Hu, ined.

广宁油茶 南山茶、红花油茶

*C. semiserrata* C.W.Chi

苍梧。亦有栽培。

种子油供食用和工业用。亦可作观赏树木。

大果广宁油茶 红花大油茶

*C. semiserrata* C.W.Chi

var. *magnocarpa* Hu et Huang

苍梧、藤县。亦有栽培。

用途同广宁油茶。

Camellia

\*茶 茶叶

*C. sinensis* (L.) O.Ktze.

(*Thea sinensis* L.)

区内各地有栽培，亦有野生。

叶供制茶叶用，除作日常饮料外，又是提咖啡碱的原料。入药，兴奋，利尿，收敛，消宿食；治神疲多眠，头痛目昏，烦渴，腹泻，小便不利。种子油可供食用，作精密仪器润滑油。

越南油茶

*C. vietnamensis* T.C.Huang ex Hu

在桂南地区，久经栽培，近年在柳城、桂林等地有引种。

种子油供食用及工业用。

锥果红淡

*Cleyera concarpa* H.T.Chang

十万大山。

肖伶

*C. incornuta* Y.C.Wu

大瑶山、大苗山。

红淡 小栏木、大茶木

*C. japonica* Thb.

罗城、大苗山、大瑶山、龙胜、兴安、全州、蒙山、苍梧、十万大山。

倒卵叶红淡

*C. obovata* H T.Chang

十万大山。

厚叶红淡

*C. pachyphylla* Chun ex H.T.Chang

龙胜、资源、灌阳、大瑶山、贺县、容县、大明山。

木材供建筑、家具用。

无腺红柃

*C. pachyphylla* Chun ex H.T.Chang

var. *epunctata* H.T.Chang

大苗山、大明山。

木材供建筑、家具用。

尖叶柃

*Eurya acuminatissima* Merr. et Chun

(*E. trichocarpa* auct., non Korth.)

容县、贺县、灌阳、恭城、大瑶山、大苗山、大明山。

尖萼毛柃

*E. acutisepala* Hu et L.K.Lin

(*E. trichocarpa* auct., non Korth.)

全州、灌阳、兴安、龙胜、临桂、贺县、大苗山、大瑶山。

翅柃

*E. alata* Kob.

大苗山、红水河流域。

金叶柃

*E. aurea* (Lévl.) Hu et L.K.Lin

(*Rapanea aurea* Lévl.,

*E. nitida* auct. non Korth.)

龙胜、灵川、大苗山。

短柱柃

*E. brevistyla* Kob.

龙胜、兴安、资源、灌阳、大苗山。

种子可榨油。

Eurya

平脉柃

*E. cavinervis* Vesque

十万大山、大瑶山、临桂。

米碎花

*E. chinensis* R.Br.

南宁、武鸣、大瑶山、大苗山、三江、罗城、临桂、苍梧、陆川、  
十万大山、合浦。

华南毛柃

*E. ciliata* Merr.

容县、贺县、武鸣、龙州、大瑶山。

二列叶柃

*E. distichophylla* Hemsl.

容县、大新、宁明、那坡、大苗山。

岗柃

*E. groffii* Merr.

(*E. acuminata* DC.

var. *multiflora* R. et W., p.p., non Bl.,

*E. acuminata* DC.

var. *groffii* (Merr.) Kob.)

区内各地。

微毛柃 黄命树、老蟹眼

*E. hebeclados* Link

苍梧、玉林、桂林、柳州、南宁等地区和十万大山、那坡等地。

蒙自柃木

*E. henryi* Hemsl.

(*E. distichophylla* Hemsl.  
var. *henryi* (Hemsl.) Kob.)

隆林金钟山。

光枝湘黔柃☆

*E. huiana* Kob.

*forma glaberrima* H.T.Chang

全州、龙胜、灵川、柳州。

凹脉柃 大米碎花

*E. impressinervis* Kob.

(*E. pseudopolyneura* Chang)

凌云、田林、罗城、大苗山、大瑶山、资源、兴安、龙胜、灵川、  
临桂、大明山、容县。

贵州毛柃

*E. kueichouensis* Hu et L.K.Lin

隆林、凌云、大苗山。

披针叶柃

*E. lanciformis* Kob.

十万大山。

线叶柃

*E. linearis* Hu et L.K.Lin

兴安。

长果柃

*E. longistyla* H.T.Chang

十万大山。

细枝柃 短尾叶柃

*E. loquaiana* Dunn

区内各地。

Eurya

金叶细枝柃 黄腺短尾叶柃

*E. loquaiana* Dunn

var. *aureo-punctata* H.T.Chang

兴安、大苗山、容县、大明山、那坡、凌云。

隆林耳叶柃

*E. lunglingensis* Hu et L.K.Lin

隆林。

黑柃

*E. macartneyi* Champ.

苍梧、贺县、十万大山、靖西。

大毛果柃 虾勒眼

*E. megatrichocarpa* H.T.Chang

十万大山、东兴。

细齿叶柃木

*E. nitida* Korth.

(*E. japonica* Thb.

var. *nitida* Thiselton-Dyer)

兴安、临桂、凌云、大瑶山、十万大山。

木材可作用具。叶、果可取染料。种子可榨油。树皮可提单宁。

黄背叶柃木

*E. nitida* Korth.

var. *aureescens* (R. et W.) Kob.

兴安、阳朔、永福、大瑶山、大苗山、罗城、玉林、北流、陆川。

种子可榨油。

矩圆叶柃

*E. oblonga* Yang

(*E. szechuanensis* H.T.Chang)

凌云。

长毛柃

*E. patentipila* Chun

(*E. parastrigillosa* Hsu)

容县、贺县、昭平、蒙山、大瑶山、兴安、东兰、凌云、大明山、宁明。

多脉柃

*E. polyneura* Chun

东兰、天峨。

大叶五室柃

*E. quinquelocularis* Kob.

十万大山、大明山、那坡、大瑶山、罗城。

窄基红褐柃

*E. rubiginosa* H.T.Chang

var. *attenuata* H.T.Chang

(*E. nitida* Korth.

var. *rigida* H.T.Chang)

昭平、大瑶山、大苗山、大明山、那坡。

岩柃

*E. saxicola* H.T.Chang

大瑶山。

毛岩柃

*E. saxicola* H.T.Chang

var. *puberula* H.T.Chang

灵川、灌阳、临桂、大苗山。

半齿柃

**E. semiserrata** H.T.Chang

大苗山、龙胜、兴安、资源。

种子可榨油。

窄叶柃

**E. stenophylla** Merr.

十万大山、大明山、马山、大瑶山、罗城、龙胜、全州、平乐。

种子可榨油。

长尾窄叶柃

**E. stenophylla** Merr.

**var. caudata** H.T.Chang

十万大山。

毛窄叶柃

**E. stenophylla** Merr.

**forma pubescens** H.T.Chang

十万大山、邕宁、那坡、龙胜。

假杨桐 大叶黄命树

**E. subintegra** Kob.

十万大山、大瑶山、宁明、凌云。

四角柃

**E. tetragonoclada** Merr. et Chun

临桂、龙胜、恭城、昭平、大苗山、大瑶山、罗城、南丹、凌云、

德保、那坡。

毛果柃 老蟹眼木(十万大山)

**E. trichocarpa** Korth.

十万大山、宁明、龙州、那坡、大苗山。

单耳柃

*E. weissiae* Chun

河池、大苗山、龙胜。

猪血木

*Eryodendron excelsum* H.T.Chang

大瑶山。

心叶船柄茶☆ 心叶赫德木

*Hartia cordifolia* H.L.Li

大瑶山。

广东船柄茶☆ 马林光(大苗山)、广东赫德木

*H. kwangtungensis* Chun

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山。

木材供建筑、家具、车船等用。

船柄茶☆ 毛叶新材、赫德木

*H. sinensis* Dunn

那坡、东兰、大苗山。

嫩芽可代茶。树皮可提单宁。

瑶山船柄茶

*H. sinii* Wu

大瑶山。

上思苦登茶☆

*H. theifera* Hu, ms.

十万大山。

叶可代茶。

大叶毛船柄茶☆ 大叶毛赫德木

*H. villosa* (Merr.) Merr.

var. *grandifolia* (Chun) H.T.Chang

Hartia-Schima

(*H. kwangtungensis* Chun

var. *grandifolia* Chun)

十万大山、大明山、大瑶山。

齿叶船柄茶 锯齿赫德木

*H. villosa* (Merr.) Merr.

var. *serrata* (Chun) H.T.Chang

(*H. Kwangtungensis* Chun

var. *serrata* Hu)

十万大山、大明山。

大头茶 楠木(上思)

*Polyspora axillaris* (Roxb.) Sw.

(*Camellia axillaris* Roxb.,

*Gordonia axillaris* Dietr.,

*G. anomala* Spreng.)

十万大山、宁明、那坡、田林、大瑶山、大苗山、永福、阳朔。

灌阳。

木材供建筑、糖榨、砧板等用。树皮可提单宁。种子可榨油。

银树木

*Schima argentea* Pritz.

十万大山、大明山、宁明、龙州、天等、靖西、那坡、田阳、百色、东兰、河池、大瑶山、大苗山、临桂。

用途参阅桐木。

竹叶桐木 竹叶荷树

*S. bambusifolia* Hu

十万大山。

桐木 何树、木荷

*S. superba* Gardn. et Champ.

(*S. confertiflora* Merr.,

*S. crenata* Korth.)

区内各地。

木材供建筑、桥梁、纱锭、旋刨细工、农具等用材。树皮含刺激性物质，与皮肤接触，能引起红肿，发痒；晒干研粉，可以毒鱼，诱杀蟑螂、苍蝇、天牛等。

鸟叶桐木 峨眉木荷

*S. wallichii* Choisy

宁明、德保、百色、田林、隆林、东兰、龙胜。

青皮茶 史拉登茶

*Sladenia celastrifolia* Kurz

隆林。

天目紫茎 脱皮树

*Stewartia gemmata* Chien et Cheng

全州、大苗山。

厚皮香 映山红

*Ternstroemia gymnanthera* (W. et A.) Sprague

(*T. japonica* auct., non Thb.)

区内各地林区。

木材供建筑、车辆、家具、工艺、农具等用材。种子油可制油漆、肥皂、润滑油等。树皮可提单宁和染料。

阔叶厚皮香

*T. gymnanthera* (W. et A.) Sprague

var. *wightii* (Choisy) H.-M.

十万大山、大瑶山。

用途参阅厚皮香。

Ternstroemia-Tutcheria

瑶山厚皮香

*T. insignis* Wu

大瑶山。

广东厚皮香

*T. kwangtungensis* Merr.

大瑶山、兴安、龙胜。

大果厚皮香

*T. macrocarpa* Wu

十万大山、大明山、大苗山、灵川、龙胜。

亮叶厚皮香 长果猪血木

*T. nitida* Merr.

永福、灵川、兴安、龙胜、大瑶山、大苗山。

窄叶厚皮香

*T. oblancilimba* H.T.Chang

十万大山。

假轮叶厚皮香 猪血木

*T. pseudoverticillata* Merr. et Chun

陆川、博白。

金花茶

*Theopsis chrysanthera* Hu

邕宁。

长梗连蕊茶

*T. longipedicellata* Hu

忻城。

石笔木

*Tutcheria championi* Nakai

(*T. spectabilis* Dunn)

十万大山、玉林、苍梧、大瑶山、大苗山。

种子可榨油。

### 柃叶石笔木

*T. euryoides* Chun

大苗山。

### 薄瓣石笔木☆ 格林根捷木

*T. greeniae* Chun

十万大山、龙州、苍梧、永福、临桂、龙胜、兴安、全州。

### 硬毛石笔木

*T. hirta* (H.-M.) H.L.Li

(*T. villosa* Wu)

大瑶山。

### 心叶石笔木

*T. hirta* (H.-M.) H.L.Li

*var. cordatula* H.L.Li

十万大山、大明山。

### 大花石笔木

*T. hirta* (H.-M.) H.L.Li

*var. grandiflora* H.L.Li

(*T. villosa* Wu

*var. grandiflora* Wu)

大瑶山。

### 小果石笔木 山油茶

*T. microcarpa* Dunn

兴安、阳朔、永福、大苗山、大瑶山。

种子可榨油。

毛石笔木

*T. pubifolia* Merr. ex H.T.Chang

永福。

## 108A 五列木科 PENTAPHYLACACEAE

五列木

*Pentaphylax euryoides* Gardn. et Champ.

(*P. racemosa* Merr. et Chun)

十万大山、大明山、大瑶山、临桂、龙胜、德保。

木材可供建筑、家具、农具、旋刨细工等用材。

## 112 猕猴桃科 ACTINIDIACEAE

猫合藤

*Actinidia asymmetrica* F.Chun

十万大山、大明山、凌云、凤山、东兰、罗城、大苗山。

京梨 马奶奶、羊奶奶

*A. callosa* Lindl.

全州、兴安、龙胜、临桂、灵川、永福、大苗山、南丹、东兰、

凌云、田林、容县。

果可食和酿酒。鲜藤含胶质，可作造纸用胶料。

猕猴桃 藤梨、羊桃

*A. chinensis* Planch.

全州、兴安、龙胜。

根健胃，催乳，散瘀，活血，消炎；治食道癌，胃癌，消化不良，呕吐，乳汁缺少，跌打，疖肿。果、叶止渴，解烦热。果含丰富的维生素和糖，可食，又可制果酱、果脯和酿酒，熬糖，提制维生素丙的原料。茎、枝纤维可制高级纸。鲜藤或根

浸汁，可作造纸用胶料。茎煮液可治稻螟和茶毛虫。花可提制香精，供糖果等食品工业用。又是优良蜜源植物。

### 革叶猕猴桃

**A. coriacea (Fin. et Gagn.) Dunn**

隆林、乐业、南丹。

果香甜，可生食，作果酱和酿酒。花可提芳香油，也是良好的蜜源植物。藤皮可取纤维，嫩枝可作造纸用胶料。

### 毛冬瓜 毛桃

**A. eriantha Benth.**

(**A. davidii Fr.**)

兴安、龙胜、灌阳、恭城、临桂、灵川、永福、大苗山、马山、苍梧。

果可生食；作果酱、果脯和酿酒。

### 粉绿猕猴桃☆ 羊奶奶(龙胜)

**A. fortunati Fin. et Gagn.**

(**A. glaucophylla F.Chun**)

全州、兴安、龙胜、临桂、灵川、大苗山、环江、罗城、东兰、马山、大明山、横县、宾阳。

果可食。茎皮纤维可制纸。

### 老猕猴桃

**A. henryi Dunn**

大苗山、永福。

### 奶果猕猴桃 牛奶藤

**A. henryi Dunn**

**var. polyodonta H.-M.**

龙胜、大苗山、大瑶山、罗城、隆林。

毛杨桃 牛奶藤、大古毛

*A. lanata* Hemsl.

全州、资源、龙胜、兴安、临桂、永福、三江、大苗山、大瑶山、田林、凌云、东兰、罗城、大明山。

果可食，可制果酱，酿酒，熬糖。茎、枝纤维可制纸。鲜藤浸汁，可作造纸胶料。茎煮液可作土农药。花可提香精。蜜源植物。

硬毛杨桃

*A. lanata* Hemsl.

*var. hirsuta* (Fin. et Gagn.) C.F.Liang, ined.

隆林、西林、田林、那坡、凌云、东兰、南丹。

阔叶猕猴桃

*A. latifolia* (Gardn. et Champ.) Merr.

全州、灌阳、恭城、资源、兴安、龙胜、临桂、灵川、荔浦、阳朔、罗城、巴马、百色、大苗山、大瑶山、宾阳、龙州、十万大山、苍梧、贵县、容县。

果可食，酿酒，熬糖。鲜藤浸汁，可作造纸胶料。蜜源植物。

尾叶猕猴桃

*A. longicauda* F.Chun

全州。

两广猕猴桃

*A. melliana* H.-M.

大苗山、大瑶山、荔浦、苍梧、容县。

厚叶猕猴桃

*A. pachyphylla* Dunn

乐业、大瑶山、容县。

紫果猕猴桃

*A. purpurea* Rehd.

龙胜、资源、大苗山。

果可酿酒。树皮可取纤维，花可提芳香油。

光叶猕猴桃

*A. sabiaefolia* Dunn

那坡、宁明、龙州、十万大山。

金花猕猴桃 大羊桃

*A. trichogyna* Fr.

龙胜、灵川、临桂、容县。

果可食，可酿酒，熬糖。

113 水东哥科 SAURAUIACEAE

圆基米花树

*Sauraui griffithii* Dyer

var. *vietnamica* Gagn.

那坡、田林。

牛嗓管树 米妙(那坡)

*S. lantsangensis* Hu

德保、靖西、那坡、田林。

树皮接骨，散瘀活血；治骨折，跌打，慢性骨髓炎。野果。

大米花树

*S. nepalensis* DC.

隆林、田林、凌云、靖西、河池、宁明。

树皮接骨，散瘀活血，生肌止血；治骨折，跌打，慢性骨髓炎，

创伤出血，枪伤。叶可作猪饲料、绿肥。野果。

Saurauia-Hopea

刚毛米花树☆

*S. oldhami* Hemsl.

大瑶山。

大花米花树☆ 广西米花树

*S. punduana* DC.

百色。

米花树 水东哥、水枇杷、水牛奶、棒筒花

*S. tristyla* DC.

钦州、玉林、梧州、南宁、百色等地区及河池地区西部、大瑶山等地。

叶清热生肌；叶粉调香油外擦，治烫火伤。野果。

## 114 金莲木科 OCHNACEAE

金莲木

*Ochna integerrima* (Lour.) Merr.

(*O. harmandii* Lec.)

十万大山。

庭园观赏树木。

线齿木☆ 辛木

*Sinia rhodoleuca* Diels

龙胜、大瑶山、大苗山。

## 116 龙脑香科 DIPTEROCARPACEAE

窄叶坡垒 米丁怕(壮音)、万年木

*Hopea chinensis* H.-M.

东兴、十万大山。

木材供建筑、水工、车辆、柱木、器械等用。

## 118 桃金娘科 MYRTACEAE

肖蒲桃 个药木、火炭木、米挣(壮音)、米查能(壮音)

*Acmena acuminatissima* (Bl.) Merr.

(*Eugenia subdecurrens* Merr. et Chun,

*E. saligna* sensu Merr., non Miq.)

陆川、东兴、十万大山、龙州、那坡。

木材耐腐，适作上等家具，亦可供建筑、车船、桥梁等用。果可食。

岗松 扫把枝、石松草

*Baeckea frutescens* L.

桂南。

全株祛风行气，止痛止痒，通淋利尿；治风湿筋骨痛，胃痛，腹痛，腹泻，小便不利，皮炎，脚癣，皮肤搔痒。枝、叶可提芳香油，供皂、香精等用；又可提制栲胶、土碱。为酸性土指示植物。

短叶岗松

*B. frutescens* L.

var. *brachyphylla* Merr. et Perry

大瑶山。

\*红千层

*Callistemon rigidus* R.Br.

桂南有栽培。

观赏树木。

水翁 水榕木、水榕

*Cleistocalyx operculatus* (Roxb.) Merr. et Perry

Decaspermum-Eucalyptus

桂南常见。

花清热解表，消滞；治感冒，消化不良。树皮煎水洗治脚癣，皮肤搔痒。嫩叶捣烂，加酒外敷治乳腺炎。花、叶可作凉茶。树皮可染布。野果。

紫凌木 米碎叶

*Decaspermum fruticosum* J. R. et G. Forster

十万大山、玉林、横县、龙州、武鸣、靖西、凌云、乐业、隆林、河池、天峨、永福、临桂。

木材可作农具等用。

桑枝米碎叶

*D. gracilellum* (Hce.) Merr. et Chun

龙州、大新、容县。

\*赤桉(注)

*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.

(*E. rostrata* Schlecht., non Cav.)

梧州、玉林、南宁、柳州、桂林等地。

\*柠檬桉

*E. citriodora* Hk.f.

(*E. maculata* Sm.

var. *citriodora* (Hk.f.) Bailey)

合浦、博白、玉林、容县、梧州、南宁、柳州、桂林等地有栽培。

枝、叶含柠檬桉油，可制薄荷脑等，供工业用。新鲜枝叶可驱蚊。木材坚韧通直，可作桥梁、枕木、建筑、车厢等用。根深，为防风林树种。

注：我国引种的本属树木，可作公路、绿化和材用树种。

\*窿缘桉

*E. exerta* F.v.Muell.

柳州、桂林、玉林。

\*蓝桉

*E. globulus* Labill

南宁、柳州、桂林有少量栽培。

叶消炎杀菌，健胃祛风；防治流感、流脑，治女性器官炎症，结膜炎，腮腺炎，腹泻，菌痢，肠炎，化脓性创伤及溃疡，皮肤湿疹，疮疖，烧烫伤，外伤出血。木材宜作车辆、家具、电杆等用材。

\*大桉

*E. grandis* (Hill.) Maiden

南宁。

\*斜脉胶桉

*E. kirtoniana* F.v.Muell.

(*E. patentinervis* R.T.Bak.)

南宁。

生长速，萌芽力强，耐瘠薄，材质硬重强韧，纹理不扭，为目前速生用材树种之一。

\*纤脉桉

*E. leptophleba* F.v.Muell.

南宁。

\*加拉桉

*E. marginata* Sm.

南宁。

\*怕拉马桉

*E. parramattensis* C. Hall

## Eucalyptus

柳州、南宁。

### \*斑叶桉

*E. punctata* DC.

南宁、桂林、柳州等地。

木材坚重，不易施工，适作枕木、矿柱、电杆、桥梁等用。可作桂南右江河谷等地先锋造林树种。

### \*树胶桉

*E. resinifera* Sm.

(*E. hemilampra* F.v.Muell.)

南宁、柳州、桂林等地。

### \*大叶桉 桉树

*E. robusta* Sm.

区内各地常有栽培。

叶消炎杀菌，防腐止痒；防治流感，流脑，治肠炎，痢疾，疟疾，乳腺炎，丹毒，溃疡，创伤感染，疮疖，神经性皮炎等。15% 煎剂对化脓性葡萄球菌、链球菌有较强的抑菌作用。叶和小枝含桉树油，可配制皂用香精、防腐剂等。树皮含单宁和阿拉伯胶。木材可作枕木、家具等用材。

### \*野桉

*E. rufida* Endl.

区内各地有栽培。

### \*柳桉 柳叶桉

*E. saligna* Sm.

南宁。

### \*弹帽桉

*E. seeana* J.H.Maiden

南宁、柳州、桂林。

\*谷桉

*E. smithii* R.T.Bak.

南宁、田阳、玉林。

\*细叶桉

*E. umbellata* (Gaertn.) Domin

(*E. tereticornis* Sm.)

南宁、柳州、桂林。

木材供建筑、车、船、机械、枕木等用。

多枝桉

*E. viminalis* Labill

南宁。

\*番樱桃 毕当茄、红果仔

*Eugenia uniflora* L.

桂林，自广州引种。

果肉多汁，可食。又供观赏。

\*白千层

*Melaleuca leucadendra* L.

南宁。

观赏树木。叶可提芳香油即玉树油，为兴奋、防腐、祛痰剂。

番石榴 鸡矢果

*Psidium guajava* L.

桂南、桂西常有栽培；也有野生。

果味甜，供生食或酿酒。叶收敛止泻，止血；治急性肠胃炎，食

滞腹泻；外敷止外伤出血。果皮和未熟果含单宁，可提栲胶。

叶含芳香油，可作调香原料。木材坚实，可作农具等用。

桃金娘 稔子、岗稔、山稔

*Rhodomyrtus tomentosa* (Ait.) Hassk.

Syzygium

区内各地。

叶收敛止泻，止血，拔脓生肌；治急性肠胃炎，菌痢，外伤出血，疮疖。根通经活络，收敛止泻；治慢性痢疾，风湿骨痛，腰肌劳损，肝炎。果补血安神；治孕妇贫血，病后体虚，神经衰弱，耳鸣，遗精。花治肺结核咳血。根皮、树皮、枝、叶均含单宁，可提制栲胶和黄红色染料。野果，亦可酿酒。

线枝蒲桃 上思蒲桃

*Syzygium araiocladum* Merr. et Perry

十万大山、横县。

短药蒲桃 梅牢(壮音)

*S. brachyantherum* Merr. et Perry

十万大山、宁明、龙州、横县。

黑嘴蒲桃

*S. bullockii* (Hce.) Merr. et Perry

博白、北流。

赤楠蒲桃 瓜子木、假黄杨

*S. buxifolium* Hk. et Arn.

区内各地。

木材可作农具柄等用。

南赤楠蒲桃

*S. buxifolium* Hk. et Arn.

*var. austrosinensis* Merr. et Perry

子凌蒲桃 子凌木

*S. championii* (Bth.) Merr. et Perry

(*Eugenia maclarei* Merr.)

合浦、十万大山、大明山、宁明、靖西、大瑶山。

密脉蒲桃

*S. chunianum* Merr. et Perry

桂南。

海南蒲桃 榆木(武鸣)、枚拉(壮音)

*S. cumini* (L.) Skeel

(*Eugenia tsoi* Merr. et Chun)

合浦、博白、横县、邕宁、武鸣、大新、宁明、扶绥、平果、靖西、德保、那坡、田阳、百色、隆林等地。

木材耐腐，宜作造船、船板、车辆、枕木、农具、家具、建筑等用材。果可食，能润肺定喘；治哮喘，肺结核。树皮含褐色染料和深红色树脂。

卫茅叶蒲桃

*S. euonymifolium* (Metc.) Merr. et Perry

(*Eugenia euonymifolium* Metc.)

十万大山、龙州、昭平。

水竹蒲桃

*S. fluviatile* (Hemsl.) Merr. et Perry

(*Eugenia fluviatile* Hemsl.)

十万大山、龙州、百色、隆林。

赤兰蒲桃☆ 赤兰

*S. grijsii* (Hce.) Merr. et Perry

平乐、昭平、罗城。

红鳞蒲桃 车辕木、红车

*S. hancei* (Hce.) Merr. et Perry

博白、北流、容县、玉林、十万大山、大瑶山、宁明、靖西、隆林。木材耐腐，宜作造船、桥梁、水工、桩木、枕木、机械器具、建筑等用材。

Syzygium

泡鳞蒲桃☆

*S. handelii* Merr. et Perry

东兴、大明山、德保、隆林、河池、大苗山。

中越蒲桃

*S. imitans* Merr. et Perry

十万大山、东兴。

\*蒲桃

*S. jambos* (L.) Alston

桂南和大瑶山、河池、天峨、百色等地。

栽培果树，又是固堤、固沙树种。

广东蒲桃

*S. kwangtungensis* (Merr.) Merr. et Perry

十万大山。

阔叶蒲桃

*S. latilimum* (Merr.) Merr. et Perry

(*Eugenia latilimba* Merr.)

那坡。

山叶蒲桃 白车

*S. levinei* (Merr.) Merr. et Perry

(*Eugenia levinei* Merr.)

十万大山、北流。

木材耐腐，宜作建筑、桥梁、车船、枕木、家具等用材。

棱翅蒲桃 小蓉木

*S. nienkui* Merr. et Perry

大瑶山、大明山、龙州。

香蒲桃

*S. odoratum* (Lour.) DC.

(*Eugenia millettiana* Hemsl.)

桂西南。

多瓣蒲桃

*S. polypetaloideum* Merr. et Perry

大明山、都安、百色、田阳。

大红鳞蒲桃☆ 红车

*S. rhederianum* Merr. et Perry

容县、苍梧、十万大山、大明山、大瑶山、南丹、隆林、永福、  
阳朔、临桂、龙胜。

\*南洋蒲桃 洋蒲桃、金山蒲桃

*S. samarangense* (Bl.) Merr. et Perry

南宁有栽培。

果有香味，可食。

硬叶蒲桃

*S. sterophyllum* Merr. et Perry

十万大山、宁明、百色、隆林。

思茅蒲桃

*S. szemaoense* Merr. et Perry

龙州。

四角蒲桃

*S. tetragonum* Wall.

桂西。

狭叶蒲桃

*S. tsoongii* (Merr.) Merr. et Perry

(*Eugenia tsoongii* Merr.,

*E. leucocarpa* Gagn.)

Tristania-Blastus

平乐、昭平。

\*红胶木

*Tristania conferta* R.Br.

南宁有栽培。原产澳洲。

常绿、耐旱、美丽乔木。可作行道树。木材可供建筑、车轮、船板之用。

120 野牡丹科 MELASTOMACEAE

异形木

*Allomorphia balansaei* Cogn.

十万大山、宁明、大瑶山、大苗山、蒙山。

广西异形木

*A. flexuosa* H.-M.

乐业、隆林。

阔叶异形木

*A. platyphylla* Diels

龙州。

藤牡丹

*Anplectrum glaucum* (Jack) Triana

靖西。

棱果木☆ 芭西

*Barthea barthei* (Hce.) Krasser

十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、龙胜。

黔贵野锦香☆ 黔贵伯拉木

*Blastus cavaleriei* Lévl. et Van.

资源、兴安、龙胜、临桂、贺县、融安、大苗山、凌云、十万大山。  
叶止血。

野锦香☆ 伯拉木、崩疮药

*B. cochinchinensis* Lour.

(*Anplectrum pauciflorum* Benth.)

合浦、十万大山、博白、北流、扶绥、宁明、龙州、靖西、百色、东兰、河池、天峨、大苗山、融安、大瑶山、临桂、昭平、贺县、苍梧、藤县。

全株拔毒生肌；治疮疖。根治产后流血不止。根、茎含单宁，可提制栲胶。

金花树

*B. dunnianum* Lévl.

龙胜、兴安、临桂、蒙山、大苗山、凌云。

长花野锦香☆ 长花柏拉木

*B. longiflorus* H.-M.

凌云、临桂、永福、大瑶山、武鸣、容县。

浓毛野锦香☆ 浓毛柏拉木

*B. mollissimus* H.L.Li

大瑶山。

刺毛野锦香☆ 刺毛柏拉木

*B. setulosus* Diels

大瑶山。

薄叶野锦香☆ 薄叶柏拉木

*B. tenuifolius* Diels

大瑶山。

绒毛野锦香☆ 茸毛柏拉木

*B. tomentosus* H.L.Li

十万大山、贺县。

Bredia-Fordiophytum

秀丽野海棠

*Bredia amoena* Diels

大瑶山。

江南野海棠☆

*B. fordii* (Hce.) Diels

临桂、大瑶山。

小叶野海棠

*B. microphylla* H.L.Li

临桂、龙胜、兴安。

瑶山野海棠

*B. sepalosa* Diels

大瑶山、临桂。

全株止血。

上思野海棠

*B. sessilifolia* (Diels) H.L.Li

容县、十万大山、大明山、宁明。

中华野海棠

*B. sinensis* (Diels) H.L.Li

大瑶山。

西南野海棠☆

*B. tuberculata* (Guill.) Diels

十万大山、那坡、大瑶山、苍梧、容县、临桂。

棱茎木 福笛木

*Fordiophytum fordii* (Oliv.) Krass.

武鸣、龙胜。

羊刀尖

*F. polystegium* H.-M.

龙州、田林、乐业、大苗山、龙胜、兴安、资源。

蓝裂膈牡丹☆ 蓝美丁花

*Medinilla caeruleocea Guill.*

十万大山、大新、扶绥、龙州、大明山、大瑶山。

北裂膈牡丹☆ 北美丁花

*M. septentrionalis Guill.*

大瑶山、龙州、百色。

裂膈牡丹☆ 美丁花

*M. spirei Guill.*

靖西、百色。

野牡丹

*Melastoma candidum D.Don*

(*M. septemnervium Lour.*)

桂南和桂西。

根、叶消积滞，收敛止血；治消化不良，肠炎腹泻，胃痛，痢疾，便血，衄血；叶捣烂外敷或用干粉，治外伤出血。酸性土指示植物。叶可提栲胶。

地菍 铺地锦、山地菍、地枇杷

*M. dodecandrum Lour.*

区内各地。

全株涩肠，止痢，舒筋活络，补血安胎。清热燥湿；治肠炎，菌痢，腰腿痛，风湿骨痛，孕妇贫血，胎动不安，月经过多。煎水洗，治疥癬，脚癣，小儿湿疹。根解木薯中毒。果熟可食。茎、枝蔓生，可保持水土。

细叶野牡丹

*M. intermedium Dunn*

(*M. suffruticosum Merr.*)

十万大山、南宁、苍梧。

肖野牡丹 爆牙郎

*M. normale* D. Don

桂南、桂西和桂林等地。

全株清积滞，收敛止血，祛瘀消肿；治消化不良，肠炎腹泻，痢疾；捣烂外敷或研粉撒布，治外伤出血，刀枪伤。叶可提制栲胶。

多花野牡丹

*M. polyanthum* Bl.

龙州、凌云、乐业、大瑶山、大苗山、龙胜、兴安、恭城、阳朔。

全草消积滞，收敛止血，散瘀消肿；治消化不良，肠炎腹泻，痢疾；捣烂外敷或研粉撒布，治外伤出血，刀枪伤。叶可提制栲胶。

毛菍

*M. sanguineum* Sims

(*M. decemfidum* Roxb.)

十万大山、上林、武鸣、宁明、龙州、藤县、苍梧、容县。

全株收敛止血，消食止痢；治水泻便血，月经过多。叶研粉外敷，治外伤出血。茎皮含单宁。熟果可吃。

谷木

*Memecylon ligustrifolium* Champ.

钦州、上思、横县、大瑶山、恭城、凌云、百色。

黑叶谷木

*M. nigrescens* Hk. et Arn.

梧州。

细叶谷木 盆状谷木

*M. scutellatum* (Lour.) Naud.

上思、陆川、博白、南宁、都安、凤山、百色。

金锦香 天香炉、金香炉

*Osbeckia chinensis* L.

区内各地。

全草清热解毒，止血，止咳；治菌痢，肠炎，阑尾炎，风寒咳嗽，衄血，肺结核咯血，血崩，蛇伤。鲜草捣敷，治痈疮肿毒，外伤出血。

朝天罐

*O. crinita* Benth.

武鸣、大明山、大瑶山、柳州、大苗山、昭平、永福、临桂、恭城、兴安、龙胜、罗城、南丹、凤山、隆林。

全株清热收敛，止血，止咳；治菌痢，肠炎，虚咳，咯血，小便失禁，白带过多。叶可提制栲胶。

云南朝天罐☆

*O. crinita* Benth.

var. *yunnanensis* Cogn.

凌云。

大叶金锦香

*O. nepalensis* Hk.f.

凌云。

尖子木

*Oxyspora paniculata* (Don) DC.

都安、河池、东兰、天峨、凤山、凌云、田林、隆林、西林、百色、靖西、德保、那坡、马山、龙州。

全株清热止痢；治痢疾，腹泻，疮疖。

湘桂锦香草☆

*Phyllagathis anisophylla* Diels

贺县姑婆山。

Phyllagathis-Sarcopyramis

锦香草 熊巴耳、铺地毡

*P. cavaleriei* (Lévl. et Van.) Guill.

(*P. tankahkeei* Metr.)

十万大山、桂平、临桂、兴安、龙胜、资源、全州、大苗山、融安、大瑶山、南丹、罗城、东兰、凌云、乐业、田林、那坡。

瑶山锦香草

*P. microplectra* Diels

大瑶山。

猪耳草

*P. planiscapa* Chun

龙胜、南丹。

两广锦香草

*P. retrotricha* Chun, ined.

凌云、乐业、大明山。

十万锦香草☆

*P. setotheca* H.L.Li

十万大山。

偏瓣花

*Plagiopetalum esquirolii* (Lévl.) Rehd.

靖西、那坡、凌云。

美肉穗草

*Sarcopyramis delicata* C.B.Rob.

大瑶山、藤县。

尼泊尔肉穗草

*S. nepalensis* Wall.

凌云、大明山、大瑶山、大苗山、罗城、龙胜、临桂、桂平。

茎、叶清肝明目；治耳鸣，耳聋，目雾羞明。

小叶肉穗草

*S. parvifolia* Merr. ex H.L.Li

十万大山。

卷花丹

*Scorpiothrysus xanthostictus* (Merr. et Chun) H.L.Li

(*Phyllagathis xanthosticta* Merr. et Chun)

东兴、十万大山。

桑勒草

*Sonerila cantonensis* Stapf

博白、容县、大瑶山、十万大山、凤山、天峨、乐业、隆林。

全株通经活络；治跌打，翳膜。

溪边桑勒草

*S. rivularis* Cogn.

乐业、南丹、宁明、十万大山。

全株治枪弹伤。

纤弱桑勒草

*S. tenera* R.Br.

临桂。

红敷地发

*Stapfiophyton elattandrum* (Diels) H.L.Li

(*Phyllagathis elattandra* Diels)

玉林、大瑶山、宁明、龙州、靖西、东兰。

全株治劳咳。

121 使君子科 COMBRETACEAE

华风车子

*Combretem alfredii* Hance

龙胜、临桂、阳朔、荔浦、三江、融安、河池、大瑶山、龙州、岑溪。

叶健胃驱虫；驱蛔虫、鞭虫。

石风车子

*C. incertum* H.-M.

大苗山、百色。

广西风车子

*C. kwangsiensis* H.L.Li

大苗山。

凌云风车子

*C. linyenensis* H.-M.

凌云。

紫风车子

*C. purpurescens* H.-M.

凌云、龙州。

盾鱗风车子

*C. squamosum* Roxb.

十万大山。

西南风车子

*C. wallichii* DC.

龙州。

榄李

*Lumnitzera racemosa* Willd.

合浦、东兴。

### 使君子

*Quisqualis indica L.*

区内各地。

种子驱虫，消疳积；治蛔虫、蛲虫，小儿疳积。叶健胃，助消化。

### \*榄仁树

*Terminalia catappa L.*

东兴、合浦、南宁。

果可生食。种子油可供食用和药用，亦可制皂，或作机械润滑油等用。油粕为良好饲料。树皮、嫩叶和树汁含单宁，为黑色染料。木材耐朽力强，可供建筑、车船、辘轳、细工等用。

### \*诃子 青果

*T. chebula Retz*

南宁、邕宁。

果敛肺涩肠；治慢性痢疾，赤白痢，喉炎，肠结核，肠出血，哮喘，久咳失音。果皮和树皮含单宁，为制革工业重要原料，又可提取黄色染料。木材可供建筑、车辆、农具、家具等用。

### 丝毛榄仁☆

*T. franchetii Gagn.*

隆林。

树皮含单宁，可提制栲胶。

### 多果榄仁

*T. myriocarpa Heurck et M.-A.*

龙州。

122 红 树 科 RHIZOPHORACEAE

木榄

*Bruguiera gymnorhiza* (L.) Lam.

(*Rhizophora gymnorhiza* L.,

*B. conjugata* sensu Merr., non L.)

钦州地区沿海一带。

树皮含单宁，可提制栲胶。木材可供桩柱和细工用。

竹节树

*Carallia brachiata* (Lour.) Merr.

合浦、十万大山、陆川。

木材易施工，但不耐久。

锯叶竹节树 广西鹅山木、人哥(壮音)、百六齿、鱼骨木、铁巴掌

*C. diplopetala* H.-M.

大苗山、大瑶山、罗城、巴马、梧州、桂平、容县、陆川、十万

大山、横县、大明山、大新、扶绥、宁明、龙州、靖西、田林。

全株通经活络；治风湿，跌打。叶治外伤出血。根治妇女血崩。

大叶竹节树

*C. garciniaeefolia* How et Ho

隆林。

秋茄树

*Kandelia candel* (L.) Druce

合浦。

树皮含单宁。

123 金丝桃科 HYPERICACEAE

毛叶黄牛木 土茶

*Cratoxylon dasypphyllum* H-M.

十万大山、崇左。

叶可代茶。枝、叶消肿去毒；治疮疖。

黄牛木 狗牙木、狗芽茶、黄芽木

*C. ligustrinum* (Spach) Bl.

(*C. polyanthum* Korth.)

合浦、十万大山、博白、玉林、容县、贵县、苍梧、藤县、大瑶山、横县、南宁、大明山、大新、宁明、凭祥、龙州、河池、巴马、凌云、乐业、百色、那坡、德保。

根、树皮清热解暑，消滞祛湿；治感冒发热，肠炎腹泻；嫩叶代茶，可防暑防痢。枝、叶消肿去毒；治疮疖。树皮可提取树脂。叶含芳香油。木材坚致，可作雕刻细工等用材。紫胶虫寄主植物。

湖南连翘 黄海棠、金丝蝴蝶

*Hypericum ascyron* L.

凌云、乐业、河池、柳州、资源。

全草清热利尿，除湿解毒；治急性肝炎，肠胃炎，腹泻，头疼，吐血，疮疖。

野金丝桃

*H. attenuatum* Choisy

资源、恭城、灌阳、兴安、龙胜、南丹、天峨、乐业、隆林、容县。

金丝桃

*H. chinense* L.

Hypericum

临桂、兴安、柳州、罗城、河池、梧州。

全草清热去毒；治疮疖。茎皮含单宁，可提制栲胶。花可供观赏。

遍地金

*H. elodeoides* Choisy

凌云、隆林。

全株清热祛湿；治水泻，久痢，赤白带。

华西金丝桃

*H. hookerianum* W. et A.

德保、那坡、隆林、柳州。

田基黄 地耳草、雀舌草

*H. japonicum* Thb.

区内各地。

全草清热解毒，渗湿利水，消肿散瘀；治急慢性肝炎，早期肝硬化，乳腺炎，肺脓肿，阑尾炎，毒蛇咬伤，恶疮肿毒，外伤出血，刀枪伤，跌打骨折。本品100%溶液对金黄色葡萄球菌、链球菌有抑制作用。

金丝梅

*H. patulum* Thb.

靖西、田林、河池。

全草清热解毒，凉血止血，止痒；治急慢性肝炎，痢疾，妇女血崩，鼻衄，小儿疳积；外洗皮炎，皮肤搔痒；干叶研粉，撒敷黄水疮。可供观赏。

大花金丝梅

*H. patulum* Thb.

*var. henryi* Veitch

乐业。

元宝草 穿心草

*H. sampsoni* Hance

区内各地。

全草通经活络，止血定痛；治月经不调，衄血，吐血，急性肝炎，腰腿疼痛，跌打扭挫伤，痈肿疔毒，毒蛇咬伤。根泡酒服，可健胃。

## 126 山竹子科 GUTTIFERAE

薄叶红厚壳 横经席、薄叶胡桐、小果海棠

*Calophyllum membranaceum* Gardn. et Champ.

东兴、浦北、十万大山、陆川、博白、玉林、梧州、昭平、大瑶山、横县、邕宁、德保。

根祛瘀止痛，补肾强腰；治风湿腰腿痛，跌打损伤，月经不调。叶研末撒敷治外伤出血。

广西山竹子

*Garcinia kwangsiensis* Merr.

十万大山。

山竹子 多花山竹子、山桔子、竹桔子、木熟果、木竹子、咪枢

*G. multiflora* Champ.

区内各地，南部较多。

树皮、果消炎止痛，收敛生肌；用树皮或果核粉末撒布，或用果核油涂，治烧伤，烫伤，湿疹，痈疮。用鲜果捣敷，治铁砂入肉不出。种子油供作肥皂或润滑油原料。果熟时酸甜可食，但多食能致腹痛。果皮、树皮均含单宁，可提制栲胶。木材坚固，可供建筑、车船、家具、工艺、雕刻等用。

Garcinia-Burretiodendron

黄牙果 岭南山竹子、岭南倒稔子

*G. oblongifolia Champ.*

钦州、博白、北流、苍梧、大瑶山、武鸣、大明山、大新、宁明、龙州。

用途参阅山竹子。

金丝李

*G. paucinervis Chun et How*

龙州、宁明、大新、武鸣、马山、隆安、靖西、那坡、德保、田林、西林、东兰、凤山、都安、河池、忻城。

木材坚固，耐湿耐腐，为栋梁、车船、建筑、糖榨、机座、家具、米斗等良材。果可食。

128 椴树科 TILIACEAE

圆蒴蚬木

*Burretiodendron combretoides Chun et How*

靖西、那坡、田林。

木材可供建筑、机械、车船等用。

心叶蚬木

*B. esquirolii (Lévl) Rehd.*

隆林、西林、天峨。

木材可供建筑、机械、车船等用。

蚬木 咪蚬

*B. hsienmu Chun et How*

武鸣、隆安、大新、宁明、龙州、平果、德保、靖西、那坡、田阳、田东、百色、天峨、巴马。

木材极坚硬，为建筑、机械、车船、糖榨、机座、家具、砧板等良材。

长蒴蚬木

**B. obconicum** Chun et How

龙州。

木材极坚硬，为建筑、机械、车船、糖榨、机座、砧板等良材。

假黄麻 甜麻

**Cochchorus acutangulus** Lam.

区内各地。

种子和叶含强心甙。茎皮纤维可代黄麻作麻织品和造纸原料。嫩叶可清凉解暑。

\*黄麻

**C. capsularis** L.

栽培作物。

叶含强心甙。茎皮纤维可制麻袋，编绳，或混纺织布。

长蒴黄麻 小麻

**C. olitorius** L.

南部和东兰、田阳等地；亦有栽培。

叶含强心甙。茎皮纤维可织麻袋，编绳，作造纸原料。叶揉碎取汁，可代肥皂。

苘麻叶扁担杆 蓼叶扁担杆

**Grewia abutilifolia** Vent. ex Juss.

扶绥、宁明、龙州、那坡、田林、平果、百色、隆林、都安、柳州。

叶止泻痢。茎皮纤维可代麻，可作人造棉原料。

扁担杆 二裂解宝叶

**G. biloba** G. Don

(**G. glabrescens** Benth.)

Grewia

临桂、恭城、凤山、田林、凌云、乐业、西林。

茎皮纤维色白，质软，作人造棉原料。

小花扁担杆

*G. biloba* G.Don

var. *parviflora* (Bunge) H-M.

全州、灌阳、临桂。

毛果扁担杆

*G. eriocarpa* Juss.

龙州、百色、田林、隆林。

茎皮纤维可织麻袋、麻布。

西南扁担杆☆

*G. henryi* Burr.

大新、龙州、靖西、那坡、田林、百色、凌云、隆林、天峨。

茎皮纤维可代麻，可作造纸原料。

刚毛扁担杆

*G. hirsuta* Vahl

龙州。

大瓣扁担杆

*G. macropetala* Burr.

少蕊扁担杆

*G. oligandra* Pierre

贵县、上思、邕宁、南宁、武鸣、龙州、田东、田阳、百色。

根皮治痢疾，疮疖。

无柄扁担杆

*G. sessilifolia* Gagn.

宁明、凭祥、龙州。

茎皮纤维可织麻袋、编绳。

椴叶扁担杆

*G. tiliaefolia* Vahl

野棉叶扁担杆

*G. urenifolia* (Pierre) Gagn.

鹿寨、大苗山、百色。

海南椴

*Hainania trichosperma* Merr.

大新、宁明、龙州。

茎皮纤维可供编绳等用。

破布叶 解宝叶、布渣叶、火布茶

*Microcos paniculata* L.

陆川、玉林、容县、贵县、苍梧、十万大山、横县、南宁、大新、

龙州、都安、那坡、田林、百色、凌云、西林。

叶清热毒，消炎，止泻；治感冒，食滞，蜈蚣咬伤，黄疸型肝炎；亦用作凉茶。茎皮纤维可作人造棉和代麻原料，编绳等。

种子可榨油。木材可制家具、农具柄等。

庐山椴

*Tilia breviradiata* (Rehd.) Hu et Cheng

(*T. tuan* Szyszyl.

var. *breviradiata* Rehd.,

*T. chingiana* Hu et Cheng)

资源、兴安。

茎皮纤维可制人造棉，造纸，编绳。

海棠椴

*T. croizatii* Chun et Wong

(*T. begoniifolia* Chun et Wong, non Stevens)

全州、灌阳、大苗山。

Tilia-Triumfetta

广东椴

*T. kwangtungensis* Chun et Wong

全州。

淡色椴

*T. tristis* Chun et Wong

全州。

椴树

*T. tuan* Szyszyl.

大苗山。

枝皮纤维可制人造棉，代麻，造纸，编绳，编草鞋，亦可作火药导引线。花可提芳香油。叶可作猪饲料。木材可作箱、盒、家具、乐器、乒乓球拍、火柴杆、火柴盒、蜂房、胶合板等。

小刺蒴麻

*Triumfetta annua* L.

兴安。

茎皮纤维较粗，宜制麻袋和绳。

刺蒴麻

*T. bartramia* L.

玉林、梧州、贺县、邕宁、南宁、龙州、百色等地。

茎、叶解毒清热；治毒疮。根清热；治痢疾。茎皮纤维可制麻袋，编绳。

长钩刺蒴麻

*T. pilosa* Roth.

贺县、昭平、平乐、大瑶山、融安、上思、宁明、龙州、靖西、

百色、凌云、隆林。

茎皮纤维可代麻，制麻线、人造棉，织麻袋，编绳等。

毛刺蒴麻

*T. tomentosa* Bojer

博白、藤县、昭平、大瑶山、柳州、巴马、河池、天峨、大明山、扶绥、龙州、德保、靖西、百色、隆林。

叶解热清毒；治白痢。茎皮纤维可代麻，织麻袋，编绳等。

128A 杜英科(胆八树科) ELAEOCARPACEAE

冬桃 柑橄果

*Elaeocarpus assimilis* Chun

永福、临桂、龙胜、兴安、恭城、全州、大瑶山、大苗山、罗城、宜山、那坡、凌云、乐业、容县。

木材可培养香菇。

小冬桃 羊屎木、野杜英

*E. chinensis* (Gardn. et Champ.) Hk. f.

苍梧、大瑶山、永福、恭城、桂林、龙胜。

树皮和果皮含单宁，可提制栲胶。木材可培养香菇、白木耳。

杜英 梅擦饭(壮音)

*E. decipiens* Hemsl.

钦州、十万大山。

木材为良好板材。

乌口果 香信木、高山望

*E. decurvatus* Diels

上思、龙州、南宁、北流、贺县、蒙山、大瑶山。

木材可培养香菇。

山模果

*E. dubia* A.DC.

十万大山、武鸣、大瑶山、百色。

Elaeocarpus

木材可供建筑、板材、家具等用。

广西杜英

*E. duclouxii* Gagn.

全州、罗城、大瑶山。

黄冠毛杜英

*E. flavigoma* Chun, ined.

十万大山、大瑶山。

毛杜英

*E. flavigoma* Chun

var. *pubescens* How, ined.

罗城、南丹、凌云、乐业。

薯豆杜英☆ 薯豆、球果胆八树、豆翁树、高山望

*E. japonicus* S. et Z.

(*E. yunnanensis* Brandis,

*E. kobanmochi* Koidz.)

贺县、十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、永福、临桂、灵川、兴安、龙胜、资源、恭城、全州、隆林。

木材可培养香菇。

狭叶杜英 剑叶杜英、冬桃

*E. lanceaefolius* Roxb.

大明山、大苗山、龙胜、资源、凌云、乐业、隆林、靖西、种子油可供制皂和作润滑油。

毛叶杜英 野冬桃

*E. limitaneus* H.-M.

容县、十万大山、邕宁、永福、桂林、龙胜、大苗山。

亮叶杜英 滑光杜英

*E. nitentifolius* Merr. et Chun

钦州、十万大山、大瑶山。

木材宜作桁、桷、门、窗、天花板、家具、器具等用材。

### 长柄杜英

*E. petiolatus* (Jack) Wall.

罗城、大苗山、容县天堂山。

### 圆果杜英

*E. subglobosus* Merr.

龙州。

木材宜作桁、桷、天花板、门、窗、家具等用材。

### 山杜英 杜英、胆八树

*E. sylvestris* (Lour.) Poir.

(*E. henryi* Hce.,

*E. glabripetalus* Merr.,

*E. kwangtungensis* Hu,

*E. subsessilis* H.-M.)

恭城、兴安、龙胜、临桂、桂林、永福、阳朔、荔浦、大苗山、

罗城、大瑶山、容县、十万大山、龙州、德保、靖西、那坡、  
百色、天峨。

木材可供建筑、桁、桷、门、窗、家具、细工等用材。树皮含鞣质，可提制栲胶。树皮纤维可制纸。

### 绿叶山杜英

*E. sylvestris* (Lour.) Poir.

var. *viridescens* Chun et How

大苗山、临桂、十万大山。

用途参阅山杜英。

### 云南杜英 龙山果、大叶香信木

*E. varunua* Buch.-Ham.

Sloanea

上思、大瑶山、那坡。

木材可培养香菇。

华西猴欢喜☆ 飞天蛤

*Sloanea assamica* (Benth.) R. et W.

南丹。

百色猴欢喜

*S. chingiana* Hu

百色、武鸣、大瑶山、容县。

细柄猴欢喜 小叶猴欢喜

*S. elegans* Chun

容县、阳朔、临桂、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、武鸣、那坡、隆林。

仿栗

*S. hemsleyana* (Ito) R. et W.

(*S. hanceana* Hemsl.)

天峨、凤山、乐业、德保。

香港猴欢喜

*S. hongkongensis* Hemsl.

灵川。

细果猴欢喜

*S. leptocarpa* Diels

大瑶山。

靖西猴欢喜

*S. mollis* Gagn.

var. *chinghsiensis* Chun et How

靖西、龙州、容县天堂山。

疏脉猴欢喜

*S. oligophlebia* Chun et Ting

(*S. sigun* Merr. et Chun, non K.Schum.)

那坡、靖西。

猴欢喜

*S. sinensis* (Hance) Hemsl.

全州、灌阳、兴安、龙胜、灵川、临桂、永福、荔浦、大苗山、大瑶山、贺县、苍梧、容县、田阳。

木材硬度适中，干时不开裂，宜作船板、车厢、建筑板材、家具等用材。可培养香菰。

思茅猴欢喜

*S. tomentosa* (Benth.) R. et W.

十万大山。

贵州猴欢喜

*S. tsiangiana* Hu

隆林、龙胜、临桂、阳朔、大瑶山、六万大山、大明山。

130 楤 桐 科 STERCULIACEAE

昂天莲 假芙蓉

*Abroma augusta* (L.) L.f.

藤县、桂平、十万大山、龙州、那坡、百色、田林、凌云、乐业、东兰、南丹、都安、天峨。

根通经，接骨；治月经不调，跌打骨折。茎皮纤维可制麻线，织麻布、麻袋，造纸。

刺果藤 大滑藤

*Buettneria aspera* Colebr.

北流、梧州、大瑶山、忻城、十万大山、邕宁、龙州、田林、凌

Commersonia-Firmiana

云、乐业、天峨。

根、茎补血，祛风，消肿接骨；治风湿痛，跌打骨折。茎皮纤维可织麻袋，制绳索。

山麻树

*Commersonia bartramia* (L.) Merr.

钦州地区、博白。

茎皮纤维可织麻布，制麻袋，编绳。

毛果田麻

*Corchoropsis tomentosa* (Thb.) Mak.

(*Corchorus tomentosa* Thb.,

*Corchoropsis crenata* S. et Z.)

恭城、桂林、灵川、昭平、贺县。

根解毒；治疮疥。茎皮纤维可织麻袋，制绳。

广西芒木 米良、米烂麻、米丹弄、米炳（均壮音）、大芒木

*Eriolaena kwangsiensis* H.-M.

南宁、大新、宁明、龙州、都安、东兰、凌云、乐业、田林、隆林、西林、百色、平果、德保。

枝皮纤维可作人造棉、造纸、制绳原料。木材可作桁条、犁耙、船舵等用材。紫胶虫寄主植物。

芒木

*E. spectabilis* (DC.) Planch.

田林、隆林。

茎皮纤维可代麻。紫胶虫寄主植物。

美丽梧桐 米波

*Firmiana pulcherrima* Hsue

靖西、上思。

\*梧桐

*F. simplex* (L.) F.W.Wight

区内各地有栽培。

根、叶祛风除湿，清热解毒；治风湿骨痛，跌打骨折，疮毒。鲜花捣烂外敷治火伤。种子(注)和胃，补肾；治胃痛，外感发热，口疮。茎皮驱蛔虫。初落的叶煎饮，据云有催生作用。树皮纤维可制麻织品，作打字纸、制绳等原料。种子油可制皂，精制后可供食用。树皮及木材粘液可作造纸糊料。木材轻韧，宜作乐器、声学仪器、家具等。根作兽药，治牛跌伤，骨折，痢疾等。嫩叶可作猪饲料。又是常见庭园树和行道树。

山芝麻 坡油麻、坡油菜

*Helicteres angustifolia* L.

区内各地，桂林以北较少。

根清热解毒，滑肠泻火，止血止痒；治感冒高热不退，扁桃体炎，咽喉炎，腮腺炎，肠炎腹泻，毒蛇咬伤，刀伤出血，皮肤湿疹。亦为凉茶配料。

长角山芝麻

*H. elongata* Wall.

横县、都安、田林。

茎皮纤维为人造棉、制绳原料。

光叶山芝麻

*H. glabriuscula* Wall.

南宁、邕宁、大新、崇左、龙州、巴马、凤山、那坡、百色、田林。

茎皮纤维可作人造棉或制绳原料。

硬毛山芝麻 肖婆麻

*H. hirsuta* Lour.

(*H. spicata* Colebr.)

注：种子含有咖啡碱、阿拉伯胶素等。

Helicteres-Pterospermum

合浦、博白、北流、宁明、龙州。

茎皮纤维可和麻混纺麻布，织麻袋，制绳。

剑叶山芝麻

*H. lanceolata* DC.

博白、北流、藤县、上思、扶绥、宁明、龙州、那坡、隆林、凤山、柳州。

根清热解毒；治感冒，麻疹。茎皮纤维可制人造棉，织麻袋，制绳。

鹧鸪麻

*Kleinhovia hospita* L.

博白。

茎皮纤维可代麻。树皮粘液可作造纸糊料。

马松子

*Melochia corchorifolia* L.

梧州、贺县、钟山、临桂、龙胜、柳州、宜山、邕宁、龙州。

韧皮纤维比黄麻好，可织麻布、麻袋，又是人造棉、造纸原料。

\*午时花

*Pentapetes phoenicea* L.

栽培花卉。

翻白叶树 米新、米纸、仙黄麻、异叶翅子树、半枫荷

*Pterospermum heterophyllum* Hance

(*P. levinei* Merr.)

陆川、博白、玉林、平南、藤县、苍梧、梧州、贺县、昭平、南宁、龙州、百色、都安、融安、临桂、桂林、平乐、恭城。

根祛风除湿，舒筋活血；治风湿骨痛，腰肌劳损，手足麻痹，产后风瘫，跌打肿痛。叶捣烂外敷或焙干研粉撒布，治外伤出血。

树皮纤维为织麻袋、麻布、草鞋、人造棉、造纸等原料，也可与棉、羊毛混纺，织成半毛织品。木材在广州称“线木”，

供建筑、板料、船桅、家具等用，较适于作室内用材。

翅子树

*P. lanceaefolium* Roxb.

博白、上思、那坡。

截裂翻白叶树☆ 米仙（壮音）

*P. truncatolobatum* Gagn.

宁明、龙州。

生长迅速。木材供建筑用。

瑶山梭罗树☆ 九层皮

*Reevesia glaucocephala* Hsue

大瑶山、阳朔、桂林。

茎皮纤维可代麻。

广西梭罗树☆

*R. kwangsiensis* Hsue

龙胜。

长柄梭罗树 茉莉茜、海南梭罗树

*R. longipetiolata* Merr. et Chun

十万大山。

树皮纤维可供纺织、造纸、制绳用。木材硬重，但不耐腐，适作门、窗、天花板、家具、用具、篮板、板鞋等用材。

隆林梭罗树☆

*R. lunglingensis* Hsue, ined.

隆林。

薄叶梭罗树

*R. membranacea* Hsue

大瑶山。

毛棱罗树

*R. pubescens* Masters

大瑶山、大苗山、临桂、靖西、田林。

茎皮纤维可代麻，制纸，制绳。

上思梭罗树

*R. shangszeensis* Hsue

十万大山。

两广梭罗树 复序利末花

*R. thyrsoides* Lindl.

容县、贺县、十万大山。

茎皮纤维可代麻，又是上等纸原料。种子油可供点灯用。木材不耐腐，适作一般板料、轻木工用材，又可作造纸原料。

绒毛梭罗树

*R. tomentosa* H.L.Li

大苗山。

粉苹婆

*Sterculia euosma* W.W.Sm

宾阳、武鸣、龙州、田阳、靖西、凌云、乐业、都安、天峨、平乐。  
树皮纤维可为麻袋、绳索、造纸原料。

香苹婆

*S. foetida* L.

龙州。

种子煮熟可食，味如栗子。

小苹婆

*S. hainanensis* Merr. et Chun

龙州。

假苹婆 赛苹婆

*S. lanceolata* Cav.

钦州、玉林、梧州、南宁、百色等地区、河池地区西部、大瑶山等地。

茎皮纤维可为制绳索、织麻袋、麻布、造纸原料，亦可和棉花混纺，作人造棉用。种子煮熟可食，或提取淀粉供食用，或作糊料原料，种子油可制肥皂。皮、叶作兽药，治牛劳伤。

苹婆 鸡冠子、七姐妹、凤眼果

*S. nobilis* Smith

灵山、上思、博白、北流、容县、大新、宁明、上林、龙州、天等、百色、隆林、凌云、河池等地，南部各地有零星栽培。

种子煮熟可食，味如栗子。树皮为制绳、织麻袋、造纸原料。木材可作箱板、器具、夹板等用料。

家麻树 哥波(壮音)、复叶苹婆、绒毛苹婆、千层皮

*S. pexa* Pierre

武鸣、上林、扶绥、龙州、德保、靖西、田阳、百色。

韧皮纤维坚韧耐水，为制绳、造纸原料。种子煮熟可食。木材可制家具。

\*胖大海

*S. scaphigera* Wall.

东兴。

种子清热利咽，解毒；治咽喉肿痛，干咳无痰，咳嗽音哑，吐血，衄血，痔疮肿毒等。

蛇婆子

*Waltheria americana* L

梧州、龙州、田阳。

韧皮纤维可织麻袋，造纸，制绳。全株作兽药，治牛、猪黄疸。

Ceiba-Ochroma

腹泻，眼热红肿。水土保持植物。

131 木 棉 科 BOMBACACEAE

\*爪哇木棉 吉贝、美洲木棉

*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.

(*Bombax pentandrum* L.)

南宁、龙州。

果内棉毛为救生圈、救生衣、床垫、椅垫、枕头等优良填充材料。

又用于飞机等作防冷、隔音的绝缘材料。种子油供点灯、制皂用。木材可作木箱、火柴梗等。

木棉 红棉

*Gossampinus malabarica* (DC.) Merr.

(*Bombax malabaricum* DC.,

*B. ceiba* auctt., non L.,

*Salmalia malabarica* (DC.) Schott et Endl.)

桂南、桂西和红水河谷。桂林有少量栽培。

花清热除湿；治菌痢，肠炎，胃痛。根皮祛风湿，理跌打。树脂为滋补药，亦用于治痢疾和月经过多。种子棉毛可作枕、褥、救生圈等填充材料。种子油可作润滑油、制皂等用。木材可作箱板、火柴梗、造纸等用。行道树、绿化树种。鲜枝搅水，能使浊水澄清。

\*轻木

*Ochroma lagopus* Swartz

南宁。

木材极轻，可制救生器，亦为冰箱绝缘材料。

## 132 锦葵科 MALVACEAE

山芙蓉 山尖茶、假芙蓉、白背木

*Abelmoschus crinitus* Wall.

(*Hibiscus crinitus* (Wall.) G.Don)

*A. hainanensis* S.Y Hu)

博白、玉林、上思、武鸣、龙州、百色、凌云。

韧皮纤维可代麻。

\*咖啡黄葵 羊角豆、咖啡葵、木丝瓜

*A. esculentus* (L.) Moench

庭园花卉。嫩果可作蔬菜食用，亦可制成罐头。成熟种子可充咖啡代用品。

黄蜀葵 秋葵、水葵

*A. manihot* (L.) Medic.

(*Hibiscus manihot* L.)

凌云、钟山、藤县、大瑶山。

根、叶清热润肠，消肿止痛；治高热不退，便秘，外敷疮疖痈疽，骨折，烫火伤。根含粘胶质，可作造纸胶料。又为栽培花卉。

黄葵 野油麻、野棉、芙蓉麻

*A. moschatus* (L.) Medic.

博白、贵县、桂平、平南、梧州、昭平、兴安、大瑶山、南宁、武鸣、龙州、隆林。

花为治疮伤要药，浸油，涂烫火伤，根、叶亦可敷疮拔脓。种子有催生功效，果含芳香油，为很有价值的调香原料，可用于优质皂的香精中。韧皮纤维可编绳，织麻布、麻袋，亦为人造棉和造纸原料。根的粘胶质可作造纸糊料。又为栽培花卉。

Abelmoschus-Althaea

箭叶黄葵 红花参

*A. sagittifolius* (Kurz) Merr.

(*Hibiscus sagittifolius* Kurz,

*Abelmoschus esquirolii* (Lévl.) S.Y.Hu,

*A. coccineus* S.Y.Hu,

*A. coccineus* S.Y.Hu

var. *acerifolius* S.Y.Hu)

武鸣、邕宁。

根补血气；叶解毒消肿；治毒疮。

苘麻

*Abutilon avicennae* Gaertn.

阳朔、柳州等地；亦有栽培。

种子明目，止痢，利尿润肠，通乳消炎；治赤白痢，痈肿，眼生翳膜，小便不利，大便燥结，乳汁缺少，乳腺炎，胎盘不脱落等症。种子油可制肥皂、油漆、润滑油、木材防腐剂等用。茎皮纤维耐水湿，常用作汲绳、牛索、雨衣、草鞋等，也可制麻袋、人造棉。叶可作猪饲料。

磨盘草 耳响草、金花草

*A. indicum* (L.) G.Don

玉林、北流、贵县、梧州、来宾、忻城、桂林、都安、马山、邕宁、武鸣、宁明、龙州、田东、凌云、百色、田林、隆林。

全草散风清热，升清降浊；治感冒，腮腺炎，中耳炎，耳聋，耳鸣等症。韧皮纤维可制绳，织麻布，作人造棉原料。

•蜀葵

*Althaea rosea* Cav.

茎皮纤维可作麻袋、绳索、人造棉原料。栽培花卉。

\*树棉 印度棉、亚洲棉

*Gossypium arboreum* L.

种子棉毛即棉花，纤维虽较粗短，但风土适应性较大。鲜根通经；治月经不调。种子催乳；治乳汁缺少。棉子和棉子油等用途参阅陆地棉。

海岛棉

*G. barbadense* L.

原产南美洲。

种子棉毛即棉花，棉纤维特别细长，可供纺高级细纱织品，产量亦高，有发展前途。茎皮纤维可织麻袋等，又为造纸原料。棉子和棉子油等用途参阅陆地棉。

\*巴西棉

*G. brasiliense* Macf.

(*G. barbadense* L.)

var. *brasiliense* Hutch., Silow et Stevens)

种子棉毛即棉花，棉纤维细长，可供纺高级细纱织品。茎皮纤维可织麻袋等，又为造纸原料。棉子和棉子油等用途参阅陆地棉。

\*草棉 非洲棉、小棉

*G. herbaceum* L.

种子棉毛即棉花。根皮强壮，镇静。治神经衰弱，月经不调。

\*陆地棉 高地棉

*G. hirsutum* L.

种子棉毛即棉花，可制棉纱、棉线、棉布，以及传动带、胶布、电线皮线、轮胎帘子线和作絮棉等制品。根皮通经；治月经不调。根止咳；治气管炎。种子催乳；治乳汁缺少。棉子油精炼后可供食用，又可制成人造奶油，作药剂调制材料、灯油、润滑油、

## Hibiscus

皂用油。油麸可制成洗涤粉、肥皂，又可提制甘油、脂肪酸供制造人造革、唱片、防雨布等用。棉子粉可作饲料。棉子壳可作提制碳酸钾、丙酮、醋酸、甲醇、糠醛、活性炭等原料。棉子壳上的短绒可纺低级纱，是很好的造纸原料，又是高级纸张、玻璃纸、塑料原料。棉秆可制绳，又可作纤维板原料。叶可提制柠檬酸。

### \*槿麻 洋麻

*Hibiscus cannabinus* L.

韧皮纤维可织麻袋、麻布、鱼网和绳索等。种子油可制肥皂。油麸可作肥料、饲料。麻屑可造纸。

### \*木芙蓉 醉酒芙蓉、芙蓉花

*H. mutabilis* L.

区内各地。

叶、花清热，消炎止痛，消肿排脓；治疗疮痈肿，乳腺炎，毒蛇咬伤。花治月经过多，白带，肺燥咳血。韧皮纤维洁白耐水，可供造纸，编绳，制蓑衣。紫胶虫寄主植物和庭园绿化植物。

### \*大红花 朱槿、扶桑

*H. rosa-sinensis* L.

根皮调经，止咳；治月经不调，白带，宫颈炎，支气管炎。叶、花消炎；治痈疽，疮毒，腮腺炎。韧皮纤维代麻，可制绳，织麻袋。庭园绿化植物。

### \*玫瑰茄

*H. sabdariffa* L.

韧皮纤维可供编绳，织麻袋等。花萼和总苞肉质，可制果酱。

### \*吊灯花 假西藏红花

*H. schizopetalus* (Mast.) Hk.f.

庭园绿化植物。

\*华木槿

*H. sino-syriacus* Bailey

庭园绿化植物。

\*木槿 朝开暮落花、盖碗花

*H. syriacus* L.

叶、花利尿消肿，除湿热；治菌痢，腹痛。皮、根清热止血，杀虫止痒，收敛；治血崩，便血，痔疮，白带，疥、癣。果治偏正头痛。花、嫩叶可打汤作菜。韧皮纤维可制纸。庭园绿化和绿篱植物。叶作农药，可治蚜虫。

黄槿 海麻、海罗麻、弓背树

*H. tiliaceus* L.

东兴、钦州、合浦等地。

海滨防风、防潮、防砂树种。木材坚实耐朽，可供造船，建筑，制家具等用。韧皮纤维耐水湿，可作鱼网、测量绳、麻袋、粗布、造纸等。嫩叶、嫩枝可供蔬食。

毛槿 芙蓉木槿、庐山芙蓉

*H. venustus* Bl.

藤县、大瑶山、南宁、宁明、龙州、百色、凌云、乐业、隆林、全州。

韧皮纤维可编绳和作造纸原料。种子油可制肥皂。叶可作绿肥。  
庭园绿化植物。

光叶云南槿

*Kydia glabrescens* Mast.

田林、隆林。

\*锦葵

*Malva sylvestris* L.

var. *mauritiana* (L.) Boiss.

Malvastrum-Sida

花卉。花含锦葵红色素。花煎汤可作喉头炎的含漱剂。

赛葵

**Malvastrum coromandelinum (L.) Garcke**

南宁、大瑶山、临桂、隆林。

全草清热利湿，去瘀消肿；治黄疸，痢疾，疟疾，肺热咳嗽，喉头炎；外敷疮疖肿痛，跌打肿痛。

\*悬铃花

**Malvaviscus arboreus Cav.**

**var. penduliflorus Schery**

庭园绿化植物。

黄花稔

**Sida acuta Burm.f.**

田阳、田东、百色等地。

韧皮纤维可编绳。叶、根活血消肿，生肌解毒；外敷疮疡肿毒。

心叶黄花稔 假黄草

**S. cordifolia L.**

北流、陆川、苍梧、龙州、百色等地。

全株清热消炎；治淋病，小儿腹泻。韧皮纤维可编绳，织麻袋，也是人造棉、造纸原料。

大花黄花稔 榆叶黄花稔

**S. corylifolia Wall. ex Mast.**

贺县、宁明、龙州、那坡、凌云、乐业。

韧皮纤维供编绳、织麻袋等用。

羊麻

**S. fallax Walp.**

北海。

粘毛黄花稔

*S. mysorensis* W. et A

宁明。

韧皮纤维可供编绳、造纸等用。

小叶黄花稔

*S. retusa* L.

(*S. rhombifolia* L.)

var. *retusa* (L.) Mast.)

容县、平南、南宁、宁明、田阳、柳江、罗城、临桂。

全株清热利湿，拔脓消肿；治黄疸，痢疾，外敷疔疮肿毒。韧皮纤维可作编绳、造纸等原料。

白背黄花稔

*S. rhombifolia* L.

区内各地。

全株疏风解表，清热利湿，散瘀拔毒，排脓生肌；治感冒，扁桃腺炎，肠炎，菌痢，黄疸，外敷痈疽疔疮。韧皮纤维细韧，拉力强，有光泽，可作织麻袋、麻布、造纸等原料。

四川黄花稔 拔毒散

*S. szechuensis* Mats.

百色。

全株消炎，拔毒生肌；治急性乳腺炎，急性扁桃腺炎，肠炎，菌痢，外敷痈疽疔疮，跌打损伤。韧皮纤维可作搓绳、造纸等原料。

云南黄花稔 川滇斧花

*S. yunnanensis* S.Y.Hu

肖槿 麻桐、棉桐

*Thespesia lampas* (Cav.) Dalz. et Gibs.

(*Hibiscus lampas* Cav.)

*Urena-Aspidopterys*

龙州、百色。

韧皮纤维可织麻布，搓绳，造纸，嫩枝和花可食。

地桃花 肖梵天花

*Urena lobata* L.

区内各地。

根、叶祛风利湿，清热解毒；治风湿痹痛，肠炎，痢疾，疮疡肿毒，跌打损伤。韧皮纤维可织麻布、鱼网、麻袋，制人造棉，亦为优良的造纸原料。种子油可制肥皂，作润滑油等。

粗叶地桃花 粗叶梵天花

*U. lobata* L.

var. *scabriuscula* DC.

南宁、龙州、来宾、柳州、南丹。

根解毒，外敷疮毒。韧皮纤维可代麻和作造纸原料。

狗脚迹

*U. lobata* L.

var. *sinuata* (L.) Gagn.

(*U. sinuata* L.)

陆川、博白、富川、龙胜、大瑶山、来宾、龙州。

根或全株解毒消炎，散瘀消肿，化痰止咳；治痢疾，毒蛇咬伤，风湿痹痛，腰肌劳损，跌打肿痛，肺热咳嗽，疮疡肿毒。韧皮纤维可代麻和作造纸原料。

## 133 金虎尾科 MALPIGHIACEAE

盾翅果

*Aspidopterys concava* (Wall.) Juss.

上林、宁明、龙州、靖西、柳州。

贵州盾翅藤

*A. esquirolii* Lévl.

桂西北。

光盾翅藤

*A. glabriuscula* (Wall) A.Juss.

宁明、龙州、那坡、百色。

风车藤 狗角藤

*Hiptage benghalensis* Kurz

十万大山、武鸣、扶绥、田阳、隆林、柳州、桂林。

龙州风车藤

*H. stellata* Chun

龙州。

## 135 古 柯 科 ERYTHROXYLACEAE

\*古柯 玻利维亚古柯

*Erythroxylum coca* Lam.

东兴。

叶含古柯碱、桂皮酰古柯碱等生物碱，为提取古柯碱（可卡因）的原料。可卡因是局部麻醉剂和表面麻醉剂。叶亦为兴奋剂，咀嚼叶可恢复疲劳。

钓丝红 东方古柯、麦果

*E. kunthianum* (Wall.) Kurz

资源、全州、龙胜、灵川、临桂、阳朔、昭平、贺县、苍梧、大苗山、大瑶山、容县、十万大山、武鸣、大明山、大新、那坡。

\*爪哇古柯

*E. novogranatense* (Morris) Hieron

南宁。

Erythroxylum-Acalypha

叶为兴奋剂,咀嚼叶可恢复疲劳,亦可提古柯碱,作局部麻醉剂用。  
华古柯

*E. sinense* Wu

大瑶山、大苗山、大明山。

**135A 粘木科 IXONANTHACEAE**

粘木

*Ixonanthes chinensis* Champ.

钦州、合浦、浦北、十万大山、陆川、永福、大瑶山、龙州、德保、南丹。

木材供建筑、家具等用。

**136 大戟科 EUPHORBIACEAE**

人苋 铁苋菜、含珠草、海蚌含珠、叶里含珠、猫眼草

*Acalypha australis* L.

区内各地。

全草抗菌解毒, 散血止血; 治痢疾, 肠炎, 咯血, 小儿疳积, 外洗治皮肤湿疹。

短穗铁苋菜 鸡眼草

*A. brachystachys* Horn.

凌云、罗城,

全草治痢疾。

\*狗尾红

*A. hispida* Burm f.

花卉。

\*红桑

*A. wikesiana* M.-A.

绿化植物，又可作绿篱。

\*金边桑

*A. wikesiana* M.-A.

var. *marginata* W.Mill.

绿化植物。

山麻杆

*Alchornea rugosa* (Lour.) M-A.

区内各地。

椴叶山麻杆

*A. tiliaefolia* (Benth) M-A.

十万大山、大瑶山、南丹。

红背山麻杆 红背娘、新妇木、红帽顶

*A. trewioides* M-A.

区内各地。

根除湿解毒，止血；治血崩，白带，腹泻，痢疾，尿路结石或尿路炎症。叶煎水洗，治风疹。叶可作绿肥。韧皮纤维可作造纸和人造棉原料。

\*光桐 三年桐、油桐

*Aleurites fordii* Hemsl.

区内各地。

重要木本油料植物。种子油即桐油，为干性油，供油漆等用。桐壳可制碳酸钾、活性炭等。桐壳灰可作肥料。木材轻软，不易生虫，可供家具、床板、建筑等用。叶可饲养白蜡虫。桐油可治疗癣。

\*石栗 铁桐

*A. moluccana* (L.) Willd

桂东南及桂南各地有栽培。

Aleurites-Antidesma

种子油可代替桐油。生长速，可作我区南部行道和绿化树种。木材可作板材和家具用。

\*皱桐 千年桐、皱果桐、木油树

*A. montana* (Lour.) Wils.

区内各地。

种子油也叫桐油。用途参阅光桐。

五月茶

*Antidesma bunius* (L.) Spreng

龙州、靖西、田林、隆林、西林、凌云。

木材可作箭板材。叶治小儿头疮。

细柄五月茶

*A. filipes* H.-M.

兴安、大苗山。

黄毛五月茶 旱禾子树

*A. fordii* Hemsl.

(*A. yunnanensis* Pax et Hoffm.)

十万大山、陆川、博白、苍梧、贺县、蒙山、大瑶山、巴马、南丹、横县、武鸣、扶绥、龙州、百色、隆林。

叶可洗疮。

方叶五月茶

*A. ghaesembilla* Gaertn.

横县、邕宁、宁明、龙州、田林、百色。

海南五月茶

*A. hainanense* Merr.

酸味子 五味子木

*A. japonicum* S. et Z.

(*A. gracile* Hemsl.)

区内各地。

### 小叶五月茶

*A. microphyllum* Hemsl.

罗城、天峨、河池、都安、隆林、那坡。

全株祛风湿，治吐血。

### 山五月茶

*A. montanum* Bl.

(*A. henryi* Hemsl.,

*A. apiculatum* Hemsl.)

大新、龙州、田林、隆林、西林、凌云、东兰、天峨、南丹、河池、都安、巴马。

### 广西五月茶

*A. morsei* Chun

桂西北。

### 沙潦木

*A. venosum* Tul.

那坡、百色、田林、隆林、乐业、南丹。

根治小儿麻疹。

### 大沙叶 银柴、厚皮稔

*Aporosa chinensis* (Champ.) Merr.

(*A. leptostachya* Benth.)

合浦、十万大山、陆川、博白、玉林、苍梧、梧州、大瑶山、

扶绥、宁明、龙州、百色、田林、西林、隆林。

### 云南大沙叶 小甜糖木

*A. yunnanensis* (Pax et Hoffm.) Metc.

靖西、百色、东兰、南丹、大瑶山、苍梧、陆川。

### 毛大沙叶☆ 毛银柴

*A. villosa* (Lindl.) Baill.

Baccaurea-Breynia

合浦。

火果 铁东木、唛咗、枝花木奶果

*Baccaurea ramiflora* Lour.

(*B. cauliflora* Lour.)

东兴、上思、崇左、大新、扶绥、宁明、龙州、那坡、靖西。

野果。木材可作家具和细工用材。

秋枫 常绿重阳木、大果重阳木

*Bischofia javanica* Bl.

(*B. trifoliata* Hk.f.)

在梧州、大瑶山、河池、天峨一线以南和以西，偶见于大苗山和昭平。

根祛风，消肿活血；治暗伤，风湿骨痛，赤白痢。叶外敷治无名肿毒。木材坚重，耐朽耐湿，为建筑、桥梁、车辆、造船、床板、枕木等用材。种子油精制后可供食用和作润滑油。果肉可酿酒。叶可作绿肥。树皮可提红色染料。适作防堤树种，又常栽培作风景树和行道树。

重阳木 水蚬木

*B. racemosa* Cheng et C.D.Chu

桂林、临桂、灵山、全州。

用途同秋枫。

黑面叶 螺掩叶、米宾宁(壮音)、青凡木、黑面神、鬼画符、细青七树

*Breynia fruticosa* (L.) Hk.f.

区内各地。

根、叶清热解毒，破瘀止痛，收敛止血；治湿热腹泻，扁桃体炎，咽喉炎，风湿骨痛，支气管炎；叶捣汁涂，治湿疹，皮炎，搔痒，烫伤。孕妇忌服。内服过量会引起呕吐。枝、叶、

树皮可提制栲胶。种子含有脂肪油。木材可供细工用材。

小叶黑面叶☆ 小叶鬼画符、红子仔

**B. hyposaupopus Croiz.**

藤县、平南、桂平、贵县、阳朔、临桂、大瑶山、来宾、忻城、柳州、柳城、南宁、武鸣、上林、龙州、靖西、平果、田阳、隆林、凌云、乐业、东兰。

根、叶祛瘀解毒；治蛇伤，咳嗽，乳痈。叶治刀伤。

尾叶黑面叶☆ 尾叶黑面神

**B. rostrata Merr.**

大瑶山。

禾串树 猪牙木

**Bridelia balansae Tutcher**

桂平、贺县、大瑶山、十万大山、武鸣、宁明、龙州、靖西、那坡、凌云、乐业、都安、东兰、天峨、桂林、全州。

树皮可提制栲胶。

虾公木

**B. fordii Hemsl.**

龙州、靖西、凌云、乐业、东兰、南丹、永福、阳朔、桂林、贺县。

土密树 逼迫子

**B. monoica (Lour.) Merr.**

钦州、博白、陆川、北流、容县、平南、贵县、藤县、苍梧、梧州、南宁、扶绥、宁明、龙州、田东、隆林。

根皮治神经衰弱，月经不调。茎、叶清心泻火；治狂犬咬伤。叶治跌打骨折。树皮可提制栲胶。叶可作绿肥。韧皮纤维可作混纺麻布原料。木材可供细工用。

托叶土密树 狗舌果

**B. stipularis (L.) Bl.**

### Cladogynos-Codiaeum

龙州、百色、田林、凌云。

#### 越南枝实

*Cladogynos orientalis* Zipp.

var. *tonkinensis* Gagn.

龙州、大新、武鸣、宁明、德保、靖西。

#### 白桐树 宝炉木、丢了棒

*Claoxylon polot* (Burm.f.) Merr.

梧州、南宁、扶绥、大新、宁明、龙州。

根、叶祛风除湿，散瘀止痛；治风湿关节痛，跌打瘀肿，支气管炎。韧皮纤维可代麻，织麻布、麻袋和编绳。

#### 闭花

*Cleistanthus saichikii* Merr.

(*Paracleisthus subgracilis* Gagn.)

博白、十万大山、宁明、龙州、天等、田林。

木材硬而稍重，耐腐，是工业良材，尤适于水工、桥梁、造船、车辆、桩木等用，亦可作建筑、机械器具、窗、地板、农具、上等家具等用材。种子油可供点灯、制皂用。树皮可提制栲胶。

#### 异萼粗毛藤

*Cnesmone anisosepala* (Merr. et Chun) Croiz.

(*Tragia anisosepala* Merr. et Chun,

*T. involucrata* sensu Merr., non L.)

龙州。

有毒，人接触叶或藤，可引起搔痒，烧痛，红肿。

#### \*洒金榕 变叶木

*Codiaeum variegatum* (L.) Bl.

叶绿色，常间有白色、黄色或红色斑点或斑纹。庭园绿化植物。

\*细叶洒金榕    细叶变叶木

*C. variegatum* (L.) Bl.

forma *taeniosum* M.-A.

庭园绿化植物。

土葆香    银叶巴豆

*Croton cascarilloides* Raeusch.

龙州。

根祛风，壮筋骨；治瘰疬，咽喉肿痛。

鸡骨香

*C. crassifolius* Geisel.

合浦、阳朔。

根行气止痛，舒筋活络；治胃痛，腹痛，黄疸，咽喉肿痛，腰腿痛，淋巴结核。种子等作土农药，参阅巴豆。

广西巴豆

*C. kwangsiensis* Croiz.

灵川。

毛果巴豆    穿珠林(恭城)

*C. lachnocarpus* Benth.

恭城、兴安、桂林、临桂、蒙山、昭平、大瑶山。

根、叶祛风散寒，破瘀活血；治跌打损伤，风寒湿痹，蛇伤，产后风瘫。

巴豆    大叶双眼龙、八百力

*C. tiglium* L.

区内各地。

全株有毒，种子油有剧毒。种子峻泻行水，杀虫解毒；治水肿，顽固便秘。全株祛风，消肿止痛；治蛇伤，风湿腰腿痛，跌打损伤。种子、叶、茎为良好土农药，可杀玉米螟、蚜虫、孑孓、

Croton-Euphorbia

蝇蛆等害虫，亦可毒鱼。

越南巴豆

*C. tonkinensis* Gagn.

桂西南。

用途参阅巴豆。

弧脉核实

*Drypetes arcuatinaervia* Merr. et Chun

苍梧、容县、龙州。

全叶核实 打炮子

*D. integrifolia* Merr. et Chun

龙州、苍梧。

广西核实

*D. kwangsiensis* Merr.

十万大山。

网脉核实☆ 米查、米家、白梨么

*D. perreticulata* Gagn.

龙州。

黄桐

*Endospermum chinense* Benth.

钦州、东兴、合浦、十万大山、北流、陆川、容县、六万大山、  
大新、龙州、巴马、大瑶山。

速生用材树种，树干通直，材质轻软，易加工，适作箱板、家具、  
建筑、模型、火柴杆、板鞋等用。树皮治疟疾（合浦）。

\*火殃簕

*Euphorbia antiquorum* L.

鲜茎、叶有毒，消肿止痛，拔毒止痒；治疗癣，恶疮，无名肿毒，  
跌打，肝硬化腹水。乳汁有毒，不可入眼，内服过量会下痢。常栽

作篱笆。

猫眼草

*E. esula* L.

柳州、临桂。

泽漆

*E. helioscopia* L.

全州。

全草利尿消肿；治淋巴结核及四肢、面目浮肿。茎、叶有杀虫作用，可试作农药。

\*猩猩草 草本一品红

*E. heterophylla* L.

庭园绿化植物。叶治疥癣。

飞扬草 大飞扬、奶母草、奶汁草

*E. hirta* L.

区内各地。

全草抗菌收敛，镇痛止痒；治痢疾，肾盂肾炎，小儿消化不良，急性支气管炎，脓疮疮，足癣，皮癣，瘰疬。可解断肠草毒。

通奶草

*E. indica* Lam.

区内各地。

南大戟☆ 上莲下柳、铁挂牌

*E. jolkini* Boiss.

全州、资源、龙胜、临桂、桂林、柳州、融安、南丹、靖西、平果、天等、大新、南宁、博白。

全草清热凉血，润肺止咳；治风湿，跌打，消化不良，感冒咳嗽。

续随子 千金子

*E. lathyris* L.

## Euphorbia

全州、龙胜、临桂、凌云、大瑶山。

种子下水破瘀；治腹水蛊毒，疥癣，大小便不利。叶消肿催乳。

种子油有毒，不能食，可制肥皂或高级软皂和润滑油。种子捣烂水浸液可作农药。

\*铁海棠 狮子簕、麒麟花

*E. milii* Ch. des Moulins

(*E. splendens* Hk.)

花卉。可作绿篱。叶可拔竹、木刺。

大戟 上莲下柳、残虫草

*E. pekinensis* Rupr.

桂林、临桂、大苗山、南宁。

根峻下利尿；治腹水，全身水肿。体弱及孕妇忌服。叶催乳，又治黄疸。根作农药，可治斜纹夜蛾。全株作兽药，可治牛染疔火热症，通秘结。

铺地草

*E. prostrata* Ait.

柳州、桂林。

全株治小儿胎毒和疳积。

\*一片红☆ 一品红、猩猩木

*E. pulcherrima* Willd.

庭园绿化植物。茎、叶消肿；治跌打。

千根草 小飞扬

*E. thymifolia* L.

玉林、平南、桂平、岑溪、昭平、南宁、武鸣、桂林、天峨。

全草清热利湿，收敛止痒；主治菌痢，肠炎，腹泻，乙型脑炎，痔疮出血，产后乳少，皮炎，湿疹。

\*绿玉树

*E. tirucalli* L.

庭园绿化植物。

海漆 土沉香

*Excoecaria agallocha* L.

东兴、北海、合浦。

海岸林树种之一，常混生在红树林中。树皮含单宁，可供制革。

树皮分泌的乳汁可使皮肤红肿，更不能入眼。木材中的一部分可作薰香。

\*红背桂

*E. cochinchinensis* Lour.

多为栽培。

庭园绿化植物。叶止血；治吐血。全株治风湿，跌打。

绿背桂

*E. cochinchinensis* Lour.

var. *viridis* (Pax et Hoffm.) Merr.

龙州、百色。

庭园绿化植物。

白饭树

*Fluggea virosa* (Willd.) Baill.

苍梧、北流、贵县、横县、南宁、大明山、宁明、龙州、隆安、靖西、那坡、平果、田林、隆林、都安、东兰、天峨、柳州、大苗山、阳朔、永福、临桂。

枝、叶拔脓杀虫；治黄泡疮。

红算盘子

*Glochidion coccineum* M.-A.

(*Phyllanthus coccineus* (M.-A.) M.-A.)

Glochidion

邕宁、宾阳、大瑶山、东兰。

厚叶算盘子 水泡木

*G. dasypphyllum* K.Koch

北流、桂平、平南、藤县、梧州、大明山、天等、龙州、平果、凌云、柳州。

根治风湿跌打，脱肛，子宫脱垂。叶消肿杀虫，止齿痛。树皮可提制栲胶。

毛果算盘子 漆姑木、漆大伯

*G. eriocarpum* Champ.

钦州、玉林、南宁、梧州、柳州、百色、河池等地区。

根、叶祛湿止痒，收敛止泻，解漆毒；外洗治漆树过敏，皮炎，荨麻疹；煎服治肠炎，痢疾，跌打，牙痛。

栗叶算盘子 山甘树

*G. fagifolium* Miq.

十万大山、藤县、上林、宁明、龙州、靖西、那坡、百色、凌云、乐业。

叶治刀伤。树皮可提制栲胶。

香港算盘子 大红心、大叶馒头果

*G. hongkongense* M.-A.

(*G. littorale* sensu Benth, non Bl.)

陆川、博白、北流、容县、横县、龙州、隆林、凌云。

根皮治咳嗽。树皮、叶治腹痛，鼻出血。树皮可提制栲胶。

果盒子

*G. hypoleucum* Hay.

大瑶山。

大叶算盘子

*G. macrophyllum* Benth.

广西南部，柳州偶见。

茎、叶散瘀消炎；治跌打，牙龈炎，口腔炎。根治黄疸。树皮可提制栲胶。

甜叶算盘子 菲岛算盘子、甜叶木

*G. philippinense* (Cav.) Benth.

(*G. philippicum* (Cav.) C.B.Rob.)

十万大山、容县、宁明、靖西、平果、百色、隆林、天峨、柳州。  
叶可代茶。

算盘子 馒头果、鸡头翁

*G. puberum* (L.) Hutch.

(*G. sinicum* (Gaertn.) Hk. et Arn.,

*G. obscurum* sensu Forbes et Hemsl., non Bl.)

区内各地。

根(或全株)清热，消滞，活血，止泻；治感冒发热，咳嗽，喉痛，食滞腹痛，腹泻，痢疾，小便不利，湿热腰痛，跌打损伤。

果治疝气。全株可提制栲胶。种子油可制肥皂和固化油，点灯。叶可作绿肥。枝叶可作农药；治螟虫、蚜虫、菜虫。叶捣烂撒粪池中可杀蛆。

庐山算盘子☆ 庐山馒头果

*G. wilsonii* Hutch.

武鸣。

白背算盘子

*G. wrightii* Benth.

(*G. breynioides* sensu Merr., non C B.Rob.)

梧州、横县、大明山、扶绥、龙州、凌云。

树皮和叶可提制栲胶。种子油供工业用。

Glochidion-Jatropha

槌柱算盘子 锡兰算盘子

*G. zeylanicum* A.Juss.

宁明、田阳、德保。

\*橡胶树 三叶胶树、巴西橡胶树

*Hevea brasiliensis* (HBK.) M.-A.

桂南有栽培。

世界著名的橡胶植物，树干皮层流出的橡胶液是国防、民用橡胶工业的重要原料。种子油可制肥皂和固化油。

水柳 水椎木

*Homonoia riparia* Lour.

十万大山、邕宁、武鸣、宁明、龙州、那坡、田阳、百色、田林、隆林、凌云、东兰。

根清热利胆，消炎解毒，利尿；治急、慢性肝炎，胆囊结石，膀胱结石，淋病梅毒，跌打，痔疮。

\*佛肚树

*Jatropha podagrica* Hk.

区内间有栽培。

庭园绿化树木，茎部肉质膨大，所以有此名。

木花生 假花生、麻风树、油芦子、黄肿木。

*J. curcas* L.

钦州、博白、容县、苍梧、南宁、邕宁、宁明、龙州、百色、凌云、都安。

有毒树木，种子有毒，枝、叶较次。种子泻下，可作催泻剂。根散瘀消肿，止血，杀虫止痒；治跌打骨折，疥癣，顽疮。种子油可制肥皂。油麸含蛋白质多，可作农药和肥料。叶可养蚕。常栽作绿篱。

大苞血桐

*Macaranga bracteata* Merr.

十万大山、陆川。

中平树

*M. denticulata* (Bl.) M.-A.

十万大山、扶绥、龙州、靖西、那坡、平果、田林、凌云、东兰、都安。

根治黄疸。

海南血桐

*M. hemsleyana* Pax et Hoffm.

龙州。

盾叶木

*M. henricorum* Hemsl.

十万大山、大瑶山、龙州、德保、那坡、百色、田林、隆林、都安、巴马。

血桐

*M. henryi* (Pax et Hoffm.) Rehd.

(*Mallotus henryi* Pax et Hoffm.)

十万大山、大明山、大新、那坡、靖西、凌云、南丹、罗城、大苗山、融安、永福、大瑶山、桂平、蒙山。

滇桂血桐☆

*M. kurzii* (O.Ktze.) Pax et Hoffm.

东兰、百色、靖西、龙州、扶绥、大瑶山。

广西血桐

*M. rosuliflora* Croiz.

十万大山。

Macaranga-Mallotus

鼎湖血桐

*M. sampsoni* Hance

十万大山、北流、苍梧、大瑶山、罗城。

白背桐 白桐、野桐、白吊栗

*Mallotus apelta* (Lour.) M.-A.

区内各地。

根舒肝活血，清热去湿，收敛固脱；治慢性肝炎，子宫脱垂，脱肛，白带，肠炎腹泻，产后风瘫。叶止血；治刀伤出血。韧皮纤维可织麻袋，编绳，制人造棉，造纸等。种子油可制肥皂、润滑油、油墨、鞣革等用。木材可作细工用材。

广西白背桐

*M. apelta* (Lour.) M.-A.

var. *kwangsiensis* Metc.

龙州、靖西。

毛桐

*M. barbatus* (Wall.) M.-A.

区内各地。

全株清热，止泻；治膀胱炎，白浊；子宫脱垂，消化不良。叶治癣。韧皮纤维可作编绳、人造棉、造纸原料。种子油可制肥皂和润滑油。

白叶子

*M. cochinchinensis* Lour.

北流、博白、桂平。

根治赤白痢，白带，子宫脱垂。韧皮纤维可作绳索、麻袋、麻布、造纸原料。种子油可供点灯用。

桂野桐

*M. conspurcatus* Croiz.

靖西。

### 两广野桐

*M. croizatianus* Metc.

龙州、东兰、天峨。

### 粤黔野桐☆

*M. furetianus* (Baill.) M.-A.

(*M. maclarei* Merr.

*Hancea muricata* Benth.)

凌云。

据载：叶可作茶叶，且带有零陵香豆的香味。

### 大齿野桐

*M. grossedentatus* Merr. et Chun

龙州、百色、田林、隆林。

### 粗毛野桐

*M. hookerianus* (Seem.) M.-A.

十万大山、博白。

### 假新妇木

*M. illudens* Croiz.

(*M. contubernalis* Pax et Hoffm., non Hance)

桂林、柳州、梧州、南宁、河池、百色等地区各地。

### 野梧桐 止血木

*M. japonicus* (Thb.) M.-A.

资源、全州、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、贺县、容县、平南、博白、北流。

全株消肿驳骨，止血；治刀伤。根、叶、花治血尿。叶、种子含赤色染料。

Mallotus

东南野桐☆

*M. lianus* Croiz.

恭城、龙胜、永福、大瑶山、容县。

罗定白桐

*M. lotingensis* Metc.

(*M. barbatus* M.-A.

var. *congestus* Metc.)

苍梧、藤县、容县、宁明。

罗城白桐

*M. luchenensis* Metc.

罗城、南丹、天峨、百色、隆林、龙州、陆川。

褐毛野桐☆

*M. metcalfianus* Croiz.

十万大山。

小果白桐

*M. microcarpus* M.-A.

龙州。

滇黔野桐☆

*M. millettii* Lévl.

武鸣、龙州、那坡、西林、隆林、乐业、凤山、南丹。

光野桐

*M. millettii* Lévl.

var. *atricha* Croiz.

龙州、凌云、乐业、河池。

广东野桐

*M. nepalensis* M.-A.

var. *kwangtungensis* Croiz.

全州。

韧皮纤维可作麻袋、人造棉、蜡纸原料。种子油可作油漆、肥皂、蜡烛原料。叶可作饲料。

### 白楸

*M. paniculatus* (Lam.) M.-A.

(*M. cochinchinensis* Lour.)

合浦、十万大山、大瑶山、邕宁、宁明、龙州、靖西、德保、临桂。

韧皮纤维可作制绳、麻袋、麻布、棉絮、造纸等原料。种子油可供点灯等用。

### 粗糠柴 铁面将军、将军树

*M. philippinensis* (Lam.) M.-A.

区内各地。

果毛(果皮外面的红色腺毛)有毒，能引起恶心，强烈下泻，呕吐；入药为驱虫剂，驱蛔虫、蛲虫、绦虫，又治烂疮，跌打，风湿。果毛亦系红色染料。树皮、叶含单宁，可提取栲胶。韧皮纤维可制绳，作造纸原料等。种子油可制肥皂、润滑油。木材坚韧，可作车辆、家具、用具用材。紫胶虫寄主植物。又可作庭园绿化树种。

### 石岩枫

*M. repandus* (Willd.) M.-A.

全州、临桂、柳州、大瑶山、苍梧、天峨、东兰、那坡、龙州等地。

全株有毒。祛风活血，舒筋止痛；治风湿骨痛，腰肌劳损，产后风瘫。叶治疝气，腹痛。果毛驱虫；治绦虫。韧皮纤维可制绳。种子油可作油漆、油墨原料。全株能毒鱼，也叫“毒鱼药”，亦可作农药。

Mallotus-Ostodes

野桐

**M. tenuifolius Pax**

龙胜、凌云。

韧皮纤维可织麻袋，制绳，作人造棉、造纸原料。种子油可制油漆、肥皂、润滑油等用。

云南白桐

**M. yunnanensis Pax et Hoffm.**

龙州、大新、靖西、德保、田阳、凌云、乐业、凤山。

\*木薯

**Manihot esculenta Crantz**

(**M. utilissima Pohl**)

栽培作物。

块根含淀粉，除经水泡去毒后供食用和饲料用外，在工业上用途很多。叶可饲木薯蚕。

小盘木

**Microdesmis caseariaefolia Planch.**

苍梧、横县、十万大山、武鸣、扶绥、百色、凌云、田林。

树汁治齿痛。

肥牛树

**Muricococcum sinense Chun et How**

宁明、凭祥、龙州、大新、隆安、天等、靖西等地。

叶和嫩株营养价值很高，牛很喜吃，是牛的优良饲料。在桂西南一带石灰岩山地适生地区，可经营饲料林。木材坚重，可作机械工业、建筑和家具用材。种子油可供工业用。也适作风景树。

叶轮木

**Ostodes paniculatus Bl.**

\*扭曲草 红雀珊瑚、拖鞋花

*Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poir.

全草有小毒。清热消炎，止血止痛；治跌打损伤，外伤出血，腰痛，眼红肿痛，疖肿疮疡。庭园绿化植物。

叶珠木☆

*Phyllanthodendron anthopotamicus* (H.-M.) Croiz.

凌云、乐业。

越南叶下珠

*Phyllanthus cochinchinensis* Spreng.

合浦、博白。

余甘子 油甘子

*P. emblica* L.

桂西、桂南分布普遍，桂北少见。

果生津止渴，可生食或渍制。入药，润肺化痰；治喉痛，牙痛，咳嗽。根解郁定痛，清湿热，降血压；治哮喘，高血压，骨痛，心胃气痛。叶治水肿，皮肤湿疹。树皮浓液可作皮肤消毒剂。虫癰治梦遗，胃痛，小儿咳嗽。树皮可提制栲胶。种子油可制肥皂。木材坚实耐朽，富弹性，可作室内装饰和家具、细工用材。又是良好薪炭材。耐旱，耐瘠薄土壤，是桂西、桂南绿化荒山的优良先锋树种。

海南余甘子

*P. hainanensis* Merr.

隆林。

全株治眼发炎。

珠子草

*P. niruri* L.

Phyllanthus-Ricinus

区内各地。

全株治小儿疳积。根治黄疸。

小叶余甘子

*P. parvifolius* Buch.-Ham.

苍梧。

烂头钵 红鱼眼

*P. reticulata* Poir.

区内各地。

全株治风湿，跌打。

黄珠子草

*P. simplex* Retz.

区内各地。

全株治淋病，骨梗，小儿疳积。根治乳房脓肿。

叶下珠

*P. urinaria* L.

区内各地。

全草清肝明目，渗湿利水；治小儿疳积，肾炎水肿，尿路感染。

尿路结石，肠炎腹泻，肝炎，黄疸，小儿咳嗽。

苦黍树

*Prosartema stellaris* Gagn.

十万大山、龙州、隆林。

\*蓖麻

*Ricinus communis* L.

区内各地。

种子油即蓖麻油，精炼的蓖麻子油，在医药上是缓泻剂，在工业上用途极广，可作飞机或机器润滑油，又可制皂、发油、印刷

油、纺织印染工业的助染剂、皮革保护油等等。榨油后的油粕(麸饼)可作照相软片原料和作肥料、家畜饲料、活性炭。叶可饲养蓖麻蚕。种子和叶作农药，可防治蛴螬、水稻螟、棉蚜、红蜘蛛、金龟子、蝼蛄、蟋蟀、松毛虫等，又可杀孑孓；蓖麻子的毒效较好。韧皮纤维可作人造棉、造纸原料。根治风湿骨痛，跌打肿痛。叶治疮疡肿痛，疥疮湿毒。种子含蓖麻毒素，有毒，未经加热处理不得内服。外敷治口眼歪斜，淋巴结核。

### 桂林乌柏☆

*Sapium chihsinianum* S.Lee

桂林。

木材可作家具、车辆、雕刻等用材。

### 山乌柏 红鸟柏

*S. discolor* (Champ.) M.-A.

区内各地。

种子油可制肥皂、蜡烛和点灯用。木材耐朽力弱，可作火柴杆、茶箱等用。保土树种。根皮、叶利尿通便，散瘀消肿，解毒；治跌打扭伤，毒蛇咬伤，便秘，淋沥，腹水；叶外敷乳痈肿痛、痈疮，皮肤湿疹。

### 白木乌柏 白乳木

*S. japonicum* (S. et Z.) Pax et Hoffm.

全州、灌阳、临桂、大苗山。

种子油可制油漆、肥皂、硬化油、蜡烛、点灯等用。

### 圆叶乌柏

*S. rotundifolium* Hemsl.

全州、兴安、临桂、桂林、平乐、贺县、柳州、大苗山、宜山、罗城、南丹、天峨、凌云、乐业、那坡、靖西、容县。

### Sapium-Sauropus

叶、果解毒消肿，杀虫；治蛇伤，疮毒，疥癣。种子油可作机械润滑油、蜡烛、制皂等用。木材宜作室内载荷小的用材。石山绿化树种。

#### 凹尖圆叶乌柏

*S. rotundifolium* Hemsl.

var. *obcordatum* S.Lee

桂林。

#### 乌柏

*S. sebiferum* (L.) Roxb.

区内各地。

种子表面的蜡质即“皮油”或“柏蜡”，可作制肥皂、蜡烛、硬脂酸、油酸等原料。从除去蜡层的种子榨出的油，叫“柏油”或“梓油”，可作油漆、油墨、油酸、皮肤防裂油，熬制中药、膏药、蜡纸等原料。用带蜡层的种子榨出的油，叫“木油”，多用作制肥皂和蜡烛。根、叶清热解毒，利尿通便，活血止痛；治血吸虫腹水，大小便不通，蛇伤，跌打肿痛，湿疹疥癣，阴道炎。嫩枝乳汁可治蜈蚣伤。叶可饲养柏蚕，又可提黑色染料。树皮和叶可提制栲胶。种子外壳可提制碳酸钾。叶可作绿肥。油麸是良好肥料。木材坚而白，可制车辆、家具，又是良好的雕刻细工材。叶浸出液作农药，可杀棉蚜、红蜘蛛、金花虫等。蜜源植物。夏季树冠浓绿，秋季叶色变红，可作绿化和行道树种。

#### 细青漆木

*Sauropus breynioides* Merr.

武鸣、扶绥、德保。

#### 离萼守宫木

*S. chorisepalus* Merr. et Chun

大瑶山、大苗山、南丹、凤山、凌云、隆林、大明山。

\*龙胆叶

*S. rostratus* Miq.

苍梧、贵县、南宁。

叶清热止咳，润肺化痰；治急性支气管炎，支气管哮喘，上呼吸道炎。

坡荔枝

*Sebastiania chamaelea* M.-A.

(*S. chamaelea* M.-A.)

var. *asperococcum* (F. v. M.) Pax)

龙州。

蝴蝶果

*Sinopimelodendron kwangsiense* Tsiang, ined.

宁明、龙州、马山、靖西、凌云、巴马、浦北。

种子含脂肪油和淀粉，经处理后可食。

广东地构叶

*Speranskia cantoniensis* (Hce.) Pax et Hoffm.

贺县、富川、临桂、全州、罗城。

全株治寒热痧症，跌打。

矮萼木☆

*Strophioblacchia fimbrialyx* Boerl.

(*S. glandulosa* Pax)

龙州。

叶治疥疮。

滑桃树 红背叶

*Trewia nudiflora* L.

龙州。

叶治疥疮。

Trigonostemon-Daphniphyllum

三宝木

*Trigonostemon chinensis* Merr.

(*T. fungii* Merr.)

龙州、东兴。

136A 虎皮楠科(交让木科)

DAPHNIPHYLACEAE

牛耳枫 南岭虎皮楠、猪络木

*Daphniphyllum calycinum* Benth.

区内各地。

根、叶活血散瘀，消肿止痛，清热解毒；治跌打肿痛，骨折，感冒发热，中暑，扁桃体炎，脾大，毒蛇咬伤。嫩茎、叶可作绿肥。果可榨油，供制皂、润滑油用。油渣作肥料。

虎皮楠 交让木

*D. glaucescens* Bl.

临桂、灵川、兴安、龙胜、全州、灌阳、永福、恭城、三江、大苗山、大瑶山、宜山、大明山、那坡、凌云、贺县、昭平、苍梧。  
种子油可制肥皂。叶煎液作土农药，杀蚜虫。庭园绿化树种。

江南虎皮楠

*D. longeracemosum* Rosenth.

武鸣、大明山、宾阳、平南、大苗山、大瑶山、凌云。

广西虎皮楠 长柱虎皮楠

*D. longistylum* Chien

大明山、大苗山、平南、全州、龙胜、永福、桂林。

木材供家具、车辆等用。庭园绿化树种。

交让木

*D. macropodum* Miq.

龙胜、资源、全州、兴安、临桂、灌阳。

两广虎皮楠☆

*D. marchandii* (Lévl.) Croiz. et Metc.

邕宁、上思、全州、桂林。

木材可供制梳等用。

南宁虎皮楠

*D. oldhami* (Hemsl.) Rosenth.

临桂、龙胜、全州、苍梧、容县、平南、凤山、南丹、大瑶山、  
大苗山、象州、靖西、百色、德保、那坡、邕宁、龙州、上思。

峨眉虎皮楠

*D. paxianum* Rosenth.

大苗山。

柳叶虎皮楠☆ 小叶虎皮楠

*D. salicifolium* Chien

十万大山。

139 鼠 刺 科 ESCALLONIACEAE

秀丽鼠刺

*Itea amoena* Chun

十万大山。

鼠刺 老鼠刺、石山杠

*I. chinensis* Hk. et Arn.

武鸣、大新、横县、龙州、上思、西林、容县、平南、苍梧、贺  
县、昭平、大瑶山、象州、桂林、临桂、永福、龙胜、恭城。  
木材供细工、农具等用材。

狭叶鼠刺

*I. chinensis* Hk. et Arn.

*forma angustata* Wu

大瑶山。

根治风湿，跌打。

长圆叶鼠刺

*I. chinensis* Hk. et Arn.

*var. oblonga* (H.-M.) Wu

全州、兴安、临桂、永福、大瑶山、大苗山、罗城、平南、陆川、

苍梧、蒙山、昭平、钟山、贺县、横县。

根治跌打、骨折。木材供农具、车辆等用。

毛脉鼠刺

*I. chinensis* Hk. et Arn.

*var. pubinervia* H.T.Chang

贺县、桂平、临桂、桂林、大瑶山、大苗山。

厚叶鼠刺

*I. coriacea* Wu

灌阳、龙胜、全州、兴安、临桂、灵山、阳朔、大瑶山、大苗山、

象州、贺县、武鸣、大明山、靖西。

腺鼠刺

*I. glutinosa* H.-M.

兴安、龙胜、临桂。

叶捣烂敷刀伤。

毛鼠刺

*I. homalioidea* H.T.Chang

大苗山、隆林、龙胜。

广西鼠刺

*I. kwangsiensis* H T.Chang

罗城、龙胜、临桂、凌云。

大叶鼠刺

*I. macrophylla* Wall.

武鸣、大明山、凤山、凌云。

滇鼠刺

*I. yunnanensis* Fr.

隆林。

多香木

*Polyosma cambodiana* Gagn.

十万大山。

141 醋栗科 GROSSULARIACEAE

南醋栗

*Ribes ambiguum* Maxim.

全州宝顶山。

种子通经，利尿；治水肿。果供食用及酿酒。

142 绣球花科 HYDRANGEACEAE

人心药

*Cardiandra moellendorffii* (Hance) H.L.Li

资源、龙胜。

四川溲疏 夏季石藤

*Deutzia setchuenensis* Fr.

上林、武鸣、南丹、上思。

Dichroa-Hydrangea

庭园绿化植物。

大明常山

*Dichroa daimingshanensis* Wu

武鸣、大明山、上林、宁明、大瑶山、南丹。

常山 黄常山

*D. febrifuga* Lour.

区内各地。

根、茎、叶截疟，催吐。治疟疾，跌打劳伤，支气管炎。叶煎液作土农药，可杀地老虎等害虫。

瑶山常山

*D. yaoshanensis* Wu

那坡、凌云、田林、都安、大瑶山、灵川、贺县。

根治风湿骨痛。

冠盖绣球 奇形绣球

*Hydrangea anomala* D.Don

龙胜、全州、资源、大苗山。

内树皮作收敛药。

珠光绣球

*H. candida* Chun

十万大山。

中国绣球

*H. chinensis* Maxim.

大瑶山、象州、永福、临桂。

绿瓣绣球

*H. chloroleuca* Diels

龙胜、临桂。

马边绣球

*H. davidi Fr.*

大苗山、凌云、龙胜。

根、叶治疟疾。髓心治麻疹，小便不通。

白皮绣球

*H. hedyotidea Chun*

贺县。

永福绣球

*H. kuochingii Chun et How, ined.*

永福。

广西绣球

*H. kwangsiensis Hu*

融安、大苗山。

椭圆广东绣球

*H. kwangtungensis Merr.*

*var. elliptica Chun*

十万大山。

临桂绣球

*H. linkweiensis Chun*

兴安、龙胜、临桂。

庭园绿化植物。

绣球花 粉团

*H. macrophylla (Thb.) DC.*

*forma hortensia Wils.*

桂林、苍梧等地有栽培。

庭园绿化植物。花清凉，抗疟疾。

Hydrangea

圆锥绣球 糊溲疏、水亚木

*H. paniculata* Sieb.

龙胜、灌阳、兴安、全州、资源、恭城、永福、临桂、大苗山。  
大瑶山、象州、九万大山、大明山、贺县、富川。

根接骨；叶治疮疥。枝干、内皮可取糊料。

南川绣球☆

*H. rosthornii* Diels

龙胜、临桂、全州、凌云、田林、大苗山。

泽八绣球

*H. serrata* (Thb.) DC.

*forma acuminata* (S. et Z.) Wils.

兴安。

上思绣球☆

*H. shaochingii* Chun

十万大山。

紫枝柳叶绣球

*H. stenophylla* Merr. et Chun

*var. decorticata* Chun

大苗山。

蜡莲绣球

*H. strigosa* Rehd.

临桂、灵川、全州、兴安、大苗山。

茎可提取橡胶。根消食积，解热毒，除胸腹满；治疟疾，擦皮  
痒。

阔叶蜡莲绣球

*H. strigosa* Rehd.

*var. macrophylla* Rehd.

龙胜。

徽花绣球

*H. umbellata* Rehd.

全州、龙胜、临桂、凌云、容县。

柔毛绣球

*H. villosa* Rehd.

资源、兴安、河池、南丹、大苗山、隆林。

川桂柔毛绣球☆

*H. villosa* Rehd.

*forma sterilis* Rehd.

南丹。

卵形柔毛绣球

*H. villosa* Rehd.

*var. velutina* Chun

兴安。

云南绣球 滇绣球

*H. yunnanensis* Rehd.

大苗山、陆川。

星毛冠盖藤

*Pileostegia tomentella* H.-M.

龙胜、临桂、桂林、永福、平乐、三江、平南、北流、上思。

冠盖藤

*P. viburnoides* Hk f. et Thoms.

兴安、全州、灌阳、资源、龙胜、临桂、荔浦、贺县、昭平、大瑶山、大苗山、象州、罗城、隆林、上思、容县。

Schizophragma-Chaenomeles

灵川钻地风

*Schizophragma choufenianum* Chun

资源、兴安、龙胜、灵川、乐业、容县天堂山。

粉绿钻地风

*S. glaucescens* (Rehd.) Chun

龙胜。

钻地风

*S. integrifolium* Oliver

大瑶山、象州、龙胜。

根皮祛风活血；治筋骨疼痛，丝虫病。叶可提单宁。

## 143 蔷 薇 科 ROSACEAE

龙芽草 仙鹤草、脱力草

*Agrimonia viscidula* Bunge

区内各地。

全草收敛，止血，活血，凉血；治各种内外出血，产后瘀血不尽，痢疾等。又可作农药。

假升麻

*Aruncus silvester* Kostel.

资源、大苗山。

庭园绿化植物。

川木瓜 木瓜、贴梗海棠

*Chaenomeles lagenaria* (Loisel.) Koidz.

桂林、兴安、全州、资源、龙胜、阳朔、乐业。

干燥的果实舒筋活络，驱风镇痛，和胃化湿；治腹痛腹泻，关节酸痛，脚气湿痹，麻木，小儿疳积。

光皮木瓜 榆楂、木李、海棠、木瓜

*C. sinensis* (Thouin) Koehne

桂林、龙胜、全州、岑溪。

用途参阅川木瓜。

粉绿栒子

*Cotoneaster glaucophylla* Fr.

田林、凌云、乐业。

野山楂 小山楂、南山楂

*Crataegus cuneata* S. et Z.

临桂、全州、桂林。

果消积化滞，助消化；治食积停滞，胸腹胀痛，泻痢，疝气，高血压等。焦山楂煎剂对赤痢杆菌、绿脓杆菌有抑菌作用。

粗叶楂 大果山楂、酸岭果、山楂果

*C. scabrifolia* (Fr.) Rehd.

隆林、田林、靖西、宁明、上思、玉林、苍梧。

果做山楂糕。叶清暑热。

皱果蛇莓

*Duchesnea chrysanthia* (Zoll. et Mor.) Miq.

茎叶捣烂敷疮，蛇伤，烫火伤。

蛇莓 落地杨梅

*D. indica* (Andr.) Focke

区内各地。

全草清热解毒，通经，散瘀；治菌痢，感冒发热，咽喉肿痛，咳嗽，腮腺炎，毒蛇伤，烫火伤，痈肿，口中生疮，支气管炎，并可解雷公藤、砒霜中毒。果可酿酒、制果酱。全株还可作农药，灭孑孓，杀蛆。

野枇杷

*Eriobotrya cavaleriei* (Lévl.) Rehd.

### Eriobotrya-Geum

龙胜、兴安、全州、临桂、永福、平乐、阳朔、资源、大苗山、大瑶山、大明山、上林、武鸣、都安、隆林、那坡、上思、苍梧、贺县。

#### 广东野枇杷

*E. cavaleriei* (Lévl.) Rehd.

var. *brackloii* (H.-M.) Rehd.

十万大山。

果可食用、酿酒。

#### 山枇杷

*E. fragrans* Champ.

上思、容县、大瑶山。

果可食、酿酒。材用。

#### \*枇杷

*E. japonica* (Thb.) Lindl.

区内各地多有栽培。

果为水果。叶为中药（枇杷叶），化痰止咳，和胃降气；治咳嗽，痰粘不爽，胃热恶心呕吐，口渴。木材坚硬，可作刀斧柄和其他器具。

#### 白薺

*Fragaria nilgerrensis* Schlecht.

柳州、忻城、鹿寨、凤山、凌云、平南、藤县。

全株解毒，调经，凉血；治红白痢，小儿疳积，刀伤。

#### 水杨梅

*Geum japonicum* Thb.

var. *chinense* F. Bolle

南丹、乐业。

全草解表散寒，壮阳补虚；治劳伤虚弱，肾阳虚，头眩晕，感

冒；外敷治疮疖。嫩叶可食。

### 棣棠花

*Kerria japonica* (L.) DC.

栽培花木。临桂。

全株治久咳，消化不良，风湿关节痛，水肿；外洗小儿麻疹。

### 湖北海棠 花红茶、茶海棠

*Malus hupehensis* (Pamp.) Rehd.

(*M. theifera* Rehd.)

十万大山、兴安、临桂。

果可食，酿酒；嫩叶可代茶。

### 尖嘴林檎

*M. melliana* (H.-M.) Rehd.

罗城、大苗山、大瑶山、兴安、临桂、阳朔、灌阳、荔浦、北流、玉林、容县、梧州、贺县、昭平、宁明。

果可食，可酿酒，制山楂片。幼树可作苹果砧木。

### \*苹果

*M. pumila* Mill.

柳州、岑溪和本所有少量栽培，但结果少，品质差。

为著名的温带果树。

### 三叶海棠

*M. sieboldii* (Reg.) Rehd.

全州、兴安、资源、龙胜、灌阳、大苗山、罗城。

可作苹果砧木。

### \*海棠花 海棠、海红

*M. spectabilis* (Ait.) Borkh.

桂林有少量栽培。

庭园绿化树种。

Malus-Photinia

台湾海棠

*M. taiwaniana* (Kaw. et Koidz.) Kaw. et Koidz.

兴安、全州、平乐、贺县、大苗山、陆川、容县、宁明。

果加工做山楂片、山楂糕。药用有收敛、强壮、治腰痛之效。

齿苞绣线梅

*Neillia serratisepala* H.L.Li

那坡、靖西、大苗山。

绣线梅

*N. sinensis* Oliv.

临桂、龙胜、贺县、大苗山、东兰、凌云、乐业。

腺绣线梅

*N. sinensis* Oliv.

*forma glanduligera* (Hemsl.) Rehd.

隆林、凌云、乐业、东兰、南丹、龙胜、兴安、临桂、全州、资源。

聚繖花绣线梅

*N. thyrsiflora* D.Don

靖西。

西南石斑木

*Photinia amphidoxa* (Schneid.) R. et W.

大苗山、东兰、南丹。

果可酿酒。

凌云山杠木      广西石斑木

*P. amphidoxa* (Schneid.) R. et W.

*var. kwangsiensis* Metc.

凌云。

假思桃 琴忌郎、野思桃

*P. beauverdiana* Schneid.

临桂、永福、资源、龙胜、全州、恭城、富川、容县、大苗山、  
大瑶山、隆林、田林、凌云、乐业、东兰、武鸣、横县。

窄叶石楠 窄叶石斑木

*P. benthamiana* (Hance) Maxim.

var. *salicifolia* Cardot

天峨、隆林、田林、十万大山、横县。

农具用材。

硬质石楠 硬质石斑木

*P. callosa* Chun

龙胜、大苗山、大瑶山、田林、乐业、德保、容县、北流、大明  
山、十万大山。

农具用材。

桂林石楠☆

*P. chihsiniana* Kuan

桂林、临桂。

农具用材。

宜山石楠

*P. chingiana* H.-M.

宜山。

农具用材。

厚叶石楠

*P. crassifolia* Lévl.

那坡、隆林、凌云。

农具用材。

Photinia

刺齒

*P. davidsoniae* R. et W.

龙胜、临桂、平南、大瑶山、田林、十万大山。

农具用材。

山杠木 光叶石楠

*P. glabra* (Thb) Maxim.

龙胜、临桂、灵川、兴安、资源、全州、阳朔、灌阳、大瑶山、大苗山、象州、三江、南丹、凌云、武鸣、上林、大明山、龙州、平南、容县、昭平、贺县。

木材坚硬，可作农具、车辆、船舶用材。种子油可制肥皂或润滑油。

青凿木

*P. impressivena* Hayata

(*P. euphlebia* Merr. et Chun)

大瑶山、三江、永福、临桂、阳朔、南宁、平南。

农具用材。

全缘石楠

*P. integrifolia* Lindl.

那坡。

农具用材。

广西山杠木

*P. kwangsiensis* H.L.Li

象州、大瑶山、横县、荔浦。

叶治风湿痛。

罗城石楠

*P. lochengensis* Yü

罗城。

小叶石楠 秤锤子

*P. parvifolia* (Pritz.) Schneid.

桂林、临桂、灵川、阳朔、永福、兴安、龙胜、全州、恭城、荔浦、平乐、钟山、昭平、贺县、梧州、苍梧、藤县、柳州、大苗山、大瑶山、三江、融安、罗城、南丹、武鸣、上林、大明山、上思。

白绒石楠

*P. podocarpifolia* Yü

田林、隆林、百色、天峨。

櫻叶石楠 山杠木、石笔木

*P. prunifolia* (Hk. et A.) Lindl.

临桂、兴安、永福、恭城、阳朔、平乐、富川、大瑶山、大苗山、罗城、武鸣、大新、横县、上思、北流、陆川、容县、藤县、昭平。

假山杠木

*P. prunifolia* (Hk. et A.) Lindl.

var. *consimilis* (H.-M.) Yü

(*P. consimilis* H.-M.)

临桂、全州、恭城、平南、大瑶山、十万大山。

农具用材。

齿叶櫻叶石楠

*P. prunifolia* (Hk. et A.) Lindl.

var. *denticulata* Yü

兴安。

饶平石楠

*P. raupingensis* Kuan

十万大山。

鄂西石楠☆

*P. schneideriana* R. et W.

Photinia-Potentilla

龙胜、兴安。

石楠 酒木

*P. serrulata* Lindl.

桂林、临桂、阳朔、全州、兴安、平乐、贵县、桂平、三江。

枝叶祛风寒，强腰膝，补虚，镇痛，解热。木材紧密可制车轮、农具用。果可酿酒，制果酱。种子油供工业用。苗木可作枇杷砧木。

狭叶石楠

*P. stenophylla* H.-M.

大苗山。

庐山石楠

*P. villosa* (Thb.) DC.

var. *sinica* R. et W.

罗城、柳州、大瑶山、资源、兴安。

种子油可制肥皂，作机械润滑油，制油漆。木材制器具。果可食。

鸡爪根 翻白草

*Potentilla discolor* Bunge

柳州、桂林、临桂。

根和全草凉血止血，祛风止痛，清热止咳；治肺热咳血，鼻衄，便血，血崩，腰痛，肺痈，痢疾等。

落地杨梅 落地蜘蛛

*P. fragarioides* L.

隆林、乐业、玉林。

全草治疮毒，止血痢。

蛇含 五匹风

*P. kleiniana* W. et A.

上林、龙州、隆林、凌云、乐业、龙胜、临桂、桂林。

全草清热解表，润肺止咳；治风热感冒头痛无汗，支气管炎，百

日咳，小儿惊癇，跌打等。其汁含漱可治喉炎。

两广樱桃

*Prunus adenodonta* Merr.

大苗山、大瑶山、凌云、乐业、容县、平南、蒙山、贺县。

\*杏

*P. armeniaca* L.

南宁。

果为生果。种仁祛痰止咳，定喘，润肠；主治外感咳嗽，气喘，胸胁胀满，喉痹，便秘。

短柄樱桃

*P. brachypoda* Batal.

龙胜。

稍秃樱桃

*P. buergeriana* Miq.

var. *nudiuscula* Koehne

龙胜。

福建樱桃

*P. campanulata* Maxim.

阳朔、临桂、桂林、灵川、龙胜、兴安、大瑶山、凌云、乐业。  
果可食。绿化树种。

四川樱桃

*P. droseracea* Koehne

龙胜。

无齿樱桃

*P. edentata* H.-M.

桂西北。

Prunus

大叶野樱

P. macrophylla S. et Z.

阳朔、临桂、永福、蒙山、靖西。

木材为农具用材。

毛大叶野樱

P. macrophylla S. et Z.

var. puberifolia Koehne

阳朔、临桂、九万大山、大瑶山、田林。

\*梅

P. mume (Sieb.) S. et Z.

果可制青梅、乌梅、话梅、陈皮梅等。乌梅敛肺涩肠，生津止渴，

驱蛔止痢；治慢性泻痢脱肛，蛔虫，久咳等。乌梅肉和盐、醋外敷治胼胝。果为染色媒染剂。又为有名的观赏植物。

\*白梅花

P. mume (Sieb.) S. et Z.

forma alba (Carr.) Rehd.

花白色，重瓣，芳香。庭园绿化树种。

\*红梅花

P. mume (Sieb.) S. et Z.

forma alphandii Rehd.

花粉红色，重瓣，芳香。庭园绿化树种。

\*绿萼梅

P. mume (Sieb.) S. et Z.

var. viridicalyx Mak.

花萼绿色，重瓣，芳香。庭园绿化树种。

\*桃

*P. persica* (L.) Batsch.

区内各地。

果除生食外，可制罐头或果脯。种仁名“桃仁”，活血散瘀，润燥滑肠；治血瘀经闭，产后瘀血不下，跌打瘀血，便秘，慢性阑尾炎等。也可作杏仁代用品。桃花利大小便；治便秘，水肿。鲜树枝治间日疟。桃叶煎水洗治湿疹，又可作土农药，杀蚜虫、蛆、孑孓。鲜叶可防跳蚤。韧皮纤维可造纸和人造棉。桃胶可作粘接剂或赋形剂。桃树又是有名的绿化植物。

\*白碧桃 千瓣白碧桃

*P. persica* (L.) Batsch.

*forma albo-plena* Schneid.

花白色，大朵，重瓣。庭园绿化植物。

\*红碧桃

*P. persica* (L.) Batsch.

*forma rubro-plena* Schneid.

花红色，大朵，重瓣。庭园绿化树种。

\*五彩桃 花碧桃

*P. persica* (L.) Batsch.

*forma versicolor* (Vanh) Voss

花瓣有红白相间的条纹。庭园绿化树种。

腺叶野樱

*P. phaeosticta* (Hance) Maxim.

区内各地。

全株活血行瘀，镇咳，利尿；种子活血行瘀，润燥滑肠；治经闭，痈疽，大便燥结。种子油点灯，制皂、油漆。

Prunus

\*李

*P. salicina* Lindl.

区内各地。

· 果树。根入药，主治消渴，心烦逆，小儿暴热，解丹毒，止牙痛。

樱花

*P. serrulata* Lindl.

桂林、龙胜。

庭园绿化。

赞桃

*P. serrulata* Lindl.

var. *pubescens* (Mak.) Wils.

灵川、永福。

庭园绿化。

小刺樱花

*P. spinulosa* S. et Z.

永福、阳朔、灌阳、灵川、兴安。

华中樱花 苦桃树

*P. wilsonii* (Diels) Koehne

龙胜、桂林、大苗山、凌云、田林、隆林。

\*日本樱花

*P. yedoensis* Mats.

南宁。

庭园绿化。

云南樱花

*P. yunnanensis* Fr.

龙胜、临桂。

思茅臀形果

*Pygeum henryi* Dunn

龙胜、阳朔、临桂、龙州。

臀形果

*P. topengii* Merr.

上思、那坡、百色、龙州、宁明、阳朔。

材质优良，可制家具、器具。

全缘火棘 鸟仔刺

*Pyracantha atalantoides* (Hance) Stapf

临桂、平乐、龙胜、全州、灌阳、阳朔、柳州、大瑶山、大苗山、贺县、富川。

细圆齿火棘

*P. crenulata* (D.Don) Roem.

临桂。

密花火棘

*P. densiflora* Yü

隆林、那坡。

火棘 火把果、救军粮、救荒粮

*P. fortuneana* (Maxim.) H.L.Li

(*P. crenato-serrata* (Hance) Rehd.)

天峨、南丹、隆林、凌云、乐业、桂林、兴安。

叶、种子明目，助消化；治筋骨痛，痢疾，妇女崩漏，跌打。果含糖和淀粉，可生食、酿酒或磨粉作代食品。根皮可提栲胶。

野梨 豆梨

*Pyrus calleryana* Decne.

桂林、临桂、永福、龙胜、恭城、全州、大瑶山、大苗山、隆林、凌云、乐业、贺县、昭平、藤县、苍梧、容县、博白、南宁、

Pyrus-Raphiolepis

宁明、龙州。

果可生食。苗木可作梨的砧木，能增强抵抗病虫害能力，并能使果味更美。

棠梨

*P. calleryana* Decne.

var. *koehnei* (Schneid.) Yü

区内各地。

用途参阅上一种。

\*梨

*P. pyrifolia* (Burm f.) Nakai

区内各地。

栽培果树。

麻梨

*P. serrulata* Rehd.

临桂、罗城。

果可食，常作沙梨砧木。木材造农具。

锈毛石斑木

*Raphiolepis ferruginea* Metc.

齿叶锈毛石斑木

*R. ferruginea* Metc.

var. *serrata* Metc.

大新、武鸣大明山。

春花木 石斑木、山花木、石棠木、车轮梅

*R. indica* Lindl.

区内各地林区。

木材带红色，质重坚硬，可做雕刻、磨齿、农具、手杖等用材。

叶治刀伤，炮码伤。根驱风，散热。果可食。

广西车轮梅

*R. kwangsiensis* Hu

十万大山、龙州、苍梧、贺县、那坡、博白。

狭叶车轮梅

*R. lanceolata* Hu

十万大山、上思。

鸡麻

*Rhodotypos scandens* (Thb.) Makino

(*R. tetrapetala* (Sieb.) Makino)

全州。

观赏。

七姐妹 华蔷薇、野玫瑰

*Rosa cathayensis* (R. et W.) Bail.

(*R. multiflora* Thb.

var. *cathayensis* R. et W.)

桂林、临桂、大苗山、南丹、乐业。

观赏花木。

\*月季花 月月红

*R. chinensis* Jacq.

各地栽培。

庭园绿化。花提芳香油制香水、香皂。花、根调经止痛，活血消肿；治慢性腰腿痛，痛经，月经不调，赤白带下。嫩叶捣烂外敷治跌打损伤。

小果蔷薇 白花刺

*R. cymosa* Tratt.

(*R. microcarpa* Lindl.)

桂林、临桂、苍梧、龙州、东兰、乐业、大瑶山。

Rosa

根为栲胶原料，药用消肿止痛，祛风除湿，健胃止泻，止血；治跌打，风湿关节炎，疮疖，烫火伤。果补血。花提芳香油。蜜源植物。

华中蔷薇☆

*R. henryi* Bouleng.

临桂。

广西蔷薇

*R. kwangsiensis* H.L.Li

资源。

广东蔷薇

*R. kwangtungensis* Yü et Tsai

var. *mollis* Metc.

王林。

金樱子 刺糖果

*R. laevigata* Michx.

区内各地。

根能收敛抗菌；主治烫火伤，子宫脱垂，腹泻，痢疾，脱肛等。果能补肾益精，止咳；主治神经衰弱，遗精，遗尿，白带等。又可熬糖，酿酒。根皮为栲胶原料。本品1:3000水溶液对流感病毒有抑制作用。

毛萼蔷薇

*R. lasiosepala* Metc.

大苗山。

毛野蔷薇

*R. multiflora* Thb.

var. *villosula* Metc.

十万大山。

花籽利尿泻下，又治月经不调。

少刺蔷薇☆

*R. paucispinosa* H.L.Li

野刺梨 刺梨

*R. roxburghii* Tratt.

*forma normalis* R. et W.

隆林、乐业、南丹。

根能清热，收敛；治血崩白带，红白痢疾，痔疮，烫火伤。果含淀粉，可酿酒。

\*玫瑰

*R. rugosa* Thb.

区内各地。

花理气，行血；治月经不调，肝胃气痛，乳痈肿毒，风湿痹痛，跌打损伤。花提芳香油制香水、香精。

云南蔷薇

*R. yunnanensis* Bouleng.

大苗山。

粗叶悬钩子 大叶泡

*Rubus alceaefolius* Poir.

区内各地。

茎、叶解毒，去瘀，生新；治疮疖，跌打暗伤，驳骨。根治腹泻，痢疾。

周毛悬钩子

*R. amphidasys* Focke

苍梧。

根能接骨。

粗糙悬钩子☆

*R. asper* Wall.

Rubus

隆林、恭城。

寒莓

*R. buergeri* Miq.

龙胜、荔浦、宁明、大瑶山。

果可食，止渴助消化。

绿花寒莓

*R. buergeri* Miq.

*var. viridiflorus* H.-M.

罗城。

掌叶复盆子

*R. chingii* Hu

大瑶山。

紫萼莓

*R. chroosepalus* Focke

融安。

红簕钩

*R. cochinchinensis* Tratt.

博白、上思、龙州、武鸣。

根散瘀活血，祛风湿。

三叶吊杆泡

*R. columellaris* Tutch.

临桂、龙胜、大瑶山、大苗山、东兰、南丹、上林、武鸣、龙州。

黄泡刺

*R. columellaris* Tutch.

*var. etropicus* (H.-M.) Metc.

资源、大苗山。

吊杆泡 山莓

*R. corchorifolius* L.f.

区内各地。

根治吐血，痔出血，月经不调，下死胎，遗精，肾亏，虫牙痛，跌打。根可制栲胶。果可食。

长叶悬钩子☆

*R. dolichophylla* H.-M.

凌云、乐业

凌云悬钩子☆

*R. echinoides* Metc.

凌云、乐业

黄泡

*R. ellipticus* Sm.

var. *obcordatus* (Fr.) Focke

全草解毒，消炎；治水泻，风湿痛。根皮为栲胶原料。

黔桂悬钩子☆

*R. feddei* Lévl. et Van.

隆林、凌云、那坡、德保、龙州。

根叶止血。

西江悬钩子☆

*R. fordii* Hance

桂林、临桂、阳朔、罗城、柳州。

乌泡

*R. gentilianus* Lévl. et Van.

龙胜、资源、大苗山、天峨、东兰、南丹、隆林、乐业、梧州。

果可食。根皮作染料。

Rubus

淡黄悬钩子☆

*R. gilvus* Focke

容县。

根清热利湿，凉血，止痛；治吐血，全身血斑，腹泻，劳伤疼痛。

六果悬钩子☆

*R. hexagynus* Roxb.

大瑶山。

黄藨子

*R. ichangensis* Hemsl. et Kuntze

凌云、乐业、大苗山。

根止痛，利尿，杀虫。

白叶莓

*R. innominatus* S. Moore

南丹、凌云、乐业、大瑶山、龙州、桂林、龙胜、资源。

早谷莓 早谷泡

*R. innominatus* S. Moore

var. *kuntzeanus* (Hemsl.) Bail.

大苗山。

地五泡藤

*R. irenaeus* Focke

全州、罗城。

根、叶理气止痛、散毒生肌；治气痞腹痛，口角疮。

广西悬钩子

*R. kwangsiensis* H L. Li

资源、兴安。

根、叶治牙痛、哮喘。

细烟筒子 高粱泡

*R. lambertianus* Ser.

桂林、临桂、平南、贺县、大瑶山、凤山、河池。  
果可食、酿酒。种子作强壮剂。叶生津止渴。

上思悬钩子☆

*R. latoauriculatus* Metc.

十万大山。

白花悬钩子

*R. leucanthus* Hance

苍梧、容县、上思、龙州、武鸣、大苗山。  
根治腹泻、赤痢。果可食。

裂叶悬钩子

*R. lobophyllus* Shih ex Metc.

大苗山。

海棠叶莓 羊鸟泡

*R. malifolius* Focke

大苗山、大瑶山、凌云、龙胜。  
根皮为栲胶原料。

小花悬钩子

*R. micranthus* D Don

隆林、田林、凌云、乐业、田阳、靖西、龙胜、大瑶山。

多苞片悬钩子☆

*R. multibracteatus* Lévl. et Van.

隆林、田林、大瑶山。

悬钩子 甜茶

*R. palmatus* Thb.

大瑶山。

Rubus

果解酒，止渴，除痰，补肾；治肺结核。未成熟果实可当复盆子入药，作强壮剂；治阳萎，遗尿等症。根治痢疾，水泻。叶代茶。

琴叶悬钩子☆

*R. panduratus* H.-M.

龙胜、大瑶山。

假琴叶悬钩子☆

*R. panduratus* H.-M.

*var. etomentosus* H.-M.

大苗山。

刺簕悬钩子☆

*R. paniculatus* Sm.

田林。

茅莓 三月泡、铺地蛇

*R. parvifolius* L.

区内各地。

根活血通经，解毒止痛，收敛利水；主治月经不调，痢疾，腹泻，糖尿，肾炎水肿，胃病，风湿痛，湿疹，咽喉炎，尿道炎，皮肤急性化脓性炎症，恶疮，奶疮。

川黔悬钩子☆

*R. pinfaensis* Lévl. et Van.

大苗山、凌云。

梨叶悬钩子

*R. pirifolius* Sm.

阳朔、临桂、大瑶山、大苗山、贺县、上思、龙州。

全草强筋骨；治寒湿腹痛。

阔萼悬钩子

*R. platysepalus* H.-M.

十万大山。

山烟筒子

*R. reflexus* Ker.

兴安、临桂、大瑶山、罗城、龙州、凌云、乐业、容县、藤县。

根治风湿痛。果可食。

红泡刺

*R. reflexus* Ker.

var. *lanceoloba* Metc.

大苗山、大瑶山。

蔷薇莓 白烟筒

*R. rosaefolius* Sm.

桂林、临桂、苍梧、大瑶山、大苗山、上林、玉林。

根驳骨，治痢疾，腹痛，发热头重。

红苞悬钩子☆

*R. rubribracteatus* Metc.

大苗山。

七裂悬钩子☆

*R. septemlobus* H L.Li

大瑶山。

川莓

*R. setchuenensis* Burr. et Fr.

凌云、乐业、隆林。

果可食。根皮作栲胶原料。茎皮为造纸原料。

桂北悬钩子☆

*R. shihae* Metc.

桂北。

Rubus-Sorbus

虎泡

*R. sumatranus* Miq.

全州、龙胜、大瑶山、大苗山、凌云。

根清热，解毒，利水。根皮磨酒滴耳内，治急性耳炎。

湖北悬钩子☆

*R. swinhoei* Hance

大苗山、龙胜、全州。

葵叶莓 灰山泡

*R. tephrodes* Hance

桂林、临桂。

根治痢疾。叶治牙痛。

黔桂葵叶莓

*R. tephrodes* Hance

var. *setosissimus* H -M.

河池。

两广悬钩子

*R. wangii* Metc

容县、武鸣、大瑶山。

根收敛止血；治痢疾。

地榆

*Sanguisorba officinalis* L.

桂林、临桂、柳州、来宾、大苗山、宜山、桂平、钟山、贺县。

根凉血止血，抗菌收敛；治创伤出血，肠胃出血，血尿，烫火伤。

子宫出血，痔出血，久痢，下血，狂犬病。根可酿酒和提栲胶。

毛背花楸

*Sorbus aronioides* Rehd.

临桂、龙胜、大瑶山、大苗山。

美脉花楸 小棠梨

*S. caloneura* (Stapf) Rehd.

临桂、兴安、全州、龙胜、资源、灌阳、融安、大苗山、大瑶山、象州、武鸣、大明山、十万大山。

材用。

石灰树 牛筋木

*S. folgneri* (Schneid.) Rehd

桂林、临桂、灵川、兴安、全州、龙胜、阳朔、荔浦、永福、大苗山、武鸣。

木材可制秤杆木。果可酿酒。

圆果花楸

*S. globosa* Yü et Tsai

南部。

疣果花楸

*S. granulosa* (Bert.) Rehd.

荔浦、龙胜、灌阳、大瑶山、大苗山、德保、上思。

果可食。

江南花楸

*S. hemsleyi* (Schneid.) Rehd.

临桂、资源、龙胜、贺县、大苗山、大瑶山、武鸣、大明山。

毛序花楸

*S. keissleri* (Schneid.) Rehd.

资源、龙胜、全州、贺县、大明山、大瑶山、大苗山。

大果花楸

*S. megalocarpa* Rehd.

龙胜、全州、资源。

材用。果可食。

Sorbus-Spiraea

泡吹叶花楸

*S. meliosmifolia* Rehd.

兴安。

滇缅花楸

*S. thomsonii* (King) Rehd.

大苗山、大瑶山、平南、上林。

华西花楸 饭香木

*S. wilsoniana* Schneid.

资源、兴安。

长果花楸

*S. zahlbruckneri* Schneid.

桂北。

绣球绣线菊 珍珠梅

*Spiraea blumei* G.Don

桂林、临桂。

绿化。叶可代茶。

麻叶绣线菊 麻叶绣球

*S. cantoniensis* Lour.

桂林、富川。

庭园绿化，枝叶治疥癩。

中华绣线菊

*S. chinensis* Maxim.

桂林、临桂、灵川、全州、柳州。

枝叶洗疮疥。庭园绿化。

狭叶绣线菊

*S. japonica* L.f.

*var. acuminata* Fr.

大苗山。

庭园绿化。

### 大绣线菊

*S. japonica* L.f.

var. *fortunei* (Pl.) Rehd.

田林、凌云、临桂、兴安、资源、龙胜、大苗山。

庭园绿化。

### 广西绣线菊

*S. kwangsiensis* Yü

临桂、灵山七分山、阳朔、罗城、乐业。

庭园绿化。

### 毛枝绣线菊

*S. martinii* Lévl.

百色、德保、乐业、凤山。

庭园绿化。

### 菱叶绣线菊

*S. vanhouttei* (Briot) Zabel

庭园绿化。

### 中华野珠兰 华空木

*Stephanandra chinensis* Hance

龙胜、全州。

### 毛萼红果树

*Stranvaesia amphidoxa* Schneid.

(*Photinia amphidoxa* (Schneid.) Rehd.)

龙胜、灌阳、资源、全州、大瑶山、大苗山、东兰、南丹。

### 湘桂毛萼红果树

*S. amphidoxa* Schneid.

var. *amphilea* (H.-M.) Yü

Stranvaesia-Dichapetalum

临桂、灵川、兴安、龙胜、资源、灌阳、罗城。

广西毛萼红果树

*S. amphidoxa* Schneid.

var. *kwangsiensis* Metc.

桂西。

红果树

*S. davidiana* Decne.

临桂、灌阳、龙胜、资源、兴安、上思。

矮红果树

*S. davidiana* Decne.

var. *undulata* (Decne.) R. et W.

龙胜、兴安猫儿山、资源、全州、灌阳、灵川、大瑶山、大苗山、凌云、乐业、上思。

滇南红果树

*S. oblanceolata* (R. et W.) Stapf

(*S. nussia* (Ham.) Decne.

var. *oblanceolata* R. et W.)

桂西北。

## 144 毒鼠子科 DICHAPETALACEAE

海南毒鼠子

*Dichapetalum longipetalum* (Turcz.) Engl.

(*D. hainanense* (Hance) Engl.)

十万大山、宁明。

治血吸虫病。

145 蜡 梅 科 CALYCANTHACEAE -

山蜡梅 鸡卵果、牛柳铃

*Chimonanthus nitens* Oliver

德保、阳朔。

\*蜡梅·

*C. praecox* Link

(*Meratia praecox* R. et W.)

栽培花树。

花解暑生津；治心烦口渴，气郁胸闷；又用花生油浸剂，可治烫伤，根、叶理气止痛，散寒解毒；治跌打，腰痛，风湿麻木，风寒感冒，刀伤出血。花又可提取芳香油，是很好的庭园绿化植物。

146 含 羞 草 科 MIMOSACEAE

沙先茶

*Acacia caesia* W. et A.

桂西北。

\*儿茶

*A. catechu* Willd.

枝、干浸膏即“儿茶”，清热生津，化痰，治痰热咳嗽，口渴，外用定痛，生肌收敛，止血；治湿疮，口疮，痔疮，牙疳，下疳。树皮可提取栲胶和染料。

\*台湾相思

*A. confusa* Merr.

(*A. richii* A. Gray)

桂南较多，柳州、桂林亦有栽培。

生长迅速，耐干旱，为荒山造林和水土保持的良好树种，又可作

公路树和行道树。材质坚硬，可作车轮、桨橹和农具等用。树皮可提制栲胶。花含芳香油，鲜花浸膏可作调香原料。种子油可点灯，制肥皂。

\*澳洲金合欢

*A. decurrens* Willd.

var. *mollis* Lindl.

南宁、桂林、柳州。

树胶可代阿拉伯胶。树皮可提制栲胶。

阔叶金合欢

*A. delavayi* Fr.

隆林。

\*金合欢 鸭皂树

*A. farnesiana* (L.) Willd.

北流、宁明、桂林等地有栽培。

树胶可供制胶水、制药、墨水等用。花含芳香油，可调制高级香精。树皮、根皮、果荚可提制栲胶。木材坚硬，可作贵重器具材。常栽作绿篱。

羽叶金合欢 蛇藤

*A. pennata* (L.) Willd.

博白、梧州、武鸣、扶绥、龙州、靖西、隆林。

木材可作雨伞柄用材。

小金合欢

*A. sinuata* (Lour.) Merr.

宁明、平果、百色、贺县、大瑶山、桂林、龙胜、兴安。

全株散血解热；治风湿骨痛，痧症，疥疮。

海红豆 孔雀豆

*Adenanthera pavonina* L.

北流、梧州、邕宁、龙州、百色、凌云、乐业、宜山、永福。材质坚硬耐腐，可作船材、油榨、支柱、建筑和箱材。心材可提红色染料。庭园绿化树种。种子和硼砂混合研碎，是一种良好的胶料；种皮红色，可作装饰品。

### 蒙自合欢

*Albizzia bracteata* Dunn

红水河流域。

### 楹树

*A. chinensis* (Osbeck) Merr.

(*A. stipulata* (Roxb.) Boiv.)

区内各地，以桂南为多。

生长迅速，枝叶茂密，耐旱耐瘠，适作荒山造林树种，又可作公路树。树皮可提制栲胶，又可毒鱼。木材色泽美丽，但质软，耐朽力弱，宜作室内载荷小的用材和箱板、家具材。树叶可作绿肥。

### 天香藤

*A. corniculata* (Lour.) Druce

(*A. millettii* Benth.)

十万大山、大瑶山、临桂、恭城。

### \*南洋楹

*A. falcata* (L.) Baker ex Merr.

南宁。

速生树种，喜湿润粘土，落叶很多，可增加土壤腐植质，改良土壤，但树龄不长。

### 合欢

*A. julibrissin* Durazz.

凌云、桂林、南宁、梧州、玉林等地。

树皮安神解郁，活血止痛，续筋驳骨，驱虫；治忧郁失眠，痈疽

## Albizia

疮肿，骨折损伤，肺痛。花解郁宁心，开胃利气；治心烦失眠，抑郁不舒。树皮和叶可提制栲胶。木材经久耐用，可作上等家具用材。韧皮纤维可作人造棉原料。种子可榨油。生长速，耐瘠耐旱，可作荒山造林先锋树种，亦可栽作行道树和庭园树。

### 山合欢

*A. kalkora (Roxb.) Prain*

桂林、柳州、梧州、南宁、百色、河池等地区。

树皮安神和血，养肝明目；治失眠，夜盲，精神失常，风湿骨痛。树皮可提制栲胶。韧皮纤维为人造棉和造纸原料。种子可榨油。生长速，耐旱耐瘠，可作荒山造林先锋树种。木材可作柱材、坑木等，亦可作农具、器具和车床木件。

### 大叶合欢 缅甸合欢

*A. lebbek (L.) Benth.*

梧州、南宁、柳州等地区，靖西、德保、田阳等地。

生长速，枝叶茂密，为良好行道树和庭园绿化树木。木材硬重，有光泽和斑纹，耐朽，适作房屋、家具、耕犁、油榨、板车、车桶、船艇、木刻、网球拍柄等用材。树皮可提制栲胶。叶和莢可作饲料。

### 光叶合欢

*A. meyeri Richer*

(*A. lucida Benth.*)

南宁、龙州、德保。

### 香合欢

*A. odoratissima (L.f.) Benth.*

武鸣、大新、宁明、龙州、那坡、田阳、百色、都安、东兰。

木材坚硬致密，特别适于制造车轮、油榨和家具。树皮可提制栲胶。

### 高合欢☆ 菲律宾合欢、黄豆树

*A. procera (Roxb.) Benth.*

桂南。

生长速，耐旱，能产大量树脂。材质坚硬，耐朽，可作车轮、农具、枕木、桥梁、支柱等用材。可作公路树。

### 皂合欢

*A. saponaria* (Lour.) Bl.

桂西北。

### 鼎湖合欢

*A. turgida* (Merr.) Merr.

(*Pithecolobium turgidum* Merr.,

*Albizzia croizatiana* Metc.,

*Paralbizzia turgidum* Kosterm.)

陆川、十万大山、大新、龙州、靖西、那坡、平果、凌云、乐业、大瑶山。

### 榼藤子 眼镜豆、过江龙

*Entada phaseoloides* (L.) Merr.

容县、平南、博白、贵县、十万大山、邕宁、武鸣、宁明、龙州、凌云、乐业、大瑶山。

种子、树皮、根皮有毒，种子、树皮含皂甙，可代肥皂。根皮、树皮含氢氰酸。树皮浸液有催吐、下泻作用，有强烈的刺激性，误入眼中可引起结膜炎。藤祛风湿，通经络，活血散瘀；治风湿性关节痛，四肢麻木，跌打损伤，骨折。种子含淀粉和脂肪油，经处理后可食。韧皮纤维可制麻袋，织细麻布，亦为人造棉和造纸原料。

### 银合欢

*Leucaena glauca* (L.) Benth.

桂林、临桂、梧州、田东。常为栽培。

耐干旱瘠薄，萌芽性强，易繁殖，为荒山造林树种。木材为良好薪炭材。树皮可提制栲胶。树皮浸出液可杀虫。

Mimosa-Pithecellobium

\*无刺含羞草

*Mimosa invisa* Mast.

var. *inermis* Benth.

绿肥、保土、覆盖作物。全株有毒，家畜误食，可中毒致死。

含羞草

*M. pudica* L.

区内各地，桂东北较少。

全草散瘀止痛，安神镇静，清热利水；治神经衰弱失眠，劳伤咯血，跌打损伤，尿路结石，肠胃炎，结膜炎。

围涎树 猴耳环

*Pithecellobium clypearia* Benth.

区内各地。

叶凉血，消炎；治子宫脱垂，疮疖。树皮可提制栲胶。木材可作箱板等用材。紫胶虫寄主植物。

牛蹄豆

*P. dulce* (Roxb.) Benth.

龙州。

木材心材红褐，质硬而脆，耐朽，可作箱板和一般建筑用材，树皮可提制栲胶和黄色染料。紫胶虫寄主植物。

亮叶围涎树 亮叶猴耳环

*P. lucidum* Benth.

区内各地。

枝、叶祛风消肿；治风湿痛，跌打，烫火伤。树皮可提制栲胶。木材可作箱板等用材。紫胶虫寄主植物。

两广围涎树 两广猴耳环

*P. utile* Chun et How

大瑶山、平南、十万大山。

147 苏木科 CAESALPINIACEAE

\*白花羊蹄甲

*Bauhinia acuminata* L.

行道或庭园绿化树。

红茸毛羊蹄甲 火索藤

*B. aurea* Lévl.

河池、博白、陆川。

\*红花羊蹄甲

*B. blakeana* Dunn

行道或庭园绿化树。木材可作家具等用材。

龙须藤 九龙藤、羊蹄藤

*B. championi* Benth.

(*B. championi* Benth.

*var. acutifolia* L.Chen,

*B. hunanensis* H.-M.)

区内各地，以桂林、柳州、河池、南宁地区为多。

藤和根活血散瘀，驱风止痛，镇静止痒；治风湿关节炎，跌打损伤，腰腿痛，小儿疳积，心胃气痛，湿疹。根和茎皮可提制栲胶。藤可供捆扎木筏、竹筏、鱼帘等用，又可作编织材料。石山绿化植物。

深裂羊蹄甲 首冠藤

*B. corymbosa* Roxb.

十万大山、龙州、凌云、乐业、大瑶山、大苗山、临桂、灵川。  
叶去毒，洗疮。

Bauhinia

马鞍叶羊蹄甲

*B. faberi* Oliv.

(*B. densiflora* Fr.)

百色、河池两地区、扶绥、宾阳等地。

根安神止痛；治筋骨疼痛，心悸失眠，盗汗，遗精，尿频。叶润肺，清热利湿，去腐生肌；治百日咳，天泡疮，顽癣，皮肤湿毒，烫火伤，痈肿。

囊萼羊蹄甲

*B. genuflexa* Craib

(*B. henryi* Craib)

龙州、罗城。

湖北羊蹄甲☆ 鄂羊蹄甲

*B. hupehana* Craib

凌云、天峨、东兰、罗城、大苗山、大瑶山、兴安、临桂。

根治膀胱疝气，睾丸肿痛，肾囊风痒；腰痛。韧皮纤维为人造棉、造纸原料。

绸缎木

*B. kerrii* Gagn.

龙州、梧州。

韧皮纤维可织麻袋、草鞋。

粤羊蹄甲

*B. kwangtungensis* Merr.

根可提制栲胶。韧皮纤维可织麻袋。

白枝羊蹄甲 紫羊蹄甲

*B. laui* Merr.

那坡。

\*羊蹄甲

**B. purpurea** L.

桂林、梧州等地。

行道和庭园绿化树。树皮和花、根治烫伤，脓疮。嫩叶汁液或粉末治咳嗽。根皮有毒。根和树皮可提制栲胶。韧皮纤维可织麻袋。叶可作饲料。木材可作农具细工、工艺品用材。花芽可腌制供食用。

红毛羊蹄甲

**B. pyrrhoclada** Drake

武鸣、大新、龙州、靖西、田林、凌云、天峨、东兰。

根通经活血；治跌打。茎、叶祛风；治小儿惊风。叶可作马饲料。

菱果羊蹄甲

**B. subrhombicarpa** Merr.

凌云。

全缘羊蹄甲☆ 越南羊蹄甲

**B. touranensis** Gagn.

凌云、乐业。

\*红花紫荆 红花羊蹄甲

**B. variegata** L.

桂林、柳州、南宁、北流等地。

行道和庭园绿化树种。根皮治消化不良。花、根治疮。树皮可提制栲胶。木材坚硬似乌木，可作农具等用材。叶可作“雪茄烟”的外皮。蜜源植物。花、芽、嫩叶和幼果均可作蔬菜。

夏花云实

**Caesalpinia aestivalis** Chun et How

罗城、南丹。

Caesalpinia

广西云实

*C. caesia* H.-M.

刺果苏木 大托叶云实

*C. crista* L.

合浦、博白、南宁、龙州。

叶祛瘀止痛，清热解毒；治肝功能失调，急慢性胃炎，胃溃疡，痈疮疖肿。可作绿篱。树皮可提制栲胶。种子可榨油。

大叶云实

*C. magnifoliolata* Metc.

十万大山、大瑶山、巴马、德保、那坡、凌云。

小叶云实

*C. milletii* Hk. et Arn.

十万大山、临桂。

根治胃病，消化不良。

南蛇簕 喙莢云实

*C. minax* Hance

区内各地。

根、叶清热解毒、去瘀消肿；治跌打，风湿骨痛，痈疮疖肿，诸骨哽喉，风热感冒。种子即苦石莲子，泻火清暑，解毒，开胃进食；治胃肠炎，痢疾，膀胱炎，梦遗。常栽在村边园圃作绿篱。

假老虎簕 华南云实

*C. nuga* (L.) Ait.

(*C. kwangtungensis* Merr.)

十万大山、上林、大新、宁明、龙州、靖西、田林、河池、罗城、临桂、龙胜等地。

根治跌打，筋骨痛，又为利尿剂。

\*金凤花 洋金凤

*C. pulcherrima* (L.) Sm.

庭园绿化植物。

苏木

*C. sappan* L.

陆川、桂平、南宁、大新、凭祥、龙州、田阳、田东、隆林等地。

心材活血散瘀，通经止痛；治产后流血过多，经闭腹痛，跌打，

痈疮肿毒，肠炎，痢疾。心材含红色染料。根含黄色染料。边材不易扭裂，为制小提琴弓的良材。枝材除含红色染料外，尚含单宁和没食子酸。耐旱，可为干旱地区的先锋造林树种。

云实

*C. sepiaria* Roxb.

区内各地。

根散寒发表；治风寒感冒，麻疹不出，疝气。种子止痢截疟；治

痢疾，疟疾。润滑油。果皮、树皮可提制栲胶。绿篱植物。

狭翼云实

*C. stenoptera* Merr.

龙州。

鸡嘴簕

*C. tsoongii* Merr.

邕宁、大新、宁明、天等、田阳、乐业、巴马、东兰。

茎、叶治痢疾。

春云实

*C. vernalis* Champ.

瑶山云实

*C. yaoshanensis* Chun

大瑶山、凌云。

Cassia

\*番泻叶 狹叶番泻叶

*Cassia angustifolia* Vahl

叶消积滞，通大便；治食物积滞，胸腹胀满，大便不通。

\*腊肠树

*C. fistula* L.

桂林。

根、树皮、果瓤为泻药。又为烟草香料。树皮可提制栲胶，木材硬重、耐朽、不易加工，可作支柱、桥梁、车辆、农具等用材。亦为美丽的庭园绿化树种。

\*光叶决明

*C. laevigata* Willd.

在危地马拉有用本种种子作咖啡的代用品。

山扁豆 望江南、野皂角

*C. mimosoides* L.

区内各地。

全草清热解毒，利尿通淋，消积退肿；治水肿淋症，小儿疳积，蛇伤，夜盲，黄疸。根可治痢疾和胃痉挛。叶富含氮素，易腐，为良好绿肥，水土保持和覆盖植物。嫩茎、叶可代茶。

大叶山扁豆

*C. mimosoides* L.

var. *wallichiana* DC

(*C. leschenaultiana* DC.)

容县、邕宁、马山、东兰、大苗山、柳州、鹿寨、恭城、临桂、桂林。

良好绿肥和水土保持、覆盖植物。嫩茎、叶可代茶。

望江南 野扁豆

*C. occidentalis* L.

区内各地。

种子有毒，含毒蛋白和大黄泻素，中毒重者可致死。入药，全草或种子清热解毒，明目，通便；治高血压头痛，便秘，结膜炎，蛇伤，哮喘，湿疹。绿肥植物。全草可提制栲胶。

\*铁刀木

*C. siamea* Lam.

合浦、南宁、崇左、凭祥、龙州、桂林。

常绿，叶茂花美，常栽作道路树、庭园绿化树。生长快，材质坚硬，耐水，不受虫蛀，可作上等家具和美术、乐器用材。树皮、荚果可提制栲胶。良好薪炭材。

槐叶决明 江芒决明

*C. sophera* L.

梧州、龙州、靖西、柳州、临桂等地。

种子解热；治眼疾，腹痛，泻痢。根强壮利尿。苗叶可作酒曲。

嫩叶、嫩莢可供食用。嫩叶可代茶。

\*黄槐

*C. surattensis* Burm.f.

(*C. glauca* Lam.)

玉林、梧州、南宁、武鸣、宁明、桂林、临桂等地。

常栽作路树、绿篱树和用于庭园绿化。木材坚重，可作家具、农具和一般用材。叶清凉，润肺燥。

决明 假绿豆、草决明、枕头子、夜笠草

*C. tora* L.

区内各地。

种子或全草清肝明目，轻泻，解毒止痛；治胃痛，胁痛，肝炎，高血压，结膜炎，便秘，皮肤搔痒，毒蛇咬伤，小儿疳积。种子含蓝色染料。幼苗、叶和嫩果可食。

Cercis-Gleditsia

\*紫荆

*Cercis chinensis* Bunge

桂林、田林、乐业等地。

树皮清热解毒，活血行气；治产后血气痛，疔疮肿毒，喉痹；花治风湿筋骨痛。常栽作庭园绿化树。

广西紫荆

*C. chuniana* Metc.

大苗山、全州、灌阳、兴安。

两广紫荆

*C. liangkwangensis* Chun

全州。

\*红花楹 凤凰木、火树

*Delonix regia* (Boj.) Raf.

龙州、宁明、南宁、百色、梧州等地。

为热带著名观赏树种之一，常栽作道路树。树脂能溶于水，供工业用。树皮可提制栲胶。木材轻软，易加工，有弹性，可用作造纸、火柴杆、盒和家具用材。

格木

*Erythrophloeum fordii* Oliv.

浦北、合浦、东兴、陆川、博白、玉林、藤县、岑溪、武鸣、龙州、靖西、桂林。

木材材质坚重，为优良木材，可作建筑、造船、车辆、家具等用。

种子和树皮有毒，含强心甙。

华南皂莢

*Gleditsia fera* (Lour.) Merr.

苍梧、武鸣、马山、临桂、全州、桂林。

豆莢、种子、树皮和树叶有毒，含皂素等。可作农药杀虫；又可

供洗涤用。木材可作家具用材。

### 大刺皂莢

*G. macracantha* Desf.

桂林。

豆莢、种子、树皮和树叶有毒，含皂素等，可作农药杀虫；又可供洗涤用。木材可作家具用材。

### 猪牙皂莢 牙皂

*G. officinalis* Hemsl.

阳朔。

果开窍祛痰，催吐；治中风口噤，喉痹；外治疥癬肿毒。

### 皂莢 皂角

*G. sinensis* Lam.

(*G. horrida* Willd.)

恭城、兴安、龙胜、临桂、桂林、融安、平南、博白、北流、富川、龙州、那坡。

豆莢、种子、树叶和树皮有毒，含皂素等。果(皂莢)、种子(皂角子)开窍，祛痰，拔毒，溃坚；治中风口噤，急性喉痹，痰喘，瘰疬，皮癬，大便不通。皂角刺治恶疮癩疥，痈疽肿毒，乳痈，通乳汁，下胞衣。作农药可杀虫。莢可代肥皂用，又是碳酸钾原料。种子油可制肥皂、润滑油。木材坚硬，可作车辆、家具用材。

### 肥皂莢

*Gymnocladus chinensis* Baill.

兴安、田林、大瑶山。

豆莢、种子有毒，含皂素等，可代皂洗衣。入药，止咳祛痰；治咳嗽，风湿，痢疾，便血，疮癩肿毒。种子油可供油漆工业用。

### 仪花 麻轧木、单刀根

*Lysidice rhodostegia* Hance

Mezoneurum-Sindora

容县、南宁、大新、龙州、那坡、田林、田阳、百色、隆林、凌云、乐业、都安、天峨、来宾。

根、茎、叶有小毒，散瘀消肿，止痛止血；治跌打，骨折，风湿关节炎，外伤出血。韧皮纤维可代麻。种子含淀粉。木材坚重，为优良用材。花美丽，为石山造林、道路和庭园绿化树种。

见雪飞

**Mezoneurum sinense Hemsl.**

龙州、天等、那坡、百色。

\*缅茄

**Pahudia xylocarpa Kurz**

合浦、南宁。

种子可供雕刻用。

银珠

**Peltophorum tonkinensis (Pierre) Gagn.**

南宁(栽培)、宁明。

老虎刺 倒钩藤、黄牛筋

**Pterolobium punctatum Hemsl.**

邕宁、大新、龙州、靖西、百色、隆林、凌云、乐业、凤山、东兰、河池、阳朔、临桂、桂林、兴安、富川等地。

枝叶治疗疮。

火焰花☆ 嘎梅马、唛坚(均壮音)、无忧花

**Saraca chinensis Merr. et Chun, ms.**

扶绥、宁明、凭祥、龙州、靖西、那坡、田阳、百色等地。  
树皮治风湿，月经过多。

\*海滨油楠

**Sindora maritima Pierre**

南宁。

木材为优良硬木。

\*越南油楠

*S. tonkinensis* A.Cheval.

南宁、桂林。

木材为优良硬木。

\*罗晃子 酸豆

*Tamarindus indica* L.

桂南。

果清热解暑，消食，驱虫；治暑热，食欲不振，妊娠呕吐，大便燥结，小儿疳积，蛔虫腹痛，疟疾。木材坚硬，可供建筑、车辆、农具、家具用材。果、嫩叶可食，亦可作饮水的清洁剂。果汁加糖水，为清凉饮料。种子可供烹调用。

米杠 米杠尚、科尚（均壮音）、四料木、砍头树

*Zenia insignis* Chun

宁明、大新、靖西、那坡、德保、平果、田东、田林、凌云、乐业、都安、巴马、阳朔、大瑶山。

萌芽力强，生长迅速。适作紫胶虫寄主，绿肥，猪的饲料树种。  
木材坚致，可作家具用材。

148 蝶 形 花 科 PAPILIONACEAE

鸡骨草

*Abrus cantoniensis* Hance

苍梧、梧州、平南、桂平、南宁、宁明、龙州等地。

种子有大毒。全草（除豆荚）清热利湿，舒肝止痛；治急、慢性肝炎，肝硬化腹水，胃痛，小便刺痛，风湿痛，跌打，蛇伤。

毛鸡骨草☆ 牛甘藤、毛相思子

*A. mollis* Hance

Abrus-Alysicarpus

苍梧、藤县、平南、北流、博白、横县。

全株消炎解毒；治乳疮，小儿疳积。

鸡眼子 相思藤、山甘草

*A. precatorius* L.

合浦、十万大山、陆川、桂平、邕宁、南宁、宁明、龙州。

根、叶、种子有毒，种子最毒，毒性剧烈。根、叶清热利尿；治支气管炎，咽喉肿痛，肝炎，胎毒。种子拔毒排脓，杀虫；外用治痈疮疥，虫毒。茎皮可制绳。种子可作装饰品。

合萌 水扬葵、水皂角

*Aeschynomene indica* L.

全州、兴安、临桂、桂林、南丹、都安、凌云、乐业、龙州、武鸣、南宁、贵县等地。

全草或茎髓清热利尿，解毒；治尿路感染，蛇伤，小儿疳积，疮疖，黄疸。茎髓轻软，耐水湿，是遮阳帽、救生圈、游泳带等浮水用具、瓶塞等原料。很好的绿肥植物。

柴胡叶链莢豆

*Alysicarpus bupleurifolius* (L.) DC.

龙州、百色、凌云、柳州、桂林。

链莢豆 假地豆

*A. vaginalis* (L.) DC.

(*A. nummulariaefolius* DC.)

邕宁、宁明、龙州、百色、田阳、贵县、富川、桂林。

很好的绿肥植物，亦可作家畜的饲料。全株治刀伤，骨折。

异叶链莢豆

*A. vaginalis* (L.) DC.

*var. diversifolius* Chun

龙州。

\*紫穗槐

*Amorpha fruticosa* L.

桂林、龙州、十万大山等地有栽培。

多年生优良绿肥。家畜饲料。茎皮可提取栲胶。种子油可作油漆、肥皂、润滑油等原料。果实含芳香油，可作调香原料。叶可作农药。枝条可织篮、筐等，又供编绳、造纸。蜜源植物。耐瘠，耐水湿和轻度盐碱土，能固氮，有改良土壤作用，能固沙保土，可作沙荒、荒山、盐碱地、低湿地、堤岸、铁路和公路两旁造林保土树种和农田防护林的下木。

满塘红

*Apios carnea* Benth.

龙胜、恭城、临桂、大苗山、容县。

种子油可制肥皂和润滑油。

土囷儿 痞子薯

*A. fortunei* Maxim.

兴安。

块根、种子散积理气，补脾解毒；治疝气，脾胃虚弱，无名肿毒，淋巴结核，蛇伤，痛经，百日咳。块根味甜，可提制淀粉。种子油可制肥皂和润滑油。

\*花生 落花生、地豆

*Arachis hypogaea* L.

区内各地。

油料作物。油麸为肥料和饲料。茎、叶可作绿肥。

\*黄耆

*Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge

根补气，固表止汗，生肌托疮，利尿消肿；治血气虚弱，中虚食少，气短无力，久泻脱肛，表虚自汗，血虚受风，关节酸痛麻

Astragalus-Campylotropis

木，痈疮不溃或溃久不敛，水肿等。

\*紫云英 红花草、翘摇

*A. sinicus* L.

区内各地。

绿肥作物。家畜饲料。亦可作蔬食。种子含脂肪油。全草清火解毒；治喉痛，疔疮，痔疮。

藤槐

*Bowringia callicarpa* Champ.

苍梧、梧州、贺县、大瑶山、横县、上林、宁明、十万大山。

茎皮可制绳。

\*木豆 三叶豆

*Cajanus flavus* DC.

(*C. cajan* (L.) Millsp.)

区内各地有少量栽培。

耐旱作物。种子供食用。常用作包点馅，叫豆蓉，又可制豆腐。

叶可作家畜饲料。紫胶虫优良寄主植物。绿肥作物。根解毒；治喉肿。茎皮可作编织原料。

\*毛蔓豆

*Calopogonium mucunoides* Desv.

(*Stenolobium brachycarpum* Benth.)

桂南栽培。

优良覆盖植物和绿肥作物。

滇南杭子梢 米过穴

*Campylotropis harmsii* Schindl.

桂西北。

韧皮纤维可制绳。树皮可提制栲胶。

杭子梢

*C. macrocarpa* (Bunge) Rehd.

藤县、德保、靖西、隆林。

绿肥。家畜饲料。枝条可供编织用具。韧皮纤维可制绳。蜜源植物。

三棱枝杭子梢

*C. trigonoclada* (Fr.) Schindl.

隆林。

根解热利湿，活血止血；治肠风下血，赤痢，高热，跌打，吹乳。

绒毛杭子梢

*C. velutina* (Dunn) Schindl.

田林、凌云、乐业。

根治赤白痢。

\*直生刀豆

*Canavalia ensiformis* (L.) DC.

桂南地区引种。

嫩莢、种子供食用。但种子有毒，须煮熟去皮，用清水浸去毒后方可食用。

\*刀豆

*C. gladiata* (Jacq.) DC.

区内各地。

嫩莢、种子供食用。但种子有毒，须煮熟去皮，用清水浸去毒后方可食用。果散瘀活血；治腰痛。莢壳治呃逆，牙疳。

\*海刀豆

*C. maritima* (Aubl.) Thou

百色。

可作绿肥和覆盖植物。

Canavalia-Christia

小刀豆

*C. microcarpa* (DC.) Piper

(*C. obtusifolia* auct., non DC.)

北流、梧州。

蔓草虫豆

*Cantharospermum scarabaeoides* (L.) Baill.

(*Atylosia scarabaeoides* (L.) Benth.)

梧州、富川、平乐、玉林、贵县、武鸣、宁明、龙州、百色、隆林。

叶健胃，利尿；治疳积；又治乳痛。

锦鸡儿 白藓皮、雀儿花根

*Caragana sinica* (Buc'hoz) Rehd.

(*C. chamlagu* Lam.)

资源、兴安、临桂、桂林、富川。

根补虚益损，健脾利湿；治病后虚弱，崩漏带下，黄疸，疖肿。

花可食。韧皮纤维可制绳。绿篱植物。

铺地蝙蝠草

*Christia obcordata* (Poir.) Bakh.f.

(*Hedysarum obcordatum* Poir.,

*Lourea obcordata* Desv.)

区内各地。

蝙蝠草 月见罗薹草

*C. vespertilionis* (L.f.) Bakh.f.

(*Hedysarum vespertilionis* L.f.,

*Lourea vespertilionis* Desv.)

武鸣、崇左、宁明、都安。

全草治肺结核，虫蛇咬伤，骨折。

翅荚香槐

*Cladrastis platycarpa* (Maxim.) Mak.

全州、临桂、桂林、大苗山、南丹、隆林、武鸣、大新、合浦。

石灰岩石山速生树种。叶可作马饲料。

香槐

*C. wilsonii* Takeda

桂林、龙胜、大苗山。

石山绿化树种。

三叶蝶豆 三叶蝴蝶花豆

*Clitoria mariana* L.

隆林。

巴豆藤

*Craspedolobium schochii* Harms

桂西北。

翅托叶猪屎豆(注)

*Crotalaria alata* Ham. ex Roxb.

(*C. sagitticaulis* Wall.,

*C. bialata* Roxb.)

龙州、田林、百色、隆林、天峨。

响铃豆

*C. albida* Heyne ex Roth.

区内各地。

叶治黄疸，乳疮，疳积。

---

注：本属大多数种类可作绿肥。

Crotalaria

\*三尖叶猪屎豆

*C. anagyroides* H. B. et K.

桂林、南宁等地。

大猪屎青

*C. assamica* Benth.

龙州、平果、靖西、德保、那坡、百色、天峨、大瑶山、平乐。  
叶止血，驱虫；治跌打，刀伤，风湿骨痛，小儿疳积。

长萼猪屎豆

*C. calycina* Schrank

(*C. stricta* Roxb.,

*C. roxburghiana* DC.)

宁明、田阳、百色、乐业、临桂。  
全株治小儿疳积。

华野百合

*C. chinensis* L.

容县、邕宁。

假地蓝

*C. ferruginea* (Grah.) Benth.

(*C. rufescens* Fr.,

*C. bodinieri* Lévl.)

区内各地。

全草补肾消炎，平喘，止咳。治目眩耳鸣，遗精，慢性肾炎，膀胱炎，慢性支气管炎，扁桃腺炎，淋巴腺炎，肾结石，疔疮，用鲜叶捣烂外敷。根、茎作农药，又可灭蛆、子孓。又为绿肥、牧草、水土保持植物。

\*太阳麻 桤麻

*C. juncea* L.

(*C. sericea* Willd.,

*C. tenuifolia* Roxb.)

绿肥作物。韧皮纤维可作各种麻织品、船缆、鱼网和造纸等原料。种子可作牛饲料。种子清血解毒；治癣疥。

线叶猪屎豆

*C. linifolia* L.

(*C. caespitosa* Roxb.,

*C. stenophylla* Vog.,

*C. taiwaniana* Matsum.,

*C. chinensis* Hance)

区内各地。

全草清热解毒，理气消积；治毒疮，癣疥，腹痛。

猪屎豆

*C. mucronata* Desv.

(*C. striata* DC, *C. saltiana* auctt., non Andr.)

陆川、北流、贵县、桂平、蒙山、邕宁、宁明、巴马、百色、柳州、桂林等地。

枝、叶是很有价值的绿肥，亦可作粗饲料。韧皮纤维可织麻袋、制绳。种子补肝益肾，明目去翳；治神经衰弱，遗精早泄，遗尿，白带，眼目昏花。

粗毛猪屎豆☆ 庇古猪屎豆

*C. peguana* Benth.

隆林。

野百合 农吉利

*C. sessiliflora* L.

### Crotalaria-Dalbergia

桂林、临桂、兴安、罗城、大瑶山、苍梧。

饲料和牧草。全草抗癌，滋阴润燥，解热通淋，补虚；治皮肤癌，

子宫颈癌，痢疾，热淋，久咳，病后虚弱。种子治小儿疳积。

#### 四棱猪屎豆

*C. tetragona Roxb.*

(*C. esquirolii Lévl.*)

百色、乐业、隆林。

#### \*光萼猪屎豆 苦罗豆

*C. usaramoensis Baker f.*

适应性和繁殖力均较强，为良好的覆盖和绿肥植物。韧皮纤维可制绳、织麻袋。

#### 南岭黄檀(注)

*Dalbergia balansae Prain*

区内各地。

紫胶虫寄主树种。韧皮纤维可代麻。常栽作风景树和荫蔽树。

#### 粤黄檀

*D. benthami Prain*

上思、百色。

#### 黔黄藤

*D. cavaleriei Lévl.*

大瑶山、罗城、隆林。

#### \*海南黄檀

*D. hainanensis Merr. et Chun*

桂林有引种。

紫胶虫寄主树。材质坚硬，可供建筑、板料、家具、扁担、雕刻等用材。

---

注：本属乔木种类，多是良好材用树种。

藤黄檀 大香藤

**D. hancei Benth.**

区内各地。

韧皮纤维可制绳，织麻袋或麻布。树皮可提制栲胶。

黄檀

**D. hupeana Hance**

隆林、田林、凌云、乐业、南丹、龙州、大苗山、兴安、临桂、桂林。

木材良好，坚固，可制载重和耐冲撞器物，如枪柄、车轴、油榨、滑轮、农具等。紫胶虫寄主树种。茎、叶杀虫。

含羞草叶黄檀

**D. mimosoides Fr.**

容县、上思。

桂西黄檀☆

**D. munghoi Chun, ined.**

十万大山、德保、凌云、乐业、隆林。

紫胶虫寄主树种。

\*钝叶黄檀 牛肋巴

**D. obtusifolia Prain**

桂西、桂南有引种。

紫胶虫优良寄主植物。

\*降香黄檀

**D. odorifera T.Chen**

桂林有引种。

木材为制优质家具良材；又可蒸馏降香油，是香料的定香剂。根部心材叫降香，为良好的镇痛剂。紫胶虫寄主树种。

Dalbergia-Derris

羽叶黄檀

*D. pinnata* (Lour.) Prain  
(*D. tamarindifolia* Roxb.)

十万大山、龙州、凌云、乐业、隆林、东兰、天峨。

多体蕊黄檀

*D. polyadelpha* Prain

那坡、百色、田林、隆林。

紫胶虫寄主树种。

多裂黄檀

*D. rimosa* Roxb.

博白、德保。

紫胶虫寄主树种。

\*思茅黄檀 紫梗树、秧青

*D. szemaoensis* Prain

桂南、桂西有引种。

紫胶虫寄主树种。

桂粤黄檀☆

*D. tonkinensis* Prain

桂西南。

滇黔黄檀

*D. yunnanensis* Fr.

德保、那坡、田林、西林、隆林、凌云。

紫胶虫寄主树种。韧皮纤维可制绳索。

白花鱼藤(注)

*Derris alborubra* Hemsl.

合浦、梧州、龙州。

注：本属植物多含鱼藤酮，为优良的农药，有杀虫和毒鱼的功效。

黔鱼藤

*D. cavaleriei* Gagn.

隆林、乐业。

\*毛鱼藤

*D. elliptica* (Wall.) Benth

柳州、南宁等地。

很好的杀虫植物。根液有促进植物生长的功效。根治疥疮湿疹。

毛果鱼藤

*D. eriocarpa* How

南宁、上林、龙州、那坡、隆林、罗城。

锈毛鱼藤 锈叶鱼藤、荔枝藤、老荆藤

*D. ferruginea* Benth.

十万大山。

很好的杀虫植物，有效成分含量高。

揭阳鱼藤☆

*D. fordii* Oliv.

全州、临桂、桂林、天峨、都安。

可作绿肥。

亮叶揭阳鱼藤☆

*D. fordii* Oliv.

var. *lucida* How

临桂、桂林、环江、柳州、凤山、龙州。

可作绿肥。

粉叶鱼藤

*D. glauca* Merr. et Chun

十万大山。

韧皮纤维可织麻布、麻袋、编绳和制人造棉。

Derris-Desmodium

肇庆鱼藤☆

*D. hancei* Hemsl.

博白、扶绥。

根接骨；治跌打。

大叶鱼藤

*D. latifolia* <sup>\*</sup>Prain

陆川、大明山、龙州、那坡。

边英鱼藤

*D. marginata* (Roxb.) <sup>~</sup>Benth.

桂林、临桂、凤山、凌云、乐业、隆林。

较好的杀虫植物。根粉液防治稻飞虱、浮尘子、菜青虫、桑金龟子及森林食叶虫等害虫。

密锥花鱼藤

*D. thyrsiflora* Benth.

十万大山。

黔桂鱼藤

*D. tonkinensis* Gagn.

桂西南。

大叶黔桂鱼藤

*D. tonkinensis* Gagn.

*var. compacta* Gagn.

龙州。

毛排钱草

*Desmodium blandum* Van Meeuwen

(*Phyllodium elegans* Desv.,

*D. elegans* (Lour.) Benth.)

区内各地，以桂西、桂南较多。

根、叶清热解表，活血散瘀；治风热感冒，疟疾，肝脾肿大，风湿骨痛，跌打瘀肿，血崩。

山蚂蝗 小槐花、拿身草、粘身草、米增草

*D. caudatum* (Thb.) DC.

(*Hedysarum caudatum* Thb.,

*D. laburnifolium* (Poir.) DC.,

*Catenaria caudata* (Thb) Schindl.)

区内各地。

根或全株清热解毒，消食止痛，透疹，杀虫；治胃痛，胃炎，肠炎腹泻，胃及十二指肠溃疡，小儿疳积，疹出不透，感冒发热，腮腺炎，淋巴腺炎，蛇伤。叶捣烂外敷，治疮疖。花调经；治月经不调。全草可灭蛆。

假山绿豆 宽卵叶山蚂蝗

*D. fallax* Schindl.

全州。

全草清热解表；治风热感冒。

大叶山绿豆☆ 大叶山蚂蝗

*D. gangeticum* (L.) DC.

梧州、南宁、武鸣、龙州、田阳、百色、隆林、河池。

舞草

*D. gyrans* (L.) DC.

(*Codariocalyx gyrans* (L.f.) Hassk.)

南宁、龙州、靖西、那坡、百色、田林、凌云、乐业、河池、巴马、天峨、龙胜、恭城、贺县。

圆叶舞草

*D. gyroides* (Roxb.) DC.

(*Codariocalyx gyroides* (Roxb.) Hassk.)

Desmodium

宁明、龙州、那坡、百色、田林、隆林、乐业、巴马、都安、天峨、河池、临桂、荔浦、昭平、容县。

异果山绿豆 假地豆

D. heterocarpum (L.) DC.

区内各地。

全株驳骨，解毒；治跌打骨折，蛇伤。韧皮纤维可造纸、制绳。

异叶山绿豆

D. heterophyllum (Willd.) DC.

恭城。

滇桂山绿豆☆

D. karensium Kurz

龙州。

广东山绿豆 广东排钱草

D. kwangtungensis Chun, ined.

十万大山。

大叶拿身草

D. laxiflorum DC.

贺县、大瑶山、龙州、德保、南丹。

疏花山绿豆

D. laxum DC.

(D. gardneri Benth.)

容县、苍梧、贺县、大瑶山、宁明、龙州、百色。

长叶排钱树

D. longipes Craib

(Phyllodium longipes (Craib) Schindl.)

博白、北流、贵县、岑溪、梧州、隆林。

铺地山绿豆 小叶三点金草、红藤

D. microphyllum (Thb.) DC.

(D. parvifolium (Spreng.) DC.)

区内各地。

全草解毒散瘀，消食，利尿；治蛇伤，黄疸，咳嗽，跌打，痈积，疥疮，痈疮溃疡。保土植物。

蔓茎葫芦茶

D. pseudotriquetrum DC.

(Pteroloma pseudotriquetrum Schindl.)

临桂、靖西、德保。

用途参阅葫芦茶。

排钱草 钱串木、燕子尾

D. pulchellum (L.) Benth.

(Phyllodium pulchellum (L.) Desv.)

区内各地。

全草清热解表，活血散瘀，治风热感冒，疟疾，跌打肿痛，风湿骨痛，肝脾肿大，赤白带下，血崩。

总序山绿豆☆ 总序山蚂蝗

D. racemosum DC.

兴安、龙胜、临桂、苍梧、大苗山、大瑶山、都安、凌云、田林、隆林。

保土植物。

显脉山绿豆 山地豆

D. reticulatum Champ.

隆林、苍梧等地。

全草去腐生肌；治刀伤。

Desmodium

饿蚂蝗 红掌草

*D. sambuense* (G Don) DC.

灌阳、兴安、龙胜、临桂、永福、阳朔、贺县、大苗山、大瑶山、德保等地。

叶可代茶。

长波叶山绿豆☆ 长波状叶山蚂蝗

*D. sequax* Wall.

恭城、昭平、大瑶山、隆林、那坡。

菱叶山绿豆☆ 波状叶山蚂蝗

*D. sinuatum* Bl.

龙胜、兴安、苍梧、太瑶山、环江、南丹、凤山、凌云、隆林、龙州、大新。

广东金钱草 金钱草

*D. styracifolium* (Osb.) Merr.

玉林、桂平、贵县、南宁、龙州。

全草平肝火，清湿热，利尿通淋；治肾炎浮肿，尿路感染，尿路结石，胆囊结石，黄疸肝炎，小儿疳积，荨麻疹。绿肥植物。

野蚂蝗 假木豆

*D. triangulare* (Retz.) Merr.

(*D. cephalotes* (Roxb.) W. et A)

梧州、贵县、大新、宁明、龙州、巴马、都安、河池、南丹、天峨、那坡、田林、隆林、百色。

根清热凉血，强筋壮骨，健脾利湿；治瘫痪，喉痛，腹泻，跌打内伤，骨折，吐血，咯血。绿肥、保土植物。马饲料。

三花山绿豆☆ 细叶野花生、三点金草

*D. triflorum* (L.) DC.

陆川、博白、玉林、平南、桂平、贵县、苍梧、昭平、大瑶山、横县、南宁、龙州、东兰、隆林。

全株治蛇伤。保土植物。

### 葫芦茶

**D. triquetrum (L.) DC.**

(*Pteroloma triquetrum* (L.) Benth.)

区内各地。

全草清热解毒，祛痰，消食，杀虫，利尿；治肝炎，支气管炎，消化不良，肾炎，细菌性痢疾，肠炎，慢性溃疡，风热感冒。全草作凉茶；煎剂或浸液能灭蝇蛆、孑孓。绿肥植物。

### 绒毛山绿豆☆ 绒毛叶山蚂蝗

**D. velutinum (Willd.) DC.**

南宁、宁明、龙州、那坡、百色、隆林。

### 长莢山绿豆 单叶拿身草

**D. zonatum Miq.**

龙州。

### \*扁豆 雪豆、蛾眉豆、白扁豆、蘿豆

**Dolichos lablab L.**

区内各地。

嫩莢供作蔬食。种子补脾胃，化暑湿，解毒；治脾胃虚弱，呕吐泄泻，暑湿内蕴，脘腹胀满，带下等，又解酒毒、河豚毒。

### 瑶山山黑豆

**Dumasia nitida Chun, ined**

大瑶山。

Dunbaria-Erythrina

山坡豆 山黄豆

*Dunbaria fusca* (Wall.) Kurz

岑溪、苍梧、平南和桂西。

根、叶健胃利尿；治黄疸，疳积。

长柄野扁豆 水芽豆

*D. podocarpa* Kurz

博白、容县、北流、平南、贵县、武鸣、龙州、靖西。

全株解毒，消肿痛；治咽喉炎。

圆叶野扁豆

*D. rotundifolia* (Lour.) Merr.

贺县、昭平、南宁。

鸡头薯 猪仔笠、雀脚珠

*Eriosema chinense* Vog.

区内各地。

块根化痰止咳，补肾，凉血，清热毒，活血消肿；治痢疾，伤风咳嗽，跌打损伤，湿热腹痛，热病烦渴。块根含淀粉，可供食用。

\*象牙红 龙芽花

*Erythrina corallodendron* L.

桂林、南宁等地。

树皮有麻醉镇静作用。材质柔软，可代软木。绿化树木。

刺桐 广东象牙红、海桐皮

*E. variegata* L.

*var. orientalis* (L.) Merr.

(*E. indica* L.)

博白、北流、南宁、武鸣、宁明、龙州、靖西、那坡、平果、凌

云、桂林等地。栽培或野生。

树皮祛风湿，通经络，驱虫；治风湿关节炎，小儿疳积，蛔虫。

绿篱树种。树皮可制绳，作饲料。

### 三小叶山豆根

*Euchresta trifoliolata* Merr.

贺县、全州。

### 土甘草 虾须草

*Fordia cauliflora* Hemsl.

苍梧、南宁、龙州、田阳、百色、隆林、东兰。

根、叶清热毒；治毒疮。

### \*黄豆 大豆、菽

*Glycine max* (L.) Merr.

(*Phaseolus max* L.,

*Dolichos soja* L.,

*G. gracilis* Skoortz)

区内各地。

重要油、粮作物，种子含蛋白质和脂肪，除供食用外，亦作豆酱、酱油、豆腐和工业用原料。种子油是主要食用油，亦是工业原料。茎、叶和油粕是肥料和饲料。茎皮可织麻袋。本种久经栽植，栽培品种很多，如大豆、黄豆、黑豆等。

### 深紫木蓝(注)

*Indigofera atropurpurea* Buch-Ham.

资源、兴安、龙胜、富川、柳州、东兰、田林、隆林、宁明。

### 野木蓝☆ 野蓝枝子

*I. bungeana* Steud.

全州、灌阳、恭城、临桂、桂林、河池、都安、天峨、凌云、隆

---

注：本属多数种类是绿肥、保土和改良土壤植物。

Indigofera

林。

全草生肌收口，止血消肿，清热利湿；治吐血，枪伤，刀伤，腹痛，痔疮，下肢溃疡，小儿口疮，无名肿毒，水泻。

尾叶木蓝

*I. caudata* Dunn

凌云。

庭藤

*I. decora* Lindl.

龙胜、临桂、贺县、百色、隆林、龙州。

假大青蓝

*I. galegoides* DC.

邕宁、宁明、龙州。

可提取染料。

毛木蓝

*I. hirsuta* L.

钦州、邕宁、凌云、凤山、南丹、桂林。

枝、叶去毒消肿；治疮疖。

黑叶木蓝

*I. nigrescens* Kurz

资源、兴安、龙胜、临桂、桂林、贺县、玉林、大苗山、天峨、百色。

广东木蓝☆

*I. parkesii* Craib

百色。

马棘 野蓝靛、野蓝枝子、狼牙草

*I. pseudotinctoria* Matsum.

临桂、桂林、河池、凌云、乐业、田林、南宁。

全株解毒，治疮毒，小儿食积，寒凉咳嗽，痔疮。可制蓝色染料。马饲料。

### 茸毛木蓝

*I. stachyoides* Lindl.

隆林、南丹。

根滋阴补肾，补气摄血；治便血，下痢日久体虚，气血两亏。

### 假蓝靛

*I. suffruticosa* Mill.

区内各地，多为栽培，以桂南、桂东为多。

可提取天然蓝靛。根清热解毒，消炎止痛；治咽喉炎，淋巴腺炎，腮腺炎，高热。又是良好绿肥。

### 木蓝 火蓝

*I. tinctoria* L.

苍梧、龙州、临桂。

常栽培作染料用。全株泻肝，散郁火，凉血解毒；治喉痛，疮疖。

### 三叶木蓝

*I. trifoliata* L.

玉林、柳州、阳朔、临桂。

根治喉痛。

### 尖叶木蓝

*I. zollingeriana* Miq.

梧州、昭平、永福、天峨、南宁、龙州、凌云、乐业。

### 长萼鸡眼草

*Kummerowia stipulacea* (Maxim) Mak.

巴马、临桂。

绿肥、饲料、水土保持植物。

Kummerowia-Lespedeza

鸡眼草 乌蝇翼、夜关门

*K. striata* (Thb.) Schindl.  
(*Lespedeza striata* H. et A.)

区内各地。

全草清热解毒，排脓生肌，消积滞；治肝郁疼痛，湿热黄疸，目赤肿痛，腰痛，腹泻，乳痛，疖肿，跌打损伤。绿肥、牧草、保土植物。

胡枝子

*Lespedeza bicolor* Turcz.

大苗山、龙胜等地。

用途参阅美丽胡枝子。

铁扫把 夜关门、蚊虫草

*L. cuneata* G. Don

(*L. sericea* Miq.)

桂林、柳州、梧州、南宁、百色等地区。

全草清热解毒，健脾消积，去湿杀虫；治痢疾腹泻，支气管炎，尿路结石，小儿疳积，遗尿，疝气，夜盲，白浊，白带，蛇伤。绿肥、保土、牧草植物。

大叶胡枝子

*L. davidi* Fr.

灌阳、恭城、兴安、灵川、临桂。

保土、绿肥植物。枝条可编筐篓。韧皮纤维为造纸、人造棉、麻袋、制绳等原料。

广东胡枝子

*L. fordii* Schindl.

柳州。

美丽胡枝子 把天门

*L. formosa* (Vog.) Koehne

桂林、柳州、梧州、玉林、南宁等地区。

鲜根活血散瘀，消肿止痛；治跌打肿痛，骨折，脱臼，风湿骨痛，腹痛，肺痈。花清热；治便血，肺热咳嗽。保土、覆盖、绿肥、牧草植物。

### 茸毛胡枝子

*L. tomentosa* (Thb.) Sieb. ex Maxim.

天峨。

根健脾补虚。治虚痨、虚肿。

### 细梗胡枝子

*L. virgata* (Thb.) DC.

临桂。

### 百脉根

*Lotus corniculata* L.

桂东北。

饲料植物。

### \*南苜蓿 黄花草子

*Medicago hispida* Gaertn.

桂林。

绿肥、牧草植物。嫩叶可作蔬菜。

### \*天蓝苜蓿

*M. lupulina* L.

桂林。

绿肥、牧草和饲料植物。

### 小苜蓿

*M. minima* Lamk.

隆林。

Medicago-Millettia

\*苜蓿 紫花苜蓿、紫苜蓿

*M. sativa* L.

桂林、柳州。

优良牧草和饲料植物。也是绿肥、蜜源植物。

小花草木犀 印度草木犀

*Melilotus indicus* (L.) All.

(*M. parviflora* Desf.)

隆林、天峨、河池。桂林有栽培。

覆盖和绿肥植物。全草清热解毒，敛阴止汗；治白口疮，虚汗，

皮肤搔痒。

银瓣崖豆藤

*Millettia argyraea* T.Chen

临桂、灵川、龙胜、兴安、全州、恭城、贺县、昭平、平南、容县、大瑶山、大苗山。

根可作农用杀虫剂。茎补血，行血；治跌打。

越南崖豆藤

*M. cochinchinensis* Gagn.

山鸡血藤 血见愁、马下消、香花崖豆藤

*M. dielsiana* Harms ex Diels

区内各地。

藤茎行血补血，舒筋活络；治风湿性关节炎，腰腿痛，贫血，闭经，遗精，胃痛。种子可杀虫。茎皮可作造纸原料，亦可代麻作绳索等。

异果崖豆藤

*M. heterocarpa* Chun ex T.Chen

全州、恭城、兴安、临桂、大瑶山、柳州、巴马、东兰、宁明、龙州、德保、田东、百色、田林、隆林、凌云。

根和种子可作农用杀虫剂。

**毛瓣崖豆藤**

**M. lasiopetala (Hay.) Merr.**

**(Derris lasiopetala Hay.,**

**M. obovata Gagn.)**

那坡、大瑶山。

根可作农用杀虫剂。

**亮叶崖豆藤 血凤藤**

**M. nitida Benth.**

十万大山、宁明、马山、靖西、凤山、大苗山、三江、永福、桂林、兴安、全州。

根可作农用杀虫剂。茎皮可作造纸、制绳原料。

**蛋果崖豆藤**

**M. oosperma Dunn**

容县、龙州、靖西、那坡、平果、百色、田林、凌云、乐业、隆林、都安、天峨、凤山、桂林、阳朔、贵县。

藤补血。种子可作农用杀虫剂。叶可作马饲料。

**厚果崖豆藤 厚果鸡血藤、冲天子、苦坛子**

**M. pachycarpa Benth.**

区内各地。

种子和根有毒，含鱼藤酮和鱼藤素，可作农用杀虫剂。种子消肿，杀虫；治疮疖。茎皮可作人造棉、造纸原料。

**海南崖豆藤 毛蕊鸡血藤**

**M. pachyloba Drake**

陆川、十万大山、大明山、龙州、那坡、百色、凌云、乐业、巴马、大瑶山、北流。

茎皮可代麻、制绳。

美花崖豆藤

*M. pulchra* (Colebr.) Kurz

容县、永福、临桂、兴安、天峨、隆林。

根、叶可作农用杀虫剂。

疏叶崖豆藤

*M. pulchra* (Colebr.) Kurz

*forma laxior* Dunn

临桂、柳州、凌云、南宁。

昆明鸡血藤 鸡血藤、网络鸡血藤

*M. reticulata* Benth.

区内各地。

根和树皮有毒，可作农用杀虫剂；种子和叶也可能有毒。入药，藤和根补血行血，通经活络，壮筋骨；治风湿骨痛，腰腿痛，贫血，遗精，阳萎，月经不调，白浊、白带。茎皮可供编织，作人造棉、造纸原料。花紫色至玫瑰红色，可供庭园绿化。

狭叶崖豆藤

*M. reticulata* Benth

*var. stenophylla* Merr. et Chun

融安。

广西崖豆藤☆ 无患子叶崖豆藤

*M. sapindifolia* T Chen

凌云、南丹。

实心崖豆藤

*M. solida* T Chen, ined.

乐业。

根补血行血。

美丽崖豆藤 牛大力

*M. speciosa* Champ.

钦州、玉林、梧州、南宁、河池、百色等地区。

根补虚润肺，强筋活络；治风湿骨痛，腰肌劳损，慢性肝炎，肺虚咳嗽。根含淀粉，可制代藕粉和酿酒；酒糟可作饲料。

虎崖豆藤 老虎豆、连珠豆

*M. tsui* Metc

北流、博白、苍梧、大瑶山、十万大山、宁明、靖西、凤山、平乐、临桂、桂林、龙胜、恭城。

根可作农用杀虫剂。韧皮纤维可代麻。

蚌壳千斤拔☆ 半灌木千斤拔、咳嗽草、百咳草

*Moghania fruticulosa* (Wall. ex Coll.) Wang et Tang  
(*Flemingia fruticulosa* Wall. ex Coll.)

恭城、阳朔、昭平、苍梧、藤县、平南、桂平、忻城、柳州、都安、东兰、天峨、隆林、百色、平果、宁明。

根治风湿痛，疮疥，咳嗽。

大叶千斤拔 钻地风、掏马桩、大力黄

*M. macrophylla* (Willd.) O Ktze

(*Flemingia macrophylla* Ktze ex Prain,

*F. prostrata* Roxb.)

区内各地。

根舒筋活络，强腰壮骨；治风湿骨痛，腰肌劳损，劳伤咳嗽，气虚脚肿，咽喉肿痛。作兽药，治猪脚软，牛挫伤，折骨，风湿，臌胀，痢疾，胃炎。

蔓性千斤拔

*M. philippinensis* (Merr. et Rolfe) H L Li

(*Flemingia philippinensis* Merr. et Rolfe,

*M. prostrata* Wang et Tang,

non *Flemingia prostrata* Roxb.)

Mucuna

区内各地。

根祛风除湿，强筋活血，消炎止痛；治风湿痹痛，跌打损伤，腰肌劳损，瘫痪，咽喉炎，劳伤久咳，肝炎，阳萎，头痛。

鸡血藤 白花油麻藤、血藤

*Mucuna birdwoodiana* Tutch.

区内各地。

藤补血行血，通经络，强筋骨；治贫血，白血球减少症，萎黄病，月经不调，瘫痪，腰腿痛。种子有毒，但含有淀粉。

黑血藤 黑肉风

*M. castanea* Merr.

十万大山、武鸣、宁明、龙州、田阳、梧州等地。

藤补血活血，通经，壮筋骨；治风湿痹痛，月经不调，贫血，萎黄病。

绢毛油麻藤

*M. championi* Benth.

临桂。

\*猫豆

*M. cochinchinensis* (Lour.) A Cheval.

桂林、临桂、梧州、北流、容县、南宁等地。

种子有毒，但经水泡处理后可食用。

海南黎豆

*M. hainanensis* Hay.

(*M. suberosa* Gagn)

桂东南。

刺毛黎豆

*M. pruriens* (L.) DC.

(*M. prurita* Wight)

隆林。

如被莢果上的刺毛所刺，可使皮肤肿痛。

### 黄毛黎豆

*M. venulosa* (Piper) Merr.

(*Stizolobium venulosum* Piper)

百色、田林。

### 喙顶红豆(注)

*O. apiculata* L.Chen

凌云、隆林。

### 长脐红豆

*O. balansae* Drake

(*O. elliptilimba* Merr. et Chun)

十万大山。

### 肥莢红豆

*O. fordiana* Oliv.

十万大山、昭平、大瑶山、南丹、宁明、龙州、靖西、那坡、百色、田林。

### 光叶红豆

*O. glaberrima* Wu

(*O. kwangsiensis* L.Chen)

苍梧、大瑶山、十万大山。

### 花榈木 花梨木

*O. henryi* Prain

全州、桂林、临桂、大苗山、罗城、田阳。

优良材用树种，木材可制上等家具。

---

注：本属树木一般供材用，也可供庭园绿化用。

Ormosia

红豆树

*O. hosiei* Hemsl. et Wils.

优良材用树种。种子镇痛；治心气痛。

韧荚红豆

*O. indurata* L.Chen

十万大山。

皮青木

*O. merrilliana* L.Chen

十万大山。

小叶红豆

*O. microphylla* Merr.

十万大山。

南宁红豆

*O. nanningensis* L.Chen

十万大山。

茸荚红豆

*O. pachycarpa* Champ. ex Benth.

河池、贵县。

菱荚红豆

*O. pachyptera* L.Chen

那坡。

海南红豆

*O. pinnata* (Lour.) Merr.

(*O. hainanensis* Gagn.)

合浦、陆川、龙州。

软荚红豆

*O. semicastrata* Hance

(*O. cathayensis* L.Chen)

苍梧、永福、大瑶山、荔浦。

韧皮纤维可作人造棉、编绳原料。

苍叶红豆

*O. semicastrata* Hance

*forma pallida* How

大瑶山、横县、十万大山、阳朔、永福、临桂、龙胜。

亮毛红豆

*O. sericeolucida* L.Chen

十万大山。

单叶红豆

*O. simplicifolia* Merr. et Chun ex L.Chen

桂西南。

木荚红豆

*O. xylocarpa* Chun ex L.Chen

(*O. polysperma* L.Chen)

十万大山、武鸣、平乐、永福、龙胜、全州、大苗山。

\*葛薯 凉薯、沙葛、豆薯、地瓜

*Pachyrhizus erosus* (L.) Urban

区内各地。

块根可生食或熟食，也可提取淀粉。种子有毒，可作农用杀虫剂，

治烟蚜、甘蔗蚜虫、竹铁甲虫成虫、黑守瓜、黄守瓜等。花解

酒毒；治酒毒烦渴，肠风下血。种子油可制肥皂。

\*赤豆

*Phaseolus angularis* (Willd.) W.F.Wight

Phaseolus-Pisum

区内各地。

种子供食用。

赤小豆

*P. calcaratus* Roxb.

栽培或野生。

种子利水行血，除湿热，消肿排脓；治水肿脚气，痢疾腹泻，痈疽肿毒；供食用。

\*棉豆 荷包豆、雪豆、金甲豆、香豆

*P. lunatus* L.

种子作蔬菜；入药，可消肿。

狭叶菜豆

*P. minimus* Roxb.

兴安。

\*绿豆

*P. radiatus* L.

(*P. aureus* sensu Merr. et Chun, non Roxb.)

种子供食用；入药，清热解毒，利尿。茎、叶可作绿肥。

\*菜豆 四季豆、云豆

*P. vulgaris* L.

区内各地。

嫩莢供蔬菜食用。

滇绿豆

*P. yunnanensis* Wang et Tang

桂西北。

\*豌豆 荷兰豆

*Pisum sativum* L.

区内各地。

嫩叶和种子供食用。茎、叶可作绿肥、饲料。

### 水黄皮

*Pongamia pinnata* (L.) Merr.

钦州专区。

种子催吐；种子油治癣疥，脓疮。很好的护堤植物。叶作绿肥和饲料。

### \*四棱豆

*Psophocarpus tetragonolobus* DC.

灵山。

块根、嫩莢供食用。

补骨脂 破故纸

*Psoralea corylifolia* L.

岑溪、桂平。

多栽作药用；种子补肾壮阳，固精缩尿，强腰膝；治阳萎，遗精，遗尿，腰膝冷痛；酊剂治白癜风，鸡眼。

### \*紫檀

*Pterocarpus indicus* Willd.

南宁。

木材为建筑、优良家具用材。公路树。

### 山葛藤

*Pueraria montana* (Lour.) Merr.

(*P. tonkinensis* Gagn.)

梧州、容县、宁明。

### 云南葛藤

*P. peduncularis* Grah.

(*P. yunnanensis* Fr.)

隆林、南丹。

韧皮纤维可制人造棉，织布。藤可编织用具。根和藤作农药，有胃毒和触杀作用，并兼有一定乳化效能，亦可和六六六混用。根或藤磨粉煮液，可杀蚜虫、红蜘蛛、幼龄棉铃虫等。根和花亦作药用，参阅葛藤。

### 三裂叶葛藤

*P. phaseoloides* (Roxb.) Benth.

(*P. javanica* Benth.)

博白、梧州、贺县、桂林等地。

韧皮纤维可代黄麻制绳索，织麻袋。根含淀粉，可制糕点，酿酒。

可作保土防沙的覆盖植物。

### 葛藤

*P. pseudohirsuta* Tang et Wang

容县、龙州、百色。

根入药，解肌透疹，生津止渴；治斑疹不透，温病发热，头痛项强，烦渴泻痢。花解酒毒。根茎和块根含淀粉，但有毒，须经水泡处理，提取淀粉，方能供食用，酿酒，作糊料、饲料等用。

根磨成粉的煮液可防治水稻金花虫、玉米螟幼虫、蚜虫、红蜘蛛、稻螟、地老虎、水稻负泥虫；根粉作成毒饵，可诱杀粘虫；根、叶液可杀蛆和孑孓。我国古来即利用葛藤茎皮纤维织成葛布，编绳索；亦可造纸和作人造棉原料。从葛根提制淀粉所剩的渣纤维，可作填充物和造纸用，加入油漆可供补船等用。

良好的水土保持覆盖植物。干草为我国良好饲料之一，马、牛特别喜吃。种子油可作机械润滑油。

### \*粉葛

*P. thomsonii* Benth.

(*Dolichos trilobus* Lour.)

梧州、南宁、龙州、十万大山、百色、桂林等地。

块根可作蔬菜，提取细粉即葛粉，可治腹泻，亦供食用和酿酒。

茎皮纤维可作粗纺原料，织麻袋，编绳。种子油可作机械润滑油。根、花入药，功用参阅葛藤。

### 野葛

*P. thunbergiana* (S. et Z.) Benth.

(*Pachyrhizus thunbergiana* S. et Z.)

区内各地。

用途参阅葛藤。

### 密子豆

*Pycnospora lutescens* (Poir.) Schindl.

(*P. nervosa* W. et A.,

*P. hedysaroides* R.Br. ex W. et A.)

龙州、那坡、百色。

保土和绿肥植物。

### 老鼠眼

*Rhynchosia chinensis* H.T.Chang, ined.

凌云、乐业、南丹、苍梧。

叶可提黄色染料。

### 淡红鹿藿

*R. rufescens* (Willd.) DC.

桂西。

### 鹿藿 山黑豆

*R. volubilis* Lour.

区内各地。

叶止痛，止血；治牙痛，乳痛，刀伤。

### \*刺槐

*Robinia pseudoacacia* L.

Sesbania-Smithia

全州、临桂、桂林等地。

道路树。叶可作饲料、绿肥。树皮可作栲胶原料。韧皮纤维可供造纸，制人造棉。花可供蔬食。又含芳香油，可作调香原料。种子油可制肥皂、油漆。木材供枕木、车辆、造船等用。

多刺田菁

*Sesbania aculeata* Pers.

田林。

绿肥。改良土壤植物。

\*田菁

*S. cannabina* (Retz.) Pers.

(*Aeschynomene cannabina* Retz.)

区内各地。

绿肥。牛、马饲料。韧皮纤维可织麻袋，编绳。

锈色宿苞豆

*Shuteria ferruginea* Baker

南宁、宁明。

毛宿苞豆

*S. pampaniniana* H.-M.

东兰、凌云、乐业。

全株治咳嗽。

西南宿苞豆

*S. vestita* W. et A.

龙州、百色。

根补血，调经。

田基豆 水百足

*Smithia sensitiva* Ait.

陆川、玉林、钟山、昭平、贺县、大瑶山、柳州、兴安、宁明、

隆林。

全株治疮毒，咳嗽，蛇伤。

苦参 流产草

*Sophora flavescens* Ait.

全州、灌阳、桂林、罗城、东兰、天峨、隆林、梧州。

根清热解毒，燥湿杀虫；治肠炎，痢疾，痔疮出血，赤白带下，咽喉肿痛，遗精，黄疸，瘰疬，阴道滴虫病，阴痒，湿疹。根茎、种子有杀虫作用，又有良好湿润和展布性能，可作农药辅助剂用。苦参的水浸液或煮液可防治稻飞虱、浮尘子、杨树天社蛾、大麦蚜虫等；又可灭孑孓。韧皮纤维可制绳索，织麻袋，造纸。种子油可制肥皂、润滑油。

槐树 中国槐

*S. japonica* L.

桂林、柳州、河池、百色、南宁等地区。

花蕾（槐米）、花和果（槐花和槐角）凉血止血；治便血，痔血，吐血，衄血，高血压，目赤肿痛，尿血，肠胃出血，糖尿病。槐米、槐角和枝作兽药，治牛臌胀病，胀胆症，赤白痢，瘟症和风湿症。花含芳香油，可作调香原料。种子油可制肥皂、润滑油；亦可掺和油漆使用。油粕可作饲料。木材良好，供建筑、车辆、家具和雕刻等用。花和芽可食用。干花可染浅黄色布。荚果外皮可制糖。叶液可防治蚜虫、菜蚜、青虫、软体害虫。韧皮纤维可作造纸等原料。根深，抗风力强，生长尚快，萌芽力强，在石灰性、中性和酸性土都可生长，为石山、平地绿化优良树种。蜜源树种。

西南槐树

*S. mairei* Pamp.

隆林、凌云、乐业、凤山、灵川。

广豆根

*S. subprostrata* Chun et T.Chen

Sophora-Tephrosia

靖西、德保、那坡、田阳、百色、乐业、凤山、南丹、罗城。  
根即中药广豆根，泻热解毒，清利咽喉；治热毒咽喉肿痛，肺热  
咳嗽，黄疸，便秘，牙龈肿痛，疮肿，疥疾。

白刺花

*S. viciifolia* Hance

隆林。

水土保持树种。

广西槐树 小红豆

*S. wightii* Baker

桂林、临桂、永福、凌云、靖西。

绿肥植物。

红血藤 华密花豆

*Spatholobus sinensis* Chun et T.Chen

十万大山。

韧皮纤维可制人造棉。

密花豆 九层风、三叶鸡血藤、猪血藤

*S. suberectus* Dunn

玉林、梧州、南宁、百色、柳州地区。

藤行血补血，通经活络；治贫血，月经不调，风湿骨痛，遗精，  
白浊。

\*巴西苜蓿

*Stylosanthes gracilis* H.B K.

饲料作物。绿肥。

\*山毛豆 短萼野蓝、短萼灰叶豆、白花灰叶豆、灰毛豆、印度豆

*Tephrosia candida* DC.

钦州、南宁、柳州、桂林等地。

绿肥。咖啡园、橡胶园或新垦地覆盖作物。荒山荒地绿化先锋植物。

灰叶 野蓝、假蓝靛

*T. purpurea* (L.) Pers.

桂西南。

全株有毒，根最毒，全株含芸香甙，根另含灰叶素和鱼藤素<sub>15A</sub>，可以毒鱼。根或全草煎剂治消化不良，咳嗽，衄血，胃炎疼痛。湿疹，皮炎，全草煎水外洗。枝叶作绿肥。很好的防砂、海岸固堤植物。

黄毛灰叶

*T. vestita* Vog.

桂南。

\*杂种车轴草

*Trifolium hybridum* L.

(*T. elegans* Savi ex Gib. et Belli)

桂林等地。

牧草、绿肥植物。

\*红车轴草

*T. pratense* L.

桂林、南宁等地。

很好的青饲料，牛、猪、羊等家畜都喜爱吃，亦可作干草和绿肥。

\*白车轴草

*T. repens* L.

桂林等地。

牧草、绿肥和水土保持植物。

野蕃豆

*Uraria clarkei* Gagn.

(*U. paniculata* Clarke, non Hassk.)

百色、隆林、临桂、恭城。

Uraria-Urariopsis

猫尾草 狐狸尾

*U. crinita* (L.) Desv.

昭平、桂平、贵县、容县、平南、南宁、那坡、百色、凌云、河池、东兰、临桂。

全草散瘀止血，清热止咳；治吐血，咯血，尿血，刀伤出血，肺热咳嗽，子宫脱垂，脱肛，痢疾。孕妇忌服。绿肥和覆盖作物。

长穗猫尾草 大穗兔尾草

*U. crinita* (L.) Desv.

var. *macrostachya* Wall.

(*U. macrostachya* Schindl.)

苍梧、宁明、龙州、凌云等地。

功能参阅猫尾草。

狸尾草 兔尾草

*U. lagopodioides* (L.) Desv. ex DC.

(*U. lagopoides* DC.)

区内各地。

全草消肿，驱虫；又治疮毒。

美花兔尾草 牵根草

*U. picta* (Jacq.) Desv.

(*U. linearis* Hassk.)

宁明、百色。

根平肝，宁心，健脾；治头晕，心烦，食欲不振。

钩柄狐狸尾

*U. rufescens* (DC.) Schindl.

(*Desmodium rufescens* DC.)

昭平、巴马、河池、南丹、百色。

算珠豆

*Urariopsis cordifolia* (Wall.) Schindl.

那坡、百色、田林、隆林。

\*蚕豆

*Vicia faba* L.

区内各地。

冬季豆类作物，种子含蛋白质和淀粉，未老熟的青蚕豆还含丰富的维生素甲、乙<sub>1</sub>、乙<sub>2</sub>和丙，是优良的蔬菜，老熟蚕豆可磨粉制糕饼，又是豆酱、酱油和糖果的原料。良好绿肥作物，能改良土壤，枝叶可作家畜饲料。有些人对蚕豆有过敏性，能致蚕豆病。

野豌豆 大巢豆、麦豆藤

*V. sativa* L.

恭城、临桂、桂林、柳州、凤山、乐业、百色、隆林等地。  
全草祛痰止咳，和血调经，截疟；治月经不调，咳嗽痰多，疟疾，衄血。绿肥。青饲料或干草，马、牛、羊都喜欢吃。

四籽野豌豆

*V. tetrasperma* (L.) Moench

乐业。

营养价值较高的青饲料，猪、牛、羊都爱吃。优良绿肥植物。

\*饭豆 眉豆

*Vigna cylindrica* (L.) Skeels

区内各地。

种子供食用。

\*豆角 豇豆

*V. sinensis* (L.) Savi ex Hassk.

(*Dolichos sinensis* L.)

区内各地。

嫩莢、豆供食用。种子、叶、果莢和根健脾利湿，清热解毒，敛汗，止血；治尿血，盗汗，蛇伤；叶治尿闭；根治疗疮。

Vigna-Stachyurus

野豇豆 假人参

*V. vexillata* (L.) Benth.

梧州、岑溪、北流、玉林、陆川、南宁。

根滋补，补气。

细梗密束花 小血藤

*Whitfordiodendron filipes* Dunn

龙州、靖西、德保、凌云。

茎祛风，补血；治风湿骨痛。

紫藤

*Wisteria sinensis* Sweet

(*W. chinensis* DC.)

桂林、临桂等地。

花穗煎剂和糖服，治腹水。韧皮纤维可制人造棉。花含芳香油，可作调香原料。庭园绿化植物。

丁葵草 斜对叶

*Zornia diphylla* (L.) Pers

钦州、陆川、玉林、北流、博白、贵县、平南。

全草解毒，散瘀消肿；治感冒，肝炎，结膜炎，肠胃炎，小儿疳积，蛇伤，跌打。

## 150 通条木科☆(旌节花科)

### STACHYURACEAE

水凉子 通泡木、小通藤

*Stachyurus chinensis* Fr.

桂林、临桂、灵川、全州、兴安、龙胜、隆林、田林、凌云、乐业、那坡、大苗山、南丹、河池、都安、龙州。

茎部髓心清热，通气，利尿，镇静。

通条木 小通草、通草

*S. himalaicus* Hk.f. et Th.

恭城、龙胜、全州、兴安、大苗山、南丹、凌云、乐业、隆林、靖西。  
用途同上一种。

## 151 金缕梅科 HAMAMELIDACEAE

半边枫 老虎班、阿丁枫

*Altingia chinensis* (Champ) Oliv. ex Hance

临桂、兴安、龙胜、恭城、大苗山、大瑶山、象州、宁明、马山、  
大明山、武鸣、上林、靖西、那坡、德保、上思、苍梧、贺县。  
材用。树杆培育香菌。根治风湿，跌打，瘫痪。

大果腊瓣花 瑞木、蚂蚁树、饭木

*Corylopsis multiflora* Hance

(*C. wilsoni* Hemsl.,

*C. cordata* Merr. ex Li)

各地林区。在桂北林区中常见。

腊瓣花

*C. sinensis* Hemsl.

灵川、临桂、龙胜、全州、资源、兴安。

光秃腊瓣花

*C. sinensis* Hemsl.

var *calvescens* R. et W.

龙胜。

窄叶蚊母树

*Distylium dunnianum* Lévl.

(*D. chinense* Rehd.,

Distylium-Liquidambar

**D. lanceolatum** Chun ex Cheng)

罗城、大苗山、东兰、隆林。

鱗毛蚊母树

**D. elaeagnoides** H.T.Chang

罗城。

大叶蚊母树

**D. macrophyllum** H.T.Chang

罗城。

杨梅蚊母树

**D. myricoides** Hemsl.

临桂、灵川、兴安、阳朔、恭城、龙胜、永福、南丹、靖西、十万大山。

根治手脚浮肿。果、树皮作栲胶原料。

毛秀柱花

**Eustigma balansae** Oliv.

(*Distylium chingii* Chun ex Walk.)

凌云、乐业、苍梧、上思、象州。

秀柱花 水棉木

**E. oblongifolium** Gardn. et Champ.

大苗山、罗城、大瑶山、象州、苍梧、贺县、上思、龙州。

金缕梅

**Hamamelis mollis** Oliv.

灵川。

庭园绿化。茎、叶可提制栲胶。树皮可制绳。种子可榨油。

缺萼枫香

**Liquidambar acalyicina** H.T.Chang

临桂、灵川、龙胜。

用途参阅枫香。

\*苏合香

*L. orientalis* Mill.

南宁栽培。

树脂开窍，祛痰。治中风痰厥，惊癇。

枫香 枫树、黑饭木

*L. taiwaniana* Hance

全区各地。

果(中药称路路通)通经，利尿，消肿止痛；治月经不调，小便不利，乳汁不通，风湿痛，神经痛，腰肌劳损，胃痛，荨麻疹等。枫树脂(白胶香)活血止痛，止血生肌；治外伤出血，内出血，皮肤化脓性感染，跌打，牙痛等。叶抗菌消炎；治菌痢，腹泻，胃痛，咳嗽，外洗治皮肤湿疹。木材供家具等用材。树皮、叶作栲胶原料。叶可饲养天蚕。

櫟木 鱼骨柴、羊角树、櫟花

*Loropetalum chinense* (R.Br.) Oliv.

桂北、桂中各地普遍分布，桂南较少。

花、叶、根止血止痛，祛风解毒，去瘀生新；治跌打吐血，痢疾，腹泻，肺结核，中暑。果治目痛，青盲不见物。花治久痢，预防小儿惊风，防麻疹。枝、叶作栲胶原料。

阔叶櫟木

*L. lanceum* H.-M.

十万大山。

大叶櫟木

*L. subcapitatum* Chun ex H.T.Chang

龙州、靖西。

米老排 壳菜果、三角枫

*Mytilaria laoensis* H.Lec.

十万大山、龙州、宁明、那坡、德保、靖西。

Rhodoleia-Symingtonia

木材优良，可作柜、箱、桌椅、房屋板料等用材。速生树种。

红苞木 红花榈 红花木

*Rhodoleia championi* Benth.

(*R. parvipetala* K.Y.Tong)

十万大山、大瑶山、象州、宜山、罗城、武鸣、上林、大明山、龙州、平南、凌云、田林、百色。

材用。庭园绿化。叶止血；治刀伤。

半枫荷

*Semiliquidambar cathayensis* H T Chang

临桂、龙胜、永福、贺县、大苗山。

材用。根、叶祛风除湿，活血通络；治风湿病痛，腰肌劳损，跌打瘀积，肿痛，产后风瘫。

小叶半枫荷

*S. cathayensis* H.T.Chang

var. *parvifolia* (Chun) H T.Chang

大苗山。

用途参阅半枫荷。

东南水丝梨☆

*Sycopsis dunnii* Hemsl

大苗山、上思、宁明、武鸣。

水丝梨

*S. sinensis* Oliv.

临桂、兴安、灌阳、龙胜、全州、资源、贺县、昭平、凌云、融安、大苗山、大瑶山。

长瓣马蹄荷

*Symingtonia longipetala* (H.T.Chang) H T.Chang

(*Exbucklandia longipetala* H T Chang,

Bucklandia longipetala H T Chang)

材用。庭园绿化。

马蹄荷 马蹄樟、合掌木、白克木

*S. populnea* (R.Br. ex Griff.) van Steenis

(*Exbucklandia populnea* (R.Br.) R.W.Bradley)

*Bucklandia populnea* R.Br.)

灵川、灌阳、永福、恭城、荔浦、那坡、靖西、德保、乐业、融安、大苗山、大瑶山、陆川、贺县、上思。

材用。庭园绿化。

大果马蹄荷

*S. tonkinensis* (Lec.) van Steenis

(*Exbucklandia tonkinensis* (Lec.) H.T.Chang,

*Bucklandia tonkinensis* Lec.)

桂林、临桂、象州、大瑶山。

材用。庭园绿化。

四药门花

*Tetrathyrium subcordatum* Benth.

龙州。

152 杜仲科 EUCOMMIAEAE

\*杜仲 丝棉木、丝棉树

*Eucommia ulmoides* Oliv.

桂林、龙胜等地。

树皮补肝肾，强筋骨，安胎；治肾虚腰膝痛，孕妇腰酸痛，先兆流产，跌打，早期高血压。树皮、叶、种子含硬性橡胶，为工业重要原料。木材纹理细致，不挠不裂，为造家具、船，车用材。

## 154 黄 杨 科 BUXACEAE

### 雀舌黄杨

*Buxus harlandii* Hance

桂林、临桂、龙胜、融安、那坡、十万大山。

根、叶止血生肌，祛风；治肺痨，咳嗽，痢疾。木材为细工用材。庭园绿化。

### 宽花柱黄杨

*B. latistyla* Gagn.

天峨。

### 大叶黄杨

*B. megistophylla* Lévl.

全州、资源。

庭园绿化。

### 小叶黄杨

*B. microphylla* S. et Z.

var. *aemulans* R. et W.

全州、资源。

庭园绿化。

### 狭叶黄杨

*B. myrica* Lévl.

var. *angustifolia* Gagn.

十万大山、河池、凌云、全州。

### 黄杨 千年矮、万年青、野黄杨、瓜子黄杨

*B. sinica* (R. et W.) Cheng

(*B. microphylla* S. et Z.

var. *sinica* R. et W.)

凌云、桂北与贵州交界地区、大瑶山、象州、桂林、龙胜。

木材密致，通常供美术雕刻。叶治刀伤。常栽培供庭园绿化。

小叶野扇花

*Sarcococca hookeriana* Baill.

var. *humilis* R. et W.

南丹。

155 悬铃木科 PLATANACEAE

械叶悬铃木 英国梧桐

*Platanus acerifolia* Willd.

桂林。

作庭园树、行道树。

悬铃木 法国梧桐

*P. orientalis* L.

桂林、南宁。

作庭园树、行道树。

156 杨柳科 SALICACEAE

\*响叶杨

*Populus adenopoda* Maxim.

桂林。

木材供制火柴杆、牙签等用。树皮纤维代麻、造纸。叶作饲料。

\*白背杨 银白杨

*P. alba* L.

桂林、南宁。

材用，绿化。

\*加拿大白杨

*P. canadensis* Moench

桂林。

Populus-Salix

木材供造纸、制火柴杆、牙签、箱子、家具等用。

\*钻天杨 箭杆杨

*P. nigra* L.

var. *italica* (Münchh.) Koehne

(*P. pyramidalis* Salisb.)

桂林。

木材制火柴杆、牙签、箱板。叶含芳香油，可作香精原料。

\*毛白杨

*P. tomentosa* Carr.

桂林。

木材供造纸、建筑、器具、火柴杆等用。树皮作栲胶原料。

\*柳 垂柳、垂枝柳、垂杨柳、垂绿柳、清明柳

*Salix babylonica* L.

各地栽培。

固堤、绿化树种。叶治恶疮丹毒，烫火伤。树皮消肿。枝条编织  
篮筐。树皮制栲胶，造纸。木材制箱盒、火柴杆等。

筐柳

*S. cheilophila* Schneid.

龙胜。

网脉柳☆

*S. dictyoneura* Seem.

桂林、临桂、龙胜、全州、资源、恭城、大瑶山、德保、隆林。

用途参阅柳。

粤柳

*S. mesnyi* Hance

桂林。

草地柳

*S. praticola* H.-M

桂西北。

## 159 杨 梅 科 MYRICACEAE

青杨梅 火梅

*Myrica adenophora* Hance

桂林、临桂、南宁、武鸣、横县、大瑶山、合浦、灵山。

果祛痰，解酒，止吐。绿化。

毛杨梅

*M. esculenta* Buch.-Ham. ex D. Don

上思、凤山、乐业、隆林。

木材坚硬，制家具、农具。根皮、树皮、叶制栲胶。果可食。

杨梅 朱红、树梅

*M. rubra* (Lour.) S. et Z.

区内各地。

果生食，酿酒，制酱，蜜饯，制糖果、果汁。药用生津，止渴。

树皮收敛。根皮止痛，消肿，凉血，散瘀生新；治吐血，血崩，骨折。树皮、根皮、叶制褐色染料。木材坚韧，作细工用材。又是绿化、防护林树种。

## 161 桦 木 科 BETULACEAE

蒙自桤木 粗糠木、萝卜木

*Alnus nepalensis* D. Don

那坡、靖西、德保、百色、田林、隆林、凌云、乐业、东兰、南丹、河池、宜山。

材质较疏松，供一般家具、板材用。树皮为栲胶原料。叶为压青

### Alnus-Betula

绿肥，又是保土、改土植物。

江南桤木 水拖柴、萝卜木

**A. trabeculosa H.-M.**

隆林、田林、资源。

用途参阅蒙自桤木。

西桦

**Betula alnoides Buch.-Ham.**

那坡、德保、靖西、百色、平果、凌云、乐业、田林、田阳、东兰、大苗山、龙胜、资源、临桂、灵川、兴安。

木材为胶合板和家具等用材。树皮制栲胶。

南桦

**B. austro-sinensis Chun ex Hu**

桂林、临桂、灵川、龙胜、资源、全州、灌阳、兴安、大苗山、大瑶山、凌云。

用途同上。

柱穗桦

**B. cylindrostachys Wall.**

龙胜。

用途同上。

光皮桦 光叶桦、映桦子、桦角、红桦树

**B. luminifera H.Winkl.**

龙胜、大苗山、大瑶山、隆林、田林、凌云、乐业。

木材不翘裂，经防腐处理后，可代胡桃木作枪托等军工用材，建筑，胶合板，火柴杆及造纸用。树皮为栲胶原料，干馏可得桦皮焦油。根清热利尿；治小便不利，水肿。

糙皮桦

**B. utilis D.Don**

凌云、乐业、百色、武鸣、罗城、大苗山、临桂。  
木材用途参阅上一种。树皮药用抗菌驱虫。

## 162 檫木科 CORYLACEAE

川黔鹅耳枥 川黔千金榆

*Carpinus fangiana* Hu

资源、全州、龙胜、兴安。

木材用途同大穗鹅耳枥。

大穗鹅耳枥 牯岭鹅耳枥、马料树

*C. fargesii* Fr.

(*C. laxiflora* (S. et Z.) Bl

var. *macrostachya* Oliv.,

*C. laxiflora* (S. et Z.) Bl. var. *fargesii* (Fr.) Burk ,

*C. laxiflora* (S. et Z.) Bl. var. *davidii* Fr ,

*C. davidii* (Fr) Schneid.,

*C. macrostachya* (Oliv.) Koidzumi)

临桂、灵川、永福、阳朔、龙胜、大苗山。

木材供建筑、家具、枕木、车辆等用。亦是培养香菌良材。树皮  
为栲胶原料。

岷江鹅耳枥

*C. londoniana* Winkl.

(*C. poilanei* A Camus)

大瑶山、大苗山、罗城、临桂。

材用一般。

紫脉鹅耳枥

*C. purpurinervis* Hu

都安。

Carpinus-Castanea

材用。

细枝鹅耳枥 雷公栎

*C. viminea* Wall

大苗山。

材用。

163 壳斗科(注) FAGACEAE

锥栗 珍珠栗、桂朴锥

*Castanea henryi* (Skan) R et W.

桂北、桂西。

优良用材树种，供建筑、枕木、车船、柱木等用。种子可供食用。树皮、壳斗可制栲胶。叶可养柞蚕。

\*板栗 栗

*C. mollissima* Bl.

区内各地，以隆安、阳朔等县为多。

种子供食用，为木本粮食树种之一；又可续筋接骨，散瘀；嚼烂外敷治筋骨断碎，肿痛瘀血。为重要用材树种，供枕木、矿柱、船舵等用。树皮、壳斗可制栲胶。叶可养柞蚕。

茅栗

*C. sequinii* Dode

(*C. hupehensis* Dode)

全州、资源、兴安、临桂。

种子可食。木材供制家具等用。树皮、壳斗可制栲胶。幼树可作板栗砧木。

注：本科树木种子含淀粉，有些可供食用，有些可供工业用。树皮、壳斗富含单宁，多可制栲胶。多数种类产优质木材。一些种类可培养香菇。水青冈属的种子含油脂。

南宁榜

*Castanopsis amabilis* Cheng et C S Chao

十万大山。

短刺南宁榜

*C. amabilis* Cheng et C S Chao

*var. brevispinosa* Cheng et C S Chao

十万大山。

树干可培养香菇。

角刺榜 刺果锥栗

*C. armata* (Roxb.) Spach

苍梧、容县、龙胜。

杯果榜

*C. calathiformis* (Skan) R. et W.

(*Quercus calathiformis* Skan,

*Pasania calathiformis* Hickel et A Camus)

容县、武鸣、十万大山、兴安。

细枝榜

*C. carlesii* (Hemsl.) Hay.

(*Quercus carlesii* Hemsl.)

龙胜、融安、大明山、十万大山、合浦、陆川。

西南榜 西南米槠

*C. carlesii* (Hemsl.) Hay.

*var. spinulosa* Cheng et C.S.Chao

十万大山。

种子味甜可食。木材供建筑、家具等用。树干可培养香菇。

astanopsis

瓦山榜 长刺锥栗

*C. ceratacantha* R. et W.

那坡、凌云、乐业、十万大山、容县、苍梧、龙胜。

锥栗榜 榜栗

*C. chinensis* Hance

桂北和梧州、藤县、博白。

种子味甜可食。木材坚硬耐用，供建筑、造船、桥梁等用。

华南榜 毛叶锥栗

*C. concinna* A DC.

十万大山、凌云、乐业、宜山。

尖尾榜 米槠、甜槠、赤柯

*C. cuspidata* (Thb.) Schottky

(*Quercus cuspidata* Thb.,

*Pasania cuspidata* Oerst.)

十 那坡。

材质坚硬，为良好用材，供桥梁、糖榨、轮轴等用。

高山榜

*C. delavayi* Fr.

隆林。

短刺榜 短刺锥栗

*C. echinocarpa* A DC.

(*C. tribuloides* A.DC.

var. *echinocarpa* King)

隆林。

水锥榜

*C. eyrei* Tutch.

(*Quercus eyrei* Benth.,  
*Lithocarpus eyrei* Rehd.,  
*C. chingii* A Camus)

隆林、大苗山、大瑶山、阳朔、灵川、临桂、龙胜、兴安、贺县、苍梧、大明山、十万大山。

种子味甜可食。木材坚韧耐久，供桥梁、枕木、建筑等用。

尾叶水锥榜☆

*C. eyrei* Tutch.

var. *caudata* (Fr.) Cheng  
(*C. caudata* Fr.,  
*C. incanna* A Camus)

龙胜、永福。

罗浮榜 白椽

*C. fabri* Hance

容县、苍梧、永福、临桂、龙胜、兴安、大瑶山、大苗山、那坡、田阳。

川鄂榜 丝栗

*C. fargesii* Fr.

十万大山、凌云、乐业。

大叶栎 大叶榜、黧蒴、裂斗锥栗、闽粤榜栗

*C. fissa* R. et W.

(*Quercus fissa* Champ.,  
*Pasania fissa* Oerst.)

区内各地。

叶可作饲料，牛爱吃。树干可培养香菇。优良的薪炭材。

Castanopsis

南岭栲 毛栲

*C. fordii* Hance

容县、大瑶山、宜山。

丛刺栲

*C. greenii* Chun

大苗山。

海南栲 海南锥栗

*C. hainanensis* Merr.

龙州。

材质坚硬，为重要工业强材之一，供建筑、桥梁、枕木、机械器具、家具等用。种子淀粉较好，可供食用。

红橡栲 橡木、红锥、红橡

*C. hickelii* A.Camus

区内各地。

为华南优良用材和主要造林树种之一，材质重而坚韧，干后少开裂，供造船、建筑、枕木、矿柱等用。

红楣栲 红帽子、印度锥栗

*C. indica* (Roxb.) A.DC.

龙州、十万大山、那坡。

材质硬而稍重，干后少开裂，但会变形，不耐腐，适作室内门、窗、桁、桷等用材。种子无苦味，可生食或熟食。

东南栲 美秀锥栗

*C. jucunda* Hance

种子味甜，可食。

铁锥栲 火锥

*C. lamontii* Hance

容县、龙胜、苍梧。

元江栲

C. neocavaleriei A.Camus

(C. concolor R. et W.)

龙胜。

长叶栲 南宁红锥

C. oblongifolia Cheng et C S Chao

十万大山。

丝栗

C. platyacantha R. et W

桂西北。

疏齿栲☆

C. remotaserrata Hu

苦楮

C. sclerophylla Schott.

(Quercus sclerophylla Lindl.)

永福、桂林、临桂等地。

耐干旱瘠薄，萌芽性强，树皮坚韧，富弹性，耐久，供建筑、桥梁、枕木、车辆、机械图板等用。

穗序栲

C. spicigera Chun et Tam

十万大山。

栲树

C. taiwaniana Hay.

(C. hystrix auct., non A DC.)

区内各地。

种子味甜可食。材质坚致，供桥梁等用。树干可培养香菇。

Castanopsis-Lithocarpus

硬叶栲 大叶锥栗、野板栗、钩栗

*C. tibetana* Hance

桂北、桂东等地。

树干可培养香菇。

弹斗栲

*C. trininhensis* Hick. et A.Camus

藤县。

水青冈 长柄山毛榉

*Fagus longipetiolata* Seem.

(*F. sinensis* Oliv.)

桂北、桂西。大瑶山等地。

种子和种子油可食，油又可作油漆原料。

云南水青冈

*F. longipetiolata* Seem.

*forma yunnanica* Y.T.Chang

德保、凌云、环江、大苗山。

光叶水青冈

*F. lucida* R. et W.

资源、灌阳、兴安、大苗山、田林。

种子油可供食用。

陡崖杏叶柯

*Lithocarpus amygdalifolius* (Skan) Hay.

*var. praecipitiorum* Chun

桂西南。

材质硬而很重，干燥后显著开裂，很耐腐，为工业强材；适作梁、柱、桩木、枕木、水工、桥梁、造船、建筑用材，亦可作机械器具、农具等用。

腰果柯

*L. anisobalanos* Chun et How

十万大山。

槟榔柯 米哥、水栗

*L. areca* (Hick. et A.Camus) A.Camus

(*Pasania areca* Hick. et A.Camus)

龙州。

狭叶柯

*L. attenuata* (Skan) Rehd.

(*Pasania attenuata* Schott.,

*Quercus attenuata* Skan)

十万大山。

岭南柯 岭南石栎

*L. brevicaudata* (Skan) Hay.

(*Pasania brevicaudata* Skan,

*Quercus brevicaudata* Skan)

靖西。

粤桂柯

*L. calophylla* Chun, ined.

龙胜、灵川、阳朔、容县。

扶绥柯☆

*L. chichaoi* Chun, ined.

扶绥。

材质坚硬耐久，少虫蛀，供建筑，作主梁用。种子可食。

靖西柯

*L. chingsiensis* Chun, ined.

靖西。

Lithocarpus

金毛柯

*L. chrysocoma* Chun et Tsiang

大苗山。

包果柯

*L. cleistocarpa* (Seem.) R. et W.

(*Quercus cleistocarpa* Seem.,

*Pasanis cleistocarpa* Schott.)

凌云、资源。

嫩叶代茶，称甜茶。

烟斗柯 石柯、杯果、滇粤石栎

*L. cornea* (Lour.) Rehd.

(*Quercus cornea* Lour.,

*Pasania cornea* Oerst.,

*Q. hainanensis* Merr.)

区内各地。

良好建筑用材，供建筑、枕木、车辆、造船等用。种子可食。

扁果柯

*L. cyrtocarpa* (Drake del Castillo) A Camus

(*Quercus cyrtocarpa* Drake del Castillo,

*Pasania cyrtocarpa* Schott)

十万大山、陆川。

皱叶柯 广西石柯

*L. dictyoneura* Chun

大瑶山、东兰。

大鳞柯 贵州石栎

*L. elizabethae* (Tutch.) Rehd.  
(*Quercus elizabethae* Tutch.,  
*Pasania elizabethae* Schott.)

十万大山、龙州。

华南柯

*L. fenestrata* Roxb.,  
(*Quercus fenestrata* Roxb.,  
*Pasania fenestrata* Oerst.)

大瑶山、灵川、宁明、那坡、隆林。

黔粤柯

*L. fordiana* (Hemsl.) Chun  
(*Quercus fordiana* Hemsl.,  
*Pasania fordiana* Hick. et A Camus)

泡叶柯

*L. haipinii* Chun  
(*Quercus tsangii* Merr.,  
*L. neotsangii* A.Camus)

大瑶山。

光叶柯

*L. hancei* (Benth.) Rehd.  
(*Quercus hancei* Benth.,  
*Pasania hancei* Schott.)

十万大山、容县、贺县、大瑶山、大苗山、大明山、南丹、隆林。  
树干可培养香菇。

Lithocarpus

瘤果柯

*L. handelianus* A.Camus

桂西南。

木材适作水工、船板、舵骨、桥梁、桥柱、桥板等用材，亦可供桩木、枕木、建筑、车辆、矿柱、机械器具、农具、运动器械用材。

长果柯 锦楮

*L. henryi* (Seem.) R. et W.

(*Quercus henryi* Seem.,

*Pasania henryi* Schott.)

东兰、南丹、龙胜。

珠眼柯 信宜石柯、鼠刺叶石柯

*L. iteaphylloides* Chun

永福、大苗山、那坡。

姜叶柯

*L. litseifolia* (Hance) Chun

贺县、临桂。

长柄柯

*L. longipedicellata* (Hick. et A.Camus) A.Camus

(*Quercus longipedicellata* Hick. et A.Camus)

桂西南。

油叶柯☆

*L. oleaeifolia* A.Camus

融安。

多穗柯 甜茶

*L. polystachya* (Wall.) Rehd.

(*Quercus polystachya* Wall.,

*Pasania polystachya* Schott.)

靖西、那坡、百色、田林、乐业、十万大山、大苗山。  
嫩叶代茶，称甜茶。

毛果柯

*L. pseudovestitus* A.Camus

十万大山、桂西南。

梨耙柯

*L. silvicolarum* (Hance) Chun

(*Quercus silvicolarum* Hance,

*Q. nariakii* Hay.)

桂西南。

球果柯

*L. sphaerocarpa* A.Camus

(*Pasania sphaerocarpa* Hick. et A.Camus)

桂西南。

硬叶柯 绿叶石柯、硬叶栎

*L. synbalanos* (Hance) Chun

(*Quercus synbalanos* Hance,

*Pasania synbalanos* Schott.)

十万大山。

椆木 石柯、石栎

*L. thalassica* (Hance) Rehd.

(*Quercus thalassica* Hance,

*Q. sieboldiana* Bl.,

*Pasania thalassica* Oerst.,

*P. sieboldiana* Nakai,

*L. glabra* Nakai)

Lithocarpus-Quercus

北流、容县、藤县、苍梧、岑溪、贺县、永福、恭城、柳州、龙州等地。木材坚硬，供枕木、建筑、车船、磨齿等用。优良薪炭材。种子和根含淀粉，可供饲猪或酿酒用。

桂南柯

*L. tsangii* A.Camus

十万大山、六万大山。

铜叶柯 广西石柯

*L. uncinata* A.Camus

十万大山。

大果柯 玉盘叶柯

*L. uvariifolia* (Hance) Rehd.

(*Quercus uvariifolia* Hance,

*Pasania uvariifolia* Schott.)

贺县。

麻栎 栲、米域

*Quercus acutissima* Carr.

(*Q. serrata* S. et Z.)

区内各地，尤以天峨、凌云、乐业、田林、隆林一带为多。

材质坚硬，供车辆、船舶、滚轴、机械、建筑、枕木、纺织工业的梭子、纱绽等用。种子除含淀粉外，还含脂肪油，可供制肥皂用。壳斗、果实消肿，涩肠止泻；治乳腺炎，哮喘，下痢和血痢。叶可饲养柞蚕。树干可培养香菇、木耳。材质好，生长较快，是产区内优良用材林、薪炭林、柞蚕林树种。

槲栎

*Q. aliena* Bl.

临桂、隆林、那坡。

种子含脂肪油。

竹叶椆 竹叶槠、竹叶青冈栎

*Q. bambusifolia* Hance

(*Cyclobalanopsis bambusifolia* Chun)

宁明、十万大山。

槟榔椆 美栎

*Q. bella* Chun et Tsiang

博白、大瑶山。

薄叶椆

*Q. blakei* Skan

(*Q. blakei* Skan

*var. parvifolia* Merr.)

靖西、蒙山、大瑶山、永福。

岭南椆 黄线椆、岭南青冈栎

*Q. championi* Benth.

(*Cyclobalanopsis championi* Oerst.)

宁明。

延平椆☆

*Q. chungii* Metc.

十万大山。

桂南椆☆

*Q. confinis* Chun et L. Lau, ined.

上思。

圆柱椆☆

*Q. cylindrica* Chun, ined.

十万大山。

Quercus

粵桂櫟

*Q. delicatula* Chun et Tsiang

十万大山。

碟斗櫟

*Q. disiformis* Chun et Tsiang

十万大山、大瑤山。

上思櫟

*Q. dispar* Chun et Tsiang

十万大山。

华南櫟

*Q. edithae* Skan

十万大山、大明山。

嗜緣櫟☆

*Q. erosa* Chun et Ko, ined.

十万大山。

白栎

*Q. fabri* Hance

全州、恭城、兴安、临桂、桂林、凌云、乐业、百色、隆林、田阳等地。

树干可培养香菇。叶可饲柞蚕。

饭甑櫟

*Q. fleuryi* Hick. et A.Camus

苍梧、蒙山、阳朔、龙胜、大瑤山、大苗山、柳州、那坡、龙州、十万大山等地。

青冈栎 米中

*Q. glauca* Thb.

(*Cyclobalanopsis glauca* (Thb.) Oerst.)

桂北各地。

材质坚韧，供车辆、船舰、农具、工艺器具等用。石灰岩石山优良绿化树种。

### 小叶青冈栎

*Q. glauca* Thb.

*forma gracilis* R. et W.

(*Cyclobalanopsis gracilis* (R. et W.)

Cheng et T. Hong)

兴安、十万大山。

### 绒毛椆

*Q. gomeziana* A Camus

(*Q. vestita* R. et W.,

*Q. velutina* Wall.)

隆林。

### 陀螺椆

*Q. helferiana* A.DC.

(*Cyclobalanopsis helferiana* Liebm.-Oerst.)

那坡、隆林、凌云、乐业、南丹。

### 灵川椆☆

*Q. hsienfui* Chun et S. Lee, ined.

灵川。

### 扁斗椆☆ 雷公椆

*Q. hui* Chun

(*Q. litseoides* sensu Merr., non Dunn)

苍梧、十万大山、柳州、大苗山。

Quercus

云山椆 大叶青冈栎、长穗青冈栎

*Q. jenseniana* H -M.

(*Lithocarpus jenseniana* Chun et Metc.,

*L. dunnii* Lévl.,

*Cyclobalanopsis Cheng et T.Hong*)

大明山、大瑶山、广西与贵州交界处。

平脉椆

*Q. kerrii* Craib

田阳。

广西椆

*Q. kwangsiensis* A.Camus

三江。

木姜子椆

*Q. litseoides* Dunn

大明山。

泡花树叶椆

*Q. meliosmifolia* Chun

南屏椆☆

*Q. mikengensis* Chun et S.Lee, ined.

十万大山。

青椆☆ 青栲、细叶青栎

*Q. myrsinaefolia* Bl.

(*Cyclobalanopsis myrsinaefolia* (Bl.) Oerst.)

苍梧、平乐、永福、临桂、全州。

果收敛；治痢疾。

多环櫟

*Q. nemorales* Chun

十万大山、大瑤山。

亮叶栎 平脉楮栎

*Q. nubium* H.-M.

(*Cyclobalanopsis sessilifolia* Schott.,

*C. paucidentata* Kudo,

*Q. changii* Metc.)

凌云、隆林、大苗山、大瑤山、龙胜。

乌冈栎

*Q. phillyraeoides* A.Gray

(*Q. ilex* L.

var. *phylliraeoides* Skan,

*Q. fokienensis* Nakai)

大瑤山、阳朔、临桂、桂林、兴安。

宽萼櫟☆

*Q. platycalyx* Hick. et A.Camus

陆川。

两广櫟☆

*Q. poilanei* Hick. et A.Camus

贺县、十万大山。

云南櫟

*Q. schottkyana* R. et W.

(*Cyclobalanopsis glaucoidea* Schott.,

*Q. glaucoidea* Koidz.)

隆林、百色。

Quercus-Casuarina

\*栓皮槠

*Q. suber* L.

南宁。

欧洲生产栓皮的主要树种。

大明山椆

*Q. tamingshanensis* Chun et S Lee, ined.

大明山。

柱果椆

*Q. tereticarpa* Chun et S.Lee, ined.

十万大山。

扁果椆

*Q. thorelii* Hick. et A.Camus

靖西。

栓皮栎

*Q. variabilis* Bl.

桂西北、桂东北。

栓皮也叫软木，是软木砖、隔音、绝缘、绝热、瓶塞、水上浮标、航海救生用具、座垫、机器填板等原料，在交通、食品、电气、化学、机械等工业上用途广泛。木材供建筑、枕木、车船、家具、薪炭等用。叶可饲柞蚕。果壳(壳斗)止泻涩肠；治水泻，咳嗽，头癣。

164 木麻黄科 CASUARINACEAE

\*木麻黄 驮骨松

*Casuarina equisetifolia* L.

钦州地区、陆川、玉林、南宁、武鸣、龙州、桂林等地有栽培。

木材坚硬耐朽，可作枕木、电杆、房椽、柱木，船舰、乐器等用

材。叶除疝气。树皮收敛表汗，利尿。本树种生长快，固沙耐旱，常作热带行道树和海岸防风林、护岸林树种。

## 165 榆 科 ULMACEAE

### 糙叶树

*Aphananthe aspera* (Thb.) Planch.

隆林、田林、凌云、乐业、那坡、临桂、龙胜、永福、龙州、大新、象州、大苗山、平南。

木材坚韧，不易裂，供器材用。叶充马饲料；作农药杀棉蚜虫；干叶供铜、锡器等磨擦用。茎皮纤维作造纸原料。

### 华南朴

*Celtis austro-sinensis* Chun

龙州、大新、凌云、乐业。

木材作家具、器具用材；叶作牛马饲料。

### 紫弹树

*C. biondii* Pamp.

桂林、临桂、全州、柳州、南丹、天峨、东兰、隆林、乐业、凌云、大新。

木材作家具、器具、车辆用材。茎皮纤维作人造棉原料。种子油供工业用。叶作马饲料。作庭园绿化树种。

### 黑弹树 小叶朴、棒棒木

*C. bungeana* Bl.

桂林、临桂、兴安、南丹、柳城、大苗山、百色。

树干煎水治慢性支气管炎。其余用途同紫弹树。

### 天目朴树

*C. chekiangensis* Cheng

龙胜。

Celtis-Gironniera

广西朴树

*C. kwangsiensis* Chun

凌云、乐业。

大果朴树

*C. macrocarpa* Chun

靖西、容县、灵川。

大叶朴树

*C. philippinensis* Bl.

天峨、东兰、凌云、隆林、田林、田阳、那坡、大新、龙州、横县。  
茎皮纤维造人造棉。木材作家具、器具用材。种子油供工业用。

叶作马饲料。

朴树 沙朴

*C. sinensis* Pers.

桂林、临桂、龙胜、宜山、凌云、田阳、龙州、武鸣、梧州、柳城。

木材作家具、枕木、建筑用材。茎皮纤维代麻和造纸。果可食。

种子油制皂和润滑油用。叶作马饲料。叶揉擦治荨麻疹。树皮煎剂治麻疹，消化不良。

四川朴

*C. vandervoetiana* Schneid.

临桂、靖西、容县。

用途参阅紫弹树。

白颜树 大叶白颜树

*Gironniera subaequalis* Pl.

(*G. chinensis* Benth.)

十万大山、上林、北流、那坡、巴马。

木材制作一般家具；易传音，宜作木鼓等乐器。茎皮纤维造人造

棉，供棉絮用。叶治寒湿。

### 青檀 翼朴

*Pteroceltis tatarinowii* Maxim.

桂林、临桂、柳州、南宁、上思、东兰。

木材坚硬，纹理密致，可作家具、农具、车轴、建筑用材。茎皮纤维适于造宣纸。

### 毛青檀

*P. tatarinowii* Maxim.

var. *pubescens* H.-M.

灵川（七分山）、黔桂交界之山区。

### 狭叶山黄麻

*Trema angustifolia* Bl.

(*T. sampsoni* (Hance) Merr.,

*T. lanceolata* Merr.)

十万大山、岑溪、平南、东兰、凤山、隆林、大苗山。

茎皮纤维造纸及纺织。根、叶清凉，止血，止痛。

### 光叶山黄麻

*T. cannabina* Lour.

(*T. virgata* Bl.)

临桂、龙胜、梧州、贺县、贵县、南宁、宁明、十万大山、大苗山。

茎皮纤维造纸及人造棉。种子油供制皂，作润滑油用。

### 山油麻

*T. dielsiana* H.-M.

用途参阅山黄麻。

### 山黄麻

*T. orientalis* (L.) Bl.

### *Ulmus-Zelkova*

龙州、武鸣、南宁、横县、宾阳、上思、容县、博白、平南、玉林、梧州、苍梧、贺县、大瑶山、东兰、河池、凌云、乐业、田林、百色、那坡、隆林、桂林。

茎皮纤维造纸，纺织。木材供建筑、乐器用材。种子油供制皂，作润滑油。树皮作栲胶原料。叶作马饲料。根、叶清凉，止痛，止血。

### 蜀榆

*Ulmus bergmanniana* Schneid.

*var. lasiophylla* Schneid.

南丹、大瑶山。

树皮、叶治烂疮，火伤。叶作家畜饲料。

### 榔榆

*U. parvifolia* Jacq.

桂林、临桂、阳朔、柳州、乐业。

木材坚硬，可作油榨、船橹、车辆。茎皮纤维造蜡纸、人造棉、麻袋。茎内皮收敛止血；治各种外出血，胃肠出血，尿血。根浸酒治跌打，去瘴气。

### 越南榆

*U. tonkinensis* Gagn.

那坡、靖西、龙州、柳城、桂林有栽培。

木材作车、船用材。茎皮纤维制棉絮，纺织土布。叶作马饲料。

### 小叶榉

*Zelkova sinica* Schneid.

隆林、灵川、东兰。

木材为建筑、造船良材，可作枕木、家具、玩具。

167 桑科 MORACEAE

见血封喉 加毒、大毒木、箭毒木

*Antiaris toxicaria* (Pers.) Lesch.

博白、北流、龙州。

茎皮纤维可搓绳索，制麻袋等。乳汁有剧毒，涂于箭头上可猎兽；又能强心，催吐。

\*木菠萝 菠萝蜜

*Artocarpus heterophyllus* Lam.

(*A. integrifolius* auct., non L.f.)

龙州、南宁、隆安、梧州及玉林地区。

果芳香可食。种子含淀粉，煮熟可食。木材宜作家具、车轮、船杆等用材。树液可治溃疡及粘接陶器。叶磨粉加热，可敷创伤。木屑可提制黄色染料。

白桂木 夏暑果、将军树

*A. hypargyreus* Hance

容县、苍梧、贺县、龙州、荔浦、灵川、乐业、那坡。

果可食，有生津、止渴、助消化之效。木材供建筑、家具用。树皮可提取硬橡胶。

桂木

*A. nitidus* Trec

*subsp lingnanensis* (Merr.) Jarrett

(*A. lingnanensis* Merr.)

容县、梧州。

果可食，助消化，止渴；可糖渍及制果酱。木材供建筑、家具用。

红山梅 二色菠萝蜜

*A. styracifolius* Pierre

(*A. bicolor* Merr. et Chun)

玉林、平南、梧州、苍梧、凌云、乐业、大瑶山。

果可食。木材制家具，建筑用。

越南桂木 小冬桃

*A. tonkinensis* A.Chev. ex Gagn.

平南、南丹、龙州、大苗山。

果可食。木材坚硬，不受虫害，是一种良好的硬木，可供船、车用材。  
藤构

*Broussonetia kazinoki* Sieb.

(*B. kaempferi* Sieb.)

桂林、临桂、龙胜、兴安、苍梧、平南、凌云、乐业、大瑶山、  
大苗山。

茎皮纤维人造棉，制绝缘纸和棉纸。叶作猪饲料。

沙皮树 猪、构树、谷木、肥猪树、沙纸树

*B. papyrifera* (L.) Vent.

区内各地。

茎皮纤维为良好的造纸（沙纸、复写纸、蜡纸、宣纸）及人造棉  
原料。果（楮实子）、根皮助阳气，壮筋骨，利水明目；治阳  
萎，腰骨痠软，水肿腹胀，目翳等。树液能治癣、蜂蝎螫伤。  
种子油制皂、油漆、润滑油。叶为良好猪饲料；又可作农药，  
杀蚜虫、瓢虫、豆蚜；叶汁对霜霉病有抑制作用。叶、树皮、  
木材均含鞣质，可制栲胶。木材造家具。

\*号角树

*Cecropia peltata* L.

原产热带美洲。南宁有栽培。

印第安人用嫩叶煎剂治肝病和浮肿。在南美洲用树汁治赤痢；亦  
用作肥皂代用品。海绵质的木材可作火绒和造纸原料。树干可  
作水槽。嫩芽有时亦用作蔬菜。

葛芝 穿破石、黄龙退壳

*Cudrania cochinchinensis* (Lour.) Kudo et Masam.

(*C. javanensis* Trecul.)

区内各地。

根清热活血，止咳祛痰；治咳血，肺结核，黄疸，跌打内伤，腰腿痛，经闭等。茎皮纤维造纸。果生食或酿酒。木材制手杖、烟管等物；心材煎汁制黄色染料。

柘藤

*C. fruticosa* Roxb.

苍梧、柳州、桂林。

根驱风散寒，止咳；治风湿痹痛，咳嗽。

柘树 黄桑、猪婆刺、老虎肝 

*C. tricuspidata* (Carr.) Bureau

区内各地。

根祛风，活血破瘀；治跌打，瘀血，痨咳，经闭，痘毒，黄疸，痔疮，风湿痛。叶饲蚕。木材提制黄色染料。

马见喜

*Dimerocarpus balansae* (Hutch.) C.Y.Wu. et H.W.Li

那坡、龙州。

叶作牛马饲料。

水榕

*Ficus abelii* Miq.

桂林、兴安、平乐、大瑶山、柳州、融安、平南、桂平、苍梧、昭平、钟山、平果、百色、隆林、扶绥、邕宁、凤山。

叶消肿止痛，去腐生新；治乳痛，刀伤。

高山榕 鸡榕

*F. altissima* Bl.

Ficus

龙州、凭祥、宁明、南宁、邕宁、大新、上思、天峨、隆林、百色、那坡、北流。

茎皮纤维代麻用。气生根清热解毒，活血止痛。树为紫胶虫寄主。嫩芽可食，味酸。

大耳榕 圆叶榕

*F. auriculata* Lour.

百色、隆林、德保、田林、平果、龙州、扶绥、大新、横县、都安、龙胜。为紫胶虫寄主树。果可食。茎皮纤维代麻。

鹿饭

*F. beecheiana* Hk. et Arn.

苍梧、容县、上思、龙州、大新、凌云、乐业、临桂、龙胜、全州、恭城、平乐、天峨、河池、都安。

茎皮纤维代麻用。全株解毒，消肿，通乳。

垂叶榕

*F. benjamina* L.

平南。

茎皮纤维代麻制绳，人造造棉。

\*无花果

*F. carica* L.

桂林、柳州、南宁、龙州等地有栽培。

果生食或糖渍食；开胃，清热，润肠，止咳；治便秘，肺热声嘶，咳嗽。根治泄泻，痔疮，痈疽。叶煎汤洗痔疮。

黄果榕

*F. championi* Benth.

苍梧、梧州、平南、横县、东兰、大瑶山。

茎皮纤维代麻，制人造棉。

纸叶榕

**F. chartacea** Wall.

柳州。

棒果榕

**F. clavata** Wall.

武鸣、龙州、大新、那坡、凌云。

耳叶榕

**F. cunia** Buch.-Ham.

龙州、凭祥、扶绥、宁明、邕宁、南宁、上思、田阳、田林、德保、那坡、龙胜、天峨。

茎皮纤维代麻或造纸。

\*橡胶榕 印度橡胶树

**F. elastica** Roxb.

梧州、南宁、龙州、博白等地。

树干的乳汁可提制橡胶，其用途与巴西橡胶同。又为绿化树种。

黄毛榕

**F. fulva** Reinw.

上思、龙州、横县、扶绥、百色、隆林、靖西、那坡、凌云、平果、平南、博白、桂平、陆川、北流、岑溪、苍梧、大瑶山、融安、宜山、天峨、都安。

茎皮纤维代麻。根皮消肿行血；治风湿痛。叶为马饲料。

斜叶榕

**F. gibbosa** Bl.

(**F. tinctoria** Forst.f. **subsp. gibbosa** (Bl.) Corner)

区内各地。

紫胶虫寄主树。茎皮造纸，人造造棉。根皮治腹痛和作缓泻剂。

叶为马饲料。

Ficus

光榕

*F. glaberrima* Bl.

隆林、田林、乐业、德保、那坡、龙州、扶绥、大新、天峨、巴马、河池。

茎皮纤维代麻制绳，织麻布和麻袋。

海南榕

*F. hainanensis* Merr. et Chun

宁明、龙州、东兰、那坡。

茎皮纤维代麻制绳，织麻布和麻袋，造纸。

水筒木

*F. harlandii* Benth.

上思、上林、大明山、扶绥、龙州、隆林、田林、靖西、大瑶山、苍梧、巴马、都安。

茎皮纤维代麻制绳，织麻布和麻袋。根皮、叶作兽药，补气，润肺，活血，渗湿利水；治五痨七伤，跌打，牛叉胛，小便不利，湿热腹泻。

山榕 青藤公

*F. harmandii* Gagn.

宁明、龙州、扶绥、巴马、都安、大瑶山、大苗山、桂林、阳朔、永福、恭城、靖西。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋和麻布，制人造棉。

藤榕 细叶石榕

*F. hederacea* Roxb.

(*F. scandens* Roxb., non Lam.)

那坡、百色。

山枇杷榕☆ 山枇杷

*F. henryi* Ward. ex Diels

凌云、乐业、那坡、南丹。

异型榕      异叶榕

*F. heteromorpha* Hemsl.

龙胜、全州、灵川、恭城、大苗山、大瑶山、罗城、南丹、那坡、德保、田林、隆林、凌云、乐业、贺县、上思。

茎皮纤维造纸，亦为人造棉原料。

尾叶榕

*F. heteropleura* Bl.

(*F. rostrata* seneu Merr. et Chun, non Lam.)

桂西南。

对叶榕

*F. hispida* L.f.

区内各地。

紫胶虫寄主树。茎皮纤维制绳，织麻袋，亦为人造棉原料。全株止痛；治眼结膜炎，赤眼，癍痧，风热。

红色对叶榕

*F. hispida* L.f.

var. *rubra* Corner

桂南。

黄葛榕      大叶榕

*F. lacor* Buch.-Ham.

区内各地。

木材制农具。茎皮纤维代麻制绳，织麻袋和麻布，作棉絮。根、叶驱风活血，接骨；治风湿痹痛，骨折，半身不遂等。放养紫胶虫。作行道树、绿化树种。

长柄藤榕

*F. lungchowensis* Chun

Ficus

龙州。

爬藤榕

*F. martini* Lévl. et Van.

(*F. kwangtungensis* Merr.)

区内各地。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋和麻布，作棉絮。

榕树 小叶榕、细叶榕

*F. microcarpa* L.

(*F. retusa* auct., *F. nitida* auct.,

*F. retusa* var. *nitida* auct., non *verae*)

桂南、桂西都有分布，桂北少见。

气根、叶活血散瘀，清热解毒，抗菌消炎；治跌打，流感，扁桃体炎，支气管炎，眼结膜炎，痢疾，疟疾，百日咳，麻疹不透等。煎水洗治痔疮。为良好行道、绿化、防护树种。

显脉榕 九丁树、凸叶榕

*F. nervosa* Heyne

宜山、上林、大明山、靖西、大新。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋、麻布。

桑叶榕

*F. obscura* Bl.

隆林、田林、靖西、龙州、都安、平乐、阳朔、永福。

茎皮纤维制麻袋和人造棉。叶作家畜饲料。

琴叶榕

*F. pandurata* Hance

大瑶山、武鸣、南宁、邕宁、大新、陆川、玉林、贵县、梧州、苍梧、昭平、桂林、临桂、龙胜。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋、麻布，作棉絮。根、叶祛风利湿。

清热解毒；治百日咳，背痛，乳汁不足，齿龈炎，蛇伤，黄疸，乳痛，腰痛，胃痛，疟疾等。

### 小叶榕

*F. parvifolia (Miq.) Miq.*

临桂、灵川、恭城、百色、德保、钦州、贺县、昭平、大新、龙州。

### 凉粉果 薜荔、王不留行

*F. pumila L.*

区内各地。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋、麻布，制人造棉，造纸。乳汁壮阳固精，消肿消炎；治阳萎，遗精，乳汁不通，痔疮，疮疖，癣疥。果实催乳，止渴，退热。花托治癣疥。茎、叶驱风活络；治风湿性腰腿痛。枝、叶、果治牛热症带屙血。子实做凉粉。

### 梨叶榕

*F. pyrifolia Burm.f.*

龙胜、平南、大苗山、龙州。

茎皮纤维制人造棉供土纺用。

### 梨果榕 水棉木、梨叶榕

*F. pyriformis Hk. et Arn.*

苍梧、大瑶山、大苗山、象州、上思、河池、田阳、那坡、平乐、龙胜、扶绥。

茎皮纤维制人造棉供土纺用。

### 直脉榕

*F. rectinervia Merr.*

龙胜（花坪）。

### \*菩提树

*F. religiosa L.*

Ficus

田阳。

树皮收敛；治牙痛。花、种子发汗解热，镇静。

箭叶榕 鳞果榕

*F. sagittata* Vahl

(*F. ramentacea* Roxb.)

武鸣。

匍茎榕

*F. sarmentosa* Buch.-Ham. ex J.E.Sm.

var. *impressa* (Champ.) Corner

(*F. foveolata* Wall.)

var. *impressa* (Champ.) King)

区内各地。

茎皮纤维代麻，造纸，人造造棉。根、叶止咳化痰，祛风行血。

垂果榕☆

*F. sikkimensis* Miq.

大瑶山。

小果榕

*F. silhetensis* Miq.

隆林、田林、乐业、凌云、靖西。

粗叶榕 五指牛奶、五指榕、五指毛桃

*F. simplicissima* Lour.

(*F. hirta* Vahl

var. *palmatiloba* (Merr.) Chun,

*F. hirta* Vahl

var. *hibiscifolia* (Champ.) Chun)

茎皮纤维代麻。根健脾化湿，行气止痛，舒筋活络；治末梢神经炎，风湿关节炎，跌打，肝硬化腹水，慢性肝炎，病后体弱，产后无乳，劳伤咳嗽。

掌叶榕

*F. simplicissima* Lour.

var. *hirta* Migo

梧州、藤县、蒙山、博白、贵县、桂平、平南、陆川、北流、德保、来宾、忻城、柳江、桂林。

用途同粗叶榕。作兽药治小猪白痢。

竹叶榕

*F. stenophylla* Hemsl.

上思、龙州、河池、天峨、南丹、柳州、大瑶山、融安、龙胜、恭城、桂林、兴安、苍梧、贺县、昭平。

茎皮纤维代麻。

锥叶榕 假斜叶榕、石榕

*F. subulata* Bl.

台湾榕

*F. taiwaniana* Maxim.

区内各地。

茎皮纤维代麻织袋。

地瓜榕 覆坡虎、地枇杷

*F. tikoua* Bureau

百色、隆林、凌云、宜山、横县、贵县、桂林。

全草利尿凉血，消肿止痛，除湿，止白带；治痔疮出血，白带过多，牙龈肿痛，肚痛，泄泻。

三叉榕

*F. trivia* Corner

贵州榕

*F. tsiangii* Merr. ex Corner

### 青果榕

*F. variegata* Bl.

var. *chlorocarpa* (Benth.) King

(*F. chlorocarpa* Benth.)

田林、靖西、龙州、陆川。

茎皮纤维代麻，织麻布、麻袋。

### 变叶榕

*F. variolosa* Lindl. ex Benth.

区内各地。

茎皮纤维代麻，造棉，造纸。枝、叶治跌打。根作兽药，治风湿痹痛，四肢无力。

### 笔管榕

*F. wightiana* Benth.

上思、十万大山、龙州、那坡、平乐。

### 牛筋藤

*Malaisia scandens* (Lour.) Planch.

龙州、宁明、南宁、隆林、田阳、罗城、北流、陆川。

茎皮纤维制绳。根祛风除湿；治风湿痹痛，腹泻。叶作牛马饲料。

### \*桑

*Morus alba* L.

区内各地。

家蚕饲料。果生食或酿酒。茎皮纤维可制蜡纸、棉纸、人造棉等。

木材供家具、乐器、旋工、雕刻等用材。桑叶清热散风，凉血明目；治风热感冒，头痛咳嗽，目赤涩痛等症。桑白皮清热消肿，止咳平喘；治肺热喘咳，水肿尿少，腹胀等。桑椹（果）滋阴补血；治体虚，头目眩晕，便秘，消渴。桑枝祛风湿，通经络；治风湿痹痛，风热臂痛，跌打等。

小叶桑 鸡桑、皮藤、鸡脚桑

*M. australis* Poir.

(*M. acidosa* Griff.)

区内各地。

根、叶清热解表，凉血利尿；治感冒咳嗽，黄疸病，鼻血等。茎皮纤维造蜡纸、绝缘纸、人造棉。果生食或酿酒。叶饲养家蚕。

崖桑

*M. mongolica* Schneid.

桂林、全州、恭城、阳朔、平乐、凌云、乐业、贵县、天峨。

叶、根皮清热利尿，驱风止咳；治全身发黄，风热咳嗽。

黔鄂桑 黄蚕木

*M. wittiorum* H.-M.

大苗山、大瑶山、罗城、全州、龙胜、扶绥。

假鹊肾树

*Pseudostreblus indica* Bur.

桂西北。

鹊肾树

*Streblus asper* Lour.

龙州、南宁、靖西。

茎皮纤维代麻织袋，造棉，造纸。树皮解热；治痢疾、腹泻。根解蛇毒，治创伤。

刺桑

*Taxotrophis ilicifolius* Vidal

(*T. macrophylla* sensu Merr., non Boerl.)

田阳。

米浓液 条隆胶树

*Teonongia tonkinensis* Stapf

Boehmeria

龙州、大新、宁明、百色、靖西。

树干所含胶乳制成的橡胶，耐酸碱及耐水性能都很强，能在较低的温度下塑炼、混炼，可以制造胶管、胶板、垫圈、力车轮胎及胶鞋等。叶可作牛饲料。

169 莼 麻 科 URTICACEAE

黔桂苎麻☆

*Boehmeria blinii* Lévl.

桂西北。

白面苎麻

*B. clidemioides* Miq.

龙胜、桂林、大瑶山。

木苎麻

*B. densiflora* Hk. et Arn.

靖西。

茎皮纤维造纸。

灌木苎麻

*B. frutescens* Thb.

龙胜、大瑶山、大苗山。

茎皮纤维代麻，造纸。

蒙自苎麻 野水苎麻、大叶苎麻

*B. grandifolia* Wedd.

临桂、全州、南宁、大新、隆林。

茎皮纤维代麻，造纸。叶清热解毒，消肿；治疮疖；又可饲猪。

薮苎麻

*B. japonica* Miq.

龙胜。

茎皮纤维代麻，造纸。叶当饲料。

大叶苎麻 长叶苎麻

**B. macrophylla** Don

武鸣、宁明、靖西、德保、那坡、百色、田林、隆林、兴安。

茎皮纤维洁白柔软，可代苎麻，供纺织用。

\*苎麻 青麻、白麻

**B. nivea** (L.) Gaud.

区内各地多数栽培，也有野生。

茎皮纤维细长，强韧，洁白有光泽，抗湿，抗热，耐用，适于织夏布、降落伞、电线包布、渔网，制人造棉、人造丝等等。并能与羊毛、棉花混纺成高级衣料，亦可单纺。短纤维可造高级纸、地毯、麻袋等。根、叶清热利尿，凉血散瘀，安胎，止血；治感冒，高热，小儿麻疹，水肿，骨折，急性关节扭伤，风湿关节炎，急性淋浊，尿血，脱肛，赤白带下，胎漏腹痛，下血。创伤出血，疮疡肿毒，用鲜叶外敷。叶作养蚕及作饲料、肥料等。种子可榨油。

青苎麻

**B. nivea** (L.) Gaud

var. *tenacissima* (Gaud.) Bl.

那坡、贺县。

用途与苎麻同。

悬铃木叶苎麻

**B. platanifolia** Fr. et Sav.

灵川、龙胜、恭城、贺县、靖西、凤山。

茎皮纤维制绳，造纸，纺织。

水苎麻

**B. platyphylla** Don

龙州、桂林。

Boehmeria-Debregeasia

茎皮纤维纺纱，作人造棉，制绳，制麻袋。全株作兽药，治牛软脚症，癩麻症和风湿。

糙叶水苎麻

*B. platyphylla* Don

var. *scabrella* (Gaud.) Wedd.

苍梧、岑溪、平南、龙州、百色。

茎皮纤维造纸，织布，制绳。全株治风湿痛，毒疮。

小赤麻

*B. spicata* Thb.

上林、全州。

茎皮纤维造纸，织布，制绳，全株治小儿麻疹。

越南苎麻

*B. tonkinensis* Gagn.

百色。

茎皮纤维造纸，织布，制绳。

三脉苎麻

*B. trinervia* Wright

藤县。

用途同上。

水麻 水麻叶

*Debregeasia edulis* (S. et Z) Wedd.

隆林、凌云、靖西、百色、田林、德保、那坡、乐业、东兰、天峨、南丹、罗城、大苗山、柳江、宁明、桂林。

茎皮纤维制人造棉及纺织用。全株止泻，消肿。果可酿酒，熬糖；果渣与叶喂猪。

长叶水麻

*D. longifolia* (Burm.f.) Wedd.

龙州。

茎皮纤维代麻，作混纺原料。果可食。籽可榨油。

### 短柄长叶水麻☆

*D. longifolia* (Burm.f.) Wedd.

var. *brevipedunculata* Chien et C J Chen

宁明(公母山)。

用途同上。

### 鳞片水麻

*D. squamata* King

(*D. spiculifera* Merr.)

平南、象州、大瑶山、宁明、桂林。

用途同上。

### 尖叶楼梯草

*Elatostema acuminata* (Poir.) Brongn.

龙胜。

### 短齿榕叶楼梯草☆

*E. ficoides* (Wall.) Wedd.

var. *brachyodontum* H.-M.

大瑶山、武鸣。

### 总苞楼梯草

*E. involucratum* Fr. et Sav.

龙胜、桂林。

### 平滑楼梯草 石羊草

*E. laevigatum* (Bl.) Hassk.

大瑶山、乐业、龙州、桂林。

全株治水泻，肺病。

Elatostema-Laportea

线条楼梯草

*E. lineolatum* Wight

var. *majus* Thw.

桂西北。

阔叶楼梯草

*E. platyphyllum* Wedd.

武鸣、龙州、扶绥、德保、百色、大瑶山。

全株清热解毒。

凸尖楼梯草 毛梗子

*E. sessile* Forst.

var. *cuspidatum* (Wight) Wedd.

龙州、扶绥、大苗山、龙胜、隆林。

多头花楼梯草 半边刀

*E. sessile* Forst.

var. *polycephalum* Wall.

容县、百色。

柔毛楼梯草

*E. sessile* Forst.

var. *pubescens* Hk.f.

凌云、乐业。

全株拔毒；治疮疖。

火麻树 麻风树

*Laportea chingiana* H.-M.

凤山、龙州、凌云、乐业、靖西、德保、隆林。

叶上刺毛有毒，刺伤皮肤会引起剧痛，红肿，抓搔之容易溃烂。

解救方法参阅艾麻草。

艾麻草 老虎脚

*L. crenulata* (Roxb.) Gaud.

桂西南。

茎皮纤维制绳，纺织粗布。全株有刺毛，含高浓度的蚁酸和草酸，皮肤触毛刺伤后引起搔痒，继而烧痛，红肿，皮肤搔破后流出的水液也有毒。刺毛对牲畜也有毒害，据记载，马被刺伤后引起发狂，严重的甚至死亡。

解救方法：用其横走的根揉擦患处；用海芋的水液洗抹；用氨水洗。如皮肤被搔破，可用浓茶或鞣酸湿敷伤口，保持清洁，以免感染。

顶花艾麻 麻风树

*L. terminalis* Wight

龙州、靖西。

茎皮纤维代麻，制人造棉。种子油供食用和药用。叶上也有含毒的刺毛，其毒害的情况和解救方法参阅艾麻草。

葡萄叶艾麻 豆麻

*L. vitifolia* H.-M.

龙州、凌云、隆林、灵川、临桂。

全株去痧气，治风湿。叶上也有含毒的刺毛，其毒害的情况和解救方法参阅艾麻草。

簕管草

*Lecanthus peduncularis* (Royle) Wedd.

桂西北。

水丝麻 普爷麻

*Maoutia puya* (Wall.) Wedd.

龙州、百色、田阳、隆林。

茎皮纤维制人造棉，造纸，制渔网。

Memorialis-Oreocnide

蔓芷麻 猪粥菜

*Memorialis hirta* (Bl.) Wedd.

区内各地。

茎皮纤维制人造棉混纺。全草凉血拔毒；治刀伤，疔疮，肿毒。作兽药治血便，血尿，感冒，中暑。作猪饲料，牛也喜吃。

花点草 油点草

*Nanocnide pilosa* Migo

龙州。

紫麻

*Oreocnide frutescens* (Thb.) Miq.

(*O. fruticosa* (Gaud.) H.-M.)

宁明、百色、苍梧、昭平、大瑶山、大苗山、龙胜、临桂、恭城。

茎皮纤维代麻制绳，纺麻织品，制人造棉。

广西紫麻☆ 广西花点草

*O. kwangsiensis* H.-M.

大新、龙州、德保、靖西、平果、那坡、天峨、忻城、河池、东兰、凤山。

纤维用途同上。根、叶接骨，洗疮毒。

倒卵叶紫麻☆ 倒卵叶花点草

*O. obovata* (C.H.Wr.) Merr.

融安、大苗山、平南。

纤维用途同上。

红紫麻☆ 红花点草

*O. rubescens* (Bl.) Miq.

震叶紫麻 震叶花点草

*O. tremula* H.-M.

桂西北。

赤车

*Pellionia radicans* Wedd.

(*Elatostema radicans* Wedd.)

大瑶山、上思、龙胜(花坪)。

长茎赤车

*P. radicans* Wedd.

*forma grandis* Gagn.

(*Elatostema radicans* Wedd.)

var. *grande* H.Schröter)

桂林、临桂、扶绥、罗城。

蔓赤车 香蕉草

*P. scabra* Benth.

(*Elatostema scabrum* Hall.f.)

宁明、扶绥、大苗山、大瑶山、玉林、博白、平南。

全株止血，洗毒疮。

长柄赤车

*P. tsoongii* Merr.

(*Elatostema tsoongii* H.Schröter)

东兴、那坡。

全株治疗疮。

越南冷水花☆

*Pilea alongensis* Gagn.

桂西。

石油菜

*P. cavaleriei* Lévl.

区内各地。

全草清热解毒，消肿止痛，利水；治跌打损伤，烫火伤，肺结核，肺热咳嗽，哮喘，疖肿等。全株肉质，可作饲料和绿肥。

### 石莞茜

*P. crassifolia* Hance

德保。

全草解热毒。

### 扇花冷水花

*P. fasciata* Fr.

龙胜、大苗山、北流。

全草祛风，活血。

### 长柄冷水花

*P. longicaulis* H.-M.

龙州。

### 广西冷水花☆

*P. microcardia* H.-M.

罗城。

### 小叶冷水花 透明草

*P. microphylla* (L.) Liebm.

百色、梧州。

全草清热解毒，安胎；治肿毒。

### 盾状冷水花

*P. peltata* Hance

那坡、罗城、柳江、陆川。

全草解毒；治疮疖，疳积，跌打。

### 荸艾冷水花

*P. peploides* (Gaud.) Hk. et Arn.

龙胜、大苗山、大瑶山。

全草散瘀止痛；治跌打损伤，骨折，无名肿毒。

石稔草

*P. plataniflora* C.H.Wright

天峨、龙州。

全草治红白痢。

描绘冷水花

*P. scripta* Wedd.

龙胜。

亚革质冷水花

*P. symmeria* Wedd.

*var. subcoriacea* H.-M.

容县（天堂山）。

三脉冷水花

*P. trinervia* Wight

大苗山、龙州、扶绥、百色、靖西、德保、凤山、阳朔。

湘桂冷水花☆

*P. velutinipes* H.-M.

大苗山、龙胜。

生根冷水花☆

*P. wightii* Wedd.

百色。

卵叶雾水葛

*Pouzolzia viminea* (Wall.) Wedd.

(*P. ovalis* Miq.)

龙州、扶绥、天峨、东兰、隆林、田林。

### 雾水葛

*P. zeylanica* (L.) Benn.

(*P. indica* Gaud.)

隆林、百色、凌云、乐业、东兰、南宁、龙州、博白、平南、贵县、梧州。

全草拔毒排脓，清热利湿；治痢疾，肠炎，化脓性炎症，牙痛。作兽药治牛、猪红肿毒疮，白浊，痢疾。

### 藤麻

*Procris wightiana* Wall.

桂西。

## 170 大 麻 科 CANNABINACEAE

### \*大麻 火麻

*Cannabis sativa* L.

那坡、凌云、隆林、东兰、都安、马山、柳州。

茎皮纤维单纺或混纺，织麻布、帆布、包装布、渔网。种子油作油漆，制肥皂；油粕作肥料和家畜饲料。火麻仁润燥滑肠；治病后肠燥便秘，产后血虚便秘，咳嗽，关节痛，月经不调，皮肤搔痒，肢体麻木，健忘等症；外敷治疮疥。叶下虻虫，治蝎毒，疟疾。根破血壅胀；治痢血石淋，胞衣不出，热淋下血不止，心腹满，气短，腕折骨痛。油治发落不生，硫磺毒发身热。

### 葎草

*Humulus scandens* (Lour.) Merr.

(*H. japonicus* S. et Z.)

南宁、龙州、扶绥、隆林、凌云、百色、天峨、忻城、昭平、钟山、桂林、临桂、恭城、平乐。

花止咳。果治蚊虫伤，健胃。全草清热利尿，凉血解毒；治肺痨潮热，痢疾，淋病，湿热带下，小儿夏季热，腋下痈初期，青竹蛇咬伤。茎皮纤维代麻，造纸。种子油制肥皂、油墨、润滑油等。

## 171 冬 青 科 AQUIFOLIACEAE

### 鼠李冬青

*Ilex aculeolata* Nakai

(*I. rhamnifolia* Merr.)

桂林、临桂、永福、龙胜、灵川、兴安、灌阳、资源、荔浦、融安、大苗山、大瑶山、罗城、博白、平南、岑溪、钟山、昭平、贺县、横县、武鸣。

根皮清凉解热；治烫火伤，化痰止咳。

### 棱枝冬青

*I. angulata* Merr. et Chun

容县、宁明、武鸣、大明山、十万大山。

### 梅叶冬青 假青梅、秤星木、土甘草

*I. asprella* (Hk. et Arn.) Champ. ex Benth.

梧州、苍梧、南宁、邕宁、横县、上思、容县、陆川、桂林、全州。

根清热解毒，消肿散瘀；治流感，感冒高热，急性扁桃体炎，咽喉炎，跌打损伤，药毒，蛇毒，虫毒，菌毒，肚痛，气胀等。全草作凉茶。作兽药治牛热症带屙血，喉风症，蜜蜂带，猪丹毒等。

双果冬青

*I. bioritsensis* Hay.

var. *ovatifolia* H L.Li

(*I. diplosperma* S.Y.Hu,

*I. pernyi* Fr. forma *veitchii* Rehd.,

*I. bioritsensis* sensu S.Y.Hu, non Hay.)

兴安、大苗山。

黄杨叶冬青

*I. buxoides* S.Y.Hu

十万大山、象州、大苗山、灌阳。

革叶冬青☆

*I. championii* Loes.

大瑶山、龙胜。

巨果冬青

*I. chapaensis* Merr.

(*I. howii* Merr. et Chun,

*I. megistocarpa* Merr.)

十万大山、百色、平果。

冬青

*I. chinensis* Sims

(*I. purpurea* Hassk.,

*I. oldhami* Miq.)

桂林、临桂、灵川、兴安、恭城、大瑶山、藤县、乐业。

木材作工具用材；制玩具、雕刻品、工具柄、刷背、木梳等。枝、

叶消肿痛；治水火烫伤。种子和树皮有强壮功效。树皮含鞣质，可提制栲胶。庭园绿化树种。

### 苗山冬青☆

*I. chingiana* Hu et Tang

罗城、大苗山、大瑶山、资源、龙胜、全州、兴安、凌云。

茎皮为造纸糊料。

### 苗山毛冬青☆

*I. chingiana* Hu et Tang

var. *puberula* S.Y.Hu

凌云、乐业。

### 密花冬青

*I. confertiflora* Merr.

龙胜、临桂、十万大山。

### 广西密花冬青

*I. confertiflora* Merr.

var. *kwangsiensis* S.Y.Hu

大苗山、大瑶山、十万大山、百色。

### 枸骨 猫儿刺、鸟不宿

*I. cornuta* Lindl.

桂林、临桂。

果固涩下焦；治白带过多，遗精，肺结核。根、皮、叶含咖啡碱等，散风热，清头目，解烦渴，祛风湿；治头痛，牙痛，耳鸣，中耳炎，结膜炎。种子油工业用。绿篱树种。茎皮制粘胶可粘鸟。

### 波缘冬青

*I. crenata* Thb.

龙胜、灌阳、兴安、灵川、临桂、大苗山。

### 弯叶冬青

*I. cyrtura* Merr.

Ilex

全州、龙胜、临桂、资源、永福、兴安、灌阳、容县、平南、大苗山、大瑶山、象州、凌云、乐业、隆林、田林。

金毛冬青

*I. dasypylla* Merr.

桂南。

凸脉冬青

*I. editicostata* Hu et Tang

上思、临桂、龙胜、田林、大苗山。

广西凸脉冬青

*I. editicostata* Hu et Tang

*var. chowii* (S.Y.Hu) S.Y.Hu

大瑶山、大苗山、临桂。

木姜叶冬青

*I. editicostata* Hu et Tang

*var. litseaefolia* (Hu et Tang) S.Y.Hu

临桂、灵川、资源、龙胜。

高冬青

*I. excelsa* (Wall.) Hk.f.

(*I. elliptica* D.Don)

融安。

榕叶冬青

*I. ficoidea* Hemsl.

恭城、兴安、阳朔、龙胜、桂林、灵川、大瑶山、大苗山、上思、隆林。

庭园绿化。

团花冬青 粘树

*I. glomerata* King

上思、大苗山、大瑶山、巴马。  
茎皮捶制粘胶可粘鸟、虫。

### 青皮香

*I. godajam* (Colebr.) Wall.

(*I. godajam* (Colebr.) Wall.

var. *capitellata* (Pierre) Loes.)

龙州、百色、那坡、大苗山、大瑶山、龙胜、恭城、灌阳、永福、  
资源、平乐。

### 海南冬青

*I. hainanensis* Merr.

(*I. rotunda* Thb.

var. *hainanensis* Loes.)

十万大山、合浦、三江、大苗山、罗城。

### 青茶冬青☆

*I. hanceana* Maxim.

灌阳、龙胜、大苗山、大瑶山、十万大山。

### 刺叶冬青

*I. hylonoma* Hu et Tang

var. *glabra* S.Y.Hu

桂林、临桂、灵川、兴安、阳朔、凌云、乐业。

### 盘柱冬青☆

*I. kengii* S.Y.Hu

大瑶山。

### 广东冬青

*I. kwangtungensis* Merr.

(*I. kwangtungensis* Merr.

var. *pilosior* H.-M.,

I. kwangtungensis Merr.

var. pilosissima H.-M.,

I. phanerophlebia Merr.,

I. latifrons Chun

var. pilosissima (H.-M.) Chun)

桂林、临桂、灌阳、永福、灵川、兴安、龙胜、大瑶山、大苗山、象州、苍梧、贺县、东兰。

庭园绿化。

### 剑叶冬青

I. lancilimba Merr.

苍梧。

### 苦登茶 大叶茶

I. latifolia Thb.

(I. macrophylla Bl.)

龙州、凭祥、大新、武鸣、桂林(引种)。

叶和果实作凉茶，清暑解毒；治痧气，肚痛，疟疾。

### 大叶冬青☆

I. latifrons Chun

十万大山、大明山、德保。

### 罗浮冬青

I. lohfauensis Merr.

(I. hanceana Maxim

var. lohfauensis (Merr.) Chun)

临桂、龙胜、荔浦、大瑶山、容县。

### 大果冬青

I. macrocarpa Oliv.

龙州、那坡、苍梧、大瑶山、容县、恭城。

木材质重，纹理直，结构细致；宜作家具及建筑板料等用。

### 长序大果冬青

I. macrocarpa Oliv.

var. longipedunculata S.Y.Hu

临桂、龙胜。

### 谷木冬青

I. memecylifolia Champ. ex Benth.

十万大山。

### 鄂桂冬青☆

I. metabaptista Loes. ex Diels

南丹、兴安。

### 小果冬青

I. micrococca Maxim.

(I. micrococca Maxim.

var. longifolia Hay.)

区内各地。

材用及绿化用。树皮可提制栲胶。

### 毛小果冬青

I. micrococca Maxim.

forma pilosa S.Y.Hu

大瑶山、罗城、凌云、乐业、那坡、靖西、隆林、龙州、宁明、全州、龙胜、永福、阳朔、灵川、平南、贺县。

### 南宁冬青

I. nanningensis H.-M.

十万大山。

长梗冬青

*I. pedunculosa* Miq.

(*I. pedunculosa* Miq.

*forma continentalis* Loes.)

龙州、上思、龙胜、灵川、灌阳、兴安、资源、恭城、大苗山。  
枝叶治痔疮，黄痧，跌打。

广西冬青

*I. peiradena* S.Y.Hu

十万大山。

平南冬青

*I. pingnanensis* S.Y.Hu

平南(大瑶山)。

毛冬青 喉毒药、土甘草、纸浆木、毛披树

*I. pubescens* Hk. et Arn.

区内各地。

根清凉解毒；治喉毒(喉头水肿)，咽喉炎症，脉管炎，暑季外感热症，皮肤急性化脓性炎症等。叶外用治烫火伤。叶和茎皮作造纸糊料原料。

秃毛冬青

*I. pubescens* Hk. et Arn.

*var. glabra* Chun

容县、河池、龙胜、扶绥。

用途参阅毛冬青。

广西毛冬青

*I. pubescens* Hk. et Arn.

*var. kwangsiensis* H.-M.

平果、田林、隆林、百色、凌云、乐业、东兰、马山、龙胜。

叶生肌，去毒，润喉。枝叶作造纸糊料的原料。

### 阴生毛冬青

*I. pubescens* Hk et Arn.

*forma umbratica* Loes.

大瑶山、象州、东兰、凌云、恭城、苍梧。

### 凹叶冬青

*I. retusifolia* S.Y.Hu

兴安。

### 铁冬青 救必应、圆果冬青、熊胆木

*I. rotunda* Thb.

区内各地。

树皮、叶凉血散血，消炎解毒；治暑季外感高热，烫火伤，咽喉炎，肝炎，急性肠胃炎，胃痛，关节痛，癣疥，湿疹等。兽医用治胃溃疡，感冒发热和各种痛症，热毒，阴疮。枝叶作造纸糊料原料。树皮可提制染料和栲胶。木材作细工用材。

### 小果铁冬青

*I. rotunda* Thb.

*var. microcarpa* (Lindl. ex Paxt.) S.Y.Hu

罗城、百色、德保、大苗山。

### 柳叶冬青

*I. salicina* H.-M.

十万大山。

### 华冬青

*I. sinica* (Loes.) S.Y.Hu

全州、龙胜。

### 华南冬青

*I. sterophylla* Merr. et Chun

## lex

上思、大苗山、大瑶山、龙胜、阳朔、灌阳、兴安。

### 黔越冬青☆

*I. stewardii* S.Y.Hu

南宁、扶绥、宁明、横县、宾阳、合浦、上思、十万大山、陆川、容县、都安、罗城、大苗山、三江、融安。

### 甜冬青

*I. suaveolens* (Lévl.) Loes.

凌云、乐业、临桂。

### 拟圆齿冬青

*I. subcrenata* S.Y.Hu

大瑶山。

### 拟榕叶冬青

*I. subficoidea* S.Y.Hu

十万大山。

### 龙胜冬青☆

*I. supracostata* Chun et How, ined.

龙胜、大瑶山。

### 四川冬青

*I. szechwanensis* Loes.

大瑶山、大苗山。

### 台湾冬青

*I. taiwanicola* Maxim.

大瑶山、大苗山、凌云、乐业、永福、临桂、全州、龙胜、昭平。

### 大果台湾冬青

*I. taiwanicola* Maxim.

*var. macropyrena* S.Y.Hu

全州。

灰叶冬青

*I. tephrophylla* (Loes.) S.Y.Hu

凌云、乐业、临桂。

三花冬青

*I. triflora* Bl.

区内各地。

乐昌冬青

*I. tsoii* Merr. et Chun

资源、龙胜、兴安、全州、那坡。

细叶冬青

*I. viridis* Champ. ex Benth.

(*I. triflora* Bl.

var. *viridis* (Champ.) Loes.)

隆林、东兰、武鸣、宁明、上思、容县、平南、大瑶山、灵川、  
龙胜、兴安、荔浦、蒙山、苍梧。

庐山冬青☆

*I. wilsonii* Loes.

容县、大瑶山。

173 卫矛科 CELASTRACEAE

大芽南蛇藤

*Celastrus gemmatus* Loes.

资源。

茎皮纤维人造棉及造纸。种子油制肥皂。叶和树皮作杀虫农药。

青江藤 野茶藤

*C. hindsii* Benth.

那坡、凌云、乐业、容县、宜山、罗城、融安、柳城。

Celastrus

短梗青江藤☆

*C. hindsii* Benth.

var. *henryi* Loes.

天峨。

藤麻南蛇藤 藤麻

*C. hookeri* Prain

容县、龙胜、全州、阳朔、大苗山、靖西。

过山枫

*C. kusanoi* Hayata

苍梧、平南、容县、大苗山、大瑶山、南丹、凌云、乐业、龙胜。

根消炎，接骨；治跌打。

单子南蛇藤 单子藤

*C. monospermus* Roxb.

(*C. benthami* (G. et C.) R. et W.,

*Monocelastrus monosperma* Wang et Tang)

临桂、桂林、阳朔、十万大山、南宁、武鸣(大明山)、龙州、凌云、平南、罗城、南丹。

南蛇藤

*C. orbiculatus* Thb.

(*C. articulatus* Thb.)

上林、大苗山、柳城、南丹、龙胜。

全株散瘀消肿，调心脾，续筋骨；治跌打。根和果壳治无名肿毒。

果治失眠症。茎皮纤维制人造棉。种子油制肥皂。茎皮制农药  
防治蔬菜害虫。

滇南蛇藤

*C. paniculatus* Willd.

龙州。

根行血气；治无名肿毒。种子油制肥皂。

褐柄南蛇藤

*C. rosthornianus* Loes.

凌云、乐业、龙胜。

根行血气；治痈疖。

无毛南蛇藤

*C. stylosus* Wall. subsp. *glaber* Ding Hou

十万大山、靖西。

长序南蛇藤

*C. vanioti* (Lévl.) Rehd.

罗城。

茎皮纤维制人造棉，作农药。

青铁果 十萼花

*Dipentodon sinicus* Dunn

凌云、乐业、大苗山。

棘果卫矛☆

*Euonymus acanthocarpa* Fr.

上思、大瑶山、临桂、全州、阳朔、荔浦。

四川棘果卫矛☆

*E. acanthocarpa* Fr.

var. *sutchuenensis* Fr.

隆林、全州。

皮刺卫矛

*E. aculeata* Hemsl.

大苗山。

卫矛

*E. alata* (Thb.) Sieb.

forma *aptera* (Reg.) Rehd.

*Euonymus*

大瑶山、桂林、永福。

枝条活血通经，祛瘀镇痛，疏风散寒；治经闭，崩中下血，产后腹痛，腹满出汗，产后败血，疟疾，狂犬伤，蛇虫咬伤。

狭叶卫矛

*E. angustata Spragae*

龙胜、大瑶山、平南、罗城。

根驱风除湿，舒筋活络；治风湿疼痛，脚转筋。

华卫矛 小正木

*E. chinensis Lindl.*

龙胜、恭城、凌云、乐业、那坡。

根治跌打。

越南卫矛

*E. cochinchinensis Pierre*

*var. tonkinensis Pitard*

桂西南。

湖北卫矛☆

*E. dielsiana Harms*

容县、龙胜、临桂、南丹、凌云、乐业、隆林。

宽叶卫矛

*E. dielsiana Harms*

*var. latifolia Loes.*

临桂。

黄花序卫矛

*E. forbesiana Loes.*

那坡、靖西。

扶芳藤 爬行卫矛、爬墙虎

*E. fortunei H.-M.*

大瑶山、大苗山、容县、蒙山、资源、桂林。

全株舒经络，散瘀血；治风湿性关节痛，跌打损伤，月经不调，咯血，血崩等。

幼枝卫矛

*E. gracillima* Hemsl.

华北卫矛

*E. hamiltoniana* Wall.

兴安、阳朔。

常春卫矛

*E. hederacea* Champ. ex Benth.

容县、凌云、乐业、龙胜。

\*正木 大叶黄杨

*E. japonica* Thb.

桂林、南宁、百色、玉林。

绿化用。

\*银边卫矛 银边大叶黄杨

*E. japonica* Thb.

*var. albo-marginata* T. Moore ex Rehd.

桂林、南宁等市。

栽培花木。

\*金心卫矛 金心大叶黄杨

*E. japonica* Thb.

*var. aureo-variegata* Reg.

桂林、南宁等市。

栽培绿化植物。

疏花卫矛

*E. laxiflora* Champ. ex Benth.

## *Euonymus*

区内各地。

根滋补，壮筋骨。树皮治腰骨酸痛。根茎皮部含硬性橡胶。

### 大陆长柄卫矛

*E. longipedicellata* Merr. et Chun

var. *continentalis* Chun et How

那坡。

### 多花卫矛

*E. myriantha* Hemsl.

桂林、临桂、龙胜、全州、资源、灵川、荔浦、大苗山、大瑶山、平南、乐业。

根、茎皮部含硬性橡胶。

### 长圆叶卫矛

*E. oblongifolia* Loes. et Rehd.

大瑶山、全州。

### 川西卫矛☆

*E. rehderiana* Loes.

融安、全州。

### 皱叶卫矛

*E. rhytidophylla* Chun et How

百色、龙州。

### 广翅卫矛 小铁树

*E. streptoptera* Merr. et Chun

阳朔、临桂、全州、融安、大瑶山、大苗山、平南、苍梧。

### 短柄卫矛

*E. subsessilis* Sprague

凌云、乐业。

有色卫矛

*E. tingens* Wall.

南丹。

种子油制肥皂，作润滑油。

刺果卫矛

*E. wilsonii* Sprague

龙胜、乐业。

根驱风除湿，止痛；治风湿水肿，劳伤。

双花假卫矛

*Microtropis biflora* Merr. et Freem.

龙胜、隆林。

假卫矛

*M. cathayensis* Merr. et Freem.

平南、象州。

密花假卫矛

*M. confertiflora* Merr. et Freem.

龙胜、资源、大苗山、大瑶山、平南。

福建假卫矛

*M. fokienensis* Dunn

上林、大苗山、灵川。

细柄假卫矛

*M. gracilipes* Merr. et Metc.

隆林、融安。

木犀叶假卫矛

*M. osmanthoides* H.-M.

(*Chingithamnus osmanthoides* H.-M.)

上思。

Microtropis-Loeseneriella

少脉假卫矛

M. paucinervia Merr. et Chun ex Merr. et Freem.

桂西南。

滇桂假卫矛☆

M. petelotii Merr. et Freem.

凌云、乐业。

网脉假卫矛

M. reticulata Dunn

武鸣(大明山)。

四角假卫矛

M. tetragona Merr. et Freem.

平南、大瑶山。

粉背雷公藤☆ 雷公藤、黄藤根、大黄藤根、南蛇根、昆明山海棠

Tripterygium hypoglauicum (Lévl.) Hutch.

临桂、兴安、全州、龙胜、灵川、资源、大苗山、贺县。

用途与雷公藤相同。

雷公藤 南蛇根、小黄藤根(全州)

T. wilfordii Hk.f.

全州。

全株有毒。藤消炎解毒；治疝气痛，腰带疮，皮肤发痒。全株作

农药杀菜虫、棉蚜虫，杀鼠，灭蛆、孑孓。茎皮纤维造纸。

178 翅子藤科(希藤科) HIPPOCRATEACEAE

翅子藤

Loeseneriella merrilliana A.C.Smith

隆林、德保、百色。

二籽扁蒴藤

*Pristimera arborea* (Roxb.) A.C.Smith

龙州、靖西。

毛扁蒴藤

*P. setulosa* A.C.Smith

龙州。

棱子藤☆

*Salacia sessiliflora* H.-M.

临桂、兴安、阳朔、罗城、那坡、靖西、龙州、十万大山。

## 179 茶茱萸科 ICACINACEAE

柴龙树

*Apodytes cambodiana* Pierre

靖西、德保、龙州。

心翼果

*Cardiopteris moluccana* Bl.

那坡、龙州。

海南粗丝木 海南须蕊木

*Gomphandra hainanensis* Merr.

(*Stemonurus hainanensis* (Merr.) Hu)

罗城、天峨、隆林、那坡、龙州、上思、十万大山。

广西琼榄

*Gonocaryum sinense* H.-M.

十万大山。

大果微花藤

*Iodes balansae* Gagn.

武鸣、十万大山。

Iodes-Erythropalum

根治肾炎。

微花藤 麻雀筋藤、花心藤

*I. ovalis* Bl.

宁明、龙州、隆林、那坡、田阳、凌云、天峨、河池。

根治风湿痛。

小果微花藤

*I. ovalis* Bl.

*var. vitiginea* (Hance) Gagn.

河池、凌云、乐业、西林、龙州。

铜钻 藤蛇总管、黄九牛

*Mappianthus iodoides* H.-M.

凌云、乐业、那坡、宁明、蒙山、贺县、钟山、平南、博白、临桂、灵川、兴安、永福、龙胜、大瑶山、大苗山。

根、藤祛风活络，除湿消肿；治腰腿痛，手足麻痺，跌打损伤，毒蛇咬伤，黄疸。

海桐假柴龙树

*Nothapodytes pittosporoides* (Oliv.) Sleum.

临桂、南丹。

肖榄 木棍树

*Platea latifolia* Bl.

大瑶山、上思、陆川。

## 182 青皮木科 OLACACEAE

赤苍藤 胪藤、菜藤

*Erythropalum scandens* Bl.

田林、凌云、龙州、大新、天等、马山、南宁、上思、苍梧、博白、北流、陆川、贵县。

全株利尿；治黄疸。嫩叶可作蔬菜食。

蒜头果 马兰后、山桐子

*Malania oleifera* Chun et S.Lee, ined.

龙州、大新、德保、靖西、乐业、田林、田阳、凤山。

种子油工业用。

疏花铁青树

*Olax laxiflora* Merr. ex H.L.Li

十万大山、横县。

香芙蓉

*Schoepfia chinensis* Gardn. et Champ

南宁、横县、上思、平南、桂平、陆川、全州、临桂、龙胜、灵川、永福、隆林、大瑶山、罗城。

种子油工业用。根治骨折。

青皮木 香青皮木、幌幌木

*S. jasminodora* S. et Z.

上思、凌云、乐业、东兰、罗城、大瑶山、全州。

## 183 山 柑 科 OPILIACEAE

山柑

*Cansjera rheedii* Gmel.

龙州、宁明、扶绥、上思、柳城。

鳞尾木 山芥兰

*Lepionurus latisquamus* Gagn.

龙州、隆林、田阳。

嫩叶可作蔬菜食。

185 桑寄生科 LORANTHACEAE

杉木鞘花寄生 枫树寄生

*Elytranthe bibracteolata* (Hance) Lec.

桂平、平南、大瑶山、上思、宁明、凌云、德保、靖西、乐业、  
那坡、桂林、临桂、荔浦、恭城、河池。

八角鞘花寄生 白银寄生

*E. cochinchinensis* (Lour.) G.Don

(*Loranthus cochinchinensis* Lour.)

平南、博白、陆川、大苗山、隆林、田林、田阳、宁明、龙州、  
武鸣、横县、阳朔、桂林、灵川、苍梧。

全株治肾脏病。

枫鞘花寄生

*E. fordii* (Hance) Merr.

苍梧、梧州、上思、北流、平南、桂平、大新、隆林、平果、东  
兰、河池、罗城、大苗山、大瑶山、恭城、桂林、临桂。  
全株清热止咳，补肝肾，祛风湿；治痧气，痢疾，咳血。

栗寄生

*Korthalsella opuntia* (Thb.) Merr.

凌云、乐业、靖西、龙州、大苗山。

松寄生 华桑寄生

*Loranthus chinensis* DC.

区内各地。

全株祛风湿，止痛。

广西桑寄生☆

*L. chingii* Cheng

龙州、武鸣、十万大山、那坡、靖西、博白。

全株祛风湿，治痢疾，小儿睾丸发肿。

心叶寄生☆

**L. cordifolius** Wall.

上思。

杂木寄生

**L. delavayi** Van Tiegh.

桂林、临桂、龙胜、那坡。

小叶寄生

**L. gracilifolius** Schultes

宁明、上思、十万大山、巴马、田阳、那坡、百色、隆林、柳城、平乐、恭城、临桂。

广东寄生 檵树寄生

**L. kwangtungensis** Merr.

临桂、龙胜、兴安、恭城、贺县。

连江寄生

**L. levinei** Merr.

凌云、乐业、那坡、都安。

油茶寄生

**L. ligustrinus** Wall.

(**L. sampsoni** Hance)

贺县、昭平、北流、容县、上思、罗城、融安、三江、东兰、龙胜、临桂以及百色地区。

全株治肺病，咳嗽，伤积。

榔榆寄生 大萼桑寄生

**L. maclarei** Merr.

临桂、全州、永福、龙胜、平乐、恭城、大苗山、大瑶山、天峨、武鸣、平南、容县、贺县、苍梧。

Loranthus

全株清热，补肝肾，祛风湿，止咳；治内伤，吐血。

小五瓣寄生 苦棘树

*L. owatarii* Hayata

龙州、兴安、全州、凌云、乐业、大苗山。

桑寄生 桑上寄生

*L. parasiticus* (L.) Merr.

上思、南宁、邕宁、龙州、宁明、苍梧、梧州、容县、玉林、平南、北流、陆川、桂林等地。

全株补肝肾，壮筋骨，安胎下乳，消肿祛痰；治咳嗽，腰腿痛，坐骨神经痛，高血压，习惯性流产，乳汁不通，吐血，疮疥，子宫脱垂。

五蕊寄生

*L. pentandrus* L.

田阳。

五瓣寄生 油桐寄生

*L. pentapetalus* Roxb.

区内各地。

全株祛痰，止痢，祛风，消肿，补血气；治痢疾，肺结核，眼角炎。

火炭木寄生☆

*L. tienyensis* H.L.Li

田阳。

樟寄生 柿寄生

*L. yadoriki* S. et Z.

桂林、临桂、全州、龙胜、资源、灌阳、十万大山、大苗山、三江、南丹。

全株祛风除湿，消肿清热，止咳，祛痰，止痢。

槲寄生

**Viscum album L.**

靖西。

全株强壮，消肿，催乳。

棱枝槲寄生 青冈栎寄生

**V. angulatum Heyne**

临桂、龙胜、平乐、全州、百色、乐业、容县、北流、平南、贺县、昭平、钟山、苍梧、大苗山、大瑶山。

全株祛风，强壮，舒筋，清热止咳；治肺病，吐血。

无叶枫寄生

**V. articulatum Burm.f.**

区内各地。

全株止咳化痰，催乳散血；治关节痛，肚痛，风湿，跌打。

檀香叶寄生

**V. orientale Willd.**

武鸣、扶绥、南宁、邕宁、宁明、龙州、崇左、天等、博白、北流、上思、苍梧、桂林。

全株清热止痛，化痰止咳；治咳嗽，痢疾，疳积。

寄生茶

**V. stipitatum Lec.**

大苗山、大瑶山、平南、藤县、桂林、那坡、德保、靖西、武鸣、十万大山。

全株代寄生用。

186 檀 香 科 SANTALACEAE

寄生藤

**Henslowia frutescens Champ.**

Osyris-Balanophora

上思、苍梧、靖西、北流、陆川、博白。

全株消肿止痛，散血接骨；治跌打刀伤。

沙针 土檀香

*Osyris wightiana* Wall.

(*O. arborea* Wall.)

宁明、龙州、大新。

根消肿止痛，驳骨；治跌打。

檀梨

*Pyrularia sinensis* Wu

大瑶山、大苗山、全州、平南。

\*檀香

*Santalum album* L.

东兴。

心材理气温中，和胃止痛；治脘腹疼痛，气逆，呕吐等。木屑可蒸檀香油，是尿道消毒剂，又为珍贵香料。

百蕊草

*Thesium chinense* Turcz.

桂林、临桂、柳城、来宾、隆林。

全株利尿；又治蛇伤。

189 蛇 蕺 科 BALANOPHORACEAE

四川蛇菰☆

*Balanophora fargesii* (Van Tiegh.) Engl.

龙胜。

红冬菰

*B. harlandi* Hk.

龙胜、兴安。

全株止血，补血。

蛇菰

*B. involucrata* Hk.f. et Th.

大苗山、隆林、凌云。

小蛇菰

*B. japonica* Makino

大苗山、容县。

多蕊蛇菰 木菌子

*B. polyandra* Griff.

陆川、贵县、桂平、苍梧。

190 鼠 李 科 RHAMNACEAE

多花勾儿茶 打炮子

*Berchemia floribunda* (Wall.) Brongn.

临桂、桂林、隆林、梧州、藤县。

全株消肿止痛；治风湿，腰痛，疮疖。

老鼠耳 铁包金、米拉藤

*B. lineata* (L.) DC.

龙州、宁明、南宁、邕宁、大新、德保、凌云、乐业、靖西、贵  
县、玉林、凤山、天峨、大瑶山、柳城。

根、叶散瘀止血，化痰止咳；治肺结核，咯血，咳嗽，颈淋巴结  
肿大，头痛，腹痛，跌打损伤，疔疮疖肿，蛇伤。

多叶勾儿茶☆ 小通花

*B. polyphylla* Wall.

凤山、南丹、凌云、靖西、贵县。

全株治淋巴腺结核。

Berchemia-Hovenia

光枝多叶勾儿茶☆

*B. polyphylla* Wall.

var. *leioclada* H.-M.

龙州、宁明、邕宁、南宁、横县、那坡、贵县、北流。

全株调经活血。

勾儿茶

*B. racemosa* S. et Z.

上思、宁明、梧州、苍梧、昭平、钟山、贺县、容县、贵县、柳州、大苗山、平果。

根治黄疸。叶治肋膜炎。茎皮纤维代麻纺麻袋，制人造棉。叶可提栲胶，又可代茶。

包叶木

*Chaydaia crenulata* H.-M.

龙州、宁明、靖西、那坡、隆林、凌云、东兰、凤山、都安。

毛叶咀签

*Gouania javanica* Miq.

龙州、宁明、靖西、德保、田东、田阳、隆林、凌云、东兰、都安、凤山、天峨。

咀签 下果藤

*G. leptostachya* DC.

那坡、龙州。

枝、叶消炎止痛；治烧伤烫伤。

枳椇 鸡爪莲、万寿果、鸡爪子、拐枣

*Hovenia dulcis* Thb.

区内各地。

果供生食或酿酒，制醋，熬糖。种子解酒毒，止渴除烦；治酒醉难醒，口干心烦，食积。根皮活血舒筋；治风湿。材质重，纹理

直，少开裂，供家具、建筑、用具、细工等用材。

毛果枳椇 毛果鸡爪莲

*H. trichocarpa* Chun et Tsiang

灵川、临桂、全州、资源、兴安、大苗山。

用途同枳椇。

铜钱树

*Paliurus hemsleyanus* Rehd.

临桂、兴安、桂林、灵川、恭城、柳州、罗城、南丹、平乐。

树皮提制栲胶。

长梗铜钱树 钩交刺

*P. hirsutus* Hemsl.

临桂、鹿寨、梧州。

马甲子 铁篱笆

*P. ramosissimus* (Lour.) Poir.

区内各地。

绿篱用。种子油制蜡烛。木材作农具柄。枝叶花果治痈肿溃脓。

根祛风利湿，消肿止痛，续筋驳骨；治腰病，劳伤，喉痛，头风痛。

靖西假鼠李☆

*Rhamnella chingii* Merr.

靖西、龙州。

乐业假鼠李☆

*R. laui* Chun, ined.

乐业。

长麦果树

*R. obovalis* Schneid.

南丹、贺县。

Rhamnella-Rhamnus

红脉麦果

*R. rubrinervis* (Lévl.) Rehd.

(*R. hainanensis* Merr.)

龙州、隆林、凌云、乐业、柳州。

硬叶鼠李☆

*Rhamnus coriophylla* H.-M.

凌云。

苦李根 苦李蔃

*R. crenata* S. et Z.

区内各地。

根有毒。杀虫消炎，收敛止痒；治癣疥，湿疹，脓疱疮。根制黄色染料。

贵州鼠李☆

*R. esquirolii* Lévl.

桂西北。

黄鼠李

*R. fulvotincta* Metc.

临桂。

海南鼠李

*R. hainanensis* Merr. et Chun

容县、蒙山、那坡。

种子油点灯，制肥皂。

细叶鼠李

*R. leptophylla* Schneid.

全州、临桂、罗城。

根、果、叶利水行气，消积通便，清热止咳；治便秘气胀，水肿，肺热咳嗽，疮毒，骨折。

纤序鼠李☆

*R. nipalensis* Laws.

龙州、凌云、隆林、临桂、阳朔、全州、龙胜、柳城、大瑶山、容县。

冻绿

*R. utilis* Decne.

隆林、百色、乐业、大苗山、鹿寨、柳州、临桂、兴安、龙胜、灵川、恭城、容县。

皮、根含绿色色素，可提制绿色染料。根、茎和叶可提制栲胶。种子油作润滑油。全株药用治跌打。果和皮缓下利尿。

帚状鼠李☆

*R. virgata* Roxb.

容县、龙胜、柳城、大苗山。

庐山鼠李☆

*R. wilsonii* Schneid.

龙胜、罗城。

密雀梅藤

*Sageretia compacta* Drumm. et Sprague

桂西北。

纤细雀梅藤☆

*S. gracilis* Drumm. et Sprague

那坡。

钩雀梅藤

*S. hamosa* Brongn.

凌云、隆林、南宁、扶绥、容县。

Sageretia-Zizyphus

红雀梅藤☆ 红藤

*S. henryi* Drumm. et Sprague

(*S. lucida* Merr.)

上思。

祛降火，清胃热。

皱雀梅藤

*S. rugosa* Hance

桂林、临桂、钟山、富川、百色、凌云。

大雀梅藤☆

*S. rugulosa* Hemsl.

南丹、靖西。

雀梅藤

*S. theezans* (L.) Brongn.

龙州、南宁、邕宁、宁明、兴安。

叶拔毒生肌；治疮疡肿毒。根降气化痰；治咳嗽。果可食。叶可代茶。

副萼翼核果☆

*Ventilago calyculata* Tul.

龙州。

翼核果 血风藤、松鳞蔃

*V. leiocarpa* Benth.

上思、隆林。

根补血，驱风，舒经络，强筋骨；治贫血，萎黄病，月经不调，风湿骨痛，四肢麻木，腰肌劳损。

\*枣 大枣、红枣

*Zizyphus jujuba* Mill.

区内各地。

果生食，作干枣或蜜饯。果补脾益气，生津；治脾胃虚弱，便溏，津液不足。木材坚硬密致，为农具、工具把柄、雕刻良材。

滇刺枣 菜莞、缅枣

*Z. mauritiana* Lam.

东兴。

树皮消炎生肌；治烧伤，烫伤。果可食。叶可提制栲胶。

锈毛叶野枣☆

*Z. oenoplia* Mill.

龙州、宁明、那坡、百色。

毛脉野枣☆

*Z. pubinervis* Rehd.

靖西、凌云、乐业。

皱枣

*Z. rugosa* Lam.

百色、田阳。

滇枣

*Z. yunnanensis* Schneid.

隆林、那坡、德保、靖西、凌云、南丹、阳朔。

## 191 胡颓子科 ELAEAGNACEAE

川西胡颓子☆

*Elaeagnus bockii* Diels

临桂、隆林、东兰。

南胡颓子

*E. conferta* Roxb.

宁明。

Elaeagnus-Ampelopsis

绣花胡颓子

*E. fruticosa* (Lour.) A.Schlecht.

临桂。

蔓胡颓子 羊奶奶

*E. glabra* Thb.

大苗山、龙胜、全州、阳朔、临桂、桂林、贺县、容县、上思。茎皮纤维代麻，造纸，制人造纤维板。果可食，酿酒。花含芳香油，用于调合香料。叶平喘止咳，治哮喘，慢性气管炎。根行气止痛；治风湿骨痛，跌打肿痛，肝炎，胃病。

角花胡颓子

*E. gonyanthes* Benth.

龙胜、临桂、宁明、龙州、大瑶山、容县。

果可食，生津止渴；治红白痢。

鄂西胡颓子

*E. henryi* Warb.

临桂、龙胜、大瑶山、容县。

叶止痛，止咳；治风湿腰痛，黄肿，跌打。

193 葡 萄 科 VITACEAE (Ampelidaceae)

草葡萄

*Ampelopsis aconitifolia* Bunge

桂林、临桂、柳州。

根皮消肿解毒；治疮疖。

掌裂草葡萄

*A. aconitifolia* Bunge

var. *palmiloba* (Carr.) Rehd.

桂林、临桂、贵县、苍梧、龙州。

用途同上。

### 蛇葡萄

*A. brevipedunculata* (Max.) Koehne

宁明、大新、龙州、靖西、凌云、乐业、隆林、天峨、东兰、临桂、龙胜、兴安、资源、灌阳、恭城、永福、全州、灵川、容县、苍梧、昭平、大苗山。

全株清热解毒；治脚气水肿，风湿性腰腿痛，跌打肿痛，恶疮肿毒等。果可酿酒。种子油制肥皂。

### 毛叶蛇葡萄

*A. brevipedunculata* (Max.) Koehne

var. *vestita* Rehd.

苍梧、钟山、贵县、上林。

枝叶治疮疥。

### 粤蛇葡萄

*A. cantoniensis* (H. et A.) Pl.

区内各地。

果可酿酒。枝叶可作饮料。全株清暑热，消肿毒。兽医用全株治牛大便秘结。

### 藤茶

*A. cantoniensis* (H. et A.) Pl.

var. *grossedentata* H.-M.

平南、贵县、贺县、梧州、昭平、龙胜、荔浦、恭城、兴安、资源、平乐、永福、全州、大瑶山、大苗山。

茎叶作饮料。根皮祛湿退热；治皮肤癣癩。

### 绿葡萄

*A. delavayana* Pl.

龙胜、贺县、乐业。

## Ampelopsis-Cayratia

根、藤祛瘀消肿，止血止痛，消炎；治风湿性腰腿痛，外伤肿痛，胃痛，痈肿，痢疾，肠炎，骨折，外伤出血。角膜云翳可用30%绿葡萄药水滴眼。

### 裂叶绿葡萄☆

*A. delavayana* Pl.

var. *gentiliana* (Lévl. et Van.) H.-M.

柳州、临桂、田林、乐业。

用途参阅绿葡萄。

### 白蔹 母鸡带仔、九牛力、九莲灯

*A. japonica* (Thb.) Mak.

桂林、临桂、全州、柳州、来宾、梧州、贺县、武鸣、南宁。

根泻火散结，止血生肌；治痈肿疮毒，烫火伤，冻疮溃疡，赤白带，痔漏，面生粉刺。

### 大叶蛇葡萄

*A. megalophylla* Diels et Gilg

大苗山、大瑶山、恭城、龙胜、昭平、苍梧、贺县、龙州。

### 山葡萄

*Cayratia corniculata* (Benth.) Gagn.

桂林、临桂、龙胜、上林、大苗山、融安、三江、河池、巴马、隆林、凌云、梧州、平南。

### 大乌蔹莓☆

*C. geniculata* (Bl.) Gagn.

龙州。

### 乌蔹莓

*C. japonica* (Thb.) Gagn.

区内各地。

全株活血消肿，祛风湿，壮筋骨；治痈疮，疖肿，跌打，风湿。

疳积，血尿。

毛叶乌蔹莓☆

*C. japonica* (Thb.) Gagn.

var. *pubifolia* Merr. et Chun

东兰、龙州、全州。

根含胶质，可充造纸糊料。茎皮纤维制绳索、犁绳。

风叶藤

*Cissus assamica* (Laws.) Craib

临桂、龙胜、灵川、大瑶山、大苗山、象州、罗城、南丹、武鸣、平南、容县。

全株通经络，祛风；治风湿，痈肿。

尖叶白粉藤

*C. glaberrima* (Wall.) Pl.

全株洗疮用。

六方藤

*C. hexangularis* Thorel ex Pl.

临桂、桂林、龙州。

全株宽筋，活络；治风湿，关节炎，疮疥。

掌叶白粉藤

*C. modeccoides* Pl.

苍梧、梧州、玉林。

四方藤

*C. pteroclada* Hayata

平南、大瑶山、上林、龙州。

全株宽筋，活血，消肿；治风湿关节炎，跌打。

白粉藤

*C. repens* (W. et A.) Lam.

Cissus-Parthenocissus

苍梧、龙州、那坡、大瑶山。

全株有小毒。拔毒消肿止痛；治喉痛，痈疽疮疡，蛇伤，跌打肿痛。兽医用治牛湿热痢疾，外敷恶疮。

华白粉藤☆

*C. repens* (W. et A.) Lam.

var. *sinensis* H.-M.

龙胜。

火筒树

*Leea indica* (Burm.f.) Merr.

上思、宁明、龙州、扶绥、那坡、靖西、隆林。

粉绿叶爬山虎

*Parthenocissus glaucophylla* Chun

大新、平果、容县、贺县、大苗山、大瑶山、荔浦、永福、兴安。

爬山虎

*P. heterophylla* (Bl.) Merr.

临桂、全州、兴安、资源、大瑶山、大苗山、横县、龙州、田林、苍梧、十万大山。

根、叶接骨，祛风，解毒；治骨折，风湿疮毒。

亮绿爬山虎 五叶爬山虎

*P. thompsonii* Pl.

靖西、大苗山、南丹、资源、兴安。

全株治跌打。

红葡萄藤 地锦

*P. tricuspidata* (S. et Z.) Pl.

全州。

根、茎活血消肿，清凉利尿，消炎；治乳疮，赤白带下，淋沥不

尽。攀援墙上，秋季叶变橙红色，点缀墙壁用。

尾叶崖爬藤 扁钻、马攀子

*Tetrastigma caudatum* Merr. et Chun

上思、龙州、大瑶山、大苗山、平南、苍梧、阳朔。

茎祛风湿，破血，拔毒。

茎花崖爬藤☆

*T. cauliflorum* Merr.

龙州。

靖西崖爬藤

*T. chingsiense* Chun et How, ined.

靖西。

单籽崖爬藤

*T. erubescens* Pl.

var. *monospermum* Gagn.

靖西。

小扁藤 三叶扁藤、拦山虎

*T. hemsleyanum* Diels et Gilg

区内各地。

全株活血舒筋，祛风消肿，清凉解热；治风湿腰腿痛，跌打损伤，疖肿，外伤出血，蛇伤，白喉。

崖爬藤

*T. obteatum* (Wall.) Pl.

靖西、那坡、凌云、凤山、贺县、大瑶山、阳朔、临桂、全州。  
全株祛风除湿，行血消肿；治跌打，风湿筋骨痛，风湿麻木，蛇伤，疮疖。

Tetrastigma-Vitis

钝叶崖爬藤

*T. obtectum* (Wall.) Pl.

var. *glabrum* Gagn.

凌云、隆林、南丹、大苗山、大瑶山。

厚叶崖爬藤

*T. pachyphyllum* (Hemsl.) Chun

(*T. harmandii* Pl.,

*T. strumarum* Gagn.)

宁明、龙州、田林、柳州。

铁带藤 扁担藤

*T. planicaule* (Hk.) Gagn.

区内各地。

根、藤祛风活络；治风湿关节炎，腰腿痛，半身不遂，鲜叶外敷  
治下肢溃疡。

毛脉崖爬藤

*T. pubinerve* Merr. et Chun

龙州、那坡、河池。

叶治风湿骨痛，刀伤。

齿叶崖爬藤

*T. serrulatum* (Roxb.) Pl.

小果野葡萄

*Vitis balanseana* Pl.

龙州、贵县、十万大山、玉林、隆林、苍梧。

根皮舒筋活血，清热解毒，生肌利湿；治骨折，风湿瘫痪，劳  
伤，无名肿毒，赤痢。茎叶消肿止痛。

桦木叶葡萄

*V. betulifolia* Diels et Gilg

闽赣葡萄☆

*V. chungii* Metc.

苍梧。

毛脉刺葡萄☆

*V. davidii* Foex

var. *ferruginea* Merr. et Chun

资源、龙胜。

果可食。

蔓山葡萄 葛藟

*V. flexuosa* Thb.

大苗山、柳州、凌云、隆林、龙州、恭城、临桂、龙胜。

果、叶润肺止咳，清热凉血，消食；治咳嗽，吐血，食积。全株强筋骨。果可生食，酿酒。

野葡萄 毛葡萄

*V. pentagona* Diels et Gilg

凌云、乐业、隆林、百色、平果、南丹、河池、都安、东兰、邕宁、苍梧、昭平、大苗山、大瑶山、荔浦、恭城、临桂、龙胜、全州、资源。

果可食及酿酒；又作葡萄砧木。根、叶清热利湿，消肿解毒；治痢疾，疮疡肿毒。

复叶葡萄

*V. piasezkii* Maxim.

桂林、全州、乐业。

果止渴，助消化。

假葡萄

*V. reticulata* Rom. du Caill. ex Pl.

凌云、乐业、田林、南丹、大瑶山、象州、苍梧、龙州、兴安、资源。

藤葡萄

*V. thunbergii* S. et Z.

龙胜、天峨。

果可食，酿酒。藤条可作绳索、捆扎、造纸原料。嫩叶作猪饲料。

\*葡萄

*V. vinifera* L.

桂林、南宁等市。

栽培水果，果可生食，制葡萄干，酿酒。酿酒后的粕可提酒石

酸。种子油可制肥皂。叶消炎，收敛；治咽喉痛。

194 柑 桔 科(芸香科) RUTACEAE

降真香 山油桂

*Acronychia pedunculata* (L.) Miq.

上思、十万大山、南宁、宁明、容县、陆川。

木材供家具、器具用材。树皮提制栲胶。根、叶、果、心材行气活血，

健脾，止咳；治跌打瘀痛，风湿骨痛，胃痛，消化不良，感冒咳嗽。

酒饼簕 东风桔、狗骨簕、狗桔、酒饼药

*Atalantia buxifolia* (Poir.) Oliv.

(*Citrus buxifolia* Poir.)

桂南。

根、叶祛风散寒，行气止痛；治流感，感冒，咳嗽，胃痛，腰腿痛。

粤酒饼簕☆

*A. kwangtungensis* Merr.

十万大山、宁明。

思茅酒饼簕☆

*A. racemosa* Wight et Arn.

var. *henryi* Swingle

靖西。

单叶酒饼簕

*A. simplicifolia* (Roxb.) Engl.

田阳、靖西。

大叶石椒 松风草、臭节草

*Boenninghausenia albiflora* (Hk) Meissn.

龙胜、全州、融安、凌云、乐业。

全株祛风镇痛，止血生肌；治跌打伤痛，刀伤出血，疮毒，疟疾。

可提芳香油；治作物害虫。

酸柠檬

*Citrus aurantifolia* (Christ) Swingle

容县、上思、宁明。

\*酸橙

*C. aurantium* L.

近成熟果实和幼果入药也作枳壳和枳实用，破气消积，行痰除痞；治脾胃湿热，胸闷腹痛，胸胁疼痛，脱肛，子宫下坠。又为柑的砧木。

\*朱橘 朱红橘、朱砂桔

*C. erythrosa* Hort. ex Tanaka

桂林、南宁等市。

庭园绿化植物。

\*柚

*C. grandis* (L.) Osbeck

(*C. maxima* Merr.)

区内各地，以容县、恭城等地所栽沙田柚 (*Citrus grandis* (L.) Osbeck var. *shatinyu* Hort.) 最著名。

除水果用外，叶、花、果皮可提芳香油。种子榨油工业用。果皮可作蜜饯。酸柚的果皮亦加工作橘红用，名叫青光七爪，但功效较差。

Citrus

\*橘红 化州橘红、化州柚

*C. grandis (L.) Osbeck*

var. *tomentosa* Hort.

陆川、博白、容县。

果皮(药名七爪)健胃止痛，化痰，行气，消肿。

宜昌橙

*C. ichangensis* Swingle

龙胜、大瑶山、大苗山。

作柑、橙砧木。

广西橙

*C. kwangsiensis* Hu

河池。

\*柠檬 洋柠檬

*C. limon (L.) Burm.f.*

区内各地。

果生食或制果汁作饮料。果实提取柠檬酸用于化工、医药、食品等工业。果皮提取芳香油用于饮食、香料；入药，为驱风剂。

干果皮可泡茶、浸酒。根、叶兽医用治牛咳嗽，疝气，腹冷，消化不良，风湿跌打，阴性疮。种子油可制皂。

\*柠檬 柠檬、广东柠檬

*C. limonia* Osbeck

区内各地。

果味极酸，不堪生食，一般盐渍后供烹调佐膳用，或制解暑解渴柠檬汤。药用叶止咳，消肿消炎；治跌打。

\*香橼 枸橼、香圆、云香

*C. medica* L.

临桂、桂林、龙州。

果肉提取柠檬酸制果汁。果皮制蜜饯。花、叶、果皮可提取芳香油。果皮药用健胃化气，祛痰消肿。木材宜制手杖。

\*手椽 佛手

*C. medica* L.

var. *sarcodactylis* (Noot.) Swingle

区内各地。

果切片晒干药用止寒咳、痨咳，治疝气痛。果皮和叶提取芳香油作调香原料。

\*四季桔

*C. mitis* Blanco

区内各地。

绿化用。

\*柑(注) 桔

*C. reticulata* Blanco

区内各地。主要品种有椪柑、温州蜜柑、红桔等。

除作水果外，花、叶、果皮可提取芳香油用作调香原料。种子油制肥皂、润滑油，亦可食用。

\*橙 广柑、广桔、黄果、甜橙

*C. sinensis* (L.) Osbeck

区内各地。主要品种有柳橙、脐橙、上龙橙、新会橙等。

除作水果外，花、叶、果皮提取芳香油作调香原料。果加工制橙汁、橙酒、果酱等。种子油制肥皂、润滑油，亦可食用。

齿叶黄皮

*Clausena dentata* (Willd.) Roem.

注：药店的陳皮多为柑橘等的成熟果皮，能理气健胃，燥湿化痰；治风寒感冒，咳嗽痰多，脘腹胀满，食欲不振，腹泻。青皮为未熟果皮或幼小果实干燥而成，能破气散结，舒肝止痛，下食化滞；治胸肋疼痛，肝气郁滞，气逆胀闷，食积。

Clausena

乐业、那坡、靖西、凌云、德保、南丹、罗城、宜山、永福、桂林、天等、龙州。

叶治麻疹，接骨。兽医用枝叶治牛气泄，腹痛，跌打伤，筋骨肿痛，消化不良。

小黄皮 假鸡皮果、山鸡皮果

*C. emarginata* Huang

龙州、大新、天等、田阳、德保。

野黄皮 山黄皮

*C. excavata* Burm f.

龙州、宁明、凭祥、隆林。

果可食。木材供家具、细工用。兽医用根、叶治牛腹膨胀，胃肠积气，消化不良，跌打，皮肤湿痒。

\*细叶黄皮 鸡皮果

*C. indica* (Dalz.) Oliv.

龙州、宁明、天等、大新、百色。

果生食，制黄皮酱。果实、枝、叶健胃，祛痰化气，消积消滞，去湿。

广西黄皮

*C. kwangsiensis* Huang

龙州、马山、武鸣、天等、平果、百色、都安。

果通经止痛。枝叶驱蚊。

\*黄皮 黄皮果

*C. lansium* (Lour.) Skeels

区内各地。

除果作水果外，种子油可制润滑油。枝、叶治牛臌胀及疝气；治猪气喘。叶治感冒。根治胃痛。

华南吴茱萸

*E. austrosinensis* H.-M.

龙胜、阳朔、永福、平南、大瑶山、龙州。

川西吴茱萸☆

*E. baberi* R. et W.

百色、凌云、乐业、龙胜、容县。

石山吴茱萸

*E. calcicola* Chun ex Huang

大苗山、靖西、南丹。

叶洗毒疮烂脚。

臭辣树

*E. fargesii* Dode

龙胜、灵川、梧州。

果实治肚痛。

三叉苦 三叉虎

*E. lepta* (Spreng.) Merr.

区内各地。

根、叶、皮清热解毒，燥湿止痒，消炎止痛；防治流脑，流感，中暑。治扁桃体炎，咽喉炎，肝炎，风湿腰腿痛，湿疹，疖肿等。

棟叶吴茱萸 擦树、贼子树

*E. meliaeifolia* Benth.

梧州、上思、龙州、永福、资源、兴安、阳朔、大瑶山。

根、果行气止痛，温中散寒；治头痛，胃痛。

\*茶辣 吴茱萸、吴萸

*E. rutaecarpa* (Juss.) Benth.

隆林、凌云、乐业、田林、凤山。

果实温中散寒，开郁止痛；治脘腹胀痛，呕吐嗳酸，疝气冷痛，

Evodia - Fortunella

月经痛，风湿痛等。叶可提芳香油。种子油制肥皂。

贵州吴茱萸

*E. rutaecarpa* (Juss.) Benth.

*var. bodinieri* (Dode) Huang

临桂、兴安、罗城、大苗山、凌云、乐业、隆林、苍梧、龙州。

用途参阅茶辣。

石虎

*E. rutaecarpa* (Juss.) Benth.

*var. officinalis* (Dode) Huang

罗城、全州。

果、叶提芳香油。种子油制肥皂。叶又作杀虫剂。根、花消肿健胃；治气痛，风湿，肚痛。

牛糾树 茶辣

*E. trichotoma* (Lour.) Pierre

龙州、容县、临桂、那坡、大瑶山。

果健胃祛风，消肿止痛；治肚痛，呕吐，风湿。

•山橘 山金桔

*Fortunella hindsii* (Champ.) Swingle

区内少量栽培。

水果。

•金柑 圆金柑、桔仔

*F. japonica* (Thb.) Swingle

容县。

水果。

•金橘 长安金桔

*F. margarita* (Lour.) Swingle

融安、阳朔、荔浦、平乐、临桂、邕宁。

果生食，作蜜饯，制金橘酒。根行气化痰；治胃痛，瘰疬。

山小桔 饭汤木、山桔仔

*Glycosmis citrifolia* (Willd.) Lindl.

天峨、梧州、昭平、上思、十万大山、百色、靖西、龙州、宁明、南宁、柳城、大瑶山。

野果。根、叶祛痰消积，破瘀消肿；治感冒咳嗽，食积腹痛，跌打肿痛。

光叶山小桔

*G. craibii* Tanaka

var. *glabra* (Craib) Tanaka

龙州、靖西、柳城。

华山小桔

*G. sinensis* Huang

龙州。

小柑 野黄皮树

*Micromelum falcatum* (Lour.) Tanaka

上思、龙州、宁明、扶绥、阳朔、柳州、那坡。

根治跌打，内伤，喉痛。

全叶小柑 小芸木、鸡屎木

*M. integrifolium* (Buch.-Ham.) Roem.

那坡、靖西、田阳、田林、隆林、凌云、乐业、百色、天峨、

东兰、罗城、融安、柳城、阳朔、龙州、扶绥。

全株行气祛痰，祛风除湿，散瘀止痛；治感冒咳嗽，胃痛，风湿痛，跌打。叶治牛臌胀，胃肠积气，食欲不振，跌打伤。外敷皮肤湿痒。

山豆根叶九里香

*Murraya euchrestifolia* Hayata

百色。

Murraya-Poncirus

九里香 千里香、月桔

*M. paniculata* (L.) Jack

区内各地。

花提芳香油。木材密致，供细工用。根、叶行气止痛，活血散瘀；治胃痛，跌打肿痛，风湿，刀伤，湿疹，局部麻醉药。兽医用根、叶治牛跌打肿痛，牛叉胛，牛臌胀，腹痛，湿毒，蛇伤。

小叶九里香

*M. paniculata* (L.) Jack.

*var. exotica* (L.) Huang

融安、梧州、贵县、北流、陆川。

根、叶行气消肿，散瘀；治跌打，风湿，蛇伤。

满天香

*M. tetraptera* Huang

龙州。

全株治疟疾。

单叶藤桔

*Paramignya confertifolia* Swingle

合浦、宁明。

秃叶黄皮树 黄柏

*Phellodendron chinense* Schneid.

*var. glabriusculum* Schneid.

罗城、大瑶山、兴安。

树皮清热，燥湿，解毒；治热痢，泄泻，黄疸，淋浊，痔疮，湿疹，便血。根清凉；治痢疾。叶治疮疥。

•枳壳 枳、枸桔、老鼠怕

*Poncirus trifoliata* (L.) Rafin.

兴安、永福、临桂。

作柑桔砧木。果实宽胸膈，下郁气，健胃；治疝气，脱肛，便秘，子宫下垂。种子油制肥皂、润滑油。叶、花、果提芳香油。果提柠檬酸，用于医药和食品工业。

●裸芸香 山麻黄

*Psilopeganum sinense* Hemsl.

桂林。

全草利水消肿，并能止呕吐。

●臭草 芸香、小香草

*Ruta graveolens* L.

区内各地。

全草祛风解毒，凉血散瘀；治感冒发热，月经不调，衄血，牙痛，疖肿，毒蛇咬伤。本品1:1水或酒提取液对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌有抑制作用。

乔木茵芋

*Skimmia arborescens* T. Anders. ap. Gamble

十万大山、宁明、上林、大明山、容县、平南、大瑶山、大苗山、荔浦、龙胜。

叶治风湿。

美脉茵芋

*S. euphlebia* Merr.

上思。

广西茵芋

*S. kwangsiensis* Huang

十万大山、武鸣、大明山、平南、大瑶山、罗城。

茵芋

*S. reevesiana* Fortune

临桂、灵川、龙胜、全州、隆林、百色、罗城、容县。

Toddalia-Zanthoxylum

叶治风湿。

见血飞 飞龙掌血、散血丹

*Toddalia asiatica* (L.) Lam.

区内各地。

根有小毒，散瘀消肿，驱风镇痛；治胃痛，风湿痹痛，感冒，毒蛇咬伤，牙痛，跌打损伤，疥癣。

椿叶花椒☆

*Zanthoxylum ailanthoides* S. et Z.

凌云、田林、龙胜。

种子油制肥皂、润滑油。果提芳香油作调香原料。根皮治跌打。

岭南花椒 搜山虎

*Z. austrosinense* Huang

兴安、桂林。

根祛风解毒，散瘀消肿，行气镇痛；治毒蛇咬伤，风湿痹痛，胃痛，牙痛，扭挫伤，骨折，感冒等。

簕档

*Z. avicennae* (Lam.) DC.

梧州、苍梧、容县、桂平、平南、南宁、龙州、宁明、上思。

根、果行气止痛，祛风利湿；治慢性肝炎，肾炎水肿，风湿骨痛，跌打瘀痛，百日咳，阑尾炎，疖肿等。种子油制油漆、肥皂等。果提芳香油作调香原料。

花椒 川椒

*Z. bungeanum* Maxim.

龙州、南丹。

果温中散寒，燥湿杀虫；治脘腹冷痛，寒泻呕吐，皮肤湿疮。种子油制肥皂、油漆等。果提芳香油作调香原料。果实作食品调味剂。

花椒簕

*Z. cuspidatum* Champ.

临桂、灵川、龙胜、资源、阳朔、象州、大苗山、南丹、乐业、百色、梧州、龙州。

根、叶治跌打。种子油工业用。

异叶花椒

*Z. dimorphophyllum* Hemsl.

柳城、柳州。

种子治眼翳膜。果、叶提芳香油作食品香料。

假蚌壳椒☆

*Z. dissitoides* Huang

扶绥、河池、靖西。

根治牙痛。

蚌壳椒☆

*Z. dissitum* Hemsl.

临桂、桂林、阳朔、那坡、乐业、田阳、南丹、大苗山。

根治牙痛。

长梗蚌壳椒☆

*Z. dissitum* Hemsl.

var. *longipedunculatum* Huang, in herb

宁明、上思。

刺壳椒

*Z. echinocarpum* Hemsl.

南丹。

根抗凝血。

广西花椒

*Z. kwangsiensis* (H.-M.) Chun

Zanthoxylum

大苗山。

根、果治痧症，舌头肿。

两面针 胡椒簕、入地金牛

*Z. nitidum* (Lam.) DC.

桂南、桂东南和桂西。

根、叶、果祛风活络，散瘀止痛，解毒消肿；治风湿骨痛，腰肌劳损，胃痛，蛇伤，虫牙痛。

竹叶椒

*Z. planispinum* S. et Z.

桂林、临桂、兴安、全州、罗城、大苗山、融安、宜山、南丹、西林、乐业。

根、果散寒去湿，健胃杀虫，止痛；治风湿骨痛，跌打肿痛，胃痛，顽癣，虫牙痛，咳嗽。种子油可食。果、籽、枝、叶提芳香油。果皮作调味品。

毛竹叶椒

*Z. planispinum* S. et Z.

*forma ferrugineum* (R. et W.) Huang

桂西。

果祛风止痛，健胃行气；治消化不良，风湿，腰骨痛，痧症，破伤风，沙眼，水肿。

大叶臭椒

*Z. rhetsoides* Drake

靖西、武鸣、大瑶山、资源。

根、叶消肿止痛，驳骨；治风湿，跌打，疮疖，痈疖，湿疹。

香椒子

*Z. schinifolium* S. et Z.

临桂、柳州。

果、根、叶温中散寒，燥湿杀虫；治脘腹冷痛，呕吐，皮肤湿疮等。

## 195 苦木科 SIMARUBACEAE

臭椿 楠

*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle

南丹、临桂、兴安。

木材造木器、车辆、农具等。根皮清热利湿，收敛固肠；治赤白痢，便血崩漏，遗精白带。果活血祛风，利湿；治肠风下血，带浊遗精，风湿痹痛。树皮和叶提制栲胶。花提芳香油。叶可饲猪。嫩苗可食。种子油可食，制肥皂、润滑油。

鸦胆子 老鸦胆、苦桑子

*Brucea javanica* (L.) Merr.

桂南各县。

种子清热利湿，杀虫止痢；治阿米巴痢疾，间日疟，赘疣，鸡眼，早期血吸虫病。种子油为半干性油，制肥皂、润滑油。

毛鸦胆子

*B. mollis* Wall.

var. *tonkinensis* Loes.

龙州。

苦树 苦胆木

*Picrasma quassioides* Benn.

岑溪、容县、桂林(栽培)、巴马、凌云、隆林。

树皮祛风除湿，消炎抗菌，杀虫；治风湿性关节炎，蛔虫病，疥癣等。茎皮纤维制人造棉，造高级文化用纸。树皮可提取染料；又作农药用。

## 196 橄榄科 BURSERACEAE

\*阿拉伯乳香树

*Boswellia carterii* Birdw.

原产伊朗、伊拉克、索马里等国，我区有引种。

Canarium-Aglaiā

干燥的油胶树脂即乳香，理气止痛，活血消痛，生肌拔毒；治筋脉拘挛，跌打损伤，痈疽疮毒，心腹诸痛。

橄榄 白榄、黄榄

*Canarium album* Raeusch.

南宁、玉林、梧州、钦州等地区，白榄多栽培，黄榄多野生。

果生食或渍制；药用清肺利咽，生津止渴，开胃顺气；治喉头炎，咳血，烦渴，肠炎腹泻。木材供建筑、造船、枕木等用。种子油制肥皂、润滑油。

华南橄榄 三角榄

*C. austro-sinensis* Huang, ined.

龙州。

果亦可食。种子油制肥皂及润滑油。木材用途同橄榄。

乌榄 黑榄

*C. pimela* Koen.

本区南部、西部、东南部各地，多属栽培。

果肉腌制榄角作菜；榨油作食用油或制肥皂及其他工业用油。榄仁作饼食及肴菜配料。木材用途同橄榄。根舒筋活络，去湿；治风湿腰腿痛，产后瘫痪，手足麻木，胃痛，烫火伤。

\*没药树

*Commiphora myrrha* (Nees) Engl.

干燥树脂即没药，行气活血，消肿止痛。治痈疽肿痛，损伤瘀血，经闭症瘕，胸腹诸痛，敛疮生肌。

白头树

*Garuga pinnata* Roxb.

龙州。

197 檉 科 MELIACEAE

\*米仔兰 树兰

*Aglaiā odorata* Lour.

梧州、南宁、武鸣、宁明、龙州、扶绥、百色、靖西、凌云、乐业、田阳、柳州。

花提芳香油配制各种香精；熏茶。木材供雕刻用。枝、叶治跌打，痈疮。

梨果米仔兰☆ 山椤

*A. roxburghiana* Miq.

宁明。

木材作造船、建筑、车辆、农具、家具用材。

四瓣米仔兰 沙椤子、红椤

*A. tetrapetala* Pierre

凌云、乐业、田林、靖西、田阳、平果、天峨、南丹、河池、平南、苍梧、大新、龙州、荔浦、阳朔。

木材用途同上一种。

滇桂米仔兰☆

*A. wangii* H L.Li

百色。

大叶山棟 苦柚木、红椤木

*Aphanamixis grandifolia* Bl.

宁明、龙州、阳朔、合浦、钦州。

木材作家具、建筑、桥梁、枕木、舟车用材。种子油制肥皂及润滑油。

溪桫

*Chisocheton paniculatus* (Roxb.) Hiern

上思。

麻棟

*Chukrasia tabularis* A.Juss.

百色、那坡、凌云、东兰、平乐、临桂、桂林、恭城。

木材作家具、车辆等用材。

Chukrasia - Heynea

毛麻棟

*C. tabularis* A Juss.

var. *velutina* (Wall.) King

西林、田林、靖西、百色、都安。

木材用途同上。

灰毛浆果棟

*Cipadessa cinerascens* (Pell.) H.-M.

(*C. baccifera* Miq.

var. *sinensis* R. et W.)

区内各地，桂西较多。

根、叶祛风化湿，行气止痛；治风湿跌打，痢疾腹痛，疟疾。种子油制肥皂。

海南樅木

*Dysoxylum hainanense* Merr.

龙州。

材用。

香港樅木

*D. hongkongense* (Tutch) Merr.

大瑶山、上思、龙州。

木材作家具、门窗、板料用材。种子油工业用。

多脉樅木

*D. lukii* Merr.

百色、上思、十万大山。

用途同上。

海木 老虎棟

*Heynea trijuga* Roxb.

上思、十万大山、宁明、龙州、那坡、蒙山。

材用。

小果海木 鸭公青

*H. trijuga* Roxb.

var. *microcarpa* Pierre

平南、靖西、田林、永福、临桂、凤山、蒙山。

材用。

毛叶海木 鸽鸽花、擦子公树

*H. trijuga* Roxb.

var. *pilosula* C.DC.

隆林。

绒果海木

*H. velutina* How et T.Chen

上思、龙州、邕宁。

苦棟 棟

*Melia azedarach* L.

区内各地。

木材作家具、用器、箱板、板鞋等用材。根、茎皮治小儿蛔虫，钩虫。外用消肿，驳骨，杀虫；治水肿，烫伤，蛇头疮，跌打。

叶、树皮、花、种子作农药。根、茎皮提制栲胶。种子油制肥皂、油漆、润滑油等。茎皮纤维造纸或代麻纺织麻袋。

南岭棟树 大棟树

*M. dubia* Cav.

兴安。

材用。

川棟

*M. toosendan* S. et Z.

阳朔、三江、田林、隆林、乐业。

Munronia-Toona

材用同苦楝。果实舒肝止痛，燥湿杀虫；治胸腹作痛，行经胸腹胀痛，头癣疥癬，蛔虫腹痛，寒疝偏坠。

小地黄连 云南地黄连

*Munronia delavayi* Fr.

田阳。

根有小毒，舒筋活血，消炎止痛；治跌打损伤，风湿关节炎。

矮地黄连☆ 白花矮朵朵

*M. henryi* Harms

隆林。

全株有小毒，舒筋活血，消炎止痛；治跌打损伤，病后虚弱，风湿骨痛，咳嗽，吐血，哮喘，肺炎。

地黄连

*M. sinica* Diels

隆林。

\*桃花心木

*Swietenia mahagoni* Jacq.

玉林、南宁、百色、靖西。

木材纹理通直，结构细致，色调鲜明，易加工，宜作门窗、家具、用器用材。

小果香椿

*Toona microcarpa* (C.DC.) Harms

百色、隆林、田阳。

木材作建筑、舟车、家具、农械等用材。

香椿 椿芽树

*T. sinensis* (A Juss.) Roem.

(*Cedrela sinensis* A.Juss.)

区内各地。

木材用途同上。根皮开窍，止痢，去湿；治子宫出血，产后出

血，肠出血。嫩叶治痔疮。果收敛止血，祛风除湿，止痛；治肠炎，痢疾，胃炎，胃溃疡，便血脱肛，血崩，白带，遗精，风湿骨痛，发表透疹。嫩叶作蔬菜。种子油制肥皂。根和木屑提芳香油作赋香剂。茎皮纤维制绳索。

红棟子 红棟

*T. sureni* (Bl.) Merr.

博白、容县、田林、隆林、那坡。

木材用途同小果香椿。树皮提制栲胶。

毛红棟子

*T. sureni* (Bl.) Merr.

*var. pubescens* (Fr.) Chun

灌阳。

用途同上。

割舌树 米层

*Walsura robusta* Roxb.

大新、龙州。

野果。

## 198 无患子科 SAPINDACEAE

肖异木患

*Allophylus racemosus* (L.) Radlk.

上思、龙州、宁明。

瑶果 细子龙、假龙眼

*Amesiadendron chinense* (Merr.) Hu

龙州、大新、隆安。

木材作家具、造船、建筑、雕刻等用材。种子油工业用。种子含淀粉，可作饲料及酿酒。

Arytera-Dodonaea

滨木患

*Arytera littoralis* Bl.

灵山、合浦、上思。

木材作农具用材。

虎灯笼

*Cardiospermum corindum* L.

龙州、平果。

倒地铃 金丝苦棟藤、包袱草

*C. halicacabum* L.

荔浦、临桂、天峨、柳州、武鸣、南宁、宁明、田阳、合浦。

全草消肿止痛，凉血解毒；治疮疖，癍痧，发冷，跌打外伤，湿疹，蛇伤。根止吐，缓泻。全草又作外科洗涤药。

小果倒地铃

*C. halicacabum* L.

var. *microcarpum* (Kunth) Bl.

龙州、宁明、南宁、大新、百色、东兰、容县、贵县。

全草消炎解毒；治蛇伤，小儿睾丸热肿，小儿发热，全身起泡，白泡疮，瘤气。

茶条木 米椿树、滇木瓜

*Delavaya yunnanensis* Fr.

龙州、大新、田林、平果、隆林、那坡、田阳、桂林（栽培）。

种子油制肥皂，润滑油；治疗癣。

坡柳 铁扫把、车桑子

*Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.

十万大山。

种子油制肥皂等工业用。叶退热；治咽喉炎。

赤才

*Erioglossum rubiginosum* (Roxb.) Bl.

(*E. edule* Lec.)

扶绥。

\*龙眼 圆眼、桂圆

*Euphoria longan* (Lour.) Steud.

桂东、桂南、桂西各地。

果生食，晒干果，制罐头。木材坚硬，为家具、细工、舟车等良材。

圆肉滋补强壮；治神经衰弱，病后体虚，失眠，心悸，健忘。

果核收敛止血，消滞止痛。叶解表；防治流感，感冒。

繖花木

*Eurycorymbus cavaleriei* (Lévl.) Rehd. et H.-M.

兴安、全州、南丹。

掌叶木 鸭脚板

*Handeliodendron bodinieri* (Lévl.) Rehd.

隆林、凌云、乐业、东兰、南丹、天峨。

种子油清香可食，量不能多，又可制肥皂。

尖果柰树

*Koelreuteria bipinnata* Fr.

var. *apiculata* (R. et W.) How et Ho

凌云、靖西、南丹、桂林、灵川、贵县。

木材作家具、用器等用材。种子油工业用。花可制黄色染料。

毛叶柰树

*K. bipinnata* Fr.

var. *puberula* Chun ex How et Ho

百色、隆林、天峨、桂林。

Koelreuteria-Mischocarpus

材用。种子油工业用。

全缘柰树 黄山柰树

*K. integrifoliola* Merr.

桂林、临桂、灵川。

材用。种子油工业用。

小柰树

*K. minor* Hemsl.

南丹、天峨、凤山、靖西、大新、龙州、宁明、临桂、桂林、灵川、平乐。多见于石山上。

材用。种子油工业用。

窄叶小柰树

*K. minor* Hemsl.

*forma angustifoliolata* How, ined.

临桂。

\*荔枝

*Litchi chinensis* Sonn.

桂南、桂东、桂西南各地。

果生食，晒干果，制罐头。木材坚硬细致，可作上等家具及特种机械用材和油榨、船舵、车轴等。果核温中理气，散寒止痛；治胃痛，疝气，妇女血气刺痛。

柄果木

*Mischocarpus oppositifolius* (Lour.) Merr.

合浦、上思、十万大山、武鸣、大明山、靖西、大瑶山。

木材硬重，结构细致，作上等家具、高级箱盒、装饰、工艺等用材。

海南韶子 毛荔枝

*Nephelium lappaceum* L.

var. *topengii* How et Ho

上思。

木材供建筑、造船用。果可食，可制果酒。种子油制肥皂、润滑油。树皮和果皮提制栲胶。果皮治痢疾。

肖韶子 山荔枝、盲眼果

*Pseudonephelium confine* How et Ho

上林、龙州、南宁、百色、容县、鹿寨。

材用。种子有毒。

\*无患子 洗手果、木患子、油患子、木患树、苦患树

*Sapindus mukorossi* Gaertn.

区内各地。

木材作箱板、器具、玩具、木梳等用材。果壳代皂，洗涤丝织品，对皮肤有消毒作用。果壳煮出液治棉蚜虫、红蜘蛛、甘薯金花虫、地老虎等。煮出液又可配制乳化剂作农药用。种子油制肥皂和润滑油等。果有小毒，有溶血作用，祛风解表，行气止痛；治伤风咳嗽，劳伤咳血，白喉，扁桃体炎，支气管炎，肠胃炎等。根有小毒，凉血解毒；治毒蛇咬伤，痈，疖。

## 198A 七叶树科 HIPPOCASTANACEAE

靖西七叶树(注)

*Aesculus chingsiensis* Fang

靖西。

注：本属树木可供庭园绿化。

Aesculus-Bretschneidera

桂西七叶树

*A. chuniana* Hu et Fang

龙州、那坡。

种子油供工业用。木材作造纸原料。

革叶七叶树

*A. coriaceifolia* Fang

靖西。

广西七叶树

*A. kwangsiensis* Fang

邕宁。

黔桂七叶树

*A. tsiangii* Hu et Fang

宁明、龙州。

198B 南华木科 BRETSCHNEIDERACEAE

南华木 伯乐树

*Bretschneidera sinensis* Hemsl.

大明山、大瑶山、大苗山、龙胜、全州。

绿化树种。树皮接骨；治骨折。

云山南华木☆ 云山伯乐树

*B. yunshanensis* Chun et How

龙胜。

绿化树种。

200 槭树科 ACERACEAE

窄裂槭(注)

*Acer angustilobum* Hu

隆林、大瑶山、罗城、龙胜、兴安、临桂、永福。

长尾窄裂槭

*A. angustilobum* Hu

*forma longicaudatum* Fang

大苗山、兴安。

广东窄裂槭

*A. angustilobum* Hu

*var. kwangtungense* (Chun) Fang

(*A. sinense* Pax

*var. kwangtungense* Chun,

*A. wilsonii* Rehd.

*var. kwangtungense* (Chun) Fang)

大苗山。

两色槭

*A. bicolor* F.Chun

(*A. sinense* Pax

*var. iatrophifolium* Diels)

靖西、大瑶山、容县、灵川。

注：本属多数树种的木材，可作木材干馏材料、单板、胶合板、枕木、家具、地板、车厢、飞机机身、船桨、冰箱、木梭、纱管、木梳、运动器械、乐器等用材；又是优良的绿化树种。

Acer

圆齿两色槭

*A. bicolor* F.Chun

var. *serrulatum* (Metc.) Fang

(*A. cappadocicum* Gled.

var. *serrulatum* Metc.)

大明山、大瑶山、大苗山、灵川、兴安、龙胜、资源。

马蹄槭

*A. bodinieri* Lévl.

var. *convexa* Fang

兴安。

桂北槭

*A. chingii* Hu

大瑶山、大苗山、环江、临桂、兴安。

樟叶槭

*A. cinnamomifolium* Hay.

(*A. oblongum* Hu, non Wall.,

*A. oblongum* Wall.

var. *macrocarpum* Hu)

永福、灵川、临桂、罗城。

紫槭

*A. cordatum* Pax

阳朔、临桂、龙胜、兴安。

革叶槭

*A. coriaceifolium* Lévl.

临桂、灵川。

青蛤蟆 青榨槭、青皮槭

*A. davidii* Fr.

(*A. cavaleriei* Lévl.)

资源、全州、恭城、兴安、龙胜、永福、大苗山、大瑶山、罗城、凌云、乐业、田林、隆林、那坡等地。

树皮和叶可提制栲胶，韧皮纤维是人造棉、造纸、编绳原料。树液可熬糖。

小蕊槭

*A. decandrum* Merr.

桂南。

罗浮槭☆

*A. fabri* Hance

(*A. oblongum* Wall.

var. *concolor* Pax,

*A. fargesii* Fr. apud Rehd.)

区内各地。

果治喊叫过度而引起的声音沙哑，又治双单鹅喉。

绿果罗浮槭 毛梗红翅槭

*A. fabri* Hance

var. *virescens* Fang

百色、苍梧。

扇叶槭

*A. flabellatum* Rehd.

兴安、灵川。

广西槭

*A. kwangsiense* Fang et Fang f.

大新、龙州、靖西、隆林、平乐、全州。

Acer

桂林槭

*A. kweilinense* Fang et Fang f.

灌阳、龙胜、大苗山、大瑶山。

果治鹅喉。

剑叶槭

*A. lanceolatum* Moll.

龙州。

疏花槭

*A. laxiflorum* Pax

资源、灌阳、兴安。

亮叶槭 蝴蝶槭

*A. lucidum* Metc.

永福、阳朔、临桂、桂林、灵川。

龙胜槭

*A. lungshengense* Fang

龙胜。

中南槭

*A. metcalfii* Rehd.

兴安、临桂、大明山、那坡、隆林。

苗山槭

*A. miaoshanicum* Fang

大苗山。

飞蛾槭

*A. oblongum* Wall.

永福、临桂、灵川、天峨。

三裂槭

*A. oliverianum* Pax

大瑶山、凌云、

上思槭

*A. shangszeense* Fang et Soong

十万大山、上思。

中华槭

*A. sinense* Pax

兴安、龙胜、临桂、大瑶山、大苗山、凌云、德保。

小果华槭

*A. sinense* Pax

var. *microcarpum* Metc.

桂西北、

角叶槭

*A. sycopseoides* Chun

阳朔、罗城、南丹。

岭南槭

*A. tutcheri* Duthie

苍梧、贺县、永福、龙胜、大瑶山、南宁、大明山。

齿叶岭南槭

*A. tutcheri* Duthie

var. *serratifolium* Fang

防城、十万大山、

天峨槭

*A. wangchii* Fang

天峨、南丹。

Acer-Meliosma

武陵槭 三峡槭

*A. wilsonii* Rehd.

资源、灌阳、恭城、兴安、龙胜、灵川、临桂、永福、荔浦、大瑶山、大苗山、容县、大明山、隆林。

都安槭

*A. yinkunii* Fang

都安。

201 清风藤科 SABIACEAE

狭叶泡花树

*Meliosma angustifolia* Merr.

十万大山、龙州、靖西、田林、隆林。

山模叶泡花树 罗壳木

*M. buchananifolia* Merr.

十万大山、横县、大明山、龙州、都安。

果核油可制油漆和肥皂。

显脉泡花树

*M. costata* Cuf.

横县、扶绥、灌阳、全州、大苗山、大瑶山、巴马。

叶治咳嗽。

疏枝泡花树

*M. depauperata* Chun et How

十万大山。

罗浮泡花树

*M. fordii* Hemsl.

十万大山、龙州、贵县、博白、容县、苍梧、大瑶山、河池、南丹、都安、田林、永福、阳朔、临桂、龙胜、恭城、兴安、全

州。

木材可作家具。种子油供工业用。树皮、叶滑肠；治便秘。

腺毛泡花树

*M. glandulosa* Cuf.

贺县、全州、龙胜、临桂、大瑶山、大苗山。

贵州泡花树

*M. henryi* Diels

靖西、宜山。

山青木

*M. kirkii* Hemsl. et Wils.

大瑶山。

崖县泡花树

*M. laui* Merr.

十万大山。

多花泡花树

*M. myriantha* S. et Z.

桂林、龙胜。

狭序泡花树

*M. paupera* H.-M.

苍梧、永福、阳朔、恭城、融安、南丹。

腋毛泡花树

*M. rhoifolia* Maxim.

*subsp. barbulata* Cuf.

全州、资源、那坡。

笔罗子 野枇杷

*M. rigida* S. et Z.

Meliosma-Sabia

(*M. patens* Hemsl.,

*M. rigida* S. et Z.

var. *patens* (Hemsl.) Cuf.)

陆川、苍梧、十万大山、临桂、大苗山、凌云。

种子油可制肥皂。树皮、叶可提制栲胶。木材供建筑用。

两广泡花树☆

*M. sinii* Diels

大瑶山。

绿樟 秤星树、野木棉

*M. squamulata* Hance

陆川、容县、贺县、十万大山、大瑶山、大苗山、罗城、临桂、

兴安、资源、全州。

木材供建筑用。

短柄清风藤

*Sabia brevipetiolata* L Chen

凌云、南丹。

防己叶清风藤

*S. discolor* Dunn

凌云、大瑶山、大苗山、临桂、龙胜、兴安、灌阳、全州、贺县。

巴东清风藤☆

*S. emarginata* Lec.

龙胜。

簇花清风藤☆

*S. fasciculata* Lec.

凌云、罗城、大瑶山。

茎治风湿骨痛。

清风藤 一刺两口

*S. japonica* Maxim.

兴安、临桂。

茎祛风湿，通经络；治风湿麻痹，跌打，疮肿。

华清风藤☆

*S. japonica* Maxim.

var. *sinensis* (Stapf) L.Chen

兴安。

柠檬清风藤☆

*S. limoniacea* Wall.

藤县、容县、十万大山、龙州、百色、大瑶山、阳朔、临桂。

茎治风湿，产后瘀血。

两广清风藤☆

*S. nervosa* Chun

大瑶山。

小花清风藤☆

*S. parviflora* Wall.

(*S. polyantha* H.-M.)

龙州、靖西、百色、田林、凌云、隆林、东兰。

台湾清风藤☆

*S. swinhoei* Hemsl.

十万大山、容县、永福、灵川、临桂、兴安、大苗山、凌云。

缴房清风藤☆

*S. swinhoei* Hemsl.

var. *subcorymbosa* (Stapf) L.Chen

融安。

Sabia-Turpinia

广西清风藤☆

*S. wangii* L.Chen

南丹。

204 省沽油科 STAPHYLEACEAE

野鸦椿 酒药树、鸡肾果

*Euscaphis japonica* (Thb.) Kanitz

区内各地。

根皮、树皮、果实、叶入药，通经活络，理气消积，退翳；治小儿疝气，水痘，天花，眼起白膜，月经不调，痢疾泄泻，风湿骨痛。种子油可制肥皂等用。树皮可提制栲胶。木材可作一般器具。

银鹊树 豆腐渣

*Tapiscia sinensis* Oliv.

全州、荔浦、龙胜、临桂、永福、大苗山、乐业、龙州。

广西山香圆

*Turpinia affinis* Merr. et Perry

容县、十万大山、大瑶山、大苗山、那坡、百色、隆林。

树干可培养香菇、木耳。

山香圆 五寸铁树、五寸刀

*T. arguta* Seem.

区内各地。

树干可培养木耳。叶治蛇头指，跌打，痈疮肿毒；又可作饲料。

光山香圆☆

*T. glaberrima* Merr.

那坡、容县。

狭叶山香圆☆

*T. glaberrima* Merr.

var. *stenophylla* Merr. et Perry

十万大山。

滇桂山香圆☆

*T. indochinensis* Merr.

十万大山。

大果山香圆

*T. pomifera* (Roxb.) DC.

(*T. nepalensis* Wall.)

德保、那坡、百色、凌云、田林、隆林、大瑶山、永福。

琼桂山香圆☆

*T. unifoliata* Merr. et Chun

上思、大新、靖西。

## 205 漆 树 科 ANACARDIACEAE

岭南酸枣 假酸枣

*Allospondias lakonensis* (Pierre) Stapf

(*Spondias chinensis* (Merr.) Metc.)

百色、武鸣、天峨、都安、贺县。

木材很软而且极轻，不耐腐，适作小家具、小件文具、箱板等用材。果熟时酸甜可食，有酒香。种子油可制肥皂，点灯。优良庭园绿化树。

腰果

*Anacardium occidentale* L.

桂南，原产热带美洲。

热带优良油料树种和果树。果托、种子可食，含油和蛋白质，种

子油为优良食用油，果壳有毒。木材供箱板、造船等用。

小叶山様子 赤楠

*Buchanania microphylla* Engl.

田林。

材质稍硬而轻，不耐腐，适作门、窗、农具、一般家具、板料等用材。

酸枣

*Choerospondias axillaris* (Roxb.) Burtt et Hill  
(*Spondias axillaris* Roxb.)

区内各地。

树皮、根皮和果消炎解毒，收敛止血，消食滞；治烫火伤，外伤出血，食滞腹泻，疮疡溃烂，疝气。木材可作船板、枪托、楼板、桌椅等用材。树皮、叶可提制栲胶。韧皮纤维可供造纸、编绳等用。果可食，酿酒。种壳可制活性炭。叶可作绿肥。

毛脉酸枣

*C. axillaris* (Roxb.) Burtt et Hill  
var. *pubinervis* (R. et W.) Burtt et Hill

百色。

人面子

*Dracontomelon daio* (Blanco) Merr. et Rolfe

陆川、平南、藤县、钟山、武鸣、宁明、龙州、那坡等地，栽培或野生。

果可生食，健胃，生津止渴，促进食欲，又可制成腌渍食品，也有和豆豉、辣椒等制成人面酱作菜。木材耐朽，供建筑、家具等用。种子油可供制肥皂等用。

厚皮树 喻木

*Lannea grandis* (Dennst.) Engl.

北海。

材质软，很轻，干燥后不开裂，不变形，但不耐腐，适作门、窗、农具、一般家具、板料等用材。心材很耐腐，常用作建筑、车辆、器具用材，又可造纸。树皮内含红色染料，可染渔网等。又可解吃河豚鱼中毒。嫩枝叶是很好绿肥。种子可榨油。

### \*杧果

*Mangifera indica L.*

桂东南一带为多，向北到柳州、宜山、河池。

热带有名果树，果可生食或制成腌渍食品、果酱，亦可酿酒。木材坚致，耐海水，适作车辆、造船、建筑、板料、家具用材。

果实疏风止咳，消滞止痒；治咳嗽，消化不良，皮炎湿疹，水肿，疝气。叶、树皮产黄色染料。优良行道树。

### 扁桃

*M. silvatica Roxb.*

左、右江各地最为普遍，野生或栽培。

用途参阅杧果。

### 泌脂藤☆

*Pegia bijuga H.-M.*

龙州、靖西、田林、隆林、东兰、天峨、河池。

### 脉果漆☆ 利黄藤

*Phlebochiton sinense Diels*

大明山、大新、崇左、天等等地。

全株治黄疸肝炎；叶治蛇伤，风湿，拔子弹。

### 黄连木 石山漆、楷木

*Pistacia chinensis Bunge*

桂北、桂西为多。

种子油可制肥皂、润滑油，点灯。木材坚重，供建筑、农具、家具、枕木、雕刻用。果、树皮、叶可提制栲胶。叶含芳香油。

根、枝、叶、皮可制农药，杀各种水稻害虫。嫩叶代茶，叫黄鹂茶或黄儿茶。

### 细叶楷木

*P. weinmannifolia* J. Poiss.

贵县、邕宁、武鸣、大新、龙州、那坡、靖西、田阳、凤山、都安。

根、叶治流感，眼痛，头疮。叶含芳香油。

### 盐肤木 五倍子树、盐酸树

*Rhus chinensis* Mill.

(*R. semialata* Merr.)

区内各地。

根、果、叶、虫瘿入药，敛肺涩肠，止血消汗，凉血解毒，活血散瘀；治中耳炎，痢疾，蛇伤，咳嗽，咯血，崩漏，脱肛，火伤，白口疮，无名肿毒，盗汗，腹泻。五倍子虫寄生在枝叶上，形成虫瘿，即五倍子，可作收敛剂和生物碱中毒的解毒药，提制鞣酸、墨水和黑色染料，也用于塑料工业。树皮亦含鞣酸。种子油制肥皂、润滑油。树脂作油漆原料。叶煮液作土农药，防治棉蚜、稻苞虫、蔬菜害虫。根煮液防治水稻害虫。嫩果味酸，可泡水代醋，故又称盐酸树。叶作绿肥。

### 滨盐肤木 盐霜白

*R. chinensis* Mill.

var. *roxburghiana* (DC.) Rehd.

苍梧、昭平、大苗山、大瑶山、永福、龙胜、临桂、资源、武鸣、龙州、德保、那坡、乐业。

亦产五倍子。根、叶凉血降火，去瘀生新，消肿止痛；治麻疹，咳嗽咯血，跌打骨折，风湿关节炎，喉炎，化脓性炎症，胃

痛，蛇伤。花、果治口腔糜烂。

### 野漆树

*R. succedanea* L.

区内各地。

叶、果、根清热解毒，散瘀生肌，利尿通淋；治尿血，血崩，白带，外伤出血，子宫下垂。种子油制肥皂，或掺合干性油作油漆。果皮的蜡质为膏药、蜡纸、蜡烛、香膏等原料。树干可割取漆液，代生漆用，涂漆烟杆、烟袋等器物（见于桂北山区）。树皮和枝可提栲胶。木材为细工用材。叶、根作农药，参阅盐肤木。有人接触本种树液或枝叶，易生漆疮。

### 山漆树

*R. silvestris* S. et Z.

区内各地。

种子油可制肥皂、油墨和油漆。叶止血。果治毒蛇伤。叶、根作土农药，参阅盐肤木。用时勿触及皮肤，以免生漆疮。

### 漆树

*R. verniciflua* Stokes

桂北。龙胜、兴安、隆林等地有零星栽培。

从树干割取的生漆，是优良的防腐、防锈涂料，耐酸，耐碱，耐醇，耐高热，用于涂漆建筑、家具、器具、电线、广播器材等。种子油可制高级香皂、香脂、油墨、蜡烛等，也可掺合油漆使用，可作灯油。果蜡可制蜡烛、蜡纸。叶可提制栲胶。使用时宜慎，有些人对漆过敏，易生漆疮。

## 206 牛栓藤科 CONNARACEAE

### 滇桂牛栓藤

*Connarus tonkinensis* H.Lec.

靖西、那坡、大新、龙州。

Santalodes-Carya

红叶藤 牛栓藤、牛见愁、荔枝藤

*Santalodes microphyllum* Hk. et Arn.

(*Rourea microphylla* Pl.)

灵川、龙州、宁明、扶绥、邕宁、横县、武鸣、南宁、百色、那坡、贵县、博白、平南、陆川、容县、梧州、苍梧、藤县、大瑶山。

藤可制绳索，常用以做犁缆，套牛鼻，作牛鞭。叶外敷，埋口生肌，收敛止血；治跌打，刀伤。果可食。

大叶红叶藤

*S. roxburghii* (Hk. et Arn.) O Ktze.

(*Rourea millettii* Pl.)

靖西、苍梧、贺县、容县、大瑶山、横县、龙州、扶绥、都安。藤可制绳索。

207 胡桃科 JUGLANDACEAE

喙嘴核桃

*Annamocarya sinensis* (Dode) Leroy

(*Rhamphocarya integrifoliolata* Kuang)

永福、隆林。

用材。种子油工业用。

山核桃

*Carya cathayensis* Sarg.

隆林、大苗山、融安。

材质重，少开裂，供建筑、车轮、农械等用。种子可食及制糕饼。果壳制活性炭。

青钱柳

*Cyclocarya paliurus* (Batal.) Iljinsk.  
(*Pterocarya paliurus* Batal.)

乐业、东兰、大苗山、永福。

黄杞

*Engelhardtia chrysolepis* Hance

区内各地。

木材轻软，富弹性，但不耐腐，可作家具、用具。树皮可提单宁及制人造纤维。叶、树皮防治农业害虫。

短翅黄杞 山马劣树

*E. colebrookiana* Lindl.

隆林、百色、田林、平果、那坡、东兰、河池。

木材用途同上。

穗序黄杞 云南黄杞

*E. spicata* Bl.

德保、那坡、靖西、百色、凌云、田阳。

木材用途参阅黄杞。树皮可提制栲胶。茎皮纤维制绳索。

华核桃 野核桃

*Juglans cathayensis* Dode

凌云、乐业、隆林、阳朔、龙胜。

种子油供食用，制肥皂及润滑油等用。果仁生食或配制糕点。木材可作枪托等军工用材。树皮和外果壳可提制栲胶。茎皮纤维造纸及制人造棉。

\*核桃 胡桃

*J. regia* L.

天峨、乐业、凌云、隆林、田林、桂林。

种仁生食或加工为高级食品，配制糕点或配菜佐膳。仁含油率高。

Platycarya-Roiptelea

樟油供食用，又宜配制绘画油料。其他用途参阅华核桃。

小化香树☆

*Platycarya glandulosa* Chun, ined.

隆林、田林、西林、靖西、凌云、田阳、龙州、全州、桂林、临桂。

木材宜制火柴杆。树皮提制栲胶。烧老木可驱蚊。

长化香树☆

*P. longipes* Wu

临桂、凌云、隆林。

化香树

*P. strobilacea* S. et Z.

田阳、隆林、凌云、桂林、临桂、灵川、兴安、龙胜。

木材宜制火柴杆和器具等物。树皮、根皮、叶和果实为良好栲胶原料。茎皮纤维代麻用。根和老木提芳香油作调香原料。叶作土农药。花制黄色染料。叶饲茶虫。果实散郁气；治胃病。叶解毒消肿；治头疮，无名肿毒。烧老木可驱蚊。

枫杨

*Pterocarya stenoptera* C.DC.

区内各地，桂北较多。

木材制火柴杆、家具、用具。叶和树皮制粉剂、溶剂治棉蚜虫，地老虎等。种子油制肥皂及润滑油。树皮提制栲胶，制染料染渔网。茎皮纤维代麻，造纸或人造棉。根、叶杀虫止痒；治血吸虫病，脚癣，痈疮。为紫胶虫寄主树之一。

207A 马尾树科 RHOIPTLEACEAE

马尾树 漆榆

*Roiptelea chiliantha* Diels et H.-M.

大苗山、融安、临桂、龙胜、兴安、那坡、田林、凌云、乐业、

百色。

树皮、叶提栲胶。树干可培养香菌。

## 209 山茱萸科 CORNACEAE

桃叶珊瑚 野蓝靛

*Aucuba chinensis* Benth.

临桂、龙胜、上思、大苗山、那坡。

叶治跌打，止痛。

狭桃叶珊瑚☆

*A. chinensis* Benth.

*forma angustifolia* Rehd.

龙胜、临桂。

纤尾桃叶珊瑚

*A. filicauda* Chun et How

龙胜、临桂。

灯台树 狗骨木、伞把树、米杯（壮音）

*Cornus controversa* Hemsl.

临桂、龙胜、兴安、资源、永福、大瑶山、大苗山、凌云、乐业、南丹。

木材坚硬，可作油榨楔木、建筑、器具、雕刻等用材。果可鲜食，亦可酿酒。树皮提制栲胶。种子油制肥皂和润滑油。

\*山茱萸 枣皮、萸肉

*C. officinalis* S. et Z.

分布于华中、华北，我区有引种。

果实补肝肾，涩精，止汗。治腰膝痺痛，眩晕耳鸣，阳萎遗精，小便频数，月经过多，虚汗不止等。

贵州梾木

*C. parviflora* Chien

Cornus-Helwingia

南丹、凌云。

茎皮纤维造纸，搓绳。树皮提制栲胶。种子油工业用。全株清热解毒。

小株木

*C. paucinervis* Hance

天峨、南丹、隆林、柳城。

鄂西株木 万吉滑

*C. wilsoniana* Wanger.

桂林、临桂。

狭叶四照花 山荔枝

*Dendrobenthamia angustata* (Chun) Fang

全州、兴安、临桂、资源、大瑶山、大苗山。

褐毛四照花

*D. ferruginea* (Wu) Fang

大瑶山。

果可食。

香港四照花 癞杨梅、山荔枝

*D. hongkongensis* (Hemsl.) Hutch.

(*Cornus hongkongensis* Hemsl.)

各地林区。

果可食。

华青莢叶

*Helwingia chinensis* Batalin

南丹、凌云、大苗山。

叶清热除湿；治痢疾，便血，落胎。果治胃病。嫩叶可食，并可焙制茶叶作饮料。嫩枝、叶作饲料。

钝齿华青荚叶

*H. chinensis* Batalin

var. *crenata* Fang

龙胜。

西南青荚叶☆

*H. himalaica* Hk.f. et Thoms.

罗城、凌云、隆林、全州。

青荚叶

*H. japonica* (Thb.) Dietr.

资源、龙胜、隆林。

叶清热除湿；治痢疾，便血，落胎；果治胃病。

210 八角枫科 ALANGIACEAE

八角枫 华瓜木

*Alangium chinense* (Lour.) Harms

区内各地。

木材轻软，可制家具。叶作饲料。根皮有毒，散瘀止痛；治麻痺，风湿性关节炎，跌打。

全州八角枫

*A. chungii* H.L.Li

全州。

西南八角枫 小黄花树

*A. faberi* Oliv.

全州、兴安、临桂、龙胜、大瑶山、大苗山、苍梧、东兰、南丹、罗城。

叶治跌打。

Alangium-Camptotheca

阔叶西南八角枫

*A. faberi* Oliv.

var. *platyphyllum* Chun et How

十万大山、大瑶山。

根行气去湿；治胃病。

毛八角枫

*A. kurzii* Craib

(*A. kwangsiense* Melch.,

*A. tomentosum* (Bl.) H.-M.)

天峨、大苗山、大瑶山、上林、武鸣、大明山、龙州、苍梧、梧州。

用途参阅八角枫。

广西八角枫 瓜木、猪耳桐

*A. platanifolium* (S. et Z.) Harms

桂北。

树皮提制栲胶。茎皮纤维造纸，制人造棉。

圆叶八角枫

*A. rotundifolium* (Hassk.) Bloemb.

var. *laxifolium* Wu

大瑶山。

## 211 紫 树 科 NYSSACEAE

喜树 水桐树、旱莲

*Camptotheca acuminata* Decne.

凤山、南丹、河池、罗城、隆林、凌云、靖西、德保、大瑶山、

桂林、临桂、兴安。

木材宜供造纸、制用具等用。根皮、果有毒，含喜树碱，抗癌；

治白血病，胃癌，风湿关节痛。

广西紫树

*Nyssa chieniana* Fang et Soong

十万大山。

华南紫树

*N. javanica* (Bl.) Wanger.

十万大山。

紫树

*N. sinensis* Oliv.

临桂、全州、兴安、龙胜、资源、大苗山、大瑶山、罗城、凤山、

凌云、隆林、十万大山。

木材作舟车、家具、建筑等用材。

## 212 五加科 ARALIACEAE

萸叶五加

*Acanthopanax evodiaefolius* Fr.

临桂、资源、兴安、象州、大瑶山。

细柄萸叶五加

*A. evodiaefolius* Fr.

var. *gracilis* W.W.Sm.

十万大山、大瑶山、大明山、资源、兴安、临桂。

五加 细柱五加

*A. gracilistylus* W.W.Sm.

临桂、兴安、全州、靖西。

根皮祛风湿，壮筋骨；治风湿骨痛，跌打损伤，腰肌劳伤，阳萎，脚气，阴囊湿疹。枝叶作农药治棉蚜虫、地老虎等。嫩叶可作蔬菜。全株提芳香油作食品调香原料。

节花五加

*A. gracilistylus* W.W.Sm.

var. *nodiflorus* (Dunn) H.L Li

扶绥。

三叶五加 白花簕、三爪风、白簕

*A. trifoliatus* (L.) Merr.

兴安、临桂、恭城、大瑶山、柳州、容县、北流、平南、陆川、田林、隆林、乐业。

根、叶祛风除湿，散瘀止痛；治风湿跌打，刀伤骨折，咳嗽胸痛，

尿路结石，疮疡疖肿等。全株亦可提芳香油作食品调香原料。

刺毛三叶五加

*A. trifoliatus* (L.) Merr.

var. *setosus* H.L Li

十万大山、百色、隆林、龙胜、兴安。

根皮及茎皮祛风除湿；治风湿脚气，腰膝疼痛，阳萎，阴囊湿痒。

广东楤木

*Aralia armata* (Wall.) Seem.

龙州、上思、百色。

根皮散瘀消肿，祛风除湿；治跌打损伤，风湿骨痛，肝炎，肾炎，

痈疮疖肿，痢疾，白带等。

拟厚叶楤木

*A. chinensis* L

var. *dasyphyloides* H.-M.

桂林尧山、临桂、贺县。

光叶楤木☆

*A. chinensis* L.

var. *nuda* Nakai

凌云、龙胜。

根皮清热利湿，解毒止痛；治咳嗽，疮毒，淋浊带下，血崩，眼生翳膜，蛇伤，犬伤。

心叶楤木 土当归、水白芷、九眼独活

*A. cordata* Thb.

大苗山、资源、龙胜。

根治风湿疼痛，腰膝痠痛，四肢萎痹，鹤膝风，目眩，牙痛等。

厚叶楤木☆

*A. dasypylla* Miq.

龙胜、大瑶山、象州、那坡、隆林、宁明。

鸟不企

*A. decaisneana* Hance

十万大山、宁明、龙州、武鸣、柳城。

根祛风除湿，散瘀消肿；治风湿腰腿痛，急慢性肝炎，跌打损伤，肾炎水肿。亦作兽药用。

刺茎楤木

*A. echinocaulis* H.-M.

临桂、灵川、凌云、资源。

秀丽楤木

*A. elegans* Ho

平南、大瑶山。

小叶楤木

*A. foliolosa* (Wall.) Seem.

桂西南。

刺叶楤木

*A. spinifolia* Merr.

临桂、梧州、大瑶山。

Aralia-Brassaiopsis

根驳骨解毒；治头昏头痛，吐血，血崩，风湿，跌打，蛇伤。  
波叶楳木

*A. undulata* H.-M.

凌云、龙州、龙胜。

狭叶掌叶树☆

*Brassaiopsis angustiloba* (Hu) Hoo

大苗山、大瑶山。

睫毛掌叶树

*B. ciliata* Dunn

凌云、隆林、龙胜。

黄毛掌叶树

*B. ferruginea* (Li) Hoo

(*Dendropanax ferrugineus* Li)

大瑶山、大苗山、龙胜、隆林、贺县。

掌叶树 刺鸭脚

*B. glomerulata* (Bl.) Regel.

龙胜、上思、大瑶山、平南、宁明、龙州、隆林。

根和树皮祛风活络，补肝肾，强筋骨；治骨折，扭挫伤，风湿关节痛，腰肌劳损。叶治牛脱臼。

长花柄掌叶树

*B. glomerulata* (Bl.) Regel.

var. *longipedicellata* H.L Li

大瑶山、龙州、宁明、靖西、凌云。

细弱掌叶树

*B. gracilis* H.-M.

乐业。

广西掌叶树☆

B. kwangsiensis Hoo

凌云。

显脉掌叶树☆

B. phanerophlebia (Merr et Chun) Ho

(Acanthopanax phanerophlebia Merr et Chun)

大瑶山、容县。

栎叶掌叶树

B. quercifolia Hoo

阳朔。

尖苞掌叶树☆

B. spinibracteata Hoo

隆林。

长尖叶木五加

Dendropanax acuminatissimus Merr.

苍梧、容县、大瑶山。

全株祛风除湿。

狭瓣木五加

D. angustilobus (Hu) Merr.

上思、隆林。

双室木五加

D. bilocularis Ho

容县、大瑶山。

枫榈桂 阴阳枫

D. chevalieri (Vig) Merr.

Dendropanax

资源、临桂、龙胜、恭城、阳朔、兴安、贺县、大明山、象州、大苗山、玉林、乐业。

根和树皮驱风湿，通经络，散瘀血，壮筋骨；治风湿骨痛，瘫痪，扭挫伤，痈，疖等。

齿叶枫桐桂

*D. chevalieri* (Vig.) Merr.

*var. dentigerus* (Harms) H.L.Li

临桂、大瑶山。

密花木五加

*D. confertus* H.L.Li

大瑶山、临桂。

细梗木五加☆

*D. gracilis* Tseng et Hoo

十万大山。

海南木五加

*D. hainanensis* (Merr. et Chun) Chun

十万大山、龙州、凌云、百色、大瑶山、大苗山、象州、临桂、龙胜、兴安、贺县、平南。

培养香菌树种。

胀果木五加

*D. inflatus* H.L.Li

凌云。

广西木五加

*D. kwangsiensis* H.L.Li

十万大山。

大果木五加

*D. macrocarpus* Ho

那坡、武鸣。

假小花木五加

*D. parvifloroides* Ho

龙州。

小花木五加

*D. parviflorus* (Champ.) Benth.

武鸣、大瑶山。

三层楼 半枫荷

*D. proteus* (Champ.) Benth.

十万大山、大明山、容县、平南。

根祛风除湿，活血通络；治风湿痹痛，腰肌劳损，跌打瘀积肿痛，产后风瘫，疮毒。

星花木五加

*D. stellatus* H.L.Li

龙州。

大果五加 马蹄藪、野枇杷

*Diplopanax stachyanthus* H.-M.

上思、十万大山、大明山、大瑶山、大苗山、融安、罗城、龙胜。

材用。

常春藤

*Hedera nepalensis* K.Koch

*var. sinensis* (Tobler) Rehd.

乐业、龙胜、桂林、永福、临桂、全州、容县、贵县。

全株舒筋散风；治肚痛，咳嗽、风湿。

Heteropanax-Macropanax

短柄幌伞枫

*Heteropanax brevipedicellatus* H.L.Li

上思、平南、大瑶山、阳朔、临桂、永福、大明山。

根和树皮治跌打损伤，烫火伤，疮毒。

华幌伞枫

*H. chinensis* (Dunn) H.L.Li

十万大山。

根和树皮治疗疮，跌打。

幌伞枫 阿婆伞、凉伞木、五加通、大蛇药

*H. fragrans* (Roxb.) Seem.

百色、龙州。

根皮凉血解毒，消肿止血；治烧伤，脓疮，疖肿，无名肿毒，

骨髓炎，骨折，扭挫伤，蛇伤，风热感冒。髓心利尿。

刺楸 百鸟不落

*Kalopanax pictus* (Thb.) Nakai

临桂、阳朔、龙胜。

木材供建筑、船舰、车辆等用材。根清热除湿，止痛生肌；治骨

折，湿热疼痛，周身浮肿。皮代中药海桐皮治赤白痢，风湿痛，

脚气，疮疥。树皮和叶提制栲胶。种子油制肥皂用。嫩叶可食。

节梗大蔓☆ 小五加

*Macropanax rosthornii* (Harms) Wu ex Hoo

(*Nothopanax rosthornii* Harms)

临桂、龙胜、隆林。

根、茎皮驱风除湿，化瘀生新；治骨折，风湿痛。

光缘大蔓

*M. undulatus* (Wall.) Seem.

龙州。

野三七 蜈蚣七、竹节三七、竹节人参

*Panax noto-ginseng* (Burk.) Hoo

(*P. pseudo-ginseng* auct., non Wall.,

*Aralia quinquefolia* A Gray

var. *notoginseng* Burk.)

兴安、全州、龙胜、资源、临桂、灵川、大苗山。

医药用途同田七。

\*田七 三七、田州三七

*P. sanchi* Hoo, ms.

靖西、德保、那坡、田东等地。

根茎止血散瘀，消肿止痛；治跌打损伤，肿痛，出血，吐血，衄血，便血，子宫出血，经闭症瘕，产后瘀阻腹痛，以及痈疽疮肿等症。

七叶莲 七加皮、鹅掌藤

*Schefflera arboricola* Hayata

本区南部较多，永福、鹿寨、荔浦、临桂，也有分布。

全株舒筋活络，消肿止痛；治风湿骨痛，跌打损伤，瘫痪，胃痛。

川黔鸭脚木☆

*S. bodinieri* (Lévl.) Rehd.

凌云、乐业。

绒毛鸭脚木☆ 大加皮

*S. delavayi* (Fr.) Harms

(*S. delavayi* Fr.

var. *ochrascens* (H.-M.) Ho

*S. discolor* Merr.)

龙胜、兴安、临桂、容县、苍梧、大瑶山、田林、凌云。

根、皮祛风活络，强筋骨，补肝肾；治骨折，扭伤，风湿骨痛，

Schefflera

腰肌劳损。

团花鸭脚木

*S. glomerulata* H.L.Li

百色、靖西、隆林、龙州、上林、凤山、平南、临桂、永福。

白叶鸭脚木

*S. hypoleuca* (Kurz) Harms

大瑶山、田林、凌云。

根、皮消肿止痛；治骨折，便秘，腹痛。

广西鸭脚木

*S. kwangsiensis* Merr. ex H.L.Li

十万大山、扶绥、大明山。

上思鸭脚木☆

*S. metcalfiana* Merr. ex H.L.Li

上思。

小星鸭脚木

*S. minutstellata* Merr. ex H.L.Li

大瑶山、龙胜、那坡、武鸣、大明山。

鸭脚木 鹅掌柴

*S. octophylla* (Lour.) Harms

区内各地。

木材宜制火柴杆、蒸笼、筛头及家具。全株作硃砂原料。树皮、嫩枝叶提取芳香油用于食品香精中。全株凉血解毒，散瘀消肿；治流感咽喉肿痛，风湿骨痛，跌打损伤，皮炎湿疹。根、茎皮作兽药治牛、猪癰疮大热，风湿筋骨痛，跌打肿痛，痈疮湿毒。蜜源植物。

密脉鸭脚木

*S. venulosa* (W. et A.) Harms

靖西、百色。

通脱木 五加通、大通、通草

*Tetrapanax papyriferus* (Hk.) K Koch

融安、凌云、乐业。

茎髓清热利尿，散瘀下乳；治水肿，尿路感染，症瘕腹痛，月经不调，乳汁不下。

广叶参树

*Trevesia palmata* (Roxb.) Vis.

大明山、龙州、南丹。

叶治跌打。

## 212A 烂泥树科 TORRICELLIACEAE

烂泥树

*Torricellia angulata* Oliv.

隆林、田林。

绿肥用。

齿叶烂泥树☆ 烂泥巴树、接骨丹、懒茶叶

*T. angulata* Oliv.

var. *intermedia* (Harms) Hu

隆林、凌云、那坡、大苗山。

绿肥用。

## 213 伞形科 UMBELLIFERAE

\* 茴萝

*Anethum graveolens* L.

果行气健胃，散瘀止血；治气胀，两胁痞满，小腹冷痛。果可提芳香油，作调合香精原料。

### Angelica-Bupleurum

香白芷 柠檬香咸草、人参归

*Angelica citriodora* Hance

全州、临桂、桂林、柳州、柳江、大瑶山、平南、桂平、贵县、玉林、博白等地。

根止血活血，散瘀消肿，行气止痛；治鼻衄，咳嗽咯血，肝硬化腹水，胃痛，风湿关节痛，跌打，闭经。

### \*白芷

*A. dahurica* Benth. et Hk.

桂林、昭平、南宁等地。

根祛风止痛，发表；治感冒头痛，眉棱骨痛，鼻渊头胀痛，疮疖脓肿痛，蛇伤，白带。种子、根含芳香油。种子含脂肪油。

柔毛当归 香独活

*A. pubescens* Maxim.

全州。

根祛风止痛；治风湿关节痛，腰膝痠痛，感冒风寒头痛，疮疖肿痛。

### \*芹菜

*Apium graveolens* L.

蔬菜。全草治高血压，根治气管炎。果可提芳香油，可调合香精，用于食品、香皂、香脂等。

柴胡 南柴胡、竹叶柴胡

*Bupleurum falcatum* L.

永福、桂林、龙胜、资源、全州、大瑶山，武鸣。

全草发表退热，疏肝解郁，调经；治感冒发热，疟疾，月经不调，子宫下垂，肝炎，原发性非典型肝炎，胸胁痛。种子含脂肪油。

\*南柴胡 狹叶柴胡

*B. scorzoneraefolium* Willd.

我区有引种。

根、全草疏肝解郁，升阳举陷，发表和里；治肝郁不舒，胸胁胀痛，感冒，寒热阵发，头眩呕吐，疟疾，月经不调，中气下陷，久泻脱肛，子宫下坠等。

崩大碗 积雪草、雷公根、灯盏菜

*Centella asiatica* (L.) Urb.

区内各地。

全草清热解毒，凉血，消炎；治感冒，扁桃体炎，肝炎，尿路感染，解断肠草、木薯、毒蕈中毒；又可作凉茶。作农药，可防治蚜虫和菜青虫。作兽药，治家畜大热症，暑症，尿少，疮痈疗毒，跌打，蛇伤，鼠咬，牛、猪皮肤痒疹。

蛇床子

*Cnidium monnieri* (L.) Cuss.

(*Selinum monnieri* L.)

桂林、龙胜、梧州、大苗山、河池、隆林。

果温肾壮阳，燥湿杀虫；治阴道滴虫，皮肤及阴囊湿疹，子宫下垂，宫寒不孕，阳萎，白带。果可提取芳香油，配制香精。种子含脂肪油。作农药，果水浸或煮液可防治小麦和玉米蚜虫、红蜘蛛，可抑制红薯黑斑病、稻斑病等孢子发芽。

\*芫荽

*Coriandrum sativum* L.

区内各地。

蔬菜。全草、种子发表透疹，散寒理气；治麻疹、痘疹不透，胸胁满闷，食积不消，外治牙痛，脱肛。果可提制芳香油，有二氢茉莉酮气味，可调制香精。又含脂肪油，可作肥皂、油酸原料。

Cryptotaenia-Hydrocotyle

鸭儿芹 鸭脚板

*Cryptotaenia canadensis* (L.) DC.

var. *japonica* (Hassk.) Mak.

(*C. japonica* Hassk.)

临桂、龙胜、大苗山、大瑶山、南丹、东兰、龙州等地。

根或全草发表散寒，温肺止咳；治风寒感冒，寒咳，尿闭。

\*胡萝卜 红萝卜

*Daucus carota* L.

var. *sativa* DC.

区内各地。

根作蔬菜。又可提取胡萝卜素。种子治虫积腹痛，腹泻，慢性痢疾。果可提芳香油，作调香原料。

刺芫荽 洋芫荽、香芫荽

*Eryngium foetidum* L.

玉林、梧州、贺县、桂林、大瑶山、武鸣、南宁等地。

全草疏风除热，芳香健胃；治感冒，胸痛，消化不良，肠炎腹泻，蛇伤。又作食用香料。

\*茴香 小茴香

*Foeniculum vulgare* Mill.

区内各地。

种子理气开胃；治胃痛，脘腹胀满。根、叶治风湿痛，疝气痛。

蔬菜。果含芳香油，可作食品调味的香料，配制酒、糖果、牙膏、牙粉等香精用。

红马蹄草

*Hydrocotyle nepalensis* Hk.

(*H. javanica* auct., non Thb.)

区内各地。

全草清凉解热，散瘀消肿；治吐血，咳嗽，跌打，腹痛，湿疹。  
闹鱼。

天胡荽 满天星、盆上芫荽

*H. sibthorpioides* Lam.

区内各地。

全草清热利尿，散瘀消肿；治黄疸肝炎，感冒发热，尿路结石，  
疖肿，结膜炎。

破铜钱 花边灯盏

*H. sibthorpioides* Lam.

var. *batrachium* (Hance) H.-M.

(*H. rotundifolia* auct., non Roxb.)

区内各地。

用途参阅天胡荽。

肾叶天胡荽 小灯盏、鱼藤草

*H. wilfordii* Maxim.

兴安、全州、龙胜、临桂、大苗山、柳州、贺县。

闹鱼。

藁本 川香(广西)、西芎

*Ligusticum sinense* Oliv.

全州、资源、兴安、龙胜、大苗山、乐业。

全草或根茎发散风寒，祛风止痛；治风寒感冒，发热头痛，巅顶  
痛，身疼，腹痛，泄泻。果实和根含芳香油，可作调香原料。

\*川芎

*L. wallichii* Fr.

大瑶山、大苗山、乐业。

根茎活血行气，祛风止痛；治月经不调，偏正头痛，头风眩晕，  
胸胁作痛，疮疡肿痛。

Oenanthe-Peucedanum

少花水芹

*Oenanthe benghalensis* Benth et Hk f.

区内各地。

水芹

*O. decumbens* (Thb.) K.-Pol.

(*O. javanica* DC.,

*O. stolonifera* (Roxb.) Wall. ex DC.)

区内各地。

可充蔬菜。全草治头目眩晕，肾虚浮肿。

野芹

*O. sinensis* Dunn

(*O. stolonifera* (Roxb) Wall. ex DC.

*forma elongata* Metc.)

区内各地。

猪饲料。

前胡 紫花前胡

*Peucedanum decursivum* (Miq.) Maxim.

区内各地。

根发散风热，降气祛痰；治感冒发热，咳嗽，痰稠，胸闷不适，

外敷疮疖肿毒。果含芳香油，为香精原料。根作兽药，治家畜外感，风热咳嗽，痰多气喘。

白花前胡

*P. praeruptorum* Dunn

桂北、昭平、贵县等地。

根发散风热，降气止咳；治感冒咳嗽，咽喉肿痛，胸胁胀满。果含芳香油，供香精用。

鹅脚板

*Pimpinella diversifolia* (Wall.) DC.

柳州、桂林。

根、全草消肿止痛，祛风散寒；治大蜂刺伤后疼痛，蛇伤，感冒，胃痛，痢疾，外敷手腕脉上治疟疾。果含芳香油，有茴香的香气，可作调香原料。

江西肿瓣芹☆

*Pternopetalum kiangsiense* (Wolff) H.-M.

资源、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山。

入地蛇

*P. nudicaule* (de Boiss.) H.-M.

var. *esetosum* H.-M.

桂北。

山芹菜☆

*Sanicula chinensis* Bunge

全州、资源、龙胜、东兰。

蒙自山芹菜☆

*S. henryi* Wolff

桂西北。

掌脉山芹菜 肺筋草

*S. lamelligera* Hance

兴安、龙胜、临桂、大苗山、容县。

全草润肺止咳，清热解表，行血调经；治感冒咳嗽，劳伤咳嗽，月经不调，小儿脐风。

直刺山芹菜

*S. orthacantha* S. Moore

全州、大苗山、隆林。

Torilis-Clethra

窃衣

*Torilis anthriscus* (L.) Gmel.

全州、临桂、柳州、罗城、天峨、乐业、隆林等地。  
果能驱蛔虫，外用作消炎药，又含芳香油。

214 山 柳 科 CLETHRACEAE

小山柳☆

*Clethra bodinieri* Lévl.

十万大山、大瑶山、大苗山、凌云。

小叶山柳

*C. bodinieri* Lévl.

var. *parvifolia* S.Y.Hu

上思。

萍乡山柳☆

*C. brammeriana* H.-M.

大苗山、全州。

华中山柳☆

*C. cavaleriei* Lévl.

凌云、大明山、大瑶山、昭平、永福、荔浦、灵川、龙胜、兴安、全州。

贵州山柳☆

*C. esquirolii* Lévl.

兴安、龙胜、贺县、大苗山、田林。

山柳

*C. fabri* Hance

(*C. liangii* H.L.Li)

十万大山、武鸣、扶绥、龙州、靖西、田林、凌云。

嘉宝山柳

*C. kaipoensis* Lévl.

兴安、龙胜、临桂、永福、大苗山、宜山。

根、叶祛风镇痛；治风湿关节痛。

广西山柳

*C. kwangsiensis* S.Y.Hu

资源、全州。

平伐山柳

*C. pinfaensis* Lévl.

大苗山、凌云。

多脉山柳

*C. polyneura* H.L.Li

凌云、阳朔、灵川、龙胜、兴安、恭城。

云南山柳☆

*C. smithiana* Fang

凌云。

215 杜鹃花科 ERICACEAE

广东假吊钟

*Craibiodendron kwangtungense* S.Y.Hu

十万大山、北流。

矮假吊钟

*C. kwangtungense* S.Y.Hu

var. *frutescens* S.Y.Hu

十万大山。

假吊钟 火炭木、厚皮树

*C. stellatum* (Pierre) W.W.Sm.

Enkianthus-Gaultheria

龙州、靖西、德保、平果、田林、那坡、百色、凌云、乐业、隆林、凤山、南丹、都安、巴马、梧州。

叶有毒，舒筋活络；治风湿，跌打，瘫痪。树皮可提制栲胶。防火林带树种。

灯笼树

*Enkianthus chinensis* Fr.

全州、资源、灌阳、兴安、龙胜、大瑶山、大苗山、大明山。

少花吊钟

*E. pauciflorus* Wils.

大瑶山。

吊钟花

*E. quinqueflorus* Lour.

容县、贺县、大瑶山、临桂、龙胜、全州、十万大山、大明山、大新。

绿化花木；广州等地，在农历春节时，常用作大型瓶花。

晚花吊钟

*E. serotina* Chun et Fang

龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、凌云、隆林、德保、大明山。

细齿吊钟

*E. serrulatus* (Wils.) Schneid.

临桂、龙胜、灌阳、大苗山、大瑶山、罗城、容县。

满山香 白珠木

*Gaultheria yunnanensis* (Fr.) Rehd.

(*G. laxiflora* Diels,

*Vaccinium yunnanensis* Fr.)

昭平、永福、临桂、龙胜、兴安、恭城、资源、全州、大苗山、大瑶山、罗城、南丹、凌云、乐业、田林、隆林、那坡、大明山、马山。

全株或根祛风除湿，活血散瘀；治风湿，跌打，骨折，脉管炎，闭经，劳伤，感冒，水肿，疮疡。枝、叶可提取芳香油，主要成分为水杨酸甲脂，供调配牙膏、牙粉、食用香精。

硬毛满山香☆ 硬毛滇白珠

*G. yunnanensis* (Fr.) Rehd.

var. *hirsuta* D. Fang et N K Liang, ined.

桂平。

宽叶南烛☆

*Lyonia doyonensis* H.-M.

隆林、那坡。

美丽南烛

*L. formosa* (Wall.) H.-M.

全州、资源、灌阳、恭城、兴安、龙胜、灵川、临桂、大苗山、凌云、田林。

粉绿南烛☆

*L. glaucooides* Chun

大瑶山。

南烛 泪木

*L. ovalifolia* (Wall.) Drude

全州、资源、临桂、永福、大苗山、大瑶山、田林、隆林、那坡、十万大山等地。

叶有毒。根、叶收敛止泻，强筋，强壮益气。茎、叶的液汁可作染料。

椭圆叶南烛

*L. ovalifolia* (Wall.) Drude

var. *elliptica* (S. et Z.) H.-M.

临桂、龙胜、兴安、隆林、大瑶山、十万大山等地。

剑叶南烛

*L. ovalifolia* (Wall.) Drude

var. *lanceolata* (Rehd.) H.-M.

全州、临桂、永福、大瑶山、南丹、东兰、凌云、乐业、靖西、  
大明山、横县、玉林等地。

红脉南烛

*L. rubrovenia* (Merr.) Chun

宁明、那坡、凌云。

安徽杜鹃(注)

*Rhododendron anhweicense* Wils.

资源、兴安。

石壁杜鹃☆ 石壁柴

*R. bachii* Lévl.

兴安、龙胜、灵川、临桂、阳朔、大苗山等地。

短脉杜鹃

*R. brevinerve* Chun et Fang

资源、兴安、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、靖西、田林。

心型杜鹃

*R. cardiobasis* Sleum.

全州、资源、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、横县。

羊角杜鹃☆ 羊角柴

*R. cavaleriei* Lévl.

全州、资源、灌阳、兴安、龙胜、大瑶山、容县。

太平杜鹃 广东杜鹃

*R. championae* Hk.

大瑶山、大苗山、恭城。

---

注：本属植物的花美丽，多可供庭园绿化用。有些种类还可供药用。

红滩杜鹃

*R. chihsinianum* Chun et Fang

龙胜、资源、大苗山。

金萼杜鹃

*R. chrysocalyx* Lévl. et Van.

十万大山。

花坪杜鹃

*R. chunnienii* Chun et Fang

龙胜、临桂、兴安、灌阳、资源、全州、大苗山、大瑶山。

苍山杜鹃

*R. delavayi* Fr.

隆林。

花有小毒，清热，拔毒，止血，调经；治骨髓炎，消化道出血，衄血，咯血，月经不调。

信宜杜鹃

*R. faithae* Chun

容县、大瑶山、大苗山。

华丽杜鹃

*R. farrerae* Tate

龙胜、临桂、阳朔、大明山。

天目杜鹃

*R. fortunei* Lindl.

全州、资源、兴安、临桂、容县。

血色杜鹃

*R. haematodes* Fr.

大瑶山。

Rhododendron

海南杜鹃

*R. hainanensis* Merr.

十万大山。

蒙自杜鹃

*R. hancockii* Hemsl.

十万大山、凌云、乐业。

红岩杜鹃

*R. haofui* Chun et Fang

资源、兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、田林。

罗浮杜鹃

*R. henryi* Hance

凌云、乐业、田林、南丹、十万大山。

古陈杜鹃

*R. kuchunense* Chun

大瑶山。

广福杜鹃

*R. kwangfuense* Chun et Fang

龙胜、大苗山。

广西杜鹃

*R. kwangsiense* Hu

龙胜、大苗山、大瑶山、凌云、乐业。

广东杜鹃

*R. kwangtungense* Merr. et Chun

桂林、阳朔、兴安、罗城。

岩杜鹃

*R. latoucheae* Fr.

全州、苍梧、十万大山、那坡。

北江杜鹃

*R. levinei* Merr.

全州、资源、灌阳、兴安、大瑶山。

百合杜鹃

*R. liliiflorum* Lévl.

全州、兴安、大瑶山、那坡。

岭南杜鹃

*R. mariae* Hance

全州、兴安、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、南丹、东兰、凌云、田林、靖西、容县、陆川、龙州。

根皮清凉解热，止咳祛痰；治慢性气管炎。

满山红

*R. mariesii* Hemsl.

全州、资源、兴安、灵川、临桂、大瑶山。

小杜鹃

*R. microphyton* Fr.

大瑶山。

细花杜鹃

*R. minutiflorum* Hu

灌阳、龙胜、灵川、临桂、大苗山、罗城、贺县、横县、马山、大明山、隆林。

黄杜鹃 羊踯躅、闹羊花、闹头花、毛老虎、三钱三

*R. molle* (Bl.) G Don

桂北。

根、花、果有大毒，入药，祛风除湿，散瘀消肿，麻醉止痛；治风湿，跌打，神经痛，疟疾，牙痛，疮疥。花煮液作农药，可杀地老虎、蝗虫、螟虫、蚜虫、青虫、椿象、猿叶虫、浮尘

Rhododendron

子、斜纹夜蛾等，又可杀蛆、臭虫，灭钉螺。庭园绿化植物。

白杜鹃

*R. moulmainense* Hk.

(*R. westlandii* Hemsl.)

区内各地。

圆叶杜鹃☆

*R. orbiculare* Decne

(*R. rotundifolium* David)

全州、资源。

卵叶杜鹃 马银花

*R. ovatum* (Lindl.) Pl.

阳朔、永福、临桂、灵川、全州、大苗山、罗城。

根和水、酒、肉同煎，白糖冲服，可治白带下黄浊水。花可煮食。木材供细工用。

尖叶杜鹃

*R. oxyphyllum* Fr.

大明山、大新。

美艳杜鹃

*R. pulchroides* Chun et Fang

龙胜、大明山。

贵州杜鹃

*R. rivulare* H.-M.

恭城、龙胜、灵川、临桂、永福、大苗山、大瑶山、蒙山、贺县。

上林杜鹃

*R. shufeniae* Fang

大明山。

南华杜鹃

*R. simiarum* Hance

全州、资源、兴安、大苗山、大瑶山、大明山、扶绥、十万大山。

杜鹃花 映山红

*R. simsii* Pl.

区内各地。

全株、根、花行气活血，补虚；治内伤咳嗽，肾虚耳聋，月经不调，跌打疼痛，风湿，血崩，白带，吐血，痔血，衄血，乳痈，口疮，荨麻疹。叶、茎、皮都可提制栲胶。作兽药，用根或枝、叶止血，治便血，阴道流血。我国中南和西南地区的酸性土指示植物。花鲜红色，为有名的绿化植物。

爆仗杜鹃

*R. spinuliferum* Fr.

隆林。

越桔杜鹃

*R. vaccinioides* Hk.f.

十万大山。

变色杜鹃

*R. versicolor* Chun et Fang

龙胜、大明山。

武鸣杜鹃

*R. wumingensis* Fang

大明山。

瑶山杜鹃☆

*R. yaoshanense* Chun in herb.

那坡。

Pyrola-Vaccinium

215A 鹿蹄草科 PYROLACEAE

雅致鹿蹄草

*Pyrola elegantula* Andr.

全州、兴安、灵川。

全草润肺止咳，祛风除湿，补虚敛汗；治咳嗽咯血，盗汗，百日咳，哮喘，劳伤骨痛，痈肿。

216 乌饭树科<sub>(注)</sub> VACCINIACEAE

越桔爱花

*Agapetes vaccinioides* Dunn

靖西、大瑶山。

乌饭小蘖☆ 山小蘖

*Hugeria japonica* (Miq.) Nakai

var. *sinica* (Nak.) H.-M.

龙胜、大苗山。

乌饭树

*Vaccinium bracteatum* Thb.

全州、灌阳、龙胜、临桂、阳朔、永福、大苗山、容县、十万大山、大明山等地。

果、树皮强筋骨，益气力，固精，又治头痛，衄血。果味甜，可生食，又可熬糖、制果酱和酿酒。树皮可提制栲胶。

水泡乌饭树

*V. bullatum* (Dop) Sleum.

桂西南。

---

注：本科也叫石楠科、越橘科。

福建乌饭树

*V. carlesii* Dunn

临桂、永福、大瑶山、大明山。

粗脉乌饭树

*V. crassivenium* Sleum.

大瑶山。

尾叶乌饭树

*V. dunnalianum* Wight

*var. urophyllum* R. et W.

那坡。

镰叶乌饭树

*V. falcatum* Merr.

桂南。

繖萼乌饭树

*V. fimbrialyx* Chun et Fang

龙胜。

广东乌饭树

*V. hancockiae* Merr.

容县。

鼠刺乌饭树

*V. iteaphyllum* Hance

兴安、龙胜、荔浦、临桂、大苗山、大瑶山、环江、南丹、东兰、凤山、凌云、乐业、田林、隆林、大明山、容县。

果可酿酒，又可生食。

广西乌饭树☆

*V. kwangsiense* Chun et Fang, ined.

灵川、大苗山、罗城。

Vaccinium

龙胜乌饭树☆

*V. lungshengense* Chun et Fang, ined.

龙胜。

壮叶乌饭树

*V. pseudorobustum* Sleum.

大瑶山。

根补血，壮身，去痨症。

厚叶乌饭树

*V. robustum* Chun, ined.

十万大山。

越桔

*V. sinicum* Sleum.

全州、资源、灌阳、兴安、龙胜、大瑶山。

米饭花

*V. sprengelii* (Don) Sleum.

(*V. mandarinorum* Diels,

*V. donianum* auct., non Wight)

全州、资源、兴安、灵川、临桂、大瑶山、十万大山、田林、隆林。

果实、叶散瘀消肿；治跌打，全身浮肿；又能拔弹，去砂。

假镰叶乌饭树

*V. subfalcatum* Merr. ex Sleum.

十万大山。

显脉乌饭树

*V. supracostatum* H.-M.

罗城。

瑶山乌饭树

*V. yaoshanicum* Sleum.

大瑶山。

## 218 水晶兰科 MONOTROPACEAE

水晶兰

*Monotropa uniflora* L.

龙胜、大苗山、大瑶山、大明山。

## 221 柿科 EBENACEAE

小叶山柿 崖柿

*Diospyros dumetorum* W.W.Sm.

隆林、柳州、龙州。

乌材

*D. eriantha* Champ.

十万大山、龙州、梧州等地。

果可提柿漆。树皮可提栲胶。木材致密而硬，适作梁、柱、门、窗、机械器具，在海南岛亦用作牛栏建筑、车辕、家具等用材。

\*柿

*D. kaki* L.f.

区内各地。

果树。果可生食，又可制成柿饼或酿酒，也是木本粮食之一。果润肺止咳，生津，润肠。柿霜治咽喉痛，咳嗽咽干。柿漆降血压。宿萼（柿蒂）治呃逆。根清热凉血；治吐血，痔血，直肠出血。嫩果可制柿漆供制伞等用。嫩果和树皮可提制栲胶。木材细致轻软，供梁、柱、门窗、家具和木梳、装饰等用材。叶可作农药，杀害虫。作兽药，治牛红白痢。

Diospyros

野柿

*D. kaki* L f.

*var. silvestris* Mak.

龙胜、临桂、阳朔、平乐、大苗山、大瑶山、凌云、乐业、田林。

用途参阅柿。

龙胜柿☆

*D. lungshengensis* S.Lee, ined.

龙胜。

君迁子

*D. lotus* L.

全州、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、南丹。

果树。果亦可制糖，酿酒、醋。树皮和未成熟果实可提制栲胶。果实和叶可提制维生素丙，供食品和医药用。木材作各种用具、农具用材。种子油可制肥皂。叶可制农药，防治造桥虫、菜青虫、地老虎、瓢虫、棉蚜、孑孓等害虫。此树又可作嫁接柿树的砧木。

罗浮柿

*D. morrisiana* Hance

区内各地。

未成熟果实可制柿漆，作防水布和雨伞等涂料。茎皮、叶、果消炎解毒，收敛；治食物中毒，烫火伤，腹泻，赤白痢。木材可作家具、用具等用材。

洞柿 油柿

*D. oleifera* Cheng

临桂、恭城、阳朔、容县等地。

果树。用途参阅柿。

一枚辣柿 山榄叶柿、米亚律（壮音）

*D. siderophyllus* H.L.Li

龙州、靖西等地。

未成熟果实可制柿漆。枝、叶作农药，防治菜青虫、地老虎等。

### 岭南柿

**D. tutcheri Dunn**

龙胜、大苗山、苍梧、容县。

叶可作绿肥和农药。

## 222 山榄科(赤铁科) SAPOTACEAE

### ●人心果

**Achras zapota L.**

桂南。

果生食或制成饮料。树干流出的乳汁为香口糖重要原料。树皮含有一种名赤铁素的植物硷，可治热症。

### 金叶树

**Chrysophyllum roxburghii G.Don**

合浦、十万大山、大明山、崇左、宁明、龙州。

### 墨拧 血胶树、山枇杷

**Eberhardtia aurata (Pierre ex Dubard) Lec.**

(*Planchonella aurata* Pierre ex Dubard,

*Pouteria aurata* (Pierre ex Dubard) Baehni)

上思、十万大山、宁明、龙州、德保、那坡、靖西、百色。

木材纹理直，结构紧密，材质坚韧；为栋梁、桥柱、家具等良材。

种子油可供制肥皂用。

### 铁色

**Madhuca pasquieri (Dubard) H J.Lam**

桂西南。

材用。

Madhuca-Pouteria

紫荆木 木花生

*M. subquincuncialis* H.J.Lam et Kerpel

宁明、龙州、容县。

木材坚韧，不裂不变形，不易被虫蛀，色调花纹美观，为建筑及工业强材，适于造船、水工、桥梁、车辆、建筑等用，并作机械器具、运动器械、农具、上等家具、美工用材。种子油可供制肥皂用。

铁线子

*Manilkara hexandra* (Roxb.) Dubard

合浦。

铁榄

*Mastichodendron wightianum* (Hk. et Arn.) van Royen  
(*Sideroxylon wightianum* Hk. et Arn.)

临桂、罗城、柳州、苍梧、上思、十万大山、大新、龙州、靖西。

木材供用具、农械、磨齿等用。

假水石梓 山胶木

*Planchonella pedunculatum* (Hemsl.) H J Lam et Kerpel  
(*Sarcosperma pedunculata* Hemsl.)

桂林、临桂、阳朔、平乐、富川、钟山、凌云、乐业、天峨、平南。

木材供农具、农械、器具用。

敏果

*Pouteria annamensis* (Pierre) Baehni  
(*P. hainanensis* (Merr.) Baehni,  
*Sideroxylon hainanense* Merr.)

龙州。

木材供建筑用。

## 222A 肉 实 科(水石梓科)

### SARCOSPERMACEAE

#### 肉实树

*Sarcosperma arboreum* Benth.

隆林、田林、凌云、乐业、田阳、那坡、百色、田东、天峨、巴马。

木材稍轻软；宜供家具、农具、器具等用。

#### 枚辣叶肉实

*S. kachinense* (King et Prain) Exell

龙州、扶绥、宁明、靖西、凌云、乐业、巴马。

材用。

#### 水石梓 月桂肉实树

*S. laurinum* (Benth.) Hk f.

上思、十万大山、博白、横县、那坡。

木材纹理直，结构细，质地稍轻软；宜作门窗、车辆、家具、农具、器具用材。

## 223 紫金牛科 MYRSINACEAE

#### 桐花树

*Aegiceras corniculatum* (Lour.) Blanco

合浦。

#### 小狮子头

*Ardisia affinis* Hemsl.

桂林。

全株治跌打，双单喉鹅。

念珠藤叶紫金牛☆

**A. alyxiaefolia Tsiang**

龙胜、大苗山、大瑶山、象州、恭城、兴安、贺县。

石狮子

**A. arborescens Wall.**

大新、龙州、武鸣、梧州。

全株作产妇用药。

两色紫金牛

**A. bicolor Walk.**

桂西。

短茎紫金牛

**A. brevicaulis Diels**

大苗山、大瑶山、兴安、临桂、灵川、龙胜、贺县、昭平。

全株除风湿，解热毒；治风湿筋骨痛，痨伤咳嗽，喉癌，无名肿毒，蛇咬伤。

棕紫金牛

**A. brunescens Walk.**

桂南。

小紫金牛

**A. chinensis Benth.**

上思、容县、平南、大苗山、三江、阳朔、蒙山、大明山、桂林、恭城。

全株活血散瘀，解毒止血；治肺结核，咯血，呕血，跌打损伤，黄疸，睾丸炎，尿路感染，闭经等。

伞房紫金牛 紫背绿

**A. corymbifera Mez**

桂西南。

用途参阅朱砂根。

**朱砂根 圆齿紫金牛**

**A. crenata Sims.**

区内各地。

根、叶祛风除湿，散瘀止痛，通经活络；治风湿痛，跌打，骨折，喉炎，牙痛，月经不调，咽喉炎，胃痛，消化不良等。种子油制肥皂，亦可食。

**百两金 大罗伞**

**A. crispa (Thb.) A.DC.**

**(A. hortorum Maxim.)**

大瑶山、大苗山、平南、龙胜、资源、凌云、乐业、那坡、凤山、蒙山。根、叶清热利咽，舒筋活血；治咽喉痛，跌打，风湿，肝炎，肾炎水肿，白浊，劳伤咳血，扁桃腺炎，骨结核，痈，疔，蛇伤等。种子油制肥皂，亦可食。

**细柄百两金☆**

**A. crispa (Thb.) A.DC.**

**var. dielsii (Lévl.)**

全州、资源、阳朔、天峨、隆林、大瑶山、大苗山、容县。全株止血；治刀伤，喉痛。

**平顶紫金牛**

**A. depressa C.B.Clarks**

百色、田阳、西林、隆林、东兰、都安、凤山、龙州。

**珍珠盖罗伞 雀儿肾**

**A. elegans Andr.**

阳朔、临桂、永福、大瑶山、大苗山、苍梧、平南、大明山、龙州、横县、邕宁、凌云、乐业、巴马、都安、罗城。

根、叶止痛；治跌打，内伤，弹伤。

剑叶紫金牛

*A. ensifolia* Walk.

凌云、乐业、田林、都安、凤山、巴马、恭城。

峨眉紫金牛 毛虫草

*A. faberi* Hemsl.

上思、大苗山、三江、兴安、凌云、乐业、

根、叶治感冒咳嗽、喉蛾。

线状紫金牛

*A. filiformis* Walk.

宁明、龙州。

两广紫金牛

*A. fordii* Hemsl.

平南、大瑶山、河池、凤山、藤县、百色、扶绥、

走马胎 大叶紫金牛

*A. gigantifolia* Stapf

大瑶山、大瑶山、象州、平南、蒙山、马山、扶绥、上思、隆林、  
凌云、乐业、永福、阳朔。

根或全株行血祛风，消肿止痛；治风湿、跌打、痈疖溃烂，经闭。  
不孕症，产后血瘀腹痛，半身不遂等。作兽药主治风湿痛，风  
痰壅塞，气促鼻煽，跌打，便秘。

紫金牛 不出林、矮地茶、平地木

*A. japonica* (Hornst.) Bl.

桂林、临桂、阳朔、兴安、永福、恭城、苍梧、藤县、昭平、岑  
溪、大瑶山、平南、博白、邕宁、上思、浦北、灵山、凤山。  
全草、根活血散瘀；治肺结核，咯血，咳嗽，慢性气管炎，跌打，  
风湿，黄疸肝炎，睾丸炎，白带，尿路感染，闭经等。

红云草

*A. maclarei* Merr.

大瑶山、苍梧、蒙山、凤山、大明山、河池，

全草止痛，散血，调经；治崩血，吐血，难产，疮疖，跌打，

红毛毡 老虎翦

*A. mamillata* Hance

龙胜、临桂、阳朔、兴安、苍梧、昭平、平乐、藤县、平南、容县、大瑶山、大苗山、三江、上思、大明山、田林、那坡、德保、都安、凤山、天峨，

全草清热利湿，活血止血，去腐生肌；治风湿，跌打，痢疾，肝炎，胆囊炎，月经不调，痛经，疖肿，肺结核咯血，外伤出血，小儿疳积，产后虚弱等，

榄色紫金牛

*A. olivacea* Walk.

桂西南。

尖叶紫金牛

*A. oxyphylla* Wall.

*var. cochinchinensis* Pitard

上思。

落地紫金牛 老虎毛虫药、打铁树

*A. primulaefolia* Gardn. et Champ.

恭城、兴安、龙胜、苍梧、上思、大明山、宁明、马山、龙州、

大苗山、象州、大瑶山、容县、凤山、东兰，

全草补血；治劳伤咳嗽，风湿，跌打，疮疖等。

斑叶朱砂根 血党、点紫金牛、活血丹

*A. punctata* Lindl.

临桂、阳朔、大瑶山、平南、玉林、北流、苍梧，

Ardisia

根活血通经，祛风止痛；治月经不调，经闭，不孕，产后风癓。  
风湿，跌打，扁桃腺炎，牙痛等。

细小紫金牛☆

*A. pusilla* A.DC.

阳朔。

全草消肿止痛；治跌打损伤，黄疸，月经不调。

罗伞树 五脚紫金牛

*A. quinquegona* Bl.

各地林区。

全株消肿，清热解毒；治跌打。作兽药，治跌打肿痛，骨折创伤，  
脚软无力。

海南罗伞树☆

*A. quinquegona* Bl.

var. *hainanensis* Walk.

桂西南。

似茄罗伞☆

*A. solanacea* Roxb.

桂西北。

细罗伞

*A. tenera* Mez

桂西北。

三花紫金牛

*A. triflora* Hemsl.

桂中。

雪下红 大罗伞树、矮脚三郎

*A. villosa* Roxb.

灵山、合浦、上思、大明山、龙州、容县、陆川。

全株消肿，活血散瘀；治风湿骨痛，内伤，吐血，跌打，红白痢，疮疥。  
宽叶雪下红

*A. villosa* Roxb.

var. *latifolia* Walk.

博白。

圆齿紫金牛 大罗伞

*A. virens* Kurz

隆林、宁明、龙州。

云南紫金牛

*A. yunnanensis* Mez

桂西北。

云南酸藤子☆

*Embelia henryi* Walk.

凌云、乐业、德保。

酸藤子 酸藤果

*E. laeta* (L.) Mez

桂南各地。

根、叶散瘀止痛，收敛止泻；治跌打肿痛，肠炎腹泻，咽喉炎，  
胃酸缺乏，痛经，闭经等。果可食，强壮补血。兽医用根、叶  
治牛伤食臌胀，热病口渴。

长叶酸藤子☆ 吊罗果

*E. longifolia* (Benth.) Hemsl.

区内各地。

全株治产后腹痛。

长圆叶酸藤子 断骨藤

*E. oblongifolia* Hemsl.

区内各地。

Embelia

果实驱虫，祛风，止泻；治蛔虫，绦虫。

当归藤 小花酸藤子、筛箕藤

*E. parviflora* Wall.

(*E. myrtifolia* Hemsl. et Mez)

区内各地。

根、藤通经活络，补虚益肾；治不孕症，月经不调，白带，萎黄病，腰腿痛，闭经，贫血，胃痛，跌打骨折。

滇桂酸藤子☆

*E. polypodioides* Hemsl. et Mez

那坡、德保。

褐毛酸藤子☆

*E. pulchella* Mez

靖西、那坡、隆林。

白花酸藤子

*E. ribes* Burm.f.

区内各地。

根清热祛湿，止血消炎；治急性肠胃炎，赤白痢，腹泻，刀枪伤，外伤出血，毒蛇咬伤。

大样酸藤子 了哥脚

*E. rufis* H.-M.

区内各地。

根、茎清凉解毒，滋阴补肾；治经闭，月经不调，风湿。

假刺藤

*E. scandens* (Lour.) Mez

凤山、东兰、德保、靖西、百色、都安、邕宁。

厚叶酸藤子☆

*E. subcoriacea* (C B Cl) Mez

龙州、大新、那坡、靖西。

果可食。

### 尖叶杜茎山

*Maesa acuminatissima* Merr.

上思。

### 银叶杜茎山 嫩肉木

*M. argentea* Wall.

var. *kwangsiensis* H.-M.

梧州。

### 中越杜茎山☆

*M. balansae* Mez

龙州、宁明、大新、巴马。

### 信宜杜茎山

*M. insignis* Chun

容县、南丹。

### 杜茎山 野胡椒

*M. japonica* (Thb.) Mor.

区内各地。

全株祛风寒，消肿胀；治腰痛，头痛，心躁，烦渴，眼目晕眩。

根与白糖煎服治皮肤风毒。

### 山杜茎山

*M. montana* A.DC.

上思、田林、昭平。

叶可代茶，又可制蓝色染料。

### 小叶杜茎山☆

*M. parvifolia* A.DC.

桂南。

### 空心花 鲫鱼胆

*M. perlarius* (Lour.) Merr.

区内各地。

全草消肿去腐，生肌接骨；治跌打刀伤，疔疮，肺病。

鱗粃杜莖山☆

*M. ramentacea (Roxb.) A.DC.*

上思、都安、天峨、巴马、百色、那坡、凌云、乐业、平果。

假茶叶

*M. tenera Mez*

融安、大苗山、凌云、乐业。

铁仔 明立花

*Myrsine africana L.*

桂西。

根、枝、叶祛风止痛，补虚活血；治风湿，虚劳，脱肛，尿血。

子宫脱垂，咽喉痛，牙痛。刀伤用鲜叶嚼烂外敷。皮、叶提制栲胶。种子榨油供工业用。

广西铁仔☆

*M. elliptica Walk.*

大瑶山、武鸣、上林。

刺叶铁仔

*M. semiserrata Wall.*

那坡、凌云、乐业、隆林、田林、平南。

皮、叶提制栲胶。种子榨油供工业用。

小铁仔

*M. stolonifera (Koidz.) Walk.*

(*M. marginata Mez*)

龙胜、大瑶山、大苗山、凌云、乐业。

海南密花树

*Rapanea faberi Mez*

乐业、德保。

广西密花树

*R. kwangsiensis* Walk.

龙州、大新、德保、靖西、那坡、百色、隆林、凤山、东兰、天峨、河池、都安、桂林。

打铁树 雀仔肾

*R. linearis* (Lour.) Moore

上思、合浦、邕宁、陆川。

密花树

*R. neriifolia* (S. et Z.) Mez

(*Myrsine neriifolia* S. et Z.)

区内各地。

材用。树皮提制栲胶。叶治外伤。

## 224 安息香科 STYRACACEAE

牛角树

*Alniphyllum eberhardtii* Guillaum.

田林、那坡、靖西、凌云、乐业、德保、龙州、都安、凤山。

用途参阅拟赤杨。

拟赤杨 水冬瓜

*A. fortunei* (Hemsl.) Perk.

各地林区。

木材轻软，易于加工；适作模型、水瓢、火柴杆、茶叶箱和其他板箱用材，亦可制纸浆。种子可榨油供工业用。

大叶拟赤杨

*A. fortunei* (Hemsl.) Perk.

var. *megaphyllum* (Hemsl. et Wils.) C.Y.Wu

Alniphyllum-Huodendron

(*A. megaphyllum* Hemsl. et Wils.)

罗城、十万大山。

用途参考拟赤杨。

小果拟赤杨

*A. fortunei* (Hemsl.) Perk.

var. *microcarpa* C.Y.Wu

隆林、那坡。

用途参考拟赤杨。

银钟树

*Halesia macgregorii* Chun

临桂、灵川、龙胜、大苗山。

材用。

钝齿银钟树

*H. macgregorii* Chun

var. *crenata* Chun

兴安、临桂。

材用。

云贵山茉莉 螺丝木

*Huodendron biaristatum* (W.W.Sm.) Rehd.

龙胜、兴安、永福、大苗山、南丹、德保、凌云、乐业、那坡、

田林、龙州。

材用。

广西山茉莉

*H. biaristatum* (W.W.Sm.) Rehd.

var. *kwangsiense* Hu

临桂。

材用。

岭南山茉莉

*H. biaristatum* (W.W.Sm.) Rehd.

var. *parviflorum* (Merr.) Rehd.

那坡、龙胜、临桂、兴安、恭城、容县、平南、南丹、大瑶山、象州、武鸣、大明山、蒙山、龙州。

材用。

西藏山茉莉 脱皮树、熊巴树

*H. tibeticum* (Anth.) Rehd.

龙胜、阳朔、大苗山。

木材坚且韧，适宜制刨壳、扁担一类工具、农具。

陀螺果

*Melliiodendron xylocarpum* H.-M.

大瑶山、象州、大苗山、平南、凌云、乐业、田林、德保、全州、龙胜、荔浦、临桂、永福、兴安、罗城、天峨、龙州。

木材作建筑、家具、用具用材。

白辛树 大叶白辛树

*Pterostyrax hispida* S. et Z.

全州、兴安、隆林。

裂叶白辛树

*P. leveillei* (Fedde) Chun

龙胜、兴安、资源、全州、临桂、大苗山、田林。

小果白辛树

*P. microcarpa* Diels

桂南。

广东木瓜红☆ 岭南木瓜红

*Rehderodendron kwangtungense* Chun

苍梧、龙胜、资源、兴安、大苗山、贺县。

Rehderodendron-Styrax

贵州木瓜红

*R. kweichowense* Hu

那坡。

矩圆果木瓜红

*R. praeteritum* Sleum.

大瑶山。

云南木瓜红

*R. tsiangii* Hu et Cheng

大苗山、那坡。

银叶安息香☆

*Styrax argentifolia* H.L.Li

苍梧、龙胜、龙州、那坡。

叶止痛消肿；治跌打刀伤，疮疥。

江苏安息香☆

*S. argyi* Lévl.

大瑶山。

变秃安息香☆

*S. calvescens* Perk.

大瑶山。

种子油可制肥皂，作润滑油，掺合油漆用。

狗奶柴

*S. confusa* Hemsl.

桂西北、桂林。

垂珠花

*S. dasyantha* Perk.

大瑶山。

种子榨油供工业用。种子含油量40%，为半干性油。

白花笼

*S. faberi* Perk.

区内各地。

种子榨油供制肥皂和润滑油，照明用。果实治头昏发热。

老鸦铃

*S. hemsleyana* Diels

大瑶山、大苗山、贺县。

种子油可制肥皂和润滑油。

滇桂安息香 滇桂野茉莉

*S. hypoglauca* Perk.

十万大山、百色、大苗山。

树脂治中风昏厥，产后血晕及心腹诸痛。

安息香 野茉莉

*S. japonica* S. et Z.

大苗山、龙胜、全州、兴安、灌阳、临桂。

木材作伞柄、拐杖、玩具等细工用材。种子油可制肥皂和润滑油，掺合作油漆。果、叶及寄生包（指虫瘿内的白粉）祛风除湿；可治瘫痪。果皮有毒，能闹鱼。

大花安息香☆

*S. macrantha* Perk.

罗城。

青山安息香

*S. macrothyrsas* Perk.

龙州、南宁。

树脂治中风昏厥，产后血晕及心腹诸痛。

毛安息香 白扣子

*S. mollis* Dunn

## Styrax

苍梧、平南、陆川、大瑶山、大苗山、象州、永福、兴安、阳朔、龙胜。  
种子油可制肥皂、油墨和润滑油。

### 玉铃花

*S. obassia S. et Z.*

平南。

木材作细工用材。种子油可制肥皂和润滑油。花可提取芳香油。

### 芬芳安息香

*S. odoratissima Champ.*

龙胜、全州、临桂、恭城、大苗山、大瑶山、贺县、凌云、乐业。

木材供建筑、船舰、车辆、家具等用。

### 上思安息香☆

*S. oligophlebia Merr. ex H.L.Li*

### 太平安息香 赛山梅

*S. philadelphoides Perk.*

隆林、靖西、那坡、南丹、罗城、大瑶山、融安、贺县、永福、  
全州、资源。

木材造农具。种子油可制肥皂和润滑油。

### 红皮

*S. suberifolia Hk. et Arn.*

上思、大瑶山、大苗山、柳城、三江、罗城、龙胜、兴安、临桂、  
恭城、永福、全州、龙州、苍梧。

种子油可制肥皂或油漆。根、叶祛风除湿，理气止痛；治风湿关  
节痛，胃痛。

### 白叶安息香 白叶野茉莉、白花木

*S. subnivea Merr. et Chun*

龙胜、资源、灵川、兴安、大苗山、大瑶山、苍梧、贺县、巴马、  
凌云、乐业、德保、平果、靖西、上思。

树脂治中风昏厥，产后血晕及心腹诸痛。种子油治皮肤痒。木材松软，可作火柴杆、家具及板材。

### 越南安息香

**S. tonkinensis** (Pierre) Craib

田林、龙州、南宁。

树脂祛风除湿，行气开窍，镇静止咳；治哮喘，咳嗽，感冒，中暑，胃痛，产后血晕，遗精，中风昏厥。

## 225 山矾科(灰木科) SYMPLOCACEAE

### 腺叶山矾

**Symplocos adenophylla** Wall.

大瑶山。

### 腺柄山矾

**S. adenopus** Hance

十万大山、大瑶山。

### 少脉腺柄山矾☆

**S. adenopus** Hce.

**var. oligophlebius** Merr.

苍梧。

### 薄叶山矾 白塔木

**S. anomala** Brand

临桂、灵川、龙胜、阳朔、兴安、全州、资源、大苗山、象州、大瑶山、上思、十万大山、容县、龙州。

木材造农具、家具，亦甚宜作火柴杆。种子油作润滑油。

### 亮薄叶山矾☆

**S. anomala** Brand

**var. nitida** H.L.Li

十万大山。

Symplocos

总状山矾

*S. botryantha* Fr.

(*S. leucophylla* Brand)

永福。

山矾 山桂花

*S. caudata* Wall.

(*S. prunifolia* S. et Z.)

资源、兴安、大瑶山、上思、凌云、乐业。

根、花、叶清热利湿，理气化痰；治黄疸，咳嗽，扁桃腺炎，关节炎。叶能杀蚤蠹；煎汁可得黄色染料；烧灰可作染料，不需白矾作媒染剂。叶片三十张和老姜三片浸水蒸热，用水洗烂弦风眼有特效。木材造农具、工具。种子油制肥皂和润滑油。花可提取芳香油。

大萼山矾☆

*S. caudata* Wall.

var. *macrocalyx* H.-M.

大瑶山、宜山。

华山矾 土常山、地黄木、猪糠木

*S. chinensis* (Lour.) Druce

区内各地。

根、叶、果清热解毒，祛风除湿，止血止痢；治病疾，疟疾，肾炎，便秘，牙痛，筋骨痛，疮疖，蛇伤，感冒。种子油制肥皂。叶充猪饲料。

上身眉

*S. chunii* Merr.

十万大山、灵川、桂林。

杷叶山矾☆

*S. cochinchinensis* (Lour.) Moore

苍梧、大瑶山、罗城、凤山、东兰、十万大山、百色、靖西、那坡、平果、北流、玉林、陆川、阳朔、平乐、恭城、永福。木材作建筑、家具、器具用材。种子油供工业用。

南岭山矾

*S. confusa* Brand

十万大山、大明山、临桂、龙胜、阳朔、兴安、大瑶山、贺县。

构花山矾

*S. confusa* Brand

var. *lysiostemon* H -M.

大瑶山、龙胜、象州。

密花山矾

*S. congesta* Benth.

(*S. cuspidata* Brand)

兴安、大瑶山、大苗山、宁明、凌云、靖西、乐业、容县、象州。

厚叶山矾☆

*S. crassifolia* Benth.

容县。

美山矾

*S. decora* Hance

十万大山、龙胜、全州、田阳。

长毛山矾

*S. dolichotricha* Merr.

(*S. indochinensis* H L Li,

*S. kwangtungensis* H.L.Li)

龙州、大明山、大瑶山、罗城、苍梧、昭平、玉林、平南。

Symplocos

茶条山矾 茶条果

*S. ernestii* Dunn

乐业、大苗山、兴安。

腺山矾

*S. glandulifera* Brand

那坡、靖西。

羊屎木 羊舌树

*S. glauca* (Thb.) Koidz.

(*S. neriifolia* S. et Z.)

陆川、上思。

木材造农具、器具，造纸。树皮散寒，清热；治伤风头痛，热邪口燥，感冒身热。种子油制肥皂和润滑油。

大叶山矾

*S. grandis* H.-M.

大瑶山。

毛山矾☆

*S. groffii* Merr.

(*S. lungtauensis* Merr.,

*S. mollipila* H.L.Li)

东兰、南丹、大苗山、三江、大瑶山、平南、武鸣、宁明、凌云、乐业、那坡、德保，

华南山矾

*S. handelii* Chun et Ting, ined.

(*S. austrosinensis* H -M., non Migo)

大瑶山、龙胜、象州。

岜山山矾☆

*S. heishanensis* Hayata

大瑶山。

万宁山矾☆

*S. howii* Merr. et Chun ex H.L.Li

临桂。

广西山矾

*S. kwangsiensis* Merr. ex H.L Li

光叶山矾 滑叶常山

*S. lancifolia* S. et Z.

区内各地。

木材造农具、用具。根治跌打。

圆萼山矾

*S. latouchei* W.W.Sm. ex H.-M.

凌云、全州。

月桂山矾 黄牛奶树、四季青

*S. laurina* (Retz.) Wall.

(*S. spicata* Roxb.)

各地林区。

木材制农具、家具。树皮散寒清热；治伤风头痛，热邪，口燥。

感冒身热。种子油制肥皂和润滑油。

狭叶月桂山矾

*S. laurina* (Retz.) Wall.

var. *bodinieri* (Brand) H.-M.

(*S. bodinieri* Brand)

大苗山、大瑶山。

骨齿山矾☆

*S. mairei* Lévl.

(*S. myriadenia* Merr.)

Symplocos

十万大山、大瑶山、凌云。

细毛山矾

*S. microtricha* H.-M.

龙州、武鸣、柳州、大瑶山、大苗山、龙胜。

木材作建筑板料及制家具用。种子油制肥皂和润滑油。

桂南山矾☆

*S. migoi* Chun

(*Babua austro-sinensis* Migo)

桂南。

卵叶山矾

*S. ovalifolia* H.-M.

临桂、灵川。

白檀 山矾、灰木

*S. paniculata* (Thb.) Miq

(*S. crataegoides* Buch.-Ham.)

梧州、容县、南宁、上思、大瑶山、象州、临桂、兴安、全州、阳朔、永福、恭城。

木材供细工及建筑用。种子油制肥皂、油漆。叶充猪饲料。根制土农药。叶止血；治刀伤。根治癰瘍。

海桐山矾

*S. pittosporifolia* H.-M.

十万大山、大瑶山、宜山。

铁山矾

*S. pseudobarberina* Gontsch.

大瑶山、大苗山、龙胜、临桂、东兰。

腺边山矾

*S. punctato-marginata* A.Chev. ex Guillaum.

(*S. stewardii* Sleumer)

十万大山、平南、苍梧、容县。

总序山矾☆

*S. racemosa* Roxb.

(*S. propinquua* Hance,

*S. intermedia* Brand,

*S. macrostachya* Brand,

*S. petelotii* Merr.)

龙州、宁明、南宁、武鸣、扶绥、隆林、田阳、百色、桂林。

叶治眼热症。

波缘山矾

*S. sinuata* Brand

大瑶山、资源、全州、那坡。

多花山矾

*S. stapfiana* Lévl.

(*S. fasciculata* Zoll.

var *chinensis* Brand,

*S. myriantha* Rehd.,

*S. ramosissima* Wall.

var. *salwinensis* H.-M.)

武鸣、隆林、田林、乐业、大瑶山、大苗山、贺县、龙胜、灵川、

临桂、上思。

滑萼山矾

*S. stapfiana* Lévl.

var. *leiocalyx* H.-M.

罗城。

星状山矾 老鼠矢

*S. stellaris* Brand

Symplocos-Buddleia

(*S. limprichtii* H.Winkl.,

*S. wilsoni* Hemsl.,

*S. neriifolia* Guill.)

龙胜、临桂、全州、阳朔、大苗山、贺县、东兰。

根治跌打。茎皮纤维造纸，制绳索。种子油制肥皂。

银色山矾☆

*S. subconnata* H.-M.

(*S. alata* Brand,

*S. argentea* Brand)

全州、合浦。

壶果山矾

*S. urceolaris* Hance

龙胜、临桂、合浦。

228 马 钱 科 LOGANIACEAE

驳骨醉鱼草 驳骨丹

*Buddleia asiatica* Lour.

区内各地。

根、叶驱风化湿，行气活络；治痢疾，脾湿腹胀，关节炎，跌打，无名肿毒，小儿口疮，哮喘。花可提芳香油。枝叶作农药，防治农作物害虫。

绛花醉鱼草

*B. davidi* Fr.

var. *magnifica* (Wils.) R. et W.

全州、资源、兴安。

用途参考下一种。

穆坪醉鱼草

*B. davidii* Fr.

var. *superba* R. et W.

龙胜、临桂、全州、资源、兴安、南丹、那坡、凌云、大苗山。全株止咳杀虫，祛风散寒，消积止痛；治感冒，风湿痛，跌打刀伤，疳积，脚癣，妇女阴痒，咳嗽。

醉鱼草 驴尾草、苦叶菜、鸡公尾

*B. lindleyana* Forst.

区内各地。

花、叶、根有毒，行血活血，止咳定喘；治急性腹炎，风湿关节炎，支气管炎，哮喘，腮腺炎，淋巴结核，跌打损伤，疖肿，烫火伤，外伤出血，崩带，牙痛等。孕妇慎用。兽医用枝叶治牛泻血。花、叶可闹鱼，灭钉螺。枝叶作农药杀螟虫，又可防治小麦吸浆虫、蚊、蝇、蛆等。花可提芳香油。本种全株有毒，多服会引起头晕、呕吐等症。中毒的解救方法用洗胃、导泻等法。

假黄花

*B. madagascariensis* Lam.

龙州、藤县、凤山、巴马、桂林。

根、叶清凉止血；治疳积，疮疥，刀伤，黄疸。蜜源植物。

密蒙花

*B. officinalis* Maxim.

宜山、桂林、容县、平南、武鸣、扶绥、龙州、大瑶山、柳州、柳城、大苗山、凌云、乐业、隆林、靖西、田林、平果。

花清热利湿，明目退翳，为眼科要药；治青盲翳障，赤肿流泪，羞明畏光，眼热痛。根治黄疸，水肿等。花、叶作农药杀秧苗害虫，亦可闹鱼。兽医用枝叶治牛红白痢。花可提芳香油，又可作黄色食用染料。茎皮纤维可造纸。

灰莉

*Fagraea chinensis* Merr.

桂西南。

西南灰莉☆

*F. khasiana* Benth.

那坡。

香港蓬莱葛☆

*Gardneria hongkongensis* Hayata

南丹、大苗山、田阳。

狭叶蓬莱葛☆

*G. lanceolata* R. et W.

隆林。

多花蓬莱葛☆

*G. multiflora* Makino

龙州、凌云、乐业、南丹、大苗山、全州。

蓬莱葛

*G. ovata* Makino

凌云、乐业。

断肠草 胡蔓藤、大茶药

*Gelsemium elegans* Benth.

区内各地，南部地区较多。

全草有剧毒；消肿止痛，拔毒杀虫；外用治疗疮，癣疥，皮肤湿疹，跌打，骨折等。根、茎、叶均可用作杀虫农药，兽医用适量内治牛、羊、猪肠虫；外用杀蟎止痒，除虱，拔毒生肌。误食断肠草中毒的解救方法：立即灌大量猪、羊等动物鲜血；给身体保暖；血压低时注射麻黄碱，静脉滴注葡萄糖盐水；呼吸障碍时注射尼可刹米等兴奋剂，输氧或行人工呼吸；腹部剧痛时可

用镇痛剂。民间解毒方法有：1. 灌大量猪油或生油；2. 蕃菜的根、茎一斤捣烂榨汁灌服；3. 雷公根捣烂拌茶油灌服；4. 金银花连叶捣烂榨汁拌黄糖灌服。

### 度量草

*Mitreola pedicellata* Benth.

南丹、隆林。

### 狭花马钱 牛眼珠

*Strychnos angustiflora* Benth.

合浦、博白。

种子散血热，消肿毒；治伤寒热病，咽喉肿痛，痞块，痈疽，恶疮。本属植物的种子有剧毒，用时注意。中毒症状是全身肌肉痉挛，呼吸困难，面色青紫，牙关紧闭，角弓反张，怕声音、光线等刺激。解救法主要是将病人安置在安静的暗室内用解痉剂等对症治疗。

### 华马钱

*S. cathayensis* Merr.

平南、苍梧、大瑶山、扶绥。

种子和根解热，止血；治头痛，心气痛，刀伤，疟疾。

### •吕宋果 解热豆

*S. ignatii* Bergius

原产亚洲热带地区。

代马钱子药用。

### •马钱子

*S. nux-vomica* L.

原产印度、锡兰、泰国。

种子有毒；散血热，消肿毒；治咽喉肿痛，肿瘤痞块，痈疽恶疮等。

229 木犀科 OLEACEAE

连翘

*Forsythia suspensa* (Thb.) Vahl

南宁栽培。

果实清热解毒，散结消肿，排脓，利尿。治热病初起，痈肿疮疡，瘰疬，丹毒，淋病等。

白蜡树

*Fraxinus chinensis* Roxb.

临桂、桂林、龙胜、阳朔、兴安、资源、罗城。

枝条柔软，称白蜡条，适宜于编制提篮、抬筐等物；较粗者制作手杖、缨枪、工具柄等物，并可作搭棚建房材料。树皮调经解毒；治月经不调，小儿头疮。本树种是白蜡虫寄主，能放养白蜡虫产白蜡。

光蜡树

*F. griffithii* C.B.Clarke

桂林、临桂、南丹、容县、大新。

苦枥木 白蜡树、水蜡树

*F. retusa* Champ.

全州、阳朔、临桂、龙胜、大苗山。

白蜡虫寄主树种。

白萼素馨

*Jasminum albicalyx* Kobuski

柳城、龙州、武鸣、平乐。

扭肚藤 波形素馨

*J. amplexicaule* Buch.-Ham.

区内各地。

茎、叶清热化湿，消滞；治急性肠胃炎，痢疾腹痛，消化不良，

急性结膜炎，风湿性关节炎，跌打骨折。

短萼素馨

*J. brevidentatum* Chia

临桂。

华南素馨

*J. cathayense* Chun ex Chia

大瑶山。

栀花素馨

*J. gardeniiflorum* Chia

上思。

光清香藤

*J. lanceolarium* Roxb.

区内各地。

根、藤行血理气，祛风解毒；治风湿麻木，无名肿毒，跌打损伤，头痛腰痛等。花可提芳香油。

清香藤

*J. lanceolarium* Roxb.

var. *puberulum* Hemsl.

罗城、容县、全州。

藤治风湿跌打。

桂叶素馨

*J. laurifolium* Roxb.

罗城、大瑶山、全州。

全草清热解毒，消炎利尿，消肿散瘀；治痢疾，尿路感染，膀胱炎，尿道炎，肾炎水肿，跌打扭伤。

长管素馨☆ 白坑藤

*J. longitubum* Chia

Jasminum

龙州。

\*云南黄素馨

*J. mesnyi* Hance

临桂、桂林。

作绿篱。

小萼素馨

*J. microcalyx* Hance

上思、龙州、天峨、隆林、柳城、平乐。

青藤仔 鸡骨香

*J. nervosum* Lour.

隆林、凌云、百色、田林、平果、东兰、巴马、河池、都安、武鸣、扶绥、龙州、临桂。

藤、花解毒消肿；治热痢，跌打，疮疖。

小叶青藤仔

*J. nervosum* Lour.

var. *elegans* (Hemsl.) Chia

天峨、百色。

毛青藤仔

*J. nervosum* Lour.

var. *villosum* (Lévl.) Chia

隆林。

厚叶素馨 鲫鱼胆

*J. pentaneurum* H.-M.

大瑶山、玉林、平南、博白、容县、北流、梧州、苍梧、藤县、

贺县、上思、横县、宁明、上林、百色、桂林、平乐。

全株清热行气，去瘀生新；治跌打刀伤，蛇伤，烂疮。

\*茉莉花

*J. sambac* (L.) Ait.

各地。

花提芳香油，又可薰茶。药用花清热解表；治外感发热，腹痛，疮毒疽瘤，眼红肿。根有毒；镇痛麻醉。绿化植物。

### 贵州素馨☆

*J. seguini* Lévl.

临桂、桂林、阳朔、武鸣。

### 大花贵州素馨☆

*J. seguini* Lévl.

*var. latilobum* H.-M.

南丹、宜山、河池、容县、靖西。

根健胃，强壮。

### 华素馨

*J. sinense* Hemsl.

凌云、田林、南丹、凤山、恭城、阳朔、荔浦、临桂、龙胜、全州、贺县、富川、钟山。

花清热解毒；治疮疖。

### 毛女贞

*Ligustrum groffiae* Merr.

罗城、都安、大瑶山、融安、平南、南宁、大新、武鸣、田林、百色、那坡、平果、龙胜、恭城、永福、昭平。

叶治喉痛，口唇糜烂。

### 东女贞

*L. japonicum* Thb.

十万大山、容县、大瑶山、大苗山、柳城、象州。

作绿篱用。作靠接月季、丹桂的砧木用。

### 女贞 大叶女贞、冬青

*L. lucidum* Ait.

## Ligustrum

桂林、临桂、兴安、龙胜、资源、全州、恭城、永福、大瑶山、南丹、罗城、东兰、上林、那坡、田林、隆林、凌云、乐业、蒙山、贺县。

种子补肾强腰；治肝肾阴亏，腰膝痠软，头晕目昏。树皮和叶清热解毒，消炎止痛；治口腔炎，咽喉炎，烫火伤，痈肿。种子油工业用。为较好绿化树种，又可放养白蜡虫。

### 亮叶女贞

**L. nitidum** Ait.

### 凹叶女贞☆

**L. retusum** Merr.

桂林、临桂、阳朔。

### 虫蜡树

**L. robustum** Bl.

放养白蜡虫。树皮提制栲胶。

### 山指甲 小叶女贞、小蜡树

**L. sinense** Lour.

区内各地。

放养白蜡虫。花提芳香油。种子可榨油和提取淀粉。叶清热解毒，消肿止痛；治跌打损伤，刀伤，疮疡肿毒。根通小便，治劳伤吐血。兽医用全株治跌打损伤，洗烂脚及皮肤搔痒。常作绿篱用。

### 蜡树

**L. sinense** Lour.

**var. myrianthum** (Diels) Hoefk.

容县、上思。

用途同上。

海南李榄

*Linociera hainanensis* Merr. et Chun

龙州。

枝花李榄

*L. ramiflora* (Roxb.) Wall.

(*L. macrophylla* Wall.)

扶绥、龙州、宁明、十万大山、平南、苍梧、龙胜、临桂、田林。

材用。树皮提制栲胶。叶、嫩枝及果实可提取芳香油供调合香精用。

毛萼李榄

*L. ramiflora* (Roxb.) Wall.

*forma pubisepala* Chia

大苗山、上思。

\*油橄榄 洋橄榄、齐墩果

*Olea europaea* L.

南宁、柳州、桂林等市有引种。

果肉榨油供食用；油在医药上用作软膏、硬膏、缓泻剂等；亦有用来制润滑油和肥皂。半成熟的果及等外果可腌泡作菜食。木材很坚固，可作工具、箱盒、刷背等用材。

狭叶木犀榄

*O. neriiifolia* H L Li

区内有记录。

方枝木犀榄

*O. tetragonoclada* Chia

十万大山、东兴、防城。

Osmanthus

狭叶木犀

*Osmanthus attenuatus* P.S.Green

平南、龙胜。

石山桂花☆

*O. fordii* Hemsl.

桂林、临桂、灵川、阳朔。

绿化花木。比桂花矮小。适用于庭园和公园。花亦很盛，但不及桂花的芬芳。

桂花 木犀

*O. fragrans* Lour.

桂林地区和富川、钟山、河池、天峨、德保、靖西、南宁、合浦等县。

花提芳香油，制桂花浸膏，用以配制高级香料，用于各种香脂、香皂及食品中。鲜花用盐或糖浸渍保存作为食品香料。花用以薰茶和制桂花糖、桂花糕、桂花酒等。花散寒破结，化痰生津，明目；治风虫牙痛，痰饮喘咳，经闭腹痛。根祛风除湿，散寒；治筋骨疼痛，风湿麻木，肾虚牙痛。优良绿化和行道树种。

•丹桂

*O. fragrans* Lour.

*var. aurantiacus* Mak.

桂林。

用途同桂花。在绿化上不同的特点是花颜色为橙红色。

月桂

*O. marginatus* (Champ. ex Benth.) Hemsl.

容县、武鸣、大瑶山、大苗山、龙胜、兴安、临桂、全州。

花提芳香油。绿化树种。

牛矢果

*O. matsumuranus* Hayata

平南、博白、北流、大瑶山、上思、都安、龙州、大明山、宁明、  
龙胜、恭城。

叶杀菌，消炎；治烂疮。

显脉木犀☆

*O. phanerophlebius* Chia

全州、资源、大瑶山。

华木犀☆

*O. sinensis* (H -M.) H -M.

(*Gonocaryum sinense* H -M )

十万大山。

\*扁球丁香☆

*Syringa oblata* Lindl.

桂林有引种。

显苞齐墩果 滨木犀榄

*Tetrapilus brachiatus* Lour.

异株木犀榄

*T. dioicus* (Roxb.) Johns.

(*Olea dioica* Roxb.)

平南、上思。

树皮解热。木材供细工、用具等用。

海南木犀榄

*T. hainanensis* (H.L.Li) Johns.

(*Olea hainanensis* H L.Li)

十万大山、大瑶山。

230 夹竹桃科 APOCYNACEAE

广西香花藤

*Aganosma kwangsiensis* Tsiang

上思、大明山、那坡、天峨、凤山、融安。

全株治水肿。

罗甸香花藤☆

*A. navailei* (Lévl.) Tsiang

(*Trachelosperma navailei* Lévl.)

南丹。

香花藤☆

*A. schlechterianum* Lévl.

(*A. odorum* Tsiang,

*A. radiatum* Merr.)

隆林、田林、凤山、南丹。

•黄蝉

*Allamanda neriifolia* Hk.

常栽培供庭园绿化。

糖胶树 面条树、灯台木

*Alstonia scholaris* (L.) R.Br.

(*Echites scholaris* L.,

*Pala scholaris* (L.) Roberty)

东兴、南宁、武鸣、宁明、龙州、那坡、陆川、北流。

叶镇静止咳，消炎退热；治百日咳，伤风咳嗽，气管炎，支气管炎，肺炎，哮喘。叶止血生肌；治外伤出血，疮疖。树胶植物，树干的白色乳汁含树胶，可提取作橡胶代用品原料，亦用作

口香糖原料。绿化树种。

云南糖胶树☆ 鸡骨常山

*A. yunnanensis* Diels

隆林、田林、乐业。

根、叶消炎止血，接骨止痛；叶治疟疾，肝炎，外伤出血，骨折。

根治发热头痛，外洗红肿痛。种子含油。

尖叶念珠藤☆

*Alyxia acutifolia* Tsiang

兴安。

海南念珠藤☆

*A. hainanensis* Merr. et Chun

大瑶山、十万大山。

广东念珠藤☆

*A. levinei* Merr.

十万大山、大明山、宁明、龙州、大瑶山、大苗山、南丹、平乐、阳朔、荔浦、临桂、兴安、恭城、贺县、苍梧。

茎、叶消肿止痛，去瘀生新；治抽筋，风湿，病后虚弱，腰痛，心胃气痛。

野念珠藤

*A. schlechteri* Lévl.

大瑶山、南丹、凌云、乐业。

串珠子

*A. vulgaris* Tsiang

大瑶山、贺县、兴安。

念珠藤

*A. sinensis* Champ.

靖西、龙州、大瑶山。

Alyxia-Catharanthus

信宜念珠藤☆

*A. yunkuniana Tsiang*

十万大山、大瑶山、南丹。

铁骨藤 神葛藤

*Anodendron affine (Hk. et Arn.) Druce*

合浦、苍梧、十万大山、大瑶山。

海南铁骨藤

*A. howii Tsiang*

防城、十万大山。

短筒清明花

*Beaumontia brevituba Oliv.*

宁明。

大花清明花 炮弹果

*B. grandiflora Wall.*

龙州、隆林。

根、叶祛风湿，散瘀活血，接骨；治骨折，跌打损伤，风湿性腰腿痛，腰肌劳损。

\*长春花 日日新

*Catharanthus roseus (L.) G Don*

桂林、南宁等市。

全草凉血降压，镇静安神；主治高血压。近年发现为抗癌药物，治白血病，肺癌，绒毛膜上皮癌，淋巴肿瘤。常栽作庭园绿化植物。

\*白长春花 白日日新

*C. roseus (L.) G. Don*

*var. albus (Sweet) G. Don*

用途同长春花。

## 海杧果

*Cerbera manghas* L.

合浦、钦州海岸砂地或近海河岸。

枝、叶、果有毒，核仁最毒（含氢氰酸和海杧果甙等）。种子可毒鱼。树液可作泻下剂。误食果实中毒时，可用对症疗法；民间用灌鲜羊血、饮椰子水解毒。

## 鹿角藤 大叶鹿角藤、奶汁藤、康膜藤

*Chonemorpha eriostylis* Pitard

苍梧、东兴、十万大山、大明山、宁明、龙州。

老茎治妇女黄疸。橡胶植物，胶乳可作橡胶原料。

## 酸叶胶藤

*Ecdysanthera rosea* Hk. et Arn.

博白、宁明、龙州、田林、十万大山、大瑶山、南丹、天峨、阳朔、临桂、灵川。

全株健胃，解热，消肿，收敛，止汗；治跌打，风湿骨痛，痈痛，溃疡，疔疮，眼肿。作兽药，治牛瘟。韧皮纤维可作造纸和人造棉原料。

## 花皮胶藤

*E. utilis* Hay. et Kaw.

十万大山、宁明、大瑶山。

橡胶植物，胶乳可制橡胶用品；如力车胎、救生圈、医疗器械等。  
树皮治小儿白泡疮。

## 桂南花皮胶藤

*E. utilis* Hay. et Kaw.

*var. dilatata* Tsiang

十万大山。

用途参阅花皮胶藤。

Ervatamia

中国狗牙花

*Ervatamia chinensis* (Merr.) Tsiang

东兴。

大陆狗牙花

*E. continentalis* Tsiang

东兴、十万大山。

毛狗牙花

*E. continentalis* Tsiang

var. *pubiflora* Tsiang

十万大山。

\*狗牙花

*E. divaricata* (L.) Burk.

常栽作庭园绿化植物。叶清凉解热，利水消肿；治眼病，疮疥，乳疮，疯狗咬伤。

\*重瓣狗牙花 狗癫木

*E. divaricata* (L.) Burk.

cultivar. “Couyahua”

用途同狗牙花。

广西狗牙花

*E. kwangsiensis* Tsiang

田阳、百色、田林。

药用狗牙花

*E. officinalis* Tsiang

龙州、靖西。

纤花狗牙花

*E. tenuiflora* Tsiang

凌云。

云南狗牙花

*E. yunnanensis* Tsiang

田林。

止泻木

*Holarrhena antidysenterica* Wall.

龙州、南宁有栽培。

树皮可治痢疾，肠胃气胀，发热。种子补肾壮阳。木材可制梳和模型。

腰骨藤 青豆藤

*Ichnocarpus frutescens* (L.) R.Br.

苍梧、大明山、田阳、百色、东兰。

种子浸酒，可治腰骨风湿痛。根可提取橡胶。韧皮纤维可提取利用。

疏花腰骨藤

*I. oliganthus* Tsiang

岑溪、南宁。

尖山橙

*Melodinus fusiformis* Champ.

大瑶山。

全株活血祛风；治风湿性心脏病。

大山橙

*M. magnificus* Tsiang

苍梧、大瑶山、象州、十万大山、靖西。

叶可代茶。

桂山橙

*M. morsei* Tsiang

龙州。

贵州山橙

*M. seguinii* Lévl.

十万大山、大瑶山、龙州、那坡、罗城。

山橙

*M. suaveolens* Champ.

十万大山、合浦、陆川、博白、宁明。

常栽培作庭园绿化植物。韧皮纤维可制绳，织麻袋。

小花藤

*Micrechites polyantha* (Bl.) Miq.

十万大山、大明山、龙州、靖西。

两广小花藤

*M. rehderiana* Tsiang

十万大山。

•夹竹桃

*Nerium indicum* Mill

常栽作庭园绿化和行道树种。枝、叶、树皮有大毒，入药，强心利尿，发汗祛痰，祛瘀止痛，解毒透疹；治哮喘，羊癫疯，跌打，亦有用治小儿麻疹不透。孕妇忌用。韧皮纤维是高级混纺原料，可混纺织成平布、帆布供衣着等用，亦可单纺或供制绳、造纸等用。种子油可作润滑油。叶、树皮和花浸液可防治稻飞虱、浮尘子等害虫。木材供细工用。

华杜仲藤 华胶藤、结衣藤

*Parabarium chinense* Tsiang

十万大山。

橡胶植物。胶乳可制鞋底等橡胶制品。全株强壮补腰；治跌打，风湿，功用近毛杜仲藤。

红杜仲藤 陶林模、红喉崩

**P. chunianum Tsiang**

十万大山。

全株入药，功用近毛杜仲藤。橡胶植物，胶乳可制鞋底等橡胶制品。

两广杜仲藤 乳汁藤

**P. handelianum Tsiang**

十万大山、苍梧。

全株入药，功用近毛杜仲藤。橡胶植物，胶乳可制橡胶制品。

毛杜仲藤 大白皮胶藤、白喉崩、麦卡吐、引汁藤、鸡头藤

**P. huitingii Chun et Tsiang**

陆川、十万大山、南宁、大明山、宁明、龙州、苍梧、大瑶山、融水、三江、兴安、临桂、永福、凤山。

根、藤祛风活络，强腰壮骨；治肾虚腰痛，扭伤，骨折，风湿关节炎。

兽医用老茎治牛软筋症。橡胶植物，胶乳可制鞋底等橡胶制品。

杜仲藤 老鸦嘴藤、白皮胶藤、小白皮胶藤、白杜仲藤、白喉崩

**P. micranthum (Wall.) Pierre**

十万大山、博白、苍梧、临桂、大瑶山、龙州、靖西、百色。

全藤入药，功用近毛杜仲藤。橡胶植物，胶乳可制橡胶制品。

棱蕊同心结

**Parsonsia goniostemon H.-M.**

龙州、河池。

●鸡蛋花

**Plumeria rubra L.**

**var. acutifolia (Poir.) Bail.**

**(P. acuminata Ait.)**

常栽作庭园绿化植物。花清热利湿，润肺止咳；治菌痢，肝炎，

Pottia-Rauvolfia

气管炎，咳喘，肺炎，消化不良，小儿疳积。花代茶，叫鸡蛋花茶。鲜花可提芳香油，用作皂用香精或香脂等香精的原料。

大花腰鼓藤

*Pottia grandiflora* Markgr.

苍梧、大瑶山、罗城、全州。

麻子藤

*P. laxiflora* (Bl.) O.Ktze.

十万大山、大瑶山、龙州、横县、贵县、苍梧、平乐、永福。

全株浸酒，治风湿腰痛。根治贫血。橡胶植物。

毛麻子藤

*P. pubescens* Tsiang

凌云。

阔叶萝芙木

*Rauvolfia latifrons* Tsiang

龙州、那坡。

根、茎接骨，又治风湿。

\*蛇根木 印度萝芙木

*R. serpentina* (L.) Benth. ex Kurz

南宁、桂林。

根、叶清热，凉血解毒，降压。

四叶萝芙木

*R. tetraphylla* L.

南宁有栽培。

萝芙木 矮青木、马蹄根、野辣椒

*R. verticillata* (Lour.) Baill.

区内各地。

根、叶清热，凉血解毒，降压；治高血压，头痛，跌打，蛇伤，失眠。

眩晕，癫痫，刀伤出血，喉痛，腰痛，急性肝炎，疟疾，胃痛。  
叶、根、皮作兽药；治牛跌打断骨。

### 海南萝芙木

*R. verticillata* (Lour.) Baill.

var. *hainanensis* Tsiang

马山。

全株治高血压。

### 百色萝芙木☆ 倒披针叶萝芙木

*R. verticillata* (Lour.) Baill.

var. *oblanceolata* Tsiang

百色。

全株治高血压。

### 药用萝芙木

*R. verticillata* (Lour.) Baill.

var. *officinalis* Tsiang

天等、龙州、德保、靖西。

全株治风寒感冒，头痛，骨痛，胃痛，肚痛，咳嗽，蛇伤。

### 红果萝芙木

*R. verticillata* (Lour.) Baill.

var. *rubrocarpa* Tsiang

凌云。

### 云南萝芙木

*R. yunnanensis* Tsiang

龙州、靖西。

根治癣疥。

### 毛药藤

*Sindechites henryi* Oliv.

Strophanthus-Trachelospermum

凌云。

羊角拗 羊角扭

*Strophanthus divaricatus* (Lour.) Hk. et Arn.

苍梧、梧州、昭平、藤县、贺县、富川、平乐、桂林(栽培)、容县、陆川、博白、合浦、十万大山、武鸣、马山、柳州、河池。

叶、种子有剧毒，入药，强心消肿，止痒杀虫；外用治跌打，癧疥，风湿，小儿麻痹后遗症，多发性脓肿，蛇伤，骨折，贅疣。作兽药，全株杀虫止痒，洗癧疥，泻下通便，催产；根治跌打骨折。全株作农药，可防治三化螟幼虫蛾、稻瘿蚊和地下害虫。全株可毒雀和老鼠。种毛很柔软，可作枕褥的填充物。

\*黄花夹竹桃

*Thevetia peruviana* (Pers.) K.Schum.

梧州、柳州、灵山、桂林。

树液、种子、花、根、茎皮、叶都有毒，含多种强心甙，叶入药，有强心作用。种子油亦有毒，可制肥皂和鞣革用油。

腋花络石☆

*Trachelospermum axillaris* Hk f.

全州、龙胜、临桂、罗城、南丹、隆林。

川西络石☆

*T. bodinieri* (Lévl.) Woods.

凌云。

短柱络石☆

*T. brevistylum* H.-M.

全州、罗城、大瑶山。

贵州络石☆

*T. dunnii* Lévl.

凌云。

细柄络石☆

*T. gracilipes* Hk.f.

大瑶山、柳州、贺县、隆林。

络石

*T. jasminoides* (Lindl.) Lem.

区内各地。

藤祛风散热，活血通络；治风湿痹痛，痈肿，刀伤，腰痛，肺结核，吐血。兽医用老茎治牛风湿症，软脚症，跌打断骨等。韧皮纤维可制人造棉、绳索，造纸。花可提取芳香油。种子棉毛可作枕褥等填充物。亦栽植供庭园绿化用。

纽子花

*Vallaris grandiflora* Hemsl. et Wils.

柳州。

海南倒吊笔

*Wrightia hainanensis* Merr.

南宁、扶绥、宁明、凌云、贺县。

两广倒吊笔☆

*W. hainanensis* Merr.

var. *chingii* Tsiang

十万大山、龙州、横县、藤县、罗城、南丹、天峨、凌云、那坡、临桂。

根、叶止血；治刀伤，跌打。

倒吊笔

*W. pubescens* R.Br.

百色、龙州、大瑶山、北流、陆川、博白、合浦、钦州。

根、茎的皮部祛风活络，散结化痰；治颈淋巴结核，风湿关节炎，腰腿痛，慢性支气管炎，黄疸肝炎，肝硬化腹水。作兽

Wrightia-Calotropis

药，治痰多咳嗽，淋巴结炎，风湿关节痛等症。木材不易裂，宜作轻巧的上等家具、天花板、门、窗、铅笔杆、乐器、板鞋等。韧皮纤维可制人造棉，造纸。绿化树种。

广西倒吊笔

*W. schlechteri* Lévl.

凌云、百色、靖西、龙州。

毛倒吊笔

*W. tomentosa* Roem. et Schult.

横县、宁明、龙州、田林、隆林。

韧皮纤维可造纸。

231 萝藦科 ASCLEPIADACEAE

毛冠藤

*Adelostemma gracillimum* (Wall.) Hk.f.

百色、武鸣、平乐。

\*莲生桂子花 马利筋

*Asclepias curassavica* L.

常栽作庭园绿化植物。全草、叶、花活血调经，消炎止痛，生肌；治月经不调，崩漏带下，扁桃体炎，肺炎，支气管炎，膀胱炎，尿道炎，感冒，刀伤。根为催吐、缓下剂。种子毛可作褥垫等填充物。

食用短梗藤

*Brachystelma edulis* Coll. et Hemsl.

南宁。

块根润肺。

牛角瓜

*Calotropis gigantea* (L.) Dryand

宁明、南宁。

茎皮纤维可供造纸、制绳索及人造棉。种子毛可作填充物。叶可止咳。根皮可治癞及梅毒。根、茎、叶、树液均有毒，含剧烈毒性和强烈刺激性的牛角瓜碱。

蜂出巢

*Centrostemma platypetalum* Merr.

(*C. multiflora* Chun, non Decne.)

十万大山。

狭瓣吊灯花

*Ceropegia trichantha* Hemsl.

(*C. angustilimba* Merr.)

凌云。

全株治癞癬。

古钩藤 牛奶藤

*Cryptolepis buchanani* Roem. et Schult.

南宁、武鸣、大新、宁明、龙州、靖西、那坡、田阳、凌云、百色、隆林。

根、果发散，止鼻血，催乳；治乳癌，衄血。全藤可扭制绳索。

种子毛可作垫褥等填充物。

白叶藤 七娘藤

*C. sinensis* (Lour.) Merr.

玉林、容县、博白、苍梧、昭平、十万大山、横县、龙州、靖西、柳州。

全株凉血败毒，通乳；治蛇伤，跌打，刀伤，疮疖。

海南杯冠藤

*Cyathella insulana* (Hance) Tsiang et Zhang

(*Cynanchum insulanum* Hance)

北海涠洲岛。

Cynanchum

白薇

**Cynanchum atratum** Bunge

全州、临桂、贺县、柳州、马山、乐业、隆林。

根清血热，利小便，消炎，止咳；治阴虚内热，产后虚烦，小便淋沥，肺结核潮热，支气管炎，风湿痛。作兽药，治牛慢性炭疽病。

耳叶牛皮消

**C. auriculatum** Royle

龙州、凌云、罗城、大苗山、柳州。

根清热解毒，消肿止痛；治痢疾，腹胀疼痛，小儿高热，蛇伤，疔毒。

牛皮消

**C. caudatum** Maxim.

龙胜。

根消积利水，祛风解毒；治肾炎，水肿，胃溃疡，胃炎，白带多，肝硬化腹水，便血。

刺果牛皮消☆ 小刺瓜

**C. corymbosum** Wight

阳朔、永福、临桂、大瑶山、容县、宁明、乐业、隆林。

粉绿牛皮消 芫花叶白前、水竹消

**C. glaucescens** (Decne.) H.-M.

昭平、全州。

根行气消积，健脾和胃，清肺化痰；治胃痛，疟疾，跌打，咳嗽。

广西牛皮消

**C. kwangsiense** Tsiang

罗城。

八叶牛皮消

*C. octophyllum* Schneid.

罗城、大瑶山。

水结草

*C. simplex* Tsiang

全州、资源、龙胜、临桂、大瑶山。

狭叶牛皮消 水杨柳

*C. stauntonii* (DC.) H.-M.

兴安、大瑶山。

根清肺热，化痰止咳；治肺热咳嗽，痰多，胸闷。又解砒中毒或  
666 中毒。

轮叶牛皮消

*C. verticillatum* Hemsl.

南丹。

假瓜子金

*Dischidanthus urceolatus* (Decne.) Tsiang

南瓜子金

*Dischidia australis* Tsiang

桂南。

全株清热解毒，补气血，消肿毒；治哮喘，咳嗽，湿疹，疮痒，关节炎。

瓜子金 石仙桃

*D. chinensis* Champ. ex Benth.

龙州、南宁、靖西、那坡、隆林、东兰、十万大山、博白。

藤、叶清肺化痰，凉血解毒；治肺燥咳血，疔疮肿毒，小儿疳积，跌打肿痛，蛇伤，痢疾。

金瓜核藤

*D. esquirolii* (Lévl.) Tsiang

十万大山、龙州、武鸣、靖西、隆林、柳州、罗城、河池。

越南瓜子金

*D. tonkinensis* Coste

龙州、靖西。

广西长梗藤☆

*Dolichostelma kwangsiensis* Tsiang, ined.

隆林。

纤冠藤

*Gongronema nepalense* (Wall.) Decne.

苍梧、龙州、凌云。

全株通乳，又治子宫下垂。韧皮纤维可织麻袋，造纸。

天星藤 年藤

*Graphistemma pictum* (Champ.) Benth. et Hk f.

十万大山、博白、容县、苍梧、东兰、天峨。

全草驳骨，催乳；治跌打。

匙羹藤

*Gymnema alterniflorum* (Lour.) Merr.

(*G. affine* Decne.)

钦州、梧州、贺县、桂平、贵县、北流、博白、横县、南宁、崇左、宁明、龙州、柳州。

全株外用，止血生肌；治枪弹创伤；又能杀虱。

番禺匙羹藤 无香藤

*G. inodorum* (Lour.) Decne.

龙州、十万大山、大瑶山。

染色无香藤

*G. tingens* (Roxb.) Spreng.

隆林。

翅脉百灵藤☆ 醉魂藤

*Heterostemma alatum* (Wall.) Wight

龙州、大瑶山、灵川、兴安。

黔桂百灵藤☆ 黔桂醉魂藤

*H. esquirolii* (Lévl.) Tsiang

百色、凌云。

广西百灵藤☆ 广西醉魂藤

*H. renchangii* Tsiang

龙州、罗城、阳朔。

灵山百灵藤☆

*H. tsoongii* Tsiang

阳朔。

较剪藤 金丝花

*Holostemma annularis* (Roxb.) K.Schum.

西林。

球兰 玉蝶梅

*Hoya carnosa* (L.) R.Br.

龙州、宁明。

全草清热解毒，补虚下乳；治肺炎，麻疹高热，关节炎，睾丸炎，痛疗，乳汁不下，目赤肿痛。作兽药，治牛关节肿痛，肝胆火热，外敷疮痈疖肿。常栽培供庭园绿化用。

陵水球兰

*H. fungii* Merr.

龙州、凌云、乐业。

全株驳骨，又治跌打。

Hoya-Huthamnus

褐色球兰

*H. fusca* Wall.

十万大山。

剑叶球兰

*H. lancilimba* Merr.

百色。

狭叶球兰☆

*H. lancilimba* Merr.

*forma tsoi* (Merr.) Tsiang

十万大山、大瑶山、永福、上林、靖西、凌云。

全株驳骨消肿；治跌打，刀伤。

三脉球兰☆

*H. pottsii* Traill

(*H. obscurinervia* Merr.)

灵山、陆川、博白。

毛球兰

*H. villosa* Cost.

十万大山、大瑶山、扶绥、龙州、靖西、凌云、东兰、河池、融水。

叶治跌打。

滇球兰

*H. yunnanensis* H.-M.

南丹。

滇桂茶药

*Huthamnus pilosus* (Kerr) Tsiang

(*H. sinicus* Tsiang)

十万大山。

牛奶菜

*Marsdenia cambodiensis* Cost.

博白、桂平、贵县。

根补精，通乳，强壮，补气血；治气虚。

光牛奶菜☆

*M. glabra* Cost.

柳州。

两广牛奶藤

*M. koi* Tsiang

凌云。

黔桂牛奶藤

*M. pseudotinctoria* Tsiang

南丹和贵州交界。

肖牛耳藤

*M. tinctoria* (Roxb.) R.Br.

十万大山、扶绥、龙州、靖西、百色、隆林、临桂。

乳汁有毒。果治心胃气痛。叶含蓝靛，可作染料，国外已栽作为染料原料之一。韧皮纤维可织粗布，制绳和渔网。种子毛可作枕褥等填充物。

短梗牛奶藤☆

*M. tinctoria* (Roxb.) R.Br.

*var. brevis* Cost.

龙州、凌云、阳朔。

华萝藦

*Metaplexis hemsleyana* Oliv.

永福、南丹、凌云。

Myriopteron-Pycnostelma

多翅果☆

*Myriopteron extensum* (Wight) K.Schum.

隆林。

尖槐藤

*Oxystelma esculentum* (L.f.) R.Br.

龙州、大明山、东兰。

根治跌打；叶治蛇伤。

南石萝藦☆ 假了刁竹

*Pentasacme championi* Benth.

东兴、容县、武鸣、临桂、兴安。

全株清热，解毒；治肝炎，风火眼痛。

青蛇藤

*Periploca calophylla* (Wight) Falc.

南丹、乐业。

茎治蛇伤，腰痛，风湿麻木，跌打损伤。韧皮纤维可制绳，造纸。

西南杠柳☆

*P. forrestii* Schltr.

靖西、田阳、凌云、乐业。

茎、叶清凉止血；治跌打骨折，伤寒，劳伤，疟疾。

了刁竹 瑶山竹、山刁竹、徐长卿、蛇脚草

*Pycnostelma paniculatum* (Bunge) K.Schum.

全州、资源、龙胜、临桂、桂林、贺县、玉林、大瑶山、大苗山、邕宁、凌云等地。

全草祛风利湿，行气止痛；治蛇伤，胃痛，牙痛，肝硬化，腹水，癌肿，风湿痛，小儿疳积，痛经。作兽药，治蛇伤，痈疮，疔疖，无名肿毒，跌打，风湿肿痛。

小花四粉块藤☆ 小花青藤

*Secamone minutiflora* (Woods.) Tsiang

(*Tylophora minutiflora* Woods.)

凌云。

华四粉块藤☆ 细叶青藤

*S. sinica* H.-M.

临桂、阳朔、柳州、大苗山、罗城、东兰、南丹、武鸣、大新、  
龙州、田阳、乐业、贵县。

叶强筋壮骨，补精，催乳。

须药藤

*Stelmatocrypton khasianum* (Benth.) H.Baill.

那坡、隆林。

全草祛风解表，温中行气，止痛；治感冒，流感，头痛，咳嗽，  
气管炎，胃痛，食积气胀。根可提制芳香油，供调配香精。

两广千金子藤☆

*Stephanotis chunii* Tsiang

十万大山、大瑶山。

华千金子藤☆

*S. mucronata* (Blanco) Merr.

(*S. chinensis* Champ. ex Benth.)

玉林有栽培。

藤补虚益气，调经；治产后虚弱，经闭，腰骨酸痛。

马连鞍

*Streptocaulon griffithii* Hk.f.

十万大山、横县、邕宁、南宁、武鸣、马山、宁明、龙州、那  
坡、百色、凌云、都安、凤山。

根、叶清热解毒，行气止痛；治心胃气痛，痢疾，肠炎，感冒。

Streptocaulon-Toxocarpus

蛇伤，跌打，肾炎。

小马连鞍

*S. juventas* (Lour.) Merr.

那坡、龙州、十万大山。

广东夜来香

*Telosma cathayensis* Merr.

平果。

•夜香花☆

*T. cordatum* (Burm.f.) Merr.

常栽培作庭园绿化植物。根、花平肝清目；治眼热，去膜。花亦可和肉作菜。

褐毛弓果藤☆

*Toxocarpus fuscus* Tsiang

博白、武鸣、扶绥。

南弓果藤

*T. himalensis* Falc. ex Hk.f.

苍梧、横县、大瑶山、隆林。

卵叶弓果藤

*T. ovalifolius* Tsiang

钦州。

疏脉弓果藤☆

*T. paucinervius* Tsiang

柳州、凌云。

弓果藤 牛角藤

*T. wightianus* Hk. et Arn.

陆川。

宜昌娃儿藤☆

*Tylophora angustiniana* (Hemsl.) Craib  
(*Henrya angustiniana* Hemsl.)

河池。

黑果娃儿藤 蛇花藤

*T. atrofolliculata* Metc.

柳州、融安、三江、罗城、马山、龙州、靖西、田阳。

全株治跌打，蛇指疮。

多花娃儿藤☆

*T. floribunda* Miq.

河池、柳州。

根清热明目，祛风化痰，通经散瘀，补虚益损；治火眼，虚弱，丝虫病，小儿惊风，白喉，跌打肿痛，蛇伤，哮喘。

信宜娃儿藤☆

*T. koi* Merr.

大瑶山、南宁、龙州、东兰。

全株治手指疮。

广花娃儿藤

*T. leptantha* Tsiang

十万大山。

贵州娃儿藤☆

*T. leveilleana* Schltr. ex Lévl.

十万大山、田林、凌云、隆林、东兰。

绵毛娃儿藤

*T. mollissima* Wight

马山、靖西。

根清肺热，化痰止咳。

Tylophora-Adina

卵叶娃儿藤 三十六荡、双飞蝴蝶

*T. ovata* (Lindl.) Hook. et Steud.

(*T. hispida* Decne.)

陆川、平南、藤县、南宁、宁明等地。

根有小毒，止咳平喘，祛风止痛；治支气管炎，哮喘，风湿痛，跌打肿痛，蛇伤。

上思娃儿藤☆

*T. renchangii* Tsiang

十万大山。

小娃儿藤☆

*T. tenuis* Bl.

南宁、东兴、合浦。

假夜来香 假猫豆

*Wattakaka volubilis* (L.f.) Stapf

那坡、凌云、宁明、南宁、横县、巴马。

## 232 茜草科 RUBIACEAE

水团花

*Adina pilulifera* (Lam.) Fr.

区内各地。

茎皮纤维代麻用或制人造棉供棉絮用或与棉花混纺。木材作雕刻一类细工用材。根、茎提制栲胶。药用全株清热解毒，散瘀消肿；治感冒发热，上呼吸道炎，腮腺炎，肠胃炎，肝炎，浮肿，痢疾，跌打骨折，外伤出血等。兽医用根治斑疹热症，跌打刀伤，皮肤糜烂，湿痒和牛炭疽病。

大叶水团花 黄棉树

*A. polyccephala* Benth.

龙胜、资源、全州、阳朔、临桂、大苗山、大瑶山、凤山、巴

马、东兰、凌云、平果、那坡、田林、乐业、龙州、上思、贺县、平南、合浦。

木材坚韧，为农具优良用材，宜作扁担。

光叶水团花☆ 青榨木

*A. polyccephala* Benth.

*var. glabra* How

兴安、全州、大苗山、平南、上思。

用途同上。

水冬瓜 鸡仔木

*A. racemosa* Miq.

临桂、桂林、融安、天峨、罗城、靖西、平果、百色、龙州。

茎皮纤维代麻制绳，织麻袋，制人造棉供棉絮及土纺用，又作造纸原料。木材轻韧，最适合于制牙签和火柴杆等。

小叶水团花☆ 串鱼木、水杨梅

*A. rubella* Hance

桂林、临桂、永福、兴安、灌阳、平乐、昭平、梧州、南宁、龙州、罗城、宜山、贵县。

茎皮纤维代麻制绳，织袋，造纸，制人造棉。根和树皮可提制栲胶。药用根治小儿惊风。兽医用根治牛臌胀症，转圈症，喉风症等。

臭假耳草☆

*Anotis ingrata* (Wall.) Hk.f.

龙胜、阳朔、临桂、昭平。

全株治毒蛇咬伤。

广东假耳草

*A. kwangtungensis* Merr. et Metc.

龙胜。

Anotis-Canthium

滇桂假耳草

*A. wightiana* (Wall.) Hk.f.

桂西北。

团花

*Anthocephalus cadamba* (Roxb.) Miq.

龙州。

假蛇舌草☆ 波利亚草

*Borreria stricta* (L.f.) G.F.W.Mey

龙州、藤县。

铁屎米

*Canthium dicoccum* (Gaertn.) Merr.

上思、龙州、那坡、靖西、天峨、南丹、平乐、阳朔、桂林。

木材可供建筑、船舰、车辆、枕木用，民间常用作水车脚和扁担等物。

刺鱼骨木☆

*C. horridum* Bl.

罗城、平南、龙州、隆林。

树皮治赤痢。叶治手指生疮，肺痨。

小叶铁屎米

*C. parvifolium* Roxb.

平南、隆林、上林、龙州。

根驱虫。

似铁屎米

*C. simile* Merr. et Chun

龙州、武鸣、扶绥、靖西、田林、都安。

根、茎、叶驳骨。木材适宜作梁、柱、桁、桷、门窗、农具、板料等。

风箱树

*Cephalanthus occidentalis* L.

大瑶山、柳州、南宁、宁明、横县、临桂、桂林、梧州、田阳。  
 本树种不怕水淹，宜作固堤植物。根、叶、花清热利湿，收敛止泻，  
 祛痰止咳；治感冒发热，肺热咳嗽，风火牙痛，咽喉肿痛，肠炎  
 腹泻，菌痢等。兽医用根治牛、猪热泻，咽喉肿痛，痰多咳嗽。

假九节木☆ 柴沙利

*Chasalia curviflora* Thev.

隆林、田林、龙州、平南。

根治风湿，肺炎，耳疾，眼疾，喉痛。

\*金鸡纳

*Cinchona succirubra* Pav.

南宁。

树皮镇痛解热，抗疟；治疟疾，高热。也可作苦味健胃剂。

\*咖啡

*Coffea arabica* L.

桂南各地农场。

种子加工(炒)后作饮料。干燥成熟的种子作药用有兴奋、利尿之效。种子和叶又是提制咖啡碱的原料。

\*大粒咖啡

*C. robusta* Lindl.

龙州。

狭叶绣花针

*Damnacanthus angustifolius* Hayata

临桂、南丹、那坡。

绣花针 虎刺、伏牛花

*D. indicus* Gaertn.f.

Damnacanthus-Galium

全州、临桂、资源、桂林、阳朔、柳州、柳城、钦州。

全株清热解毒，行血祛风，消肿利尿；治急慢性肝炎，结合膜炎，感冒咳嗽，跌打内伤，风湿骨痛，脾虚浮肿，小儿疳积。

大叶绣花针☆

*D. macrophyllus* Sieb. ex Miq.

那坡。

小叶绣花针☆

*D. major* S. et Z.

南宁。

长柱山丹

*Duperrea pavetaefolia* (Kurz) Pitard

龙州、宁明。

香果树

*Emmenopterys henryi* Oliv.

龙胜、兴安、隆林、大新。

茎皮纤维可作蜡纸及人造棉原料。木材制家具用。本树种耐涝，宜作固堤植物。

拉拉藤 猪殃殃

*Galium aparine* L.

忻城、大苗山、柳州、凌云。

全草活血行瘀；治跌打扭伤，劳伤胸痛，痛经，乳腺癌，疔疮，牙疳，眼生白翳等。根可提取红色染料。

粗叶拉拉藤☆

*G. asperifolium* Wall.

大苗山、隆林、凌云、乐业。

四叶拉拉藤☆

*G. bungei* (Bl.) Steud.

隆林、柳州、龙胜、东兰。

全株接筋。

腺叶拉拉藤

*G. glandulosum* H.-M.

柳州、凌云。

宽叶拉拉藤☆

*G. kamtschaticum* Stellar

凌云、乐业。

海南黄栀

*Gardenia hainanensis* Merr.

大苗山、上思、十万大山。

梔子 山枝、枝子

*G. jasminoides* Ellis

区内各地。

花提制芳香浸膏，用于化妆品和香皂香精调合剂。果提取黄色染料，供食品和纤维染色用。果、根清热泻火，利尿消肿，凉血止血；治黄疸肝炎，感冒高热，肾炎水肿，菌痢，乳腺炎，淋巴结核，吐血，衄血，尿血，烫火伤等。作兽药治牛肺炎，喉风症，红白痢，猪瘟，马肺病等。

\*白蝉 梔子花

*G. jasminoides* Ellis

var. *fortuniana* Lindl.

桂林、柳州、南宁等市。

为绿化用栽培花木。花亦可提制芳香浸膏。

Gardenia-Knoxia

狭叶栀子☆

*G. stenophylla* Merr.

上思。

爱地草

*Geophila herbacea* (L.) O.Ktze.

龙州、昭平。

全株消肿排脓。

土连翘 网膜木

*Hymenodictyon flaccidum* Wall.

龙州、靖西。

龙船花

*Ixora chinensis* Lam.

柳州、邕宁、南宁、龙州、桂林、合浦、凌云、苍梧。

全株活血散瘀，清热解毒；花治月经不调，闭经，高血压；根治肺结核咳嗽，咯血；茎、叶治跌打损伤，瘀血疼痛，疮疖痈肿等。兽医用治跌打，疮疡等症。

白龙船花

*I. henryi* Lévl.

区内各地。

绿化花木。

长叶龙船花☆

*I. nienkui* Merr. et Chun

上思、龙州、龙胜。

假红芽大戟☆

*Knoxia corymbosa* Willd.

临桂、象州、邕宁、南宁、宁明。

红芽大戟

*K. valerianoides* Thorel ex Pitard

(*K. corymbosa* auct., non Willd.)

邕宁。

根泻水，通便；治水肿胀满，痰饮积聚。

尖叶粗叶木☆ 尖叶鸡矢树

*Lasianthus acuminatissimus* Merr.

桂西北。

粗叶木

*L. chinensis* (Champ.) Benth.

上思、南宁、容县、北流。

叶治黄疸湿热症。

罗浮粗叶木☆

*L. fordii* Hance

苍梧、宁明、平南。

光粗叶木☆

*L. glaberrima* Chun

桂林、临桂、龙胜、全州。

福建粗叶木☆

*L. hartii* Fr.

桂林、临桂、龙胜、恭城、全州、大苗山、大明山、昭平、蒙山、南丹、东兰、凌云、靖西、那坡、上思。

叶治刀伤。

云南粗叶木☆

*L. henryi* Hutch.

大苗山、靖西、田林、那坡、凌云、昭平、蒙山。

Lasianthus

广西粗叶木

*L. kwangsiensis* Merr. et H.L.Li

上思。

广东粗叶木☆

*L. kwangtungensis* Merr.

平南、博白、龙州。

披针叶粗叶木☆

*L. lancilimbus* Merr.

武鸣、大苗山、容县、平南、龙胜、靖西。

两广粗叶木

*L. lei* Merr. et Metc.

长尾粗叶木☆

*L. longicauda* Hk.f.

凌云、乐业、大瑶山、大苗山、兴安、龙胜、容县。

小花粗叶木☆

*L. micranthus* Hk.f.

大瑶山。

八脉粗叶木☆

*L. octonervius* H.-M.

百色。

西南粗叶木☆

*L. sikkimensis* Hk.f.

桂西北。

上思粗叶木☆

*L. tsiangii* Merr. ex H.L.Li

上思。

小叶鸡屎树

*L. wallichii* Wight

(*L. plagiophyllus* Hance)

藤县、博白、上思、巴马、横县、龙州、宁明、扶绥。

根舒筋活血；治跌打。

假野丁香☆

*Leptodermis affinis* How, ined.

龙州、德保、那坡、靖西、南丹、临桂。

卵叶野丁香☆

*L. ovata* H.Winkl.

阳朔、临桂、那坡。

桂丁香

*Luculia intermedia* Hutch.

德保、靖西、河池、凤山。

叶消肿；治跌打。

小滇丁香

*L. minor* Chun et How

田阳、那坡、靖西、德保、天峨。

毛鸡眼藤☆

*Morinda cochinchinensis* DC.

贺县、龙州、桂平、博白。

根驱风，止咳。

巴戟天 鸡肠风

*M. officinalis* How

上思、龙州、宁明、大新、靖西、玉林、苍梧、贺县、临桂、大苗山。

根补肾壮阳，强筋骨，祛风湿；治肾虚腰酸，痿痹瘫痪，风湿骨

Morinda-Mussaenda

痛，神经衰弱，阳萎，遗精，早泄，失眠，宫寒不孕。

鸡眼藤 黑藤钻、糠藤、三角藤、羊角藤

*M. umbellata* L.

区内各地。

根消肿去毒，祛风湿。兽医治牛、猪皮肤疮疥，炭疽病，猪丹毒等症。

异形玉叶金花☆

*Mussaenda anomala* H.L.Li

大瑶山。

密花玉叶金花☆

*M. densiflora* H.L Li

龙州。

散玉叶金花

*M. divaricata* Hutch.

临桂、龙胜、大瑶山、融安、大苗山、三江、河池、南丹、天峨、田林、隆林、平果、南宁、武鸣、昭平、苍梧、贵县。

长玉叶金花☆

*M. elongata* Hutch.

那坡。

啮状玉叶金花 胶鸟藤

*M. erosa* Champ.

武鸣、龙州、宁明、横县、上思、桂平、平南、东兰、田阳、大瑶山、桂林。

枝叶清热，消炎，解热毒；治疮疥，热积。茎皮纤维代麻制绳及织麻袋。根捣烂加水过滤的胶液可粘捕麻雀、老鼠、野兔。还可做造纸糊料。

贵州玉叶金花☆

*M. esquirolii* Lévl.

全州、兴安、龙胜、临桂、桂林、资源、永福、象州、大瑶山、  
大苗山、贺县、容县、平南、龙州、凌云。

云南玉叶金花☆

*M. henryi* Hutch.

龙州。

硬毛玉叶金花☆ 半夜开门

*M. hirsutula* Miq.

广西玉叶金花☆

*M. kwangsiensis* H.L.Li

大瑶山。

长萼玉叶金花☆

*M. longisepala* Chun et How

象州、大瑶山、大苗山、河池、东兰、龙州、都安、扶绥、田林。

大叶玉叶金花

*M. macrophylla* Wall.

南宁、永福、恭城、大瑶山。

玉叶金花

*M. pubescens* Ait.f.

区内各地。

藤、叶清热解毒，消暑利湿；治流感，中暑，支气管炎，扁桃体炎，咽喉炎，肾炎水肿，肠炎腹泻，毒蛇咬伤等。兽医用治风热感冒，口舌生疮，伏热中暑，外洗疮疡。茎皮纤维代麻制绳作缆。根捣烂滤取胶液作造纸糊料。

腺萼木

*Mycetia sinensis* Craib

Myrioneuron-Oldenlandia

苍梧、容县、龙州、大瑶山。

根除湿，利大小便。

密脉木☆

*Myrioneuron faberi* Hemsl.

天峨、河池、南丹、都安、田林、隆林、德保、那坡、百色、永福、恭城、阳朔、龙州、三江。

中越密脉木☆

*M. tonkinensis* Pitard

宁明、龙州。

药乌檀

*Nauclea officinalis* Pierre ex Pitard

大瑶山、平南。

木材适于造上等家具及作建筑板料。枝和树皮清热解毒，消肿止痛；治急性扁桃体炎，咽喉炎，乳腺炎，肠炎，菌痢，胆囊炎，下肢溃疡，疖肿，脚癣湿疹等。

薄柱草

*Nertera sinensis* Hemsl. ex Forbes et Hemsl.

大苗山、罗城、龙胜。

耳草

*Oldenlandia auricularia* (L.) F.Muell.

梧州、玉林、博白、容县、贵县、南宁、邕宁、龙州、宁明、崇左、兴安、桂林、平果。

全草清热解毒，散瘀消肿；治感冒发热，肺热咳嗽，咽喉痛，肠炎痢疾，疮疖肿毒，乳痈，湿疹，跌打损伤。兽医用治牛、猪热症，牛瘟，牛胀肚，牛锁喉，蛇伤，蜈蚣伤，刀伤出血，大便出血，疮疡等。

二花耳草

*O. biflora* L.

梧州。

尾叶耳草☆

*O. caudatifolia* (Merr. et Metc.) Chun, in herb.

上思、南宁、平南。

黄毛耳草 铺地蜈蚣

*O. chrysotricha* (Palib.) Chun

桂林、临桂、全州、兴安、龙胜、永福、大苗山、大瑶山、玉林。

全株消肿止血；治刀伤，蛇伤；又治牛挫伤，跌伤等。

缴房花耳草

*O. corymbosa* L.

梧州、富川、钟山、南宁、横县、龙州、宁明、桂林。

全株消肿去毒；治蛇伤，功近白花蛇舌草。

中肋耳草☆

*O. costata* (Roxb.) K.Schum.

武鸣大明山。

白花蛇舌草 小竹叶菜、一摸消

*O. diffusa* (Willd.) Roxb.

大苗山、大瑶山、柳城、贵县、苍梧、桂林、兴安。

全草清热解毒，利尿消肿；治毒蛇咬伤，尿路感染，阑尾炎，痢疾，肝炎，癌症，痈疖，咽喉炎，扁桃体炎，小儿疳积，小儿惊风，跌打损伤。兽医用治一切疮疡，喉肿，喉痛，蛇伤，跌打，出血性败血症。

牛白藤

*O. hedyotidea* (DC.) H.-M.

区内各地。

Oldenlandia

全草清热解毒，祛风除湿，活血通络；治中暑，感冒咳嗽，胃炎，痔疮出血，痈疮肿毒，皮肤湿疹，跌打损伤，风湿骨痛。兽医用治牛、猪湿热泄泻，尿少尿短，风热感冒。根捣烂滤取胶汁作造纸糊料。

丹草

*O. herbacea* (L.) Roxb.

兴安、桂林。

粗叶耳草

*O. hispida* Poir.

武鸣、马山、百色、田林、隆林、凌云、天峨、昭平、梧州。

全草止呕，杀虫；治肺痨咳血，痢疾。兽医用治牛牙龈肿烂，口腔舌生疮。

剑叶耳草 少年红

*O. lancea* (Thb.) O.Ktze.

玉林、博白、容县、平南、大瑶山、永福、临桂、阳朔、恭城、灌阳、藤县、昭平、贺县。

全草祛风，止血；治小儿疳积，五劳七伤。根、茎治肺病，咳嗽，哮喘，支气管炎，跌打。

长突耳草☆

*O. longiexserta* (Merr. et Metc.) Chun, in herb.

上思。

全株治眼热。

两广耳草☆

*O. matthewii* (Dunn) Chun

苍梧、大苗山、永福。

光叶耳草

*O. mellii* (Tutch.) Dunn

兴安、全州、临桂、桂林、龙胜。

松叶耳草

*O. pinifolia* (Wall.) K.Schum.

玉林、陆川、贺县、那坡、钦州。

全草清热止血，散结消肿；治潮热，小儿疳积。功近纤花耳草。

山耳草

*O. platystipula* (Merr.) Chun

(*Hedyotis platystipula* Merr.)

桂西北。

全草治妇女风肿，骨痛。

鼎湖耳草☆

*O. pterita* (Bl.) Miq.

龙州。

纤花耳草

*O. tenelliflora* (Bl.) O.Ktze.

大瑶山、大苗山、兴安、龙胜、桂林、容县、龙州、凌云、田林、梧州。

全草清热解毒，消肿止痛；治毒蛇咬伤，肺热咳嗽，跌打损伤，刀伤出血，小儿疳积。

方茎耳草

*O. tetrangularis* (Korth.) Merr.

博白。

全株治热症。

长节耳草

*O. uncinella* (H. et A.) O.Ktze.

柳州、大瑶山、临桂、龙胜、兴安、桂林、昭平、苍梧、玉林、容县。|

全草治蛇伤，风湿，小儿腹泻。

Oldenlandia-Ophiorrhiza

糙叶长节耳草

*O. uncinella* (H. et A.) O.Ktze.

var. *scabrida* (Fr.) Chun

南宁。

叶凉血。

大蛇根草☆ 蚂蚁菜

*Ophiorrhiza cantoniensis* Hance

大苗山、大瑶山、龙胜、临桂、全州、阳朔、桂林、平南、容县、

藤县、昭平、龙州、横县、扶绥、凌云、田林、凤山、天峨。

全草作猪饲料。

中蛇根草☆

*O. japonica* Bl.

蒙山、昭平、梧州、大苗山、融安、永福、临桂、龙胜、兴安、

全州、凌云、田林、百色、德保、东兰、龙州。

广西蛇根草☆

*O. kwangsiensis* Merr. ex H.L.Li

十万大山。

木质蛇根草

*O. lignosa* Merr.

南丹。

透明蛇根草☆

*O. pellucida* Lévl.

南丹。

小蛇根草☆

*O. pumila* Champ.

大瑶山、藤县、龙州、隆林、凌云。

根、叶消肿去毒。

滇桂蛇根草☆

*O. succirubra* King ex Hk.f.

大瑶山、上思。

圆叶鸡矢藤 山豆叶

*Paederia cavaleriei* Lévl.

临桂、桂林、龙胜、大瑶山、大苗山、罗城。

广西鸡矢藤☆

*P. pertomentosa* Merr. ex H.L.Li

南丹、临桂。

鸡矢藤 牛皮冻

*P. scandens* (Lour.) Merr.

(*P. chinensis* Hance)

区内各地。

全草消食化积，化痰止咳，祛风除湿，散瘀解毒；治小儿疳积，

胃痛腹胀，支气管炎，百日咳，肺结核咳嗽，肝炎；痢疾，风湿骨痛，跌打损伤，毒蛇咬伤。茎皮纤维作造纸和人造棉原料。

兽医用全草治牛臌胀，小猪白痢，跌打骨折，蛇虫咬伤。

毛鸡矢藤

*P. scandens* (Lour.) Merr.

var. *tomentosa* (Bl.) H.-M.

(*P. tomentosa* Bl.)

大瑶山、临桂、龙胜、资源、贺县、南丹、凤山、平果、龙州、博白、玉林。

全草解毒，健胃；治黄疸，疟疾，腹痛，消化不良。

云南鸡矢藤

*P. yunnanensis* (Lévl.) Rehd.

(*Cynanchum yunnanensis* Lévl.)

Pavetta-Prismatomeris

凌云、乐业、百色、龙州。

茜木 猪屎栏、大沙叶

*Pavetta hongkongensis* Brem.

(*Tarenna kwangsiensis* H.-M.)

永福、兴安、临桂、阳朔、平乐、恭城、大苗山、大瑶山、田林、

天峨、苍梧、蒙山、博白、容县、上思、宁明、龙州、宾阳。

多花茜木

*P. polyantha* R.Br.

大苗山、大瑶山、容县、上林、武鸣、靖西、隆林。

西南三角瓣花☆

*Prismatomeris henryi* (Lévl.) Rehd.

临桂、龙胜、凌云、乐业、东兰。

叶治跌打。

黔桂三角瓣花☆

*P. labordei* (Lévl.) Merr.

(*Lasianthus labordei* (Lévl.) Rehd.)

桂西北、龙胜。

三角瓣花

*P. linearis* Hutch.

龙胜、资源、灌阳、融安、大瑶山、大苗山、那坡、凌云、乐业、靖西、德保、上思、容县。

四蕊三角瓣花 黄根

*P. tetrandra* (Roxb.) K.Schum.

上思、陆川、博白。

治再生障碍性贫血，亚急性粒细胞白血病。对溶血性贫血、地中海贫血及肝炎亦有一定疗效。

九节 刀枪木、山大颜

*Psychotria rubra* (Lour.) Poir.

(*P. elliptica* Ker)

区内各地。

根、叶清热解毒，祛风除湿，接骨生肌；治感冒发热，扁桃体炎，咽喉炎，白喉，风湿骨痛，腰肌劳损，跌打损伤，骨折，毒蛇咬伤，疮疡肿毒，疟疾，牙痛，产后风瘫。兽医用根、茎、叶治牛、猪跌打骨折，流感，高热，臌胀等症。

穿根藤

*P. serpens* L.

苍梧、大瑶山、上思、合浦。

全草祛风止痛，舒筋活络；治虚弱无力，风湿骨痛，腰肌劳损，四肢酸痛，小儿疳积，跌打骨折。

驳骨九节☆ 驳骨草

*P. siamica* (Craib) Hutch.

龙州、大新、天峨、河池、南丹、那坡、田林、平果、隆林、靖西、凌云、乐业、十万大山、凤山、东兰、阳朔、贺县。

全株清热解毒，祛风消肿，止血，止痛；治菌痢，肠炎，上感，风湿骨痛，跌打损伤，蛇伤。

灰九节

*P. straminea* Hutch.

十万大山。

小叶九节

*P. tutcheri* Dunn

上思、龙州、宁明、大苗山、大瑶山、罗城、永福、临桂、苍梧。

云南九节

*P. yunnanensis* Hutch.

Randia

那坡、平果。

厚叶茜草树

*Randia accedens* Hance

博白、平南、百色、武鸣、龙州。

多毛茜草树 黄棉木

*R. acuminatissima* Merr.

临桂、平乐、大瑶山、大苗山、凌云、乐业、龙州、上思、蒙山、贺县、平南。

香楠☆ 水棉木

*R. canthioides* Champ. ex Benth.

苍梧、藤县、大瑶山、武鸣、大明山、上林。

越南香楠☆

*R. cochinchinensis* (Lour.) Merr.

龙州、容县、大瑶山、大苗山、贺县、苍梧、阳朔、龙胜。

西南香楠☆

*R. henryi* Pritz.

全州、兴安、龙胜、临桂、永福、阳朔、三江、大苗山、大瑶山、蒙山、武鸣、大明山、龙州、凌云、乐业、南丹。

广西香楠☆

*R. kwangsiensis* Chun et How, ined.

田林、凌云、乐业。

白果香楠☆

*R. leucocarpa* Champ.

尾叶香楠☆

*R. merrillii* Chun

(*R. caudatifolia* Merr.)

大苗山、百色、贺县。

柳叶香楠☆

*R. salicifolia* H.L.Li

平南、容县。

根驳骨。叶治胃痛，筋骨痛，风湿痛。

鸡爪簕 凉粉木

*R. sinensis* (Lour.) Schult.

临桂、南宁、龙州、大新、宁明、上思、岑溪。

山石榴 对面花、霸泡木

*R. spinosa* (Thb.) Poir.

(*R. dumetorum* Lam.)

区内各地。

根利尿，驳骨，祛风湿；治跌打，腹痛。叶止血，治衄血。木材供制家具、器具、农具、雕刻用，尤宜做扁担。果实可作农药。果皮作洗涤原料用。又可作刺篱和绿化植物。

茜草

*Rubia cordifolia* L.

桂林、临桂、全州、龙胜、融安、大苗山、大瑶山、平南、百色、那坡、龙州、贺县。

根凉血止血，活血祛瘀；治月经不调，经闭腹痛，跌打损伤，瘀血肿痛。根炒炭治吐血，衄血，便血，血崩，尿血。根提取红色的茜素，用于染动物性或植物性纤维，为一种媒染性的天然染料，亦是天然的红色食用色素。茎、叶、果作农药治蚜虫、椿象等害虫。

肉叶茜草

*R. cordifolia* L.

var. *herbacea* Chun et How, ined.

Rubia-Schizomussaenda

隆林。

用途参阅茜草。

长叶茜草

*R. cordifolia* L.

var. *longifolia* H.-M.

桂西北、凌云、兴安。

用途参阅茜草。

柔毛茜草

*R. cordifolia* L.

var. *mollis* Chun et How

河池、龙胜。

用途参阅茜草。

狭叶茜草 土茜草、四棱草

*R. cordifolia* L.

var. *stenophylla* Fr.

大苗山、龙胜、兴安。

根止血止痛。全株治风湿脚气。

延叶茜草☆

*R. decurrens* Chun et How

南丹。

裂果金花

*Schizomussaenda dehiscens* (Craib) H.L.Li

南宁、龙州、大新、宁明、扶绥、上思、那坡、平果、德保、河池。

根、茎清热解毒，消炎利尿；治支气管炎，肺热咳嗽，咽喉炎，

扁桃体炎，肾炎水肿，尿路感染，声哑等。

## 六月雪

**Serissa foetida (L.f.) Comm.**

桂林、临桂、大瑶山、隆林。

全株舒肝解郁，清热利湿，消肿拔毒，止咳化痰；治急性肝炎，

风湿性腰腿痛，痈肿恶疮，蛇伤，脾虚泄泻，小儿疳积，白浊，

白带，目翳，阑尾炎，狂犬病等。庭园绿化。

## 白马骨

**S. serissoides (DC.) Druce**

柳州、大苗山、大瑶山、临桂、灌阳、恭城、桂林、龙胜、南宁、贺县。

功近六月雪。作兽药治牛、猪跌打骨折，水泻，恶疮痈肿等。

## 假螺序草☆

**Spiradiclis pseudocaespitosa How, ined.**

河池。

## 中华螺序草☆

**S. sinensis Chun et How, ined.**

百色、南丹。

## 假桂乌口树☆

**Tarennia attenuata Hutch.**

容县、柳州、罗城、宜山、都安、东兰、靖西、平果、田阳、上林、武鸣、宁明、龙州。

叶治口疳，跌打。

## 白骨木

**T. depauperata Hutch.**

容县、柳州、扶绥、兴安、临桂、阳朔、平乐、田阳。

种子油供药用，制肥皂、润滑油用。

## 石楠乌口树☆

**T. inserta Koorders et Valeton**

Tarenna-Tricalysia

隆林、那坡。

木材适用于建筑、造桥、车、船等用，亦可作器具、农具、家具等用材。

披针叶乌口树☆

*T. lancilimba* How, ined.

十万大山。

乌口树 达仑木

*T. mollissima* (Hk. et Arn.) Robins.

(*Webera mollissima* Benth. ex Hance)

容县、苍梧、龙州、大瑶山、象州。

毛脉乌口树☆

*T. pubinervis* Hutch.

龙胜。

牛老药藤 流苏子

*Thysanospermum diffusum* Champ.

区内各地。

茎皮纤维造纸和人造棉。

小狗骨柴

*Tricalysia fruticosa* (Hemsl.) K. Schum.

临桂、龙胜、永福、大苗山、象州、大瑶山、宁明、武鸣、桂平、平南、凌云、乐业、那坡、蒙山。

狗骨柴 三萼木

*T. viridiflora* (DC.) Matsum.

(*Diplospora viridiflora* DC.)

容县、武鸣、横县、上思、大瑶山、阳朔、永福、兴安、龙胜、全州、蒙山。

木材作器具及雕刻等细工用材。

毛钩藤

*Uncaria hirsuta* Haviland

龙州、马山、大瑶山、西林、田林、那坡、容县。

功近钩藤。

平滑钩藤

*U. laevigata* Wall.

那坡。

功近钩藤。

大叶钩藤

*U. macrophylla* Wall.

百色、靖西、凌云、上思、博白、上林、巴马。

功近钩藤。

膜叶钩藤

*U. membranifolia* How

宁明、靖西。

功近钩藤。

钩藤 桂钩藤、孩儿茶

*U. rhynchophylla* (Miq.) Jacks.

区内各地。

带钩的茎枝清热平肝，熄风定惊，镇静镇痉；治小儿高热抽搐、寒热、夜啼及受惊症，成年人高血压、头晕、目眩、神经性头痛。根治风湿性关节炎，坐骨神经痛。作兽药治牛臌胀、风湿、斑麻、寒湿等症。茎皮富含纤维，可作人造棉及造纸原料。

假钩藤

*U. rhynchophylloides* How

大瑶山、罗城。

功近钩藤。

攀茎钩藤

*U. scandens* (Sm.) Hutch.

桂平、上思、龙州、宁明、横县。

功效与大叶钩藤相似。

无柄果钩藤

*U. sessilifructus* Roxb.

桂西北、扶绥。

根皮含鞣质，可提取栲胶。

华钩藤

*U. sinensis* (Oliv.) Haviland

灵川、桂林。

药用功近钩藤。

云南钩藤☆

*U. wangii* How

隆林。

尖叶木

*Urophyllum chinense* Merr. et Chun

苍梧、宁明、上思、大瑶山。

广西水锦树

*Wendlandia aberrans* How

那坡。

木姜子叶水锦树

*W. litseifolia* How

龙州、田林、靖西。

密花水锦树

*W. myriantha* How

上思、十万大山、龙州。

粗叶水锦树

*W. scabra* Kurz

上思、龙州、田林、隆林。

台湾水锦树☆

*W. taiwaniana* Cowan

藤县。

短花台湾水锦树☆

*W. taiwaniana* Cowan

subsp. *breviflora* How

上思、武鸣、百色。

叶治跌打。

三花水锦树☆

*W. terniflora* Cowan

宁明、扶绥、都安。

粗毛水锦树☆

*W. tinctoria* DC.

subsp. *barbata* Cowan

武鸣大明山、田阳。

滇桂水锦树☆

*W. tinctoria* DC.

subsp. *handelii* Cowan

武鸣大明山。

东方水锦树☆

*W. tinctoria* DC.

subsp. *orientalis* Cowan

武鸣大明山。

Wendlandia-Xanthophytopsis

水锦树 饭汤木

**W. uvariifolia Hance**

大瑶山、梧州、藤县、平南、玉林、武鸣、龙州、凌云、乐业。

叶治崩漏恶疮，根治风湿跌打。

中华水锦树☆ 猪血树、饭汤树。

**W. uvariifolia Hance**

**subsp. chinensis (Merr.) Cowan**

容县、玉林、横县、十万大山、苍梧。

滇黔水锦树☆

**W. uvariifolia Hance**

**subsp. dunniana (Lévl.) Cowan**

凌云、乐业、大瑶山。

圆叶水锦树☆

**W. uvariifolia Hance**

**subsp. rotundifolia (H.-M.) Cowan**

平南、龙胜。

微红水锦树

**W. uvariifolia Hance**

**subsp. rufula Cowan**

大瑶山。

百色水锦树☆

**W. zool How**

百色。

广东拟黄树☆

**Xanthophytopsis kwangtungensis Chun et How, ined.**

十万大山。

## 233 忍冬科 CAPRIFOLIACEAE

### 糯米条

**Abelia chinensis R.Br.**

临桂。

花艳丽，供庭园绿化。

### 细叶银花

**Lonicera affinis Hk. et Arn.**

恭城、兴安、临桂、三江。

### 毛金银花 腺背忍冬

**L. affinis Hk. et Arn.**

**var. pubescens Maxim.**

**(L. hypoglaaca Miq.)**

玉林、梧州、藤县、贺县、临桂、昭平、三江、平果、凌云、乐业、隆林、靖西、都安、马山、武鸣、邕宁、龙州、横县等地。

用途参阅山银花。

### 山银花 土金银花、山金银花、土忍冬

**L. confusa DC.**

全州、桂林、天峨、田阳、陆川等地。

花清热解毒；治感冒发热，咽喉炎，菌痢，肠炎，疖肿，淋巴腺炎，湿疹。藤治风湿痛、痈肿疮毒。花或全藤作兽药，治牛赤痢，炭疽病，猪瘟，猪丹毒等症。亦常栽培作庭园绿化植物。

### 毛柱金银花

**L. dasystyla Rehd.**

柳州、桂林。

花蕾、茎、叶清热解毒，止痢，消炎。有用花蕾代金银花用。

Lonicera

锈毛金银花

*L. ferruginea* Rehd.

田阳。

光冠银花

*L. henryi* Hemsl.

全州、大瑶山。

金银花 忍冬

*L. japonica* Thb.

全州、桂林。

花蕾、花清热解毒，抗菌消炎；治感冒发热，痢疾，痈疮疗毒，眼发炎，湿疹，疥癣。炒炭止白痢。藤治风湿骨痛。作兽药，治牛臌胀症，肠炎，淋病和化脓性疾病。花含芳香油，可作调配香脂等香精用。从花提取金银花露，能止咳，消暑。茎、叶作农药，能防治菜青虫、稻飞虱、水稻浮尘子，又可杀蛆。常栽培作庭园绿化植物。

长花银花

*L. longiflora* DC.

十万大山。

大花金银花 大花忍冬

*L. macrantha* DC.

全州、兴安、龙胜、临桂、大苗山、融安、大瑶山、平南、容县、大新、龙州、乐业等地。

花蕾清热解毒，祛风镇惊；治小儿急惊风，疮毒等。亦有作代金银花用。

野金银花

*L. macranthoides* H.-M.

全州、资源、灌阳、兴安、龙胜、临桂、永福、大苗山、罗城。花蕾清热解毒；有作代金银花用。

湖南金银花

**L. nubium (H.-M.) H.-M.**

(**L. giraldii Rehd. forma nubium H.-M.**)

全州、龙胜、大苗山、罗城。

线叶常绿忍冬

**L. pileata Oliv.**

**var. linearis Rehd.**

隆林。

网脉银花☆ 网脉忍冬

**L. reticulata Champ.**

容县、平南、苍梧、大瑶山、临桂、龙胜、兴安、恭城、乐业。

花蕾清热解毒；有作代金银花用。

蒴藋 五加皮、接骨草、陆英

**Sambucus javanica Reinw. ex Bl.**

(**S. chinensis Lindl.**)

区内各地。

全草活血散瘀，祛风除湿，通经活络；治扭伤，腰肌劳损，骨折，风湿痹痛，水肿，湿疹，黄疸腹胀，消化不良。作兽药，治牛跌打。

接骨木 欧接骨木

**S. racemosa L.**

贺县、富川、钟山、桂林、资源、全州、大苗山、大瑶山。

全草接骨，理跌打，祛风除湿；治跌打损伤，风湿，黄疸，热痢，汗疹。

短总序莢蒾

**Viburnum brachybotryum Hemsl.**

临桂、龙胜、南丹、容县。

Viburnum

金腺莢蒾☆

*V. chunii* P.S.Hsu

陆川、贺县、昭平、龙胜、兴安、全州、大苗山、大瑶山、大明山。

毛金腺莢蒾☆

*V. chunii* P.S.Hsu

*var. piliferum* P.S.Hsu

大苗山。

樟叶莢蒾

*V. cinnamomifolium* Rehd.

临桂、桂林、龙州。

圆齿莢蒾☆

*V. colebrookianum* Wall.

灵川。

榛叶莢蒾

*V. corylifolium* Hk.f. et Thoms.

灵川、龙胜、隆林。

缴房莢蒾

*V. corymbiflorum* P.S.Hsu et S.C.Hsu

全州、龙胜、临桂、大苗山、凌云、隆林、陆川。

四季青 水红木

*V. cylindricum* Buch.-Ham. ex D.Don

(*V. coriaceum* Bl.,

*V. crassifolium* Rehd.)

区内各地。

树皮和叶清热解毒，利湿；治脓疮痘，痒疹，疥癣。树皮、果实可提制栲胶。种子油可制肥皂。嫩叶可作猪饲料。

莢蒾

**V. dilatatum Thb.**

全州、龙胜、临桂、大苗山、凌云、乐业。

枝、叶清热解毒，疏风解表；治感冒发热，疔疮发热。韧皮纤维可制绳和人造棉。种子油可制肥皂和润滑油。果实熟时可食，可酿酒。绿化植物。

变红莢蒾

**V. erubescens Wall.**

龙胜。

臭莢蒾

**V. foetidum Wall.**

**var. rectangulatum (Graebn.) Rehd.**

龙胜。

火柴子树 酸闷木

**V. fordiae Hance**

梧州、桂林、柳州、河池、南宁、百色等地区，容县、十万大山等地。

嫩枝叶可作绿肥。绿化植物。

海南莢蒾

**V. hainanense Merr. et Chun**

**(V. tsangii Rehd.)**

东兴、合浦、十万大山、陆川、博白。

毛莢蒾

**V. harryanum Rehd.**

凌云。

硬毛莢蒾

**V. hirtulum Rehd.**

兴安、永福、大瑶山、贺县、藤县、苍梧、容县、龙州。

小鳞莢蒾

*V. lepidotulum* Merr. et Chun

苍梧、十万大山、龙州、靖西。

黄莢蒾☆

*V. lutescens* Bl.

兴安、龙胜、临桂、桂林、永福、大苗山、融安、大瑶山、横县、凌云。

叶去瘀生新，消肿。

罗盖莢蒾☆ 罗盖叶

*V. luzonicum* Rolfe

容县、大瑶山、柳州。

茎、叶驳骨；治骨折，又治枪伤。果实可酿酒。

红子仔

*V. luzonicum* Rolfe

var. *taiwanianum* (Hance) Rehd.

容县、大瑶山、罗城、龙州。

珊瑚树 猪耳木

*V. odoratissimum* Ker

全州、资源、兴安、临桂、灵川、大苗山、大瑶山、苍梧、藤县、平南、容县、陆川、博白、十万大山、合浦。

嫩叶、枝消肿，止痛；治刀伤，又治蛇伤。也可做绿肥。作兽药，治牛、猪感冒发热，跌打创伤。可作绿篱和庭园绿化植物。木材供细工用。

少花莢蒾☆

*V. oliganthum* Batal.

大苗山、龙胜。

兴山莢蒾

*V. propinquum* Hemsl.

田阳、那坡、靖西、武鸣、临桂。  
全株治跌打，风湿痛。

坚莢树 长叶火柴枝树、萝芥叶

*V. sempervirens* C Koch

十万大山、大瑶山、贺县、桂林、龙胜、兴安。  
茎、叶接骨，活血消肿；治跌打，又治风湿骨痛，痧气，驱绦虫。作兽药，治牛、猪跌打外伤。叶可作绿肥。果实味酸甜，可生食。绿化树种。

刚毛莢蒾

*V. setigerum* Hance

资源、兴安、龙胜。

丛轴莢蒾

*V. sympodiale* Graebn.

大苗山、龙胜、全州。

光果台湾莢蒾

*V. taiwanicum* Hay.

*subsp. leiogynum* P.S.Hsu

凌云。

蝴蝶树

*V. tomentosum* Thb.

龙胜、临桂。

根、茎清热解毒，健脾消积；治淋巴腺炎，小儿疳积。

三脉莢蒾

*V. triplinerve* H -M.

龙州。

Viburnum-Patrinia

叶消肿止痛；治跌打。

管花莢遂

*V. tubulosum* P.S.Hsu

兴安、临桂、桂林、灵川。

杨柳

*Weigela japonica* Thb.

var. *sinica* (Rehd.) Bail.

资源、兴安、隆林。

235 败 酱 科 VALERIANACEAE

狭叶败酱

*Patrinia angustifolia* Hemsl.

龙州。

幼嫩部分可食，作猪饲料。根治疟疾。

异叶败酱

*P. heterophylla* Bunge

藤县、昭平、贺县、龙胜、全州、资源、临桂、阳朔、荔浦、灌阳、平乐、兴安、大瑶山、大苗山、柳州、河池、凤山、那坡、平南、马山。

全草和根茎清热解毒，消肿生肌；治急性阑尾炎初起，瘰疬，疮疖，痈肿，子宫颈癌，白带。

单雄蕊败酱☆

*P. monandra* C.B.Clarke

临桂、兴安、宁明、大瑶山、那坡。

斑花败酱

*P. punctiflora* P.S.Hsu et H.J.Wang

东兰、贺县、富川、钟山。

败酱

*P. scabiosaeifolia* Fisch. ex Link

灵川、临桂、永福、恭城、龙胜、昭平、贺县。

根清热解毒，消肿排脓；治肠炎下痢，慢性结肠炎，急性阑尾炎初起，腹膜炎，眼结膜充血等症。根可提取芳香油。作兽药治牛耳流脓。幼嫩部分可食，可饲猪。

粗毛败酱☆

*P. scabiosaeifolia* Fisch. ex Link

var. *hispida* (Bunge) Fr.

龙州、邕宁、贵县、隆林、凌云、乐业、柳州、大瑶山、大苗山、临桂、昭平、富川、钟山。

根消炎排脓；治白带，肠炎，腹部肿胀。

白花败酱 脂肪麻

*P. villosa* (Thb.) Juss.

(*P. sinensis* (Lévl.) Koidz.)

临桂、龙胜、全州、兴安、资源、平乐、藤县、贺县、富川、上思、武鸣、马山、南丹。

全草清热解毒，消肿排脓；治急性阑尾炎初起，疔疮肿毒，蛇伤，痢疾，便秘，痔疮等。

阔叶缬草

*Valeriana hardwickii* Wall.

凌云、乐业。

根兴奋，镇痉，安神；治神经衰弱，失眠，心跳。根茎皮层可提缬草油。

马蹄香 蜘蛛香

*V. jatamansi* Jones

(*V. wallichii* DC.)

Dipsacus - Adenostemma

隆林、凌云、乐业。

根茎理气止痛，开胃；治消化不良，腹胀，胃痛，小儿疳积。根茎皮层可提芳香油。

236 续 断 科 DIPSACACEAE

川续断 平地跑马

*Dipsacus asper* Wall.

龙胜、兴安、资源、全州、临桂、灌阳、南宁、龙州、柳州、大苗山、凌云、隆林、贺县。

根补肝肾，通血脉；治腰膝酸痛，月经不调，胎漏，崩漏，带下，遗精，咳嗽，咳血，赤白痢，痈疮肿毒，草乌中毒，跌打损伤。

续断

*D. japonicus* Miq.

临桂、桂林、全州。

药用功效同川续断。

238 菊 科 COMPOSITAE

飞天蜈蚣

*Achillea wilsoniana* (Heim.) H.-M.

区内各地有少量栽培。

全草消炎解毒，驱风镇痛；治蛇咬伤，无名肿毒，跌打损伤，外伤出血，牙痛，胃痛，经闭腹痛等。

下田菊

*Adenostemma lavenia* (L.) O.Ktze.

(*A. viscosum* Forst.)

贺县、藤县、巴马、靖西、那坡、临桂、阳朔、兴安、大苗山、宁明。

全草祛风解表，解痉止痛；治风湿骨痛，外感，乳痛，牙痛等。

胜红薊 鱼草、鱼花草

*Ageratum conyzoides* L.

区内各地。

全草清热解毒，止血止痛；治感冒风热，外伤出血，疮疖湿疹等。

作鱼花饲料。作绿肥。又可提取芳香油。

熊耳草

*A. houstonianum* Mill.

南宁、柳州。

杏香兔儿风

*Ainsliaea fragrans* Champ.

临桂、全州、兴安、恭城、融安、三江、大苗山、大瑶山、昭平、上思。

全草消炎解毒，止血生肌，利水除湿；治咳嗽吐血，跌打损伤，蛇伤肿毒，水肿腹胀等。

黄毛柄兔儿风

*A. fulvipes* J.F.Jeffrey et W.W.Sm.

桂西北。

软兔儿风

*A. gracilis* Fr.

龙胜、那坡、昭平。

全株治咳血。

滇桂兔儿风☆

*A. henryi* Diels

临桂、龙胜、凌云、田林、大苗山。

卵叶兔儿风☆

*A. hui* Diels

Ainsliaea-Anaphalis

昭平、贺县。

多枝兔儿风

*A. ramosa* Hemsl.

兴安、龙胜、阳朔、大苗山、象州、平南。

全株清热解毒，润肺止咳；治痢疾，喉痛，吐血，小儿哮喘。

蒲公山鼠菊

*A. walkeri* Hk.f.

上思、武鸣、龙胜、临桂、罗城、大苗山。

蛛毛香青 火绒艾

*Anaphalis busua* (Buch.-Ham.) H.-M.

(*Gnaphalium busua* Buch.-Ham.,

*A. araneosa* DC.)

宁明。

全草治眼病。

细白艾

*A. forrestii* Diels

柳城。

香青 火草、珍珠香青、山萩

*A. margaritacea* (L.) Benth. et Hk.f.

灌阳。

全草止痒，止血，驱虫；治痢疾，刀伤，蛔虫病。茎、叶、花提芳香油作调香原料。

肉桂香青 肉桂山萩

*A. margaritacea* (L.) Benth. et Hk.f.

var. *cinnamomea* (Wall.) H.-M.

(*A. cinnamomea* Clarke)

靖西、武鸣。

山黄菊 旱山菊

*Anisopappus chinensis* (L.) Hk. et Arn.

容县、陆川、藤县、梧州、邕宁、龙州、柳州、南丹、临桂。

花有小毒，下气行水，消痰，软坚；治头晕目眩，喘咳，水肿，胸满肋痛。花亦作旋复花用。

牛蒡

*Arctium lappa* L.

隆林、全州。

种子疏风散热，宣肺透疹，消肿解毒；治感冒咳嗽，咽喉肿痛，疹出不透，痈疮肿毒。根治劳伤，阳萎，肾虚耳聋，产后无乳。

黄花蒿 青蒿

*Artemisia annua* L.

百色、隆林、富川、钟山、贺县、贵县、南宁、宁明。

全草清虚热，退骨蒸；治疟疾，胸闷不舒，寒热往来，肺结核潮热盗汗等。

异形蒿 奇蒿

*A. anomala* S. Moore

永福、临桂、全州、兴安、恭城、灌阳、龙胜、罗城、大瑶山、大苗山。

全草破血通经，止痛敛疮；治小便不通，经闭症瘕，胸腹胀痛，产后血瘀，金疮出血。

假青蒿

*A. apiacea* Hance

*var. carvifolia* (Mattyf.) Pamp.

凌云、天峨、柳城。

Artemisia

艾 祈艾

*A. argyi* Lévl. et Van

兴安、龙胜、临桂等县。

全草温经，安胎，止血，逐寒湿；治月经不调，腹痛，吐血，衄血，崩漏带下，胎动不安，久痢不止，疝气作痛等。叶作艾绒。

茵陈蒿 扫把艾

*A. capillaris* Thb.

容县、昭平、临桂、平乐。

全草清湿热，利水道；治黄疸肝炎，胆囊炎，尿少短赤。茎、叶提芳香油，配制各种清凉剂及香精用。作农药可防治蚜虫。嫩叶可食。

广西蒿☆

*A. chingii* Pamp.

桂西北。

叶理气血，逐寒湿，止血，温经，安胎。

五月艾

*A. dubia* Wall.

*var. acuminata* Pamp.

靖西、龙州。

小野艾 野艾、野菊花

*A. indica* Willd.

区内各地。

花、叶敷洗疮毒，又可提芳香油。嫩枝叶作猪饲料。

牡蒿 假柴胡、齐头蒿

*A. japonica* Thb.

容县、龙州、武鸣、上思、大瑶山、大苗山、龙胜、桂林、阳朔。

灌阳、隆林、百色、凌云。

全草祛风解暑，行血散瘀，降血压；治中暑，跌打，风湿，高血压，刀伤，蛇伤，疳积，喉痛，疔疮热毒。全草提芳香油。作牛、马饲料。作绿肥。作农药制成肥皂合剂杀蚜虫、红铃虫等。

白花蒿 甜艾、甜菜子、刘寄奴

*A. lactiflora* Wall.

临桂、桂林、龙胜、兴安、平乐、平南、象州、大瑶山、大苗山、藤县、昭平、富川、钟山、宁明、武鸣、南宁。

全草通经散瘀，理气消肿；治月经不调，闭经，慢性肝炎，肝硬化，跌打肿痛，胃肠胀气，肾炎水肿，疮疡湿毒。作兽药治牛腹痛下痢，胃肠气胀，子宫出血。又可提芳香油。

野艾蒿 细叶艾

*A. lavandulaefolia* DC.

隆林。

全草止血，代艾叶用。

臭蚊艾

*A. lavandulaefolia* DC.

var. *feddei* (Lévl. et Van.) Pamp.

永福、桂林。

根、叶治流感，又可薰蚊。

小花艾

*A. parviflora* Wight

南宁、藤县。

全草下血；治痰火。代青蒿用。

多头蒿

*A. pleiocephala* Pamp.

艾叶 端午艾

*A. principis* Pamp.

Artemisia-Aster

桂林、临桂、阳朔、隆林。

全草理气血，逐寒湿；治产后腹痛，月经过多，子宫出血。

小叶艾

*A. roxburghiana* Bess.

兴安、临桂、平南。

石山蒿

*A. sacrorum* Ledeb.

柳城。

白背五叶艾

*A. simulans* Pamp.

龙州、隆林、凌云、乐业。

光叶艾

*A. thellungiana* Pamp.

宁明、南宁。

白背蚊艾

*A. vestita* Wall.

龙州。

野艾 艾、五月艾

*A. vulgaris* L.

区内各地。

老叶制艾绒，作印泥原料。嫩叶可制糍粑。茎、叶提芳香油（艾油）调配香精用。全草温经止血，逐风止痒；治吐血，便血，月经不调，血崩，胎动不安，肠炎，痢疾，跌打扭伤。小儿夜啼。

三脉山白菊☆

*Aster ageratoides* Turcz.

*var. trinervius* (Roxb.) H.-M.

隆林、容县、藤县、上思、武鸣、大苗山、临桂、龙胜。

全草清热解表；治感冒，跌打，蛇伤。

耳状紫菀☆

*A. auriculatus* Fr.

隆林、临桂。

两广紫菀☆

*A. baccharoides* Steetz

桂江河岸、昭平。

南岭紫菀☆

*A. gerlachii* Hance

全州。

滇黔紫菀☆

*A. marchandii* Lévl.

平南、南丹、全州。

北紫菀☆

*A. mongolicus* Fr.

昭平。

广州紫菀☆

*A. sampsoni* (Hance) Hemsl.

东风菜

*A. scaber* Thb.

区内各地。

全草祛风解毒，行气止痛；治目赤肿痛，咽喉肿痛，肠炎腹泻，蛇伤。作兽药用，功效类同。亦可作猪饲料。

路边菊 田边菊、鸡儿肠

*Asteromaea indica* Bl.

(*Aster indicus* L.,

*Boltonia indica* (L.) Benth.)

区内各地。

全草清热解表，健脾去积；治外感风热，肝炎，消化不良，胃溃

Atractylodes-Blumea

痨，中耳炎，疖肿等。

•白术

*Atractylodes macrocephala* Koidz.

平南、容县、桂平。

根茎补中健胃，化湿安胎；治食少便溏，消化不良，脘腹胀满。  
胎动不安。

婆婆针 鬼针草

*Bidens bipinnata* L.

桂林、梧州、贺县、富川、贵县、邕宁、平果、百色。

全草清热解毒，活血散瘀；治风湿疼痛，湿热黄疸，毒蛇咬伤。  
跌打损伤，疳积，高血压等症。茎、叶作农药杀蚜虫、螟虫。

三叶婆婆针 虾钳草、三叶鬼针草

*B. pilosa* L.

区内各地。

全草清热解毒，活血散瘀；治流感，感冒，咽喉肿痛，肠炎腹泻。  
黄疸肝炎，跌打损伤，风湿骨痛，痈疮肿毒，蛇伤。亦作兽药  
用，功效类同。又作猪饲料。

异冠毛菊々 百能蕨

*Blainvillea latifolia* (L.) DC.

武鸣。

香艾 山风

*Blumea aromatica* (Wall.) DC.

(*Conyzza aromatica* Wall.)

宁明、那坡、百色、大苗山、兴安、龙胜。  
全草治风湿。

大艾 大风艾、冰片艾、艾纳香

*B. balsamifera* (L.) DC.

容县、龙州、百色、田林、凌云、乐业、天峨、河池、宜山。叶经蒸馏提取芳香油，结晶为冰片，是多种清热解毒、消肿止痛一类中药成药和痱子粉的重要原料，又可调制迷迭香等香精和皂用香精。作草药用，全草有小毒，祛风消肿，活血调经；治风湿骨痛，跌打肿痛，急慢惊风，头风痛，月经痛，痈疮疖肿，皮肤湿痒。作兽药治牛、猪神昏气闭，喉风，箭脚，眼翳，臌胀，胃肠积气等症。

### 田芥菜仔

*B. cavaleriei* Lévl. et Van.

桂林。

### 聚花艾纳香

*B. fistulosa* (Roxb.) Kurz

隆林、田林、凌云、乐业。

全草作强壮剂。

### 毛毡草

*B. hieracifolia* DC.

大瑶山。

全草清热解毒，消肿；治蛇伤，疟疾。

### 七里明

*B. hongkongensis* Van.

贺县、上思、桂林。

### 见霜黄

*B. lacera* DC.

上思、宁明、武鸣、凌云、乐业、柳城、桂林。

全草治外伤肿痛。

### 柔毛艾纳香

*B. mollis* (Don) Merr.

隆林、凌云、乐业、天峨、大瑶山。

全草祛痰止咳；治头痛，鼻渊，皮肤干燥。

中华艾纳香

*B. pubigera* (L.) Merr.

(*B. chinensis* DC.)

上思、宁明、武鸣、南宁、苍梧、梧州、藤县、容县、平南、柳城、柳州、罗城、临桂、龙胜、阳朔、靖西、南丹。

全草明日，退子弹；治眼疾，疮疥，难产。

丝毛艾纳香

*B. sericans* (Kurz) Hk f.

罗城。

全草治肿毒。

波缘艾纳香 六耳铃、吊钟黄

*B. sinuata* (L.) Merr.

(*B. laciniata* (Roxb.) DC.)

东兰。

全草祛风湿，通经络；治风湿性关节炎，跌打扭伤，蛇伤，湿疹，皮炎，痈疮，疖肿。

拟艾脑

*Blumeopsis falcata* (D.Don) Merr. et Chun

隆林。

兔儿伞

*Cacalia aconitifolia* Bunge

(*Senecio aconitifolius* Turcz.,

*Syneilesis aconitifolia* Maxim.)

昭平、象州。

根舒筋活血，祛风湿；治风湿麻木，腰腿疼痛，跌打损伤，行经腹痛。

蟹甲菊☆

*C. subglabra* Chang

资源。

•金盏花

*Calendula arvensis* L.

各城市。

全草发汗利尿，降血压。绿化花卉。

•大金盏花

*C. officinalis* L.

各城市。

全草发汗利尿，泻下通经。绿化花卉。

锣白菊

*Camchaya loloana* Dunn ex Kerr

龙州。

天名精

*Carpesium abrotanoides* L.

南宁、宁明、梧州、贺县、临桂、桂林、龙胜、恭城、柳州。

全草止血利尿，清热解毒，破血生肌；治吐血，衄血，小儿惊风，

咽喉肿痛，虫牙痛，气管炎，便秘，痔疮。种子中药称北鹤虱，驱虫；治虫积腹痛，可驱除绦虫、蛔虫。水浸液作农药杀菜青虫、地老虎、守瓜虫等。

烟管草

*C. cernuum* L.

平南、隆林、罗城。

全草发汗，解毒，散瘀；治疟疾，喉痹，黄水疮，疥疮，脓泡疮，痔疮等。可提芳香油，作调制香精原料。

金挖耳

*C. divaricatum* Sav. et Fr.

全州。

全草清热解毒，消炎祛瘀；治感冒，腹痛，肠炎，乳腺炎，淋巴

Carpesium-Chrysanthemum

结炎，蛇伤，犬伤等。

狗耳菜

*C. trachelifolium* Less.

桂西北。

•红花

*Carthamus tinctorius* L.

南宁、全州。

花活血通经，祛瘀止痛；治血瘀经闭，胎死腹中，产后恶露不尽，痛经，跌打损伤。红花籽油为优良食用油，可制人造奶油，可代替亚麻仁油制油漆、油布、润滑油，作蜡纸原料。花提碱色素，作糕点着色料和棉布印染原料。

石胡荽 鹅不食草、球子草

*Centipeda minima* (L.) A.Br. et Aschers.

区内各地。

全草通窍明目，祛风消肿；治鼻塞不通，百日咳，疟疾，蛇伤，作兽药治风痰，风寒，鼻塞，跌打，疔疽，蛇伤等症。

•白花除虫菊

*Chrysanthemum cinerariaefolium* Vis.

柳州、南宁。

花作农药，制熏烟剂、油剂、乳剂杀虫。作草药治疥癣。

•白菊仔

*C. frutescens* L.

各地城镇。

绿化花卉。

野菊 野黄菊

*C. indicum* L.

区内各地。

全草清热解毒，活血消肿，降压，健胃；治高血压(花)，疮疖肿

毒，牙疳，中耳炎，乳腺炎。捣烂制成液剂作农药防治作物病虫害；杀孑孓，灭蝇蛆。花、叶提芳香油或制成浸膏制皂用香精。

•菊花

*C. morifolium* Ram.

各地城镇。

绿化花卉。花散风清热，平肝明目；治感冒风热，目赤肿痛，头昏目花，疮疡肿痛。

•茼蒿

*C. spatiatum* Bailey

区内各地。

蔬菜。全草安心气，健脾胃，清痰饮，利肠胃。

小薊 小叶老虎脚

*Cirsium chinense* Gardn. et Champ.

宁明、临桂、柳城。

根活血散瘀，解毒生肌。嫩苗可食。

薊 大薊、老虎脚、山萝卜

*C. japonicum* DC.

区内各地。

全草凉血止血，破血行瘀，利水消肿；治吐血，咯血，衄血，外伤出血，尿血，子宫出血，痈疮肿毒，肝炎黄疸，乳腺炎，阑尾炎，烫火伤。根(含淀粉)和嫩苗可食。作兽药治各种血症。

山地菊

*Conyzæ japonica* (Thb.) Less.

隆林。

粘毛假蓬

*C. viscidula* (Wall.) DC.

宁明。

Coreopsis-Dichrocephala

\*剑叶波斯菊 大金鸡菊

*Coreopsis lanceolata* L.

南宁、桂林等市。

绿化花卉。叶散瘀消肿，清热解毒；治刀伤出血，无名肿毒。

\*波斯菊 蛇目菊

*C. tinctoria* Nutt.

南宁、桂林等市。

绿化花卉。

芫荽菊

*Cotula anthemoides* L.

梧州、河池。

全草治孕妇呕吐。

绿茎还阳参

*Crepis lignea* (Van.) Babc.

隆林。

杯菊

*Cyathocline purpurea* (Ham.) O.Ktze.

(*C. lyrata* Cass., *Dichrocephala minutifolia* Van.)

凌云、乐业、隆林、河池。

全草杀虫。

\*大丽花

*Dahlia pinnata* Cav.

区内各城市。

根治虫牙痛，腮腺炎，无名肿毒，绿化花卉。

茯苓菜 山胡椒菊、鱼眼草

*Dichrocephala auriculata* (Thb.) Druce

(*D. latifolia* (Lam.) DC.)

临桂、桂林、龙胜、凌云、乐业、天峨、容县、平南、梧州、上思。全草温中散寒，活血调经，消肿拔毒；治月经不调，嘴吐清水，喉炎，疔疮，蛇伤等。作猪饲料。

### 旱莲草 鳞肠草、墨菜、白花蟛蜞菊

*Eclipta alba* (L.) Hassk.

临桂、桂林、柳州、南丹、天峨、凌云、乐业、隆林、武鸣、宁明、南宁、龙州。

全草凉血止血，补肾，收敛；治肺结核咳血、鼻衄、呕血等各种出血，肝肾虚腰酸痛，头晕目花，腹泻，紫癜等。作兽药治牛、猪各种血症。

### 地胆草 毛儿细辛

*Elephantopus scaber* L.

临桂、桂林、平乐、容县、贵县、平南、玉林、南宁、马山、龙州、宁明、武鸣、邕宁、梧州、贺县、藤县、巴马、东兰、大瑶山、大苗山、凌云。

全草清热解毒，利尿消肿；治流感，咽喉炎，结膜炎，肝炎，肾炎水肿，湿疹，疖肿，蛇伤。作兽药治牛、猪肝胆火旺，各种大热症，牛瘟，猪瘟，猪丹毒。

### 白花地胆草

*E. tomentosus* L.

宁明、邕宁、临桂、马山。

全草清热解毒，祛风止痛；治痛经，喉炎，麻疹等。

### 小一点红 耳挖草、七十二枝花

*Emilia prenanthoides* DC.

梧州、大苗山、恭城、临桂、龙胜、全州、容县、平南。

全草抗菌消炎，活血去瘀；治上呼吸道炎，肺炎，扁桃体炎，乳

Emilia-Erigeron

腺炎，痢疾，腹泻，蛇伤。

纓绒花 小七十二枝花

*E. sagittata* (Vahl) DC.

(*E. flammea* Cass.)

资源、全州、桂平、平南。

一点红 红背叶、羊蹄草

*E. sonchifolia* (L.) DC.

临桂、桂林、南宁、宁明、柳州、大瑶山、罗城、隆林、梧州。

全草清热解毒，消炎利水，活血消肿；功用同小一点红。作兽药

治湿热腹泻，痢疾，疮疖痈肿，跌打。作猪饲料。

拳头菊☆ 萍蓬草

*Epaltes australis* Less.

南宁、隆林。

全草止血理气；治内伤，功近石胡荽。

菊芹

*Erechtites valerianaeifolia* DC.

苍梧、容县。

短花茎飞蓬☆

*Erigeron breviscapus* (Van.) H.-M.

(*E. praecox* Vierh. et H.-M.)

隆林、全州。

全草治小儿头疮。

小飞蓬 加拿大蓬

*E. canadensis* L.

区内各地。

作猪饲料和绿肥；又可提芳香油，作农药。全草退热，祛风湿；

治骨痛，尿血，小儿头疮。

香丝草 裳衣草

*E. crispus* Pourr.

临桂、桂林、恭城、天峨、罗城、东兰、大苗山、大瑶山、凌云、苍梧、贺县、昭平、富川、百色。

作绿肥，猪饲料，熏蚊。全草止痛；治风湿。

琴叶飞蓬☆

*E. panduratus* Chang

资源。

丛生泽兰☆

*Eupatorium caespitosum* Migo

梧州。

兰草 孩儿草

*E. chinense* L.

(*E. reevesii* Wall.)

区内各地。

根、叶清热解毒，宣痹通络，利咽散结；治扁桃体炎，咽喉炎，麻疹，肺炎，风湿骨痛，劳伤，血淋。专用根治小儿白喉。作兽药治牛、猪筋骨肿痛，跌打损伤，疮痈疔疽，蛇伤，痰多，肺热咳嗽。

单叶泽兰☆

*E. chinense* L.

var. *simplicifolium* Mak.

全州。

泽兰

*E. japonicum* Thb.

区内各地。

全草活血散瘀；治月经不调，水肿，跌打肿痛。

毛泽兰

**E. lindleyanum DC.**

南宁、龙州、武鸣、宁明、临桂、兴安、全州、资源、梧州、昭平、贺县、平南、贵县、都安。

全草发表祛风，和中化湿；治风寒感冒，疟疾，寄生虫病。

飞机草

**E. odoratum L.**

百色、那坡、凭祥。

茎、叶提芳香油，用于香料及医药工业。绿化植物。全草杀虫，止血；治蚂蟥咬伤后流血不止。鲜叶揉碎涂肢体，防蚂蟥咬。

水泽兰 鸡骨香、老山茶、佩兰

**E. stoechadosmum Hance**

区内各地。

茎、叶提芳香油。全草通经散瘀，祛湿；治月经不调，白带白浊，胃痛，腹痛，跌打肿痛，吐血，衄血等。

异叶泽兰☆

**E. wallichii DC.**

**var. heterophyllum (DC.) Diels**

资源。

•荔枝菊

**Gaillardia aristata Pursh**

南宁、桂林等市。

绿化花卉。

大丁草

**Gerbera anandria (L.) Schtz.-Bip.**

龙胜、临桂、柳城。

全草祛风除湿，止咳平喘，解毒；治风湿麻木，咳喘，疔疮。

\*非洲菊

*G. jamesonii* Bolus

南宁、桂林等市。

绿化花卉。

白眉 一柱香、毛大丁草

*G. piloselloides* Cass.

临桂、桂平、上思、梧州、柳州、大苗山、大瑶山、隆林、凌云、那坡、龙州、横县、东兰。

全草清热止咳，活血行气，解毒；治咳嗽痰多，小儿疳积，跌打损伤，肺痨咳血，风湿麻木，疔疮，蛇伤。根、叶作农药能防治蚜虫。

香菇

*Glossogyne tenuifolia* Cass.

玉林。

全草清热利湿；治湿热黄疸，中暑吐泻，牙龈肿痛，痢疾。

贴生鼠麹草 大白艾

*Gnaphalium adnatum* Wall. ex DC.

(*Anaphalis adnata* DC.,

*A. esquirolii* (Lévl.) Lévl.)

容县、上思、恭城、灌阳。

全株治痢疾，风湿，小儿惊风。

秋鼠麹草 山艾

*G. hypoleucum* DC.

南宁、横县、武鸣、隆林、德保、靖西、平乐、贺县、柳州、南丹、恭城。

可食，可与米粉相拌做糍粑。全草止咳；又治热痢。

狭叶鼠麹草 白花艾、田灰艾

*G. indicum* L.

梧州、昭平、容县、武鸣、宁明、临桂、恭城、上思、凤山、柳城。

Gnaphalium-Gynura

作猪饲料。全草治热痢，咽肿，小儿食滞。

细叶鼠麹草

*G. japonicum* Thb.

大苗山、融安。

可食，全草清肝明目，消炎止血；治结膜炎，咽喉炎，尿道炎，扁桃腺炎，白浊，血崩，痈肿等。

鼠麹草

*G. multiceps* Wall.

隆林、田阳、凌云、乐业、天峨、临桂、龙胜、容县、横县、大苗山、上思、柳城、大瑶山。

可食，取嫩叶和米粉相拌做糍粑。作猪饲料。全草提芳香油。药用宣肺平喘，祛痰止咳，补脾利湿；治风寒咳嗽，急慢性支气管炎，哮喘，风湿性腰腿痛。

黄花球 田黄菜、荔枝草

*Grangea maderaspatana* (L.) Poir.

隆林、百色、南宁、田阳。

叶镇痉，调经；治耳痛，肺结核。

红背菜

*Gynura bicolor* DC.

临桂、阳朔、恭城、平南、凌云、靖西、那坡、大苗山、昭平、贺县。作蔬菜。全草消肿，止痛；治血崩，月经不调。

革命菜 竹筒蒿

*G. crepidioides* Benth.

区内普遍分布。

野菜。猪饲料。全草行气消肿，健脾利尿；治消化不良，脾虚浮肿。

又花土三七 大肥牛、白子菜

*G. divaricata* (L.) DC.

(*G. ovalis* DC., *G. pseudo-china* DC.)

平卧土三七☆

*G. procumbens* (Lour.) Merr.

汉三七 土三七、菊三七、破血丹

*G. segetum* (Lour.) Merr.

桂南、平果、昭平、全州、临桂、桂林。

全草活血通经，祛风消肿；治跌打损伤，风湿骨痛，乳痈疮毒，急慢惊风。

\*向日葵

*Helianthus annuus* L.

区内各地。

种子油为半干性油，供食用，制糕点饼食，制肥皂、涂料、油漆用，点灯用。茎、叶作牛的饲料。花可制成黄色染料。茎的髓心用于显微切片技术方面。药用：茎髓治血淋，乳汁少，肺结核，花止痛，催生。叶治疟疾。籽治虚弱头风。根治浮肿。

\*菊芋

*H. tuberosus* L.

全州、兴安、资源、临桂、灵川。

根茎含淀粉和糖分，作粮食或蔬菜，酿酒，作猪饲料。茎皮纤维代麻制绳，织麻袋，制人造纤维板等。药用茎、叶驳骨。

\*蜡菊

*Helichrysum bracteatum* Andr.

各城市。

绿化花卉。

泥胡菜

*Hemistepta lyrata* Bunge

(*Saussurea carthamoides* (Ham.) Benth.,

*S. affinis* Spreng.)

Heteroplexis-*Ixeris*

隆林、桂林。

异裂菊☆

*Heteroplexis vernalioides* Chang

龙州。

繖花山柳菊

*Hieracium umbellatum* L.

兴安。

旋复花

*Inula britannica* L.

全州。

花序下气，消痰，行水；治喘咳，嗳气呕吐，胸满肋痛，大腹水肿等。

白牛胆 羊耳菊、柱头草、猪耳风、大力王、白头婆

*I. cappa* DC.

区内各地。

全草或根除痰定喘，祛风消肿，活血调经；治咳嗽，肾炎水肿，

风湿腰痛，跌打损伤，月经不调等。作兽药治牛、猪感冒发热，痰多咳嗽，宿草不消，泄泻下痢。作绿肥。

苦菜

*Ixeris chinensis* (Thb.) Nak.

隆林、临桂。

全草清热解毒，消肿排脓；治疮疖痈肿。

小苦菜

*I. dentata* (Thb.) Nak.

(*Lactuca dentata* (Thb.) Mak)

野苦荬菜

*I. denticulata* (Houtt.) Stebb.

(*Lactuca denticulata* (Houtt.) Maxim)

龙胜、临桂。

全草清热解毒，消肿；治疮疖痈肿。

细叶苦菜☆

*I. gracilis* (DC.) Stebb.

(*Lactuca gracilis* (Wall.) DC.)

临桂、兴安。

全草治痨咳，疮疖。

剪刀股

*I. japonica* (Burm.) Nak.

(*I. debilis* A. Gray)

桂南。

全草治乳腺炎。

高莴苣☆

*Lactuca elata* Hemsl.

龙州、藤县。

细花莴苣☆

*L. graciliflora* (Wall.) DC.

隆林、田林、平南、融安、大苗山。

全草治痨咳，疮疖。

山莴苣 野生菜

*L. indica* L.

临桂、容县、龙州、凌云、乐业、梧州。

全草清肝热，解毒。作猪饲料。

• 莴苣 生菜

*L. sativa* L.

区内各地。

蔬菜。

Lactuca-Laggera

• 莴苣笋

*L. sativa* L.

var. *asparagina* Bailey

区内各地。

蔬菜。

• 球叶莴苣

*L. sativa* L.

var. *capitata* L.

区内各地。

蔬菜。

• 钩叶莴苣 玻璃生菜

*L. sativa* L.

var. *crispa* L.

区内各地。

蔬菜。

• 长叶莴苣

*L. sativa* L.

var. *longifolia* Lam.

区内各地。

蔬菜。

瓶头菊

*Lagenophora billardieri* Cass.

桂南。

六棱菊

*Laggera alata* (DC.) Schtz.-Bip.

百色、田林、隆林、龙州、邕宁、南宁、武鸣、巴马、天峨、恭城。  
全草消肿拔毒，散瘀止痛；治疮疖肿毒，烫火伤，湿疹，跌打。

蛇伤，风湿痛，肾炎水肿，血枯经闭。叶、花可提芳香油。

狮子草

*L. pterodonta* (DC.) Benth.

龙州、宁明、南丹。

禾稿草 稻槎菜

*Lapsana apogonoides* Maxim.

临桂、凌云、乐业、博白，

光栓果菊☆ 土蒲公英

*Launaea acaulis* (Roxb.) Bab. ex Craib

(*L. glabra* (Wight) Fr.)

隆林、柳州、宁明。

小舌菊

*Microglossa albescens* (DC.) C.B Clarke

梨叶小舌菊

*M. pyrifolia* (Lam.) O.Ktze.

大瑶山、隆林、靖西、南宁、龙州。

全株解毒，生肌，明目；治疮疥。

西南齿冠菊☆

*Myriactis gmelinii* DC.

桂西北。

粗齿齿冠菊☆ 尼泊尔齿冠菊

*M. nepalensis* Less.

桂西北。

山苦荬 甜麦、空筒菜

*Paraprenanthes sororia* (Miq.) Chang, in sched.

(*Lactuca sororia* Miq.)

大苗山。

Pentanema-Rhynchospermum

苇谷草

*Pentanema indicum* (L.) Ling

(*Inula indica* L., *Vicoa auriculata* Cass.)

桂南。

粉背苇谷草

*P. indicum* (L.) Ling

var. *hypoleucum* (H.-M.) Ling

田林。

全草治疳积。

毛连菜

*Picris hieracioides* L.

隆林、田林。

西南毛连菜☆

*P. hieracioides* L.

var. *divaricata* (Van.) Chang, ined.

全州。

西南垂序苣☆

*Prenanthes henryi* Dunn

大瑶山、大苗山、恭城。

根清热解毒；治蛇伤。

小垂序苣☆ 福王草

*P. macilenta* Van. et Lévl.

大瑶山。

卵叶垂序苣☆ 野麦叶

*P. tatarinowii* Maxim.

大瑶山。

秋分草

*Rhynchospermum verticillatum* Reinw.

龙州。

\*金光菊 太阳花、假向日葵

*Rudbeckia laciniata* L.

桂南各地。

绿肥。绿化花卉。叶消肿拔毒。

三角叶风毛菊

*Saussurea deltoides* (DC.) C B.Clarke

(*S. radiata* Fr., *S. lamprocarpa* Hemsl.,

*S. cirsium* Lévl.)

大瑶山、南丹。

根治腹痛，腰痛。

中间风毛菊

*S. intermedia* Turcz.

乐业。

根作人工流产用。

风毛菊

*S. japonica* (Thb.) DC.

临桂、隆林、百色。

\*广木香 云木香

*S. lappa* C.B.Clarke

南宁、桂林。

根健胃消胀，行气止痛；治气滞腹胀，痢疾腹痛，消化不良，呕吐泄泻，胎动不安。根提芳香油作调香原料。用根制成的香连丸放在衣物、毛呢中可防虫蛀。

蛛毛千里光

*Senecio araneosus* DC.

临桂、容县。

Senecio

藤千里光

*S. buimalia* Buch.-Ham.

那坡。

田野千里光☆ 狗舌草

*S. campestris* DC.

大苗山。

全株治疮疥。

拟菊千里光

*S. chrysanthemoides* DC.

隆林。

聚繖千里光

*S. cymatocrepis* Diels

凌云、乐业、那坡。

根作人工流产用。

密花千里光

*S. densiflorus* Wall.

临桂、上思、大瑶山。

峨眉千里光☆ 小花野苦卖

*S. faberi* Hemsl.

大苗山。

绵毛千里光☆

*S. hoi* Dunn

宁明、大瑶山、阳朔。

全草止血生肌，和血调经；治损伤，小儿慢惊风。

金千里光☆

*S. hugonis* S. Moore

大瑶山。

黔桂千里光☆

*S. latouchei* J.F.Jeffr.

龙胜、大瑶山、全州。

橐吾千里光

*S. ligularia* Hk.f.

大瑶山。

根化痰止咳。叶消肿。

白千里光☆

*S. nagensium* C.B.Clarke

龙胜、阳朔、大苗山、那坡。

全株祛风暖胃，消疮毒；治刀伤，腹痛，腹泻，哮喘。

黄菊莲 蒲儿根

*S. oldhamianus* Maxim.

临桂、龙胜、全州、宜山、柳州、大瑶山、天等、平南。

全草消肿解毒；治金疮。

千里光 九里明

*S. scandens* Buch.-Ham.

区内各地。

全草清热解毒，益肝明目，去腐生肌；治黄疸性肝炎，痈肿，湿

疹，皮炎，急性结膜炎，咽喉肿痛，迎风流泪，痔疮，疟疾。

作兽药治眼疾，痢疾，皮肤病。茎、叶作农药除蚜虫。

中华千里光☆

*S. sinicus* (Diels) Chang

那坡。

三舌千里光

*S. triligulatus* Buch.-Ham.

凌云、乐业。

Serratula-Sphaeranthus

麻花头 广东升麻

*Serratula chinensis* S. Moore

全州。

根散风解毒，透疹；治咽喉肿痛，麻疹不透，久泻脱肛，子宫脱垂。

豨莶

*Siegesbeckia orientalis* L.

区内各地。

全草安神降压，祛风除湿；治失眠，高血压，风湿痛，肺痨咳嗽，犬伤，蛇伤，半身不遂。

一枝黄花 蛇头黄、一朵云

*Solidago virga-aurea* L.

区内各地。

全草凉血解毒，消肿止痛；治咽喉肿痛，毒蛇咬伤，感冒咳嗽，跌打，疮疖，肠炎，小儿疳积。作兽药治牛、猪疮疾，喉症，臌胀，腹泻等症。

苣荬菜 野苦荬

*Sonchus arvensis* L.

南丹、柳州、隆林、凌云、乐业、扶绥、富川、钟山、恭城、临桂。全草清热解毒；治阑尾炎初起，乳痈，疮疖肿毒，痢疾，烫火伤。苗充蔬菜。全株作家畜饲料。

\*苦荬菜 苦荬

*S. oleraceus* L.

区内各地。

蔬菜。

戴星草

*Sphaeranthus africanus* L.

全草健胃，利尿，止痛。

金纽扣

*Spilanthes acmella* (L.) Murr.

(*Verbesina acmella* L.)

龙州。

全草止咳定喘，消肿止痛；治感冒咳嗽，肺结核，百日咳，哮喘，支气管炎，蛇伤，疮毒，牙痛。

金腰箭 苞壳菊

*Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn.

容县、临桂、宁明。

根治疮疥。

\*万寿菊

*Tagetes erecta* L.

区内各城镇。

绿化花卉。花补血，通经，去瘀，生新。

\*藤菊 西番菊

*T. patula* L.

区内城镇。

绿化花卉。全草清热利湿，止咳；治咳嗽，痢疾。

\*蒲公英 黄花地丁

*Taraxacum mongolicum* H.-M.

各地有少量栽培。

全草清热解毒，消肿散结，利尿催乳；治乳痈，热疖疮毒，肝炎，阑尾炎，乳少，胃炎，胃溃疡，便秘，尿路感染，蛇虫伤。作猪饲料。根含橡胶。

毒根斑鸠菊 大木菊、过山龙

*Vernonia andersonii* C B. Clarke

大瑶山、龙州、南宁、宁明、横县、扶绥、上思、灵山、平南、

容县、那坡、百色、田林、天峨、凤山、东兰。

根、藤有大毒；舒筋活络，祛风解表；治风湿痛，腰肌劳损，感冒，疟疾，牙痛，结膜炎。

### 粗叶斑鸠菊

**V. aspera (Roxb.) Buch.-Ham.**

临桂、宁明、凤山、梧州、德保、那坡、隆林。

根凉血，败毒；可用于人工流产。

### 广西斑鸠菊☆

**V. chingiana H.-M.**

临桂、那坡。

根、叶治小儿惊风，烂疮。

### 斑鸠菊 寄色草、夜香牛

**V. cinerea (L.) Less.**

天峨、罗城、隆林、德保、大瑶山、柳州、梧州、贺县、藤县、

平南、容县、龙州、武鸣、横县、上思、龙胜、临桂。

全草疏风散热，安神镇静，消积化滞；治感冒咳嗽，急性肝炎，

失眠，小儿夜尿，痢疾，疔疮肿毒，乳痈，蛇伤，跌打扭伤。

### 大藤菊

**V. esculenta Hemsl.**

靖西、隆林、乐业、那坡、德保、百色、天峨、都安。

### 展叶斑鸠菊☆ 狗仔菜、咸虾花

**V. patula (Ait.) Merr.**

(**V. chinensis Less.**)

南宁、龙州、宁明、梧州、巴马。

全草（根最好）发表散寒，清热止泻；治热泻，肝阳头病，风热感冒，疟疾。

### 柳叶斑鸠菊☆

**V. saligna DC.**

田林、凌云。

叶治高热。根下胎催生。

### 蔓斑鸠菊

*V. scandens* DC.

大瑶山、龙州。

根镇痛，宽筋活络；治喉痛，风湿骨痛。

### 咸虾花 斑鸠木

*V. solanifolia* Benth.

大瑶山、三江、罗城、昭平、上思。

全草治腹痛，肠炎，痧气。作兽药治牛风湿脚软，咽喉肿痛。

### 圆柱斑鸠菊

*V. teres* Wall.

桂西北。

全草治痢疾，水肿。

### 大叶斑鸠菊

*V. volkameriaeefolia* (Wall.) DC.

隆林、百色、田林。

### 双花蟛蜞菊

*Wedelia biflora* (L.) DC.

武鸣、大瑶山、南宁、桂林。

### 蟛蜞菊 卤地菊

*W. chinensis* (Osb.) Merr.

桂南、大瑶山。

全草破瘀消肿；治跌打，风湿，腹痛。

### 荨麻叶蟛蜞菊

*W. urticaefolia* DC.

桂西南。

Wedelia-Canscora

高原蟛蜞菊

*W. wallichii* Less.

龙州、桂平。

苍耳

*Xanthium sibiricum* Patr.

区内各地。

种子油与桐油相仿，可与桐油掺合制油漆，又可做油墨、肥皂、

油毡原料；还可做硬化油、润滑油。全株有毒，果最毒；果通鼻窍，祛风止痛；治鼻炎，神经性头痛，高血压，麻风，淋巴结核，寄生虫病。全草作兽药治牛、猪疮疥，湿疹，水肿等。

异叶黄鹌菜

*YOUNGIA heterophylla* (Hemsl.) Babo et Stebb.

临桂。

黄鹌菜

*Y. japonica* (Thb.) DC.

(*Crepis japonica* Benth.)

临桂、恭城、隆林、乐业、凌云、靖西、百色、东兰、博白、三江。

全草消肿，止痛；治感冒。

\*鱼尾菊 百日草

*Zinnia elegans* Jacq.

各城镇。

绿化花卉。药用全草治痢疾，淋症，乳头痛。

## 239 龙胆科 GENTIANACEAE

穿心草 串钱草

*Canscora lucidissima* (Lévl. et Van.) H.-M.

龙州、马山、阳朔、临桂、柳州。

全草凉肝胆，活血止痛；治黄疸，肝炎，胸痛，胃痛，跌打内伤，  
毒蛇咬伤等。

罗星草☆

*C. melastomacea* H.-M.

合浦、十万大山、博白、平南、陆川、宁明、大瑶山、荔浦。

全草散瘀止痛，接骨；治跌打。

双蝴蝶

*Crawfurdia fasciculata* Wall.

(*C. japonica* S. et Z.)

上林、昭平一线以北各地。

全草治乳痛，久痢，月经不调。叶生肌。

蝴蝶草 接筋藤

*C. pricei* (Marq.) Ma

(*Gentiana pricei* Marq.)

分布同上一种。

全草治刀伤，接筋骨。

美丽藻百年草

*Exacum bellum* Hance

宁明、藤县、南丹、都安、临桂、桂林。

全草治肝炎，喉炎。

藻百年草

*E. tetragonum* Roxb.

桂西北。

吊兰龙胆☆

*Gentiana atkensonii* Burk.

灵川、临桂、兴安、灌阳、大瑶山、容县、贺县。

Gentiana-Swertia

华南龙胆 地丁、紫花地丁

*G. loureiri* (D.Don) Griseb.

大苗山、临桂、全州、龙胜、贵县、武鸣。

全草清热利尿，消炎解毒；治病疮疖肿、无名肿毒，肝炎，痢疾。

线叶龙胆☆

*G. manshurica* Kitagawa

贵县、桂林、临桂。

红花龙胆

*G. rhodantha* Fr.

大瑶山。

根清热利湿；治急性肝炎，小儿肺炎。

坚龙胆 胆草

*G. rigescens* Fr.

凌云、乐业、田林、隆林。

根、根状茎健胃，泻火，清热，明目，定惊。

龙胆草 胆草、观音草

*G. scabra* Bunge

桂北、桂西一带。

根泻肝胆实火，除下部湿热；治肝火眼红肿痛，胁肋刺痛，阴囊湿痒，黄疸尿赤，小儿惊风。作兽药治牛肺病，便秘，暑热，伤寒，转圈症。全草作农药治棉蚜虫、玉米螟等害虫。

匙叶草☆

*Latouchea fokiensis* Fr.

大苗山、临桂、灌阳、龙胜、全州，资源、武鸣，

獐牙菜

*Swertia bimaculata* (S. et Z.) C B Clarke

龙胜、资源、灌阳、全州、凤山、大苗山、钟山、富川。  
根治毒蛇咬伤。

美丽獐牙菜☆

*S. pulchella* Buch.-Ham.

靖西、隆林、邕宁、容县、桂林、临桂、兴安。

239A 睡 菜 科 MENYANTHACEAE

野苦菜☆

*Nymphoides hydrophyllum* (Lour.) O.Ktze.

(*Menyanthes hydrophyllum* Lour.)

桂西北。

金银莲花

*N. indicum* (L.) O.Ktze.

(*Limnanthemum indicum* (L.) Griseb.)

东兴、临桂、桂林。

240 报春花科(樱草科) PRIMULACEAE

点地梅 喉咙草

*Androsace saxifragifolia* Bunge

(*A. umbellata* (Lour.) Merr.)

柳城。

全草清热解毒；治喉痛，喉炎，扁桃腺炎，口腔炎，跌打摔伤，眼翳。

过路黄

*Lysimachia alfredi* Hance

全州、兴安、永福、桂林、临桂、龙胜、大苗山、容县。

全草清热利湿，排石利胆；治黄疸肝炎，尿路感染，尿路结石等。

Lysimachia

粗珍珠菜☆

**L. aspera** H.-M.

桂西北。

泽珍珠菜

**L. candida** Lindl.

临桂、柳州、天峨、隆林、平果、百色。

全草治痈疮，无名肿毒。

毛柄珍珠菜

**L. capillipes** Hemsl.

隆林、靖西。

全草益气补虚，祛风活血；治虚弱，气管炎，哮喘，月经不调，

感冒咳嗽。外搽雀斑。茎、叶提芳香油。

异叶珍珠菜

**L. capillipes** Hemsl.

**var. diversifolia** Chun et F.Chun

桂林、隆林。

球花珍珠菜☆

**L. cephalantha** Knuth

临桂、容县。

四川金钱草      铜钱草、过路黄、路边黄

**L. christinae** Hance

兴安、全州、龙胜、临桂、桂林、河池、大瑶山、容县。

全草治胆囊结石，尿路结石，蛇伤。外敷烫火伤及化脓性炎症。

珍珠菜      扯根菜、野鸡公花

**L. clethroides** Duby

兴安、全州、资源、龙胜、灵川、灌阳、隆林、西林、凌云、

乐业、大苗山。

全草利水消肿，活血调经；治水肿，跌打，月经不调，白带，疳积，刀伤，喘咳。种子油可制肥皂。叶为野菜。果可酿酒。作猪饲料。

密花排草☆ 细样黄瓜草

*L. congestiflora* Hemsl.

全州、龙胜、桂林、临桂、大苗山、大瑶山、象州、罗城、平果。

全草清热解毒；治黄疸肝炎，赤白痢，咳嗽痰多，咽喉肿痛，腹泻，小儿脐风等。

延叶珍珠菜

*L. decurrens* Forst.

临桂、河池、大瑶山、田林、武鸣、大明山、扶绥、横县、龙州、桂平、平南、苍梧。

全草消肿止痛，补血调经；治跌打，疗毒。

灵香草 香草、佩兰、排草

*L. foenum-graecum* Hance

龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、象州、隆林、田林、凌云、乐业、那坡。

名贵芳香植物。全草提制的芳香油广用于烟草及香脂等香精。干品放箱中能防虫蛀衣物。全草芳香辟秽；治鼻塞，齿痛，胸闷腹胀。

大叶排草☆

*L. fordiana* Hemsl.

龙胜、大瑶山、凤山、凌云、乐业、苍梧。

根治跌打损伤，喉痛，蛇伤，痈毒，疬核。

大田基黄 星宿草、假辣蓼、泥鳅草、红曲根

*L. fortunei* Maxim.

区内各地。

Lysimachia

全草清热解毒，祛痰除湿；治肝炎，支气管哮喘，痢疾，暑热症。  
小儿疳积。

裸头排草☆

**L. gymnocephala** H.-M.

全州、隆林、苍梧。

西南排草☆

**L. henryi** Hemsl.

西林。

全草调经养血。

奇异珍珠菜☆

**L. insignis** Hemsl.

桂西北。

根祛风除湿，舒筋活血；治风湿，跌打，肝炎，骨折。

披针叶珍珠菜

**L. lancifolia** Craib

桂西北、阳朔。

假半支莲

**L. lobelioides** Wall.

隆林。

全草治乳房肿痛。

长梗珍珠菜☆

**L. longipes** Hemsl.

凤山。

全草治刀伤。

重楼排草

**L. paridiformis** Fr.

全州、龙胜、三江、田林、凌云、乐业。

全草宽胸利膈，祛痰止咳；治肺结核，肠胃炎，小儿久咳，胃痛，风湿痛，跌打，血崩，蛇伤。

聚叶珍珠菜☆

*L. phyllocephala* H.-M.

兴安、龙胜、桂林、大苗山、大瑶山、象州、横县、容县。

赤褐珍珠菜

*L. rubiginosa* Hemsl.

桂西北。

石山珍珠菜☆

*L. saxicola* Chun et F.Chun, ined.

南丹、河池。

吊丝排草☆

*L. sikokiana* Miq.

全州、兴安、龙胜、南丹、河池、罗城、大苗山、大瑶山、隆林、凌云。

狭叶排草

*L. tridentaloides* Hemsl.

桂林、柳州、梧州、河池等地区。

全草祛风除湿，活血，定惊；治骨折，跌打，小儿惊风。

241 蓝 雪 科(白花丹科)

PLUMBAGINACEAE

紫雪花 红花丹

*Plumbago indica* L.

陆川、北流、贵县。

全草破血，通经，止痛；治风湿。

白雪花 白花丹、火灵丹、猛老虎

*P. zeylanica* L.

Plantago-Adenophora

灵山、富川、梧州、平乐、临桂、阳朔、十万大山、贵县、南宁、  
宁明、龙州、靖西、那坡、百色、隆林、大苗山。

根祛风除湿；治风湿骨痛，腰腿痛，心胃气痛，肝脾肿大。叶多  
外用，散瘀消肿；治跌打扭伤，恶疮，蛇伤，退眼膜。本品根、  
叶均有毒。孕妇忌服。外敷时间不可过长。

242 车前草科 PLANTAGINACEAE

车前 车前草

*Plantago asiatica* L.

田林。

用途同大车前。

车前草 钱贯草、车轮菜、牛舌草、饭匙草、灰盆草

*P. major* L.

区内各地。

全草、种子利尿通淋，祛痰止咳；治水肿，淋浊，尿急尿痛，咳  
嗽痰多，支气管炎，肺炎，白带，高血压。

大叶车前☆

*P. major* L.

var. *sinuata* (Lam.) Decne.

凌云。

全草煎水洗疮疖。

243 桔梗科 CAMPANULACEAE

钝叶沙参☆ 银叶花

*Adenophora obtusifolia* Merr.

大苗山、柳州、横县、桂林。

根清肺泻火，养阴止咳。

杏叶沙参(注)

*A. stricta* Miq.

全州、资源、兴安、龙胜、灵川、临桂、富川、贵县、马山、隆林。

功用同钝叶沙参。根可食，又可提淀粉或酿酒。

轮叶沙参

*A. tetraphylla* (Thb.) Fisch.

(*A. verticillata* Fisch.)

全州、资源、兴安、临桂、阳朔、大苗山、大瑶山、武鸣、马山、凌云。

根清肺泻火，养阴止咳；治支气管炎，肺痈咳血，干咳，阴虚发热，咽喉肿痛。嫩茎、叶可食。根含淀粉，可酿酒。

肖牧根草

*Asyneuma fulgens* (Wall.) Briq.

(*Campanula fulgens* Wall.)

桂西北。

土党参 上人参、奶参、金钱豹、风铃藤、桂党参

*Campanumoea javanica* Bl.

(*C. labordei* Lévl.)

区内各地。

根补中益气，润肺生津；治虚弱倦怠，多汗，心悸，肺结核，腹泻，产后少乳。

剑叶金钱豹

*C. lancifolia* (Roxb.) Merr.

兴安、龙胜、恭城、荔浦、贺县、融安、大瑶山、大苗山、东兰、天峨、宁明、龙州、那坡、靖西、乐业、隆林。

注：据《中药志》第I卷314页载，目前我国南方习用的商品南沙参，是沙参属多种植物的根部。北方的北沙参是繖形科植物。

### Codonopsis-Wahlenbergia

根益气补虚，去瘀止痛，润肺止咳；治气虚，跌打，肠绞痛。

奶参 羊乳、奶叶藤、四叶参

*Codonopsis lanceolata* (S. et Z.) Benth. et Hk f.

资源、龙胜。

根补中益气，润肺祛痰；治病后虚弱，产后乳少，肺痈，乳痈。

淋巴结核，蛇伤。作兽药，治牛、猪肺痈，乳水不足，痈肿疮疖。根含淀粉，可代粮食制糕点、酿酒。

### \*党参

*C. pilosula* (Fr.) Nannf.

南宁、大瑶山。

中药。根补中益气，养胃生津；治虚弱，泄泻，怠倦，肺虚咳嗽，血虚心悸。种子油可制肥皂。

### 桔梗

*Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A.DC.

桂林地区、柳州地区、南丹、昭平、邕宁等地。

根祛痰，利咽，排脓；治感冒咳嗽痰多，咽喉肿痛，痰壅喘促，肺痈，疮毒。作兽药，治牛、猪痰多咳嗽，咽喉肿痛，肺热气促，胸膈不利，肺痈和外科痈疽。根含淀粉，可代粮食作糕点和酿酒。种子油供工业用。庭园绿化植物。

兰花参 娃儿草、细叶沙参

*Wahlenbergia marginata* (Thb.) A.DC.

(*Campanumoea marginata* Thb.,

*W. gracilis* A.DC.)

兴安、龙胜、临桂、桂林、大苗山、横县、扶绥、武鸣、十万大山、田阳、隆林。

根补虚损，止盗汗，又治白带，疳积。

243A 五膈草科 PENTAPHRAGMATACEAE

中华五膈草

*Pentaphragma sinense* Hemsl. et Wils.

十万大山。

穗序五膈草

*P. spicata* Merr.

东兴、龙州、大瑶山、河池。

243B 楔瓣花科 SPHENOCLEACEAE

楔瓣花 木空菜、牛奶藤

*Sphenoclea zeylanica* Gaertn.

合浦、玉林。

全草外治热疮。

244 半边莲科(山梗菜科) LOBELIACEAE

半边莲 急解索

*Lobelia chinensis* Lour.

(*L. radicans* Thb.)

龙胜、临桂、桂林、大苗山、罗城、贺县、梧州、陆川、北海。

全草凉血解毒，利尿消肿，散瘀止痛；治蛇伤，水肿，哮喘，跌打，疖肿，扁桃体炎，肠炎腹泻，湿疹。作兽药，治牛、猪蛇伤，痈疽，疮疖，无名肿毒，跌打，全身水肿，腹水，小便不通，气逆喘咳。

广西半边莲☆

*L. kwangsiensis* E.Wimm.

大苗山、资源、阳朔。

Lobelia-Pratia

狭萼半边莲☆

*L. melliana* E.Wimm. ex H.-M.

隆林、凌云。

大叶半边莲☆ 大叶山梗菜

*L. sequinii* Lévl. et Van.

隆林。

长萼半边莲

*L. sequinii* Lévl. et Van.

*forma longisepala* E.Wimm.

靖西、那坡、百色。

棱茎半边莲☆

*L. succulenta* Bl.

(*L. zeylanica* L.p.p.,

*L. affinis* Wall.)

阳朔、大苗山。

大叶棱茎半边莲☆

*L. succulenta* Bl.

*var. lobbiana* (Hk.f. et Thoms.) E.Wimm.

罗城。

铜锤玉带草 扣子草、马莲草

*Pratia nummularia* (Lam.) A.Br. et Aschers.

(*P. begoniifolia* Lindl.)

区内各地。

全草消炎解毒，补虚，退翳；治虚弱，咳吐浓痰，目翳，乳痈。

无名肿毒。

华南玉带草

*P. wollastonii* S. Moore

罗城。

247 花葱科(翠梅科) POLEMONIACEAE

\*桔梗石竹 福禄花、福禄考

*Phlox drummondii* Hk.

常栽作庭园绿化植物。

\*天蓝绣球

*P. paniculata* L.

常栽作庭园绿化植物。

248 田基麻科 HYDROPHYLLACEAE

田基麻 假芹菜

*Hydrolea zeylanica* (L.) Vahl

宁明、龙州。

249 紫草科 BORAGINACEAE

狗舌草

*Antiotrema dunnianum* (Diels) H.-M.

(*Cynoglossum dunnianum* Diels,

*C. cavaleriei* Lévl.)

隆林。

根、叶捣烂敷患处，治跌打红肿。内服清湿热，利水消肿；治红崩，白带，水肿，肝炎。

Bothriospermum-Ehretia

斑种草

*Bothriospermum tenellum* (Roem. et Schult.)

Fisch. et Mey.

临桂、阳朔、柳州、百色、凌云、乐业、隆林。

基及树

*Carmona microphylla* (Lam.) Don

(*C. retusa* Masamune)

破布木 文木

*Cordia dichotoma* Forst.f.

龙州、梧州、隆林。

韧皮纤维可造纸、制绳。木材供建筑用。果实可食。

分叉破布木

*C. furcans* I.M.Johnst.

桂西南。

狭叶倒提壶☆

*Cynoglossum lanceolatum* Forst.

临桂、龙胜、大苗山、隆林。

全草治蛇伤。

琉璃草

*C. zeylanicum* (Vahl) Thb. ex Lehm.

凌云。

全草清湿热，利水消肿；治红崩，白带，气虚水肿，肝炎，黄疸。

云南厚壳树 毛板栗

*Ehretia dicksonii* Hance

扶绥、平果、田阳、兴安等地。

木材稍硬，不易破裂，可作建筑、用具、装饰用材。嫩枝、叶可作绿肥。果、叶作农药，可防治棉蚜、毛蜘蛛。种子油可制肥。

皂。树皮可提染料。叶具粗毛，可洗擦器皿、用具。

椴叶厚壳树

*E. dicksonii* Hance

var. *tilioides* I.M.Johnst.

那坡、凌云、乐业、隆林、南丹、都安、大苗山、临桂、龙胜。  
长花厚壳树

*E. longiflora* Champ. ex Benth.

横县、扶绥、龙州、靖西、田阳、百色、凌云、隆林、大苗山、  
大瑶山、贺县、永福。

厚壳树

*E. thyrsiflora* (S. et Z.) Nakai

(*E. acuminata* R.Br.

var. *obovata* (Lindl.) I.M.Johnst.)

全州、兴安、临桂、梧州、大瑶山、柳州、横县、南宁、武鸣、  
龙州、靖西、田林、隆林、贵县、陆川。

木材供建筑、用具、装饰用材。树皮可作染料。绿化树种。

上思厚壳树

*E. tsangii* I M Johnst.

十万大山、武鸣。

叶治蛇伤。能解食物中毒。

天芥菜 狗尾虫

*Heliotropium indicum* L.

梧州、横县、南宁。

紫草 红条紫草

*Lithospermum erythrorhizon* S. et Z.

全州、资源、兴安、龙胜、临桂、乐业、隆林、永福。

根凉血，活血，解毒；治热毒发斑，痈肿，烫火伤，便秘，冻

Rotula-Atropa

伤，刀伤，湿疹。根产红色染料，适用于棉、丝织品染色。  
轮廓木

*Rotula aquatica* Lour.

南宁。

盾果草

*Thyrocarpus sampsonii* Hance

兴安、桂林、永福。

大叶附地菜☆

*Trigonotis macrophylla* Van.

var. *verrucosa* I M Johnst.

大苗山、龙胜。

全草治风湿，疝气。

附地菜

*T. peduncularis* (Trev.) Benth.

龙胜、临桂。

全草祛风止痛；治手足麻木，胸肋骨痛。

## 250 茄 科 SOLANACEAE

广西地海椒

*Archiphysalis kwangsiensis* Kuang

贺县。

\*颠茄

*Atropa belladonna* L.

桂林。

干根和叶的制剂，在医药上用作镇静，止痛，局部麻醉，抗痉挛药；制成复方颠茄片、颠茄酊，治轻度肠胃绞痛；制成硫酸阿托品，用于胃、肠、胆、肾绞痛，有机磷中毒，散瞳等。

\* 鸳鸯茉莉

*Brunfelsia acuminata* (Pohl) Benth.

常栽作庭园绿化植物。

\* 辣椒 香椒、鸡嘴椒

*Capsicum annuum* L.

果供蔬菜和调味品用。作药用；发汗，健胃，亦作皮肤引赤剂。

茎治风湿冷痛，冻疮。

\* 樱桃椒

*C. annuum* L.

var. *cerasiforme* Irish

常作庭园绿化植物。

\* 指天椒

*C. annuum* L.

var. *conoides* Irish

果供蔬菜和调味品用。作兽药，治牛、猪胃寒不食，消化不良，外擦风湿痹痛；又治鸡白痢。

\* 灯笼椒

*C. annuum* L.

var. *grossum* Sendt.

果供蔬菜用。

\* 牛角椒

*C. annuum* L.

var. *longum* Sendt.

果供蔬菜用。

\* 红花夜来香 炮仗红、红花洋素馨

*Cestrum elegans* Schlecht.

Cestrum-Lycianthes

常栽作庭园绿化植物。

•夜来香

*C. nocturnum* L.

常栽作庭园绿化植物。花可提芳香油。

白花曼陀罗 闹羊花

*Datura metel* L.

栽培或野生。花、果、叶有大毒；麻醉止痛，除风湿，平喘咳；治哮喘，肌肉疼痛，麻木，寒湿，脚气，跌打，蛇伤。作兽药，全株亦可用，治猪喘气病，又治牛、猪跌打，痈疽恶毒，风湿痹痛。全株作农药，水煮液防治稻螟、蚜虫、红蜘蛛、玉米螟、小造桥虫和其他软体害虫。花、果可灭孑孓。

曼陀罗

*D. stramonium* L.

桂林、南宁、上林、龙州、百色等地。

功用近白花曼陀罗。

•莨菪 “天仙子”

*Hyoscyamus niger* L.

南宁。

种子有大毒；定痉，止痛；治癫痫，抽搐，肌肉麻木疼痛，咳喘，久痢久泻，恶肿毒。种子、茎、叶可提莨菪油供车辆润滑油和照明用。种子油可制肥皂和油漆。

钮扣子 十萼茄

*Lycianthes biflora* (Lour.) Bitt.

(*Solanum biflorum* Lour.)

区内各地。

根、叶、果治消化不良，疮疥，蛇伤，跌打，虚弱咳嗽。

排草叶钮扣子☆

*L. lysimachioides* (Wall.) Bitt.

大瑶山、龙胜。

紫花钮扣子☆

*L. lysimachioides* (Wall.) Bitt.

var. *sinensis* Bitt.

龙胜。

\*宁夏枸杞

*Lycium barbarum* L.

功同枸杞，但质量较好。

\*枸杞 枸杞菜、地骨皮

*L. chinense* Mill.

区内各地。

果滋补肝肾，润肺，益精明目；治虚劳精亏，腰脊酸痛，肝肾不足，头晕眼花，视力减退，虚劳发热，肺热咳喘。根皮泻火，清热凉血，退虚热；治咳嗽吐血，烦热消渴。嫩叶供蔬菜食用，能清热，种子油可制润滑油。

\*番茄 西红柿、毛秀才

*Lycopersicum esculentum* Mill.

区内各地。

蔬菜作物。果供生食或作蔬菜，制果汁、果酱。

\*烟草

*Nicotiana tabacum* L.

农作物，烟草工业原料。作农药，叶、茎水煮或干粉或烟油防治稻螟、地蚕、蚜虫、红蜘蛛、红薯金花虫、浮尘子、黄条跳岬、三化螟、蔬菜害虫等。烟草制剂不能久放，应尽快使用。烟草含有麻醉物质，称烟碱，也叫尼古丁。叶治骨节疼痛，偏头

Petunia-Solanum

痛，蛇伤。烟筒油垢可治蛇伤，蜈蚣伤。

\*彩花茄 碧冬茄

*Petunia hybrida* Vilm

常栽作庭园绿化植物。

\*矮茄

*P. violacea* Lindl.

常栽作庭园绿化植物。

苦蘗

*Physalis angulata* L.

临桂、龙州。

全草治膀胱炎。

酸浆 打拍草

*P. franchetii* Mast.

var. *bunyardii* (Hort.) Mak.

(*P. alkekengi* auct., fl. *asiat*, non L.)

野生或栽培庭园绿化植物。缩萼清热，利尿，化痰；治咽喉肿痛，热痰咳嗽，小便不利，湿疮痈肿。孕妇忌用。果可食。

灯笼泡 小酸浆

*P. minima* L.

临桂、梧州、玉林、南宁、宁明、龙州、隆林。

全草清热解毒，化痰止咳；治感冒发热，咽喉肿痛，急性支气管炎，腮腺炎，睾丸炎，脓泡疮，湿疹，疖肿。作兽药，治牛、猪风热咳嗽，呕逆痰壅，风热腹痛，热眼红肿；外敷治天泡疮。

龙珠

*Solanum bigeminatum* Nees

兴安、临桂、蒙山、贺县、大苗山、大瑶山、那坡。

果实有毒。

黄刺茄(注)

*S. coagulans* Forsk.

梧州、大瑶山、武鸣、那坡等地。  
果可治虫牙痛。

粤桂茄

*S. debilissimum* Merr.

宁明、龙州。

苦茄 千年不烂心、白英、野番茄

*S. dulcamara* L.

(*S. dulcamara* L.

var. *chinense* Dunal,

*S. dulcamara* L.

var. *pubescens* Bl.,

*S. lyratum* Thb.)

大瑶山、南宁、宁明、十万大山。

全草清热解毒，祛风止痛；治阴道糜烂，痈疮，疥疮，风湿痛，癌症，黄疸，丹毒，疔疮，月经不调，白带，蛇伤。作兽药，治牛、猪黄疸，水肿，小便淋沥，阴道糜烂，赤白带，痈疽，恶疮，疥疮，皮肤搔痒。全株可作农药。

大叶毛刺茄 毛茄

*S. ferox* L.

大瑶山、武鸣、龙州、靖西、百色、临桂。

全株治跌打，疝气。

紫花茄 五宅茄

*S. indicum* L.

区内各地。

注：黄刺茄、苦茄、紫花茄、玉珊瑚、刺茄、假烟叶等全株有毒，尤其是未成熟的果最毒，含有茄碱等几种生物碱，中毒时可照生物碱中毒解救方法解救。

Solanum

根、全草散瘀止痛，清肝明目；治咽喉炎，淋巴结炎，跌打，风湿痛，风火赤眼，咳嗽。

五角茄

*S. mammosum* L.

苍梧、梧州、南宁、柳州、桂林。

全草治瘰疬，心气痛。果治胃痛。常栽作庭园绿化植物。

\*卵茄

*S. melongena* L.

var. *depressum* Bailey

蔬菜。

\*茄 矮瓜

*S. melongena* L.

var. *esculentum* Nees

蔬菜。根、茎、花清热利湿，祛风止咳；治年久咳嗽，久痢，白带，风湿痛，冻疮，乳痈。生茄子和种子可解蕈毒。

\*长萼茄

*S. melongena* L.

var. *serpentinum* Bailey

蔬菜。

龙葵

*S. nigrum* L.

区内各地。

全草清热解毒，利水消肿；治小便不利，淋浊，白带，痈疮肿毒，湿疹，咳嗽，喉痛。作农药，防治棉蚜、红蜘蛛。

少花龙葵 左钮菜、扣子草

*S. nigrum* L.

var. *pauciflorum* Liou

博白、桂林、乐业。

无毒。叶可供蔬菜食。

### 海南茄

**S. procumbens** Lour.

(**S. hainanense** Hance)

合浦。

### \*玉珊瑚

**S. pseudo-capsicum** L.

常栽作庭园绿化植物。

根生肌埋口，解毒止痛；治疮疖，劳伤腰痛。

### 山烟木

**S. spirale** Roxb.

宁明、那坡、田林、隆林、凤山、都安、南丹、天峨。

根利尿。叶止咳。

### 刺茄 钉茄

**S. surrattense** Burm.f.

(**S. aculeatissimum** Jacq.)

区内各地。

根、果、叶抗菌，活血散瘀，麻醉止痛，镇咳平喘；治风湿腰痛，

跌打，慢性支气管炎，哮喘，感冒，慢性骨髓炎，冻疮，淋巴结核，

脚癣，蛇伤。作兽药，治牛、猪气喘咳嗽；外敷治跌打，疮痈。

### 水茄

**S. torvum** Sw.

梧州、临桂、贵县、十万大山、宁明、龙州、田东、隆林、都安、东兰、天峨。

根散瘀消肿，止痛；治跌打瘀痛，腰肌劳损，胃痛。

### \*马铃薯

**S. tuberosum** L.

Solanum -Argyreia

区内各地。

块茎可作粮食和蔬菜，又可制淀粉和酒精。发芽的块茎含毒质龙葵精，多集于芽旁及皮下，不能食。食时要多削些皮，浸水中数小时，充分煮熟才可食。

假烟叶 野烟叶、土烟叶

*S. verbascifolium* L.

区内各地。

全草有毒；消肿解毒，行气止痛，生肌收敛；治痈疮肿毒，皮炎湿疹，腹痛，骨折。作兽药，治牛、猪肠胃臌气，猪咳嗽；外敷疮痛，外洗疥癣。

## 251 旋 花 科 CONVOLVULACEAE

白鹤藤 白背绸缎、一匹绸

*Argyreia acuta* Lour.

梧州、苍梧、昭平、藤县、贺县、贵县、陆川、北流、玉林、平南、灵山。

全藤止咳祛痰，去湿生肌；治咳嗽，疮疖脓肿，乳痈，水火烫伤。

毛白鹤藤☆

*A. capitata* (Vahl) Choisy

龙州、扶绥、百色、凌云、那坡、隆林。

叶生肌愈合，止痛。

钝叶白鹤藤

*A. obtusifolia* Lour.

那坡。

叶治跌打损伤，白带，内伤吐血。

白花银背藤 旋花藤、白背藤

*A. sequini* (Lévl.) Van.

扶绥、大新、龙州、宁明、天峨、河池、南丹、都安、靖西、百色、那坡。

全草驳骨止血，生肌收敛；治内伤。

苞叶藤 拍岭葛

*Blinkworthia discostigma* H.-M.

百色。

\*月光花

*Calonyction aculeatum* (L.) House

(*Ipomoea bona-nox* L.,

*C. speciosum* Choisy)

桂林、南宁等市。

绿化藤本。嫁接于红薯上，可提高红薯产量。苗、叶作猪饲料。

全草治蛇伤。

\*白月光花☆

*C. album* (L.) House

桂林、柳州。

篱天剑

*Calystegia sepium* R.Br.

临桂、桂林。

菟丝子 豆寄生、雾水藤、小粒菟丝子

*Cuscuta chinensis* Lam.

龙州、南宁、武鸣、百色、河池、天峨、临桂、贺县、贵县。

种子补肾固精，养肝明目；治阳萎，遗精，肾虚腰酸痛，视力减退。藤活血散瘀；治扭挫伤。

雾水藤 红雾水藤、大粒菟丝子

*C. japonica* Choisy

大瑶山、苍梧、宁明、大新、龙州。

茎煎出液作粉刷灰浆的糊料。种子补肾益精，止泻杀虫；治阳萎，遗精，白带，目赤痛。

马蹄金 黄胆草、酒窝草、四川小金钱草、小灯盏

*Dichondra repens* Forst.

Erycibe-Ipomoea

靖西、罗城、桂北、大瑶山。

全草清热利尿，行气止痛，止血生肌；治肝炎黄疸，胆石症，尿路结石，水肿，乳腺炎，菌痢，跌打，月经不调。

光滑麻辣子☆ 光滑丁公藤

*Erycibe laevigata* Wall.

大瑶山、十万大山。

瑶山麻辣子☆

*E. sinii* Chun et How

大瑶山。

银丝草 土丁桂

*Evolvulus alsinoides* L.

百色、凌云、隆林、龙州、宁明、临桂、柳州。

全草清湿热，消积滞；治急性肠炎，尿路感染，尿血，白带，痢疾。

\*蕹菜 空心菜

*Ipomoea aquatica* Forsk.

(*I. reptans* Poir.)

区内各地。

蔬菜。药用全草解毒，利尿；治食物中毒，痈疮，虫牙痛，白带。

\*红薯 番薯

*I. batatas* (L.) Poir.

区内各地。

薯作粮食或饲料，加工制红薯淀粉、红薯粉丝、酒精、葡萄糖等。薯藤作猪饲料。药用藤叶清热利湿，润肺止咳，去腐排脓；治痧症，乳痈，疔疮，咳嗽，吐血，便血，泻痢，蛇虫伤。

五爪金龙 上竹龙

*I. cairica* (L.) Sweet

(*Convolvulus cairicus* L.,

*I palmata* Forsk.)

容县、贵县、北流、百色、柳州、合浦、梧州、苍梧。

叶治痈疮。果治跌打，腹蛊积。全草作猪饲料。作蔽荫绿化植物。

密生牵牛☆

*I. congesta* R.Br.

隆林、资源。

七爪龙 藤商陆、野牵牛

*I. digitata* L.

(*I. paniculata* R.Br.)

龙州、扶绥、南宁、博白、陆川。

根、叶泻水解毒，拔脓散结；治水肿腹胀，乳痛，瘰疬等。肉质

根可提制淀粉或酿酒。作猪饲料。

华陀花 筋番薯、老虎豆

*I. hardwickii* Hemsl.

(*I. calycina* Benth.)

贺县、梧州、钟山、龙州、宁明、南宁、隆林、百色、天峨、柳州、平乐。

茎、叶治小儿疳积。种子治跌打，蛇伤。

牵牛 喇叭花

*I. hederacea* Jacq.

龙州、南宁、宁明、钟山、昭平、大瑶山、桂林、隆林、百色、天峨。

种子有小毒；泻下，利尿；治二便不通，蛔虫腹痛，水肿胀满，

痰饮。全草作猪饲料。又可杀猪蛔虫。

总苞牵牛

*I. involucrata* Beauv.

邕宁、龙州、那坡、百色、巴马。

小心叶薯

*I. obscura* (L.) Ker-Gawl.

Ipomoea-Lepistemon

隆林、凌云。

种子逐水，利小便。

厚藤 马鞍藤

*I. pes-caprae* (L.) Sweet

(*I. biloba* Forsk.)

合浦。

毛七爪龙 虎掌牵牛、毛五爪龙

*I. pes-tigridis* L.

龙州。

根泻下；治咯血。

\*紫花牵牛 毛牵牛

*I. purpurea* (L.) Roth

区内城镇。

绿化花卉。种子泻下利尿。

大叶牵牛

*I. staphylina* Roem. et Schult.

龙州、武鸣、博白。

小牵牛

*Jacquemontia paniculata* (Burm f.) Hall.f.

龙州。

延叶鳞蕊藤☆

*Lepistemon decurrens* H.-M.

百色、南宁、上思。

分裂鳞蕊藤☆

*L. lobatus* Pilger

龙州。

戟叶鱼黄草

*Merremia hastata* (Desr.) Hall.f.

玉林。

全草外用治骨节疼痛。

鱼黄草 茉栾藤

*M. hederacea* (Burm.f.) Hall.f.

(*Lepistemon glaber* H.-M., fide Y.Tsiang, in herb.)

百色与云南交界处、上林、平乐。

全草清热解毒，利咽明目；治感冒，结合膜炎，扁桃体炎，咽喉炎；外用治疮疖。

毛鱼黄草

*M. hirta* (L.) Merr.

南宁、梧州、那坡。

微花鱼黄草

*M. umbellata* (L.) Hall f.

龙州、宁明、邕宁、上思、百色、那坡、大瑶山、都安。

葡萄叶鱼黄草☆

*M. vitifolia* (Burm.f.) Hall.f.

田阳。

盒果藤

*Operculina turpethum* (L.) Manso

(*Ipomoea turpethum* R.Br.)

龙州、宁明、邕宁、百色、巴马。

根缓下；治热病，水肿。叶松筋。

小翼萼藤☆

*Porana racemosa* Roxb.

那坡、百色、隆林、凤山、龙胜。

Porana-Adenosma

飞蛾藤

*P. sinensis* Hemsl.

(*Porana delavayi* Gagn. et Courch.)

融安、宁明、凌云、乐业、南丹、阳朔、平乐。

大翼萼藤

*P. spectabilis* Kurz

(*P. megalantha* Merr.)

隆林、靖西、东兰、天峨、龙州、邕宁、武鸣。

茑萝

*Quamoclit pennata* (Lam.) Bojer

(*Q. vulgaris* Choisy)

区内各地。

缠绕草质藤本，供绿化用。

252 玄参科 SCROPHULARIACEAE

蓝花毛麝香

*Adenosma caeruleum* R.Br.

平南、藤县、巴马。

全株行气，消肿，止痛。

毛麝香

*A. glutinosum* (L.) Druce

(*A. grandiflorum* Benth.)

贵县、贺县、昭平、梧州、大瑶山、临桂。

全草祛风活络，散瘀止痛；治小儿麻痹症初期，风湿骨痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，疮疡湿疹。作兽药参照使用。

球花毛麝香 沙虫药

*A. indianum* (Lour.) Merr.

(*A. capitatum* Benth.)

南宁、宁明、贵县、梧州、贺县、德保、百色、乐业、上思、全州、柳州。

全草疏风解表，散瘀止痛；治感冒，咳嗽，发热，头痛，消化不良，腹胀腹泻，皮炎，沙虫脚。

•金鱼草 龙头花

*Antirrhinum majus* L.

区内城镇。

本种花期长，花色鲜艳多彩，是公园、花园常栽花卉，也可作花束等用。

多花假马齿苋☆

*Bacopa floribunda* Wettst.

贺县。

广西腹水草☆

*Botryopleuron grandifolium* Chun et How, ined.

龙胜。

来江藤☆

*Brandisia hancei* Hk.f.

南丹、凌云、乐业。

广西来江藤☆

*B. kwangsiensis* H.L.Li

大瑶山、那坡。

广东来江藤☆

*B. swinglei* Merr.

大瑶山、隆林、那坡。

Buchnera-Ilysantes

黑草 鬼羽箭

*Buchnera cruciata* Buch.-Ham.

河池、巴马、柳州、靖西、隆林、藤县、合浦、马山。

全草清热解暑；治流感，腹痛，疟疾，肺痨，荨麻疹，暑热口渴，癫痫等。作兽药治牛、猪风湿，跌打，猪丹毒；外敷治疮痛，无名肿毒，血箭。

四方麻 假金鸡尾

*Calorhabdos cauloptera* Hance

临桂、全州、平乐、漓江沿岸、昭平、大苗山。

全草清热解毒，消肿止痛；治腮腺炎，咽喉炎，结合膜炎，淋巴结核，痢疾，黄疸，尿血，湿疹，烫火伤，疔疮，蛇伤。

白花阿生草 赛尔茜

*Celsia coromandeliana* Vahl

天峨、南宁。

全草解热；治痢疾，皮肤病。

华白花阿生草☆

*C. coromandeliana* Vahl

var. *chinensis* Murb.

南宁。

胡麻草

*Centranthera cochinchinensis* (Lour.) Merr.

(*C. hispida* R.Br.)

靖西、罗城、桂林。

泥花草

*Ilysantes antipoda* (L.) Merr.

(*Ruellia antipoda* L.,

*Bonnaya veronicifolia* (Retz.) Spreng.)

隆林、百色、龙州、柳州、大苗山、龙胜、梧州、贵县。

全株消肿去毒；治蛇伤，热疮，羊毛痧。作兽药治猪喘气病，湿热腹泻。

### 旱田草

*I. ciliata* (Colsm.) O.Ktze.

(*Gratiola ciliata* Colsm.,

*Bonnaya reptans* Spreng.)

苍梧、武鸣、龙州、上思、平南、大苗山、大瑶山、天峨、东兰、田林、那坡、凌云、隆林、恭城。

全草清热解毒，消肿破瘀；治赤痢，蛇伤，跌打，疮疖，产后腹痛。

### 齿叶泥花草

*I. serrata* (Roxb.) Urban

(*Bonnaya brachiata* Link et Otto)

南宁、邕宁、百色、大瑶山。

全草清肺热；治疮毒，蛇伤，功近旱田草。

### 细叶泥花草☆

*I. tenuifolia* Urban

柳州、桂林、大瑶山。

### 紫苏草

*Limnophila aromatica* (Lour.) Merr.

桂南。

全草清热解毒，消肿止痒；治蛇伤，疮毒，癣疥，感冒等。

### 中华石龙尾☆ 肖紫草

*L. chinensis* (Osb.) Merr.

南宁、宁明、武鸣、贺县、贵县、上思、柳州。

全草消肿拔毒；治水肿，疳积，全身痒痛。

Limnophila-Lindernia

大叶水辣椒

*L. connata* (Buch.-Ham.) H.-M.

(*Cybbantha connata* Buch.-Ham.,

*L. hypericifolia* Benth.)

异叶石龙尾☆

*L. heterophylla* Benth.

桂林、阳朔。

水八角 大叶石龙尾

*L. rugosa* (Roth) Merr.

临桂、武鸣、龙州、大新、苍梧、岑溪、容县。

全草提芳香油。药用续筋驳骨，健胃止痛；治水肿，疝气，跌打骨折，蛇伤，疔疮。

石龙尾 假水八角

*L. sessiliflora* (Vahl) Bl.

龙州、桂林、临桂。

钟萼草☆

*Lindenbergia philippinensis* (Cham.) Benth.

(*L. melvillei* S. Moore)

河池、百色、梧州。

狭叶母草☆

*Lindernia angustifolia* (Benth.) Wettst.

临桂。

长蒴母草

*L. cordifolia* (Colsm.) Merr.

(*L. pedunculata* Wettst.

*Vandellia pedunculata* Benth.)

大瑶山、柳州、南丹、罗城、凤山、隆林、苍梧、桂平、合浦。  
全草清热解毒；治乳痈，腮腺炎，蛇头疮，蛇伤，气喘。

### 母草

**L. crustacea (L.) F.Muell.**

(*Vandellia crustacea* Benth.)

梧州、贺县、苍梧、昭平、玉林、龙州、南宁、上思、融安、大  
瑶山、永福、罗城、东兰。

全草清热利湿；治痢疾，肠炎，腹泻，蛇伤，肝炎，水肿。

### 铜钱叶母草

**L. nummularifolia (G.Don) Wettst.**

大苗山。

### 具盖母草

**L. pyxidaria All.**

柳州、柳城。

### 荨麻叶母草☆ 野凉粉草

**L. urticifolia Hance**

贺县、苍梧。

### 粘母草☆

**L. viscosa (Willd.) Merr.**

东兴、十万大山、大瑶山。

全草治毒疮，乳痈。

### 通泉草

**Mazus japonicus (Thb.) O.Ktze.**

(*M. rugosus* Lour.)

临桂、龙胜、大苗山、柳城、南宁、上思、河池、凤山、百色、  
隆林、靖西、凌云、乐业、昭平。

全草清热解毒；治脓泡疮，无名肿毒。作猪饲料。

Melampyrum-pedicularis

山萝花

*Melampyrum esquierolii* (Lévl. et Van.) H.-M.

全州。

泡桐 白桐

*Paulownia fortunei* (Seem.) Hemsl.

区内各地。

木材轻软，不易传热，适于做保险箱衬板。亦可作箱、柜、乐器等用材。枝、叶作绿肥。花、叶作猪饲料，可使猪肥大。作环境绿化树。根药用祛风，止痛，消肿毒。

长叶泡桐

*P. longifolia* H.-M.

龙胜、大苗山。

广西泡桐☆

*P. rehderiana* H.-M.

龙胜、兴安、大瑶山。

毛泡桐 马蹄郎

*P. tomentosa* (Thb.) Steud.

大苗山、龙胜、阳朔、荔浦、兴安、靖西。

用途参阅泡桐。

粘毛泡桐☆

*P. viscosa* H.-M.

桂西北、临桂。

西南马先蒿☆

*Pedicularis henryi* Maxim.

兴安、全州、龙胜。

松蒿

*Phtheirospermum japonicum* (Thb.) Kanitz

(*P. chinensis* Bunge)

容县、昭平。

苦玄参

*Picria fel-terrae* Lour.

龙州、东兰。

全草治腹痛，疳积，喉痛，心气痛，瘰疬，蛇伤。

黑翅茎草

*Pterygiella nigrescens* Oliv.

河池。

\*地黄

*Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) Libosch.

桂林、南宁。

生地养阴清热，凉血止血；熟地滋阴补血；治高热，吐血，衄血，口舌生疮，小便短赤，贫血，月经不调，腰痛，遗精，头晕耳鸣。

\*怀庆地黄

*R. glutinosa* (Gaertn.) Libosch.

*forma hueichingensis* (Chao et Schih) Hsiao

藤县、富川、平南、桂平、北流、容县、南宁。

功用参阅地黄。

\*炮仗竹 马蹄花、吉祥草

*Russelia equisetiformis* Schlecht. et Cham.

平南、柳城、桂林。

全草治跌打，骨折。绿化花卉。

野甘草 土甘草

*Scoparia dulcis* L.

Scrophularia-Striga

苍梧、梧州、贵县。

全草清热利湿，生津止渴；治感冒发热，腹炎腹泻，水肿，小便不利，湿疹热痒。代茶饮用。

\*北玄参 玄参

*Scrophularia buergeriana* Miq.

桂林。

用途参阅浙玄参。

\*玄参 浙玄参、元参

*S. ningpoensis* Hemsl.

桂东、桂东南。

根滋阴降火，润燥生津，消肿解毒；治热病伤阴，口渴便秘，咽喉肿痛，发斑，痈肿，瘰疬。

阴行草 茵陈草、鸡肉菜

*Siphonostegia chinensis* Benth.

武鸣、邕宁、龙州、资源、兴安、永福、临桂、贺县。

全草清热解毒，利湿消肿，活血散瘀，顺气化痰；治黄疸，肠炎腹泻，水肿，尿血，烫火伤，漆疮，产后血瘀腹痛，闭经等。

短冠草 英雄草

*Sopubia trifida* Buch.-Ham.

藤县、南丹、上思、大瑶山、永福、龙胜、临桂、隆林。

全草驱肠寄生虫。

独脚金

*Striga asiatica* (L.) O.Ktze.

(*S. lutea* Lour.)

罗城、大瑶山、临桂、资源、桂林、百色、隆林、平南、贵县、昭平、武鸣、邕宁、马山。

全草健脾消食，清热利尿；治小儿疳积，食积腹泻，黄疸。

大独脚金☆

*S. masuria* (Buch.-Ham.) Benth.

武鸣、扶绥、全州、临桂、河池。

同色蓝猪耳 灯笼草

*Torenia concolor* Lindl.

龙州、大新、大苗山、凌云、乐业、东兰、巴马、天峨、恭城、  
临桂、兴安、龙胜、平乐、昭平。

全草清热利湿，散瘀，止咳；治黄疸，血淋，风热咳嗽，蛇伤，  
疗毒，腹泻，跌打损伤。

黄花蓝猪耳☆

*T. flava* Buch.-Ham. ex Wall.

博白、上思、宁明。

全草治阴囊肿大。

光叶蓝猪耳☆

*T. glabra* Osb.

(*T. benthamiana* Hance)

罗城、大苗山、大瑶山、全州、邕宁、百色。

全草清热解毒，止血止痛；治跌打刀伤，蛇伤。

毛叶蓝猪耳☆

*T. hirsuta* Lam.

苍梧、藤县、平南。

全草治疗疮。

总梗蓝猪耳☆

*T. peduncularis* Benth.

龙州、大瑶山、临桂、龙胜、兴安、永福。

蝴蝶蓝猪耳☆ 蝴蝶花

*T. vagans* Roxb.

Veronica-Gleadowia

大瑶山。

水苦荬

*Veronica anagallis* L.

凌云、田阳、乐业、东兰、临桂。

苗、叶作蔬菜。全草和血止痛，通经止血；治闭经，跌打红肿  
吐血。

蚊母草

*V. peregrina* L.

桂林、临桂。

婆婆纳

*V. polita* Fries

柳城、柳州、大瑶山。

253 列 当 科 OROBANCHACEAE

野菰

*Aeginetia indica* L.

(*A. japonica* S. et Z.)

宁明、马山、大明山、上思、大瑶山、大苗山、藤县、贺县、昭  
平、平南、桂林、资源、兴安、临桂、灵川、灌阳、西林。

全草解热止咳；治喉痛，骨髓炎。

广东藨寄生☆

*Gleadovia kwangtungensis* Hu

隆林、龙州。

石蜡烛

*G. lepoensis* Hu

临桂。

全草治横痃。

254 狸藻科 LENTIBULARIACEAE

蓝花狸藻(注)

*Utricularia affinis* Wight

黄花狸藻

*U. aurea* Lour.

(*U. flexuosa* Vahl)

藤县、南宁等地。

二裂狸藻☆

*U. bifida* L.

灵山、大瑶山、富川、昭平、临桂、龙胜等地。

小狸藻

*U. exoleta* R.Br.

梧州、临桂。

圆叶狸藻

*U. orbiculata* Vahl

大瑶山。

总序狸藻☆

*U. racemosa* Wall.

大瑶山、柳州。

256 苦苣苔科 GESNERIACEAE

上树蜈蚣

*Aeschynanthus buxifolius* Hemsl.

大瑶山、资源。

全草治蛇虫伤。

---

注：本属植物是食虫植物。

Aeschynanthus-Briggsia

芒毛苣苔

*A. chinensis* Gardn. et Champ.

大瑶山、扶绥、宁明、靖西。

全草补血，祛风，去湿。

广西旋蒴苣苔☆

*Boea anceps* Chun

龙州。

网脉旋蒴苣苔

*B. dictyoneura* Hance

武鸣、南丹。

全草益气补血，止咳；治腹痛，劳伤，产后流血不止。

旋蒴苣苔

*B. hydrometrica* (Bunge) R.Br.

南丹、东兰、田林、隆林。

红旋蒴苣苔

*B. rufescens* Fr.

上林、南丹、凤山、东兰、凌云、百色、隆林。

全草补血，益精。

台湾旋蒴苣苔☆ 土烟叶

*B. swinhonis* Hance

大苗山、南丹、河池、凤山、天峨、百色、龙州。

叶治内伤。

异药苣苔

*Brachistemon macrocalyx* H.-M.

龙州、靖西、那坡。

大嘴肥肚苣苔

*Briggsia macrosiphon* (Hance) Chun

(*Chirita macrosiphon* Hance)

全草清热，消肿。

广西肥肚苣苔

*B. stewardii* Chun

三江、龙胜。

鹿角苣苔

*Ceratoscyphus caeruleus* Chun

十万大山。

中华被萼苣苔

*Chlamydoboea sinensis* (Oliv.) Stapf

(*Phylloboea sinensis* Oliv.)

凌云。

深隐长蒴苣苔☆

*Didymocarpus anachoretus* (Hance) Lévl.

(*Chirita anachoretus* Hance)

大明山、大瑶山、南丹、凌云、昭平、临桂、恭城。

南长蒴苣苔

*D. dimidiatus* (R Br.) Chun

(*Chirita dimidiatus* R.Br.)

凌云。

两广长蒴苣苔

*D. dryas* (Dunn) Chun

隆林。

牛耳朵

*D. eburneus* (Hance) Lévl.

(*Chirita eburnea* Hance,

*C. faurei* Fr.)

Didymocarpus

兴安、临桂、桂林、富川、柳州等地。

全草清肺止咳，补虚止血；治肺结核，咳喘，吐血，红崩白带。

蚂蟥七 红蚂蟥七、石螃蟹、睫萼长蒴苣苔

D. *fimbrisepalus* H.-M.

(*Chirita fimbrisepalus* H.-M.)

全州、龙胜、临桂、大苗山、大瑶山、蒙山。

根茎健脾消食，清热除湿，凉血止痛；治小儿疳积，胃痛，肝炎，痢疾，跌打。

多花长蒴苣苔☆

D. *floribundus* Chun

容县、大瑶山、武鸣。

苗山长蒴苣苔☆

D. *floribundus* Chun

var. *retrotrichus* Chun

大苗山。

钩状长蒴苣苔☆

D. *hamosus* Wall.

凌云、百色。

单叶钩长蒴苣苔☆

D. *hamosus* Wall.

var. *unifolius* (C.B.Clar.) H.-M.

桂西北。

肥牛草 耳草长蒴苣苔

D. *hedyotideus* Chun

龙州、宁明、武鸣。

根茎治劳伤咳嗽；外用消肿，治跌打，马口疗。

靖西长蒴苣苔☆

D. holocalyx Chun

靖西。

广西长蒴苣苔☆

D. kwangsiensis Chun, ined.

大苗山。

破血丹 浅裂长蒴苣苔

D. pinnatifidus H.-M.

大明山、凌云、罗城、大苗山、大瑶山、资源、临桂、兴安、龙胜、全州。  
全草消肿毒。

小石上莲☆

D. pinnatifidus H-M.

var. grossedentatus Chun

大瑶山。

华长蒴苣苔

D. sinensis (Lindl.) Lévl.

苍梧。

全草治无名肿毒。

上思长蒴苣苔

D. sinoherryi Chun

十万大山、大瑶山。

狭花长蒴苣苔☆

D. stenanthos C.B.Clarke

凌云。

瑶山长蒴苣苔☆

D. verecundus Chun

大瑶山。

Epithema-Lysionotus

独脚莲花

*Epithema carnosum* (D.Don) Benth.

百色。

大降龙草☆

*Hemiboea follicularis* C.B Clarke

苍梧、龙胜、大苗山。

叶治化脓炎症。

纤细半蒴苣苔☆

*H. gracilis* Chun, ined.

龙胜、临桂。

降龙草

*H. subcapitata* C.B.Clarke

龙胜、大苗山。

互生苣苔

*Isanthera discolor* Maxim.

藤县、贺县。

斜蒴苣苔

*Loxostigma chinensis* Chun, ined.

那坡、靖西。

滇桂斜蒴苣苔☆

*L. griffithii* (Hk.f. et Th) C.B Clarke

凌云。

胡麻斜蒴苣苔☆

*L. sesamoides* H.-M.

大瑶山。

两广吊石苣苔☆

*Lysionotus chingii* Chun

龙州、凌云。

丝柄吊石苣苔☆

**L. filipes** Chun, ined.

龙胜。

海南吊石苣苔☆

**L. hainanensis** Merr. et Chun

龙州、靖西、那坡、乐业、东兰。

少花吊石苣苔☆ 石吊兰

**L. pauciflorus** Maxim.

(**L. wilsonii** Kranzl.)

区内各地。

全草益肾强筋，散瘀止痛；治骨折，跌打，风湿骨痛，胃痛，血崩，小儿疳积。常盆栽供室内布置。

马铃苦苣苔

**Oreocharis argyreia** Chun

昭平、蒙山、大瑶山、大明山、德保、靖西。

耳状苣苔

**O. auricula** (Moore) C.B.Clarke

全州、资源、龙胜、大苗山、罗城。

石上莲

**O. benthami** C.B.Clarke

贺县、大瑶山、大苗山、兴安。

全草治跌打，刀伤，烂脚。

网脉石上莲☆

**O. benthami** C.B.Clarke

var. *reticulata* Dunn

(*Didymocarpus oreocharis* Hance)

Petrocodon-Slackia

兴安、临桂、大瑶山、蒙山、横县、靖西。  
全草止血。

石钟花

*Petrocodon dealbatus* Hance  
(*P. longistylus* Kranzl.)

罗城、临桂。

滇桂悬岩苣苔☆

*Petrocosmea wardii* W.W.Sm.  
南丹。

细蒴苣苔

*Raphiocarpus sinicus* Chun  
十万大山、龙州、大瑶山。

歪冠苣苔 一串珍珠

*Rhynchoglossum obliquum* Bl.  
凌云。  
根软坚散结；治甲状腺肿大。

阔叶线柱苣苔☆

*Rhynchotechum latifolium* Hk.f. et Thomas.  
苍梧、大瑶山、大苗山、龙州、都安、凤山、田林。  
全草清肝，解毒；又治疮疥。

短柄横蒴苣苔☆

*Slackia brevipes* Chun, ined.  
大瑶山。

瑶山横蒴苣苔☆

*S. pingkueii* Chun, ined.  
大瑶山。

羽裂横蒴苣苔☆

*S. pinnatifida* Chun, ined.

大苗山。

横蒴苣苔

*S. sinensis* Chun

十万大山、大瑶山、大明山、田林、凌云。

两广横蒴苣苔☆

*S. tonkinensis* Pellegrin

十万大山、凌云。

257 紫葳科 BIGNONIACEAE

\*凌霄 白狗肠、红花倒水莲、紫葳、上树蜈蚣

*Campsis grandiflora* (Thb.) Loisel.

(*C. chinensis* (Lam) Voss.,

*Tecoma grandiflora* Loisel.)

苍梧、贺县、全州、临桂、桂林、兴安、龙胜、大苗山、南丹。花凉血，祛瘀，通经；治经闭，痛经，产后瘀阻，症瘕，崩漏。根、叶、藤清热利湿，散瘀消肿；治肠胃炎，白带，风湿痹痛，痈疖，乳腺炎。常栽植作庭园绿化植物，适于布置花廊、花架、攀墙。

\*厚萼凌霄☆ 美国凌霄

*C. radicans* (L.) Leem.

桂林。

常栽植作庭园绿化植物。

灰楸

*Catalpa fargesii* Bureau

南丹、东兴。

果利尿。根皮治皮肤病。木材供家具、器具、乐器、琴底等用。

Catalpa-Oroxylon

亦供建筑用。嫩叶、花供蔬食。叶亦作猪饲料。梓皮、梓叶浸液作农药，可治稻螟飞虱。庭园绿化树种，道路树种。

•梓树

*C. ovata* G.Don

(*C. kaempferia* S. et Z.)

各城市间有少量栽培。

根皮清热解毒，和胃降逆；治胃热呕吐，小儿热疮，皮肤痒疹。

果利尿；治肾炎浮肿，肝硬化腹水。其他用途参阅灰楸。

•白花梓树

*C. speciosa* Ward.

桂林、临桂、南丹。

•蓝花楹

*Jacaranda acutifolia* Humb. et Bonpl.

各地公园有栽。

庭园绿化树种。木材供家具、用具用材。

•猫尾木

*Markhamia cauda-felina* (Hance) Craib

宁明、那坡、桂林。

庭园绿化树种。木材供家具、板料用。

火花树 缅木

*Mayodendron igneum* Kurz

隆林、田阳、龙州。

木蝴蝶 千张纸

*Oroxylum indicum* (L.) Vent.

合浦、邕宁、武鸣、龙州、田林、百色、隆林、凌云、宜山、桂林（栽培）。

种子润肺止咳，止痛；治支气管炎，肺结核咳嗽，咽喉肿痛，扁

桃体炎，心胃气痛，百日咳。树皮清热凉血；治肝炎，膀胱炎，痈疮，湿疹。木材供火柴杆等用。

•炮仗花

*Pyrostegia ignea* Presl

(*P. venusta* Baill.)

常栽植供庭园绿化用。

美叶菜豆树

*Radermachera frondosa* Chun et How

桂南。

叶供绿肥用。

海南菜豆树

*R. hainanensis* Merr.

龙州、靖西。

菜豆树

*R. sinica* (Hance) Hemsl.

(*Stereospermum sinicum* Hance)

阳朔、临桂、桂林、恭城、柳州、上林、宁明、龙州、大新、都安、东兰。

根、叶凉血散瘀，消肿止痛；治高热，头痛，扭挫伤，骨折，蛇伤，痈肿。果治胃痛。花可打汤，又治痢疾。木材供家具、美工用材。绿化树种。

羽叶楸 咸沙木

*Stereospermum chelonoides* (Oliv.) DC.

那坡。

木材为良好硬材。根、叶、花解热。

Stereospermum-Acanthus

毛羽叶楸

*S. chelonoides* (Oliv.) DC.

var. *puberula* Dop

隆林、田林、百色、凌云。

木材为硬材。

\*硬骨凌霄

*Tecomaria capensis* Spach

桂林。

绿化花木。

258 芝 麻 科 PEDALIACEAE

\*芝麻 脂麻、胡麻

*Sesamum orientale* L.

(*S. indicum* DC.)

油料作物。油供食用，亦可制成人造奶油，亦可作香脂等原料。

种子供制点心、糖果。种子补肝益肾，养血润燥；治肝肾亏虚，头昏，眼花，耳鸣，肠燥便秘，病后脱发。韧皮纤维可制人造棉、绳索、麻袋。榨油后的油麸可作猪的精饲料，亦是优良肥料。

259 爵 床 科 ACANTHACEAE

老鼠簕

*Acanthus ilicifolius* L.

桂南海岸。

全草清热凉血，消肿止痛；治淋巴结核，肝炎，胃痛，哮喘，肝脾肿大。

\* 鸭嘴花 大驳骨

*Adhatoda vasica* Nees

桂林、临桂。

全草散瘀接骨，祛风止痛；治骨折，扭伤，风湿骨痛，肾炎，妇女血崩。作兽药治牛、猪风痰咳嗽，跌打损伤，各种血症。作绿篱植物。

偏肿鸭嘴花 大驳骨、大还魂、大骨节草、黑叶爵床

*A. ventricosa* (Wall.) Nees

(*Justicia ventricosa* Wall.,

*Gendarussa ventricosa* Nees)

桂东南、梧州、邕宁、宁明、龙州、隆林、田林、百色、东兰、巴马、大瑶山。

功同鸭嘴花。

\* 榄核莲 穿心莲、一见喜

*Andrographis paniculata* (Burm.f.) Nees

桂林、南宁、钦州、梧州、玉林等地区。

全草清热解毒，消肿止痛，抗菌消炎；治肠炎，痢疾，喉炎，肺炎，扁桃体炎，结膜炎，疮疡肿毒，蛇伤。

假牛膝☆ 小阿茜达

*Asystasiella neesiana* (Wall.) Lindau

(*Asystasia chinensis* S.Moore)

桂西北、大苗山、兴安、贺县。

根茎止血；治无名肿毒。

\* 马蓝 蓝靛、板蓝根、南板蓝根

*Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek.

(*Strobilanthes flacidifolius* Nees,

*S. cusia* O.Ktze.,

Barleria-Clinacanthus

*Goldfussia cusia* Nees)

大瑶山、龙胜、桂林、田林、凌云、隆林。

根清热解毒，凉血消肿；治热病发斑，咽喉肿痛，肠炎，菌痢，

肝炎，丹毒，吐血，衄血。作为蓝色染料的原料。

假杜鹃

*Barleria cristata* L.

梧州、靖西、百色、田阳、凌云、田林、隆林、乐业、桂林、天峨、东兰。

全草治蛇伤，关节痛。绿化花木。

\*花叶假杜鹃

*B. lupulina* Lindl.

南宁。

全株通经活络，解毒消肿；治毒蛇咬伤，犬咬伤，跌打，痈肿，外伤出血，水煎服。外用鲜叶捣烂敷。

\*麒麟吐珠

*Beloperone gutata* Brandegee

南宁、桂林等市。

绿化花木。

光广东爵床☆

*Chingiacanthus glaber* H.-M.

大苗山。

广东爵床☆

*C. patulus* H.-M.

大瑶山、蒙山、昭平、苍梧、永福、阳朔、容县、靖西。

柔刺草 青箭、小接骨、鸡骨草

*Clinacanthus nutans* (Burm.f.) Lindau

博白、陆川、北流、宁明、扶绥、邕宁、大苗山。

Codonacanthus-Gutzlaffia

全草活血调经，散瘀消肿；治跌打骨折，贫血，黄疸，风湿。

钟刺草

*Codonacanthus pauciflorus* Nees

昭平、贺县、苍梧、藤县、容县、阳朔。

穗序钟刺草☆

*C. spicatus* H.-M.

大瑶山、大苗山。

狗肝菜

*Dicliptera chinensis* Nees

临桂、桂林、柳城、靖西、贵县、玉林、昭平、贺县、钟山。

全草清热利尿，凉血消肿；治感冒，肺热咳嗽，结合膜炎，黄疸

肝炎，疖肿，风湿痛。作兽药治牛、猪肝胆火旺，癰疮大热，

流感，疮疽，骨节肿痛。苗、叶可作蔬菜。

\*可爱花

*Eranthemum nervosum* R.Br.

桂林。

绿化花木。叶治跌打。

多花可爱花☆

*E. polyanthum* C.B.Clarke

龙州、横县。

异毛金竹草

*Goldfussia dimorphotricha* (Hance) Bremek.

(*Strobilanthes dimorphotrichus* Hance)

阳朔、三江。

野格拉菲

*Gutzlaffia aprica* Hance

武鸣。

半柱花

*Hemigraphis procumbens* (Lour.) Merr.

容县。

全草消肿止痛，止血生肌；治跌打，痢疾。

水蓑衣 墨菜

*Hygrophila salicifolia* (Vahl) Nees

桂林、兴安、贺县、苍梧、昭平、梧州、百色、陆川。

全草健胃消食，散瘀消肿；治骨折，劳伤，跌打，消化不良，乳腺炎，咽喉炎，无名肿毒，蛇伤。作兽药治牛、猪反胃吐草，乳疮，咽喉肿痛。

\*岩水蓑衣☆ 南天仙子

*H. saxatilis* Ridl.

南宁（栽培）。

种子镇痉止痛；治癫痫，抽搐，喘咳，胃痛等。

刀枪药 红丝线

*Hypoestes purpurea* (L.) Soland.

柳城、柳州、凌云、乐业、阳朔。

全草散瘀止血，止咳；治肺结核咳血，支气管炎，跌打刀伤。

驳骨丹 小接骨、小驳骨、接骨草

*Justicia gendarussa* Burm.f.

桂林、忻城、邕宁、南宁、武鸣、上林、龙州、来宾、那坡、田东、田阳、百色、隆林、苍梧。

全草舒筋活络，消肿止痛；治骨折，扭伤，创伤，风湿痛，无名肿毒，蛇伤。

细穗爵床

*J. leptostachys* Hemsl.

马山、忻城。

全草散瘀止血，清热；治骨折，跌打，小儿惊风。

爵床 鼠尾红

*J. procumbens* L.

区内各地。

全草清热解毒，散瘀消滞；治感冒，咽喉肿痛，肝炎，小儿疳积，痈疮，疖肿，乳痈，跌打等。

鳞花草

*Lepidagathis incurva* Don

(*L. hyalina* Nees)

大瑶山、南宁、隆林。

红背草

*Perilepta dyerianus* (Mast.) Bremek.

(*Strobilanthes dyerianus* Mast.)

桂林。

红蓝

*Peristrophe bivalvis* (L.) Merr.

(*P. tinctoria* Nees)

岑溪、三江、兴安。

全草止血去腐；治跌打。叶和嫩茎为橙黄色、橙红色染料原料。

毛脉焰爵床☆

*Phlogacanthus pubinervis* T.Anders.

凌云、乐业、靖西。

蛋黄焰爵床 黄尿草

*P. vitellinus* (Roxb.) T.Anders.

龙州。

茎、叶治黄尿。

小驳骨 钩粉草

*Pseuderanthemum palatiferum* (Wall.) Radlk.

Rhinacanthus-Staurogyne

龙州。

根止血。

白鹤灵芝 癜草

*Rhinacanthus nasuta* (L.) Kurz

(*R. communis* Nees)

钦州、南宁、梧州等地；多为栽培。

枝、叶润肺降火；治肺结核。鲜叶涂治体癣，湿疹，响尾蛇咬伤。

喜栎小苞爵床☆ 芦莉草

*Ruellia drymophila* (Diels) H.-M.

隆林、大瑶山、天峨。

小苞爵床

*R. repens* L.

玉林地区和凤山、武鸣、邕宁、临桂等县。

叶治刀伤，牙痛，腹痛。

明萼草

*Rungia chinensis* Benth.

靖西。

孩儿草

*R. pectinata* (L.) Nees

(*R. parviflora* Nees)

百色、柳州。

全草消积导滞，清热解毒；治小儿疳积，食欲不振，肝炎，急性结合膜炎，感冒，喉痛，颈淋巴结核，痢疾，蛇伤，疖肿。

叉柱花

*Staurogyne chapaensis* R Ben.

平南、蒙山。

Strobilanthes-Callicarpa

异叶紫云菜☆

*Strobilanthes dalzielii* (W.W.Sm.) R.Ben.

var. *inaequalis* R.Ben.

隆林、田林、那坡、大明山、贺县。

叉开紫云菜 清沙草

*S. divaricatus* T.Anders.

大苗山、天峨。

全草治疮疥。

汗斑草

*S. maclarei* Merr.

兴安、荔浦、大瑶山。

全草煎水加密陀僧和铜绿治汗斑有特效（大瑶山）。

大花老鸦嘴

*Thunbergia grandiflora* (Rottl. et Willd.) Roxb.

龙州、宁明、临桂、桂林、阳朔、柳州、梧州。

根破血通经，补气益血；治跌打。

261 苦槛蓝科 MYOPORACEAE

苦槛蓝

*Myoporum bontioides* (S. et Z.) A.Gray

钦州地区海边。

根治肺病。

263 马鞭草科 VERBENACEAE

树紫珠 南洋紫珠

*Callicarpa arborea* Roxb.

宁明、龙州、田东、那坡、田林、凤山。

Callicarpa

叶凉血止血；治血崩，外伤，衄血等。

珍珠枫 毛老鸦糊

*C. bodinieri* Lévl.

平乐、永福、临桂、兴安、全州、天峨、东兰。

根、叶收敛止血，通经活血；治外伤出血，咯血，衄血，月经不调，虚劳白带，风寒头痛，产后血虚痛。根煎水洗眼治眼翳。

老鸦糊

*C. bodinieri* Lévl.

var. *giraldii* (Rehd.) Rehd.

桂林、南丹。

全株解毒，止血；治血崩，疮毒，鹤膝风。

华中老鸦糊☆

*C. bodinieri* Lévl.

var. *lyi* (Lévl.) Rehd.

龙胜、永福、桂林。

川桂老鸦糊☆

*C. bodinieri* Lévl.

var. *rosthornii* (Diels) Rehd.

龙州。

叶治疮疥，跌打。花可提芳香油。

短柄紫珠

*C. brevipes* (Benth.) Hance

梧州、容县、隆林、龙胜、大苗山。

多齿短柄紫珠

*C. brevipes* (Benth.) Hance

var. *dentosa* H.T.Chang

资源、全州。

### 华紫珠

*C. cathayana* H.T.Chang

梧州、龙州、凌云、乐业。

根、叶祛风利湿，散瘀止血；治外伤出血，吐血，咯血，跌打，风湿，热病。

### 白棠子树 水薄荷、小泡树、小叶蜘蛛

*C. dichotoma* (Lour.) K.Koch

区内各地。

叶解毒，止血；治内出血，外出血，痈疽肿毒，蛇伤。作兽药治牛、猪肝胆郁火，目赤胀痛，无名肿毒，小猪白痢。

### 红线紫珠

*C. erythrosticta* Merr. et Chun

田林、凌云、乐业、苍梧、阳朔。

### 全缘叶紫珠

*C. integrifolia* Champ.

大瑶山、十万大山、苍梧。

根、叶祛风；治瘰疬。

### 广东紫珠

*C. kwangtungensis* Chun, ined.

苍梧、贺县、龙胜、资源、兴安、灌阳、阳朔、融安、大苗山、大瑶山、上林、龙州、凌云。

### 尖萼紫珠

*C. lobo-apiculata* Metc.

区内各地。

叶治癣疥。

Callicarpa

白毛长叶紫珠

*C. longifolia* Lam.

var. *floccosa* J.C.Schau.

凌云、乐业、靖西、龙州、天峨、都安、阳朔、恭城。

披针叶紫珠

*C. longifolia* Lam.

var. *lanceolaria* C.B.Clarke

苍梧、马山、大苗山。

长柄紫珠

*C. longipes* Dunn

龙胜、兴安、永福、昭平、梧州、苍梧、东兰、罗城、三江、融安、百色、凌云、乐业、武鸣、贵县、容县。

尖尾枫 枫叶、粘手风

*C. longissima* (Hemsl.) Merr.

靖西、凌云、乐业、南宁、贺县、苍梧、平乐、桂林、三江、柳城。

全株止血镇痛，散瘀消肿，祛风湿；治外出血，内出血，产后风痛，四肢瘫痪，风湿痹痛，跌打损伤，风寒咳嗽，寒积腹痛。

秃尖尾枫

*C. longissima* Merr.

forma *subglabra* Pei

大瑶山、三江、苍梧、蒙山、平南、桂平、十万大山、龙州、德保、凌云、乐业。

叶治刀伤，腹胀。作兽药治牛软脚病，风湿症，缩阳症。

大叶紫珠 郎陆

*C. macrophylla* Vahl

区内各地。

根、叶散瘀消肿，止血；治外出血，内出血，风湿跌打，小儿脱肛。枝、叶茂盛肥厚，可作绿肥。

### 膜叶紫珠

**C. membranacea H.T.Chang**

永福、龙胜、资源、全州。

### 裸花紫珠

**C. nudiflora Hk. et Arn.**

扶绥、邕宁、南宁、宁明、陆川。

功近大叶紫珠。作兽药治牛风湿脚软，跌打损伤，筋络疼痛，风寒咳嗽。

### 杜虹花

**C. pedunculata R.Br.**

上思、博白、容县、贺县。

叶止血镇痛，散瘀消肿；治咳血，吐血、鼻出血。创伤出血，跌打损伤。

### 粤赣紫珠☆

**C. peii H.T.Chang**

全州、临桂、永福、阳朔、恭城、蒙山、贺县、平南、大瑶山、凌云、乐业。

### 红紫珠

**C. rubella Lindl.**

区内各地。

全草驱蛔虫，治疗疮。叶接骨；治骨折，跌打。作兽药治牛跌伤。

### 狭叶红紫珠

**C. rubella Lindl.**

**forma angustata Pei**

隆林、德保、那坡、靖西、龙州、南宁、上林、十万大山、藤县、南丹、桂林。

叶止痒，消瘀，去腐生肌。根治肺痨，风湿，五淋白浊，小儿惊风。

Callicarpa-Clerodendron

钝齿红紫珠 沙药草

*C. rubella* Lindl.

*forma crenata* Pei

贺县、梧州、大苗山、大瑶山、十万大山、龙州、凌云、乐业、都安、兴安。

根或全株清热止血，消肿止痛；治月经不调，痔疮出血，咳血，红白痢，肝炎，跌打。

秃红紫珠

*C. rubella* Lindl.

*var. subglabra* (Pei) H.T.Chang

大瑶山、昭平、容县、平南。

兰香草 走马天风、宝塔草、莸

*Caryopteris incana* (Thb.) Miq.

(*C. mastacanthus* Schau.)

大新、龙州、南宁、邕宁、武鸣、上林、贵县、上思、柳州、桂林、钟山、贺县。

全草祛风利湿，化气行滞；治风湿瘫痪，产后腹痛，月经不调，跌打，蛇伤，气滞胃痛。

圆锥花莸☆

*C. paniculata* C.B.Clarke.

靖西、那坡。

臭牡丹

*Clerodendron bungei* Steud.

(*C. foetidum* Bunge,

*Caryopteris grata* (Wall.) Benth.)

龙胜、大瑶山、隆林。

全草健脾燥湿，理气消积；治虚弱，疝气，头痛，头晕，阳萎，白带，风湿，吐血，疔疮。

大青 路边青、猪屎青、鸭公青

*C. cyrtophyllum* Turcz.

区内各地。

根、叶清热解毒，凉血利尿；治腮腺炎，喉炎，扁桃体炎，牙周炎，菌痢，丹毒，蛇伤。作绿肥，肥效颇高。

齿叶桢桐

*C. divaricatum* Jack

(*C. serratum* (L.) Spreng.)

天峨、河池、东兰、都安、靖西、那坡、隆林、西林、凌云、百色、田林、平果、龙州、上林。

全株驳骨，杀虫，健胃，清心火；治疟疾，痢疾，头痛，眼炎，跌打。

两广桢桐

*C. elachistanthum* Merr. ex H.L Li

十万大山。

红灯笼 苦灯笼、灯笼草

*C. fortunatum* Lindl.

区内各地，南部较多。

根清热解毒，止咳，祛风；治感冒，咽痛，咳嗽，肺病，胃痛，腹痛，疖肿，跌打，风湿。作兽药治牛瘟，猪瘟，流感，热咳，跌打等。

臭茉莉 臭矢茉莉、老虎草、小将军、蜻蜓叶

*C. fragrans* Vent.

柳州、大瑶山、大苗山、融安、恭城、临桂、桂林、兴安、龙州、宁明、靖西、隆林。

根、叶祛风活血，强筋壮骨；治风湿痹痛，高血压，水肿，白带，湿疹。花蒸鸡蛋吃，治头昏。

海南臭茉莉

*C. hainanensis* H.-M.

Clerodendron

龙州、上思。

滇桂臭茉莉☆

*C. henryi* Pei

百色、乐业。

假茉莉 许树

*C. inerme* (L.) Gaertn.

苍梧、北流、容县、平南、贵县、靖西。

根清热解毒，散瘀除湿，舒筋活络；治风湿骨痛，胃痛，疟疾，肝炎，跌打扭伤，癰疥等。木材可作火柴杆用材。

桢桐 贞桐花、状元红

*C. kaempferi* (Jacq.) Sieb.

(*C. squammatum* Vahl)

区内各地。

全草祛风利湿，消肿散瘀；治风湿骨痛，跌打肿痛，咳血，疖肿。

广东臭牡丹

*C. kwangtungense* H.-M.

大瑶山、象州。

根治脚软，风湿。

白灯笼☆ 木常山

*C. mandarinorum* Diels

龙州、隆林、凌云、乐业、百色、那坡、天峨、南丹、大苗山、

大瑶山、临桂、龙胜。

枝、叶治半边风。

大叶白灯笼☆

*C. mandarinorum* Diels

var. *macrophyllum* Chun

龙州、田林、隆林、龙胜、大苗山。

长花龙吐珠 垂茉莉、黑叶龙吐珠

*C. nutans* Wall.

桂林、龙州、靖西。

\*龙吐珠

*C. thomsonae* Balf.

桂林、南宁等市。苍梧、贵县、靖西。

绿化花木。

海州常山

*C. trichotomum* Turcz.

大瑶山、隆林。

根、叶舒筋活血，祛风止痛；治风湿痛，高血压，皮炎，腹泻。

枝叶作农药能杀红蜘蛛、棉蚜虫和地下害虫。

狮子球 人瘦木

*C. viscosum* Vent.

区内各地。

全草退热止痛，治毒疮，风湿。

\*假连翘

*Duranta repens* L.

桂林、临桂。

绿化花木。根、叶止痛，止渴。

亚洲石梓☆

*Gmelina asiatica* L.

龙州。

根止痛，止渴。

石梓 铁商木、蛇头花

*G. chinensis* Benth.

南宁、田阳、凌云、乐业、大苗山。

Gmelina-Premna

毛石梓☆

*G. villosa Roxb.*

南宁、宁明、田阳、大苗山。

\*冬红花

*Holmskioldia sanguinea Retz.*

桂林。

绿化花木。

马缨丹 五色梅、臭草、如意草

*Lantana camara L.*

区内各地。

根、叶、花清热解毒，祛风止痒；治感冒，腮腺炎，肺结核咳血，湿疹，风湿，跌打，淋巴结核。根、花作兽药治牛、猪肺结核，湿热臌胀，皮炎，疮疖等。

过江藤 苦舌草

*Lippia nodiflora (L.) Michx.*

平果、隆林、西林、天峨、上林、邕宁、贵县。

全草清热解毒；治痢疾，牙疳，喉炎，疗毒，痈疽，跌打刀伤，心气痛。

大叶豆腐木

*Premna cavaleriei Lévl.*

南丹、东兰、凌云、乐业、隆林、田林、龙州、容县、临桂。

近邻豆腐木☆

*P. confinis Pei et S.L.Chen*

龙州、大新、那坡、隆林、凤山。

叶外用治关节肿。

细柄豆腐木☆

*P. filipes Chun, ined.*

全州。

黄毛豆腐木☆

*P. fulva* Craib

(*P. crassa* H.-M.)

龙州、天峨。

小豆腐木☆

*P. herbacea* Roxb.

宁明。

根治泄泻。

臭豆腐木☆

*P. integrifolia* L.

河池。

全株治风湿。

女贞豆腐木☆

*P. ligustroides* Hemsl.

罗城。

全株清热祛风，除湿；外用解毒。

长毛豆腐木☆

*P. longipila* Pei

隆林。

叶接筋。

豆腐木    臭辣树、鸡屎泡、雀儿子树

*P. microphylla* Turcz.

龙州、隆林、河池、大苗山、融安、龙胜、兴安、全州、临桂、

桂林、永福、贺县、苍梧。

根、叶清热解毒，收敛止血；治痢疾，头痛，无名肿毒，外出血。

疟疾，跌打，蛇伤。作兽药治牛胀胆。

中南豆腐木☆

*P. peii* Chun ex H T Chang

Premna-Tsoongia

上思、大瑶山、苍梧。

微毛豆腐木☆

*P. puberula* Pamp.

那坡、凌云、乐业、隆林。

茎、叶治眼膜，疮疥。

信宜豆腐木☆

*P. sunyiensis* Pei

宁明、上林、大明山。

全株治热症。作兽药治牛关节肿大疼痛，虫积消瘦，痰涎壅盛，

寒湿泄泻。

四棱草

*Schnabelia oligophylla* H.-M.

贵县、贺县、柳城。

全株活血通经；治闭经。

假败酱 玉龙鞭

*Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl

扶绥、柳州。

全草清热解毒，消肿止痛；治跌打肿痛，疮疡疖肿，结膜炎，疟

疾，蛇伤。作兽药治牛、猪痈疽肿毒，痰多喘咳，湿热下痢。

\*柚木

*Tectona grandis* L.f.

北流、南宁、凭祥等地有引种。

为世界著名材用树种之一。木材耐久不腐，坚硬，但又易于加工；

作栋梁、桥梁、船只、房屋、家具、枕木、楼板等用材。花和种子利尿。

假紫珠☆

*Tsoongia axillariflora* Merr.

大瑶山。

马鞭草

*Verbena officinalis* L.

区内各地。

全草凉血散瘀，清热解毒，利尿消肿；治高热，经闭，产后瘀阻，痢疾，水肿，痈疖，疥癣，湿疹，肝炎，疝气，血淋。作兽药治牛、猪产后瘀血不行，胎衣不下，血痢，跌打肿痛，痈疮疗毒，皮肤疥癣，腹水及全身水肿。

\*彩花马鞭草

*V. phlogiflora* Champ.

桂林。

绿化花卉。

灰布荆

*Vitex canescens* Kurz

桂西南。

光叶灰布荆

*V. canescens* Kurz

*forma subglabra* Pei

靖西、南丹。

广西布荆☆

*V. kwangsiensis* Pei

龙州。

贵州布荆

*V. kweichowensis* Pei

宁明、龙州、靖西、凌云、乐业、巴马、龙胜。

黄荆

*V. negundo* L.

区内各地。

叶解表发汗，化湿浊；根祛风除湿，利关节；种子行气止咳；治感冒，痢疾，疳积，胃肠炎，哮喘，胃痛，便秘，淋病，风湿脚气等。作兽药治牛臌胀，水泻，软脚，喉风，泻血，难产，霍乱，伤寒，慢性炭疽，猪丹毒。茎皮纤维造纸和制人造棉。枝条编制篮子、箩筐、爹箕等用具。种子油可制肥皂。花和叶可提芳香油。果实可代茶叶用。是良好的绿肥。蜜源植物。木材耐久，不受白蚁之害，可作家具、细工用材。夏天可用枝叶薰蚊。

### 山牡荆

*V. quinata* (Lour.) F.N.Will.

(*V. heterophylla* Roxb.)

龙州、藤县、平南、凌云、乐业、河池、罗城、大瑶山、永福、临桂。

根止咳定喘，镇静退热；治气管炎，哮喘，气促，疳积，风湿，跌打。木材为建筑桥梁适宜用材，干燥时不反翘，白蚁侵害少。

### 单叶蔓荆 白布荆

*V. rotundifolia* L.

(*V. trifolia* L. var. *ovata* Makino,

*V. trifolia* L. var. *unifoliolata* Schau)

临桂、宁明、灵山。

功用同蔓荆。

### 小叶布荆

*V. sampsonii* Hance

梧州、贵县。

### 蔓荆

*V. trifolia* L.

容县、龙州、龙胜。

果实疏散风热。叶消肿止痛；治刀伤。作兽药，治牛、猪风热感冒，鼻流清涕，目昏赤肿，破伤风及拘挛痹痛等症。

### 大叶布荆

*V. vestita* Wall.

凌云、乐业、百色。

## 263A 透骨草科 PHRYMACEAE

### 透骨草

*Phryma leptostachya* L.

桂西北。

全草清热解毒，祛风活血；治风湿痹痛，筋骨拘挛，疥疮，难产。

## 264 唇形科 LABIATAE

### 尖头花

*Acrocephalus indicus* (Burm f.) O Ktze.

(*A. capitatus* Benth.)

西林、梧州。

### \*藿香

*Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.) O.Ktze.

灵川。

全草清暑化湿，和胃止呕；治暑湿发热，头痛呕恶，胸闷腹泻，妊娠呕吐，风湿骨痛，皮肤湿疹。茎、叶可提取芳香油，是调配香精的原料，也是名贵香料之一。种子油可制肥皂和油漆等。叶可代茶用。

### 筋骨草 青鱼胆

*Ajuga decumbens* Thb.

隆林、柳州、桂林等地。

全草清热解毒，凉血降压；治发热，高血压，目赤肿痛，痈肿疮

Ajuga-Brunella

毒，支气管炎，肺炎，扁桃体炎，跌打肿痛，骨折，烫火伤。  
欧筋骨草

*A. genevensis* L.

功用近筋骨草。

大筋骨草

*A. pallescens* (Maxim.) Price et Metc.

(*A. decumbens* Thb.

var. *pallescens* (Maxim.) H.-M.)

百色。

\*肉质异唇花

*Anisochilus carnosus* (L.) Wall.

南宁。原产印度。

根茎治水肿。

防风草 移草

*Anisomeles indica* O.Ktze.

(*A. ovata* R.Br.)

区内各地。

全草祛风发表，行气消滞；治风湿骨痛、风寒感冒，呕吐腹泻，

皮肤湿疹，虫蛇咬伤。作兽药，治小猪白痢，猪感冒发热，痰喘咳嗽，腹泻，牛臌胀症。嫩茎、叶可作绿肥。

夏枯草

*Brunella vulgaris* L.

区内各地。

花序清肝明目，散结解毒，降血压；治肝火上升，高血压，头痛，目赤，眼花，耳鸣，瘰疬，痈疮肿毒。作兽药，治猪瘟，猪丹毒，牛痘疾。全草代茶，有清凉利尿作用。干花炒过代茶，可治咳嗽。本属亦名*Prunella*。

风轮菜 夜偏头草、野鱼腥草

*Calamintha chinensis* Benth.

全州、兴安、灌阳、临桂、桂林、龙胜、大苗山、凤山、德保、那坡、隆林、扶绥、横县、贵县等地。

全草清热解毒，活血消肿；治肝炎，胆囊炎，痢疾，腮腺炎，肠炎，血尿，结膜炎，乳腺炎，刀伤，蛇伤，犬咬伤，痔疮，小儿疳积。

瘦风轮菜 塔花、宝塔菜

*C. gracilis* Benth.

(*C. confinis* Hance,

*Satureia gracilis* (Benth.) Nakai)

全州、临桂、大苗山、贺县、梧州、武鸣、凌云、隆林等地。

全草治痢疾，乳痈，血崩。猪饲料。

多头花塔草

*C. polycephala* Van.

兴安。

\*肾茶

*Clerodendanthus spiralis* (Lour.) C.Y.Wu

(*Orthosiphon spirale* (Lour.) Merr.)

南宁。

全草清热利湿，排石；治肾炎，膀胱炎，尿路结石，风湿关节炎。

\*彩叶紫苏

*Coleus blumei* Benth.

常栽作庭园绿化植物。

叶治蛇伤。

肉叶鞘蕊花

*C. carnosifolius* (Hemsl.) Dunn

(*Plectranthus carnosifolius* Hemsl.)

Coleus-Dysophylla

平南、贵县。

全草治疮疖。

南鞘蕊花

*C. esquirolii* Dunn

(*Calamintha esquirolii* Lévl.)

靖西。

小彩叶紫苏 小洋紫苏

*C. pumilus* Blanco

桂南。

常栽植作庭园绿化植物。

毛水珍珠菜

*Dysophylla auricularia* (L.) Bl.

(*Mentha auricularia* L.)

陆川、藤县、贺县、南宁、武鸣、大明山、那坡、凌云、宜山等地。

全株祛风热；治老人小孩盗汗，烂皮疮，沙虫。

水箭草

*D. benthamiana* Hance

(*D. verticillata* (Roxb.) Benth.)

临桂、柳州、宜山、上思。

全株散血毒；治皮肤红肿。

中间水箭草

*D. benthamiana* Hance

var. *intermedia* C Y. Wu et Hsuan

十万大山。

斑叶水珍珠菜

*D. sampsonii* Hance

桂林、阳朔、富川。

红荆芥

*Elsholtzia argyi* Lévl.

(*E. cristata* Willd.)

陆川、容县、兴安、恭城、大瑶山、那坡。

白香薷 滇香薷

*E. blanda* Benth.

靖西、那坡、百色、东兰。

叶、花清热，解毒，消炎，利尿；治急慢性肾盂肾炎，肾炎，感冒，小儿疳积，腋臭。茎叶含芳香油。

吉龙草

*E. communis* (Coll. et Hemsl.) Diels

(*Dysophylla communis* Coll. et Hemsl.)

宣山、靖西、那坡。

全草发汗解表，清热解毒；治感冒，疔疮，鼻渊。

鸡骨柴

*E. fruticosa* (D. Don) Rehd.

(*E. polystachya* Benth.)

桂西。

茎、叶含芳香油。

香薷(注)

*E. patrini* (Lep.) Garcke

(*Mentha patrini* Lep.)

昭平。

注：据《中药志》第三卷153页(1960年版)记载，市场上以海州香薷

*E. haichowensis* Sun作为香薷正品。

全草发汗解暑，利湿行水；治伤暑头痛，发热恶寒，全身水肿。

茎、叶含芳香油。种子炒熟后，可掺和玉米粉食用；又可榨油供食用，或供照明、制皂等用。油饼为良好饲料。

### 细皱香薷

*E. rugulosa* Hemsl.

龙州。

叶含芳香油。全草治烂疮。蜜源植物。

### 假水苏☆

*E. stachyodes* (Link.) C.Y.Wu

(*E. incisa* Benth.)

临桂、灵川。

茎、叶含芳香油。

### 扫把菜

*E. yunnanensis* C.Y.Wu

凌云。

茎、叶含芳香油。

### 假野芝麻

*Galeobdolon chinense* (Benth.) C.Y.Wu

(*Lamium chinense* Benth.)

柳州、临桂、桂林。

### 块根假野芝麻

*G. tuberiferum* (Mak.) C.Y.Wu

桂林。

### 阳朔假野芝麻

*G. yangsoense* Sun

阳朔。

活血丹(注) 连钱草、透骨消

*Glechoma longituba* (Nakai) Kupr.

(*G. hederacea* auct., non L.,

*G. hederacea* L. var. *longituba* Nakai)

区内各地。

全草活血通经，祛风去湿；治跌打，骨折，尿路结石，风湿，疳积，黄疸，小儿惊风，痛经、吐血。

中华锥花 棒红花

*Gomphostemma chinensis* Oliv.

苍梧、藤县、昭平、大瑶山、南丹、田林、凌云、恭城。

全株补气血；治气血衰弱。

长毛锥花 大棒红花

*G. crinitum* Wall.

百色。

宽叶锥花

*G. latifolium* C.Y.Wu

东兴、十万大山。

细齿锥花

*G. leptodon* Dunn

龙州。

全株治烫火伤。

注：苏联 Kuprianova 建立 *Glechoma brevituba* Kupr. 与 *Glechoma longituba* (Nakai) Kupr. 二个种，其主要区别是前者花冠长约1.3—1.5厘米；后者花冠长1.8—2.5厘米，花冠管狭长，伸出尊管以外。但我們实际观察后，发现同一活血丹新鲜植株上二种情况同时并存，甚至在同一节腋生的花中，一朵花冠长，另一朵花冠短，所以，我們認為Kupr. 建立的这二个种极可能是同一种植物。

Gomphostemma-Leonurus

光泽锥花 瓜子菜

*G. lucidum* Wall.

容县、苍梧、大苗山、隆林。

假长毛锥花

*G. pseudo-crinitum* C.Y.Wu

凌云。

曲折罗香草

*Hanceola flexuosa* C.Y.Wu et H.W.Li

兴安、大瑶山。

假走马风

*Hyptis decurrens* (Blanco) Epling

南宁(栽培)。

山香 毛老虎

*H. suaveolens* (L.) Poir.

陆川、玉林、北流、贵县、桂平、平南、桂林、百色。

全草祛风解表，散瘀止痛；治跌打，刀伤，感冒，头痛，胃肠胀气，皮肤湿疹。

动蕊花

*Kinostemon ornatum* (Hemsl.) Kudo

(*Teucrium ornatum* Hemsl.,

*Orthosiphon delavayi* Lévl.)

罗城。

益母草

*Leonurus heterophyllus* Sweet

(*L. sibiricus* auct., non L.)

区内各地。

全草祛瘀生新，活血调经；治月经不调，产后瘀阻，头晕腹痛。

种子(中药茺蔚)活血调经，凉肝明目；治目赤肿痛，高血压。

全株作兽药，治牛、猪产后瘀积，胎衣不下，恶露不清，崩漏不止，是产科要药，又治跌打积瘀；茺蔚子治肝热目痛和水肿。种子油可作润滑油等用。茎、叶可作农药。

白花益母草

*L. heterophyllus* Sweet

forma *leucanthus* C.Y.Wu et H.W.Li

(*L. sibiricus* L.)

var. *albiflorus* Migo)

兴安、阳朔、陆川。

毛绣球防风

*Leucas mollissima* Wall.

梧州、藤县、龙州、东兰。

全株治疗疮。

顶序绣球防风☆

*L. zeylanica* (L.) R.Br.

(*Phlomis zeylanica* L.)

大瑶山、龙州。

全草祛风解表，化痰止咳；治感冒，咳嗽，风火牙痛，肠胃不适，百日咳。

银条菜 欧地瓜儿苗

*Lycopus europaeus* L.

全州。

全草接骨，调经。

地笋 泽兰、地瓜儿苗

*L. lucidus* Turcz.

var. *hirtus* Regel

兴安、龙胜、临桂。

全草行血，利尿，疏肝解郁；治月经不调，瘀血腹痛，身面浮肿。

## Meehania-Microtoena

跌打，肾炎水肿，产后小便淋沥。根可食，亦可提取淀粉。  
茎、叶可作猪饲料。

### 疏麻菜

*Meehania fargesii* (Lévl.) C.Y.Wu  
var. *pedunculata* (Hemsl.) C.Y.Wu

资源、大苗山、罗城。

### 薄荷

*Mentha arvensis* L.

栽培或野生，见于临桂、桂林、柳州、龙州、靖西等地。

全草疏解风热，清利头目；治风热感冒，咽喉肿痛，麻疹初起，  
眼红肿痛，口疮，牙痛，皮肤湿疹。作兽药，治家畜风热流感，  
咽喉肿痛，斑痧热症，牛臌胀症。茎、叶含薄荷油，用于  
提取薄荷脑，以及供糖果、饮料、牙膏、香精、清凉油等用。  
干茎、叶亦常供清凉食品、饮料等用。

### 野薄荷

*Mentha haplocalyx* Briq.

兴安、桂林、钟山、大瑶山、贵县、北流、陆川、南宁。

功用同薄荷，但质量较次。

### 凉粉草

*Mesona chinensis* Benth.

贺县、苍梧、岑溪、容县、博白、陆川等地。

全草清热解暑，凉血利尿；治感冒，关节炎，高血压，肾炎，跌打。茎、叶可制凉粉，即枝、叶的水煮液和米浆煮熟，冷却后即成，是华南夏季的一种清凉食品。

### 毛冠唇花

*Microtoena mollis* Lévl.  
(*M. insuavis* Prain ex Dunn)

隆林。

近穗状冠唇花

*M. subspicata* C.Y.Wu

隆林。

全缘萼

*Nosema cochinchinensis* (Lour.) Merr.

(*Goniosporum holocheilum* Hance,

*Mesona prunelloides* Hemsl.,

*Nosema prunelloides* (Hemsl.) C.B.Clarke,

*N. holocheilum* (Hance) Kudo)

北海、合浦、博白。

花清肝火，散郁结；治痈肿疮毒，目赤肿痛，瘰疬。

鸭香草 罗勒、五香草

*Ocimum basilicum* L.

平乐、临桂、大瑶山、桂平、武鸣等地。

全草、种子祛风消肿，散瘀止痛，疏风解表；治胃肠胀气，头痛，

胸痛，肠炎腹泻，风湿，跌打，皮炎。种子治眼疾。茎、叶、

花穗可提取芳香油，是调香原料，用于皂用、牙膏、食用等香精。苗、叶亦作烹饪调味香料。

●丁香罗勒

*O. gratissimum* L.

功用近罗勒。茎、叶、花穗含芳香油，可提取丁香酚，用于食用，皂用、牙膏等香精。

回香草

*O. sanctum* L.

贺县、大瑶山。

功用近罗勒。茎、叶作食用香料。

牛至 土茵陈

*Origanum vulgare* L.

Orthodon

临桂、柳州、贵县、博白等地。

全草清热利湿，理气和胃；治湿热黄疸，水肿，热泻，疳积，呕吐。全株可提芳香油，供调配香精和酒曲配料。嫩芽、叶供烹调香料用。

小叶芥苧

*Orthodon cavaleriei* (Lévl.) Kudo

(*Mosla cavaleriei* Lévl.)

平南。

全株散寒发表，止血；治感冒，刀伤出血。

细叶芥苧 土香薷、华荆芥、痧药儿、蚊子草

*O. chinensis* (Maxim.) Kudo

(*Mosla chinensis* Maxim.)

区内各地。

全草祛风发表，清暑利湿，行气消肿；治感冒头昏，黄疸，小儿惊风。茎、叶含芳香油，又可熏蚊。

芥苧 热痱草

*O. diantherus* (Buch.-Ham.) H.-M.

(*Mosla dianthera* (Buch.-Ham.) Maxim.)

临桂、昭平、岑溪、桂平等地。

全草散寒发表，祛风止痒；治感冒发热，皮肤湿疹，搔痒，热痱。作兽药，治牛、猪感冒发热，外洗湿疹、搔痒。

长苞芥苧 土荆芥

*O. longibracteatus* C.Y.Wu et Hsuan

兴安。

粗糙芥苧 石芥苧、沙虫药

*O. scaber* (Thb.) H.-M.

(*Ocimum scabrum* Thb., non L.f.)

*Orthodon punctatum* (Thb.) Kudo,

*O. punctulatus* Ohwi,

*O. lanceolatus* (Benth.) Kudo,

*Mosla lanceolata* Maxim.)

全州、临桂、梧州、南宁、龙州、德保、那坡。

全草祛风，退热，下气。又含芳香油，可供调制香精用。

两广直管花 当芽

*Orthosiphon marmoritis* (Hance) Dunn

(*Plectranthus marmoritis* Hance)

全州。

全草治蛇伤。

海南深红直管花

*O. rubicundus* Benth.

var. *hainanensis* C.Y.Wu et Hsuan

宁明。

短齿白毛假糙苏

*Paraphlomis albida* H.-M.

var. *brevidens* H.-M.

(*P. albiflora* auct., non (Hemsl.) H.-M.,

*P. albida* auct., non H.-M.)

容县。

短叶假糙苏

*P. brevifolia* C.Y.Wu

罗城。

罗甸纤细假糙苏

*P. gracilis* Kudo

var. *lutienensis* (Sun) C.Y.Wu

Paraphlomis

(*P. lutienensis* Sun,

*P. albiflora* auct., non (*Hemsl.*) H.-M.

凌云。

长叶假糙苏 罗城假糙苏

*P. lanceolata* H.-M.

罗城。

无柄长叶假糙苏

*P. lanceolata* H.-M.

var. *sessilifolia* H.-M.

龙胜、大苗山、大瑶山、罗城。

少刺毛假糙苏

*P. paucisetosa* C.Y.Wu

凌云。

假糙苏

*P. rugosa* (Benth.) Prain

(*Phlomis rugosa* Benth.,

*Lamium longipetiolata* Hay.)

百色、都安、南丹、贺县、容县。

狭叶假糙苏

*P. rugosa* (Benth.) Prain

var. *angustifolia* C.Y.Wu

苍梧、藤县、大瑶山、凌云。

小叶假糙苏

*P. rugosa* (Benth.) Prain

var. *coronata* (Van.) C.Y.Wu

(*Lamium* ? *coronatum* Van.,

*Phlomis rugosa* auct., non Benth.,  
*Lamium gesneroides* Hay.,  
*Paraphlomis albiflora* auct., non Hemsl.,  
*P. rugosa* auct. plurim, quoad specim. subtrop.,  
non (Benth.) Prain)

全州、兴安、恭城、临桂、昭平、容县、大瑶山、融安、大苗山、  
那坡、田林、凌云、隆林、凤山、宁明。  
全草润肺止咳，补血调经；治痨咳，月经不调。

### 刺萼假糙苏

*P. seticalyx* C.Y.Wu

兴安、龙胜、大苗山、大瑶山、十万大山。  
梗、叶、种子理气，宽胸，解郁，安胎。

### 白苏

*Perilla frutescens* (L.) Britt.

(*Ocimum frutescens* L.,

*Perilla ocymoides* L.)

区内各地。

功用近紫苏，可代用，参阅紫苏。

### •紫苏

*P. frutescens* (L.) Britt.

var. *crispa* (Thb.) Decne.

(*P. nankinensis* (Lour.) Decne.)

区内各地。

叶发汗散寒，行气解毒；治风寒感冒，鱼蟹中毒吐泻。枝(苏梗)  
顺气安胎；治胎动不安。种子(苏子)降气平喘，消痰止咳；  
治咳嗽痰多。种子油为干性油，可涂金属、木材、雨伞、油纸、  
器皿等，又有防腐作用，可作酱油等的防腐剂。又可食用，亦

Plectranthus:

可供制肥皂、油墨等。油饼为良好的牲畜饲料。茎、叶可提芳香油，用于调合香精和作糖果食品香料。所含紫苏醛可制成紫苏糖，有甜味，甜度大于砂糖。叶可食用，和肉共煮，可增加香味。茎、叶、果作兽药，治牛咳嗽，水泻，斑麻症，风寒食积，猪丹毒，肚痛等症。

皱薄荷 南薄荷、腺花香茶菜

*Plectranthus adenanthus* Diels

桂林、苍梧、玉林、容县。

根健脾利湿，理气和胃；治吐泻，食积饱胀，痢疾。

香茶菜 蛇总管

*P. amethystoides* Benth.

(*P. sinensis* Miq.)

兴安、龙胜、平乐、蒙山、昭平、容县、北流、柳州、大苗山、隆林、德保。

茎、叶散瘀消肿，清热解毒；治跌打肿痛，毒蛇咬伤。

脉叶香茶菜 蓝花柴胡、大叶蛇总管

*P. nervosus* Hemsl.

(*P. mosifolius* Lévl.)

全州、岑溪。

茎、叶清热解毒，防湿消肿；治肝炎，蛇伤，脓疮疖，湿疹。

四方草

*P. stracheyi* Benth.

(*P. veronicifolius* Hance)

龙胜、十万大山。

线纹香茶菜 溪黄草

*P. striatus* Benth.

龙胜、临桂、罗城、柳州、苍梧、贺县。

全草清热利湿，凉血散瘀；治肝炎，胆囊炎，跌打瘀肿。

细叶香茶菜 伤寒头、三姐妹

*P. ternifolius* D.Don

(*Elsholtzia lychnitis* Lévl.)

区内各地。

全草发散风寒，消肿止痛；治流感，蛇伤，刀伤，牙痛。

\*广藿香

*Pogostemon cablin* (Blanco) Benth.

栽培作香料和药物。

全草发表，和中，行气，化湿，解暑；治伤寒头痛，胸腹满闷，

呕吐泄泻。茎、叶可提取广藿香油，是优良的定香剂，又可调合香精。

光刺蕊草

*P. glaber* Benth.

东兴、容县、苍梧、阳朔、大瑶山、融安、河池。

长叶钩子

*Rostrinucula sinensis* (Hemsl.) C.Y.Wu

(*Leucosceptrum sinensis* Hemsl.,

*L. bodinieri* Lévl.,

*Elsholtzia cavaleriei* Lévl. et Vent.)

兴安。

鼠尾草

*Salvia japonica* Thb.

(*S. fortunei* Benth.,

*S. chinensis* Benth.)

龙胜、融安、柳州、凌云、隆林、苍梧、武鸣、十万大山。

根治风湿、神经痛，产后流血过多。

Salvia-Scutellaria

丹参

*S. miltorrhiza* Bunge

桂林。

根活血祛瘀，调经止痛；治月经不调，行经腹痛，痈肿疮毒，心跳不眠，症瘕，风湿痹痛。

雪见草 麻婆菜

*S. plebeia* R.Br.

临桂、桂林、柳州、南宁、那坡、平果、隆林。

全草祛瘀消肿，凉血解毒；治咽喉肿痛，无名肿毒，肾炎水肿，

膀胱结石，血崩，下肢溃疡，蛇伤。种子油可制肥皂、油漆。

全草作农药，可防治棉蚜、螟虫、守瓜、菜青虫等。

假鼠尾草

*S. prionitis* Hance

龙胜、兴安、大苗山、乐业、隆林、武鸣。

\*一串红 象牙红、西洋红

*S. splendens* Sello

常栽培供庭园绿化用。

荆芥

*Schizonepeta tenuifolia* Briq.

全州、兴安、龙胜。

全草解表，祛风，理血，炒黑止血；治风寒感冒，麻疹初起，扁桃体炎，鼻血，产后血晕，便血。

半枝莲 狹叶韩信草

*Scutellaria barbata* D.Don

(*S. rivularis* Wall.)

全州、龙胜、临桂、桂林、灵川、大瑶山、藤县、南宁等地。

全草清热解毒，凉血消肿；治癌症，肝炎，蛇伤，无名肿毒，经

闭，阑尾炎。

退色黄芩

*S. discolor* Colebr.

隆林。

全草治疮疖。

两广耳挖草

*S. grossescrenata* Merr. et Chun

龙胜。

耳挖草 韩信草、大力草

*S. indica* L.

临桂、桂林、龙胜、大苗山、柳州、东兰、凌云、南宁、武鸣、  
贵县、桂平、梧州等地。

全草舒筋活络，散瘀止痛，利湿；治跌打，四肢麻木，饱胀，黄疸，  
头晕，咳嗽。根或全草作兽药；治牛、猪风湿，跌打，劳伤干  
咳，蛇伤，喉部化脓等症。

海南耳挖草

*S. javanica* Jungh

苍梧。

光柄筒冠花

*Siphocranion nudipes* (Hemsl.) Kudo

(*Plectranthus nudipes* Hemsl.,

*Hancea nudipes* (Hemsl.) Dunn)

龙胜。

地蚕 白冬虫草、土冬虫草

*Stachys geobombycis* C.Y.Wu

(*S. aspera* auct., non Michx.,

Stachys-Teucrium

S. kouyanensis auct., non (Van) Dunn,

S. arrecta auct., non Bailey)

临桂、柳州、桂平、苍梧、玉林、宁明。

白花地蚕

S. geobombycis C.Y.Wu

var. alba C.Y.Wu et H.W.Li

全州。

根清热补虚；治肺病久咳。

细柄水苏☆ 香草

S. oblongifolia Benth.

var. leptopoda (Hay.) C.Y.Wu

(S. leptopoda Hay.,

S. oblongifolia Benth.

forma leptopoda (Hay.) Kudo)

阳朔、柳州、扶绥、宁明。

二齿香科

Teucrium bidentatum Hemsl.

(T. bidentatum Hemsl.

var. purpureum Diels,

Kinostemon bidentatum (Hemsl.) Kudo,

Plectranthus hanceiformis Lévl.)

南丹。

锦毛穗花香科☆

T. japonicum Willd.

forma lanatum Sun

兴安。

庐山香科

*T. pernyi* Fr.

(*T. ningpoense* Hemsl.,

*Kinostemon ningpoense* (Hemsl.) Kudo,

*K. pernyi* (Fr.) Kudo

var. *ningpoense* (Hemsl.) kudo)

临桂、桂林。

长毛香科

*T. pilosum* (Pamp.) C.Y.Wu et Chow

(*T. japonicum* Willd.

var. *pilosum* Pamp.)

南丹。

铁轴草 山薄荷、四列石蚕

*T. quadrifarium* Buch.-Ham.

(*T. fulvo-aureum* Lévl.,

*T. kouytchouense* Lévl.)

资源、龙胜、灵川、临桂、昭平、贺县、大苗山、大瑶山、南丹、东兰、邕宁。

全草清热解毒，止痛；治感冒头痛，跌打。

血见愁 山藿香

*T. viscidum* Bl.

(*T. stoloniferum* Roxb.,

*T. philippinensis* Merr.)

龙胜、临桂、桂林、大瑶山、罗城、凌云、田林、大明山、龙州、十万大山。

全草散瘀消肿，止血止痛；治跌打，吐血，鼻血，蛇伤，疮肿。

Teucrium

根作兽药；治牛、猪跌打，外伤出血，衄血，尿血，便血，可内服外敷；外敷治蛇伤，疮痈恶毒。

大唇血见愁

*T. viscidum* Bl.

var. *macrostaphanum* C.Y.Wu et Chow

田林。





# 中名索引

黑体字是正名，宋体字是别名。

## 一 笔

- 一匹绸 ..... 670  
一见喜 ..... 699  
**一片红** ..... 222  
一朵云 ... 121, 642  
一块瓦 ..... 58  
**一串红** ..... 736  
一串珍珠 ..... 694  
一刺两口 ..... 467  
**一枝黄花** ..... 642  
一柱香 ..... 631  
**一点红** ..... 628  
一品红 ..... 222  
一粒金丹 ..... 82  
**一碗泡** ..... 78  
一摸消 ..... 587

## 二 笔

[一]

- 二列叶柃** ..... 148  
二色菠萝蜜 ... 369  
**二色琼楠** ..... 16  
**二花耳草** ..... 587  
**二齿香科** ..... 738  
**二歧蓼** ..... 90  
**二籽扁蒴藤** ... 411

- 二裂狸藻** ..... 687  
二裂解宝叶 ... 187  
**丁香罗勒** ..... 729  
**丁香蓼** ..... 113  
**丁葵草** ..... 334  
**十大功劳** ..... 47  
**十万大山润楠** 31  
**十万锦香草** ... 178  
**十字花科** ..... 68  
**十萼花** ..... 405  
**十萼茄** ..... 664  
**七十二枝花** ... 627  
**七爪龙** ..... 673  
**七叶树科** ..... 457  
**七叶莲** ..... 489  
**七加皮** ..... 489  
**七里明** ..... 621  
**七姐妹** ..... 261  
**七姐妹** ..... 201  
**七姐妹藤** ..... 49  
**七指莲** ..... 139  
**七娘藤** ..... 563  
**七裂悬钩子** ... 269
- 〔二〕
- 八月瓜 ..... 49  
**八叶牛皮消** ... 565  
八百力 ..... 219
- 八角** ..... 8  
**八角枫** ..... 479  
**八角枫科** ..... 479  
**八角科** ..... 6  
**八角莲** ..... 46  
**八角莲** ..... 46, 47  
**八角樟** ..... 19  
**八角鞘花寄生** 414  
**八宝树** ..... 110  
**八脉粗叶木** ... 582  
**人心果** ..... 513  
**人心药** ..... 241  
**人苋** ..... 212  
**人参归** ..... 492  
**人面子** ..... 470  
人哥(壮音) ... 182  
人瘦木 ..... 713  
入地金牛 ..... 446  
**入地蛇** ..... 497  
入地麝香 ..... 8  
九丁树 ..... 376  
九牛力 ..... 428  
**九节** ..... 593  
**九节风** ..... 63  
九节茶 ..... 63  
九龙胆 ..... 56  
九龙盘 ..... 94, 95  
九龙藤 ..... 281

九重葛	117
九里明	641
九里香	442
九层风	330
九层皮	14, 199
九莲灯	428
九眼独活	483
儿茶	275

[ 7 ]

了刁竹	570
了哥王	116
了哥脚	522
刀豆	295
刀枪药	702
刀枪木	593

三 筆

[ 一 ]

三十六荡	574
三七	489
三小叶山豆根	311
三叉苦	439
三叉虎	439
三叉树	115
三叉榕	379
三月泡	268
三爪风	482
三叶五加	482
三叶木通	48
三叶木蓝	313

三叶吊杆泡	264
三叶豆	294
三叶鸡血藤	330
三叶金盆	132
三叶扁藤	431
三叶绞股蓝	131
三叶胶树	226
三叶鬼针草	620
三叶海棠	249
三叶婆婆针	620
三叶蝴蝶花豆	297
三叶蝶豆	297
三白草	61
三白草科	61
三尖叶猪屎豆	298
三舌千里光	641
三年桐	213
三色秋海棠	137
三色堇	75
三花山绿豆	308
三花水锦树	601
三花冬青	403
三花紫金牛	520
三角车	72
三角叶风毛菊	639
三角叶酢浆草	105
三角花	117
三角麦	90
三角枫	337
三角果海桐	123
三角榄	448
三角藤	584
三角瓣花	592
三层楼	487
三股筋香	25
三宝木	238
三姐妹	735
三点金草	308
三峡槭	464
三脉山白菊	618
三脉苎麻	384
三脉冷水花	391
三脉莢蒾	609
三脉球兰	568
三钱三	505
三萼木	598
三裂叶葛藤	326
三裂槭	463
三棱枝杭子梢	295
三筒管	56
下田菊	612
下果藤	420
土丁桂	672
土人参	87
土人参	655
土三七	633
土大黄	96
土乌药	125
土牛膝	98
土甘草	311
土甘草	393, 400
	683
土冬虫草	737
土当归	483

土花粉	136	大力草	737	大叶毛赫德木	153
<b>土连翘</b>	580	大力王	319, 634	大叶双眼龙	219
土沉香	114, 223	<b>大山橙</b>	555	<b>大叶玉叶金花</b>	585
土忍冬	603	大飞扬	221	大叶石龙尾	680
土青木香	56	<b>大马蓼</b>	92	<b>大叶石椒</b>	435
土金银花	603	大五月五	132	<b>大叶布荆</b>	719
<b>土细辛</b>	58	大木莲	4	<b>大叶冬青</b>	398
土细辛	61	大木菊	643	<b>大叶白灯笼</b>	712
土茶	183	<b>大风子科</b>	124	大叶白辛树	527
土茜草	596	大风艾	620	大叶白颜树	366
<b>土荆芥</b>	97	<b>大毛果柃</b>	150	<b>大叶半边莲</b>	658
土荆芥	730	<b>大乌蔹莓</b>	428	<b>大叶朴树</b>	366
土茵陈	729	大古毛	160	<b>大叶合欢</b>	278
土香薷	730	大艾	620	<b>大叶竹节树</b>	182
<b>土茉香</b>	219	<b>大叶千斤拔</b>	319	<b>大叶红叶藤</b>	474
<b>土党参</b>	655	<b>大叶山矾</b>	534	<b>大叶豆腐木</b>	714
土烟叶	670, 688	大叶山蚂蝗	305	<b>大叶拟赤杨</b>	525
土黄连	48	<b>大叶山扁豆</b>	286	<b>大叶杨桐</b>	141
土常山	532	大叶山梗菜	658	<b>大叶苎麻</b>	383
<b>土密树</b>	217	<b>大叶山绿豆</b>	305	<b>大叶苎麻</b>	382
土蒲公英	637	<b>大叶山棯</b>	449	<b>大叶附地菜</b>	662
<b>土圈儿</b>	293	大叶女贞	545	大叶青冈栎	362
土檀香	418	<b>大叶车前</b>	654	<b>大叶刺篱木</b>	124
万丈龙	56	<b>大叶马兜铃</b>	57	<b>大叶金牛</b>	76
<b>万宁山矾</b>	535	大叶五室柃	151	<b>大叶金锦香</b>	177
万吉滑	478	<b>大叶云实</b>	284	<b>大叶鱼藤</b>	304
万年木	162	<b>大叶木莲</b>	4	大叶泡	263
万年青	340	<b>大叶水团花</b>	574	大叶茶	398
万寿果	139, 420	<b>大叶水指甲</b>	107	<b>大叶栎</b>	349
<b>万寿菊</b>	643	<b>大叶水辣椒</b>	680	<b>大叶胡枝子</b>	314
<b>大丁草</b>	630	<b>大叶毛刺茄</b>	667	大叶香信木	193
<b>大八角</b>	7	<b>大叶毛船柄茶</b>	153	<b>大叶钩藤</b>	599

大叶桉	166	大叶藤	55	大花忍冬	604
大叶榜	349	大四块瓦	62	大花金丝梅	184
大叶蚊母树	336	大田基黄	651	大花金银花	604
大叶拿身草	306	大白艾	631	大花贵州素馨	545
大叶臭椒	446	大白皮胶藤	557	大花黄花稔	208
大叶绣花针	578	大白菜	70	大花第伦桃	120
大叶堇	75	大半边莲	137	大花清明花	552
大叶黄杨	340	大兰树	5	大花紫薇	108
大叶黄杨	407	大头茶	154	大花腰鼓藤	558
大叶黄命树	152	大头菜	69	大芽南蛇藤	403
大叶槿木	337	大加皮	489	大还魂	699
大叶排草	651	大芒木	196	大沙叶	215
大叶蛇总管	734	大托叶云实	284	大沙叶	592
大叶蛇葡萄	428	大西番莲	129	大驳骨	699
大叶野樱	256	大耳榕	372	大陆长柄卫矛	408
大叶猫眼草	81	大回魂	55	大陆狗牙花	554
大叶牵牛	674	大血藤	50	大青	711
大叶鹿角藤	553	大血藤科	50	大青藤	35
大叶斑鸠菊	645	大羊桃	161	大枣	424
大叶棱茎半边莲	658	大米花树	161	大苞血桐	227
大叶紫金牛	518	大米碎花	149	大苞赤脚	135
大叶紫珠	708	大红心	224	大苞栝楼	135
大叶紫薇	108	大红花	206	大刺皂莢	289
大叶楠	5	大红鳞蒲桃	171	大转心莲	129
大叶鼠刺	241	大豆	311	大果山香圆	469
大叶锥栗	352	大丽花	626	大果山楂	247
大叶榕	375	大花五桠果	120	大果广宁油茶	145
大叶酸模	96	大花石竹	84	大果马蹄荷	339
大叶馒头果	224	大花石笔木	157	大果五加	487
大叶算盘子	224	大花老鸦嘴	705	大果木五加	487
大叶黔桂鱼藤	304	大花米花树	162	大果木姜	27
		大花安息香	529	大果冬青	398

大果台湾冬青	402	大酒店	13	大鳞柯	355
大果朴树	366	大绣线菊	273	[ 1 ]	
大果花楸	271	大黄藤根	410	上竹龙	672
大果柯	358	大雀梅藤	424	上身眉	532
大果厚皮香	156	大蛇药	488	上林杜鹃	506
大果重阳木	216	大蛇根草	590	上思长蒴苣苔	691
大果腊瓣花	335	大猪屎青	298	上思瓜馥木	13
大果微花藤	411	大麻	392	上思安息香	530
大罗伞	517, 521	大麻科	392	上思苦登茶	153
大罗伞树	520	大粒咖啡	577	上思厚壳树	661
大明山椆	364	大巢豆	333	上思娃儿藤	574
大明常山	242	大萼山矾	532	上思鸭脚木	490
大齿野桐	229	大萼木姜	25	上思绣球	244
大肥牛	632	大萼桑寄生	415	上思梭罗树	200
大金不换	76	大棒红花	725	上思悬钩子	267
大金鸡菊	626	大戟	222	上思野海棠	174
大金盏花	623	大戟科	212	上思粗叶木	582
大降龙草	692	大筋骨草	720	上思椆	360
大茶木	146	大薊	625	上思蒲桃	168
大茶药	540	大棟树	451	上思槭	463
大毒木	369	大新木姜	32	上树蜈蚣	687
大骨节草	699	大滑藤	195	上树蜈蚣	695
大独脚金	685	大蓼	90, 93	上莲下柳	221, 222
大香藤	13, 301	大酸味草	105	小一点红	627
大活血	50	大酸藤	49	小二仙草	114
大烂花	28	大蟠脚	93	小七十二枝花	628
大通	491	大嘴肥肚苣苔	688	小刀豆	296
大桉	165	大穗兔尾草	332	小山柳	498
大样酸藤子	522	大穗鹅耳枥	345	小山楂	247
大钻	8	大翼萼藤	676	小飞扬	222
大钻骨风	8	大藤菊	644	小飞蓬	628
大唇血见愁	740	大瓣扁担杆	188		

<b>小马连鞍</b> .....	572	<b>小叶余甘子</b> ...	234	<b>小冬桃</b> .....	370
<b>小五加</b> .....	488	<b>小叶冷水花</b> ...	390	<b>小地黄连</b> .....	452
<b>小五瓣寄生</b> ...	416	<b>小叶鸡屎树</b> ...	583	<b>小竹叶菜</b> .....	587
<b>小木莲</b> .....	4	<b>小叶青冈栎</b> ...	361	<b>小舌菊</b> .....	637
<b>小木通</b> .....	38	<b>小叶青藤仔</b> ...	544	<b>小血藤</b> .....	9,334
<b>小化香树</b> .....	476	<b>小叶虎皮楠</b> ...	239	<b>小灯盏</b> ...	495,671
<b>小毛茛</b> .....	44	<b>小叶钓樟</b> .....	24	<b>小红豆</b> .....	330
<b>小毛蓼</b> .....	88	<b>小叶油茶</b> .....	144	<b>小花人字果</b> ...	42
<b>小心叶薯</b> .....	673	<b>小叶荸芋</b> .....	730	<b>小花八角</b> .....	7
<b>小石上莲</b> .....	691	<b>小叶铁屎米</b> ...	576	<b>小花木五加</b> ...	487
<b>小正木</b> .....	406	<b>小叶铁线莲</b> ...	39	<b>小花木兰</b> .....	3
<b>小叶九节</b> .....	593	<b>小叶鬼画符</b> ...	217	<b>小花艾</b> .....	617
<b>小叶九里香</b> ...	442	<b>小叶桑</b> .....	381	<b>小花四粉块藤</b>	571
<b>小叶三点金草</b>	307	<b>小叶绣花针</b> ...	578	<b>小花远志</b> .....	77
<b>小叶山様子</b> ...	470	<b>小叶黄杨</b> .....	340	<b>小花青藤</b> .....	35
<b>小叶山柿</b> .....	511	<b>小叶黄花稔</b> ...	209	<b>小花青藤</b> .....	571
<b>小叶山榔</b> .....	498	<b>小叶野扇花</b> ...	341	<b>小花草木犀</b> ...	316
<b>小叶女贞</b> .....	546	<b>小叶野海棠</b> ...	174	<b>小花扁担杆</b> ...	188
<b>小叶五月茶</b> ...	215	<b>小叶犁头草</b> ...	73	<b>小花野苦荬</b> ...	640
<b>小叶云实</b> .....	284	<b>小叶假糙苏</b> ...	732	<b>小花悬钩子</b> ...	267
<b>小叶水团花</b> ...	575	<b>小叶猴欢喜</b> ...	194	<b>小花清风藤</b> ...	467
<b>小叶石楠</b> .....	253	<b>小叶寄生</b> .....	415	<b>小花粗叶木</b> ...	582
<b>小叶艾</b> .....	618	<b>小叶黑面叶</b> ...	217	<b>小花蓼</b> .....	92
<b>小叶布荆</b> .....	718	<b>小叶榉</b> .....	368	<b>小花酸藤子</b> ...	522
<b>小叶半枫荷</b> ...	338	<b>小叶楤木</b> ...	483	<b>小花藤</b> .....	556
<b>小叶朴</b> .....	365	<b>小叶瑞香</b> .....	115	<b>小芸木</b> .....	441
<b>小叶老虎刺</b> ...	625	<b>小叶榕</b> .....	377	<b>小赤麻</b> .....	384
<b>小叶网脉山龙眼</b> .....	119	<b>小叶榕</b> .....	376	<b>小豆腐木</b> .....	715
<b>小叶肉穗草</b> ...	179	<b>小叶蜘蛛</b> .....	707	<b>小杜鹃</b> .....	505
<b>小叶红豆</b> .....	322	<b>小白皮胶藤</b> ...	557	<b>小远志</b> .....	76
<b>小叶杜茎山</b> ...	523	<b>小白菜</b> .....	68	<b>小阿茜达</b> .....	699
		<b>小冬桃</b> .....	191	<b>小驳骨</b> .....	703

小驳骨	702	小牵牛	674	小棉	205
小苦菜	634	小茴茴蒜	43	小萼素馨	544
小苹婆	200	小茴香	494	小紫金牛	516
小苜蓿	315	小狮子头	515	小棠梨	271
小苞爵床	704	小香草	443	小薊	625
小刺瓜	564	小香藤	12	小蓉木	170
小刺蒴麻	190	小将军	711	小滇丁香	583
小刺樱花	258	小洋紫苏	722	小新木姜	34
小果石笔木	157	小扁藤	431	小酸浆	666
小果冬青	399	小娃儿藤	574	小蓼	92
小果白辛树	527	小桂皮	18	小槐花	305
小果白桐	230	小钻	8	小蜡树	546
小果华槭	463	小钻骨风	8	小辣蓼	91
小果拟赤杨	526	小铁仔	524	小蕊槭	461
小果油茶	144	小铁树	408	小翼萼藤	675
小果香椿	452	小盘木	232	小藜	97
小果铁冬青	401	小彩叶紫苏	722	小蕡	46
小果倒地铃	454	小狸藻	687	小蕣科	46
小果海木	451	小柰树	456	小鳞莢蒾	608
小果海棠	185	小通花	419	山八角	7
小果野葡萄	432	小通草	335	山八角	7
小果微花藤	412	小通藤	334	山刁竹	570
小果榕	378	小黄皮	438	山大颜	593
小果蔷薇	261	小黄花树	479	山小桔	441
小金不换	76	小梾木	478	山小蕡	508
小金合欢	276	小梅花草	43	山马劣树	475
小垂序苣	638	小接骨	700, 702	山五月茶	215
小狗骨柴	598	小野艾	616	山木通	38
小泡树	707	小蛇根草	590	山风	620
小星鸭脚木	490	小蛇菰	419	山毛豆	330
小柑	441	小甜糖木	215	山乌龟	55
小栏木	146	小麻	187	山乌柏	235

山艾	631	山谷蓼	92	山柳科	498
山甘树	224	山鸡皮果	438	山指甲	546
山甘草	292	山鸡血藤	316	山胡椒	22
山石榴	595	山鸡椒	26	山胡椒菊	626
山龙眼	119	山青木	465	山香	726
山龙眼科	117	山矾	532	山香圆	468
山叶蒲桃	170	山矾	536	山扁豆	286
山冬瓜	133	山 矜 科	531	山姜	24
山丝瓜藤	136	(灰木科)		山莓	265
山耳草	589	山苦瓜	136	山桔子	185
山芝麻	197	山苦葵	637	山桔仔	441
山地豆	307	山枝	579	山桐子	125
山地菊	625	山枇杷	248	山桐子	413
山地菍	175	山枇杷	120,374	山桂皮	18
山尖茶	203		513	山桂花	124
山合欢	278	山枇杷榕	374	山桂花	532
山竹子	185	山坡豆	310	山核桃	474
山竹子科	185	山蚂蝗	305	山胶木	514
山豆叶	591	山金桔	440	山铁线莲	41
山豆根	51	山金银花	603	山烟木	669
山豆根叶九里香		山钓樟	23	山烟筒子	269
	441	山油茶	157	山莴苣	635
山芙蓉	203	山油桂	434	山桩	124
山花木	260	山油麻	367	山黄皮	438
山芥兰	413	山油樟	35	山黄豆	310
山芹菜	497	山茶	143	山黄菊	615
山苍子	26	山茱萸	477	山蕡麻	367
山杠木	252	山茱萸科	477	山萝卜	625
山杠木	253	山荔枝	457,478	山萝卜花	682
山杜英	193	山柑	413	山银花	603
山杜茎山	523	山柑科	413	山麻杆	213
山牡荆	718	山柳	498	山麻树	196

山麻黃	443	千年桐	214	川黔千金榆	345
山葵	60	千年矮	340	川黔悬钩子	268
山萩	614	千里光	641	川黔鸭脚木	489
山葡萄	428	千里香	442	川黔鹅耳枥	345
山葛藤	325	千层皮	201	及己	63
山椤	449	千张纸	696		
山棉皮	116	千金子	221	[、]	
山黑豆	327	千金藤	54	广木香	639
山慈姑	56	千屈菜科	107	广玉兰	2
山楂	167	千根草	222	广东山胡椒	23
山榄叶柿	512	千瓣白石榴	111	广东山绿豆	306
山榄科	513	千瓣白碧桃	257	广东木瓜红	527
(赤铁科)		千瓣红石榴	111	广东木莲	4
山楂果	247	个药木	163	广东木蓝	312
山鼠尾	77	川木瓜	246	广东升麻	642
山蓼	91	川木通	41	广东乌饭树	509
山榕	374	川乌	36	广东冬青	397
山模果	191	川西卫矛	408	广东西番莲	129
山槁树	26	川西吴茱萸	439	广东地构叶	237
山蜡梅	275	川西湖颓子	425	广东来江藤	677
山漆树	473	川西络石	560	广东杜鹃	504
山蕉	14	川芎	495	广东杜鹃	502
山橘	440	川香	495	广东拟黄树	602
山橙	556	川莓	269	广东含笑	6
山様叶泡花树	464	川桂	20	广东转心莲	129
山薄荷	739	川桂老鸦糊	706	广东金钱草	308
山藿香	739	川桂柔毛绣球	245	广东钓樟	23
		川鄂栲	349	广东念珠藤	551
		川续断	612	广东夜来香	572
千日红	101	川椒	444	广东厚皮香	156
千斤藤	41	川棟	451	广东柠檬	436
千年不烂心	667	川滇钤花	209	广东胡枝子	314

[ノ]

千日红 101  
千斤藤 41  
千年不烂心 667

广东臭牡丹	… 712	广西山胡椒	… 23	广西异形木	… 172
广东窄裂槭	… 459	广西五月茶	… 215	广西血桐	… … 227
广东刺柊	… … 126	广西天料木	… 127	广西米花树	… 162
广东排钱草	… 306	广西木五加	… 486	广西花点草	… 388
广东野枇杷	… 248	广西木莲	… … 4	广西花椒	… … 445
广东野桐	… … 230	广西水锦树	… 600	广西来江藤	… 677
广东象牙红	… 310	广西车轮梅	… 261	广西冷水花	… 390
广东船柄茶	… 153	广西毛冬青	… 400	广西鸡矢藤	… 591
广东假耳草	… 575	广西毛萼红果树		广西轮环藤	… 52
广东假吊钟	… 499		… … 274	广西虎皮楠	… 238
广东寄生	… … 415	广西云实	… … 284	广西肥肚苣苔	689
广东粗叶木	… 582	广西巴豆	… … 219	广西钓樟	… … 23
广东琼楠	… … 16	广西长梗藤	… 566	广西狗牙花	… 554
广东紫珠	… … 707	广西长蒴苣苔	691	广西泡桐	… … 682
广东蒲桃	… … 170	广西风车子	… 180	广西茵芋	… … 443
广东櫟	… … 190	广西牛皮消	… 564	广西香楠	… … 594
广东櫟木	… … 482	广西乌饭树	… 509	广西香花藤	… 550
广东赫德木	… 153	广西石柯	354, 358	广西核实	… … 220
广东薔薇	… … 262	广西石斑木	… 250	广西鸭脚木	… 490
广东爵床	… … 700	广西布荆	… … 717	广西倒吊笔	… 562
广东蕉寄生	… 686	广西玉叶金花	585	广西铁仔	… … 524
广叶参树	… … 491	广西凸脉冬青	396	广西绣球	… … 243
广宁油茶	… … 145	广西瓜馥木	… 12	广西绣线菊	… 273
广西七叶树	… 458	广西冬青	… … 400	广西粉绿藤	… 53
广西八角枫	… 480	广西白背桐	… 228	广西桑寄生	… 414
广西大风子	… 125	广西半边莲	… 657	广西黄皮	… … 438
广西山杠木	… 252	广西芒木	… … 196	广西梭罗树	… 199
广西山竹子	… 185	广西地海椒	… 662	广西崖豆藤	… 318
广西山茉莉	… 526	广西百灵藤	… 567	广西蛇根草	… 590
广西山柳	… … 499	广西杜英	… … 192	广西悬钩子	… 266
广西山矾	… … 535	广西杜鹃	… … 504	广西清风藤	… 468
广西山香圆	… 468	广西朴树	… … 366	广西密花冬青	395

- 广西密花树 …… 525  
 广西粗叶木 …… 582  
 广西旋蒴苣苔 688  
 广西椆 …… 362  
 广西琼榄 …… 411  
 广西斑鸠菊 …… 644  
 广西紫荆 …… 288  
 广西紫树 …… 481  
 广西紫麻 …… 388  
 广西鹅山木 …… 182  
 广西掌叶树 …… 485  
 广西楠 …… 34  
 广西槐树 …… 330  
 广西醉魂藤 …… 567  
 广西蒿 …… 616  
 广西腹水草 …… 677  
 广西鼠刺 …… 241  
 广西新木姜 …… 33  
 广西槭 …… 461  
 广西橙 …… 436  
 广西蔷薇 …… 262  
 广州紫菀 …… 619  
 广州糙果藤 …… 65  
 广防已 …… 57  
 广豆根 …… 329  
 广花娃儿藤 …… 573  
 广柑 …… 437  
 广桔 …… 437  
 广翅卫矛 …… 408  
 广福杜鹃 …… 504  
 广藿香 …… 735

[二]

- 马下消 …… 316  
 马见喜 …… 371  
 马甲子 …… 421  
 马兰后 …… 413  
 马奶奶 …… 158  
 马边绣球 …… 243  
 马连鞍 …… 571  
 马肝石 …… 92  
 马利筋 …… 562  
 马尾树 …… 476  
 马尾树科 …… 476  
 马林光 …… 153  
 马齿苋 …… 87  
 马齿苋科 …… 87  
 马松子 …… 198  
 马莲草 …… 658  
 马钱子 …… 541  
 马钱科 …… 538  
 马铃苦苣苔 …… 693  
 马铃薯 …… 669  
 马料树 …… 345  
 马桑 …… 120  
 马桑科 …… 120  
 马廯儿 …… 133  
 马银花 …… 506  
 马兜铃 …… 56  
 马兜铃科 …… 56  
 马鹿角 …… 89  
 马驥花 …… 683  
 马棘 …… 312
- 马蓝 …… 699  
 马褂木 …… 1  
 马槟榔 …… 66  
 马鞍子 …… 120  
 马鞍叶羊蹄甲 282  
 马鞍藤 …… 674  
 马缨丹 …… 714  
 马蹄金 …… 671  
 马蹄郎 …… 682  
 马蹄香 …… 611  
 马蹄荷 …… 339  
 马蹄根 …… 558  
 马蹄蔓 …… 487  
 马蹄槭 …… 460  
 马蹄樟 …… 339  
 马攀子 …… 431  
 马鞭草 …… 717  
 马鞭草科 …… 705  
 飞天蚧 …… 194  
 飞天蜈蚣 …… 612  
 飞天蜈蚣 …… 88  
 飞龙掌血 …… 444  
 飞机草 …… 630  
 飞扬草 …… 221  
 飞燕草 …… 41  
 飞蛾槭 …… 462  
 飞蛾藤 …… 676  
 习见蓼 …… 94  
 卫矛 …… 405  
 卫矛叶蒲桃 …… 169  
 卫矛科 …… 403  
 女贞 …… 545

女贞豆腐木	715	天葵	44	云南润楠	32
女萎	38	天葵海棠	138	云南椆	363
叉花土三七	632	天蓝苜蓿	315	云南朝天罐	177
叉指叶栝楼	136	天蓝绣球	659	云南葛藤	325
叉柱花	704	天蓬草	86	云南紫金牛	521
弓果藤	572	天蓼	93	云南蔷薇	263
弓背树	207	云山伯乐树	458	云南酸藤子	521
子凌木	168	云山南华木	458	云南樟	19
子凌蒲桃	168	云山椆	362	云南樱花	258

## 四 笔

### [一]

天女花	3	云南山柳	499	太平安息香	530
天目朴树	365	云南山指甲	11	太平杜鹃	502
天目杜鹃	503	云南木瓜红	528	太阳花	639
天目紫茎	155	云南水青冈	352	太阳麻	299
天仙子	664	云南玉叶金花	585	不出林	518
天仙藤	56	云南白桐	232	五寸刀	468
天名精	623	云南地黄连	452	五寸铁树	468
天花公	136	云南杜英	193	五月艾	616
天芥菜	661	云南鸡矢藤	591	五月艾	618
天竺葵	104	云南狗牙花	555	五月茶	214
天胡荽	495	云南厚壳树	660	五爪三七	79
天星吊红	78	云南钩藤	600	五爪金龙	672
天星藤	566	云南绣球	245	五匹风	254
天香炉	177	云南黄花稔	209	五叶爬山虎	430
天香藤	277	云南黄杞	475	五加	481
天峨槭	463	云南黄素馨	544	五加皮	605
天料木	127	云南萝芙木	559	五加科	481
天料木科	126	云南假鹰爪	11	五加通	488, 491
天堂瓜馥木	13	云南粗叶木	581	五列木	158

<b>五列木科</b>	158	<b>无柄山柑</b>	66	<b>木防已</b>	50
五色梅	714	<b>无柄长叶假糙苏</b>	732	<b>木豆</b>	294
五宅茄	667	<b>无柄果钩藤</b>	600	<b>木李</b>	247
<b>五角茄</b>	668	<b>无柄扁担杆</b>	188	<b>木花生</b>	226
五味子木	214	<b>无柄槌果藤</b>	66	<b>木花生</b>	514
<b>五味子科</b>	8	<b>无香藤</b>	566	<b>木苎麻</b>	382
五指牛奶	378	<b>无根藤</b>	17	<b>木芙蓉</b>	206
五指毛桃	378	<b>无患子</b>	457	<b>木质蛇根草</b>	590
五指榕	378	无患子叶崖豆藤	318	<b>木油树</b>	214
五香草	729	<b>无患子科</b>	453	<b>木空菜</b>	657
<b>五桠果科</b>	120	<b>元腺红淡</b>	147	<b>木葵红豆</b>	323
(第伦桃科)		<b>元江栲</b>	351	<b>木香子</b>	21
五倍子树	472	<b>元宝草</b>	185	<b>木姜子</b>	26
五倍叶	37	车轮梅	260	<b>木姜子椆</b>	362
<b>五彩石竹</b>	84	车轮菜	654	<b>木姜子叶水锦树</b>	600
<b>五彩桃</b>	257	车线藤	53	<b>木姜叶冬青</b>	396
五虎通城	57	<b>车前</b>	654	<b>木荷</b>	154
五脚紫金牛	520	<b>车前草</b>	654	<b>木莲</b>	3
<b>五数薄瓣节节菜</b>		车前草	654	<b>木笔</b>	2
	109	<b>车前草科</b>	654	<b>木海棠</b>	104
<b>五膈草科</b>	657	车桑子	454	<b>木通科</b>	48
<b>五蕊寄生</b>	416	车辕木	169	<b>木菌子</b>	419
<b>五瓣寄生</b>	416	<b>木兰</b>	2	<b>木菠萝</b>	369
<b>互生苣苔</b>	692	<b>木兰科</b>	1	<b>木患子</b>	457
<b>无毛白花苋</b>	99	<b>木瓜</b>	139	<b>木患树</b>	457
<b>无毛南蛇藤</b>	405	木瓜	246, 247	<b>木常山</b>	712
<b>无叶枫寄生</b>	417	<b>木瓜科(万寿果科、番木瓜科)</b>	139	<b>木麻黄</b>	364
无头藤	17	木丝瓜	203	<b>木麻黄科</b>	364
<b>无花果</b>	372	木竹子	185	<b>木棉</b>	202
无忧花	290			<b>木棉科</b>	202
<b>无刺含羞草</b>	280			<b>木棍树</b>	412
<b>无齿樱桃</b>	255				

木犀	548	中华槭	463	水亚木	244
木犀叶假卫矛	409	中华螺序草	597	水百足	328
木犀科	542	中肋耳草	587	水团花	574
木榄	182	中间水箭草	722	水竹消	564
木蓝	313	中间风毛菊	639	水竹蒲桃	169
木蓼	93	中国狗牙花	554	水冰片	84
木槿	207	中国绣球	242	水红木	606
木蝴蝶	696	中国槐	329	水芹	496
木熟果	185	中果油茶	144	水芽豆	310
木薯	232	中南豆腐木	715	水苍树	26
木鳖	134	中南槭	462	水苋菜	99
木瓣瓜馥木	13	中蛇根草	590	水苎麻	383
牙皂	289	中越杜茎山	523	水杨柳	565
牙香树	114	中越密脉木	586	水杨梅	248
王不留行	377	中越蒲桃	170	水杨梅	575
王瓜	136	水八角	680	水扬葵	292
巨果冬青	394	水马齿	114	水皂角	292
瓦山榜	348	水马齿科	114	水茄	669
〔1〕		水车藤	120	水苦荬	686
中平树	227	水牛奶	162	水青冈	352
中华千里光	641	水龙	112	水枇杷	162
中华五膈草	657	水东哥	162	水拖柴	344
中华水锦树	602	水东哥科	161	水泡木	224
中华石龙尾	679	水石梓	515	水泡乌饭树	508
中华艾纳香	622	水田芥	71	水泡茶	143
中华被萼苣苔	689	水瓜	133	水泽兰	630
中华绣线菊	272	水瓜子	110	水面一盏灯	45
中华野珠兰	273	水冬瓜	575	水柳	226
中华野海棠	174	水冬瓜	525	水指甲	107
中华密榴木	14	水白芷	483	水结草	565
中华锥花	725	水丝梨	338	水栗	353
		水丝麻	387	水蚬木	216

水珠草	111	少花吊钟	500	毛五爪龙	674
水桐树	480	少花菱蓬	608	毛木防已	50
水翁	163	少刺毛假糙苏	732	毛木蓝	312
水凉子	334	少刺蔷薇	263	毛水珍珠菜	722
水黄皮	325	少果海桐	122	毛凤仙	107
水猪菜	107	少脉木姜	28	毛六驳	15
水麻	384	少脉假卫矛	410	毛龙须	67
水麻叶	384	少脉腺柄山矾	531	毛石笔木	158
水葵	203	少蕊扁担杆	188	毛石梓	714
水棉木	336, 377 594	见风干	22	毛叶木姜	26
		见风消	22	毛叶乌蔹莓	429
水晶兰	511	见血飞	444	毛叶柰树	455
水晶兰科	511	见血封喉	369	毛叶杜英	192
水筒木	374	见雪飞	290	毛叶阿芳	10
水椎木	226	见霜黄	621	毛叶轮环藤	51
水蓝青	84	日日新	552	毛叶咀签	420
水湿蓼	94	日本瓜	129	毛叶铁线莲	40
水蓑衣	702	日本樱花	258	毛叶海木	451
水锦树	602	止血木	229	毛叶黄牛木	183
水锥榜	349	止泻木	555	毛叶蛇葡萄	427
水蓼	91			毛叶蓝猪耳	685
水榕	371			毛叶锥栗	348
水榕	163	毛七爪龙	674	毛叶新材	153
水榕木	163	毛八角枫	480	毛冬瓜	159
水槟榔	66	毛八角莲	46	毛冬青	400
水蜡树	542	毛儿细辛	627	毛白杨	342
水箭草	722	毛大丁草	631	毛白鹤藤	670
水薄荷	707	毛大叶野樱	256	毛瓜馥木	12
少年红	588	毛大沙叶	215	毛老虎	505, 726
少花水芹	496	毛山矾	534	毛老鸦糊	706
少花龙葵	668	毛小果冬青	399	毛虫草	518
少花吊石苣苔	693	毛女贞	545	毛竹叶椒	446

[ノ]

毛七爪龙	674	毛叶新材	153
毛八角枫	480	毛冬瓜	159
毛八角莲	46	毛冬青	400
毛儿细辛	627	毛白杨	342
毛大丁草	631	毛白鹤藤	670
毛大叶野樱	256	毛瓜馥木	12
毛大沙叶	215	毛老虎	505, 726
毛山矾	534	毛老鸦糊	706
毛小果冬青	399	毛虫草	518
毛女贞	545	毛竹叶椒	446

毛安息香	529	毛齿叶铁线莲	40	毛脉嘉赐树	127
毛防已	53	毛岩伶	151	毛毡草	621
毛羽叶楸	698	毛狗牙花	554	毛钩藤	599
毛红棟子	453	毛金银花	603	毛扁蒴藤	411
毛花马驥儿	133	毛金腺莢蒾	606	毛桃	4,159
毛杨桃	160	毛鱼黄草	675	毛桃木莲	4
毛杨梅	343	毛鱼藤	303	毛桂	18
毛杜仲藤	557	毛宝巾	117	毛桐	228
毛杜英	192	毛泽兰	630	毛榜	350
毛秀才	665	毛泡桐	682	毛连菜	638
毛秀柱花	336	毛牵牛	674	毛倒吊笔	562
毛序花楸	271	毛茛	43	毛高山蓼	93
毛鸡矢藤	591	毛茛科	36	毛窄叶冷	152
毛鸡骨草	291	毛草龙	112	毛绣球防风	727
毛鸡眼藤	583	毛荔枝	457	毛黄肉楠	15
毛茄	667	毛莢蒾	607	毛堇菜	73
毛板栗	660	毛药藤	559	毛菍	176
毛枝绣线菊	273	毛相思子	291	毛梗子	386
毛披树	400	毛柄珍珠菜	650	毛梗红翅槭	461
毛刺蒴麻	191	毛柱金银花	603	毛梭罗树	200
毛青檀	367	毛柱铁线莲	40	毛排钱草	304
毛青藤	36	毛鸦胆子	447	毛球兰	568
毛青藤仔	544	毛背花楸	270	毛蛇王藤	129
毛果巴豆	219	毛冠唇花	728	毛野薔薇	262
毛果田麻	196	毛冠藤	562	毛银柴	215
毛果鸡爪莲	421	毛脉乌口树	598	毛麻子藤	558
毛果鱼藤	303	毛脉刺葡萄	433	毛麻栎	450
毛果柯	357	毛脉野枣	425	毛宿苞豆	328
毛果柃	152	毛脉崖爬藤	432	毛萎	60
毛果枳椇	421	毛脉焰爵床	703	毛萼红果树	273
毛果扁担杆	188	毛脉鼠刺	240	毛萼李榄	547
毛果算盘子	224	毛脉酸枣	470	毛萼薔薇	262

毛葡萄	433	长叶莴苣	636	长波叶山绿豆	308
毛鼠刺	240	长叶排钱树	306	长波状叶山蚂蝗	
毛蓼	88	长叶悬钩子	265		308
毛蔓豆	294	长叶假糙苏	732	长英山绿豆	309
毛嘉赐树	127	长叶酸藤子	521	长柄山毛榉	352
毛槿	207	长尖叶木五加	485	长柄山龙眼	118
毛蕊鸡血藤	317	长安金桔	440	长柄山桂花	124
毛瓣崖豆藤	317	长麦果树	421	长柄本勒木	124
毛麝香	676	长花龙吐珠	713	长柄瓜馥木	12
丹参	736	长花厚壳树	661	长柄杜英	193
丹草	588	长花柏拉木	173	长柄赤车	389
丹桂	548	长花柄掌叶树	484	长柄冷水花	390
长毛山矾	533	长花野锦香	173	长柄柯	356
长毛豆腐木	715	长花银花	604	长柄梭罗树	199
长毛柃	151	长角山芝麻	197	长柄野扁豆	310
长毛香科	739	长序大果冬青	399	长柄紫珠	708
长毛锥花	725	长序南五味子	8	长柄藤榕	375
长化香树	476	长序南蛇藤	405	长柱山丹	578
长玉叶金花	584	长尾远志	77	长柱虎皮楠	238
长节耳草	589	长尾窄裂槭	459	长春花	552
长叶水麻	384	长尾窄叶冷	152	长钩刺蒴麻	190
长叶牛膝	93	长尾粗叶木	582	长突耳草	588
长叶火柴枝树	609	长茎赤车	389	长圆叶卫矛	408
长叶玉兰	2	长苞芥苧	730	长圆叶鼠刺	240
长叶龙船花	580	长刺锥栗	348	长圆叶新木姜	33
长叶苎麻	383	长刺酸模	96	长圆叶酸藤子	521
长叶茅膏菜	82	长果花楸	272	长脐红豆	321
长叶泡桐	682	长果冷	149	长倒卵叶山龙眼	
长叶茜草	596	长果柯	356		118
长叶柞木	126	长果猪血木	156	长梗冬青	400
长叶钩子	735	长果琼楠	16	长梗连蕊茶	156
长叶栲	351	长果满天香	121	长梗蚌壳椒	445

长梗金粟兰	62	牛奶藤	159, 160 563, 657	风车藤	211
长梗细辛	58	牛糹树	440	风毛菊	639
长梗珍珠菜	652	牛至	729	风叶藤	429
长梗铜钱树	421	牛耳朵	689	风吹楠	36
长梗润楠	30	牛耳枫	238	风轮菜	721
长萼玉叶金花	585	牛耳楠	5	风铃藤	655
长萼半边莲	658	牛老药藤	598	风箱树	577
长萼鸡眼草	313	牛肋巴	301	凤藤	8
长萼茄	668	牛舌草	654	月见罗薹草	296
长萼堇菜	74	牛角瓜	562	月见草	113
长萼猪屎豆	298	牛角树	525	月月红	261
长蒴母草	680	牛角椒	663	月光花	671
长蒴蚬木	187	牛角藤	572	月季花	261
长蒴黄麻	187	牛柳铃	275	月桔	442
长管素馨	543	牛栓藤	474	月桂	548
长穗青冈栎	362	牛栓藤科	473	月桂山矾	535
长穗猫尾草	332	牛眼果	125	月桂肉实树	515
长瓣马蹄荷	338	牛眼珠	541	乌口果	191
化香树	476	牛筋木	271	乌口树	598
牛大力	318	牛筋藤	380	鸟冈栎	363
牛牙果	124	牛蒡	615	鸟叶柯木	155
牛见愁	474	牛噪管树	161	鸟头	36
牛心果	10	牛膝	98	鸟材	511
牛心树	4	牛蹄豆	280	鸟饭小蘖	508
牛甘藤	291	牛繁缕	86	鸟饭树	508
牛矢果	543	牛藤	40	鸟饭树科	508
牛白藤	587	凤山楂果藤	65	鸟泡	265
牛皮冻	591	凤仙花	106	鸟药	25
牛皮消	564	凤仙花科	106	鸟柏	236
牛皮菜	97	凤眼果	201	鸟榄	448
牛奶菜	563	凤凰木	288	鸟蔹莓	428
				鸟蝇翼	314

乌藤	15	火草	614	巴西橡胶树	226
午时花	198	火树	288	巴豆	219
分叉破布木	660	火炭木	163, 499	巴豆藤	297
分枝感应草	104	火炭木寄生	416	巴戟天	583
分裂鳞蕊藤	674	火炭母	89	引汁藤	557
手瓜	135	火绒艾	614	双飞蝴蝶	574
手椽	437	火索藤	281	双花假卫矛	409
反枝苋	100	火柴子树	607	双花蟛蜞菊	645
爪哇木棉	202	火梅	343	双果冬青	394
爪哇古柯	211	火球花	101	双室木五加	485
勾儿茶	420	火麻	392	双蝴蝶	647

[、]

心叶石笔木	157
心叶青藤	35
心叶茶	142
心叶蚬木	186
心叶黄花稔	208
心叶船柄茶	153
心叶寄生	415
心叶櫟木	483
心叶赫德木	153
心型杜鹃	502
心翼果	411
火力楠	5
火力楠	5
火布茶	189
火把果	259
火花树	696
火灵丹	653
火果	216
火殃簕	220

火筒树	430
火蓝	313
火锥	350
火焰花	290
六月雪	597
六方藤	429
六耳铃	622
六角莲	47
六果悬钩子	266
六棱菊	636
文木	660
方叶五月茶	214
方枝木犀榄	547
方茎耳草	589

[、]

巴东清风藤	466
巴西苜蓿	330
巴西棉	205

## 五 笔

[一]

正木	407
玉叶金花	585
玉龙鞭	716
玉兰	2
玉果	36
玉珊瑚	669
玉铃花	530
玉盘叶柯	358
玉蝶梅	567
可爱花	701
石山杠	239
石山吴茱萸	439
石山珍珠菜	653
石山桂花	548
石山蒿	618

石山漆	471	石斑木	260	龙山果	193
石上莲	693	石檵草	391	龙头花	677
石上莲	137	石棠木	260	龙吐珠	713
石上海棠	137	石楠	254	龙州风车藤	211
石风车子	180	石楠乌口树	597	龙芽花	310
石龙芮	43	石榴	110	龙芽草	246
石龙尾	680	石榕	379	龙胜乌饭树	510
石仙桃	565	石蜡烛	686	龙胜冬青	402
石灰树	271	石蝉草	53	龙胜钩樟	23
石吊兰	693	石辣蓼	83	龙胜柿	512
石竹	84	石壁杜鹃	502	龙胜槭	462
石竹科	83	石壁柴	502	龙胆草	648
石羊草	385	石螃蟹	630	龙胆科	646
石松草	163	石蟾蜍	55, 136	龙须藤	281
石岩枫	231	平头海桐花	123	龙珠	666
石虎	440	平地木	518	龙珠果	129
石果山茶	144	平地跑马	612	龙脑香科	162
石油菜	389	平伐山柳	499	龙眼	455
石芥芋	730	平伐山茶	145	龙刚叶	237
石莽草	89	平阳厚壳桂	20	龙船花	580
石南藤	60	平顶紫金牛	517	龙葵	668
石柯	354, 357	平卧土三七	633	左钮菜	668
石栎	357	平南冬青	400	布渣叶	189
石胡荽	624	平脉柃	148	东女贞	545
石钟花	694	平脉椆	362	东方水锦树	601
石栗	213	平脉槠栎	363	东方古柯	211
石狮子	516	平滑钩藤	599	东方蓼	93
石笔木	156	平滑楼梯草	385	东风桔	434
石笔木	253	古陈杜鹃	504	东风菜	619
石海椒	102	古柯	211	东南水丝梨	338
石莞茜	390	古柯科	211	东南栲	350
石梓	713	古钩藤	563	东南野桐	230

艾	616	四川棘果卫矛	405	田七	489
艾	618	四川溲疏	241	田边菊	619
艾叶	617	四川樱桃	255	田州三七	489
艾纳香	620	四子莲	62	田灰艾	631
艾麻草	387	四子海桐花	123	田芥菜仔	621
节瓜	130	四方草	734	田菁	328
节节花	76,99	四方台	128	田基豆	328
节节菜	109	四方麻	678	田基黄	184
节花五加	482	四方藤	429	田基麻	659
节梗大薙	488	四叶参	656	田基麻科	659
打不死	56	四叶拉拉藤	579	田黄菜	632
打拍草	666	四叶萝芙木	558	田野千里光	640
打炮子	220,419	四列石蚕	739	田繁缕	83
打铁树	525	四块瓦	62	北玄参	684
打铁树	519	四角冷	152	北江十大功劳	48
打破碗花花	37	四角假卫矛	410	北江杜鹃	505

[ I ]

叶下珠	234
叶子花	117
叶里含珠	212
叶轮木	232
叶珠木	233
四大金刚	63
四川小金钱草	671
四川冬青	402
四川朴	366
四川杨桐	140
四川轮环藤	52
四川金钱草	650
四川黄花稔	209
四川蛇菰	418

四川棘果卫矛	405	田七	489
四川溲疏	241	田边菊	619
四川樱桃	255	田州三七	489
四子莲	62	田灰艾	631
四子海桐花	123	田芥菜仔	621
四方草	734	田菁	328
四方台	128	田基豆	328
四方麻	678	田基黄	184
四方藤	429	田基麻	659
四叶参	656	田基麻科	659
四叶拉拉藤	579	田黄菜	632
四叶萝芙木	558	田野千里光	640
四列石蚕	739	田繁缕	83
四块瓦	62	北玄参	684
四角冷	152	北江十大功劳	48
四角假卫矛	410	北江杜鹃	505
四角蒲桃	171	北江菊花	116
四季豆	324	北美丁花	175
四季青	606	北堇菜	73
四季青	535	北紫菀	619
四季桔	437	北裂脣牡丹	175
四季海棠	139	号角树	370
四药门花	339	凸叶榕	376
四料木	291	凸尖楼梯草	386
四籽野豌豆	333	凸脉冬青	396
四棱豆	325	史拉登茶	155
四棱草	716		
四棱草	596		
四棱猪屎豆	300		
四蕊三角瓣花	592		
四瓣米仔兰	449		

[ N ]

禾串树	217
禾雀脯	80
禾稿草	637
生根冷水花	391

生菜	635	白皮胶藤	557	白花悬钩子	267
白千层	167	白冬虫草	737	白花菜	67
白千里光	641	白头树	448	白花菜科	65
白子菜	632	白头婆	634	白花曼陀罗	664
白马胎	75	白兰	4	白花笼	529
白马骨	597	白芍	43	白花银背藤	670
白木乌柏	235	白扣子	529	白花梓树	696
白木香	114	白吊粟	228	白花蒿	617
白车	170	白灯笼	712	白花矮朵朵	452
白车轴草	331	白芷	492	白花簕	482
白日日新	552	白花木	530	白花酸藤子	522
白月光花	671	白花丹	653	白花蟛蜞菊	627
白长春花	552	白花艾	631	白苏	733
白毛长叶紫珠	708	白花仔	99	白克木	339
白牛胆	634	白花灰叶豆	330	白杜仲藤	557
白玉兰	2	白花老枪谷	100	白杜鹃	506
白石榴	111	白花地蚕	738	白身树	125
白石榴花	111	白花地胆草	627	白饭树	223
白术	620	白花羊蹄甲	281	白辛树	527
白布荆	718	白花苋	99	白英	667
白龙船花	580	白花阿生草	678	白枝羊蹄甲	282
白叶子	228	白花含笑	6	白刺花	330
白叶瓜馥木	11	白花刺	261	白果香楠	594
白叶安息香	530	白花油麻藤	320	白乳木	235
白叶厚壳桂	21	白花鱼藤	302	白狗肠	695
白叶莓	266	白花败酱	611	白线薯	53
白叶野茉莉	530	白花益母草	727	白绒石楠	253
白叶鸭脚木	490	白花除虫菊	624	白面苎麻	382
白叶藤	563	白花前胡	496	白栎	360
白瓜	130	白花犁头草	73	白背子草	79
白皮	126	白花蛇舌草	587	白背木	203
白皮绣球	243			白背五叶艾	618

白背杨	341	白喉崩	557	冬青	545
白背厚壳桂	21	白楠	34	冬青科	393
白背桐	228	白榄	448	冬桃	191
白背蚊艾	618	白楸	231	冬桃	192
白背黄花稔	209	白鼓钉	58	包叶木	420
白背绸缎	670	白瑞香	115	包果柯	354
白背算盘子	225	白碧桃	257	包菜	70
白背藤	670	白筋	482	鸟袱草	454
白骨木	597	白蕊	428	鸟不企	483
白香薷	723	白蝉	579	包不宿	47
白扁豆	309	白蜡树	542	鸟仔刺	259
白眉	631	白蜡树	542	乐业假凤李	421
白珠木	500	白颜树	366	乐昌冬青	403
白莲藕	61	白鹤灵芝	704	仙人掌	140
白桐	228,682	白鹤藤	670	仙人掌科	139
白桐树	218	白椽	349	仙黄麻	198
白桂木	369	白薇	564	仙鹤草	246
白梅花	256	白檀	536	仪花	289
白胶木	21	白藓皮	296	印度石莲花	80
白烟筒	269	白薰	248	印度豆	330
白粉小蘖	46	瓜子木	168	印度草木犀	316
白粉藤	429	瓜子金	565	印度萝芙木	558
白雪花	653	瓜子金	76	印度棉	205
白菊仔	624	瓜子菜	87,726	印度锥栗	350
白菜	68	瓜子黄杨	340	印度蔊菜	72
白野槁树	27	瓜木	480	印度橡胶树	373
白梨么	220	瓜萎	136	丛生泽兰	629
白银寄生	414	瓜馥木	12	丛花厚壳桂	21
白麻	383	冬瓜	129	丛刺栲	350
白萼素馨	542	冬红花	714	丛轴荚蒾	609
白塔木	531	冬青	394		
白棠子树	707				

〔一〕

- 玄参 ..... 684  
 玄参 ..... 684  
**玄参科** ..... 676  
 头花蓼 ..... 89  
**兰花参** ..... 656  
**兰草** ..... 629  
**兰香草** ..... 710  
**半边刀** ..... 386  
**半边楓** ..... 335  
**半边莲** ..... 657  
**半边莲科** ... 657  
 (山梗菜科)  
**半边蝶** ..... 81  
**半枝莲** ... 87, 736  
**半枫荷** ..... 338  
 半枫荷 ... 198, 487  
 半枫樟 ..... 34  
**半齿柃** ..... 152  
 半夜开门 ..... 585  
**半柱花** ..... 702  
**半匍匐毛茛** ... 44  
 半截叶 ..... 128  
**半覆瓦十大功劳**  
 ..... 48  
 半灌木千斤拔 319  
**宁夏枸杞** ..... 665  
**永福绣球** ..... 243  
**汉三七** ..... 633  
**刘寄奴** ..... 617

〔二〕

- 母生 ..... 127  
 母鸡带仔 ..... 428  
**母草** ..... 681  
**皮青木** ..... 322  
**皮刺卫矛** ..... 405  
**皮藤** ..... 381  
**尼泊尔老鹳草** 103  
**尼泊尔肉穗草** 178  
**尼泊尔齿冠菊** 637  
**尼泊尔胡椒** ... 60  
**尼泊尔蓼** ..... 92  
**台湾水锦树** ... 601  
**台湾冬青** ..... 402  
**台湾相思** ..... 275  
**台湾海棠** ..... 250  
**台湾旋蒴苣苔** 683  
**台湾清风藤** ... 467  
**台湾榕** ..... 379  
**发冷藤** ..... 56  
**边英鱼藤** ..... 304  
**边缘罗裙子** ... 9  
**凹叶女贞** ..... 546  
**凹叶冬青** ..... 401  
**凹叶瓜馥木** ... 12  
**凹叶厚朴** ..... 1  
**凹尖圆叶乌柏** 236  
**凹脉柃** ..... 149  
**凹萼木鳖** ..... 134  
**加拉桉** ..... 165  
**加毒** ..... 369

- 加拿大白杨** ... 341  
**加拿大蓬** ..... 628  
**对叶榕** ..... 375  
**对面花** ..... 595  
**奶母草** ..... 221  
**奶叶藤** ..... 656  
**奶汁草** ..... 221  
**奶汁藤** ..... 553  
**奶参** ..... 656  
**奶参** ..... 655  
**奶果猕猴桃** ... 159  
**幼枝卫矛** ..... 407  
**丝毛艾纳香** ... 622  
**丝毛榄仁** ..... 181  
**丝瓜** ..... 132  
**丝栗** ..... 351  
**丝栗** ..... 349  
**丝铁线莲** ..... 39  
**丝柄吊石苣苔** 693  
**丝棉木** ..... 339  
**丝棉树** ..... 339

## 六 笔

〔一〕

- 西瓜** ..... 130  
**西芎** ..... 495  
**西红柿** ..... 665  
**西江悬钩子** ... 265  
**西伯利亚老鹳草**  
 ..... 104  
**西伯利亚远志** 77

西南八角枫	479	百鸟不落	488	芝麻科	698
西南三角瓣花	592	百两金	517	托叶土密树	217
西南马先蒿	682	百合杜鹃	505	扫把艾	616
西南风车子	180	百色水锦树	602	扫把枝	163
西南毛连菜	638	百色威灵仙	39	扫把菜	724
西南石斑木	250	百色萝芙木	559	扫帚菜	98
西南灰莉	540	百色猴欢喜	194	扫锅草	112
西南米槠	347	百咳草	319	扛板归	93
西南远志	78	百脉根	315	扣子草	658, 668
西南杠柳	570	百能葳	620	扣子藤	54
西南青葵叶	479	百解藤	51	扣匹	15
西南齿冠菊	637	百蕊草	418	朴树	366
西南垂序苣苔	638	耳叶马兜铃	57	地丁	648
西南金粟兰	62	耳叶牛皮消	564	地丁草	74
西南香楠	594	耳叶榕	373	地下明珠	82
西南扁担杆	188	耳状苜蓿	693	地五泡藤	266
西南栲	347	耳状紫莞	619	地瓜	323
西南宿苞豆	323	耳草	586	地瓜榕	379
西南海桐	122	耳草长蒴苣苔	690	地耳草	184
西南排草	652	耳挖草	737	地豆	293
西南野木瓜	49	耳挖草	627	地肤	98
西南野海棠	174	耳响草	204	地灵苋	101
西南粗叶木	582	耳聋草	81	地枇杷	175, 379
西南槐树	329	亚革质冷水花	391	地苦胆	56
西洋红	736	亚洲石梓	713	地骨皮	665
西洋菜	71	亚洲棉	205	地胆草	627
西桦	344	亚麻	102	地笋	727
西番莲	128	亚麻科	102	地蚕	737
西番菊	643	芒木	196	地桃花	210
西藏山茱莉	527	芒毛苣苔	638	地菍	175
百日草	646	芍药	43	地黄	683
百六齿	132	芝麻	698	地黄木	532

<b>地黃連</b>	452	<b>老鼠簕</b>	698	<b>灰盆草</b>	654
<b>地棉皮</b>	116	<b>老蟹眼</b>	148	<b>灰絨白兰花</b>	5
<b>地棉麻</b>	116	<b>老蟹眼木</b>	152	<b>灰莉</b>	540
<b>地榆</b>	270	<b>老鶴草</b>	103	<b>灰楸</b>	695
<b>地錦</b>	430	<b>吉貝</b>	202	<b>夾竹桃</b>	556
<b>地櫟杷</b>	132	<b>吉龍草</b>	723	<b>夾竹桃叶崖花子</b>	
<b>老山茶</b>	630	<b>吉祥草</b>	683		121
<b>老槍谷</b>	99	<b>過山風</b>	9	<b>夾竹桃科</b>	550
<b>老虎毛虫藥</b>	519	<b>過山風</b>	28	<b>列當科</b>	686
<b>老虎豆</b>	319, 673	<b>過山龍</b>	643	<b>有色衛矛</b>	409
<b>老虎肝</b>	371	<b>過山楓</b>	404	<b>畢當茄</b>	167
<b>老虎刺</b>	290	<b>過山蛇</b>	78	<b>動蕊花</b>	726
<b>老虎須</b>	41	<b>過江龍</b>	279		[1]
<b>老虎須藤</b>	40	<b>過江藤</b>	714	<b>光山香圓</b>	468
<b>老虎草</b>	711	<b>過塘蛇</b>	112	<b>光广东爵床</b>	700
<b>老虎斑</b>	335	<b>過塘蛇</b>	110	<b>光牛奶菜</b>	569
<b>老虎腳</b>	93, 387 519, 625	<b>過塘藕</b>	61	<b>光葉山小桔</b>	441
<b>老虎棟</b>	450	<b>過路黃</b>	649	<b>光葉山芝麻</b>	197
<b>老鴉嘴藤</b>	557	<b>過路黃</b>	650	<b>光葉山硯</b>	535
<b>老鴉胆</b>	447	<b>過路蛇</b>	76	<b>光葉山黃麻</b>	367
<b>老鴉鈴</b>	529	<b>達倉木</b>	598	<b>光葉雲南槿</b>	207
<b>老鴉糊</b>	706	<b>灰九節</b>	593	<b>光葉水團花</b>	575
<b>老荆藤</b>	303	<b>灰山泡</b>	270	<b>光葉水青岡</b>	352
<b>老猕猴桃</b>	159	<b>灰木</b>	536	<b>光葉艾</b>	618
<b>老鼠矢</b>	537	<b>灰木葉八角</b>	7	<b>光葉玉蘭</b>	2
<b>老鼠耳</b>	419	<b>灰木楊桐</b>	142	<b>光葉石楠</b>	252
<b>老鼠怕</b>	442	<b>灰毛豆</b>	330	<b>光葉白蘭花</b>	5
<b>老鼠刺</b>	239	<b>灰毛漿果棟</b>	450	<b>光葉灰布荆</b>	717
<b>老鼠拉冬瓜</b>	133	<b>灰布荆</b>	717	<b>光葉耳草</b>	588
<b>老鼠屎</b>	44	<b>灰葉</b>	331	<b>光葉合歡</b>	278
<b>老鼠眼</b>	327	<b>灰葉冬青</b>	403	<b>光葉決明</b>	286

光叶红豆	321	光榕	374	岜山山矾	534
光叶柯	355	光蜡树	542	网叶山胡椒	22
光叶显脉木姜	33	尖子木	177	网脉山龙眼	119
光叶桦	344	尖山橙	555	网脉石上莲	693
光叶海桐	121	尖叶山茶	143	网脉忍冬	605
光叶猕猴桃	161	尖叶木	600	网脉钓樟	22
光叶紫玉盘	14	尖叶木蓝	313	网脉柳	342
光叶櫟木	482	尖叶乌药	23	网脉核实	220
光叶蓝猪耳	685	尖叶六驳	15	网脉假卫矛	410
光皮木瓜	247	尖叶白粉藤	429	网脉银花	605
光皮桦	344	尖叶杜茎山	523	网脉旋蒴苣苔	688
光华柳叶菜	111	尖叶杜鹃	506	网脉琼楠	17
光秃腊瓣花	335	尖叶鸡矢树	581	网脉紫薇	108
光枝多叶勾儿茶		尖叶念珠藤	551	网络鸡血藤	318
	420	尖叶柃	147	网膜木	580
光枝湘黔冷	149	尖叶唐松草	44	同色蓝猪耳	685
光刺蕊草	735	尖叶黄肉楠	15	团花	576
光果台湾葵蓬	609	尖叶粗叶木	581	团花冬青	396
光泽锥花	726	尖叶紫金牛	519	团花鸭脚木	490
光柄筒冠花	737	尖叶楼梯草	385	肉叶茜草	595
光冠银花	604	尖头花	719	肉叶鞘蕊花	721
光盾翅藤	211	尖尾枫	708	肉豆蔻	36
光桐	213	尖尾栲	348	肉豆蔻科	36
光栓果菊	637	尖苞掌叶树	485	肉果	36
光野桐	230	尖果柰树	455	肉盾异唇花	720
光粗叶木	581	尖脉木姜	25	肉实树	515
光清香藤	543	尖萼毛柃	147	肉 实 科	515
光萼猪屎豆	300	尖萼紫珠	707	(水石梓科)	
光滑丁公藤	672	尖槐藤	570	肉桂	18
光滑麻辣子	672	尖嘴林檎	249	肉桂山荺	614
光缘大蔓	488	当归藤	522	肉桂香青	614
光蓼	90	当芽	731	刚毛三叶五加	482

刚毛米花树	162	华中老鹤草	103	华南冬青	401
刚毛芙蓉	609	华中樱花	258	华南朴	365
刚毛扁担杆	188	华中蔷薇	262	华南吴茱萸	439
幽江远志	76	华风车子	180	华南皂荚	288
曲折罗香草	726	华凤仙	106	华南柯	355
曲枝槌果藤	66	华毛茛	43	华南栲	348
回香草	729	华长蒴苣苔	691	华南素馨	543
吊兰龙胆	647	华古柯	212	华南椆	360
吊丝排草	653	华东润楠	29	华南落新妇	80
吊灯花	206	华北卫矛	407	华南紫树	481
吊杆泡	265	华四粉块藤	571	华南橄榄	448
吊罗果	521	华瓜木	479	华钩藤	600
吊钟花	500	华冬青	401	华荆芥	730
吊钟黄	622	华白花阿生草	678	华核桃	475
早谷泡	266	华白粉藤	430	华桢楠	29
早谷莓	266	华西花椒	272	华素馨	545
农吉利	299	华西金丝桃	184	华胶藤	556
贞桐花	712	华西猴欢喜	194	华润楠	29
虫蜡树	546	华杜仲藤	556	华桑寄生	414
〔/〕		华丽杜鹃	503	华萝藦	569
		华赤胫散	94	华野百合	298
华山小桔	441	华陀花	673	华清风藤	467
华山矾	532	华青荚叶	478	华密花豆	330
华山葵	61	华空木	273	华紫珠	707
华千金子藤	571	华南山矾	534	华幌伞枫	488
华千金藤	55	华南山胡椒	24	华蔷薇	261
华卫矛	406	华南云实	284	全叶小柑	441
华马钱	541	华南木姜	27	全叶芥	69
华木犀	549	华南毛柃	148	全叶核实	220
华木槿	207	华南升麻	80	全州八角枫	479
华中山柳	498	华南龙胆	648	全缘火棘	259
华中老鸦糊	706	华南玉带草	659	全缘石楠	252

全缘叶紫珠	707	多花指蒴草	65	竹节三七	489
全缘羊蹄甲	283	多花娃儿藤	573	竹节树	182
全缘柰树	456	多花野牡丹	176	竹节秋海棠	138
全缘萼	729	多花假马齿苋	677	竹节海棠	138
合欢	277	多花蓬莱葛	540	竹节蓼	88
合荫	292	多花蓼	92	竹叶木姜	28
合掌木	339	多体蕊黄檀	302	竹叶青冈栎	359
伞把树	477	多苞片悬钩子	267	竹叶柴胡	492
伞形科	491	多刺田菁	328	竹叶桐木	154
伞房紫金牛	516	多枝桉	167	竹叶荷树	154
似小叶铁线莲	41	多枝兔儿风	614	竹叶惆	359
似茄罗伞	520	多枝唐松草	44	竹叶椒	446
似铁屎木	576	多环惆	363	竹叶榕	379
伏牛花	577	多齿短柄紫珠	706	竹叶楮	359
伊桐	125	多果榄仁	181	竹枝草	86
仿栗	194	多葵草	85	竹桔子	185
伤寒头	735	多脉山柳	499	竹筒蒿	632
多毛马齿苋	87	多脉柃	151	血水草	63
多毛茜草树	594	多脉檉木	450	血见愁	739
多叶勾儿茶	419	多脉润楠	30	血见愁	316
多头花塔草	721	多香木	241	血凤藤	317, 424
多头花楼梯草	386	多籽南五味子	9	血头果	8
多头蒿	617	多翅果	570	血色杜鹃	503
多花山竹子	185	多裂叶芥	69	血苋	102
多花山矾	537	多裂瓜萎	136	血桐	227
多花卫矛	408	多裂恬楼	136	血党	519
多花勾儿茶	419	多裂黄檀	302	血胶树	513
多花长蒴苣苔	690	多蕊蛇菰	419	血藤	50, 320
多花可爱花	701	多穗金粟兰	62	向日葵	633
多花瓜馥木	12	多穗惆	356	自扣草	43
多花泡花树	465	多瓣蒲桃	171	白坑藤	543
多花茜木	592	竹节人参	489	朱红	343

朱红橘	435	羊角树	337	米花树	162
朱砂桔	435	羊角柴	502	米杠	291
朱砂根	517	羊角菜	69	米杠尚(壮音)	291
朱槿	206	羊角杜鹃	502	米饭花	510
朱橘	435	羊角藤	584	米良(壮音)	196
丢了棒	218	羊乳	656	米纸	198
乔木茵芋	443	羊屎木	534	米妙	161
杂木寄生	415	羊屎木	191	米层	453
杂种车轴草	331	羊屎果	118	米尾加	124
犸骝橙	66	羊桃	153	米杯(壮音)	477
年藤	566	羊麻	208	米拉藤	419
〔、〕		羊蹄躅	505	米亨加	124
安石榴	110	羊蹄	96	米波	196
安石榴科	110	羊蹄	95	米浓液	381
安息香	529	羊蹄甲	283	米查	220
安息香科	525	羊蹄草	128,628	米查能(壮音)	163
安徽杜鹃	502	羊蹄藤	281	米挣(壮音)	163
交让木	238	米丁怕(壮音)	162	米烂麻(壮音)	196
交让木	238	米子草	99	米哥	353
齐头绒	61	米子蓼	94	米宾宁(壮音)	216
齐头蒿	616	米中	360	米域	358
齐墩果	547	米勿友(壮音)	142	米念芭	103
羊刀尖	174	米丹弄(壮音)	196	米得洗	14
羊乌泡	267	米仙(壮音)	199	米炯	196
羊奶奶	158,159	米瓜(壮音)	18	米家	220
	426	米仔兰	448	米碎叶	164
羊舌树	534	米过穴	294	米碎花	148
羊角豆	203	米达栋	110	米椿树	454
羊角扭	560	米亚律(壮音)	512	米稔怀	125
羊角拗	560	米老排	337	米新	198
		米多鸡	126	米槁(壮音)	18
		米弄	4	米楮	348

米增草	305	红马蹄草	494	红花丹	653
江芒决明	287	红木	123	红花龙胆	648
江西肿瓣芹	497	红木科	123	红花羊蹄甲	281
江西堇菜	74	红天葵	138	红花羊蹄甲	283
江苏安息香	528	红云草	519	红花鸡距草	65
江南花椒	271	红车	169, 171	红花夜来香	663
江南虎皮楠	238	红车轴草	331	红花油茶	145
江南桤木	344	红毛羊蹄甲	283	红花参	204
江南野海棠	174	红毛毡	519	红花草	294
汗斑草	705	红乌柏	235	红花点草	388
冲天子	317	红叶	138	红花榈	338
冰片艾	620	红叶老枪谷	100	红花洋素馨	663
壮叶乌饭树	510	红叶树	118	红花荷树	7
决明	287	红叶哥纳香	13	红花倒水莲	695
灯台木	550	红叶藤	474	红花酢浆草	105
灯台树	477	红皮	530	红花蛇不过	94
灯盏花	106	红冬菰	418	红花紫荆	283
灯盏菜	493	红半边莲	137	红花楹	288
灯笼泡	666	红丝线	702	红刨楠	26
灯笼草	685, 711	红曲根	651	红芽大戟	581
灯笼树	500	红色对叶榕	375	红杜仲藤	557
灯笼椒	663	红血藤	330	红条紫草	661
兴山葵蓬	609	红灯笼	711	红纹凤仙	107
兴安楠木	34	红米菜	99	红芭木	338
闭花	218	红豆树	322	红芭悬钩子	269
许树	712	红花	624	红枣	424
〔 〕		红花八角	7	红果山胡椒	22
红山梅	369	红花大油茶	145	红果仔	167
红千层	163	红花木	127	红果钓樟	22
红子仔	608	红花木	338	红果树	274
红子仔	217	红花木莲	4	红果黄肉楠	15
				红果萝芙木	559

红果楠	15	红润楠	31	纤花狗牙花	554
红岩杜鹃	504	红旋蒴苣苔	688	纤花金盆	132
红鱼眼	234	红绿草	99	纤序鼠李	423
红泡刺	269	红棉	202	纤尾桃叶珊瑚	477
红线紫珠	707	红敷地发	179	纤枝糙果藤	67
红草	99	红葡萄藤	430	纤细半蒴苣苔	692
红茸毛羊蹄甲	281	红帽顶	213	纤细雀梅藤	423
红荆芥	723	红掌草	308	纤冠藤	566
红树科	182	红紫珠	709	纤脉桉	165
红背山麻杆	213	红紫麻	388	纤弱桑勒草	179
红背叶	237, 628	红喉崩	557	异毛金竹草	701
红背草	703	红锥	350	异叶山绿豆	306
红背桂	223	红蓝	703	异叶石龙尾	680
红背娘	213	红楠	31	异叶节节菜	109
红背菜	632	红椽榜	350	异叶花椒	445
红背蓝	76	红楣	142	异叶败酱	610
红蚂蟥七	690	红楣子	350	异叶泽兰	630
红脉麦果	422	红楣榜	350	异叶珍珠菜	650
红脉南烛	502	红棟	453	异叶翅子树	198
红莲	89	红棟子	453	异叶黄鹌菜	646
红茴香	7	红雾水藤	671	异叶紫云菜	705
红桦树	344	红滩杜鹃	503	异叶链莢豆	292
红盐菜	97	红辣蓼	88	异叶榕	375
红胶木	172	红簕钩	261	异形木	172
红梅花	256	红算盘子	223	异形玉叶金花	584
红桑	212	红碧桃	257	异形蒿	615
红萝卜	494	红薯	672	异果山绿豆	306
红椤	449	红藤	50, 307, 421	异果崖豆藤	316
红椤木	449	红藤菜	102	异药苣苔	688
红雀珊瑚	233	红棣	350	异型榕	375
红雀梅藤	424	红鳞蒲桃	169	异冠毛菊	620
红淡	146	纤花耳草	589	异株木犀榄	549

异裂菊	634	两广耳挖草	737	豆麻	387
异萼粗毛藤	218	两广吊石苣苔	692	豆腐木	715
阴生毛冬青	401	两广杜仲藤	557	豆腐菜	102
阴阳枫	485	两广直管花	731	豆腐渣	468
阴阳莲	89	两广围涎树	280	豆薯	323
阴行草	684	两广虎皮楠	239	豆瓣草	114
阴香	18	两广泡花树	466	豆瓣草科	113 (小二仙草科)
阳桃	104	两广倒吊笔	561	豆瓣菜	59
阳朔假野芝麻	724	两广梭罗树	200	豆瓣菜	71
防已	53	两广悬钩子	270	丽春花	64
防已马兜铃	57	两广野桐	229	赤才	455
防已叶清风藤	466	两广猕猴桃	160	赤小豆	324
防已科	50	两广清风藤	467	赤车	389
防风草	720	两广粗叶木	582	赤兰	169
那大紫玉盘	14	两广润楠	30	赤兰蒲桃	169
那藤	49	两广紫金牛	518	赤豆	323
羽叶金合欢	276	两广紫荆	288	赤苍藤	412
羽叶黄檀	302	两广紫菀	619	赤果鱼木	67
羽叶楸	697	两广猴耳环	280	赤柯	348
羽裂横蒴苣苔	695	两广萎	60	赤胫散	94
观音草	648	两广椆	363	赤桉	164
如意草	714	两广桢桐	711	赤楠	470
七笔		两广锦香草	178	赤楠蒲桃	168
[一]		两广樱桃	255	赤褐珍珠菜	653
弄七	125	两广横蒴苣苔	695	走马天风	710
两广小花藤	556	两色紫金牛	516	走马胎	518
两广千金子藤	571	两色槭	459	走茎黄连	42
两广牛奶藤	569	两面针	446	麦卡吐	557
两广长蒴苣苔	689	豆角	333	麦豆藤	333
两广耳草	588	豆翁树	192	麦果	211
		豆豉姜	26		
		豆梨	259		

壳斗科	346	花皮胶藤	553	苎麻	383
壳菜果	337	花边灯盏	495	芦莉草	704
来江藤	677	花防已	52	苏木	285
远志	77	花红茶	249	苏木科	281
远志科	75	花坪杜鹃	503	苏合香	337
还亮草	42	花点草	388	芭西	172
连江寄生	415	花葱科	659	垓芭菊	628
连明子	96	(翠梅科)		杏	255
连珠豆	319	花菱草	64	杏叶沙参	655
连钱草	44,725	花梨木	321	杏香兔儿风	613
连翘	542	花椒	444	李	258
连蕊藤	53	花椒簕	445	杜仲	339
芫花叶白前	564	花椰菜	70	杜仲科	339
芫荽	493	花榈木	321	杜仲藤	557
芫荽菊	626	花碧桃	257	杜英	191
芸苔	68	芥兰	68	杜英	193
芸香	443	芥蓝	63	杜英科	191
芫青	70	芥蓝头	68	(胆八树科)	
芙蓉木槿	207	芥菜	69	杜茎山	523
芙蓉花	206	芬芳安息香	530	杜鹃花	507
芙蓉麻	203	苍山杜鹃	503	杜鹃花科	499
苣荬菜	642	苍叶红豆	323	杉木鞘花寄生	414
苋	100	苍白秤钩风	52	杠果	471
苋科	98	苍耳	646	杨柳科	341
苋菜	100	苍耳七	81	杨栌	610
花木通	41	苍蝇花	85	杨桐	141
花心藤	412	苇谷草	638	杨梅	343
花叶八角莲	47	芹叶铁线莲	38	杨梅科	343
花叶细辛	58	芹菜	492	杨梅蚊母树	336
花叶假杜鹃	700	芨	45	扶芳藤	406
花生	293	芑叶葵	59	扶桑	206

扯根菜	81	岗松	163	何首乌	92
扯根菜	650	岗柃	148	伯乐树	458
护心胆	65	岗柃	167	伸筋藤	56
拟艾脑	622	旱山菊	615	伴蛇莲	89
拟赤杨	525	旱田草	679	佛手	437
拟厚叶惚木	482	旱禾子树	214	佛手瓜	135
拟威灵仙	39	旱莲	480	佛甲草	80
拟圆齿冬青	402	旱莲草	627	佛肚树	226
拟菊千里光	640	呂宋果	541	伽蓝菜	79
拟榕叶冬青	402	吴茱萸	439	卵心叶虎耳草	81
把天门	314	吴萸	439	卵叶山矾	536
扭曲草	233	串鱼木	575	卵叶弓果藤	572
扭肚藤	542	串珠子	551	卵叶远志	77
报春花科 (樱草科)	649	串钱草	646	卵叶杜鹃	506
韧荚红豆	322	坚龙胆	648	卵叶垂序苣苔	638
块根假野芝麻	724	坚莢树	609	卵叶兔儿风	613
		吹风散	24	卵叶娃儿藤	574
		时计草	128	卵叶雾水葛	391
		围涎树	280	卵叶海桐	122
				卵叶野丁香	583
〔一〕				卵形柔毛绣球	245
卤地菊	645	〔ノ〕		卵茄	668
肖牛耳藤	569	谷木	176	卵苞金粟兰	62
肖异木患	453	谷木	370	饭木	335
肖牧根草	655	谷木冬青	399	饭汤木	441, 602
肖柃	146	谷桉	167	饭汤树	602
肖梵天花	210	余甘子	233	饭豆	333
肖野牡丹	176	含珠草	212	饭香木	272
肖婆麻	197	含笑花	5	饭匙草	654
肖榄	412	含羞草	280	饭甑椆	360
肖紫草	679	含羞草叶黄檀	301	秀丽野海棠	174
肖蒲桃	163	含羞草科	275	秀丽惚木	483
肖韶子	457	何树	154		
肖槿	209				

秀丽鼠刺	239	沙叶毛柱铁线莲	怀庆地黃	683
秀柱花	336	沙皮树	[口]	41
秃毛冬青	400	沙朴	鸡儿肠	370 619
秃叶黄皮树	442	沙虫药	鸡爪三七	677,730 79
秃尖尾枫	708	沙先茶	鸡爪子	275 420
秃红紫珠	710	沙苋菜	鸡爪风	97 11
延平稠	359	沙针	鸡爪莲	418 420
延叶茜草	596	沙纸树	鸡爪根	370 254
延叶珍珠菜	651	沙药草	鸡爪簕	710 595
延叶鳞蕊藤	674	沙葛	鸡公尾	323 539
近邻豆腐木	714	沙椤子	鸡仔木	449 575
近穗状冠唇花	729	沙塘香草	鸡仔茶	97 141
角叶槭	463	沙滩子	鸡仔树	89 75
角刺栲	347	沙潦木	鸡矢果	215 167
角菜	98	没药树	鸡矢藤	448 591
皂合欢	279	沟厚(壮音)	鸡皮果	18 438
皂角	289	沟繁缕科	鸡头簕	83 225
皂莢	289	沉香	鸡头薯	114 310
皂帽花	11	庐山石楠	鸡头藤	254 557
刨花树	15	庐山冬青	鸡肉菜	403 86
刨花润楠	30	庐山芙蓉	鸡肉菜	207 684
钉茄	669	庐山厚朴	鸡血藤	1 320
条隆胶树	381	庐山香科	鸡血藤	739 318
利黄藤	471	庐山椴	鸡肠风	189 583
牡蒿	616	庐山鼠李	鸡卵果	423 275
		庐山馒头果	鸡肾果	225 468
辛木	162	庐山算盘子	鸡冠子	225 201
辛夷	2	庇古猪屎豆	鸡冠花	299 101
状元红	712	应春花	鸡骨草	2 291
冷饭团	8	诃子	鸡骨草	181 700
冻绿	423	补骨脂	鸡骨香	325 219

鸡骨香	26, 544	尾叶崖爬藤	431	陀螺榈	361
	630	尾叶猕猴桃	160	纽子花	561
鸡骨柴	723	尾叶黑面叶	217	纸叶琼楠	17
鸡骨常山	551	尾叶黑面神	217	纸叶榕	373
鸡屎木	441	尾叶紫薇	107	纸浆木	400
鸡屎泡	715	尾叶槌果藤	66	纳槁润楠	30
鸡桑	381	尾叶榕	375		
鸡眼子	292	灵山百灵藤	567	八 笔	
鸡眼草	314	灵川钻地风	246	[一]	
鸡眼草	212	灵川润楠	30		
鸡眼藤	584	灵川椆	361	青山安息香	529
鸡脚桑	381	灵香草	651	青凡木	216
鸡麻	261	忍冬	604	青木香	56
鸡蛋花	557	忍冬科	603	青牛胆	56
鸡蛋果	128	君迁子	512	青冈栎	360
鸡榕	371	驱蚊树	26	青冈栎寄生	417
鸡嘴椒	663	驴尾草	539	青皮木	413
鸡嘴簕	285	驳骨九节	593	青皮木科	412
尾叶山茶	142	驳骨松	364	青皮茶	155
尾叶山胡椒	21	驳骨丹	702	青皮香	397
尾叶马槟榔	66	驳骨丹	538	青皮柴	103
尾叶木蓝	312	驳骨草	593	青皮槭	461
尾叶水锥栲	349	驳骨醉鱼草	538	青兰木	124
尾叶乌饭树	509	阿丁枫	335	青江藤	403
尾叶耳草	587	阿拉伯乳香树	447	青豆藤	555
尾叶远志	75	阿婆伞	488	青杨梅	343
尾叶钓樟	21	阿婆胶	15	青苎麻	383
尾叶香楠	594	陆地棉	205	青果	181
尾叶美丽山胡椒	24	陆英	605	青果榕	380
	24	附子	36	青鱼胆	719
尾叶美丽钓樟	24	附地菜	662	青萸叶	479
尾叶铁线莲	41	陀螺果	527	青茶冬青	397

青栲	362	苦苣苔科	687	茅瓜	133
青铁果	405	苦李根	422	茅栗	346
青钱柳	475	苦李藻	422	茅莓	268
青菜	68	苦坛子	317	茅膏菜	82
青蛇丹	93	苦茄	667	茅膏菜科	82
青蛇藤	570	苦枥木	542	茄	668
青麻	383	苦罗豆	300	茄科	662
青欓	362	苦参	329	茎花防已	52
青葙	101	苦树	447	茎花崖爬藤	431
青葵	59	苦柚木	449	苹果	249
青凿木	252	苦胆木	447	莘婆	201
青蛤蟆	461	苦荬	642	茉莉花	544
青蒿	615	苦荬菜	642	茉莉茜	199
青蓝木	78	苦荞麦	95	茉来藤	675
青莧菜	72	苦桑子	447	苞叶藤	671
青榨木	575	苦桃树	258	苞壳菊	643
青榷械	461	苦梓	4	英国梧桐	341
青箭	700	苦梓	6	英雄草	684
青篱柴	103	苦菜	634	苜蓿	316
青檀	367	苦患树	457	茑萝	676
青藤	50	苦登茶	398	松风草	435
青藤公	374	苦楝	451	松叶耳草	589
青藤仔	544	苦辣树	416	松叶牡丹	87
青藤科	35	苦槛蓝	705	松寄生	414
苦木科	447	苦槛蓝科	705	松筋藤	56,83
苦叶菜	539	苦楮	351	松蒿	683
苦瓜	134	苦藶	666	松鳞螽	424
苦瓜藤通	41	苗山小蘖	46	枫叶	708
苦玄参	683	苗山毛冬青	395	枫杨	476
苦舌草	714	苗山长蒴苣苔	690	枫树	337
苦灯笼	711	苗山冬青	395	枫树寄生	414
苦芥	69	苗山槭	462	枫香	337

枫榈桂	485	拉拉藤	578	刺蒴麻	190
枫鞘花寄生	414	抽筋菜	83	刺蓼	94
杯叶西番莲	128	拖鞋花	233	刺槐	327
杯叶转心莲	128	拔毒散	209	刺簕悬钩子	268
杯苋	101	刺毛巴拉木	173	刺箣木	124
杯花凤仙	106	刺毛野锦香	173	刺糖果	262
杯果	354	刺毛黎豆	320	软水蓼	91
杯果拷	347	刺叶冬青	397	软兔儿风	613
杯菊	626	刺叶铁仔	524	软芸红豆	323
枝子	579	刺叶梔木	483	转心莲	128
枝花木奶果	216	刺苋	100	转心莲科	
枝花李榄	547	刺芫荽	494	(西番莲科)	
杭子梢	295	刺壳椒	445	转枝莲	128
杷叶山矾	532	刺茄	669	轮叶木姜	28
枕头子	287	刺茎梔木	483	轮叶牛皮消	565
构花山矾	533	刺果卫矛	409	轮叶沙参	655
构树	370	刺果牛皮消	564	轮环藤	51
枇杷	248	刺果苏木	284	轮冠木	662
板栗	346	刺果紫玉盘	14	斩蛇剑	78
板蓝根	099	刺果锥栗	347	欧地瓜儿苗	727
枚拉(壮音)	169	刺果藤	195	欧接骨木	605
枚辣叶肉实	515	刺鱼骨木	576	欧筋骨草	720
枚辣柿	512	刺籽鱼木	68	顶花艾麻	387
拦山虎	431	刺桐	310	顶序山龙眼	119
披针叶乌口树	598	刺鸭脚	484	顶序绣球防风	727
披针叶柃	149	刺桑	381	玫瑰	263
披针叶南五味子	8	刺黄连	46	玫瑰茄	206
披针叶珍珠菜	652	刺梨	263	坡油菜	197
披针叶粗叶木	582	刺萼假糙苏	733	坡油麻	197
披针叶紫珠	708	刺凿	252	坡柳	454
拍岭莴	671	刺凿	126	坡荔枝	237
拐枣	420	刺楸	488	枣	424

枣皮	477	罗盖叶	608	昂天莲	195
直生刀豆	295	罗盖英遂	608	昙花	139
直刺山芹菜	497	罗裙子	9	昌感秋海棠	137
直脉榕	377	肾叶天胡荽	495	非洲菊	631
奇异珍珠菜	652	肾茶	721	非洲棉	205
奇形绣球	242	齿叶枫桐桂	486	岭南山竹子	186
奇蒿	615	齿叶岭南槭	463	岭南山茉莉	527
武鸣杜鹃	507	齿叶泥花草	679	岭南木瓜红	527
武陵槭	464	齿叶烂泥树	491	岭南石栎	353
[ ]		齿叶铁线莲	40	岭南杜鹃	505
罗汉果	134	齿叶黄皮	437	岭南花椒	444
罗伞树	520	齿叶崖爬藤	432	岭南青冈栎	359
罗壳木	464	齿叶船柄茶	154	岭南柯	353
罗志藤	68	齿叶锈毛石斑木	260	岭南柿	513
罗甸香花藤	550	齿叶桢桐	711	岭南倒檵子	186
罗甸纤细假糙苏	731	齿叶櫻汁石楠	253	岭南椆	359
罗定白桐	230	齿苞绣线梅	250	岭南酸枣	469
罗城石楠	252	虎皮楠	238	岭南槭	463
罗城白桐	230	虎皮楠科	238	岷江鹅耳枥	345
罗星草	647	(交让木科)		岩水蓑衣	702
罗城假糙苏	732	虎耳草	81	岩生远志	77
罗晃子	291	虎耳草科	80	岩杜鹃	504
罗浮冬青	398	虎灯笼	454	岩柃	151
罗浮杜鹃	504	虎杖	89	岩茶	145
罗浮泡花树	464	虎刺	577	果盒子	224
罗浮柿	512	虎泡	270	咖啡	577
罗浮栲	349	虎崖豆藤	319	咖啡黄葵	203
罗浮粗叶木	581	虎掌牵牛	674	咖啡葵	203
罗浮槭	461	明立花	524	咀签	420
罗勒	729	明萼草	704	败酱	611
		昆明山海棠	410	败酱科	610
		昆明鸡血藤	318	具盖母草	681

[ノ]					
金不换	55	金鸡纳	577	金缕梅	336
金山蒲桃	171	金英草	64	金缕梅科	335
金千里光	640	金果瓜馥木	11	金腺萸速	606
金毛冬青	396	金果榄	56	金锦香	177
金毛柯	354	金虎尾科	210	金腰箭	643
金凤花	285	金鱼草	677	金缨子	262
金心大叶黄杨	407	金鱼藻	45	金橘	440
金心卫矛	407	金鱼藻科	45	钓丝红	211
金甲豆	324	金狗胆	56	念珠藤	551
金叶细枝柃	150	金线吊乌龟	54	念珠藤叶紫金牛	
金叶柃	147	金线吊芙蓉	81		516
金叶树	513	金线风	51	佩兰	630, 651
金瓜	131	金线草	95	侧耳根	61
金瓜核藤	566	金柑	440	使君子	181
金丝花	567	金挖耳	623	使君子科	180
金丝李	186	金盆	131	肥儿草	76
金丝苦楝藤	454	金钮扣	643	肥牛树	232
金丝桃	183	金香炉	177	肥牛草	690
金丝桃科	183	金莲木	162	肥皂莢	289
金丝梅	184	金莲木科	162	肥菜红豆	321
金丝蝴蝶	183	金莲花	106	肥猪树	370
金边桑	213	金莲花科	106	胀果木五加	486
金耳环	58	金盏花	623	周毛悬钩子	263
金光菊	639	金盏藤	40	爬山虎	430
金合欢	276	金钱草	308	爬行卫矛	406
金花树	173	金钱豹	655	爬岩香	60
金花草	204	金银花	604	爬墙虎	406
金花茶	156	金银莲花	649	爬藤榕	376
金花猕猴桃	161	金粟兰	63	鱼木	68
金龟莲	131	金粟兰科	62	鱼花草	613
		金萼杜鹃	503	鱼尾菊	646
		金锁匙	51	鱼泡菜	112

鱼草	613	垂茉莉	713	宜昌橙	436
鱼骨木	182	垂果榕	378	空心花	523
鱼骨柴	337	垂柳	342	空心菜	672
鱼黄草	675	垂盆草	80	空筒菜	637
鱼眼草	626	垂珠花	528	实心崖豆藤	318
鱼腥草	61	垂叶榕	372	宛田红花油茶	145
鱼藤草	495	垂绿柳	342	变叶木	218
狗牙木	183	乳汁藤	557	变叶榕	380
狗牙花	554			变色杜鹃	507
狗仔菜	644			变红美速	607
狗奶柴	528	单刀根	289	变秀安息香	528
狗耳菜	624	单子南蛇藤	404	夜关门	314
狗舌果	217	单子藤	404	夜合花	1
狗舌草	659	单叶红豆	323	夜来香	664
狗舌草	640	单叶泽兰	629	夜来香	113
狗芽茶	183	单叶钩长蒴苣苔		夜香木兰	1
狗肝菜	701		690	夜香牛	644
狗角藤	211	单叶拿身草	309	夜香花	572
狗尾虫	661	单叶酒饼簕	435	夜偏头草	721
狗尾红	212	单叶蔓荆	718	夜笠草	287
狗骨木	477	单叶藤桔	442	京梨	158
狗骨柴	598	单耳柃	153	盲眼果	457
狗骨簕	434	单果阿芳	10	泽八绣球	244
狗贴耳	61	单籽崖爬藤	431	泽兰	629
狗桔	434	单雄蕊败酱	610	泽兰	727
狗笠耳	61	宝巾	117	泽珍珠菜	650
狗脚迹	210	宝炉木	218	泽漆	221
狗筋蔓	83	宝塔草	710	河白草	93
狗癩木	554	宝塔菜	721	泪木	501
狐狸尾	332	宜山石楠	251	油甘子	233
垂杨柳	342	宜昌娃儿藤	573	油叶柯	356
垂枝柳	342	宜昌铁线莲	40	油瓜	132

[、]

- |        |     |        |         |        |     |
|--------|-----|--------|---------|--------|-----|
| 油芦子    | 226 | 浅裂长蒴苣苔 | 691     | 细叶野牡丹  | 175 |
| 油柿     | 512 | 泌脂藤    | 471     | 细叶银花   | 603 |
| 油茶     | 144 | 祈艾     | 616     | 细叶鼠李   | 422 |
| 油茶寄生   | 415 | 闹头花    | 505     | 细叶鼠麴草  | 632 |
| 油点草    | 388 | 闹羊花    | 505,664 | 细叶榕    | 376 |
| 油桐     | 213 | 卷花丹    | 179     | 细叶楷木   | 472 |
| 油桐寄生   | 416 | 郎陆     | 708     | 细白艾    | 614 |
| 油菜     | 68  | 怕拉马桉   | 165     | 细红藤    | 53  |
| 油患子    | 457 |        |         | 细花丁香蓼  | 112 |
| 油梨     | 34  |        |         | 细花杜鹃   | 505 |
| 油渣果    | 132 | 细小紫金牛  | 520     | 细花莴苣   | 635 |
| 油橄榄    | 547 | 细子龙    | 453     | 细青七树   | 216 |
| 泡叶柯    | 355 | 细毛山矾   | 536     | 细青漆木   | 236 |
| 泡花     | 30  | 细叶十大功劳 | 48      | 细刺毛蓼   | 88  |
| 泡花树叶槭  | 362 | 细叶水苋   | 107     | 细枝柃    | 149 |
| 泡花楠    | 30  | 细叶艾    | 617     | 细枝栲    | 347 |
| 泡吹叶花椒  | 272 | 细叶石榕   | 374     | 细枝蚬壳草  | 83  |
| 泡桐     | 682 | 细叶冬青   | 403     | 细枝鹅耳枥  | 346 |
| 泡麟蒲桃   | 170 | 细叶谷木   | 176     | 细齿叶柃木  | 150 |
| 波叶楤木   | 484 | 细叶沙参   | 656     | 细齿吊钟   | 500 |
| 波形素馨   | 542 | 细叶苦菜   | 635     | 细齿金盞藤  | 40  |
| 波利亚草   | 576 | 细叶青栎   | 362     | 细齿锥花   | 725 |
| 波状叶山蚂蝗 | 308 | 细叶青葵藤  | 60      | 细罗伞    | 520 |
| 波斯菊    | 626 | 细叶青藤   | 571     | 细果猴欢喜  | 194 |
| 波缘山矾   | 537 | 细叶变叶木  | 219     | 细柱五加   | 481 |
| 波缘艾纳香  | 622 | 细叶泥花草  | 679     | 细柄五月茶  | 214 |
| 波缘冬青   | 395 | 细叶莽芋   | 730     | 细柄水苏   | 738 |
| 泥花草    | 678 | 细叶香茶菜  | 735     | 细柄百两金  | 517 |
| 泥胡菜    | 633 | 细叶洒金榕  | 219     | 细柄杨桐   | 141 |
| 泥鳅草    | 651 | 细叶棱    | 167     | 细柄豆腐木  | 714 |
| 法国梧桐   | 341 | 细叶黄皮   | 438     | 细柄络石   | 561 |
| 浅圆齿堇菜  | 74  | 细叶野花生  | 308     | 细柄萸叶五加 | 481 |

[二]

- 细柄假卫矛 …… 409  
 细柄猴欢喜 …… 194  
 细轴荛花 …… 116  
 细样黄瓜草 …… 651  
 细圆齿火棘 …… 259  
 细圆藤 …… 53  
 细皱香薷 …… 724  
 细烟筒子 …… 267  
 细弱掌叶树 …… 484  
 细梗木五加 …… 486  
 细梗胡枝子 …… 315  
 细梗密束花 …… 334  
 细萼海桐 …… 122  
 细蒴苣苔 …… 694  
 细蕊木兰 …… 1  
 细穗爵床 …… 702  
 线叶龙胆 …… 648  
 线叶伶 …… 149  
 线叶猪屎豆 …… 299  
 线叶常绿忍冬 605  
 线条楼梯草 …… 386  
 线状紫金牛 …… 518  
 纹纹香茶菜 …… 734  
 线枝蒲桃 …… 168  
 线齿木 …… 162  
 绒叶海桐 …… 121  
 虻子草 …… 111  
 屈头鸡 …… 66  
 屈草 …… 93  
 降龙草 …… 692  
 降香黄檀 …… 301  
 降香藤 …… 12

- 降真香 …… 434  
 带状鼠李 …… 423  
 弧脉核实 …… 220  
 建楠 …… 30

## 九 笔

### [一]

- 面条树 …… 550  
 厚叶八角 …… 7  
 厚叶山矾 …… 533  
 厚叶乌饭树 …… 510  
 厚叶石楠 …… 251  
 厚叶红淡 …… 146  
 厚叶茜草树 …… 594  
 厚叶素馨 …… 544  
 厚叶铁线莲 …… 39  
 厚叶梅花草 …… 81  
 厚叶崖爬藤 …… 432  
 厚叶猕猴桃 …… 160  
 厚叶琼楠 …… 17  
 厚叶櫟木 …… 483  
 厚叶鼠刺 …… 240  
 厚叶酸藤子 …… 522  
 厚叶算盘子 …… 224  
 厚皮树 …… 470  
 厚皮树 …… 500  
 厚皮香 …… 155  
 厚皮稔 …… 215  
 厚朴 …… 2  
 厚壳树 …… 661  
 厚壳桂 …… 20
- 厚果鸡血藤 …… 317  
 厚果崖豆藤 …… 317  
 厚轴荛花 …… 116  
 厚藤 …… 674  
 厚萼凌霄 …… 695  
 歪冠苣苔 …… 694  
 咸沙木 …… 697  
 咸虾花 …… 645  
 咸虾花 …… 644  
 威灵仙 …… 30  
 南大戟 …… 221  
 南山茶 …… 145  
 南山楂 …… 247  
 南川绣球 …… 244  
 南弓果藤 …… 572  
 南天仙子 …… 702  
 南天竹 …… 48  
 南长蒴苣苔 …… 689  
 南方硷蓬 …… 98  
 南石萝藦 …… 570  
 南瓜 …… 131  
 南瓜子金 …… 565  
 南宁红豆 …… 322  
 南宁红锥 …… 351  
 南宁虎皮楠 …… 239  
 南宁冬青 …… 399  
 南宁栲 …… 347  
 南老鹳草 …… 103  
 南华木 …… 458  
 南华木科 …… 458  
 南华杜鹃 …… 507  
 南赤楠蒲桃 …… 168

南板蓝根	699	毒根斑鸠菊	643	茶叶	146
南岭山矾	533	毒鼠子科	274	茶花	143
南岭虎皮楠	238	革叶七叶树	458	茶条山矾	534
南岭柞木	126	革叶冬青	394	茶条木	454
南岭荛花	116	革叶猕猴桃	159	茶条果	534
南岭栲	350	革叶蓼	89	茶油树	144
南岭黄檀	300	革叶槭	460	茶茱萸科	411
南岭紫菀	619	革命菜	632	茶科	140
南岭棟树	451	茜木	592	茶胶树	15
南苜蓿	315	茜草	595	茶海棠	249
南胡颓子	425	茜草科	574	茶梅	145
南洋紫珠	705	荆芥	736	茶辣	439
南洋蒲桃	171	菟葵	607	茶辣	440
南洋楹	277	茸毛木蓝	313	茯苓菜	626
南屏椆	362	茸毛柏拉木	173	荞麦	90
南桦	344	茸毛胡枝子	315	荞麦七	90
南柴胡	493	茸荚红豆	322	菜	114
南柴胡	492	草本一品红	221	荠	70
南烛	501	草乌	36	荠苨	730
南蛇根	410	草龙	112	芥菜	70
南蛇簕	284	草地柳	343	萱	75
南蛇藤	404	草决明	287	茹菜	71
南紫薇	108	草珊瑚	63	尊麻叶母草	681
南醋栗	241	草棉	205	尊麻叶蟛蜞菊	645
南薄荷	734	草葡萄	426	尊麻科	382
南鞘蕊花	722	苘蒿	625	荔枝	456
牵牛	673	茵芋	443	荔枝草	632
牵根草	332	茵陈草	684	荔枝菊	630
春云实	285	茵陈蒿	616	荔枝藤	303, 474
春头草	8	茴芹美花草	37	荭草	93
春花木	260	茴香	494	药乌檀	586
毒瓜	131	茶	146	药用狗牙花	554

药用萝芙木	559	柳叶冬青	401	树梅	343
柘树	371	柳叶虎皮楠	239	树棉	205
柘藤	371	柳叶茶	145	树紫珠	705
柄果木	456	柳叶香楠	595	指天椒	663
柄果海桐	122	柳叶桉	166	指甲花	106, 108
柑	437	柳叶菜	112	指叶紫堇	65
柑桔科	434	柳叶菜科	111	珍珠兰	63
(芸香科)		柳叶润楠	31	珍珠枫	706
柑橄榄果	191	柳叶斑鸠菊	644	珍珠香青	614
柚	435	柳叶蓼	92	珍珠栗	346
柚木	716	柳枝山柑	67	珍珠梅	272
枳	442	柳桉	166	珍珠菜	650
枳壳	442	柳楠	31	珍珠盖罗伞	517
枳椇	420	柳辣草	91	玻利维亚古柯	211
相思藤	292	柿	511	玻璃生菜	636
栎	358	柿叶木姜	27	珊瑚树	608
栎叶掌叶树	485	柿科	511	珊瑚藤	87
柃叶石笔木	157	柿寄生	416	鸦片	64
柃叶油茶	143	柱头草	634	鸦胆子	447
枸杞	665	柱果桐	364	砍头树	291
枸杞菜	665	柱穗梓	344	残虫草	222
枸骨	395	柠檬	436	胡瓜	130
枸桔	442	柠檬	436	胡枝子	314
枸橼	436	柠檬香咸草	492	胡桃	475
柞木	126	柠檬桉	164	胡桃科	474
柏拉木	173	柠檬清风藤	467	胡萝卜	494
梔子	579	桎柳	128	胡麻	698
梔子花	579	桎柳科	128	胡麻草	678
梔花素馨	543	桎麻	299	胡麻斜蒴苣苔	692
柳	342	树兰	448	胡椒	60
柳叶天料木	127	树枝草	79	胡椒科	59
柳叶牛膝	99	树胶桉	166	胡椒簕	446

胡颓子科	425	贵州远志	76	蚂蚁树	335
胡蔓藤	540	贵州吴茱萸	440	蚂蚁菜	590
轻木	202	贵州青藤	35	蚂蟥七	690
〔 〕		贵州泡花树	465	〔 〕	
点地梅	649	贵州娃儿藤	573	重阳木	216
显苞齐墩果	549	贵州络石	560	重楼排草	652
显脉山绿豆	307	贵州素馨	545	重瓣狗牙花	554
显脉木犀	549	贵州梾木	477	香木莲	6
显脉乌饭树	510	贵州猴欢喜	195	香艾	620
显脉泡花树	464	贵州鼠李	422	香叶	104
显脉掌叶树	485	贵州榕	379	香叶树	22
显脉新木姜	33	省沽油科	468	香瓜	130
显脉榕	376	骨齿山矾	535	香白芷	492
星毛冠盖藤	245	临桂绣球	243	香丝草	629
星色草	85	响叶杨	341	香合欢	278
星花木五加	487	响铃豆	297	香豆	324
星状山矾	537	咳嗽草	319	香芙蓉	413
星宿草	651	咪枢	185	香花木	6
思茅酒饼簕	434	咪蚬	186	香花崖豆藤	316
思茅黄檀	302	映山红	155, 507	香花楠	6
思茅猴欢喜	195	映桦子	344	香花藤	550
思茅蒲桃	171	昭平山茶	143	香芫荽	494
思茅臀形果	259	贴生鼠麹草	631	香青皮木	413
贵州山柳	498	贴梗海棠	246	香苹婆	200
贵州山橙	556	虹石竹	84	香果新木姜	32
贵州木瓜红	528	虾子花	110	香果树	578
贵州毛柃	149	虾公木	217	香茶菜	734
贵州玉叶金花	585	虾须草	311	香茹	631
贵州石栎	355	虾钳草	620	香草	651, 738
贵州布荆	717	虾钳菜	99	香独活	492
贵州杜鹃	506	虾勒眼	150	香秋海棠	138

香信木	191	盾叶木	227	保亭秋海棠	138
香桂子	18	盾叶唐松草	44	保亭糙果藤	66
香圆	436	盾状冷水花	390	待霄草	113
香铁线莲	38	盾果草	662	钝叶白鹤藤	670
香粉叶	24	盾翅果	210	钝叶沙参	654
香椒	663	盾鳞风车子	180	钝叶黄檀	301
香椒子	446	食用短梗藤	562	钝叶崖爬藤	432
香港木兰	1	盆上芫荽	495	钝叶樟	19
香港四照花	478	盆状谷木	176	钝齿华青萸叶	479
香港瓜馥木	13	鬼羽箭	678	钝齿红紫珠	710
香港厚壳桂	21	鬼画符	216	钝齿芹叶铁线莲	
香港檫木	450	鬼针草	620		38
香港猴欢喜	194	匍茎榕	378	钝齿银钟树	526
香港楠木	29	兔儿伞	622	钟刺草	701
香港蓬莱葛	540	兔尾草	332	钟萼草	680
香港新木姜	32	急性子	106	钩虫草	97
香港算盘子	224	急解索	657	钩交刺	421
香港鹰爪	10	科尚(壮音)	291	钩状长蒴苣苔	690
香槐	297	秋分草	638	钩柄狐狸尾	332
香楠	594	秋枫	216	钩栗	352
香椿	452	秋茄树	182	钩粉草	703
香蒲桃	171	秋海棠	137	钩雀梅藤	423
香蓼	95	秋海棠科	137	钩藤	599
香蕉草	389	秋葵	203	钮子瓜	133
香糊楠	5	秋鼠麹草	631	纽扣子	664
香椽	436	信宜石柯	356	饶平石楠	253
香薷	723	信宜杜茎山	523	矩圆果木瓜红	528
香藤风	12	信宜杜鹃	503	须药藤	571
复叶苹婆	201	信宜豆腐木	716	狭叶山胡椒	21
复叶葡萄	433	信宜念珠藤	552	狭叶山香圆	469
复耳金果榄	55	信宜娃儿藤	573	狭叶山黄麻	392
复序利末花	200	信宜润楠	31		

狭叶卫矛	406	狭叶番泻叶	286	剑叶槭	462
狭叶木犀	548	狭叶楠	29	胆八树	193
狭叶木犀榄	547	狭叶蒲桃	171	胆草	648
狭叶车轮梅	261	狭叶鼠麹草	631	肺筋草	497
狭叶月桂山矾	535	狭叶鼠刺	240	脉叶香茶菜	734
狭叶牛皮消	565	狭花马钱	541	脉果漆	471
狭叶石楠	254	狭花长蒴苣苔	691	胖大海	201
狭叶四照花	478	狭序泡花树	465	胖婆茶	142
狭叶母草	680	狭桃叶珊瑚	477	胜红蓟	613
狭叶红紫珠	709	狭萼半边莲	658	〔、〕	
狭叶杜英	192	狭翼云实	285	亮毛红豆	323
狭叶崖豆藤	318	狭瓣木五加	485	亮叶女贞	546
狭叶韩信草	736	狭瓣吊灯花	563	亮叶杜英	192
狭叶败酱	610	狭瓣紫薇	108	亮叶杨桐	141
狭叶泡花树	464	独山瓜馥木	11	亮叶围涎树	280
狭叶柯	353	独脚金	684	亮叶厚皮香	156
狭叶柄果海桐	123	独脚莲	46	亮叶栎	363
狭叶茜草	596	独脚莲花	692	亮叶崖豆藤	317
狭叶香港楠	29	狮子草	637	亮叶揭阳鱼藤	303
狭叶柴胡	493	狮子球	713	亮叶猴耳环	280
狭叶倒提壶	660	狮子簕	222	亮叶槭	462
狭叶绣花针	577	牯岭鹅耳枥	345	亮绿爬山虎	430
狭叶绣线菊	272	牻牛儿苗科	103	亮薄叶山矾	531
狭叶菜豆	324	剑叶山芝麻	198	弯叶冬青	395
狭叶梔子	580	剑叶冬青	398	弯曲碎米荠	70
狭叶球兰	568	剑叶耳草	588	度量草	541
狭叶黄杨	340	剑叶杜英	192	庭藤	312
狭叶崖花子	121	剑叶金钱豹	655	疣果花椒	271
狭叶排草	653	剑叶波斯菊	626	痞子薯	293
狭叶假糙苏	732	剑叶南烛	502	穿心草	646
狭叶掌叶树	484	剑叶球兰	568	穿心草	185
狭叶蓬莱葛	540	剑叶紫金牛	518		

穿心莲	699	美花崖豆藤	318	洋芫荽	494
穿线蛇	84	美秀锥栗	350	洋金凤	285
穿破石	371	美国凌霄	695	洋柠檬	436
穿珠林	219	美栎	359	洋麻	206
穿根藤	593	美脉花楸	271	洋蒲桃	171
窃衣	498	美脉茴芋	443	洋橄榄	547
扁斗椆	361	美洲木棉	202	染色无香藤	566
扁竹花	88	美艳杜鹃	506	炮仗竹	683
扁豆	309	美新木姜	33	炮仗红	663
扁担杆	187	姜叶柯	356	炮仗花	697
扁担藤	432	首乌	92	炮弹果	552
扁果柯	354	首冠藤	281	烂头钵	234
扁果润楠	31	前胡	496	烂泥巴树	491
扁果椆	364	总状山矾	532	烂泥树	491
扁桃	471	总状千金藤	55	烂泥树科	491
扁钻	431	总序山矾	537	神仙果	7
扁球丁香	549	总序山蚂蝗	307	闽粤榜栗	349
美丁花	175	总序山绿豆	307	闽赣葡萄	433
美山矾	533	总序狸藻	687	冠盖绣球	242
美木莲	4	总苞牵牛	673	冠盖藤	245
美叶菜豆树	697	总苞楼梯草	385		
美肉穗草	178	总梗蓝猪耳	685	[一]	
美丽山胡椒	24	将军树	231, 369	眉豆	333
美丽叶子花	117	洒金榕	218	贯叶蓼	93
美丽钓樟	24	洞柿	512	蚤缀	83
美丽胡枝子	314	浓毛柏拉木	173	柔毛艾纳香	621
美丽南烛	501	浓毛野锦香	173	柔毛当归	492
美丽梧桐	196	洗手果	457	柔毛茜草	596
美丽崖豆藤	318	活血丹	725	柔毛绣球	245
美丽獐牙菜	649	活血胎	519	柔毛楼梯草	386
美丽藻百年草	647	洛阳花	84	柔刺草	700
美花兔尾草	332	洋丁香	84	退色黄岑	737

陡崖杏叶柯	352	夏季石藤	241	桂西七叶树	458
娃儿草	656	夏枯草	720	桂西黄檀	301
结衣藤	556	夏暑果	369	桂花	548
结香	115	唇形科	719	桂林乌柏	235
绒毛山绿豆	309	莲	45	桂林石楠	251
绒毛千屈菜	109	莲子草	99	桂林紫薇	108
绒毛叶山蚂蝗	309	莲生桂子花	562	桂林锥	346
绒毛杭子梢	295	莲花白	70	桂林槭	462
绒毛莘婆	201	莘艾冷水花	390	桂南山矾	536
绒毛鸭脚木	489	商麻	204	桂南木莲	3
绒毛梭罗树	200	商麻叶扁担杆	187	桂南花皮胶藤	553
绒毛椆	361	莴苣	635	桂南柯	358
绒毛野锦香	173	莴苣笋	636	桂南椆	359
绒果海木	451	莳萝	491	桂钩藤	599
绒润楠	31	蕡苕	664	桂圆	455
绒楠	31	莫菜	95	桂党参	655
络石	561	菜菔	71	桂野桐	228
绛花醉鱼草	538	菜莼	425	桂粤黄檀	302
绞股蓝	131	茺蔚	710	桔	437
孩儿茶	599	荷	45	桔仔	440
孩儿草	704	荷包豆	324	桔红(见橘红)	436
孩儿草	629	荷兰豆	324	桔梗	656
		荷花玉兰	2	桔梗石竹	659
		荷莲豆	84	桔梗科	654
		莞香	114	榜树	351
		碧迭菜	97	榜栗	348
栗	346	桂丁香	583	桃	257
栗叶算盘子	224	桂山橙	555	桃叶珊瑚	477
栗寄生	414	桂木	369	桃花心木	452
哥波(壮音)	201	桂叶素馨	543	桃金娘	167
夏无踪	44	桂北悬钩子	269	桃金娘科	163
夏花云实	283	桂北槭	460	桐花树	515

## 十 笔

[一]

- 栗
- 栗叶算盘子
- 栗寄生
- 哥波(壮音)
- 夏无踪
- 夏花云实

栓皮栎	364	翅脉百灵藤	567	圆果冬青	401
栓皮槠	364	翅莢香槐	297	圆果杜英	193
桦木叶葡萄	432	都安槭	464	圆果花楸	271
桦木科	343	盐巴米	97	圆果琼楠	15
桦角	344	盐肤木	472	圆果蔊菜	72
格木	288	盐酸树	472	圆齿两色槭	460
格林褐捷木	157	盐霜白	472	圆齿莢蒾	606
栝楼	136	壺果山矾	538	圆齿紫金牛	521
核桃	475	泰国西番莲	129	圆齿紫金牛	517
桉树	166			圆金柑	440
捕虫瞿麦	85			圆柱斑鳩菊	645
热痱草	730	唛吠	216	圆柱櫟	359
豇豆	333	唛坚(壮音)	290	圆基米花树	161
珠子草	233	唛采	6	圆眼	455
珠兰	63	唛榜	23	圆萼山矾	535
珠光绣球	242	唛梅马(壮音)	290	圆蒴蚬木	186
珠眼柯	356	唛嫩	10	圆锥花荵	710
破布木	660	唛螺陀	10	圆锥蕘花	116
破布叶	189	圆叶八角枫	480	圆锥绣球	244
破血丹	691	圆叶水锦树	602	圆滑番荔枝	10
破血丹	633	圆叶乌桕	235	鸭儿芹	494
破故纸	325	圆叶节节菜	110	鸭公青	451, 711
破铜钱	495	圆叶瓜子菜	59	鸭仔虫菜	79
较剪藤	567	圆叶杜鹃	506	鸭皂树	276
耙齿钩	21	圆叶鸡矢藤	591	鸭香草	729
翅子树	199	圆叶茅膏菜	82	鸭屎瓜	136
翅子藤	410	圆叶细辛	58	鸭脚木	490
翅子藤科	410 (希藤科)	圆叶狸藻	687	鸭脚板	455, 494
翅托叶猪屎豆	297	圆叶野扁豆	310	鸭脚黄连	37
翅果槌果藤	66	圆叶榕	372	鸭脚蓼	94
翅柃	147	圆叶舞草	305	鸭嘴花	699
		圆角金果榄	55	峨眉千里光	640

[ 1 ]

峨眉山胡椒	22	倒卵叶红淡	146	铁带藤	432
峨眉木荷	155	倒卵叶花点草	388	铁骨藤	552
峨眉五味子	9	倒卵叶琼楠	16	铁屎米	576
峨眉虎皮楠	239	倒卵叶紫麻	388	铁桐	213
峨眉紫金牛	518	倒披针叶萝芙木		铁钻	12
蚬木	186		559	铁海棠	222
蚬肉秋海棠	139	倒刺草	98	铁脚威灵仙	39
蚬肉海棠	139	倒钩藤	290	铁商木	713
蚌壳千斤拔	319	倒劈藤	65	铁榄	514
蚌壳椒	445	假白菊	623	铁锥栲	350
蚝猪刺	46	倍蕊田繁缕	83	铁篱笆	421
蚊子草	730	徐长卿	570	缺萼枫香	336
蚊母草	686	钱串木	307	缺腰叶蓼	94
蚊虫草	314	钱贯草	654	矩圆叶柃	150
贼子树	439	钻天杨	342	秤星木	393
柴龙树	411	钻地风	246	秤星树	466
柴沙利	577	钻地风	319	秤钩风	52
柴胡	492	铁刀木	287	秤锤子	253
柴胡叶链莢豆	292	铁山矾	536	秧青	302
党参	656	铁巴掌	182	积雪草	493
〔ノ〕		铁东木	216	彩叶紫苏	721
		铁仔	524	彩花马鞭草	717
胭脂花	117	铁冬青	401	彩花茄	666
胭脂麻	611	铁包金	419	皱叶卫矛	408
胶木	15, 26	铁扫把	314	皱叶芥	69
胶鸟藤	584	铁色	513	皱叶柯	354
脂麻	698	铁苋菜	212	皱叶莴苣	636
倒水莲	75	铁面将军	231	皱叶酸模	95
倒地铃	454	铁线莲	39	皱枣	425
倒吊笔	561	铁线子	514	皱果油茶	144
倒吊黄	75	铁轴草	739	皱果桐	214
倒卵叶山龙眼	118	铁挂牌	221	皱果蛇莓	247

皱纹	214	蚕豆	333	窄叶小柰树	456
皱雀梅藤	424	蚕茧草	91	窄叶石斑木	251
皱薄荷	734	爱地草	580	窄叶石楠	251
饿蚂蝗	308	笔罗子	465	窄叶坡垒	162
豺皮木姜	28	笔管榕	380	窄叶柃	152
豺皮樟	28	鸳鸯茉莉	663	窄叶厚皮香	156
狸尾草	332			窄叶蚊母树	335
狸藻科	687			窄叶落瓣油茶	144
狼牙草	312	高山栲	348	窄基红褐柃	151
透明草	390	高山望	191, 192	窄裂槭	459
透明蛇根草	590	高山蓼	93	容县瓜馥木	13
透骨草	719	高山榕	371	唐松草	44
透骨草科	719	高冬青	336	扇叶槭	461
透骨消	725	高地棉	205	扇花冷水花	390
臭节草	435	高合欢	278	凌云山杠木	250
臭矢茉莉	711	高原蟛蜞菊	646	凌云山胡椒	25
臭矢菜	67	高莴苣	635	凌云风车子	180
臭豆腐木	715	高雪轮	85	凌云悬钩子	265
臭牡丹	710	高脚白菜	70	凌霄	695
臭茉莉	711	高脚犁头草	74	凉伞木	488
臭草	443	高粱泡	267	凉粉木	595
臭草	714	离萼守宫木	236	凉粉果	377
臭英蓬	607	宽叶卫矛	406	凉粉草	728
臭蚊艾	617	宽叶拉拉藤	579	凉粉藤	51
臭菜	61	宽叶南烛	501	凉薯	323
臭假耳草	575	宽叶雪下红	521	酒饭团	8
臭椿	447	宽叶锥花	725	酒药树	468
臭棘树	439	宽花柱黄杨	340	酒饼子	14
臭棘树	715	宽卵叶山蚂蝗	305	酒饼叶	11
臭蒙藿	97	宽萼桐	363	酒饼药	434
拿身草	305	宽筋藤	56	酒饼簕	434
拿拉藤	43	家麻树	201	酒窝草	671

浙玄参	684	海南莢蒾	607	海桐皮	310
海刀豆	295	海南草珊瑚	63	海桐花	123
海木	450	海南厚壳桂	21	海桐花科	121
海风藤	8	海南毒鼠子	274	海桐假柴龙树	412
海州常山	713	海南须蕊木	411	海蚌含珠	212
海红	249	海南栲	350	海桑科	110
海红豆	276	海南倒吊笔	561	海麻	207
海杧果	553	海南臭茉莉	711	海棠	247, 249
海岛棉	205	海南铁骨藤	552	海棠叶莓	267
海罗麻	207	海南崖豆藤	317	海棠花	249
海南大风子	124	海南檉木	450	海棠椴	189
海南山龙眼	118	海南梭罗树	199	海滨油楠	290
海南马苋菜	57	海南黄栀	579	海滨薄瓣节节菜	
海南五月茶	214	海南黄檀	300		109
海南木五加	486	海南萝芙木	559	海漆	223
海南木犀榄	549	海南菜豆树	697	流产草	329
海南冬青	397	海南粗丝木	411	流苏子	598
海南耳挖草	737	海南深红直管花		涩叶藤	120
海南吊石苣苔	693		731	涩沙藤	120
海南风吹楠	36	海南密花树	524	烟斗柯	354
海南血桐	227	海南萎	59	烟草	665
海南红豆	322	海南椴	189	烟管草	623
海南红褪	142	海南蒲桃	169	粉叶轮环藤	51
海南杜鹃	504	海南鼠李	422	粉叶鱼藤	303
海南杨桐	141	海南锥栗	350	粉团	243
海南李榄	547	海南新樟	32	粉防已	55
海南余甘子	233	海南榕	374	粉苹婆	200
海南茄	669	海南韶子	457	粉背山胡椒	24
海南杯冠藤	563	海南樟	19	粉背苇谷草	638
海南轮环藤	51	海南黎豆	320	粉背雷公藤	410
海南罗伞树	520	海南霍而飞	36	粉绿牛皮消	564
海南念珠藤	551	海桐山矾	536	粉绿叶爬山虎	430

粉绿南烛	501	绢毛油麻藤	320	黄叶树	78
粉绿栒子	247	绣花针	577	黄瓜	130
粉绿钻地风	246	绣线梅	250	黄瓜香	73
粉绿秤钩风	52	绣球花	243	黄皮	438
粉绿猕猴桃	159	绣球花科	241	黄皮果	438
粉葛	326	绣球绣线菊	272	黄花夹竹桃	560
瓶头菊	636	陵水球兰	567	黄花序卫矛	406
浆果水苋	107	陶林模	557	黄花远志	75
资源木姜	27	预知子	49	黄花地丁	643
调羹树	120	展叶斑鸠菊	644	黄花鸡距草	64
益母草	726			黄花草子	315
拳头菊	628			黄花狸藻	687
拳参	89			黄花倒水莲	75

## 十一笔

### [一]

[一]		黄九牛	412	黄花船板草	113
桑	380	黄干头	89	黄花酢浆草	105
桑上寄生	416	黄山柰树	456	黄花蒿	615
桑叶榕	376	黄山景天	80	黄花蓝猪耳	685
桑枝米碎叶	164	黄牙果	186	黄花稔	208
桑科	369	黄牛木	183	黄芽木	183
桑寄生	416	黄牛奶树	535	黄芽白	70
桑寄生科	414	黄牛簕	290	黄杨	340
桑勒草	179	黄毛五月茶	214	黄杨叶冬青	394
通奶草	221	黄毛耳草	587	黄杨科	340
通条木	335	黄毛灰叶	331	黄杨刺柊	125
通条木科	334	黄毛豆腐木	715	黄杞	475
(旌节花科)		黄毛柄兔儿风	613	黄杜鹃	505
通泡木	334	黄毛掌叶树	484	黄豆	311
通草	335, 491	黄毛榕	373	黄豆树	278
通城虎	57	黄毛黎豆	321	黄连	42
通泉草	681	黄兰	5	黄连木	471
通脱木	491	黄龙退壳	371	黄菊莲	641

黄壳楠	26	黄棉木	594	芥菜	97
黄尿草	703	黄棉树	574	菠萝蜜	369
黄板木	141	黄耆	293	菠菜	98
黄板叉木	141	黄鹤菜	646	菠菜	98
黄刺茄	667	黄榄	448	菱	113
黄果	437	黄蜀葵	203	菱叶山绿豆	308
黄果厚壳桂	21	黄腺短尾叶柃	150	菱叶绣线菊	273
黄果榕	372	黄槐	287	菱角	113
黄肿木	226	黄蝉	550	菱角菜	69
黄命树	148	黄端木	141	菱果羊蹄甲	283
黄泡	265	黄槿	207	菱莢红豆	322
黄泡刺	264	黄樟	20	菱科	113
黄细心	117	黄椿木姜	28	萍乡山柳	498
黄线绸	359	黄檀	301	萍蓬草	45
黄柏	442	黄藤	52	堇叶碎米荠	71
黄荆	717	黄藤根	410	堇菜	72
黄英蘧	608	黄藤通	38	堇菜科	72
黄冠毛杜英	192	黄藨子	266	菜豆	324
黄背叶柃木	150	黄鼠李	422	菜豆树	697
黄胆草	671	菊三七	633	菜藤	412
黄珠子	122	菊芋	633	菩提树	377
黄珠子草	234	菊花	625	普泰树	234
黄桐	220	菊芹	628	萸叶五加	481
黄根	592	菊科	612	萸肉	477
黄蚕木	381	菽	311	菲岛算盘子	225
黄海棠	183	菝葜叶铁线莲	40	菲律宾合欢	278
黄桑	371	萝卜	71	莉格	125
黄堇	64	萝卜木	343, 344	菟丝子	671
黄常山	242	萝卜花	115	梅	256
黄麻	187	萝芙木	558	梅叶冬青	393
黄葵	203	萝芥叶	609	梅花草	43
黄葛榕	375	萝藦科	562	梅花钻	8

梅牢(壮音) ...	168	接骨金粟兰 ...	63	野杜瓜 ...	133
梅擦饭(壮音)	191	接骨草 ...	605, 702	野杜英 ...	191
櫟木 ...	337	接筋藤 ...	647	野牡丹 ...	175
櫟花 ...	337	排草 ...	651	野牡丹科 ...	172
梯芭木 ...	103	排草叶钮扣子	665	野皂角 ...	286
梧桐 ...	197	排钱草 ...	307	野鸡公花 ...	650
梧桐科 ...	195	救必应 ...	401	野鸡冠 ...	101
榆木 ...	154	救军粮 ...	259	野枇杷 ...	247
梓树 ...	696	救荒粮 ...	259	野枇杷 ...	465, 487
梢瓜 ...	130			野苦荬 ...	642
雪下红 ...	520			野苦荬菜 ...	634
雪见草 ...	736	野八角 ...	7	野板栗 ...	352
雪豆 ...	309, 324	野三七 ...	489	野茉莉 ...	529
雪花罂粟 ...	63	野山茶子 ...	142	野刺梨 ...	263
球子草 ...	624	野山楂 ...	247	野玫瑰 ...	261
球兰 ...	567	野木兰 ...	5	野思桃 ...	251
球叶莴苣 ...	636	野木瓜 ...	49	野金丝桃 ...	183
球花水蓼 ...	89	野木棉 ...	466	野金瓜 ...	136
球花毛麝香 ...	677	野木蓝 ...	311	野金银花 ...	604
球花珍珠菜 ...	650	野水竺麻 ...	382	野念珠藤 ...	551
球茎甘蓝 ...	68	野艾 ...	618	野鱼腥草 ...	721
球果木莲 ...	3	野艾 ...	616	野油麻 ...	203
球果柯 ...	357	野艾蒿 ...	617	野柿 ...	512
球果胆八树 ...	192	野甘草 ...	683	野茶子 ...	143
基及树 ...	660	野生菜 ...	635	野茶藤 ...	403
基脉润楠 ...	29	野冬桃 ...	192	野荞麦 ...	90
副萼翼核果 ...	424	野西瓜 ...	135	野胡椒 ...	59, 523
琉璃草 ...	660	野百合 ...	299	野鸦椿 ...	468
描绘冷水花 ...	391	野当归 ...	95	野蚂蝗 ...	308
掏马桩 ...	319	野苋 ...	100	野扁豆 ...	286
接骨木 ...	605	野芹 ...	496	野桐 ...	232
接骨丹 ...	491	野麦叶 ...	638	野桐 ...	228

[ 1 ]

野接	166	野辣椒	558	蛇床子	493
野豇豆	334	野漆树	473	蛇总管	734
野核桃	475	野豌豆	333	蛇毒	247
野芸菜	649	野薯豆	331	蛇根木	558
野蚊子草	85	野薄荷	728	蛇菰	419
野彩雀	42	鄂西石楠	253	蛇菰科	418
野海棠	137	鄂西胡颓子	426	蛇俐草	570
野烟叶	670	鄂西梾木	478	蛇婆子	201
野凉粉草	681	鄂羊蹄甲	282	蛇葡萄	427
野菰	686	鄂桂冬青	399	蛇藤	276
野菊	624	啮状玉叶金花	584	雀儿子树	715
野菊花	616	啮缘惆	360	雀儿花根	296
野黄皮	438	匙叶伽蓝菜	79	雀儿肾	517
野黄皮树	441	匙叶草	648	雀仔肾	525
野黄杨	340	匙羹藤	566	雀舌草	86
野黄桂	19	曼陀罗	664	雀舌草	184
野黄菊	624	眼镜豆	279	雀舌黄杨	340
野梧桐	229	悬钩子	267	雀梅藤	424
野梨	259	悬铃木	341	雀胸珠	310
野牵牛	673	悬铃木叶苎麻	383	崖花子	121
野格拉菲	701	悬铃木科	341	崖县泡花树	465
野葛	327	悬铃花	208	崖爬藤	431
野棉	203	蛇不过	93	崖柿	511
野棉叶扁担杆	189	蛇目菊	626	崖桑	381
野棉花	37	蛇瓜	135	崖藤	50
野棉花	37	蛇头花	713	崩大碗	493
野葡萄	433	蛇头黄	642	崩疮药	173
野番茄	667	蛇头蓼	94	常山	242
野蓝	331	蛇头藤	54	长春卫矛	407
野蓝枝子	311, 312	蛇舌莲	80	长春藤	487
野蓝靛	312, 477	蛇花藤	573	常绿重阳木	216
野锦香	173	蛇含	254		

偏肿鸭嘴花 …… 699  
 偏瓣花 …… 178  
 斜叶榕 …… 373  
 斜叶澄广花 …… 14  
 斜对叶 …… 334  
 斜脉胶桉 …… 165  
 斜脉暗罗 …… 14  
 斜蒴苣苔 …… 692  
 穗草 …… 720  
 假人参 …… 334  
 假了刁竹 …… 570  
 假九节木 …… 577  
 假大青蓝 …… 312  
 假山龙眼 …… 119  
 假山杠木 …… 253  
 假山绿豆 …… 305  
 假小花木五加 487  
 假卫矛 …… 409  
 假木豆 …… 308  
 假水八角 …… 680  
 假水瓜 …… 112  
 假水石梓 …… 514  
 假水苏 …… 724  
 假牛膝 …… 699  
 假长毛锥花 …… 726  
 假升麻 …… 246  
 假龙眼 …… 453  
 假瓜子金 …… 565  
 假半支莲 …… 652  
 假芙蓉 …… 195, 203

假花生	……	226	假烟叶	……	670
假芹菜	……	659	假通城虎	……	57
假杜鹃	……	700	假黄皮	……	67
假杨桐	……	152	假黄花	……	539
假地豆	…	292, 306	假黄杨	……	168
假地蓝	……	298	假黄草	……	208
假老虎簕	……	284	假黄麻	……	187
假西藏红花	…	206	假菠菜	……	96
假吊钟	……	499	假野丁香	……	583
假肉桂	……	33	假野木瓜	……	50
假向日葵	……	639	假野芝麻	……	724
假红芽大戟	…	580	假蛇舌草	……	576
假走马风	……	726	假斜叶榕	……	379
假鸡皮果	……	438	假绿豆	……	287
假连翘	……	713	假猫豆	……	574
假茉莉	……	712	假萎	……	61
假苹婆	……	201	假葡萄	……	433
假青梅	……	393	假琴叶悬钩子	268	
假青蒿	……	615	假散血薯	……	55
假刺藤	……	522	假紫珠	……	716
假轮叶厚皮香	156		假鹊肾树	……	381
假败酱	……	716	假蓝靛	……	313
假金鸡尾	……	678	假蓝靛	……	331
假夜来香	……	574	假鼠尾草	……	736
假茶叶	……	524	假辣蓼	……	651
假荔枝	……	49	假新妇木	……	229
假思桃	……	251	假酸枣	……	469
假钩藤	……	599	假糙苏	……	732
假桂乌口树	…	597	假螺序草	……	597
假栝楼	……	136	假鹰爪	……	11
假蚌壳椒	……	445	假镰叶乌饭树	510	
假柴胡	……	616	脱力草	……	246

脱皮树	527	盘花地不容	54	犁耙柯	357
匐伏堇	73	盘柱冬青	397	猫儿刺	395
匐茎佛甲草	80	象牙红	310	猫爪草	44
敏果	514	象牙红	736	猫合藤	158
猛老虎	653	船板草	114	猫豆	320
甜艾	617	船柄茶	153	猫尾木	696
甜叶木	225	猪牙木	217	猫尾草	332
甜叶算盘子	225	猪牙皂莢	289	猫眼草	221
甜瓜	130	猪母楠	23	猫眼草	212
甜冬青	402	猪仔笠	310	铜叶柯	358
甜麦	637	猪耳木	608	铜钱叶母草	681
甜果木通	49	猪耳风	634	铜钱树	421
甜茶	267, 356	猪耳草	178	铜钱草	650
甜荞麦	90	猪耳桐	480	铜钻	412
甜菜	97	猪血木	153	铜锤玉带草	658
甜菜子	617	猪血木	156	银叶巴豆	219
甜麻	187	猪血树	602	银叶安息香	528
甜槠	348	猪血藤	330	银叶杜茎山	523
甜橙	437	猪油果	132	银叶花	654
兜蓬菜	63	猪乸菜	97	银白杨	341
脚骨脆	127	猪殃殃	578	银边大叶黄杨	407
猕猴桃	158	猪屎豆	299	银边卫矛	407
猕猴桃科	158	猪屎青	711	银丝草	672
梨	260	猪屎栏	592	银色山矾	538
梨叶小舌菊	637	猪络木	238	银合欢	279
梨叶悬钩子	268	猪笼草	58	银条菜	727
梨叶榕	377	猪笼草科	58	银线金粟兰	62
梨叶榕	377	猪脚楠	29	银钟树	526
梨果米仔兰	449	猪婆刺	371	银珠	290
梨果榕	377	猪粥菜	388	银桦	117
盒子草	129	猪糠木	532	银柴	215
盒果藤	675	犁头草	74	银柯木	154

银鹊树	468	密齿凤仙	106	婆婆指甲菜	83
银瓣崖豆藤	316	密脉木	586	淮木通	41
〔、〕		密脉鸭脚木	490	清风藤	467
麻子藤	558	密脉蒲桃	169	清风藤科	464
麻札木	289	密雀梅藤	423	清沙草	705
麻叶绣线菊	272	密蒙花	539	清明柳	342
麻叶绣球	272	密锥花鱼藤	304	清香木姜子	26
麻花头	642	密榴木	13	清香藤	543
麻栎	358	康膜藤	553	清藤香	57
麻风树	226, 386 387	廊茵	94	深山佛甲草	80
麻桐	209	鹿角苣苔	689	深山含笑	5
麻雀筋藤	412	鹿角藤	553	深山黄堇	64
麻梨	260	鹿饭	372	深圆齿堇菜	73
麻婆菜	736	鹿蹄草科	508	深隐长蒴苣苔	689
麻棯	449	鹿薹	327	深裂羊蹄甲	281
密子豆	327	商木	125	深紫木蓝	311
密生牵牛	673	商陆	96	淡色椴	190
密花山矾	533	商陆科	96	淡红鹿薹	327
密花千里光	640	寄生茶	417	淡黄悬钩子	266
密花木五加	486	寄生藤	417	粗毛千金藤	54
密花水锦树	600	寄色草	644	粗毛水锦树	601
密花火棘	259	剪刀股	635	粗毛水蓼	91
密花玉叶金花	584	盖碗花	207	粗毛败酱	611
密花冬青	395	望江南	286	粗毛野桐	229
密花豆	330	望江南	286	粗毛猪屎豆	299
密花远志	76	望春花	2	粗叶木	581
密花轮环藤	51	旋花科	670	粗叶水锦树	601
密花树	525	旋花藤	670	粗叶耳草	588
密花排草	651	旋复花	634	粗叶地桃花	210
密花假卫矛	409	旋蒴苣苔	688	粗叶拉拉藤	578
		婆婆针	620	粗叶梵天花	210
		婆婆纳	686	粗叶悬钩子	263

粗叶斑鸠菊	644	绿花寒莓	264	葫芦	132
粗叶楂	247	绿茎还阳参	626	葫芦茶	309
粗叶榕	378	绿果罗浮槭	461	葫芦科	129
粗齿齿冠菊	637	绿背桂	223	葛薯	323
粗珍珠菜	650	绿萼梅	256	葛藟	433
粗柄铁线莲	39	绿萼酸模	96	葛藤	326
粗脉乌饭树	509	绿葡萄	427	袞芝	371
粗脉樟	20	绿樟	466	蓖麻	234
粗根细辛	58	绿瓣绣球	242	葡萄	434
粗喙秋海棠	137	绵楮	356	葡萄叶艾麻	387
粗糙荠芋	730	绵毛娃儿藤	573	葡萄叶鱼黄草	675
粗糙悬钩子	263	绵毛千里光	640	葡萄科	426
粗糠木	343	绸缎木	282	葎草	392
粗糠柴	231	续断	612	葵叶扁担杆	187
粘木	212	续断科	612	葵叶莓	270
粘木科	212	续随子	221	落地生根	79
粘毛泡桐	682	蛋果崖豆藤	317	落地杨梅	254
粘毛黄花稔	209	蛋黄焰爵床	703	落地杨梅	247
粘毛假蓬	625	隆林耳叶柃	150	落地金钱	82
粘手风	708	隆林梭罗树	199	落地紫金牛	519
粘母草	681	隐脉琼楠	17	落地蜘蛛	254
粘身草	305	弹斗转	352	落花生	293
粘树	396	弹帽桉	166	落葵	102
粘酢浆草	105	十二笔		落葵科	102
断肠草	540	〔一〕		落瓣油茶	144
断骨藤	521	粟米草	86	蔷薇	88
〔七〕		粟米草科	86	萎叶	59
绿玉树	223	喜树	480	椅	125
绿叶山杜英	193	喜栎小苞爵床	704	棒凤仙	106
绿叶石柯	357	喜钙碎米莽	70	棒红花	725
绿豆	324			棒果榕	373
				棒棒木	365

棒筒花	162	散血子	138	酢浆草	105
棒锤瓜	135	散血丹	444	酢浆草科	104
楮	370	散沫花	108	雅丽千金藤	54
棱子藤	411	棘果卫矛	405	雅致鹿蹄草	508
棱角丝瓜	132	硬毛山芝麻	197	裂斗锥栗	349
棱果木	172	硬毛玉叶金花	585	裂叶白辛树	527
棱茎木	174	硬毛石笔木	157	裂叶秋海棠	138
棱茎半边莲	658	硬毛杨桃	160	裂叶悬钩子	267
棱枝冬青	393	硬毛莢蒾	607	裂叶绿葡萄	428
棱枝槲寄生	417	硬毛滇白珠	501	裂果金花	596
棱翅蒲桃	170	硬毛满山香	501	裂脣牡丹	175
棱蕊同心结	557	硬叶栎	357	塔花	721
椰菜	70	硬叶柯	357	越瓜	130
椆木	357	硬叶栲	352	越南瓜子金	566
椆琼楠	17	硬叶蒲桃	171	越南卫矛	406
棉毛含笑	5	硬叶鼠李	422	越南山龙眼	118
棉豆	324	硬叶樟	18	越南山胡椒	25
棉桐	209	硬质石楠	251	越南大叶藤	55
稔子	167	硬质石斑木	251	越南巴豆	220
稔膜草	76	硬骨凌霄	698	越南叶下珠	233
棕紫金牛	516	斑叶水珍珠菜	722	越南安息香	531
榔榆	368	斑叶桉	166	越南羊蹄甲	283
榔榆寄生	415	斑叶朱砂根	519	越南冷水花	389
椭圆广东绣球	243	斑花败酱	610	越南油楠	291
椭圆叶南烛	501	斑鳩菊	644	越南油茶	146
椭圆豺皮木姜	28	斑鳩木	645	越南枝实	218
椭圆野木瓜	49	斑种草	660	越南苎麻	384
棣棠花	249	琴叶飞蓬	629	越南香楠	594
揭阳鱼藤	303	琴叶悬钩子	268	越南桂木	370
搜山虎	444	琴叶碎米荠	71	越南崖豆藤	316
琼桂山香圆	469	琴叶榕	376	越南紫玉盘	15
散玉叶金花	584	琴忌郎	251	越南榆	368

越南裸瓣瓜	131	掌叶榕	379	紫荆	288
越桔	510	掌叶蓼	93	紫荆木	514
越桔杜鹃	507	掌脉山芹菜	497	紫背天葵	138
越桔爱花	508	掌裂草葡萄	426	紫背金牛	76
越桂樟	20	棠梨	260	紫背金钱	82
翘摇	294	紫云英	294	紫背绿	516
戟叶扛板归	94	紫风车子	180	紫脉鹅耳枥	345
戟叶鱼黄草	675	紫玉兰	2	紫凌木	164
戟叶犁头草	73	紫玉盘	14	紫堇科	64
戟叶蓼	95	紫龙须	67	紫雪花	653
朝开暮落花	207	紫羊蹄甲	282	紫麻	388
朝天罐	177	紫花地丁	74	紫弹树	365
博白大果油茶	143	紫花纽扣子	665	紫梗树	302
博白大果茶	143	紫花茄	667	紫蕨	695
博白油茶	143	紫花前胡	496	紫蕨科	695
博落回	64	紫花堇	74	紫萼莓	264
韩信草	737	紫花苜蓿	316	紫楠	34
逼迫子	217	紫花牽牛	674	紫槭	460
〔1〕		紫苏	733	紫薇	108
量天尺	140	紫苏草	679	紫檀	325
景天科	79	紫枝柳叶绣球	244	紫穗槐	293
鼎湖耳草	589	紫茉莉	117	紫藤	334
鼎湖合欢	279	紫茉莉科	117	黑九牛	35
鼎湖血桐	228	紫苜蓿	316	黑木姜	25
鼎湖钓樟	21	紫果猕猴桃	161	黑叶木蓝	312
齿木	254	紫金牛	518	黑叶龙吐珠	713
掌叶木	455	紫金牛科	515	黑叶谷木	176
掌叶白粉藤	429	紫金花	108	黑叶爵床	699
掌叶树	484	紫树	481	黑肉风	320
掌叶秋海棠	138	紫树科	480	黑血藤	320
掌叶复盆子	264	紫草	661	黑壳楠	23
		紫草科	659	黑饭木	337

黑果果	120	短刺南宁栲	347	短萼黄连	42
黑果娃儿藤	573	短刺栲	348	短萼野蓝	330
黑草	678	短刺锥栗	348	短筒清明花	552
黑柃	150	短茎秋海棠	138	短穗铁苋菜	212
黑面叶	216	短茎紫金牛	516	短瓣石竹	83
黑面神	216	短齿白毛假糙苏	731	铺地山绿豆	307
黑翅茎草	683			铺地草	222
黑弹树	365	短齿榕叶楼梯草	385	铺地毡	178
黑榄	448			铺地蛇	268
黑嘴蒲桃	168	短柄卫矛	408	铺地蜈蚣	587
黑藤钻	584	短柄长叶水麻	385	铺地锦	175
喃木	470	短柄本勒木	124	铺地蝙蝠草	296
喇叭花	673	短柄清风藤	466	链荚豆	292
喙顶红豆	321	短柄紫珠	706	锈毛木莲	4
喙果皂帽花	10	短柄幌伞枫	488	锈毛石斑木	260
喙嘴核桃	474	短柄樱桃	255	锈毛叶野枣	425
喙荚云实	284	短柄横蒴苣苔	694	锈毛鱼藤	303
喉咙草	649	短柱八角	6	锈毛金银花	604
喉毒药	400	短柱柃	147	锈叶鱼藤	303
蛛毛千里光	639	短柱络石	560	锈叶新木姜	32
蛛毛香青	614	短药野木瓜	49	锈色纤枝糙果藤	
晚花吊钟	500	短药蒲桃	168		67
〔J〕					
短叶岗松	163	短冠草	684	锈色柳枝山柑	67
短叶假糙苏	731	短脉杜鹃	502	锈色宿苞豆	328
短花台湾水锦树	601	短总序莢蒾	605	锈花胡颓子	426
		短翅黄杞	475	腊肠树	286
		短梗牛奶藤	569	腊瓣花	335
短花茎飞蓬	628	短梗青江藤	404	腋毛泡花树	465
短序润楠	29	短萼天料木	127	腋花络石	560
短序琼楠	16	短萼灰叶豆	330	稍秃樱桃	255
短尾叶柃	149	短萼素馨	543	猩猩木	222
		短萼海桐	121	猩猩草	221

猴耳环	280	筛箕藤	522	滑叶常山	535
猴欢喜	195	筒桂	18	滑光杜英	192
鹅不食	83			滑桃树	237
鹅不食草	624			滑萼山矾	537
鹅肠菜	86	湘桂毛萼红果树		割舌树	453
鹅脚板	497		273	愉悦蓼	91
鹅脚草	97	湘桂冷水花	391	普爷麻	387
鹅掌柴	490	湘桂锦香草	177	普通千屈菜	109
鹅掌楸	1	湖北卫矛	406	普通丝瓜	133
鹅掌藤	489	湖北羊蹄甲	282	普通油茶	144
粤羊蹄甲	282	湖北海棠	249	寒莓	264
粤柳	342	湖北悬钩子	270	遍地金	184
粤桂茄	667	湖南杨桐	141	痧药儿	730
粤桂柯	353	湖南连翘	183	粪箕笃	54
粤桂椆	360	湖南金银花	605		
粤酒饼簕	434	阔叶十大功劳	47	[丁]	
粤黄檀	300	阔叶瓜馥木	11	缅木	696
粤蛇葡萄	427	阔叶西南八角枫		缅甸木莲	3
粤黔野桐	229		480	缅甸合欢	278
粤赣紫珠	709	阔叶异形木	172	缅茄	290
番木瓜	139	阔叶金合欢	276	缅枣	425
番石榴	167	阔叶线柱苣苔	694	缘毛一碗泡	78
番茄	665	阔叶厚皮香	155	疏叶崖豆藤	318
番泻叶	286	阔叶楷木	337	疏花山桂花	124
番荔枝	10	阔叶萝芙木	558	疏花山绿豆	306
番荔枝科	10	阔叶猕猴桃	160	疏花卫矛	407
番禺匙羹藤	566	阔叶蒲桃	170	疏花本勒木	124
番樱桃	167	阔叶楼梯草	386	疏花铁青树	413
番薯	672	阔叶蜡莲绣球	244	疏花海桐	122
鲁花	125	阔叶领草	611	疏花腰骨藤	555
筐柳	342	阔萼悬钩子	269	疏花蓼	90
筋骨草	719	阔瓣白兰花	6	疏花槭	462

疏枝泡花树	464	蒺藜科	103	神葛藤	552
疏齿栲	351	蒲儿根	641	雾水藤	671
疏脉弓果藤	572	蒲公山鼠菊	614	雾水藤	671
疏脉猴欢喜	195	蒲公英	643	雾水葛	392
疏麻菜	728	蒲桃	170	雷公根	493
十三笔		蒴莲	128	雷公藤	410
〔一〕		蒴囊	605	雷公藤	410
蓝	95	薊	625	雷公枥	346
蓝花毛麝香	676	蒜头果	413	雷公惆	361
蓝花草	76	蓬莱葛	540	感应草	105
蓝花柴胡	734	椴叶山麻杆	213	桢桐	712
蓝花狸藻	687	椴叶厚壳树	661	碎米荠	71
蓝花楹	696	椴叶扁担杆	189	碌耳草	109
蓝美丁花	175	椴树	190	瑞木	335
蓝桉	165	椴树科	186	瑞香	115
蓝 雪 科	653	榄仁树	181	瑞香科	114
(白花丹科)		榄色紫金牛	519	塘葛菜	72
蓝裂膈牡丹	175	榄李	180	塘边藕	61
蓝蓼	95	榄核莲	699	鹊肾树	381
蓝靛	699	棟	451	〔二〕	
蓑衣草	629	棟叶吴茱萸	439	蜂出巢	563
蒙自山芹菜	497	棟科	448	蜂刺草	83
蒙自合欢	277	楔瓣花	657	蜈蚣七	489
蒙自苎麻	382	楔瓣花科	657	蜈蚣草	88
蒙自杜鹃	504	楹树	277	路边青	711
蒙自柃木	148	槌柱算盘子	226	路边菊	619
蒙自桤木	343	椿叶花椒	444	路边黄	650
蒙花	115	椿芽树	452	睫毛掌叶树	484
蒙国润楠	29	楠木	34	睫萼长蒴苣苔	690
蒺藜	103	榆科	365	蜀葵	204
		楷木	471	蜀榆	368

虞美人	64	鳳刺乌饭树	509	锥栗	346
幌伞枫	488	鼠刺叶石柯	356	锥栗栲	348
幌幌木	413	鼠刺科	239	锡叶藤	120
睡莲叶秋海棠	139	鼠掌老鹤草	104	锡兰莲	43
睡莲科	45	矮瓜	668	锡兰算盘子	226
睡菜科	649	矮地茶	518		
〔ノ〕					
腺山矾	534	矮地黄连	452		
腺毛泡花树	465	矮红果树	274	滇木瓜	454
腺叶山矾	531	矮茄	666	滇印琼楠	15
腺叶拉拉藤	579	矮青木	558	滇枣	425
腺叶野樱	257	矮香叶树	22	滇刺枣	425
腺边山矾	536	矮雪轮	85	滇南红果树	274
腺花香茶菜	734	矮假吊钟	499	滇南杭子梢	294
腺柄山矾	531	矮脚三郎	520	滇南蛇藤	404
腺背忍冬	603	解宝叶	189	滇香薷	723
腺点紫金牛	519	解热豆	541	滇球兰	568
腺绣线梅	250	微子蔊菜	72	滇桂山香圆	469
腺萼木	585	微毛豆腐木	716	滇桂山绿豆	306
腺鼠刺	240	微毛柃	148	滇桂木莲	3
腰果	469	微红水锦树	602	滇桂水锦树	601
腰果柯	353	微花藤	412	滇桂牛栓藤	473
腰骨藤	555	锦上添花	140	滇桂血桐	227
腥藤	412	锦毛穗花香科	738	滇桂安息香	529
鼠李冬青	393	锦地罗	82	滇桂米仔兰	449
鼠李科	419	锦鸡儿	296	滇桂金粟兰	62
鼠麹草	632	锦香草	178	滇桂茶药	568
鼠尾红	703	锦葵	207	滇桂兔儿风	613
鼠尾草	735	锦葵科	203	滇桂臭茉莉	712
鼠刺	239	锯叶竹节树	182	滇桂海桐	122
鼠刺木姜	27	锯齿赫德木	154	滇桂野茉莉	529
		锥叶榕	379	滇桂蛇根草	591
		锥果红淡	146	滇桂悬岩苣苔	694

滇桂假卫矛	410	靖西崖爬藤	431	瑶山船柄茶	153
滇桂假耳草	576	靖西假鼠李	421	瑶山麻辣子	672
滇桂斜蒴苣苔	692	靖西猴欢喜	194	瑶山锦香草	178
滇桂酸藤子	522	新木姜子	32	瑶山横蒴苣苔	694
滇绣球	245	新妇木	213	瑶果	453
滇绿豆	324	裸头排草	652	碧冬茄	666
滇琼楠	17	裸花赤瓈	135	酸叶胶藤	553
滇粤石栎	354	裸花紫珠	709	酸豆	291
滇缅花椒	272	裸芸香	443	酸闷木	607
滇鼠刺	241	福王草	638	酸枣	470
滇黔水锦树	602	福建乌饭树	509	酸味子	214
滇黔黄檀	302	福建假卫矛	409	酸味草	105
滇黔野桐	230	福建粗叶木	581	酸岭果	247
滇黔紫菀	619	福建樱桃	255	酸荞麦	90
滨木患	454	福笛木	174	酸柠檬	435
滨木犀榄	549	福禄考	659	酸筒杆	89
滨盐肤木	472	福禄花	659	酸浆	666
满山红	505	十四笔		酸模	95
满山香	500	〔一〕		酸橙	435
满天星	495	瑶山山黑豆	309	酸藤子	521
满天香	442	瑶山云实	285	酸藤果	521
满园花	71	瑶山乌饭树	511	蝶斗桐	360
满塘红	293	瑶山长蒴苣苔	691	豨莶	642
溪边桑勒草	179	瑶山杜鹃	507	聚叶珍珠菜	653
溪畔银莲花	37	瑶山竹	570	聚花艾纳香	621
溪桫	449	瑶山厚皮香	156	聚徽千里光	640
溪黄草	734	瑶山梭罗树	199	聚微花绣线梅	250
准人瓜	135	瑶山常山	242	蔷薇科	246
意敬(瑶音)	136	瑶山野木瓜	49	蔷薇莓	269
靖西七叶树	457	瑶山野海棠	174	赫德木	153
靖西长蒴苣苔	691			蔓山葡萄	433
靖西柯	353			蔓地梨	74

- 蔓赤车 ..... 389  
 蔓芭麻 ..... 388  
 蔓茎堇菜 ..... 73  
 蔓茎葫芦茶 ... 307  
 蔓性千斤拔 ... 319  
 蔓荆 ..... 718  
 蔓草虫豆 ..... 296  
 蔓胡颓子 ..... 426  
 蔓斑鳩菊 ..... 645  
 蔓菜 ..... 72  
 萝 ..... 91  
 萝子草 ..... 89  
 萝芽菜 ..... 91  
 萝科 ..... 87  
 榆木科 ..... 345  
 榆叶葵蓬 ..... 606  
 榆叶黄花稔 ... 208  
 榆藤子 ..... 279  
 榆楂 ..... 247  
 榆叶决明 ..... 287  
 榆树 ..... 329  
 榆榔柯 ..... 353  
 榆榔钻 ..... 50  
 榆榔椆 ..... 359  
 榆榔葵 ..... 59  
 榆叶冬青 ..... 396  
 榆树 ..... 376  
 榆菜 ..... 69  
 榆树 ..... 28  
 截裂翻白叶树 199  
 嘉宝山柳 ..... 499  
 嘉赐树 ..... 126

[一]

- 蜡树 ..... 546  
 蜡莲绣球 ..... 244  
 蜡菊 ..... 633  
 蜡梅 ..... 275  
 蜡梅科 ..... 275  
 蜻蜓叶 ..... 711  
 蜘蛛香 ..... 611  
 蝉翼藤 ..... 78  
 龙栗 ..... 64  
 龙栗科 ..... 63

[二]

- 膜叶钩藤 ..... 599  
 膜叶紫珠 ..... 709  
 膜叶糙果藤 ... 66  
 膜叶嘉赐树 ... 127  
 算珠豆 ..... 332  
 算盘子 ..... 225  
 算盘子密瘤木 13  
 算花葵蓬 ..... 610  
 馒头果 ..... 225  
 算牙菜 ..... 648  
 舞草 ..... 305

[三]

- 漆大伯 ..... 224  
 漆姑木 ..... 224  
 漆姑草 ..... 85  
 漆树 ..... 473

- 漆树科 ..... 469  
 漆榆 ..... 476  
 辣鸡树 ..... 32  
 辣味根 ..... 77  
 辣椒 ..... 663  
 辣椒木 ..... 121  
 辣蓼 ..... 91  
 端午艾 ..... 617  
 褐毛弓果藤 ... 572  
 褐毛四照花 ... 478  
 褐毛野桐 ..... 230  
 褐毛酸藤子 ... 522  
 褐色球兰 ..... 568  
 褐柄南蛇藤 ... 405  
 赛山梅 ..... 530  
 赛尔茜 ..... 678  
 赛苹婆 ..... 201  
 赛牡丹 ..... 64  
 赛短序润楠 ... 30  
 赛葵 ..... 208  
 肇庆鱼藤 ..... 304  
 瘦风轮菜 ..... 721

[四]

- 嫩肉木 ..... 523  
 熊巴耳 ..... 178  
 熊巴树 ..... 527  
 熊耳草 ..... 613  
 熊胆木 ..... 401  
 缨绒花 ..... 628

## 十五笔

### [一]

- 醋栗科 ..... 241  
醉鱼草 ..... 539  
醉香含笑 ..... 5  
醉酒芙蓉 ..... 206  
醉魂藤 ..... 567  
醉蝶花 ..... 67  
樗 ..... 447  
槿麻 ..... 206  
横经席 ..... 185  
横蒴苣苔 ..... 695  
槭叶悬铃木 ..... 341  
槭树科 ..... 459  
樱叶石楠 ..... 253  
樱花 ..... 258  
樱桃椒 ..... 663  
槲栎 ..... 358  
槲寄生 ..... 417  
樟叶木防已 ..... 50  
樟叶莢蒾 ..... 606  
樟叶槭 ..... 460  
樟树 ..... 18  
樟科 ..... 15  
樟梨 ..... 34  
樟寄生 ..... 416  
橄榄 ..... 448  
橄榄科 ..... 447  
橡胶树 ..... 226

- 橡胶榕 ..... 373  
蕨叶人字果 ..... 42  
蕺菜 ..... 61  
震叶花点草 ..... 388  
震叶紫麻 ..... 388  
豌豆 ..... 324

### [二]

- 蝶形花科 ..... 291  
蝴蝶花 ..... 685  
蝴蝶果 ..... 237  
蝴蝶草 ..... 647  
蝴蝶树 ..... 609  
蝴蝶蓝猪耳 ..... 685  
蝴蝶槭 ..... 462  
蝴蝶藤 ..... 129  
蝙蝠草 ..... 296  
墨菜 ..... 627,702

### [三]

- 稻槎菜 ..... 637  
箭叶黄葵 ..... 204  
箭叶淫羊藿 ..... 47  
箭叶榕 ..... 378  
箭叶蓼 ..... 90  
箭杆杨 ..... 342  
箭毒木 ..... 369  
鲫鱼胆 ..... 523,544

### [四]

- 糊溲疏 ..... 244  
澳洲金合欢 ..... 276

- 潺槁木姜 ..... 26  
潺槁树 ..... 26  
瘤果柯 ..... 356  
瘤果琼楠 ..... 16

### [七]

- 缴花山柳菊 ..... 634  
缴花木 ..... 455  
缴花鱼黄草 ..... 675  
缴花绣球 ..... 245  
缴房花耳草 ..... 587  
缴房莢蒾 ..... 606  
缴房清风藤 ..... 467  
縫石竹 ..... 84  
縫萼木 ..... 237  
縫萼乌饭树 ..... 509

## 十六笔

### [一]

- 颠茄 ..... 662  
薯豆 ..... 192  
薯豆杜英 ..... 192  
燕子尾 ..... 307  
蕹菜 ..... 672  
薄叶山矾 ..... 531  
薄叶红厚壳 ..... 185  
薄叶柏拉木 ..... 173  
薄叶胡桐 ..... 185  
薄叶梭罗树 ..... 199  
薄叶野锦香 ..... 173  
薄叶稠 ..... 359

薄柱草	586
薄荷	728
薄瓣石笔木	157
蕓芨麻	382
薜荔	377
橙	437
橘红	436
霍而飞	36
橐吾千里光	641

〔1〕

黔鱼藤	303
黔茶	142
黔贵柏拉木	172
黔贵野锦香	172
黔桂七叶树	458
黔桂三角瓣花	592
黔桂千里光	641
黔桂千金藤	54
黔桂牛奶藤	569
黔桂百灵藤	567
黔桂芑麻	382
黔桂鱼藤	304
黔桂悬钩子	265
黔桂葵叶莓	270
黔桂楂果藤	65
黔桂醉魂藤	567
黔黄藤	300
黔鄂桑	381
黔越冬青	402
黔粤柯	355

〔ノ〕

箭天剑	671
穆坪醉鱼草	539
赞桃	258

〔1〕

〔、〕

磨盘草	204
鵙鹃花	451
鵙鹃茶	63
鵙鹃麻	198
糙叶长节耳草	590
糙叶水芑麻	384
糙叶树	365
糙皮桦	344
糙果山茶	143
糙刺蓼	94
糖胶树	550
懒茶叶	491

## 十七笔

〔一〕

蘿豆	309
藁本	495
檀香	418
檀香叶寄生	417
檀香科	417
檀梨	418
翳子草	43
戴星草	642

〔、〕

糠秕琼楠	16
糠藤	584
翼朴	367

〔7〕

翼核果 ..... 424

臀形果 ..... 259

擘蓝 ..... 68

## 十八笔

### [一]

覆坡虎 ..... 379

藜 ..... 97

藜科 ..... 97

藤千里光 ..... 640

藤牡丹 ..... 172

藤茶 ..... 427

藤构 ..... 370

藤菊 ..... 643

藤菜 ..... 102

藤黄连 ..... 52

藤黄檀 ..... 301

藤蛇总管 ..... 412

藤梨 ..... 158

藤麻 ..... 392

藤麻 ..... 404

藤麻南蛇藤 ..... 404

藤商陆 ..... 673

藤葡萄 ..... 434

藤榕 ..... 374

藤槐 ..... 294

檫子公树 ..... 451

檫木 ..... 34

檫树 ..... 439

檫树寄生 ..... 415

### [一]

嚙咛 ..... 513

嚙齿鸣 ..... 125

霍麦 ..... 84

蟛蜞菊 ..... 645

### [ノ]

镰叶乌饭树 ..... 509

镰叶鱼木 ..... 68

翻白叶树 ..... 198

翻白草 ..... 254

### [、]

鹰爪 ..... 10

鹰爪花 ..... 10

癞杨梅 ..... 478

灌木苎麻 ..... 382

## 十九笔

### [一]

藻百年草 ..... 647

藿香 ..... 719

檫木 ..... 350

檫檫 ..... 436

攀茎钩藤 ..... 600

### [ノ]

蟹爪兰 ..... 140

蟹甲菊 ..... 622

### [、]

爆牙郎 ..... 176

爆仗杜鹃 ..... 507

痒草 ..... 95,704

麒麟吐珠 ..... 700

麒麟花 ..... 222

## 二十笔

### [ノ]

黧蒴 ..... 349

鳞毛蚊母树 ..... 336

鳞片水麻 ..... 385

鳞花草 ..... 703

鳞尾木 ..... 413

鳞果榕 ..... 378

鳞粃杜茎山 ..... 524

### [、]

糯米条 ..... 603

## 二十笔以上

### [一]

霸王花 ..... 140

霸王鞭 ..... 140

露珠草 ..... 111


囊萼羊蹄甲 ..... 282

### [ノ]

蠟肠草 ..... 627

# 拉丁文科名、属名索引

科名或属名后的第一个数字是科的序列号，第二个数字是页码。有“#”号者是异名，不列科号，只列页码。



Abelia .....	233	603	Actinostemma.....	103	129
Abelmoschus .....	132	203	Adelostemma .....	231	562
Abroma .....	130	195	Adenanthera .....	140	276
Abrus .....	148	291	Adenia .....	101	128
Abutilon .....	132	204	Adenophora .....	243	654
Acacia .....	146	275	Adenosma...	252	676
Acalypha .....	136	212	Adenostemma .....	238	612
ACANTHACEAE .....	259	698	Adhatoda.....	259	699
Acanthopanax .....	212	481	Adina .....	232	574
Acanthopanax# .....	485		Adinandra .....	108	140
Acanthus .....	259	698	Aegiceras.....	223	515
Acer .....	200	459	Aeginetia.....	253	686
ACERACEAE .....	200	459	Aerva.....	63	99
Achillea .....	238	612	Aeschynanthus ...	256	687
Achras .....	222	513	Aeschynomene.....	148	292
Achyranthes .....	63	98	Aeschynomene#.....	328	
Achyranthes# .....	85	99, 101	Aesculus .....	198A	457
Acmena .....	118	163	Aganosma .....	230	550
Aconitum .....	15	36	Agapetes .....	216	508
Acrocephalus .....	264	719	Agastache .....	264	719
Acronychia .....	194	434	Ageratum .....	238	613
Actinidia .....	112	158	Aglaia .....	197	448
ACTINIDIACEAE	112	158	Agrimonia .....	143	246
Actinodaphne .....	11	15	Ailanthus.....	195	447
Actinodaphne# .....	28	32	Ainsliaea .....	238	613

<i>Ajuga</i>	.....	264	719	<b>ANACARDIACEAE</b>
<i>Akebia</i>	.....	21	48	..... 205 469
<b>ALANGIACEAE</b>	.....	210	479	<i>Anacardium</i> ..... 205 469
<i>Alangium</i>	.....	210	479	<i>Anaphalis</i> ..... 238 614
<i>Albertisia</i>	.....	23	50	<i>Andrographis</i> ..... 259 699
<i>Albizzia</i>	.....	146	277	<i>Androsace</i> ..... 240 649
<i>Alchornea</i>	.....	136	213	<i>Anemone</i> ..... 15 37
<i>Aleurites</i>	.....	136	213	<i>Anethum</i> ..... 213 491
<i>Allamanda</i>	.....	230	550	<i>Angelica</i> ..... 213 492
<i>Allomorphia</i>	.....	120	172	<i>Anisochilus</i> ..... 264 720
<i>Allophylus</i>	.....	198	453	<i>Anisomeles</i> ..... 264 720
<i>Allospondias</i>	.....	205	469	<i>Anisopappus</i> ..... 238 615
<i>Alniphyllum</i>	.....	224	525	<i>Annamocarya</i> ..... 207 474
<i>Alnus</i>	.....	161	343	<i>Anneslea</i> ..... 108 142
<i>Alphonsea</i>	.....	8	10	<i>Annona</i> ..... 8 10
<i>Alseodaphne</i> <sup>#</sup>	.....	29		<b>ANNONACEAE</b> ..... 8 10
<i>Alsomitra</i> <sup>#</sup>	.....	135		<i>Anodendron</i> ..... 230 552
<i>Alstonia</i>	.....	230	550	<i>Anotis</i> ..... 232 575
<i>Alternanthera</i>	.....	63	99	<i>Anplectrum</i> ..... 120 172
<i>Althaea</i>	.....	132	204	<i>Anplectrum</i> <sup>#</sup> ..... 173
<i>Altingia</i>	.....	151	335	<i>Anthocephalus</i> ... 232 576
<i>Alysicarpus</i>	.....	148	292	<i>Antiaris</i> ..... 167 369
<i>Alyxia</i>	.....	230	551	<i>Antidesma</i> ..... 136 214
<b>AMARANTHACEAE</b>	.....			<i>Antigonum</i> ..... 57 87
	.....	63	98	<i>Antiotrema</i> ..... 249 659
<i>Amaranthus</i>	.....	63	99	<i>Antirrhinum</i> ..... 252 677
<i>Amesiodendron</i>	....	198	453	<i>Aphanamixis</i> ..... 197 449
<i>Ammannia</i>	.....	72	107	<i>Aphananthe</i> ..... 165 365
<i>Ammannia</i> <sup>#</sup>	.....	109, 110		<i>Apios</i> ..... 148 293
<i>Amorpha</i>	.....	148	293	<i>Apium</i> ..... 213 492
<b>AMPELIDACEAE</b>	193	426		<b>APOCYNACEAE</b> ..... 230 550
<i>Ampelopsis</i>	.....	193	426	<i>Apodytes</i> ..... 179 411

Aporosa .....	136	215	Asystasia*	699	
AQUIFOLIACEAE	171	393	Asystasiella .....	259	699
Aquilaria .....	81	114	Atalantia.....	194	434
Arachis.....	148	293	Atractylodes .....	238	620
Aralia .....	212	482	Atropa.....	250	662
Aralia*	489		Atylosia*	296	
ARALIACEAE.....	212	481	Aucuba...	209	477
Archiphysalis .....	250	662	Averrhoa .....	69	104
Arctium .....	238	615	Babua*	536	
Ardisia.....	223	515	Baccaurea .....	136	216
Arenaria.....	53	83	Bacopa .....	252	677
Argyreia .....	251	670	Baeckea .....	118	163
Aristolochia .....	24	56	Balanophora.....	189	413
ARISTOLOCHIACEAE			BALANOPHORACEAE		
.....	24	56	.....	189	418
Artabotrys .....	8	10	BALSAMINACEAE	71	106
Artemisia.....	238	615	Baphicacanthus ...	259	699
Artocarpus .....	167	369	Barleria .....	259	700
Aruncus .....	143	246	Barthea .....	120	172
Arytera .....	198	454	Basella .....	64	102
Asarum .....	24	58	BASELLACEAE	64	102
ASCLEPIADACEAE			Bauhinia .....	147	281
.....	231	562	Beaumontia .....	230	552
Asclepias .....	231	562	Beesia.....	15	37
Aspidopterys .....	133	210	Begonia .....	104	137
Aster .....	238	618	BEGONIACEAE	104	137
Aster*	619		Beilschmiedia .....	11	15
Asteromaea .....	238	619	Beloperone .....	259	700
Asteropyrum .....	15	37	Benincasa.....	103	129
Astilbe .....	47	80	Bennettiodendron	93	124
Astragalus .....	148	293	BERBERIDACEAE	19	46
Asyneuma.....	243	655			

Berberis .....	19	46	Brachiostemon .....	256	688
Berchemia .....	190	419	Brachystelma .....	231	562
Bergia .....	52	83	Brachystemma .....	53	83
Beta .....	61	97	Brandisia .....	252	677
Betula .....	161	344	Brassaiopsis .....	212	484
BETULACEAE .....	161	343	Brassica .....	39	68
Bidens .....	238	620	Bredia .....	120	174
BIGNONIACEAE .....	257	695	Bretschneidera .....	198A	458
Biophytum .....	69	104	BRETSCHNEIDERACEAE .....	198A	458
Bischofia .....	136	216	Breynia .....	136	216
Bixa .....	91	123	Bridelia .....	136	217
BIXACEAE .....	91	123	Briggsia .....	256	688
Blainvillea .....	238	620	Broussonetia .....	167	370
Blastus .....	120	172	Brucea .....	195	447
Blinkworthia .....	251	671	Bruguiera .....	122	182
Blumea .....	238	620	Brunella .....	264	720
Blumeopsis .....	238	622	Brunfelsia .....	250	663
Boea .....	256	688	Bryonia* .....	134	
Boehmeria .....	169	382	Bryonopsis* .....	131	
Boenninghausenia .....	194	435	Bryophyllum* .....	79	
Boerhaavia .....	83	117	Buchanania .....	205	470
Boltonia* .....	619		Buchnera .....	252	678
BOMBACACEAE .....	131	202	Bucklandia* .....	339	
Bombax* .....	202		Buddleia .....	228	538
Bonnaya* .....	678	679	Buettneria .....	130	195
BORAGINACEAE .....	249	659	Bupleurum .....	213	492
Borreria .....	232	576	Surretiiodendron .....	128	186
Boswellia .....	196	447	BURSERACEAE .....	196	447
Bothriospermum .....	249	660	BUXACEAE .....	154	340
Botryopleuron .....	252	677	Buxus .....	154	340
Bougainvillea .....	83	117			
Bowringia .....	148	294			

Cacalia .....	238	622
CACTACEAE .....	107	139
Caesalpinia .....	147	283
CAESALPINIACEAE .....	147	281
Cajanus .....	148	294
Calamintha .....	264	721
Calamintha* .....	722	
Calendula .....	238	623
Callicarpa .....	263	705
Callistemon .....	118	163
CALLITRICHACEAE .....	79	114
Callitricha .....	79	114
Calonyction .....	251	671
Calophyllum .....	126	185
Calopogonium .....	148	294
Calorhabdos .....	252	678
Calotropis .....	231	562
CALYCANTHACEAE .....	145	275
Calystegia .....	251	671
Camchaya .....	238	623
Camellia .....	108	142
Camellia* .....	154	
CAMELLIACEAE .....	108	140
Campanula* .....	655	
CAMPANULACEAE .....	243	654
Campanumoea .....	243	655
Campanumoea* .....	656	
Campsis .....	257	695
Camptotheca .....	211	480
Campylotropis .....	148	294
Campylus* .....		56
Canarium .....	196	448
CANNABINACEAE .....	170	392
Cannabis .....	170	392
Canscora .....	239	646
Cansjera .....	183	413
Cantharospermum .....	148	296
Canthium .....	232	576
Canvalia .....	148	295
CAPPARIDACEAE .....	36	65
Capparis .....	36	65
CAPRIFOLIACEAE .....	233	603
Capsella .....	39	70
Capsicum .....	250	663
Caragana .....	148	296
Carallia .....	122	182
Cardamine .....	39	70
Cardiandra .....	142	241
Cardiopteris ...	179	411
Cardiospermum ...	198	454
Carica .....	106	139
CARICACEAE .....	106	139
Carmona .....	249	660
Carpesium .....	238	623
Carpinus .....	162	345
Carthamus .....	238	624
Carya .....	207	474

CARYOPHYLLACEAE	
.....	53... 83
<i>Caryopteris</i>	263...710
<i>Caryopteris</i> #	710
<i>Casearia</i>	94...126
<i>Cassia</i>	147...286
<i>Cassytha</i>	11... 17
<i>Castanea</i>	163...346
<i>Castanopsis</i>	163...347
<i>Casuarina</i>	164...364
CASUARINACEAE	
.....	164...364
<i>Catalpa</i>	257...695
<i>Catenaria</i> #	305
<i>Catharanthus</i>	230...552
<i>Cayratia</i>	193...428
<i>Cecropia</i>	167...370
<i>Cedrela</i> #	452
<i>Ceiba</i>	131...202
CELASTRACEAE	173...403
<i>Celastrus</i>	173...403
<i>Celosia</i>	63...101
<i>Celsia</i>	252...678
<i>Celtis</i>	165...365
<i>Centella</i>	213...493
<i>Centipeda</i>	238...624
<i>Centranthera</i>	252...678
<i>Centrostemma</i>	231...563
<i>Cephalanthus</i>	232...577
<i>Cerastium</i>	53... 83
CERATOPHYLLACEAE	
.....	17... 45
<i>Ceratophyllum</i>	17... 45
<i>Ceratoscyphus</i>	256...689
<i>Cerbera</i>	230...553
<i>Cercis</i>	147...288
<i>Ceropegia</i>	231...563
<i>Cestrum</i>	250...663
<i>Chaenomeles</i>	143...246
<i>Chasalia</i>	232...577
<i>Chavica</i> #	60
<i>Chaydaia</i>	190...420
<i>Chayota</i> #	135
CHENOPODIACEAE	
.....	61... 97
<i>Chenopodium</i>	61... 97
<i>Chimonanthus</i>	145...275
<i>Chingiacanthus</i>	259...700
<i>Chingithamnus</i> #	409
<i>Chirita</i> #	689, 690
<i>Chisocheton</i>	197...449
<i>Chlamydoboea</i>	256...689
CHLORANTHACEAE	
.....	30... 62
<i>Chloranthus</i>	30... 62
<i>Chloranthus</i> #	63
<i>Chocrospondias</i>	205...470
<i>Chonemorpha</i>	230...553
<i>Christia</i>	148...296
<i>Chrysanthemum</i>	238...624
<i>Chrysophyllum</i>	222...513
<i>Chrysosplenium</i>	47... 81
<i>Chukrasia</i>	197...449
<i>Cimicifuga</i> #	37

Cinchona.....	232	577	Coleus .....	264	721
Cinnamomum .....	11	18	<b>COMBRETACEAE</b>	121	180
Cipadessa.....	197	450	Combretum .....	121	180
Circaea .....	77	111	Commersonia .....	130	196
Cirsium .....	238	625	Commiphora .....	196	448
Cissus .....	193	429	<b>COMPOSITAE</b>	238	612
Citrullus .....	103	130	<b>CONNARACEAE</b>	206	473
Citrus .....	194	435	Connarus .....	206	473
Citrus* .....	434		Consolida .....	15	41
Cladogynos .....	136	218	<b>CONVOLVULACEAE</b>		
Cladrastis .....	148	297	.....	251	670
Claoxylon...	136	218	Convolvulus*.....	672	
Clausena .....	194	437	Conyza.....	238	625
Cleistanthus .....	136	218	Conyza*.....	620	
Cleistocalyx .....	118	163	Coptis .....	15	42
Clematis .....	15	38	Corchoropsis .....	130	196
Cleome .....	36	67	Corchorus.....	128	187
Clerodendanthus...	264	721	Corchorus* .....	196	
Clerodendron .....	263	710	Cordia .....	249	660
Clethra .....	214	498	Coreopsis .....	238	626
<b>CLETHRACEAE</b>	214	498	Coriandrum .....	213	493
Cleyera.....	108	146	Coriaria .....	87	120
Clinacanthus .....	259	700	<b>CORIARIACEAE</b>	87	120
Clitoria...	148	297	<b>CORNACEAE</b>	209	477
Cnesmone.....	136	218	Cornus .....	209	477
Cnidium .....	213	493	Cornus* .....	478	
Cocculus .....	23	50	Corydalis .....	33	64
Codariocalyx* .....	305		<b>CORYLACEAE</b>	162	345
Codiaeum.....	136	218	Corylopsis .....	151	335
Codonacanthus ...	259	701	Cotoneaster .....	143	247
Codonopsis .....	243	656	Cotula .....	238	626
Coffea .....	232	577	Craibiodendron	215	499

Craspedolobium	...148	297	Cynoglossum*	.....	659	
Crassula*	.....	80	Dactylicapnos	...33	65	
CRASSULACEAE	...45	79	Dahlia	.....	238	626
Crataegus	.....	143	Dalbergia	.....	148	300
Crataeva	.....	36	Damnacanthus	.....	232	577
Cratoxylon	.....	123	Daphne	.....	81	115
Crawfurdia	.....	239	DAPHNIPHYLLOACEAE	.....		
Crepis	.....	238	.....	136A	238	
Crepis*	.....	646	Daphniphyllum	...136A	238	
Crotalaria	.....	148	Dasymaschalon	.....	8	10
Croton	.....	136	Datura	.....	250	664
CRUCIFERAE	....	39	Daucus	.....	213	494
Cryptocarya	.....	11	Debregeasia	.....	169	384
Cryptolepis	.....	231	Decaspernum	.....	118	164
Cryptotaenia	.....	213	Deeringia	.....	63	101
Cucubalus	.....	53	Delavaya	.....	198	454
Cucumis	.....	103	Delonix	.....	148	288
Cucurbita	.....	103	Délpkinium	.....	15	42
CUCURBITACEAE	103	129	Délpkinium*	.....	41	
Cudrania	.....	167	Dendrobenthamia	209	478	
Cuscuta	.....	251	Dendropanax	.....	212	485
Cyathella	.....	231	Dendropanax*	.....	484	
Cyathocline	.....	238	Derris	.....	148	302
Cyathula	.....	63	Derris*	.....	317	
Cybanthera*	.....	680	Desmodium	.....	148	304
Cyclea	.....	23	Desmodium*	.....	332	
Cyclobalanopsis*	359	360	Desmos	.....	8	11
	361	363	Deutzia	.....	142	241
Cyclocarya	.....	207	Dianthus	.....	53	84
Cynanchum	.....	231	DICHAPETALAGEAE	.....		
Cynanchum*	.....	563	.....	144	274	
Cynoglossum	.....	249				

Dichapetalum .....	144	274
Dichocarpum .....	15	42
Dichondra .....	251	671
Dichroa .....	142	242
Diehrocephala .....	238	626
Diehrocephala# .....		626
Dicliptera .....	259	701
Didymocarpus .....	256	689
Didymocarpus# .....		693
Dillenia .....	85	120
DILLENIACEAE	85	120
Dimerocarpus .....	167	371
Diospyros .....	221	511
Dipentodon .....	173	405
Diplocisia .....	23	52
Diplocyclos .....	103	131
Diplopanax .....	212	487
Diplospora# .....		598
DIPSACACEAE	236	612
Dipsacus .....	236	612
DIPTEROCARPACEAE		
.....	116	162
Dischidanthus.....	231	565
Dischidia.....	231	565
Distylium .....	151	335
Distylium# .....		336
Dodonaea .....	198	454
Dolichos .....	148	309
Dolichos# .....	311, 326, 333	
Dolichostelma.....	231	566
Dracontomelon .....	205	470
Drosera .....	48	82
DROSERACEAE	48	82
Drymaria .....	53	84
Drypetes .....	136	220
Duabanga .....	74	110
Duchesnea .....	143	247
Dumasia .....	148	309
Dunbaria .....	148	310
Duperrea .....	232	578
Duranta .....	263	713
Dysophylla .....	264	722
Dysophylla# .....		723
Dysoisma .....	19	46
Dysoxylum .....	197	450
EBENACEAE	221	511
Eberhardtia .....	222	513
Ecdysanthera .....	230	553
Echites# .....		550
Eclipta .....	238	627
Edgeworthia .....	81	115
Ehretia .....	249	660
ELAEAGNACEAE	191	425
Elaeagnus .....	191	425
ELAEOCARPACEAE		
.....	128A	191
Elaeocarpus .....	128A	191
ELATINACEAE	52	83
Elatostema .....	169	385
Elatostema# .....		389
Elephantopus .....	238	627
Elsholtzia .....	264	723
Elsholtzia# .....		735

Elytranthe	185	414
Embelia	223	521
Emilia	238	627
Emmenopterys	232	578
Endospermum	136	220
Engelhardtia	207	475
Enkianthus	215	500
Entada	146	279
Eomecon	32	63
Epaltes	238	628
Epilobium	77	111
Epimedium	19	47
Epiphyllum	107	139
Epithema	256	692
Eranthemum	259	701
Erechtites	238	628
ERICACEAE	215	499
Erigeron	238	628
Eriobotrya	143	247
Erioglossum	198	455
Eriolaena	130	196
Eriosema	148	310
Ervatamia	230	554
Erycibe	151	672
Eryngium	213	494
Eryodendron	108	153
Erythrina	148	310
Erythropalum	182	412
Erythrophloeum	147	288
ERYTHROXYLACEAE		
	135	211
Erythroxylum	135	211

ESCALLONIACEAE		
	139	239
Eschscholtzia	32	64
Eucalyptus	118	164
Euchresta	148	311
Eucommia	152	339
EUCOMMIACEAE	152	339
Eugenia	118	167
Eugenia*	163, 168,	
	169, 170, 171	
Euonymus	173	405
Eupatorium	238	629
Euphorbia	136	220
EUPHORBIACEAE		
	136	212
Euphoria	198	455
Eurya	108	147
Euryale	18	45
Eurycorymbus	198	455
Euscaphis	204	468
Eustigma	151	336
Evodia	194	439
Evolvulus	251	672
Exacum	239	647
Exbucklandia*	338, 339	
Excoecaria	136	223
FAGACEAE		
Fagopyrum*	90	
Fagraea	228	540
Fagus	163	352
Fibraurea	23	52

Ficus .....	167	371	Geophila .....	232	580
Firmiana .....	130	196	GERANIACEAE .....	67	103
Fissistigma .....	8	11	Geranium .....	67	103
Flacourtie .....	93	124	Gerbera .....	238	630
Flacourtie* .....	126		GESNERIACEAE .....	256	687
FLACOURTIACEAE .....			Geum .....	143	248
..... .....	93	124	Gironniera .....	165	366
Flemingia* .....	319		Gleadowia .....	253	686
Fluggea .....	136	223	Glechoma .....	264	725
Foeniculum .....	213	494	Gleditsia .....	147	288
Fordia .....	143	311	Glochidion .....	136	223
Fordiophyton .....	120	174	Glossogyne .....	238	631
Forsythia .....	229	542	Glycine .....	148	311
Fortunella .....	194	440	Glycosmis .....	194	441
Fragaria .....	143	248	Gmelina .....	263	713
Fraxinus .....	229	542	Gmelina* .....	124	
FUMARIACEAE .....	33	64	Gnaphalium .....	238	631
Gaillardia .....	238	630	Goldfussia .....	259	701
Galeobdolon .....	264	724	Goldfussia* .....	700	
Galium .....	232	578	Gomphandra .....	179	411
Garcinia .....	126	185	Gomphostemma .....	264	725
Gardenia .....	232	579	Gomphrena .....	63	101
Gardneria .....	228	540	Gongronema .....	231	566
Garuga .....	196	448	Goniothalamus .....	8	13
Gaultheria .....	215	500	Gonocaryum .....	179	411
Gelsemium .....	228	540	Gonocaryum* .....	549	
Gendarussa* .....	699		Gordonia* .....	154	
Geniosporum* .....	729		Gossampinus .....	131	202
Gentiana .....	239	647	Gossypium .....	132	205
Gentiana* .....	647		Gouania .....	190	420
GENTIANACEAE .....	239	646	Grangea .....	238	632
			Graphistemma .....	231	566

<i>Gratiola</i> *	679	<i>Helicia</i>	84	118	
<i>Grevillea</i>	84	117	<i>Helicia</i> *	119, 120	
<i>Grewia</i>	128	187	<i>Heliciopsis</i>	84	119
<b>GROSSULARIACEAE</b>			<i>Helicteres</i>	130	197
	141	241	<i>Heliotropium</i>	249	661
<b>GUTTIFERAE</b>	126	185	<i>Helwingia</i>	209	478
<i>Gutzlaffia</i>	259	701	<i>Hemiboea</i>	256	692
<i>Gymnema</i>	231	566	<i>Hemigraphis</i>	259	702
<i>Gymnocladus</i>	147	289	<i>Hemistepha</i>	238	633
<i>Gymnopetalum</i>	103	131	<i>Hemsleya</i>	103	131
<i>Gymnotheca</i>	29	61	<i>Henrya</i> *		573
<i>Gynandropsis</i> *		67	<i>Henslowia</i>	186	417
<i>Gynostemma</i>	103	131	<i>Heteropanax</i>	212	488
<i>Gynostemma</i> *		135	<i>Heteroplexis</i>	238	634
<i>Gynura</i>	238	632	<i>Heterostemma</i>	231	567
			<i>Hevea</i>	136	226
<i>Hainania</i>	128	189	<i>Heynea</i>	197	450
<i>Halesia</i>	224	526	<i>Hibiscus</i>	132	206
<b>HALORAGACEAE</b>	78	113	<i>Hibiscus</i> *	203, 204, 209	
<i>Haloragis</i>	78	113	<i>Hieracium</i>	238	634
<b>HAMAMELIDACEAE</b>					
	151	335	<b>HIPPOCASTANACEAE</b>	198A	457
<i>Hamamelis</i>	151	336			
<i>Hancea</i> *	229	737		178	410
<i>Hanceola</i>	264	726	<i>Hiptage</i>	133	211
<i>Handeliodendron</i>	198	455	<i>Hodgsonia</i>	103	132
<i>Hartia</i>	108	153	<i>Helarrhena</i>	230	555
<i>Hedera</i>	212	487	<i>Holmskioldia</i>	263	714
<i>Hedyotis</i> *		589	<i>Holostemma</i>	231	567
<i>Hedysarum</i> *	296, 305		<i>Homalium</i>	94	127
<i>Helianthus</i>	238	633	<i>Homalocladium</i>	57	88
<i>Helichrysum</i>	238	633	<i>Homonoia</i>	136	226

Hopea .....	116	162	Ilex .....	171	393
Horsfieldia .....	14	36	ILLICIACEAE .....	2A	6
Houttuynia .....	29	61	Illicium.....	2A	6
Hovenia .....	190	420	Illigera .....	13A	35
Hoya .....	231	567	ILLIGERACEAE .....	13A	35
Hugeria .....	216	508	Ilysanthes .....	252	678
Humulus .....	170	392	Impatiens .....	71	106
Huodendron .....	224	526	Indigofera .....	148	311
Huthamnus .....	231	568	Inula .....	238	634
Hydnocarpus .....	93	124	Inula# .....	.....	638
Hydrangea .....	142	242	Iodes .....	179	411
HYDRANGEACEAE .....	.....	142	Ipomoea .....	251	672
HYDROCARYACEAE .....	.....	77A	Ipomoea# .....	.....	671, 675
Hydrocotyle .....	213	494	Iresine .....	63	102
Hydrolea .....	248	659	Isanthera .....	256	692
HYDROPHYLACEAE .....	.....	248	Isopyrum# .....	.....	42, 43
Hygrophila .....	259	702	Itea .....	139	239
Hylocereus .....	107	140	Itoa .....	93	125
Hymenodictyon .....	232	580	Ixeris .....	238	634
Hyoscyamus .....	250	664	IXONANTHACEAE .....	.....	.....
HYPERICACEAE .....	123	183	.....	135A	212
Hypericum .....	123	183	Ixonanthes .....	135A	212
Hypoestes .....	259	702	Ixora .....	232	580
Hypserpa .....	23	53	Jacaranda .....	257	696
Hyptis .....	264	726	Jacquemontia .....	251	674
ICACINACEAE .....	179	411	Jasminum .....	229	542
Ichnocarpus .....	230	555	Jatropha .....	136	226
Idesia .....	93	125	JUGLANDACEAE .....	207	474
			Juglans .....	207	475
			Jussiaca .....	77	112

Jussiaea*	112
Justicia	259...702
Justicia*	699
Kadsura	3 ... 8
Kalanchoe	45... 79
Kalopanax	212...488
Kandelia	122...182
Kerria	143...249
Kinostemon	264...726
Kinostemon*	738, 739
Kleinhovia	130...198
Kmeria	1 ... 1
Knoxia	232...580
Kochia	61... 98
Koelreuteria	198...455
Korthalsella	185...414
Kummerowia	148...313
Kydia	132...207
LABIATAE	264...719
Lactuca	238...635
Lactuca*	634, 635, 637
Lagenaria	103...132
Lagenophora	238...636
Lagerstroemia	72...107
Laggera	238...636
Lamium*	724, 732, 733
Lannea	205...470
Lantana	263...714
Laportea	169...386
Lapsana	238...637
LARDIZABALACEAE	
	21 ... 48
Lasianthus	232...581
Lasianthus*	592
Latouchea	239...648
Launaea	238...637
LAURACEAE	
	11 ... 15
Lawsonia	72...108
Lecanthus	169...387
Leea	193...430
LENTIBULARIACEAE	
	254...687
Leonurus	264...726
Lepidagathis	259...703
Lepionurus	183...413
Lepistemon	251...674
Lepistemon*	675
Leptodermis	232...583
Lespedeza	148...314
Lespedeza*	314
Leucaena	146...279
Leucas	264...727
Leucosceptrum*	735
Ligusticum	213...495
Ligustrum	229...545
Limnanthemum*	649
Limnophila	252...679
LINACEAE	
	65...102
Lindenbergia	252...680
Lindera	11 ... 21
Lindernia	252...680
Linociera	229...547

<i>Linum</i>	.....	65	102	
<i>Lippia</i>	.....	263	714	
<i>Liquidambar</i>	.....	151	336	
<i>Liriodendron</i>	.....	1	1	
<i>Litchi</i>	.....	198	456	
<i>Lithocarpus</i>	.....	163	352	
<i>Lithocarpus</i> *	.....	349	362	
<i>Lithospermum</i>	.....	249	661	
<i>Litsea</i>	.....	11	25	
<i>Litsea</i> *	.....	15	22, 24, 33	
<i>Lobelia</i>	.....	244	657	
<b>LOBELIACEAE</b>	...	244	657	
<i>Loeseneriella</i>	.....	178	410	
<b>LOGANIACEAE</b>	...	228	538	
<i>Lonicera</i>	.....	233	603	
<b>LORANTHACEAE</b>	...	185	414	
<i>Loranthus</i>	.....	185	414	
<i>Loranthus</i> *	.....	414		
<i>Loropetalum</i>	.....	151	337	
<i>Lotus</i>	.....	148	315	
<i>Lourea</i> *	.....	296		
<i>Loxostigma</i>	.....	256	692	
<i>Luculia</i>	.....	232	583	
<i>Ludwigia</i>	.....	77	112	
<i>Luffa</i>	.....	103	132	
<i>Lumnitzera</i>	.....	121	180	
<i>Lycianthes</i>	.....	250	664	
<i>Lycium</i>	.....	250	665	
<i>Lycopersicum</i>	.....	250	665	
<i>Lycopus</i>	.....	264	727	
<i>Lyonia</i>	.....	215	501	
<i>Lysidice</i>	.....	147	289	
<i>Lysimachia</i>	.....	240	649	
<i>Lysionotus</i>	.....	256	692	
<b>LYTHRACEAE</b>	...	72	107	
<i>Lythrum</i>	.....	72	109	
<i>Macaranga</i>	.....	136	227	
<i>Machilus</i>	.....	11	29	
<i>Macleaya</i>	.....	32	64	
<i>Macropanax</i>	.....	212	488	
<i>Madhuca</i>	.....	222	513	
<i>Maesa</i>	.....	223	523	
<i>Magnolia</i>	.....	1	1	
<b>MAGNOLIACEAE</b>	...	1	1	
<i>Mahonia</i>	.....	19	47	
<i>Malaisia</i>	.....	167	380	
<i>Malania</i>	.....	182	413	
<i>Mallotus</i>	.....	136	228	
<b>MALPIGHIACEAE</b>				
			133	210
<i>Malus</i>	.....	143	249	
<i>Malva</i>	.....	132	207	
<b>MALVACEAE</b>	...	132	203	
<i>Malvastrum</i>	.....	132	208	
<i>Malvaviscus</i>	.....	132	208	
<i>Mangifera</i>	.....	205	471	
<i>Manglietia</i>	.....	1	3	
<i>Manglietia</i> *	.....		6	
<i>Manihot</i>	.....	136	232	
<i>Manilkara</i>	.....	222	514	
<i>Maoutia</i>	.....	169	387	
<i>Mappianthus</i>	.....	179	412	
<i>Markhamia</i>	.....	257	696	

<i>Marsdenia</i>	.....	231	569	<i>Mesona</i>	.....	264	728
<i>Mastichodendron</i>	.....	222	514	<i>Mesona</i> <sup>#</sup>	.....	729	
<i>Mayodendron</i>	.....	257	696	<i>Metaplexis</i>	.....	231	569
<i>Mazus</i>	.....	252	681	<i>Mezoneurum</i>	.....	147	290
<i>Medicago</i>	.....	148	315	<i>Michelia</i>	.....	1	4
<i>Medinilla</i>	.....	120	175	<i>Microchites</i>	.....	230	556
<i>Meehania</i>	.....	264	728	<i>Microcos</i>	.....	128	189
<i>Melaleuca</i>	.....	118	167	<i>Microdesmis</i>	.....	136	232
<i>Melampyrum</i>	.....	252	682	<i>Microglossa</i>	.....	238	637
<i>Melastoma</i>	.....	120	175	<i>Micromelum</i>	.....	194	441
<b>MELASTOMACEAE</b>				<i>Microtoena</i>	.....	264	728
	.....	120	172	<i>Microtropis</i>	.....	173	409
<i>Melia</i>	.....	197	451	<i>Miliusa</i>	.....	8	13
<b>MELIACEAE</b>	.....	197	448	<i>Millettia</i>	.....	148	316
<i>Melilotus</i>	.....	148	316	<i>Mimosa</i>	.....	146	280
<i>Meliosma</i>	.....	201	464	<b>MIMOSACEAE</b>	.....	146	275
<i>Meliodendron</i>	.....	224	527	<i>Mirabilis</i>	.....	83	117
<i>Melochia</i>	.....	130	198	<i>Mischocarpus</i>	.....	198	456
<i>Melodinus</i>	.....	230	555	<i>Mitreola</i>	.....	228	541
<i>Mcldorum</i> <sup>#</sup>	.....	12		<i>Mitrephora</i>	.....	8	14
<i>Melothria</i>	.....	103	133	<i>Moghania</i>	.....	148	319
<i>Memecylon</i>	.....	120	176	<b>MOLLUGINACEAE</b>			
<i>Memoralis</i>	.....	169	388		.....	54	86
<b>MENISPERMACEAE</b>				<i>Mollugo</i>	.....	54	86
	.....	23	50	<i>Momordica</i>	.....	103	134
<i>Mentha</i>	.....	264	728	<i>Monocelastrus</i> <sup>#</sup>	.....	404	
<i>Mentha</i> <sup>#</sup>	.....	722	723	<i>Monotropa</i>	.....	218	511
<b>MENYANTHACEAE</b>				<b>MONOTROPACEAE</b>			
	.....	239A	649		.....	218	511
<i>Menyanthes</i> <sup>#</sup>	.....	649		<b>MORACEAE</b>	.....	167	369
<i>Meratia</i> <sup>#</sup>	.....	275		<i>Morinda</i>	.....	232	583
<i>Merremia</i>	.....	251	675	<i>Morus</i>	.....	167	380

Mosla*	730	731
Mucuna	148	320
Muehlenbeckia*	88	
Munronia	197	452
Muricococcum	136	232
Murraya	194	441
Mussaenda	232	584
Mycetia	232	585
MYOPORACEAE	261	705
Myoporum	261	705
Myriactis	238	637
Myrica	159	343
MYRICACEAE	159	343
Myrioneuron	232	585
Myriophyllum	78	114
Myriopteron	231	570
Myristica	14	36
MYRISTICACEAE	14	36
MYRSINACEAE	223	515
Myrsine	223	524
Myrsine*	525	
MYRTACEAE	118	163
Mytilaria	151	337
Nandina	19	48
Nanocnide	169	388
Naravelia	15	43
Nasturtium	39	71
Nasturtium*	72	
Nauclea	232	586
Neillia	143	250
Nelumbo	18	45
Neoalsomitra	103	135
Neocinnamomum	11	32
Neolitsea	11	32
Neolitsea*		24
NEPENTHACEAE	27	58
Nepenthes	27	58
Nephelium	198	457
Nerium	230	556
Nertera	232	586
Nicotiana	250	665
Nosema	264	729
Nothapodytes	179	412
Nothopanax*		488
Nuphar	18	45
NYCTAGINACEAE		
		83
		117
NYMPHAEACEAE		
		18
		45
Nymphoides	239A	649
Nyssa	211	481
NYSSACEAE	211	480
Ochna	114	162
OCHNACEAE	114	162
Ochroma	131	202
Ocimum	264	729
Ocimum*		733
Ocymum*		730
Oenanthe	213	496
Oenothera	77	113
OLACACEAE	182	412
Olax	182	413

Oldenlandia	.....	232	586
Olea	.....	229	547
Olea*	.....		549
OLEACEAE	.....	229	542
ONAGRACEAE	.....	77	111
Operculina	.....	251	675
Ophiorrhiza	.....	232	590
OPILIACEAE	.....	183	431
Opuntia	.....	107	140
Oreocharis	.....	256	693
Oreocnide	.....	169	388
Origanum	.....	264	729
Ormosia	.....	148	321
OROBANCHACEAE	.....		
	.....	253	686
Orophea	.....	8	14
Oroxylon	.....	257	696
Orthodon	.....	264	730
Orthodon*	.....		731
Orthosiphon	.....	264	731
Orthosiphon*	.....	721, 726	
Osbeckia	.....	120	177
Osmanthus	.....	229	548
Ostodes	.....	136	232
Osyris	.....	186	418
OXALIDACEAE	....	69	104
Oxalis	.....	69	105
Oxyspora	.....	120	177
Oxystelma	.....	231	570
Pachygone	.....	23	53
Pachyrhizus	.....	148	323
Pachyrhizus*	.....		327
Paederia	.....	232	591
Paeonia	.....	15	43
Pahudia	.....	147	290
Pala*	.....		550
Paliurus	.....	190	421
Panax	.....	212	489
Papaver	.....	32	64
PAPAVERACEAE	....	32	63
PAPILIONACEAE	....	148	291
Parabaena	.....	23	53
Parabarium	.....	230	556
Paracleisthus*	.....		218
Paracyclea*	.....		51, 52
Paralbizzia*	.....		279
Paramanglietia	.....	1	6
Paramignya	.....	194	442
Paraphlomis	.....	264	731
Paraprenanthes	....	238	637
Parnassia	.....	47	81
Parsonia	.....	230	557
Parthenocissus	....	193	430
Pasania*	....	347, 348, 349,	
		353, 354, 355,	
		356, 357, 358	
Passiflora	.....	101	128
PASSIFLORACEAE	.....		
	.....	101	128
Patrinia	.....	235	610
Paulownia	.....	252	682
Pavetta	.....	232	592
PEDALIACEAE	....	258	698

Pedicularis .....	252	682	Phlomis <sup>#</sup> .....	727, 732, 733
Pedilanthus.....	136	233	Phlox .....	247, 659
Pegia .....	205	471	Phoebe .....	11, 34
Pelagonium .....	67	104	Photinia .....	143, 250
Pellionia .....	169	389	Photinia <sup>#</sup> .....	273
Peltophorum .....	147	290	Phryma .....	263A, 719
Pentanema .....	238	638	PHRYMACEAE	263A, 719
Pentapetes .....	130	198	Phtheirospermum	252, 683
Pentaphragma ...	243A	657	Phyllagathis .....	120, 177
PENTAPHRAGMATACEAE			Phyllagathis <sup>#</sup> .....	179
.....	243A	657	Phyllanthodendron	136, 233
PENTAPHYLACACEAE			Phyllanthus .....	136, 233
.....	108A	158	Phyllanthus <sup>#</sup> .....	223
Pentaphylax .....	108A	158	Phylloboea <sup>#</sup> .....	689
Pentasacme .....	231	570	Phyllodium <sup>#</sup> ...	304, 306, 307
Penthorum.....	47	81	Physalis .....	250, 666
Peperomia.....	28	59	Phytolacca.....	59, 96
Pericampylus .....	23	53	PHYTOLACCACEAE	
Perilepta.....	259	703	.....	59, 96
Perilla.....	264	733	Picrasma .....	195, 447
Periploca.....	231	570	Picria .....	252, 683
Peristrophe .....	259	703	Picris .....	238, 638
Persea .....	11	34	Pilea .....	169, 389
Petrocodon .....	256	694	Pileostegia .....	142, 245
Petrocosmea .....	256	694	Pimpinella .....	213, 497
Petunia .....	250	666	Piper .....	28, 59
Peucedanum .....	213	496	PIPERACEAE	28, 59
Phaseolus.....	148	323	Pistacia .....	205, 471
Phaseolus <sup>#</sup> .....		311	Pisum .....	148, 324
Phelodendron .....	194	442	Pithecellobium .....	146, 280
Phlebochiton .....	205	471	Pithecolobium <sup>#</sup> .....	279
Phlogacanthus .....	259	703		

PITTOSPORACEAE	
.....	88...121
Pittosporum	88...121
Plagiopetalum	120...178
Planchonella	222...514
Planchonella*	513
PLANTAGINACEAE	
.....	242...654
Plantago	242...654
PLATANACEAE	155...341
Platanus	155...341
Platea	179...412
Platycarya	207...476
Platycodon	243...656
Plectranthus	264...734
Plectranthus*	721, 731, 737, 738
PLUMBAGINACEAE	
.....	241...653
Plumbago	241...653
Plumeria	230...557
Podophyllum*	46, 47
Pogostemon	264...735
Polanisia*	67
POLEMONIACEAE	
.....	247...659
Polyalthia	8...14
Polycarpaea	53...85
Polycarpon	53...85
Polygala	42...75
Polygala*	78
POLYGALACEAE	42...75
POLYGONACEAE	57...87
Polygonum	57...88
Polyosma	139...241
Polyspora	108...154
Poncirus	194...442
Pongamia	148...325
Populus	156...341
Porana	251...675
Portulaca	56...87
PORFULACACEAE	
.....	56...87
Potentilla	143...254
Pott sia	230...558
Pouteria	222...514
Pouteria*	513
Pouzolzia	169...391
Pratia	244...658
Premna	263...714
Prenanthes	238...638
PRIMULACEAE	240...649
Prismatomeris	232...592
Pristimera	178...411
Procris	169...392
Prosartema	136...234
PROTEACEAE	84...117
Prunus	143...255
Pseuderanthemum	259...703
Pseudonephélium	198...457
Pseudosassafras	11...34
Pseudostreblus	167...381
Psidium	118...167
Psilopeganum	194...443

<i>Psophocarpus</i>	.....	148	325
<i>Psoralea</i>	.....	148	325
<i>Psychotria</i>	.....	232	592
<i>Pternopetalum</i>	.....	213	497
<i>Pterocarpus</i>	.....	148	325
<i>Pterocarya</i>	.....	207	476
<i>Pterocarya</i> <sup>#</sup>	.....	475	
<i>Pteroceltis</i>	.....	165	367
<i>Pterolobium</i>	.....	147	290
<i>Pteroloma</i> <sup>#</sup>	.....	307	309
<i>Pterospermum</i>	.....	130	198
<i>Pterostyrax</i>	.....	224	527
<i>Pterygiella</i>	.....	252	683
<i>Pueraria</i>	.....	148	325
<i>Punica</i>	.....	75	110
<b>PUNICACEAE</b>	.....	75	110
<i>Pycnospora</i>	.....	148	327
<i>Pycnostelma</i>	.....	231	570
<i>Pygeum</i>	.....	143	259
<i>Pyracantha</i>	.....	143	259
<i>Pyrola</i>	.....	215A	508
<b>PYROLACEAE</b>	.....	215A	508
<i>Pyrostegia</i>	.....	257	697
<i>Pyrularia</i>	.....	186	418
<i>Pyrus</i>	.....	143	259
<i>Quamoclit</i>	.....	251	676
<i>Quercus</i>	.....	163	358
<i>Quercus</i> <sup>#</sup>	.....	347, 348, 349, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358	
<i>Quisqualis</i>	.....	121	181
<i>Radermachera</i>	.....	257	697
<i>Randia</i>	.....	232	594
<b>RANUNCULACEAE</b>			
	.....	15	36
<i>Ranunculus</i>	.....	15	43
<i>Rapanea</i>	.....	223	524
<i>Rapanea</i> <sup>#</sup>	.....	147	
<i>Raphanus</i>	.....	39	71
<i>Raphiocarpus</i>	.....	256	694
<i>Raphiolepis</i>	.....	143	260
<i>Rauvolfia</i>	.....	230	558
<i>Reevesia</i>	.....	130	199
<i>Rehderodendron</i>	.....	224	527
<i>Rehmannia</i>	.....	252	683
<i>Reinwardtia</i>	.....	65	102
<i>Reinwardtia</i> <sup>#</sup>	.....	103	
<b>RHAMNACEAE</b>	.....	190	419
<i>Rhamnella</i>	.....	190	421
<i>Rhamnus</i>	.....	190	422
<i>Rhamphocarya</i> <sup>#</sup>	.....	474	
<i>Rhinacanthus</i>	.....	259	704
<i>Rhizophora</i> <sup>#</sup>	.....	182	
<b>RHIZOPHORACEAE</b>			
	.....	122	182
<i>Rhododendron</i>	.....	215	502
<i>Rhodoleia</i>	.....	151	338
<i>Rhodomyrthus</i>	.....	118	167
<i>Rhodotypos</i>	.....	143	261
<i>Rhoiptelea</i>	.....	207A	476
<b>RHOIPTELEACEAE</b>			
	.....	207A	476

Rhus.....	205	472	Sagina .....	53	85
Rhynchoglossum ...	256	694	Salacia.....	178	411
Rhynchosia .....	148	327	SALICACEAE .....	156	341
Rhynchospermum	238	638	Salix .....	156	342
Rhynchotechum ...	256	694	Salmalia* .....	202	
Ribes .....	141	241	Salomonia .....	42	78
Ricinus .....	136	234	Salvia .....	264	735
Rinorea .....	40	72	Sambucus.....	233	605
Robinia .....	148	327	SAMYDACEAE.....	94	126
Roripa .....	39	72	Sanguisorba.....	143	270
Roripa* .....		71	Sanicula .....	213	497
Rosa.....	143	261	SANTALACEAE .....	186	417
ROSACEAE.....	143	246	Santalodes .....	206	474
Rostrinucula .....	264	735	Santalum .....	186	418
Rotala .....	72	109	SAPINDACEAE .....	198	453
Rotula .....	249	662	Sapindus .....	198	457
Rourea* .....		474	Sapium.....	136	235
Rubia .....	232	595	SAPOTACEAE .....	222	513
RUBIACEAE .....	232	574	Saraca .....	147	290
Rubus .....	143	263	Sarcandra .....	30	63
Rudbeckia .....	238	639	Sarcococca .....	154	341
Ruellia.....	259	704	Sarcopyramis .....	120	178
Ruellia* .....		678	Sarcosperma .....	222A	515
Rumex .....	57	95	Sarcosperma* .....		514
Rungia .....	259	704	SARCOSPERMACEAE .....		
Russelia .....	252	683		222A	515
Ruta.....	194	443	Sargentodoxa .....	22	50
RUTACEAE .....	194	434	SARGENTODOXACEAE .....		
				22	50
Sabia .....	201	466	Sassafras* .....		35
SABIACEAE .....	201	464	Satureia* .....		721
Sageretia.....	190	423	Saurauia .....	113	161

SAURAUIACEAE	113	161	Semiliquidambar	151	338
Sauropus	136	236	Senecio	238	639
SAURURACEAE	29	61	Senecio*		622
Saururus	29	61	Serissa	232	597
Saussurea	238	639	Serratula	238	642
Saussurea*		633	Sesamum.	258	698
Saxifraga	47	81	Sesbania	148	328
SAXIFRAGACEAE	47	80	Shuteria	148	328
Schefflera	212	489	Sida		132
Schima	108	154	Sideroxylon*		514
Schizandra	3	9	Siegesbeckia	238	642
SCHIZANDRACEAE	3	8	Silene		53
Schizomussaenda	232	596	SIMARUBACEAE	195	447
Schizonepeta	264	736	Sindechites	230	559
Schizophagma	142	246	Sindora		147
Schnabelia	264	716	Sinia		114
Schoepfia	182	413	Sinocrassula		45
Scopolia	93	125	Sinomenium		23
Scoparia	252	683	Sinopimelodendron		
Scorpiothrysus	120	179		136	237
Scrophularia	252	684	Siphocranion		264
SCROPHULARIACEAE			Siphonostegia		684
	252	676	Sisymbrium*		72
Scutellaria	264	736	Skimmia		194
Sebastiania	136	237	Slackia		256
Secamone	231	571	Sladenia		108
Sechium	103	135	Sloanea		128A
Securidaca	42	78	Smithia		148
Sedum	45	79	SOLANACEAE		250
Sedum*		80	Solanum		666
Selinum*		493	Solanum*		664
Semiaquilegia	15	44	Solidago		238

<i>Sonchus</i>	.....	238	642	<i>Stephanandra</i>	.....	143	273				
<i>Sonerila</i>	.....	120	179	<i>Stephania</i>	.....	23	53				
<b>SONNERATIACEAE</b>											
	.....	74	110	<i>Stephanotis</i>	.....	231	571				
<i>Sophora</i>	.....	148	329	<i>Sterculia</i>	.....	130	200				
<i>Sopubia</i>	.....	252	684	<b>STERCULIACEAE</b>							
<i>Sorbus</i>	.....	143	270	<i>Stereospermum</i>	....	257	697				
<i>Spatholobus</i>	.....	148	330	<i>Stereospermum</i> <sup>#</sup>	.....	697					
<i>Speranskia</i>	.....	136	237	<i>Stewartia</i>	.....	108	155				
<i>Sphaeranthus</i>	.....	238	642	<i>Stixis</i>	.....	36	68				
<i>Sphenoclea</i>	.....	243B	657	<i>Stizolobium</i> <sup>#</sup>	.....	321					
<b>SPHENOCLEACEAE</b>											
	.....	243B	657	<i>Stranvaesia</i>	.....	143	273				
<i>Spilanthes</i>	.....	238	643	<i>Streblus</i>	.....	167	381				
<i>Spinacia</i>	.....	61	98	<i>Streptocaulon</i>	.....	231	571				
<i>Spiradiclis</i>	.....	232	597	<i>Striga</i>	.....	252	684				
<i>Spiraea</i>	.....	143	272	<i>Strobilanthes</i>	.....	259	705				
<i>Spondias</i> <sup>#</sup>	.....	469	470	<i>Strobilanthes</i> <sup>#</sup>	699, 701, 703						
<i>Stachys</i>	.....	264	737	<i>Strophanthus</i>	.....	230	560				
<i>Stachytarpheta</i>	...	263	716	<i>Strophioblachia</i>	...	136	237				
<b>STACHYURACEAE</b>											
	.....	150	334	<i>Strychnos</i>	....	228	541				
<i>Stachyurus</i>	.....	150	334	<i>Stylosanthes</i>	.....	148	330				
<i>Stapfiophyton</i>	.....	120	179	<b>STYRACACEAE</b>							
<b>STAPHYLEACEAE</b>											
	.....	204	468	<i>Styrax</i>	.....	224	525				
<i>Stauntonia</i>	.....	21	49	<i>Suaeda</i>	.....	61	98				
<i>Staurogyne</i>	.....	259	704	<i>Swertia</i>	.....	239	648				
<i>Stellaria</i>	.....	53	86	<i>Swietenia</i>	.....	197	452				
<i>Stelmatocrypton</i>	...	231	571	<i>Sycopsis</i>	.....	151	338				
<i>Stemonurus</i> <sup>#</sup>	.....	411		<i>Symingtonia</i>	.....	151	338				
<i>Stenolodium</i> <sup>#</sup>	.....	294		<b>SYMPLOCACEAE</b>							
				<i>Symplocos</i>	.....	225	531				
				<i>Syndiclis</i>	.....	11	35				
				<i>Synedrella</i>	.....	238	643				
				<i>Syneilesis</i> <sup>#</sup>	.....	622					

Syringa .....	229	549	Thea*	142	143	146
Syzygium.....	118	168	THEACEAE.....	108	140	
Tagetes .....	238	643	Theopsis .....	108	156	
Talinum.....	56	87	Theopsis* .....	142		
TAMARICACEAE...	98	128	Thesium .....	186	418	
Tamarindus.....	147	291	Thespesia .....	132	209	
Tamarix.....	98	128	Thevetia .....	230	560	
Tapiscia .....	204	468	Thladiantha.....	103	135	
Taraktogenos*	124	125	Thunbergia .....	259	705	
Taraxacum .....	238	643	THYMELAEACEAE	81	114	
Tarennia .....	232	597	Thyrocarpus .....	249	662	
Tarennia*	592		Thysanospermum	232	598	
Taxotrophis .....	167	381	Tiarella .....	47	82	
Tecomaria .....	695		Tilia.....	128	189	
Tecoma.....	257	698	TILIACEAE.....	128	186	
Tectona .....	263	716	Tinomiscium .....	23	55	
Telosma .....	231	572	Tinospora .....	23	55	
Teonongia .....	167	381	Tirpitzia .....	65	103	
Tephrosia .....	148	330	Toddalia .....	194	444	
Terminalia .....	121	181	Toona .....	197	452	
Ternstroemia .....	108	155	Torenia .....	252	685	
TERNSTROEMIACEAE			Torilis .....	213	498	
.....	108	140	TorriceLLIAEAE			
Tetracera .....	85	120	.....	212A	491	
Tetrapanax .....	212	491	Tovara*	.....	95	
Tetrapilus .....	229	549	Toxocarpus .....	231	572	
Tetragastigma .....	193	431	Trachelosperma*	.....	550	
Tetrathyrium .....	151	339	Trachelospermum	230	560	
Teucrium.....	264	738	Tragia*	.....	218	
Teucrium*	726		Trapa .....	77A	113	
Thalictrum .....	15	44	Trema .....	165	367	

Trevesia .....	212	491
Trewia .....	136	237
Tribulus .....	66	103
Tricalysia .....	232	598
Trichosanthes .....	103	135
Trifolium .....	148	331
Trigonostemon ...	136	238
Trigonotis .....	249	662
Tripterygium .....	173	410
Tristania.....	118	172
Triumfetta .....	123	190
TROPAEOLACEAE	70	106
Tropaeolum .....	70	106
Tsoongia .....	263	716
Tsoongiodendron ...	1	6
Turpinia .....	204	468
Tutcheria.....	108	156
Tylophora .....	231	573
Tylophora# .....		571
ULMACEAE .....	165	365
Ulmus .....	165	368
UMBELLIFERAЕ	213	491
Uncaria .....	232	599
Uraria .....	148	331
Urariopsis .....	148	332
Urena .....	132	210
Urophylleum.....	232	600
URTICACEAE .....	169	382
Utricularia .....	254	687
Uvaria .....	8	14
Uvaria# .....		11
VACCINIACEAE	216	508
Vaccinium .....	216	508
Vaccinium# .....		500
Valeriana .....	235	611
VALERIANACEAE		
.....		235
Vallaris .....	230	561
Vandellia# .....		680, 681
Ventilago .....	190	424
Verbena .....	263	717
VERBENACEAE	263	705
Verbesina# .....		643
Vernonia .....	238	643
Veronica .....	252	686
Viburnum .....	233	605
Vicia .....	148	333
Vicoa# .....		638
Vigna .....	148	333
Viola .....	40	72
VIOLACEAE .....	40	72
Viscum.....		185
VITACEAE .....	193	426
Vitex .....	263	717
Vitis .....	193	432
Wahlenbergia .....	243	656
Walsura .....	197	453
Waltheria .....	130	201
Wattakaka .....	231	574
Webera# .....		598
Wedelia .....	238	645

Weigela .....	233	610			
Wendlandia.....	232	600	Youngia .....	238	646
Whitfordiodendron .....	148	334	Zanthoxylum .....	194	444
Wikstroemia.....	81	116	Zelkova .....	165	368
Wisteria .....	148	334	Zenia .....	147	291
Woodfordia .....	72	110	Zinnia .....	238	646
Wrightia.....	230	561	Zippelia.....	28	61
Xanthium .....	238	646	Zizyphus .....	190	424
Xanthophyllum .....	42	78	Zornia .....	148	334
Xanthophytopsis...	232	602	Zygocactus .....	107	140
Xylosma.....	93	126	ZYGOPHYLLACEAE .....	66	103

中科院植物所图书馆



S0050188

13007  
58.VI

