


Per Belg
B-4



Pattern

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR & DE L'AGRICULTURE

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

A BRUXELLES

Volume 2



BRUXELLES

MAISON D'ÉDITION A. CASTAIGNE

Albert DE BOECK, Successeur

265, Rue Royale, 265

1910

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR & DE L'AGRICULTURE

#

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

A BRUXELLES —

Volume 2



BRUXELLES

MAISON D'ÉDITION A. CASTAIGNE

Albert DE BOECK, Successeur

265, Rue Royale, 265

1910

ARND BRONKHORST
GRAND COMPTON


Oct. 1900

23073

TABLE DES MATIÈRES

DU VOLUME 2

THÉOPH. & HÉL. DURAND. — *Sylloge Florae Congolanae.*



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
BHL-SIL-FEDLINK

<https://archive.org/details/bulletindujardin2191jard>

Comment ne pas citer les noms du Baron *van Eetvelde*, ancien Secrétaire d'État honoraire, de MM. *Hub. Droogmans* et *Ch. Liebrechts*, respectivement anciens Secrétaires généraux des Départements des Finances et de l'Intérieur et de M. *N. Arnold*, placé à la tête du Service, si important, de l'Agriculture congolaise, depuis sa fondation.

Le Baron van Eetvelde rendit possible le voyage botanique, si fructueux, d'Alfred Dewèvre et les deux premières missions d'Émile Laurent et il fut le créateur des superbes *Annales du Musée du Congo*, dont les mémoires sont cités presque à chaque page dans le SYLLOGE, *Annales* que le major Liebrechts protégea, dans la suite, avec un soin jaloux.

Si l'Herbier du Congo, qui comptait 12 paquets en 1896, en comprend, à l'heure qu'il est, plus de douze cents, ce résultat est dû, dans une large mesure, au zèle éclairé de M. Droogmans, aujourd'hui Secrétaire général du Ministère des Colonies, et de M. Arnold, directeur général au même Ministère, qui n'ont reculé devant aucun effort pour stimuler le zèle de tous ceux qui pouvaient enrichir les collections du Jardin botanique (1).

Lorsque Émile Laurent voulut entreprendre un troisième voyage scientifique au Congo, ce sont encore ces hommes éminents qui aplanirent les difficultés et lui donnèrent toutes les facilités désirables pour que ses recherches fussent aussi fructueuses que possible, et quand notre génial ami fut si prématurément enlevé, c'est encore eux, qui assurèrent la publication de la *Mission Émile Laurent* (2) et apportèrent un précieux concours à la fondation du prix Laurent.

On a déjà deviné que c'est aussi à ce puissant appui que le SYLLOGE FLORAE CONGOLANAE, imprimé aux frais de l'État Indépendant, doit le grand honneur d'être le premier ouvrage de science édité sous les auspices du nouveau Ministère des Colonies.

(1) Voici, en chiffres ronds, les *principales* augmentations de l'Herbier du Congo, dues à des récoltes faites directement sous l'impulsion du Gouvernement de l'État Indépendant : ils feront mieux ressortir l'importance des résultats obtenus :

NOMBRE DE FEUILLES D'HERBIER

Just. Gillet	6000	Agost. Flamigni	700
Ém. et Marc. Laurent	3500	Edg. Verdick	600
L. Pynaert	3000	Ém. Laurent	500
Alfr. Dewèvre	2000	L. Gentil	500
Fél. Seret	2000	Alph. Cabra et L. Michel	400
Marc. Laurent	1500	F. Demeuse	300
A. Sapin	900	Alb. Bruneel	300
Hyac. Vanderyst	800	Solheid	300

(2) Émile De Wildeman, *Mission Émile Laurent*, vol. I, CCXXV-617 pages, vol. II, 185 planches.

Au lieu de développer longuement les progrès réalisés, nous avons condensé dans trois tableaux les données réunies dans le SYLLOGE FLORAE CONGOLANAE. Nous attirons notamment l'attention sur le tableau montrant la progression des connaissances relatives à la flore congolaise (1); il fait ressortir toute la part qui revient, soit à ceux qui ont succombé au champ d'honneur [*A. Dewèvre, Ém. Laurent, Gust. Debeerst, Éd. Lesclauwaert*, etc.] soit à ceux qui, aujourd'hui encore, comme le *Fr. Gillet*, poursuivent leurs recherches, en Afrique, ou sont rentrés dans la Mère-Patrie, après avoir apporté leur pierre à l'œuvre immense, poursuivie sous l'impulsion du Roi.

*
* * *

Si les Belges occupent le premier rang pour le nombre d'espèces, découvertes au Congo, il est juste de rappeler que la voie leur a été ouverte, au point de vue botanique, par les collecteurs étrangers. En effet, les premières collections de plantes congolaises furent rapportées par des Anglais (*Chr. Smith* 1816; *R. Burton* 1862; *H. Johnston* 1882-1883) et surtout par des Allemands (*G. Schweinfurth* 1870; *Fr. Naumann* 1874; *P. Pogge* 1875-1883; *Max Buchner* 1878-1880; *Al. von Mechow* et *E. Teusz* 1880-1882).

On connaissait 829 espèces au Congo, lorsque les premières plantes recueillies par un Belge (*C. Callewaert*, 1885) parvinrent en Belgique, puis ce furent les précieuses récoltes de *Fr. Hens* [1887-1888], de *Fern. Demeuse* [1888-1892], du capitaine [actuellement major] *G. Descamps* [1890-1896], de *Jul. Cornet* [1891-1893], de *Paul Briart* [1890-1893] etc. Nous avons montré plus haut combien les recherches botaniques s'étaient développées depuis 1895.

De 1885 à 1908, 2580 plantes nouvelles ont été découvertes au Congo, par des Belges.

Dans le tableau suivant, en laissant de côté 88 espèces, pour lesquelles les renseignements relatifs à la date de récolte ou au nom du collecteur font défaut, on trouvera la liste complète de ceux, grâce auxquels la connaissance de la flore du Congo a marché à pas de géant.

(1) Voir pages 13-16.

	Esp.	Var.		Esp.	Var.
Alfr. Dewèvre (1895-96)	426	35	Hyac. Vanderyst (1891; 1905-08).	12	3
Just. Gillet (1893-1903)	347	40	Éd. Lescrauwaet (1903-05)	12	4
Edg. Verdick (1899-1900)	301	26	Ém. Duchesne (1898-99)	12	
Chr. Smith (1816)	236	6	Paul Briart (1890-93)	11	1
P. Pogge (1875-76. 1880-83)	236	14	Ad. Oddon (1901-04)	11	
Fr. Hens (1887-88)	211	21	E. Pechuel-Loesche (1874; 1882)	8	
Ém. et Marc. Laurent (1903-04)	150	24	Max Buchner (1878)	8	
Ém. Laurent (1893; 1895)	147	11	A. Sapin (1906-08)	7	1
Fern. Demeuse (1838-92)	142	9	Xav. Hendrickx (1903)	7	
G. Schweinfurth (1870-71)	128	5	Alb. Bruneel (1905-06)	6	
Georg. Descamps (1890-92; 1893-96)	127	9	C. Callewaert (1885)	6	1
R. Buettner (1885-86)	102	7	A. Van Houtte (1902)	6	
Marc. Laurent (1905-06)	94	10	J. Monteiro (1832)	6	
Paul Dupuis (1893-95; 1896-98)	67	5	Jos. Duchesne (1892-93)	6	
L. Gentil (1897-1900; 1901-03)	50	3	Eug. Wilwerth (1896-98)	4	
Rud. Schlechter (1899)	49	1	S. Ledermann (1906-08)	4	
Gust. Debeerst (1894-95)	47	2	S. Bieler (1903-04)	4	
A. Cabra et Fr. Michel (1896-1903)	43	5	Knut Jespersen (1907)	4	
H. Johnston (1882-83)	42		A. Delpierre (1902-04)	3	
Fél. Seret (1905-07)	41	6	Ch. Gérard (1900-02)	3	
René Butaye (1895-1932)	35		Fr. Ledien (1887)	3	
Fr. Naumann (1874)	33		Aug. Linden (1885-86)	3	
Éd. Luja (1898-99; 1904-06)	33	3	A.-J. Marques (1885)	3	
Fr. Thonner (1896)	30	4	Ern. Dewèvre (1895-98)	3	1
L. Pynaert (1903-07)	26	6	H. Tilman (1899)	2	1
G. A. von Goetzen et von Pritt witz (1894)	22		P. Huyghe (1903)	2	
Alex. von Mechow et E. Teusz (1880-82)	11	24	R. Dubreucq (1898-1901)	2	
L. Gentil et Just. Gillet (1902)	20	1	Gust. de Brouwer (1903-04)	2	
Rich. Burton (1862-63)	19	1	J. H. Camp (1898)	2	
Jul. Cornet (1891-93)	17		Cél. Hecq (1899)	2	
			Agost. Flamigni (1907)	2	2
			Ach. Durieux (1896)	2	
			Aug. Vermeulen (1903)	2	

Enfin, MM. Bastian, Chaltin, Curror, Jul. Chargeois, G. De Bauw, A. De Clercq, Norb. Diderrich, Vict. Durant, J.-B. Hanquet, R. Kindt, Ch. Lemaire, P. Lemarinel, J.-F. Lopez, L. C. S. Malchair, H. Mardulier, H. Mueller, Guill. Van Kerkhoven, Royaux, Van Rysselberghe, G. Stuhlmann, Taymans, Wlterwulghe, ont chacun trouvé une espèce nouvelle.

Naturellement, dans ce tableau, il n'est question que des espèces *nouvelles* pour le Congo et seulement des *espèces phanérogames*; il est juste de souligner que plusieurs des collecteurs mentionnés, *peu favorisés à ce point de vue spécial*, ont réuni des collections fort

importantes et qui ont largement contribué à faire mieux ressortir la dispersion, dans l'ensemble du Congo, d'espèces déjà connues.

*
* *
*

Les divers districts du Congo sont fort inégalement explorés, comme le montre le tableau suivant ainsi que celui des pages 658-661 :

		Nombre d'espèces phanérogames.
I	Banana	124
II	Boma	652
III	Matadi	86
IV	Cataractes	320
V	Stanley-Pool	1463
VI	Kwango	428
VII	Lac Léopold II	298
VIII	Équateur	752
IX	Bangala	459
X	Ubangi	90
XI	Aruwimi	223
XII	Uele.	388
XIII	Province Orientale	357
XIV	Ruzizi-Kivu	53
XV	Kasai	885
XVI	Katanga	763

Quatre de ces districts sont, à leur tour, subdivisés en zones :

II Boma	} II a : Mayumbe.
IX Bangala	} IX a : Mongala.
XII Uele	} XII a : Rubi.
	} XII b : Uere-Bili.
	} XII c : Bomokandi.
	} XII d : Gurba-Dungu.
	} XII e : enclave de Lado.
XIII Province Orientale	} XIII a : Stanley-Falls.
	} XIII b : Haut-Ituri.
	} XIII c : Ponthierville.
	} XIII d : Maniema.

Seule, la région de Kisantu, dans le district du Stanley-Pool commence à être connue, grâce aux recherches infatigables du Frère Justin Gillet qui l'explore depuis 1893, secondé par d'autres membres de la Mission, dont nous avons déjà cité les noms.

Cinq points du Congo ont été plus spécialement explorés :

- 1) *Kisantu* [V], dont nous venons de parler.
- 2) *Eala* [VIII] (Marc. Laurent, L. Pynaert, etc.)
- 3) *Munza*, dans le pays des *Mangbettu* [XII c] (G. Schweinfurth).
- 4) *Mukenge* près *Luluabourg* [XV] (P. Pogge).
- 5) *Lukafu* [XVI] (Edg. Verdick).

Ces localités sont fort distantes l'une de l'autre; chacune d'elles possède une série d'espèces non observées dans les autres. On peut en conclure que la flore du Congo présente une grande variété.

Toute la région orientale du Congo, du lac Benguelo à l'enclave du Lado, possède une flore bien différente de celle du Congo proprement dit. La belle collection du C^t *Edg. Verdick*, les récoltes nombreuses de *G. Descamps*, de *P. G. Debeerst* et celles, faites au volcan Kirunga [au N. du lac Kivu] par le botaniste *von Prittwitz*, qui accompagnait le Comte *A. von Goetzen* dans sa traversée de l'Afrique [1894], le prouvent suffisamment.

Nous avons tout d'abord commencé à répartir dans le *Sylloge*, les localités suivant les régions botaniques, adoptées par l'un de nous, dans des travaux précédents [*Études, Census*]. Nous avons cru préférable d'attendre que les matériaux fussent plus nombreux pour tracer les limites définitives de ces régions et nous avons réparti les habitations, suivant des divisions politiques.

Il ne nous a pas toujours été possible de retrouver la situation géographique des endroits où des plantes ont été récoltées : noms estropiés, mal orthographiés ou illisibles, villages disparus, sont surtout des causes d'inexactitude. Nous avons indiqué ces points douteux sous la rubrique : Indications non classées.

* * *

Le SYLLOGE présente le relevé complet de toutes les plantes, trouvées au Congo, à la fin de 1908 et de toutes les habitations de plantes indiquées. Pour chaque espèce, nous avons donné les indications permettant de trouver rapidement les renseignements les plus utiles. Si la plante a été figurée, nous l'avons indiqué; enfin, nous avons relevé tous les noms vernaculaires ou indigènes en les reprenant dans un répertoire alphabétique, placé à la fin de notre ouvrage.

Plus encore que pour les noms de localités, il y a lieu de faire des réserves sur l'orthographe des noms vernaculaires, qui, ainsi que les noms géographiques, ont été écrits souvent de deux et parfois de trois manières. Citons, comme exemples, les postes bien connus de *Pweto* et de *Toa* que l'on écrivit d'abord : *M'Pueto*, *M'Towa*, puis *Pueto* et *Towa*, enfin *Pweto* et *Toa* et les noms vernaculaires : *N'Gulu*,

Goulou, Gulu: En se servant du Répertoire, il faudra donc souvent chercher à plusieurs endroits, avant de conclure que le renseignement désiré ne s'y trouve pas.

* * *

Nous avons déjà dit tout ce que nous devons à MM. HUB. DROGMANS et N. ARNOLD.

En rédigeant le SYLLOGE, nous avons rencontré des difficultés de toutes natures : difficultés linguistiques, géographiques, botaniques. Nous aurions été souvent fort embarrassés si nous n'avions pu, sans cesse, recourir aux connaissances variées de M. L. GENTIL qui s'est montré d'une complaisance inépuisable.

M. AUG. LEYS, actuellement attaché au Ministère des Colonies, a bien voulu revoir et compléter le répertoire que nous avons dressé des localités du Congo. Sans son aimable collaboration, bien plus de localités seraient restées sous la rubrique : Indications non classées.

Les riches séries de fiches, dressées par M. P. VAN AERDSCHOT, bibliothécaire du Jardin botanique, nous ont rendu de grands services.

M. le Conservateur ÉM. DE WILDEMAN, dont le nom fait autorité dans toutes les questions relatives à la flore congolaise, nous a souvent aidés à résoudre des questions difficiles. L'Herbier africain du Jardin botanique, qu'il a soigneusement déterminé et classé, nous a aussi été d'un grand secours pour l'éclaircissement de points douteux.

Nous devons enfin une mention toute spéciale à notre ami M. le D^r ALFR. COGNIAUX, qui, non seulement a revu les épreuves de notre travail, page par page, mais nous a, maintes fois, fait profiter de ses vastes connaissances en botanique systématique et a amélioré notre ouvrage par ses observations et par ses critiques judicieuses.

Malgré tous ces efforts, nous sentons qu'il y a encore bien des détails à corriger, bien des points douteux à élucider. Nous recevrons avec reconnaissance toutes les observations nous permettant de rendre le SYLLOGE plus exact, en vue d'une nouvelle édition, que les découvertes ininterrompues, faites au Congo, rendront nécessaire dans quelques années.

TABLEAU MONTRANT, PAR FAMILLE, LA
PROGRESSION DES CONNAISSANCES SUR LA FLORE CONGOLAISE.

Dicotyledoneae.	GENRES.			ESPÈCES.		
	1896	1900	1908	1896	1900	1908
Ranunculaceae	2	3	4	5	9	12
Dilleniaceae		1	1		4	8
Anonaceae	1	6	13	3	19	45
Menispermaceae	3	3	5	3	4	6
Nymphaeaceae	1	1	1	2	2	2
Cruciferaeeae			2			3
Capparidaceae.	3	6	11	5	11	33
Violaceae	3	3	4	3	3	13
Bixaceae	5	5	7	5	10	15
Polygalaceae	1	1	3	3	4	10
Caryophyllaceae	2	3	4	3	4	6
Portulacaceae.	2	2	2	3	4	6
Hypericaceae	1	4	4	1	4	8
Guttiferaceae	2	3	5	3	5	14
Dipterocarpaceae.			2			3
Malvaceae	10	12	13	29	47	57
Sterculiaceae	5	8	10	8	18	43
Scytopetalaceae			3			5
Tiliaceae	6	8	10	13	20	41
Linaceae		2	2		2	8
Malpighiaceae.	2	3	3	3	5	7
Geraniaceae		1	1		1	1
Oxalidaceae	1	1	2	2	3	4
Balsaminaceae	1	1	1	1	6	14
Rutaceae	1	2	4	1	2	13
Simarubaceae.	2	2	6	2	2	7
Ochnaceae	2	2	3	7	11	35
Burséraceae	2	1	2	3	4	2
Meliaceae	2	4	10	2	5	18
Dichapetalaceae	1	1	1	1	5	13
Olacaceae	5	11	17	4	13	32
Celastraceae	1	1	1	1	1	2
Hippocrateaceae	2	3	3	2	8	24
Rhamnaceae	1	2	3	1	2	5
Ampelidaceae	3	4	4	10	16	34

Dicotyledoneae.	GENRES.			ESPÈCES.		
	1896	1900	1908	1896	1900	1908
Sapindaceae	3	7	11	3	11	26
Anacardiaceae	5	6	10	6	7	18
Moringaceae			1			1
Connaraceae	5	5	5	19	35	41
Leguminosaceae	42	76	93	73	199	415
Rosaceae	4	5	6	5	12	23
Crassulaceae	1	2	3	1	4	5
Droseraceae		1	1		2	2
Rhizophoraceae	2	2	3	2	3	5
Combretaceae	2	3	4	5	24	42
Myrtaceae	3	3	5	3	8	10
Melastomataceae	6	11	14	19	30	65
Lythraceae	2	2	3	3	3	6
Onagrariaceae	1	2	2	4	5	5
Samydaceae	2	2	3	2	5	13
Turneraceae	1	1	1	2	2	2
Passifloraceae	3	6	6	6	15	18
Cucurbitaceae	9	14	19	15	26	35
Begoniaceae	1	1	1	1	4	17
Cactaceae	1	1	1	1	1	1
Ficoïdaceae	3	3	3	4	6	6
Umbelliferaceae	2	3	5	3	4	7
Araliaceae		2	2		2	4
Rubiaceae	36	48	56	75	154	299
Dipsaceae			2			2
Compositaceae	35	45	55	64	108	148
Campanulaceae	3	4	5	3	4	7
(incl. Lobeliaceae).						
Ericaceae			1			1
Plumbaginaceae	1	1	1	1	1	1
Myrsinaceae			2			2
Sapotaceae	1	3	7	1	3	18
Ebenaceae	3	3	3	3	3	7
Oleaceae		1	3		1	6
Apocynaceae	9	20	33	12	46	122
Asclepiadaceae	7	15	26	13	29	70
Loganiaceae	5	7	8	14	15	40
Gentianaceae	2	4	9	2	5	18

Dicotyledoneae.	GENRES.			ESPÈCES.		
	1896	1900	1908	1896	1900	1908
Hydrophyllaceae	1	1	1	1	1	1
Boraginaceae	3	5	5	3	6	13
Convolvulaceae	8	12	14	18	41	51
Solanaceae	4	6	6	10	15	39
Scrophulariaceae.	13	13	17	21	31	46
Lentibulariaceae	1	1	1	3	3	10
Gesneraceae			1			1
Bignoniaceae	2	3	6	2	4	16
Pedaliaceae	1	1	1	2	4	7
Acanthaceae	17	31	34	20	77	119
Verbenaceae	4	8	8	12	36	49
Labiataceae	15	20	21	33	62	70
Nyctaginaceae	2	2	3	2	4	6
Amarantaceae.	8	11	13	14	20	22
Chenopodiaceae		1	2		1	4
Phytolaccaceae		2	2		2	3
Polygonaceae	2	3	3	3	6	9
Podostemaceae	2	2	5	3	3	5
Cytinaceae			1			1
Aristolochiaceae		1	1		3	3
Piperaceae	1	2	2	4	6	6
Myristicaceae			1			1
Lauraceae	1	1	1	1	1	1
Proteaceae		1	2		1	5
Thymelaeaceae	2	2	3	9	9	11
Loranthaceae	1	1	2	5	16	32
Santalaceae			1			1
Balanophoraceae		1	1		1	1
Euphorbiaceae	19	36	40	36	81	144
Urticaceae	6	11	19	13	24	91
Ceratophyllaceae.		1	1		1	1
	384	598	808	709	1490	2826

Monocotyledoneae.	GENRES.			ESPECES.		
	1896	1900	1908	1896	1900	1908
Hydrocharitaceae		3	4		3	6
Burmanniaceae			1			2
Orchidaceae	6	18	26	11	59	152
Flagellariaceae			1			1
Zingiberaceae	2	4	7	6	18	28
Marantaceae	5	6	9	9	14	22
Cannaceae	1	1	1	1	1	1
Musaceae		1	1		2	4
Haemodoraceae	1	1	1	3	3	5
Iridaceae	3	4	5	4	8	16
Amaryllidaceae	4	5	8	7	14	24
Taccaceae		1	1		1	1
Dioscoreaceae	1	1	1	4	9	20
Liliaceae	9	12	20	16	28	64
Pontederiaceae			4			4
Xyridaceae	1	1	1	1	2	3
Commelinaceae	5	6	9	12	26	45
Palmaceae	5	9	7	7	10	15
Pandanaceae	1	1	1	1	1	2
Araceae	6	10	12	9	14	25
Lemnaceae			2			2
Alismaceae			2			2
Eriocaulonaceae	1	1	2	1	1	2
Cyperaceae	13	15	15	85	104	139
Graminaceae	26	40	41	65	113	132
	90	140	180	242	431	717
Gymnospermeae						
Gnetaceae		1	1		1	1
Cycadaceae			1			2
		1	2		1	3
Dicotyledoneae	384	598	808	709	1490	2826
Monocotyledoneae	90	140	180	242	431	717
Gymnospermeae		1	2		1	3
	474	739	991	951	1922	3546

PHANEROGAMAE

DICOTYLEDONEAE

POLYPETALAE

RANUNCULACEAE

CLEMATIS L.

Clematis chrysocarpa *Welw. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 5 et in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 25, t. 1; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 2; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 2; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 34.

C. villosa DC. subsp. — *O. Kuntze* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 174.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 280).

— — var. **Poggei** [*O. Kuntze*] *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 55 et l. c. I² 1895 (1898) 2.

C. villosa DC. subsp. *chrysocarpa* *O. Kuntze* var. — *O. Kuntze* l. c. XXVI (1885) 174.

1882 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg.); Lofoi (Verd.).

Clematis glaucescens *Fresen.* Mus. Senckenb. II (1837) 268; *Walp.* Repert. bot. I, 4; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 3.

C. orientalis L. var. — *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) 217.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Katanga (Desc.).

Clematis grandiflora DC. Syst. nat. I (1818) 151; *Oliv. Fl. trop. Afr. I* (1868) 7; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*², 3; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II* (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109].

C. pseudograndiflora O. Kuntze in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 128; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 4.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur. 1903; Ém. et M. Laur.).

Clematis Kirkii Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 5; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*², 4; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II* (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 243.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.); Lofoi; plateau près de Lukafu. — Nom vern. : **Kalundi-Kumi** (Verd.).

Clematis orientalis L. Sp. pl. ed. I (1753) 543; DC. Prodr. I, 3; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 3.

Le type croît dans l'Asie tropicale.

— — subsp. **Wightiana** [Wall.] O. Kuntze in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 125; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 180; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 244; II (1907) 35.

C. Wightiana Wall. List (1831) n. 4674.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1355). — XII : l'Uele (Delp.).

Clematis scabiosaefolia DC. Syst. nat. I (1818) 154 et Prodr. I, 7; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 56 et *Consp. fl. Afr. I*², 6; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II* (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109].

C. villosa DC. subsp. — O. Kuntze in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 174; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 2.

1880 (Max Buchner). — Congo (Buchn.). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Clematis simensis Fresen. Mus. Senckenb. II (1837) 267; *Oliv. Fl. trop. Afr. I*, 6; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 180; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*², 6; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, II* (1901) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 738] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 1.

C. orientalis L. var. — O. Kuntze in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 124; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 3.

1895 (P. Pogge). — II a : Shinganga (Dew. 1308). — V : Kisantu (Gill. 1355).

Clematis spathulaefolia [*O. Kuntze*] *Prantl* in Engl. Jahrb. IX (1888) 258; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 6 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 56.

C. villosa DC. subsp. — *O. Kuntze* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXVI (1885) 174.

1882 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg.).

Clematis Thunbergii *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, I (1841) 380; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 6; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 7.

Le type croît dans l'Afrique trop. et austr., mais n'a pas été indiqué au Congo.

— — var. **angustisecta** *Engl.* ex *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109].

1896 (G. Descamps). — XVI : Lac Kisali (Desc.).

THALICTRUM L.

Thalictrum rhynchocarpum *Delile et Rich.* in Annal. sci. nat. Sér. 2, XIV (1842) 262; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 8; *Lecoyer* in B. S. B. B. XXIV (1885) 148; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. 221; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 9; *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 376.

1894 (G. A. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : rég. du Kirunga (Goetz. et Prittw.).

RANUNCULUS L.

Ranunculus sardous *Crantz* Stirp. Austriac. ed. 1, II (1763) 84; *Rouy et Fouc.* Fl. de Fr. I, 107; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 23.

R. philonotis *Ehrh.* Beitr. zur Naturk. II (1788) 145; *DC.* Prodr. I, 41; *Fl. Danica*, t. 1459; *Dietr.* Fl. Boruss. X, t. 668; *Coss.* Comp. fl. Atlant. II, 33.

1901 (J. Gillet). — V : endr. humid. de la vallée de l'Inkisi (Gill.).

OBS. — Le *R. pinnatus* *Poir.* a été indiqué, avec doute, dans le Bas-Congo par M. H. Johnston.

DELPHINIUM L.

Delphinium dasycaulon *Fresen.* Mus. Senckenb. II (1837) 272; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 11; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 29; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 34.

1892 (G. Descamps). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kavungu-Vungu** (Verd. 176); vallée de Buleshi (Desc.).

DILLENIACEAE

TETRACERA L. (1)

Tetracera Demeusei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 290.

T. alnifolia Willd. var. — *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 1 [B. S. B. B. XXXIX², 53].

1891 (F. Demeuse). — IX : pays des Bangala (Dem. 330).

Tetracera Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 290 et Miss. Laurent (1907) 409.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 807).

Tetracera Masuiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 61, t. 31, Contr. fl. Cgo, I (1899) 1 et Reliq. Dewevr. (1901) 2; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 54; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 196.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lemfu (But. in Gill. 1207, 1210); Kisantu-Makela; Kisantu (Van Houtte); entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 3453, 3664). — XIII d : Lubunda (Dew. 1025).

Tetracera podotricha *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 200; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 291; II (1907) 54, (1908) 310.

T. alnifolia Auct. [non *Willd.*] *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 300; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae. I (1900) 2 et Contr. fl. Cgo. II (1900) 1; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 61.

1899 (J. Gillet et R. Schlechter). — V : Lukolela (Schlt. 12646); Kimuenza; Kisantu (Gill. 1122, 2118). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1507). — XI : Limbutu (Pyn. 81). — XV : Lubi (Lescr. 193).

— — var. **glabrescens** *De Wild.* l. c. I (1906) 291; II (1908) 310.

1891 (F. Demeuse). — V : Lukolela (Dem. 456); env. de Sanda (Odd.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 79, 209, 1508; Pyn. 1042).

(1) Le *T. alnifolia Willd.* existe au Congo, voir Addit. et Correct. p. 651.

Tetracera Poggei Gilg in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 71 et in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 198; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 55.

T. fragrans *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 55. t. 28; *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 1 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 1.

1881 (P. Pogge). — V : Kimuenza (Gill.); env. de Sanda (Odd.). — IX : Bumba. — Nom vern. : **Makolokosa** (Dew.). — XV : Mukenge (Pg.).

Tetracera roseiflora Gilg in Engl. Jahrb XXXIII (1902) 199; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 292.

T. obtusata *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Planch.*] *Pl. Gilletiana*, I (1900) 2 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 2].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1669).

Tetracera Stuhlmanniana Gilg in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 272.

Le type croît dans l'Afrique or. allem.

— — var. **occidentalis** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 410, t. 123.

1904 (Aug. Krekels). — IV : district des Cataractes (Pyn. 85). — IX : rives de l'Itimbiri (Ser.); Umangi (Krek.). — XII a : rives du Rubi (Ser. 41).

ANONACEAE

UVARIA L.

Uvaria brevistipitata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 38; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 473.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1733).

Uvaria Cabrae *De Wild.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, XI (1901) 2; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 37; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 472.

1896 (Alph. Cabra). — II a : la Lemba. — Nom vern. : **Mundembo** (Cabra).

Uvaria glabrata *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 28.

1883 (P. Pogge). — XV : loc. haud ind. [Pg. 683].

Uvaria latifolia [*Scott-Elliot*] *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 22.

Anona — *Scott-Elliot* in Journ. Linn. Soc. XXX (1895) 69.

Le type est indiqué dans la Haute-Guinée.

— — var. **luluensis** *Engl. et Diels l. c.* (1901) 23, t. 3, fig. A, a-h.
1883 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua, vers 6° (Pg.).

Uvaria Mocoli *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I* (1899) 3; Ill. fl. Cgo (1900) 115, t. 58 et Reliq. Dewevr. (1901) 2; *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 10.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Lukolela. — Nom vern. : **Mokoli** (Dew. 823 a, II).

Uvaria Poggei *Engl. et Diels in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II* (1899) 294 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 26, t. 7, fig. A, a-f.; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 241.

1882 (P. Pogge). — V : env. de Lemfu (But.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — XV : Mukenge (Pg. 622, 627, 1635).

Uvaria scabrida *Oliv. Fl. trop. Afr. I* (1868) 21; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*, 35; *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 14; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 241.

1903 (J. Gillet). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.).

Uvaria Smithii *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 28.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Uvaria verrucosa *Engl. et Diels in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II* (1899) 294 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 20, t. 7, fi. B, a-c.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : ruisseau Kambele [entre Kapili et Kibali] (Schw. 3683).

CLEISTOPHOLIS Pierre.

Cleistopholis grandiflora *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1903) 39; *Diels in Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 475.

1900 (Ch. Gérard). — V : région de Kimuenza (Gér. in Gill. 1739).

ANONIDIUM Engl. et Diels.

Anonidium Laurentii [*Engl. et Diels*] *Engl. et Diels in Notizbl.*

bot. Gart. Berlin, III (1900) 56 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 37.

Anona Laurentii *Engl. et Diels* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 300.
1893? (Ém. Laurent) — Bas-Congo (Ém. Laur.).

Anonidium Mannii [Oliv.] *Engl. et Diels* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, III (1900) 56 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 37, t. 14; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 82.

Anona — Oliv. in *Hook. Icon. pl. XI* (1867) t. 1010 et *Fl. trop. Afr. I*, 17;
*Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*², 40; *De Wild et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I* (1899) 2 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 5.

1893 (Ém. Laurent). — Ravins boisés du Bas-Congo (Ém. Laur., Dew.). — VIII : Lulanga (Ém. Laur.). — XV : Kamba (Ém. Laur.).

UNONA L. F.

Unona glauca *Engl. et Diels ex Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 296 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 40, t. 15, fig. D.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

POPOWIA Endl.

Popowia congensis [*Engl. et Diels*] *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 44, t. 17, fig. A, a-f.

Unona — *Engl. et Diels ex Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 296.
1895 (Ém. Laurent). — IX : Bangala (Ém. Laur.).

Popowia ferruginea [Oliv.] *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 46, t. 17, fig. D; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 241.

Unona — Oliv. *Fl. trop. Afr. I* (1868) 35; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*², 36; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 11.
U. Eminii *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 172.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 3188). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 3803).

Popowia Gilletii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 241; *Diels* in *Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 477.

1903 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 3592).

Popowia Laurentii *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 83, t. 19; *Diels* in *Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 477.

1903 (Ém. Laurent). — V : Lukolela (Ém. Laur.).

Popowia Schweinfurthii *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 51, t. 19, fig. E, a-g.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Mbruole (Schw.).

MONANTHOTAXIS Baill.

Monanthotaxis Poggei *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 53.

1876 (P. Pogge). — V : Kinshassa (Schlt. 12801). — XVI : Musumba, 8°5 (Pg.).

— — var. **latifolia** *Engl. et Diels* l. c (1901) 53.

1882 (P. Pogge). — XIII d : Lufubu (Pg. 638).

HEXALOBUS A. DC.

Hexalobus grandiflorus *Benth.* in *Trans. Linn. Soc. XXIII* (1862) 486, t. 40; *Oliv. Fl. trop. Afr. I*, 27; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 57; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 84.

H. crispiflorus *Auct.* [an *A. Rich.*] in *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*², (1898) 36; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II* (1900) 1 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 3.

1870 (G. Schweinfurth). — IX : Bangala. — Nom vern. : Ilumbe (Dew.). — XI : Basomelo (Ém. Laur.). — XV : la Lulua (Pg. 556, 1635).

XYLOPIA L.

Xylopia aethiopica [*Dunal*] *A. Rich.* *Fl. de Cuba* (1853) 53 in adnot.; *Oliv. Fl. trop. Afr. I*, 39; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI* [Anon.] (1901) 60, t. 21, fig. C, a-m.

Unona — *Dunal* *Anonac.* (1817) 113.

Xylopicum — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 8; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I*², 42 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 57.

Xylopia undulata *P. Beauv.* *Fl. d'Oware, I* (1804) t. 16 (fruct. sol.); *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 9.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Xylopia Bokoli *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo, II* (1900) 2 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 6; *Diels* in *Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 481.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : Bokoli (Dew. 785).

Xylopia Butayei *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 33; *Diels* in *Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 481.

1901 (R. Butaye). — II : Malela (But. in Gill. 2239).

Xylopa congolensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 41; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 480.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 812).

Xylopa De Keyzeriana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 43; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 481.

1902 (Aug. Van Houtte). — V : Sanda. — Nom vern. : **Mukwa** (Van Houtte in Gill. 2258).

Xylopa Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 42; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 480.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 207).

Xylopa katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 32; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 481.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Moingele** (Verd. 503).

Xylopa odoratissima *Welw. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 31 et in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 12; *Engl. et Diels* in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 66.

Xylopicum — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 8; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 43.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Xylopa oxypetala [*DC.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 31; *Engl. et Diels* in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 63, t. 22, fig. E, a-f.

Unona — *DC.* Syst. nat. I (1818) 496.

Coelocline — *A. DC.* Monog. Anon. (1832) 33.

X. Dunaliana *Vallot* in B. S. B. Fr. XXIX (1832) 219.

Xylopicum *Dunalianum* *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I² (1895) 42 et Étud. fl. Cgo (1896) 58.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Xylopa parviflora [*Guill. et Perr.*] *Engl. et Diels* [non *Benth.*] in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 64.

Uvaria — *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1830-1831) 9, t. 3, fig. 1.

Coelocline — *A. DC.* Mém. Anon. (1832) 33.

Xylopicum — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 8; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 43.

X. longipetala *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 4; Ill. fl. Cgo (1900) 133, t. 67 et Reliq. Dewevr. (1901) 6; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 481.

X. acutiflora *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XVII (1841) 418; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 32.

1870 (G. Schweinfurth). — IX : Bangala (Dew.). — XII d : rive droite du Kibali [Mangbettu] Schw.).

Xylopia **Poggeana** *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 65.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 634).

Xylopia **Wilwerthii** *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 5 et Ill. fl. Cgo (1900) 127, t. 64; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 65; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 481.

1896 (Eug. Wilwerth). — IX : Upoto (Wilw.).

— — var. **cuneata** *De Wild.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, XI (1901) 63; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 44 et 243; *Diels* l. c. XXXIX (1907) 481.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2589); Kimuenza (Gill.).

STENANTHERA *Engl. et Diels.*

Stenanthera pluriflora *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 45, 243; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 482.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill. 168); Kisantu-Makela (Van Houtte); Kimuenza (Gill.); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3635).

ARTABOTRYS R. Br.

Artabotrys aurantiodorus [*De Wild. et Th. Dur.*] *Engl. ex Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 76; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 84.

*Xylopi*a — *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 4 et Ill. fl. Cgo (1900) 137, t. 69.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

Artabotrys congolensis *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 2; Ill. fl. Cgo (1901) 145, t. 83 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 3; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 76.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.).

Artabotrys Thomsoni *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I (1868) 28; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* I³, 30; *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 34 [B. S. B. B. XXXVII, 109]; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* [Anon.] (1901) 72.

1881 (P. Pogge). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — XV : Mukenge (Pg. 555, 624).

ANONA L.

Anona senegalensis Pers. Syn. pl. II (1807) 95; DC. Prodr. I (1824) 86; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 16; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* I², 41; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 8; *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 78; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109]; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1900) 2 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 5.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Schimp.). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Shibolo** (Dew.; Cabra); Bingila (Ém. Laur.; Dup.); route de Shinganga à Zobe (Dew.). — IV : route des caravanes [rég. des Cataractes] CC. (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool; Léopoldville (Ém. Laur.); Kisantu. — Nom vern. : **Lolo** (Gill.). — VII : Lac Léopold II (Ém. Laur.). — IX : Olombo (Ém. Laur.). — XIII d : Nyangwe (Dew.). — XV : le Kasai; Dibebe (Ém. Laur.); Mukenge (Pg.). — Noms vern. : **Lolo** (Kasongo); **Mkando** [Tanganika] (Dew.).

— — var. **cuneata** *Oliv. Fl. trop. Afr.* I (1868) 16; *Engl. et Diels l. c.* 80; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1906) 243.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.). — VI : env. de Tumba-Mani (Cabra et Michel).

ISOLONA Engl. et Diels.

Isolona congolana [*De Wild. et Th. Dur.*] *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 84.

Monodora — *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* III (1899) 5 [B. S. B. B. XXXVIII², 13]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 3.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Lokandu [env. de Bena-Kamba] (Dew. 1103).

Isolona Dewevrei [*De Wild. et Th. Dur.*] *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 83, t. B, a-d.

Monodora Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* III (1899) 3 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 11] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 4; *Diels in Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 486.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Isolona pilosa *Diels in Engl. Jahrb.* XLI (1908) 328.

1906 (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm. 11).

Isolona Thonneri [*De Wild. et Th. Dur.*] *Engl. et Diels in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VI [Anon.] (1901) 83.

Monodora — *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* III (1899) 4 [B. S. B. B. XXXVIII², 12] et *Pl. Thonnerianae* (1900) 16, t. 3.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Masanga; Bogola (Thonn. 104, 106).

MONODORA Dunal.

Monodora angolensis *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1853) 587 et in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 10, t. 1; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 38; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 38; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 64 [B. S. B. B. XXXVII, 109] et Reliq. Dewevr. (1901) 3; *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 88, t. 29 c; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 123.

1896 (A. Dewèvre et Ém. Laurent). — Bas-Congo (Tilman). — II a : Tshoa. — Nom vern. : **Selufu** (Cabra). — VIII : env. d'Eala. — Noms vern. : **Mongangila Ifuafua** (M. Laur.); Coquilhatville (Dew.); Équateurville [Waugata] (Durieux). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.).

Monodora Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, XI (1900) 3 [B. S. B. B. XL², 64]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 40; *Diels* in *Engl.* Jahrb. XXXIX (1907) 486.

1896 (Alph. Cabra). — II a : Tshoa (Cabra, 2).

Monodora Durieuxii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo; I (1904) 122; *Diels* in *Engl.* Jahrb. XXXIX (1907) 476.

1896 (Ach. Durieux). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dur. in Dew. 613).

Monodora Myristica [*Gaertn.*] *Dunal* Monog. Anon. (1817) 80; *Cliv.* Fl. trop. Afr. I, 37; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 39; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 12; *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VI [Anon.] (1901) 86, t. 30, fig. A; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 29 et *Miss. Laurent* (1905) 84.

Anona — *Gaertn.* De fruct. et semin. III (1805) 194, t. 125, fig. 1.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo? (Ém. Laur.). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.) — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.).

MENISPERMACEAE

CHASMANTHERA Hochst.

Chasmanthera strigosa [*Miers*] *Baill.* in *Adansonia*, V (1864-1865) 364; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 45 et Étud. fl. Cgo (1896) 58.

Jateorhiza — *Miers* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 213.

Cocculus (?) macranthus *Hook.* f. l. c. (1849) 213, t. 18 (icon. mal.) et in *Hook.* Icon. pl. VIII, t. 759.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

DIOSCOREOPHYLLUM Engl.

Dioscoreophyllum strigosum *Engl.* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 407, t. 11, fig. a-f; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 2.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra).

SYNCLISIA Benth.

Synclisia scabrida *Miers* in Ann. nat. Hist. Ser. 3, XX (1867) 171 et Contr. to Bot. III, 371; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 49; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 46 et Étud. fl. Cgo (1896) 59.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

STEPHANIA Lour.

Stephania laetificata [*Miers*] *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. I (1865) 962; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 47; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 49; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 19; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 126.

Perichasma — *Miers* in Ann. nat. Hist. Ser. 3, XVIII (1866) 22 et Contr. to Bot. III, 249, t. 123.

1905 (Marc. Laurent). — VII : Efukwa-Kombe (M. Laur.).

CISSAMPELOS L.

Cissampelos Pareira *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1031; *DC.* Prodr. I, 100; *Descourtiz* Fl. des Antilles, III, t. 20†; *Nees* Pl. officin. t. 365; *Spach* Hist. des végét. (Atlas) t. 87; *Hook. f.* et *Thoms.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 103; *Eichl.* in *Mart.* Fl. Brasil. XIII¹, 188; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 45; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 51; *Bentl.* et *Trim.* Medic. Pl. I, t. 15.

Au Congo, cette espèce a été rencontrée sous les deux variétés suivantes :

— — var. **owariensis** *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 45; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 51 et Étud. fl. Cgo (1896) 59; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 18; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 123; II (1908) 126.

C. Pareira *L.* subsp. — *Engl.* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 696.

C. owariensis *P. Beauv.* ex *DC.* Prodr. I (1824) 100.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Kest.); Bingila (Dup.); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — IV : la Lufu; Banza-Putu (Dem.); Luozi (Luja). — V : Lukolela (Pyn.); env. de Kisantu, de Kimuenza et de Dembo (Gill.); env. de Sanda (Odd.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. de Coquilhatville; Eala et env. (M. Laur.); Bikoro; Bombimba (Pyn.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Somba (Cabra).

C. Pareira var. **zairensis** *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 60 et 52 Consp. fl. Afr. I² (1898).

C. Pareira L. var. *transitoria* *Engl.* subvar. — *Engl.* l. c. XXXVI (1899) 395.
C. zairensis *Miers* Contr. to Bot. III (1871) 180.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Cissampelos tenuipes *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 399; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 35.

1881 (P. Pogge). — V : Sanda (De Brouw. in Gill. 3834); env. de Kisantu (Gill. 3766). — XV : la Lulua (Pg. 817, 818); le Sankuru (Ém. et M. Layr.).

NYMPHAEACEAE

NYMPHAEA L.

Nymphaea coerulea *Savign.* Décad. pl. Égypt. III (1799) 74; *Bot. Mag.* (1802) t. 552 et (1852) t. 4647; *Spach* Hist. des végét. (Atlas) t. 87; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 55 et Étud. fl. Cgo (1896) 60; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 7.

N. stellata *Willd.* Sp. pl. II (1800) 1153; *Bot. Mag.* (1819) t. 2088; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I, t. 178; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 114; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 52; *Wood et Evans* Natal Pl. t. 29 et 33; *Engl.* Pl. Ost-Afr. 178; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 245.

N. guineensis *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 247.

1891 (G. Descamps). — II a : Bingila [form. *nana*] (Dup.). — V : Kisantu (Gill.); Kisanga (Vanderyst). — XII d : entre Dungu et Faradje (Ser.). — XV : entre Kabinda et Kisinga (Cransh.). — XVI : Lac Mosolo; Toa (Desc.); Lac Moero; Lukafu. — Nom vern. : **Makuba** (Verd.).

— — var. **parviflora** *Hook. f. et Thoms.* Fl. Ind. I (1855) 243 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 114.

1896 (A. Dewèvre). — IV : env. de Monsumbi (Dew.).

— — var. **versicolor** (*Sims*) *Hook. f. et Thoms.* ll. cc.

N. versicolor *Sims* in *Bot. Mag.* (1809) t. 1189; *Rchb.* Fl. exot. t. 15.

1898 (Éd. Luja). — IV : Sona-Gongo (Luja).

Nymphaea Lotus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 511; Bot. Mag. (1810) t. 1280 et (1811) t. 1364; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 50, t. 88; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 52; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 56 et Étud. fl. Cgo (1896) 60; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 22; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 7; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 32; Miss. Laurent (1905) 82 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 245.

1874 (Fr. Maumann). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Ponta da Lenha [subv. *parcepubescens* Casp.] (Naum.). — II a : Katala. — Nom vern. : **Makotunkotu** (Dew.); Benza.-Masola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Ser.). — VIII : Eala (Pyn.). — IX : pays des Bangala? (Hens); Meenge-sur l'Itimbiri (Ém. Laur.); Bumba (Pyn.). — XII a et d : entre Niangara et Dungu (Ser.). — XV : le Sankuru. — Nom vern. : **Madelemba** (Sap.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musanga** (Verd.). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.).

CRUCIFERACEAE

NASTURTIUM R. Br.

Nasturtium humifusum *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. (1831) 19; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 58; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 75; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 2 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 2].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 60).

BRASSICA L.

***Brassica juncea** [*L.*] *Coss.* in B. S. B. Fr. VI (1859) 609 et Comp. fl. Atlant. I. 181; *Boiss.* Fl. Orient. I. 390; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 116; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 39.

Sinapis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 668; *Jacq.* Hort. Vindob. t. 171.

1888 (Fr. Hens). — Bas Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.). — V : Tamo [Stanley-Pool] (Hens); Kisantu (Gill.) — IX : pays des Bangala (Dew.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.).

***Brassica oleracea** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 667; *Coss.* Comp. fl. Atlant. I, 182; *Rouy* et *Fouc.* Fl. de Fr. II, 52; *Rchb.* Icon. fl. Germ. II, t. 97; *Engl.* Pf. Ost-Afr. 183; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 117; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 380.

1903 (Ém. Laurent). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — IX : cultivé chez les Bangala (Ém. et M. Laur.); Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

CAPPARIDACEAE

CLEOME L.

Cleome ciliata *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 294; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 78; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 159 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 61; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 27; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 7; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 86 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 245.

C. guineensis *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 218.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.); Shimbanza. — Nom vern. : **Mabunda** (Cabra). — IV : Lutete (Hens). — V : Dembo (Vanderyst). — VI : Bamdundu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Lulanga (Ém. et M. Laur.). — XIII a : env. de Kabanga (Dew.). — XIV : Uvira (Coll.?). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Noms vern. : **Lusada** (Tanganika); **Mohala** [Kasongo] (Dew.); **Musaka**; **Galagale** (Cabra).

Cleome Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 36.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Cleome monophylla *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 672; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 76; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 159; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 4 [B. S. B. B. XXXVI², 50].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marangu (Deb.).

Cleome spinosa *Jacq.* Enum. pl. Carib. (1760) 26; *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) 939; *DC.* Prodr. I, 239; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 78; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 161 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 61; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 36, (1905) 244; II (1908) 245.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Zambi (Dew.). — II a : le Mayumbe (Kest.). — V : le Stanley-Pool (Cabra); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Bolobo (Hens). — VIII : entre Lukolela et Équateurville (Buett.); Eala et env. (M. Laur.). — XV : bassin du Kasai (Ém. et M. Laur.) et du Bas-Sankuru (Ém. Laur.).

Cleome thyrsiflora *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 6 [B. S. B. B. XXXIII², 14] et Reliq. Dewevr. (1901) 8.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 121).

POLANISIA Raf.

Polanisia hirta [*Klotzsch*] *Pax* in *Engl. Jahrb.* X (1888) 14; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* I², 162; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo.* I (1897) 5. [B. S. B. B. XXXVI², 51].

Decastemon — *Klotzsch* in *Peters* *Reise n. Mossamb.* I (1862) 157.

Cleome — *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I (1868) 81; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 246.

1895 (Gust. Debeerst). — VI : Kolomonja (Ém. Laur.). — XV : Lac Foa (Lescr.). — XVI : Pala (Deb.).

Polanisia Sereti *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 264.

1905 (F. Seret). — XII : entre les villages des chefs Guago et Bo (Ser. 269).

PEDICELLARIA Schrank.

Pedicellaria pentaphylla [*L.*] *Schrank* in *Roem. et Usteri* *Mag. f. d. Bot.* III, St. VIII (1790) 11; *Gilg* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 184; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo.* (1896) 62 et *Consp. fl. Afr.* I², 164; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I.*, 487; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo.* I (1897) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51]; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 8; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 35; *Miss. Laurent* (1905) 86 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1903) 36, (1904) 124, (1906) 241; II (1908) 245.

Cleome — *L. Sp. pl. ed. 2* (1763) 963; *Bot. Mag.* (1814) t. 1640.

Gynandropsis — *DC. Prodr.* I (1824) 238; *A. Gray* et *Sprague* *Gen. pl. Amer. bor.-or.* t. 78; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 82.

C. acuta *Schumach.* et *Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 82; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. II.*, 481.

1885 (R. Buettner). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dup.). — V : Lisha (M. Laur.); env. du Stanley-Pool (Dem.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Moe près Bolobo (Dew.); Suata (Buett.); env. de Lemfu (But.); Kimuenza (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill.); Muene-Putu-Kasongo (Buett.); entre Luanu et Lusubi (Lescr.); Madibi. — Nom vern. : **Mosapa**; **Mosatwa** (Sap.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Ikoko (Sap.). — IX : pays des Bangala (Hens); Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XII c : Niangara (Delp.). — XIV : Kalemba-Lemba. — Noms vern. : **Katshongo**; **Kashongo** (Coll.?). — XV : le Kasai; Kondue (Ém. et M. Laur.); Djoko-Punda (Lescr.). — XVI : Pweto. — Nom vern. : **Mobanga** (Cabra).

— — var. **hirsutissima** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 246.

1905 (Marc. Laurent). — IX : Lisha (M. Laur. 455). — XIV : Uvira (Cabra, 27).

MAERUA Forsk.

Maerua angolensis *DC. Prodr.* I (1824) 254; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* I, 86; *Gilg* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 187; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* I², 165; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I.*, 29; *Th. Dur.* et *De Wild.*

Mat. fl. Cgo, I (1897)^o 5 [B. S. B. B. XXXVI^o, 51]; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 36.

1895 (G. Descamps). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kasausa** ; **Kalumu-Kulu** (Verd. 40, 79. 598); Albertville [Toa] (Desc.).

Maerua Aprevaliana *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 5 et Reliq. Dewevr. (1901) 9; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 37; II (1908) 252; *Gilg in Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 225.

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2725); entre Kikwit et Boala (L.escr. 151). — VIII : env. de Bokakata (Dew. 784). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1478). — XIII a : Romée (M. Laur. 1025). — XV : le Bas-Sankuru (Dew.): le Sankuru (Sap.).

Maerua Descampsii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 180.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Maerua Gilgiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 180.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Maerua Kassakalla *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 179.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kasakalla** (Verd. 8).

CERCOPETALUM Gilg.

Cercopetalum dasyanthum *Gilg in Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 308, t. 3; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 9; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 252.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Eala (M. Laur. 689; Pyn. 397, 461, 617, 830); Ikenge (Ém. Laur. : Pyn. 384); Basankusu (Brun.); Monzambi (Pyn. 353); Monsole (Huyghe et Ledoux). — XI : Yambuya (M. Laur. 148). — XII c : env. de Surango (Ser. 393).

— — var. **longeacuminatum** *De Wild.* l. c. II (1908) 252.

1906 (F. Seret). — XII : Koroboro (Ser. 621).

BOSCIA Lam.

Boscia salicifolia *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 93; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I^o, 172; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 31; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 36.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musaisa** (Verd. 68).

Boscia Welwitschii *Gilg in Engl. Jahrb.* XXIII (1903) 218; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 252.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Midilla-Kuha** (Verd. 530).

BUCHHOLZIA Engl.

Buchholzia coriacea Engl. in Engl. Jahrb. VII (1886) 335; Pax in Engl. Jahrb. XIV (1891) 300, t. 4; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I², 173; De Wild. Miss. Laurent (1906) 236 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 252.

(1903) Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kiri [Lac Léopold II] (Ém. et M. Laur.). — XI : Limbutu (M. Laur. 1476); Yambuya (M. Laur. 1477); Mondjo (Pyn. 340).

CAPPARIS L.

Capparis acuminata De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 37; II (1908) 251.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — XII c : la Banka [entre Surango et Niangara] (Ser. 443). — XV : le Sankuru. — Nom vern. : Intfundu (Sap.).

Capparis cerasifera Gilg ex De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 179.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 1203).

Capparis Duchesnei De Wild. Miss. Laurent (1905) 87 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 251.

1888 (F. Demeuse). — IX : Umangi (Ém. Duch.). — X : Bonioka (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Romée (M. Laur. 1488, 1499). — XV : le Sankuru. — Nom vern. : Lokwanta; Mosampo (Sap.); Munungu (Lescr. 259); le Kasai (Dem. 190).

Capparis erythrocarpa Iserl in Ges. naturf. Fr. Berl. Schrift. IX (1789) 334. t. 9; DC. Prodr. I, 246; Oliv. Fl. trop. Afr. I, 98; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I², 174 et Étud. fl. Cgo (1896) 62.

C. Afzelii DC. l. c. I (1824) 246.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Capparis Kirkii Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 98; Pax in Engl. Pfl. Ost-Afr. 185; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. I², 175; De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 179.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd.). — Nom vern. : Mubinga-Kisvoo (Verd.).

Capparis Poggei Pax in Engl. Jahrb. XIV (1891) 298; Th. Dur. et Schinz I², Étud. fl. Cgo (1896) 62 et Consp. fl. Afr. 175.

1882 (P. Pogge). — XV : Congo mérid. (Pg. 641).

Capparis Verdickii De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 35.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kabanga (Verd.).

CRATAEVA L.

Crataeva religiosa *Forst. f.* Fl. insul. Austral. prodr. (1786) 203; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 395; *DC.* Prodr. I, 243; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 99; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 177.

Le type, non encore trouvé au Congo, croît dans toute l'Afrique trop.

— — var. **brevistipitata** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 35.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kampaki** (Verd. 94).

Obs. — M. De Wildeman pense aujourd'hui que cette variété est plutôt un accident.

RITCHIEA R. Br.

Ritchiea ageleaefolia *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 207; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 87 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 245.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 3182). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Ritchiea ealaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 248.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 908).

Ritchiea fragrans *R. Br.* in *Denh.* et *Clappert.* Narr. trav. Centr.-Afr. Append. (1826) 20 et ex *Walp.* Repert. bot. I (1842) 201; *Oliv.* Fl. trop Afr. I, 100; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I^a, 177; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 33; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 9; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 37.

R. erecta *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 216, t. 19-20.

R. polypetala *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1862) t. 5344.

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gent. : Gill. 290). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 928). — Noms vern. : **Mwaba** [Kasongo]; **Wambala** [Tanganika]; **Lumbalumba** [Ikwangula] (Dew.).

Ritchiea immersa *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 248, t. 86.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Limbutu (M. Laur. 1475 b).

Ritchiea Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 250, t. 85.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Limbutu (M. Laur. 1475).

Ritchiea Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 247, t. 87.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 1203).

EUADENIA Oliv.

Euadenia alimensis *Hua* in B. S. Philom. Paris, Sér. 8, VII (1895) 81; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 3 et Reliq. Dewevr. (1901) 10.

Pteropetalum Klingii Pax ex *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 40, t. 20.

1896 (A. Dewèvre). — IX : île en face de Umangi (Ém. Duch.). — XI : Lokandu [rive gauche]. — Nom vern. : **Kinokoto** (Dew. 1110 pr. p.). — XV : bords du Kasai (Luja).

Euadenia trifoliata [*Schumach. et Thonn.*] *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. I (1867) 969; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 244; II (1908) 251 et Miss. Laurent (1905) 87.

Stroemia — *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 114.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bolomba près d'Ikelemba (M. Laur. 64). — IX : Bumba (Pyn. 114). — XI : env. de Lokandu (Dew. 1110 pr. p.). — XII c : Rungu (Ser. 858).

VIOLACEAE

VIOLA L.

Viola abyssinica *Steud. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 105; *Baill.* Hist. pl. Madag. (1890) t. 143. *Engl. Pfl.* Ost-Afr. 276 et in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 376; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. I², 240.

1894 (G. A. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

IONIDIUM Vent.

Ionidium enneaspermum *Vent.* Pl. Jard. Malmaison (1803) sub t. 27; *Ging.* in *DC.* Prodr. I, 308; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 105; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 63 et Consp. fl. Afr. I², 207; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 63, II (1908) 314.

Calceolaria — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 41; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 34.

Viola guineensis *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. pl. (1827) 133.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lukungu (Hens, A. 187). — V : Kwamouth (M. Laur. 432); Kisantu (Gill. 2328). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2816).

— — var. **thesiifolium** [*DC.*] *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 3.

I. thesiifolium *DC.* ex *Ging.* in *DC.* Prodr. I (1824) 309.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

ALSODEIA Thou.

Alsodeia brachypetala Turcz. in Bull. Soc. Natur. Mosc. XXXVI (1863) I, 558; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 109; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 63.

Rinorea — *O. Kuntze Rev. Gener.* (1891) 42; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* I², 209; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 4.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); Bingila (Dup.) — III : Tondoa (Buett.). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — XV : Bena-Dibele [Kasai] (Éd. Luja); le Sankuru (Ém. Laur.).

Alsodeia congensis [Engl.] Th. et Hél. Dur.

Rinorea — *Engl. in De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 3 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 138; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 10.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 265).

Alsodeia dentata P. Beauv. *Fl. d'Oware*, II (1807) 11. t. 65; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 110; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* A, 91.

Rinorea — *O. Kuntze Rev. Gener.* (1891) 42; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* I², 209; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 36; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 10.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : entre Irebu et Lukolela (Dew. 817). — Ind. non cl. : Tata (Dew. 1071 a).

Alsodeia Dewevrei [Engl.] Th. et Hél. Dur.

Rinorea — *Engl. in De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 4 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 144; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 11.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 305).

Alsodeia Dupuisii [Engl.] Th. et Hél. Dur.

Rinorea — *Engl. in De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 4 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 138.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

Alsodeia Engleriana De Wild. et Th. Dur. in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, VI (1900) 3 [B. S. B. B. XXXVIII², 173].

Rinorea — *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 11.

1896 (A. Dewèvre). — XIII c : Rewa (Dew. 114).

Alsodeia Poggei [Engl.] *Th. et Hél. Dur.*

Rinorea — *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 137.

1883 (P. Pogge). — III : Tondoia (Buett. 492). — XV : la Lulua, vers le 6° o. (Pg. 646).

Alsodeia Welwitschii *Oliv. Fl. trop. Afr. I* (1868) 110.

Rinorea — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 42; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr. I*², 212; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 12.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 948). — Noms vern. : **Keurwe** [Kasongo]; **Kambiru** [Tanganika]; **Bongi-Bongi** [Ikwangula].

SAUVAGESIA L.**Sauvagesia congoensis** *Engl.* in *Schlechter* *Westafr. Kautsch.-Exp.* (1900) 301 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12443).

Sauvagesia erecta *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 203; *DC. Prodr. I*, 315; *St-Hil. Pl. remarq. du Brésil, t. 3*; *Spach* *Hist. des végét. [Atlas]* t. 42; *Oliv. Fl. trop. Afr. I*, 111; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 274; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 63 et *Consp. fl. Afr. I*², 212; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I* (1899) 6 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 12; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1903) 63, (1904) 168; *II* (1908) 311.

S. nutans *Pers. Syn. pl. I* (1805) 253.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja) : entre Léopoldville et Mombasi ; env. de Léopoldville ; Kimuenza env. de Dembo (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — Ind. non cl. : Ganga-Tshikamba [Gangu?, II a] (Cabra).

BIXACEAE**BIXA L.**

***Bixa Orellana** *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 512; *DC. Prodr. I*, 259; *Des-courtilz* *Fl. des Antilles, I, t. 4*; *Bot. Mag.* (1812) t. 1456; *Wight* *Illustr. Ind. Bot.* t. 11; *Spach* *Hist. des végét. [Atlas]* t. 44; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 64 et *Consp. fl. Afr. I*², 214; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 12; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 37; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II* (1906) 5-19 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 314.

1888 (Fr. Hens). — II a : Zenze (Ém. Laur.). — IV : route des Caravanes; entre Tumba et Kitobola (Ém. Laur.). — V : Bolobo (Dew.); env. de Sanda (Gill.); Kinkosi; Kisango (Vanderyst). — VIII : Coquilhatville (Ém. Laur.) — IX : pays des Bangala (Hens); Upoto (Welw.); Ukaturaka (Ém. Laur.). — XV : le Kasai (Lescr.); Kanda-Kanda (Gent.); Mokole (Lescr.); env. de Yoko-Punda (Ém. Laur.). — XVI : Lubile (Lescr.).

POGGEA Guerke.

Poggea alata *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 162, t. 7; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 65 et Consp. fl. Afr. I², 215; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 65 [B. S. B. B. XXXVII, 110]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 63; II (1908) 314 et *Miss. Laurent* (1905) 44.

1881 (P. Pogge). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2732). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Limbutu (M. Laur. 1900). — XV : Mukenge (Pg. 609, 1048, 1096); Luebo (Ém. Laur.); Butala; Mange (Ém. et M. Laur.).

ONCOBA Forsk. [s. str.]

Oncoba spinosa *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 103; *A. Rich.* Fl. Seneg. tent. I, 32, t. 10; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 115; *Warb.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 277; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 216; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 3 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 3] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 16; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 38; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 158 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 58 (1908) 315; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XL (1908) 454, in obs.

Lundia monacantha *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 231.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kolo [entre Kimpoko et Dolo] (M. Laur. 451); entre Kange et Zoma [près Lukungu] (Dew. 415); Kisantu; bords de l'Inkisi (Gill.). — XII : Ludibi (Lescr. 195). — XII c : Niangara (Ser. 833). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

CALONCOBA Gilg.

Caloncoba Crepiniana [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XL (1908) 460.

Oncoba — *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 7; *Ill. fl. Cgo* (1900) 123, t. 62 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 12; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 157 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 58.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : Longenge (Dew. 848; Ém. Laur.). — XI : Limbutu (M. Laur.); Lokandu (Dew. 1120). — XV : Lubi (Lescr. 183).

Caloncoba glauca [*P. Beauv.*] *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XL (1908) 459.

Ventenatia — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 30, t. 17.

Oncoba glauca *Planch.* in Hook, Lond. Journ. of Bot. VI (1847) 296 et Niger Fl. (1849) 220; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 117; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 215; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 67 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 739] et Reliq. Dewevr. (1901) 13; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II, (1907) 64, (1908) 315.

1896? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kimuenza (Hoebeker). — VI : Madibi (Sap.). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1895). — XV : la Loanje; Lusambo (Gent.).

***Caloncoba Schweinfurthii* Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 461.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3488).

OBS. — Les habitations suivantes ne sont pas, croyons-nous, dans le Congo : Nabambisso (Schw. 2964); le Juru (Schw. 2344).

***Caloncoba subtomentosa* Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 463.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3385).

***Caloncoba Welwitschii* [Oliv.] Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 462.

Oncoba — *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 117; *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 13, t. 3; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 217; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 4 [B. S. B. B. XXXVI², 50]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 28; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 38; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 5; Reliq. Dewevr. (1901) 14 et Pl. Gilletianae (1900) 3 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 3]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 58, (1908) 315 et Miss. Laurent (1905) 158.

O. Laurentii *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 8.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Kwakwa** (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.); Shinganga (Dew. 309); Tshia. — Nom vern. : **Tshikwakwa** (Cabra); Bingila (Dup.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. et M. Laur.). — V : distr. du Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); Kisantu. — Nom vern. : **Kisania** (Gill.) : env. de Dembo. — Nom vern. : **Kisani** (Gill.). — VI : Madibi (Lescr. 102). — VIII : Ikoko (Lescr. 168); Coquilhatville (Ém. Laur.); Eala (Pyn. 993). — IX : Mongo (Thonn.). — XI : Limbutu (M. Laur. 1901). — XIII a : La Romée (Ém. et M. Laur.).

LINDACKERIA Presl.

***Lindackeria cuneato-acuminata* [De Wild.] Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 465.

Oncoba dentata *Oliv.* var. — *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 246.

1903 (Ad. Odden). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Sanda (Odd. in Gill. 3013). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.).

***Lindackeria dentata* [Oliv.] Gilg** in Engl. Jahrb. XL (1908) 465.

Oncoba — *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 119; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 217; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 5; Pl. Gilletianae, I (1900) 3 et Reliq. Dewevr. (1901) 13; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 39; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 58, (1908) 315 et Miss. Laurent (1905) 157.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Shinganga (Dew. 337); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : rive N. du Kasai (Luja); Kisantu (Gill. 29). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (M. Laur. 72, 697, 1897, 1898, 1902); Bokakata (Dew. 785 a). — XI : Mogaudjo (M. Laur. 1896); env. de Yambuya (Solh.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.); Bandaka-Kole (Flam.).

Lindackeria Poggei [*Guerke*] *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 466.

Oncoba — *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1893) 163; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 64 et Consp. fl. Afr. 1², 216.

O. Demeusei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 2 [B. S. B. B. XXXIV², 54]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 63; II (1907) 58 et *Miss. Laurent* (1905) 157, (1907) 411.

1881 (P. Pogge). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2526); env. de Lukolela (M. Laur. 510); Chenal (Ém. et M. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 1821). — IX : Bumba (Dem.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.); la Lulua (Pg. 571). — Ind. non cl. : Monothueri [Monshumi (?) VI] (Dew.).

Lindackeria Schweinfurthii *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 466.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Linduku (Schw. 3070).

BUCHNERODENDRON *Guerke*.

Buchnerodendron Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 411; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 467, in obs.

1903 (Ém. et M. Laurent). — XV : Ibaka; Munungu (Ém. et M. Laur.).

Buchnerodendron speciosum *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 161, t. 6; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 64 et Consp. fl. Afr. 1², 214; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 29; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 412 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 57, (1908) 315; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 467.

1880 (Alex. von Mechow). — VI : bassin du Kwango (Mech. 526). — VIII : Ibaka (Ém. et M. Laur.). — IX : Bombati (Thonn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.); env. de Yambuya (Solh.). — XIII a : Romée (Kohl.). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.; Sap.); lisière des bois du Kasai (Buch.); le Sankuru. — Nom vern. : **Difindo** (Sap.). — XVI : Katanga (Verd.).

PHYLLOCLINIUM *Baill.*

Phylloclinium paradoxum *Baill.* in B. S. Linn. Paris, II (1890) 870; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 64 et Consp. fl. Afr. 1², 266; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 246, 294; II (1907) 59.

1891 (F. Demeuse). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VII : bassin de l'Ikata [Lukenie] (Dew. 1903; Ém. Laur.). — VIII : Ibaka (Ém. et M. Laur.). — XV : Luluabourg (V. Durant).

POLYGALACEAE

POLYGALA L.

Polygala acicularis *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 132 et in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 32; *Chodat* Monog. Polygal. II, 368, t. 29, fig. 8 et 9; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 65 et Consp. fl. Afr. I², 229; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 9 et Reliq. Dewevr. (1901) 14; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 273; II (1908) 266 et Miss. Laurent (1905) 126.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem. 91); Kisantu (Gill.); Kimuenza (Dew.); Dolo (Schlt.); Kinkosi (Vanderyst). — VI : env. de Bandundu (Ém. et M. Laur.); route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser. 305). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.).

Polygala arenaria *Willd.* Sp. pl. III (1803) 880; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 128; *Chodat* Monog. Polygal. II, 337; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 66 et Consp. fl. Afr. I², 230; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 43; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 5; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 78 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162; II (1908) 266.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.; Vanderyst). — XII c : Gombari (Ser. 262). — XVI : Lukafu (Verd.).

Polygala Cabrae *Chodat* in B. Herb. Boiss. VI (1898) 838; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 10 et Ill. fl. Cgo (1899) 87, t. 46.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra).

Polygala congoensis *Guerke* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 295 [nom. tant.]

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12809).

Polygala Gomesiana *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 126 et in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 14, t. 4; *Chodat* Monog. Polygal. 336; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 66 et Consp. fl. Afr. I², 235; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 43; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 69 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 740]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162 (1906) 273; II (1907) 40.

1891 (G. Descamps). — V : Kisantu : Kimuenza (Gill.). — XV : Lambi (Desc.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mafumbo** (Verd.); bords du Tanganika (Hecq).

Polygala persicariaefolia *DC.* Prodr. I (1824) 326; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 129; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 43; *Chodat* Monog. Polygal. II (1893) 331; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 243; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 51.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

Polygala sparsiflora *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 127; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 246; *Chodat* Mono. Polygal. II (1893) 491; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 47.

P. ukerensis *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XIV (1891) 310 et in *Engl. Pfl. Ost.-Afr.* 234.

Le type est assez largement répandu dans l'Afrique trop., le Congo excepté.

— — form. **robustior** *Chodat* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 14.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : entre Ikori et Kisanga-Sanga (Dew. 1675).

Polygala Verdickii *Guerke* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 205.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 556).

SECURIDACA L.

Securidaca longepedunculata *Fresen.* Mus. Senckenb. II (1837) 275; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 134; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 235; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 47; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 258; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 78 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 40.

1899 (Edg. Verdick). — V : rég. de Kisantu-Makela (Van Houtte); env. de Lemfu (But.). — VI : Tumba-Mani (Cabra et Michel). — XVI : plateau des env. de Lukafu (Verd.).

— — var. **parvifolia** *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 134; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 47; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 68 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 740]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 78.

1899 (Edg. Verdick). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1525). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 116).

CARPOLOBIA G. Don.

Carpolobia alba *G. Don* Gen. Syst. Bot. I (1831) 370; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 135; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 48; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. I², 259; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161, 273; II (1907) 40, (1908) 265.

1891 (F. Demeuse). — VI : vallée de la Djuma (Gill. et Gent.) — VII : env. de Zoka [Bolombo] (Brun.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Basankusu (Brun.) — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.).

Obs. — M. F. Demeuse a récolté cette espèce à Gunchu (?); il s'agit peut-être de Gandshu [Congo français].

CARYOPHYLLACEAE

CERASTIUM L.

Cerastium africanum [*Hook. f.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 141; *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 375 et in Hochgeb. trop. Afr. (1892) 212.

Arenaria — *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 184.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

DRYMARIA Willd.

Drymaria cordata [*L.*] *Willd.* ex *Roem. et Schult.* Syst. veget. V (1819) 406; *DC.* Prodr. I, 395; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 143; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 4 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 4].

Holosteum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 88; *Lam.* Pl. bot. Encycl. I, t. 51.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

POLYCARPON Loeffl.

Polycarpon depressum [*L.*] *Rohrb.* in *Mart.* Fl. Brasil. XIV² (1872) 257, t. 9; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 289.

Pharnaceum — *L.* Mant. pl. alt. (1771) 562.

Polycarpon pusillum *Roxb.* ex *Wight et Arn.* Prodr. fl. Ind. or. (1834) 358; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 50 [Polycarpa].

Polycarpaea Loefflingii *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. I (1862) 153; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 144; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 66.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : îles du Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XV : baues de sable du Sankuru (V. Durant); îlots du Sankuru en aval de Butala (Ém. et M. Laur.).

Polycarpon prostratum [*Forsk.*] *Pax* in *Engl. et Prantl* Natürl. Pflanzenfam. III, 1b (1889) 87.

Alsine — *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 207; *Dehle* Fl. d'Égypte, 240, t. 14, fig. 2.

Arenaria — *Seringe* in *DC.* Prodr. I (1824) 400.

Polycarpaea prostrata *Decne* in *Annal. sci. nat.* Sér. 2, III (1835) 263; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 147.

1885 (R. Buettner). — VI : Kingunshi (Buett.).

POLYCARPAEA Lam.

Polycarpaea corymbosa [*L.*] *Lam.* *Illust. genr.* Encycl. II (1793) 129; *DC.* Prodr. I, 145; *Wight* *Icon. pl. Ind. or.* II, t. 712; *Oliv.*

Fl. trop. Afr. I, 145; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 67; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 9, II (1900) 5; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 35.

Achyranthes corymbosa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 205.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dew.). — I : Moanda (Vanderyst). — IV : Goma (Hens). — V : Kisantu (Gill.); rég. de Lumene (Hendr.). — XV : Bombaie (Luja).

P. corymbosa var. **eriantha** [*Hochst.*] *Pax* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 65 [B. S. B. B. XXXVII, 10]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 14.

P. eriantha *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 303.

1899 (Jul. Chargeois). — XVI : Pweto (Charg.).

— — var. **genuina** *Pax* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 589; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 67.

1888 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 557, 576).

Polycarpaea glabrifolia *DC.* Prodr. III (1828) 374 et *Mém. Paronych.* t. 5; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 146; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 235.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Eiolo [Kasai] (Ém. et M. Laur.).

PORTULACACEAE

PORTULACA L.

***Portulaca grandiflora** *Hook.* in *Bot. Mag.* (1829) t. 2885; *Cambess.* in *A. St-Hil.* Fl. Bras. mér. II, 192; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 234.

1904 (Ém. Laurent). — IX a : en aval de Mobeka (Ém. Laur.).

» Probablement introduit ».

Portulaca oleracea L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 445; *Sibth. et Sm.* Fl. Graeca, t. 457; *DC.* Pl. grass. t. 123 et Prodr. III, 353; *Schnizl.* Iconogr. fam. nat. t. 206; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 149; *Dyer* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 246; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 67; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 52; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 4 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 4]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 234.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Ibaka (Ém. et M. Laur.).

OBS. — Très répandu et sans doute échappé des cultures (Ém. Laur.).

Portulaca quadrifida L. Mant pl. I (1767) 73; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 149; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 9 et Pl. Thonnerianae, 16; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 176; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 52; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 244.

1896 (A. Dewèvre). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimpoko (M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — IX a : Gongo; Mongo (Thonn.), env. de Mobeka (Dew.). — XII a : Amadis (Ser.). — XVI : le Katanga (Verd.).

TALINUM Adans.

Talinum crassifolium [Jacq.] Willd. Sp. pl. II (1800) 862; *Haw.* Syn. pl. succul. 123; *DC.* Prodr. III, 357; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 150; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 68.

Portulaca — *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) t. 52.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

Talinum cuneifolium Willd. Sp. pl. II (1800) 864; *DC.* Prodr. III, 357; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 150; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 54; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 68; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 15; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 234 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 244.

1888 (Fr. Hens). — V : Léopoldville (Ém. et M. Laur.). — VII : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Bangala (Hens); Upoto (Ém. Laur.); Liboko (Thonn.). — IX a : en aval de Mobeka (Ém. et M. Laur.).

Talinum patens [Jacq.] Willd. Sp. pl. II (1800) 863; *DC.* Prodr. III, 357; *Rohrb.* in *Mart.* Fl. Bras. XIV² (1872) 296, t. 67; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 4 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 4]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 244.

Portulaca — *Jacq.* Hort. Vindob. II (1785) t. 151.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — Cultivé à Gombari [XII c] (Ser. 479).

HYPERICACEAE

HYPERICUM L.

Hypericum lanceolatum Lam. Encycl. méth. bot. IV (1797) 45; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 156; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 274; *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 376.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

Hypericum Quartinianum A. Rich. Tent. fl. Abyss. I (1847) 97, t. 21; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 156; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 91.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : haut plateau du Katanga (Verd.).

VISMIA Vell.

Vismia affinis *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 161; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 65 [B. S. B. B. XXXVII, 110]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 311.

1895 (P. Dupuis). — I : Moanda (Gill.). — II a : Bingila (Dup.).

Vismia Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 311.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 2012).

Vismia rubescens *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 160; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 312.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — I : Moanda (Gill. 4062). — V : Léopoldville (Ém. et M. Laur.).

PSOROSPERMUM Spach.

Psorospermum febrifugum *Spach* in *Annal. sci. nat.* Sér. 2, V (1836) 163; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 274; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 158; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 688; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 57; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 65 [B. S. B. B. XXXVII, 110]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 10; II (1900) 5 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 15; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 91, *Miss. Laurent* (1906) 245 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 55, (1908) 312.

P. ferrugineum *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 241.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : env. de Zobe (Dew.). — V : env. de Lukolela (Pyn. 337); route des cataractes vers le Stanley-Pool; Sabuka (Ém. et M. Laur.); env. de Léopoldville (Luja; Pyn.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — XVI : Lukafu (Verd.); Pala (Deb.).

— — form. **latifolium** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 91.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Moibanganga** (Verd. 39).

Psorospermum tenuifolium *Hook. f.* in *Hook.* Icon. pl. VIII (1848) t. 771 et in *Hook.* Niger Fl. (1849) 242; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 159; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 15; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 245 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 55, (1908) 312.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn. 296, 364, 376, 517, 956, 1022, 1245, 1335, 1660). — IX : Bangala (Dew. 862g); Nouvelle-Anvers (Pyn. 5).

HARONGA Thou.

Haronga paniculata [Pers.] Lodd. ex Steud. Nomencl. bot. ed. 2, I (1841) 722; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 274; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 65 [B. S. B. B. XXXVII, 110], *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 10, *Pl. Gilletianae*, I (1900) 14 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 15; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 91, *Miss. Laurent* (1906) 245 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 55; II (1908) 312.

Harongana — *Pers. Syn. pl.* II (1807) 91; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 58.

Haronga madagascariensis Choisy *Prodr. monog. Hyper.* (1821) 34; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 160.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.) — II a : la Lemba. — Nom vern. : **Sasa** (Cabra); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — IV : Nord Manyanga (Cabra et Michel). — V : Kisantu (Gill.); Sanda — Nom vern. : **Tumu** (Odd.). — VI : Luanu (Leser.); Madibi (Sap.). — VII : rég. du Lac Léopold II. — Nom vern. : **Montoni** (Body). — VIII : Coquilhatville; Équateurville [Wangata] (Dem.); Ikenge (Malchair); Eala et env. (M. Laur.; Pyn.). — Noms vern. : **Botoni**; **Bontone**. — XI : Isangi; Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Kanda-Kanda (Leser.). — Noms vern. : **Bangwa** [Abarembo]; **Andjolia** [Mangbettu]; **Bukiret** [Asande]; **Muntoni** [Bangala]. (Dew.).

GUTTIFERACEAE

SYMPHONIA L. f.

Symphonia globulifera L. f. *Suppl. pl.* (1781) 302; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 163; *Vesque in DC. Monog. Phan.* VIII, 227; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 110]; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 6 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 15; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 62; II (1907) 56 et *Miss. Laurent* (1906) 245; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 59; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1906) 20-27.

1889 (F. Demeuse). — Haut-Congo (Dem. 127). — IV : route des caravanes (Ém. Laur.). — V : Sanda. — Nom vern. : **Nsongia** (Odd.). — VII : Iboka (Gent.); Kutu (Ém. Laur.). — VIII : Eala. — Noms vern. : **Bolaka**; **Boloko** (Pyn.). — IX : Bangala (Ém. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.); Lokandu. — Nom vern. : **Kilungu** (Dem.). — XIII a : les Stanley-Falls (Ém. Laur.). — XV : Bombaie (Luja); AC. dans les forêts du Kasai et du Sankuru (Ém. Laur.; Luja). — Nom vern. : **Bokunge** (Équateur).

— — var. **africana** *Vesque in DC. Monog. Phan.* VIII (1893) 230; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 62.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

— — **gabonensis** [Pierre¹ *Vesque in DC. l. c.* VIII (1893) 291; *De Wild. l. c.* II (1908) 314.

S. gabonensis Pierre ex *Vesque, l. c.* VIII (1893) 230, in syn.

1904 (Ad. Odon). — I : Moanda. — Nom vern. : **Ki-Nsangia** (Gill. 4008). — V : rég. de Sanda (Odd.). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Bolongo** (Sap.). — VIII : Eala (Pyn. 1038).

PENTADESMA Sabine

Pentadesma butyracea *Sabine* in Trans. Hort. Soc. V (1824) 457; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 164; *Vesque* in *DC.* Monog. Phan. VIII, 247; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 59; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 57, (1908) 314.

1891 (F. Demeuse). — V : Sanda (Odd.). — XV : Pania-Mutombo (Lescr. 418); Plantations Lacourt [Kasai]. — Nom vern. : **Kalonga-Longa** (Brisac); Munungu (Sap.) — Ind. non cl. : le Lomami (Dem. 115). — Nom vern. : **Bonzo** [Bangala] (Sap.).

ALLANBLACKIA Oliv.

Allanblackia floribunda *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. X (1869) 43 et Fl. trop. Afr. I, 163; *Hook.* Icon. pl. XI, t. 1004; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 69; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 16; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 246 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 61; II (1907) 55, (1908) 312.

1891 (F. Demeuse). -- Bas-Congo (Cabra). — VI : vallée de la Djuma (Gill.); Luanu (Gill. et Gent.). — VII : Ganda (Ém. Laur.). — VIII : Basankusu; Coquilhatville (Dem.); Eala (M. Laur.; Pyn.). — XI : Limbutu; Barumbu (M. Laur.); Isangi (Ém. Laur.); env. de Lokandu (Dew.). — XVI : le Katanga (Verd.). — Ind. non cl. : Ikoto (Lescr.).

GARCINIA L.

Garcinia Giadidi *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 55.

1903 (A. Van Houtte). — V : env. de Sanda. — Nom vern. : **Giadidi** (Van Houtte in Gill. 3761).

Garcinia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 61; II (1907) 56.

1901 (J. Gillet). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Gadi** (Gill. 2208); Lemfu (But.); Sanda (Odd.; Van Houtte in Gill. 3756, 3761).

Garcinia longaeacuminata *Engl.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 56 et in *Engl.* Jahrb. XL (1908) 569.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Bas-Congo orient. à Vungu (Ém. Laur.). — VIII : Eala (Pyn.). — XV : le Sankuru (Lescr.).

Garcinia lualabensis *Engl.* in *Engl.* Jahrb. XL (1908) 558.

1906 (S. Ledermann). — XV : le Sankuru (Lederm. 28).

Garcinia Mannii *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 167; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 5.

1899 (Éd. Luja). — XV : Bena-Dibele [Kasai] (Luja).

Garcinia ovalifolia *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 166; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 6 et Reliq. Dewevr. (1904) 16.

1891 (F. Demeuse). — VIII : Bokakata (Dem. 797). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.).

Garcinia Pierreana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 212.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mufishu** (Verd. 533).

Garcinia punctata *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 167; *Vesque* in *DC.* Monog. Phan. VIII, 380; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 60; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 6 et Reliq. Dewevr. (1901) 16; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 44.

G. polyantha *Th. Dur.* et *Schinz* (non *Oliv.*) Étud. fl. Cgo (1896) 69; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 44.

1893 (Ém. Laurent). — Congo (Dew.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

Garcinia Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 312.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Pyn. 491, 935, 1484, 1765). — XI : env. de Mogandjo (M. Laur. 2611).

Garcinia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 313.

1907 (F. Seret). — XII c : env. de Nala (Ser. 764).

OBS. — *Vesque* [in *DC.* Monog. Phan. VIII, 339] indique vaguement, sur la foi de Kirk, le *G. Livingstonei* T. Anders. au Congo.

OCHROCARPUS Thou.

Ochrocarpus africanus *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 169; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 68 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I 740] et Reliq. Dewevr. (1901) 289.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 255). — V : Kimuenza (Gill. 1754).

DIPTEROCARPACEAE

VATICA L.

Vatica africana [A. DC.] *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 15; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 173 et Sert. Angol. 15, t. 5.

Monotes—A. DC. in *DC.* Prodr. XVI² (1868) 623; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 61.

Le type n'a pas été trouvé au Congo.

V. africana var. **hypoleuca** [*Welw.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 193; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 92.

Vatica — *Welw.* Sert. Angol. (1869) 17, t. 5, fig. 12.

M. africana *A. DC.* var. — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 62.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 442).

Vatica katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 92.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : Kasolo; Musanga-Saya (Verd. 486, 548).

LOPHIRA Banks.

Lophira alata *Banks* in *Gaertn.* De fruct. et semin. III (1805-1807) 52, t. 188, fig. 2; *DC.* Prodr. XVI², 638; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I, 109, t. 4; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 174; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 88; *Gilg* in Bot. Jahrb. XXXIII (1902) 274.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

MALVACEAE

SIDA L.

Sida acuta *Burm. f.* Fl. Indica (1768) 147; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 266; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 63; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 165, 287 et *Miss. Laurent* (1905) 153.

S. carpinifolia *L. f.* Suppl. pl. I (1781) 307; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 180; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 17.

S. stipulata *Cav.* Monadelph. cl. diss. I (1785) 22, t. 3, fig. 10; *Hook f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 231.

S. rugosa *Thonn.* in *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 311.

S. Vogelii *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 231.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — VI : Dima (Ém. Laur.). — XVI : Toa (Dew.).

Sida cordifolia *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 684; *Cav.* Monadelph. cl. diss. I, t. 3; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 181; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil. XII², 330, t. 62; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 69; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 11 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 17; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 165, (1906) 287; II (1907) 47 et *Miss. Laurent* (1906) 153.

S. africana *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 87, t. 110.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — Brousse du Bas Congo (Ém. Laur.). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — II : Boma (Schimp.). — III : Toundoa (Buett.). — V : Stanley-Pool (Hens); Kinshassa (Dew.); Kisanu; env. de Dembo (Gill.); Kiduma; Sonzo (Vanderyst). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel). — IX : Bumba; env. de Yaminga (Pyn.); Nouvelle-Anvers (M. Laur.) — XIII a : Romée (M. Laur.).

Sida humilis Cav. Monadelph. class. diss. V (1785-90) 277, t. 134; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 179 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 322; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 70; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 301.

S. veronicifolia Lam. var. — *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil, XII³ (1891) 320.
S. unilocularis L'Hérit. Stirp. nov. (1784-85) t. 56.

1816 (Chr. Smith). — Congo (Burt.). — Bas-Congo (Sm.). — XVI : Toa (Desc.). — XII d : entre Vankerkhovenville et Arebi (Ser. 721).

Sida linifolia Cav. Monadelph. class. diss. I (1785) 14, t. 2, fig. I; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 179; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil. XII³, 292, t. 57; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 70; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 165 et *Miss. Laurent* (1907) 388.

S. linearifolia Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 303.

1816 (Chr. Smith), — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — V : Sanda (De Brouw.). — VIII : Gombe [Irebu] (M. Laur.). — XVI : Lutembue (Desc.). — Ind. non cl. : Bulebù (Ém. et M. Laur.).

Sida paniculata L. Amoen. acad., V (1760) 401; *DC.* Prodr. I, 465; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil, XII³, 294 t. 57; *E.-G. Bak.* in *Journ. of Bot.*, XXX (1892) 294; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 301.

1902 (A. DelPierre). — XII c : Nala (Delp.); entre Gombari et Dungu (Ser. 745).

Obs. — C'est probablement le *S. Schweinfurthii* E.-G. Bak. [l. c. 265].

Sida rhombifolia L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 684; Cav. Monadelph. class. diss. I, t. 3; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil. XII³, 337, t. 63 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 260; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 181; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 64; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 17; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 143-45.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 48, (1908) 301.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Léopoldville (Schlt.): env. de Bokala (M. Laur.); env. de Kwamouth (Bieler). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — IX : Boyenga [Ikelembu] (M. Laur.); Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XV : env. de Kabinga (Dew.). — Noms vern. : **Kafuta** [Kasongo]; **Kavenru** [Tanganika] (Dew.).

Sida spinosa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 683; Cav. Monadelph. class. diss. I, t. 1; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 180 et in *Hook. f.* Fl. Brit.

Ind. I. 323; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost.-Afr.* 265; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 71; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 63; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 165 et *Miss. Laurent* (1906) 257.

S. scabra *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 305.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Schlt.). — XVI : Katanga (Desc.).

Sida urens *L.* Syst. nat. ed. 10 (1758-59) 1145; *Cav.* Monadelph. class. diss. I, t. 2; Nov. Comm. Soc. Gott. III, t. 5; *DC.* Prodr. I, 465; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 179; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 71; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 4 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 4].

1816 (Chr. Smith). — Congo (Burt.). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XVI : Toa (Desc.)

OBS. — *K. Schumann* [in *Schlechter* West-Afr. Kautch. Exped. (1900) 299] a indiqué, d'après *Schlechter*, n° 12562, un *Sida rotundifolia* *L.* à Léopoldville. — C'est probablement *S. cordifolia* *L.* qu'il faut lire.

WISSADULA Medic.

Wissadula hernandioides [*L'Hérit.*] *Guerke* in Zeitschr. f. Naturw. LXIII (1890) 122; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 11.

Sida — *L'Hérit.* Stirp. nov. (1784-85) 121 t. 58.

1891 (Hyas. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst).

Wissadula rostrata [*Schumach.* et *Thonn.*] *Planch.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 229; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 182 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 325; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 71; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 65; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 17; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 48 et *Miss. Laurent* (1905) 153.

Sida — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 306.

Abutilon laxiflorum *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 66.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); Yumbi (Ém. Laur.). — VI : Madibi (Sap.). — IX : Lisala; Ukatoraka (Ém. et M. Laur.). — XII c : env. d'Amadi (Ser.). — XV : le Kasai (Lescr.). — Ind. non cl. : Kibaka (Buett.); Yindu (Vanderyst).

ABUTILON Gaertn.

Abutilon angulatum [*Guill.* et *Perr.*] *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 183; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 72.

Bastardia angulata *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 65.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Abutilon Cabrae *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 8 [B. S. B. B. XXXVIII², 16] et *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 7; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 152 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 48, (1908) 300.

1897 (Alph. Cabra) — Bas-Congo (Cabra). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bala-Lundzi (Pyn. 239); Ikenge (Ém. et M. Laur.); Bobangi (Ém. et M. Laur.); Eala et env. (Pyn. 932; M. Laur. 1208). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XII d : Dungu (Ser. 616). — XVI : Pala (Deb.); Albertville [Toa] (Decc.).

Abutilon Eetveldeanum *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 9 [B. S. B. B. XXXVIII², 17]; *Ill. fl. Cgo* (1900) 121 t. 61; *Reliq. Dewevr.* (1901) 18; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 301.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — XI : Barumbu (M. Laur. 1853).

Abutilon indicum [*L.*] *Sweet* Hort. Brit. ed. 1 (1827) 54; *G. Don* Gen. Syst. Bot. I (1831) 504; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 186; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51].

Sida — *L.* *Amoen. acad.* — IV (1760) 323; *DC.* Prodr. I, 471.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

Abutilon zanzibaricum *Boj. ex Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 186; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 72.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.).

MALACHRA L.

Malachra capitata *L.* Syst. nat. ed. 12 (1767) 458; *Cav.* Monadelph. class. diss. I, t. 33; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 580; *DC.* Prodr. I, 440; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 188 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 329.

M. hispida *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 47.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Malachra radiata *L.* Syst. nat. ed. 12 (1767) 458; *Cav.* Monadelph. class. diss. I, t. 33; *Lam.* Pl. bot. Encycl. III, t. 580; *DC.* Prodr. I, 440; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 188; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 73; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1905) 165.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

URENA L.

Urena lobata *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 692; *Dillen.* Hort. Eltham. t. 319; *Cav.* Monadelph. class. diss. t. 185; *DC.* Prodr. I, 441; *Bot. Mag.*

(1831) t. 3043; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 189 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 329; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 73; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 42.

Urena americana L. Pl. Surinam. (1775) 11; *R. Br.* in *Tuckey* Narrat. Exped. riv. Zaïre, Append. V (1818) 484.

U. diversifolia *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 308.

U. obtusata et *virgata* *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 48.

1894 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.).

OBS. — Ces localités appartiennent sans doute à la variété suivante.

U. lobata var. **reticulata** *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 370; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 5 [B. S. B. B. XXXVI², 51]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 67; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 87 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 48, (1908) 301.

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Hens). — I : Moanda (Vanderyst); Bauana (Dew.). — II : Boma (Dup.); brousse et cultures : villages dans la partie occ. (Ém. Laur.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Stanley-Pool (Buett.); Bokala (M. Laur.); Kwamouth (Flamigny, 90). — VI : Madibi (Sap.); entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra-Michel). — VII : Lac Léopold II (Body). — VIII : env. d'Eala. — Noms vern. : **Titchi**; **Ikola** (M. Laur.). — XII d. : Dungu (Delp.). — XIII d. : Nyangwe (Pg.). — XV : Mokole [Lubi] (Lescr.); Bas-Sankuru (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Caguibisa** (Verd.); Albertville [Toa] (Desc.). — Ind. non cl. : Luango (Cabra-Michel). — Noms vern. : **Bakuta** (Bangala); **Keongo** (Kwilu).

PAVONIA L.

Pavonia kilimandscharica *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XIX, Beibl. n. 47 (1894) 40 in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 384 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 260.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

KOSTELETZKYA Presl.

Kosteletzkya Buettneri *Guerke* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXXI (1890) 92; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 74.

1881 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett. 72).

Kosteletzkya Grantii [*Mast.*] *Garcke* in *Linnaea*, XXXVIII (1874) 697 et XLIII (1880-82) 53; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 49, (1908) 302.

Hibiscus — *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 203 et in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 36 t. 12.

1895 (G. Descamps). — XII : Ueie (Delp.); Bozo (Ser. 279). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser. 213). — XVI : Toa (Desc.). — Nom vern. : **Cingusapo** [Amadi].

HIBISCUS L.

Hibiscus Abelmoschus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 696; *Cav.* Monadelph. class. diss. t. 62; *Descourtilz* Fl. des Antilles, V t. 361; *DC.* Prodr. I, 452; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 207 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 342; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 74; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 75; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 151; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 7; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo; I (1903) 53, (1906) 288; II (1907) 48, (1908) 301 et Miss Laurent (1905) 154.

1862 (R. Burton).—Congo (Burt.: Ém. Laur.).— II a : le Mayombe (Cabra); Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.); Lula-Lumene (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Hendr.); route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel); Madibi (Sap.). — XII d : cult. à Dungu (Ser. 611). — XV : Bukila (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Bokaie**; **Bolinda** (Bangala); **Momfimi**; **Intsimi**; **Ndzimi** (Kwilu).

Hibiscus calyphyllus *Cav.* Monadelph. class. diss. V (1788) 283 t. 140; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 72; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 99.

H. calycinus Willd. Sp. pl. III (1801) 817; *DC.* Prodr. I, 448; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 202; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 74.

H. calycosus A. Rich. Tent. fl. Abyss. I (1847) 62 t. 14.

? *H. owariensis* P. Beauv. Fl. d'Oware, II (1807) 88 t. 117.

H. triumfettifolius Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 312.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

Hibiscus cannabinus L. Syst. nat. ed. 10 (1758-59) 1149; *Cav.* Monadelph. class. diss. t. 52; *Roxb.* Corom. Pl. t. 190; *DC.* Prodr. I, 450; *Reichb.* Iconogr. bot. t. 164; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 204 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 339; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 74; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 72; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 114; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 11; II (1900) 71 et Reliq. Dewevr. (1901) 18; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 166, 288; II (1907) 48, (1908) 302 et Miss. Laurent (1905) 154.

H. congener Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 204.

H. verrucosus Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. I (1831) 87.

H. radiatus *Cav.* Monadelph. class. diss. (1786-90) t. 54; Bot. Mag. (1817) t. 1911; *Benth.* Fl. Austral. I. 216.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Gill.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Piko (Ém. Duch.); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : env. de Coquilhatville (Ém. Laur.). — XII : Uele (Delp.). — XII c : Gombari (Ser.). — XVI : Toa (Desc.). — Noms vern. : **Angbeni** [Amadi]; **Dombu** [Asandé et Abarembo]; **Pussa** [Mangbettu]; **Takataka** [Kwilu]; **Bokaie** [Bangala].

Hibiscus crassinervius *Hochst.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 61; *Walp.* Annal. bot. II, 147; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 205; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 75; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 81.

H. crasinervis *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 205.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : Katanga (Corn.).

Hibiscus Debeerstii *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 13 et X (1901) 6 [B. S. B. B. XXXVIII², 21 et XL, 12]; *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 7 et III. fl. Cgo (1901) 135 t. 78; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 91.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.); env. d'Albertville [Toa] (Hecq).

Hibiscus diversifolius *Jacq.* Icon. pl. rarior. III (1786-93) t. 551; *DC.* Prodr. I, 449; *Bot. Reg.* (1819) t. 381; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 449 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 339; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 75; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 119.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — III : Tondoa (Buett.). — V : Bolobo (Buett. 69). — XVI : Pala (Deb.).

Hibiscus Eetveldeanus *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 6 et X (1901) 5 [B. S. B. B. XXXVIII², 24 et XL, 11]; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 5 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 5] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 19; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 154.

H. surattensis *L.* var. *furcatus* *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 112.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 697, 716, 868). — VIII : env. d'Équateurville [Wangata]. — Nom vern. : **Bonkaie** (Dew. 741 a). — IX : env. de Mombanga. — Nom vern. : **Bokai-Limpata** (Dew. 757). — X : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 920 a). — Noms vern. : **Nea** [Manyanga]; **Casera** [Kasongo]; **Ikobulé** [Ikwangula]; **Bonkaie-itendo** [Équateur] (Dew.).

Hibiscus esculentus *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 676; *Tussac* Fl. des Antill. I t. 10; *Descourtilz* Fl. des Antill. IV, t. 269; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 207; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 75; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 75; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 150; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1900) 5 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 19; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 48, (1908) 302.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett.); Kisantu (Gill. 967); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Sap.). — XVI : Congo supér. (Dew.). — Ind. non cl. : Pececondo [Pasolonde (?) II a] — Noms vern. : **Ochio** (Dew.); **Kinkumi** [Kwilu]; **Molenda** [Bangala].

Hibiscus ferrugineus *Cav.* Monadelph. class. diss. III (1787) 162 t. 60, fig. 1; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, I (1900) 84.

H. gossypinus *Thunb.* Prodr. pl. Cap. II (1800) 118; *DC.* Prodr. I. 453; *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. I, 175; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 205; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo, I (1896) 76.

H. fuscus *Garcke* in Bot. Zeit. (1849) 854.

1891 (G. Descamps). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Hibiscus Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 166.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2057).

Hibiscus Guerkeanus *Hochreut.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 3 [B. S. B. B. XL, 9].

1891 (G. Descamps). — XVI : Lutembue (Desc.).

Hibiscus lancibracteatus *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 17 [B. S. B. B. XXXVIII², 25]; Ill. fl. Cgo (1901) 147 t. 84 et Reliq. Dewevr. (1901) 20; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 124 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 6 [B. S. B. B. XL, 12].

1895 (A. Dewèvre). — IX : env. de Mabanga [cult. dans les villages] (Dew.). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

Hibiscus Liebrechtsianus *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 14 [B. S. B. B. XXXVIII², 22]; Ill. fl. Cgo (1901) 141 t. 81 et Reliq. Dewevr. (1901) 21; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 79 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 6 [B. S. B. B. XL, 12].

1892 (Jul. Cornet). — IX : env. de Bumba (Dew. 900). — XVI : plaine de Musima [Lualaba supér.] (Corn.).

Hibiscus Masuianus *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 12 [B. S. B. B. XXXVIII², 20] et Reliq. Dewevr. (1901) 21; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 124.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma. — Nom vern. : **Sete** (Dew.).

Hibiscus micranthus *L. f.* Suppl. pl. (1781) 308 et 310; *Cav.* Monadelph. class. diss. t. 66; *DC.* Prodr. I, 453; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 205 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 335; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 76; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 82.

H. clandestinus *Cav.* Icon. et descr. pl. I (1791) 2.

H. hastatus *Cav.* Monadelph. class. diss. III (1787) 143 t. 50 fig. I.

H. versicolor *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 311.

1891 (G. Descamps). — XVI : vallée du Bulechi (Desc.); Musumba [Lualaba supér.] (Briart).

Hibiscus panduriformis *Burm.* Fl. Ind. (1768) 151 t. 47, fig. 2; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 203; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 72; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 95; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1904) 211 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 288.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.) : le Katanga. — Nom vern. : **Kiboga** (Verd. 95); Lukafu (Verd.).

Hibiscus physaloides *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 52; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 199; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo, 76; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 161; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; Contr. fl. Cgo, II (1900) 7 et Reliq. Dewevr. (1901) 22; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 69; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 87; Miss. Laurent (1905) 154 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 48. (1908) 302.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : la Lemba (Dew.) ; le Mayombe (Cabra); Bingila (Dup.). — VII : Kiri (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Ém. Laur.); Bokakata; Wangata (Huyghe et Ledoux). — Nom vern. : **Bokaie-Itende** (Dew.). — XI : Yambuya (M. Laur.). — XV : Lac Foa (Lescr.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lukosa** (Verd.).

Hibiscus rhodanthus *Guerke* ex *Schinz* in B. Herb. Boiss. III (1895) 405; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 91.

1891 (G. Descamps). — XVI : Lovoi (Desc. 71).

Hibiscus rostellatus *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 55; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 201; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo, 76; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 267; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 71; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 5; Contr. fl. Cgo, I (1899) 11 et Reliq. Dewevr. (1901) 22; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 154 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 49.

H. surattensis *L.* var. — *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, IV (1900) 113.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : la Lemba (Dew.). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Makaie** (M. Laur.). — IX : Ukatoraka (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XIII a : Tschopo; envir. de Stanleyville (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Bobangi [Boangi, VIII]. (Ém. Laur.).

Hibiscus Sabdariffa *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 695; *DC.* Prodr. I, 453; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 204; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 7; *Hochreut.* in Ann. Conserv. bot. Genève, I (1900) 116.

H. digitatus *Cav.* Monadelph. class. diss. III (1787) 151 t. 70 fig. 2; *Ker* in Bot. Reg. VIII t. 608.

1896 (Ém. Laurent). — VIII : env. de Coquilhatville (Ém. Laur.).

Hibiscus submonospermus *Hochreut.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, X (1901) 2 [B. S. B. B. XL, 8].

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Hibiscus surattensis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 696; *Bot. Mag.* (1813) t. 1356; *DC. Prodr.* I, 449; *Wight Icon. pl. Ind. or.* I t. 197; *Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 201 et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* I, 334; *Guerke in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 267; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 77; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 71; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 7; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 5 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 22; *Hochreut. in Ann. Conserv. bot. Genève*, IV (1900) 110; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 288, II (1908) 302 et *Miss. Laurent* (1905) 154.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.); Zenze (Ém. Laur.). — II a : C. dans le Mayombe; Kibinga (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel); Madibi (Sap.). — VII : Lac Léopold II (Body). — IX : Yaminga (Ém. Laur.). — XV : Lubue (Luja); env. de Lie (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Ekenienti** [Lac Léopold II]; **N'danana**, **Ndanan** [Kwilu].

Hibiscus tiliaceus *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 694; *DC. Prodr.* I, 454; *Bot. Reg.* 3 t. 232; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 207; *Guerke in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 160; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 160, II (1908) 302; *Hochreut. in Ann. Conserv. bot. Genève*, IV (1900) 63.

1903 (J. Gillet). — I : env. de Moanda (Gill. 3984). — II : Boma (Gill. 3151).

Hibiscus vitifolius *L.* Sp. pl. ed. 1 (1733) 696; *Cav. Monadelph. class. diss.* t. 58; *DC. Prodr.* I, 450; *Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 197 et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* I, 338; *Guerke in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 267; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 77; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 68; *Hochreut. in Ann. Conserv. bot. Genève*, IV (1900) 168; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 88; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 22.

H. strigosus *Schumach. et Thonn.* (non *Lindl.*) *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 314.

1816 (Chr. Smith). — Congo. — Nom vern. : **Modi-Katala** (Dew. 148). — Bas-Congo (Sm.). — XVI : Lukafu (Verd. 135).

Hibiscus Welwitschii *Hiern Cat. Welw. Pl.* I (1896) 75; *Hochreut. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, X (1901) 6 in obs. [B. S. B. B. XL, 12]; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 88.

H. Cornetii *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 10; X (1901) 6 [B. S. B. B. XXXVIII², 12 et XL, 12]; *Ill. fl. Cgo* (1901) 129 t. LXXV.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba supér. (Corn.); vallée du Bulechi (Desc.); env. de Lukafu et du lac Moero (Verd. 13, 414).

THESPESIA Cav.

Thespesia Debeerstii *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 6.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Thespesia populnea [L.] *Soland. ex Correa* in Ann. Mus. Paris, IX (1807) 290; *DC. Prodr.* I, 456; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 209; *Wight Icon. pl. Ind. or.* I, t. 8; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 49.

Hibiscus — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 976; *Cav. Monadelph. cl. diss.* t. 56.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala [cult. ?] (M. Laur. 816).

GOSSYPIUM L. (1)

Gossypium arboreum *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 693; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 391.

G. arborescens *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 693; *DC. Prodr.* I, 456; *Royle Ill. Bot. Himal.* t. 23; *Reichb. Fl. exot.* t. 150; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 211; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 77; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 11.

1885 (R. Buettner). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — IX : Suata (Buett. 80, 81). — XV : le Lualaba (Ém. Laur.).

Gossypium barbadense *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 693; *Bot. Reg.* I (1816) t. 84; *DC. Prodr.* I, 456; *Reichb. Fl. exot.* III (1835) t. 150; *Wight Illustr. Ind. Bot.* t. 28 A et B; *Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 210 et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* I, 347; *Bentl. et Trim. Medic. Pl.* I t. 37; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 77; *Guerke in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 268; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 12, 25; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 8 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 28; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 391.

G. punctatum *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 210.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Briart). — II : Boma. — Nom vern. : **Mukoko** (Dew.). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba (Cabra). — V : le Stanley-Pool (Hens) : Kisantu (Gill.); Bolobo (Dew.); Kinshassa (Ém. Laur.). — VI : Madibi (Leser.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — IX : Ukatoraka (Ém. et M. Laur.). — XII : l'Uele (Delpierre). — XII a : Surango (Ser.). — XVI : cult. sur les bords du Lualaba (Ém. Laur.).

Gossypium hirsutum *L. Sp. pl. ed. 2* (1763) 975; *DC. Prodr.* I, 456; *Cav. Monadelph. cl. diss.* VI t. 167; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52]; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 392.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

(1) conf. *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 344-395.

ADANSONIA L.

Adansonia digitata L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1190; Bot. Mag. (1828) t. 2791 et 2792; DC. Prodr. I, 478; Reichb. Fl. exot. t. 350 et 350a; Belg. Hort. IX (1859) 75 t. 6-8; Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr. I, 212 et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. I, 348; De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 157-163, (1904) 298-302, (1905) 561-563; A. Chevalier in B. S. B. Fr., LIII (1906) 493.

Cette espèce a été indiquée dans II a : Bingila (Dup.). — II : Boma (Naum.; Ém. Laur.). — III : Vivi (Ledien). — V : Kimuenza (Gill.), mais ces indications se rapportent peut-être à l'*A. sulcata* Chevalier. Pourtant il est bon d'ajouter que M. A. Chevalier a créé un *A. digitata* var. *congolensis* [B. S. B. Fr. LII (1906) 493] qu'il indique à San Thome et, avec doute, dans le Bas-Congo.

Adansonia sulcata A. Chevalier in B. S. B. Fr. LIII (1906) 494 t. VII fig. 5, 6; De Wild. Miss. Laurent (1907) 395 t. CXXIX et fig. 64.

A. digitata Auct. pr. p.

1901 (Alb. Declercq). — V : env. de Kinshassa et de Dolo (Chev.).

Obs. — *Pachira* sp. — Cult. à Bumba (Ém. Laur.). — [Conf. De Wild. Pl. Laurent. (1903) 42].

BOMBAX L.

Bombax aquaticum [Aubl.] K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. III, 6 (1890) 62 fig. 30b; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr (1901) 23; De Wild. Miss. Laurent (1905) 155, (1897) 397.

Pachira — Aubl. Hist. pl. Guian. (1775) 725 t. 291-02; K. Schum. in Mart. Fl. Bras. XII^o, 233 t. XLVI fig. 11; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. II (1908) 301.

1895 (A. Dewèvre). — V : Sabuka (Ém. Laur.). — VIII : Équateur (Dew.).

Cette espèce est cultivée à Umangi [IX] (Ém. Laur.) et à Eala [VIII] (M. Laur. 1990).

Bombax Kimuenzae De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletiana, II (1901) 68 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 740].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1618).

Bombax lukayense De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletiana, II, (1901) 69 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 741] et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 49.

1900 (J.-B. Hanquet). — V : bords de la Lukaya (Hanq. in Gill. 1748); bords de la Djili (Odd.).

CEIBA Gaertn.

Ceiba pentandrum [L.] Gaertn. De fruct. et semin. II (1791) 244 t. 133; K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 269.

Bombax pentandrum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 511.

Eriodendron anfractuosum DC. Prodr. I (1824) 479; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II t. 400; Bot. Mag. (1864) t. 3360; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 212 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 349; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 78; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 12.

B. guineense *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 302.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Kibinga (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.). — C. dans tout le bassin central du Congo (Em. Laur.).

STERCULIACEAE

STERCULIA L.

Sterculia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 211.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Katanga (Verd. 383).

Sterculia pedunculata *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 10 [B. S. B. B. XXXVIII², 180] et Reliq. Dewevr. (1901) 23.

1896 (A. Dewèvre). — Ind. non cl.; Mont Mariœ [rég. de Lubunda] (Dew. 1060). — Noms vern. : **Moko, Mapalo-Mopala** [Tanganika] (Dew.).

Sterculia quinqueloba [*Garcke*] *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 135; in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 271 et in Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1903) 104 t. 9, fig. D., a-c; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 79; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 83 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, II (1907) 52.

Cola — *Garcke* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 130; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 224.

1882 (P. Pogge). — V : entre Kisantu et le Kwango (But.). — XIII d. : riv. Lufubu [près Nyangwe] et près d'un village Kalebue (Pg. 596, 652). — XVI : env. de Pueti (Desc.); poste de Kilwa [Mulenga] (Verd.).

Sterculia Tragacantha *Lindl.* in Bot. Reg. XVI (1830) t. 1353; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 216; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 79; *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 102 t. 9, E, a-c.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 52, (1908) 303.

S. pubescens *G. Don* ex *Loud.* Hort. Brit. (1830) 392 et Gen. Syst. Bot. I (1831) 615; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 81.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Kisantu (Gill. 3379). — XII c : env. de Nala (Ser. 767). — XV : entre le Lomami et le Lubilasch [près d'un village Kalebue] (Pg. 1001).

COLA Schott et Endl.

Cola acuminata [*P. Beauv.*] *Schott* et *Endl.* Meletem. (1832) 33; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 220; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl.

Cgo (1896) 79; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr. B*, 252 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. V* [Stercul.] (1900) 125 fig. 3; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 8 et Reliq. Dewevr. (1901) 24; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 43; Miss. Laurent (1905) 155 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 167, 289; II (1907) 52, (1908) 304.

Sterculia acuminata *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 41 t. 24; Bot. Mag. (1868) t. 5699.

Edwardia lurida *Rafin.* Specch. d. Science, II n. 11 (1814) 158; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 84. [Cf. *Hackel*, Sur les Kolas afric. in Ann. Inst. colon. Marseille].

1893 (Ém. Laurent). — V : Sadi (Cabra-Michel, 30); Kisantu (Gill.). — VII : Ibali; Kiri (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew. 598; Pyn. 344); Bamania (Ém. Laur.). — XII c : env. de Nala (Ser. 750). — Noms vern. : **Nangwec** [Mangbetu]; **Ligo** [Magogo]; **Soro** [Asande].

C. acuminata var. **Ballayi** [*Cornu*] *K. Schum.* in *Engl.* l. c. V [Stercul.] (1900) 127 et Pl. Laurentianae (1903) 43.

C. Ballayi *Cornu* ex *Heckel* in Mém. Inst. bot.-géol. Marseille, I (1893) t. 2 fig. 8-9 et 17-24; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 80; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 12.

C. acuminata *Griffon du Bellay* ex *Baill.* in *Adansonia*, X (1872) 169.

C. acuminata *P. Beauv.* var. *B Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 221.

Sterculia verticillata *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 240.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Zenze (Ém. Laur.). — XV : env. de Luebo (Martin). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.).

Obs. — Des officiers disent que ce *Cola* existerait dans l'Aruwimi (Ém. Laur.).

Cola Bruneelii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 305.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — Baringa-Yala (Bruneel). — XV : Ibaka? (Ém. et M. Laur.).

Cola caricifolia [*G. Don*] *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. V* [Stercul.] (1900) 111 t. XI, B, a-c.; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 70 [B. Herb. Boiss. Sér. 2. I, 742]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 156.

Sterculia — *G. Don* Gen. Syst. Bot. I (1831) 517.

Cola Afzelii *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 224; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 79.

Edwardia — *O. Kuntze* Rev. Gener. I (1891) 79; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 84.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : entre Kisantu et Dembo (Gill. 1579). — VII : Kutu (Ém. Laur.).

Cola congolana *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 11 [B. S. B. B. XXXVIII², 181] et Reliq. Dewevr. (1901) 24.

1896 (A. Dewèvre). — Ind. non cl. : entre Maiende et Kibala (Dew. 1061).

Cola cordifolia [Cav.] R. Br. in *Bennett* Pl. Jav. rarior. (1838) 237; *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* V [Stercul.] (1900) 133; fig. 4 et 6 t. 16, A; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 214 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 52, (1908) 304.

Sterculia — Cav. *Monad. cl. diss.* V (1799) 286 t. 144; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I, 79 t. 15; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 217.

1870 (G. Schwenfurth). — XII c : Surango (Ser. 396). — XII d : Linduku (Schw. 3096). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutabu** (Verd.). — Nom vern. : **Boro** [Abarambo] (Schw.).

Cola Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 14 [B. S. B. B. XXXVIII². 184] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 24; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 406 in obs. t. 127.

1895 (A. Dewèvre) — II a : la Lemba (Dew. 365).

Cola digitata *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 124; *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* V [Stercul.] (1900) 123 t. 15, D. a-b.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 52, t. 26 et 27 (1908) 304.

1900 (Marc. Laurent). — IX : Yaminga (M. Laur. 948). — XI : env. de Yambuya (Solh.).

Cola diversifolia *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 13 [B. S. B. B. XXXVIII², 183] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 25; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 59; II (1907) 53, (1908) 304 et *Miss. Laurent* (1907) 408.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Kisantu et Kimuenza; entre Kisantu et Dembo (Gill. 1519); Kimuenza (Gill. 2132); Lukolela (Dew. 819 a); Yumbi (Pyn. 310). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Ikaie** (Dew.); env. d'Eala. — Nom vern. : **Tera-Elungu** (Ém. et M. Laur. 207, 742, 1130; Pyn. 723, 852, 874, 1056, 1339, 1431, 1495, 1557, 1654; Flamigny 55). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1847). — Noms vern. : **Ikaie** [Bangala]; **Nkwakuku** [Kwilu]; Lulonga. — Nom vern. : **Icota** (Dew.).

Cola Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 58; II (1908) 304.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2792). — XV : le Sankuru (Sap.). — Noms vern. : **Skaie** [Bangala]; **Buse** [Sankuru].

Cola griseiflora *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 408 t. 126 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 304.

1906 (Marc. Laurent). — VI : Dima (Sap.). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1845). — Bomaneh (M. Laur. 1002). — Noms vern. : **Mokekeri** [Bangala]; **Lusole** [Buluba].

Cola heterophylla *Schott* et *Endl.* *Meletem.* (1832) 33; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 233; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111] et *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 12; *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* V [Stercul.] (1900) 118.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Zenze (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Camp).
— XV : Mokole (Lescr.).

Cola Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 403 fig. 68, t. 135 et 136.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Sabuka (M. Laur. 528). — XV : Dibele;
Kondue (Ém. et M. Laur.).

— — form. **integrifolia** *De Wild.* l. c. (1907) 405 t. 137 et Étud.
fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 304.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XI : Yam-
buya (M. Laur. 1852).

— — form. **intermedia** *De Wild.* l. c. (1907) 405.

1903 (Ém. et M. Laurent). — IX : Yaminga (M. Laur. 1070). — XV : Kondue
(Ém. et M. Laur.).

Cola longifolia *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 404.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1039).

Cola monponensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 304.

1906 (Alb. Bruneel). — VIII : Monpono (Bruneel 57).

Cola nalaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 307.

1907 (F. Seret). — XII c : Nala (Ser. 703).

Cola pachycarpa *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 137 t. 5, 6 et
in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* V [Stercul.] (1900) 122.

1874 (F. Naumann). — Bas-Congo (Naum.).

Cola Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 307.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 571).

Cola Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 308.

1907 (F. Seret). — XII c : env. de Nala (Ser. 166).

Cola subverticillata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 53
t. 31 et 32.

1905 (R. Butaye). — Ind. non cl. : Lindende (But. in Gill. 3594).

Cola urceolata *K. Schum.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* V [Stercul.]
(1900) 114.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munsa (Schw. 3451).

Cola variantifolia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 306.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Zenze ? (Ém. Laur.). — VII : Lac Léopold II ? —
Nom vern. : **Lokeke** [Body]. — VIII : Boyenge [Ikelemba (M. Laur. 1848); Eala
(Pyn. 976, 1081, 1157, 1174, 1422)].

Cola yambuyaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 309.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Yambuya (M. Laur. 1849).

PTERYGOTA Endl.

Pterygota macrocarpa *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 135 et fig. 1 [pag. 101].

? (Coll. ?). — Congo [Herb. Brux. fide K. Schum.].

DOMBEYA Cav.

Dombeya Goetzenii *K. Schum.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 384, 387 et in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 24.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. -- Nom vern. : **Makollé** (Verd. 20).

Dombeya katangensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1907) 7 [B. S. B. B. XL, 13].

1894 (G. H. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga, 2500 m. (Goetz. et Prittw.).

Dombeya Kindtiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 8 [B. S. B. B. XL, 14].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 342).

Dombeya myriantha *K. Schum.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 302 et in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 34.

1881 (Max Buchner). — XV : pays des Bashilange. — Nom vern. : **Mundatu** (Buchn. 527).

Dombeya niangaraensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 49 t. 11.

1906 (F. Seret). — XII a : entre Niangara et Gombari (Ser. 358).

Dombeya Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 50 t. 10.

1905 (F. Seret). — XII c : env. de Surango (Ser. 358).

MELOCHIA L.

Melochia corchorifolia *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 675; *Cav.* Monadelph. class. diss. t. 174; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 236; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 81; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 90; *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] 1900) 42; *De Wild.* et

Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 8; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1906) 133 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 52, (1908) 303.

Riedleya corchorifolia DC. Prodr. I (1824) 491.

1885 (R. Buettner). — IV : Lufete (Hens). — V : env. de Léopoldville (Ém. Duch.); Suata (Buett.); Kwamouth (Flamigny); Sabuka (M. Laur.); env. de Kisantu (Gill.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Melochia melissifolia Benth. in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 129; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 236; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 271; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 411]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo. II (1900) 8 et Reliq. Dewevr. (1901) 26; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 397 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 52, (1908) 301.

1891 (F. Demeuse). — Bas Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Stanley-Pool (Dew.); Léopoldville (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — XII c : entre Bambili et Amadi (Ser.). — XII d : entre Faradje et Vankerkhovenville (Ser.). — XVI : Masange (Deb.).

— — var. **bracteosa** *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 43.

M. bracteosa F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 13.

1876 (P. Pogge). — XV : le Lulua (Pg. 12).

— — var. **mollis** *K. Schum.* l. c. (1900) 43.

1882 (P. Pogge). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 582).

WALTHERIA L.

Waltheria americana L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 673; DC. Prodr. I, 492; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 235; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 80; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 80; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 91; *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 45; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 27; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1905) 167; II (1907) 47, (1908) 303 et *Miss. Laurent* (1907) 397.

W. indica L. l. c. ed. 1 (1753) 673; DC. l. c. I, 493; *Mast.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I 347.

W. guineensis Schumacher. et Thonn. l. c. (1827) 295.

W. arborescens Cav. Monadelph. class. diss. VI (1790) 316 t. 170; *Lam.* Pl. bot. Encycl. III t. 570.

W. africana Schumacher. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 296.

1885 (R. Buettner). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.). — V : Dolo (M. Laur.); Stanley-Pool (Hens, 88); Suata (Buett.); env. de Kwamouth (But.); Kisantu (Gill.); Mayidis (Vanderyst).

HUA Pierre.

Hua Gabonii *Pierre* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 288 t. 65.

1903 (Ad. Odden). — V : env. de Sanda (Odd. in Gill. 3551).

SCAPHOPETALUM Mast. (1)

Scaphopetalum Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IX (1901) 5 [B. S. B. B. XXXIX², 97] et Reliq. Dewevr. (1901) 26; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 167.

S. Thonneri *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 13 pr. p. t. VII, et Pl. Thonnerianae, 26 pr. p. t. XIX.

1896 (A. Dewèvre). — XV : Kondue (Luja). — Ind. non cl. : Matchatcha (Dew. 1090).

Scaphopetalum Thonneri *De Wild.* et *Th. Dur.* in Bull. Herb. Boiss. V (M. Jun. 1897) 521 [non Ill. fl. Cgo t. VII, nec Pl. Thonner. t. 19] et Mat. fl. Cgo, IX (1900) 4 [B. S. B. B. XXXIX², 96] et *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 400-02 t. 141 et 142 fig. 66, 67.

S. monophysca *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl*, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV [m. Oct. 1897] 247 nomen; et in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 93 t. VII fig. A, a-i.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi près Gali (Thonn. 48). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XV : Ibaka, Kapinga (Ém. et M. Laur.).

LEPTONYCHIA Turcz.

Leptonychia chrysocarpa *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 241 et in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 97 t. 8, D. a-b.

1870 (G. Schweinfurth). — XII : Linduku (Schw. 3069).

Leptonychia multiflora *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 241; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 12 et Reliq. Dewevr. (1901) 26; *K. Schum.* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. V [Stercul.] (1900) 95 t. VIII, C.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 51, (1908) 303.

(1) Ici vient le *Theobroma Cacao* L. cultivé à Eala (M. Laur.) et sur plusieurs autres points du Congo [Conf. *De Wild.* et *Gentil*, in Le Congo (1904) n. 19-21 et *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 397; *K. Schum.* in *Mart.* Fl. Brasil., XII³, 72 t. 16].

1892 (F. Demeuse). — V : Kisantu (Gill.); Lukolela (Dew.; Pyn.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Lulonga (Ém. Laur.); Bozoto [Eala] (M. Laur.); Eala (Pyn.); Yala [Maringa] (Bruneel); Injolo (M. Laur.). — IX : entre Nouvelle-Anvers et Mobeka (Pyn.). — IX a : la Mongalla (Dew.). — X : Ubangi (Ém. Laur.). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Ém. Laur.). — Ind. non cl. **Bama-Lecoula** (Dew.).

BUETTNERIA L.

Buettneria africana Mast. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I (1868) 239; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 81; *K. Schum. in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* V [Stercul.] (1900) 90.

1816 (Chr. Smith.). — Bas-Congo (Sm.).

SCYTOPETALACEAE

SCYTOPETALUM Engl.

Scytopetalum Duchesnei Engl. in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 101.

1893 (Jos. Duchesne). — Bas-Congo (Duch.).

ERYTHROPYXIS Engl.

Erythropyxis Eetveldeana [*De Wild. et Th. Dur.*] Engl. in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 103.

Rhaptopetalum — *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, V (1899) 2 [B. S. B. B. XXXVIII², 121]; *Reliq. Dewevr.* (1901) 43 et *Pl. Gilletianae*, I (1900) 8 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 8]; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 243 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 42, (1908) 309.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 338); C. sur les bords de l'Inkisi. — Nom vern. : **Binsonculon** (Dew. 469). — VI : vallée de la Djuma (Gent.: Gill. 2821); Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. de Bokakata (Dew. 808); env. de Bamanian (M. Laur. 1834). — XI : Limbutu (M. Laur. 975). — XV : en aval de Butala (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Buchinda** [Boeka]; **Satu-satu** [Lulonga].

OBS. — Cette espèce a été indiquée par erreur à Bena-Kamba (Dew.).

OUBANGUIA Pierre

Oubanguia laurifolia [*Pierre*] Pierre ex *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 150.

Egassea — Pierre in *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 31 t. XVII.

1893 (Jos. Duchesne). — XV : Lusambo (Duch.).

OBS. — M. De Wildeman conserve des doutes sur cette détermination.

Oubanguia Laurentii [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.].

Egassea — *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 310.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 1120, 1174, 2032; Pyn. 540, 562, 1782); Ikua (Lamb. in M. Laur. 921).

Oubanguia Pierreana [*De Wild.*] *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 150.

Egassea — *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 32 t. 18 : II (1908) 310.

1896 (A. Dewèvre). — VII : Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. de Wangata (Dew. 666); Eala et env. (Pyn. 601, 1169, M. Laur. 2033); Bula-Lundzi (Pyn. 323).

TILIACEAE

CHRISTIANIA DC.

Christiania africana DC. Prodr. I (1824) 516; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 241; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 81; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 26.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); à un jour de marche de Bolobo; Lukolela (Ém. Laur.); entre Tumba et Kimpese (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — IX : Bumba (Pyn.).

GREWIA L.

Grewia africana [*Hook. f.*] *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 253; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 81;

Omphacarpus — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 237.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Grewia batangensis C. H. Wright in Kew Bull. (1896) 158; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 5 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 5].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 825).

Grewia barombiensis K. Schum. in Engl. Jahrb. XV (1893) 124; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 298.

1906 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Grewia carpinifolia Juss. in Ann. Mus. Paris, IV (1804) 91 t. 51 fig. 1; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 251; K. Schum. in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. B, 210; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 95; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 164.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.).

Grewia coriacea *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 252; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 298.

1905 (Marc. Laurent). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Injolo (M. Laur. 1850, 1857, 2050; Huyghe et Ledoux, 37); env. d'Eala (M. Laur. 1192). — Noms vern. : **Bofumbo** (Bangala); **Binganganan** (Kwilu).

Grewia floribunda *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 262; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 97; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111].

1887 (Fr. Hens). — III : Matadi (Hens).

— — var. **latifolia** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 164; II (1907) 46, (1908) 298 et *Miss. Laurent* (1905) 152.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 3199. 4041). — II : Boma (Pyn. 17). — III : Matadi (Ém. Laur.).

Grewia Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 399 t. CXXV.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.).

Grewia malacocarpoides *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 298.

1905 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 590). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1861).

Grewia mollis *Juss.* in Ann. Mus. Paris, IV (1804) 91; *DC.* Prodr. I, 510; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 218; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 364; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 27.

1896 (A. Dewèvre). — Ind. non cl. : env. de Kabanga (Dew. 983) — Noms vern. : **Mochochia** (Kasongo); **Mochia** (Tanganika).

Grewia occidentalis *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 964; Bot. Mag. t. 422; *Lodd.* Bot. Cab. t. 1526; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 246; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66 [B. S. B. B. 66 XXXVII, 111].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Grewia pinnatifida *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 253; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 27; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 399 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 299.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Yambuya (Solh. 61). — XII c : env. de Nala (Ser. 804). — XIII a : Romée (M. Laur. 1059).

Grewia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 299.

1906 (F. Seret). — XII c : env. de Gombari (Ser. 814).

Grewia tetragastris *R. Br.* ex *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 252; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 66.

1896 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Grewia venusta *Fresen.* Mus. Senckenb. II (1837) 159 t. 10; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 249; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1889) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

G. venusta var. **angustifolia** *K. Schum. ex De Wild. et Th. Dur.*
l. c. II (1898) 66 [B. S. B. B. XXXVII, 111].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Albertville [Toa] (Deb.).

GREWIELLA O. Kuntze

Grewiella Dewevrei [*De Wild. et Th. Dur.*] *Th. et Hél. Dur.*

Grewiopsis — *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 7 [B. S. B. B., XXXVIII², 177] et Reliq. Dewevr. (1901) 28; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 56; II (1907) 46, (1908) 300 et Miss. Laurent (1905) 152.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Léopoldville et Mombazi; Kisantu. — Nom vern. : **M'wanda-M'wanda** (Van Houtte); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1866); (Pyn. 643); Botomon [Ikelemba] (M. Laur. 1658); Lulonga (Ém. et M. Laur.). — IX : Lie (Ém. et M. Laur.); Bumba. — Nom vern. : **Ukambulu** (Dew. 901); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Monbatza** [Kwilu].

— — var. **subintegrifolia** [*De Wild. et Th. Dur.*] *Th. et Hél. Dur.*

Grewiopsis Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* var. — *De Wild. et Th. Dur.* l. c. VI (1900) 8 [B. S. B. B. XXXVIII², 178] et Reliq. Dewevr. (1901) 28.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata (Dew. 803).

Grewiella globosa [*De Wild. et Th. Dur.*] *Th. et Hél. Dur.*

Grewiopsis — *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 8 [B. S. B. B. XXXVIII², 178]; Contr. fl. Cgo, II (1900) 9 et Reliq. Dewevr. (1901) 28; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 58; II (1907) 46, (1908) 300.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : Madibi (Leser. 105, 114). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Bofumbu** (Dew. 614). — XV : Bena-Dibele (Luja); le Sankuru (Sap.). — Nom vern. : **Bomonkolata** (Bangala).

TRIUMFETTA L.

Triumfetta Descampsii *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 3 [B. S. B. B. XXXIX², 95]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 81 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 164.

1891 (G. Descamps). — XVI : Haut-Marungu (Deb.); Lukafu (Verd. 344). — Ind. non cl. : Babondo [Lomami] (Desc.).

Triumfetta dubia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 54.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Triumfetta Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 55.

T. setulosa *De Wild. et Th. Dur.* [non *Mast.*] Pl. Gilletianae, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 6].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 531, 945).

Triumfetta heliocarpa *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 181 ;
Th. Dur. et Schinz *Étud. fl. Cgo* (1896) 82.

1882 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua (Pg. 10).

Triumfetta Hensii *De Wild. et Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo*, IX (1900) 1
[*B. S. B. B.* XXXIX², 93]; *Ill. fl. Cgo* (1902) 189 t. 95; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 56.

1888 (Fr. Hens). — IV : Gombi-Lutete (Hens, A, 269). — V : Kimuenza (Gill. 2157).

Triumfetta intermedia *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 56.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 531 b).

Triumfetta lomalla *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 134 ;
Th. Dur. et Schinz *Étud. fl. Cgo* (1896) 82.

1882 (P. Pogge). — XV : Musumba [pays des Bashilange] (Pg. 21).

Triumfetta orthacantha *Welw. ex Mast.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I
(1868) 258; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 82.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Hens, A, 269).

Triumfetta pilosa *Roth* *Nov. pl. sp.* (1821) 223 : *Mast.* in *Oliv. Fl.*
trop. Afr. I, 257; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 265; *Hiern*
Cat. Welw. Pl. I, 98; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 87.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kilama (Verd.).

Triumfetta rhomboidea *Jacq.* *Enum. pl. Carib.* (1760) 22 et *Stirp.*
Amer. hist. (1780) t. 134; *DC. Prodr.* I, 507; *Mast.* in *Oliv. Fl. trop.*
Afr. I, 257; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 82; *K. Schum.*
in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 265; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 98; *De Wild.*
et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 9 et *Pl. Thonnerianae* (1900) 25;
De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 47, (1908) 300.

T. velutina *Vahl* *Symb. bot.* III (1794) 62.

T. trilocularis *Guill. et Perr.* [non *Roxb.*] *Fl. Seneg. tent.* I (1831) 93.

1888 (Fr. Hens). — I : Banana (Dew.). — II : Boma (Wilw.). — II a : Chianzo :
Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Dew.); Bolobo (Hens); Lemfu (But.); Ki-
muingu; Kisunga (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (Ém. Laur.). — IX :
Ukatoraka (Ém. et M. Laur.); Upoto (Thonn.); Bangala (Dew.). — IX a : Boyangi
(Thonn.). — XV : Eiolo (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (Sap.). — XVI : Albertville
[Toa] (Desc.; Hecq.). — Ind. non cl. : Manganja (Dew.). — Noms vern. : **Ekalili**
[Mangbettu]; **Sibu** [Amadi]; **Zaira** [Abarembo; Asande]; **Mukonki** [Bangala]; **Mam-
bulinkanka** [Sankuru].

Triumfetta semitriloba *Jacq.* *Enum. pl. Carib.* (1760) 22 et *Stirp.*
Amer. hist. t. 133; *DC. Prodr.* I, 507; *Mast.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.*
I, 256; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 82; *K. Schum.*
in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 264; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 97; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 300).

T. cordifolia A. Rich. in *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 93 t. 18.

T. longiseta A. Rich. in *Guill. et Perr.* l. c., I (1831) 92.

1885 (R. Buettner). — II a : le Mayombe (Kest.). — V : Bolobo (Buett.); Boko (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Lac Léopold II. — Nom vern. : **Mokongi** (Body) — VIII : Équateur (Dew.); district de l'Équateur (Pyn.); IX : Bangala (Hens). — XII b : env. de Bambili (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.); Lubue (Luja). — Ind. non cl. : Bulebu (Lescr.); Lusubi (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Lukonga** [Batetela et Bangala]; **Mokonki**, **Nikonki** [Bangala]; **Keongo**, **Kiungu** [Kwilu].

T. semitriloba var. **africana** K. Schum. in *Schlechter* West-Afr. Kautsch. Exped. (1900) 300.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt. 12611).

Triumfetta trachystoma K. Schum. in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 130; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 83.

1882 (P. Pogge). — XV : pays des Bashilange (Pg. 611).

Triumfetta Welwitschii Mast. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 255; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 83; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 97; A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 98.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — XVI : savane du Katanga (Corn.).

CEPHALONEMA K. Schum.

Cephalonema polyandrum K. Schum. ex *Schlechter* West-Afr. Kautsch. Exped. (1900) 299; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 70 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 31; *De Wild.* Not. Pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 29; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 53, 164; II (1907) 45, (1908) 298 et *Miss. Laurent* (1905) 151.

1896 (A. Dewèvre). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu; Kimuenza. — Nom vern. : **Punga** (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : distr. du lac Léopold II. — Nom vern. : **Bekenge** (Gent.). — VIII : distr. de l'Équateur. — Noms vern. : **Belukonge**; **Bekonge**; **Lokonge** (Pyn.); Coquilhatville. — Nom vern. : **Djicota** (Dew.; Schlt.); Eala. — Nom vern. : **Lotiti** (M. Laur.); Lulonga (Ém. Laur.; Pyn. 764). — IX : Nouvelle-Anvers. — Nom vern. : **Makongi** (Duvivier).

SPARMANNIA L. f.

Sparmannia abyssinica Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. I (1847) 79 t. 20; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 261; K. Schum. ex *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 384 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 262.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 35).

HONCKENYA Willd.

Honckenya ficifolia Willd. in *Usteri* Delect. opusc. bot. II (1793) 201 t. 4; *DC.* Prodr. I, 506; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 260; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 83; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 262; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 12; II (1900) 9; Pl. Gilletianae, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 6] et Reliq. Dewevr. (1901) 30; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 151 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 287; II (1907) 46, (1908) 297.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.); Congo, C (Ém Laur.). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Konza (Dew.); distr. des Cataractes. — Nom vern. : **Panza-za-uenga** (Dew.); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Camp); Kisantu (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — VI : Madibi : Dima (Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Dolo-Konge** (M. Laur.). — IX : Umangi (Krek.). — XII b : env. de Bambili [rive gauche] (Ser.). — XV : entre le Sankuru et le Lualaba (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Lusubi (Leser.); le Lomami (Ém. Laur.); Golongo (Leser.). — Nom vern. : **N'Kongo** [Bangala].

CORCHORUS L. (1)

Corchorus acutangulus Lam. Encycl. méth. Bot. II (1786) 104; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III, t. 739; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 264; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 262; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 101; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 54; II (1907) 46.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.).

Corchorus capsularis L. Sp. pl. ed. I (1753) 529; *DC.* Prodr. I, 505; *Hook.* in Journ. of Bot. (1850) t. 3; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I, t. 311; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I 397; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 70 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 743].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

Corchorus lobatus *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 54 II (1907) 46.

1903 (J. Gillet). — V : entre Tumba et Kimpese (Gill.). — IX a : Mobeka (Pyn. 20).

Corchorus olitorius L. Sp. pl. ed. I (1753) 529; Bot. Mag. (1828) t. 2810; *DC.* Prodr. I, 504; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 262; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 83; *De Wild.* et *Th. Dur.*

(1) M. De Wildeman a publié une étude détaillée sur les *Corchorus* [*Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 199-221].

Contr. fl. Cgo, II (1900) 9 et Reliq. Dewevr. (1901) 31; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 100.

1885 (R. Buettner). — V : env. de Lukolela (M. Laur.); Bolobo (Buett.); Kisantu (Gill.). — VII : Inongo (Ém. Laur.). — IX : Mukangani (Thonn.). — IX a : env. de Mobeka (Ém. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XVI : Albertville [Toa] (Hecq.). — Ind. non cl. : Boangi (Ém. Laur.).

C. olitorius form. **grandifolius** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 46.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : route d'Eala à Coquilhatville (M. Laur.).

Corchorus trilocularis *Burm.* Fl. Ind. (1768) 123 t. 37 fig. 2.

C. tridens *L.* Mant. pl. II (1771) 566; *DC.* Prodr. I, 505; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 264; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 83; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 6]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 297.

C. angustifolius *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl (1827) 244.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett.); Kisantu (Gill.). — XIV : Uvira. — Nom vern. **Dendere** (Desc.).

CISTANTHERA K. Schum.

Cistanthera Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 4 [B. S. B. B. XXXVIII², 174]; Reliq. Dewevr. (1901) 30; Ill. fl. Cgo (1902) 173 t. 81; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 297.

1896 (A. Dewèvre). — IX : Monsembe (Dew. 1857); env. de Bumba (Pyn. 34).

Cistanthera kabingaensis *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1898) 234; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 5 in obs. et Reliq. Dewevr. (1901) 31; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 388.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : Stanley-Falls (Dew.). — XV : Dibele : Kabinga (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Monierecoula (Dew. 1155).

GLYPHAEA Hook. f.

Glyphaea grewioides *Hook. f.* in *Hook.* Icon. pl. VIII (1848) t. 760 et Niger Fl. (1849) 238 t. 22; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 267; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 262; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 84; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 102; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112] et Contr. fl. Cgo, I (1899) 12, 9; Pl. Gilletianae, I (1900) 9 et Reliq. Dewevr. (1901) 31; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 151 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 163, 287; II (1907) 45, (1908) 297.

G. Monteiroi *Hook. f.* in Bot. Mag. (1866) t. 5610.

1885 (Fr. Hens). — II a : Shimbete (Dew.). — IV : massif du Bangu (Dew.); nord Manyanga (Cabra-Michel); Ganda (Lescr.). — V : Lukolela (Ém. Laur.); Luvituku (Luja); Dembo (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VII : Nioki (Ém. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.); Coquilhatville (Dew.); Bamania (Ém. Laur.); Monzambi. — Nom vern. : **Itombo** [Bruneel]. — IX : Bangala (Hens); Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.); Suata (Buett.); Bolombo (Ém. Laur.); Mobeka (Pyn.); Upoto (Wilw.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII : village Zunec [Uele] (Ser.). — XIII a : Stanley-Falls (Dew.). — Ind. non cl. : Rewa (Dew.). — Noms vern. : **Intombo** [Coquilhatville]; **Adolim** [Amadi]; **Molobiola** [Asende]; **Pi** [Abarembo] (Dew.); **Lotombo** [Eala] (M. Laur.).

LINACEAE

HUGONIA L.

Hugonia obtusifolia *C. H. Wright ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 38, (1908) 258.

1904 (L. Pynaert). — VIII : Bala-Lundzi (Pyn. 290, 386); Ikenge (Huyghe).

Hugonia platysepala *Welw. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 272; *De Wild. et Th. Dur* Mat. fl. Cgo, II (1893) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112] et Reliq. Dewevr. (1901) 32; *Engl.* Pfl. Ost Afr. 226; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 103; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 6]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158, 270; II (1907) 38, (1908) 258 et Miss. Laurent (1905) 124.

1895 (Ém. Laurent). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Kilonga** (Gill.); env. de Sanda (Odd.); Kitobola (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Baisandeke** (Dew.; Pyn. 272); env. d'Eala (M. Laur.; Ser. 768; Pyn. 1442); Irebu (M. Laur.); Bokakata (Dew.). — IX : Bumba (Pyn.); Umangi (Ém. Laur.). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1045). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Hugonia reticulata *Engl.* in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 107.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 654); Mukenge (Pg. 658).

— — form. **longifolia** *Engl.* l. c.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 659, 660).

Hugonia villosa *Engl. ex Th. Dur. et De Wild.* Pl. Gilletianae, II (1901) 70 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 742] et in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 105; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158.

1900 (J. Gillet). — V : le Stanley-Pool (Ém. Laur.); Kimuenza (Gill.).

PHYLLOCOSMUS Klotzsch.**Phyllocosmus congolensis** [*De Wild. et Th. Dur.*] *Th. et Hél. Dur.*

Ochthocosmus — *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 9 [B. S. B. B. XXXVIII², 27] et Reliq. Dewevr. (1901) 32; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 124.

1895 (A. Dewèvre). — VIII : Équateur (Ém. et M. Laur.): entre Équateurville et Léopoldville (Dew.).

Phyllocosmus Dewevrei *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 109; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 258.

Ochthocosmus africanus *De Wild. et Th. Dur.* [non *Hook. f.*]. Pl. Gilletianae, II (1901) 71 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 743] et Reliq. Dewevr. (1901) 32; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158; II (1907) 38 et Miss. Laurent (1905) 124.

Phyllocosmus — *De Wild.* [non *Klotzsch*] Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 258.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza (Gill. 1767); env. de Lukolela (Gill.; Ém. et M. Laur.; Pyn. 249). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 812, 1137, 1183; Malchair in Pyn. 417b, 840, 926); Wangata [Équateurville] (Dew. 663; Pyn. 255).

Phyllocosmus Lemaireanus [*De Wild. et Th. Dur.*] *Th. et Hél. Dur.*

Ochthocosmus — *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) II [B. S. B. B. XL, 17].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 529).

Phyllocosmus senensis *Klotzsch ex Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 110.

1870 (G. Schweinfurth). — XII : Bangua [pays des Mangbettu] (Schw. 3582). — XV : la Lulua, vers le 6° (Pg. 655, 656).

OBS. 1. — Le *Linum usitatissimum* L. est cultivé à Eala [VIII]. — Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 124.

OBS. 2. — L'*Erythroxylon Coca* Lam. se développe assez bien dans les jardins d'Eala [VIII] (Ém. Laur.) et de Kisantu [V] Gill.). [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52 et Miss. Laurent (1906) 237].

MALPIGHIACEAE

HETEROPTERIS Kunth.

Heteropteris africana *A. Juss.* in *Arch. Mus. Paris*, III (1843) 456 et *Monog. Malpigh.* (1843) 202; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 276; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 84; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 13 et Reliq. Dewevr. (1901) 33; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 270 et Miss. Laurent (1906) 238.

Banisteria Leona Cav. Monadelph. class. diss. IX (1790) 421 t. 247 (fruct. excl.); *Lam. Pl. bot. Encycl.* II t. 381.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — V : au N. du Stanley-Pool; Lukolela et env. (Dew.: Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Lone Island [Angola ?] (Buett.).

ACRIDOCARPUS Guill. et Perr.

Acridocarpus corymbosus Hook. *f.* in *Hook. Icon. pl.* VIII (1848) t. 774 et *Niger Fl.* (1849) 248 t. 24; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 247; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 84.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Burton).

Acridocarpus katangensis De Wild. *Étud. fl. Kat.* (1902) 27.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 136).

Acridocarpus Laurentii De Wild. *Miss. Laurent* (1906) 237.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.).

Acridocarpus rudis De Wild. et *Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 2 [B. S. B. B. XXXVIII², 28] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 34.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 263). — V : bords de la Zili [env. de Sanda] (Odd. in Gill. 3677).

Acridocarpus Smeathmanni [DC.] Guill. et Perr. *Fl. Seneg. tent.* I (1831) 124 et in *Archiv. Mus. Paris*, III t. 15; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 278; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 85.

Heteropteris ? — DC. *Prodr.* I (1824) 592.

Acridocarpus guineensis Juss. *Monog. Malpigh.* (1843) 231.

A. longifolius Hook. *f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 244.

1891 (Fr. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : forêts des bords du Stanley-Pool (Dew.).

FLABELLARIA Cav.

Flabellaria paniculata Cav. Monadelph. class. diss. (1790) 436 t. 264; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 282; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 232; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 104; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 10.

1896 (Eug. Wilwerth). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Upoto (Wilw.). — XIII a : Stanleyville (Pyn. 67).

GERANIACEAE

GERANIUM L.

Geranium aculeolatum *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 291; *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 384.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 39).

OXALIDACEAE

OXALIS L.

Oxalis Corneti A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII² (1895) 98; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 85.

1892 (J. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Oxalis corniculata L. Sp. pl. ed. I (1753) 435; *Rchb.* Icon. fl. Germ. V t. 199; *Wright* Icon. pl. Ind. or. I, t. 18; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 296; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 225; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112; *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 10 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 33; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 109; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 138.

(1895) (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XVI : Masanze (Deb.); Toa (Desc.). — Ind. non cl. : Lubundo (Dew.).

Oxalis katangensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 12 [B. S. B. B. XL, 18],

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 346).

BIOPHYTUM DC.

Biophytum sensitivum [L.] DC. Prodr. I (1824) 690; *Edgew.* et *Hook. f.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 456; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, II (1907) 37.

Oxalis — L. Sp. pl. ed. I (1753) 434; *Jacq.* *Oxalis*, t. 78; *Bot. Reg.* XXXI (1845) t. 68; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I 297; *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 226; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 85; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 109; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 138.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.); Bas-Congo (Cabra). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Lutete (Hens); Luvituku (Luja); Lukungu (Hens). — V : le Stanley-Pool (Luja); Kisantu (Gill.). — XV : le Bas-Kasai; Kondue (Ém. Laur.). — XVI : Zilo (Briart).

BALSAMINACEAE

IMPATIENS L.

Impatiens bicolor *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. IV (1860) 138; Bot. Mag. (1863) t. 5366; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 23 et Reliq. Dewevr. (1901) 34; *Warb.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 252; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162; II (1907) 44, (1908) 297 et Miss. Laurent (1905) 147.

1896 (A. Dewèvre). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); env. de Basankusu. — Nom vern. : **Magnieri** (Dew.); Dikila-Yala (Bruneel). — IX a : Bobi (Thonn.). — XI : Watende (Gent.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII a : route de Buta à Bima; entre Zobia et Buta (Ser.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.); Ibaka (Brisac).

— — var. **brevifolia** *Warb.* ex *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 384, 388 et in *Engl. Jahrb.* XXII (1895) 51.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga, 2500 m. (Goetz. et Prittw.).

Impatiens Briartii *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 15 [B. S. B. B. XXXVIII², 185].

1891 (Paul Briart). — XVI : Zilo (Briart).

Impatiens Declercqii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 384.

1901 (Alb. Declercq). — XV : grotte de la Kondue (Decl. in Gent. 23). — (retrouvé en 1903 par Ém. et Marc. Laurent).

Impatiens Eminii *Warb.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 254.

Le type a été trouvé dans l'Afrique orientale.

— — var. **lanceolata** *Warb.* ex *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1905) 384, 388 et in *Engl. Jahrb.* XXII (1895) 51.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 54).

Impatiens hians *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 7.

Le type n'est indiqué qu'à Fernando-Po et au Kamerun.

— — form. **glabra** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 383.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1136).

Impatiens Irvingii *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 300; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 86; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 13; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52; II (1907) 44, (1908) 296.

1885 (R. Buettner). — II a : Bingila (Dup.). — IV : route des caravanes (Em. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Sehlt.); env. de Kisantu (Gill.); Dembo; Boko (Vanderyst, B. 259). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.); Madibi (Sap.). — IX a : Gali (Thonn.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XV : Loange (Gent.); Kondue (Lescr. 423); Lubefu (Lescr. 366). — XVI : Haut-Marungu (Deb.). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.).

Impatiens katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 82.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd. 348).

Impatiens Kerckhoveana *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 385.

1906 (Guill. Van Kerckhove). — XII d : village Bagba [Van Kerckhovenville] (Ser.).

Impatiens Kirkii *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 300; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 111; *Warb.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 252; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 6 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 6]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 83; Miss. Laurent (1907) 385 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 44, (1908) 297.

1899 (G. Descamps). — II a : entre Kabuluku et Shikongo (Lescr.). — V : env. de Léopoldville (Ém. et M. Laur.); Sabuka (M. Laur.); Kisantu (Gill.); Kinkosi (Vanderyst). — IX : env. de Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XII c : Gombari (Delp.). — XV : Djoco-Punda (Lescr.). — XVI : Katanga (Verd.); Toa [Albertville] (Desc.).

Impatiens mayombensis *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 385 t. CXVII.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.).

Impatiens refracta *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 83.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga. — Nom vern. : **Tumafumba** (Verd. 408).

Impatiens Sereti *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 386, t. CXVIII.

1906 (F. Seret). — XII d : village Bagba [Van Kerckhovenville] (Ser. 542).

— — form. **etentaculifera** *De Wild.* l. c. (1907) 387.

1906 (F. Seret). — XII d : village Bagba [Van Kerckhovenville] (Ser. 542).

Impatiens Thonneri *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 24, t. XI.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 24).

Impatiens Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 84.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd.).

RUTACEAE

FAGARA L.

Fagara Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 271 t. 62.

1903 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 3365).

Fagara Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 124.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.).

Fagara macrophylla [*Oliv.*] *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 118.

Zanthoxylum? — *Oliv.* Fl. trop Afr. (1868) 304.

Le type n'a encore été trouvé qu'au Kamerun et dans la Haute-Guinée.

— — var. **Preussii** *Engl.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 271.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Fagara pilosiuscula *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 112 et in *Engl.* Jahrb. XXIII (1896) 150.

1882 (P. Pogge). — XV : Musumba vers 8° ½ (Pg. 513).

Fagara Poggei *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 118 et in *Engl.* Jahrb. XXIII (1896) 146.

1882 (P. Pogge). — XV : pays des Bashilange (Pg. 670, 1234).

Fagara Welwitschii *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 118 et in *Engl.* Jahrb. XXIII (1897) 147; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112].

1892 (F. Demeuse). — V : Lukolela (Dem.). — XV : bords de la Lulua (Desc.).

TECLEA Delile.

Teclea Engleriana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 76.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kimena** (Verd. 365).

LIMONIA L.

Limonia Demeusei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 159 t. 41 et Miss. Laurent (1906) 238.

1891 (F. Demeuse). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.); Yambinga (Dem. 441). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanley-Falls (Dem. 399). — XV : en aval d'Ibaka (Ém. et M. Laur.).

Limonia Lacouriana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 159, t. 40 et Miss. Laurent (1906) 238.

1903 (L. Gentil). — V : rég. de Lumene (Hendr. in Gill. 3280). — XV : Bombaie (Gent. 9).

Limonia Poggei *Engl.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 190 et in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 29; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 86.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 668).

— — var. **latialata** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 160; II (1907) 38 et Miss. Laurent (1906) 238, t. 43.

1900 (L. Gentil). — X : Ubangi; Imese (Ém. Laur.); Inkongo (Gent.). — XV : rives du Sankuru (Brisac).

Limonia Schweinfurthii *Engl.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 190.

1870 (G. Schweinfurth). — XII? : env. d'Uando (Schw.).

OBS. — Cette habitation est peut-être en dehors des limites du Congo belge.

CLAUSENA Burm.

Clausena anisata *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 256; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 228; *Oliv.* Fl. trop. Afr., I, 308; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 159, 272; II (1907) 196, t. 42, 43, (1908) 258.

1902 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.). — V : Mombasi [Casier-St-Jean] (Gill.). — VI : embouch. du Kwango (Gill. 2668).

Clausena Bergeyckiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 743].

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1527).

CITRUS L.

***Citrus Aurantium** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 783; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 229; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 118; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161.

1900 (J. Gillet). — V : cultivé à Kisantu (Gill.).

***Citrus medica** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 782; *Risso* in Ann. Mus. Paris, XX (1813) 199, t. 2, fig. 2; *DC.* Prodr. I, 539; *Engl.* Pfl. Ost-Afr., 229; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 34.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.). — XIII d : cult. aux env. de Kabango (Dew.). — Ind. non cl. : env. de Yambuli (Ém. Laur.).

Citrus medica L. subsp. **Limonum** [Risso] Hook. f. Fl. Brit. Ind. I (1875) 515; *De Wild. et Th. Dur.* l. c. 34.

C. Limonum Risso in Ann. Mus. Paris, XX (1813) 211; DC. t. 539. 1895 (A. Dewèvre). — IV : Lukungu (Dew.).

SIMARUBACEAE

QUASSIA L.

Quassia africana Baill. in Adansonia, VIII (1867-68) 89, t. 8; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 86; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 10; Mat. fl. Cgo, II (1898) 67 [B. S. B. B. XXXVII, 112]; Pl. Gilletianae, II (1901) 72 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744]; Pl. Thonnerianae (1900) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 35; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161, 272; II (1907) 39 et Miss. Laurent (1907) 380.

1880 (von Mechow). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe; Lukala (Brisac). — V : Kimuenza (Dew.); Sanda (Odd.). — VI : bord du Kwango (von Mechow); route de Lusali à Luano (Leser.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : **Botumbo** (Dew.). — IX : Yaminga (Pyn.). — IX a : Mondjerengi (Thonn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.); Lokandu. — Nom vern. : **Monie-cama** (Dew.). — XV : rives de la Lulua (Ém. Laur.); Bolongula; Olombo (Ém. et M. Laur.); Luebo (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Gauchu? (Dew.). — Nom vern. : **Vuda-Buadi**.

Obs. — A. Dewèvre a trouvé cette espèce au N. de Stanley-Pool (Congo français).

HANNOA Planch.

Hannoa gabonensis Pierre ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161.

1899 (H. Tilman). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Dumbu-dumbu**. (Tilm. in Cabra, 49).

IRVINGIA Hook. f.

Irvingia Barteri Hook f. in Trans. Linn. Soc. XXIII (1860) 167; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 315; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 35.

Mangifera gabonensis Aubry Le Comte ex O'Rorcke in Journ. Pharm. et Chim. Sér. 3, XXXI (1837) 275.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata]. — Nom vern. : **Mombulu** (Dew.). — Ind. non cl. : le Lomami (Dew.).

Irvingia Smithii *Hook. f.* in Trans. Linn. Soc. XXIII (1860) 167 ; *Baill.* in Adansonia, VII, 381 ; *Oliv.* Fl. trop. Afr., I, 314 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 86 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 35.

1816 (Chr. Smith). Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Lukungu (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — V : en amont du Stanley-Pool ; Kinshassa (Schlt.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.) ; Irebu (Schlt.). — XV : le Kasai (Ém. Laur.).

KLAINEDOXA Pierre.

Klainedoxa gabonensis *Pierre* in B. S. Linn. Paris, I (1896) 1235.

Le type n'a été trouvé qu'au Gabon.

— — var. **oblongifolia** *Engl.* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 239. 1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.).

OBS. — A Lukolela, A. Dewèvre a récolté une espèce appelée **Ekele**, rapportée, avec doute, à ce genre *Klainedoxa* [Conf. *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 35.

KIRKIA Oliv.

Kirkia acuminata *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XI (1867) 26 t. 1036 et in Fl. trop. Afr. I (1868) 310 ; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 227.

Le type n'a été trouvé qu'au Mozambique.

— — var. **cordata** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 78.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kipangu** (Verd.).

BALANITES Delile.

Balanites aegyptiaca *Delile* Fl. d'Égypte (1813) 211, t. 28 fig. 1 ; *DC.* Prodr. I, 708 ; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I, t. 274 ; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 315 ; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 50-54.

1891 (Chaltin). — Distr. de Lado. — Nom vern. : **Lalo**. (Chalt.).

OCHNACEAE

OCHNA Schreb.

Ochna arenaria *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 7 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 7].

Campylochnella — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 402. 1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill., 68).

Ochna Buettneri *Engl. et Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 242 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293.

Pleodiporochna — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII* (1903) 58.

O. membranacea *Th. Dur. et Schinz* [non *Oliv.*]. *Étud. fl. Cgo* (1896) 87.

1885 (R. Buettner). — V : env. de Léopoldville (*Buett.* 33 ; *Schlt.* 12521 ;
Duchesne, 24 ; *Tilm.* 55) ; env. de Dembo (*Gill.*) ; Kimuenza (*Gill.* 1661). —
VI : vallée de la Djuma (*Gent.*).

Ochna congoensis *Gilg ex Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat., Sér. 8, XVI*
(1902) 349 in syn. et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 239.

Polyochnella — *Van Tiegh.* l. c. (1902) 349.

1895 (Ém. Laurent). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : bords de
la Sele (*But.*) ; Kimuenza (*Gill.*) ; entre Dembo et le Kwango (*But.* in *Gill.* 1483) ;
entre Kisantu et Dembo (*Gill.* 592).

— — var. **microphylla** *Gilg* l. c. (1903) 240.

1889 (*Gillet*). — V : Kisantu (*Gill.* 153).

Ochna Debeerstii *De Wild. ex Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903)
237 ; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 88.

Ochnella — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII* (1903) 40.

1895 (*Gust. Debeerst.*). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kinkunga** (*Verd.*) ; Pala
(*Deb.* 19).

Ochna Gilletiana *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 239 ; *De Wild.*
Miss. Laurent (1905) 156 et *Étud. fl. Bas.- et Moy.-Cgo*, I (1906) 293.

Polyochnella — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII* (1903) 40.

1900 (*J. Gillet*). — V : env. de Sanda (*Odd.* in *Gill.* 3556) ; Kisantu (*Gill.* 968).
— XV : Batempa ; Munungu [*Sankuru*] (*Ém. et M. Laur.*).

Ochna Hoffmanni-Ottonis *Engl.* in *Engl. Jahrb.*, XVII (1893) 78 ;
Th. Dur. et Schinz *Étud. fl. Cgo* (1896) 87 ; *De Wild. Étud. fl.*
Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293.

Porochna — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI* (1902) 387.

O. pulchra *O. Hoffm.* [non *Hook.*] in *Linnaea*, XLIII (1880-82) 122.

1882 (*P. Pg.*). — V : rég. de la Lumene (*Hendr.* in *Gill.* 3236). — XV : Mu-
kenge (*Pg.* 1685).

Ochna katangensis *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 89.

Campylochnella — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII* (1903) 60.

O. Wildemaniana *Gilg ex De Wild.* l. c. (1903) 90, 212.

1899 (*Edg. Verdick*). — I : Haut plateau du Katanga (*Verd.*) ; Lukafu (*Verd.*
114). — Le fruit porte le nom de **Mulolo** (*Verd.*).

Ochna Laurentiana *Engl. ex De Wild. et Th. Dur.* Pl. *Gilletianae*,
II (1901) 72 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744*].

1899 (*J. Gillet*). — V : Kisantu (*Gill.* 153, 968).

Ochna membranacea *Oliv.* Fl. trop. Afr., I (1868) 316; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 36.

Diporochna — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 390.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Tchia (Dew. 402).

Ochna pulchra *Hook.* Icon. pl. VI (1843) t. 588; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 317; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 87.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens).

Ochna quangensis *Buettn.* in Verh. bot. Ver. Brandenb., XXXIII (1890) 49; *Th. Dur. et Schinz*, Étud. fl. Cgo (1896) 87.

Porochna — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1903) 57.

1885 (P. Pogge). — VI : Lulende au bord du Kwango (Pg.; Buett., 27).

Ochna Schweinfurthiana *Fr. Hoffm.* Beitr. Kenntn. Fl. Ost-Afr. (1889) 20; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 273; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 90; *Gilg* in Engl. Jahrb., XXXIII (1903) 240.

Diporidium — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 356.

Ochnella — *Van Tiegh.* l. c. Sér. 8, XVIII (1903) 39.

1894 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Musafoi**; **Kitete** (Verd. 112, 313).

Ochna Welwitschii *Rolfe* in Bolet. Soc. Brot. XI (1893) 84; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 121; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 168.

Polyochnella — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1902) 348.

1891 (F. Demeuse). — IV : rég. des Cataractes (Dem. 526).

OURATEA Aubl.

Ouratea affinis [*Hook. f.*] *Engl.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 79; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 87; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 122.

Gomphia — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 274; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 320.

Rhabdophyllum — *Van Tiegh.* in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 321 et XVIII (1903) 34.

1885 (R. Buettner). — V : Léopoldville (Schlt.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — Ind. non cl. : Lone-Island [Angola ?] (Buett.).

Ouratea Arnoldiana *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 22 [B. S. B. B. XXXVIII², 30]; *Gilg* in Engl. Jahrb., XXXIII (1903) 257; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 156 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 292.

Rhabdophyllum Arnoldianum *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8. XVI* (1902) 321 et. XVIII (1903) 34.

Ouratea affinis *De Wild. et Th. Dur.* [non *Engl.*] *Reliq. Dewevr.* (1901) 36 et *Pl. Gilletianae, I* (1900) 7 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 7*].

1895 (A. Dewèvre). — V : Kisantu et env. (Gill. 3399); Kimuenza (Dew.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2827). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukenge (Pg. 676, 681, 682).

OBS. 1. — L'habitation " au N. du Stanley-Pool " (Dew.) est dans le Congo français.

OBS. 2. — M. Gilg rapporte, avec doute, le n° 3075, récolté par G. Schweinfurth à Mbruole, [XII] à cette espèce.

Ouratea bracteata *Gilg* in *Engl. Jahrb. XXXIII* (1903) 264; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 292.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2722).

Ouratea Cabrae *Gilg* in *Engl. Jahrb. XXXIII* (1903) 262.

Exomicrum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII* (1903) 38.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 33).

Ouratea coriacea *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 36; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 156 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 292; *Gilg* in *Engl. Jahrb. XXXIII* (1903) 261.

Exomicrum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI* (1902) 339 et XVIII (1903) 38.

O. reticulata [*P. Beauv.*] *Engl. var. Schweinfurthii Engl.* in *Engl. Jahrb. XVII* (1893) 81.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2683): entre Lukolela et Gombi (Dew. 795). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2837). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XII d : Kusumba (Schw. 3169).

Ouratea densiflora *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 37; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 156.

Exomicrum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI* (1902) 339.

Monelasmum. — *Van Tiegh.* l. c. XVIII (1903) 35.

1895? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — XIII c : Yakusu (Ém. et M. Laur.).

Ouratea Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 37; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 292; *Gilg* in *Engl. Jahrb. XXXIII* (1903) 271.

Exomicrum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI* (1902) 339.

Monelasmum — *Van Tiegh.* l. c. XVIII (1903) 35.

1890 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 33). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 744).

Ouratea Dupuisii [*Van Tiegh.*] *Th. et Hél. Dur.*

Monelasmum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI* (1902) 328.

1893? (P. Dupuis). — Bas-Congo (Dup. fide Van Tiegh.).

Ouratea elongata [Oliv.] Engl. in Engl. Jahrb. XVII (1893) 80; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 7 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 7]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 157 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293, t. 67.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Dibebe (Ém. Laur.).

Ouratea febrifuga Engl. et Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 257; *De Wild.* Pl. Laurentianae (1903) 43.

Bisetaria — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 11.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

Ouratea laevis *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 26 [B. S. B. B. XXXVIII². 34]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 156 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 293.

Monelasmum — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVIII (1903) 327.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — V : Kimuenza (Gill. 1907, 2205); Sanda (De Brouw. in Gill. 3024; Odd. in Gill. 3554). — XV : Isaka (Ém. et M. Laur.).

Ouratea laxiflora *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 25 [B. S. B. B. XXXVIII², 33] et Pl. Thonnerianae (1900) 37 t. 1; Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 262.

Campylospermum — Van Tiegh. in *Morot.* Journ. de Bot. (1902) 197.

Monelasmum — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 2, XVI (1902) 327 et XVIII (1903) 37.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 20).

Ouratea leptoneura Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 255.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12535, 12584); Léopoldville (Luja, 15; Duchesne, 9).

Ouratea longipes [Van Tiegh.] Th. et Hél. Dur.

Rhabdophyllum — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 323.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala. (Hens, 120).

? **Ouratea myrioneura** Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 255.

1885 (R. Buettner). — Ind. non cl. : rive gauche du Congo en aval de Lone-Island [Angola?] (Buett. 31).

M. Gilg [l. c.] conserve quelques doutes sur la détermination de cette espèce.

Ouratea pellucida *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 27 [B. S. B. B. XXXVIII², 35] et Reliq. Dewevr. (1901) 38; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 157; Gilg in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 261.

Exomicrum — Van Tiegh. in Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI (1902) 339.

Monelasmum — Van Tiegh. l. c. XVIII (1903) 35.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew. 1159); retrouvé en 1904 (Ém. Laur.).

Ouratea Poggei [*Engl.*] *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 272.

Monelasmum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI* (1902) 328.

O. reticulata Engl. var. — *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 81.

O. reticulata Engl. var. andongensis Hiern *Cat. Welw. Pl. I* (1896) 122.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 683, 684, 686); forêts vierges de la Lulua (Pg. 673, 677, 678, 679); Muene-Muketela vers 6° 5 (Pg. 675).

Ouratea pseudospicata *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 263 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 292.

1891 (H. Vanderyst). — Bas Congo (Gill.). — I : Moanda (Vanderyst).

Ouratea refracta *De Wild. et Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo, III* (1899) 23
[*B. S. B. B. XXXVIII*², 31] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 38; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 256.

Rhabdophyllum — *Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI* (1902) 321.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : forêt de Rewa [rég. de Nyangwe] (Dew. 1140).

Ouratea reticulata [*P. Beauv.*] *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 81; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 86; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 122; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletiana*, I (1900) 11 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 39; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 267.

Gomphia — *P. Beauv. Fl. d'Oware, II* (1807) 22 t. 72; *Oliv. Fl. trop. Afr. I*, 320.

Ochna [err. cal.] — *De Wild. Pl. Laurent.* (1903) 44.

G. flava Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 216.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur. 31). bassin de la Sele (But. in Gill. 1454).

OBS. — A. Dewèvre a récolté cette espèce au N. du Stanley-Pool, [n. 720] mais sur la rive française.

— — var. **Schweinfurthii** *Engl. l. c.* (1893) 81; *Th. Dur. et Schinz l. c.* 88.

Monelasmum *Schweinfurthii Van Tiegh.* in *Annal. sci. nat. Sér. 8, XVI* (1902) 328.

1870 (G. Schweinfurth). — XIII d : Kusumba [pays des Mangbettu] (Schw. 3169).

Ouratea subumbellata *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 254; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 157 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 293.

1880 (von Mechow). — V : env. de Léopoldville et de Lemfu (Gill.); Kimuenza (Gill. 1672); Sanda (Odd. in Gill. 3014, 3555); rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3064). — VI : le Kwango (von Mech.); Gango près Muene-Putu-Kasongo (Buett.):

vallée de la Djuma (Gent.). — VIII : Eala (M. Laur. 137). — XV : le Kasai (Ém. Laur.); Lubue (Gent. 34); Olombo; Mange; Dibebe; Munungu (Ém. et M. Laur.). — Ind. noncl. : le Lomami (Desc.). — Nom vern. : **Mboyo** [Équateur] (Dew.).

VAUSAGESIA Baill.

Vausagesia africana Baill. in B. S. Linn. Paris, II (1890) 871; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 72 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 168.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1782).

BURSERACEAE

PACHYLOBUS G. Don.

Pachylobus edulis G. Don Gen. Syst. Bot. II (1832) 89; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 365.

Canarium — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 285; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 127.

— — var. **Mubafo** [*Ficalho*] *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 365; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 72 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 39; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 125.

Canarium Mubafo *Ficalho* in Bol. Soc. geogr. Lisboa, Sér. 2 (ann.?) 611 et Pl. Uteis (1884) 115.

Pachylobus edulis « G. Don » *Hemsl.* in *Hook.* Icon. pl. XXVI t. 2566, 2567.

Canarium Saphu *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 99 c. fig. in textu et t. 3;

Th. Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 89.

Pachylobus — *Engl.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 4 (1896) 243.

C. Safu « *Engl.* » *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 36.

1883 (P. Pogge). — Arbre fruitier planté dans les villages du Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — IV : Lukungu (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1330). — VIII : Lilangi (Dew. 760); Bokakata (Dew. 796 a). — XV : Mukenge (Pg.).

CANARIUM L.

Canarium Schweinfurthii *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. IV (1883) 101 et in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 99; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 89; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 14 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 40; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 36 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 272.

1883 (P. Pogge). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — IX : Bumba (Dew.). — XIII a : zone des Stanley-Falls. — Nom vern. : **Beli** (Coll.?) — XV : Mukenge (Pg.) — XVI : Urua. — Nom vern. : **Bafu** (Desc.).

MELIACEAE

TURRAEANTHUS Baill.

Turraeanthus Klainei *Pierre ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 272.

1904 (Ad. Odden). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3753).

TURRAEA L.

Turraea Cabrae *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 31 t. 16; Contr. fl. Cgo, I (1899) 13 et Reliq. Dewevr. (1901) 40; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 39 t. 33, (1908) 261.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Shinganga (Dew. 350); Shim-bete (Dew. 316); Shimbanga [Haut-Shiloango] (Cabra-Michel). — V : env. de Léopold-ville (Gill. 3889). — VI : Madibi (Sap.). — Noms vern. : **Munkanakana; Monganagana** [Kwilu] (Sap.).

Turraea Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 261 t. 88.

1891 (F. Demeuse). — VIII : entre Lulanga et Coquilhatville (Pyn. 797). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XII a : Stanley-Falls (Dem. 392). — Ind. non cl. : Busa (Ém. et M. Laur.).

Turraea Vogelii *Hook. f. in Hook.* Niger Fl. (1849) 253; *Walp.* Annal. bot. II, 227; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 330; *C. DC.* in *DC.* Monog. Phan. I, 141; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 130; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 31 [B. S. B. XXXVI², 77] et Contr. fl. Cgo, I (1899) 13; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 39.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Lukolela (Pyn.); Kisantu; entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Lemfu (De Brouw.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. Duch.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XII c : env. de Gombari (Scr.). XV : rives du Sankuru (Ém. Laur.); env. d'Idange; Bena-Dibele (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lac Moero (Desc.).

Obs. — Le *T. Vogelii* signalé dans *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 89, appartient probablement au *T. Cabrae*.

PYNAERTIA De Wild.

Pynaertia ealaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 262 t. 84.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 1024).

MELIA L.

Melia Azedarach L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 384; Bot. Mag. (1807) t. 1066; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 332; *C. DC.* in *DC. Monog. Phan.* I, 451; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 231; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 31; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 15; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 130; *De Wild.* *Pl. Laurent.* (1903) 37 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 42-49, (1905) 486-488; *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 262.

M. angustifolia *Schumach.* et *Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 214.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo. (Ém. Laur.). — I : Banana (Dup.). — III : Tondoa (Buett.). — V : Kinshassa (Ém. Laur.); Dembo; Kisantu (Gill.). — IX : Lie [introd.] (Ém. Laur.). — XV : Lonkala (Sap.). — XVI : Toa (Desc.).

OBS. — Cette espèce paraît répandue dans le bassin du Congo (Ém. Laur.).

GUAREA Allem.

Guarea Laurentii De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 263.

1906 (Marc. Laurent): — VIII : Eala (Pyn. 369, 968). — XI : env. de Yambuaya (M. Laur. 1935).

TRICHILIA L

Trichilia emetica Vahl *Symb. bot.* I (1796) 34; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 335 et in *Trans. Linn. Soc. XXIX*, t. 201; *C. DC.* in *DC. Monog. Phan.* I, 680; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 134; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 231; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 77.

Mafureira oleifera Bertol. *Misc. bot.* IX (1850 ?) 6 t. 2.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu et env. — Nom vern. : **Musjikinsi** (Verd. 21, 173).

Trichilia Gilletii De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 50; II (1907) 40, (1908) 264.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza et env. (Gill. 1962, 2097, 2165; Van Houtte in Gill. 2032). — VIII : Injolo (M. Laur. 1940).

Trichilia Laurentii De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 264.

1908 (Marc. Laurent). — XI : env. de Mogandjo (M. Laur. 1939).

Trichilia Pynaertii De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 265.

1906 (A. Sapin). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (Pyn. 1070). — Noms vern. : **Mpana** [Kwilu]; **Sobulolo** [Bangala].

Trichilia quadrivalvis *C. DC.* in B. Herb. Boiss. III (1895) 402.

1881 (von Mechow). — VI : bassin du Kwango (v. Mech.).

Trichilia retusa *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 658; *C. DC.* in *DC.* Monog. Phan. I, 658; *Guerke* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 232; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 51; II (1907) 40 et *Miss. Laurent* (1905) 126.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2787). — VIII : Coquilhatville (M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur. 947). — XV : le Kasai (Luja, 213).

CARAPA Aubl.

Carapa procera *DC.* Prodr. I (1824) 626; *C. DC.* in *DC.* Monog. Phan. I, 716; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 134; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 55-57; *Miss. Laurent* (1907) 380 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Congo, I (1904) 161; II (1908) 260.

C. guianensis *Oliv.* [non *Aubl.*] Fl. trop. Afr. I (1868) 339.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VIII : Iko (Lamb.); Eala (Ém. et M. Laur.). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.); Kasongo-Batetela (Sap.).

— — var. **Gentilii** *De Wild.* in Bull. Soc. étud. colon. (1903) 198; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 60 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 161.

1902 (L. Gentil). — XV : Luluabourg (Gent.).

ENTANDROPHRAGMA C. DC.

Entandrophragma Candolleianum *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 14; Ill. fl. Cgo (1899) 125 t. 63 et Reliq. Dewevr. (1901) 41.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : rég. des Stanley-Falls (Dew.).

LEIOPTYX Pierre.

Leioptyx congoensis *Pierre* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 259 t. 76-77.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 367).

LOVOA Harms.

Lovoa Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 260.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 674, 1283).

Lovoa trichilioides *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 165.

1885 (L. Marques). — XV : vallée de la Lovo (Marq., 232).

DICHAPETALACEAE

DICHAPETALUM Thou.

Dichapetalum adnatiflorum *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 142.

1882 (P. Pogge). — XV : Jambe [pays des Bashilange] vers 4° ¼ (Pg.).

Dichapetalum congoense *Engl. et Ruhland* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 78.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

Dichapetalum Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 41.

1895 (A. Dewèvre). — II a : la Lemba (Dew. 1359).

Dichapetalum holopetalum *Ruhland* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 77.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Dichapetalum leucosepalum *Ruhland* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 81.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 1048).

Dichapetalum Lolo *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 42 et *Ill. fl. Cgo* (1902) 179 t. 90.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Basankusu. — Nom vern. : **Lolo** (Dew. 777).

Dichapetalum Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo*, VIII (1900) 3 [B. S. B. B. XXXIX², 55]; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 8 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 8]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 273; II (1907) 41 [Lujae] et *Miss. Laurent* (1906) 329.

1896 (A. Dewèvre). — V : le Stanley-Pool (Luja) ; Sanda et env. (De Brouw. in Gill. 3116; Vermeulen in Gill. 3408, 3568); Kimuenza (Gill. 1635); env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Dew. 1576) — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.).

Dichapetalum mombuttense *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 135; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 273; II (1907) 41 et *Miss. Laurent* (1906) 240.

1872 (G. Schweinfurth). — IX : env. de Yaminga (Pyn. 59). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XII : Munsa (Schw. 3454).

Dichapetalum mundense *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 134.
1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 693).

Dichapetalum obliquifolium *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902)
87.

1896 (A. Dewèvre). — XIII c : Wabundu (Dew. 1143 b).

Dichapetalum patenti-hirsutum *Ruhland* in *Engl. Jahrb.* XXXIII
(1902) 86; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 273.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 841). — V : Kimuenza (Gill.).

Dichapetalum Poggei *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 141 et
XXXIII (1902) 85.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 626); pays des Bashilange (Pg. 1643).

Dichapetalum rufipile [*Turez.*] *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo*
(1896) 90.

Chailletia — *Turez.* in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* XXXVI (1836) 611; *Oliv. Fl.*
trop. Afr. I, 342.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.).

SPECIES DUBIA.

Pittosporum? bicrurium *Schinz et Th. Dur.* *Étud. fl. Cgo* (1896)
65; *De Wild. et Th. Dur.* *Ill. fl. Cgo* (1898) 46 t. 20.

1891 (F. Demeuse). — Ind. non cl. : Jawubu (Dem.).

OBS. — MM. Engler et Ruhland [in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 91] disent
que cette planche représente certainement un *Dichapetalum* et peut-être le
D. floribundum [Planch.] Engl.

OLACACEAE

APTANDRA Miers.

Aptandra Zenkeri *Engl.* in *Engl. et Prantl* *Nat. Pflanzenfam.*
Nachtr. zum II-IV (1897) 147 et in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, II (1899)
287; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 377 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-*
Cgo, II (1907) 31.

1899 (Edg. Verdick). — VI : entre les chutes François-Joseph et Popokabaka
(Gent.). — VIII : Coquilhatville (Ém. et M. Laur.). — IX : Yambiunga (M. Laur.).
— XV : Mununga (Lescr.): env. de Luluabourg (Verd.).

Aptandra Zenkeri var. **latifolia** *Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 287; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 289.

1896 (A. Dewèvre). — XI : entre Isangi et Basoko (Dew.).

COULA Baill.

Coula Cabrae *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1898) 19 [B. S. B. B. XXXVIII², 189]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 231, (1907) 379.

1897 (A. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.).

HEISTERIA L.

Heisteria parvifolia *Smith* in *Rees Cyclop.* XVII (1811) n. 3; *DC.* Prodr. I, 533; *Oliv.* Fl. trop. Afr., I, 346; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 90; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 140; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 13; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 231.

Acrolobus — *Klotzsch* in Verh. Akad. Berlin (1856) 237, t. 3.

A. Schoenleinii *Klotzsch* l. c. (1856) 236, t. 3.

1888 (Fr. Hens). — II a : le Mayumbe (Dup.). — V : Galiema (Pyn.); Kisantu; env. de Sanda (Gill.). — VI : env. de Dima (Lescr.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur (Pyn.); Coquilhatville (Dew.); Eala. — Nom vern. : **Etumdulu** (M. Laur.); Irebu; Bamania (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Bolombo; Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — IX a : Bobi (Thonn.). — X : Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Lokandu (Dew.); Basoko (Ém. Laur.). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukundji; Munungu (Ém. et M. Laur.).

PTYCHOPETALUM Benth.

Ptychopetalum alliaceum *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 33.

1900 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.). — V : Kisantu (Gill.).

Ptychopetalum Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 231.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2816, 2825, 2931). — IX a : en aval de Mobeka (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Ptychopetalum nigricans *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 34; II (1907) 33 et Miss. Laurent (1906) 232.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1673); Kisantu; entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Dima (Ém. et M. Laur.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

OLAX L.

Olax Aschersoniana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 46; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 91.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kassongo (Buett. 613).

Olax Durandii *Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 287; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 176.

1896 (Ém. Laurent). — XVI : Lukafu (Verd. 526). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.).

Olax Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 32.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Olax macrocalyx *Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 285; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 35.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.); env. de Kimuenza (Dew. 72).

Olax obtusifolia *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 177.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Niyaro** (Verd. 156).

Olax Poggei *Engl.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 285.

1881 (P. Pogge). — XV : Muene-Muketela, vers le 6° (Pg. 649).

Olax Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 32.

1905 (L. Pynaert). — IX : Bumba (Pyn. 110).

Olax viridis *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 349; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 8 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 8].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

LAVALLEOPSIS Van Tiegh.

Lavalleopsis longifolia *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) [B. S. B. XXXVIII², 186]; Pl. Gilletianae, II (1901) 72 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744] et Reliq. Dewevr. (1901) 44; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 232 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 32.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill. 1127, 2107); Tumba (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 810). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XIII c : Bamanga (Dew.).

STROMBOSIOPSIS Engl.

Strombosiopsis congolensis *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 17 [B. S. B. B. XXXVIII², 1877] et Reliq. Dewevr. (1901) 43.
1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

SCHOEPFIANTHUS Engl.

Schoepfianthus Zenkeri *Engl. ex De Wild.* Miss. Laurent (1907) 377.
1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.).

RHOPALOPILIA Oliv.

Rhopalopilia patens *Pierre* in B. S. Linn. Paris, II (1896) 1263 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 61.
1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1952).

— — var. **angustifolia** *De Wild.* l. c. (1903) 61.
1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2053).

Rhopalopilia Poggei *Engl.* in *Engl. et Prantl.* et Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 143 et in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1899) 282.
1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1324).

LEPTAULUS Benth.

Leptaulus daphnoides *Benth.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. I (1862) 351 ; *Oliv.* Fl. trop. Afr., I, 354 et in *Hook.* Icon. pl. XXIV (1894) t. 2339 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 242 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 43.
1870 (G. Schweinfurth). — Bas-Congo (Odd. in Gill. 3640, 3641). — V : Dembo (Hendr. in Gill. 2102) ; Sampa (Odd. in Gill. 3697) (Vermeulen in Gill. 3426). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2771). — XII : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Lubi (Lescr. 172) ; Batempa (Ém. et M. Laur.).

APODYTES E. Mey.

Apodytes beninensis *Hook. f.* in *Hook.* Icon. pl. VIII (1848) t. 778 et Niger Fl. (1849) 259 t. 28 ; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 355 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 290.
Raphiostylis — *Planch.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 259.

R. Heudelotii *Planch.* ex *Miers* in *Ann. Nat. Hist. Sér. 2, IX* (1852) 381 et *Contrib. to Bot. I, 60 t. 6.*

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : env. de Bokakata. — Nom vern. : **Bokoli** (Dew.).

ICACINA A. Juss.

Icacina Guessfeldtii *Aschers.* ex *Buett.* in *Mitth. Afr. Gesellsch. V* (1889) 263 et ex *Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam. III, 5* (1893) 250 fig. 139; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 263.

1885 (R. Buettner). — V : Lukolela (Buett. 182).

Icacina Mannii *Oliv.* *Fl. trop. Afr. I* (1868) 357; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 290.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew. 687, 688).

ALSODEIOPSIS Oliv.

Alsodeiopsis Poggei *Engl.* in *Engl. Jahrb. XV* (1893) 71; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 91.

1883 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg.).

Alsodeiopsis Oddoni *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 42.

1903 (Ad. Oddon). — V : rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3573).

PYRENACANTHA Hook.

Pyrenacantha Staudtii *Engl.* in *Schlechter West-Afr. Kautsch.-Exped.* (1900) 297.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt. 12061).

POLYCEPHALIUM Engl.

Polycephalum integrum *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, II* (1901) 73 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 744].

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1546).

Polycephalum Poggei *Engl.* in *Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV* (1897) 227 et in *Engl. Jahrb. XXIV* (1898) 484 t. 7; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 42.

1881 (P. Pogge). — V : Kisantu (Gill. 3781). — XV : Mukenge (Pg. 1360, 1371).

IODES Blume.

Iodes africana *Welw. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 358; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 143; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 283.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 651).

Iodes Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 381 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 295.

1905 (Marc. Laurent). — V : Lukoleia (Pyn 258). — VIII : env. de Coquilhatville (Malchair); Boyenge [Ikelemba] (M. Laur.); Eala et env. (M. Laur. 1117, 1524; Pyn. 401, 1343).

CELASTRACEAE

GYMNOSPORA Wight et Arn.

Gymnosporia Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 8 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 8].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1032, 1230).

Gymnosporia senegalensis [*Lam.*] *Loesen.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 541; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 145; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 92.

Celastrus — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) 661; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 361; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 81.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

— — var. **inermis** [*A. Rich.*] *Loesen.* l. c. 542 et in *Engl. Pf.* Ost-Afr. 246; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 44.

Celastrus senegalensis *Lam.* var. — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 133.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kabanga [form. *macrocarpa* Loesen.].

HIPPOCRATEACEAE

CAMPYLOSTEMON Welw.

Campylostemon angolense *Welw. ex Oliv.* in Journ. Linn. Soc. X (1869) 44 et Fl. trop. Afr. I, 366; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 147; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 45.

1896 (A. Dewèvre). — XV : forêt de Bena-Lunkala (Dew.).

Campylostemon Duchesnei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 5 [B. S. B. B. XXXIX², 57] et Ill. fl. Cgo (1900) 141 t. 71.

1892 (Jos. Duchesne). — XV : Lusambo (Duch.).

Campylostemon Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 240 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 292.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Pyn. 867); Monzambi (Pyn. 352). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Campylostemon Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 41.

1905 (L. Pynaert). — IX : entre Nouvelle-Anvers et Mobeka (Pyn.).

HIPPOCRATEA L.

Hippocratea apiculata *Welw.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 369 ; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 745]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 294.

1900 (R. Butaye). — V : entre Dembo et le Kwango (But. in Gill. 1486). — XI : Mogandjo (M. Laur.).

Hippocratea bipindensis *Loesen.* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 102 fig. 13; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 293.

1907 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 4014).

Hippocratea Bruneelii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 292.

1906 (Alberic Bruneel). — VIII : Toka [riv. Baringa] (Bruneel, 30); Eala (Pyn. 537, 559, 1032); entre Coquilhatville et Lulanga (Pyn. 771).

Hippocratea clematides *Loesen.* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 109; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 41.

1906 (Marc. Laurent). — XV : Limbutu (M. Laur. 971).

Hippocratea cymosa *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 67 t. 34; Contr. fl. Cgo, I (1899) 15 et Reliq. Dewevr. (1901) 45; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 106; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 240.

H. obtusifolia Schweinf. var. *obtusifolia Loesen.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 237.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Lukolela (Dew. 827). — VIII : Lulanga (Ém. Laur.).

Hippocratea indica *Willd.* Sp. pl. I (1797) 193; *Roxb.* Corom. Pl. II, t. 130; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 368; *Brandis* For. Fl. of Ind. 83;

Laws. in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 624; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 148; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 293.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et euv. (M. Laur.; Pyn. 1350, 1474). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1970); env. de Mogandjo (M. Laur.).

Hippocratea isangiensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 293.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Isangi (M. Laur.).

Hippocratea myriantha *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 369; *Loesen.* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 106 fig. 1 D-F; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 293.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 802). — VIII : Eala (Pyn. 918, 1290, 1640); Waka [Maringa]; Ikenge (Bruneel); Mondjo (Pyn. 317); riv. Lulonga (Pyn. 763). — XI : Yambuya (M. Laur. 1906).

Hippocratea obtusifolia *Roxb.* Hort. Bengal. (1814) 5; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 369; *Engl. Pfl.* Ost-Afr. 247; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 81.

Le type croît en Asie et en Australie trop.

— — var **Richardiana** *Loesen.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 236 et XXXIV (1904) 108.

H. *Richardiana* *Camb.* in *St-Hil.* Fl. Bras. mer. II (1829) 102 in adnot.; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I, 112 t. 26.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Boriri**, **Lubulukutu** (Verd. 78, 593).

Hippocratea Poggei *Loesen.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 238 et XXXIV (1904) 117; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 92.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1983).

Hippocratea Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 294.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 736, 1300, 1315, 1438).

Hippocratea velutina *Afzel.* Remed. guin. (1815) 33 et ex *Spreng.* Neue Entdeck. III (1822) 234; *DC.* Prodr. I, 568; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 370; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 120, fig. III, a-c.; *Loesen.* in *Schlechter* West-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 297; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 295.

Salacia unguiculata *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 3 [B. S. B. B. XXXVIII², 80] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 46.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 607; Schl.): env. d'Eala (M. Laur.).

Hippocratea Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 208.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 582).

SALACIA L.

Salacia alata *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 241.

1904 (S. Bieler). — VIII : Haut-Lopori (Biel.).

— — form. **gracilis** *De Wild.* l. c. (1906) 242.

1906 (L. Pynaert). — IX : Bumba (L. Pyn. 103).

Salacia congolensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 85, t. 43; Contr. fl. Cgo, I (1899) 16 et Pl. Thonnerianae (1900) 23, t. 20.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Mongo (Thonn. 190).

Salacia Demeusei *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 11; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 41, (1908) 295.

1891 (F. Demeuse). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1139). — IX : pays des Bangala (Dem.).

Salacia Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 2 [B. S. B. B. XXXVIII², 79] et Reliq. Dewevr. (1901) 46.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kisanga? [rég. de Nyangwe] (Dew. 1079).

Salacia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent. (1906) 241.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.).

Salacia Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 295.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 19, 1705).

Salacia senegalensis *DC.* Prodr. I (1824) 570; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I, 113 t. 27; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 374; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 92.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

RHAMNACEAE

VENTILAGO Gaertn.

Ventilago leiocarpa *Benth.* in Journ. Linn. Soc. V (1861) 77; *Hemsl.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 378; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 47.

V. maderaspatana *Benth.* (non *Gaertn.*) in Kew Journ. of Bot. IV (1852) 42
Celastrus diffusa *G. Don.* Gen. Syst. Bot. II (1832) 6.

1896 (A. Dewèvre). — IX : env. de Lukasa? [rég. de Bumba] (Dew.).

ZIZYPHUS L.

Zizyphus espinosus *Buett.* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXXII (1890) 48; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 93.

1884 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett. 493).

Zizyphus Jujuba *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* III (1789) 318; *Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 379; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 255; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 150.

Z. insularis *C. Sm.* in *Tuck. Congo Expéd., App.* (1818) 250.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

— — var. **obliquifolia** *Engl. ex De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 54.

1895 (G. Descamps). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kankono** (Verd. 224); Pweto (Charg.); Albertville [Toa] (Desc.).

GOUANIA Jacq.

Gouania longipetala *Hemsl.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I (1868) 383; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 20; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 9 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 9] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 47; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 49 et *Miss. Laurent* (1907) 388.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Équateur (Dew.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Lubue (Luja). — Ind. non cl. : Mapumi (Ser.). — Noms vern. : **Ketendolo** [Kasongo]; **Puku-puku** [Ikwangua]; **Vanda-Makolo** [Tanganika] (Dew.).

Gouania Sereti *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 45.

1906 (F. Seret). — XII a : entre Niangara et Gombari (Ser. 448).

AMPELIDACEAE

AMPELOCISSUS Planch.

Ampelocissus abyssinica *Planch.* in *La Vigne améric.* (1885) 24 et in *DC. Monog. Phan.* V, 383; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 9 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 9].

Vitis — *Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss.* I (1847) 112.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Ampelocissus angolensis *Planch.* in *La Vigne améric.* (1885) 48 et in *DC. Monog. Phan.* V, 400; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 156.

Le type n'a été trouvé que dans l'Angola.

Ampelocissus angolensis var. **congoensis** *Planch.* l. c. V (1887) 400; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 93.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Ampelocissus calophylla *Gilg* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 285.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Luozi (Luja, 150). — XI : Lokandu (Dew. 1124). — XII c : Nala (Pyn.).

Ampelocissus Chantinii (*Lécard*) *Planch.* in *La Vigne améric.* (1885) 27 et in *DC. Monog. Phan. V*, 389; *Gilg* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* 257; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 47.

Vitis — *Lécard* ex *Planch.* l. c. V (1887) 389 in obs.

1896 (A. Dewèvre). — XV : le Haut-Lualaba (Dew. 1022, 1071). — Nom vern. : **Kisangama** [Tanganika].

CISSUS L.

Cissus adenocaulis *Steud.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 111; *Planch.* in *DC. Monog. Phan. V*, 586; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 162; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 163 et *Miss. Laurent* (1905) 147.

Vitis — *Miq.* in *Ann. Mus. Lugd.-Bat.* I (1863-64) 79; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I (1868) 404; *De Wild.*: Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 147 [err. cal. *tenuicaulis*].

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — VII : Kiri (Ém. Laur.). — XII? : le Nabambisso (Schw.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Cissus aralioides [*Welw.*] *Planch.* in *DC. Monog. Phan. V* (1887) 513; *Gilg* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 259; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 160; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 48.

Vitis — *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I (1868) 411.
V. constricta *Bak.* l. c. I (1868) 409.

1895 (J. Gillet). — II a : Katala (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Yumbi (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Ikenge (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — Nom vern. : **Mecece** [Coquilhatville] (Dew.).

Cissus articulata *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1830) 135; *Planch.* in *DC. Monog. Phan. V*, 588; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 48.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew.).

Cissus Bakeriana *Planch.* in *DC. Monog. Phan. V* (1887) 599; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 94.

V. Thonningii *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* I (1868) 402 pr. p.

1870 (G. Schweinfurth). — XII : pays des Mangbettu (Schw.).

Cissus Barbeyana *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 11 et Reliq. Dewevr. (1901) 48; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 163.*

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 339). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2713).

Cissus cornifolia [*Bak.*] *Planch. in DC. Monog. V (1887) 492; De Wild. Etud. fl. Kat. (1903) 209.*

Vitis — *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 390; Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 47 t. 22*

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.). — Nom vern. : **Moganza.** — Ind. non cl. : Gumango [Congo?] (Schw.).

Cissus debilis *Planch. in DC. Monog. Phan. V (1887) 569; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletiana, I (1900) 9 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 9]; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 161; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52.*

Vitis — *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 403.*

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Cissus Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 12 et Reliq. Dewevr. (1901) 48.*

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (But.). — V : Kisantu (Gill. 228); rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3624). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew. 1160); chutes de la Tshopo (Ém. Laur.).

Cissus diffusiflora [*Bak.*] *Planch. in DC. Monog. Phan. V (1887) 496; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletiana, II (1901) 78 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 750]; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 159.*

Vitis — *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 390.*

1900 (J. Gillet). — V : Lukolela (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.).

Cissus farinosa [*Welw.*] *Planch. in DC. Monog. Phan. (1887) 488; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 159; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 285 et Miss. Laurent (1905) 148.*

Vitis — *Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 394.*

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — XIII d : Lubunda [rég. de Niangwe] (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.); Munungu (Ém. Laur.).

Cissus Gilletii *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 6 [B. S. B. B. XXXIX², 58]*

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.) Samba. — XV : (Cabra).

Cissus Guerkeana [Buett.] Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 9; Gilg in Schlecht. West-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 298.

Vitis — Buett. in Verhandl. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 89.

1886 (R. Buettner). — V : montagne entre Léopoldville et le Stanley-Pool (Buett.); Dolo (Schlt. 12463).

Cissus Haullevilleana De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 12 et Reliq. Dewevr. (1901) 49; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 53.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.).

Cissus ibuensis Hook. f. in Hook. Niger Fl. (1849) 265; Planch. in DC. Monog. Phan. V, 567; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 95; De Wild. Miss. Laurent (1905) 149 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 286.

Vitis — Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 402.

1874 (Fr. Naumann). — II : env. de Boma (Dew.); Ponta da Lenha (Naum.). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — XIII a : Yakusu (Ém. Laur.).

Cissus Kakoma De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 210.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 158).

Cissus Laurentii De Wild. Miss. Laurent (1905) 148.

1904 (Ém. et Marc. Laur.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.).

Cissus Livingstoniana Welw. in Journ. Linn. Soc. VIII (1864) 159; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 158; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52 et 286.

Vitis rubiginosa Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 394.

Cissus — Planch. in DC. Monog. Phan. V (1887) 485; Gilg in Engl. Pfl. Ost-Afr. 258; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 95; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 50; De Wild. Pl. Laurent. (1903) 40.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.); Luvi-tuku (Dem.); Sona Gongo (Ém. Laur.); Lutete (Hens). — V : rég. de Kimuenza (Gerard); Kisantu (Gill.). — XIII d : Lubunda [rég. de Nyangwe] (Dew.). — XV : Dibele (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Ind. non cl. : Mont Kiobo (Coll?). — Noms vern. : Tjabilonda [Lukafu]; Ilikiwagurta (Ikwangula); Luanzu [Tanganika].

OBS. — Cette espèce paraît assez répandue dans le Congo belge (De Wild.).

Cissus mayombensis Gilg ex Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 95 [nom. tant.].

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur. 77).

Cissus Oliveriana [Engl.] Gilg in Engl. Pfl. Ost-Afr. (1895) 258; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 286.

C. arguta Hook. f. var. — Engl. Hochgeb. trop. Afr. (1892) 295,

1898 (Ed. Luja). — IV : Tuimba (Luja, 120).

Cissus polycymosa *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2715).

Cissus producta [*Afzel.*] *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 493; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 149.

Vitis — *Afzel.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 389; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 16 et Pl. Thonnerianae (1900) 24.

1896 (Fr. Thonner.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — IX a : Gali (Thonn. 18).

Cissus prostrata *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 13; Reliq. Dewevr. (1901) 49 et Pl. Gilletianae, I (1900) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 74]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 149 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 52, 163.

1895 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Dew. 487); Sabuka (Ém. Laur.); entre Dembo et le Kwango (But.); Kimuenza (Gill. 1724); Lemfu (But. in Gill. 3482); rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3019, 3578).

Cissus Smithiana [*Bak.*] *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 490; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 95.

Vitis — *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 391; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 25.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — IX a : Bogola (Thonn. 108).

Cissus suberosa [*Welw.*] *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 481; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 9 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 9]; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 40.

Vitis — *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 392.

1893 (Ém. Laurent). — II : Ile des Princes (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — IX : Bolombo; Umangi (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.).

Cissus tenuicaulis *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 266; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 95.

Vitis — *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 404.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Cissus tiliifolia *Planch.* in *DC.* Monog. Phan. V (1887) 491; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 95.

1870 (G. Schweinfurth). — XII : Munza [pays des Mangbettu] (Schw. 3485).

Cissus trinervis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 210.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Lendja (Verd. 181, 221).

RHOICISSUS Planch.

Rhoicissus edulis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 86 et 209 t. 41, fig. 6-10.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kasungana** (Verd. 302).

Rhoicissus Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 85, 209 t. 41 fig. 1-6.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kaluma-kalenda** (Verd. 364).

LEEAL.

Leea guineensis *G. Don* Gen. Syst. Bot. I (1831) 712; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 164; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 163, 286 et *Miss. Laurent* (1905) 150.

L. sambucina *Schumach.* et *Thonn.* [non *Willd.*] Beskr. Guin. Pl. (1827) 124; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 415; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 96. *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 16; II (1900) 13; *Pl. Gilletiana*, I (1900) 19; *Reliq. Dewevr.* (1901) 50 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 129.

1890 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Ern. Dew.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Banza-Putu (Dew.); Luvituku (Dem.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Itatamba** (Pyn.).

SAPINDACEAE

PAULLINIA Schum.

Paullinia pinnata *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 366; *Gaertn.* De fruct. et semin. I, t. 79; *DC.* Prodr. I, 604; *Lam.* Pl. bot. Encycl. II t. 318; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 419; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 249; *Radlk.* Monog. Paullinia (1895) 69; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 96; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 17 et Étud. fl. Kat. (1903) 82; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 116,

P. senegalensis *Juss.* in *Ann. Mus. Paris*, IV (1804) 348; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. I, 116.

P. uvata *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 195.

P. africana *G. Don* Gen. Syst. Bot. I (1831) 661.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ile des Princes (Dup.). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba [plateau au S. de la Lukula] (Cabra-Michel); le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : entre Tumba et Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kisantu. — Nom vern. : **Lubula-Kutu** (Gill.). —

VI : vallée de la Djuma (Gill. et Gent.); Ile en face de Dima (Lescr.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Aug. Krekels). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : bassin du Sankuru; Batempa (Ém. et M. Laur.); Lusambo (Ém. Laur.); Djoko-Punda (Lescr.). — XVI : Lukafu (Verd.).

CARDIOSPERMUM L.

Cardiospermum grandiflorum Sw. Prodr. veget. Ind. occid. (1788) 64; *Radlk.* in Sitzungsab. Akad. Muench. VIII (1878) 260; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 166; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVI², 52].

1892 (F. Demeuse). — IV : Kitobola (Pyn.). — II a : bord de la Lulu (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — IX a : la Mongala (Dem.). — XV : embouchure du Luebo (Desc.).

— — form. **hirsutum** *Radlk.* in Sitzungsab. Akad. Muench. VIII (1878) 260 et in *Mart.* Fl. Bras. XIII³ (1897) 436; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 14 et Reliq. Dewevr. (1901) 50; *Hiern.* Cat. Welw. Pl. I, 167.

C. barbicaule *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 418.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — IX : env. de Bumba. — Nom vern. : **Doandu** (Dew.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Cardiospermum Halicacabum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 366; *Bot. Mag.* (1807) t. 1049; *DC.* Prodr. I, 601; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II t. 308; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 417; *Boiss.* Fl. Or. I, 945; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 107; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 96; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 114-115.

C. glabrum *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 197.

C. microcarpum *Kunth* in *Humb.* et *Bonpl.* Nov. gen. et sp. pl. V (1821) 104; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 418.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu (Hens). — V : env. de Bolobo (Dew.); Kisantu (Gill.). — VIII : Haut-Lopori (Bieler). — XII : entre Bima [XII a] et Buta [XII d] (Ser.). — XVI : Pala (Desc.).

ALLOPHYLUS L.

Allophylus africanus P. Beauv. Fl. d'Oware, II (1807) 74 t. 107; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 167; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 746].

Schmiedelia — *DC.* Prodr. I (1824) 610; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 421.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza; Kisantu; entre Kisantu et Dembo (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte); env. de Lemfu (But.); rég. de Sanda (Odd.). — VIII : env. d'Eala (Ém. Laur.). — IX : Bangala (Dew.); Nouvelle-Anvers (Pyn.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Allophylus congolanus *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 294.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Allophylus leptocaulos *Radlk.* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 17 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 51.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 1046).

Allophylus longipetiolatus *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 286.

1872 (G. Schweinfurth). — XII d : bassin du Gadda [Mangbettu] (Schw. 3523).

Allophylus macrobotrys *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 288; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 51; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 383.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 650). — X : Ubangi (Ém. Laur.).

Allophylus Schweinfurthii *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 286.

1872 (G. Schweinfurth). — XII d : forêts au S. de Mbruoïe (Schw. 3668).

DEINBOLLIA Schumach. et Thonn.

Deinbollia insignis *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 250; *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr.* I, 431; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 97.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Deinbollia Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 144.

1903? (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

LYCHNODISCUS Radlk.

Lychnodiscus cerospermus *Radlk.* in *Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam.* III, 5 (1890) 344; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 296.

1896? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

CHYTRANTHUS Hook. f.

Chytranthus Gerardi *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 283.

1902 (Ch. Gérard). — V : rég. de Kimuenza (Gér. in Gill. 2045).

Chytranthus Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 284.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

Chytranthus Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 146.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Iballi (Ém. et M. Laur.).

Chytranthus stenophyllus *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 297 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 285.

1898 (J. H. Camp). — Bas-Congo (Camp). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1906, 2070).

RADLKOFERA *Gilg.*

Radlkofera calodendron *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 300 ;
De Wild. Miss. Laurent (1905) 144.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.).

PANCOVIA *Willd.*

Pancovia Harmsiana *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 302 t. 2
fig. G.

1885 (R. Buettner). — VI : Ganga près Muene-Putu-Kasongo (Buett. 498).

BLIGHEA *Koen.*

Blighea Wildemanniana *Gilg ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-
Cgo, II (1908) 296 [nom. tant.].

1900 (J. Gillet). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : env. de Kisantu (Gill. 1823).

ERIOCOELUM *Hook. f.*

Eriocoelum macrospermum *Gilg ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et
Moy.-Cgo, II (1908) 296 [nom. tant.].

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.).

Eriocoelum microspermum *Radlk. ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et
Moy.-Cgo, II (1908) 296 [nom. tant.].

1896 (A. Dewèvre). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 182).
— VIII : Coquilhatville (Dew. 608).

PHIALODISCUS *Radlk.*

Phialodiscus Dewevrei *Gilg ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-
Cgo, II (1908) 296 [nom. tant.].

1896 † (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Phialodiscus plurijugatus *Radlk.* in Sitzungsab. Akad. Muench. XX (1890) 263 in obs.; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 171; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 51; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 44.

1895 ? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.).

Phialodiscus unijugatus *Radlk.* in Sitzungsab. Akad. Muench. IX (1879) 655; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 14.

1896 (Ém. Laurent). — IX : pays des Bangala (Ém. Laur.).

ANACARDIACEAE

MANGIFERA L.

***Mangifera indica** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 200; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 442; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 243; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 174; *De Wild.* Pl. Laurent. (1903) 40 et *Miss. Laurent* (1905) 143.

1903 (Ém. Laurent). — Espèce cultivée à Tenvo [II a], Lulanga [VIII], Eala [IX] et à Nyangwe [XIII d] (Ém. Laur.).

ANACARDIUM Rottb.

***Anacardium occidentale** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 383; *Jacq.* Stirp. Amer. hist. t. 121; *DC.* Prodr. II, 62; *Descourtilz* Fl. des Antilles VII, t. 507; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 443; *Beddome* Fl. Sylv. Ind. t. 163; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 20; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 97; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 175.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (Dem.). — II : Boma; Ponta da Lenha (Naum.). — III : Matadi (Ern. Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Équateur [Wangata] (Ém. et M. Laur.).

SPONDIAS L.

Spondias lutea *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 613; *DC.* Prodr. II, 75; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 448; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. IV, 244; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1899) 10 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 10]; et Reliq. Dewevr. (1901) 52; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 146-48.

? *S. Mombin* *L.* l. c. ed. 1 (1753) 371; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 175.

S. Myrobalanus *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) 1036.

S. aurantiaca *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 225.

S. dubia *A. Rich.* Fl. Seneg. tent. (1832) 153.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

PSEUDOSPONDIAS Engl.

Pseudospondias microcarpa [A. Rich.] Engl. in *DC.* Monog. Phan. IV (1883) 259; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 98; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 244; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 176; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 14 et Pl. Gilletianae, I (1900) 10; Reliq. Dewevr. (1901) 52; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 144,

Spondias — A. Rich. in *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832). 151, t. 40; *Oliv.* Fl trop. Afr. I, 448.

S. angolensis O. Hoffm. in *Linnaea*, XLIII (1880-82) 125.

1895 (A. Dewèvre). — II : env. de Boma. — Nom vern. : **Suza** (Dew.). — II a : Shinganga. — Noms vern. : **Suza**; **Cucunia** (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.).

LANNEA A. Rich.

Lannea velutina A. Rich. in *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 154, t. 42; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 81.

Odina — *Endl.* ex *Walp.* Repert. bot. I (1842) 550.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mu-Bumbu** (Verd. 219).

Lannea Welwitschii [*Hiern*] Engl. in *Engl.* Jahrb. XXIV (1898) 498; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 52.

Calesium — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 179.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 837). — IX : Bumba (Dew.).

OBS. — *Lannea* [sp.] : M. DeWildeman [Étud. fl. Kat. (1903) 208] rapporte aussi à une espèce de ce genre, un arbre appelé **N'Bumbu** découvert à Lukafu, en août 1899 par M. Edg. Verdick.

THYRSODIUM Benth.

Thyrsodium africanum Engl. in *Engl.* Jahrb. XV (1892) 106; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 98.

1882 (P. Pogge). — II a : Kalamu (Ém. Laur.). — XV : Mukenge (Pg. 717, 721); bassin de la Lulua (Pg.).

SORINDEIA Thou.

Sorindeia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 281, t. 66.

1901 (Ch. Gérard). — V : bords de la Lukaya (Gér. in Gill. 1925).

Sorindeia juglandifolia *Planch. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 440; *Marchand* Révis. Anacard. 166; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. IV, 302; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 98.

Dupuisia -- *Rich.* in *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. I (1831) 148, t. 38.

Sapindus simplicifolius « Don » ex *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 286, in syn. 1863 (R. Burton). — Congo (Burt.).

Sorindeia Kimuenzae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 281 t. 72.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1935, 2185).

Sorindeia Poggei *Engl.* in *Engl.* Jahrb. XV (1892) 107; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 98.

1882 ? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1729).

EMILIOMARCELIA *Th. et Hél. Dur.* (1).

Emiliomarcelia Braunii [*Engl.*] *Th. et Hél. Dur.*

Trichosecypha — *Engl.* in *Engl.* Jahrb. XV (1893) III; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 52.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Shinganga (Dew. 342).

Emiliomarcelia congoensis [*Engl.*] *Th. et Hél. Dur.*

Trichosecypha — *Engl.* in *Engl.* Jahrb. XXXVI (1905) 222.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbé (Ém. Laur.).

Emiliomarcelia Laurentii [*De Wild.*] *Th. et Hél. Dur.*

Trichosecypha — *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 144.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Ibali [Lac Léopold II] (Ém. et M. Laur.).

Emiliomarcelia Oddoni [*De Wild.*] *Th. et Hél. Dur.*

Trichosecypha — *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy-Cgo, I (1906) 282 t. 60.

1904 (Ad. Oddon). — V : rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3659).

HEERIA *Meissn.*

Heeria abyssinica [*Hochst.*] *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 152; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 245; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 180.

(1) Un genre *Trichosecypha* étant admis en cryptogamie, nous avons dû abandonner le nom du genre créé par Hooker. Nous sommes heureux de lui substituer un nom qui rappelle la belle mission scientifique Émile et Marcel Laurent.

Anaphrenium abyssinicum *Hochst.* in *Flora*, XXVII (1844) 32; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. IV, 357; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 99; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 180.

Ozoroa insignis *Delile* in *Annal. sc. nat. Sér. 2*, XX (1843) 91, t. 1 fig. 3; *Ferret* et *Galnier* Atlas. bot. t. 9.

Rhus — *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 437.

1899 (Edg. Verdick). — III : Matadi (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Matwi-Kabula** (Verd.).

Heeria abyssinica* var. *lanceolata [*Engl.*] *Th.* et *Hél. Dur.*

Anaphrenium abyssinicum *Hochst.* var.—*Engl.* in *DC.* Monog. Phan. IV (1883) 357; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. 99.

1895 (G. Descamps). — V : Kapanga (Desc.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

— — var. ***latifolia*** [*Engl.*] *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 245.

Anaphrenium abyssinicum *Hochst.* var.—*Engl.* l. c. 357; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. 99.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Heeria pulcherrima [*Schweinf.*] *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 152; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 207.

Anaphrenium — *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 32; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. IV, 356.

Rhus — *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 436.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 86).

RHUS L.

Rhus glaucescens *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 143; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 437; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

MORINGACEAE

MORINGA Juss.

Moringa oleifera *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) 398 et Pl. bot. Encycl. II, t. 337; *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 188; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 53.

M. pterygosperma *Gaertn.* De fruct. et semin. II (1791) 314, t. 147; *DC.* Prodr. II, 488; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 35.

Guilandina Moringa *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 546.

Hyperanthera — *Vahl* Symb. bot. I (1790) 30.

1895 (A. Dewèvre). — II : env. de Boma (Dew.). — XII c : Surango (Ser.).

CONNARACEAE

AGELAEA Soland.

Agelaea Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 56.

1895 (A. Dewèvre). — IV : la Lufu (Dew. 1435).

Agelaea Duchesnei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 9 [B. S. B. B. XXXIX, 2, 61].

1899 (Ém. Duchesne). — IX : Umangi [Bangala] (Duch).

Agelaea obliqua [*P. Beauv.*] *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 454; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 124 et Miss. Laurent (1905) 89.

Cnestis — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 97, t. 59.

A. nitida *Soland.* ex *Planch.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 437; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 188.

A. Demeusei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1901) 9 [B. S. B. B. XXXIX², 61].

1891 (F. Demeuse). — V : Kimuenza (Gill.). — VII : Ibali; Kutu (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dem.).

Agelaea phaseolifolia *Gilg ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 246.

1902 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 2065). — : entre Tumba et Kimpesse (Gill.).

Agelaea Poggeana *Gilg* in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, I (1895) 65.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 737); Mukenge (Pg. 726, 734).

Agelaea rubiginosa *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XIV (1891) 319; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 99.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3537).

Agelaea Schweinfurthii *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XIV (1891) 319; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Uando; Mbruole (Schw. 3090, 3099).

PAXIA Gilg.

Paxia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 6 [B. S. B. B. XXXVIII², 83]; Reliq. Dewevr. (1901) 51 et Pl. Gilletiana, I (1900) 10 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 10].

1895 (A. Dewèvre). — II a : bords du Tshaf près Zobe (Dew. 237). — V : Kisantu (Gill.).

ROUREA Aubl.

Rourea adiantoides *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 213; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 15; Pl. Thonnerianae (1900) 17; Pl. Gilletianae, I (1900) 10 et Reliq. Dewevr. (1901) 53; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 91.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill. 703). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Lokaka** (M. Laur.); env. de Bokakata (Dew. 772 a). — IX : route de Lisala [Umangi] (Ém. Duch.). — XV : Kapinga (Ém. et M. Laur.).

Rourea bamangaensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 62 [B. S. B. B. XXXVIII², 82] et Reliq. Dewevr. (1901) 53.

1896 (A. Dewèvre). — XIII c : Bamanga (Dew.).

Rourea chiliantha *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 212.

1883 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 727, 732, 739 a, 745, 746, 747, 757).

Rourea fasciculata *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 329; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100.

1883 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 731).

Rourea Foenum-graecum *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 18; Ill. fl. Cgo (1899) 75, t. 38 et Reliq. Dewevr. (1901) 54.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 424).

Rourea inodora *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 71, t. 36; Contr. fl. Cgo, I (1899) 17 et Reliq. Dewevr. (1901) 54; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 98.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Kembo (Dew. 442). — V : Léopoldville (Ém. et M. Laur.).

Rourea oliquifoliolata *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 328; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 248.

1883 (P. Pogge). — V : Sanda (Gill.). — XV : le Kasai (Lescr. 120); Mukenge (Pg. 3120, 3411).

Rourea ovalifoliolata *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 327 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 192; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 15 et Étud. fl. Kat. (1903) 182.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.): Lukafu. — Nom vern. : **Kansolo-solo** (Verd. 1218).

Rourea Poggeana *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 326; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 748).

Rourea pseudobaccata *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 325; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 124, 248 et Miss. Laurent (1905) 91.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 3526); Uyole (Gill.). — IX : Umangi (Krek.). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Mabodé-bache [Congo ?] (Schw. 2969).

Rourea splendida *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 222; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 744).

Rourea unifoliolata *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 325; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100.

1882 (P. Pogge). — XVI : Mukenge (Pg. 1426)..

Rourea viridis *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 327; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 100; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 92 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 248.

1882 (P. Pogge). — V : env. de Kwamouth (Ém. et M. Laur.); Sanda (*De Brouw.* in Gill. 3032). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — IX : Lisala (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukenge (Pg. 750); Bolongula (Ém. et M. Laur.).

CONNARUS L.

Connarus Englerianus *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 316; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 752).

Connarus luluensis *Gilg* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 64.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua, vers le 6° lat. (Pg. 741).

Connarus Stuhlmanni *Planch.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 4; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 458; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 124, (1906) 246.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Shinganga (Dew.).

MANOTES Soland.

Manotes Aschersoniana *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 334; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 751).

Manotes brevistyla *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 334; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1882 (P. Pogge). — XV : Musumba; la Lulua (Pg. 532, 739).

Manotes Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 10 [B. S. B. B. XXXIX², 62].

1897 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra, 30, 106). — V : bords de la Pioka (Ém. Laur.); env. de Sanda (Vermeulen). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Manotes Griffoniana *Baill.* in *Adansonia*, VII (1866-67) 244; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., I, 460; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 189; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113].

1816 (Chr. Smith). — Congo (Dew. 434). — Bas-Congo (Sm.).

Manotes Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 90.

1895 (Ém. Laurent). — V : bords de la Pioka (Ém. Laur.); env. de Sanda (Vermeulen, in Gill. 3436; Odd. in Gill. 3533). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Manotes pruinosa *Pax* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 332; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 14 et Reliq. Dewevr. (1901) 55 in obs.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 246.

M. sanguineo-arillata *Gilg* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 333; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113].

1882 (P. Pogge) — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Lemfu (But.); Kisantu (Gill. 91, 628, 805); env. de Dembo (Gill.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); bords de la Pioka (Ém. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 1054). — XV : bords de la Lulua (Pg. 724); Isaka (Ém. et M. Laur.); Mukenge (Pg. 718, 749).

CNESTIS Juss.

Cnestis corniculata *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) 23; *DC.* Prodr., II, 87; *Planch.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 440; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 461; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 101.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Burton).

Cnestis ferruginea *DC.* Prodr. II (1825) 87; *Planch.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 440; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 462; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 102; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 56; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 190.

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (Gill.). — VI : rég. de Luanu (Lescr.). — VIII : Eala (Pyn.); Lac Tumba (Ém. Laur.); Coquilhatville. — Nom vern. : **Kutum-bulu** (Dew.). — IX : Lisala; Mobeka (Ém. Laur.). — XV : Kamba [Sankuru] (Ém. Laur.).

Cnestis ferruginea var. **pilosa** A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 98; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 102.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

?**Cnestis grandiflora** Gilg in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 70.

1886 (L. Marques). — XV ? : entre le fleuve Luaschim et la Chicapa (Marq. 268).

OBS. — Il est difficile de se rendre compte si cette plante a été réellement trouvée sur le territoire du Congo belge.

Cnestis grandifoliolata De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, II (1901) 74 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 74].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1420).

Cnestis iomalla Gilg in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 169; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 91 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 247.

C. emarginata De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, IV (1899) 4. [B. S. B. B. XXXVIII², 81]; Ill. fl. Cgo (1900) 129, t. 65 et Reliq. Dewevr. (1901) 125.

1888 (P. Pogge). — V : Galiema (Ém. Laur.); Léopoldville (Schlt.). — VI : Madibi (Leser. 85). — XV : Mukenge (Pg. 930).

OBS. — En 1896, Dewèvre découvrit cette espèce sur la rive française du Stanley-Pool.

— — var. **grandifoliolata** De Wild. l. c. (1900) 247.

1904 (Éd. Lescrauwaet). — VI : Madibi (Leser. 115).

Cnestis Lescrauwaetii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo (1906) 247.

1904 (Éd. Lescrauwaet). — VI : Madibi (Leser. 88).

Cnestis oblongifolia Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. I (1868) 462; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 102; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 56; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 248.

1888 (Fr. Hens). — II a : brousse de la Lukula (Dew. 553). — V : Léopoldville (Schlt.); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3549). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 106).

Cnestis polyantha Gilg in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 215.

1882? (P. Pogge). — XV : Musumba, 8 ½° (Pg. 147).

Cnestis setosa Gilg ex Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 102 et in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1896) 70; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113]; Contr. fl. Cgo, I (1899) 18; Reliq. Dewevr. (1901) 56 et Pl. Gilletianae, I (1900) 10 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 10].

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Cabra). — II a : la Lukula. — Nom vern. : **Teuze** (Ém. Laur.); Shimbete (Dew.); la Lemba (Dew. 160). — V : Kisantu (Gill. 150).

Cnèstis urens Gilg in Engl. Jahrb., XIV (1891) 330; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 102.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu à Kusumba (Schw.).

LEGUMINOSACEAE

PAPILIONACEAE

CROTALARIA L.

Crotalaria aculeata De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 185.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kamima** (Verd. 106).

Crotalaria brevidens Benth. in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. II (1843) 585; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 37; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 3 [B. S. B. B. XXXVII, 46] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 57; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 256; II (1907) 145.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi. — Nom vern. : **Monwe-Monwe** (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Luanu (Lescr.); Eicolo (Krek.). — VII : Kutu; la Fini (Ém. et M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XII c : Gombari (Ser.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Abakusso** [Amadi]; **Asuroli** [Abarambo].

Crotalaria calycina Schrank Pl. rar. Hort. Monac. (1819) t. 12; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 15; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 197; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132, (1906) 256.

1898 (Ed. Luja) — IV : distr. des Cataractes (Luja). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.).

Crotalaria capensis Jacq. Hort. Vindob. III (1776) 36, t. 64; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 38; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 8 [B. S. B. B. 36², 54].

1894 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

Crotalaria comosa *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II (1871) 34; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 203; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

Crotalaria Cornetii *Taub.* et *A. Dewèvre* ex *A. Dewèvre* in *B. S. B. B. XXXIV*² (1895) 94; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 50; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 50.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.); Lukafu (Verd. 607).

Crotalaria cylindrocarpa *DC.* *Prodr.* II (1825) 133; *Bak.* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* II, 40; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 8 [*B. S. B. B. XXXVI*², 54]; *De Wild.* *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 256; II (1907) 145.

1895 (P. Dupuis). — I : Moanda (Gill.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Dolo (M. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.); Kisantu (Gill.); Tumba; Lukolela (Ém. Laur.). — VI : Eiolo (Ém. Laur.). — VII : Lac Léopold II (Ém. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.); Nouvelle-Anvers (Ém. Laur.).

Crotalaria Descampsii *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1898) 7 [*B. S. B. B. XXXVI*², 53] et *Ill. fl. Cgo* (1899) 69, t. 35.

1891 (G. Descamps). — XVI : Haut Marungu (Desc.).

Crotalaria dubia *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 185.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 430).

Crotalaria filifolia *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 256 t. 45, fig. 3-9.

1891 (G. Descamps). — XV : rég. du Lualaba ? (Desc.).

Crotalaria glauca *Willd.* *Sp. pl.* III (1800) 974; *DC.* *Prodr.* II, 127; *Bak.* in *Oliv.* *Fl. trop. Afr.*, II, 12; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 195; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 103.

1885 (R. Buettner). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool; entre Bolobo et Lukolela (Buett.); env. de Léopoldville; Kisantu; Kimuenza (Gill.). — VII : rives du Lac Léopold II (Ém. Laur.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.). — XVI : la Lofoi; Lukafu (Verd.).

Crotalaria globifera *E. Mey.* *Comment. pl. Afr. austr.* I (1835) 24; *Benth.* in *Lond. Journ. of Bot.* II (1843) 581; *Harv.* in *Harv. et Sond.* *Fl. Capens.* II, 44; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 103.

C. macrostachya *Sond.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 26.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

— — var. **stenophylla** *Taub.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 170.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 849).

Crotalaria Hildebrandtii *Vatke* in *Oest. Bot. Zeitschr.* XXIX (1879)

220; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 207; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 145.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo, parfois planté près des villages (Ém. Laur.). — II a : Benza-Masola : Temvo (Ém. Laur.). — V : Kisantu et env. (Gill.); en aval de Tumba (Ém. Laur.).

Crotalaria intermedia *Kotschy* in Sitzb. Akad. Wien, Math.-Nat. L Abth. 1 (1865) 362, t. 3; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 37; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103.

1893 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dup.).

Crotalaria katangensis *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 99; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Crotalaria lanceolata *E. Mey.* Comm. pl. Afr. austr., I (1836) 24; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.*, II, 36; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 8 [B. S. B. B. XXXVI², 54]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132; II (1907) 145.

1897 (Alph. Cabra). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Chenal-Kasai (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — XII c : Niangara (Delp.). — Ind. non cl. : Lombe (Cabra).

Crotalaria linearifolia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 257 t. 45 fig. 1 et 2.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Crotalaria longifoliolata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 187.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kinkandja** (Verd. 362).

Crotalaria lukafuensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 184.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kapumpo** (Verd. 469).

Crotalaria mesopontica *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 205 et ex *Engl.* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 383.

1894 (G. A. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

Crotalaria oligostachya *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.*, II (1871) 41; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 204; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132 et *Miss. Laurent* (1905) 107.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.).

Crotalaria ononoides *Benth.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot., II (1843) 572; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 22; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 29 [B. S. B. B. XXXVI², 75]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 199; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132; II (1907) 146.

C. ononoriges [err. cal.] ex *Schlechter* West-Afr. Kautsch. Exped. (1900) 291.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Chenal [Léopoldville-Kwamouth] (Ém. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.); Kisantu; env. de Léopoldville (Gill.); Bulebu (Ém. et M. Laur.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Schlt.). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XV : env. de Kanda-Kanda (Lescr.); env. de Butala (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Crotalaria Poggei *Taub.* in Engl. Jahrb., XXIII (1896) 179.

1876? (P. Pogge). — VI : le Kwango, vers 10° 30' (Pg. 157).

Crotalaria polygaloides *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II (1871) 15; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 190.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1891).

Crotalaria polyantha *Taub.* in Engl. Jahrb., XXIII (1896) 179.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 845, 846).

Crotalaria quangensis *Taub.* in Engl. Jahrb., XXIII (1896) 177.

1876? (P. Pogge). — VI : le Kwango, vers 10° 30' (Pg.).

Crotalaria senegalensis *Bacle* in *DC.* Prodr. II (1825) 133; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. 165; *Benth.* in Lond. Journ. of Bot., II (1843) 582; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 31; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 103.

C. macilenta *Delile* Cent. pl. Afr. (1826) 35, t. 3 fig. 2.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Crotalaria sertulifera *Taub.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 178.

1882? (P. Pogge). — XV : Musumba, 8° 30' (Pg.).

Crotalaria sessilis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 257, t. 49.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1560).

Crotalaria spartea *R. Br.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 12; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *Schinz* Mat. fl. Cgo, I (1897) 29 [B. S. B. B. XXXVI², 75]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 196. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 107.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Bulebu (Ém. et M. Laur.).

Crotalaria spinosa *Hochst.* in *Flora*, XXIV (1841) I, *Intell.* 32; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.*, II, 3; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVII, 46]; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 197.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo. — Nom vern. : Kaseniengue (Dew.).

Crotalaria stenothyrsus *Taub.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 178.

1880 (von Mechow). — VI : Chasamango (Mech. 539).

Crotalaria striata *DC.* *Prodr.* II (1825) 131; *Bot. Mag.* (1832) t. 3200; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.*, II, 38 et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* II, 84; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 104; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 47, (1906) 258; II (1907) 147.

C. Saltiana *Andrews Bot. Repos.* X (1811) t. 648.

C. pisiformis *Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent.* (1832) 162.

C. Brownei *Berth ex DC. Prodr.* II (1825) 130; *Rchb, Hort. bot.* (1830) t. 232.

1893 (P. Dupuis). — II : Boma (Dup.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — V : Léopoldville (M. Laur.); Dolo (Schlt.); env. de Dembo (Gill.); env. de Kwamouth (Biel.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Ind. non cl. : Lone Island [Angola?] (Buett.).

— — form. **latifoliolata** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 48, 258 et *Miss. Laurent* (1905) 107.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.). — VIII : Eala (Ém. Laur.).

Crotalaria subcapitata *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 186.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 611).

TRIFOLIUM L.

Trifolium Goetzenii *Taub.* in *von Goetzen Durch Afrika* (1895) 384, 386, et in *Engl. Jahrb.*, XXIII (1896) 180.

1894 (A. G. v. Goetzen et v. Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

RHYNCHOTROPIS Harms.

Rhynchotropis Poggei [*Taub.*] *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXX (1901) 86.

Indigofera — *Taub.* in *Engl. et Prantl Nat Pflanzenfam.* III, 3 (1894) 260 fig. 115 H-K et ex *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 284.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango à 12 ½° lat. (Pg. 138).

INDIGOFERA L.

Indigofera astragalina DC. Prodr. II (1825) 228; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 89; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVII, 47] et Pl. Thonnerianae (1900) 18.

1895 (Ém. Laurent). — IX : Yabosumba près Dobo (Thonn. 81). — XV : Luebo (Ém. Laur.).

Indigofera Binderi Kotschy in Sitzb. Acad. Wien, Math.-Nat. LI, Abth. II (1865) 364, t. 6b [Pl. Binderianae]; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 91; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa]; Pweto (Desc.).

Indigofera Butayei De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 132, 258.

1900 (J. Gillet). — V : le Stanley-Pool (Camp); Kisantu (Gill. 960); Lemfu (But. in Gill. 1208).

Indigofera capitata Kotschy in Sitzb. Acad. Wien, Math.-Nat. LI, Abth. II (1865) 365 [Pl. Binderianae]; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 91; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Af. 209; *Th. Dur.* et *Schinx* Étud. fl. Cgo (1896) 104; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 208; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 58.

Anil — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 939.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : bords de l'Owali à Shinganga (Dew.); Bingila (Dup.). — V : env. du Stanley-Pool et de Léopoldville (Hens); Dolo (Schlt.); entre Bolobo et Lukolela (Buett.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — VIII : Équateur (Pyn.). — XIII d : Nord-Maniema (Cabra-Michel). — XV : Butala (Ém. Laur.).

Indigofera congesta Welw. ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 70; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 206; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 811); Lemfu (But. in Gill. 1209); Kimuenza (Gill. 776).

Indigofera congolensis De Wild. et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 11 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 11] et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1732); Lemfu (But. in Gill. 1134).

Indigofera Dewevrei M. Micheli in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 8 [B. S. B. B. XXXVI², 54]; *De Wild.* et *Th. Dur.*

Ill. fl. Cgo (1899) 59, t. 30 et Reliq. Dewevr. (1901) 58; Pl. Gilletianae, I (1900) 8 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 12] et *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 258.

1888 (Fr. Hens). — II : Zambé (Dew. 197). — IV : Lukungu (Hens, A. 275); Kisantu (Gill. 854, 877, 957). — XV : le Lualaba (Dew.).

OBS. — M. R. Schlechter [West.-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 291] croit que cette espèce n'est pas spécifiquement distincte de *I. polysphaera* Bak.

Indigofera Dupuisii M. Micheli in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 9 [B. S. B. B. XXXVI², 55] et in *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 97, t. 49.

1895 (P. Dupuis). — V : Bingila (Dup.).

Indigofera endecaphylla Jacq. Collect. bot. II (1788) 358 et Icon. pl. rar. t. 570 [hendecaphylla]; Bak. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 96; Taub. in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 210; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 214; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 108 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 146.

Anil — O. Kuntze, Rev. Gener. (1891) 939.

1895? (G. Descamps). — VIII : Eala (Ém. Laur.). IX : Bolombo; Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.); Bumba (Pyn.).—XIII a : Romée (Van Goitsenhoven).—XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Masanze [Mazanze? XIV]. (Desc.).

Indigofera erythrogramma Welw. ex Bak. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 73; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 73; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 207; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 3 [B. S. B. B. XXXVII, 46]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 15 et Reliq. Dewevr. (1901) 8.

1886 (R. Buettner).—Congo (Dem.).—V : le Stanley-Pool (Buett.); Mont Léopold (Luja); env. de Léopoldville (Luja); Dolo (Schlt.); Kisantu et env. (Gill.); Kiumuenza. — Nom vern. : **Mcaca** (Dew.); entre Kisantu et le Kwango (But.).

Indigofera erythrogrammoides *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 133.

1903 (Xav. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3063).

Indigofera Garckeana Vatke in Oest. Bot. Zeitsch. XXIX (1879) 221; Taub. in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 135; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill. 1295).

Indigofera Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 12 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 12]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

1900 (J. Gillet). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3062); Kisantu (Gill. 583, 737, 881).

Indigofera Heudelotii *Benth. ex Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 85; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 108.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Indigofera hirsuta *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 751; *Bak. in Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 88; *Hook.* Compan. Bot. Mag. t. 24; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 209; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo. (1896) 105; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 212; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 51 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

Anil — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 160.

1882 (H. Johnston). — Bas-Congo (Johnst.). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — V : Yumbi (Ém. et M. Laur.); Suata (Buett.); Kisantu (Gill.). — VII : Basenge (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.). — XVI : env. de Lukafu (Verd.).

Indigofera kisanuensis *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 13 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 13].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 839).

Indigofera moeroensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 133.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lac Moero (Verd.).

Indigofera paucifolia *DC.* Prodr. II (1825) 234; *Bak. in Oliv.* Fl. trop. Afr., II (1871) 88; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56].

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Indigofera polysperma *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 14 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 14]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 108.

1893 (Ém. Laurent). — II a : la Lukula (Ém. Laur.). — V : env. de Kwamouth (Biel.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimpoko (M. Laur.); Kisantu (Gill. 656, 736, 919).

Indigofera procera *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 365; *Bak. in Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 71; *Th. Dur. et De Wild.*

Mat. fl. Cgo, I (1897) 29 [B. S. B. B. XXXVI², 75]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 207; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 14 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 14] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 15; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

Anil procera *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 939.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); rive N. du Kasai (Luja); Kisantu (Gill.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — XII c : entre Niangara et Gombari (Ser.).

Indigofera Schimperii *Jaub.* et *Spach* Ill. pl. orient. V (1857) 94, t. 484; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II, 93; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 135.

1891 (G. Descamps). — XVI : vallée du Lofoi (Desc.); Lukafu (Verd. 61).

Indigofera scopa *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 60.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Lusonga (Dew. 1027 b).

OBS. — Cult. autour des villages pour faire des balais (Dew.).

Indigofera secundiflora *Poir.* Encycl. méth. Suppl. III (1813) 148; *DC.* Prodr. II (1825) 228; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr., II, 94; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 210; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 59.

I. oligosperma *DC.* l. c. II (1825) 228; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. 181; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I, 181.

I. glutinosa *Schumach.* et *Thonn.* [non *DC.*] Beskr. Guin. Pl. (1827) 370.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 90).

Indigofera tetraptera *Taub.* ex *Harms* in *Engl.* Jahrb. XXIII (1896) 181.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 795).

Indigofera tetrasperma *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 365; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 75; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 8 et II (1898) 3 [B. S. B. B. XXXVI², 54 et XXXVII, 46].

1895 (G. Descamps). — V : Dolo (Schlt.). — XV : rives du Kasai (Ém. Laur.). — XVI : Toa (Desc.).

Indigofera trita *L. f.* Suppl. pl. (1781) 335; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 86; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 210; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVII, 47] et Reliq. Dewevr. (1901) 59.

1896 (A. Dewèvre; Eug. Wilwerth). — V : Kisantu (Gill. 938, 946). — IX : Upoto (Wilw.). — XI : Bena-Kamba. — Nom vern. : **Kommolobilo** (Dew. 1099 a).

Indigofera variabilis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 134.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 734).

TEPHROSIA Pers.

Tephrosia bracteolata *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 194; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 116; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 105; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 211; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 142, (1906) 261 et *Miss. Laurent* (1905) 111.

Cracca — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1901) 174; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 221.

1886 (R. Buettner). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Dolo (Schlt.); le Stanley-Pool (Buett.); Chenal : Mopolenge (Ém. et M. Laur.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.); Kisantu; env. de Kimuenza (Gill.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — XV : Bolombo; Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Tephrosia Butayei *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 75 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 747].

1900 (R. Butaye). — V : ravin de la Sele (But. in Gill. 1444).

Tephrosia curvata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 190.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kambalubala** (Verd. 403).

Tephrosia elegans *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 376; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 118; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 142, (1906) 261; II (1907) 149 et *Miss. Laurent* (1905) 111.

Cracca — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 175; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 221.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (But.). — II : Zambi (Dew.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : Dolo (Schlt.); Chenal [Leo-Kwamouth] (Ém. et M. Laur.); env. de Léopoldville (Gill.); Lula-Lumene (Hendr.); Kisantu (Gill.).

Tephrosia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 192.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Tephrosia Kindu *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 191.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kakindu-kindu** (Verd. 439).

Tephrosia Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 111.

1895 (A. Dewèvre). — I : Banana (Dew. 155; M. Laur.).

Tephrosia linearis Pers. Syn. pl. II (1807) 330; DC. Prodr. II (1825) 254; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 130; Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 211; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 56]; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I (1899) 19 et Reliq. Dewevr. (1901) 59; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 262.

Cracca — O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 175; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 222.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — V : Bokala (M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.).

Tephrosia lupinifolia DC. Prodr. II (1825) 255; Harv. et Sond. Fl. Capens. II, 204; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 107; Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 211; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 105; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 142 et Miss. Laurent (1905) 111.

Cracca — O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 175; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 219.

Rhynchosia Cienkowskii Schweinf. Reliq. Kotschyanae (1868) 31, t. 24-26.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kimuenza (Gill.); Bulebu (Ém. et M. Laur.).

— — var. **digitata** Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 107; Th. Dur. et Schinz l. c. 106.

T. digitata DC. Prodr. II (1825) 255.

1885 (R. Buettner). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buett.).

Tephrosia megalantha M. Micheli in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I (1897) 11 [B. S. B. B. XXXVI², 57]; Ill. fl. Cgo (1899) 79 t. 40 et Reliq. Dewevr. (1901) 60.

1895 (A. Dewèvre). — V : env. de Kimuenza (Dew. 1520). — XV : Lusambo (Ém. Laur.). — Nom vern. : Bongo (Mobangui).

Tephrosia nseleensis De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 141, t. 36.

1900 (R. Butaye). — V : bassin de la Sele (But. in Gill. 1448).

Tephrosia noctiflora Boj. Hort. Maurit. (1837) 93; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 112; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49].

1894 (Ém. Laurent). — V : Mont Léopold [Léopoldville] (Luja). — XV : brousse à l'E. de Lusambo (Ém. Laur.).

Obs. — Une forme [magis pubescens] croît sur les bords du Lomami [distr. ?] (Ém. Laur.).

Tephrosia villosa [L.] Pers. in DC. Prodr. II (1825) 213; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 132; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 10 [B. S. B. B. XXXVI², 55]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 149.

Cracca — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 752; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 223.

1891 (G. Descamps). — V : Léopoldville (Pyn.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XVI : Pala (Desc.). — Nom vern. : **Buka** [Kwilu]; **Luvanki** [Bangala] (Sap.).

Tephrosia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 192.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

Tephrosia Vogelii *Hook. f.* ex *Hook.* Niger Fl. (1849) 296; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 110; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 130; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 211; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 106; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 15 et Reliq. Dewevr. 60; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 51; Miss. Laurent (1905) 112 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 262.

Cracca — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 175; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 220.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : Vungu-Singa (Dup.). — V : C. dans les villages près du Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. de Mobanga. — Noms vern. : **Lopangui-panga**; **Pophangue** (Dew.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : Wanie-Rukula (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kabala** (Verd.).

MILLETIA Wight et Arn.

Milletia Baptistarum *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 50; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 106; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 229.

1885 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett.).

Milletia breviflora *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 136.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2845).

Milletia brevistipellata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 193.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Solemosji** (Verd. 55).

Milletia Cabrae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 136.

1897 (Alph. Cabra). — Ind. non cl. : forêt d'Inteba (Cabra, 110).

Milletia congolensis *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 15 [B. S. B. B. Sér. 2, I, 15] et Reliq. Dewevr. (1901) 61; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 140, (1906) 259 et Miss. Laurent (1905) 109.

M. macrophylla *M. Micheli* [non *Hook. f.*] in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVII, 47]

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Léopoldville et Sabuka (Luja, 33); Sanda (De Brouw. in Gill. 3033, 3133); Kisantu (Gill. 87, 383); Sadi [Inkisi] (Cabra-Michel, 33). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2852). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

***Milletia Demeusei* De Wild.** *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 137.

1891 (F. Demeuse). — XI : Yamonongeri (Dem. 413).

***Milletia drastica* Welw.** ex *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 128; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 92; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 106; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 226; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 15] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 61; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 193

Phaseolodes — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 202.

1885 (R. Buettner). — V : le Stanley-Pool (Buett. 252); Kisantu (Gill. 99). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kafita**; **Dimanba** (Verd. 109, 290). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc. 681).

***Milletia dubia* De Wild.** *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 137.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2875).

***Milletia Duchesnei* De Wild.** *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 138.

1898 (Ém. Duchesne). — XIII a : route de la Tshopo à Stanleyville (Duch. 4).

***Milletia Gentilii* De Wild.** *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 138, (1906) 258, t. 53.

1902 (L. Gentil). — V : rég. de Sanda (Verm. in Gill. 3433). — XV : vallée de la Loange (Gent. 29).

***Milletia Harmsiana* De Wild.** *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 139, II (1907) 37.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1919).

— — form. ***acuminata* De Wild.** *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 147.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 454).

***Milletia Laurentii* De Wild.** in *La Belg. colon.* (1904) 378; *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1904) 341-42; *Miss. Laurent* (1905) 109 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 269; II (1907) 147.

1894 (J. Gillet). — V : Léopoldville (Ém. et M. Laur.; Dew. 523); Bolobo (Coll.?); Kisantu. — Nom vern. : **Mbota** (Gill. 40); Kimuenza (Gill. 2164). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bokakata (Gent.).

Milletia ? macrourea *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 289.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 828).

Milletia Mannii *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 127; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 106; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 62 et *Pl. Gilletiana*, II (1901) 75 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 747]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 147.

1888 (Fr. Hens). — V : Léopoldville (Hens); Lukolela (Pyn.); entre Kisantu et le Kwango (But.); env. de Sanda (Odd.). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : **Busembo** (Dew. 786); Équateur (Pyn.); Eala (M. Laur.; Pyn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.).

Milletia Teuszii [*Buett.*] *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 140, (1906) 260, t. 48; II (1907) 147 et *Miss. Laurent* (1905) 110.

Lonchocarpus — *Buett.* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXXII (1891) 51.

1880 (von Mechow). — V : rég. de Kisantu (Gill. 605, 2527); env. de Kimuenza (Gill. 1677); rég. de Sanda (Verm. in Gill. 3833); env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VI : le Kwango (v. Mechow). — VIII : Ikenge (Malchair in M. Laur. 935); Injolo (M. Laur. 1884). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (Ém. Laur.).

Milletia Thonningii [*Schumach. et Thonn.*] *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 128; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 128; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1900) 18 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 62; *Pl. Gilletiana*, II (1901) 75 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 747]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 140, (1906) 260; II (1907) 147.

Robinia — *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 349.

Phaseolodes — *O. Kuntze Rev. Gener.* (1891) 202.

M. Griffoniana *Baill.* in *Adansonia*, VI (1866) 222; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 225.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens, 335). — II : env. de Boma (Dew. 180). — II a : bord de la Msafo (Dup.); le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2532); Lukolela (Pyn. 177); Kisantu (Gill. 1045, 1234); Kimuenza (Gill. 2192); Sanda (Odd. in Gill. 3308). — VI : riv. Inchina. — Nom vern. : **Bokinku** (Sap.). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **M'Banza** (M. Laur. 1682, 1815); Irebu (Schlt.); Équateur (Pyn. 264). — IX : Umangi (Ém. Duch.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 963 a). — Noms vern. : **Alimne** [Ikwangula]; **Nyangwe** [Kasongo]; **Kasonswe** [Tanganika] (Dew.).

Milletia urophyloides *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 147.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 801, 1821).

OBS. — Cette espèce a été retrouvée au Congo français par M. A. Baudon (*De Wild. l. c.*)

Milletia versicolor *Welw. ex Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 129; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 227; *De Wild. Not. pl. util. ou intér.*

du Cgo, I (1904) 343-45 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 260, t. 47; II (1907) 148.

Lonchocarpus Dewevrei *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 23, t. 5 [B. S. B. B. XXXVI², 69]; *Pl. Gilletianae, I* (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 19]; *Contr. fl. Cgo, II* (1900) 17 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 72.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 413). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.); la Lemba (Dew. 370, 841 a); Zenze. — Nom vern. : **Boto** (Ém. Laur.). — V : env. de Léopoldville (Dew. 524); rég. de Lukolela. — Nom vern. : **Mitoko** (Dew.); Kisantu. — Nom vern. : **M'Butu** (Gill. 41); Kimuenza (Gill. 2125); Tumba (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini; Noki (Ém. et M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.); Luozi (Lujá). — XV : Luebo (Ém. Laur.); Bukila (M. Laur.).

PLATYSEPALUM Welw.

***Platysepalum cuspidatum* Taub.** in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 187.

1881 (P. Pogge). — XV : Samba à l'O. du Lualaba, 4° 15 (Pg. 766)

***Platysepalum ferrugineum* Taub.** in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 186.

1881 (P. Pogge). — XV : bords du Lualaba vers 4° 15 (Pg. 799).

***Platysepalum hypoleucum* Taub.** in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 186.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 816); village Kalebue, 5° 45 (Pg. 863).

***Platysepalum Poggei* Taub.** in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 185; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 149.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 868, 901); Lubefu (Lescr. 367).

***Platysepalum Vanhouttei* De Wild.** *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 260.

1903 (Aug. Van Houtte). — V : rég. de Kisantu (Van Houtte in Gill. 3660).

***Platysepalum violaceum* Welw.** ex *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr. II* (1871) 131; *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 10, t. 6 et II (1898) 4 [B. S. B. B. XXXVI², 56 et XXXVII, 47]; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 230; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 63; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 110 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 149.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 413). — V : Léopoldville (Pyn. 157); Lukolela (Dew. 841). — VIII : Coquilhatville (Ém. Laur.); Wangata (Dew. 670); Lulanga : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala. — Nom vern. : **Moloko** (Dew. 864 a). — X : Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Bomaneh (M. Laur.). — XV : Limbutu (M. Laur.).

DEWEVREA M. Micheli.

Dewevrea bilabiata *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49]; Ill. fl. Cgo (1898) 3, t. 2; Reliq. Dewevr. (1901) 62; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 148.

1894 (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1687). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew. 1163); Stanley-Falls (Ém. Laur.).

SESBANIA Pers.

Sesbania aegyptiaca [*Poir.*] *Pers.* Syn. pl. II (1807) 316; *DC.* Prodr. II (1825) 264; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 134; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 213; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 12, 29 [B. S. B. B. XXXVI², 58]; Contr. fl. Cgo, II (1900) 15 et Reliq. Dewevr. (1901) 63; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 141, (1906) 262; II (1907) 149 et Miss. Laurent (1905) 111.

Sesban aegypticus *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) 128; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 231.

Emerus Sesban *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 180.

1888 (Fr. Hens). — II : Sisia (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (M. Laur.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Léopoldville (Dew.); en amont de Kinshassa (Camp); env. de Kisantu (Gill.). — VII : bords de la Fini (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Duch.). — XV : env. de Lusambo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. non cl. : Mont Angba (Ser.).

Sesbania affinis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 141 et Miss. Laurent (1905) 112.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2626); Bokala (Ém. et M. Laur.).

Sesbania pubescens *DC.* Prodr. II (1825) 266; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 135; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 213; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49] et Reliq. Dewevr. (1901) 63; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 263.

Sesban — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 231.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill. 3167); Banana (Dew.). — II : Boma (Dew. 60, 70).

Sesbania punctata *DC.* Prodr. II (1825) 265; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 133; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 213; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 107; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I

(1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 15]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 263; II (1907) 149.

Sesban punctatus *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 230.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — II : Sisia (Dup.). — V : Léopoldville (M. Laur.); Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3047); Dembo; Kisantu (Gill. 552).

CYCLOCARPA Afzel.

Cyclocarpa stellaris *Afzel.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 151 in nota; *Urban* in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, III (1884) 247 et ex *Taub.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 3 (1894) 320, fig. 112 M.; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 107; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 15]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 141, 263.

1883 (E. Teusz). — IV : Luvituku (Luja, 154). — V : le Stanley-Pool (Teusz); Dolo (Schlt.); Kimuenza (Gill. 2121); Kisantu (Gill. 340, 513, 526).

ORMOCARPUM P. Beauv.

Ormocarpum affine *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 197.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Boka** (Verd. 537).

Ormocarpum sennoides *DC.* Prodr. II (1825) 315; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 143; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 15]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 113 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 150.

O. sesamoides [err. cal.] *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVII, 49] et Reliq. Dewevr. (1901) 64.

Diphaca cochinchinensis *Lour.* Fl. Cochinch. (1790) 454; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 233.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Lukolela [cult. dans les villages] (Pyn.); Kisantu (Gill.). — VIII : Irebu (M. Laur.). — XI : Yambuli (Em. et M. Laur.).

HERMINIERA Guill. et Perr.

Herminiera Elaphroxylon *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 201, t. 51; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II 144; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 107; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 233; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 19; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 51 et Miss. Laurent (1905) 113.

Aeschynomene — *Taub.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 3 (1894) 319; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 30 [B. S. B. B. XXXVI², 76]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 144.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool : Léopoldville (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Lukolela (Pyn.). — IX : Bangala (Ém. Laur.); Lisala (Ém. et M. Laur.). — XIII d : entre Nyangwe et Kasongo (Ém. et M. Laur.). — XV : Lubue [Kasai] (Gent.). — XVI : bords du Lac Moero. — Nom vern. : **Machila-Ambacha** (Verd.).

AESCHYNOMENE L.

Aeschynomene aspera L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 713; *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 147; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 234; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 113.

1903 (Ém. et M. Laurent). — XV : îlots du Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Aeschynomene brachycarpa Harms in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 292 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12524).

Aeschynomene Butayei De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1904) 143.

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2236).

Aeschynomene Dewevrei De Wild. et *Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 64.

1905 (Marc. Laurent). — V : Dolo (M. Laur. 473).

Aeschynomene Gilletii De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1904) 143.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2676).

Aeschynomene glandulosa De Wild. *Étud. fl. Kat.* (1903) 142.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Aeschynomene indica L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 713; *DC. Prodr.* II, 320; *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 147 et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* II, 151; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 234; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I* (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 15].

A. sensitiva P. Beauv. [non Sw.] *Fl. d'Oware I* (1804) 89, t. 53.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Aeschynomene katangensis De Wild. *Étud. fl. Kat.* (1903) 188.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 229).

Aeschynomene lateritia Harms in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 292; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1904) 144; II (1907) 150.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Kimuenza et de Kisantu (Gill. 2190, 2340); Boko (Pyn. 111).

Aeschynomene Schimperii *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 202; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 146; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 214; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 52.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Dichila** (Verd.).

Aeschynomene Schlechteri *Harms* in *Schlechter* West-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 293 [nom. tant.]

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12491).

Aeschynomene sensitiva *Sw.* Prodr. veget. Ind. occ. (1788) 107 et Fl. Ind. occ. III (1806) 1276; *DC.* Prodr. II, 147; *Benth.* in *Mart.* Fl. Brasil. XV', 58; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 147; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 107; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 144 et *Miss. Laurent* (1905) 113.

1888 (Fr. Hens). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : chute de Tamo (Hens); Dolo (Schlt.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.).

Aeschynomene uniflora *E. Mey.* Comm. fl. Afr. austr. I (1835) 123; *Harv.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. II, 226; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 146; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 64 et Pl. Gilletianæ, I (1900) 15 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 15].

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

SMITHIA Ait.

Smithia Harmsiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 52.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kalemdu** (Verd. 620).

Smithia strobilantha *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 154; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 108; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 52.

Damapana — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 179; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 237.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : bords du Lac Moero (Verd.); le Katanga (Corn.).

Smithia uguenensis *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 215; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 12 [B. S. B. B. XXXVI², 58].

1893 (P. Dupuis). — II a : entre Bingila et Ki-Mpanana (Dup.).

GEISSASPIS Wight et Arn.

Geissaspis bifoliolata *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 12 [B. S. B. B. XXXVI², 58].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb. 74).

Geissaspis Descampsii *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 13 [B. S. B. B. XXXIX², 65].

1891 (G. Descamps). — XV : rég. des Samba (Desc.).

STYLOSANTHES Sw.

Stylosanthes erecta *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 28, t. 77; *DC.* Prodr. II, 317; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 204; *Vogel* in *Linnaea*, XII (1838) 68; *Baill.* in *Adansonia*, VI, 224; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 156; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 238, *Taub.* in *Verhandl. bot. Ver. Prov. Brandenb.* XXXII (1890) 23; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 108; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 63; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 263.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.); Banana (Dew. 56).

ARACHIS L.

Arachis hypogaea *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 741; *DC.* Prod. II, 474; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 158; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 138; *Benth.* in *Mart.* Fl. Bras. XV¹, 86, t. 23; *Bentl. et Trim.* Medic. Pl. I, t. 75; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 108; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 239; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 397-481.

1893 (Ém. Laurent). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Ifuta (Ém. et M. Laur.). — Espèce cultivée au Congo (Ém. Laur.).

ZORNIA Gmel.

Zornia diphylla *Pers.* Syn. pl. II (1807) 318; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 301; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 158; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 239 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 65; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 263.

Z. glochidiata *Rchb.* ex *DC.* Prodr. II (1825) 316.

Z. gracilis *DC.* l. c. II (1825) 316.

Z. angustifolia *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 203; *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I, 43.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.).

DROOGMANSIA De Wild.

Droogmansia megalantha [*Taub.*] *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 56.

Desmodium — *Taub.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1896) 192.

Meibomia — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 243.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Obs. — La plante du Katanga appartient à une forme que M. De Wildeman [l. c.] a appelée *longipedicellata*.

Droogmansia pteropus [Bak.] *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 54.

Dolichos — Bak. in Kew Bull. (1895) 66.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 199).

Droogmansia Stuhlmannii [Taub.] *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 55.

Desmodium — Taub. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 217.

Meibomia — *Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1896) 244 in obs.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Pweto (Verd.).

DESMODIUM Desv.

Desmodium adscendens DC. Prodr. II (1825) 332; Bak. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 162; Taub. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 216; M. Micheli in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 13 [B. S. B. B. XXXVI², 59]; *De Wild.* Miss. Laurent. (1905) 114.

Meibomia — O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 195; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 241.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala — Nom vern. : Ebake (M. Laur.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Desmodium barbatum Benth. et Oerst. in Kjob. Vidensk. Meddel. (1853) 18; Wall. Cat. n. 5724; Taub. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 216; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 144.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 2018).

Desmodium dimorphum Welw. ex Bak. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 161; *De Wild.* et *Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 16 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 16]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 144.

1903 (Gust. De Brouwer). — V : Sanda (De Brouw.); Kisantu (Gill.).

Desmodium gangeticum DC. Prodr. II (1825) 327; Bak. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 161; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 30 [B. S. B. B. XXXVI², 7]; Taub. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 216; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 118-119.

Meibomia — O. Kuntze Rev. Génér. (1891) 196; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 240.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 505). — V : Kisantu (Gill.).

Desmodium hirtum Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. (1833) 209; Bak. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 163; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo*, (1896) 109.

D. setigerum E. Mey. Comm. pl. Afr. austr. (1843) 124; Harv. in *Harv. et Sond. Fl. Capens.* II, 229.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Hens, 360).

Desmodium lasiocarpum DC. Prodr. II (1825) 328; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 207; *Bak. in Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 162; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 109; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 18; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 241; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 145, (1906) 263; II (1907) 150.

Meibomia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 241; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 241.

D. latifolium DC. l. c. II (1825) 327; *Bak. in Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 168.

Hedysarum deltoideum *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 361.

Anarthrosyne cordata *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 39, t. 7.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.); Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); Benza-Masola (Ém. Laur.); la Lemba (Dew.). — III : env. de Matadi (Ém. Laur.). — IV : Lutete (Hens); Luvituku (Dem.); Kitobola (Dem.). — V : Dolo (M. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.); Kisantu (Gill.); Lula-Lumene (Hendr.); env. de Tumba (Ém. Laur.); Sanda (Odd.). — IX : Upoto; Boyangi (Thonn.); Luozi (Luja). — XII a et b : entre Bima et Bambili (Ser.). — XIV : Ruzizi-Kivu; Luebo. — Nom vern. : **Mutesa** (Leser.). — XV : Mukundji (Ém. Laur.); Dibebe (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kindana** (Verd.). — Ind. non cl. : Kibaka [Angola?] (Buett.); brousse près du Lomami (Ém. Laur.).

Desmodium mauritianum DC. Prodr. II (1825) 334; *Bak. in Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 162; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 109; *Taub. in Engl.* Pfl. Ost-Afr. 216; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 65; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145, (1906) 264; II (1907) 151 et *Miss. Laurent* (1905) 114.

Meibomia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 198; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 242.

Hedysarum fruticosum *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 363.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens). — II : Boma (Schimp.). — II a : Bingila (Dup.); plateau au S. de la Lukula (Cabra). — III : la Lufu (Hens). — IV : Madiata (Van Houtte). — V : Dolo (M. Laur.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.); Bulebu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **Bosasa** (M. Laur.). — IX : Mobeka (Ém. et M. Laur.). — XII : entre Amadis et Surango (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.); — Noms vern. : **Mwandandone** [Ikwangula]; **Yambonkolo** [Bakusu]; **Gomvonboza** [Tanganika].

Desmodium paleaceum *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1833) 209; *Bak. in Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 166; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXX]; *Taub. in Engl.* Pfl. Ost-Afr. 217; *Th. Dur. et De Wild.* Reliq. Dewevr. (1901) 66; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 52; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145 et *Miss. Laurent* (1905) 114.

Meibomia — *O. Kuntze* [non *Kurz*] Rev. Gener. (1891) 198.

D. oxybracteam DC. Prodr. II (1825) 334.

Meibomia — *O. Kuntze* l. c. (1891) 198; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 242.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.). — IX : Bolombo; en aval de Bumba (Ém. et M. Laur.); env. de Lie (Ém. et M. Laur.). — XVI : bords du Lukafu dans les env. de Lukafu (Verd.). — XIV : Mazanze (Dew.). — Noms vern. : **Sonnda** [distr. des Cataractes] (Dew.).

Desmodium polygonoides *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 161; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 13 [B. S. B. B. XXXVI², 59].

Meibomia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 240; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 240. 1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Desmodium tenuiflorum *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 13 [B. S. B. B. XXXVI², 59]; Ill. fl. Cgo (1899) 119, t. 60; Pl. Thonnerianae (1900) 18 et Pl. Gilletianae, I (1900) 16 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I. 16]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 264.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens, 340); rég. de Kisantu (Gill. 813, 3609). — IX a : Mundumba (Thonn. 83).

Desmodium triflorum [*L.*] *DC.* Prodr. II (1825) 334; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I, t. 291 et 292; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 110; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 217; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 15; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145, (1906) 264.

Hedysarum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 749.

H. granulatum *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 362.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Mont Léopold [Stanley-Pool] (Luja); le Stanley-Pool (Hens); env. de Lemfu et de Kisantu (But.); entre Kisantu et Popokabaka (But.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.).

PSEUDARTHRIA *Wight et Arn.*

Pseudarthria confertiflora *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 167; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145.

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Gill.). — XV : Mukenge (Pg.).

Pseudarthria Hookeri *Wight et Arn.* Prodr. fl. Ind. or. (1834) 209; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 168; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 217; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 14 [B. S. B. B. XXXVI², 60]; Pl. Gilletianae, I (1900) 16; Pl. Thonnerianae (1901) 19 et Reliq. Dewevr. (1901) 66; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 145, 264 et Miss. Laurent (1905) 115.

Desmodium lasiocarpum *De Wild.* [non *DC.*] Étud. fl. Kat. (1902) 53.

1891 (F. Demeuse). — IV : Kitobola (Pyn.); Luvituku (Dem.). — V : Dolo (M. Laur.); Kisantu (Gill.); Lula-Lumene; entre Kisantu et le Kwango (But.). — IX : env. de Yaminga (Pyn.); Yangula près Dobo (Thonn.); env. de Bumba (Ser.). — XIII d : Kasongo (Dew.); env. de Kabanga (Dew.). — XIV : Kalembalamba. — Nom vern. : **Kibaka** (Ser.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.); env. de Tshitadi (Lescr.).

URARIA Desv.

Uraria picta [Jacq.] Desv. Journ. de Bot. I (1813) 123, t. 5, fig. 19; DC. Prodr. II, 324; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 169; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 110; Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 217; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 245; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 66; De Wild. Miss. Laurent (1905) 115.

Hedysarum — Jacq. Icon. pl. rar. III (1786-93) t. 567 et Collect. bot. II, 260.

1884 (R. Buettner). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Boma (Dew.); Malela (Ém. Laur.). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba (Cabra). — III : Tondoa (Buett.); Matadi (Dem.). — IV : Banza-Manteka (Hens). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kwamouth (Ém. Laur.); Dolo (Schlt.); env. de Sanda (Odd.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — IX : Umangi (Ém. Duch.); Luozi (Luja). — XII a et c : entre Bima et Amadis. — XII b : Bambili (Ser.). — Ind. non cl. : Lusubi (Leser.).

ALYSICARPUS Neck.

Alysicarpus rugosus DC. Prodr. II (1825) 353; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 171; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 16 [B. Herb. Bois. Sér. 2, I, 16]; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 246.

Fabricia — O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 182; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 246.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu; entre Kisantu et Dembo (Gill.).

Alysicarpus vaginalis [L.] DC. Prodr. II (1825) 353; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 170; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 110; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 66; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 264; II (1907) 151.

Hedysarum — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 746.

II. nummularifolium — L. l. c. ed. 1 (1753) 746.

Fabricia — O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 181; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 246.

Alysicarpus Harnieri Schweinf. Reliq. Kotschyanae (1868) 24, t. 19.

1885 (R. Buettner). — I : Banana (Ém. Laur.). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — III : Tondoa (Buett.); Matadi (Ém. Laur.).

ABRUS L.

Abrus canescens Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 175; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 248; De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, I (1897) 14 [B. S. B. B. XXXVI², 60]; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 150; II (1907) 153.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — V : rives du Kasai (Luja); Kwamouth et env. (Biel.; M. Laur.); Sanda (De Brouw.); Kisantu (Gill.). — VIII : Éala (M. Laur.). — XII a et b : entre Bima et Bambili (Ser.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kampanda-panda** (Verd.).

Abrus precatorius *L.* Syst. veget. ed. 12 (1767) 472; *Descourtilz* Fl. des Antilles, IV, t. 275; *Lam.* Pl. bot. Encycl. t. 608; *DC.* Prodr. II, 381; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 212; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 175; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 111; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 247; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 104-105.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : distr. des Cataractes (Luja). — V : bords du Kasai (Luja). — VIII : Coquilhatville — Nom vern. : **Tensi** (Dew.); env. d'Eala (M. Laur.). — IX : en aval de Bumba (Luja).

Abrus pulchellus *Wall.* in *Thw.* Enum. pl. Zeyl. (1864) 91; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 175; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50].

1896 (A. Dewèvre). — V : Lemafu (But.); Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

— — var. **latifoliolatus** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 150, 267 ; II (1907) 153 et Miss. Laurent (1905) 168.

1900 (J. Gillet). — IV : Nord-Manyanga (Cabra-Michel). — V : Kisantu ; Kimuenza (Gill. 828, 924, 1904, 2113). — VIII : Irebu (Ém. Laur.). — IX : Bumba (Pyn. 40) ; Imese (Ém. et M. Laur.).

CLITORIA L.

Clitoria Ternatea *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 753; *DC.* Prodr. II, 223; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 177; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. I (1897) 14 [B. S. B. B. XXXVI², 60]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 67; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 248.

1891 (F. Demense). — Congo (Dem.). — II : Boma (Dew.; Wilw.).

EMINIA Taub.

Eminia Harmsiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 198.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Munkago** (Verd. 528).

GLYCINE L.

Glycine Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 150 ; II (1907) 154.

1900 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Pyn. 41). — V : Kisantu (Gill. 675).

Glycine holophylla *Taub.* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 199.

Eriosema — *Bak.* in Journ. of Bot. XXXIII (1895) 235.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 347).

Glycine javanica *L* Sp. pl. ed. 1 (1753) 754; *DC.* Prodr. II, 242; *Benth.* in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) 260; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 178 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 183; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 220; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 111; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 249; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 199; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 67; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 199 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 151; II (1907) 154.

G. micrantha *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 212.

G. mouliiformis *Hochst.* ex *A. Rich.* l. c. I (1847) 211.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); Kibinga; Bingila (Dup.). IV : Kitobola (Pyn.). — V : Kisantu (Gill.); Lukolela (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Muntangia** (Verd.); Albertville [Toa] (Desc.).

— — form. **glabrescens** *Buett.* in Mitth. Afr. Gezell. V (1889) 266; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 111.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett. 255).

Glycine kisantuensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 150 et 267 et Miss. Laurent (1905) 119.

1891 (F. Demeuse). — V : Chenal [Leo-Kwam.] (Ém. et M. Laur.); le Stanley-Pool (Dew. 150); Tumba (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill. 269).

ERYTHRINA L.

Erythrina abyssinica *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) 392; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I, 214, t. 41; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 184 in obs.; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221; *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 383.

E. tomentosa *R. Br.* in *Salt* Voy. to Abyss. Append. (1814) t. 65; *A. Rich.* l. c. 213; *Bak.* in *Oliv.* l. c. II, 184; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 268; II (1907) 155.

1894 (A. G. von Goetzen et von Prittwitz). — XII : l'Uele (Delp.). — XII c : Bomo-kandi (Ser. 564). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 923). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.). — XV : Lubefu (Lescr. 374). — Noms vern. : **Kelobo** [Kasongo]; **Kisongwo** [Tanganika]; **Elonneli** [Ikwangula] (Dew.).

Erythrina Droogmansiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 13 [B. S. B. B. XL, 19].

1898 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra, 74).

Erythrina Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, I (1904) 151.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 16, 106).

Erythrina huillensis *Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 183; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 250; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 154.*

1905 (Éd. Lesclauwaet). — XV : au S. de Tshitadi (Lescr. 321).

Erythrina Sereti *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 154.*

1906 (Fél. Seret). — XII c : partie E. de la rive du Bomcokandi (Ser. 564).

Erythrina suberifera *Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 183; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 748]; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 250; De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 59.*

1899 (Edg. Verdick). — V : entre Dembo et le Kwango (But.); Kisantu (Gill.). — XVI : Lukafu et env. — Nom vern. : **Kitjipi** ou **Kitjipitjipi** (Verd. 82. 270).

MUCUNA Adans. (1)

Mucuna flagellipes *Vogel ex Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 307; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 185; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 67 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17.] et Reliq. Dewevr. (1901) 67; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 268; II (1907) 153 et Miss. Laurent (1905) 118.*

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Katala (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Lescr.). — VIII : Coquilhatville (Pyn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XV : Butala (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Poces** [Kasai]; **Tunga** [Katala] (Dew.).

Mucuna pruriens [*Medic.*] *DC. Prodr. II (1825) 405; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 187; Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 221; M. Micheli in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnérianae (1900) 19; Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17]; Contr. fl. Cgo, II (1900) 16 et Reliq. Dewevr. (1901) 68; De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 135-36 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 153.*

Stizolobium — *Medic.* in Vorlese Churpf. Phys. Ges. II (1787) 399; *Hiern Cat. Welw. Pl. I, 251.*

1895 (A. Dewèvre). — II a : Katala. — Nom vern. : **Maucundra** (Dew.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : Kisantu (Gill.); Yumbi (M. Laur.). — VIII : Eala [introd. de l'Uele (M. Laur.). — IX a : Mombanza (Thonn.). — XII : rég. orient. (Ser.). — XV : Lubue (Luja).

(1) *Mucuna Poggei* *Taub. in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 194.*

1885 ? (L. Marqués). — Ind. non cl. : vers le fleuve Luatschini (Marq. 279).

Cette habitation est peut-être dans le Congo belge.

Mucuna urens *Medic.* in Vorles. Churpf. Phys. Ges. II (1787) 399; *DC.* Prodr. II, 405; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 185; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 68 et Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17].

Stizolobium — *Pers.* Syn. pl. II (1807) 297; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 250.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — XV : env. de Bena-Mulengere (Dew.). — Noms vern. : **Pece** [Bakusu; Kasongo]; **Lwaga** [Tanganika] (Dew.).

DIOCLEA H. B et K.

Dioclea reflexa *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 306; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 189; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 254; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 68; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 37, 155.

1896 (A. Dewèvre). — II a : entre Shimbanza et Mangwala (Cabra). — V : Léopoldville (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Bondo [Ikelemba] (Pyn.); Bokakata. — Nom vern. : **Msoko** (Dew.). — XIII a : Romée (Ém. Laur.). — XV : rives du Sankuru (Luja); Bamania (M. Laur.).

CANAVALIA Adans.

Canavalia incurva *Thou.* in *Desv.* Journ. de Bot. I (1813) 80; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 254; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 268 in syn.

C. ensiformis *DC.* Prodr. II (1825) 404; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 190; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155, (1906) 268; II, 155 et *Miss. Laurent* (1905) 119.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst). — III : Matadi (Sap.). — V : Kisantu et env. (Gill.); Lukolela (Ém. Laur.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.); Ikenge (Ém. Laur.). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — XII c : env. de Surango (Ser.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Mpasa** [Kwilu]; **Basesei**; **Basaka** [Bangala].

Canavalia obtusifolia [*Lam.*] *DC.* Prodr. II (1825) 404; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 190; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 68.

Dolichos — *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1789) 295.

C. maritima *Thou.* in *Desv.* Journ. de Bot. I (1813) 80; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 254.

D. obovatus *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 341.

D. ovalifolius *Schumach.* et *Thonn.* l. c. (1827) 341.

Canavalia emarginata *G. Don* Gard. Syst. Bot. II (1833) 362.

1895 (A. Dewèvre). — I : Banana (Dew.).

C. obtusifolia form. **macrophylla** *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 17].

1900 (J. Gillet) — V : Kisantu (Gill. 604).

PHYSOSTIGMA Balf.

Physostigma mesoponticum *Taub.* in Ber. deutsch. bot. Gesellsch. XII (1894) 81; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 61.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu et de Pweto (Verd.).

Physostigma venenosum *Balf.* in Trans. roy. Soc. Edinb. XXII (1861) 310; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 191; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 748]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 156.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Luana (Leser. 21).

PHASEOLUS L.

Phaseolus adenanthus *G. F. W. Mey.* Prim fl. Esseq. (1818) 239; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 192; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. B. 141; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 255; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155 et *Miss. Laurent* (1905) 121.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — X : Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Phaseolus lunatus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 724; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 192; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223, t. 24; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 56]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 255; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 68; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 268; II (1907) 156.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Limbutu (M. Laur.).

Obs. — A Eala [VIII] on en cultive une var. à graines blanches (Dew.).

Phaseolus Mungo *L.* Mant. pl. I (1767) 101; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 193; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 155.

1900 (R. Butaye). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Lemfu (But.).

* **Phaseolus vulgaris** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 723; *Nees* Pl. offic. Suppl. t. 15; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 193; *Taub.* in *Engl.*

Pfl. Ost-Afr. 223; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 255; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 122 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 268.

1903 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Iloko [Lac Tumba] [Ém. et M. Laur.]. — IX : Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.).

VIGNA Savi.

Vigna Afzelii *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 202; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 155.

1900 (J. Gillet). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3094); Kisantu (Gill. 341); Sanda (De Brouw.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel, 18).

Vigna ambacensis *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 201; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 258; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 155.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 959). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel.).

Vigna capitata *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 67.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga; Lukafu. — Nom vern. : **Kengwalala** (Verd. 431).

Vigna esculenta [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.].

Liebrechtsia — *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 74.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kafoi** (Verd. 109 b, 110).

Vigna gracilis *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 311; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 205; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXVI², 63]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 20.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — IX : Boyangi près Dobo (Thonn.).

Vigna hastifolia *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 200; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 155.

1903 (Xav. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3096).

Vigna katangensis [*De Wild.*] *Th.* et *Hél. Dur.* [non *De Wild.*].

Liebrechtsia — *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 72.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tjikundu-kundu** (Verd. 560).

Vigna Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 122.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Bulebu (Ém. et M. Laur.).

Vigna luteola *Benth.* in *Mart. Fl. Bras.* XV¹ (1859) 194, t. 50, fig. 2; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 205; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 223; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 123 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 269; II (1908) 256.

V. glabra *Savi* *Mem. Phaseol.* III (1825) 8; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 260; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 269.

1896 (Eug. Wilwerth). — VI : Dima (Leser. 7). — IX : Upoto (Wilw.). — XII c : entre Amadis et Surango (Ser.). — XV : Mukundji (Ém. Laur.).

— — var. **villosa** *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 69.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — V : Léopoldville (Schlt.): Kisanu (Gill.).

Vigna micrantha *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 311 et in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 294; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 155; II (1908) 256.

1882 (P. Pogge). — V : entre Dolo et Kinshassa (Schlt. 12592); Bolobo (M. Laur.); Kisanu; Kimuenza (Gill. 2145). — IX : env. de Bumba (Ser.). — XV : Mukenge (Pg. 811, 834).

Vigna pubigera *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 199; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXI², 63].

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

Vigna reticulata *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 310; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 198; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 112; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 223; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 256; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 69; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 156 (1906) 270; II (1908) 257.

1892 (Jul. Cornet). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Ém. Duch.: Lujà): Kwamouth (M. Laur.); Sanda (Odd.). — XVI : le Katanga (Corn.): Lukafu. — Nom vern. : **Komboi** (Verd.).

Vigna scabra [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.].

Liebrechtsia — *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 75.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 602).

Vigna sinensis [*L.*] *Endl. ex Hassk. Pl. Jav. rarior.* (1848) 386; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 386; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 223, t. 24; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 112; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 259; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 156 et *Miss. Laurent* (1905) 123.

Dolichos sinensis L. Cent. pl. II (1756) 28; DC. Prodr. II, 399.

D. Catjang L. Mant. pl. II (1771) 259.

Vigna — Walp. in Linnaea, XIII (1839) 533; A. Rich. Tent. fl. Abyss. I, 219; Bak. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. II, 205; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 259.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Inkongo (Ém. et M. Laur.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Vigna triloba Walp. in Linnaea, XIII (1839) 534; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 204; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXVI², 63]; Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 223; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 259; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 69; De Wild. Miss. Laurent (1905) 123 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 270.

1894 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — V : cult. en champs aux env. de Kimuenza (Dew.); env. de Lemfu (But.). — IX : Umangi (Krek.).

Vigna venulosa Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 203; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 156.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 814).

Vigna vexillata [L.] Benth. in Mart. Fl. Brasil. XV¹ (1859) 193, t. 50, fig. 1; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 199; Harv. in Harv. et Sond. Fl. Capens II, 240; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 112; Taub. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 223; M. Micheli in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXVI², 63]; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 156, (1906) 270 et Miss. Laurent (1905) 123.

Phaseolus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 724.

Plectrotropis hirsuta Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 338.

V. tuberosa A. Rich. Tent. fl. Abyss. I (1847) 217, t. 42.

V. capensis Walp. in Linnaea, XIII (1839) 533; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 257.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Zambi (Dup.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — IX : Upoto (Ém. et M. Laur.); Bangala (Hens).

VIGNOPSIS De Wild.

Vignopsis lukafuensis De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 69.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 401).

SPHENOSTYLIS E. Mey.

Sphenostylis angustifolia [Hook. f.] Sond. in Linnaea, XXIII (1850) 33; Harms in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 309.

Vigna angustifolia *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 311; *Benth.* ex *Harv.* et *Sond.* *Fl. Capens.* II (1861) 240; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 17 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17*]; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 155, (1906) 269.

V. vexillata *Benth.* var. — *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 200.

1890 (F. Demeuse). — II : Sisia (Dup.). — V : Kisantu (Dem.; Gill.).

Sphenostylis katangensis [*De Wild.*] *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 177 in obs.

Vigna — *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 67.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Malumboi** (Verd. 405).

Sphenostylis stenocarpa [*Hochst.*] *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 309.

Dolichos — *Hochst.* ex *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* I (1847) 224; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 213.

Vigna ornata *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 203; *Taub.* in *Engl. Pf. Ost-Afr.* 223; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 17 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17*]; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 258; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 156, (1906) 269; II (1908) 257 et *Miss. Laurent* (1905) 123.

1882? (P. Pogge). — IV : Tempo (Gill.). — V : env. de Léopoldville (Buett. 322; Gill.); Kisantu; Kimuenza (Gill.). — XII c : env. d'Amadis et de Surango (Ser.). — XV : Lusambo; Dibele (Em. et M. Laur.); route de Luebo à Luluabourg (Gent.); Mukenge (Pg. 779, 781); entre Luebo et Djoko-Punda (Lem.)

— — var. **latifoliolata** [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.].

V. ornata *Welw.* var. — *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 156, (1906) 270.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1124); rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3053).

ADENOLICHOS *Harms.*

Adenolichos grandifoliolatus *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 203.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 622).

Adenolichos Harmsianus *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 203.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 564).

Adenolichos punctatus [*M. Micheli*] *Harms* in *Engl. Bot. Jahrb.* XXXIII (1902) 180.

Vigna — *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 16 [*B. S. B. B. XXXVI*², 62] et *Ill. fl. Cgo* (1899) 91, t. 59.

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

VOANDZEIA Thou.

Voandzeia subterranea *Thou.* Gen. nov. Madag. (1806) 23; *DC.* Prodr. II, 207; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 254; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 207; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 115; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 223, t. 22; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 260; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 19; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 269 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 482-85.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : cult. dans les bassins du Lualaba et du Kasai (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Mangasa** [Ikwangula]; **Djokomaure** [Matam-Matam]; **Ibongo** [Kasai]; **Kazan** [Tanganika].

PACHYRHIZUS Rich.

Pachyrhizus bulbosus [*L.*] *Kurz* in Journ. As. Soc. Beng. XLV (1876) II, 246; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 115; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 121.

Dolichos -- *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) 1020.

P. angulatus *Rich.* ex *DC.* Prodr. II (1825) 402; *Benth.* in *Mart.* Fl. Brasil, XV¹, 199, t. 53; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 208 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 207; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 257.

Taeniocarpum articulatum *Desv.* in Annal. sc. nat. Sér. 1, IX (1826) 421.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo [cult. ?] (Ém. Laur.). — VIII : Eala [cult.] (M. Laur.); Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Katanga (Desc.).

PSOPHOCARPUS Neck.

Psophocarpus longepedunculatus *Hassk.* in Flora, XXV (1842) II, Beibl. 75 et Pl. Jav. rarior. (1848) 388; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 113; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 113; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 224, t. 24; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 17 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 17] et Reliq. Dewevr. (1901) 69; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 61; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158; (1908) 257 et Miss. Laurent (1905) 122.

Psophocarpus palustris *Desv.* in Annal. sc. nat. Sér. 1, IX (1826) 420.

Botor — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 163; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 261.

P. palmettorum *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 221.

Diesingia scandens *Endl.* Atakta bot. (1833) t. 1-2.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma. — Nom vern. : **Fumgatata** (Dew.). — V : entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur.). — X : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

OBS. — Dewèvre, dans ses notes, dit que cette espèce est répandue dans tout le domaine de la flore du Congo (Dew.).

DOLICHOS L.

- Dolichos biflorus** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 727; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 210; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 224; *Harms* in *Engl.* Jahrb. XXVI (1899) 31; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 263; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 158.
1882 (P. Pogge). — V : Kimuenza (Gill.) : Sanda (Odd.); env. de Lemfu (But.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — XV : Mukenge; Musumba (Pg.).
- Dolichos dubius** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 64.
1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Molundo-polo** (Verd. 178).
- Dolichos esculentus** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 64.
1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom. vern. : **Muku** (Verd. 370).
- Dolichos Gululu** *De Wild.* Etud. fl. Kat (1902) 65.
1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom. vern. : **Kisjima-wa-Gululu** (Verd. 236).
- Dolichos Hendrickxii** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 156, t. 39.
1903 (Xav. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3098).
- Dolichos Katali** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 157.
1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Katali-tali** (Verd. 437).
- Dolichos Lablab** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 725; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 210; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 224; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 262; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 7 [B. S. B. B. XXXVII, 50]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 70.
1895 (A. Dewèvre). — II : Plante cultivée un peu partout et formant de grands champs à Zambézi [II] (Dew.).
- Dolichos pseudopachyrhizus** *Harms* in *Engl.* Jahrb. XXVI (1899) 320; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 202.
1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kafulo** (Verd. 239, 271).
- Dolichos serpens** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 63.
1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 343).
- Dolichos splendens** *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 215; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 17 [B. S. B. B. XXXVI², 63].
1895 (G. Descamps). — XVI : Pala (Desc.).

Dolichos trinervis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 66.

1899 (Edg. Verdict). — XVI : brousse de Lukafu (Verd. 272).

Dolichos Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 63.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : le Katanga (Verd.).

CAJANUS DC.

Cajanus indicus *Spreng.* Syst. veget. III (1826) 248; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 216 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 217; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 115; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221, t. 24; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 119 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 155.

Cytisus *Cajan* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 739.

C. pseudo-Cajan *Jacq.* Hort. Vindob. II (1772) 54, t. 119.

C. guineensis *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 349.

C. bicolor *DC.* Prodr. II (1825) 496; Bot. Reg. (1845) t. 31.

Cajan indorum *Medic.* in Vorles. Churpfl. Phys. Gesellsch. II (1787) 363; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 266.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — II : Boma; Ponta da Lenha (Naum.); Zambé. — Nom vern. : **Wandu** (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.); Kimpesse (Ém. Laur.); Bolobo (M. Laur.). — IX : Bumba [cult.]. (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.).

DISTRIB. : Origine douteuse (Inde?); région tropicale du monde entier; cult. en grand.

RHYNCHOSIA Lour.

Rhynchosia affinis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 152.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lac Moero (Verd.).

Rhynchosia calycina *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 214; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 217; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 116.

Cyanospermum — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 218.

Dolicholus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 267.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B, 86).

Rhynchosia caribaea *DC.* Prodr. II (1825) 384; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 220; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mai. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51] et Reliq. Dewevr. (1901) 70.

Dolicholus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 267.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambé (Dew. 408).

Rhynchosia congensis *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 217; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 116; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 748].

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill. 1853).

— — var. **Gilletii** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 152.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2119).

Rhynchosia cyanosperma *Benth.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 218; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 60 et *Miss. Laurent* (1905) 119.

1900 (Edg. Verdick). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XVI : plateau du Katanga. — Nom vern. : **Mupakuma** : (Verd.) : Lukafu (Verd. 589).

Rhynchosia flavissima *Hochst.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 219; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 18 [B. S. B. B. XXXVI², 64].

1895 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Rhynchosia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 154.

1901 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Rhynchosia Mannii *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 217; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 116; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 25; Pl. Gilletianae, I (1900) 18 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 18] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 70; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 267; II (1907) 155 et *Miss. Laurent* (1905) 119.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens). — II a : Shinganga (Dew.). — V : Kisantu (Gill.) : Sanda (Odd.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX a : Mongo (Thonn.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XIII : Romée (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Lemboi-lo-Dianga** [lkwangula] (Dew.).

Rhynchosia Memnonia [*Delile*] *DC.* Prodr. II (1825) 386; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 253; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 220; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 116.

Glycine — *Delile* Fl. Aegypt. Illustr. (1813) 100, t. 38, fig. 3.

Dolicholus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 267.

1885 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett. 244).

Rhynchosia minima *DC.* Prodr. II (1825) 385; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 219; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 221; *De Wild.* et

Th. Dur. Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51] et Reliq. Dewevr. (1901) 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 120.

Dolicholus minimus *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 267.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew. 195). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.).

Rhynchosia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 199.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 550).

ERIOSEMA DC.

Eriosema affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 200.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Kundjialealeya**. (Verd. 97).

Eriosema cajanoïdes [*Guill. et Perr.*] *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 314; *Harv. et Sond.* Fl. Capens. II, 261; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 227; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 222; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 113; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 61; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 154, (1906) 268; II (1907) 156 et Miss. Laurent (1905) 120.

Rhynchosia — *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 215.

E. psoraleoides *G. Don* Gen. Syst. Bot. II (1832) 348; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 273.

1862 (R. Burton). — II : Boma (Schimp.). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel); Bingila (Dup.); bords de la Lukula (Cabra); Zenze (Ém. Laur.). — III : Tondoa (Buett.); Matadi (Ém. et M. Laur.). — III-IV : la Lufu (Hens). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.); Luvituku (Dem.). — V : Chenal (Ém. et M. Laur.); Dolo (M. Laur.); env. de Kwamouth (But.); Lukolela (Ém. et M. Laur.); Sanda (Cabra); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VI : env. de Dima (Lescr.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Luozi (Luja). — XII c : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XV : brousse des bords du Kasai (Ém. et M. Laur.) et du Lubi (Lescr.). — XVI : Pala; Toa (Desc.); Lukafu et dans toute la région (Verd.). — Nom vern. : **Mutumbu-Tumbu** (Verd.).

Eriosema Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 18 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 18].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Eriosema glomeratum [*Guill. et Perr.*] *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 313; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 228; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 113; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 222; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 273; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 120 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 269; II (1907) 156.

Rhynchosia — *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 216.

Glycine rufa *Schumach.* et *Thonn.* (non *H. B.* et *K.*) Beskr. Guin. Pl. (1827) 344.

Eriosema — *Baill.* (non *E. Mey.*) in *Adansonia*, VI (1866) 226.

. 1862 (R. Burton). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : Kibinga; Bingila (Dup.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Léopoldville; Dolo (Schlt.); Kinshassa (Hens 297); env. de Bokala (Ém. et M. Laur.); env. de Kwamouth (But.); env. de Kisantu (Gill.); Tumba (Ém. Laur.). — VIII : la Fini (Ém. Laur.); Banga (Ém. et M. Laur.). — XV : Lusambo (Desc.).

E. glomeratum var. **elongatum** *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 229; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 114.

E. elongatum *Baill.* in *Adansonia*, VI (1866) 227.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo bor. (Ém. Laur. 65). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett. 236).

— — form. **microphyllum** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 154.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

Eriosema griseum *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 228; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 272; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51]; Pl. Gilletianae, I (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 19] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 70.

1895 (A. Dewèvre). — II a : brousse de Zobe (Dew. 251). — V : Kisantu (Gill. 175).

Eriosema Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 120.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IV : Songololo (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Yumbi; Sabuka (Ém. et M. Laur.). — XV : en amont de Butala (Ém. et M. Laur.).

Eriosema parviflorum *E. Mey.* *Comm. pl. Afr. austr.* (1835) 130; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 225; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 222; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 154, (1906) 269.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu; entre Kisantu et Dembo (Gill. 1338, 1524, 3447, 3529).

Eriosema pulcherrimum *Taub.* in *Engl.* et *Prantl* *Nat. Pflanzenfam.* III, 3 (1894) 375; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 154, (1906) 269; II (1907) 150 et *Miss. Laurent* (1905) 121.

1893 (G. Descamps). — IV : env. de Kitobola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 50); Kisantu-Makela (Van Houtte in Gill. 3442). — XII c : Surango (Ser. 388). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Eriosema sericeum *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 226; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 19].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 577, 958).

Eriosema tuberosum *Hochst.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 227; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 224; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 18 [B. S. B. B. XXXVI², 64].

1891? (G. Descamps). — XVI : Pala (Desc.).

Eriosema Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 201.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lofoi (Verd.).

DALBERGIA L.

Dalbergia ealaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 151.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 837). — XI : Bomaneh (M. Laur 1831).

Dalbergia florifera *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 146.

1900 (R. Butaye). — V : Dembo (Gill.); entre Dembo et le Kwango (But.).

— — var. **obscura** *De Wild.* l. c. (1904) 146.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1701).

Dalbergia Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 147.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2853).

Dalbergia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 265.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2084).

Dalbergia glaucescens *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 147.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1702).

Dalbergia Harmsiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 194.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga. — Nom vern. : **Tjucja** (Verd. 102).

Dalbergia isangiensis *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 116.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.).

Dalbergia kisantuensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 748]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 148.

1900 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2598); Kisantu (Gill. 544).

Dalbergia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 116 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 152.

1903 (Marc. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 198). — VIII : Eala (M. Laur. 177, 778).

Dalbergia laxiflora *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 19, t. 4 et II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVI², 65 et XXXVII, 51]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 117 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 152.

1895 (A. Dewèvre). — V : entre Lukolela et Gombi (Dew. 550); en aval de Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1649); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); Équateurville [Wangata] (Ém. Laur.).

Dalbergia luluensis *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 294.

1883 (P. Pogge). — XV : la Lulua vers 6° 5 (Pg. 876).

Dalbergia macrosperma *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 235.

Amerimnon — *O. Kuntze.* Rev. Gener. (1891) 159; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 276.

1883 (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

— — var. **longipedicellata** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 265.

1903 (Ad. Odden). — V : env. de Sanda (Odd. in Gill. 3313).

Dalbergia medicinalis *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 194.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Tjabilonda**; **Lupipi** (Verd. 22, 585).

Dalbergia Micheliana *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 146, (1906) 266; II (1907) 153 et Miss. Laurent (1905) 115.

1896 (A. Dewèvre). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Sanda (Gill. 3615; Odd. in Gill. 3708). — VIII : Coquilhatville (Dew. 656).

Dalbergia saxatilis *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 314; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Af.* II, 233; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51] et Reliq. Dewevr. (1901) 71; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 152.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1647); Yambuya (M. Laur. 1646).

ECASTAPHYLLUM P. Browne.

Ecastaphyllum Brownei [*Jacq.*] *Pers.* Syn. pl. II (1807) 277; *DC.* Prodr. II, 420; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. 232; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 236; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 114; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 264, II (1907) 151 et *Miss. Laurent* (1905) 117.

Hecastaphyllum — *Benth.* in *Mart.* Fl. Brasil. XV² (1862) 228.

Pterocarpus Ecastaphyllum *L.* (ubi?) fide *Auct.*; *Svensk Acad.* (1769) t. 4; *Descourtilz* Fl. des Antilles, IV, t. 258.

Amerimnon — *Jacq.* Enum. pl. Carib. (1760) 27; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 275.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — V : Bolobo; Lukolela Bulebu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Ecastaphyllum Monetaria *Pers.* Syn. pl. II (1807) 277; *DC.* Prodr. II (1825) 421; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 236; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51] et *Reliq. De wevr.* (1901) 71; *De Wild.*, *Miss. Laurent* (1905) 117.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata]. — Noms vern. : **Bombombolu**; **Vombola** (Dew.). — IX : Umangi (Krek.).

Ecastaphyllum pachycarpum *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 77 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 749].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 490, 1097, 1231).

DREPANOCARPUS G. F. W. Mey.

Drepanocarpus lunatus [*L. f.*] *G. F. W. Mey.* Prim. fl. Essequib. (1818) 238; *DC.* Prodr. II, 420; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. 237; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 237; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 117; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 277; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 266.

Pterocarpus — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 317.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.).

PTEROCARPUS L.

Pterocarpus Cabrae *De Wild.* in La Belg. colon. (1902) 193 et in *Rev. cult. colon.* (1902) 43; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 48 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1904) 349-350.

1899 (H. Tilmann). — II a : le Mayumbe (Tilm. in Cabra, 50). — Noms vern. : **N'Kula**; **N'Gula** ou **Gula** (Tilm.).

Pterocarpus Dekindtianus *Harms* in Engl. Jahrb. XXX (1901) 89;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 148, (1906) 266.

P. erinaceus *Auct.* [non *Poir.*] *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 117;
De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, II (1901) 78 [B. Herb. Boiss. Sér.
2, I, 750]; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 57.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Gill. 2299). — V : Boko [Kinanga] (But. in
Gill. 3348); env. de Lemfu (But.). — VI : le Kwango (Buett.); env. de Tumba-Mani
(Cabra-Michel, 55). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Mulembo** (Verd. 83,
497).

Pterocarpus grandiflorus *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.*
Mat. fl. Cgo, I (1897) 99 [B. S. B. B. XXXVI³, 65] et in *Ill. fl. Cgo*
(1901) 137, t. 79.

1896 (Ém. Laurent). — XIII a : les Stanley-Falls (Ém. Laur.).

Pterocarpus Mutondo *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 57.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutondo** (Verd. 16, 557).

Pterocarpus odoratus *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 58.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mubalakula** (Verd. 428,
493).

Pterocarpus tinctorius *Welw.* *Apont. phyto-geogr.* (1859) 584;
Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 239; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 277;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 48; II (1907) 152.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3752).

OSTRYOCARPUS Hook. f.

Ostryocarpus parvifolius *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.*
Mat. fl. Cgo, I (1897) 21 [B. S. B. B. XXXVI², 67] et *Reliq. De-*
wevr. (1901) 71.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata]. — Nom vern. : **Botoko**
(Dew. 640).

LONCHOCARPUS H. B. et K.

Lonchocarpus affinis *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 196.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mwofi** (Verd. 115).

Lonchocarpus Barteri *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* IV (suppl.) (1860)
99; *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 243; *Th. Dur. et Schinz Étud.*
fl. Cgo (1896) 117; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 30;
II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVI², 176; XXXVII, 51]; *De Wild. et*

Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 19];
De Wild. Miss. Laurent (1905) 117.

L. Heudelotianus *Baill.* in *Adansonia*, VI (1866) 222.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill. 219). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Luima (Dem.).

Lonchocarpus comosus *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 23 [B. S. B. B. XXXVI², 69]; Reliq. Dewevr. (1901) 72 et Ill. fl. Cgo (1902) 183, t. 92.

1895 (A. Dewèvre). — II a : la Lemba (Dew. 362). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew. 1166).

Lonchocarpus dubius *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 196.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kibimbia** (Verd. 62).

Lonchocarpus Eetveldeanus *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 21 [B. S. B. B. XXXVI², 67] et Ill. fl. Cgo (1898) 17, t. 9; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 267.

1895 (Ém. Laurent). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — V : env. de Dembo (Gill.).

Lonchocarpus katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 195.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mukutu** (Verd. 49).

Lonchocarpus Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 117.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Lonchocarpus sericeus [*Poir.*] *H. B.* et *K.* Nov. gen. et sp. VI (1823) 383; *DC.* Prodr. II, 260; *Benth.* in Journ. Linn. Soc. IV (suppl.) (1860) 88; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 241; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 117.

Robinia — *Poir.* Encycl. méth. Bot. VI (1804) 226.

R. violacea *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 28, t. 76.

R. argentiflora *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 352.

1862 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — III : Tondoa (Buett.).

Lonchocarpus ? subulidentatus *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 53; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 118.

1884 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett. 454).

Lonchocarpus Teuszii *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 51; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 8 [B. S. B. B. XXXVII, 51] Pl. Gilletianae, I (1900) 19 et Reliq. Dewevr. (1901) 73.

1898 (A. Dewèvre). — IV : Lukungu. — Nom vern. : **Fontu** (Dew. 468). — V : Kisantu (Gill. 292, 605); — XV : le Kasai (Luja).

DERRIS Lour.

Derris brachyptera *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 246; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 73; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 149, (1906) 267; II (1907) 153.

Deguelia — *Taub.* in Bot. Centralbl. XLVII (1891) 386; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 183.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 3603); entre Kisantu et Popokabaka (But. in Gill. 2307). — VIII : Eala (M. Laur. 792); Équateurville [Wangata] (Dew. 668); Mondjo (Pyn. 314).

Derris congolensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 149, t. 38, (1906) 267; II (1907) 152.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.; Odd. in Gill. 625). — V : env. de Kisantu (Gill. 3646).

Derris nobilis *Welw.* ex *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 245; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 149.

Deguelia — *Taub.* in Bot. Centralbl. XLVII (1891) 387.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1631).

DALHOUSIEA Wall.

Dalhousiea africana *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 2; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 284; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1900) 78 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 750]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 131; II (1907) 145 et *Miss. Laurent* (1905) 106.

D. bracteata *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 247.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza (Gill.); entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill.); Madibi (Lescr.). — VIII : Coquillatville (Dew.; Pyn.); Eala (M. Laur.). — IX : Dobo (Pyn.); Umangi (Krek.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Lusambo; Butala (Ém. et M. Laur.); Kondue (Lederm.).

BAPHIA Afz. (4)

Baphia acuminata *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 104.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : en aval de Basoko (Ém. Laur.). — XIII a : Wanie-Rukula (Ém. Laur.).

(1) **Baphia aurivellerea** *Taub.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 174.

1882? (P. Pogge). — XV? : entre Kimbundo et le Kwango vers 10° (Pg. 535).

Baphia angolensis *Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 249; M. Micheli in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52]; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 74; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 285; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 143.*

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.; Pyn. 200); Kinshassa (M. Laur. 492). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 273 b). — VIII : env. d'Équateurville [Wangata]. — Nom vern. : **Bokongo-Bomponpono** (Dew.); Coquilhatville (Pyn. 292); Eala (M. Laur. 842). — XI : Barumbu (M. Laur. 167); Mogandjo (M. Laur. 1669). Yambuya (M. Laur. 1668). — XV : Mokole [Lubi] (Lescr. 186); Djoko-Punda (Lescr. 288).

Baphia chrysophylla *Taub. in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 175.*

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 798, 802, 852, 896, 898).

Baphia compacta *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 144.*

1906 (L. Pynaert). — V : Lukolela (Pyn. 157).

Baphia congolensis *Welw. ex Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 249; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 285; De Wild. Miss. Laurent (1905) 105.*

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : Chenal ; Bolobo ; Tumba (Ém. et M. Laur.). — XV : Bombaie (Ém. Laur.).

Baphia crassifolia *Harms ex De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 131.*

1902 (L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — XV : Loange [Kasai-Lualaba] (Gent. 28).

Baphia densiflora *Harms in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 280.*

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 819).

Baphia Laurentii *De Wild. Miss. Laurent (1905) 105.*

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur. 40).

Baphia Lescrauwaetii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 143.*

1905 (Éd. Lescrauwaet). — XV : Pania-Mutambo (Lescr. 386).

Baphia nitida *Lodd. Bot. Cab. IV (1819) t. 367; DC. Prodr. II, 424; Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 249; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 118.*

Podalyria Haematoxyton *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 202.*
Baphia — *Hook. f. in Hook. Niger Fl. (1849) 324.*

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Baphia pubescens *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 250; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 250; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 118; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 17 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 74; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 255; II (1907) 143.

B. laurifolia *Baill.* in *Adansonia*, VI (1866) 213.

1863 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Bolobo (Dew.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); rég. de Luanu (Lescr.). — IX : Luozi (Luja). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Baphia Pynaertii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 143.

1906 (L. Pynaert). — VIII : env. d'Eala (Pyn. 239).

Baphia racemosa *Hochst.* in *Flora*, XXIV (1841) II, 638; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 248; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 9 [B. S. B. XXXVII², 52]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 74.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : forêts au-dessus d'Elungu près de la Kusuku (Dew. 1061 a).

Baphia Schweinfurthii *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 175.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d ? : env. de Kubbi [riv. droite du Kibali] (Schw. 3551). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

Baphia spathacea *Hook f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 320; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 250; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 118; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 144.

1888 (Fr. Hens). — V : Lukolela (Ém. Laur.). — VIII : Irebu (M. Laur. 631); Bombimba (Pyn. 322). — IX : Bangala (Hens). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

— — var. **scandens** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1907) 144.

1905 (L. Pynaert). — XI : Yambuya (Pyn. 58).

Baphia Vermeuleni *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 255, t. 51.

1903 (Aug. Vermeulen). — V : env. de Sanda (Verm. in Gill. 3409, 3432).

ANGYLOCALYX Taub.

Angylocalyx ramiflorus *Taub.* in *Engl. Jahrb.* XXVII (1897) 172; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 9 [B. S. B. XXXVII, 52]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 74.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata (Dew. 801). — XI : Lokandu (Dew. 1134 e).

Angylocalyx Schumannianus *Harms* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV* (1897) 199 et in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 278; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 131.

1903 (Ad. Odden). — V : le Stanley-Pool (Camp); Sanda (Odd.).

Angylocalyx Vermeuleni *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 251, t. 55; II (1907) 141.

1903 (Ad. Odden et Aug. Vermeulen). — V : Sanda (Odd. et Verm. in Gill. 3434, 3575). — XV : env. de Limbutu (M. Laur. 1801).

ORMOSIA Jack.

Ormosia Brasseuriana *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 183.

O. angolensis *De Wild.* [non *Bak.*] *Étud. fl. Kat.* (1902) 50.

1899 (Edg. Verdick). — XV : env. de Lukafu. — Noms vern. : **Mulanga** : **Mubanga** (Verd. 38, 180, 197).

CAMOENSIA Welw.

Camoensia Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 103.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Camoensia maxima *Welw. ex Benth.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1866) 302, t. 36; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 252; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 119; *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1898) t. 7572; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 254; II (1907) 142.

Gigantemum scandens *Welw.* *Apont. phyto-geogr.* (1859) 585; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 285.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Sanda (Odd.). — IX : Bangala (Dup.); Upoto (Wilw.); Luozi (Luja). — XV : Pangu (Ém. Laur.).

SWARTZIA Schreb.

Swartzia madagascariensis *Desv.* in *Annal. sci. nat. Sér. 1*, IX (1826) 424; *Bak.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 257; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 183.

Tourneatea — *Taub.* in *Bot. Centralbl.* XLVII (1891) 792; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 286.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **N'Dale** (Verd. 77, 233, 295).

CAESALPINIEAE

PELTOPHORUM Vogel.

Peltophorum africanum *Sondl.* in *Linnaea*, XXIII (1859) 35; *Oliv* Fl. trop. Afr. II, 260; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 287; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 102.

Brasilettia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1901) 164.

1903 (Ém. et Marc. Laurent. — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

MEZONEURON Desf.

Mezoneuron angolense *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 261; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 287; *M. Micheli* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 74.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

CAESALPINIA L.

Caesalpinia Bonducella *Fleming* in *Asiat. Res.* XI (1810) 159; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 262; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 289; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 202; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 254.

1900 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.).

Caesalpinia pulcherrima [*L.*] *Sw.* *Observ. bot.* (1791) 166; *Maund* *The Botanist*, IV, t. 151; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 262 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 255; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 119; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 288; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 74.

Poinciana — *L.* *Sp. pl.* ed. 1 (1753) 380; *DC.* *Prodr.* II, 484; *Jacq.* *Stirp. Amer.* hist. t. 120; *Bot. Mag.* (1807) t. 995.

1893 (P. Dupuis). — II : Boma (Dup.). — II a Yema-Lianga (Cabra). — V : Léopoldville (Duch.). — XVI : Pala (Deb.). — XI : Yambuli (Ém. Laur.).

Obs. — Rob. Brown a indiqué dans le Bas-Congo, d'après C. Smith, le **Guilandina Bonduc** *Ait.* (*Caesalpinia* — *Roxb.*). Oliver dit qu'il n'a jamais vu d'échantillons africains de cette espèce et qu'il présume que tout ce que l'on a indiqué, sous ce nom, dans l'Afrique tropicale, appartient au *C. Bonducella* *Roxb.* (*Guilandina* — *L.*). *Bentl.* et *Trim.* *Medic. Pl.* II, t. 85; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 262.

POINCIANIA L.

Poinciana regia *Boj.* ex *Hook.* in *Bot. Mag.* (1829) t. 2884; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* II, 306; *Taub.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 202; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 289; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 131 et *Miss. Laurent* (1905) 102.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Boma (Dew.). — V : Kimuenza (Gill. 1731). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.).

PARKINSONIA L.

Parkinsonia aculeata *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) 375; *Jacq.* *Stirp. Amer. hist.* t. 119; *Descourtilz* *Fl. des Antilles*, I, t. 12; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* II, 267; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 131, (1906) 254; II (1907) 140.

1903 (L. Gentil). — II : Boma (Gill.). [cult.] (Pyn.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XI : Yaisuli [Lomami] (Gent.).

OLIGOSTEMON Benth.

Oligostemon pictus *Benth.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1865) 305, t. 39; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* II, 267; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 75.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 421).

CASSIA L.

Cassia Absus *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) 376; *Nees* *Pl. officin.* t. 348; *DC.* *Prodr.* II, 500; *Jacq.* *Eclog. pl.* (1811) t. 53; *Oliv.* *Fl. trop. Afr.* II, 279; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 119; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 292; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 17 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 75; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 47 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 165; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 130; II (1907) 139 et *Miss. Laurent* (1905) 101.

C. viscosa *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 205.

C. Thonningii *DC.* I, c. II (1825) 500.

1888 (Fr. Hens). — II : Zambé (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens); Kitobola (Pyn.). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Léopoldville (Gill.); Dolo (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.); Bandundu (Ém. Laur.). — XVI : Pala (Desc.); Lofoi (Verd.). — Noms vern. : **Galonga** [Kasongo]; **Gangale** [Ikwangula]; **Locoso** [Bakusus]; **Kisiwegue** [Tanganika] (Dew.).

Cassia alata L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 378; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 275; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 19 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 19]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 166-167; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 101 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 253; II (1907) 140.

C. reticulata M. *Micheli* [non Willd.] in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 9 [B. S. B. B. XXXVII, 52]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 18.

1896 (Ém. Laurent). — Bas-Congo, cult. dans diverses stations (Ém. Laur.). — V : env. de Dembo et de Kisantu (Gill.). — VI : rég. de Luanu (Lescr.). — VIII : Eala (Pyn.). — XV : Isaka : (Ém. et M. Laur.).

Cassia Droogmansiana *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 48.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Musemjesji** (Verd. 126).

Cassia Kethulleana *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 48.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mututa** (Verd. 562),

Cassia Kirkii *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 281; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 120; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 294; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 130; II (1907) 140 et *Miss. Laurent* (1905) 111.

1888 (Fr. Hens). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.); Sanda (De Brouw.). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XIV : volcan Kirunga (v. Goetz. et v. Prittw.). — XV : Mukundji (Ém. Laur.): la Lulua vers 7° (Lescr.).

— — var. **microphylla** A. *Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 100.

1892 (Jul. Cornet) — XVI : le Katanga (Corn.).

Cassia Mannii *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 272; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 131, (1906) 253; *Miss. Laurent* (1905) 101 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 168.

1901 (J. Gillet). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.); Sanda (Van Houtte). — X : l'Ubangi; Busa (Ém. et M. Laur.).

— — var. **Van Houttei** *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 168 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 253.

1902 (Aug. Van Houtte). — V : rég. de Sanda (Van Houtte; Odd.).

Cassia mimosoides L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 379; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 281; *Bak.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 266; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 120; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 293; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 19; II (1900) 18; Pl. Thonnerianae

(1900) 19; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 172-173; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 131, (1906) 253; II (1907) 140 et Miss. Laurent (1901) 101.

C. geminata *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 281.

C. gracillima *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1858) 590.

1885 (R. Buettner). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Ém. Laur.). — II : Boma (Schimp.). — II a : le Mayumbe à Bingila (Dup.); Ganda-Yanga (Cabra). — V : C. autour du Stanley-Pool (Buett.; Dem.); Léopoldville et env. (Hens; Ém. Duch.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Dolo. — Nom vern. : **Bankause** (Biel.); Kinshassa (Dem.); env. de Kwamouth (Biel.); entre Bolobo et Lukolela (Buett.); Sabuka (Luja); Kisantu (Gill.); Dembo (Cabra); rég. de Lula-Lumene (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — IX : Yabasumba (Thonn.); Upoto (Wilw.). — X : Musima (Briart.). — XV : Lusambo; Bukila (Ém. Laur.). — XVI : le Katanga (Corn.).

Cassia occidentalis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 377; Bot. Reg. (1816) t. 83; *DC.* Prodr. II, 202; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 262; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 120; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 291; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 75; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 49; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 169-74; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 253; II (1907) 140 et Miss. Laurent (1905) 101.

Senna — *Roxb.* Fl. Ind. II (1832) 343.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : la Lemba (Gill.); Haut-Shiloango (Cabra-Michel); Bingila (Dup.). — III : Matadi (Sap.). — IV : rég. des Cataractes (Dem.). — V : Kisantu; env. de Lemfu; env. de Dembo (Gill.); env. de Yumbi (Ém. Laur.). — VI : Luanu et env. (Lescr.); Muene-Putu-Kasongo (Buett.); env. de Sanga (Cabra). — VII : Ibali (Ém. Laur.). — VIII : Équateurville (Buett.); Basankusu. — Nom vern. : **Kwantala** (Dew.). — IX : Bangala (Hens). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lukungu-Moka** (Verd.). — Noms vern. : **Tchungu-Tchungu** [Tanganika]; **Bao** [Ikwangula]; **Ikongolo** [Kasongo].

Cassia Tora *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 376; *DC.* Prodr. II, 263; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 275 et in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 263; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 121; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1906) 76; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 173-74; Miss. Laurent (1905) 102 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 140.

Senna — *Roxb.* Fl. Ind. II (1832) 340.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo, brousse près des villages (Ém. Laur.). — V : Dolo (Sap.); Kwamouth (M. Laur.); Bolobo (Dew.); Kisantu (Gill.); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Krek.). — XII a et b : entre Bima et Bambili (Ser.).

Cassia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 49.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kionga** (Verd. 590).

DIALIUM L.

Dialium acuminatum *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 139.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 797).

Dialium angolense *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 283; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 153; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 296; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 47.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kafungu-Kakoma** (Verd. 476).

Dialium guineense *Willd.* in Roem. Archiv. f. Bot. I (1796-98) 31, t. 6; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 283; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10 [B. S. B. B. XXXVII, 53]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 76; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 294; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 100 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 254; II (1907) 139.

Codarium acutifolium *Afzel.* in Schrad. N. Journ. Bot. II (1807) 233.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Pyn.). — Nom vern. : **Djungu** (Dew.); Kimuenza (Gill.); rég. de Sanda (Odd.). — VII : Ibali (Ém. Laur.). — VIII : Efukoi-Kombe [Ikelemba] (M. Laur.); Eala (M. Laur.). — XI : Basoko (M. Laur.).

Dialium Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 100 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 145.

1904 (Ém. Laurent). — VIII : Lulanga (Ém. Laur.); Eala (M. Laur. 1104).

BAUHINIA L.

Bauhinia Petersiana *Bolle* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 24; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 288; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 200; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 25 [B. S. B. B. XXXVI², 71].

1899 (G. Descamps). — XVI : Pala (Desc.); Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Kitotolo**; **Kifumbi** (Verd.).

Bauhinia reticulata *DC.* Mém. fam. Légumin. XIII (1825) 484 et Prodr. II (1825) 515; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. 266, t. 60; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 290 (err. cal. *articulata*); *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 121; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 296; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 76; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 47 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 253; II (1907) 138; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 112.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.), — III-IV : la Lufu. — Nom vern. : **Lolokemdamba** (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Luozi (Luja). — XII : rég. bor. or. — Nom vern. : **Dopwa** (Ser.). — XV : entre Lusambo et le Lualaba (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kifumbi** (Verd.).

Bauhinia tomentosa *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 375; *DC.* Prodr. II, 514; Bot. Mag. (1866) t. 5560; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 290; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 121; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 296; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 130, (1906) 253; II (1907) 139.

Alvesia bauhinioides *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 587.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Hens; Dew.). — IV : Luvituku (Dem.); Kito-bola (Ém. Laur.). — V : forêts entre Léopoldville et Luvituku (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.); route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel). — VIII : Eala (M. Laur.). — XVI : le Katanga (Corn.).

BANDEIRAEA Welw.

Bandeiraea simplicifolia [*Vahl*] *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1866) 306 in nota; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 285; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 25 [B. S. B. B. XXXVI², 71].

Schotia — *Vahl* ex *DC.* Prodr. II (1825) 508.

1895 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Luebo (Ém. Laur.); Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Bandeiraea speciosa *Welw.* ex *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1865) 306, t. 40; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 284; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 138.

Griffonia — *Taub.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 3 (1894) 147.

1903 (Marc. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 237). — XV : Lusambo (M. Laur.).

Bandeiraea tenuiflora *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1866) 307; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 285; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 17.

1899 (Éd. Luja). — V : Kimuenza (Gill.). — XV : Lubue [Kasai] (Luja).

MACROLOBIUM Schreb.

Macrolobium coeruleoides *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 137.

Vouapa coerulea *De Wild.* [non *Taub.*] Miss. Laurent (1905) 98.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 179); env. de Kisantu. — Nom vern. : **Lubeso** (Gill. 3784). — VII : Iballi (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 734). — IX : Lisala (Ém. et M. Laur.).

Macrolobium Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 129.

1896 (A. Dewèvre). — V : la Lukaya (Gill. 205). — XII d : Vieux-Kasongo (Dew. 949). — Noms vern. : **Mooti** [Kasongo]; **Taulon** [Tanganika] (Dew.).

M. Dewevrei form. **fol. bijugis** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 129, t. 30; II (1907) 138.

1906 (Marc. Laurent). — XIII : kilom. 18 du chemin de fer des Grands Lacs (M. Laur. 1017).

— — form. **fol. trijugis** *De Wild.* l. c. I (1904) 129, t. 31; II (1907) 138 et Miss. Laurent (1905) 99.

1903 (Ém. et Marc Laurent). — V : env. de Sanda (Odd.). — VIII : Efukoi-Kombe (M. Laur. 1267). — XIII a : Romée (M. Laur. 1679); Stanleyville. — Noms vern. : **Imbali**; **Bombali** (Pyn. 73); entre Djambo et Buta. — Nom vern. : **Limbo** (Ser. 31). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (Brisac); Lubi (Lescr. 172). — Nom vern. : **Bombari** [Ikwangula].

Macrolobium Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 252, t. 46.

1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 3645).

Macrolobium Heudelotii *Planch.* ex *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1865) 308; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 298; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10 [B. S. B. B. XXXVII, 53] et Reliq. Dewevr. (1901) 77; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 252; II (1907) 138.

Vouapa macrophylla *Baill.* in *Adansonia*, VI (1865) 178 t. 3, fig. 6; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 299.

1895 (A. Dewèvre). — II a : rives du Loango (Dew. 281). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3307). — VIII : Monzambi (Brun. in M. Laur. 1816). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1659).

Macrolobium Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 99.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Dibebe; bords du Sankuru (Ém. et M. Laur.).

OBS. — M. De Wildeman [l. c.] signale aussi à Dibebe, une forme très voisine de cette espèce.

Macrolobium Palisotii *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1865) 308; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 297; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10 [B. S. B. B. XXXVII, 53] et Reliq. Dewevr. (1901) 77; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 138.

Vouapa — *Baill.* in *Adansonia*, VI (1865) 178; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 299.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 1166). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

BERLINIA Soland.

Berlinia lacuminata *Soland.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 326; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 293; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl.

Cgo, I (1897) 26 [B. S. B. B. XXXVI², 72] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 17; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 77; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 98 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 129, (1906) 251; II (1907) 134.

1896 (G. Descamps). — V : env. de Stanleyville (Dew.); env. de Sanda (Odd.); Lula-Lumene (Hendr.). — VI : rég. du Kwango (But.); Eiolo (Ém. et M. Laur.) — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : le long du Rubi (Lescr. 171). — IX : Pedza [Umangi] [(Krek.). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.).

B. Acuminata var. **Bruneelii** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 135.

1904 (Éd. Lescrauwaet). — IX : la Baringa (Brun. 26). — XV : Lubi (Lescr. 158); Limbutu (M. Laur. 1003).

— — var. **pubescens** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 129.

1901 (Alph. Cabra et Michel). — Ind. non cl. : Buete-Kimanga (Cabra-Michel, 1).

Berlinia bracteosa *Benth.* in Trans. Linn. Soc. XXV (1866) 309; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 294; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 26 [B. S. B. B. XXXVI², 72].

1895 (G. Descamps). — Congo (Ern. Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — XVI : Toa (Desc.).

Berlinia Eminii *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 98; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 30 [B. S. B. B. XXXVI², 76]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 46.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.); Lukafu. — Nom vern. : **Musamba** (Verd.).

Berlinia Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 135.

1906 (Marc. Laurent). — XIII a : Romée (M. Laur. 1661).

Berlinia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 136.

1905 (Fél. Seret). — XIII a : rives du Rubi depuis Kuti (Ser. 45).

AFZELIA Sm.

Afzelia africana *Sm.* in Trans. Linn. Soc. IV (1798) 221; *DC.* Prodr. II, 507; *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. 263; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 302; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 122; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 77; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 109-110.

Intsia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 102; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 290.

1816 (Chr. Smith).— Bas-Congo (Sm.).— II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).— VIII : Coquilhatville (Dew.); Eala (M. Laur.; Pyn.); Bombinba [Ikelemba] (M. Laur.). — IX : Bumba (Pyn.). — XI : Yambuya (M. Laur.); Basoko (M. Laur.); Lokandu (Dew.). — XIII a : Stanleyville (M. Laur.). — XIII c : Yakusu (Ém. Laur.). — XV : Bena-Dibele (Ém. Laur.); Lubi (Lescr.); Limbutu (M. Laur.); Lac Foa (Lescr.); Kondue (Lederm.).

Afzelia cuanzensis *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 386; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 302; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 30 [B. S. B. B. XXXVI, 2, 76].

Intsia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 192; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 299.

1888 (Fr. Hens). — VIII : pays des Bangala (Hens, C. 141). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Mupapa** (Verd. 27).

TAMARINDUS L.

Tamarindus indica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 34; *Jacq.* Hist. stirp. Amer. t. 13; *DC.* Prodr. II, 488; *Bot. Mag.* (1851) t. 4563; *Descourtilz* Fl. des Antilles, II, t. 120; *Nees* Pl. officin. t. 341; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 308; *Bebdome* Fl. Sylv. Ind. t. 184; *Bak.* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. I, 273; *Bentl.* et *Trim.* Medic. Pl. I, t. 92; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 122; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 28 [B. S. B. B. XXXVI², 74; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 191; *De Wild.* Not. pl. util. on intér. du Cgo, II (1906) 151-153, fig. 9.

1877? (J. F. Lopez). — Bords du Congo (Lop.). — IX : Bangala (Ém. Laur.). — XIV : Uvira (Desc.).

BAIKIAEA Benth.

Baikiaea anomala *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 25 [B. S. B. B. XXXVI², 72].

1895 (Ém. Laurent). — XV : forêts près de Lusambo (Ém. Laur.).

Baikiaea insignis *Benth.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1865) 314, t. 41; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 309; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10² [B. S. B. B. XXXVII, 54]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 102 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 254.

1895 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Bombaie; Bas-Kasai (Ém. et M. Laur.); rives du Kasai (Ém. Laur.).

Baikiaea Lescrauwaetii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 141.

1905 (Éd. Lescrauwaet). — VIII : Ikoko (Lescr. 415).

Baikiaea minor *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 309; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 123; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 78; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 103 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 254; II (1907) 141.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Sanda (Odd.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Yambola** (M. Laur. 908); **Ikoko** (Lescr. 167); rives du Ruki (Gisseleire in Pyn. 288). — IX : Bangala (Hens).

SCHOTIA Jacq.

Schotia latifolia *Jacq.* Fragm. bot. (1809) 23, t. 15, fig. 1; *Harv. et Sond.* Fl. Capens. II, 274; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10² [B. S. B. B. XXXVII, 54] et Reliq. Dewevr. (1901) 78.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Babundu (Dew. 1146).

Schotia Romii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 132, fig. 4.

1888 (F. Demeuse). — Congo (Dew.). — VIII : Mompono (Bruneel, 37). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1680); Yambuya (M. Laur. 1827). — XV : Limbutu (M. Laur. 1681); Idanga (L. Rom); rég. du Kasai (Lescr.). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. non cl. : le Lomami (Dem. 159).

BRACHYSTEGIA Benth.

Brachystegia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 204.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kisamba-Kwe-Kwe** (Verd. 117).

Brachystegia mpalensis *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 27 [B. S. B. B. XXXVI², 73] et Ill. fl. Cgo (1902) 175, t. 88; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 45.

1895 (G. Descamps). — XVI : Pala (Deb.); Toa (Desc. 27); Lukafu (Verd. 58).

— — var. **latifoliolata** *De Wild.* l. c. (1902) 45.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mukutu** (Verd. 64).

Brachystegia stipulata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 44.

B. appendiculata *De Wild.* [non *Benth.*] l. c. (1902) t. 12.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 18).

CRUDIA Schreb.

Crudia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 97.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

CRYPTOSEPALUM Benth.

Cryptosepalum Debeerstii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 40.

1895 (Gnst. Debeerst). — XVI : Pala (Deb. 32).

Cryptosepalum exfoliatum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 41.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Cryptosepalum maraviense *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 304; *M. Micheli* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 28 [B. S. B. B. XXXVI², 74].

1895? (G. Descamps). — Congo (Desc.)

— — var. **minus** *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII² (1895) 100; *Th. Dur.* et *Schinx* Étud. fl. Cgo (1896) 122.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Cryptosepalum Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 39.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd.).

DEWINDTIA De Wild.

Dewindtia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 43.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 118).

COPAIFERA L.

Copaifera Arnoldiana [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *Th.* et *Hél. Dur.*

Copaiba — *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 12 [B. S. B. B. XXXIX², 64] et in *Ill. fl. Cgo* (1901) 125, t. 73.

1899 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra, 136).

Copaifera Demeusei *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 264; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 128; II (1907) 132 et *Miss. Laurent* (1905) 97.

1892 (F. Demeuse). — V : Bolobo (Ém. et M. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — VII : Lac Léopold II (Dem.); Inongo; Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Baka** (M. Laur. 753). — X : C. le long de l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.).

Copaifera Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 132.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1648, 1825).

HARDWICKIA Roxb.

Hardwickia Mannii *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 316; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10²; [B. S. B. B. XXXVII, 56] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 78; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 132.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 667 a). — XV : Limbutu (M. Laur.).

CYNOMETRA L.

Cynometra congensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 127.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Cynometra ? djumaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 128, t. 39.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

Cynometra Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 128; II (1907) 130 et *Miss. Laurent* (1905) 95.

1902 (J. Gillet). — V : Wombali (Gill. 2710). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.); Bala-Lundzi (Pyn. 334). — IX : Monzambi (Pyn. 398). — XV : Limbutu (M. Laur. 1036).

Cynometra Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 96 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 130.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 284); Eala (Pyn. 360, 406, 437); Yala [Baringa] (Brun. 35). — IX : Busa (Ém. et M. Laur.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Lac Foa (Lescr. 219).

Cynometra Lujae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 250, t. 70.

1898 (Éd. Luja). — IX : Luozi (Luja, 147).

Cynometra Mannii *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 317; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 123; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI², 77] et *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 18; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 130.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dup.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — V : rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja); env. de Yumbi (M. Laur. 417); Lukolela (Pyn. 206). — VIII : Eala (M. Laur. 830, 1806).

Cynometra Oddoni *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 131.

1904 (Ad. Odon). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3706).

Cynometra pedicellata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 131.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1807). — XV : Limbutu (M. Laur. 1670).

Cynometra Schlechteri *Harms* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 290 [nom. tant.] et in *Engl. Jahrb.* XXX (1901) 77.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlecht. 12659).

Cynometra sessiliflora *Harms* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 262.

1898? (J. H. Camp). — V : le Stanley-Pool? (Camp).

Cynometra Vogelii *Hook. f.* in *Hook.* Niger. Fl. (1849) 328; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 317; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 78.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga. — Nom vern. : **Banda-banda** (Dew. 290).

ERYTHROPHLEUM Afzel.

Erythrophleum guineense *Don* Gen. Syst. Bot. II (1832) 424; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 320; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 196; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 123; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1896) 127.

Fillaea suaveolens *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. (1832) 242, t. 55.

E. ordale *Bolle* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 10.

Mavea judicialis *Bertol.* in *Mem. Acc. Sc. Bolog.* II (1850) 570, t. 39.

1882 (H. Johnston). — Bas-Congo (Decort, in Gill. 1542). — II a : le Mayumbe (Em. Laur.).

MIMOSEAE

PENTACLETHRA Benth.

Pentaclethra Eetveldeana *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 20 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 20]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 126; II (1907) 130, 250 et *Miss. Laurent* (1905) 95.

1900 (J. Gillet). — IV : Luvituku (Em. Laur.) — V : Kisantu (Gill. 710); Sanda et env. — Nom vern. : **Kinseka** (Odd.; Gill. 3657). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VII : Ibalí (Em. Laur.). — VIII : Bikoro (Pyn. 371).

Pentaclethra macrophylla *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 330; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 322; *Taub.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 196; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 10² [B. S. B. XXXVII, 54] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 78; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 127; II (1907) 130.

1893 (Ém. Laurent). — II : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Panza** (Gill.); Sanda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Madibi (Sap.). — VIII : Coquilhatville. — Noms vern. : **Boala**; **Mobala** (Dew.); Eala (M. Laur.).

PARKIA R. Br.

Parkia biglobosa *Benth.* in *Hook. Journ. of Bot.* IV (1842) 328; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 324; *M. Micheli* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 10² [B. S. B. B. XXXVII, 54] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 79; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 140-43.

1895 (A. Dewèvre). — V : l'Inkisi (Dew.).

Parkia filicoidea *Welw.* ex *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 324; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 305; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 126; II (1907) 129.

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2289). — VI : entre Popokabaka et les chutes François-Joseph (Gent. 103). — XV : Limbutu (M. Laur.).

Parkia Klainei *Pierre* ex *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 129 [nom. tant.].

1905 (Marc. Laurent). — XV : Limbutu (M. Laur. 1828).

ENTADA Adans.

Entada abyssinica *Steud.* in *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* I (1847) 234; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 327; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 28 [B. S. B. B. XXXVI², 74]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 79 et *Pl. Gilletianae*, II (1901) 76 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 748]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 249; II (1907) 129.

Gigalobium — *Hiern Cat. Welw. Pl.* I (1896) 305.

1891 (F. Demeuse). — IV : Luvituku (Dew.) — V : Kisantu (Gill.); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VIII : Coquilhatville (Dew. 606). — XV : le Sankuru (Ém. Laur.); Bena-Mulengere (Dew. 1009). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Noms vern. : **Niniki** [Kasongo]; **Onguikie** [Bakusu]; **Nicena** [Tanganika]. — Ind. non cl. : bords du Lomami (Ém. Laur.).

Entada africana *Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent.* (1832) 233; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 326; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 126.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Entada scandens *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 332; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 325; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 126, (1906) 249; II (1907) 129, 257, t. 75.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill. 1162). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1106). — XV : rég. de Mukenge (Pg.)

Entada sudanica *Schweinf.* Reliq. Kotschyanae (1868) 8, t. 8; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 327; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. II (1907) 129.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 674, 712, 1290). — XII : Kiravungu (Ser. 175).

— — var. **pauciflora** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 126 et Miss. Laurent (1905) 94.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

FILLAEOPSIS Harms.

Fillaeopsis discophora *Harms* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 259, t. 6; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 124; II (1907) 37, 129, t. 15, 16.

1896 (A. Dewèvre). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — VIII : env. de Bokakata. — Nom vern. : **Sonanaka** ou **Esonanaka** (Dew.). — XI : Basoko (M. Laur. 1053).

PIPTADENIA Benth.

Piptadenia africana *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 320; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 328; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 306; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 94 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 129.

1903 (Ém. Laurent). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville; Lulanga (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laurent); Limbutu (M. Laur.); Kondue (Lederm.).

ADENANTHERA Royen.

Adenantha Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 249.

1903 (J. Gillet). — V : Sanda (Gill. 3435, 3459).

TETRAPLEURA Benth.

Tetrapleura Thonningii *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 345; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 339; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl.

Cgo, II (1898) 10² [B. S. B. B. XXXVII, 54]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 307; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 79; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 94 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 129.

1895 (Ém. Laurent). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Eleci** (Dew.). — VI : env. de Madibi (Sap.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Yanongo (Ém. et M. Laur.). — XV : bords du Sankuru (Ém. Laur.); Kondue (Lederm.).

DICHROSTACHYS Wight et Arn.

Dichrostachys nutans *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 355; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 333; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 123; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 195; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 308; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 39; *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 115 et Miss. Laurent (1905) 94.

1863 (R. Burton). — Congo (Burt.); brousse du Bas-Congo (Ém. Laur.). — III : vallée de la Ufwa [affl. de la Pozo] (Cabra-Michel). — IV : Kitobola (Ém. Laur.); Lukungu (Hens). — V : le Stanley-Pool; entre Dembo et le Kwango (But.). — XVI : Lukafu (Verd.).

OBS. — « Une des espèces les plus caractéristiques de la steppe, répandue dans toute l'Afrique tropicale » (Dew.).

Dichrostachys platyptera *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 576; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 333; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 308; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 94.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.).

MIMOSA L.

Mimosa asperata *L.* Syst. veget. ed. 10 (1759) 1312; *DC.* Mém. fam. Légum. t. 63 et Prodr. II, 428; *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 400; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 335; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 195; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 124; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 79; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 126, (1906) 249; II (1907) 128 et Miss. Laurent (1905) 94.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (But.). — II : Boma (Dew.); Ponta da Lenha (Naum.). — II a : Bingila (Dup.). — III : Tondoa (Naum.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Léopoldville (Ém. Duch.); Suata (Buett.); Lukolela (Pyn.); Kisantu (Gill.). — VIII : Ikenge (Paulus); Équateurville [Wangata] (Dew.); Gombe (M. Laur.). — XV : bords du Kasai (Ém. et M. Laur.).

Mimosa pudica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 518; Bot. Reg. XI, t. 941; *Spach* Hist. des végét. [Atlas] t. 1; *Benth.* in *Mart.* Fl. Brasil. XV², 316; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 336 in obs.; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 195; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 128.

1903 (L. Pynaert). — V : Lukolela (Pyn.).

ACACIA Willd.

Acacia ataxacantha *DC.* Prodr. II (1825) 459; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 244; *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 511; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 343; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 125; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 79; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 39.

1872 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII d : entre Nyangwe et Kabanga (Dew.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Acacia Buchanani *Harms* in Engl. Jahrb. XXX (1901) 76; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 183.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kopunga-Umba** (Verd. 221).

Acacia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 80; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 125.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville; entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2578). — XIII d : env. de Kabanga. — Nom vern. : **Canga-Chicot** (Dew. 953).

On en rencontre des formes à feuilles uni- bi- et trijuguées.

Acacia Farnesiana [*L.*] *Willd.* Sp. pl. IV (1806) 1083; *Benth.* in *Hook.* Journ. of Bot. IV (1842) 496 et in *Mart.* Fl. Brasil. XV², 394; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 346; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 124; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 312; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 105-108 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 248; II (1907) 127.

Mimosa — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 521.

1885 (R. Buettner). — II : Boma (Gill.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — III : Tondoa (Buett.). — V : bords du Stanley-Pool (Hens). — VIII : Eala [cult.] (M. Laur.).

Acacia Lahai *Steud. et Hochst.* ex *Benth.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) 506; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 240; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 80.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Vieux-Kasongo (Dew.). — Noms vern. : **Kacegnengui** [Kasongo]; **Pomboro** [Ikwangula]; **Ouban-Banguée** [Tanganika].

Acacia Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 8 [B. S. B. B. XXXIX², 99].

1899 (Éd. Luja). — Bena-Dibele [Kasai] (Luja).

Acacia pennata Willd. Sp. pl. IV (1805) 1090; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 345; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 312; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 194; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 93 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 127.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

Acacia Seyal Delile Descr. Égypte (1813) 286, t. 52, fig. 2; *DC.* Prodr. II, 460; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 351; *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 195.

Le type existe dans tout le bassin du Nil.

— — var. **Lescrauwaetii** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 128.

1905 (Éd. Lescrauwaet). — XV : entre la Lulua et Kanda-kanda, au S. de 7° (Lescr.).

— — var. **Sereti** *De Wild.* l. c. II (1907) 128.

1905 (F. Seret). — XII : rég. du chef Guago (Ser. 290).

Acacia Sieberiana *DC.* Prodr. II (1825) 463; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 347; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 39 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 108-109.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Muesa** (Verd.).

Acacia tortilis *Hayne* *Arzneigew.* X (1836?) t. 31; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 352; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 28 [B. S. B. B. XXXVI², 74].

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

ALBIZZIA Durazz.

Albizzia Brownei [*Walp.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 362; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 317; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 37 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 248.

Zygia — *Walp.* *Repert. bot.* I (1849) 928.

Feuilleea Zygia *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 187.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kasongo (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern : **Kabumbu** (Verd.).

Albizzia ealaensis *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 126.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 665).

Albizzia fastigiata [*E. Mey.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 361; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 317; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 78 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 750]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 111-112 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 125, (1906) 249; II (1907) 127.

Zygia — *E. Mey.* Comm. fl. Afr. austr. (1835) 165.

Feuilleea Sassa *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 186.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.); entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — XI : Bomaneh (M. Laur.). — XV : reg. de Mukenge (Pg.).

Albizzia intermedia *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 79 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 750].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1986).

Albizzia katangensis *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 37.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musase** (Verd. 66).

Albizzia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 92 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 127.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 240). — VIII : Eala (M. Laur. 793); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Bongo** [Eala] (M. Laur.)

Albizzia Lebbek [*Willd.*] *Benth.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. III (1844) 87; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 358; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 93 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 36, 127, t. 3.

Acacia — *Willd.* Sp. pl. IV (1805) 1066.

Feuilleea — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 183.

Albizzia latifolia *Boiv.* in *Encycl. du XIX^e siècle*, II, 33; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 315.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Galiema (Ém. et M. Laur.). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.).

OBS. — Cultivé comme ombrage dans la plupart des postes du Congo (Em. Laur.).

Albizzia versicolor *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 359; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 315; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 125; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 38 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 125, (1906) 248.

Feuilleea — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 189.

1890 (F. Demeuse). — Bas-Congo orient. (Ém. Laur.). — II : Boma (Dem.). — III : près de la riv. Pandi (Cabra-Michel). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Sakela-Gombo** (Verd.).

PITHECOLOBIUM Mart.

Pithecolobium altissimum [*Hook. f.*] *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 364; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 21 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 21] et Reliq. Dewevr. (1901) 80; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 125, (1906) 248; II (1907) 126 et Miss. Laurent (1905) 92.

Albizzia — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 332.

1896 (A. Dewèvre). — V : bord de la Djili (Odd.); Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.); Kimuenza (Verm.). — VI : entre Swinburn et Eiolo (Ém. Laur.). — VII : Kiri (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Ikenge (Ém. Laur.); Mondjo (Pyn.). — X : rive de l'Ubangi (Ém. Laur.).

ROSACEAE

CHRYSOBALANUS L.

Chrysobalanus ellipticus *Soland. ex Sabine* in Trans. Hort. Soc. V (1824) 453; *DC.* Prodr. II, 526; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 366; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 125; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 319.

C. Icaco L. var. *ellipticus* *Hook. f.* in *Mart.* Fl. Brasil. XI² (1867) 7.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Chrysobalanus Icaco L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 513; *Schnizl.* Iconogr. t. 274; *Descourtilz* Fl. des Antilles, II, t. 84; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 365; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 319; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 178; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo. II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113].

1893 (Eug. Wilwerth). — I : Moanda (Vanderyst); Banana. — II : Ile des Princes (Wilw.).

PARINARIUM Juss.

Parinarium congense *F. Didr.* [Pl. nonnull. Mus. Holm. (1854) 16] in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1854) 197.

Kigelaria? *paniculata* *Schumach.* ex *F. Didr.* l. c. in syn.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Parinarium congolanum *Th. et Hél. Dur.* [nom. nov.].

P. congoense *Engl.* [non *F. Didr.*] in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 377; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 18 et Reliq. Dewevr. (1901) 81; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 89 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 253.

P. excelsum *Th. Dur. et De Wild.* [non *Sabine*] *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 113]; *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 138-140).

1891 (F. Demeuse). — Congo (Ém. Laur.; Camp). — V : le Stanley-Pool (Cabra); en aval de Lukolela (Ém. et M. Laur.); env. de Kwamouth (M. Laur.); C. entre Kwamouth et Bolobo (Dew.); Lisha (Dem.); env. de Yumbi (M. Laur. 429). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew. 691); îles sablonneuses en aval d'Irebu (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Pompo** [Bangala]; **Mampombo** [Équateur] (Dew.).

Parinarium curatellifolium *Planch. ex Benth.* in *Hook.* *Niger Fl.* (1849) 33; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 368; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 191; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 19 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 81; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 245; II (1908) 253.

1896 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Duch. et Luja); Sabuka (Ém. Laur.); Kisantu; Kimuenza (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte); Kinshassa (Schlt.). — VI : Eïolo (M. Laur.); le Kwilu (Sap.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Bukila (Ém. Laur.); Munungu (Lescr. 365).

Parinarium gabonense *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 87.

Le type a été trouvé au Gabon.

— — var. ***mayumbense*** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 89.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : Temvo (Ém. et M. Laur.).

Parinarium Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 245, t. 59.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2529).

Parinarium glabrum *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 370; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 81; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 254.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Sanda (Odd.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 9, 675; Pyn. 361, 1265). — IX : pays des Bangala (Dew. 864).

Parinarium Holstii *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 423.

P. salicifolium *Engl.* [non *Miq.*] l. c. (1895) 191.

Le type a été trouvé dans l'Afrique orient. allemande.

— — var. ***longifolium*** *Engl. ex De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 81.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Lokandu (Dew. 1109 c).

Parinarium Mobola *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 368; *Ficalho Pl. Uteis* (1884) 178; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 191; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 125; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 37.

Ferolia Mobola O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 216.

Parinari — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1896) 320.

1885 (R. Buettner). — VI : le Kwango (Buett.). — XVI : Toa (Desc.); Lukafu.

— Nom vern. : **Mapunda** (Verd.).

Parinarium Poggei Engl. in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 378.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge? (Pg. 914).

Parinarium subcordatum Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 367; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 126; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 19; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 46; II (1908) 254.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : bords du Congo [distr. des Cataractes] (Luja). — V : le Stanley-Pool (Dem.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kinshassa (M. Laur. 493); Lukolela (Pyn. 320). — VIII : Eala : (Pyn. 1068).

Parinarium Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 182.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mupundu** (Verd. 568).

ACIOA Willd.

Acioa Buchneri Engl. in Engl. Jahrb. XVII (1893) 88; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 126.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.).

Acioa Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 19; Reliq. Dewevr. (1901) 81 et Ill. fl. Cgo (1902) 185, t. 93.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.).

Acioa Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 47.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Acioa Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 254.

1906 (F. Seret). — XII c : rive du Bende à Gombari (Ser. 807).

Acioa Vanhouttei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 255.

1906 (Aug. Van Houtte). — V : l'Inkisi (Van Houtte, in Gill. 3964).

GRIFFONIA Hook. f.

Griffonia Barteri Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 373; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 126.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.).

MAGNISTIPULA Engl.

Magnistipula Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 255.

1900 (R. Butaye). — V : bassin de la Sele (But.).

RUBUS L. (1)

Rubus Goetzenii *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 384, 385.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

Rubus kirungensis *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 385.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

Rubus pinatus *Willd.* Sp. pl. II (1799) 1081; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 190; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 322; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 80 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 752]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 245; II (1908) 253.

1900 (J. Gillet). — V : entre Kisantu et Dembo (Gill.). — XII a : Gombari (Delp.); entre Bima et Bambili (Ser. 144). — XIII d : le Maniema (Verd.).

CRASSULACEAE

CRASSULA L.

Crassula abyssinica *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 309; *Britten* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 388.

Le type a été trouvé en Abyssinie.

— — var. **vaginata** [*Eckl.* et *Zeyh.*] *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 189; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 326; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 20.

C. vaginata *Eckl.* et *Zeyh.* Enum. pl. Afr. austr. (1837) 238; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 341.

1896 (G. Descamps). — XVI : Kititema (Desc.).

(1) L'*Eriobotrya japonica* Lindl. a été introduit à Kisantu par le Fr. Gillet [conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 253].

BRYOPHYLLUM Salisb.

Bryophyllum calycinum *Salisb.* Parad. Londin. (1806) 3; *Britten* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 390; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 80 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 752]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 236.

Crassuvia floripendia *Commers.* ex *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) 141; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 326.

Crassula floripendula *Sims* in Bot. Mag. (1811) t. 1409.

1900 (J. Gillet). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.).

KALANCHOE Adans.

Kalanchoe coccinea *Welw.* ex *Britten* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 375; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 189; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 328; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 236.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — X : Bobangi (Ém. et M. Laur.).

— — var. **subsessilis** *Britten* l. c. II (1871) 375; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 127.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Kalanchoe Cuisini *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 3 [B. S. B. B. XXXVIII², 122] et Reliq. Dewevr. (1901) 82.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Mokanga [Mobanga?]. — Nom vern. : **Putu-Putu** (Dew.).

Kalanchoe glandulosa *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 312; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 253.

1905 (F. Seret). — XII c : case Zala [Surango] (Ser. 403). — Noms vern. : **Kuli-kuli** [Abarembo]; **Kula-kula** [Amadi].

— — var. **benguelensis** *Engl.* Hochgebirgsfl. trop. Afr. (1892) 223; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 318; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 179.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kakungui** (Verd.).

DROSERACEAE

DROSER L.

Drosera Burkeana *Planch.* in Annal. sc. nat. Sér. 3, IX (1848) 318; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 402; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 330; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 31 [B. S. B. B. XXXVI², 77] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 20.

1897 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Luja) : Dembo (Gill.).

Drosera indica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 282; *Wight* Ill. of Ind. Bot. t. 20; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 402; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 330; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 20.

1898 (Éd. Luja). — V : env. de Léopoldville (Luja).

RHIZOPHORACEAE

RHIZOPHORA *L.*

Rhizophora Mangle *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 443; *DC.* Prodr. III, 32; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 408; *Spach* Hist. des végét. [Atlas] t. 34; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 181; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 333; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 127.

1882 (H. Johnston). — Congo (Dew.); Bas-Congo (Johnst.). — I : Moanda (Gill.).

Rhizophora racemosa *G. F. W. Mey.* Prim. fl. Esseq. (1818) 185; *DC.* Prodr. III, 32; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 408; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 127.

R. Mangle *L.* var. — *Engl.* in *Mart.* Fl. Brasil XII² (1876) 427.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

WEIHEA *Spreng.*

Weihea africana [*Benth.*] *Benth.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 410; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 83; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 61.

Cassipouréa — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 341.

1895 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville. — Nom vern. : **Kokoko** (Dew. 53); entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2513). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew. 693).

ANISOPHYLLEA *R. Br.*

Anisophyllea laurina *R. Br.* ex *Sabine* in Trans. Hort. Soc. V (1824) 446; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 413; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 127.

Anisophyllum — *Don* ex *Benth.* et *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 324.

1885 (R. Buettner). — VI : le Kwango (Buett.).

Anisophyllea Poggei *Engl.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 83 [nom. tant].

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Tshoa (Dew. 396).

COMBRETACEAE

TERMINALIA L. (1)

Terminalia Catappa L. Mant. pl. (1771) 519; *Nuttall* Amer. Sylv. I, t. 32; *DC.* Prodr. III, 11; Bot. Mag. (1830) t. 3004; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 416; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 182; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 338; *Engl. et Diels* in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV [Combret.] (1899) 9, fig. 4; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 21.

1896 (Ém. Laurent). — XI : Basoko (Ém. Laur.).

Terminalia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 4 [B. S. B. B. XXXVIII², 123] et Reliq. Dewevr. (1901) 84.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Terminalia superba *Engl. et Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV [Combret.] (1899) 26, t. 14, B. a-c; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 84.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : Ngotto (Dew. 840).

CONOCARPUS Gaertn.

Conocarpus erectus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 147; *Jacq.* Stirp. Amer. hist. 78, t. 52; *DC.* Prodr. III, 16; *Descourtilz* Fl. des Antilles, VI, t. 399; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 417; *Engl. et Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV [Combret.] (1899) 32; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 297; II (1908) 245.

1873 (Bastian). — I : Moanda (Gill. 3163); Banana (Fr. Naum.; Ém. et M. Laur.). — II : Boma (Bast.).

COMBRETUM L.

Combretum angustifolium *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 213; *Diels* in Engl. Jahrb. XXXIX (1907) 506.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu — Nom vern. : Muliumbu. (Verd. 81).

(1) *Terminalia torulosa* *F. Hoffm.* Beitr. Kenntn. Fl. Centr.-Ost.-Afr. (1889) 27; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV [Combret.] (1899) 15, t. 5 fig. A, a-c; *T. mollis* *Laws.* [non *Vidal*] in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 417. « Ober Kongo Gebiet » arbre de la savane entre Ruemb et Tshih 1880 (Buchn. 564).

Nous ne savons si cette habitation est dans le Congo belge: nous ne trouvons pas ces localités.

Combretum Bosoi *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 195; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 502.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 179).

Combretum Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 196; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 490.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.).

Combretum Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 8 [B. S. B. B. XXXIX², 100]; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 507.

1899 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 175).

Combretum camporum *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 62; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 19 et Reliq. Dewevr. (1901) 84; *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 30, t. 8, fig. C, a g; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 296 et *Miss. Laurent* (1905) 161.

C. elaeagnoides *Th. Dur.* et *Schinz* [non *Klotzsch*] Étud. fl. Cgo (1896) 128.

C. polystictum *Welw.* ex *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1 (1898) 351.

1874 (F. Naumann). — Bas-Congo (Hens, B. 36). — II : Boma. — Nom vern. : **Taite**. — Nom du fruit : **Kingo** (Naum.; Gill. 116, 3261). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur. 27). — III : Matadi (Ém. Laur.).

Combretum cinereopetalum *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 84, t. 23, fig. E, a-f; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 84; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 296.

C. racemosum *Hiern* [non *P. Beauv.*] Cat. Welw. Pl. 1 (1898) 343.

1885 (R. Buettner). — II a : Shimbete (Dew. 315). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett. 35); env. de Boala (Lescr.). — XIII d : Nyangwe (Dew. 924 a). — XVI : Lovoi (Desc.). — Noms vern. : **Mombo-Koma** [Kasongo]; **Gonfe** [Ikwangula]; **Né** [Tanganika] (Dew.).

Combretum confertum [*Benth.*] *Laws.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 422; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 128; *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 74, t. 22, fig. C, a-b; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 85; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 161.

Poivrea — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 338.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : île voisine de Malela (Dew.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.) — Ind. non cl. : Pezo [Poço? III] (Krek.).

Combretum constrictum [*Benth.*] *Laws.* (1) ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 432; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 128.

Poivreia — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 337.

P. mossambicensis *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 78, t. 13.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 36).

Combretum cordifolium *Engl.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 296.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2728, 2737).

Combretum exannulatum [*O. Hoffm.*] *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. III [Combret.] (1899) 88; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 161.

Cacoucia — *O. Hoffm.* in *Linnaea*, XLIII (1881) 132.

Campylogyne — *Hemsl.* in *Hook.* Icon. pl. (1897) t. 2550; *Hiern* Cat. Welw. Pl. 1, 354.

Cacoucia bracteata *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 434 pr. p.

1903 (Ém. Laurent). — II a : Benza-Masola (Ém. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.).

Combretum Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 65, 197 et 296 et Miss. Laurent (1905) 161; *Diels* in *Engl.* Jahrb. XXXIX (1907) 509.

1902 (L. Gentil). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3315 ; rég. de Lumene (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2805, 2892). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.).

Combretum Haullevilleianum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 213; *Diels* in *Engl.* Jahrb. XXXIX (1907) 506.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Bulubu** (Verd. 9).

Combretum Hensii *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. III [Combret.] (1899) 85, t. 25, fig. A, a-c; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 85; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 161 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 296.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Dew. 481; Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 36); Chenal (Ém. Laur.); Sanda (Odd. in Gill. 3312); Dembo (Gill.). — VI : Madibi (Lescr. 81).

Combretum hispidum *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 421; *Engl.* et *Diels* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. III [Combret.] (1899)

(1) *Engl.* et *Diels* [Monog. Afr. Pfl. Fam. III (Combret.) 98, 99] séparent le **C. constrictum** *Laws.* en *C. constrictum* *Laws.* pr. p. et *C. quangense* *Engl.* et *Diels.* — La plante du Congo devra donc être réétudiée.

89; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 85; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 162.

C. Klotzschii Welw. ex Laws. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 422; *Hiern.* Cat. Welw. Pl. I, 341.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : Kelekese (Dew. 806). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.).

Combretum Kamatutu *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 215; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 497.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kamatutu (Verd.).

Combretum latialatum *Engl.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl. Fam.* III [Combret.] (1899) 86, t. 14, fig. C, a-f; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 85; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 162 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 197.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 229); lac Tumba (Ém. et M. Laur.); Équateurville [Wangata] (Dew. 642); Coquilhatville. — Nom vern. : Bosoi (Dew. 636, 642). — IX : Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.).

— — var. **multibracteatum** *Engl.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 65.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1912).

Combretum Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 197 et *Miss. Laurent* (1905) 162; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 509.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 193)

Combretum Lawsonianum *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 101, t. 30, fig. a-b; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 30; Contr. fl. Cgo, I (1899) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 85; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 162.

Cacoucia paniculata Laws. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 484.

1891 (F. Demeuse). — V : Léopoldville (Dew.). — IX : Umangi-Mbwela [route de Ndeki] (Ém. Duch.). — IX : Bangala (Dew.). — IX a : Monga (Thonn.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.).

Combretum laxiflorum Welw. ex Laws. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 428; *Hiern* Cat. Welw. pl. I, 348; *Engl.* et *Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 12; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 96, t. 1, fig. D, a-f.

1880 (von Mechow). — XV : pays des Majakalla (Mech. 286). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kasakala (Verd. 53).

Combretum longepilosum *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 30; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 85.

1896 (A. Dewèvre). — IX : pays des Bangala (Dew. 880).

Combretum lukafuense *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 214; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 508.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lukondu-N'Bo** (Verd. 10).

Combretum marginatum *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 18.

1893 (Jos. Duchesne). — Congo (Duch.).

Combretum mucronatum *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 184; *DC. Prodr.* II, 20; *Laws. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 426; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 31, t. 6; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 86; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 162.

C. Smeathmanni *G. Don.* in *Trans. Linn. Soc.* XV (1827) 423.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 620). — IX : env. de Mobeka (Em. et M. Laur.).

Combretum mussaendiflorum *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 87, t. 25, fig. E, a-b; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 86.

1895 (G. Descamps). — XI : Lokandu (Dew. 1123). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Nom vern. : **Kakisa-Kissa** [Tanganika].

Combretum nervosum *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 101, t. 29, fig. A, a-c.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

Combretum odontopetalum *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 60, t. 18, fig. E; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 216.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulama** (Verd. 90).

Combretum olivaceum *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* (1895) 288; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899); *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 216.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 406).

Combretum paniculatum *Vent.* *Choix de pl.* (1803) sub t. 58, in adnot.; *DC. Prodr.* III, 20; *Laws. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 425;

Hiern Cat. Welw. Pl. I, 344; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 70.

1891 (G. Descamps). — XV : rég. de Mukenge (Pg.). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Combretum Poggei *Engl. et Diels.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 86, t. 25, fig. B, a-c; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 65 et Miss. Laurent (1905) 162.

1882 (P. Pogge). — V : Kimuenza (Gill. 2063). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukenge (Pg. 920, 923, 924, 926, 929).

Combretum porphyrobotrys *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 73; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 86; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 66 et Miss. Laurent (1905) 163.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 321). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1975). — VII : Ganda (Ém. et M. Laur.); Ibali; Inongo (Ém. et M. Laur.).

Combretum puetense *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 46.

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

Combretum pyriforme *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 296, t. 71; *Diels* in *Engl. Jahrb.* XXXIX (1907) 508.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Combretum racemosum *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 87, t. 118; *Guill. et Perr.* Fl. Seneg. tent. 285, t. 67; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 424; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 128; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 343; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* III [Combret.] (1899) 82; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 87; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 197, (1906) 297 et Miss. Laurent (1905) 163.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe; Shimbete (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); rég. de Lumene (Hendr.). — VI : Madibi (Lescr.); Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — VIII : Eala (M. Laur.); Équateurville [Wangata]. — Noms vern. : **Bosoi**; **Bosofo** (Dew.). — IX : Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.). — X : Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XV : rég. de Mukenze (Pg.).

— — var. **flammeum** *Welw.* ex *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 425; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 129.

C. flammeum *Welw.* ex *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 344.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo; entre Bungi et Kingunshi (Buett. 36, 36 a).

Combretum sericogyne *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Combret.] (1899) 87; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 163.

1895 (Ém. Laurent). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.); Lusambo (Ém. Laur.).

Combretum sinuatipetalum *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 215; *Diels* in *Engl. Jahrb. XXXIX* (1907) 493.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kifula-Buta** (Verd. 193).

Combretum splendens *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* (1895) 289; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 37; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 216.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutuma** (Verd. 305).

Combretum towaense *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. III* [Combret.] (1899) 11, t. 3, fig. A, a-c.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

QUISQUALIS L.

Quisqualis indica *L. Sp. pl. ed. 2* (1762) 556; *DC. Prodr. III*, 23; *Laws.* in *Oliv. Fl. trop. Afr. II*, 435; *Clarke* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. II*, 459; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 129; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 37; *Engl. et Diels* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. IV* [Combret.] (1899) 5, fig. 3; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 297 et *Miss. Laurent* (1905) 163.

Q. ebracteata *P. Beaur.* *Fl. d'Oware, I* (1804) 57, t. 35.

1862 (R. Burton). — I : delta du Congo (Schimp.). — II : env. de Boma (Dew.). II a : Zenze (Ém. Laur.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Chenal (Ém. et M. Laur.).

Cultivée dans toute la région tropicale de l'ancien monde, cette espèce parait sauvage en Malaisie. (Clarke, l. c.).

MYRTACEAE

PSIDIUM L. (1)

Psidium Guajava *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 470; *Ficalho* *Pl. Uteis* (1884) 184; *Engl.* *Pfl. Ost-Afr.* 287; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 357; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo, I* (1900) 21 et *Reliq. Dewevr.*

(1) De Wildeman, *Les Goyaviers* in *Not. pl. util. et intér. du Cgo, I* (1904) 252-262.

(1901) 88; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 25 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 325.

P. pyriferum L. l. c. ed. 2 (1762) 672, Bot. Reg. XIII, t. 1079; *Descourtilz* Fl. des Antilles, II, t. 72.

P. pomiferum L. l. c.; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 436.

1899 (Éd. Luja). — II a : Kemba (Dew.). — V : Léopoldville (Luja). — VIII : Équateurville [Wangata] (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi [cult.] (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Yambuya (M. Laur.). — XV : Ifuta (Ém. et M. Laur.). —

EUGENIA L. (1)

***Eugenia calophylloides* DC.** Prodr. III (1828) 272; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 437; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 130.

E. caryophylloides *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 359.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

***Eugenia Demeusei* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 325.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Léopoldville (Gill. 2700). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 3654).

— — form. ***lukolelaensis* De Wild.** l. c. I (1988) 325.

1906 (L. Pynaert). — V : Lukolela (Pyn. 204).

***Eugenia Dewevrei* De Wild.** et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. II (1898) 6 [B. S. B. B. XXXVIII²] et Reliq. Dewevr. (1901) 88.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.).

***Eugenia Jambos* L.** Sp. pl. ed. 1 (1753) 470; *Willd.* Sp. pl. II², 959; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II, 81 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 753]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 361; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 324.

E. Jambosa *Elliot* in Journ. Linn. Soc. XXX (1894) 80.

Jambosa vulgaris DC. Prodr. III (1828) 286; Bot. Mag. (1834) t. 3356.

1898 (Ern. Dewèvre). — Congo (Ern. Dew.). — V : Kimuenza (Luja); Kisantu (Gill.).

OBS. — Cultivé à Galiema [V] (Pyn. 142).

***Eugenia Laurentii* Engl.** in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 288; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 326.

1895 (Ém. Laurent). — Congo (Ém. Laur.). — V : entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 3716).

***Eugenia uniflora** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 470; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 359.

E. *Michelii* Lam. Encycl. méth. Bot. III (1789) 203; DC. Prodr. III 263; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 437; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 160 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 326.

Plinia pedunculata L. f. Mant. pl. (1767) 253; Bot. Mag. (1800) t. 473.

1904 (Ém. Laurent). — Cultivé en 1904 à Nouvelle-Anvers [IX] (Ém. et M. Laur.) et à Eala [VIII] (M. Laur. 1280).

SYZYGIUM Gaertn.

Syzygium cordatum Hochst. ex Sond. in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II (1862) 521; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 288; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 95.

Eugenia — *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 438; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 360.

S. cordifolium *Klotzsch.* in *Peters.* Reise n. Mossamb. (1862) 63, t. 11.

1892 (Jul. Cornet). — V : bassin de la Sele (But.). — XVI : plateau du Katanga (Corn.; Verd.).

Syzygium owariense [*P. Beauv.*] *Benth.* in *Hook. f.* Fl. Niger (1849) 359; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 278; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 88; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 95 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 326.

Eugenia — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 20, t. 70; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 438; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 130; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 81 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 753].

Jambosa — DC. Prodr. III (1828) 287.

Zyzygium guineense *Guill.* et *Perr.* Fl. Seneg. tent. (1833) 315, t. 72.

Eugenia — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 359.

1863 (R. Burton). — Congo (Burt.). — I : Moanda (Gill.). — IV : Kitobola (Pyn.); Nord-Manyanga (Cabra-Michel). — V : Léopoldville (Gill.); Chenal (Ém. Laur.); Lemfu (But.); bassin de la Sele (Pyn.); Kisantu; env. de Kimuenza (Gill.); Kisantu, Makela (Van Houtte); Lukolela (Pyn.); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.); env. du Lac Léopold II (Body). — VIII : Eala et env. (M. Laur.); Coquilhatville (Dew.); Basankusu (Brun.); Mondjo (Pyn.). — IX : Bangala (Dew.). — XI : Basoko (M. Laur.). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XV : bord de La Lubi (Ém. et M. Laur.); Limbutu (M. Laur.); rég. de Mukenze (Pg.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.). — Noms vern. : **lcasagne** [Bangala] (Dew.); **lendu**; **Mukulumbi** [Bangala] (Sap.); **Mokulu**; **Mokulo** [Kwilu] (Sap.); **Mufinsa**; **Biabilondo**; **Mutanea-Gommo** (Verd.).

PETERSIA Welw.

Petersia africana Welw. ex *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. I (1865) 721; *Laws.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 439; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 362; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 89; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 295.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.). — VI : Madibi (Leser.). — Noms vern. : **Nimengu**; **Mombinxo** [Lukolela]; **Mompoco** [Lulanga] (Dew.).

OBS. 1. — Des essais de plantation d'*Eucalyptus globulus* ont été tentés dans le Bas-Congo (conf. *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 175-198.

OBS. 2. — L'*Eucalyptus robusta* Sm. a été introduit de semis à Boma (Pyn.). [conf. *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 326].

OBS. 3. — L'*Eucalyptus viminalis* Labill., introduit en 1895, commence à se répandre dans les villages autour de Kisantu (J. Gillet); *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 80 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 752].

NAPOLEONAEA P. Beauv.

Napoleonaea imperialis P. Beauv. ex Fr. Fisch. in *Mém. Soc. Natural. Mosc.* I (1806) 92; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 362.

Napoleona — P. Beauv. *Fl. d'Oware*, II (1807) 29, t. 78; *DC. Prodr.* VIII, 550; *Laws. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 439; *Miers* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, I (1875) 7, t. 1, fig. 1 et t. 3, fig. 1-24; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 130; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 21 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 89; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo* (1906) 295; II (1908) 324.

N. Heudelotii Juss. in *Annal. sci. nat. Sér. 3*, II (1854) 227, t. 4; *Miers* in *Trans. Linn. Soc. Sér. 2*, I (1875) 8, t. 3, fig. 25, 26.

N. Vogelii Planch. in *Hook. Niger Fl.* (1849) 361, t. 49, 50; *Miers* l. c. 9.

N. Whitfieldii Decne in *Rev. Hort.* (1853) 301, t. 10; *Miers* l. c., t. 1, fig. 2-7.

N. angolensis Welw. *Apont. phyto-geogr.* (1859) 571, 586; *Miers* l. c. 12, t. 1, fig. 8-12.

N. cuspidata Miers l. c. (1875) 10, t. 2, fig. 4-6.

N. Mannii Miers l. c. (1875) 11, t. 2, fig. 1-3.

1880 (von Mechow). — V : Kisantu et env. (Gill. 3388); Sanda (Odd.). — VI : bassin du Kwango (v. Mech.). — VIII : Eala (Pyn.). — XIII d : entre Matendi et Kibala (Dew.). — XV : Bena-Dibele (Luja); Kondue (Lederm.).

MELASTOMACEAE

OSBECKIA L.

Osbeckia albiflora Cogn. in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 21 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 90.

1896 (A. Dewèvre). — XV : env. de Mokoanga (Dew.).

Osbeckia Brazzaei Cogn. in *DC. Monog. Phan.* VII (1891) 335; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 9; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 327.

1906 (Hyac. Vanderyst). — V : Boko; Dembo; Kisantu (Vanderyst).

Osbeckia congolensis Cogn. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 95 et in *DC. Monog. Phan.* VII, 314; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 131; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 23, t. 12, fig. 1-9 et Reliq. Dewevr. (1901) 90; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 6; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 171; II (1907) 196.

1885 (R. Buettner). — V : route de Léopoldville à l'Équateur [1^{re} halte.] (Dew.); Léopoldville (Schlt.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimuenza (Gill.); Sanda (De Brouw.). — VI : Eïolo (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Haut-Lopori (Biel.). — XV : la Lulua, vers 6 1/2° (Pg. 943); le Kasai, vers 6 3/4° (Pg. 941); pays des Bashilange, vers 9 1/2° (Pg. 137); Butala (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Kibaka (Buett.); Golongo (Pyn.).

— — var. **robustior** Cogn. ll. cc. XXXI (1889) 95 et VII, 314, 1177; *Th. Dur. et Schinz* l. c. 131; *De Wild.* Miss. Laurent, (1906) 163 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 327 [*sphalm.* « robusta »].

1885 (R. Buettner). — V : Kwamouth (Ém. et M. Laur.); le Stanley-Pool (Hens); île de Bamon (Dem.); Léopoldville (Em. Duch.); entre Bolobo et Lukolela (Buett.); env. de Kisantu (Gill.). — VI : Dima (Sap.). — VII : env. du Lac Léopold II (Body). — VIII : Eala (Pyn.).

Osbeckia Crepiniana Cogn. in *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 23, t. 23, fig. 10, 11; *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 21; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 21 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 21] et Reliq. Dewevr. (1901) 90; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 171.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.). — Ind. non cl. : Gambi [Gombi?, IV] (Dew.).

Osbeckia drepanosepala Gilg in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 7; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 302.

1874 (Fr. Naumann.). — II : Ponta de Lenha (Naum.). — V : Dolo (Schlt. 12468).

GUYONIA Naud.

Guyonia intermedia Cogn. in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 30, t. 16.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn.).

TRISTEMMA Juss.

Tristemma Demeusei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 299.

1891 (F. Demeuse). — IV : Mont Bangu (Dem. 76).

Tristemma grandifolium [Cogn.] Gilg in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 26; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 165 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 329.

T. Schumacheri *Guill. et Perr.* var. — *Cogn. in DC. Monog. Phan. VII* (1891) 361.

T. incompletum *R. Br.* var. — *Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1898) 364.

1903 (Aug. Krekels). — VIII : Eala (M. Laur. 1931) — XI : env. de Yambuya (Sohl.). — XV : Isaka (Krek.).

— — var. **congolatum** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 329.

T. Schumacheri *Auct.; Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 132 pr. p.; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II* (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114]; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I* (1899) 20 et *Reliq. Dewevr.* (1900) 91 pr. p.; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 165 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 197.

1888 (Fr. Hens). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.). — IV : Lutete (Hens). — V : Kimuenza (Gill. 1979). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Motantum** (Sap.). — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1926). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 181); env. de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 938 a). — XV : Leki (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Ikaie** [Équateur]; **Ganga-Tibie** [Ikwangula]; **Kaido-Kom** [Kasongo] (Dew.).

Tristemma hirtum *Vent.* *Choix des pl.* (1803) 35 in adnot.; *P. Beauv. Fl. d'Oware, I* (1804) 94, t. 57; *Oliv. Fl. trop. Afr. II*, 446; *Cogn. in DC. Monog. Phan. VII*, 361; *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 26; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II* (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114].

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

Tristemma incompletum *R. Br.* in *Tuck. Congo Exped. Append.* (1818) 435; *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 25; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 364; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 329.

T. Schumacheri *Guill. et Perr.* *Fl. Seneg. tent.* (1833) 311; *Naud. in Annal. sci. nat. sér. 3, XIII*, 298 t. 6, fig. 6; *Benth. in Hook. Niger Fl.* 353; *Hook f. in Oliv. Fl. trop. Afr. II*, 446; *Cogn. in DC. Monog. Phan. VII*, 361, 1180; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 132 pr. p.; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 91 pr. p.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Shinganga (Dew. 302). — V : Léopoldville? (Schlt.).

Tristemma leiocalyx *Cogn. in DC. Monog. Phan. VII, add.* (1891) 1179; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 131; *De Wild. et Th. Dur. Ill. fl. Cgo* (1898) 27, t. 14 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 91; *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 24; *De Wild.*

Miss. Laurent (1905) 165 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 300; II (1908) 330.

1887 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 13); Kimuenza (Dew. 505; Gill. 1664); Sanda (Odd. in Gill. 3334). — IX a : entre Misa et Gongo (Ser. 302).— XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur).

Tristemma littorale *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 353; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 362; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 91; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 365; *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 25.

T. Schumacheri *Guill. et Perr.* var. — *Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 446.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kinshassa (Dew. 704).

Tristemma roseum *Gilg.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 24, t. 1, fig. J, a-b.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Kusumba [Mangbettu] (Schw. 3656).

Tristemma Verdickii *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1904) 219.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 621).

Tristemma vincoides *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 24.

1882? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 934, 936).

DINOPHORA *Benth.*

Dinophora spenneroides *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 555; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* VII, 384; *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 27, t. 1 H, fig. a-c; *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114].

1882? (P. Pogge). — Bas-Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); Sanda (De Brouw.). — VI : Madibi; Motanla [Kwilu] (Sap.). — XI : env. de Mogandjo (M. Laur.). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XV : Mukenge (Pg. 942, 944).

PHAEONEURON *Gilg.*

Phaeoneuron dicellandroides *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 35, t. 8, fig. B, a-n; *De Wild. Miss. Laurent* (1904) 166 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1907) 197; II (1908) 332.

Dinophora Thonneri *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 70 [B. S. B. B. XXXVII, 115] et *Pl. Thonnerianae* (1900) 31, t. 18.

1870 (G. Schweinfurth). — Bas-Congo (But.). — V : Kimuenza (Gill.). — VIII : Eala (Pyn. 1225, 1389, 1417); Ikenge (Huyghe); Bombimba [*Iapsu cal.* Bambula] (Pyn. 335; M. Laur. 1217). — IX a : Gali (Thonn. 26). — XII d : Kusumba [Mangbettu] (Schw. 3166). — XII c : Yakusu (Ém. et M. Laur.).

ANTHEROTOMA Hook. f.

Antherotoma Naudini *Hook. f.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. I (1862) 745; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 444; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 9; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 327.

Osbeckia Antherotoma Naud. in *Annal. sci. nat. Sér. 3, XIV* (1850) 66; *Cogn. in DC. Monog. Phan. VII*, 330; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 363.

1904 (A. Delpierre). — XII c : Niangara. — Nom vern. : Ninga (Delp.).

DISSOTIS Benth.

Dissotis aquatica *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 217.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : haut plateau du Katanga (Dew.).

Dissotis Autraniana *Cogn.* in *DC. Monog. Phan. VII, add.* (1891) 1180; *De Wild. et Th. Dur. Ill. fl. Cgo* (1899) 89, t. 45; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 13; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 164.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 32 pr. p.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.).

Dissotis Brazzaei *Cogn.* in *DC. Monog. Phan. VII* (1891) 371 et in *De Wild. et Th. Dur. Ill. fl. Cgo* (1898) 29, t. 15; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 132; *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo.* II (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114]; *Contr. fl. Cgo.* I (1899) 20; II (1900) 22 et *Pl. Gilletiana*, II (1901) 21 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 21]; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 18 in syn.; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1904) 191, 278; II (1907) 197, (1908) 327.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.); Luvituku (Dem. 66); Lutete (Hens, A. 45). — V : Léopoldville et env. (Schlt.; Luja); env. de Sabuka (Ém. et M. Laur.); env. de Dembo (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte in Gill. 3459); Kisantu (Gill. 684, 704); Maydis (Odd.); Kiduma (Vanderyst). — VI : riv. Sanga (Cabra). — XII b : entre Bima et Bambili (Ser. 216).

Dissotis capitata [*Vahl*] *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 449; *Cogn. in DC. Monog. Phan. VII*, 365; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 132; *Hiern Cat. Welw. Pl. I²*, 365; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 13; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1904) 171; II (1907) 197, (1908) 171.

Melastoma capitatum Vahl Eclog. pl. (1796) 45.

Heterotis — Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 352.

Tristemma erectum Guill. et Perr. Fl. Seneg. tent. (1833) 312.

Melastomastrum — Naud. in Annal. sc. nat. Sér. 3, XIII (1849) 296, t. 5, fig. 4.

1882? (P. Pogge). — V : le Stanley-Pool (Ém. Laur.); Kisantu; env. de Kimuenza (Gill.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.); Mayidis (Odd.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.); le Sankuru (Ém. Laur.); Musumba (Pg. 180). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.); Lupundi (Dem.).

D. capitata var. **Vogelii** [Benth.] Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 450; *Cogn.* l. c. VII, 365; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 20; *Gilg* in *Engl.* l. c. II, 13; *Hiern* l. c. 366.

1896 (Ém. Laurent). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.).

Dissotis cordata Gilg in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 17, t. 3 fig. B.

1876? (P. Pogge). — XV : pays des Bashilange au bord de la Lulua, vers 9½° (Pg. 134).

Dissotis cornifolia [Benth.] Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr. II (1871) 364; *Cogn.* in DC. Monog. Phan. VII, 364; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 13; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 327.

Heterotis — Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 351.

Tristemma — Triana in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 57.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Efukwa-Kombi (M. Laur. 1930).

Dissotis debilis [Sond.] Triana in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58; *Cogn.* in DC. Monog. Phan. VII, 367; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 20; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 14.

Osbeckia — Sond. in Linnaea, XXIII (1850) 47.

D. lanceolata *Cogn.* in DC. l. c. VII (1891) 366; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 22]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 366; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 299.

D. villosa *Engl.* [non Hook. f.] in *Engl.* Jahrb. VIII (1887) 62; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 135.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : Kimuenza (Gill 770); Sanda (Odd.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel, 27). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Dissotis decumbens [P. Beauv.] Triana in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58; *Cogn.* in DC. Monog. Phan. VII, 368; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 69 [B. S. B. B. XXXVII, 114]; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 15; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 366; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 171, (1906) 299; II (1907) 197, (1908) 327.

Melastoma decumbens *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 69, t. 41.

D. laevis *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 451; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 366; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 299.

1895 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Cabra). — III : ravin du Diable (Dem. 36). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Dembo (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Ém. Laur.); Eala (M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XII : route de Bambili à Amadis (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

D. decumbens var. **minor** *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII (1891) 369; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 133; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 21 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 21].

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (Gill. 609). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 164).

Dissotis falcipila *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 23, t. 3, fig. A, a-b.

1876? (P. Pogge). — XV : Musumba (Pg. 132).

Dissotis Gilgiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 217.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : haut plateau du Katanga, 1000^m d'alt. (Verd.).

— — var. **petiolata** *De Wild.* l. c. (1903) 218.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : Kaleala (Verd. 113).

Dissotis Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1896) 298.

1900 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 1816). — V : Kinanga (Odd. in Gill. 1873).

Dissotis gracilis *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII (1891) 366; *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 302; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 14.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville; Dolo (Schlt.).

Dissotis Hensii *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII (1891) 372; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 133; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 92 et Ill. fl. Cgo (1898) 19, t. 10; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 19; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 164 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 171; II (1908) 328.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Gill. 1891). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi; riv. Kwilu (Sap.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur (Dew. 557); Eala et env. (M. Laur. 63, 723; Pyn. 731, 1093); Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : Bangala (Hens, C. 129). — XIII d : Elungu (Dew. 1059 b). — Nomsvern. : **Losele** [Madibi]; **Motoaton** [Kwilu]; **Kondoku** [Bangala] (Sap.).

Dissotis incana [*E. Mey.*] *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) 58, t. 4, fig. 44 d; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 370; *Gilg* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 295 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 17; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 298; II (1908) 328.

Osbeckia — *E. Mey.* ex *Hochst.* in *Walp. Repert. bot.* V (1858) 708.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2320). — XV : au S. de Tshitadi (Lescr. 318).

Dissotis Irvingiana *Hook.* in Bot. Mag. (1859) t. 5149; *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58, t. 4, fig. 44 c; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 453; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 133; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 375; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 20.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

Dissotis macrocarpa *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 18; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 328.

1904 (Gust. Delpierre). — XII : l'Uele (Delp.). — XII b : route de Bima à Bambilili (Ser. 229).

Dissotis multiflora [*Sm.*] *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 412; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 18, t. 2, fig. F, a-d; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 164 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 328.

Osbeckia — *Sm.* in *Rees Cyclop.* XXV (1814) n. 7; *DC.* Prodr. III, 143; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 364; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 332 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 31 [B. S. B. B. XXXVI, 17].

1870 (G. Schweinfurth). — Bords du Congo (Ern. Dew.). — V : Sabuka (Ëm. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville; Irebu (Schlt.); Eala (Pyn. 1140); Lulanga (Ëm. et M. Laur.; Pyn. 75). — XII d : pays des Mangbettu, sur la rive gauche de l'Uele (Schw.). — XV : Musumba (Pg. 133, 139, 141).

Dissotis phaeotricha [*Hochst.*] *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 367; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* II [Melast.] (1898) 14 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 295; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 299; II (1908) 328.

Osbeckia — *Hochst.* in *Walp. Repert. bot.* V (1816) 708.

D. villosa *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 450; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 367; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 135.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 3731). — XV : Musumba (Pg. 131). — XVI : le Katanga (Verd.).

Dissotis rotundifolia [*Sm.*] *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 58; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 369; *Th. Dur. et Schinz*

Étud. fl. Cgo (1896) 134; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 15; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 328.

Osbeckia rotundifolia Sm. in *Rees Cyclop. XXV* (1822) n. 20.

Melastoma plumosum D. Don in *Mem. Wern. Soc. IV* (1823) 291; *DC. Prodr. III*, 147.

Heterotis — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 348.

Dissotis — *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr. II* (1871) 452.

D. prostrata Triana l. c. (1871) 58; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr. II*, 452; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1873) 73, t. 39; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan. VII*, 369; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 134; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I* (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 22].

Melastoma — *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 220.

Heterotis — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 349.

Osbeckia zanzibarensis Naud. in *Annal. sci. nat. Sér. 3, XIV* (1850) 55, t. 7, fig. 5.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 164). — XII a : route de Buta à Bima (Ser. 51). — XII d : Munza (Schw.). — Ind. non cl. : Lulunka (Dem.).

Dissotis Schweinfurthii *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 21.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3445).

Dissotis segregata *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 350 et in *Oliv. Fl. trop. Afr. II*, 448; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 134; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan. VII*, 363; *Gilg.* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 12 (1); *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II* (1900) 22; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 164.

Heterotis — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 350.

Tristemma — *Triana* in *Trans. Linn. Soc. XXVIII* (1871) 56.

1882 (P. Pogge). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Kisantu (Gill.); Suata (Buett.). — VII : Kiri (Em. et M. Laur.). — VIII : Équateur (Dew.). — XV : pays des Bashilange (Pg. 935).

Dissotis Sereti *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 328.

1906 (F. Seret). — XII d : territ. de Bokoyo (Ser. 587).

Dissotis Thollonii *Cogn. ex Buett.* in *Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI* (1889) 96 et in *DC. Monog. Phan. VII* (1891) 373 et 1180; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 134; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 19; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 165 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1904) 171, (1906) 298; *II* (1907) 197, (1908) 329.

(1) M. Gilg [l. c.] indique cette espèce comme ayant été récoltée à Vista, dans le Bas-Congo, par Chaves, en 1885. Cette localité nous est inconnue.

1885 (R. Buettner). — Bords du Congo (Buett.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 6); Sabuka (Luja); Léopoldville (Ém. Laur.); Dolo (Schlt.); Sanda (De Brouw.); Boko (Vanderyst); Kimuenza (Ém. Laur.). — VI : Plateau de Kimbele (Cabra-Michel). — XV : Kapulumba (Lescr.).

Dissotis Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 248.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : haut plateau du Katanga (Verd.); Lukafu (Verd. 621 b).

CALVOA Hook. f.

Calvoa sessiliflora *Cogn.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 22 et Reliq. Dewevr. (1901) 92; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 172; II (1907) 198, (1908) 331 et Miss. Laurent (1905) 165, t. 43, 44.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala et env. (M. Laur.; Pyn. 1452). — XIII d : Kasuku (Dew. 1064). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : forêt de Giard (Body).

? **Calvoa orientalis** *Taub.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 296; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 32, t. 5, fig. D, a-c.

1870 (G. Schweinfurth). — XII ? : pays des Uando à Diagbe (Schw. 3116).

Cette localité est-elle réellement dans le Congo belge?

AMPHIBLEMMA Naud. (1)

Amphiblemma setosum *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 456; *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 79; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 527; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 135; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 29.

1882 ? (P. Pogge). — XIII d : Nyangwe (Pg.).

Amphiblemma Wildemannianum *Cogn.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 22; Ill. fl. Cgo (1900) 143, t. 72 et Reliq. Dewevr. (1901) 92; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 330, t. 79.

1891 (F. Demeuse). — V : Sadi (Dem.); Kisantu (Gill.).

OBS. 1. — Dewèvre a récolté cette espèce au N. du Stanley-Pool [Congo franç.] (Dew. 718).

OBS. 2. — L'*Amphiblemma ciliatum* *Cogn.* est signalé, avec doute, à Bingila [II a] (P. Dupuis) [*De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 92, in obs.].

(1) **Amphiblemma acaule** *Cogn.* in Bolet. Soc. Brot. XI (1892-93) 89, *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 29. — Pays des Bashilange [distr. de Lem-pangulu] (Senz. Marq. 211). — Cette localité est-elle sur le territoire congolais?

CINCINNOBOTRYS Gilg.

Cincinnobotrys Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 330, t. 89.

1906 (F. Seret). — XII c : route de Runga à Poko (Ser. 645).

DICELLANDRA Hook. f.

Dicellandra Barteri *Hook. f.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. I (1865) 757 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 459; *Triana* in Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 168, t. 7, fig. 85 b; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. VII, 516 pr. p.; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 33; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 300; II (1907) 199, (1908) 332.

1902 (L. Gentil). — VIII : Eala (M. Laur. 1924, 1927); Lokelenge (Brun. 40). — XVI : route du Lomami au Lualaba (Gent.).

Obs. — M. Gilg [l. c.] rapporte le *D. Barteri* de Kusumba [Schw.] au *Phaseoloneuron dicellandroides*.

— — var. *runcinata* *De Wild.* l. c. II (1908) 332.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 776).

SAKERSIA Hook. f.

Sakersia Laurentii *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 23; Ill. fl. Cgo (1900) 135, t. 68 et Reliq. Dewevr. (1901) 93; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 172 (1906) 300; II (1907) 198, (1908) 331.

1896 (Ém. Laurent). — Congo (Dew.). — V : entre Kisantu et le Kwango (But.). — VIII : Équateur (Pyn. 316); env. d'Eala (M. Laur. 1933); env. de Bamania (M. Laur. 1925). — IX : env. de Bumba (Ém. Laur.; Ser. 10). — XV : rég. de la Loanje (Gent. 27).

— — var. *cuneata* *De Wild.* l. c. II (1908) 332.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 938; Pyn. 1051).

Sakersia strigosa *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 23 et Reliq. Dewevr. (1901) 93; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 172, (1906) 300.

1895 (A. Dewèvre, Ém. Laurent). — V : le Stanley-Pool (Ém. Laur.); Kimuenza (Dew. 501; Gill. 638); Sanda (Odd.).

MEDINILLA Gaudich.

Medinilla africana Cogn. in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 24.

1893 ? (Ém. Laurent). — Congo (Ém. Laur.).

MEMECYLON L.

Memecylon Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 172.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 895).

Memecylon jasminoides Gilg in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 39.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : village Bongwa [Mangbettu] (Schw. 3609).

Memecylon Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 332.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Botuma [Ikelemba] (M. Laur. 1929).

Memecylon leucocarpum Gilg in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 40; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 333.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1932).

Memecylon longicauda Gilg in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 40, t. 10 E.; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 166 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 333.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.).

Memecylon Mannii Hook. f. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 461; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 21; Cogn. in *DC.* Monog. Phan. VII, 1132; Gilg in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 39; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 333.

1896 (Eug. Wilwerth). — VIII : Eala (Pyn. 602, 1114, 1258; M. Laur. 1201). — IX : Upoto (Wilw.).

Memecylon membranifolium Hook. f. in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 462; Cogn. in *DC.* Monog. Phan. VII, 1135; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 136; Gilg in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. II [Melast.] (1898) 41.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Zenze (Ém. Laurent).

Memecylon myrianthum *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 44 et in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 303; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 166 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 333.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12526); Léopoldville (Pyn.); en aval de Bolobo (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.; M. Laur. 967).

Memecylon Poggei *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 43.

1882? (P. Pogge). — XV : pays des Bashilange [entre la Lulua et le Kasai] (Pg. 1066).

Memecylon polyanthemos *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr. II* (1871) 463; *Cogn. in DC. Monog. Phan. VII*, 1160; *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 44.

M. Afzelii *R. Br. ex Triana* in *Trans. Linn. Soc. XXVIII* (1871) 155.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 940).

— — var. **grandifolium** *Cogn. in DC. Monog. Phan. VII* (1891) 1161; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 136.

1880 (von Mechow). — VI : rives du Kwango (Mech. 515).

Memecylon Pynaertii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 334.

1906 (L. Pynaert). — V : Lukolela (Pyn. 251).

Memecylon strychnoides *Bak. in Kew Bull.* (1895) 105; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1903) 66.

M. Millenii *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* [Melast.] (1898) 38.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Memecylon tamifolium *Gilg ex De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 94 (err. cal. *ternifolium*) [nom. tant.].

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga. — Nom vern. : Tidi-Tidi (Dew. 296).

Memecylon Vogelii *Naud. in Annal. sci. nat. Sér. 3, XVIII* (1852) 263, 282; *Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr. II*, 462; *Cogn. in DC. Monog. Phan. VII*, 1138; *Gilg in Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. II* (1898) 43; *Engl. in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII* (1908) 829.

Spathandra memecyloides Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 357.

1882? (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

LYTHRACEAE

ROOTALA L.

Rotala fontinalis *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 468; *Koehne* in *Engl. Jahrb.* I (1880) 172; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 136; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 372.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

OBS. — La synonymie donnée dans *Th. Dur.* et *Schinz* [l. c.] doit être retranchée; elle se rapporte au *R. filiformis* *Hiern*.

AMMANIA *Houst.*

Ammania auriculata *Willd.* *Hort. Berol.* (1806) t. 7; *DC. Prodr.* III, 80; *Clarke* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* II, 570; *Koehne* in *Engl. Jahrb.* I (1880) 244; *Engl. Pfl. Ost.-Afr.* 285; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 94.

A. senegalensis *L.* var. — *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 477 et *Cat. Welw. Pl. I*, 373.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

Ammania multiflora *Roxb.* *Hort. Bengal.* (1814) 11 et *Fl. Ind.* I, 447; *Spreng. Syst. veget.* I, 444; *DC. Prodr.* III, 79; *Koehne* in *Engl. Jahrb.* I (1880) 247; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 137.

A. senegalensis *Lam.* var. — *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 477 et *Cat. Welw. Pl. I*, 373.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Naum.).

Ammania salicifolia *Monti* in *Comm. Instit. Bonon.* I (1767) 112 cum icone; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 478; *Clarke* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* II, 569; *Engl. Pfl. Ost.-Afr.* 28; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 137; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 374.

A. aegyptiaca *Willd.* *Hort. Berol.* (1803) t. 6; *DC. Prodr.* III, 78.

A. verticillata *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* I (1783) 131 et *Illustr. gener. Encycl.* I, t. 77, fig. 3; *DC. Prodr.* III, 79.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Ammania senegalensis *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* I (1791) 311, t. 77, fig. 2; *DC. Prodr.* III, 77; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 477 et *Cat. Welw. Pl. I*, 373; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 259.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

LAWSONIA L.

Lawsonia inermis L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 349; *Gilg* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 286.

L. alba *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) 106; *Sommer.* Voy. Haute- et Basse-Égypte, I (1798) 291, t. 4; *DC.* Prodr. III, 91; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 483; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 94.

1893 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — XIII d : Nyangwe (Dew.).

ONAGRARIACEAE

JUSSIUEA L.

Jussieua linifolia *Vahl* Eclog. Amer. II (1798) 32; *DC.* Prodr. III, 55; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 489; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 296; *M. Micheli* in *Mart. Fl. Brasil.* XIII², 163, t. 33; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 138; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 379; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 23 et Reliq. Dewevr. (1901) 95; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 259, (1907) 417 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 63, (1908) 334.

J. acuminata *Benth.* [non *Sw.*] in *Hook.* Niger Fl. (1849) 343; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 296; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 489; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 137.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — II : Boma (Dew.); Sisia (Dup.). — V : Léopoldville (Schit.; Duch.); Sabuka (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : Kingunshi (Buett.). — VIII : Coquilhatville et env. (Dem.; M. Laur.). — IX : Busa (Em. et M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Pyn.). — XV : Butala (Em. et M. Laur.).

Jussieua pilosa *Kunth* in *Humb. et Bonpl.* Nov. gen. et sp. VI (1823) 101, t. 532 b; *DC.* Prodr. III, 53; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 488; *M. Micheli* in *Mart. Fl. Brasil.* XIII², 161; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 296; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 138; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 379; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 95; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 259, (1907) 417 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 334.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II : Zambi (Dew.). — IV : Luvi-tuku (Em. et M. Laur.); Kikosi; Kinduma (Vanderyst). — V : Sabuka (M. Laur.); Tamo (Hens); Kisantu (Gill.). — VI : Kingunshi (Buett.). — VII : la Fini; Kutu (Em. et M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Em. et M. Laur.).

Jussieua repens L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 388; *Ch. Martins* Mém. Juss.

Le *Punica granatum* L. [*Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 486] est cultivé à Kimuenza (Gill.) et aussi à Stanleyville, par les Arabes [*De Wild. Miss. Laurent* (1907) 416].

(1866) 22, t. 1-4; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 296; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.* 379.

J. diffusa Forsk. *Fl. Aegypt.-Arab.* (1775) 210; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 488; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 416.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — IX : Itimbiri (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Jussieua suffruticosa L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) 838; *DC. Prodr.* III, 58; *Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* I, 587; *M. Micheli in Mart. Fl. Brasil.* XIII², 169; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 296; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 138; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.* 380; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 23 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 95.

J. villosa Lam. *Encycl. méth. Bot.* III (1789) 331 et *Illustr. genr. Encycl.* II, t. 280, fig. 3; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 489.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens). — II : Boma (Dew.). — V : Léopoldville (Luja). — XIV : Uvira (Deb.).

LUDWIGIA L.

Ludwigia prostrata Roxb. *Hort. Bengal.* (1814) 11 et *Fl. Ind.* II, 420; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 490; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 20; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 22 [B. *Herb. Boiss. Sér.* 2, I, 22] et *Pl. Thonnerianae* (1900) 32; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 259, (1907) 417 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 61, (1908) 334.

Isnardia — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 250; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.* 381.

1896 (Fr. Thonner). — IV : Gongolo (Vanderyst). — V : Léopoldville; Kinkosi (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VI : rives du Kwilu (Sap.). — VII : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — IX : Bobi (Thonn.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.).

SAMYDACEAE

CASEARIA Jacq.

Casearia congensis Gilg in *Engl. Jahrb.* XL (1908) 513.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Bolobo et Lukolela (Dew. 734).

HOMALIUM Jacq.

Homalium africanum [*Hook. f.*] Benth. in *Journ. Linn. Soc.* IV (1860) 35; *Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 497; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 133; *Gilg in Engl. Jahrb.* XL (1908) 488.

Blackwellia — *Hook. f. in Hook. Niger Fl.* (1849) 361.

1862 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Homalium bullatum *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 492; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 316.

1904 (Éd. Lescauwæet). — XV : Kondue (Lederer.); Ikoka (Leser. 342).

Homalium Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 9 [B. S. B. B. XXXVIII², 128] et Reliq. Dewevr. (1901) 95; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 489.

1896 (A. Dewèvre). — IX : Bangala (Dew. 861).

Homalium ealaense *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 413 et Étud. Fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 316; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 490.

1893 (Marc. Laurent). — VIII : forêts des env. d'Eala (M. Laur. 81, 1100, 1132, 2017; Pyn. 464, 941, 1039, 1541, 1581); le long du Ruki. — Noms vern. : **Pongia**; **Lofandji-Joku** (M. Laur. 139); entre Coquilhatville et Lulanga (Pyn. 775); Basankusu (Brun.).

Homalium Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 46; II (1907) 196; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 493.

1902 (L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2797).

Homalium Gilletii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 414 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 316; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 491.

1903 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 3396). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 2015).

— — var. **sessile** *De Wild.* l. c. (1907) 415; *Gilg* l. c. (1908) 491.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Mondjo (Pyn. 309).

Homalium Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 412 et Étud. Fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 490.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Pyn. 513). — XI : entre Basoko et Limputu (M. Laur. 956).

Homalium molle *Stapf* in Journ. Linn. Soc. XXXVII (1905) 100; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 2016). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

Homalium setulosum *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 497; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317.

H. Abdessammadii *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Aschers.* et *Schweinf.*] Contr. fl. Cgo, II (1900) 22.

1899 (Éd. Luja). — IX : Luozi (Luja, 428).

Homalium stipulaceum *Welw.* ex *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 498; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 381; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 22; Pl. Gilletianae, II (1901) 81 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 753]; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 415 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 493.

1895 (A. Dewèvre). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1528); Zanza sur la Luzumu (Gill. 1096). — XV : Batempa (M. Laur.).

Homalium Wildemannianum *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 497; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 317.

H. Abdessammadii *De Wild.* [non *Aschers.* et *Schweinf.*]. Étud. fl. Kat. (1903) 93.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lofoi (Verd. 130); Lukafu (Verd. 123). — Nom vern. : Munkwasa (Verd.).

BYRSANTHUS Guill.

Byrsanthus Brownii *Guill.* in *Deless.* Icon. select. pl. III (1837) 30, t. 52; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 487.

B. epigynus *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 499; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 139; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 96; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 316.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu (Hens); env. de Gombi-Lutete (Dem.; Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Léopoldville et de Bolobo (Pyn.); Lukolela (Hens; Pyn. 196); Kimuenza (Gill.). — IX : pays des Bangala (Dem. 2).

TURNERACEAE

WORMSKIOLDIA Schum. et Thonn.

Wormskioldia lobata *Urban* [Monog. Fam. Turner.] in Jahrb. bot. Gart. Berlin, II (1883) 52; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 139; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 280; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 391; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 71 [B. S. B. B. XXXVII, 116] et Reliq. Dewevr. (1901) 96; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 169 et Miss. Laurent (1904) 158.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kimuenza (Gill.); Sanda (Odd.). — XVI : Kapanpa [Tanganika] (Desc.).

Wormskioldia pilosa [Willd.] Schweinf. ex Urban [Monog. Fam. Turner.] in Jahrb. bot. Gart. Berlin, II (1883) 54; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 139.

Raphanus pilosus Willd. Sp. pl. III (1801) 562.

W. heterophylla Schumach. et Thonn. in DC. Prodr. I (1824) 240 in syn. et Beskr. Guin. Pl. (1827) 165; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 502.

Cleome raphanoides DC. l. c. I (1824) 240.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

PASSIFLORACEAE

PASSIFLORA L.

Passiflora foetida L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 959; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 530 in obs.; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 94; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 169.

1903 (J. Gillet). — II : Boma (Gill.; Ém. Laur.).

Passiflora quadrangularis L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 1248; *Jacq.* Stirp. Amer. hist. t. 218; Bot. Reg. I, t. 14; *Mast.* in *Mart.* Fl. Brasil. XIII¹, 595 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 520 in obs.; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 386; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 23; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 159.

1897? (Ern. Dewèvre). — Congo (Ern. Dew.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Ém. Laur.).

PAROPSIA Noronha.

Paropsia Brazzeana Baill. in B. S. Linn. Paris, I (1886) 611; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 472.

1882? (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg. 951).

Paropsia grewioides Welw. ex *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 505; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 383; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 315; *Gilg* in Engl. Jahrb. XL (1908) 472.

P. Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 21 [B. S. B. B. XXXVIII², 191]; Pl. Gilletianae, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 22] et Reliq. Dewevr. (1901) 97.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 271); Kimuenza (Dew. 497).

— — var. **condensata** [*De Wild.*] *Th. et Hél. Dur.*

P. Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* var. — *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 64.

1901 (R. Butayo). — V : Lemfu (But. in Gill. 2267).

Paropsia reticulata *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XIV (1891) 391 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* III, 6a, 26, fig. D-F; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 24 et *Pl. Gilletianae*, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 22]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 64, (1904) 169, (1906) 294; II (1908) 315.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (But. in Gill. 3508). — V : env. de Kwamouth (Biel.); env. de Lula-Lumene ? (Hendr. in Gill. 3100); Lisha (Dem.); Sauda (Odd. et de Brouw. in Gill. 3003, 3103); Kisantu (Gill. 70); entre Kisantu et le Kwango; entre Kisantu et Popokabaka (But. in Gill. 2296). — VI : plateau de Kimbali [entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra-Michel, 76); Madibi (Sap.). — Ind. non cl. : vallée du Lomami (Desc.). — Noms vern. : **Mokasi** [Bangala]. — Au Kwilu et chez les Bangala, les poils de la plante s'appellent **Mpoto** ou **Mputo**.

— — var. **ovatifolia** *Engl.* l. c. XIV (1891) 391; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 140.

1882? (P. Pogge). — XV : loco haud indic. (Pg.).

BARTERIA Hook f.

Barteria Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 8 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 97; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 247-249 cum. xylogr. 32 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 316; *Gilg in Engl. Jahrb.* XL (1908) 480.

1896 (A. Dewèvre). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — IX : Bangala (Hens); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XV : falaises de Batempa; le Sankuru; Kondue; Bena-Dibele; Olombo; Bombaie (Ém. et M. Laur.); Bena-Makima (Lescr. 270).

Barteria fistulosa *Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 511; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 250-258, t. 91, 92, fig. 33-36 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 57, (1908) 316.

1903 (Éd. Lescrauwaet). — Bas-Congo (Odd.). — V : Tumba (Ém. et M. Laur.). — VI : Madibi (Lescr. 109); Dima (Ém. et M. Laur.; Lescr.; Sap.). — VII : Lac Léopold II (Body); Ibali; Inongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Betutu (Brun.); Botomon (M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Romée (Kohl). — XV : Mange; Lomkala; Olombo (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Bachi-Shombe (Lescr.). — Noms vern. : **Monku'ono**; **MaKonkomo** [Bangala]; **Okakumbu** [Lac Léopold II].

— — var. **macrophylla** *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 98.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

Barteria nigritana *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* V (1860) 15, t. 2; *Mast. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 510.

Le type habite la région du Niger.

B. nigritana var. **uniflora** *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 24 et Pl. Gilletianae, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 22]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 169.

1899 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (But.). — V : Kisantu (Gill.). — Ind. non cl. : forêt de Talavanje (Cabra).

ADENIA Forsk.

Adenia lobata [*Jacq.*] *Engl.* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 375; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 384; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 243, t. 59, 60, fig. 31 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 204.

Modecca — *Jacq.* Fragm. bot. (1809) 12, t. 131; *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 516; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 158.

1889 (J. Gillet). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); Tshumbiri (Ém. et M. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.). — XV : Pangu (Ém. et M. Laur.).

— — var. **elegans** *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 394.

Modecca lobata Jacq. var. — *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 517; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 22 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 22] et Reliq. Dewevr. (1901) 98.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Kemba (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

Adenia panduriformis *Engl.* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 376; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 139.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

Adenia Schweinfurthii *Engl.* in Engl. Jahrb. XIV (1891) 377; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 140.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Adenia venenata *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 77; *Engl.* in Engl. Jahrb. XIX (1891) 379; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 23.

Modecca abyssinica Hochst. in *Schimp.* Pl. Abyss. Sect. 3, n. 1572 et in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 297.

1896 (Ém. Laurent). — IX : Upoto (Ém. Laur.).

OPHIOCAULON Hook. f.

Ophiocaulon apiculatum *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 8 [B. S. B. B. XXXVIII², 86]; Pl. Gilletianae, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23] et Reliq. Dewevr. (1901) 99; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 258.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VII : Ibali (Ém. Laur.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew.).

Ophiocaulon cissampeloides [*Planch.*] *Mast.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 518; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 140; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 385; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 258.

Modecca — *Planch.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 365.

1883 (P. Pogge). — II a : Gandayanga (Cabra). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XV : Mukenge (Pg.).

Ophiocaulon Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 8 [B. S. B. B. XXXVIII², 85] et Reliq. Dewevr. (1901) 99; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 294.

1895 (A. Dewèvre). — V : env. de Bolobo (Dew.); env. de Sanda (Odd.).

Ophiocaulon lanceolatum *Engl.* in *Engl.* Jahrb. XIV (1891) 386; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 140.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).

Ophiocaulon Poggei *Engl.* in *Engl.* Jahrb. XIV (1891) 386; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 140.

1883 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).

Ophiocaulon reticulatum *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 9 [B. S. B. B. XXXVIII², 86] et Reliq. Dewevr. (1901) 100; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 158.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Gombi (Dew.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

CARICA L.

Carica Papaya *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1036; *Lindl.* in *Bot. Reg* VI, t. 459; *Hook.* in *Bot. Mag.* (1829) t. 2898-2899; *Ficalho* Pl. Uteis, 185; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 386; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 23; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 229-250.

Papaya vulgaris *DC.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. V (1804) 2; *A. DC.* in *DC.* Prodr. XV¹, 414.

1893 (Ém. Laurent). — Très répandu, à l'état cultivé, dans tout le Congo (Ém. Laur.; Éd. Luja; Fr. Thonn.). — V : Kisantu (Gill.). — XI : Yambuli (Ém. Laur.).

CUCURBITACEAE

TELFAIREA Hook.

Telfairea pedata [*Sm.*] *Hook.* in *Bot. Mag.* (1827) t. 2751-2752; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 523; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan.

III, 350; *Muell.* et *Pax* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* B, 231; C, 397; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 387; *Heck.* in *Rev. cult. colon.* (1903) 107; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 153-158, fig. 9 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 83, t. 35.

Feuillaea pedata Sm. ex *Sims* in *Bot. Mag.* (1826) t. 2681.

1904 (Ed. Luja). — XV : rég. du Kasai (Luja).

TROCHOMERIA Hook. f.

Trochomeria macrocarpa *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 524; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III, 398; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 388.

Le type croît dans l'Afrique australe.

— — var. **Welwitschii** *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 399; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 388; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 161.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 153).

ADENOPUS Benth.

Adenopus breviflorus *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 372; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 528 (excl. syn. *Lagen. masca-rena*); *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III, 412; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 141; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 389; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo* II (1900) 24 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 101.

Lagenaria angolensis *Naud.* n *Annal. sci. nat. Sér.* 5; V (1866) 10.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II : Boma (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Dem.).

PEPONIA Naud.

Peponia bracteata *Cogn.* in *Bolet. Soc. Brot.* X (1893) 119; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 324.

1904 (Éd. Lesclauwaet). — VI : env. de Dima [rive gauche du Kasai] (Lescl.).

— — var. **hirsuta** *Cogn.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 26; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 210; II (1907) 205 et *Miss. Laurent* (1905) 188.

1896 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.); Benza-Masola (Ém. Laur.). — V : Léopoldville (Pyn.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.).

COGNIAUXIA Baill.

Cogniauxia cordifolia Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. 3, XIV (1887) 350; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 141; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 24; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 304; II (1907) 205.

1885 (R. Buettner). — Congo (Cabra). — V : Kisantu; Dembo (Gill.). — VI : Madibi (Lescr.); Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — IX : Monzambi (Brun. in M. Laur. 1497).

Cogniauxia podolaena Baill. in B. S. Linn. Paris, I (1884) 424; *Cogn.* in Bull. Acad. Belg. Sér. 3, XVI (1888) 236; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 141; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 24; Ill. fl. Cgo (1898) 11, t. 6 et Pl. Gilletianae, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 187 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 324; (1907) 82, 204.

Luffa ? Batesii C. H. Wright in Hook. Icon. pl. XXV (1896) t. 2490 et in Kew Bull. (1896) 161 [fide cl. Cogniaux].

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Cabra). — II a : forêts du Mayumbe (Ém. Laur.); Haut-Shiloango (Cabra-Michel); route de Poiti à Tshoa (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu. — Nom vern. : Kasikamba (Gill.). — VI : rég. de Luanu (Lescr.); env. de Tumba-Mani (Cabra-Michel). — XV : Lusambo (Ém. Laur.). — Noms vern. : Moijaenka [Bangala]; Mamonpete [Kwilu]; Bagayenga [Morzambi].

Cogniauxia trilobata Cogn. in *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 141; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 24 et Ill. fl. Cgo (1898) 9, t. 5; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 187 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 324; II (1907) 205.

1888 (Fr. Hens). — VII : Isaka (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 275); env. d'Eala (M. Laur. 1492, 1494). — IX : pays des Bangala (Hens). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.). — XV : Lubue (Luja). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.).

OBS. — Cette espèce paraît C. dans le bassin du Congo (Ém. Laur.).

LAGENARIA Ser.

Lagenaria vulgaris Ser. in Mém. Soc. Genève, III¹ (1825) 25, t. 2 et in DC. Prodr. III, 299; *Descourtilz* Fl. des Antilles, V, 85, t. 325; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 529; *Cogn.* in DC. Monog. Phan. III, 417; *Muell. et Pax* in *Engl.* Pf. Ost-Afr. 398; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 144; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 391; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 101; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 83.

Cucurbita Lagenaria L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1010 *Vell.* Fl. Flumin. X, t. 98.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kwamouth (M. Laur.) — XII : l'Uele (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga et de Nyangwe (Dew.). — XV : Mukundji; Bolongula (Ém. et M. Laur.).

MOMORDICA L. (1)

Momordica Charantia L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1009; Bot. Mag. (1824) t. 2455; Ser. in DC. Prodr. III, 311; Wright Icon. pl. Ind. or. II, t. 504 et Illustr. Ind. Bot. I, t. 105^{bis}; Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 537; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. II, 616; Cogn. in DC. Monog. Phan. III, 436.

Le type, répandu sous les tropiques, n'a pas encore été trouvé au Congo belge.

— — var. **abbreviata** Ser. in DC. l. c. III (1828) 311; Cogn. l. c. III, 437; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 143; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 71 [B. S. B. B. XXXVII¹, 116] et Pl. Thonnerianae (1900) 48; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 393; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 204.

M. anthelmintica Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 423.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Zambé. — Nom vern. : **Matudulu** (Dew.); Sisia (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Kitobola (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.). — IX : Bobi (Thonn.); Upoto (Wilw.); Mozambique (Brun.). — XII c : env. d'Arebi (Ser.). — XV : Mange (Em. et M. Laur.).

Momordica cissoides Planch. ex Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 370; Walp. Annal. bot. II, 645; Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 535; Cogn. in DC. Monog. Phan. III, 430; Muell. et Pax in Engl. Pfl. Ost-Afr. 397; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1891) 43; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 393; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 102; De Wild. Miss. Laurent (1905) 186, (1907) 449.

M. guttata Planch. ex Benth. l. c. (1849) 371.

M. maculata Planch. l. c.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : Shinganga (Dew.). — V : Chenal (Em. et M. Laur.); Bolobo (Buett.); Kisantu (Gill.). — VIII : Lulanga (Em. Laur.). — X : Bamoka (Em. Laur.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Momordica Cogniauxiana De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 160.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

Momordica foetida Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 426; Cogn. in DC. Monog. Phan. III, 451; Muell. et Pax in Engl. Pfl. Ost-Afr. 397; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 102; De Wild. Miss. Laurent (1905) 186.

M. Morkorra A. Rich. Tent. fl. Abyss. I (1847) 292, t. 53; Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr. II, 539.

(1) Le *M. pterocarpa* Hochst. a été trouvé dans la région des Niamniam, par Schweinfurth, mais en dehors des limites du Congo [Conf. Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 144].

1896 (A. Dewèvre) — Congo (Dew. 1125). — VIII : Eala (M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.); Tielen-St-Jacques (Lescr.); Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Momordica Gabonii Cogn. in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 450; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 25 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 102; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 204.

1891 (F. Domeuse). — Congo (Dew.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Ile de Yambinga (Dem.).

Momordica gracilis Cogn. in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 25.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

LUFFA L.

Luffa cylindrica [L.] Roem. Synops. monogr. fasc. II (1846) 63; Cogn. in *DC. Monog. Phan.* III, 456; *Muell. et Pax in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 390; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 144; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 130, fig. 8.

Momordica — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1009.

L. aegyptiaca Mill. Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 1; *Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 530; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 394.

L. pentandra Roxb. Hort. Beng. (1814) 70; *Wight Icon. pl. Ind. or.* II, t. 499 et *Illustr. Ind. Bot.* I, t. 105 b.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Welw.). — II a : Kibinga (Dup.); la Lemba (Dew.). — IV : Lutete (Hens). — V : cult. aux env. de Bolobo (Dew.); Kisantu (Gill.). — IX : Ukaturaka (Ém. Laur.). — XII c : Amadis. — Nom vern. : **Mdungu** (Ser.). — XV : Lac Foa (Lescr.). — Ind. non cl. : Kapilumba (Lescr.).

SPHAEROSICYOS Hook. f.

Sphaerosicyos sphaericus [E. Mey.] Cogn. in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 466; *Muell. et Pax in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 398; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 71 [B. S. B. B. XXXVII, 116].

Lagenaria — E. Mey. in *Drège Zwei Pfl. Docum.* (1843) 197.

S. Meyeri *Hook. f. in Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 532.

1896 (Edg. Verdick). — XVI : env. du lac Moero (Verd.). — Ind. non cl. : Mwana-Bwene — Nom vern. : **Katanda** (Dew.). — Nom vern. : **Otutu** [Busira] (Dew.).

CUCUMIS L.

Cucumis hirsutus Sond. in *Harv. et Sond. Fl. Capens.* II (1862) 497; Cogn. in *DC. Monog. Phan.* III, 489; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 145.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Beaudoinville (Deb.).

Cucumis metuliferus *E. Mey. ex Schrad.* in *Linnaea*, XII (1838) 406; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 543; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III, 499; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 26; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 397.

1893 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dew.). — II a : Kibinga (Dup.).

CITRULLUS Neck.

***Citrullus vulgaris** *Schrad. ex Eckl. et Zeyh.* *Enum. pl. Afr. austr.* (1836) 279; *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 549; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III, 508; *Ficalho Pl. Uteis* (1884) 190. *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 103; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 187.

Colocynthis amarissima Schrad. Ind. sem. Hort. Gotting. (1833) 2; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 397.

1895 (A. Dewèvre). — Plante cultivée. — I : Banana (Dew.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

DIMORPHOCHLAMYS Hook. f.

Dimorphochlamys Cabraei *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 24 et *Ill. fl. Cgo* (1900) 131, t. 66.

1897 (Alph. Cabra). — II a : entre Sombo et Ganda-Janga (Cabra).

Dimorphochlamys Crepiniana *Cogn.* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 25.

1897 (Alph. Cabra). — II a : Sombo (Cabra).

Dimorphochlamys Mannii *Hook. f.* in *Benth. et Hook. f. Gen. pl.* I (1867) 827, in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 515 et in *Hook. Icon. pl. XIV* (1880) t. 1322; *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III, 515; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 82.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur.).

CUCUMEROPSIS Naud.

Cucumeropsis edulis [*Hook. f.*] *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* III (1886) 518; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 145; *Ficalho Pl. Uteis* (1884) 188; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 399. *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 26 et *Pl. Gilletianae*, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23].

Cladosicyos — *Hook. f.* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 518.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : Kibinga (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

PHYSEDRA Hook. f.

Phyzedra Barteri [*Hook. f.*] *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 525; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 145; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 168 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 205.

Staphylosyce — *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. I (1867) 828 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 555.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Lukolela (Pyn. 187); Kisantu (Gill. 517). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Krek.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Phyzedra heterophylla *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 553; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 524; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 399; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 103.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — Noms vern. : **Motalaci** [Kasongo]; **Mombina** [Ikwangula]; **Mioba** [Tanganika] (Dew.).

RAPHIDIOCYSTIS Hook. f.

Raphidiocystis Welwitschii *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. I (1867) 828 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 554; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 527; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 23 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 23]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 400.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 495).

CUCURBITA L.

Cucurbita maxima *Duchesne* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) 151; *Ficalho* Pl. Uteis (1884) 191; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 555; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 544; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117] et Reliq. Dewevr. (1901) 103; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo (1906) 324; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 401.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala (M. Laur.). — XI : Haut-Aruwimi. — Nom vern. : **Euzambi** (Coll. ?) : Basoko. — Nom vern. : **Eloko** (Coll. ?). — Ind. non cl. : Bena-Lecoula [Bena-Lunkula?, XV]. — Nom vern. : **Limoke** [Tanganika].

Cucurbita moschata *Duchesne* ex *Poir.* Dict. sci. nat. XI (1818) 334; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 556; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 546; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 401.

1895 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.).

Cucurbita Pepo *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1010; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 556; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 545; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 401; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 103; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 205.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Efukwa-Kombe (Brun.). — IX : en aval de Mobéka (Ém. Laur.). — XI : Moe [au N. de Bolobo] (Dew.).

MELOTHRIA L.

Melothria capillacea [*Schumach.* et *Thonn.*] *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 600; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 146.

Bryonia — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 430; *Walp.* Repert. bot. II, 198; *Roem.* Synops. monogr. II, 36.

M. triangularis *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 367; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 562.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Melothria deltoidea [*Schumach.* et *Thonn.*] *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 368; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 563; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 594; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 146.

Bryonia — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 420.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.).

Melothria maderaspatana [*L.*] *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 623; *Muell.* et *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 396; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 146; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 403; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 103.

Cucumis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1012.

Bryonia scabrella *L. f.* Suppl. pl. (1781) 424; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 501.

Mukia — *Arn.* in *Hook.* Jour. of Bot. III (1851) 276; *Wight* Illustr. Ind. Bot. II, t. 105; *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. II, 489; *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 561.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens); Kitobola (Ém. Laur.; Pyn.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kwamouth et env. (Biel.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Mukundji (Ém. Laur.).

Melothria tridactyla *Hook. f.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 562; *Cogn.* in *DC.* Monog. Phan. III, 596; *Muell.* et *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 396; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 147; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 402.

M. Thwaitesii *Schweinf.* Reliq. Kotschyanae (1868) 44, t. 29 (excl. syn. et descr. fruct.).

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); route de La Lemba à Poiti (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Hens). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : banc de sable du Sankuru (Ém. Laur.).

CAYAPONIA Manso.

Cayaponia latebrosa [Ait.] Cogn. in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 776; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 24 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 24].

Bryonia — Ait. *Hort. Kewensis*, III (1789) 384.

Trianosperma africana Hook. f. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 568.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

SICYOS L.

Sicyos australis Endl. *Prodr. fl. Norfolk* (1833) 67; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* III, 875; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 405; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 161.

S. Schimperii Naud. in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. App.* (1867) 268.

S. angulatus Hook. f. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 568.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd.).

BEGONIACEAE

BEGONIA L.

Begonia Bruneelii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 318, t. 78, fig. 1.

1906 (Albéric Bruneel). — VII : village Loka [rive gauche de la Bolombo] (Brun.).

Begonia duruensis *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 318.

1906 (F. Seret). — XII c : territ. de Mugdangba [Duru] (Ser. 544); territ. d'Arebi; env. de Nala; territ. de Sabona (Ser.).

Begonia elaeagnifolia Hook. f. in *Oliv. Fl. trop. Afr.* II (1871) 579; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 25.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra).

Begonia Gentilii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 294.

1902 (L. Gentil). — XV : route de Luluabourg; Kanda-Kanda (Gent.).

Begonia gracilipetiolata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 319.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1702).

Begonia Haullevilleana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 320.

1907 (F. Seret). — XII a et c : route entre Zobia et Buta (Ser. 866).

Begonia injoloensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 347.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1091, 1703). — [cultivé à Eala (Pyn. 428)].

Begonia Poggei *Warb.* in Engl. Jahrb. XXII (1895) 170; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 258, t. 82 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 320.

1883 (P. Pogge). — II a : route de Kabuluku à Tshikongo (Lescr.). — VII : Zoka [Bolombo] (Brun.). — VIII : Bombimba (M. Laur. 1224); [cult. à Eala (M. Laur.; Pyn. 429, 473)]; Bala-Lundzi (Pyn.); marais d'Ipeco (Huyghe et Ledoux). — IX a : Gongo (Ser. 294). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII c : Nala et env. (Van Ryss.; Ser. 802); Poka-Zobia (Ser. 118); Gombari (Ser.); Rungu (Ser. 619). — XIII c : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukenge (Pg.). — Ind. non cl. : entre Irumu et Beni (Cabra, 8).

— — var. **albiflora** *Th. et Hél. Dur.*

B. Poggei *Warb.* var. flore albo; *C. DC.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 104.

1896 (A. Dewèvre). — XIII : forêts près de Mutumbe (Dew.).

Begonia quadrialata *Warb.* in Engl. Jahrb. XXII (1895) 43; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 25; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 321.

1897 (Alph. Cabra). — II a : entre Shindambo et la Lemba (Cabra). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1704). — XII c : entre Gombari et Rungu (Ser. 498).

Begonia romeensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 321, t. 78, fig. 2.

1906 (Marc. Laurent). — XI : forêt de Patalongo [Yambuya] (M. Laur. 1693). — XIII a : Romée (M. Laur. 1691).

Begonia rubronervata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 322.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1701); [cult. à Eala (Pyn. 534)].

Begonia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 59, t. 18.

1905 (F. Seret). — XII c : env. d'Arebi [village Adama] (Ser. 121 b). — Ind. non cl. : entre Manbanba et Gangara (Ser. 121).

Begonia subfalcata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 323.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 968). — XIII a : Romée (M. Laur. 1694).

Begonia subscutata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 322.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1700); [cult. à Eala (Pyn.)]. — XII c : entre Gombari et Rungu (Ser. 4997); entre Zobia et Buta (Ser. 499).

Begonia Sutherlandi *Hook. f.* in Bot. Mag. (1868) t. 5689; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 147.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Begonia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 93.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

Begonia zobiaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 324.

1907 (F. Seret). — XII c : entre Zobia et Buta (Ser. 882).

CACTACEAE

HARIOTA Adans.

Hariota parasitica [*L.*] *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 262; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 407.

Cactus — *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) 1054.

Rhipsalis aethiopica *Welw.* in Journ. Linn. Soc. III (1859) 152 [nom. tant.].

R. Cassytha *Gaertn.* De fruct. et semin. I (1788) 137, t. 28, fig. I; *DC.* Prodr.

III, 476; Bot. Mag. (1858) t. 3080; *Hook.* Exot. Fl. t. 2; *Oliv.* Fl. trop. Afr.

II, 581; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 658; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud.

fl. Cgo (1896) 147; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 64, (1904)

168, (1906) 295; II (1907) 61 et *Miss. Laurent* (1905) 159.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Vungu (Ém. Laur.). — V : Kimuenza; plateau de

l'Inkisi à Kilmango (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.). — VIII : Co-

quilhatville. — Nom vern. : **Pata-Pata** (Ém. Laur.); Eala (M. Laur.). — X : l'Ubangi

(Ém. et M. Laur.). — XI : forêt de l'Aruwimi (Coll.?). — XII c : Nala (Van Ryss.).

— XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XV : Batempa (Ém. et M.

Laur.); le Lualaba; le Sankuru (Ém. Laur.).

Obs. — *L'Opuntia vulgaris* Mill. a été introduit à Kisantu par le Fr. Gillet [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 168].

FICOIDACEAE

SESUVIUM L.

Sesuvium crystallinum *Welw.* ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 586; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 27 et Reliq. Dewevr. (1901) 104.

S. mesembryanthemoides *Wavra* et *Peyr.* in Sitzb. Akad. Wien, XXXVIII (1860) 564.

Halimum — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 413.

1908 (J. Gillet). — I : Banana (Gill.).

MOLLUGO L.

Mollugo lotoides [*Loefl.*] *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II (1879) 776 [nom. tant.].

Glinus lotoides; *Loefl.* Iter Hisp. (1758) 145; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 275; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 76.

M. hirta *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1772) 24; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 415.

M. Glinus A. *Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 48; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 590; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 148; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 84 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 754]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 121.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Mollugo nudicaulis *Lam.* Encycl. méth. Bot. IV (1797) 234; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 591; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 175; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 32 [B. S. B. B. XXXVI², 78]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 417; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 25; Pl. Gilletiana, I (1900) 24 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 24] et Reliq. Dewevr. (1901) 105; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 379.

M. bellidifolia *Ser.* in *DC.* Prodr. I (1824) 301.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Dew.); Kisantu (Gill.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

Mollugo oppositifolia *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 89; *Trim.* Fl. Ceyl. II (1894) 271; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 416.

M. Spergula *L.* Syst. veget. ed. 10 (1774) 881; *DC.* Prodr. I, 391; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 590; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 662; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 148; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 25.

Glinus — *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, 1 (1840) 688; *Pax* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 1 b (1894) 40 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 175; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 26, (1904) 121.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Dobo (Luja); bassin de la Sele (But.).

GIESEKIA L.

Giesekia Miltus *Fenzl* Nov. stirp. dec. Vind. X, 86; *DC.* Prodr. XIII², 28; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 594; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 148; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 420.

Miltus africanus *Lour.* Fl. Cochinch. (1790) 302.

Glinus mozambicensis *Spreng.* Syst. veget. II (1825) 467.

1885 (R. Buettner). — V : entre Suata et Bolobo (Buett.).

Giesekia pharnaceoides *L.* Mant. pl. II (1771) 562; *Wight* Icon. pl. Ind. or. t. 1167; *DC.* Prodr. XIII², 27; *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 594; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 664; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 175; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 149; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 410; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 105; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 134 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 127.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Bauana (Dew.). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : Léopoldville (Dew. ; Gill.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); le Stanley-Pool (Hens, B. 309); Chenal (Ém. Laur.); Sanda. — Nom vern. : *Kekansu* (Odd.); env. de Kwamouth (Biel.); Kisanu (Gill.). — VIII : Équateur (Pyn.). — XV : entre le Sankuru et le Kasai (Ém. Laur.).

UMBELLIFERACEAE

HYDROCOTYLE L.

Hydrocotyle asiatica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 234; *DC.* Prodr. IV, 62; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 656; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 6; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. II, 669; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 298; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 149; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 423; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 66.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville; Kisanu (Gill.). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).

PIMPINELLA L.

Pimpinella tomentosa *Engl.* in *Engl.* Jahrb. XXX (1901) 368; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 220.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

PEUCEDANUM L.

Peucedanum araliaceum [*Hochst.*] *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. I (1865) 920; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 21; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 300; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 149; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 220.

Steganotaenia — *Hochst.* in *Flora*, XXVII (1844). Beil. 4.

1885 (R. Buettner). — Congo (Buett.). — XVI : le Katanga (Verd.).

Peucedanum fraxinifolium *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 22 et in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 79; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 149; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 427.

P. araliaceum Benth. et Hook. f. var. — *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 300.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kipanga (Verd.).

Peucedanum muriculatum *Welw. ex Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1898) 429; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 220.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : plateau de Lukafu. — Nom vern. : Kikebe-Beteli (Verd.).

LEFEBURIA A. Rich.

Lefeburia benguelensis *Welw. ex Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) 322; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 24 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 24]; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 166.

Lefeburea — *Welw. ex Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1898) 430.

1900 (J. Gillet). — Entre Sonagongo [IV] et Tumba [V] (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 562).

OBS. — En 1900, M. le C^t Verdick a récolté à Lukafu [XVI] une espèce, probablement nouvelle, de ce genre [*Conf. De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 220].

MALABAILA Hoffm.

Malabaila Kirungae *Engl. in von Goetzen Durch Afrika* (1895) 380.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga 2500 m. (Goetz. et Prittw. 66).

ARALIACEAE

SCHEFFLERA Forst.

Schefflera Barteri *Harms ex De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 334 (nom. tant.).

1905 (Marc. Laur.). — VIII : Bombimba (M. Laur. 1520; Pyn. 343).

Schefflera Goetzenii *Harms* in *Engl. Pfl. Ost-Afr. A* (1895) 134, in *von Goetzen Durch Afrika* (1895) 7 et in *Engl. Jahrb. XXVI* (1899) 242.

1894 (A. G. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga, 2500 m. (Goetz. et Prittw. 46).

CUSSONIA Forst.

Cussonia angolensis [*Seem.*] *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr. III* (1877) 32 et *Cat. Welw. Pl. I*, 432; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 335.

Sphaerodendron — *Seem.* in *Journ. of Bot.* (1865) 34, t. 26 et *Rev. Heder.* 37, t. 1.

1903 (Aug. Van Houtte). — IV : Madiata. — Nom vern. : **Lembila** (Van Houtte in Gill. 3501).

Cussonia arborea *Hochst.* ex *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss. I* (1847) 356; *Oliv. Fl. trop. Afr. III*, 31; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 32 [B. S. B. B. XXXVI², 78].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.); Lukafu. — Nom vern. : **Dikasa-ya-Tambu** (Verd.).

[GAMOPETALAE]

RUBIACEAE (1)

SARCOCEPHALUS Afzel.

Sarcocephalus Diderrichii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Masui L'État Indép. à l'Exposit. de Brux.-Tervueren* (1897) 439 [nom. tant.]; *De Wild. in Rev. cult. colon. IX* (1901) 7 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 34-37.

1896 (Norb. Diderrich). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **N'Gulu-Maza** (Diderr.).

Sarcocephalus Gilletii *De Wild.* in *Rev. cult. colon. IX* (1901) 8; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 82 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 754]; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 38-41.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1069).

(1) Une Caprifoliacée, le **Sambucus nigra** L., est introduite à Kisantu [V] (Gill.) [Conf. *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 24].

Sarcocephalus Russeggeri [*T. Winterb.*] *Kotschy ex Schweinf.*
Reliq. Kotschyanae (1868) 49, t. 33 [excl. fig. 6-8, 9-12]; *Hiern* in
Oliv. Fl. trop. Afr. III, 39; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat.*
Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 59 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 879; *Th. Dur.*
et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 150.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.),

Sarcocephalus sambucinus [*T. Winterb.*] *K. Schum.* in *Engl. et*
Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 59 et in *Schlechter Westafr.*
Kautsch.-Exped. (1900) 319; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae,*
I (1900) 25; II (1901) 82 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 105; *De Wild. Miss.*
Laurent (1906) 274 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo,* II (1907) 193.

Nauclea — *T. Winterb.* Account of Sierra Leone, II (1803) 45.

S. esculentus Afzel. ex *Sabine* in *Trans. Hort. Soc.* V (1824) 442, t. 18; *Hiern*
in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 38.

Cephaelis — *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 105.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Ponta da Lenha (Naum.).
— II a : Kamba. — Nom vern. : **Borinalolo** (Dew.); Katala. — Nom vern. : **Ma-**
jampa (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kinshassa (Schlt.); Ki-
santu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — IX : lleko [Maringa] (Brun.).

MITRAGYNE Korth.

Mitragyne africana [*Willd.*] *Korth.* Obs. Naocl. Ind. (1839) 19,
in obs.; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 40.

Stephegyne — *Walp.* Repert. bot. II (1843) 513; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.*
380, t. 37; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 150.

Nauclea — *Willd.* Sp. pl. I (1797) 929; *DC.* Prodr. IV, 345.

Platanocarpum — *Hook. f.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) t. 37.

1874 (É. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pechuel-Loesche).

Mitragyne macrophylla [*Perr. et Leprieur*] *Hiern* in *Oliv. Fl.*
trop. Afr. III (1877) 41; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae,* I
(1900) 25 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 25].

Nauclea — *Perr. et Leprieur* ex *DC.* Prodr. IV (1830) 340, in syn..

N. stipulosa DC. l. c. IV (1830) 340.

Mamboga — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 435.

Mamb. stipulosa O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 289; *De Wild. et Th. Dur.*
Reliq. Dewevr. (1901) 105.

Stephegyne [*an err. cal. stipulata*] *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. II (1873) 31;
Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 150.

1874 (É. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pechuel-Loesche). — II : Boma
(Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VII : bord de la Fini près Kutu (Ém. Laur.). —
IX : Bangala (Dew.); Bolombo (Ém. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. Laur.). — XI :
en aval de Basoko (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Malucu** [Bangala]; **Vuku** [Boma];
Wuwoko [Lulanga] (Dew.).

UNCARIA Schreb.

Uncaria africana *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 471; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 41; *Hook. Icon. pl.* VIII, t. 781; *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* 381, t. 42; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 25 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 25] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 106; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 76; II (1907) 71, 192.

Nauclea — *Walp.* (non *Willd.*) *Repert. bot.* II (1843) 512.

Ourouparia — *Baill.* in *B. S. Linn. Paris*, I (1879) 228; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 435.

Uruparia — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 228; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 4 (1891) 57 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 378.

1870 (*G. Schweinfurth*). — IV : bords de la Lukungu (*Dew.*). — V : env. de Kisantu (*Gill.*). — XII : savane [de l'Uele] (*Ser.*). — XII d : pays des Mangbettu (*Schw.*). — XV : Linkanda [Lubue-Kasai] (*Gent.*). — Nom vern. : **Magwadabirada** [Bakongo] (*Ser.*).

HYMENODICTYON Wall.

Hymenodictyon fimbriolatum *K. Schum.* ex *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 225 [nom. tant.].

1899 (*Edg. Verdick*). — XVI : le Katanga. — Nom vern. : **Kampululu** (*Verd.*).

CORYNANTHE Welw.

Corynanthe paniculata *Welw.* in *Trans. Linn. Soc. XXVII* (1869) 37, t. 14; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 43 et *Cat. Welw. Pl. I*, 437; *Ficalho* *Pl. Uteis*, 194; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 152; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 27; II (1900) 26; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 113.

1816 (*Chr. Smith*). — Bas-Congo (*Sm. ; Cabra*). — II a : Shinon (*Ém. Laur.*). — XV : rég. de Mukenge (*Pg.*). — Noms vern. : **Saja**; **Sakala** (*Ém. Laur.*); **Sagna** (*Cabra*).

CROSSOPTERIX Fenzl.

Crossopteryx africana [*T. Winterb.*] *Baill. Hist. des pl.* VII (1879) 489; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 378; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 226.

Rondeletia febrifuga *Afzel.* ex *G. Don* *Gen. Syst. Bot.* III (1834) 516.

Crossopteryx — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 381; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 152; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 106.

C. Kotschyana *Fenzl* in *Endl. et Fenzl Nov. stirp. decad.* (1839) 46; *Kotschy et Peyr. Pl. Tinneanae*, 32, t. 15 a et b; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 44 et *Cat. Welw. Pl. I*, 437; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 154.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kisantu (Gill.); env. de Sanda (Verm.). — VI : Madibi (Sap.). — Nom vern. : **Moala** [Kwilu] (Sap.). — XV : rég. de Mukenge (Pg.). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kububa**; **Sachi** (Verd.).

PENTAS Benth.

Pentas cleisostoma *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 419.

Le type croit dans l'Angola.

— — var. **Poggeana** *K. Schum.* l. c. (1896) 420.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1110).

Pentas Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 28 [B. S. B. B. XXXVIII², 199] et Reliq. Dewevr. (1901) 106; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 273.

1896 (A. Dewèvre). — XIII : Mutumbe (Dew. 1089). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.).

Pentas Liebrechtsiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 153.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Luangane** (Verd. 391).

Pentas longiflora *Oliv.* in *H. Johnst.* Kilim.-Exped., Append. (1886) 341 et in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1887) 335.

Le type croit dans l'Afrique trop. orient.

— — var. **occidentalis** *K. Schum.* ex *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Pentas longituba *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 377; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117].

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Pentas zanzibarica [*Klotzsch*] *Vatke* in Oest. Bot. Zeitschr. XXV (1875) 232; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 154.

Pentanisia — *Klotzsch* ex *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 286.

Pentas purpurea *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 83; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 46.

Neurocarpaea — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 438.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mukulia** (Verd. 597).

OTOMERIA Benth.

Otomeria dentata *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 50; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117].

1891? (F. Demeuse). — Ind. non cl. : Lunfudi (Dem. 510).

Otomeria dilatata *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 50; *K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 377; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 27; II (1900) 26 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 107; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 440; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 273 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 99; II (1907) 71, 193, (1908) 343.

O. speciosa *S. Elliot* in *Journ. Linn. Soc.* XXXII (1896) 437.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Dew.); entre Léopoldville et Sabuka (Ém. Duch.); Dolo (Schlt.); Kimpoko (M. Laur.); Kisantu (Gill.); Sanda (De Brouw.); Boko; Dembo (Vanderyst); Lula-Lumene (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Eïolo (Ém. et M. Laur.). — XII d : de Vankerkhovenville à Faradje (Ser.). — XVI : Pweto; le Katanga (Desc.). — Ind. non cl. : Lusubi (Leser. 146).

Otomeria graciliflora *K. Schum. ex De Wild. Miss. Laurent* (1906) 274 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 343.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — I : Moanda (Vanderyst). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.).

Otomeria guineensis *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 405; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 49; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 26 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 107.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — V : Léopoldville (Schlt.); env. de Léopoldville et de Kwamouth (Luja).

Otomeria lanceolata *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 50; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 152; *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 117]; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 274 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 76; II (1907) 71, 192, (1908) 343.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Léopoldville (Pyn.); env. de Kwamouth (Biel.); Yindu (Vanderyst); Kisantu; Kimuenza (Gill.). — VI : Madibi (Leser.); vallée de la Djuma (Gent.); bord du Kwilu. — Nom vern. : Mondondono (Sap.). — VII : Ibali (Ém. Laur.). — VIII : Lulanga (Ém. Laur.). — XV : Lomkala (Ém. Laur.); Eala. — Nom vern. : Bongolo (M. Laur.). — Ind. non cl. : Bundaka (Flamigay).

Otomeria madiensis *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 83, t. 41; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 49; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 153.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

PENTODON Hochst.

Pentodon pentander [Schumach. et Thonn.] Vatke in Oest. Bot. Zeitschr. XXV (1875) 231; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 377; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 72 [B. S. B. B. XXXVII, 417] et Reliq. Dewevr. (1901) 108; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 273 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 176.

Hedyotis — *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 71.

Hedyotis macrophylla *Leprieur et Perr.* ex *DC.* Prodr. IV (1830) 427.

Oldenlandia — *DC.* Prodr. IV (1830) 427; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 63 et Cat. Welw. Pl. I, 450.

1895 (P. Dupuis). — II : Sisia (Dup.). — II a : Zobe (Dew.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — XIII : saline de Piani-Lombe (Dew.).

OLDENLANDIA L.

Oldenlandia angolensis *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 412; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 449; *K. Schum.* in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 317; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 27; Pl. Gilletianae, II (1900) 82 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 754] et Reliq. Dewevr. (1901) 108; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 175.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Léopoldville (Schlt.); Kimuenza; entre Dembo et Kisantu (Gill.). — XIII a : env. de Nyangwe (Dew. 1052).

Oldenlandia asperuliflora *K. Schum.* in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 318 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt. 12597).

Oldenlandia Bojeri [*Klotzsch*] *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 23; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 153.

Agathisanthemum — *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 294.

Hedyotis — *Vatke* in Oest. bot. Zeitschr. XXV (1875) 252.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens).

Oldenlandia caffra *Eckl.* et *Zeyh.* Enum. pl. Afr. austr. (1836) 2291; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 58; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 153.

Hedyotis — *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, 1 (1840) 726.

Kohautia setifera *DC.* Prodr. IV (1830) 430.

Hedyotis — *Sond.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III (1864) 10.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Oldenlandia capensis *L. f.* Suppl. pl. (1781) 127; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 63; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 375; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 153; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 446; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 153; Miss. Laurent (1906) 271 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 191.

Hedyotis — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) 271; *Sond.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 9.

II. *sabulosa* *DC.* Prodr. IV (1830) 424.

1899 (Edg. Verdick). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — VIII : Haut-Lopori (Biel.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Oldenlandia congensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 82 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 754]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 87); entre Dembo et Kisantu; Kimuenza (Gill. 1779). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 1565).

Oldenlandia corymbosa *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 119; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 62; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 375; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 154; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 108; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 466; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 137 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 342.

Hedyotis — *Vatke* in *Oest. bot. Zeitschr.* XXV (1875) 232.

O. *herbacea* *DC.* Prodr. IV (1830) 425.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Banana (Dew.). — II : Borna (Dew.); Zambé (Dup.). — IV : Batongo (Luja). — V : env. de Léopoldville (Cabra); Suata (Buett.); Dembo (Gill.). — VIII : Équateur (Buett.). — XIII a : Stanley-Falls (Dem.). — XIV : Uvira (Cabra). — XV : entre le Sankuru et le Lualaba (Ém. Laur.). — XVI : Toa (Desc.).

Oldenlandia Crepiniana *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 55 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 319; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 83 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 755]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 271 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 342.

1899 (R. Schlechter). — V : entre Kisantu et Dembo (Gill. 1540). — VIII : Coquilhatville (Schlt.); Eala (M. Laur. 831, 840; Pyn. 838); Lulanga (Ém. et M. Laur.).

Oldenlandia Debeerstii *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 27.

1895 (Guët. Debeerst). — XVI : rég. du Tanganika (Deb.).

Oldenlandia decumbens [*Hochst*] *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 55; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 376; *Th. Dur.* et

Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 154; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 108; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 442; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 271 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75; II (1907) 70, 191, (1908) 342.

Hedyotis decumbens *Hochst.* in Flora (1844) 552; *Sond.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 11.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.); Zobe (Dew.). — IV : Lutete (Hens). — V : Sabuka (M. Laur.); Kisantu; Kimuenza (Gill.); Galiema (Pyn.); Kinkosi (Vanderyst). — VI : Madibi (Sap.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.).

Oldenlandia florifera *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 271.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

Oldenlandia globosa [*Klotzsch*] *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 54; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 118]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 25 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 25].

Agathisanthemum — *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 94. 1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.).

Oldenlandia herbacea [*L.*] *Roxb.* Hort. Bengal. (1814) 11; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 444.

Hedyotis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 103.

O. Heynei *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXXIX (1873) 84; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 59; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 375; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 155; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 27; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 199; II (1907) 191, (1908) 342 et Miss. Laurent (1906) 272.

Hedyotis dichotoma *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 361.

1899 (Éd. Luja). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — IV : Luozi (Luja). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill.); Boko; Yindu (Vanderyst); Lula-Lumene (Hendr.). — VIII : Eala (Pyn.). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XV : Bas-Sankuru (Ém. Laur.).

Oldenlandia Kimuenzae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2115).

Oldenlandia lancifolia [*Schumach. et Thonn.*] *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 61; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 375; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1893) 155; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 42 et Reliq. Dewevr. (1901) 108; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 446; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 71 et Miss. Laurent (1906) 272, (1907) 449.

Hedyotis — *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 72.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : env. de Zobe (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Équateur (Pyn.). — IX : Gali (Thonn.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : en aval d'Ifuta; Ibaka (Ém. et M. Laur.).

Oldenlandia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 272.

1905 (Marc. Laurent). — V : entre Bolobo et Mopolenge (M. Laur. 620).

Oldenlandia macrophylla *DC.* Prodr. IV (1830) 427; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 63; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 155.

Hedyotis pentandra *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 71.

Oldenlandia — *DC.* (non *Retz.*) l. c. IV (1830) 427.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Oldenlandia microphylla *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 28 et Reliq. Dewevr. (1901) 108.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : rég. de l'Équateur (Dew. 365).

Oldenlandia moandensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 190, (1908) 342.

1903 (J. Gillet.). — I : Moanda (Gill. 3183, 4051).

VIRECTA Sm.

Virecta multiflora *Sm.* in *Rees* Cyclop. XXXVII (1817) n. 4; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 48; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 25 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 25] et Reliq. Dewevr. (1901) 107; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 273 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 76, (1904) 199; II (1907) 192, (1908) 342.

Phyteumoides hirsuta *Smeathm.* ex *DC.* Prodr. IV (1830) 414

1888 (Fr. Hens). — IIa : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Dew.; Luja); entre Léopoldville et Sabuka (Ém. Duch.); Kisantu; Kimuenza (Gill.); Yindu (Vanderyst). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew.); Coquilhatville (Schlt.); Eala (M. Laur.); Bamania; Boangi (Ém. Laur.); Mompoko [Lulanga] (Brun.); Ikenge (Huyghe). — IX : Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.).

Virecta procumbens *Smith* in *Rees* Cyclop. XXXVII (1817) n. 2; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 48; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 152.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Léopoldville (Schlt.). — VIII : Eala et env. — Nom vern. : **Bolivo** (M. Laur. 37, 1195).

MUSSAENDA L.

Mussaenda arcuata Poir. in *Lam. Encycl. méth. Bot.* IV (1797) 392; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 68; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 379; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 155; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 453; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 29 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 109; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 76, (1904) 199; II (1907) 192, (1908) 344.

1885 (R. Buettner). — V : env. de Kisantu (Gill.); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Monkoso** (M. Laur.); entre Coquilhatville et Lulange (Pyn.). — XI : Isangi (Ém. Laur.); Mogandjo (M. Laur.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XV : rég. du Kasai (Luja; Gent.); C. brousse entre Lusambo et le Lomami (Ém. Laur.); Dibebe (Flam.); rég. de Mukenge (Pg.). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. non cl. : brousse du Lomami (Desc.); Lombolo ? (Lescr.).

Mussaenda deburu Stapf ex H. Johnston G. Grenfell and the Congo, II (1908) 906 [nom. tant.].

Ann. ? (G. Grenfell). — X : Mubangi bor. (Grenf.).

Mussaenda elegans Schumacher et Thonn. *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 117; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 70; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 156; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Thonnerianae* (1900) 42 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 109; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 454; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 275 et *Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo*, I (1904) 200; II (1907) 71, 192, (1908) 349.

Gardenia coccinea G. Don in *Edinb. Phil. Journ.* XI (1824) 343.

Bertiera — G. Don *Gen. Syst. Bot.* III (1834) 506.

M. discolor Thonn. ex DC. (non Thou.) *Prodr.* IV (1830) 372, in syn.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Johnst.); Bas-Congo (Gill.). — II a : le Mayumbe (Kest.); Katala. — Nom vern. : **Manicolo** (Dew.); Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.); Coquilhatville (Dew.). — IX : Ukaturaka; Umangi (Ém. Laur.). — IX a : Bokapa (Thonn.). — XI : env. de Yambuya (Sohl.). — XII a : pays des Mangbetu (Schw.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.). — XV : rég. de Mukenge (Pg.). — XVI : Lac Moero (Desc.).

— — var. **minor** *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 27.

1896 (Alph. Cabra). — II a : la Lemba (Cabra).

Mussaenda erythrophylla Schumacher et Thonn. *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 116; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 69; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 156; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 453; *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 426; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 28; II (1900) 29 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 109; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 275 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 200; II (1907) 71, 198, (1908) 344.

M. splendida Welw. in Trans. Linn. Soc. XXVII (1867) 36, t. 13.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Johnst.); Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe (Kest.); Zenze (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : pays des Makalla (Mech.). — IX : env. de Yaminga (Pyu.). — X : l'Ubangi; Imese (Ém. Laur.). — XI : Lokandu (Dew.). — XII c : entre Poko et Rungu (Ser.). — XII d : Vankerkhovenville (Ser.); pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : Stanleyville (Dem.); env. d'Elungu (Dew.). — XV : le Loanje (Gent.); Lubi (L.escr.); Bena-Dibele (Flam.); Ikoka (Sap.). — XVI : le Katanga (Verd.). — Nom vern. : **Manenobe** [Tanganika] (Dew.).

Mussaenda heinsioides Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 70; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 156.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Mussaenda hispida Engl. in Engl. Jahrb. VIII (1887) 66; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 156.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (Naum.).

Mussaenda luteola Delile [non Hochst.] Cent. pl. Méroé (1826) 65, t. 1, fig. 1; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 71; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 156; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 118].

Vignaudia — *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 182.

1893 (P. Dupuis). — II : Boma (Dup.).

Mussaenda platyphylla Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 70; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 157.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Mussaenda polita Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 67; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 118]; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 155.

1895 (Ém. Laurenr.). — Congo (Dew.). — XV : le Sankuru (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Mussaenda stenocarpa Hiern in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 68; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 157; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 28; II (1900) 29 et Reliq. Dewevr. (1901) 110; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 275 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 76, (1906) 200; II (1907) 72, 198, (1908) 344.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Léopoldville (Dew.); Tshumbiri (M. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.); Madibi (L.escr.; Sap.); Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VII : Lac Léopold II; bords de la Fini (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); près Équateur (Pyn.); Eala (M. Laur.); Monzambi (Brun.). — IX : Bumba (Dem.); Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XII a : route de Buta à Bima; route des Caravanes de Goo (Ser.). — XII c : Amadis et env. (Ser.).

— XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : Romée (Ém. Laur.). — XIII c : Yakoma (Ém. et M. Laur.). — XV : le Saukuru (Sap.); le Kasai (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Mopolambamba**; **Bobalabaneba** [Bangala] (Sap.); **Bopalabamba** [Eala] (M. Laur.); **Djaurbakessem**; **Koto-Koto** [Kwilu] (Sap.).

M. stenocarpa form. **congensis** *Buett.* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXXI (1889) 83; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 157.

1885 (R. Buettner). — VIII : Équateurville (Buett.).

— — var. **latifolia** *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Thonnerianae* (1901) 43.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi (Thonn. 35).

Mussaenda tenuiflora *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 392; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 69; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 379; *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 118] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 110; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 453; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 275 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 72, (1904) 193; II (1907) 200, (1908) 344.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu et env. (Gill.). — VI : le Kwilu (Sap.). — VII : la Fini (Ém. Laur.); Lac Léopold II (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Bala-Lundzi (Pyn.); env. de Bokakata (Dew.). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XIII a : les Stanley-Falls; Romée (Ém. Laur.). — XV : Idanga (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Tambo** [Eala] (M. Laur.); **Mtinku** [Sankuru] (Sap.).

UROPHYLLUM Wall.

Urophyllum callicarpoides *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 72; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 110; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 278 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 72; II (1907) 193.

1896 (A. Dewèvre). — Congo. — Nom vern. : **Ompampolo** (Dew. 753). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.). — VIII : Efukwa-Kombo (M. Laur.); Bombimba (Pyn.); env. de Lemfu (But.). — XIII a : Romée (Ém. et M. Laur.).

Urophyllum Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II, (1900) 30 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 110; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 77; II (1907) 72, 193 et *Miss. Laurent* (1906) 278.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kwamouth (Ém. et M. Laur.); Kisantu et env. (Gill. 3522); env. de Dembo (Gill.); env. de Lemfu (But. in Gill. 3476); Kimuenza (Dew.); Sanda (Odd.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bombimba (Pyn. 325); env. d'Eala (M. Laur. 1224); Équateur (Pyn.). — XIII c : env. de Ponthierville [Wabundu] (Dew.). — XV : Limbutu (M. Laur.); Butala (Ém. et M. Laur.).

Urophyllum Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 26 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 26]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 77; II (1907) 72, 193.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 402); rives de la Lukaya (Ch. Gérard; Gill. 1929). — VIII : Eala (Pyn. 467); Monzambi. — Nom vern. : **Oshampongo** (M. Laur. 1456). — IX : Bumba (Pyn. 49).

Urophyllum Liebrechtsianum *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 29 et Reliq. Dewevr. (1901) 111; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 77; II (1907) 194 et Miss. Laurent (1906) 278.

1896 (A. Dewèvre). — V : le Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); env. de Léopoldville (Gill. 12689); Lukolela (Pyn. 195). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1579). — IX : Bolombo (Dew. 799).

Urophyllum verticillatum *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 20 et Reliq. Dewevr. (1901) 111.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew. 257).

Urophyllum viridiflorum *Schweinf. ex Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 74; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 157.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

SABICEA Aubl.

Sabicea affinis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 77; II (1907) 72 et Miss. Laurent (1906) 275.

1899 (J. Gillet). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill. 159, 357, 1390). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 1902). — IX : Bumba (Pyn.).

Sabicea calycina *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 399; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 76; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 276 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 194.

1903 (Ém. Laurent). — V : Lukolela (Pyn. 241). — XV : Kapinga (Ém. et M. Laur.).

Sabicea capitellata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 398; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 76; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 157; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 84 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 756]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 72.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : entre le Kwango et Dembo; bassin de la Sele (But.); env. de Kisantu : Kimuenza (Gill.); env. de Lemfu (But.; Gill.).

Sabicea Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 112; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 276 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 194.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala (M. Laur. 1597). — XIII c : Ponthierville [Wabundu] (Dew. 1143).

— — var. **latifolia** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 276.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Sabicea Dinklagei *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 428; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 31.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 139; Dem.).

Sabicea floribunda *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 428; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 71.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1749).

Sabicea Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 78 et Miss. Laurent (1906) 276.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1911, 2024). — XV : Lomkala; Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Sabicea Kolbeana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 78; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 157.

1885 (R. Buettner). — VI : bois des bords du Kwango (Buett. 440).

Sabicea Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 276.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. Laur. 902).

— — var. **Pynaertii** *De Wild.* l. c. (1906) 277 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 194.

1905 (L. Pynaert). — VIII : Nouvelle-Anvers (Pyn. 12); Eala (Pyn. 579).

— — var. **velutina** *De Wild.* l. c. (1906) 277.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.).

Sabicea longepetiolata *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 78 et Miss. Laurent (1906) 278.

1901 (J. Gillet). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kimuenza (Gill. 2179).

Sabicea Schumanniana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 76; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 157.

1885 (R. Buettner). — V : entre Lukolela et Bolobo (Buett.).

Sabicea venosa *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 399; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 77; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 379; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 454; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 31; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 27 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 27*] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 112.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Katala; Shinganga (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Dem.).

— — var. **villosa** *K. Schum.* ex *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 31; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 194.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — VIII : Eala (Pyn. 515).

Sabicea Vogelii *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 398; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 76; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 278.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

STIPULARIA P. Beauv.

Stipularia africana *P. Beauv.* *Fl. d'Oware*, II (1807) 26, t. 75; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 80; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 84 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 756*]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1903) 79, (1904) 200 et *Miss. Laurent* (1906) 278.

1895 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Dew.); Yumbi (Ém. Laur.); Lukolela (Pyn.). — VII : Lac Léopold II (Body). — IX : Lie (Ém. Laur.). — XI : env. de Bena-Kamba (Dew.).

— — var. **hirsuta** *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 194.

1906 (Alberic Bruneel). — VIII : Lokelenge (Brun. 41).

Stipularia elliptica *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 80; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 112 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 102; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 278 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 195.

1900 (R. Butaye). — V : Dolo (Ém. Laur.); env. de Léopoldville (Gill.); bassin de la Sele (But.); Kimuenza (Gill.); Lula-Lumene (Hendr.); entre Kisantu et Popokabaka (But.).

— — var. **hirsuta** *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1907) 195.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 800).

HEINSIA DC.

Heinsia [*densiflora* *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 81 ;
K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 382.

Le type n'est indiqué que dans l'Afrique trop. orientale.

— — var. **occidentalis** *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 289 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 169.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bena-Dibele; Isaka; Mokole (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (Sap.).

Heinsia pulchella [*G. Don*] *K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 4 (1891) 84 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 382; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 73 [B. S. B. B. XXXVII, 118]; *Pl. Thonnerianae* (1900) 43 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 113; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 289 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 75, 169; (1908) 343.

Gardenia — *G. Don* in *Edinb. Phil. Journ.* XI (1824) 343.

G. crinita Afzel. *Stirp. guin. medic. sp. nov.* (1829) 13.

H. jasminiflora DC. *Prodr.* IV (1830) 390; *Bot. Mag.* (1846) t. 4207; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 81; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 158; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 455.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Kest.); la Lemba (Dew.); Bingila (Dup.). — IV : Luozi (Luja). — V : le Stanley-Pool (Buett.); Léopoldville (Ém. Duch; Schl.); Sabuka; Mopolenge (Ém. et M. Laur.); Kisantu; env. de Dembo. — Nom vern. : Nscanuma (Gill.); env. de Sanda (Odd.); Dembo (Vanderyst). — VII : Malepie (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Ikenge (Pyn.); Injolo (Ledoux et Huyghe); Baringa-Yala [Bolombo] (Brun.). — IX : Umangi (Krek.); Bokumbi (Thonn.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Isangi (Dem.); env. de Yambuya (Solh.). — XIII a : Romée (Ém. et M. Laur.). — XV : le Sankuru (L. Rom.); Ifuta (Ém. et M. Laur.); Lusambo (Jos. Duch.) — Ind. non cl. : Bena-Kusadi (Leser.); Kibaka (Buett.); Bunga [la Songo] (Ern. Dew.).

OBS. — Espèce répandue dans la région du Stanley-Pool, de la Fini et du Lac Léopold II (Ém. Laur.).

— — var. **hispidissima** *K. Schum. ex Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 119].

1895 (Ém. Laurent). — V : bords du Congo en amont du Stanley-Pool (Ém. Laur.).

— — var. **phyllocalyx** *K. Schum. ex Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 117] et *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 28; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 79.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : au S. de la Lukula (Cabra). — IV : rives de la Lukungu (Gérard in Gill. 1930). — V : Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Hens, 376). — IX : Bokumbi (Thonn.).

BERTIERA Aubl.

Bertiera aethiopica *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 83; *Engl.* in *Schlecht. Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 319.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt. 12607).

Bertiera capitata *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 169, (1908) 344.

1903 (Marc. Laurent). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (Pyn. 41 a, 122, 628, 1023, 1163; M. Laur.); Boyenge [Ikelemba] (M. Laur. 1260).

Bertiera congolana *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo* (1900) 28 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 113; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 75, 170.

1895 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Dew.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kisantu et env. (Gill. 255, 661, 1833); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3563). — XIII a : Stanleyville (Dew.).

Bertiera Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 27 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 27] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 113; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 290 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 170.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Luvituku (Pyn. 86). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1582; Pyn. 514). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew.); Romée (Ém. et M. Laur.).

Bertiera gracilis *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 290.

1903 (Ém. et M. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — XV : Kapigna (Ém. et Laur.).

— — var. **latifolia** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 170.

1895 (F. Demeuse). — IX : pays des Bangala (Dem. 315); Romée (M. Laur. 1444). — XI : Yambuya (M. Laur. 1453).

Bertiera Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 290 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 76, t. 6-7, 171.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.); Eiolo (Ém. Laur.). — VII : bord des pièces d'eau dans les savanes du distr. du Lac Léopold II (Body).

Bertiera laxa *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 85; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 85; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 153.

1816 (Ch. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Bertiera macrocarpa *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 394; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 84 et Cat. Welw. Pl. I, 456; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 117] et *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 29; II (1900) 29; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 291.

1893 (Ém. Laurent). — Congo (Dew.); Bas-Congo (Ém. Laur.). — IX : Gali (Thonn.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

Bertiera Thonneri *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 44, t. 13.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 19).

Obs. — *L'Alibertia edulis* A. Rich. [in Mém. Soc. hist. nat. Paris, V (1830) 234] a été introduit, en 1898, à Kisantu, par le Fr. J. Gillet [*De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 203].

DICTYANDRA Welw.

Dictyandra arborescens *Welw.* ex *Benth.* et *Hook.* f. Gen. pl. II (1873) 85; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 86 et Cat. Welw. Pl. I, 456; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 27 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 27]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84, (1906) 201; II (1907) 196, (1908) 345 et Miss. Laurent (1906) 281.

1899 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu; env. de Kimuenza (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Pyn. 979, 1052, 1324). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XV : le Sankuru (Sap.); Mange (Ém. Laur.).

LEPTACTINIA Hook. f.

Leptactinia Arnoldiana *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 279, t. 96-97 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 157.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Limbutu (M. Laur. 974). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Leptactinia formosa *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 431.

1882? (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1120); Mukenge (Pg. 1181, 1177).

Obs. — Pogge a aussi indiqué cette espèce entre Nyangwe et Kimbundo (Pg. 1083, 1195).

Leptactinia Laurentiana A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 102 et XXXIV² (1895) 95; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 158.

1903 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur. 106).

Leptactinia Leopoldi II *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 75; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 158; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 72, 157, (1908) 344.

1885 (R. Buettner). — V : Lukolela (Dew. 849 a); entre Lukolela et Bolobo (Buett. 436, 448); Kisantu (Gill. 289); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3579). — VI : Kongo-Kwilu (Sap.); rég. de Luanu (Leser. 38); Dima (Sap.). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — VIII : Eala et env. — Nom vern. : **Jakoi-Loko** (M. Laur. 140, 1215; Pyn.). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 110). — XV : Mushenge (Leser.); Bukila (Ém. et M. Laur. 504, 973, 978, 1142, 1243, 1358; Flam. 28); Kapilumba (Sap.). — Nom vern. : **Mompusu** [Bangala] (Sap.).

Leptactinia Liebrechtsiana *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 27 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 27]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 79, (1906) 200; II (1907) 73, 100.

1900 (J. Gillet). — V : entre le Kwango et Kisantu (But.); Kisantu (Gill. 182); Sanda et env. (Odd.; De Brouw. in Gill. 3002, 3109, 3119, 3416); rég. de Kimuenza (Gérard in Gill. 2042); Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3051, 3099).

Leptactinia Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 345.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1944). — VIII : Eala (Pyn. 916). — XI : Mogandjo (M. Laur. 577).

Leptactinia Sereti *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 280.

1896 (A. Dewèvre). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.).

Leptactinia surongaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 73.

1905 (F. Seret). — XII c : Surango (Ser. 422).

TARENNA Gaertn.

Tarenna congensis *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 91 et Cat. Welw. Pl. I, 457; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 159.

Chomelia — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 278; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 121; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 157.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew. 97; Pyn. 24).

RANDIA L.

Randia acarophyta *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 158, (1908) 346.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Pyn. 397, 443, 837, 1647). — XI : Yam-buya (M. Laur. 1440).

Randia acuminata [*G. Don*] *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 385; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 95; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 159; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 114; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 281 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 158, (1908) 346.

Gardenia — *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 499.

1870 (*G. Schweinfurth*). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Boandsu**; **Bondju** (*Dew.*). — VII : Ibali (*Ém.* et *M. Laur.*). — VIII : Irebu (*Schlt.*): Coquilhatville (*Pyn.*): Eala (*M. Laur.*; *Pyn.* 532, 951, 1302; *Flam.* 54); Mompoko [*Lulanga*] (*Brun.*). — IX : Bolombo — Nom vern. : **Etundulu** (*Ém.* et *M. Laur.*). — XII : Mapusi [rive gauche de l'Uele] (*Ser.*). — XII d : pays des Mangbettu (*Schw.*). — XIII c : Lokandu. — Nom vern. : **Kikiki** (*Dew.*). — XV : le Sankuru (*Sap.*). — Nom vern. : **Kilanga** [*Tanganika*] (*Dew.*).

Randia Bruneelii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 159, (1908) 346.

1906 (*Alberic Bruneel*). — VIII : Eala (*Pyn.* 1150); Basankusu; Mompono (*Brun.* 56).

Randia cladantha *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 62; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 114; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 159, (1908) 346.

1896 (*A. Dewèvre*). — V : env. de Lukolela. — Nom vern. : **Mocingate**; **Mompompolo** (*Dew.*). — VIII : Eala (*M. Laur.* 1102, 1274, 1572; *Pyn.* 882, 1041, 1760).

Randia congolana *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 28 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 28*] et Reliq. Dewevr. (1901) 114; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 201, II (1907) 74, 159, (1908) 346 et *Miss. Laurent* (1906) 281.

1896 (*A. Dewèvre*). — V : Kisantu; env. de Sanda (*Gill.* 3418, 3429). — VI : vallée de la Djuma (*Gent.*). — VIII : env. d'Eala (*M. Laur.* 117 a); Bombimba (*Pyn.* 326); Ioko [*Baringa*] (*Brun.* 33). — XI : Lokandu et env. (*Dew.* 1105; *Gos. saert*); en aval de Basoko; Malema; Barumbu (*Ém.* et *M. Laur.*). — XII a : entre Buta et Bima (*Ser.* 102). — XIII a : Stauleyville (*Pyn.* 70). — XV : Batempa; Butala; Dibele; Bolongula (*Ém.* et *M. Laur.*); le Sankuru. — Nom vern. : **Mokindu** (*Sap.*). — Ind. non cl. : Bena-Lecoula [*XIII c?*] (*Dew.* 1150 a).

Randia Cuvelierana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 79, (1904) 201 et *Miss. Laurent* (1906) 282, fig. 39.

1902 (*L. Gentil* et *J. Gillet*). — VI : Tshimbane (*Gill.* 2485, 2906; *Gent.* 82). — VIII : Eala (*M. Laur.* 121). — XII : Danga. — Nom vern. : **Bienga** (*M. Laur.* 6). — XV : Libusha (*Ém.* et *M. Laur.*).

Randia Eetveldeana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 24 [*B. S. B. B. XXXVIII², 194*]; Reliq. Dewevr. (1901) 115 et *Ill. fl. Cgo* (1902) 169, t. 85; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 283 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 74, (1908) 331.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 161). — IX : en aval de Bolombo; Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XII c : Nala (Van Ryss.). — XV : Butala (Lescr. 260).

Randia Eetveldea var. **elongata** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 283.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : le Mayumbe [Bukula] (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Randia Lemairei *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 155.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mukonli** (Verd.).

Randia Liebrechtsiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 23 [B. S. B. B. XXXVIII², 193] et Reliq. Dewevr. (1901) 117.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Bowana-Panzi** (Dew. 826).

Randia longiflora [*Salisb.*] *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 159.

Rothmannia — *Salisb.* Parad. Londin. (1807) t. 65.

Randia maculata *DC.* Prodr. IV (1830) 388; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 96.

Gardenia speciosa *A. Rich.* in Mém. Soc. hist. nat. Paris, V (1834) 240.

G. Stanleyana *Hook.* ex *Lindl.* in Bot. Reg. (1845) t. 47; Bot. Mag. (1845) t. 4185.

Rothmannia — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 383.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Randia Lujae *De Wild.* in Comp.-rend. Acad. sci. Paris (1904) 913 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 283 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 159.

1903 (Éd. Luja). — VIII : Lokelenge (Brun. 28). — XV : forêts du Sankuru (Luja).

Randia malleifera [*Hook.*] *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. II (1873) 89; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 89; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 31; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 159; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 160.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila? (Dup.). — V : Upoto? (Wilw.). — XI : Yambuya (M. Laur.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Randia micrantha *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 438; *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.

1882 (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

— — var. **Poggeana** *K. Schum.* l. c. (1896) 438.

1882 (P. Pogge). — XV : entre Kingenge et le Kasai (Pg. 977); Mukenge (Pg. 1051).

Randia Munsae Schweinf. ex Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 99; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 160.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Randia myrmecophita De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 160-163, fig. 5-8, t. 38-39, (1908) 346.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 822)

— — var. **glabra** De Wild. l. cc. 163 et 346.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Coquilhatville (M. Laur.). — XI : env. de Yambuya (Sohl. 44). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

— — var. **subglabra** De Wild. l. c. 163.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Yambuya (M. Laur. 1614, 1617).

— — var. **typica** De Wild. l. c. 160.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1616; Pyn. 445).

Randia nalaensis De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 347.

1907 (F. Seret). — XII c : env. de Nala (Ser. 805).

Randia octomera [Hook.] Benth. et Hook. f. Gen. pl. II (1876) 89; Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 98; K. Schum in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 439; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 31 et Reliq. Dewevr. (1901) 117; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 80, (1906) 201; II (1907) 74, 164, (1908) 346 et Miss. Laurent (1906) 283.

1882 (P. Pogge). — V : Kimuenza; entre Dembo et le Kwango (Gill.); Sanda (Odd.; De Brouw.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. et Gent.). — VII : Lac Léopold II (Body). — VIII : Bokakata (Dew.); Ikenge (Krek.); Eala (M. Laur.; Pyn.). — IX : pays des Bangala (Dem.); Umangi (Krek.). — XI : env. de Yambuya (Sohl.). — XIII a : Stanleyville (Pyn.). — XV : Bolongula; le Sankuru (Ém. Laur.); Munungu (Lescr.); Mukenge (Pg.); Mukikamu (Ém. Laur.); Dibele (Flam.). — Nom vern. : **Malalenko** [Sankuru] (Sap.).

Randia physophylla K. Schum. in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 64; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 81; II (1907) 74, 164.

1900 (R. Butaye). — V : env. de Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.); la Lukaya (Gill.). — VI : rég. du Kwango (But.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1557). — XV : Lubi (Lescr. 204).

Randia Pynaertii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 164, (1908) 347.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 1440); Mondjo (Pyn. 310). — XV : le Sankuru (Sap.).

MORELIA A. Rich.

Morelia senegalensis A. Rich. in Mém. Soc. hist. nat. Paris, V (1834) 232; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 113; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 74 et Reliq. Dewevr. (1901) 117; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 201; II (1907) 75, 167 et Miss. Laurent (1906) 285.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Zenze (Ém. Laur.); Shinganga (Dew.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Bolobo (Ém. et M. Laur.); Tshumbiri (M. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.). — VII : bassin de la Fini (Ém. Laur.); Lac Léopold II (Body). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Bala-Lundzi (Pyn.); XV : rég. de Mukenge (Pg.).

GARDENIA L.

Gardenia Jovis-tonantis *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 101 et Cat. Welw. Pl. I, 461; *Ficalho* Pl. Uteis, 461; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 348.

G. Thunbergia Auct. [non L.]. *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 160; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 283, t. 80 et fig. 40; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 124-126, t. 23 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 158.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Ém. Laur.). — II a : C. dans le Mayumbe (Ém. Laur.); Bingila (Dup.). — IV : route des Caravanes, C. [distr. des Cataractes] (Ém. Laur.); Luvituku (Pyn.). — V : C. dans le district (Ém. Laur.); le Stanley-Pool (Dem.); Léopoldville; Kisautu; Dembo (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — XII c : entre Guruga et Niangara (Ser.); entre Mapusi et Koko [Uele] (Ser.). — XV : Mission St-Joseph de Luluabourg (Lescr.); Luluabourg. — Nom vern. : **Kapulumba** (Sap.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kinkolela** (Verd.). — Ind. non cl. : bords de la Luile (Desc.).

Gardenia Leopoldiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 28 et Reliq. Dewevr. (1901) 117; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 285.

1895 (A. Dewèvre). — II : env. de Boma (Ém. et M. Laur.). — II a : Shinganga (Dew. 286).

Gardenia Sereti [*De Wild.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 348.

Randia — *De Wild.* l. c. II (1907) 164 [sphalm.].

1905 (F. Seret). — XII : bord de la Giradi près de Duru-Mokra (Ser. 152).

Gardenia Vogelii *Hook. f.* in *Hook.* Icon. pl. VIII (1848) t. 782-783 et Niger Fl. 381, t. 38-39; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 103; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 160.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

AMARALIA Welw.

Amaralia calycina [*G. Don*] *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 4 (1891) 78; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 32 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 118; *De Wild. Étud. fl. Bas et Moy.-Cgo*, II (1907) 74, 165 et *Miss. Laurent* (1906) 285.

Gardenia — *G. Don* *Gen. Syst. Bot.* III (1834) 497.

G. bignoniiflora *Welw.* *Apont. phyto-geogr.* (1859) 585.

Amaralia — *Welw. ex Benth. et Hook. f.* *Gen. pl.* II (1873) 91; *Hiern* in *Oliv.*

Fl. trop. Afr. III, 112; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 160; *De Wild.*

Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 201.

G. Sherbourniae *Hook.* in *Bot. Mag.* (1843) t. 4044.

Sherbournia foliosa *G. Don* in *Loud. Enc. pl. Suppl.* II (1855) 1322; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 466.

1870 (*G. Schweinfurth*). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.). — V : Bolobo (Ém. et M. Laur.); Kisantu (*Gill.*); Banza-Boma (*Luja*). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. : *Pyn.*). — IX : Bangala (*Dew.*). — XII d : pays des Mangbettu (*Schw.*). — XV : Lubefu (*Lescr.*); rég. de Mukenge (*Pg.*).

OXYANTHUS DC.

Oxyanthus dubius *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 285.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Ganda [*Lac Léopold II*] (Ém. et M. Laur.).

Oxyanthus formosus *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* (1848) t. 785-786; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 109; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 74 [*B. S. B. B. XXXVII, 117*]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 165.

1895 (Ém. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — XV : bords du Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Oxyanthus Laurentii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 165.

O. formosus *De Wild.* [non *Hook. f.*] *Miss. Laurent* (1906) 286.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.).

Oxyanthus sankuruensis *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 166.

1896 (Ém. Laurent). — XV : bords du Sankuru (Ém. Laur. 1906; *Sap.*).

Oxyanthus Schumannianus *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 119; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 81 et *Miss. Laurent* (1906) 286.

1900 (*J. Gillet*). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); env. de Kisantu : entre Kisantu et Dembo (*Gill.* 1542); Kimuenza (*Gill.* 1671).

OBS. — A. Dewèvre, qui le premier découvrit cette espèce, en 1896, la récolta dans le Congo français au N. du Stanley-Pool, n. 700.

Oxyanthus Smithii *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 107; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 161.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Oxyanthus speciosus *DC.* in *Annal. Mus. Paris*, IX (1807) 218 et *Prodr.* IV, 376; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 108; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 381; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 32; *Pl. Gilletiana*, I (1900) 28 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 28*] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 119; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 465; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 81; II (1907) 78, 116 et *Miss. Laurent* (1906) 286.

1895 (A. Dewèvre; Ém. Laurent). — II a : Kamba (Dew.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Kitobola (Pyn.); Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Lukolela (Dew.); Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — IX : Yaminga (M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur.); Yambuya (M. Laur.). — XV : Pangu (Ém. et M. Laur.).

Oxyanthus unilocularis *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 110; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 74 [*B. S. B. B. XXXVII, 119*] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 119; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 32; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 81 et *Miss. Laurent* (1906) 286.

1891 (F. Demeuse). — II a : Zenze. — Nom vern. : Ouku (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.); env. de Bokakata (Dew.). — IX : Bangala (Dem.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.).

POUCHETIA A. Rich.

Pouchetia africana *DC.* *Prodr.* IV (1830) 393; *A. Rich.* in *Mém. Soc. hist. nat. Paris*, V (1834) 117 et 251; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 117; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 161; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 467.

Wendlandia virgata *G. Don* *Gen. Syst. Bot.* III (1834) 519.

1816 (Chr. Smith). — V : Bas-Congo (Sm.).

— — var. **cuneata** *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 117; *Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 161; *De Wild. et Th. Dur. Mat. Th. fl. Cgo*, II (1898) 74 [*B. S. B. B. XXXVII, 117*] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 120.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.); Iles du Bas-Congo (Dew.). — II a : Zenze (Ém. Laur.).

Pouchetia Baumanniana *Buett.* in *Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.* XXXI (1889) 89; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 161.

1884 (R. Buettner). — III : montagnes de Tondoa (Buett. 445).

FERETIA Delile,

Feretia apodanthera *Delile* in *Annal. sci. nat. Sér. 2, XX* (1843) 92, t. 1, fig. 4; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr. III*, 115; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 156.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kasa-Sanga** (Verd.).

TRICALYSIA A. Rich.

Tricalysia aurantiodora *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 157.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 569).

Tricalysia coriacea *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr. III* (1877) 120; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 161.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Tricalysia Crepiniana *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 120; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 286 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 167.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala (M. Laur. 1131, 1446); Équateurville [Wangata] (Dew. 740); Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.).

— — var. **elliptica** *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 287.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2690).

Tricalysia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, VI* (1900) 30 [B. S. B. B. XXXVIII², 200] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 120; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1904) 203.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 964). — Noms vern. : **Genia** [Kasongo]; **Mzinia** [Tanganika] (Dew.).

Tricalysia djumaensis *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1904) 202; II (1907) 167.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2781). — XI : Limbutu (M. Laur. 1568).

Tricalysia Hensii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 167.

1888 (Fr. Hens). — V : Bolobo (Dem. 460); Lukolela (Hens, C. 121; Pyn. 273).

Tricalysia katangensis *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 156.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. **Musongwa** (Verd. 538).

Tricalysia Laurentii *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 287, 354.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.).

Tricalysia longestipulata *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 84 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 756]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 203; II (1907) 168 et Miss. Laurent (1906) 288.

T. griseiflora *K. Schum.* var. — *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1901) 28 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 28].

1900 (J. Gillet). — V : Lukolela (Pyn. 253); env. de Kisantu. — Nom vern. : **Kibete-Kibete** (Gill. 238, 887, 1108, 3401); Lemfu (But. in Gill. 3276); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Lescr. 99). — VII : Iballi (Ém. et M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); Eala et env. (M. Laur. 1171, 1564).

Tricalysia petiolata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 202; II (1907) 75; Miss. Laurent (1906) 289 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 281.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2756, 2840). — VIII : Équateurville [Wangata] (Ém. et M. Laur.) — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Tricalysia Pynaertii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 287, 354 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 75, t. 13, 168.

1891 (F. Demeuse). — VIII : Équateur (Pyn. 263); Mondombe (Dem. 468); Eala (Pyn. 395). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.).

Tricalysia reticulata [*Benth.*] *Hiern in Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 121; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 162.

Randia — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 386.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Tricalysia roseoides *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 85 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 825].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 454, 923, 1349).

Tricalysia Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 168.

1907 (A. Sapin). — VI : Madibi (Sap.).

Tricalysia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 168.

1907 (F. Seret). — XII c : Gombari (Ser. 559).

Tricalysia Welwitschii *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1897) 449; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 288 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 169.

1903 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Pyn. 40). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.): entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.).

OBS. — Cette espèce paraît répandue dans les districts des Cataractes [IV] et du Stanley-Pool [V] (Ém. et M. Laur.).

CHOMELIA Jacq.

Chomelia apiculata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 205.

1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Chomelia Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1901) 29 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 29]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 207; II (1907) 78.

Tarenna — *De Wild.* et *Th. Dur.* l. c. in obs.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 207. in syn.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu et env. : entre Tumba et Kimpesse (Gill. 149, 3442).

Chomelia Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1904) 206; II (1907) 78, 157 et Miss. Laurent (1906) 281.

1903 (Marc. Laurent). — V : env. de Lemfu (But.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 167, 1199). — IX : Bumba (Pyn.) : Bombimba (M. Laur. 1155).

Chomelia longifolia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 206, t. 37; II (1907) 157.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.); Madibi. — Noms vern. : **Tuatua**; **Mopukabuko** (Sap.).

Chomelia nigrescens [*Hook. f.*] *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 126.

Coptosperma — *Hook. f.* in *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. II (1873) 87.

Tarenna — *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 92.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 266).

PENTANISIA Harv.

Pentania variabilis *Harv.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. I (1842) 21; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 384; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 32; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 158.

P. Schweinfurthii *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 131; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 162.

1891 (G. Descamps). — XVI : bords du Moero (Verd.); env. de Lukafu. — Nom vern. : **Sjinko** (Verd.); le Katanga (Corn.); Musima (Briart); le Lualaba (Desc.).

CREMASPORA Benth.

CreMASpora triflora [*Schumach.* et *Thonn.*] *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 88 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 383; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 162; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162; II (1907) 171.

Psychotria triflora Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 128.

Coffea hirsuta G. Don Gen. Syst. Bot. III (1834) 581.

CreMASpora africana Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 412; *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 126 et Cat. Welw. Pl. I, 471; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 291.

1870 (G. Schweinfurth). — V : en aval de Bolobo (Krek.). — IX : Lie (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Krek.); — XI : env. de Bena-Kamba (Dew.); Mogandjo (M. Laur.); Mompono (Brun.); Bomaneh (M. Laur.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

POLYSPHAERIA Hook. f.

Polysphaeria pedunculata K. Schum. ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 226.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Katisa; Tsinkoliba** (Verd. 191, 293).

AULACOCALYX Hook. f.

Aulacocalyx jasminiflora Hook. f. in Hook. Icon. pl. (1873) t. 1126; *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 129; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 82; II (1907) 171.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — V : Lukolela (Pyn.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.).

— — var. **latifolia** *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 27 [B. S. B. B. XXXVIII², 197] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 32.

1898 (Éd. Luja). — V : forêt de Sabuka (Luja).

PLECTRONIA L.

Plectronia acarophyta *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 173.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Mondjo (Pyn. 317).

Plectronia Arnoldiana *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 29 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 29]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 82; II (1907) 76.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 595); rég. de Sanda (Odd.).

Plectronia Barteri [*Hiern*] *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 33.

Canthium — *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 143.

1895 (Ém. Laurent). — XV : à l'est de Lusambo (Ém. Laur.).

Plectronia brevifolia [Engl.] Engl. ex De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 33 et Reliq. Dewevr. (1901) 122; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo (1906) 204.

Canthium — Engl. in Engl. Jahrb. VIII (1886) 67; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 162.

1893 (Ém. Laurent). — bois du Bas-Congo, AC (Ém. Laur.). — II : Boma (Dew. 117). — V : env. de Kisantu (Gill. 2005, 3274). — Noms vern. : plante : **Filulolo**; fruit : **Diuka** (Dew.).

Plectronia congensis [Hiern] Th. et Hél. Dur.

Canthium — Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 141 et Cat. Welw. Pl. I. 477; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 162.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Plectronia connata De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, VI (1899) 31 [B. S. B. B. XXXVIII², 201] et Reliq. Dewevr. (1901) 122; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 204.

1896 (A. Dewèvre). — V : bassin de la Sele (But. in Gill. 1476). — VIII : Bolenge. — Nom vern. : **Boka-Napombo** (M. Laur. 147). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc. 681).

Plectronia cornelioides De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 159.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Noms vern. : **Mukwakasa**; **Kapekille** (Verd. 32, 124).

Plectronia Dewevrei De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 203 et Miss. Laurent (1906) 293.

1891 (F. Demeuse). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — V : distr. du Stanley-Pool (Dem. 217); env. de Léopoldville (Gill.); Kimuenza (Gill. 784). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Plectronia Gentilii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 83 et Miss. Laurent (1906) 294.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill. 2884). — IX : Busa (Ém. et M. Laur.).

Plectronia Gilletii De Wild. Miss. Laurent (1906) 293 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 77, t. 4.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kwamouth; Kisantu (Gill. 1894); Kimuenza (Gill. 1722).

Plectronia Laurentii De Wild. Miss. Laurent (1906) 294, t. 98-99 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 174, (1908) 348.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Bokala (M. Laur. 637); env. de Lukolela (Pyn. 231); Tshumbiri (M. Laur. 638). — VIII : Eala (M. Laur. 1607); Irebu; Bolenge (M. Laur. 1450). — IX : Bolombo; Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — XI : Malema (Ém. et M. Laurent). — XIII a : Romée (Kohl).

Plectronia Lualabae *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 76.

1882 (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

Plectronia lucida *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 33
et *Reliq. Dewevr.* (1901) 122.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 657).

Plectronia Oddoni *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907)
76, t. 5.

1903 (Ad. Oddon). — V : env. de Kisantu (Odd. in Gill. 3651).

Plectronia psychotrioides *K. Schum.* ex *De Wild.* *Étud. fl. Kat.*
(1903) 228.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 312, 338).

Plectronia pulchra *K. Schum.* ex *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 229.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mufula** (Verd. 381).

Plectronia Pynaertii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907)
174.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 403).

Plectronia tomentosa *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903)
83 et *Miss. Laurent* (1906) 296.

1902 (J. Gillet). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2644).

Plectronia venosa *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 85, t. 49;
K. Schum. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 286; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.*
(1903) 160.

Canthium — *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 144.

1900 (Edg. Verdick). — VI : Lukafu (Verd. 569).

VANGUERIA Juss.

Vangueria brachytricha *K. Schum.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 227.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Vangueria canthioides *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 408; *Hiern*
in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 149 et *Cat. Welw. Pl.* I, 480; *De Wild.*
Contr. fl. Cgo, II (1900) 34 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 82.

1891 (F. Demeuse). — V : Léopoldville (Schlt.); Kimuenza (Gill. 1745). — IX :
Bangala (Dem.).

Vangueria Demeusei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 172, t. 41.

1891 (F. Demeuse). — V : Kimuenza (Gill. 1745). — VIII : Eala (M. Laur. 1164; Pyn. 575). — IX : Bangala (Dem. 326).

Vangueria Dewevrei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 15 [B. S. B. B. XXXVIII², 92] et Reliq. Dewevr. (1901) 123; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 292.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.); Shinganga (Dew. 307).

Vangueria infausta *Burch.* Trav. South Afr. II (1829) 258; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 147 et Cat. Welw. Pl. I, 480; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 384; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 159 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1907) 159.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mabolela** ou **Malolela** (Verd.).

Vangueria katangensis *K. Schum.* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 227.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Vangueria Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 292.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.).

Vangueria rubiginosa *K. Schum.* in *Engl.* Jahrb. XXIII (1897) 457 et XXVIII (1899) 72.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1061).

Vangueria tristis *K. Schum.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 227.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Pweto (Verd.).

Vangueria Verdickii *K. Schum.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 228.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kibusji** (Verd. 350).

FADOGIA Schweinf.

Fadogia ancylantha *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 155; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 74 [B. S. B. B. XXXVII, 117].

1896 (G. Descamps). — XVI : Kapanga [Tanganika] (Desc.).

Fadogia Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 204.

1900 (R. Butaye). — V : entre Dembo et le Kwango (But.).

Fadogia Cienkowskii *Schweinf.* Reliq. Kotschyanae (1868) 47 ; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 154 ; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120] ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1903) 77.

1895 (Gust. Debeerst). — V : entre Kisantu et le Kwango (But.) ; vallée de la Lumene (Hendr.). — XVI : Beaudoinville (Deb.).

Fadogia fuchsioides *Welw.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 85, t. 54 ; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 155 et Cat. Welw. Pl. I, 482 ; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 160.

1899 (Edg. Verdick). — VI : rives du Kwango entre Popokabaka et les chutes François-Joseph (Gent.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Fadogia lactiflora *Welw.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 156 et Cat. Welw. Pl. I, 483 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 78.

1904 (Alph. Cabra et Michel). — VI : env. de Kimbele (Cabra-Michel, 45).

Fadogia tomentosa *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 78, (1908) 348.

1900 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.). — V : Léopoldville (Gill.) ; Dembo (Vanderyst).

Fadogia Verdickii *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1901) 15 [B. S. B. B. XL, 21].

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 60)

CUVIERA DC.

Cuviera angolensis *Welw.* ex *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 94 fig. 33 J ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 483 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 86 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 826] et Reliq. Dewevr. (1901) 124 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 296-299, t. 106, fig. 41 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 205 ; II (1907) 78, 173, (1908) 348.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.) ; Kisantu (Gill.). — VI : Kikwite (Lescr.). — VII : rive gauche du Congo en aval de Bolombo (M. Laur.). — VIII : Irebu (Pyn.) ; Eala [Ikakemo] (M. Laur.). — XI : Malema ; env. de Lie (Ém. et M. Laur.). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XIII a : chutes de la Tshopo (M. Laur.). — Ind. non cl. : Lifingula (Ser.).

ANCYLANTHUS Desf.

Ancylanthus fulgidus *Welw.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 158 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 484 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 76.

1902 (R. Butaye). — VI : rég. du Kwango (But.).

CRATERISPERMUM Benth.

Craterispermum angustifolium *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 13 [B. S. B. B. XXXVIII², 89] et Reliq. Dewevr. (1901) 124.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Buginda [Lulanga] (Dew. 811).

Craterispermum brachynematum *Hiern in Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 161; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 30 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 30]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 292 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 76, 171, (1908) 348.

1899 (J. Gillet). — V : env. de Bolobo (Ém. Laur.); env. de Sanda (Odd.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (Flam.). — IX : Upoto (Welw.). — XII : Gombari au bord de la riv. Bendet (Ser.). — XV : Lac Foa (Leser.).

— — var. **breviflorum** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 172.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1445).

Craterispermum congolanum *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo. IV (1899) 13 [B. S. B. B. XXXVIII², 90] et Reliq. Dewevr. (1901) 125; *De Wild.* Étud. fl. Bas et Moy.-Cgo, I (1904) 204; II (1907) 76, 171, (1908) 348 et Miss. Laurent. (1906) 293.

1891 (F. Demeuse). — V : env. de Kisantu (Gill. 2003); Sanda (Odd.); entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur. 1197; Pyn. 1765). — IX : Bangala (Dem.); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1566); Isangi (Ém. et M. Laur.); Malema (Ém. et M. Laur.). — XII c : Gombari (Ser. 506 b); Bomaneh (M. Laur. 1567). — XIII c : Wabundu [Ponthierville] (Dew. 1144 c). — XV : entre Luluabourg et Kanda-Kanda (Gent.).

Craterispermum Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 11 [B. S. B. B. XXXVIII², 88]; Reliq. Dewevr. (1901) 125 et Pl. Gilletianae, II (1901) 86 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 826].

1896 (A. Dewèvre). — IV : Gombi (Dew.). — V : Bolobo (Dew. 697); Kisantu (Gill. 1074).

Craterispermum laurinum *Benth. in Hook.* Niger Fl. (1849) 411; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 30 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 30].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Craterispermum reticulatum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 158.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kibubia (Verd. 122).

IXORA L. (1)

***Ixora enosmia* K. Schum.** in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 355; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 345.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : en aval de Bumba (Ém. et M. Laur.).

***Ixora Laurentii* De Wild.** Miss. Laurent (1906) 345, t. 93 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 177.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. Laur. 508; Pyn. 202). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.).

***Ixora longipedunculata* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 177.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1451); en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.).

— — var. ***Dewevrei* De Wild.** l. c. II (1907) 178, t. 37.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew. 1157).

***Ixora odorata* Hook. f.** in Bot. Mag. (1845) t. 4191; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 163; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120]; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 387; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1906) 45 et Reliq. Dewevr. (1901) 126; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 346 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 83; II (1907) 178.

1891 (F. Demeuse). — V : env. de Léopoldville (Gill); Chenal (Ém. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Gill). — IX : île du Congo en aval d'Upoto (Ém. Laur.); entre Gorima et Inkaea (Dew.); Bogali (Thonn.). — XII b : Bambili; Surango (Ser.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. Laur.). — XV : Ibaka (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Gunchon [? Gunshu?, Congo franç.].

***Ixora radiata* Hiern** in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 163; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 178.

1904 (Ém. et Marc. Laurent.). — IX : Lie (Ém. et M. Laur.).

— — var. ***latifolia* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 83; II (1907) 79, 178 et Miss. Laurent (1906) 346.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2662). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2924). — VIII : env. d'Eala (Ém. et M. Laur.): Sanda et env. (Vermeul. in Gill. 3431; Odd. in Gill. 3008); Mompono [Maringa] (Brun. 43). — IX : env. de Bumba (Sér. 20). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1452). — XV : Lac Foa (Lescr. 217).

(1) L'*Ixora coccinea* L. [*Hook. f.* Fl. Brit. Ind. III, 145] espèce de l'Asie tropicale, est introduit à Matadi [III] et à Eala [VIII] (M. Laur.). [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 177].

Ixora Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 178.

1905 (F. Seret). — XII : case Koko [riv. gauche de l'Uele] (Ser. 381).

Ixora Soyauxii *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 166 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 163 ; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120] et Reliq. Dewevr. (1901) 126 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 208 ; II (1907) 79, 179.

1888 (Fr. Hens). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens) ; env. de Léopoldville (Gill.) ; Lukolela (Dew. ; Pyn.). — VIII : Eala (M. Laur.) ; bassin de la Maringa (Brun.).

PAVETTA L.

Pavetta Baconia *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 176 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 163 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 487 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 346 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. II (1907) 176.

Randia corymbosa *DC.* in *Annal. Mus. Paris*, IX (1807) 220.

Verulania — *DC.* in *Lam. Encycl. méth. Bot.* VIII (1808) 543.

Ixora nitida *Schumach.* et *Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 77.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — II a : Zenze (Ém. Laur.). — VIII : Équateur (Pyn.) ; Eala (M. Laur.). — XII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

— — var. **congolana** *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 126.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : rives de la Lamaba à Kasongo. — Nom vern. : **Kasilu** (Dew. 1000).

— — form. **puberulosa** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 346.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : la Lukula ; Kalamu (Ém. et M. Laur.).

Pavetta canescens *DC.* *Prodr.* IV (1830) 492 ; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 178.

P. tomentosa *A. Rich.* [non *Roxb.*] in *Mém. Soc. hist. nat. Paris*, V (1834) 181.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech.-Loesche).

Pavetta crassipes *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 389 ; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 229.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mobala** (Verd. 334).

Pavetta flammea *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 83.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1107).

Pavetta Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 176, t. 39.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1447).

Pavetta Lescrauwaetii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 79, t. 12.

1904 (Éd. Lescrauwaet). — XV : Munungu (Lescr. 247).

Pavetta longituba *K. Schum. ex De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 207.

1899 (Cél. Hecq.). — XVI : zone du Tanganika (Hecq.).

Pavetta Warburgiana *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 127.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : près de Kisanga (Dew. 1080).

COFFEA L.

Coffea arabica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 172; Bot. Mag. (1810) 1303; *Hiern* in *Oliv*, Fl. trop. Afr. III, 180; *Bentl. et Trim.* Medic. Pl. II, t. 144; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 163; *Froehner* in Engl. Jahrb. XXV (1898) 26; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120] et Reliq. Dewevr. (1901) 127; *De Wild.* Les Caféiers (1901) 35.

1896 (A. Dewèvre et Ém. Laurent). — V : île entre Lukolela et Gombi (Dew.). — VIII : Équateur (Dew.). — X : distr. de l'Ubangi (Ém. Laur.). — "Caféier cultivé à la Lemba [II a] (Dew.); dans le Bas-Congo" (Ém. Laur.) et à Coquilhatville [VIII] (Ém. Laur.).

Coffea Arnoldiana *De Wild.* in Compte-rendu Congr. intern. bot. Paris (1900) 236 [Not. sur qlq. esp. de Coffea, 16] et Miss. Laurent (1906) 325, t. 74.

1904 (Ém. et Marc. Laur.). — XI : distr. de l'Aruwimi (Coll.?) — Caféier cultivé à Eala [VIII] (Ém. et M. Laur.).

Coffea aruwimiensis *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 321, t. 66 et fig. 51.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — X : Monga (Ém. et M. Laur.). — XI : distr. de l'Aruwimi (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Wanie-Rukula (Ém. et M. Laur.). — Caféier cultivé à Siranga [X] et à Basoko [XI].

Coffea canephora *Pierre ex Froehner* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1897) 230, 237 et in Engl. Jahrb. XXV (1898) 269; *Lecomte* Le Café, 32, fig. 6; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75

[B. S. B. B. XXXVII, 120]; *De Wild.* Les Caféiers, I (1901) 37 et Miss. Laurent (1906) 329.

1895 (Ém. Laurent). — Ind. non cl. : le Lomami (Coll.?). — Cultivé à Lusambo [XV] (Ém. Laur.).

C. canephora var. **crassifolia** *Ém. Laurent ex De Wild.* Miss. Laurent (1906) 333, t. 76.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

— — var. **kouilouensis** *Pierre in De Wild.* Les Caféiers (1901) 21 et Miss. Laurent (1906) 334, t. 101.

1903 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — Cultivé à Luvituku [IV] (Ém. Laur.).

— — var. **sankuruensis** *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 330-333, t. 77, fig. 52-53.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Ibaka (Ém. Laur.). — Caféier cultivé à Lusambo [XV], à Dibebe [XV], à Idanga [XV], à Bombaie [XV] (Ém. Laur.) et à Ikongo [VII] (Ém. Laur.).

— — var. **Wildemanii** *Pierre ex De Wild.* Les Caféiers (1901) 25.

1906 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 976 a).

Coffea congensis *Froehner in Notizbl. bot. Gart. Berlin* (1897) 230 et in *Engl. Jahrb.* XXV (1898) 265; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120]; *Lecomte Le Café*, 27; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 335.

1896 (Ém. Laurent). — VIII : île en face de Coquilhatville (Ém. Laur.). — XIII c : île du Lualaba; Congo près de Wabundu [Ponhierville] (Ém. Laur.). — Cult. aux Stanley-Falls [XIII a] (Ém. Laur.).

— — var. **Chalottii** *Pierre in De Wild.* Les Caféiers (1901) 17 et Miss. Laurent (1906) 335, t. 71-72, fig. 54.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 737). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kinshassa, cult. (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur (L. Pyn.). — IX : Ukaturaka; île en aval de Bumba (Ém. et M. Laur.). — IX a : Bili [Mongo] (Kembrouck). — Cult. à Wangata [VIII] (Ém. et M. Laur.) et à Imese dans une île de l'Ubangi [X] (Ém. et M. Laur.).

— — var. **Froehneri** *Pierre ex De Wild.* Les Caféiers (1901) 15.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 736).

— — var. **subsessilis** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 337-338, t. 73.

1896 (Ém. Laurent). — XIII a : cult. aux Stanley-Falls, comme provenant de l'Ubangi, mais paraît indigène (Ém. Laur.). — XIII c : île du Lualaba près de Wabundu [Ponhierville] (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Batekolela (Ém. et M. Laur.).

Coffea Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 32 [B. S. B. B. XXXVIII², 202] et Reliq. Dewevr. (1901) 128; *De Wild.* Les Caféiers (1901) 38.

1896 (A. Dewèvre). — Ind. non cl. : Bena-Lecula (Dew. 1149).

Coffea divaricata *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1897) 461; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 33 et Reliq. Dewevr. (1901) 126; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 345.

1891 (F. Demeuse). — VIII : Bokakata (Dew.). — IX : Upoto : Lisala (Ém. Laur.); pays des Bangala (Dem.).

Coffea jasminoides *Welw. ex Hiern* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1876) 175; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop Afr. III, 185; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 164; *Froehner* in Engl. Jahrb. XXV (1898) 257; *Lecomte* Le Café, 15; *De Wild.* Les Caféiers (1901) 39; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 490.

1882 (P. Pogge). — VI : Ganga près Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — XV : Mukenge (Pg.).

— — var. **Trilesiana** *Pierre ex De Wild.* Les Caféiers (1901) 29 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 81.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2849).

Coffea Laurentii *De Wild.* in Act. Congr. intern. bot. Paris (1900) 234 [Not. sur qlq. esp. de *Coffea*, 14]; Les Caféiers (1901) 28, 39 et Miss. Laurent (1896) 328.

1905 (Ém. Laurent). — XV : Café du Sankuru cultivé à Lusambo (Ém. Laur.); Bombaie (Gent.). — Cult. à Kasongo [XIII d] (Dew. 887).

Coffea liberica *Bull ex Hiern* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1876) 171, t. 24 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 181; *K. Schum.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 103, fig. 31; *Froehner* in Engl. Jahrb. XXV (1898) 269; *Lecomte* Le Café, 35; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 489; *De Wild.* Les Caféiers, I (1901) 18, 39 et Miss. Laurent (1906) 338, t. 104.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Nioki [la Fini] (Ém. et M. Laur.). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.); Malema (Ém. et M. Laur.).

Espèce cultivée à Lukolela et Léopoldville [V] (Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 339).

Coffea robusta *L. Linden* Cat. pl. nouv. de l'Hortic. colon. (1901) 11, 65, c. xyl.; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 328-329 in obs.

1900 (Em. Duchesne et Ed. Luja). — Congo (Duch. et Luja).

Coffea Royauxii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 326-328, t. 78.

1891 (Royaux). — X : Banzyville [Ubangi] (Royaux).

« Caféier importé de Bili [VII] et que l'on rencontre aussi en petite quantité dans la région ». [*De Wild.* Miss. Laurent (1906) 327].

Coffea spathicalyx *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1897) 464 ; *Froehner* in Engl. Jahrb. XXV (1898) 266 et in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1899) 232 ; *De Wild.* Les Caféiers I (1901) 41 et Miss. Laurent (1906) 344.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2693).

***Coffea stenophylla** *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 587 ; *Hiern* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1876) 172 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 182 ; Bot. Mag. (1896) t. 7475 ; *De Wild.* Les Caféiers, I (1901) 41 et Miss. Laurent (1906) 340 ; t. 62-64.

1905 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : cultivé à Eala (Ém. et M. Laur.).

« Cette espèce ne paraît pas exister à l'état indigène au Congo ».

Coffea subcordata *Hiern* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1876) 174 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 184 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 128 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 345.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.).

RUTIDEA DC.

Rutidea Dupuisii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 174.

R. rufipilis *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Hiern*] Contr. fl. Cgo, II (1900) 34.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — VIII : Injolo (M. Laur. 1439)

Rutidea hispida *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 189 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 31 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 31] ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84 ; II (1907) 80, 176 et Miss. Laurent (1906) 346.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.) ; entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur. ; Pyn.). — XI : Limbutu (M. Laur.).

Rutidea leucotricha *K. Schum.* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 346.

1903 (Ém. Laurent). — IV : Luvituku (Ém. Laur.).

Rutidea olenotricha *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 189 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 164.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

Rutidea Schlechteri *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 320 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — VIII : Irebu (Schl. 12632).

Rutidea Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 175.

1906 (F. Seret). — XII c : env. de Gombari (Ser. 559).

Rutidea Smithii *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 189; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 164; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 129; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 80.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Dew.); Congo (Dew. 168?). — V : Kisantu (Gill. 149, 3377). — VI : Madibi (Lescr. 197).

MORINDA L.

Morinda citrifolia *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 176; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III. 189; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 394; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 164 [err. cal. *Morelia*]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 492; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 34 et Reliq. Dewevr. (1901) 129; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1906) 133-135 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 189, (1908) 349.

M. geminata *DC.* Prodr. IV (1830) 447.

M. quadrangularis *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 545.

M. lucida *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 406.

M. citrifolia *L.* var. — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 402.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu. — Nom vern. : **Siki** (Dew.). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu; Kimuenza (Gill.). — VI : Eïolo (Ém. et M. Laur.); Madibi (Sap.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew.); Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Pyn.); zone Malo (Brun.). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : Yanongo (Ém. et M. Laur.); Romée (M. Laur.). — XV : Munungu; Lusambo (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (Sap.); Bandaka-Kole (M. Laur.). — Ind. non cl. : le Lomami (Dew.); Yanumbi (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Keaborina**; **Bokakate** [Kwilu] (Sap.); **Ntingu**; **Tchungu** [Sankuru] (Sap.).

Morinda longiflora *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 545; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 192; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165 [err. cal. *Morelia*]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120] et Reliq. Dewevr. (1901) 129; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 492; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 209; II (1907) 81, 190, (1908) 349 et Miss. Laurent (1906) 353.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Lescr.); route de Kikwite à Boala (Lescr.). — VIII : Équa-

teurville [Wangata] (Dew.): Eala et env. (M. Laur.): Lulanga (Ém. et M. Laur.).
 — IX : Upoto (Ém. Laur.): env. de Bumba (Dew.); Umangi (Ém. et M. Laur.).
 — XI : Mogandjo (M. Laur.; Pyn.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). —
 XIII d : Nyangwe (Dew.). — XV : Munungu (Sap.). — Noms vern. : **Lebwa**
 [Ikwangula]; **Kiupe** [Kasongo] (Dew.). — Ind. non cl. : Lomami; Bas-Lualaba
 (Ém. Laur.).

GRUMILEA Gaertn.

Grumilea moninensis *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 496; *De Wild.*
 Étud. fl. Kat. (1903) 229.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 311).

Grumilea psychotrioides *DC.* Prodr. IV (1830) 495; *Hiern* in
Oliv. Fl. trop. Afr. III, 216; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr.
 (1901) 129.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Kemba (Dew.).

Grumilea venosa *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 217; *De*
Wild. et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 130.

1895 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Dew. 482). — VIII : Bokakata. — Nom
 vern. : **Dijito** (Dew. 800).

PSYCHOTRIA L.

Psychotria acamptopoda *K. Schum.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et
 Moy.-Cgo, I (1904) 84; II (1907) 80.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2832, 2858; Gent.).

Psychotria Ansellii *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 214;
Th. Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165; *De Wild.* et *Th. Dur.*
 Contr. fl. Cgo, II (1900) 24 et Reliq. Dewevr. (1901) 129; *De Wild.*
 Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84.

Chasalia laxiflora *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 416.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Zenze (Ém. Laur.); Shinganga (Dew.). — V :
 Kisantu : Kimuenza : Dembo (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

Psychotria Bieleri *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907)
 179, t. 64 [sphalm. t. 64 in text.].

1904 (S. Bieler). — VIII : Haut-Lopori (Biel.).

Psychotria brachyantha *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877)
 196; *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 321.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12566).

Psychotria brunnea *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 201; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : vallée du Kibali [Mangbettu] (Schw.).

Psychotria Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) t. 64.

1902 (R. Butaye). — V : env. de Kisantu (But.).

Psychotria Cabrae *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 349.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 117). — II a : Haut-Shiloango (Cabra-Michel); la Lukula (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Léopoldville; Kisantu (Gill. 596, 1121, 1163, 1352). — VII : Kutu (Ém. et Laur.).

Psychotria cinerea *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 181, t. 43.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : forêt des env. d'Elungu [rég. de Nyangwe] (Dew. 1063).

Psychotria cristata *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 203; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 181.

Myrsiphyllum — *Hiern.* Cat. Welw. Pl. I (1898) 493.

1870 (G. Schweinfurth). — IX : Bangala (Dem. 305); Nouvelle-Anvers (Pyn. 2). — XII : Munza [Mangbettu] (Schw.).

Psychotria cyanopharynx *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 90.

1881? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 982).

Psychotria Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 208.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kasongo. — Nom vern. : **Kan** (Dew. 911). — Nom vern. : **Wangate** [Tanganika] Dew.

Psychotria djumaensis *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 349.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2791).

Psychotria ealaensis *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 348, t. 94 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 182.

1903 (Marc. Laurent). — V : Kisantu et env. (Gill. 362, 1071, 3246). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 224, 1105); Mondjo (Pyn. 312).

Psychotria Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 208; II (1907) 80, 182.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 251, 487, 889); entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Mayidis (Odd. in Gill. 1881); Sanda (Odd. in Gill. 3710). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 281); Eala (M. Laur. 1610; Pyn. 545, 599).

Psychotria gracilescens *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 182, t. 42.

1904 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1581).

Psychotria hamata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 183, t. 45.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Mobanga [rég. de Coquilhatville] (Dew. 760 b).

Psychotria Kimuenzae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 184.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu et env. (Gill. 664, 1154, 2355; Odd.); Kimuenza (Gill. 2199); Mayidis (Gill.).

Psychotria kisantuensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 185, t. 58.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 115).

Psychotria Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 307, t. 95.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2566); Tshumbiri (M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew. 690); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Psychotria longevaginalis *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 201; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : la Kapili [pays des Mangbettu] (Schw.).

Psychotria mogandjoensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 185, t. 46.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 982); Limbutu (M. Laur. 1442).

Psychotria nigropunctata *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 207; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 165; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 350 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 80, 186.

Myrsiphyllum — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 493.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Kitobola; Gongolo (Pyn.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Lemfu (But.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

Psychotria obovatifolia *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 186, t. 49.

1900 (Marc. Laurent). — XI : Yambuya (M. Laur. 1563)

Psychotria Oddoni *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 187, t. 44.

1903 (Ad. Odon). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3001, 3746).

Psychotria Poggei *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 97.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1039, 1095, 1251).

Psychotria potamophila *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 97.

1881 (P. Pogge) — XV : Mukenge (Pg. 1049).

Psychotria pygmaeodendron *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 98.

1876 (P. Pogge). — XV : entre Kimbundo et le Kwango (Pg. 534).

Psychotria stigmatophylla *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 100.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1078).

Psychotria Vogeliana *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 210; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 210; *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.

1881 (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

Psychotria Wildemaniana *Th. Dur.* ex *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 349 [nom. nov.].

P. djumaensis *De Wild.* l. c. II (1907) 182 [non Miss. Laurent].

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill. in Gill. 2738, 2762, 2768).

GEOPHILA D. Don.

Geophila Aschersoniana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 74; *Th. Dur.* et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 166.

1885 (R. Buettner). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buett.)

Geophila hirsuta *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 422; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 221; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 188, (1908) 349.

1905 (Éd. Lesclauwaet). — VI : Madibi (Sap.). — XII a : entre Buta et Bima (Ser. 77). — XII b et c : entre Bambili et Amadis (Ser. 200). — XV : Batempa (Lescr.). — Noms vern. : **Malari** [Kwilu]; **Eaki** [Bangala] (Sap.).

— — var. **brevifolia** *De Wild.* l. c. II (1907) 189.

1906 (Albéric Bruneel). — VIII : Betutu sur la Loporé (Brun. 8).

— — var. **hirsutissima** *De Wild.* l. c. II (1907) 188, (1908) 349.

1902 (J. Gillet). — V : rég. de la Lumene (Hendr.). — VIII : env. de Léopoldville (Gill. 3080); Injolo (Huyghe et Ledoux).

G. hirsuta var. **stricta** *De Wild.* l. c. II (1907) 188.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Injolo (M. Laur. 1578).

Geophila involucrata *Schweinf.* ex *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 222; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 166; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 34 et Reliq. Dewevr. (1901) 136; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84; II (1907) 189, (1908) 349 et Miss. Laurent (1906) 352.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Gill.). — Bas-Congo (Cabra). — IV : Luozi (Luja). — V : Kimuenza (Dew. 518); Dembo (Vanderyst). — XII d : Munza; riv. Mbruole (Schw.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.).

Geophila obvallata [*Schumach.* et *Thonn.*] *F. Didr.* in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 186; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 222; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 45; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 349.

Psychotria — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 111.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn.). — XI : env. de Yambuya (Solh.).

Geophila renaris *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 29; II (1900) 34; Pl. Thonnerianae (1900) 45, t. 2 et Pl. Gilletianae, I (1900) 31 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 31]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84, (1904) 209; II (1907) 81, 189 et Miss. Laurent (1906) 352.

1888 (F. Demeuse). — V : Kisantu (Gill.); Lula-Lumene (Hendr.); Sanda (Odd.). — VII : Inongo; Kiri (Ém. et M. Laur.); Ikata (Dem.). — VIII : Eala (M. Laur. 1213). — IX a : Gali (Thonn.). — XV : forêts du Sankuru (Ém. et M. Laur.); Bukila (Ém. et M. Laur.).

Geophila reniformis *D. Don* Prodr. fl. Nepal. (1825) 136; *Wight.* Icon. pl. Ind. or. I, t. 54; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. III, 178; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 220; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 31 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 31].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

TRICHOSTACHYS *Hook. f.*

Trichostachys Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 351.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.).

Trichostachys microcarpa *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 88; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 351 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 80, t. 14.

1881 (P. Pogge). — Congo (Dem.). — V : env. de Kimuenza (Gill.) et de Sanda (Odd.); Tumba (Dem.). — XV : Mukenge (Pg. 1257).

URAGOGA L.

Uragoga ceratoloba *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 105.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1160).

Uragoga peduncularis [*Salisb.*] *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 4 (1891) 120; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 75 [B. S. B. B. XXXVII, 120]; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 498; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 130; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 229; *Miss. Laurent* (1906) 353 et *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, II (1907) 81, 189.

Cephaelis — *Salisb. Parad. Lond.* (1808) t. 99; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 223.

1892 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — IV : env. de Gombi (Dew.). — V : Lukolela (Pyn.). — VI : Eiolo (Em. et M. Laur.). — VIII : Bikoro (Pyn.). — IX : Yaminga (Pyn.); Bolombo (Em. et M. Laur.). — XV : Ibanga; bords du Sankuru (Em. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Uragoga Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Thonnerianae* (1900) 46, t. 9.

1896 (Fr. Thonner). — IX : Bobi (Thonn.).

CEPHAELIS Sw.

Cephaelis congensis *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 226; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 166.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

LASIANTHUS Jack.

Lasianthus tortistilus *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 108; *Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 859.

1882 (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).

OTIOPHORA Zucc.

Otiophora pulchella *K. Schum. ex De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 230.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga. — Nom vern. : **Kampumboi** (Verd. 320).

DIODIA L.

Diodia maritima Thonn. in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 75; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 231; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 166.

D. foliosa Wawra et Peyr. Sert. Benguel. (1860) 39.

1885 (R. Buettner). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buett. 474). — Ind. non cl. : Kibaka (Buett. 575).

Diodia scandens Sw. Prodr. fl. Ind. occ. (1788) 30; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 501.

D. breviseta Benth. in *Hook. Niger Fl.* (1849) 424; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 231; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 166; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 34; *Pl. Thonnerianae* (1900) 47 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 130; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 353 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 85; II (1907) 81, 190.

Spermacoce serrulata P. Beauv. *Fl. d'Oware*, I (1804) 39, t. 23.

Diodia — *K. Schum. ex De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 47.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Kwamouth (Pyn.); Bolobo (Dew.); env. de Lemfu (But.); Kimuenza; Kisantu (Gill.). — VI : Kongo [Kwilu] (Sap.). — VIII : Haut-Lopori (Biel.). — IX : Bangala (Dew.). — IX a : Boyangi (Thonn.).

BORRERIA G. F. W. Mey.

Borreria dibrachiata [Oliv.] K. Schum. in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 4 (1891) 141.

Spermacoce — *Oliv. in Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 87, t. 52 et *Fl. trop. Afr.* III, 239; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 35.

Tardavel — *Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1898) 507.

1891 (G. Descamps). — XVI : bords du Luwenbe [affl. du Lubilasch] (Desc.).

Borreria hebecarpa A. Rich. *Tent. fl. Abyss.* I (1847) 347.

Spermacoce — *Oliv. [non DC.] in Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 89; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 236; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 167.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens).

OBS. — Peut-être faut-il rapporter à cette espèce le *B. neglecta* A. Rich. indiqué en 1885 par Buettner à Léopoldville [Conf. *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 167].

Borreria ocimoides [Burm.] DC. Prodr. IV (1830) 544.

Spermacoce — *Burm. Fl. Indica* (1768) 34, t. 13, fig. 1; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* III, 200; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII 121] et *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 35.

S. ramisperma Pohl ex DC. l. c. IV (1830) 544; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 238; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 167.

Borreria — DC. Prodr. IV (1830) 544.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Gombi (Hens).

Borreria scabra [Schumach. et Thonn.] *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 394.

Diodia — Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 76.

Tardavel — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 504.

Spermacoce *Ruelliae* DC. Prodr. IV (1830) 554; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 238; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 167.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Johnst.). — IV : Gombi-Lutete (Hens).

Borreria senensis [Klotzsch] *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 394; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 31 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 31].

Diodia — Klotzsch in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 289.

Spermacoce — *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 236; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo. II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121].

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.).

Borreria stricta [*L. f.*] DC. Prodr. IV (1830) 561; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 4 (1891) 143 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 394; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 30; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 354 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 85; II (1907) 81.

Spermacoce — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 120; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 236; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121] et Reliq. Dewevr. (1901) 130; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 190.

Tardavel — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 503.

1888 (Fr. Hens.). — Congo (Dem.); Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Lutete (Hens). — V : entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

Borreria tetradon *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 322 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12499).

MITRACARPUM Zucc.

Mitracarpum scabrum Zucc. in *Schult.* Mant. pl. III (1827) 210; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 243; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 168; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 96 [B. S. B. B. XXXVII, 121]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 131; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 209; II (1907) 190.

Staurospermum verticillatum *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 73.

Mitracarpum — *Vatke* in *Linnaea*, XL (1876) 196.

M. senegalense *DC. Prodr. IV* (1830) 572.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Buett.); Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Yaba** (Sap.). — XV : Bolungula (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Kimbumbi (Dew.); île de Zobaka (Dew.). — Noms vern. : **Tomba-Tomba** [Bakusu]; **Tuyaie** [Tanganika] (Dew.).

GALIUM L.

Galium stenophyllum *Bak. in Kew Bull.* (1895) 58; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

— — var. *longifolium* *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 26.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

DIPSACEAE

CEPHALARIA Schrad.

Cephalaria attenuata [*L. f.*] *Roem. et Schult. Syst. veget. III* (1818) 44; *DC. Prodr. IV*, 649; *Sond. in Harv. et Sond. Fl. Capens. III*, 42.

Scabiosa — *L. f. Suppl. pl.* (1781) 118.

Le type existe dans l'Afrique australe.

— — var. *longifolia* *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 164.

C. attenuata *Roem. et Schult. var. b. Sond. in Harv. et Sond. Fl. Capens. III* (1864) 42.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 577).

SCABIOSA L.

Scabiosa Columbaria *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 99; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. I*, 368; *Rehb. Pl. crit. IV*, t. 534-535; *Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III*, 252 et *Cat. Welw. Pl. I*, 512; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 164.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

COMPOSITACEAE

SPARGANOPHORUS Gaertn.

Sparganophorus Vaillantii Gaertn. De fruct. et semin. II (1791) 396, t. 165; *DC. Prodr.* V, 12; *Oliv. et Hiern* Fl. trop. Afr. III, 262; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 168; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 131; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 205 et Miss. Laurent (1905) 189.

Struthium africanum P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 81, t. 48.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Shinganga (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Ukaturaka; Lie (Ém. et M. Laur.). — XII a : route de Bima à Bambili (Ser.). — XV : Ibaka (Ém. Laur.).

HOEHNELIA Schweinf.

Hoehnelia vernonioides Schweinf. in *Hoehn.* Zum Rudolph See, App. (1892) 106; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 402; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 131; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 211.

1895 (A. Dewèvre). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2565); env. de Yumbi (Pyn. 305). — VIII : Équateurville (Dew. 535 a).

ETHULIA L. (1)

Ethulia conyzoides L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1171; *Bot. Reg.* (1823) t. 695; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 262; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. III, 227; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 169; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 402; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 513; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 131; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 189 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 205.

E. gracilis DC. in *Delile.* Voy. à Meroë (1827) t. 64; *DC. Prodr.* V, 12.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — II a : Pasokonde (Dew.). — V : Goma; Bolobo (Hens); Kisantu (Gill.); Lukolela (Pyn.); le Stanley-Pool (Hens). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Ém. Laur.); Lusambo (Jos. Duch.). — XVI : env. d'Albertville [Toa] (Hecq.).

(1) M. F. Demeuse a trouvé le *Centratherum grande* [DC.] *Th. Dur. et Schinz* [Étud. fl. Cgo (1896) 169] sur les rives de l'Ambriz, mais cette localité doit être dans l'Angola.

BOTHRIOCLINE Oliv.

Bothriocline longipes *N.E.Br.* in Kew Bull. (1894) 389; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 169.

B. Schimperii Oliv. et *Hiern* var. — Oliv. et *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 266; *O. Hoffm.* in Engl. Pl. Ost-Afr. 402; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 131; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 208.

1870 (G. Schweinfurth). — XII c : env. d'Amadis (Ser.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII d : env. de Piani-Gongo (Dew. 1056). — Nom vern. : **Kaluma** [Tanganika] (Dew.).

Bothriocline misera [Oliv. et *Hiern*] *O. Hoffm.* in Bolet. Soc. Brot. XIII (1896) 11; *Schlecht.* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 323.

Vernonia — Oliv. et *Hiern* in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 278; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 171.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Buett.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.).

VERNONIA Schreb.

Vernonia acrocephala *Klatt* in Annal. naturh. Hofmus. Wien, VII (1892) 100; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 30; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 325.

1891 (G. Descamps). — XII : Kansomme (Lescr.). — XV : Samba [Bashilange] (Desc.).

Vernonia amygdalina *Delile* Cent. pl. Méroë (1826) 41; *Oliv.* et *Hiern* Fl. trop. Afr. III, 284; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 32 [B. S. B. B. XXXVI², 78].

Decaneurum — *DC.* Prodr. V (1836) 68.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : C. au bord du Tanganika (Deb.).

Vernonia armerioides *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 462.

1876 (P. Pogge). — XV : pays de Muata-Jamvo, vers 10 1/2° (Pg. 182).

— — var. **tomentosa** *O. Hoffm.* l. c. (1897) 462.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1273).

Vernonia auriculifera *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 539.

Le type croît dans l'Angola.

— — var. **auriculis deficientibus** *O. Hoffm.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 325.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1286).

Vernonia Burtoni *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 281; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 170.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.).

Vernonia Calvoana *Hook. f.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 199; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 293; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 206.

1905 (F. Seret). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser. 187).

Vernonia cinerea [*L.*] *Less.* in *Linnaea* (1829) 291 et (1831) 673; *DC. Prodr.* V, 24; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 275; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 170; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 405; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 521; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 132; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 189 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 325.

Conyza — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 862.

Chrysocoma violacea *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 384.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Schimp.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens). — V : Dolo (Schlt.); Tumba (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Kasongo (Dew.).

Vernonia conferta *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 42; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 294; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 170; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 537; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 132; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 211, (1906) 325; II (1907) 206.

V. arborea *Welw. ex O. Hoffm.* in *Bolet. Soc. Brot.* X (1893) 172.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.); Benza-Masola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VII : Isaka (Ém. et M. Laur.). — VIII : Basankusu (Dew.); env. d'Eala (Pyn.; M. Laur.). — XIII a : Romée (Ém. Laur.). — XV : le Sankuru (Ém. Laur.).

— — var. **Sereti** *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 206.

1905 (F. Seret). — IX : env. de Bumba (Ser. 4).

Vernonia clinopodioides *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 465.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua, vers 9 1/2° (Pg. 234).

Vernonia cruda *Klatt ex Schinz* in *B. Herb. Boiss.* IV (1896) 456; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 206.

1891 (G. Descamps). — V : Kisantu (Gill. 1100); Boko-Sainte-Barbe (Vanderyst, B, 108). — XIII d : Lubunda [rég. de Nyangwe] (Desc. 28).

Vernonia Dupuisii *Klatt* in *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 171 et in *B. Herb. Boiss. IV* (1896) 825; *De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79].

1893 (P. Dupuis). — II : env. de Boma (Dew. 15); Sisia (Dup.). — II a : Bingila (Dup. 39).

Vernonia gerberiformis *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr. III* (1877) 285; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 164 et *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I* (1906) 325.

1900 (Edg. Verdick). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. ; Gill. 3284). — XVI : plateau du Katanga (Verd.).

Vernonia glaberrima *Welw. ex O. Hoffm.* in *Bolet. Soc. Brot. XIII* (1896) 15; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 537; *De Wild. Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I* (1904) 210; II (1907) 206 et *Miss. Laurent* (1906) 190.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Pyn. 136); Dolo (Schlt.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Sanda (De Brouw. in Gill. 3031).

Vernonia grandis *Boj. ex DC.* *Prodr. V* (1836) 68, in syn.; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I* (1899) 30.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst).

Vernonia Grantii *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1873) 92; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr. III*, 291; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 493; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79]; *De Wild. Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I* (1904) 210.

1895 (G. Descamps). — Bas-Congo (Cabrajet Michel). — XVI : Toa (Desc.).

Vernonia hamata *Klatt ex Schinz* in *B. Herb. Boiss. IV* (1896) 456.

1891 (G. Descamps). — XV : vallée de la Luile (Desc. 32).

Vernonia Hensii *Klatt ex Schinz* in *B. Herb. Boiss. IV* (1896) 828.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 24).

Vernonia iufundibularis *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr. III* (1877) 285; *Tu. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79].

1891 (G. Descamps). — XV : Lusambo (Desc.).

Vernonia jugalis *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr. III* (1877) 270; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 171; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl.*

Vernonia Fischeri *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb. XX* (1894) 221.

OBS. — P. Pogge a récolté cette espèce, en 1876, dans le pays de Muata-Yamvo (n. 269). Nous ne savons pas si c'est dans le Congo belge.

Ost-Afr. 404; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 516; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 32 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 32] et Reliq. Dewevr. (1901) 132.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Basankusu (Dew.). — XIII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Noms vern. : **Ikonga** [Basankusu]; **Momboka** [Kasongo]; **Katatumba** [Tanganika] (Dew.).

Vernonia jugalis var. **Dekindtii** [*O. Hoffm.*] *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 516; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 190 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, II (1907) 207.

V. Dekindtii *O. Hoffm.* in Bolet. Soc. Brot. XIII (1896) 18.

1903 (Ém. Laurent). — VI : entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel); Madibi (Sap.). — VIII : Eala et env. (Pyn. 311; M. Laur. 687, 1512). — XV : Lubefu (Leser. 375); Kondue (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Moleama** [Kwilu]; **Pinkekokwa**; **Pingerokwa** [Bangala].

Vernonia katangensis *O. Hoffm.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) p. IX.

1901 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu (Verd. 74).

Vernonia lasiolepis *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1898) 464; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 210; II (1907) 207 et Miss. Laurent (1905) 190.

1876 (P. Pogge). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); rég. de la Lula-Lumene (Hendr.); Kimuenza; Kisantu (Gill.). — XV : Musumba (Pg. 192, 196, 273, 276); Mukenge (Pg. 787, 1209, 1312, 1317).

Vernonia Melleri *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 282; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI², 79] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 35.

1891 (G. Descamps). — XV : vallée du Lubudi (Desc.). — XVI : Toa (Desc.).

Vernonia Napus *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 463.

Le type croît dans l'Angola.

— — form. **angustifolia** *O. Hoffm.* l. c. 463.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1276).

— — form. **latifolia** *O. Hoffm.* l. c. 463.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1275).

Vernonia natalensis *Schultz-Bip.* ex *Walp.* Repert. bot. II (1843) 947; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 277; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. III, 51; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-

Afr. 405; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 522; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 171; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 35 et Reliq. Dewevr. (1901) 132; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 190 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 325; II (1907) 207.

Webbia aristata DC. Prodr. V (1836) 73.

Vernonia — *Schultz-Bip.* (non *Less.*) in Flora (1844) 667.

1888 (Fr. Hens).. — Congo (Duch.): Bas-Congo (Cabra). — II a : Temvo (Ém. et M. Laur.); la Lemba (Dew.). — IV : Lukungu (Hens). — V : entre Léopoldville et Sabuka (Ém. Duch. et Luja); Boko-Sainte-Barbe (Vanderyst). — VI : rég. de Luanu (Leser.). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.).

Vernonia pandurata *Link* Enum. pl. hort. Berol. II (1822) 276; *DC.* Prodr. V, 27; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 271; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Burt.).

Vernonia podocoma *Schultz-Bip.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 287; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 296; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172.

V. cylindrica A. *Rich.* (non *Schultz-Bip.*) Tent. fl. Abyss. I (1847) 374.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Vernonia Poskeana *Vatke* et *Hildebr.* in Oest. bot. Zeitschr. (1875) 324; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 274; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 404; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 593; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 325.

Crystallopollen angustifolium *Steetz* form. vulgaris *Steetz* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) 366.

1888 (Fr. Hens). — V : env. du Stanley-Pool (Hens). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel).

— — var. ***chlorolepis*** [*Steetz*] *O. Hoffm.* in Bolet. Soc. Brot. X (1893) 171; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 520; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1907) 207.

1906 (A. Sapin). — VI : Madibi (Sap.).

Vernonia potamophila *Klatt* in Annal. naturh. Hofmus. Wien VII (1892) 100; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 30 et Pl. Gilletianae, I (1900) 32

? ***Vernonia Poggeana*** *O. Hoffm.* in *Engl.* Jahrb. XX (1894) 221; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 172.

1876 (P. Pogge). — XV : pays de Muata-Yamvo (Pg. 269).

Cette plante a-t-elle été trouvée dans le Congo belge ?

[B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 32]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 241, 325; II (1907) 207 et Miss. Laurent (1905) 190.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Coango (Cabra). — II a : Bingila (Dup.) : Haut-Shiloango (Cabra-Michel). — IV : Mont Bangu (Dem. 77) : Lutete (Hens, A, 241). — V : Kisantu (Gill. 518); entre Kisantu et le Kwango (But.) : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3041).

Vernonia quangensis *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 463.

Le type n'est indiqué que dans l'Angola.

— — var. **tomentosa** *O. Hoffm.* l. c. 463.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1273).

Vernonia senegalensis [*Pers.*] *Less.* [non *Desf.*] in *Linnaea*, IV, (1829) 265; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 283; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 173; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 405; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 528; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 33 et Reliq. Dewevr. (1901) 133; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 164 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326.

Baccharis — *Pers.* Syn. pl. II (1807) 424.

Decaneurum — *DC.* Prodr. V (1836) 68.

Chrysocoma amara *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 383.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — II a : brousse de Katala. — Nom vern. : **Manduli-Duli** (Dew.). — IV : Banza-Puta (Dem.). — XIII d : env. de Kasongo — Nom vern. : **Molonga** (Dew.). — XVI : Toa (Desc.) : bords du Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Mululundja** [Tanganika]; **Eavoapanda** [Ikwangula] (Dew.).

Vernonia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 207.

1905 (F. Seret). — XII c : entre Niangara et Gombari (Ser. 438); entre Amadis et Surango (Ser. 344).

Vernonia sericolepis *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 466.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 236); Musumba (Pg. 249); Mukenge (Pg. 1268, 1286, 1308, 1314).

Vernonia Smithiana *Less.* in *Linnaea*, V (1831) 638; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 276; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 173; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 405; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 522; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 133.

Webbia — *DC.* Prodr. V (1836) 72.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.) ; env. de Kasongo (Dew. 995 a).

Vernonia suprafastigiata *Klatt* in B. Herb. Boiss. IV (1896) 458.

1891 (G. Descamps). — Ind. non cl. : Luengue (Desc. 29).

Vernonia Teuszii *Klatt* ex *Schinz* in. B. Herb. Boiss. III (1895) 424; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 164.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 471); Haut-Marungu (Deb.).

Vernonia ulophylla *O. Hoffm.* in Bolet. Soc. Brot. XIII (1896) 13; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 534; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326; II (1907) 208 et Miss. Laurent (1905) 190.

1902 (L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Dima (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XII b : entre Bima et Bambili (Ser.).

Vernonia undulata *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 276; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 521; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 133; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 165 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326; II (1907) 208.

1891 (F. Demeuse). — IV : distr. des Cataractes (Dem.). — V : Dolo (Schlt.; Sap.). — XII b : entre Bima et Bambili (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Bu-Kukuta** (Verd.); Kayumba [Tanganika-Moero]. — Nom vern. : **Koito** (Coll.?).

Vernonia Verdickii *O. Hoffm.* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) p. IX.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 463).

Vernonia vernicata *Klatt* in Annal. naturh. Hofmus. Wien, VII (1892) 99; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 30.

1891 (G. Descamps). — XV : vallée de la Luile (Desc.).

Vernonia violacea *Oliv.* ex *Hiern* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 91 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 275; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 33 [B. S. B. XXXVI², 79]; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 404; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 33 [B. S. B. XXXVI², 79]; Contr. fl. Cgo, I (1899) 30 et Reliq. Dewevr. (1901) 133; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 190 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Ém. et M. Laur.). — II : Boma (Dew. 105). — II a : Bingila (Dup.).

DEWILDEMANIA *O. Hoffm.*

Dewildemaniania filifolia *O. Hoffm.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) p. X.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 415).

HERDERIA Cass.

Herderia lancifolia *O. Hoffm.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 17 [B. S. B. B. XL, 23].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb. 87).

Herderia stellulifera *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 425; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 298; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 540; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 173; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 32; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 190 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326.

1888 (Fr. Hens). — II : Sisia (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.).

ELEPHANTOPUS L.

Elephantopus multisetus *O. Hoffm.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 8 [B. S. B. B. XXXIX², 31].

1895 (Ém. Laurent). — XV : brousse à l'E. de Lusambo (Ém. Laur.).

Elephantopus scaber *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 814; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 299; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 406; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 540; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 86 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 826] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 37; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 211.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu (Gill.).

ADENOSTEMMA Forst.

Adenostemma viscosum *Forst.* Char. gener. (1776) 90, t. 45; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 299; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 542; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 400; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 173; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 133; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 191.

1816 (Chr. Smith). — II a : Bingila (Dup.); Shinganga (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Ind. non cl. : Bocra. — Nom vern. : **lbongo** (Dew.).

AGERATUM L.

Ageratum conyzoides L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 839; DC. Prodr. V, 108; Hook. Exot. Fl. t. 15; Wight Ill. of Ind. Bot. II, t. 134; Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 300; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 174; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 542; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 134; De Wild. Miss. Laurent (1905) 191 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 110-111.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); Zobe (Dew.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Luvituku (Dem.); Lukungu (Hens). — V : Suata (Buett.); Kisantu (Vanderyst). — VI : Muene-Putu; Kasongo (Buett.). — IX : pays des Bangala (Ém. Laur.); Upoto (Wilw.). — XII : l'Uele (Delp.). — XIII d : Nyangwe (Dew.). — XV : Luebo (Ém. Laur.); Baraka (L. Dohet). — XVI : le Lualaba (Desc.); Pala (Deb.); Toa (Desc.). — Noms vern. : Lokasa [Équateur]; Kinongo [Tanganika]; Kasuku-Suku [Kasongo]; Eulu [Ikwangoula].

MSUATA O. Hoffm.

Msuata Buettneri O. Hoffm. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 5 (1893) 388; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I (1897) 33 [B. S. B. B. XXXVI¹, 79]; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 219.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 19); entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2614); Yumbi (Pyn. 308). — VII : Lac Léopold II (Dem.).

EUPATORIUM L.

Eupatorium africanum Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III (1877) 301; O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 406; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 542; De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 165 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 326; II (1907) 209.

1900 (Edg. Verdick). — V : Kimuenza (Gill. 2117). — VI : au N. du Kaongo (Cabra et Michel 7). — XVI : le Katanga (Verd.).

MIKANIA Willd.

Mikania scandens [L.] Willd. Sp. pl. III (1804) 1743; Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 301; O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 406; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 174; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 37 et Reliq. Dewevr. (1901) 134; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 211, (1906) 327; II (1907) 209 et Miss. Laurent (1905) 191.

Eupatorium — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 836.

Willoughbeya — Hiern Cat. Welw. Pl. I (1898) 543.

M. chenopodiifolia Willd. Sp. pl. III (1804) 1745; R. Br. in Tuckey Congo Exped. App. (1818) 128.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ponta da Lenha (Naum.). — II a : le Mayumbe; Zobe; Bingila (Dup.). — IV : Luvituku (Pyn.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.); env. de Kimuenza (Dew.); Lukolela (Ém. et M. Laur.); Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Sap.); Eiole (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Équateur (Pyn.); Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : Uman-gi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo. — Nom vern. : **Karici** (Dew.). — XV : le Sankuru (Luja); Lusambo (Desc.). — Noms vern. : **Kumu** [Kwilu]; **Kasai** [Bangala] (Sap.).

DICHROCEPHALA DC.

Dichrocephala chrysanthemifolia DC. Prodr. V (1836) 372; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 303; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 174.

D. macrocephala *Schultz-Bip.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* (1867) 145.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens).

Dichrocephala latifolia DC. in *Guill. Archiv. de bot.* II (1833) 518 et Prodr. V, 372; *Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 303; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 36 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 134; *O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 406; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 544; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 209 et *Miss. Laurent* (1905) 191.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Haut-Lopori (Biel.). — IX : Bolombo (Ém. Laur.). — XIII d : Nyangwe; Elungu (Dew.). — XV : Lokandu, rive gauche (Dew.).

GRANGEA Adans.

Grangea maderaspatana [L.] *Poir. Encycl. méth. Bot.* XI (1813) 825; *Wight* *Icon. pl. Ind. or.* III, t. 1097; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 304; *O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 406; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 175; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 134; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 545; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 192 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 327; II (1907) 209.

Artemisia — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 849.

Cotula Sphaeranthus *Link* *Enum. pl. Hort. Berol.* II (1822) 344.

Grangea — *C. Koch* in *Bot. Zeit.* (1843) I, 41.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.); Ponta da Lenha (Naum.); Sisia (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Yumbi (Pyn.); Kwamouth (M. Laur.). — VI : Kingunshi (Buett.). — XVI : Lofoi (Verd.).

MICROGLOSSA DC.

Microglossa angolensis *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 309; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 549; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 135; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 165; *Miss. Laurent* (1905) 192 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 209.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : rég. de Luanu (Leser.). — VIII : env. de Bamania (M. Laur.). — XII c : entre Amadis et Surango (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Munungu (Leser.); Butala (Ém. et M. Laur.). — XVI : plateau du Katanga (Verd.).

— — form. fol. **grosse dentatis** *O. Hoffm. ex De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 192.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Microglossa volubilis [*Wall.*] *DC. Prodr.* V (1836) 320; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 309; *O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 407; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 549; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 32 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 32] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 135; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 192 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 209.

Conyza — *Wall. Catal.* (1831) n. 3057.

1896? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — II a : Banza-Masola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.; Pyn.).

CONYZA Less.

Conyza aegyptiaca [*L.*] *Dryand. in Ait. Hort. Kew. ed. 1*, III (1789) 183; *DC. Prodr.* V, 382; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 314; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 175; *O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 407; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 135; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 192 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 337; II (1907) 210.

Erigeron — *L. Mant. pl.* (1771) 112; *Jacq. Hort. Vindob.* III, t. 19.

Marsea — *Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1898) 550.

Conyza echioides *A. Rich. Tent. fl. Abyss. I* (1847) 388.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte); Kinshassa (Dew.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XII : pays des Mangbettu (Schw.). — XII c : Amadis. — Nom vern. : **Averu** (Ser.). — XIII d : Kasongo (Dew.). — Noms vern. : **Macumbu-Macumbu** [Ikwangula]; **Kafoine** [Kasai]; **Karibululu** [Tanganika] (Dew.).

BLUMEA DC.

Blumea aurita [*L. f.*] *DC.* in *Wight* Contrib. Ind. Bot. (1834) 16 et Prodr. V, 449; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 322; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 176.

Conyza — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 367.

Erigeron stipulatum *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 385.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.).

Blumea lacera [*Burm.*] *DC.* in *Wight* Contr. Ind. Bot. (1834) 14 et Prodr. V (1836) 436; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 322; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 176; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 135; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 210.

Conyza — *Burm.* Fl. Ind. (1768) 180, t. 59.

Placus — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 356; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 555.

Erigeron stipitatum *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 385.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Zambi (Dew.). — III-IV : la Lufu (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : vallée du Stanley-Pool (Hens); env. de Kisantu (Gill.).

LAGGERA Schultz-Bip.

Laggera alata [*DC.*] *Schultz-Bip.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 94; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 326; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 176; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 408; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 556; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 135; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 210.

Blumea — *DC.* Prodr. V (1836) 448; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III, t. 1101 et Spicil. Neilgher. t. 109.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi. — Nom vern. : *Mosalata* (Sap.). — XIII d : brousse de Kasongo (Dew.). — Noms vern. : *Kifanga-Fanga* [Kasai]; *Kimonga* [Tanganika] (Dew.).

Laggera brevipes *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 327; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 408; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 177; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 557; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 136; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 327.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : la Lemba (Dew. 387). — V : env. de Léopoldville et de Kisantu (Gill. 2664, 3344).

Laggera oblonga *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 327; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 177.

1816 (Chr. Smith), — Bas-Congo (Sm.).

Laggera pterodonta [DC.] *Schultz-Bip.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* (1867) 151; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 324; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 408; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 136; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 165.

Blumea — DC. Prodr. V (1836) 448.

L. purpurascens *Schultz-Bip. ex Hochst.* in *Flora*, XXIV (1841) I. Intell. 21, 95; *A. Rich. Tent. fl. Abyss. I*, 393; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 556.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kasongo (Dew. 912 pr. p.). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 1171).

PLUCHEA Cass.

Pluchea Dioscoridis [L.] DC. Prodr. V (1836) 450; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 329; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 408; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 177; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 557; *De Wild. Reliq. Dewevr.* (1901) 136 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 210.

Baccharis — L. *Amoen. acad.* IV (1759) 289.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.); Banana (Dew.). — II : Boma (Pyn.); Sisia (Dup.). — III : Tondoa (Buett.).

SPHAERANTHUS L.

Sphaeranthus flexuosus *O. Hoffm.* in *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) p. X.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 107).

Sphaeranthus polycephalus *Oliv. et Hiern ex Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 95, t. 59 et in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 334; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 409; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 177; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.- Cgo*, I (1904) 211.

1888 (Fr. Hens). — V : env. du Stanley-Pool (Hens); env. de Léopoldville (Gill.).

Sphaeranthus suaveolens DC. Prodr. V (1836) 370; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 333; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 409; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 166.

1900 (Edg. Verdick). — VI : Lukafu (Verd.).

BLEPHARISPERMUM Wight.

Blepharispermum spinulosum *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 335; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 177.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

ACHYROCLINE Less.

Achyrocline batocana *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 339; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 178.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

GNAPHALIUM L.

Gnaphalium luteo-album *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 851; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 343; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 409; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 559; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 327; II (1907) 210.

1999 (Cél. Hecq). — V : Kisantu-Makela (Van Houtte); Lemfu (But.); Boko (Pyn.). — XIV : plateau du Kivu (Hecq).

HELICHRYSUM Gaertn.

Helichrysum argyrosphaerum *DC.* Prodr. VI (1837) 174; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 351; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 178.

Gnaphalium — *Schultz.-Bip.* in *Bot. Zeit.* III (1847) 170.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Congo (Pech.-Loesche ; Johnst.).

Helichrysum auriculatum *Less.* Syn. Composit. (1832) 311; *DC.* Prodr. VI, 209; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 347; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 178.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt. ; Johnst.).

Helichrysum fulgidum [*L. f.*] *Willd.* Sp. pl. III (1804) 1904; *Less.* Syn. Composit. 286; *DC.* Prodr. VI, 187; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 187; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 178.

Xeranthemum — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 365; *Jacq.* Icon. pl. rar. I, t. 173; *Bot. Mag.* (1793) t. 414.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Helichrysum geminatum *Klatt* in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, VII (1892) 104; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 210.

1903 (Alph. Cabra et L. C. Michel). — VI : C. sur les collines au N. de Kaonga (Cabra et Michel, 5).

Helichrysum Mechowianum *Klatt* in *Annal. naturh. Hofmus.* Wien, VII (1892) 101; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 563 [*Elichrysum*]; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 86 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 826]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 328.

1891 (F. Demeuse). — IV : Kinkanda (Dem.).

Helichrysum nudifolium [L.] *Less.* *Syn. Composit.* (1832) 299; *DC. Prodr.* VI, 200; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 410; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 36; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 564 [*Elichrysum*]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 211 et *Miss. Laurent* (1906) 193.

Gnaphalium — *L. Pl. rar. Afr.* (1760) 19.

1891 (F. Demeuse). — V : Kisantu; entre Kisantu et Dembo (Gill.). — Ind. non cl. : Belem (Dem.).

Helichrysum pachyrhizum *Harv.* in *Harv. et Sond. Fl. Capens.* III (1864-65) 222; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 346; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 179.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Helichrysum panduratum *O. Hoffm.* in *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 87 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 827].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1293).

Helichrysum subglomeratum *Less.* *Syn. Composit.* (1832) 283; *DC. Prodr.* VI, 186; *Harv.* in *Harv. et Sond. Fl. Capens.* III, 236; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 179.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Helichrysum undatum *Less.* *Syn. Composit.* (1832) 298; *DC. Prodr.* VI, 198; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 353; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 179.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

INULA L. (1)

Inula Engleriana *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1898) 471.

1876 (P. Pogge). — XV : Lunda, vers 8 1/2° (Pg. 192).

(1) **Inula Poggeana** *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1898) 471.

1876 (P. Pogge). — VI : entre Kimbundo et le Kwango, vers 10 1/2° (Pg. 186).

OBS. — Cette habitation est-elle dans le Congo belge?

Inula Klingii *O. Hoffm.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1898) 472; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 328; II (1907) 211.

1891 (F. Demeuse). — IV : Luvituku (Dem.). — V : Kisantu (Gill. 3684); entre Kisantu et le Kwango (But.); Boko (Pyn. 114).

ANISOPAPPUS Hook. et Arn.

Anisopappus africanus [*Hook. f.*] *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 369; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 166.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 501).

ZINNIA L.

Zinnia elegans *Jacq.* *Collect. bot.* III (1789) 152 et *Icon. pl. rar.* III, t. 659; *Bot. Mag.* (1801) t. 527; *DC. Prodr.* V, 536; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 412; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 179.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — XI : Idanga (Ém. Laur.).

ENHYDRA Lour.

Enhydra fluctuans *Lour.* *Fl. Cochinch.* (1790) 511; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 373; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Thonnerianae* (1900) 49 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 136.

Cryphiospermum — *P. Beauv.* *Fl. d'Oware*, II (1807) 25, t. 24.

E. longifolia *DC.* *Prodr.* V (1836) 637.

E. paludosa *DC.* l. c. 637.

E. Heloncha *DC.* l. c. 637.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Zobe (Dew.). — IX : Bobi près Gali (Thonn.).

ECLIPTA L.

Eclipta alba [*L.*] *Hassk.* *Pl. Javan. rarior.* (1848) 528; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 373; *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* III, 305; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 179; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 36 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 136; *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 125-126.

Verbesina — *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) 902.

Ecliptica — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 334.

E. erecta *L.* *Mant. pl.* II (1771) 296; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 585.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — V : entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.); — VII : la Fini (M. Laur.). — VIII : Équateur (Buett.); Eala (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Lie (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Prani Lombi; env. de Nyangwe (Dew.). — XVI : Toa (Desc.). — Noms vern. : **Kwanta** [Nouvelle-Anvers] (Ém. Duch.); **Bioto** [Bakusu]; **Vungui** [Tanganika] (Dew.); **Lolimissa** [Eala]. (M. Laur.).

BLAINVILLEA Cass.

Blainvillea Priureana DC. Prodr. V (1836) 492; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 375; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 180.

1893 (P. Dupuis). — II : Sisia (Dup.).

ASPILIA Thou.

Aspilia Dewevrei O. Hoffm. in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, VII (1900) 9 [B. S. B. B. XXXIX², 22] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 137.

1896 (A. Dewèvre). — IX : Bumba (Dew. 898). — XIII d : Kasongo (Dew.). — Noms vern. : Toki [Kasongo]; Malebumuki [Ikwangula]; Kaluangwe [Tanganika] (Dew.).

Aspilia latifolia *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 379; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 48; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 211.

1905 (Éd. Lescreauwaet). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser. 167). — XV : Kanda-Kanda (Lescr. 341).

Aspilia Kotschyi [*Schultz-Bip.*] *Benth. et Hook. f. Gen. pl.* II (1873) 372; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 98; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 381; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 180; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 579; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 137; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 328; II (1907) 211 et *Miss. Laurent* (1906) 193.

Dipterotheca — *Schultz-Bip.* in *Flora* (1842) 435.

Coronocarpus — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 433.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Binginga; Kibinga (Dup.); Shinganga (Dew.); Haut-Shiloanga (Cabra-Michel). — III : entre Matadi [III] et Léopoldville [V] (Vanderyst). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Kitobola (Pyn.). — V : le Stanley-Pool (Dew.); env. de Kwamouth (Biel.); Kinshassa (M. Laur.); Boko-Sainte-Barbe (Vanderyst); Kisantu (Gill.); Suata (Buett.). — VI : rég. de Luanu (Lescr.); route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra-Michel). — VII : la Fini; lac Léopold II (Ém. et M. Laur.). — IX : env. de Bumba (Ser.). — XII a : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XIII d : Nyangwe (Dew.). — XV : le Kasai et le Sankuru (Ém. et M. Laur.). — XVI : village Bakondo; Toa (Desc.).

Aspilia Smithiana *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III (1877) 380; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 180.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

OBS. — L'*Helianthus annuus* L. a été importé à Eala (M. Laur. 1514) [*Conf. De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 211].

MELANTHERA Rohr.

Melanthera Brownei [DC.] *Schultz-Bip.* in Flora, XXVII (1844) 672; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III. 382; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 414; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 181; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 579; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 137; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 194 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 328; II (1907) 211.

Lipotriche — DC. Prodr. V (1836) 544.

Bupthalmum scandens *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 392.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo. — Noms vern. : **Lurakasa**; **Manakasa** (Cabra). — II : Zambé (Dew.); Boma. — Nom vern. : **Mautuntu** (Dew.). — II a : Temvo (Ém. Laur.). — V : Léopoldville (Ém. Duch. et Luja); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — VII : Iboka (Ém. Laur.). — VIII : Bamania et env. (Ém. et M. Laur.); Coquilhatville (Pyn.). — IX : env. de Bumba (Dew.); Ukaturaka; Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.); Malema (Ém. Laur.). — XV : Batempa (Lescr.). — XVI : env. d'Albertville [Toa] (Desc.; Hecq); Lukafu (Verd.).

SPILANTHES L.

Spilantes Acmella [L.] *Murr.* Syst. veget. ed. 13 (1774) 610; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 384; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 414; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 181; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 38; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 584; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 328 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 328.

Verbesina — L. Sp. pl. ed. I (1753) 901.

E. africana et E. caulirhiza DC. Prodr. V (1836) 623.

? Eclipta filicaulis *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 390.

1884 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — IV : Kitoboïa (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Yumbi (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Équateurville (Buett.). — IX : pays des Bangala (Hens); Nouvelle-Anvers. — Nom vern. : **Ebakomba** (Ém. Duch.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XVI : env. d'Albertville [Toa] (Hecq); Lukafu (Verd.).

— — var. **oleracea** [L.] *Clarke* Compos. Ind. (1879) 138; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 414; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 138.

S. oleracea L. Syst. nat. ed. 12 (1767) 534; *Jacq.* Hort. Vindob. II (1772) 63 t. 135; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 194.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — XI : Lokandu [Riba-Riba] (Dew.); env. de Lie (Ém. et M. Laur.).

CALYPTROCARPUS Less.

Calyptracarpus africanus *O. Hoffm.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 87 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 827].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1382).

COREOPSIS L.

Coreopsis Grantii *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 98, t. 65; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 388; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 181; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 114; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 38 et Reliq. Dewevr. (1901) 138; Bot. Mag. (1906) t. 8110; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 194 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 212; II (1907) 212.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — Bas-Congo (Gill.). — V : env. du Stanley-Pool (Hens); Dolo (Sap.); Bolobo (M. Laur.); Kisantu et env. (Gill.); env. de Lemfu (But.). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Kolokoso** [Kwilu] (Sap.). — XV : Bombaie (Luja); E. de Lusambo; Koudue (Ém. Laur.): le Sankuru. — Nom vern. : **Sokomini** (Sap.); Mokole [Lubi] (Leser.).

Coreopsis Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 212.

1905 (F. Seret). — XII d : sommet du Mont Angba [rive droite de l'Uele] (Ser. 306).

BIDENS L.

Bidens pilosa *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 832; *Dillen.* Hort. Eltham. t. 43; *DC.* Prodr. V, 597; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 392; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 182; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 587; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 31; II (1900) 38 et Reliq. Dewevr. (1901) 138; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 210, (1906) 329; II (1907) 212 et Miss. Laurent (1906) 194.

B. leucantha *Willd.* Sp. pl. III (1804) 1719.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.): Bas-Congo (Cabra). — II : Boma (Dew.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — IV : Konzo (Dem.); Lutete (Hens). — V : Suata (Buett.); Kisantu (Gill.); l'Inkisi (Hens). — VIII : Équateurville (Buett.); env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.); Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XII b : Bambili (Ser.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XIV : Kalemba-Lemba [Ruzizi-Kivu] (Coll.?). — XV : Luebo (Ém. Laur.); Ikongo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lofoi (Verd.); env. d'Albertville [Toa] (Heq); Lukonzolwa (Coll.?). — Noms vern. : **Ikatabao** [Eala] (M. Laur.); **Tobelengue** [Équateur]; **Ephidi** [Ikwangula]; **Ifuige** [Kasongo]; **Acisa** [Tanganika] (Dew.).

Bidens urceolata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 167.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 464).

CHRYSANTHELLUM Rich.

Chrysanthellum procumbens *Pers.* Syn. pl. II (1807) 471; *DC.* Prodr. V, 630; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 394; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 588; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 138; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 213.

1896 (A. Dewèvre). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Noms vern. : **Kenia** [Bakusu]; **Biti** [Ikwangula]; **Kiomeome** [Tanganika].

JAUMEA Pers.

Jaumea compositarum [Steetz] *Benth. et Hook. f. Gen. pl. II* (1873) 397; *Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III*, 395; *O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 415; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 182; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI². 80]; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 167.

Hypericophyllum — *Steetz in Peters Reise n. Mossamb. II* (1864) 499, t. 50.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — XVI : Lukafu (Verd.); vallée du Lubudi et du Lovoi (Desc.).

Jaumea congensis *O. Hoffm. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, VII* (1900) 10 [B. S. B. B. XXXIX², 33 et in *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 139; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1904) 212; II (1907) 213 et *Miss. Laurent* (1906) 195, t. 46.

1895 (J. Gillet). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Sanda (De Brouw.; Gill. 1036); rég. de la Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3089). — VI : entre Kisantu et Popokabaka (But. in Gill. 2309, 2329). — XV : Lomkala (Ém. Laur.); route de Luebo à Luluabourg (Gent. 34); Pania-Mutambo (Lescr. 417).

OBS. — A. Dewèvre a récolté cette espèce au N. du Stanley-Pool (Congo franç.).

TAGETES L.

Tagetes Gilletii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 213.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

***Tagetes patula** *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 887; *Bot. Mag.* (1791) t. 150; *DC. Prodr. V*, 643; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 182; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I* (1900) 33 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 33].

1888 (Fr. Hens). — IV : Gombi-Lutete (Hens, A. 256). — V : Kisantu (Gill.).

SCHISTOSTEPHIUM Less.

Schistostephium heptalobum [*DC.*] *Benth. et Hook. f. ex O. Hoffm. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 416; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 167.

Tanacetum — *DC. Prodr. VI* (1837) 133.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

GYNURA Cass.

Gynura cernua [*L. f.*] *Benth.* in *Hook.* Niger. Fl. (1849) 437 [excl. syn., pr. p.]; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 402; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 183; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 416; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 139; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 166; Miss. Laurent (1905) 188 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1906) 234; II (1907) 214.

Senecio — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 370.

Crassocephalum — *Moench* Meth. pl. Marb. (1794) 510; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 593.

1883 (H. Johnston). — II : Boma (Dew.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.) : Bingila (Dup.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.) ; Lutete (Heus) ; Luvituka (Dem.). — V : Léopoldville (Dew.) ; Suata (Buett.) ; Kisantu (Gill.) ; Maydis (Odd.) ; env. de Dembo (Gill.) ; rég. de Lula-Lumene (Hendr.) ; Bokala (M. Laur.). — VI : riv. du Kwilu. — Nom vern. : Lemalema (Sap.) ; Muene-Putu-Kasongo (Buett.) ; Madibi (Sap.) ; route de Kikwit à Boala (Lescr.) ; le Kasai à Eïolo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Ser.). — IX : Upoto (Wilw.). — XI : euv. de Basoko (Ém. Laur.). — XII : prov. orient. (Ser.) ; l'Uele (Delp.). — XIV : Ruzizi-Kivu (Coll. ?) ; haut plateau du Kivu (Hecq.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.) ; CC. dans les villages à l'E. de Lusambo (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Katanga (Verd.).

— — var. **coerulea** [*O. Hoffm.*] *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 139; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 166; Miss. Laurent (1905) 189 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1906) 324.

Gynura coerulea *O. Hoffm.* in B. Herb.-Boiss. I (1893) 86.

Crassocephalum cernuum *Moench* var. — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 594.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VI : entre Kikwit et Boala (Lescr.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Gynura crepidioides *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 438; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 403; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 183; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 416; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 38; Pl. Thonnerianae (1900) 48 et Reliq. Dewevr. (1901) 139.

Senecio — *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 155.

S. diversifolius *A. Rich.* [non *Wall.*] Tent. fl. Abyss. I (1847) 437.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Zambi (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — IX a : Evankoyo (Thonn.). — XI : Lokandu (Dew.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Gynura vitellina *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 438; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 402; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 183.

Senecio — *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 286.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : le Mayumbe (Dup.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

EMILIA Cass.

Emilia caespitosa *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 100; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 406; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 184.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens. B. 2).

Emilia graminea *DC.* Prodr. VI (1837) 303; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 31; II (1900) 38 et Reliq. Dewevr. (1901) 140; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 195 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 329.

1895 (Ém. Laurent). — V : env. de Kisantu et de Dembo (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Malepie (Ém. Laur.). — XIII : Mutumbe (Dew.). — XV : bords du Kasai (Ém. Laur.); Bena-Dibele (Luja).

Emilia integrifolia *Bak.* in Kew Bull. (1895) 69; *O. Hoffm.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 326.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Scht.).

Emilia sagittata [*Vahl*] *DC.* Prodr. VI (1837) 302; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 405; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 184; *O. Hoffm.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 416; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 167; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 140; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 195 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 329; II (1907) 204.

Cacalia — *Vahl* Symb. bot. III (1791) 91; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1901) 214.

E. flammea *Cass.* in Dict. sci. nat. XIV (1819) 406; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 595.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Johnst.). — II : Malela (Gill.). — II a : le Mayumbe; Bingila (Dup.); Shinganga (Dew.); entre Yema-Lianga et Shimbanza (Cabra et Michel). — IV : Lukungu (Hens); Luvituku (Dem.); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Ém. Duch.); Léopoldville (Hens); entre Léopoldville et Sabuka (Luja); Kisantu (Gill.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.); entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel); Eiolo (Ém. et M. Laur.); Madibi. — Noms vern. : **Kofu**; **Monabata** (Sap.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et euv. (M. Laur.); Coquilhatville. — Nom vern. : **Elekeke-Adjico** (Dew.). — IX : Upoto (Wilw.). — XII d : pays des Maugbettu (Schw.). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Luabala (Desc.); Lukafu; le Lofoi (Verd.); Pweto (Desc.); Haut-Marungu (Deb.).

Emilia sonchifolia *DC.* Prodr. VI (1837) 302; *Oliv. et Hiern* in *Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 405; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 24 [B. S. B. B. XXXVI², 80].

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

SENECIO L.

Senecio abyssinicus *Schultz-Bip.* in *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. I (1847) 438; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 410; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 417; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 184; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 33 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 33] et Reliq. Dewevr. (1901) 140.

S. Quartinianus *Aschers.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 158; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 195; *O. Hoffm.* ex *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 326.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — XII b : entre Bambili et Amadis (Ser. 205). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII a : env. de Kasongo (Dew.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Lefide** [Ikwangula]; **Katchilo** [Kasongo]; **Kolembe-Lembe** [Tanganika] (Dew.).

Senecio congolensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 86, (1906) 329.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1356); Kimbata près de Dembo (But. in Gill. 3350).

Senecio Dewevrei *O. Hoffm.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 12 [B. S. B. B. XXXIX², 33] et Reliq. Dewevr. (1901) 140.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 935). — Noms vern. : **Ducambutu** [Ikwangula]; **Lololo**; **Matosa** [Tanganika]. (Dew.).

Senecio discifolius *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 100; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 410; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 417; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 214.

1906 (F. Seret). — XII c : entre Surango et Niangara (Ser. 436).

Senecio katangensis *O. Hoffm.* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) p. XI.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 340).

? **Senecio maritimus** *L. f.* Suppl. pl. (1781) 369; *Thunb.* Fl. Capens. (ed. Schult) 680; *DC.* Prodr. VI, 434; *Harv.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 351; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 184.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 293).

OBS. — Il reste quelques doutes sur la détermination de cette espèce.

KLEINIA L.

Kleinia fulgens *Hook. f.* in Bot. Mag. (1866) t. 5590; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI², 80].

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

OSTEOSPERMUM L.

Osteospermum sonchifolium *DC.* Prodr. VI (1837) 465; *Harv.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 440.

Le type croit dans l'Afrique australe:

— — var. **subpetiolatum** *Harv.* l. c. (1865) 440; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 141.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 124).

ECHINOPS L.

Echinops Korobori *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 216, t. 63.

1906 (F. Seret). — XII d : savane du territoire du chef Koroboro (Ser. 617).

Echinops Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 214, t. 62.

1906? (F. Seret). — XII d : rég. N.-E. du Congo (Ser.).

DICOMA Cass.

Dicoma anomala *Sond.* in Linnaea, XXIII (1850) 71; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 443; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 420; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 614; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 168.

1900 (Edg. Verdick). — Bas-Congo (But.). — XVI ; Lukafu (Verd.).

— — var. **karaguensis** *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 443; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 186.

D. karaguensis *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 103, t. 70.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua, 9°5 lat. S. (Pg. 200).

Dicoma Poggei *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 545; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 168.

1900 (Edg. Verdick). — XV : pays de Muata-Yamvo (Pg. 275). — XVI : Lukafu — Nom vern. : **Mutzianvo** (Verd.).

PLEIOTAXIS Steetz.

Pleiotaxis affinis *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 538; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1285).

Pleiotaxis Dewevrei *O. Hoffm.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 11 [B. S. B. B. XXXIX², 33] et Reliq. Dewevr. (1901) 141.

1896 (A. Dewèvre). — XVI : montagne Kitchina [Haut-Lualaba] (Dew. 1014).

Pleiotaxis eximia *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 539; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 31 et Pl. Gilletianae, I (1900) 33 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 33]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 216.

P. pulcherrima Klatt (non *Steetz*) in Ann. naturh. Hofmus. Wien, III (1892) 104.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 714); env. de Dembo (Gill.). — XV : pays de Muata-Yamvo [Congo belge?] (Pg. 263); plaines du Haut-Kasai (Leser.).

Pleiotaxis pulcherrima *Steetz* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) 499; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 440; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 420; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 610; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 168 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 212, (1906) 329; II (1907) 217.

1881 (P. Pogge). — V : la Lula-Lumene (Hendr.); bord de la Sele; entre Dembo et le Kwango (Gill.). — VI : plateau de Kimbele (Cabra et Michel). — XV : Kanda-Kanda (Gent.); Mukenge (Pg. 1270, 1279); Campine à l'O. du Lomami (Pg. 1266). — XVI : le Lofoi; env. de Lukafu. — Nom vern. : **Kabonga** (Verd.); Kayumba [Tanganika-Moero]. — Nom vern. : **Bombo** (Coll. ?).

— — var. **Poggeana** *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 537; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185.

1876? (P. Pogge). — XV? : pays de Muata-Yamvo (Pg. 203).

Pleiotaxis rugosa *O. Hoffm.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 538; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 610; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 329; II (1907) 217.

1892 (F. Demeuse). — V : entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 3726). — XV : au S. de Tshitadi (Leser. 322). — Ind. non cl. : Belem (Dem. 513).

ERYTHROCEPHALUM Benth.

Erythrocephalum erectum Klatt ex Schinz in B. Herb. Boiss. IV (1896) 472; *De Wild et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 105, t. 53; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 168.

1891 (G. Descamps). — XV : pays des Samba (Desc.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Tjikundi (Verd.).

PASACARDOA O. Kuntze.

Pasacardoa Grantii [Benth.] O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 355; O. Hoffm. in Engl. Jahrb. XV (1893) 543; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI², 80].

Phyllactinia — Benth. ex Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 102, t. 68; Oliv. et Hiern in Oliv. Fl. trop. Afr. III, 412.

1891 (G. Descamps). — Ind. non cl. : vallée de la Luile (Desc.).

— — var. **angustiligulata** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 169, in syn.

Phyllactinia Grantii Benth. var. — *De Wild.* l. c. 169.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Lofoi ; Lukafu. — Nom vern. : Musombeke (Verd 360).

— — var. **reducta** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 169, in syn.

Phyllactinia Grantii Benth. var. — *De Wild.* l. c. 169.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 445).

GERBERA Gronov.

Gerbera piloselloides Cav. in Dict. sci. nat. XVIII (1820) 461; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 445; O. Hoffm. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 420; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 212.

Perdicium — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 615.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

CICHORIUM L.

***Cichorium Intybus** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 813; DC. Prodr. VII, 84; *Rchb.* Icon. fl. Germ. XIX, t. 1357; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 195 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 213.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XII c : Amadis (Ser.). — XV : Ibanga (Ém. et M. Laur.).

OBS. — La plante signalée, sous ce nom, dans les env. de Lusambo, par Ém. Laurent, appartient au genre *Lactuca* [*De Wild.*].

LACTUCA L.

Lactuca Cabrae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 217.

Launaea — *De Wild.* l. c. II (1907) 217.

1901 (Alph. Cabra et F. L. Michel). — III : crête du Vanda [bassin de la Pozo] (Cabra et Michel, 62). — V : rég. de la Lumene (Hendr. in Gill. 3278); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Sanda (Odd. in Gill. 3210).

Lactuca capensis *Thunb.* Prodr. pl. Cap. (1800) 139; *DC.* Prodr. VII, 136; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 452; *Harv.* in *Harv.* et *Sond.* Fl. Capens. III, 526; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 621; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 141.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

— — var. **duruensis** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 217.

1906 (F. Seret). — XII c : poste de la Duru (Ser. 496).

Lactuca Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 86.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill. 1588).

Lactuca longispicata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 87; II (1907) 219.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu et env. (Gill. 1509, 3887).

Lactuca Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 218.

1905 (F. Seret). — XII b : territoire du chef Misa (Ser. 273).

Lactuca taraxacifolia [*Willd.*] *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 380; *DC.* Prodr. VII, 138; *Schultz-Bip.* in Flora (1842) 422; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 451; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 186; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 31 [B. S. B. B. XXXVI², 80] et Contr. fl. Cgo, I (1899) 31; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 329; II (1907) 219.

Sonchus — *Willd.* Sp. pl. III (1804) 1511.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — II : Boma (Schimp.). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Dembo; Kisantu (Gill.); Boko-Sainte-Barbe (Vanderyst). — XV : pays de Kazembe-Mouba [bassin du Lualaba] (Desc.).

Lactuca tricostata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 88; II (1907) 219.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.); env. de Kisantu (Van Houtte in Gill. 3499).

Lactuca Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 170.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 139).

SONCHUS L.

Sonchus asper *Hill* Herb. Brit. I (1769) 47; *Dietr.* Fl. Boruss. VII, t. 503; *Rchb.* Icon. fl. Germ. XIX, t. 1410; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. II, 324; *Rouy* in *Rouy et Fouc.* Fl. de Fr. IX, 203.

S. spinosus *Lam.* Fl. Française, II (1778) 86; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 219.

S. oleraceus *L.* var. — *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 457.

1906 (F. Seret). — XII c : Gombari (Ser. 475).

Sonchus Dregeanus *DC.* Prodr. VII (1838) 184; *Harv.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 528; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 169; *Miss. Laurent* (1906) 196 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 219.

1900 (Edg. Verdieck). — VIII : Baka [Ikelemba] (M. Laur.). — XI : Bomaneh (M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.),

Sonchus oleraceus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 194; *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 457; *Harv.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 528; *Rchb.* Icon. fl. Germ. XIX, t. 1410; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 622; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 88 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 828]; *Rouy* in *Rouy et Fouc.* Fl. de Fr. IX, 204.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Sonchus Schweinfurthii *Oliv. et Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III (1877) 458; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 421; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 186; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 623; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 142; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 219.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XII c : entre Surango et Niangara (Ser.). — XIII d : env. de Kabanga — Nom vern. : Kokolola (Dew.).

LOBELIACEAE (1)

LOBELIA L.

Lobelia fervens *Thunb.* Fl. Capens. II (1818) 46; *DC.* Prodr. VII, 385; *Sond.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. III, 548; *Hemsl.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 468; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 186.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

(1) A. Dewèvre a récolté, en 1895, une Goodéniacée, le *Scaevola Lobelia* Murr. mais à Landanu dans l'enclave portugaise de Kabinda.

Lobelia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 85.
1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill. 2802).

CYPHIA Berg.

Cyphia erecta *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 163.
1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 345).

Cyphia scandens *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 163.
1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kitjangulula** (Verd. 368).

CEPHALOSTIGMA A. DC

Cephalostigma Perrottetii A. DC. in DC. Prodr. VII (1838) 420 ;
Deless. Icon. sel. pl. V, t. 15 ; *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 472 ;
Th. Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 187 ; *Th. Dur.* et *De Wild.*
Mat. fl. Cgo, I (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI², 80] ; *De Wild.* et *Th.*
Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 34] et
Contr. fl. Cgo, II (1900) 39.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.) ; Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.). — Ind. non cl. : Noki [Angola?] (Schlt.).

LIGHTFOOTIA L'Hérit.

Lightfootia napiformis A. DC. in Annal. sci. nat. Sér. 5, VI (1866)
328 ; *Hemsl.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 475 ; *Th. Dur.* et *De Wild.*
Mat. fl. Cgo, I (1897) 34 [B. S. B. B. XXXVI², 80] et Reliq. Dewevr.
(1901) 142 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 629 ; *De Wild.* Étud. fl. Kat.
(1903) 162 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 85, 210.

1895 (G. Descamps). — V : env. de Léopoldville ; Kisantu (Gill.) ; la Lula-Lumene (Gill.). — XIII d : au-delà de Nyangwe (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kanzanza** (Verd.) ; Toa (Desc.).

SPHENOCLEA Gaertn.

Sphenoclea zeylanica *Gaertn.* De fruct. et semin. I (1788) 113,
t. 24, fig. 25 ; *Oliv.* et *Hiern* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 481 ; *Hook. f.*
Fl. Brit. Ind. III, 438 ; *O. Hoffm.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 400 ; *Th.*
Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 187 ; *De Wild.* Étud. fl. Kat.
(1903) 162 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 210 ; II (1908) 350.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Pyn.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — XVI : Lukafu (Verd.).

ERICACEAE

ERICINELLA Klotzsch.

Ericinella Mannii *Hook. f.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 16; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 484; Bot. Mag. (1866) t. 5569; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 303; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 96.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

PLUMBAGINACEAE

PLUMBAGO L.

Plumbago zeylanica *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 151; Bot. Reg. XXXII (1846) t. 23; *Wight* Illustr. Ind. Bot. t. 179; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 486; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 304; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 187; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Deweyr. (1901) 143; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 634; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 97 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 335.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — V : Léopoldville (Pyn.); Dolo (Schitt.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — XVI : Lukafu (Verd.).

MYRSINACEAE

MAESA Forsk.

Maesa lanceolata *Forsk.* Fl. Aegypt-Arab. (1775) 106; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 303; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 492; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 637; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 221; *Mez* in *Engl.* Pflanzenreich, IV, n. 236 [Myrsin.] (1902) 26.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : plateau de Lukafu. — Nom vern. : **Samba-Bululu** (Verd.).

EMBELIA Burm.

Embelia retusa *Gilg* in Engl. Jahrb. XXX (1901) 95; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 335; *Mez* in *Engl.* Pflanzenreich, IV, n. 236 [Myrsin.] (1902) 330.

1870 (G. Schweinfurth). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 904). — XII d : le Kibali [Mangbettu] (Schw. 3550).

SAPOTACEAE

CHRYSOPHYLLUM L.

Chrysophyllum africanum A. DC. in DC. Prodr. VIII (1844) 163; *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 500; *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII [Sapot.] (1904) 43, t. 15 A; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 425.

Gambeya — *Pierre* Not. bot. Sapot. (1890) 63.

1906 (Marc. Laurent). — XV : Limbutu (M. Laur. 980).

Chrysophyllum Lacourtianum *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 425, fig. 77-79, t. 138-140.

1903 (Guill. De Bauw). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VII : Iballi; Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : distr. de l'Équateur (De Bauw); rég. de la Lomila (Jurgensen); Coquilhatville (De Bauw in Pyn. 336); Bikoro (De Bauw). — XV : Kondue (Luja). — Ind. non cl. : le Lomami (De Bauw).

Chrysophyllum Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 429, t. 133.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Bamania (Ém. et M. Laur.).

Chrysophyllum longepedicellatum *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 431, t. 134.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Bombimba (M. Laur. 1160).

PACHYSTELE Radlk.

Pachystele cinerea [*Engl.*] *Pierre* ex *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII [Sapot.] (1904) 36, t. 12, fig. A, a-g.

Chrysophyllum — *Engl.* in *Engl.* Jahrb. XII (1890) 522; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 640.

C. Stuhlmannii *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 306.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2874).

— — var. **cuneata** [*Radlk.*] *Engl.* l. c. VIII (1904) 37, t. 12, fig. C, a-h; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 173 et Miss. Laurent (1907) 425.

P. cuneata *Radlk.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 32 et Reliq. Dewevr. (1901) 144.

1895 (A. Dewèvre). — II a : bords du Tshaf à Zobe (Dew. 239). — IV : Luozi (Luja). — V : Kisantu (Gill. 398, 1299). — VII : Kiri; Iballi (Ém. et M. Laur.). — VIII : la Lulanga. — Nom vern. : **Kloro** (Dew. 830). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.).

P. cinerea var. *undulata* *Engl.* l. c. VIII (1904) 36, t. 12, fig. B, a-d.

1881 ? (P. Pogge). — XV : Pumbale [rég. de la Lulua] (Pg.). — Ind. non cl. : Unayamba (Ém. Laur.).

SERSALISIA R. Br.

Sersalisia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 432, t. 124.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 95).

OMPHALOCARPUM P. Beauv.

Omphalocarpum bomanehense *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 422, fig. 74-76, t. 116.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Bomaneh (M. Laur. 1073).

Omphalocarpum Cabrae *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 421, fig. 73, t. 128.

1896 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 2).

Omphalocarpum Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 417, fig. 69, t. 114-115.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).

Omphalocarpum sankuruense *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 419, fig. 70-72, t. 112-113.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bolongula (Ém. et M. Laur.).

SYNSEPALUM Baill.

Synsepalum dulcificum [*Schumach. et Thonn.*] *Daniell* ex *S. Bell* in *Pharm. Journ.* VI, n. 10 (1852) 445; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 143; *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VIII [Sapot.] (1904) 32, t. 7, c.; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 173; II (1907) 62 et Miss. Laurent (1907) 433.

Bumelia — *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 150.

Sideroxyton — *A. DC. Prodr.* VIII (1844) 183; *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr.* III, 583.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Lukolela (Dew.) — VIII : Eala. — Nom vern. : **Bomanga** (Ém. et M. Laur.); le Haut-Lopori (Biel.). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Synsepalum stipulatum [Radlk.] *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII* [Sapot.] (1904) 31, t. 7, fig. D, a-g.

Stironeuron — Radlk. ex De Wild. et Th. Dur. *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 32 et Reliq. Dewevr. (1901) 143.

1896? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

BAKERISIDEROXYLON Engl.

Bakerisideroxylon revolutum [Bak.] *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII* [Sapot.] (1904) 34, t. 11, fig. B; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 62.

Sideroxylon — Bak. in *Oliv. Fl. trop. Afr. III* (1877) 563.

Vincentia — *Pierre Not. bot. Sapot.* (1891) 37.

1905 (F. Seret). — IX : env. de Bumba (Ser. 1).

MIMUSOPS L.

Mimusops affinis *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 221.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Munga-Gu (Verd. 222).

Mimusops congolensis *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 436, fig. 82-83.

Ann.? (Coll.?). — Bas-Congo (Coll.?).

Mimusops cuneifolia *Bak. in Oliv. Fl. trop. Afr. III* (1877) 506; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 188; *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII* [Sapot.] (1904) 64.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Mimusops ubangiensis *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 433, fig. 81.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — X : rég. de l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Mimusops Welwitschii *Engl. in Engl. Jahrb. XII* (1890) 524, t. 21, fig. A et *Monog. Afr. Pfl.-Fam. VIII* [Sapot.] 58, t. 20, fig. A; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 645.

Le type croît dans l'Angola.

— — form. **grandifolia** *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 62.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2366, 2768).

EBENACEAE

EUCLEA L.

Euclea divinorum *Hiern* in Trans. Cambr. Phil. Soc. XII (1873) 79; Monog. Eben. 99 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 513; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 188.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Euclea katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 222.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Sakonnida** (Verd. 93).

MABA Forsk.

Maba buxifolia *Pers.* Syn. pl. II (1807) 606; *Hiern* Monog. Eben. 116 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 515.

Ferreola guineensis *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 448.

Maba — *A. DC.* Prodr. VIII (1844) 241.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

DIOSPYROS L.

Diospyros incarnata *Guerke* in *De Wild.* Étud. fl. Bas et Moy.-Cgo, II (1908) 335 [nom. tant.].

1907 (J. Gillet). — VIII : Mondjo [Ikelemba] (Gill.).

Diospyros Loureiriana *G. Don* Gen. Syst. Bot. IV (1837) 39; *Hiern* Monog. Eben. 194 et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. III, 322; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 188.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

OBS. — *M. Hiern* (l. c.) rapporte la plante de Smith à la var. *heterotricha* *Welw.* ex *Hiern* in *Trimen* Journ. of Bot. (1875) 355.

Diospyros mespiliformis *Hochst.* ex *A. DC.* in *DC.* Prodr. VIII (1844) 672; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 651; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 222 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 119-123.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kasagola** (Verd.).

Diospyros monbuttensis *Guerke* in Engl. Jahrb. XXVI (1898) 66.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : l'Uele [pays des Mangbettu] (Schw. n. 3598)

OLEACEAE

JASMINUM L.

Jasminum dichotomum *Vahl* Symb. bot. I (1790) 26; *DC.* Prodr. VIII, 307; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 9; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 259 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 63.

J. guineense *G. Don* Gen. Syst. Bot. IV (1837) 61.

J. noctiflorum *Afzel.* Remed. Guin. (1813) 25; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 222.

J. ternum *Knobl.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 535.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.); Bambili (Ser. 12 b). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kisjinko** (Verd.). — Ind. non cl. : vallée du Lomami (Desc.).

Jasminum Schweinfurthii *Gilg* in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, I (1895) 72; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 3.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 1668).

Jasminum Verdickii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 63.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 279).

LINOCIERA Sw.

Linociera nilotica *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 106, t. 117; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 19.

Mayepea — *Knobl.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1898) 528; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 62.

1896 (Ém. Laurent). — IX : île en aval d'Upoto (Ém. Laur.) : Bumba (Pyn.).

SCHREBERA Roxb.

Schrebera trichoclada *Welw.* [Sertul. Angolense] in *Trans. Linn. Soc.* XXVII (1869) 41; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXX (1901) 72; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 97; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 15.

Nathusia — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 412; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I*, 657.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kabale-Bale** (Verd.).

APOCYNACEAE

VAHADENIA Stapf.

Vahadenia Laurentii [*De Wild.*] *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 30, (1904) 589; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 451.

Landolphia — *De Wild.* in *Rev. cult. colon.* VIII (1901) 229; XI (1902) 76 et in *Not. Apoc. laticif. du Cgo* (1903) 62-67; *De Wild. et Gentil Lian. caoutch. du Cgo* (1904) 94, t. 15; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 89 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829*]; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 169.

1895 (Ém. Laurent). — II a : Mushipila (Ém. Laur.) : la Lukuta. — Nom vern. : **Mpusa** (Kest.). — V : la Sele. — Nom vern. : **Malombo** (Coll?); Kimuenza (Gill. 1666). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Momponpo** (Sap.). — VIII : Eala (M. Laur. 1870); secteur de Mondongo; Tshuapa : Moma (Jesp.). — XII c : zone de Bomo-kandi. — Nom vern. : **Bobo** [Lamboray]. — XV : Kole; Dibebe-Kapepula (Flam. 306); route de Luebo à Luluabourg (Coll.?); Galikoko-Luebo (Gent.); Kondue (Ém. et M. Laur.); Bena-Dibebe. — Nom vern. : **Otoankima** (Flam. : Rossel. 18); Katako-Kombe. — Noms vern. : **Pongundeli**, **Muninga-Sendive** (Serm. 10, 11). — Ind. non cl. : Tshimbumbang. — Nom vern. : **Tshibobobo** (Sap.)

— — var. **grandiflora** [*De Wild.*] *Stapf* l. c. IV¹ (1904) 589; *De Wild.* l. c. (1907) 452.

Landolphia *Laurentii* *De Wild.* var. — *De Wild. Not. Apoc. laticif. du Cgo* (1903) 64; *De Wild. et Gentil Lian. caoutch. du Cgo* (1904) 96.

1901 (L. Gentil). — II : Temvo (Ém. et M. Laur.). — V : Kimuenza (Gill.). — VII : Buseuga [bassin de la Lukenie] (Gent.). — XV : Bena-Dibebe (Ém. et M. Laur.; Cransh.).

— — form. **obtusifolia** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 452.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 129).

LANDOLPHIA P. Beauv.

Landolphia Dewevrei *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 52, (1904) 592; *De Wild. Not. Apoc. laticif. du Cgo* (1903) 73-77; *Miss. Laurent* (1907) 482, t. 147, 153 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 172-174.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Ibali. — Nom vern. : **Tentze** (Coll.?). — VIII : Eala (M. Laur. 1871); Moma (Jesp.). — IX : Bunba et env. — Nom vern. : **Mosanganda** (Pyn. 92, 1045). — XI : Yambuya (Pyn. 52). — XII c : env. de Nala (Sap.). — XV : Kasongo-Batetela. — Nom vern. : **Lupembe** (Sap.); Lac Foa (Sap.); Batempa (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Walaralapira** [Asande].

Landolphia Droogmansiana *De Wild.* in *De Wild. et Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 59-60, t. 3; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 593; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 455-458, fig. 85-86.

1902 (L. Gentil). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Gungu-Bu-Dutu** (Coll. ?). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Landolphia Dubreucqiana *De Wild.* in *De Wild. et Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 92-93, t. 13-14; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 593; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 453 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 174.

1896 (A. Dewèvre). — VII : Inongo; Isaka (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 251); Eala. — Nom vern. : **Matofe-Ampumba** (Pyn. 681, 714, 1288, 1623, 1631; M. Laur. 60, 1238, 1876, 1877, 1902); secteur de Mondombe (Jesp.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 1036 a). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.); Munungu (Leser. 252); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Kela** (Rossel. 19; Flam.); le Kasai (Luja); Lubue (Gent.); Kasongo-Batetela; Kapulumba (Sap.); env. de Lubefu; Kole (Flam.). — Nom vern. : **Musumbo** [Lulua].

OBS. — Cette espèce paraît assez répandue dans tout le domaine du Congo (De Wild. et Gentil).

Landolphia florida *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 444; *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinneanae, 30, t. 13 A; *Hallier* f. Kautschuklian. 89; *Jumelle* Pl. à caoutch. et à gutta, 54; *Warb.* in *Tropenpflanzer*, III (1899) 311, fig. 65 et *Kautschukpfl.* 117, fig. 61; *Vilbouch.* Les pl. à caoutch. 221; *Henriq.* Kautschuk (1899) t. 3-4; *Schlechter* Westaf. Kautsch.-Exped. 67 et fig. p. 68; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 145; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 38, 590; *De Wild. et Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 87, 88, t. 11-12; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 64 et Miss. Laurent (1907) 482.

Vahea — *F. Muell.* in *Wittst.* Org. constit. Pl. (1880) 258.

Pacouria — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 662.

L. eomorensis *Boj.* var. — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 402-405, fig. 1 B et 2; in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* B, 456, fig. 19 et 458, fig. 20 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV², 128 et 129 fig. 50 B et 51; *A. Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 18; *Kohler* *Mediz. Pfl.* III, 13, cum xyl.; *Sadebeek* *Kulturgew.* Deutsch. Kolon. 274, fig. 105.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Zambi (Dew.); Ile Mateba (Dew.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Dipumunu** (Gill.); Lukolela et env. (Dew.). — VI : Madibi (Leser.; Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.; Ser. C, F, 195); Bodzuana. — Nom vern. : **Songa** (Coll. ?). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Bolombobo** (Dew.); Eala (Flam. 52). — IX : Bumba (Dew.); Peza (Krek.). — X : l'Ubangi (Coll. ?); Inese. — Nom vern. : **Barakota** (Coll. ?); zone de Bomokandi (Lamboray). — XII d : pays des Mangbettu — Nom vern. : **Djgua** (Coll. ?). — XII e : Kagube (Coll. ?). — XIII e : Wabundu (Dew.). — XV : Kondue (Luja); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Doma** (Rossel. 1; Flam. 1); Munungu. — Nom vern. : **Naondongo ?** (Sap.); ehutes du Lubi (Gent.); env. de Lubefu (Coll. ?). — XVI : Bunkeya; Toa (Desc.); Haut-Marungu (Deb.). — Nom vern. : **Ilombo** [Lulanga]; **Mondongo ?** [Madibi] (Sap.); **Ponguendole** [Lubefu] (Flam.).

M. De Wildeman fait des réserves au sujet de l'exactitude de ces derniers noms [*Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 176].

L. florida var. **leiantha** *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1869) 107; *Hallier f.* *Kautschuklian.* 93; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 39; *De Wild. et Gentil* *Lian. caoutch. du Cgo*, 89-91; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 67; *Miss. Laurent* (1907) 484 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 176.

L. florida *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1887) t. 6963.

L. comorensis *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 402; *Jumelle* *Pl. à caoutch. et à gutta*, 56; *Sadebeek* *Kulturgew. Deutsch. Kolon.* 276.

Vahea — *Boj.* *Hort. Maurit.* (1837) 207; *DC.* *Prodr.* VIII, 328 et in *Nov. Act. Acad. Nat. Cur.* XXII, 2 (1850) t. 41, fig. 4-7.

L. comorensis *K. Schum.* var. *florida* *K. Schum.* in *Sitz.-Ber. Berl. Akad. Wiss.* XVI (1900) 195.

Willughbeia cordata *Klotzsch* in *Peters Reise n. Mossamb.* I (1862) 283.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela et env. (Dew. 830 a; Ém. et M. Laur.); env. de Kisantu (Gill.). — VIII : Eala et env. — Noms vern. : **Bolembola**; **Ilombola** (M. Laur. 1873; Pyn. 1160); Coquilhatville (Dew. 584); env. de Bikoro (Coll.?). — X : l'Ubangi; Imese. — Nom vern. : **Inga** (Luja); au N. de Banzyville. — Nom vern. : **Mokwa** (Coll.?). — XI : Limbutu (M. Laur. 1894). — XII : l'Uele. — Nom vern. : **Ndevre** (Delp.). — XII b : Bambili. — Nom vern. : **Pobiru** (Coll.?). — XIII a : Romée (Coll.?). — XV : env. de Lusambo (Flam.).

Landolphia Gentilii *De Wild.* *Apoc. à latex recueill. par Gentil* (1901) 20; *De Wild. et Gentil* *Lian. caoutch. du Cgo* (1904) 61-64, t. 4; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 51, in obs.; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 473-474 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 177.

1900 (L. Gentil). — VII : entre le Lac Tumba et le Lac Léopold II (Coll.?). — VIII : bassin du Ruki, de la Lopori et de la Maringa (Coll.?): secteur de Mondombe. — Nom vern. : **Bumuke** (Jesp.). — XI : entre la Lopori et le Barumbu (Coll.?). — XII c : env. de Nala (Ser. et Van Geersdael; Ser. 758, 846). — XV : Kanda-Kanda (Coll.?): env. de Kondue (Luja). — Nom vern. : **Walaralapira** [Asande].

OBS. — Postérieurement, M. Stapf [l. c. (1904) 590] a réuni le *L. Gentilii* au *L. owariensis* P. Beauv.

Landolphia humilis *K. Schum.* in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 306, fig. p. 228; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 53, 592; *Hua* in *Rev. cult. colon.* XI, 322-328; *De Wild. et Gentil* *Lian. caoutch. du Cgo* (1904) 124; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 453-455 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 178-181.

1899 (R. Schlechter). — IV : distr. des Cataractes (Coll.?). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12544; Ém. et M. Laur.); Léopoldville (Pyn. 137, 166); Chenal Léo-Kwam (Ém. et M. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.; Pyn. 309; Gent. 94 b); Dolo (M. Laur. 471); Sabuka (Coll.?). — VI : vallée de la Djuma (Gill.); Bandundu (Coll.?): Dima (Leser. 359; Sap.). — VII : Tollo (Coll.?): la Fini (Coll.?): Malepie (Ém. Laur.). — XV : distr. du Lualaba-Kasai (Coll.?). — Nom vern. : **Bungu-Bungu** [Kwango or.].

Landolphia Klainei *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 13; *Jumelle* Pl. à caoutch. et à gutta, 40; *Hallier f.* Kautschuklian. 43, 79; *Warb.* Kautschukpfl. 119; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. 83, c. fig.; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 52, 591; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 67-77, t. 3; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 67-75, t. 5-7 et fig. 5-6; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 475-479, fig. 98-101 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 181-186.

L. owariensis *A. Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 36 pr. p. 1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Mayenga-Zambi (Coll. ?). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Madungu** (Kest.); la Lemba (Dew. 362); la Lukula (Cassart). — V : Léopoldville. — Nom vern. : **Zoko** (Gill. 2525; M. Laur. 411); Bokala. — Nom vern. : **Malemanso** (Ém. et M. Laur.); Sabuka. — Nom vern. : **Zoko** (Coll. ?); Tua (Coll. ?). — VI : entre Dungu et Popokabaka (Coll. ?); env. de Dinga. — Nom vern. : **Bolombola** (Coll. ?); Muene-Dinga (Gent.). — VII : Mushie (Coll. ?). — VIII : bords de la Tshuapa [sect. de Mondombe] (Jesp.). — X : Imese. — Nom vern. : **Iboboro** (Coll. ?). — XI : Yambuya (Solh. 116). — XII : Poko (Coll. ?). — XII b : Bambili. — Nom vern. : **Biombio** (Coll. ?). — XII c : Gombari (Ser. 742); — XV : le Sankuru (Dem. 106); Lubefu (Cransh., 26, 37); Lusambo (Ém. Laur.); Munungu (Leser. 23); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Muemie** (Rossel. 6; Flam. 4, 284 et n. III); Pania-Mutombo; chutes Wolff (Gent.); Mokole. — Nom vern. : **Iboboro** (Coll. ?). — Ind. non cl. : Bium-Bium (Van Geersdael); env. de Boblo (Dew. 721 a). — Nom vern. : **Matoli** [Bangala] (Dew.).

Landolphia Lecomtei *A. Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 25; *Warb.* in Tropenpflanzer, III (1899) 312 et Kautschukpfl. 118; *Vilbouch.* et *Warb.* Pl. à caoutch. 228; *Hallier f.* Kautschuklian. 88; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 42; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 81-83 et Miss. Laurent (1907) 484-485, t. 148.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : Benza-Masola (Ém. et M. Laur.); la Lukula. — Nom vern. : **Mpusa** (Kest.).

Landolphia lucida *K. Schum.* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1895) 25; *A. Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog. Landolph. 32; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 189; *Henriq.* Kautschuk, t. 4; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 59.

Dictyophlebia — *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 93.

1882 (P. Pogge). — XV : rég. du Kasai (Pg.); Mukenge (Pg. 1038, 1236).

Landolphia ochracea *K. Schum.* ex *Hallier f.* Kautschuklian. (1899) 86, t. 1 [Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt, XVII (1899) 3, Beih. 86]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 40; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 187.

1905 (Coll. ?). — II a : le Mayumbe (Coll. ?). — V : Sabuka, en 1907 (Spanaro).

— — var. **breviflora** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 486 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 188.

L. ochracea De Wild. [non *K. Schum.*] Miss. Laurent (1907) 485, t. 151.

1904 (S. Bieler). — VIII : Iteko [Haut-Lopori]. — Noms vern. : **Ikele**; **Towagna**. (Biel.). — XII d : Bambili (Coll.?). — Ind. non cl. : Makala.. — Nom vern. : **Dambola**.

Landolphia owariensis P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 55, t. 34; A. Dewèvre Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 36; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 189; *Jumelle* Pl. à caoutch. et à gutta, 42; *Sadebeek* Kulturgew. Deutsch. Kolon. 272; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 122]; *Hallier f.* in Tropenpflanzer, III (1899) 312 et Kautschukpfl. 118; *Warb.* Kautschukpfl. 42; *Henriq.* Kautschuk, t. 3-4; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 146; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. 229 [fig. p. 128]; *De Wild.* Apoc. à latex recueill. par Gentil (1901) 11-19; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 49; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 51-58, t. 1, 2 et 17, fig. 5-8; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 459-473, t. 152 et fig. 87-97, 119 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 189-199.

Paederia — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 609.

Vahea — *F. Muell.* in *Wittst.* Org. const. Pl. (1880) 258.

Pacouria — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 661.

L. Heudelotii *Schlechter* [non *DC.*] Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 9.

Vahea elastica *Klotzsch* ex *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 50, in syn.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); la Lemba (Dew. 362). — IV : Tumba (Ém. et M. Laur. — V : distr. du Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); env. de Léopolville. — Noms vern. : **Bari**; **Akariabeti** (Gill. 2525); Sabuka. — Nom vern. : **Bikuli** ou **Bikule** (Coll.?): Bolobo. — Noms vern. : **Botowe**; **Bituba** (Dew.); Tua. — Nom vern. : **Bikule** (Coll.?): forêts de la Sele. — Noms vern. : **Makuku**; **Bikuli** (Coll.?): Sanda. — Nom vern. : **Bikuri** (Odd. in Gill. 3748); env. de Lemfu (Gossart); env. de Kisantu. — Nom vern. : **Lisuki** (Gill.). — VI : le Kwango orient. [part. mérid]; chutes François-Joseph (Coll.?): Zovo [sur la haute Wamba] (Coll.?): entre les rivières Inzia, Tungila et Wamba (Coll.?): vallée de la Djuma (Gent.): Kundi-Dunga. — Nom vern. : **Kinkwite** (Coll.?). — VII : Kundu. — Noms vern. : **Samba**, **Nsamba** (Coll.?): env. d'Ila. — Nom vern. : **Botope** (Coll.?): Kutu. — Nom vern. : **Bole** (Elskens; Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Coll.?): Équateur (Coll.?) env. d'Eala. — Nom vern. : **Matofe-Mongo** (M. Laur. 57, 127, 174, 175, 176, 216, 1872, 1891; Pyn. 1747); Monzambi (M. Laur. 1893); env. de Bikoro (Coll.?): Ikenge. — Nom vern. : **Matofe-Mongo** (Paulus); Lac Tumba. — Nom vern. : **Bomoke** (Ém. et M. Laur.); chenal de Monkero (Ém. et M. Laur.); bassin de la Lulanga (Dew. 811 a); secteur de Mondombe. C. — Nom vern. : **Kole** (Jesp.); Beet-Moma. — Nom vern. du fruit : **Baloma** (Jesp.). — IX : pays des Bangala. — Nom vern. : **Matoli** (Dew. 721 a). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.); Imese. — Noms vern. : **Ikekeke**; **Bolundu-Kete** (Coll.?). — XI : l'Aruwimi. — Noms vern. : **Ahanguila**; **Malola** (Coll.?): Isangi (Ém. et M. Laur.); Yambuya (M. Laur. 1890). — XII : l'Uele. — Noms vern. : **Nikandi**; **Biombian** (Delp.); Mendele (Delp.). — XII b : Bambili. — Noms vern. : **Babetet**; **Asangia**; **Bomet** (Coll.?). — XII c : Poko. — Nom vern. : **Angwanga** (Coll.?): Gombari (Ser. 736); zone de Bomokandi [Lamboray]. — XIII a : Stanley-Falls (Dew. 1188). — XIII c : Lokandu (Gossart). — XV : l'Inkongo (Sap.); Kondue. — Nom vern. : **Kadjanga** (Luja); Kole (Craensh. 24, 27); Bolongula (Ém. et M. Laur.); Mokolo. — Nom vern. : **Bolundu-Kete** (Coll.?): Bena-Dibele. — Nom vern. : **Okonga**; **Dundu** (Ém. et M. Laur.; Flam. 285, et n. II); Mange; Munungu (Ém. et M. Laur.);

env. de Lubefu. — Noms vern. : **Oloma; Okango** (Coll.?); rives du Lubi (Sap.); Lac Foa. — Nom vern. : **Kaiembe?** (Sap.); Katak-Kombe (Serm. 1, 2, 3). — XVI : Toa (Desc.). — Ind non cl. : Bari [Bali?, VII]. — Nom vern. : **Akariabeti** (Coll.?); Kikongi (Coll.). — Nom vern. : **Nabo** [Mangbettu] (Coll.?).

Landolphia robusta [*Pierre*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1904) 43; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 487, t. 155, fig. 102-103 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 205.

Aphanostylis — *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1893) 92.
L. Mannii *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 146.

1896 (A. Dewèvre). — VI : Madibi (Leser. 96: Sap.). — VII : env. d'Ila (Coll.). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 250); Eala (Pyn. 909, 1256, 1482, 1691; M. Laur. 896, 1288); Bala-Lundzi [Momboyo] (Pyn. 267); sect. de Mondombe. — Noms vern. : **Sjolongo; Omongemonge** (Jesp.). — IX : Bumba et env. (Dew. 885; Pyn. 82). — XII b : Bambili. — Nom vern. : **Bobo** (Coll.). — XV : Bena-Dibele. — Nom vern. : **Kelela** (Rossel.; Flam.); Dibele (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (Ém. et M. Laur.); Katak-Kombe (Serm.); Kapulumba (Sap.); env. de Lubefu (Coll.). — Noms vern. : **Lukunatchima** [Kwilu]; **Ditolo** [Lulua].

Landolphia scandens [*Schumach.* et *Thonn.*] *F. Didr.* [Pl. nonnull. Mus. Holm.] in Vidensk. Meddel. naturh. Kjob. (1855) 190; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 44; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 67; Miss. Laurent (1907) 489, fig. 104 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 206-207.

Strychnos — *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 127; *DC.* Prodr. IX, 13.

L. Petersiana *Dyer* var. crassifolia *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 402, t. 12, fig. A.

Pacouria crassifolia *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 663.

Aphanostylis mammosa *Pierre* var. — *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 92.

A. mammosa *Pierre* var. mucronata *Pierre*, l. c. (1898) 92.

L. Petersiana *Dyer* var. — A. Dewèvre Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 30 pr. p.

L. scandens *F. Didr.* var. genuina *Hallier* f. Kautschuklian. (1899) 80.

L. scandens *F. Didr.* var. coriacea *Hallier* f. l. c. (1899) 81.

L. Welwitschii « *Dyer* » ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 146.

L. Petersiana *Jumelle* Pl. à caoutch. et à gutta (1903) 57 pr. p.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill. 3232, 4052). — II a : route de Poiti à Tshoa (Dew. 393); la Lukula (Coll.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.); Ganda (Body). — VIII : secteur de Monia vers la Tshuapa; secteur de Mondombe (Jesp.); Équateur (Pyn. 380); Irebu (M. Laur. 636); Basankusu. — Nom vern. : **Monondongo** (Brun.); Eala. — Nom vern. : **Mondonga** (M. Laur. 896; Pyn. 985, 1658, 1716); Iala [la Baringa] (Brun.). — IX : Umangi (Krek.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.); Limbutu (M. Laur. 976). — XV : Lubue (Gent.); Kasongo-Batetela. — Nom vern. : **Fundiakima** (Sap.); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Olole** (Rossel. 25; Flam.). — Nom vern. : **Lokalia** [Kanda].

Landolphia Thollonii A. Dewèvre Caoutch. Afr. Monog. Landolph. (1895) 50; *Warb.* Kautschukpfl. 120; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr.

IV¹, 58; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 8, 93-96; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 117-119, t. 25-26; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68, (1906) 301; Miss. Laurent (1907) 491-495, fig. 105-107 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 208.

L. owariensis *P. Beauv.* var. *parvifolia* *Hallier f.* Kautschukian. (1899) 41, 74 pr. p.

L. Kirkii *Dyer* var. — *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 88 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 828].

1902 (J. Gillet). — IV : distr. des Cataractes (Gent.). — V : plaines du Stanley-Pool. — Nom vern. : **Lunda** (Rouy); env. de Léopoldville (Gill.): **Sabuka** (Ém. et M. Laur.); Dolo. — Nom vern. : **Botofi** (Sap.); CC. de Dolo à Kimpoko (M. Laur. 592); Kinshassa (Sap.); rég. de la Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3071); Boko; Kisantu (Gill. 69); Galiema [cult.] (Pyn. 116). — VI : plaines du Kwango (Rouy); env. de Popokabaka (Coll.?). — XV : la Kantsha: la Lubue; la Loange (Gent.); Babundu (Briart).

CLITANDRA Benth.

Clitandra Arnoldiana *De Wild.* in Compt.-Rend. Acad. sci. Paris, CXXXVI (1903) 399-400 et Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 20; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 80-82, t. 9-10, fig. 7; *Chevalier* in Rev. cult. colon. XV, 5; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 20-21; II (1908) 214-217; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 301 et Miss. Laurent (1907) 495-501, fig. 108-110.

C. Gilletii *De Wild.* Obs. Apoc. à latex recueill. par Gentil (1903) 37-38.

1904 (1) (Ed. Luja). — II a : zone du Mayumbe. — Nom vern. : **Fulu-M'Boa** (Coll.?). — IV : distr. des Cataractes. — Nom vern. : **Malumbo** (Coll.?). — V : Bokala (Coll.?): forêts de la Sele, de la Lumene, de la Lufumu (Coll.?): Tua. — Noms vern. : **Makalanga**; **Mojon** (Coll.?): Madimba; Banza-Boma. — Nom vern. : **Makalanga** (Coll.?). — VI : Madibi et env. (Sap.); entre Kundi et Popokabaka. — Nom vern. : **Kindinga** (Coll.?): route de Kundi-Dinga; env. de Faylela. — Nom vern. : **Kindinga** (Coll.?). — VII : Lac Léopold II. — Nom vern. : **Bitope** (Elsk.); Kutu (Coll.?): Ila. — Nom vern. : **Moloma** (Elsk.); env. de Ganda. — Nom vern. : **Zamba** (Body); Nioki. — Noms vern. : **Matoli**; **Matopi** (Coll.?). — VIII : secteur de Mondombe. — Noms vern. : **Setete**; **Mondongo** (Jesp.); Eala et env. (M. Laur. 1142, 1885, 1887, 1888); env. de Bikora (Coll.?): Ikenge (Paulus). — Nom vern. : **Mondongo** (Paulus). — X : Imese. — Nom vern. : **Barakota** (Ém. et M. Laur.); Yakoma. — Nom vern. : **Mokwaa** (Coll.?). — XI : l'Aruwimi. — Nom vern. : **Abodo** (Coll.?): Barumbu (Coll.?). — XII c : Poko (Coll.?): zone de Bomokandi (Lamboray). — XII d : rég. des Mangbettu. — Nom vern. : **Adjoksetamba** (Coll.?). — XV : Bena-Dibele. — Nom vern. : **Dongetele** (Rossel. 5, 23; Flam. 7 et 14); Bombaie; Munungu (Ém. et M. Laur.); Kondue. — Nom vern. : **Moloma**; **Bitopa** (Luja, 2); Katako-Kombe (Serm. 3, 4; Cransh. 30); Kole (Cransh. 29); env. de Lubefu (Coll.?): Mokole. — Nom vern. : **Barakota** (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : nom de la plante : **Undulu**; fruit : **Olva**; caoutchouc : **Lukata** [Lubefu]; **Kindandu** [Buluba]; **Sonko**; **Kaembe** [Lulua]; **Mumbumu** [Kwilu]; **Badongo** [Bangala].

(1) Un échantillon de cette espèce, avec la date de 1900, se trouve au Jardin Botanique de l'État, mais sans nom de collecteur.

OBS. — Dans la *Fl. of trop. Afr.* IV¹ 594, M. Stapf réunit cette espèce au *Cl. orientalis* K. Schum.

C. Arnoldiana var. **Sereti** *De Wild.* Miss. Laurent (1908) 500.

1906 (F. Seret). — XII c : Arebi (Ser.).

Clitandra cirrhosa *Radlk.* in *Abhandl. naturhist. Ver. Bremen*, VIII (1883) 400; *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 219; *Hallier f. Kautschuklian.* (1899) 129; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 67; *De Wild.* Miss. Laurent (1908) 501.

Carpodinus — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 219.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3705). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Clitandra Gentilii *De Wild.* in *Belg. colon.* (1903) 137 et *Not. Apoc. laticif. du Cgo* (1903) 25-26; *De Wild. et Gentil Lian. caoutch. Cgo* (1904) 112; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 596.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2857).

Clitandra Kabulu *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 219.

1907 (A. Sapin). — XV : Kapulumba. — Nom vern. : **Kabulu** (Sap.).

Clitandra Lacourtiana *De Wild.* in *De Wild. et Gentil Lian. caoutch. du Cgo* (1904) 110, t. 24; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 596; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 501, t. 163 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 220.

1902 (L. Gentil). — V : Tua. — Nom vern. : **Gamenkuye** (Coll.?). — VIII : env. de Bikoro (Coll.?): Eala (Pyn. 528). — XV : Kanda-Kanda sur les bords de la Luile (Gent. 64); Katako-Kombe (Serm. 5); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Kodolembe** (Rosel. 15); Lac Foa (Sap.). — Nom vern. : **Kaia** [Baluba] (Sap.).

Clitandra laxiflora [*K. Schum.*] *Hallier f. Kautschuklian.* (1899) 124 [*Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt*, XVII, 124]; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 502, fig. 111 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 221.

Carpodinus — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 220.

Aphanostylis — *Pierre* in *B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér.* (1898) 90.

Clit. cymulosa *Stapf* [non *Benth.*] in *Journ. Linn. Soc.* XXX (1894) 87.

Carp. incerta *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1897) 132.

1905 (Albéric Bruneel). — VIII : Basankusu (Brun.). — XI : env. de Yambuya (Sohl.). — XV : env. de Bena-Dibele (Flam.).

Clitandra Mannii *Stapf* in *Kew Bull.* (1894) 20 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 69; *Jumelle Pl. à caoutch. et à gutta*, 62; *Hallier f.*

Kautschuklian. 125; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 503 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 222.

Aphanostylis Mannii *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 89.

Clit. exserrens *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 219.

Aphanostylis — *Pierre* l. c. II (1898) 90.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : entre Coquilhatville et Lulanga (Pyn. 806). — VIII : secteur de Mondombe; Moma (Jesp. 45, 62). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XII b : Bambili? — Nom vern. : **Mapeleko** (Coll.?). — XII c : Gombari (Ser. 733). — XV : Bena-Dibele. — Nom vern. : **Weloafu** (Rossel. 26). — Ind. non cl. : Poto [Poko?, XIII a] (Coll.?): Bari [Bali?, VII]. — Nom vern. : **Eku** (Coll.?).

Clitandra Nzunde *De Wild.* in Belg. colon. (1903) 126 et in Not. Apoc. laticif. du Cgo, I (1903) 22; *De Wild.* et *Gentil* Liañ. caoutch. du Cgo (1904) 83; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ 595; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 222.

1901 (Coll.?). — X : Banzyville (Coll.?).

Clitandra parvifolia [*Pierre*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 63; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 223.

Cylindropsis — *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 39; *Hallier* f.

Kautschuklian. (1899) 132; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam.

Erganz I (1900) 55.

Carpodinus. — *Pierre* l. c. (1898) 39.

1904 (Éd. Luja). — VIII : env. de Mondombe et de Moma (Jesp.). — XV : Bena-Dibele (Coll.?): Kondue. — Nom vern. : **Kindandu** (Luja). — Nom vern. : **Tokinda** [Basongo-Meno] (Sap.).

Clitandra robustior *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 130; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 71; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 224-226.

C. myriantha *K. Schum.* ex *Pierre* in B. Soc. Linn. Paris, II (1898) 40; *Hallier* f. Kautschuklian. (1899) 121.

Carpodinus — *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 221.

Landolphia Preussii *K. Schum.* ex *A. Dewèvre* Caoutch. Afr. Monog.

Landolph. (1895) 56.

1907 (A. Sapin). — VI : env. de Madibi (Sap.). — VIII : Moma (Jesp.); Belo. — Nom vern. : **lfofi** (Jesp. 58); Mondombe (Jesp. 50). — XII c : zone de Bomokandi. — Nom vern. : **M'Bitti** (Lamboray). — XV : Katakoko-Kombe (Dobbelaere). — Noms vern. : **Sonko**; **Kaembe** [Lulua] (Sap.).

Clitandra Sereti *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 226.

1907 (F. Seret). — XII c : rives de l'Aruwimi sur la route de Gombari à la Duru (Ser. 731).

CARPODINUS R. Br.

Carpodinus Bruneelii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 504, t. 149 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 230.

1896 (Albéric Bruneel). — VIII : Yala (Brun. 36). — XV : Bena-Dibele? (Flam. 268).

Carpodinus congolensis *Stapf* in Kew Bull. (1898) 303; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 34 et Reliq. Dewevr. (1901) 146; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 76; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 505.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Bingila (Dup.); Shimbete. — Nom vern. : **Bolico-Bolico** (Dew. 311). — XV : le Kasai (V. Durand).

Carpodinus Eetveldeana *De Wild.* et *Gentil* Lian. cautch. du Cgo (1904) 107, t. 23; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 597; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 506 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 231.

1902 (L. Gentil). — VIII : secteur de Mondombe. — Nom vern. : **Baloma** (Jesp.). — XV : entre Luebo et Luluabourg (Gent. 60); Dienga-Monene (Gent. 60); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Abutadjamba** (Rossel. 11; Flam.); Katakoko-Kombe. — Nom vern. : **Akutshu-Aramba** (Serm. 8). — Ind. non cl. : Kolomoam (Flam.).

Carpodinus Gentilii *De Wild.* Apoc. à latex recueilli par Gentil (1904) 26-28; *De Wild.* et *Gentil* Lian. cautch. du Cgo (1904) 99, t. 16, 17, 19, fig. 4-7; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 88, 600; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 506-508, t. 161 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 232-233.

1905 (L. Gentil). — V : bord de la Sele; env. de Sabuka. — Nom vern. : **Mampoto** (Coll. ?); env. de Kisantu. — Nom vern. : **Masinja** (Gill.); Bokala. — Nom vern. : **Mosia, Manzenga** (Coll. ?). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Ganda [Lac Léopold II]. — Nom vern. : **Ezendja** (Body); env. d'Ila (Coll. ?). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); secteur de Mondombe, C. — Nom vern. : **Masindu** (Jesp.); env. de Bikoro. — Nom vern. : **Loliki** (Coll. ?); — XII c : Poko [Uele]. — Nom vern. : **Bapenongwala** (Coll. ?); zone de Bomokandi (Lamboray). — XII d : Dungu (Ser. 4). — XIII : env. de Makola (Coll. ?). — XV : Djoko-Punda (Lescr. 292); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Iteka** (Rossel.; Flam. 108); le Sankuru (Sap.); Kondue. — Nom vern. : **Madimbi** (Luja); Katakoko-Kombe. — Nom vern. : **Osindja** (Serm. 13); Lubefu et env. (Flam.). — Noms vern. : **Masisi** [Kwilu]; **Businda** [Bangala].

Carpodinus gracilis *Stapf* in Kew Bull. (1898) 303 et in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 35; Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss Sér. 2, I, 34] et Reliq. Dewevr. (1901) 147; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 85, 599; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 43; *De Wild.* et *Gentil* Lian. cautch. du Cgo (1904) 129, t. 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 509.

Carpodinus camptoloba *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1897) 132.

Clitandra gracilis *Hallier f.* *Kautschuklian.* (1899) 117.

1885 (R. Buttner). — IV : distr. des Cataractes (Gent.). — V : plaines du Stanley-Pool (Coll.?) ; Léopoldville (Luja) ; entre Léopoldville et Sabuka (M. Laur. 548) ; entre Léopoldville et Kimuenza (Ém. Laur.) ; Kimuenza (Dew. 516) ; Sabuka (Ém. et M. Laur.) ; Kisantu et env. — Noms vern. : **Bungu-Bungu** ; **Dinsona** ; **Dinsonia** (Gill. 71, 2223, 3516, 3600) ; rég. de la Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3093). — VI : plaine du Kwango (Coll.?) ; Muene-Putu-Kasongo (Buett. 480). — VIII : Eala [cult.] (Pyn. 648 ; M. Laur. 1190, 1892). — XV : rég. du Lac Dilolo (Questiaux, 1).

Carpodinus Jesperseni *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 235.

1907 (Knut Jespersen). — VIII : secteur de Mondombe (Jesp.).

Carpodinus lanceolata *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 132 ; *Stapf* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 36 ; II (1900) 39 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 148 ; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 68, (1906) 301 ; *Warb. in Zeitschr. trop. Landwirthsch.* (1897) n. 6, 8 et in *Tropenpfl.* I (1897) 134, fig. A-D ; *Henriq. Kautschuk*, 19, t. 4 ; *Hallier f. Kautschuklian.* 115, t. 3, fig. 5 ; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 85, 599 ; *De Wild. Not. Apoc. laticif. du Cgo*, (1903) 39, 56, 94 ; *De Wild. et Gentil Lian. caoutch. du Cgo* (1904) 130-132 ; *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 52, cum xylogr. ; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 509, t. 148 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 236.

1882 (P. Pogge). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool ; Dolo (Sap. ; Schlt. 12447 ; Pyn. 124) ; Léopoldville (Ém. Laur. ; Dew. 489) ; Chenal (Ém. et M. Laur.) ; Kwamouth (M. Laur. 618 ; Flam. ; Gent. 194) ; Tampa (Ém. Laur.) ; Selembao (Dew. 110) ; Chenal ; Sabuka (Ém. et M. Laur.). — VI : Kinwanda près Tumba-Mani (Cabra et Michel, 142) ; Baija [Kwilu]. — Noms vern. : **Bagui** ; **Botofi** (Sap.) ; Madibi. — Nom vern. : **Madiaka** ; **Tshinchele** ; Kimoko [Madibi] (Sap.). — VII : Tollo [sur la Lukenie] (Body). — XI : Basomelo (Ém. Laur.). — XIII d : entre la riv. Lufubu et Nyangwe (Pg. 1074). — XV : Mange [Kasai] (Briart) ; Bena-Dibele (Luja, 266 ; Flam.) ; Kikasa [Bashilange] (Pg. 1157) ; Bukila (Ém. et M. Laur.) ; entre Luebo et Djoko-Punda (Leser. 272) ; Kole (Cransh.) ; env. de Lubefu. — Nom vern. du fruit : **Omokembulo** (Flam.). — Ind. non cl. : Mangbay (Flam.). — Noms vern. : **Maboki** [Popokabaka] ; **Batshindji** [Sankuru-Lukenie] ; **Dondecha** [Loange et la Lulua].

OBS. — Cette espèce paraît assez répandue dans les districts des Cataractes, du Stanley-Pool, du Kwango orient., du Lac Léopold II et dans la Province Orientale [zone du Manyema-Tanganika].

Carpodinus leptantha *Stapf* [non *K. Schum.*] in *Kew Bull.* (1898) 303 ; in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 34 ; II (1900) 39 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 148 ; *Hallier f. Kautschuklian.* (1899) 114, t. 3 ; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 82 ; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 510 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 236.

2 Janv. 1896 (A. Dewèvre), 14 Février 1896 (Ém. Laurent). — V : Coquilhatville (Dew. 590). — VIII : secteur de Mondombé (Jesp.). — XI : Basomelo (Ém. Laur.). — XV : Bena-Dibele (Flam.); Katako-Kombe. — Nom vern. du fruit : **Afridi na hima** (Serm. 9); env. de Lubefu (Coll.?). — Noms vern. : **Oyongasolo**; **Oyongasudi** (Coll.?).

Carpodinus ligustrifolia *Stapf* in Kew Bull. (1898) 304 et in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 149; *De Wild. et Gentil* Lian. cautch. du Cgo (1904) 104, t. 21 fig. 1-4; *Hallier f.* Kautschuklian. (1899) 112; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 83, 599; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 510-511 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 237-240.

C. gracilis *Stapf* l. c. 303 pr. min. pte [Conf. *Stapf* in *Dyer* l. c. 83]. 1901 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Sanda (Odd. in Gill. 3410); Dembo (Hendr. in Gill. 2023); Kisantu: Kimuenza (Gill. 171, 2184). — VI : entre le Kwango et Popokabaka (Coll.?): env. de Madibi (Coll.?). — VIII : Eala et env. — Nom vern. : **Bosere-Motani** (M. Laur. 186, 245, 1889; Pyn. 1375); sect. de Mondombe, C. (Jesp.): Ipeco (Pyn. 1583). — IX : Bumba (Pyn. 96). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1879); Bomaneh (M. Laur. (1878)). — XV : Bena-Dibele; Kole (Coll.?). — Nom vern. : **Motepa** (Rossel. 10; Flam.); env. de Lubefu (Coll.?). — Nom vern. : **Autontongo** [Basongo-Meno] (Sap.).

— — var. **angusta** *De Wild.* in *De Wild. et Gentil* Lian. cautch. du Cgo (1904) 105.

1902 (L. Gentil). — XV : rives de la Lubue (Gent. 47); Mukanda-Monene (Gent. 47).

Carpodinus rufescens *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 241.

1907 (Knut Jespersen). — VIII : secteur de Mondombe (Jesp. 66).

— — var. **longeacuminata** *De Wild.* l. c. 241.

1907 (Agost. Flamigny). — XV : Dibele (Flam. 37).

Carpodinus Schlechteri *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 305, 306, cum xyl. [nom. tant.]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 75.

1899 (R. Schlechter). — V : Kinshassa (Schlt. 12804).

Carpodinus subrepanda *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 132; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 82; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 511.

C. friabilis *Pierre* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 38.

C. lacteus *K. Schum.* ex *Stapf* l. c. IV¹ (1902) 132, in syn.

1903 (Coll.?). — IX : pays des Bangala (Coll.?).

Carpodinus turbinata *Stapf* in Kew Bull. (1898) 304, in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 35; Ill. fl. Cgo (1899) 57, t. 29 et

Reliq. Dewevr. (1901) 149; *De Wild.* Apoc. à latex récol. par Gentil, 31, 33; *Hallier f.* Kautschuklian. (1899) 109, t. 3, fig. 2-4; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 83, 599; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 102, t. 18-19, fig. 1-3; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 512-515, fig. 513 515.

1895 (A. Dewèvre). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3701); Tua. — Nom vern. : **Palenkima** (Coll.?). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (M. Laur. 1874, 1889); Équateurville. — Noms vern. : **Okeba**; **Susu** (Dew. 311); Ikenge [Ruki] (Gent.); Injolo (M. Laur. 1875); Huyghe et Led.); la Bolombo en aval de Dikila (Brun.). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange; Bolongula; Dibele (Ém. et M. Laur.); Bena-Dibele. — Nom vern. : **Otungu** (Rossel. 9; Cransh. 33); Katakoko-Kombe. — Nom vern. : **Momomo** (Serm. 14); Munungu (Sap.); Kasongo-Batetela. — Nom vern. : **Otongu** (Sap.); forêts du Sankuru (Luja, 6; Brisac). — Nom vern. : **Mosere**; **Mosele**; **Bimba** [Kwilu]; **Mosere** [Bangala]; **Bosele-Motani** (Gent.).

Carpodinus verticillata *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 515, t. 156-157, fig. 116-118 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 243.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Tua (Coll.?). — VI : Madibi? (Sap.). — VII : rég. du Lac Léopold II. — Nom vern. : **Tsentse** (Body, 3). — VIII : Équateur (Gisseleire). — X : l'Ubangi. — Nom vern. : **Bolundu** (Coll.); forêts au S. de Banzyville. — Nom vern. : **Mokwa** (Coll.); Imese. — Nom vern. : **Bolundu-Mabe** (Ém. et M. Laur.). — XII c : Niangara (Ser. 1275). — XII d : Nyangwe. — **Kalombo-Lombo** (Coll.). — XV : rég. du Kasai. — Nom vern. : **Thibulu** (Sap.). — Nom vern. : **Munbalankube** [Kwilu].

CYCLOCOTYLA Stapf.

Cyclocotyla congolensis *Stapf* in *Kew Bull.* (1908) 260; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 168.

1905 (Agost. Flamigny). — VIII : secteur de Mondombe. — Nom vern. : **Lolika-Ikolo** (Jesp.); Eala (Pyn. 1113, 1634). — XV : Bandaka-Kole (Flam.).

CARISSA L.

Carissa edulis *Vahl* Symb. bot. I (1790) 22; *Delile* Cent. pl. Méroë, 51, t. 2, fig. 1; *DC.* Prodr. VIII, 334; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII, 64; *Ficalho* Pl. Uteis, 221; *Lewin* in *Engl. Jahrb.* XVII, Beibl. n. 41 (1893) 44-51; *Planch.* Prodr. Apoc. 141, 256, 292; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 189; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 89; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 535.

Arduina — *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 669; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl*

Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 127 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 135.

Jasminonerium — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 415.

Curandos — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 664.

Carissa richardiana *Jaub. et Spach* Ill. pl. Orient. V (1857) t. 496.

Carissa dulcis *Schumacher et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 146.

Jasminonerium — *O. Kuntze* l. c. (1891) 415.

1874 (Fr. Naumann). — I : embouchure du Congo (Naum.). — XII d : entre Vankerekhovenville et Faradje (Ser. 553).

PICRALIMA Pierre.**Picralima nitida** [Stapf] Th. et Hél. Dur.

Tabernaemontana — Stapf in Kew Bull. (1894) 22 et in *De Wild. et Th. Dur.*

Contr. fl. Cgo, I (1899) 30 et Reliq. Dewevr. (1901) 153.

P. Klaineana Pierre in B. S. Linn. Paris, I (1896) 1278; K. Schum. in *Engl.* et Prantl Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV, 285 et Erganz. I, 60; Stapf in *Hook.* Icon. pl. XXVIII (1902) t. 2745-2746 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 95; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 244.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Dolo** (Dew. 847). — XI : Lokandu (Dew. 1113). — XII c : route de Poko à Zobia (Ser. 873).

PLEIOCERAS Baill.**Pleioceras Gilletii** Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 167, 604; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 70 et Miss. Laurent (1907) 546.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — Bas-Congo (But. in Gill. 2230). — V : Kisantu (Gill. 3690). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 537, 2812). — VIII : Bala-Lundzi (Pyn. 273).

PLEIOCARPA Benth.**Pleiocarpa bicarpellata** Stapf in Kew Bull. (1894) 21 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 100; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 245.

Hunteria ambiens K. Schum. in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 223.

1907 (Agost. Flamigny). — VIII : Bokungu (Jesp.). — XV : Dibebe (Flam.).

Pleiocarpa tubicina Stapf in Kew Bull. (1898) 204 et in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 37; II (1900) 40; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 91, t. 46 et Reliq. Dewevr. (1901) 150; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 107; Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 101, 600; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 535 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 245.

Hunteria pycnantha Hallier f. [non K. Schum.] Kautschuklian. (1899) 191, pr. p.

1891 (F. Demeuse). — XI : Basoko (Dem.); Barumbu (Ém. et M. Laur.). — XII c : route de Buta à Zobia (Ser. 893). — XIII d : Kasongo (Dew. 945). — XV : Idanga (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd. 594). — Noms vern. : **Mababalo** [Ikwangula]; **Motola** [Kasongo]; **Musabela** [Tanganika] (Dew.).

Pleiocarpa Welwitschii Stapf ex Hiern Cad. Welw. Pl. I (1898) 665 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ 100; *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXVIII (1908) 827.

Hunteria pycmaniha Hallier f. [non K. Schum.] Kautschuklian. (1899) 191 pr. p.

1907 (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).

DIPLORHYNCHUS Welw. (1)

Diplorhynchus angolensis *Buett.* in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 85; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 189; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 106; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo, 33-34 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 302; *De Wild.* et *Gentil* Lian. caoutch. du Cgo (1904) 33-34.

1885 (R. Buettner). — VI : Kinwenda près Tumba-Mani (Cabra et Michel); pays des Majakalla (Buett.)

OBS. — Suivant M. Stapf, le *D. angolensis* indiqué par M. De Wildeman comme récolté par le P. Butaye à Kisantu [Rev. cult. colon. X (1902) 140-142, ne serait pas le type].

Diplorhynchus mossambicensis *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. (1881) t. 1335; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 316; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 107, 600; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 101.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Moengue** (Verd.).

OBS. — M. De Wildeman [l. c.] décrit, sans nom, une forme peut-être spécifiquement distincte, récoltée aussi à Lukafu et appelée **Bietji**. (Verd.).

Diplorhynchus Welwitschii *Rolfe* in Bolet. Soc. Brot. XI (1893) 85; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 105.

D. Poggei *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 142, fig 54 o; *De Wild.* in Rev. cult. colon. X (1902) 142.

D. angolensis *Britten* [non *Buett.*] in Journ. of Bot. (1895) 76, pr. p.; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 667, pr. p.; *De Wild.* l. c. 141, pr. p.

1882 ? (P. Pogge). — Ind. non. cl. : le Lomani (Pg. 1002).

RAUWOLFIA L.

Rauwolfia caffra *Sond.* in *Linnaea*, XXIII (1850) 77; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 110; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 102.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lac Moero; Lukafu. — Nom. vern. : **Mulimbalimba** (Verd. 618).

Rauwolfia longeacuminata *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1898) 35 [B. S. B. B. XXXVIII², 205]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 117.

1897 (Alph. Cabra). — V : Bas-Congo (Cabra).

(1) Une espèce d'un genre voisin, le *Thevetia neriifolia* Juss. originaire de l'Amérique, est cultivée, pour sa graine oléagineuse, à Wumbali [V] et à Eala [VIII] (M. Laur.). — [Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 536].

Rauwolfia Mannii *Stapf* In Kew Bull. (1894) 21 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 113; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 37 et Reliq. Dewevr. (1901) 150; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 536.

R. cardiocarpa *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 154, fig. 56 R.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata. — Nom vern. : **Mbara** (Dew. 791) : Basankusu (Brun.).

Rauwolfia obscura *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 154; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 117, 602; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 12]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 69, 179; Miss. Laurent (1907) 536 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 245.

1882 ? (P. Pogge). — IV : Gombi-Lutete (Hens, A. 165). — V : Léopoldville (Schlt.); entre Dembo et Kisantu (Gill. 1583); Kimuenza (Gill. 770, 1652, 1661 b). — VI : le Kwilu. — Nom vern. : **Dimadini** (Sap.); Madibi (Sap.). — VIII : Ikenge (P. Huyghe). — IX : Upoto (Ém. Laur.). — XV : Mukenge (Pg.); Bolongula; Basongo; Lusambo; Mukundji (Ém. et M. Laur.); le Sankuru. — Nom vern. : **Busangulatati** (Sap.). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.). — Nom vern. : **Lopundu** [Bangala].

Obs. — L'indication de Butala est erronée [Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 536].

Rauwolfia vomitoria *Afzel.* Stirp. med. Guin. sp. nov. (1818); *Hook.* Niger Fl. (1849) 446; *Planch.* Prodr. Apocyn. 295; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 115, 604; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 70; Miss. Laurent (1907) 536 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 246.

R. senegambica *A. DC.* in *DC.* Prodr. VIII (1844) 340; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 34] et Reliq. Dewevr. (1901) 150.

R. congolana *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1900) 34 [B. S. B. B. XXXVIII², 304] et Reliq. Dewevr. (1901) 150.

1891 (F. Demeuse). — V : Kisantu (Gill. 496); Lemfu (But. in Gill. 2262). — VIII : Eala et env. (Pyn. 639, 1474, 1485; Lescr. 30; M. Laur. 1138); env. de Mombanganga (Dew.). — IX : Bangala (Dem.); Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XI : Mougandjo (M. Laur. 1363). — XII : Deinge. — Nom vern. : **Nagomgami** (Ser.). — XIII d : Kibulu près Kasongo (Dew.). — Ind. non cl. : Tombolo (Lescr. 39).

ALLAMANDA L.

***Allamanda cathartica** *L.* Mant. pl. II (1771) 214; Bot. Mag. (1796) t. 338; *Muell.-Arg.* in *Mart.* Fl. Brasil. VI¹, 10; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 315; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 33 et Reliq. Dewevr. (1901) 145; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr.

IV¹, 117; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 67 et Miss. Laurent (1907) 535.

A. Schottii Hook. [non *Pohl*] in Bot. Mag. (1848) t. 4351.

A. Aubletii Pohl Pl. Brasil. I (1827) 75; Bot. Mag. (1848) t. 4411.

Orelia grandiflora Aubl. Pl. Guian. I (1775) 271, t. 106.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 417). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2590).

OBS — Plante originaire d'Amérique, cult. à Eala [VIII] (M. Laur. 1115, 1367).

LOCHNERA Richb. (1)

Lochnera rosea [L.] Richb. Consp. regn. veget. (1828) 134; *K. Schum.* in Engl. Pfl. Ost-Afr. 316; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 190; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 39 et Reliq. Dewevr. (1901) 151; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 118; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 179 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 246.

Vinca — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 302; Bot. Mag. (1794) 248; *DC.* Prodr. VIII, 382.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo, cult. et partout au bord des chemins dans les villages (Dup.). — I : Banana (Dew.). — II : Boma (Welw.). — V : Kimuenza (Gill.); Kisantu; Boko (Vanderyst).

ALSTONIA R. Br.

Alstonia congensis Engl. in Engl. Jahrb. VIII (1887) 64; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 190; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 121.

A. scholaris Chevalier [non *R. Br.*] in B. Mus. hist. nat. Paris, VI (1900) 423 et in Rev. cult. colon. VIII (1900) 492, 493, cum. xyl.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

Alstonia Gilletii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 537 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 246.

1904 (J. Gillet). — V : rég. de Kisantu (Gill. 353); Sanda (Odd. in Gill. 3751). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Lumpundu** (Sap.). — VIII : Eala (Pyn. 788).

— — var. **Laurentii** *De Wild.* l. c. (1907) 538, t. 162.

1904 (Ém. et M. Laurent). — VII : Bolombo (Ém. et M. Laur.).

(1) Deux espèces d'un genre voisin [**Plumeria**] originaires d'Amérique, ont été indiquées au Congo, mais n'y étaient que cultivées : le **P. alba** L. à Kimuenza (Gill.) et le **P. rubra** L. à Kisantu (Gill.). [Conf. *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 80].

TABERNANTHE Baill.

Tabernanthe Bocca *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 122.

T. Iboga Oliv. [non *Baill.*] in *Hook.* Icon. pl. (1894) t. 2337 [tab.; non text.];
Kew Bull. (1895) 37 cum tab. pr. p.

1883 (H. Mueller). — Bas-Congo. — Nom vern. : racine : **Bocca** (Muell.).

Tabernanthe Iboga *Baill.* in B. S. Linn. Paris, I (1889) 783; *Stapf*
in Kew Bull. (1895) 38, cum ic.; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II
(1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 122]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr.
IV¹, 124; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 223-228;
II (1908) 247.

T. albiflora *Stapf* in Kew Bull. (1898) 305; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl.
Cgo, I (1899) 38 et Reliq. Dewevr. (1901) 151.

1895 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Dup.). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Sanda
et env. (Verm. in Gill. 3437; Odd. in Gill. 3562); bassin de la Sele (But. in Gill.
1443). — VIII : Coquilhatville (Dew. 684); env. de Coquilhatville. — Nom vern. :
Lopundja (Malchair); Eala et env. (M. Laur. 750, 1140, 1234; Pyn. 718, 1115, 1370,
1528). — IX : secteur de Mondombe (Jesp. 40). — XV : le Sankuru (Sap.); Bena-
Dibele (Flam. 138). — Nom vern. : **Lopundu** [Bangala].

Tabernanthe tenuiflora *Stapf* in Kew Bull. (1898) 305; *De Wild.*
et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 38; II (1900) 40 et Reliq. Dewevr.
(1901) 152; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 124; *De Wild.* Miss.
Laurent (1907) 538 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 247.

1891 (F. Demeuse). — II a : la Lemba (Dew. 361). — V : Sabuka (Ém. et M.
Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 54, 166, 710; Pyn. 1235). — XIII a : Stanleyville
(Dem.). — XV : Kapulumba (Sap.). — Nom vern. : **Makuntju** [la Lulua].

CALLICHILIA Stapf.

Callichilia Barteri [*Hook. f.*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902)
133; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 539 et Étud. fl. Bas- et Moy.-
Cgo, II (1908) 338.

Tabernaemontana — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1870) t. 5859; *Stapf* in *De Wild.* et
Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I (1899) 39 et Reliq. Dewevr. (1901) 153; *K. Schum.*
in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Expéd. (1900) 306.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Lukolela et Gombi (Dew. 793). — VIII : Équa-
teurville (Pyn. 341); Eala (Pyn. 582); env. de Monzambi (Pyn. 349).

CARVALHOA K. Schum.

Carvalhoa Ledermanni *Gilg* ex *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss.
XXVIII (1908) 829 [nom. tant.].

1908 (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).

GABUNIA K. Schum.

Gabunia eglandulosa [Stapf] Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 138; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 543-545, fig. 124-125 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 247.

Tabernaemontana — Stapf in Kew Bull. (1894) 24 pr. p.

1903 (J. Gillet). — V : Sanda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2880). — VIII : Lokelenge; Basankusu (Brun.); env. d'Eala (M. Laur. 1373); secteur de Mondombe (Jesp. 25). — XII c : env. de Gombari (Ser. 684). — XV : Bolongula (Ém. et M. Laur.).

CONOPHARYNGIA Stapf.

Conopharyngia durissima [Stapf] Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 144.

Tabernaemontana — Stapf in Kew Bull. (1894) 24; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 148.

T. durinervis [err. cal.] *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 190.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

OBS. — M. Stapf, qui, en 1894, a créé l'espèce sur les échantillons de Christian Smith, ne l'indique plus en 1902 [l. c.] qu'au Kamerun et au Gabon. Est-ce une omission?

Conopharyngia Gentilii [De Wild.] *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 539.

Gabunia — *De Wild.* in Belg. colon. (1902) 508 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68; Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 602.

1902 (L. Gentil). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2528); Lukolela (Pyn. 261). — VIII : Eala (M. Laur. 901, 1378, 7300; Pyn. 261, 363, 942). — XI : Yambuya (M. Laur. 901, 1378). — XV : Lubue (Gent.).

OBS. — Une espèce, peut-être identique, a été récoltée par M. Van Tichelen près de la Lukula [Conf. *De Wild.* l. c. 69, in obs.].

Conopharyngia pachysiphon [Stapf] Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 146; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 540.

Tabernaemontana — Stapf in Kew Bull. (1894) 22 et in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 40 et Reliq. Dewevr. (1901) 153.

1896 (A. Dewèvre). — XII c : Gombari (Ser. 566). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 943). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Mongombe** [Kasongo]; **Kalungu** [Tanganika]; **Aguka** [Ikwangula] (Dew.).

OBS. — M. O. Stapf conserve quelques doutes sur la détermination de la plante des env. de Kasongo.

Conopharyngia penduliflora [*K. Schum.*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 149; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 248.

Tabernaemontana — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 225.

1902 (L. Gentil). — XII c : env. de Nala (Ser. 769). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Conopharyngia Smithii [*Stapf*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 143.

Tabernaemontana — *Stapf* in *Kew Bull.* (1898) 305; *De Wild et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 39 et Reliq. Dewevr. (1901) 153.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Shinganga. — Nom vern. : **Benene** (Dew. 61). — V : Léopoldville (Ém. Laur.). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew. 1167 a). — XV : bassin du Sankuru (Ém. Laur.).

— — var. **brevituba** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 541.

1905 (Éd. Lesclauwaet). — XV : Mushenge (Lescl.).

Conopharyngia Thonneri [*De Wild. et Th. Dur.*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 148.

Tabernaemontana — *Th. Dur.* et *De Wild.* ex *Stapf* in *Kew Bull.* (1898) 306; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 39 et Pl. Thonnerianae (1900) 32, t. 7.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bogolo près de Businga (Thonn. 109).

Obs. — Le Fr. Gillet semble avoir retrouvé cette espèce à Dembo [distr. V].

— — var. **Demeusei** *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 541.

1891 (F. Demeuse). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem. 440).

— — var. **Lesclauwaetii** *De Wild.* l. c. (1907) 542.

1899 (Éd. Luja). — VI : route de Lusubi à Luanu (Lescl. 68). — XV : Munungu (Lescl. 265); Bena-Dibele (Luja, 264); le Sankuru. — Nom vern. : **Monkeka** (Sap.).

VOACANGA Thou.

Voacanga africana *Stapf* in *Journ. Linn. Soc.* XXX (1894) 87 pr. p. et in *Oliv.* Fl. trop. Afr. IV¹, 157; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 102 et Miss. Laurent (1907) 545; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 157, 603.

V. Schweinfurthii *Th. Dur.* et *De Wild.* [non *Stapf*] *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 120]; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo, (1899) 77 t. 39 [descr. excl.]; *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 40 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 151.

V. glabra *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 149.

1891 (F. Demeuse). — V : Léopoldville. — Nom vern. : **Sanga** (Dew. 483); Kisantu (Gill. 186). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — IX : Bangala (Dem.). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Kilimboi** (Verd. 46).

Voacanga angolensis *Stapf* in *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 668 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 155; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 545.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.).

Voacanga obtusa *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 149; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 34]; *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1896) 226; *Scheffler* in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, III, 161; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 153, 603; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 69, (1906) 302 et *Miss. Laurent* (1907) 545.

V. obtusata *K. Schum* ex *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 122].

1895 (Gust. Debeerst). — V : rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3570); rég. de la Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3070); Kisantu (Gill. 203, 1115). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — XII d : env. de Vankerkhovenville (Ser. 547). — XV : Lac Foa (Lescr. 210). — XVI : Kibanga [Tanganika] (Deb.).

Voacanga psilocalyx *Pierre* ex *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 159; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 545.

1906 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1000); Yambuya (Solh.).

Voacanga puberula *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 149; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 156; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 302; *Miss. Laurent* (1907) 545 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 248.

V. Schweinfurthii *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Stapf*] Pl. Gilletianae, I (1900) 34 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 34].

V. Klainei *Pierre* ex *Stapf* in *Dyer* l. c. IV¹ (1902) 156.

1903 (J. Gillet). — V : Léopoldville (Pyn. 144); env. de Kisantu (Gill. 186, 3506). — VIII : Eala (M. Laur. 670, 1374, 1375; Pyn. 507); Ikenge (Huyghe). — XII c : Gombari (Ser. 548). — XV : bords du Kasai (Ém. et M. Laur.).

HOLARRHENA R. Br.

Holarrhena congolensis *Stapf* in *Kew Bull.* (1898) 306; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 37 et Pl. Gilletianae, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 35]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 163.

1897 (Alph. Cabra). — II : entre Boma et Tschoa (Cabra). — II a : Boma-Sundi (Cabra). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Kembaki** (Gill. 155).

Holarrhena febrifuga *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 277; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* A, 33, 76; C, 315; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 162, 604; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 101.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 27).

H. febrifuga form. **grandiflora** *Stapf* ex *De Wild.* l. c. (1903) 101.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 133).

Holarrhena floribunda [*G. Don*] *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 190; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 122].

Rondeletia — *G. Don* Gen. Syst. Bot. III (1834) 513.

H. africana *A. DC.* in *DC.* Prodr. VIII (1844) 414; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 459; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 164.

1895 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : route des Caravanes (Ém. Laur.).

Holarrhena Wulfsbergii *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 164, 604; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68.

H. africana *Wulfsberg* [non *A. DC.*] *Holarrh.* Afr. Inaug. Diss. (1880) cum tab.; *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. 306.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2758).

STROPHANTHUS. DC.

Strophanthus Arnoldianus *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 36 [B. S. B. B. XXXVIII², 206]; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV, 164; *Gilg* in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VII [Stroph.] (1903) 26, t. 5, fig. C, a-f et t. 10, fig. H; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 303 et *Miss. Laurent* (1907) 546, t. 145.

1899 (R. Kindt). — IV : Kitobola (Kindt); forêt de Zundu (Pyn. 72). — V : vallée du Kwilu près de Tumba (Cabra et Michel, 66).

Obs. — Cette espèce est cultivée à Eala [VIII] (M. Laur. 392; 1107).

Strophanthus Demeusei *A. Dewèvre* in *Journ. pharm.* Anvers (1894) 431 [extr. 8]; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 191; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1892) 152 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] (1903) 32, fig. 4; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 184.

1891 (F. Demeuse). — Ind. non cl. : Buana (Dem.).

Strophanthus Dewevrei *De Wild.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 40 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 154; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 155; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] (1903) 25 t. 5, fig. A.

S. parviflorus *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Franch.*] *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 41.

1895 (Ém. Laurent). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 1058). — XV : Luebo (Ém. Laur.). — Nom vern. : **Mubuta** [Tanganika] (Dew.).

Obs. — M. Stapf [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 607] admet le *S. parviflorus* *Franch.* au nombre des espèces congolaises et lui donne, comme synonyme, le **S. Dewevrei** *De Wild.*

Strophanthus gardeniiflorus *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam* VII [Stroph.] (1903) 20; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 605, in add.

S. Tholloni *De Wild.* [non *Franch.*] *Étud. fl. Kat.* (1903) 102.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulembe** (Verd. 235, 236).

Strophanthus hispidus *DC.* in *B. Soc. Phil. Paris*, (1802) 123, t. 8; *A. DC.* in *DC. Prodr.* VIII, 419; *L. Planch.* *Prodr. Apocyn.* (1894) 33-44, 82, fig. 1-2; *Kohler* *Mediz. Pfl.* II, t. 194; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 41; II (1900) 40 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 155; *Payrau* *Stroph.* (1900) 47, 70, 163, c. fig.; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 34; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 155, in *Tropenpflanzen*, VI (1902) 556, 560 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] (1903) 35, t. 2, fig. a f et t. 10, fig. D; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 174; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 546 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 248.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo, AC. dans la partie N. (Cabra). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Muilu** (Cabra). — V : Kisantu (Gill. 83). — VIII : Haut-Lopori (Biel.); Eala (Pyn. 843, 1077); Mondombe (Jesp.). — IX : Nouvelle-Anvers [Bangala] (Dew. 866). — XII c : env. de Nala (Ser. 773).

— — var. **Bosere** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 546.

1905 (L. C. E. Malchair). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **Bosere** (Malch. in *M. Laur.* 1273).

Strophanthus holosericeus *K. Schum.* et *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 157; *Gilg* in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam* VII [Stroph.] (1893) 39, t. 1, fig. A; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 171.

1893 (G. Descamps). — XVI : Zimu sur le Tanganika (Desc.).

Strophanthus intermedius *Pax* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 375; *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V* (1893) 287; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 671; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 156 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* VII [Stroph.] 31; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 185, 608.

Le type croît dans l'Angola.

— — var. **Bieleri** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1907) 547.

1904 (S. Bieler). — VIII : le Haut-Lopori (Biel.).

Strophanthus Ledieni *Stein* in *Gartenfl.* XXXVI (1887) 145, t. 1241; *Christy* *New comm. pl. and drugs* (1887) 28; *Pax* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 368, 383 et in *Ber. Deutsch. Pharm. Ges.* III (1893) 46; *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V* (1893) 270; *Th. Dur.*

et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 191; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXII (1892) 155 et in Monog. Afr. Pfl.-Fam. VII [Stroph.] (1903) 35; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 171.

1887 (F. Ledien). — III : Vivi (Led.).

Strophanthus Preussii *Engl. et Pax* in Engl. Jahrb. XV (1892) 369; *Franch.* in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, XV (1893) 279; *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 230 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 307; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 670; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 41; Pl. Thonneriana (1900) 32 et Reliq. Dewevr. (1901) 154; *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 155; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 176, 606; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 548 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 249.

S. bracteatus *Franch.* in Morot. Journ. de Bot. VII (1892) 324 et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V (1893) 280; *Payrau* *Strophanthus* (1900) 104-106, 162 c. xyl.; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I. (1899) 41 et Reliq. Dewevr. (1901) 154; *Stapf* in *Dyer*, Fl. trop. Afr. IV¹, 177.

1896 (A. Dewèvre). — VII : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 676, 2038, 2039; Pyn. 393, 610, 746, 1020, 1342, 1391, 1761); Efu-kwa-Kombe (M. Laur. 1229); Bamania (Pyn. 916); Dikila-lala (Brun.); Bokakata (Dew. 809); env. de Mondombe (Jesp.); Ikenge (Huyghe). — IX : Bombati près Dobo (Thonn.). — X : Bomoka (Ém. et M. Laur.). — XI : Yambuya (M. Laur. 1458); Bomaneh (M. Laur. 2041). — XII c : env. de Nala (Ser. 783); village Belia (Ser. 501).

— — var. ***brevifolius*** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 249.

1907 (Agost. Flamigni). — XV : Bena-Dibele (Flam. 190).

Strophanthus sarmentosus *DC.* in B. S. Phil. Paris, III (1802) 123, t. 8, fig. 1 et in Annal. Mus. Hist. nat. Paris, I (1802) 410, t. 27, fig. 1; *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1892) 374; *Franch.* in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V (1893) 282 et in *Morot* Journ. de Bot. VIII (1894) 204; *L. Planch.* Prodr. Apocyn. (1894) 79; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 191; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 40; *K. Schum.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 307; *Payrau* *Strophanthus* (1900) 85-87, 163, cum fig.; *Gilg* in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 156, 161 et in *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. VII [Stroph.] (1903) 29, t. 10, fig. K; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 180, 607; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 548 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 249 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 249.

S. Paroissei *Franch.* in Morot, Journ. de Bot. VII (1893) 320 et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 3, V (1893) 290, t. 16; *L. Planch.* Prodr. Apocyn. (1894) 58, 83; *Payrau* *Strophanthus* (1900) 88-91, 163; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1901) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 35].

1891 (F. Demeuse).— Bas-Congo (Ém. Laur.).— II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); la Lemba (Dem.). — V : Kisantu et env. (Gill. 52, 194, 3388). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1032); env. de Mondombe (Jesp. 33). — XI : Yambuya (M. Laur. 1032); Bomaneh (M. Laur. 1033). — XV : Bena-Dibele (Flam. 188).

Strophanthus Welwitschii [Baill.] K. Schum. in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. I, Ergänzt.* (1900) 59; *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 157, 162 et in *Monog. Afr. Pfl.-Fam. VII* [Stroph.] (1903) 21.

Zygonerion — Baill. in B. S. Linn. Paris, I (1888) 758.

S. ecaudatus Rolfe in B. S. Brot. XI (1893) 85; *Hiern* Cat. Welw. Pl. III, 671; *Payrau* *Strophanthus* (1900) 94-96, c. fig.; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV (1902) 183, 608.

S. Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 105. t. 31.

S. Verdickii *De Wild.* l. c. 103 [incl. var. *latisepalus* *De Wild.* l. c. 104, t. 32].

1899 (Edg. Verdick). — V : Sanda (De Brouw. in Gill. 3017); Kimuenza (Gill. 2129); Kisantu (Verm.). — VI : env. de Tumba-Mani (Cabra et Michel, 32). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kasonga-Kabasji**; **Kandalupire** (Verd. 84, 146).

Strophanthus Wildemanianus *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 156-159 et in *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam. VII* [Stroph.] (1903) 26, t. 5, fig. A, a-b; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 179, 607.

1902 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2083).

ISONEMA R. Br.

Isonema infundibuliflorum *Stapf* in *Kew Bull.* (1898) 306 et in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 40; *Reliq. Dewevr.* (1901) 154 et *Ill. fl. Cgo* [1899] 103, t. 52; *K. Schum.* in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* 305; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 184; *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1908) 250.

1895 (A. Dewèvre).— VI : env. de Dima (Flam.).— VIII : Coquilhatville (Schlt.); Eala (Pyn. 1462); Équateur. — Nom vern. : **Ngando** (Dew. 594). — XV : le Kasai (Flam.).

FUNTUMIA Stapf.

Funtumia elastica [*Preuss*] *Stapf* in *Proc. Linn. Soc.* (1900) 2 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 191, 609; *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 256; *Stapf* in *Hook. Icon. pl.* XXVII (1901) t. 2694-2695; *Luc* in *B. Jard. colon.* (1907) 4-25, cum ic.; *De Wild.* *Not. Apoc. laticif. du Cgo* (1903) 80-92 et *Miss. Laurent* (1907) 552-561 t. 170-174, 183, fig. 126-131.

Kickxia — *Preuss* in *Notizbl. bot. Gart. Berlin*, II (1899) 353-360, t. 1; *Warb. Kautschukpfl.* 112, 153; *Vilbouch.* in *Warb. Pl. à caoutch.* 204, fig. 15, 206, 207; *Schlechter* in *Tropenpfl.* IV (1900) 109-120; *De Wild.* in *Rev. cult. colon.* VII, 633-634, 743-747.

K. africana Stapf [non *Benth.*] in Kew Bull. (1895) 244 cum, ic. : *Lecomte* in Rev. cult. colon. I, 12-19, 41-47, fig. 2; *Thonn.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1901) p. XII.

K. congolana De Wild. in Rev. cult. colon. (Déc. 1900) 745; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829].

1898 (H. Mardulier). — V : Kwamouth (Ém. et M. Laur.); Bokala. — Noms vern. : **Bole**; **Mobuli** (Coll.); **Limu** (Gill.); **Bolle** (Luja); Tua. — Nom vern. : **Mobuli** (Coll.); Kisantu (Gill. 387, 3130). — VI : Madibi (Sap.); Luanu (Lescr. 29). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Osuma** (Coll.); Eala et env. (M. Laur. 943, 1789, 1790, 1797; Pyn. 248); Lilangi (Mardulier); Bolombo [la Baringa] (Coll.); Ekutshidikila. — Nom vern. : **Montone** (Coll.). — IX : Nouvelle-Anvers [Bangala] et env. — Nom vern. : **Dembo**, **Mariguongo** (Ém. et M. Laur.; de Giorgi; am Rhyn.); rég. de la Giri. — Noms vern. : **Ireh**; **Dembonagete**; **Musali** (de Giorgi). — IX a : Gali. — Nom vern. : **Ireh** [Hausa] (Thonn. 13). — X : l'Ubangi (M. Laur. 56); Imese. — Nom vern. : **Mosale** (Ém. et M. Laur.); Yakoma. — Nom vern. : **Bwombwo** (Coll.); Banzyville. — Nom vern. : **Bwombwo** (Coll.). — XII b : l'Uere-Bili (Coll.). — XII c : env. de Gombari (Ser. 476); Poko. — Nom vern. : **Tondefere** (Coll.). — XIII a : Romée (M. Laur. 1788); Bengamisa. — Nom vern. : **Bombwoke** (Coll.); Kondelele. — Nom vern. : **Bwombwo** ou **Bongbwo** (Coll.) — XIII b : le Haut-Ituri (Coll.). — XV : Mange; Pangu (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Ingiri [Giri?, IX] (M. Laur. 223). — Nom vern. : Mondembo (**Mondunga**) [Bangala].

Funtumia Gilletii [*De Wild.*] *De Wild.* [nom. nov.]

Kickxia — *De Wild.* in Rev. cult. colon. [Déc. 1900] 744; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

OBS. — M. Stapf [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 190, in syn.] réunit cette espèce au *Funtumia africana* Stapf; mais M. De Wildeman estime que les éléments manquent pour trancher cette question.

Funtumia latifolia [*Stapf*] *Stapf* ex *Schlechter* Westfr. Kautsch.-Exped. (1900) 236; *Stapf* in *Hook.* Icon. pl. XXVII (1901) sub t. 2694-2695 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 192. 609; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 563-567.

Kickxia — *Stapf* in Kew Bull. (1898) 307; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 43; II (1900) 41 et Reliq. Dewevr. (1901) 157; *Schlechter* Westfr. Kautsch.-Exped. (1900) 63, 64, 125, fig. 236, 307 et in *Tropenpfl.* 1, 30; *Preuss* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I, 353-359, fig. F, G.; *Warb.* Kautschukpfl. 112; *De Wild.* in Rev. cult. colon. VII, 633, 634; *Vilb. et Warb.* Pl. à caoutch. 205, 207, fig. 16.

K. congolana *De Wild.* in Rev. cult. colon. VII (1900) 745; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829].

1896 (A. Dewèvre). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Mupepe** (Coll.). — V : Kisantu et env. — Nom vern. : **Bolle** (Gill. 387, 886, 2211, 2215, 2313, 3127); env. de Kimuenza (Gill. 1937, 2142); Dembo (Coll.); Bokala (Ém. et M. Laur. 640); Kwamouth. — Nom vern. : **Bolle** (M. Laur. 641). — VI : Madibi; le Kwilu (Sap.); la Loange (Gill.); Lusubi (Lescr.). — VII : env. de Bumbuli. — Nom vern. : **Busumba** (Coll.); Nioki. — Nom vern. : **Bobole** (Coll.); Kutu (Bolle; Ém. et M. Laur.; Delhy); Ibali; la Kiri (Bolle). — VIII : distr. de l'Équateur (Coll.); la Ba-

ringa (Coll.?) ; la Momboyo (Pyn. 279) ; Coquilhatville et env. (Gent.) ; Bolombo (de Giorgi) ; rég. de Ekutshi. — Nom vern. : **Isote** (Coll.?) ; Ikenge (Ém. et M. Laur.) ; Eala (M. Laur. 124, 1775) ; Bolombo (de Giorgi). — IX : Bangala (Dew. 867) ; Nouvelle-Anvers. — Noms vern. : **Dembo** ; **Mariguongo** (Ém. Duch. 14 ; de Giorgi) ; rég. de la Giri [au S. de Bomboma]. — Nom vern. : **Dembo-Mabe** (de Giorgi). — XI : Barumbu (M. Laur. 1074) ; Yambuya (Solh.) ; rég. de Yaboila, de Yamba et et de Mosaka. — Nom vern. : **Wembe** (Coll.?). — XII c : Nala et env. (Van Rysselb. 2) ; Gombari et env. (Ser. 476 b). — XIII a : Romée. — Nom vern. : **Osuma** (M. Laur. 1791 ; Cransh.) ; Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XIII d : rég. des Mangbettu. — Nom vern. : **Bongon** (Coll.?). — XV : Lusambo (Luja, 249, 308) ; Mobole (Coll.?) ; Tielen-Saint-Jacques (Leser. 344) ; Olombo (Coll.?) ; Kondue (Luja) ; rég. du Kasai (Leser. 30) ; Bena-Dibele (Coll.?) ; Katoko-Kombe (Serm.) ; la Lubi (Leser. 174) ; Mange (Ém. et M. Laur.) ; Babadi (Gent.). — Ind. non cl. : rég. de Bodzuma (Coll.?). — Noms vern. : **Boli** ou **M'Bole** [Bangala] ; **Moboli** ; **Mobole** [Sankuru] (1).

MALOUETIA A. DC.

Malouetia Heudelotii A. DC. in DC. Prodr. VIII (1844) 380 ; *Benth.* in Hook. Niger Fl. 450 ; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 195, 609 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 68, (1906) 303 et Miss. Laurent (1907) 574.

M. africana K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1897) 187.

1902 (L. Gentil). — Bas-Congo (Odd.). — V : env. de Sanda (Odd. in Gill. 3553) ; env. de Léopoldville (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2784) ; la Inzia (Gent.) ; la Wamba (Gent. 108). — VIII : le Haut-Lopori (Biel.). — XI : Yambuya (M. Laur. 1023).

ALAFIA Thou.

Alafia Benthami (Baill.) Stapf in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 199 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 302 ; Miss. Laurent (1907) 574, t. 143 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 250.

Ectinocladus — Baill. Hist. des pl. X (1888) 211 ; Oliv. in Hook. Icon. pl. XXIV (1894) t. 2341 ; Stapf in Journ. Linn. Soc. XXX (1894) 88 ; K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 165.

1903 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Bamanian [la Loliva] ; Lac Tumba (Ém. et M. Laur.) ; bords de la Tshuapa. — Nom vern. : **Mosasala** (Jesp.). — XI : Limbutu (M. Laur. 1035).

Alafia caudata Stapf in Kew Bull. (1894) 123 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 199 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 673 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 575.

1907 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 4021, 4052).

(1) Dans la Mission Laurent [pp. 550-574] M. De Wildeman a fait une étude très complète des *Funtumia* du Congo.

Alafia gracilis *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 196; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 575, fig. 136.

Tabernaemontana erythrophthalma *K. Schum.* ex *Stapf* l. c. IV¹ (1902) 196. 1901 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 2009). — XII c : Nala (Ser. 749).

Alafia lucida *Stapf* in Kew Bull. (1894) 122 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 198; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 575 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 251.

A. cuneata *Stapf* l. c. (1894) 122; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 672.

A. reticulata *K. Schum.* in *Engl. Nat. Pfl.-Fam.* IV, 2 (1897) 165.

Wrightia Stuhlmannii *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 319.

1905 (Marc. Laurent). — V : env. de Kisantu (Gill. 4093). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 838; Pyn. 366, 870, 1415). — IX : secteur de Mondombe (Jesp.). — XII c : route de Tely à Poko, Fryant (Ser. 641).

HOLALAFIA *Stapf.*

Holalafia multiflora *Stapf* in Kew Bull. (1894) 123 et in *Hook.* Icon. pl. XXIV (1894) t. 2350; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 41; II (1900) 42 et Reliq. Dewevr. (1901) 157; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 201, 611; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 576 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 251.

Alafia major *Stapf* in Kew Bull. (1898) 307; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 41 et Reliq. Dewevr. (1901) 155; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 611, in obs.

1891 (F. Demeuse). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 298); Eala (M. Laur. 8, 221 b; Pyn. 623, 1175); Équateurville [Wangata] (Dew. 673; Ém. et M. Laur.). — IX : secteur de Mondombe (Jesp.). — XI : Lokandu (Dew.). — XII c : entre Surango et Niangara (Ser. 816). — Noms vern. : **Loledja** [Équateur]; **Gluka** [Tanganika] (Dew.).

PYCNOBOTRYA *Benth.*

Pycnobotrya nitida *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XII (1876) t. 1183; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 202; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 251.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1050). — VIII : secteur de Mondombe. — Nom. vern. : **Mongongongo** (Jesp.). — XII c : route de Poko à Zobia (Ser. 856).

BAISSEA *A. DC.*

Baissea axillaris [*Benth.*] *Hua* in C. R. Acad. sci. Paris, CXXIV (1894) 887 et in B. Mus. Hist. nat. Paris, VIII (1902) 479; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 210, 611; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 577 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 252.

Zygodia axillaris Benth. in *Hook. Icon. pl.* XII (1878) t. 1184; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 673.

Guerkea Schumanniana De Wild. et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, V (1899) 9 [B. S. B. B. XXXVIII², 128]; Reliq. Dewevr. (1901) 157 et Pl. Gilletianae, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 35]; *Stapf* in *Dyer* l. c. IV¹, 217, 611.

1896 (A. Dewèvre). — V : Léopoldville (Vanderyst); Kisantu (Gill.); env. de Lemfu (But.). — VIII : Équateur (Pyn. 581); Eala (M. Laur. 1369; Pyn. 1026, 1407, 1478); secteur de Mondombe (Jesp.). — IX : Bangala; Bumba (Dew.).

Baissea gracillima [*K. Schum.*] *Hua* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 12; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 216; *De Wild.* in Journ. d'agricult. colon. (1905) 106; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 96-97; (1908) 252 et Miss. Laurent (1907) 577, t. 158-159, fig. 137-138.

Guerkea — *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 228.
Baissea micrantha *Hua* l. c. (1898) 11.

1904 (S. Bieler). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 297); Efukwa-Kombe (Biel.; Geisseler); Eala (Pyn. 1097). — IX : forêts de Mondombe. — Nom vern. : **Mosusulu** (Jesp.). — XV : Munungu. — Nom vern. : **Lobuma** (Sap.). — Noms vern. : **Ete** [Congo centr.]; **Budemba** [Balembo]; **Olembo** [Batetela; Bakula].

Baissea laxiflora *Stapf* in Kew Bull. (1894) 124, in *Hook. Icon. pl.* XXIV (1894) t. 2342 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 208; *Hua* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 10; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 580.

Guerkea — *De Wild.* et Th. Dur. Mat. fl. Cgo, IV (1899) 17 [B. S. B. B. XXXVIII, 94]; *De Wild.* Not. Apocyn. laticif. du Cgo (1903) 12 [err. cal. *congolensis*] *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 611, in obs.

1897 (Alph. Cabra) — Bas-Congo (Cabra). — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel).

Baissea Laurentii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 253-254.

1906 (Marc. Laurent). — XII a : Romée (M. Laur. 1362).

Baissea major *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 675; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 210; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 580.

B. angolensis *Stapf* var. — *Stapf* in Kew Bull. (1894) 126.

1905 (L. Pynaert). — IX : Bumba (Pyn. 108).

Baissea tenuiloba *Stapf* in Kew Bull. (1894) 124 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV, 214; *Hua* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 10-11.

Guerkea uropetala *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 228; *De Wild.* et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 157.

1895 (A. Dewèvre). — VIII : Wangata (Dew.).

Baissea Tholloni *Hua* in B. S. Linn. Paris, Nouv. Sér. (1898) 10 ; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 209 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 580 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 255.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 98, 1365 ; Pyn. 468, 917, 1001, 1536). — IX : Moma (Jesp.). — XI : Barumbu (M. Laur. 1371). — XII c : Gombari [la Benda] (Ser. 591). — XIII a : Stanleyville (M. Laur. 1361, 1364). — XV : Bandaka-Kole (Flam.).

ZYGODIA Benth.

Zygodia subsessilis *Benth.* in *Hook.* Icon. pl. XII (1876) 73 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 191 ; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 218.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

ONCINOTIS Benth.

Oncinotis glabrata *Stapf* ex *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 674 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 222 ; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 255.

1907 (Knut Jespersen). — VIII : Bokungu (Jesp. 85).

Oncinotis glandulosa *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 221 ; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 255.

1907 (L. Pynaert). — VII : Eala (Pyn. 1301, 1982).

Oncinotis hirta *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XIII (1878) t. 1232 ; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 223 ; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 7-8 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 255.

1900 (J. Gillet). — V : rég. de Kisantu (Gill.). — VIII : Mondombe ; Belo (Jesp.).

Oncinotis Jesperseni *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 256.

1907 (Knut Jespersen). — VIII : secteur de Mondombe (Jesp. 12).

Oncinotis tenuiloba *Stapf* in *Kew Bull.* (1898) 307, in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 41 ; *Reliq. Dewevr.* (1901) 156 ; *Ill. fl. Cgo* (1901) 131, t. 76 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 222 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 580 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 257.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 1269). — VIII : secteur de Mondombe (Jesp.) ; Eala (M. Laur. 673 ; Pyn. 583). — IX : env. de Lukasa (Dew. 883).

MOTANDRA A. DC. (1)

Motandra guineensis [Thonn.] A. DC. in DC. Prodr. VIII (1844) 423; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 672; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 44 et Reliq. Dewevr. (1901) 155; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 257.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — VIII : Mondombe et env. (Jesp.). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Dem.). — XIII d : env. de Kasongo (Ém. Laur.).

Motandra Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1898) 17 [B. S. B. B. XL, 23]; *De Wild.* Not. Apoc. laticif. du Cgo (1903) 17; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 225, 613.

1899 (Ed. Luja). — XV : Lubue [Kasai] (Luja, 274, 287).

DEWEVRELLA De Wild.

Dewevrella cochliostema *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 549, t. 144, 145 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1908) 250.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 587, 653 a); Eala et env. (Pyn. 398, 594, 733, 1119, 1674; M. Laur.); Bombimba (M. Laur. 1161). — IX : Bokungu [sect. de Mondombe] (Jesp.).

ASCLEPIADACEAE

CRYPTOLEPIS R. Br.

Cryptolepis Debeerstii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 180.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

Cryptolepis Hensii *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 246; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 180, (1906) 304 et Miss. Laurent (1906) 263.

1888 (Fr. Hens). — IV : la Tombi près Lutete (Hens). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimuenza; env. de Kisantu (Gill.); bassin de la Sele (But.).

(1) *L'Urceola esculenta* *Benth.* [in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. III, 658] de l'Asie tropicale, est cultivé à Mange [XV] (Flam.) [Conf. *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo (1908) 257].

ECTADIOPSIS Benth.

Ectadiopsis Buettneri *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 219; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 252, in obs.

1885 (R. Buettner). — V : Léopoldville (Buett.).

Ectadiopsis scandens *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 219; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 108; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 249, in obs.

Cryptolepis — *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 308; *Stapf* in *Dyer* l. c. 249.

1899 (Edg. Verdick). — V : Dolo (Schlt.). — XVI : Lukafu (Verd.).

OBS. — M. Stapf [l. c.] croit que cet *Ectadiopsis* doit être réuni au *Cryptolepis Welwitschii* Hiern.

TACAZZEA Decne.

Tacazzea apiculata *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 108; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 320 et in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1900) 454; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 35]; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 267; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 180.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 259, 555, 1033, 2283).

Tacazzea pedicellata *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 115; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 192; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 262.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3483, 3488).

RAPHIONACME Harv.

Raphionacme Michelii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 181.

1900 (R. Butaye). — V : entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : plateau de Kimbele (Cabra et Michel); entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel, 172, 177).

Raphionacme splendens *Schlechter* in *Journ. of Bot.* XXXIII (1895) 301; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 271, 614; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 181.

Raphiacme — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 322.

R. macrostemon *K. Schum.* l. c. XXXIII (1903) 322, in obs.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.); Haut-Marungu (Deb.).

Raphionacme Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 182.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le long de la Lufira. — Nom vern. : **Kabutumpa** (Verd. 283).

CHLOROCODON Hook. f.

Chlorocodon Whitei *Hook. f.* in Bot. Mag. (1871) t. 5898; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 255; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 180, (1906) 304.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu; entre Tumba et Kimpesse (Gill.); env. de Sanda (Odd.).

PERIPLOCA L.

Periploca nigrescens *Afzel.* Stirp. guin. med. sp. nov. I (1817) 2; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 681; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 35] et Reliq. Dewevr. (1901) 158; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 258; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 180, (1906) 304; II (1907) 65, t. 34; Miss. Laurent (1906) 263-268, t. 86, 87, fig. 37-38 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 83-95, t. 21-22.

P. Preussii *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 117 et in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 216, fig. 64 R-V; (*De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 41.

P. nigricans *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 308.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Cabra). — II a : entre Samba et Jangu (Cabra). — IV : Lukungu (Dew.). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Dipengo-Pungu** (Gill.; Gent.); env. de Kimuenza (Gill.). — VI : Madibi (Leser.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Eala et env. (M. Laur.; Pyn.); Wangata (Dew.). — IX : Umangi (Krek.). — X : Imese; Bamoko (Ém. et M. Laur.). — XII b : entre Bambili et Kirarunga (Ser.). — XIII : Motumbe (Dew.). — XV : rég. du Kasai (Sap.); Lubue (Luja); Kamba (Ém. et M. Laur.); Kondue [concession de l'Abir]. — Nom vern. : **Kibemlese** (Lescr.).

SECAMONE R. Br.

Secamone Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 191.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 602).

TOXOCARPUS Wight et Arn.

Toxocarpus Lujaei [*De Wild.* et *Th. Dur.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 191.

Rhynchostigma Lujaei *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 38 [B. S. B. B. XXXVIII, 208].

1898 (Éd. Luja). — V : env. de Léopoldville; Kimuenza (Gill. 2124); Sabuka (Luja).

XYSMALOBIUM R. Br.

Xysmalobium decipiens *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 250 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 301; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 682.

X. *Holubii* *Scott-Elliot* in *Journ. of Bot.* XXVIII (1890) 365 pr. p.; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 302; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 182; *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 120 in obs.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1105).

Xysmalobium dissolutum *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 119 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 233; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 192.

Asclepias — *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 309; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 347.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1227).

Xysmalobium Holubii *Scott-Elliot* in *Journ. of Bot.* XXVIII (1890) 365 [pr. max. pte]; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 302; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1894) 182.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.).

Xysmalobium spathulatum [*K. Schum.*] *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 312.

Schizoglossum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 120; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 192; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 77 [B.S.B.B. XXXVII, 120].

1880 (von Mechow). — VI : Chasamango (Mech.). — XVI : Haut-Marugu (Deb.); Pweto (Desc.).

Xysmalobium tricorniculatum [*K. Schum.*] *Th. et Hél. Dur.*

Schizoglossum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 121 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 233; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 192.

X. *andongense* *Hiern Cat. Welw. Pl. I* (1898) 682; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 309.

1876? (P. Pogge). — XV : Musumba (Pg. 379, 380).

SCHIZOGLOSSUM E. Mey.

Schizoglossum Cabrae *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 182.

1896 (Alph. Cabra). — II a : la Lemba (Cabra, 129). — V : Kisantu (Gill. 701).

Schizoglossum Debeerstianum *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 323; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 618.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Buluba [Marungu] (Deb.).

Schizoglossum macroglossum *K. Schum.* ex *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 158 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 323; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 618.

1905 (A. Dewèvre). — IV : Tumba-Lukuti (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Dem.).

GOMPHOCARPUS R. Br.

Gomphocarpus amoenus *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 124 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2, (1895) 236; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 122].

Asclepias Schumanniana *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I (1898) 686; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ 346; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 188.

1895 (Gust. Debeerst). — V : env. de Kisantu (Gill.). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Gomphocarpus cristatus *Decne* in *Annal. sci. nat. Sér. 2*, IX (1838) 325, t. 52, fig. 3 et in *DC. Prodr.* VIII, 562; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV², (1895) 236.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

OBS. — M. N. E. Brown [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ 350] réunit cette espèce à l'*Asclepias palustris* Schlechter *G. paluster* K. Schum.

Gomphocarpus dependens *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 125 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 236; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 193.

Asclepias — *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 352.

1882 (P. Pogge). — XV : Musumba (Pg.).

Gomphocarpus foliosus *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 126 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 237; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 193.

Asclepias — *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1902) 349.

1882? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1130).

OBS. — Il faut peut-être rapporter à cette espèce un échantillon récolté entre Kingunshi et le Kasai [IV] (Pg. n. 975).

Gomphocarpus fruticosus [*L.*] *R. Br.* in *Mem. Wern. Soc.* I (1809) 38; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 77 [B. S. B. B. XXXVII, 120].

Asclepias fruticosa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 216 : *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 685 ;
S. Moore in Journ. of Bot. XL (1902). 255 ; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr.
IV¹, 330.

G. abyssinicus Decne in DC. Prodr. VIII (1844) 557.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : rég. du Tanganika (Deb.).

Gomphocarpus lineolatus Decne in Annal. sci. nat. Sér. 2, IV (1838)
326 et in DC. Prodr. VIII, 558 ; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr.
322 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 193 ; *De Wild.* et *Th.*
Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 41.

Asclepias — *Schlechter* in Journ. of Bot. XXXIII (1895) 336 et Westafr.
Kautsch.-Exped. (1900) 308 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 685 ; *N. E. Br.* in
Dyer Fl. trop. Afr. IV¹ 322.

G. bisacculatus Oliv. in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1887) 341.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Dolo (Schlt.) ; Kisanu
(Gill.) ; rég. de la Lula-Lumene (Hendr.) ; Kinanga (Odd.) ; — VI : Bandundu (Ém.
et M. Laur.). — IX : Luozi (Luja). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.). — XVI :
Lukafu ; le Lofoi (Verd.) ; Toa (Desc.).

Gomphocarpus paluster *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 127 ;
XXX (1901) 382.

Asclepias — *Schlechter* in Journ. of Bot. (1895) 336 ; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl.
trop. Afr. IV¹, 349.

1901 (Alph. Cabra et F. Michel). — VI : vallée de la Tawa (sous-affl. du Kwango
(Cabra et Michel).

Gomphocarpus roseus *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 127
et in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam IV, 2 (1895) 237 ; *Th. Dur.*
et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 193.

Asclepias rubens *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 348.

1876? (P. Pogge). — VI : bassin du Kwango à Kitamba (Pg. 614).

Gomphocarpus semiamplectens *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII
(1893) 128 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 193.

Asclepias — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 685 ; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop.
Afr. IV¹, 321.

1882? (P. Pogge). — Bas-Congo (But.). — V : Kimuenza (Gill.) ; bassin de la Sele
(But.). — XV : Mukenge (Pg. 1006, 1077, 1141) ; entre le Lubilasch et le Lomami
(Pg. 1037).

Gomphocarpus tomentosus *Burch.* Trav. South-Afr. I (1822) 543 ;
Th. Dur. et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII,
123] ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 157 et Pl. Gille-
tiana, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 35].

Asclepias Burchellii *Schlechter* in Journ. of Bot. XXXIII (1895) 336, in obs. ;
XXXIV (1896) 432 ; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 335..

1895 (Gust. Debeerst). — V : Kisantu (Gil.). — XIII d : env. de Rabanga (Dew.).

OBS. — Cette plante cultivée à Pala [XVI] serait originaire de Kibanga [XVI] (Deb.).

STATHMOSTELMA K. Schum.

Stathmostelma chironioides *K. Schum.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.*
Pl. Gilletianae, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829]; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 305.

1890 (F. Demeuse). — V : Kimpesse (Dem. 5); Kisantu (Gill.): env. de Lemfu (But.).

Stathmostelma incarnatum *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII (1893)
130 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 240; *Th. Dur.*
et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 193; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 686.

Asclepias coccinea *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 340.

1876? (P. Pogge). — VI : bassin du Kwango à Kitamba (Pg. 381, 382, 608).

Stathmostelma Laurentianum *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII²
(1894) 102; XXXIV² (1895) 87; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo
(1896) 194.

Asclepias — *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1902) 312.

1893 (Ém. Laurent). — V : Bas-Congo (Ém. Laur.).

Stathmostelma pedunculatum *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII
(1893) 132 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 322; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et
Moy.-Cgo, I (1904) 189.

Asclepias macrantha *Hochst.* in Flora (1844) 101; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop.
Afr. IV¹, 340.

1902 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Stathmostelma Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, I
(1904) 188 [non 305].

Asclepias — *De Wild.* l. c. I (1904) 188, in syn. [non 305].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulombo** (Verd. 361).

Stathmostelma Wildemanianum *Th. et Hél. Dur.*

S. Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 305, in syn. [non
188 ejusd. oper.].

Asclepias — *De Wild.* l. c. I (1904) 305 [non 188].

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Lofoi (Verd.).

ASCLEPIAS L.

Asclepias affinis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 184.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 184, in syn.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Vieux-Kasongo (Dew. 952 b).

Asclepias Buchwaldii [*Schlechter* et *K. Schum.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 185.

Gomphocarpus — *Schlechter* et *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXXIII (1903) 324.

Le type croît dans l'Afrique orient. allem.

— — var. **angustifolia** *De Wild.* l. c. (1904) 185.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Vieux-Kasongo (Dew. 952).

Asclepias Cabrae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 185; II (1908) 384.

1902 (Alph. Cabra et F. Michel). — V : Kisantu-Makela (Van Houtte). — VI : vallée de la Tawa (Cabra et Michel, 52).

Asclepias congolensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 186.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 186, in syn.

1899 (J. Gillet). — Bas-Congo (But.). — V : Kisantu (Gill.).

Asclepias Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 186.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 187, in syn.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : brousse au delà du grand marais de Nyangwe (Dew. 1035).

Asclepias erecta *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 187.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 187, in syn.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.).

Asclepias katangensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 187.

Gomphocarpus — *De Wild.* l. c. I (1904) 188, in syn.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

PENTARRHINUM E. Mey.

Pentarrhinum abyssinicum *Decne* in *DC.* Prodr. VIII (1844) 503; *Deless.* Icon. select. pl. V, 30, t. 70; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl.

Ost-Afr. 323 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 234, fig. 68 K; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 379; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 42.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu sur les bords de l'Inkisi (Gill.).

P. abyssinicum var. **angolense** *N. E. Br.* l. c. IV¹ (1902) 379; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 189; *N. E. Br.* l. c. IV¹, 379.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.); Lemfu (But. in Gill. 1180).

MARGARETTA Oliv.

Margaretta Corneti *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIV² (1895) 90; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 108; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 376, 618.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.); Lukafu (Verd. 284).

— — var. **pallida** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 108; *Stapf* l. c. IV¹, 618.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 133).

Margaretta Verdickii Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 183.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 148 b).

CYNANCHUM L.

Cynanchum congolense *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 190.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. d'Équateurville [Wangata] (Dew. 644).

Cynanchum Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 52; *Pl. Gilletianae*, I (1900) 35 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 35] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 159; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 400.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 955). — XIII d : env. de Kabanga (Dew. 976 a); Mwanana-Tumbwe (Dew. 904). — Noms vern. : **Bulula** [Kasongo]; **Eletnetamba** [Ikwangula] (Dew.).

Cynanchum minutiflorum *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 252 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 28 [B. S. B. B. XXXVII, 123].

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 77).

OBS. — M. N. E. Brown [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 396] réunit cette espèce au *C. schistoglossum* Schlechter.

Cynanchum polyanthum *K. Schum.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 2 (1895) 253; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 393; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 190.

Vincetoxicum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 136; *Th. Dur et Schinz Étud. fl. Congo* (1896) 194.

C. obscurum *K. Schum.* in *Engl. et Prantl l. c.* IV, 2 (1895) 253; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 688.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill. 759, 942, 2212). — VI : env. de Bokakata (Dew. 767). — XII d : Munza (Schw. 3345).

Cynanchum schistoglossum *Schlechter* in *Journ. of Bot.* XXXII (1895) 271; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 688; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 395, pr. p.; *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 309.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — V : Dolo (Schlt. 12484).

DAEMIA R. Br.

Daemia extensa [*Jacq.*] *R. Br.* in *Mem. Wern. Ser.* I (1809) 50; *Decne* in *DC. Prodr.* VIII, 544; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II, 35; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 33 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 159; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 690; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 388; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1906) 117-118; *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 190 et *Miss. Laurent* (1906) 269.

Cynanchum — *Jacq. Misc. bot.* II (1781) 752 et *Icon. pl. rar.* I, t. 56.

Asclepias scandens *P. Beauv. Fl. d'Oware*, I (1805) 93, t. 56.

1895 (A. Dewèvre). — II a : la Lemba (Dew.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VII : Kutu (Coll.?). — IX : Yabosumba (Thonn.?). — XV : Kondue; Mange; Munungu (Ém. et M. Laur.).

GYMNEMA R. Br.

Gymnema subvolubile [*Schumach. et Thonn.*] *Decne* in *Annal. sci. nat. Sér. 2*, IX (1838) 277 et in *DC. Prodr.* VIII, 621; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 159.

Cynanchum — *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 150.

1896 (A. Dewèvre). — V : village de Moe au-dessus de Bolobo (Dew.).

OBS. — M. N. E. Brown [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 414] réunit cette espèce à la précédente.

Gymnema sylvestre [*Retz.*] *R. Br.* in *Mem. Wern. Soc.* I (1809) 33; *Schum* in *DC. Prodr.* VIII, 624; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II, 43; *K. Decne* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 325; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.*

IV¹, 414; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 193, 305 et Miss. Laurent (1906) 270.

Periploca sylvestris Retz. Observ. bot. II (1780) 15.

Gymnema rufescens Decne in Annal. sci. nat. Sér. 2, IX (1838) 277.

G. geminatum Hiern [non *R. Br.*] Cat. Welw. Pl. I (1898) 691.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

TYLOPHORA R. Br.

Tylophora congoensis Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 309 [nom. tant.] et in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 51, fig. 9.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12551).

Tylophora Gilletii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 193.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill. 1656).

Tylophora gracilis De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 194.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 268, 572, 1710).

Tylophora sylvatica Decne in Annal. sci. nat. Sér. 2, IX (1838) 273; *K. Schum.* in Engl. Pfl. Ost-Afr. 325; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 691; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 407; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 269.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — XIII a : Romée (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.).

SPHAEROCODON Benth.

Sphaerocodon platypoda *K. Schum.* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 225.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Safoi** (Verd. 411).

MARSDENIA R. Br.

Marsdenia latifolia [*Benth.*] *R. Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 270; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 270.

Gongronema — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 456; *Walp.* Annal. Bot. III, 62; *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 236; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 196.

M. racemosa *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 147; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 692; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 425; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 194.

1881 (P. Pogge). — IV : Kitobola (Luja). — V : Kisantu ; entre Kisantu et Dembo (Gill.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — XV : la Haut-Lulua (Pg. 1249).

PERGULARIA L.

Pergularia africana *N. E. Br.* in Kew Bull. (1895) 259 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 426; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 195 et Miss. Laurent (1906) 270.

P. sanguinolenta *Britten* [non *Lindl.*] in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, IV, 29; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 326.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 174); Kimuenza (Gill. 1612, 1685). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

OBS. — L'habitation signalée par A. Dewèvre, en 1896 [au N. du Stanley-Pool] est dans le Congo français.

FOCKEA Endl.

Fockea multiflora *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 145, in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 296, fig. 90 P-V et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 326; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 110; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 428.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Noms vern. : **Kombodi**; **Bulembilimbu** (Verd.)

OBS. — M. N. E. Brown [l. c. IV¹, 620, in obs.] a émis l'avis que cette espèce devrait probablement être réunie au *F. SchiENZii* *N. E. Br.*

DREGEA E. Mey.

Dregea rubicunda *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 147 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 326, t. 29, fig. A-H; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 225 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 195.

Marsdenia — *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ (1903) 421.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tjama-Zebele** (Verd.).

CEROPEGIA L.

Ceropegia angustiloba *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 109; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 621.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutama** (Verd. 367).

Ceropegia Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 192.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.).

Ceropegia Dewevrei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 192.

1895 (A. Dewèvre). — II a : entre Tshoa et Tshia (Dew. 399).

Ceropegia Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo; III (1899) 98 [B. S. B. B. XXXVIII², 96]; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 452; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, (1904) 193.

1898 (J. Gillet). — V : Kisantu ; env. de Dembo (Gill. 349, 706, 3026).

Ceropegia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 109; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 620.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tumko** (Verd. 389).

BRACHYSTELMA R. Br.

Brachystelma nauseosum *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 191.

1901 (Alph. Cabra et F. Michel). — III : vallée de la Ufura [affl. de la Pozo] (Cabra et Michel).

LOGANIACEAE

MOSTUEA Fr. Didr.

Mostuea Brunonis *F. Didrichs.* [Pl. nonnull. Mus. Holm.] in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1855) 87; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 195; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 505.

1884 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett. 400, 401).

Mostuea densiflora *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 198; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 195; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 508; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 63.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Bingila (Dup.); le Mayumbe (Ém. Laur.); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — VI : env. de Madibi (Lescr. 117).

Mostuea Duchesnei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 173; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 623.

1899 (Ém. Duchesne). — XIII a : Stanleyville (Ém. Duch. 16).

Mostuea Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 174; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 623.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent. ; Gill. 2914, 2928).

Mostuea Lujaei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 15 [B. S. B. B. XXXIX², 67]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 506; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 260 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 175, (1906) 307; II (1907) 63.

1898 (Éd. Luja). — V : Sabuka (Ém. Laur.); entre Dembo et le Kwango (But. in Gill. 1490); Kimuenza (Gill. 1902, 2197); Sanda (De Brouw. in Gill. 311) et env. (Odd. in Gill. 3567).

Mostuea penduliflora *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1898) 108; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 505.

1881 (P. Pogge). — XV : la Lulua [pays des Bashilange] (Pg. 886, 1129).

Mostuea Schumanniana *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 560; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 508; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 175 et Miss. Laurent (1906) 260.

1888 (F. Demeuse). — I : Moanda (Gill. 3230). — XV : le Sankuru (Dem. 21); Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Mostuea Taymansiana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 174; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 623.

1899 (Éd. Luja). — XV : Bena-Dibele (Luja, 252).

COINOCHELAMYS T. Anders.

Coinochlamys angolana *S. Moore* in Journ. of Bot. XIV (1876) 322; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123].

Mostuea — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 700; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹ 510.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Ém. Laur.). — XIII a : les Stanley-Falls (Ém. Laur.).

— — var. **Laurentii** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 260.

M. angolana *Hiern* var. — *De Wild.* l. c. (1906) 260, in syn.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : la Lukula (Ém. et M. Laur.). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

Coinochlamys congolana *Gilg* in Engl. Jahrb. XXIII (1896) 197; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII,

123]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 42; *Pl. Thonnerianae* (1900) 42 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 160.

Mostuea congolana *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1903) 509.

1888 (Fr. Hens). — V : env. de Lukolela (Dew. 743). — IX : Bangala (Hens, C. 169); Upoto (Thoun.).

Coinochlamys Poggeana *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 559; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 196.

Mostuea — *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1903) 510.

1876? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 254).

NUXIA Lam.

Nuxia dentata *R. Br.* in *Salt Voy. to Abyss.* Append. (1814) 62; *Benth. et A. DC.* in *DC. Prodr.* X, 435; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 124; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 700; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 513.

1891 (G. Descamps). — XVI : la Lufira (Desc.).

BUDDLEIA L.

Buddleia madagascariensis *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* I (1783) 513; *Bot. Mag.* (1828) t. 2824; *Benth.* in *DC. Prodr.* X, 447; *Bak.* *Fl. of Maurit.* 233; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 196; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 517, in obs.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech.-Loesche).

ANTHOCLEISTA Afzel.

Anthocleista Baertsiana *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, II (1901) 89 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 829]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 198; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 625.

1899 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2543); Kisantu (Gill. 56).

Anthocleista Buchneri *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 576; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 194.

1880 (Max Buchner). — Ind. non cl. : Bassin du Luatschim (Buch. 618).

OBS. — M. Baker [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 539] rapporte cette espèce à *A. nobilis* G. Don.

Anthocleista inermis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 63; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 194; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 541.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : île près de Ponta da Lenha (Naum.).

Anthocleista innocua *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1887) 63.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

OBS. — Cette espèce n'est pas relevée dans la *Flora of tropical Africa*.

Anthocleista Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 262.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.).

Anthocleista Liebrechtsiana *De Wild. et Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 19 [B. S. B. B. XXXVIII², 96] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 160; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 540; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 262.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Eroke** (Dew. 829). — VII : la Kiri (Ém. et M. Laur.). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

Anthocleista Schweinfurthii *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 579; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 195; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 541.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Mbruole (Schw. 3726).

Anthocleista squamata *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, II (1901) 90 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 830]; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 625; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 262 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 198.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1773) : bords de la Lukaye (Gér. in Gill. 1921). — IX : île en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Anthocleista Vogelii *Planch.* in *Hook. Icon. pl.* VIII (1848) t. 793; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1887) 63.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

USTERIA Willd.

Usteria guineensis *Willd.* in *Ges. Naturf. Fr. Berlin*, X (1792) 55; *A. DC.* in *DC. Prodr.* IX, 22; *Hook. Niger Fl.* (1849) 459, t. 45; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123]; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 517; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.*

IV¹, 517; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 261 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 66, (1904) 175; II (1907) 63.

U. vulgaris Afzel. Gen. pl. Guin. (1804) 27, c. fig.

1896 (Ém. Laurent). — V : env. de Léopoldville: Kimuenza (Gill.); env. de Sanda (Odd.). — VI : Madibi (Lescr.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.).

STRYCHNOS L (1).

***Strychnos congolana* Gilg** in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 120; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 161; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 521.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo. — Nom vern. : **Goïo** (Dew. 931).

***Strychnos densiflora* Baill.** in *Adansonia*, XII (1879) 369; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 528; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 289-290.

S. suaveolens Gilg in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 566; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 196.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : bassin du Mbruole [Mangbettu] (Schw. 3597).

***Strychnos Dewevrei* Gilg** in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 119 et ex *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 91 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 831]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 161; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 551; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 175; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 291-297 et Miss. Laurent (1906) 261.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 845). — V : env. de Sabuka: Kwamouth (Dew.); Kisantu (Gill.); Lukolela (Dew. 845). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.).

***Strychnos floribunda* Gilg** in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 566; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 195; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 527.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Kapili, pays des Mangbettu (Schw. 3558).

***Strychnos Gilletii* De Wild.** *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 176; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 624.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 134, 880).

(1) Voir l'article de M. Ém. De Wildeman, sur les *Strychnos* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 285-297).

Strychnos gracillima *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 573; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 97; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 536.

Le type croît dans le Bahr-el-Ghazal.

— — var. **paucispinosa** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 97.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kakunta-Puku** (Verd. 48).

Strychnos innocua *Delile* Cent. pl. Méroë (1826) 53; *DC.* Prodr. IX, 17; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo. (1896) 195; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 533.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech.-Loesche).

Strychnos Kipapa *Gilg* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, II (1899) 256 et in Engl. Jahrb. XXVIII (1899) 118; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 521; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 291, in obs.

1876? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 630).

Strychnos longicaudata *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 570; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 196; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 527.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu à Bongwa (Schw. 3610).

Strychnos pungens *Solered.* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 554 et in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 40; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 42; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 704; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 530; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 64.

S. occidentalis *Solered.* l. c. IV, 2 (1890) 40.

1876? (P. Pogge). — Bas-Congo (Gill. 3780). — V : brousse du distr. du Stanley-Pool (Ém. Laur.): Dolo (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XV : Musumba (Pg. 375). — Ind. non cl. : Punda (Pinda?, VI] (Lescr. 274).

Strychnos Schweinfurthii *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 568; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 196; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 525.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3509).

Strychnos suberosa *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 177, (1906) 300; II (1907) 64 et *Miss. Laurent* (1906) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 624.

1900 (J. Gillet). — V : Dolo (Coll.?) ; Chenal (Ém. et M. Laur.) ; Lemfu (But. in Gill. 2261) ; Kisantu ; entre Dembo et le Kwango (But. in Gill. 1505). — Nom vern. : **N'Konghi** [Stanley-Pool].

Strychnos Unguacha A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 52 et Atlas, t. 73; *Gilg* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 562 et in *Engl. Pfl. Ost Afr.* 310; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 534.

Le type croît en Abyssinie.

— — var. **obovata** De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 98.

1899 (Edg. Verdieck) — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Munkollo-Kollo** (Verd.).

Strychnos variabilis De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 178; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 623.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.) : Kisantu (Gill. 808) ; Kimuenza (Gill. 1726, 2081).

GAERTNERA Lam.

Gaertnera paniculata Benth. in *Hook. Niger Fl.* (1849) 459; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 84; II (1907) 81, 189 et *Miss. Laurent* (1906) 352; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 543.

1902 (J. Gillet). — V : le Stanley-Pool (Schlt.) : Léopoldville et env. (Gill. ; Pyn.) ; Galiema (Pyn.) ; entre Léopoldville et Mombasi : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.) ; Madibi. — Nom vern. : **Munkaman** (Sap.) ; Lenano (Lescr.). — VII : Ganda (Body). — VIII : Eala (M. Laur.) ; la Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : Nouvelle-Anvers (Pyn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XV : le Kasai ; Butala ; Dibebe (Ém. et M. Laur.).

Gaertnera plagiocalyx K. Schum. in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 322 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool près Léopoldville (Schlt. 12586).

GENTIANACEAE

EXACHAENIUM Griseb.

Exachaenium chionanthum [*Gilg*] *Schinz* in B. Herb. Boiss. Sér. 2, VI (1906) 806; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336.

Belmontia — *Gilg* in *Baum Kunene-Sambesi-Exped.* (1903) 332; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 625.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1785).

Exachaenium Gentilii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336.

Belmontia — *De Wild.* l. c. II (1908) 336.

1902 (L. Gentil). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Exachaenium Teuszii [Vatke] Schinz in B. Herb. Boiss. Sér. 2, V (1906) 807; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336.

Belmontia — Vatke ex Schinz in Viertelj. Zürich. Nat. Ges. XXXVI (1891) 334; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 197; Bak. et N. E. Br. in Dyer Fl. trop. Afr. IV¹, 554.

Tachiadenus continentalis Bak. in Kew Bull. (1895) 70.

1891 (G. Descamps). — XV : la Muaba près Lima [affl. du Lubudi] (Desc.). — XVI : chutes de Zilo (Desc.).

Exachaenium Wildemanianum Gilg in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336 [nom. tant.].

1899 (Éd. Luja). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Mombasi (Gill. 2564); env. de Sabuka (M. Laur. 554). — V : env. de Bokala (M. Laur. 607). — XV : le Kasai (Luja, 222).

SEBAEA R. Br.

Sebaea debilis [Welw.] Schinz in B. Herb. Boiss. Sér. 2, VI (1906) 734; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 336.

Exachaenium — Welw. in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 48.

Belmontia — Schinz in Viertelj. Zürich. Nat. Ges. XXXVI (1891) 332; Bak. et N. E. Br. in Dyer Fl. trop. Afr. IV¹, 552.

Parasia — Hiern Cat. Welw. Pl. I (1898) 708.

1880 (von Mechow). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Dolo (M. Laur. 534). — VI : bord du Kwango (Mech.).

Sebaea oligantha [Gilg] Schinz in B. Herb. Boiss. Sér. 2, VI (1906) 736.

Belmontia — Gilg in Engl. Jahrb. XXVI (1898) 102; Bak. et N. E. Br. in Dyer Fl. trop. Afr. IV¹, 552.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2141, 2338).

EXACUM L.

Exacum quinquenervium Griseb. in DC. Prodr. IX (1845) 46; Bak. et N. E. Br. in Dyer Fl. trop. Afr. IV¹, 546; Engl. in Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 304; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 335.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt.). — VIII : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2585).

CHIRONIA L. (1)

Chironia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy. Cgo, II (1908) 338.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : plateau de Lukafu (Verd. 446).

CANSCORA Lam.

Canscora decussata [*Roxb.*] *Schult.* Mant. pl. III (1827) 229; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 68 [B. S. B. B. XXXVII, 123]; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 557; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 337.

Pladera — *Roxb.* Fl. Ind. I (1820) 478; Bot. Mag. (1831) t. 3066.

1895 (G. Descamps). — V : Kwamouth (M. Laur. 430). — XVI : Toa (Desc.).

FAROA Welw.

Faroa affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 99; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 567.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 536).

Faroa paradoxa *Gilg* in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 337 [nom. tant.].

1903 (Aug. Hendrickx). — V : rég. de la Lumene (Hendr. in Gill. 3299).

Faroa salutaris *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 46, t. 17; *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. 336; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 710; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 100; *Knobl.* in Bot. Centralbl. LX (1894) 330; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 569.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : entre Lukafu et le Tanganika; Lukafu (Verd. 120).

LEIPHAEMOS Cham. et Schlecht.

Leiphaemos primuloides [*Bak.*] *Gilg* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 2 (1895) 104, fig. 16.

Voyria — *Bak.* in Kew Bull. (1894) 25; *Bak.* et *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 569.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba (Desc.).

(1) MM. Baker et Brown [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV¹, 627] disent que Baum a récolté le **Chironia transvaalensis** Gilg, dans le Congo près de Kavanga sur le Kumbango. — Nous croyons que cette localité n'est pas dans le Congo belge.

NEUROTHECA Salisb.

Neurotheca congolana *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 21 [B. S. B. B. XXXVIII², 98] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 162; *Hua* in B. S. B. Fr. XLVIII, 262, 265; 337; *Bak. et N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 562.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Lukolela [V] et Équateur [VIII] (Buett. 575). — XIII : Oukumu (Dew. 1084).

Neurotheca densa *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 337.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : sables d'Inongo (Ém. et M. Laur.).

Neurotheca loeselioides [*Spruce*] *Benth.* in *Benth. et Hook. f. Gen. pl.* II (1873) 812; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 197; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 67, (1906) 301; II (1908) *Bak. et N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 560.

Octopleura — *Spruce ex Prog.* in *Mart. Fl. Bras.* VI¹ (1865) 212, t. 58, fig. 1.

1885 (R. Buettner). — V : env. de Léopoldville; entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Dolo (Schlt.; M. Laur. 569). — IX : Bangala (Hens); entre Amadis et Surango (Ser. 353).

Neurotheca longidens *N. E. Br. ex Bak. et N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹ (1903) 560; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 337.

1888 (Fr. Hens). — V : Dembo (Vanderyst). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VIII : Eala (Pyn. 136). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 103). — XIII : Kasuku (Dew. 1068?).

LIMNANTHEMUM Gmel.

Limnanthemum indicum [*L.*] *Griseb.* *Gen. et sp. Gentian.* (1839) 343; *Boiss. Fl. Or.* IV, 65; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 78 [B. S. B. B. XXXVII, 123] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 162; *Gilg.* in *Schlechter Westafr. Kautch.-Exped.* (1900) 304; *Bak. et N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV¹, 587 et *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 42; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 101 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 67, (1906) 301.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Lukolela (Schlt.) et env. — Nom vern. : **Etoko** (Dew.). — VI : embouch. du Kwango (Gill.). — XVI : Lac Moero (Verd.). — Ind. non cl. : Kipilia (Em. Laur.).

HYDROPHYLLEACEAE

HYDROLEA L.

Hydrolea guineensis *Choisy* in *Annal. sci. nat. Sér. 2, I* (1834) 180; *DC Prodr. X*, 180; *Bak. et N. E. Br. in Dyer Fl. trop. Afr. IV²*, 3.

H. glabra *Schumach. et Thomm.* [non *Sm.*] *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 161; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 197.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lutete (Hens, A. 9).

BORAGINACEAE

CORDIA L.

Cordia aurantiaca *Bak.* in *Kew Bull.* (1894) 24; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 198; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 715; *Bak. et C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV²*, 10.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Cordia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III* (1899) 29 [B. S. B. B. XXXVIII², 37]; *Pl. Gilleltianaë, II* (1901) 91 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 831] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 163; *Bak. et C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV²*, 9.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 1344). — XIII d : env. de Vieux-Kasongo (Dew. 915).

Cordia Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1903) 72.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 1344, 1858).

Cordia Liebrechtsiana *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III* (1899) 30 [B. S. B. B. XXXVIII², 38] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 164; *Bak. et C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV²*, 13; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 170.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.).

EHRETIA L.

Ehretia abyssinica *R. Br.* in *Salt Voy. to Abyss. app.* (1814) 64; *Fresen. in Flora* (1838) 608; *DC. Prodr. IX*, 506; *A. Rich. Tent. fl.*

Abyss. II, 82; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 198; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 23.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Boma (Naum.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Ehretia Guerkeana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 223; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 21.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 308).

Ehretia longistyla *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 44 et Reliq. Dewevr. (1901) 164; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 309; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 22.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill. 3153). — II : Boma (Dew. 416). — III : Matadi (Gill.).

HELIOTROPIUM L.

Heliotropium indicum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 130; Bot. Mag. (1816) t. 1837; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 152; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 337; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 719; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 198; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 164; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 170 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 36, (1904) 198; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 32.

Tiaridium — *Lehm.* Asperifol. (1818) 14; *Cham.* in *Linnaea* (1829) 152, t. 5, fig. 2.

Heliophytum — *DC.* Prodr. IX (1845) 556.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II : Boma. — Nom vern. : **Leco** (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Bangala (Hens); Umangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.). — XII d : le Kibali (Schw.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Heliotropium katangense *Guerke* in *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 223; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 43.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kakabolo-Kampanga** (Verd. 141, 182).

Heliotropium ovalifolium *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 38; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 150; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 337; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 116; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 718; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 34.

H. coromandelianum *Retz.* Observ. bot. II (1781) 9; *Wight* Icon. pl. Ind. or. IV, t. 1388.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

TRICHODESMA R. Br.

Trichodesma Droogmansianum *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 17 [B. S. B. B. XXXIX², 69]; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 47.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lualaba (Desc.).

Trichodesma zeylanicum [L.] *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 496; *DC.* Prodr. X, 172; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 91; *Bot. Mag.* (1855) t. 4820; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 43; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 337; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 51.

Borago — *L. Mant. pl.* II (1771) 202²; *Jacq. Icon pl. rar.* II. t. 314.

1891 (G. Descamps). — XVI : la Luaba [affl. du Lubudi] (Desc.).

CYNOGLOSSUM L.

Cynoglossum lanceolatum *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 41; *DC.* Prodr. X, 155; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 721; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 54.

C. micranthum *Desf.* Tabl. Écol. bot. Mus. Paris, éd. 1 (1804) 220; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 43.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

CONVOLVULACEAE**EVOLVULUS L.**

Evolvulus alsinoides [L.] *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 392; *Choisy* in *DC.* Prodr. IX, 447; *Hallier f.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVIII (1893) 85; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 328; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 204; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 198; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 724; *Bak. et C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 67.

Convolvulus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 157.

1888 (Fr. Hens). — I : Mbanda (Gill.). — III-IV : la Lufu (Hens). — XVI : Toa (Desc.).

— — var. **procumbens** *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 94; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 85; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 42 [B. S. B. B. XXXVII, 87].

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

E. alsinoides var. **strictus** *Klotzsch* in *Peters Reise n. Mossamb.* I (1862) 246; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr* 318; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 42 [B. S. B. B. XXXVII, 87].

E. alsinoides *L.* var. *erectus* *Schweinf.* *Beitr. Fl. Aethiop.* (1867) 94; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 85; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 205.

E. linifolius *L.* *Sp. pl. ed. 2* (1762) 399.

E. heterophyllus *Labill.* *Sert. Austro-Caled.* I (1824) 24, t. 29.

1888 (F. Hens). — IV : Lukungu (Hens).

BONAMIA Thou.

Bonamia minor *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 91 et in *B. Herb. Boiss.* V (1897) 999; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 205; *Bak. et Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 80; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 43 [B. S. B. B. XXXVII, 88]; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 110.

1882 (P. Pogge). — XVI : bassin du Kazembe [tributaire du Lualaba] (Desc.); Lukafu. — Nom vern. : **Kisowa** (Verd. 592). — Ind. non cl. : le Lomani (Pg. 1214).

PREVOSTEA Choisy.

Prevostea breviflora *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 70.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2086. 2143).

Prevostea Cabrae *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, VIII (1900) 48 [B. S. B. B. XXXIX², 70]; *Bak. et Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 83.

1897 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra, 88. 92).

Prevostea campanulata [*Bak.*] *K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 3 a (1897) 17; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 44; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 92; *Bak. et Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 82.

Breweria — *Bak.* in *Kew Bull.* (1894) 68.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Luele [affl. du Buchi] (Desc.).

Prevostea Oddoni *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 306.

1904 (Ad. Oddon). — V : rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3632).

Prevostea Poggei *Dammer ex Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 43 [B. S. B. B. XXXVII, 88]; *Bak. et Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 84.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1090, 1172).

PORANA Burm.

Porana subrotundifolia *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 111.

1900 (Edg. Verdieck). — XVI : Lukafu (Verd. 481, 525).

OBS. — MM. Baker et Rendle [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 189] rapportent ce *Porana* à l'*Ipomoea shirensis* Oliv.

JACQUEMONTIA Choisy.

Jacquemontia capitata [*Desv.*] *G. Don* Gen. Syst. Bot. IV (1837) 283; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 95; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 204; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 85; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 200.

Convolvulus — *Desv.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) 354.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens); Sonagungu (Luja). — V : le Stanley-Pool (Hens); près de Kwamouth (Em. Laur.); Kinshassa (Dem.); Kisantu : Dembo (Gill.). — XII d : Congo bor. or. (Ser.).

OBS. — Dewèvre dit que cette espèce est C. dans la brousse.

ANISEIA Choisy.

Aniseia martinicensis [*Jacq.*] *Choisy* in Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève, VIII (1838) 144 et in Prodr. IX (1845) 430; *Meisn.* in *Mart.* Fl. Brasil. VII (1869) 320, t. 115, fig. 2; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1893) 96 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 43 [B. S. B. B. XXXVII, 88].

Ipomoea — *Jacq.* Hist. stirp. Amer. (1780) 26, t. 17.

Aniseia uniflora *Choisy* in Mém. Soc. phys. et hist. nat. phys. Genève, VI (1834) 483 et in *DC.* Prodr. IX (1845) 431; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 203; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 88.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

HEWITTIA Wight et Arn.

Hewittia sublobata [*L. f.*] *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 441; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 111; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 203; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 168.

Convolvulus — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 135.

C. bicolor *Vahl* Symb. bot. III (1794) 25.

Hewittia — *Walk.-Arn.* in Madras Journ. of sci. V (1837) 22; *Wight* Icon. pl. Ind. or. III, t. 835; *Hallier f.* in B. Herb. Boiss. V (1897) 375, 379, 380, 1008 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 44 [B. S. B. B. XXXVII, 89]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 166; *Bak.* et

Rendle in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 100; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308; II (1907) 199.

Shutereaia bicolor *Choisy* in Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève, VI (1833) 486 et in *DC.* Prodr. IX, 435.

1816 (Chr. Smith). — Congo (But.); Bas-Congo (Sm.). — IV : Luvituku (Dem.); Lutete (Hens). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu (Gill.). — VI : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XIII d : Nyangwe (Pg.). — XV : Isaka (Ém. et M. Laur.). — XVI : entre le Lubilasch et le Lomami (Pg.).

MERREMIA Dennst.

Merremia angustifolia [*Jacq.*] *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVI (1893) 552; XVIII (1894) 117; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 111; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1904) 200.

Ipomoea — *Jacq.* Collect. bot. II (1788) 367 et Icon. pl. rar. II (1786-1793) 10. t. 317; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 199 pr. p.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — V : env. de Kwamouth (Biel.).

— — var. ***ambigua*** *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 117; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38; II (1898) 46 [B. S. B. B. XXXVI², 82; XXXVII, 91]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 729; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 167; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 306.

Convolvulus filicaulis *Vahl* Symb. bot. III (1794) 24.

M. hastata *Hallier f.* l. c. XVIII (1893) 117 [quoad specim. afric.].

1891 (G. Descamps). — Bas-Congo, en plusieurs endroits (Cabra). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — II : Boma (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Banza-Manteka (Hens). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Bulebu (Dew.); Lomfu (But.); Kisantu (Gill.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — XVI : Lac Musolo (Desc.); Haut-Marungu (Deb.).

Merremia hederacea [*Burm.*] *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 118; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 205; *Hallier f.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 46 [B. S. B. B. XXXVII, 91] et Reliq. Dewevr. (1901) 167; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 309.

Evolvulus — *Burm.* Fl. Ind. (1768) 77, t. 30, fig. 2.

Ipomoea chryseides *Ker* in Bot. Reg. IV (1818) t. 270; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I (1840) t. 157.

M. convolvulacea *Dennst.* Schluess. Hort. Malab. (1818) 34; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 114.

1888 (Fr. Hens). — II a : Zobe (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.). — X : l'Ubangi (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Lone Island [Angola?] (Buett.).

Merremia pentaphylla [*L.*] *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVI (1894) 552; XVIII (1893) 115 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I

(1897) 36; II (1898) 46 [B. S. B. B. XXXVI², 82; XXXVII, 90] et Reliq. Dewevr. (1901) 167; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 728; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 108; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 309.

Convolvulus pentaphyllus L. Sp. pl. ed. 2 (1762) 223 pr. p.

Ipomoea — *Jacq.* [non *Cav.*] Collect. bot. III (1788) 297 et Icon. pl. rar. II (1786-1793) 10, t. 319.

Batatas — *Choisy* in Mém. Soc. phys. hist. nat. Genève, VI (1833) 436 et in *DC.* Prodr. IX, 339; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 834.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma et env. (Dup.; Dew.; Pyn.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Kisantu (Gill.).

***Merremia pes-draconis* Hallier f.** in B. Herb. Boiss. VI (1898) 537; *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 45 [B. S. B. B. XXXVII, 90]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 107.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lutembue [affl. du Lubudi] (Desc.).

***Merremia pterygocaulos* [Choisy] Hallier f.** in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 113; *Dammer* in Engl. Pfl. Ost-Afr. 330; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 205; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 36; II (1898) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 82; XXXVII¹, 90] et Reliq. Dewevr. (1901) 167; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 727; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 105; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 116; *Miss. Laurent* (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 200.

Ipomoea — *Choisy* in *DC.* Prodr. IX (1845) 381.

1882 (P. Pogge). — II : Boma (Dup.). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.); Bingila (Dup.); la Lemba (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XII c : l'Uele; Gombari (Delp.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser.). — XV : territ. des Bena-Kabondo [Kasai] (Desc.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Malole** (Verd.). — Ind. non cl. : env. de Madji (Lescr.); le Lomami (Pyn.). — Nom vern. : **Monemena** (Dew.).

— — var. ***tomentosa* Hallier f.** in *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 36; II (1898) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 90; XXXVII, 90]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* l. c. 106.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

ASTROCHLAENA Hallier f.

***Astrochlaena solanacea* Hallier f.** in Engl. Jahrb. XVIII (1893) 121; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 47 [B. S. B. B. XXXVII, 92]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 120.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

LEPISTEMON Blume.

Lepistemon owariense [*P. Beauv.*] *Hallier f. ex De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 112 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 306; II (1907) 198.

Ipomoea — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 41, t. 82.

L. africanum *Oliv.* in *Hook.* Icon. pl. XIII (1878) 54, t. 1270; *De Wild.* Miss.

Laurent (1905) 167; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 116

1900 (Edg. Verdick). — V : env. de Léopoldville (Gill.); env. de Mopolenge (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Pyn.). — IX : en aval de Bumba (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kubilonga** (Verd.).

IPOMOEA L.

Ipomoea amoena *Choisy* in *DC.* Prodr. IX (1845) 365; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 33; XXVIII (1899) 31; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 199; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 154; *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 48 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 93] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 43; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 199.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : le Manyanga (Dem.). — V : Kisantu (Gill.); Boko (Pyn.). — IX : Upoto (Wilw.). — XIII d : entre Nyangwe et Kimbundo (Pg.). — XVI : Toa (Desc.).

Ipomoea asclepiadea *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 142; XXVIII (1899) 43; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 199; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 167; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVII, 96].

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Nembe [le Kusambo] (Schw. 3141). — Ind. non cl. : le I. omami (Pg. 1213).

Ipomoea Barteri *Bak.* in Kew Bull. (1894) 70; *Hallier f.* in B. Herb. Boiss. VI (1898) 542; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 169; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 199.

1903 (Aug. Hendrickx). — V : Sanda (De Brouw. in Gill. 3027); rég. de la Luala-Lumene (Hendr. in Gill. 3035).

— — var. **subsericea** *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVII, 96]; *Bak. et Rendle* l. c. 169; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 43.

1897 (Alph. Cabra). — Congo (Cabra). — V : Mont Léopold [le Stanley-Pool] (Luja).

***Ipomoea Batatas** [L.] Poir. *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) 11; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 199; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 138; XXVIII (1899) 35 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 35; II (1898) 50 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 95]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 175; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 167 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 307; II (1907) 199.

Convolvulus — L. *Amoen. acad.* VI (1763) 121; *Kern.* *Hort. semp.* t. 340.

Batatas edulis Choisy *Convolv. orient.* (1833) 53 et in *DC. Prodr.* IX, 338.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.); Sanda (Odd.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Wangata (Ém. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.). — XVI : bassin du Tanganyika (Desc.).

Cette espèce est cultivée au Congo.

Ipomoea Brasseuriana *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 115; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 186.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. du Lac Moero (Verd.).

Ipomoea cairica [L.] *Sweet.* *Hort. Brit. ed.* 1 (1827) 287; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 148 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 35; II (1898) 53 [B. S. B. B. XXXVI², 81 et XXXVII, 98] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 165; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1904) 168 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 307.

Convolvulus — L. *Syst. nat. ed.* 10 (1759) 922.

I. palmata Forsk. *Fl. Aegypt.-Arab.* (1775) 43; *Choisy* in *DC. Prodr.* IX, 386; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 178.

I. stipulacea Jacq. *Hort. Schoenbr.* II (1797) 39, t. 199; *Meisn.* in *Mart. Fl. Brasil*, VII, 288, t. 105.

I. vesiculosa P. Beauv. *Fl. d'Oware*, II (1807) 73, t. 106

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : île voisine de Malela (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Bolobo (Buett.). — VIII : Coquilhatville (Ém. Laur.). — IX a : env. de Mobeka (Ém. Laur.) — XIII a : Nyangwe (Dew.). — XVI : le Lualaba (Pg.); Toa (Desc.).

Ipomoea chrysochaetia *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 133 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 35; II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 93]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 156; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 199.

I. polytricha Bak. in *Kew Bull.* (1894) 12.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu et env. (Gill. 1125, 3764).

Ipomoea Dammeriana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1904) 116; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 182.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 252).

Ipomoea Debeerstii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 115; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 142.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb. 95).

Ipomoea elythrocephala *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 134; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 200; *Henriq.* in Bolet. Soc. Brot. XVI (1899) 68; *Hallier f.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 94]; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 157.

1882 (P. Pogge). — II a : Bingila (Dup.). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1142).

Ipomoea fimbriosepala *Choisy* in *DC.* Prodr. IX (1845) 359; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 143 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 52 [B. S. B. B. XXXVII. 97]; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 199.

I. *Smithii* *Bak.* in Kew Bull. (1894) 73.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Ipomoea fulvicaulis [*Hochst.*] *Boiss.* ex *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 128; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 143.

Le type croît de l'Abyssinie au Nyassaland.

— — var. **depauperata** *Hallier f.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 48 [B. S. B. B. XXXVII, 93].

I. *hypoxantha* *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 128; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 200; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 144.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 334).

Ipomoea Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 36 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 36].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 419).

Ipomoea hispida [*Vahl*] *Roem. et Schult.* Syst. veget. I (1819) 238; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 123; in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 47 [B. S. B. B. XXXVI², 81 et XXXVII, 93] et in *Reliq. Dewevr.* (1901) 165; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 307; II (1907) 199.

Convolvulus — *Vahl* Symb. bot. III (1794) 29.

I. *eriocarpa* *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 484; *Choisy* in *DC.* Prodr. IX, 369; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 136.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lutete (Hens). — V : env. de Lemfu (But.). — IX : Bumba (Dew.); Upoto (Wilw.). — XII : l'Uele (Delp.). — XVI : Toa (Desc.); Pweto (Chargois).

Ipomoea involucrata *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 52, t. 89; *Choisy* in *DC.* Prodr. IX, 365; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 134; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 200; *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 94] et Reliq. Dewevr. (1901) 165; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 150; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 307; II (1907) 199.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — Noms vern. : **Nzizi** ou **Luzizi** (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); Zobe. — Nom vern. : **Teka** (Dew.). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Léopoldville (Luja); Suata (Buett.); Kisantu (Gill.); Bulebu (Ém. et M. Laur.). — VI : lé Kwilu [Djuma] (Sap.); Kingunshi (Buett.); entre Kingunshi et le Kasai (Pg.); Madibi (Leser.); route de Lumbi à Luanu (Leser.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens). — XII c : Gombari (Delp.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser.). — XIII d : Nyangwe (Pg.). — XV : entre le Lubilasch et le Lomami; Mukenge (Pg.); env. de Luebo (Leser.); Bolongula (Ém. et M. Laur.); la Lubue (Luja); Leki (Ém. Laur.). — XVI : Lac Kenda (Desc.). — Noms vern. : **M'Ponbu** ou **Bpompo** [Bangala]; **Pongolowe** [Sankuru]; **N'Sombala** [Kwilu] (Sap.).

Ipomoea kentrocarpa *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 70; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 139; XXVIII (1899) 41; *Rendle* in Journ. of Bot. XXXIX (1901) 55; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 164; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XII c : Gombari [Uele] (Delp.).

Ipomoea lasiophylla *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVII, 94]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 156.

1882 (P. Pogge). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1215).

Ipomoea lilacina *Blume* Bijdr. Fl. Ned. Indië, II (1825) 716; *Choisy* in *DC.* Prodr. IX, 369; *Hallier f.* in B. Herb. Boiss. V (1897) 380 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 55 [B. S. B. B. XXXVII, 100] et Reliq. Dewevr. (1901) 165; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 187.

I. oxyphylla *Bak.* in Kew Bull. (1894) 71.

I. Stuhlmannii *Dammer* in Engl. Pfl. Ost.-Afr. (1895) 333.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.).

Ipomoea littoralis [*L.*] *Boiss.* Fl. Orient. IV (1879) 112; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 144 et in B. Herb. Boiss. V (1897) 376.

Convolvulus littoralis L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 924.

I. stolonifera Gmel. Syst. nat. II (1791) 345; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 738; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 171.

1832 (J. Monteiro). — I : Banana (Mont.),

Ipomoea lukafuensis De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 112; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 184.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 342).

Ipomoea micrantha Hallier f. in B. Herb. Boiss. VI (1898) 541; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 166.

Le type croît dans la Haute-Guinée.

— — var. ***hispida*** Hallier f. l. c. 542 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVII, 54]; Pl. Gilletianae, I (1900) 37 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 37] et Reliq. Dewevr. (1901) 165; *Bak. et Rendle* l. c. 466.

1895 (P. Dupuis) — II a : Bingila (Dup. 8). — V : la Lemba (Dew. 357); Kisantu (Gill. 899).

Ipomoea Nil [L.] Roth Catalecta bot. I (1796) 36; Hallier f. in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 136 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 49 [B. S. B. B. XXXVII, 94] et Reliq. Dewevr. (1901) 166.

Convolvulus — L. Sp. pl. ed. 2 (1762) 219; Bot. Mag. (1792) t. 188.

I. hederacea Jacq. Collect. bot. I (1786) 124 et Icon. pl. rar. I, t. 36; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 159.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill. 1021); Lemfu (But.). — XV : brousse de Bena-Moulengere (Dew.).

Ipomoea ochracea [Lindl.] G. Don Gen. Syst. Bot. IV (1838) 270; Hallier f. in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 140, in B. Herb. Boiss. VI (1898) 540 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 50 [B. S. B. B. XXXVII, 95] et Reliq. Dewevr. (1901) 166; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 166.

Convolvulus — Lindl. in Bot. Reg. XIII (1827) t. 1060.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew. 128).

Ipomoea ophthalmantha Hallier f. in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 141; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 201; Hallier f. in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVII, 96].

1882 (P. Pogge). — XVI : Samba [Lac Musolo]; Toa; vallée du Mukalue [affl. du Lubudi] (Desc.). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg.).

Obs. — MM. Baker et Rendle [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 163] réunissent cette espèce à l'*I. kentrocarpa* Hochst.

Ipomoea paniculata [L.] R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 486; Bot. Reg. (1815) t. 62; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 149; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 201; *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35; II (1898) 54 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 99]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308 et Miss. Laurent (1905) 168.

Convolvulus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 156.

I. digitata L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 924; *Choisy* in DC. Prodr. IX, 389; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 189.

1832 (J. Monteiro). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Moba** (Cabra). — I : Banana (Monteiro). — II a : le Mayumbe (Ém. et M. Laur.); Bingila (Dup.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — VI : Bandundu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilbatville. — Nom vern. : **Bosesere** (Malchair); **Eala** (M. Laur.); **Bolenge** (Gent.). — IX : **Mobeka**; **Ukaturaka**; **Lie** (Ém. et M. Laur.). — X : **Bas-Ubangi**; (Ém. et M. Laur.). — XV : la **Lulua** (Pg.); CC. bassins du Kasai, du Sankuru et de la Lulua (Ém. Laur.); **Bena-Makima** (Lescr.). — XVI : le **Lofoi** (Verd.); le **Lualaba** (Pg.). — Ind. non cl. : **Gombe** [Gombe?, VIII] I (Lambert).

— — var. **indivisa** *Hallier f.* ex *De Wild* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 43.

1895 (Ern. Dewèvre). — Congo (Ern. Dew.).

Ipomoea Pes-Caprae [L.] Roth Nov. pl. sp. (1821) 109; *Choisy* in DC. Prodr. IX, 349; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 35 [B. S. B. B. XXXVI², 81]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308.

Convolvulus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 159.

I. biloba Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 44; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 172.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : **Moanda** (Gill.); **Banana** (Monteiro). — XVI : **Toa** (Dese.).

Ipomoea recta *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 114; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 141.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : **Lukafu**. — Nom vern. : **Kamutofwa** (Verd. 306).

Ipomoea reptans [L.] Poir. in Lam. Encycl. méth. Bot. Suppl. III (1813) 460; *Choisy* in DC. Prodr. IX, 349; *Hallier f.* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 143, in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 52 [B. S. B. B. XXXVII, 97] et Reliq. Dewevr. (1901) 166; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 168 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 308.

Convolvulus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 158.

I. aquatica Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 44; *Bak. et Rendle* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 170.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : **Boma** (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — XV : **bane de sable du Kasai** (Ém. et M. Laur.).

Ipomoea tenuis *E. Mey.* in *Flora* (1843) Beig. 195; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 140; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 202; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 50 [B. S. B. B. XXXVII, 95].

I. fragilis *Choisy* in *DC. Prodr.* IX (1845) 140; *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 50 [B. S. B. B. XXXVIII, 95]; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 165.

1863 (R. Burton). — Congo (Burt.).

Ipomoea velatipes *Welw.* ex *Rendle* in *Journ. of Bot.* XXXII (1894) 175; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 735; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 155.

I. Verdickii *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 113.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 11).

CALONYCTION Choisy.

Calonyction bona-nox [*L.*] *Boj.* *Hort. Maurit.* (1837) 227; *Hallier f.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 56 [B. S. B. B. XXXVII, 101] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 165; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 307; II (1907) 198.

Ipomoea — *L.* *Sp. pl. ed. 2* (1762) 228.

C. speciosum *Choisy* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève*, VI (1834) 441, t. I, fig. 4; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 742; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 117.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kwamouth (Gent.); Kisantu (Gill.). — XII a et c : route de Bima à Amadis (Ser.). — XV : le long du Luebo (Desc.). — Ind. non cl. : Bena-Lecoula [Bena-Lunkala?, XV] (Dew.).

QUAMOCLIT Moench.

Quamoclit pinnata [*Desr.*] *Boj.* *Hort. Maurit.* (1837) 224; *Hallier f.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 154 et in *B. Herb. Boiss.* V (1897) 378, 379, 1042; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 35; II (1898) 56 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 101] et *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 44; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 167 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 307; II (1907) 198.

Convolvulus — *Desr.* in *Lam. Encycl. méth. Bot.* III (1789) 567; *Descourtilz* *Fl. des Antill.* VI, t. 146.

Ipomoea *Quamoclit* *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) 159 et *ed. 2* (1762) 227; *Bôt. Mag.* (1793) t. 244.

Q. vulgaris *Choisy* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève*, VI (1834) 434; *Bak.* et *Rendle* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 128.

1893 (P. Dupuis). — II : Boma (Dup.). — V : Léopoldville (Ém. Duch.). — VIII : Eala [cult.] (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Umangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Luebo (Ém. Laur.).

STICTOCARDIA Hallier f.

Stictocardia beraviensis [Vatke] Hallier f. in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 159; Dammer in Engl. Pfl. Ost-Afr. 334; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 57 [B. S. B. B. XXXVII, 102]; De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 224; Miss. Laurent (1905) 169 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 200.

Ipomoea — Vatke in Linnaea, XLIII (1882) 511.

Argyreia — Bak. ex Bak. et Rendle in Dyer Fl. trop. Afr. IV² (1906) 201.

1882 (P. Pogge). — VI : env. de Lusubi (Lescr.). — IX : Bobangi (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Katingwe** (Verd.); vallée du Bulechi [riv. tribut. de la Luina] (Desc.). — Ind. non cl. : la Lomami (Pg.).

SOLANACEAE**SOLANUM L. (1)**

Solanum acanthocalyx Klotzsch in Peters Reise n. Mossamb. I (1862) 232; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 44; C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 235; De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 173.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lofoi (Verd.); Bunkeya (Desc.).

Solanum aculeastrum Dunal in DC. Prodr. XIII¹ (1852) 366; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 167; C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 243; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 66.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Nom vern. : **lbenge** (fruit); **Locombe-Combe** (plante) [Kasongo]; **Kizango-Banza** [Tanganika] (Dew.).

Solanum aethiopicum L. Amoen. acad. IV (1759) 307; Dunal in DC. Prodr. XIII¹, 351; C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 217; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 44.

1897 (Alph. Cabra). — Yema Lianga (Cabra).

Solanum antidotum Dammer in Engl. Pfl. Ost-Afr. (1895) 355; De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 173; C. H. Wright in Dyer Fl. trop. Afr. IV², 242.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Lofoi (Verd.).

(1) Le **Solanum Seafortianum** Andrews [Bot. Repos. (1810) t. 514] est cultivé à Bolobo et à Mopolonge [V] (Ém. et M. Laur.). — [Conf. De Wild. Miss. Laurent (1907) 440].

Solanum congense *Link* Enum. pl. Hort. Berol. I (1821) 187; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 498; *Dammer* in Engl. Jahrb. XXXVIII (1906) 189; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 245.

1816? (Ch. Smith?). — Congo (Sm.?).

OBS. — Link n'a pas dit le nom du collecteur, mais il n'a pu décrire qu'une plante découverte par Chr. Smith.

Solanum Dewevrei *Dammer* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 290.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 741).

Solanum duplosinuatum *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 233; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 244; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 750; *Medley* et *Wood* Natal Pl. I, 39, t. 49; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 436.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XII : distr. de l'Uele (Delp.).

Solanum Durandii *Dammer* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 290 [nom. tant.].

1895 (A. Dewèvre). — II a : brousse de Zobe (Dew. 344).

Solanum edule *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 125; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 356; *Dammer* in Engl. Pfl. Ost-Afr. 355; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 175.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

OBS. — M. C. H. Wright [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 242] réunit cette espèce au *S. Melongena* L.

Solanum inconstans *C. H. Wright* in Kew Bull. (1894) 127 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 241.

S. symphyostemon *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 44; Ill. fl. Cgo (1899) 113, t. 57 et Pl. Thonnerianae (1900) 34, t. 22; *Dammer* in Engl. Jahrb. XXXVIII (1906) 184.

1882 (P. Pogge). — IX : Bolombo près Gali (Thonn.). — XV : Samba [à une journée de marche à l'O. du Lualaba (Pg. 1203)].

Solanum indicum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 187; *Wight* Icon. pl. Ind. or. I, t. 346; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 309; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 206; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 232.

S. Anguivi *Hook.* Exot. Fl. III (1827) t. 199.

1884 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett.).

Solanum Laurentii *De Wild.* Miss Laurent (1905) 176.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Solanum Lescauwae *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 438, t. 120.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : env. de Mushie (M. Laur. 616). — VIII : Bala-Lundzi (Pyn. 275). — XV : Luluabourg (Leser. 310, 312); Inkongo (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Tombolo (Leser.).

***Solanum macrocarpon** *L.* Mant. pl. II (1771) 205; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 353; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 214.

S. mors elephantum *Dammann* Catal. n. LXX, 100, fig. 81 : Wien. Ill. Gart.-Zeit. (1894) 30, fig. 7.

Cette espèce croît de l'Uganda au Nyassaland.

*— — var. **hirsutum** *Dammer* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 290.

Plante cultivée dans tout le Congo. — Noms vern. : **Coco** [Bas-Congo]; **Elo** ; fruit : **Macumba** [Basankusu] (Dew.).

***Solanum Melongena** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 186; *Wight* Illustr. Ind. Bot. t. 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 206; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 748; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 242; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 175, (1907) 435.

S. esculentum *Dunal* Solan. syn. (1816) 208, t. 3 et in *DC.* Prodr. XIII¹, 355

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II a : cult. dans le Mayumbe (Ém. Laur.). — VI : rég. de Lemano (Leser.). — XV : Lusambo; Bolongula (Ém. et M. Laur.).

Solanum Monteiroi *C. H. Wright* in *Kew Bull.* (1894) 127 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 216.

1832 (J. Monteiro). — II : Boma (Mont.).

Solanum Naumannii *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 64; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 206; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 747; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 216.

1873 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.).

Solanum nigrum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 186; *Mutel* Fl. de Fr. t. 39-40; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 50; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 37 et Reliq. Dewevr. (1901) 168; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 218; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 178 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 66.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Songololo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Biti** [Ikwangula]; **Moncagui** [Kasongo]; **Mumbu** [Manyanga]; **Kitoya-Kamono** [Tanganika] (Dew.). — XIII d : Nyangwe (Dew.).

Solanum nodiflorum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-1793) t. 326 ;
Dunal in *DC.* Prodr. XIII¹, 46 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 745 ;
C. H. Wright in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 218.

S. guineense *Lam.* Ill. genr. Encycl. II (1793) 18 : *Dammer* in Engl. Jahrb. XXXVIII (1906) 177.

1876 (P. Pogge). — II a : Bingila (Dup.). — XV : la Lulua vers 9 1/2° ; Musumba (Pg.). — XVI : Toa (Desc.).

Solanum Preussii *Dammer* in Engl. Jahrb. XXXVIII (1906) 183.

1895 (Ém. Laurent). — XV : entre Lusambo et le Lomami (Ém. Laur.).

Solanum Pynaertii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 437, t. 119.

1903 (L. Pynaert). — II : Boma (Pyn. 302).

Solanum Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 341, t. 74.

1906 (A. Sapin). — VII : Ikongo (Sap.). — Noms vern. : *Dilomba* [Bangala] ; *Kichilo-Kiabeto* [Sankuru].

Solanum Sereti *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 439, t. 122.

1905 (F. Seret). — XII a et b : route de Bima à Bambili (Ser. 166).

Solanum subcoriaceum *Th. et Hél. Dur.* [nom. nov.].

S. Laurentii *Dammer* [non *De Wild.*] in Engl. Jahrb. XXXVIII (1906) 182.

1893 ? (Ém. Laurent). — Congo (Ém. Laur. s. n.).

Solanum Welwitschii *C. H. Wright* in Kew Bull. (1894) 126 ;
Hiern Cat. Welw. Pl. I, 747 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322 ; II (1907) 66 ; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 747 ; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 231 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 440.

1904 (Gust. De Brouwer). — V : env. de Kisantu (Gill. 3779). — VI : rég. du Kwango (De Brouw. in Gill. 3601). — VIII : Eala (M. Laur.). — XII a : entre Buta et Bima (Ser. 67). — XII c : Gombari (Ser. 570). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

— — var. **strictum** *C. H. Wright* l. c. (1894) 126 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 213 ; *Hiern* l. c. 127 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 44 et Reliq. Dewevr. (1901) 168.

S. Lujaei *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 40 [B. S. B. B. XXXVIII², 210] et Pl. Gilletianae, I (1900) 37 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 37].

1870 (G. Schweinfurth). — IV : Sona-Gongo (Luja). — V : Bolobo (Dem.) ; Kisantu (Gill. 717). — VIII : Équateur (Dew. 563). — XII d : Munza (Schw. 3198). — XIII c : Stanleyville (Ém. Duch.) ; env. d'Olekwa (Dew. 1057 a). — Nom vern. : **Kalembele** [Tanganika] (Dew.).

Solanum Wildemanii *Dammer ex De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 291; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 177, (1907) 440, t. 121 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 67.

1895 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 547). — VI : Bandundu (Ém. et M. Laur.). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Lescr.); le Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Solanum Zuccagnianum *Dammer ex De Wild.* Miss. Laurent (1905) 177 [nom. tant.].

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : env. d'Irebu (Ém. et M. Laur.).

LYCOPERSICUM Hill.

***Lycopersicum esculentum** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 2; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 26; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 744; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 441.

Solanum Lycopersicum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 185.

S. cerasiforme *Dunal* Hist. Solan. (1813) 113.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.).

PHYSALIS L.

***Physalis aequata** *Jacq. f.* Eclog. pl. II (1844) t. 137; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 447; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II, (1900) 44 et Reliq. Dewevr. (1901) 168; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322; II (1907) 66.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Cabra). — I : Banana (Dew.). — II : Boma. Nom vern. : **Mapolo** (Dew.). — IV : Luvituku (Dem.). — V : env. de Kwamouth (Biel.); Kisantu (Gill.). — VIII : Équateur (Pyn.).

***Physalis minima** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 183; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 445; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 206; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 247; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 168; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 198; II (1907) 66 et Miss. Laurent (1905) 178, (1907) 436.

1885 (R. Buettner). — II a : la Lemba (Dew.). — IV : Lutete (Hens); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Lukolela (Buett.); Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (M. Laur.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.) — XII d : Vankerkhovenville (Ser.). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Beti**; **Buteke** [Ikwan-gula]; **Kalamandu** [Kasongo]; **Buki** [Tanganika] (Dew.).

***Physalis peruviana** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 183; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 440; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 238; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 248; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 44; II (1900) 45 et Reliq. Dewevr. (1901) 168.

P. edulis *Sims* in Bot. Mag. (1807) t. 1068.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Lem.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 97). — XVI : Albertville [Toa] (Hecq). — Cult. à Coquilhatville [VIII] et au pays des Bangala [IX] (Dew.; Ém. Laur.).

***Physalis pubescens** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 183; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 446; *Sendt.* in *Mart.* Fl. Brasil. X, 132; *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII (1904) 103; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilleltiana, I (1900) 38 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 38]; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 247; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 175.

P. barbadosis *Jacq.* Miscell. bot. II (1781) 159 et Icon. pl. rar. I, t. 59.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XIII a : Stanleyville ; entre Stanleyville et les chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

CAPSICUM L.

***Capsicum cerasiferum** Willd. Enum. pl. Hort. Berol. I (1809) 242; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 422; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 751; *Fingerh.* Monog. Caps. 19, t. 5; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 175.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.).

***Capsicum conicum** *Mey.* Prim. fl. Essequeb. (1818) 112; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 415; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 169.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

***Capsicum conoides** *Mill.* Gard. Dict. ed. 8 (1768) n. 1; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 414; *Dammer* in *Engl.* Pl. Ost-Afr. 351; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 33 et Miss. Laurent (1905) 175.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XII d : Munza (Schw.).

OBS. — M. C. H. Wright [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 252] réunit cette espèce au *C. annuum* L.

***Capsicum frutescens** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 189; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 413; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 251; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 67.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur.).

DATURA L.

***Datura fastuosa** L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 932; *Dunal* in *DC.* Prodr. XIII¹, 542; *Wight* Icon. pl. Ind. or. IV, t. 1396; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 122; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1901) 441.

1899 (Edg. Verdick). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu. —
Nom vern. : **Mupopo** (Verd.).

***Datura Stramonium** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 179; Engl. Bot. (1804)
t. 1288; *Dunal* in *DC. Prodr.* XIII¹, 540; *Bentl. et Trim. Medic.*
Pl. III, t. 192; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 753; *De Wild. et Th. Dur.*
Pl. Gilletianae, I (1900) 38 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 38]; *C. H. Wright*
in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 257; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 177,
(1907) 441.

1900 (J. Gillet). — V : Tumba (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — XV :
Kapinga (Ém. et M. Laur.).

* — — var. **Tatula** *Dunal* in *DC. Prodr.* XIII¹ (1852) 540; *Clarke*
in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* IV (1883) 242; *Th. Dur. et Schinz* Étud.
fl. Cgo (1896) 207; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 45.

D. Tatula L. Sp. pl. ed. 2 (1762) 256; *Sweet* Brit. Flow. Gard. t. 83.

1892 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — Cult. et subsp. dans le Mayumbe [II a]
(Ém. Laur.).

NICOTIANA L. (1)

***Nicotiana rustica** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 258; *Lehm.* Nicot. 34;
Dunal in *DC. Prodr.* XIII¹, 563; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo
(1896) 207; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 45; *Comes*
Monog. Nicotian. 20, fig. 2; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr.
IV², 260.

1870 (G. Schweinfurth). — XIII a : Romée (Ém. Laur.).

OBS. — Cultivé dans le Bas-Congo (Ém. Laur.; Dup.) et chez les Mangbettu
(Schw.).

***Nicotiana Tabacum** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 180; *Dunal* in *DC.*
Prodr. XIII¹, 557; *Bentl. et Trim. Medic.* Pl. III, t. 191; *Th. Dur.*
et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 208; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 754;
De Wild. Miss. Laurent (1905) 177, (1907) 441-445; *Comes* Monog.
Nicotian. 7, fig. 1; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 253.

1885 (R. Buettner). — VIII : Équateurville (Buett.); Coquilhatville (Dew.). —
IX : Bolombo; Yambinga (Ém. et M. Laur.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.). —
XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Lusanga (Dew.). — XV : env. de
Lusambo; Basongo (Ém. et M. Laur.).

(1) Conf. *Ém. De Wildeman* Miss. Laurent (1907) 441-442.

M. R. Buettner a indiqué à Tondoa [III] le **Petunia nyctaginiflora** Juss. espèce de
l'Amérique méridionale [Conf. *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 208].

***N. Tabacum** var. **brasiliensis** *Comes* Monog. gen. *Nicotiana* (1899) 13, t. 1 et 6 et Della razze dei Tabacchi (1905) 19; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 344.

1901 (Ém. et Marc. Laurent) — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.). — Variété cultivée par les Asendé [XII] (Ser.).

* — — var. **virginica** *Anastasia* Le var. tip. della *Nicotiana Tabacum* (1906) 106, t. 3, D; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 443-444.

N. Tabacum L. var. — *Comes* l. c. (1899) 13, t. 1, 5, et (1905) 19.

N. Tabacum L. var. *lancifolia* *Comes* l. c. (1899) 10, t. 1, 4 et (1905) 17.

1903 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

SCHWENKIA L.

Schwenkia americana L. Gen. pl. ed. 6 (1761) 567; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 194; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 208; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 754; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1890) 44 et Reliq. Dewevr. (1901) 169; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 260; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 444 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 67.

1862 (R. Burton). — II : Boma (Dew.). — IV : Luvituku (Dem.); Lutete (Hens); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Buett.); env. de Kwamouth (But.); Kisantu (Gill.) — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.).

SCROPHULARIACEAE

HALLERIA L.

Halleria lucida L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 625; Bot. Mag. (1815) t. 1744; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 301; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 209; *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 295.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

MIMULUS L.

Mimulus gracilis R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 439; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 369, 594 et Fl. Austral. IV, 482; *Hook. f.* Brit. Fl. Ind. IV, 259; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 109; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 758; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 310.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

BACOPA Aubl.

Bacopa alternifolia *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313 [nom. tant.]; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 323, in obs.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12571).

Bacopa calycina [*Benth.*] *Engl.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 92 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 832]; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73.

Herpestis — *Benth.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) 57 et in *DC.* Prodr. X, 399; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 209.

Moniera — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 760; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 320.

1874 (Fr. Naumann). — II : île près de Ponta da Lenha (Naum.). — V : le Stanley-Pool; chutes de Léopoldville (Schlt. 12559); Tamo (Hens); entre Léopoldville et Mombasi; entre Dembo et Kisantu (Gill. 1556).

ARTANEMA G. Don.

Artanema Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 12 [B. S. B. B..XXXVIII², 131] et *Contr.* fl. Cgo, II (1900) 45.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Cabra). — IX : Umangi (Ém. Duch.). — XI : Isangi (Dem.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.).

Artanema longifolium [*L.*] *Vatke* in *Linnaea*, XLIII (1880-1882) 307; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 357 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *Wettst.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1891) 79.

Columnea — *L.* Mant. pl. (1767) 90.

Diceros — *Pers.* Syn. pl. II (1807) 164.

Achimenes sesamoides *Vahl* Symb. bot. II (1791) 71.

Artanema — *Benth.* Scrophul. Ind. (1835) 39 et in *DC.* Prodr. X, 408; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr.* fl. Cgo, II (1900) 45 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 169; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73; II (1907) 67 et *Miss. Laurent* (1907) 444.

1891 (F. Demeuse). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — IX : env. de Bumba (Dew.); Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.); Stanleyville (Pyn.). — XV : le Kasai et le Sankuru (Ém. et M. Laur.).

CRATEROSTIGMA Hochst.

Craterostigma latibracteatum [*Engl.*] *Skan* ex *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV² (1906) 333.

Lindernia — *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt.).

TORENIA L.

Torenia affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 122.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Katanga (Desc.); Lukafu. — Nom vern : **Musula-Kurri** (Verd. 387).

Torenia parviflora *Hamilt.* in *Wall.* List (1831) n. 3958; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 410; *Schmidt* in *Mart.* Fl. Brasil. VIII, 322, t. 56, fig. 1; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 210; *Th. Dur.* et *De Wild.* Pl. Thonnerianae (1900) 36 et Reliq. Dewevr. (1901) 170; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 335.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Boma (Dew.) : île près de Ponta da Lenha (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Lukolela (Buett.); Kisantu (Gill.) — VI : le Kwango (Buett.). — IX a : Bobi (Thonn.). — XII d : Munza (Schw.).

— — var. **brevipedicellata** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73; II (1907) 67; *Hemsl.* et *Skan* l. c. 336.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2554); env. de Lemfu (But.).

VANDELLIA L.

Vandellia diffusa *L.* Mant. pl. I (1767) 89; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 416; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 210; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 45 et Reliq. Dewevr. (1901) 170; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 444.

Lindernia — *Wettst.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1891) 80; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 765; *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 338; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 444.

1885 (R. Buettner). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Léopoldville (Dew.) Suata (Buett.); Kinshassa (Luja); Kisantu (Gill.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

ILYSANTHES Rafin.

Ilysanthes parviflora [*Roxb.*] *Benth.* in *DC.* Prodr. X (1846) 419; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 283; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 210; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 346.

Gratiola — *Roxb.* Pl. Coromand. III (1819) 3, t. 204.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

HYDRANTHELIUM H. B. et K.

Hydrantheium egense *Poepp. et Endl.* Nov. gen. et sp. III (1845) 75, t. 287; *Benth.* in *DC.* Prodr. X, 425; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 351.

Herpestis *Monnieria* *Th. Dur. et Schinz* [non *H. B. et K.*] Étud. fl. Cgo (1896) 209 [syn. excl.].

1888 (Fr. Hens). — V : embouch. du Kasai (Hens, 119).

SCOPARIA L.

Scoparia dulcis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 168; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 85, t. 115; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 211; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 766; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 355; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 45; II (1900) 45 et Reliq. Dewevr. (1901) 170; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 74; II (1907) 67 et *Miss. Laurent* (1907) 445.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — II : Boma (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — V : le Stanley-Pool (Buett.); Léopoldville (Ém. Duch. et Luja); Kinshassa (Dem.). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **Bompuru** (M. Laur.). — IX : env. de Mobeka (Ém. Laur.). — XV : le Kasai au poste de bois n° 6 (Ém. Laur.); Lusambo (Jos. Duch.).

MELASMA Berg.

Melasma indicum [*Benth.*] *Wettst.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1891) 91 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 358; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 68.

Alectra — *Benth.* in *DC.* Prodr. X (1846) 339; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 297. 1904 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 3693, 3809).

HARVEYA Hook.

Harveya Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 35, t. 6; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 436.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn.).

BUCHNERA L.

Buchnera affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 123; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 382.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : plateau des env. de Lukafu. — Nom vern. : **Sangala** (Verd. 42).

Buchnera Buettneri *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 72, t. 3 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 314.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12488).

OBS. — MM. Hemsley et Skan [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 414] réunissent cette espèce au *Striga macrantha* Benth.

Buchnera capitata *Burm.* Fl. Capens. prodr. (1768) 17; *Benth.* in *DC.* Prodr. X 495; *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 314; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 45; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 381; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 68.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens) : Dolo (Schlt.); Kimuenza; entre Dembo et Kisantu (Gill.).

Buchnera inflata [*De Wild.*] *Skan* ex *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV² (1906) 390.

Stellularia — *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 124.

1892 ? (P. Briart). — XVI : Maniue [Lualaba supér.] (Briart).

Buchnera multicaulis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* (1894) 69; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 211; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 123; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 397.

1880 (Max Buchner). — XV : bassin de la Lulua à 9°5 lat. (Pg.); bassin du Kasai (Buchn.). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : Kasjinkamballa (Verd.); entre le Luapula et la Lufila (Desc.).

Buchnera quangensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 71; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 212; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 382.

1881 (E. Teusz). — VI : Chasamango (Teusz in Mech. 540).

Buchnera Reissiana *Buett.* ex *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 68, t. 3, fig. 1 et in *Baum* Kunene Samb.-Exped. 366; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 212; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 386.

1885 (R. Buettner). — V : Lukolela (Buett.). — VIII : Équateurville (Buett.).

Buchnera subcapitata *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 71; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 212; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 383; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 122.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 275); Lukafu. — Nom vern. : Kantu-limtulu (Verd. 371).

Buchnera Verdickii *Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV² (1906) 388.

B. pusilla *De Wild.* [non *H. B.* et *K.*] Étud. fl. Kat. (1903) 123.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 574).

STRIGA Lour.

Striga Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 22 [B. S. B. B. XXXVIII², 99] et Reliq. Dewevr. (1901) 170; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 74.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2687). — XIII : env. de Lubundu (Dew. 1024). — Nom vern. : Kasikesike [Tanganika].

OBS. — D'après MM. Hemsley et Skan [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 411 in obs.] cette espèce est très voisine de *S. Forbesii* Benth.

Striga Forbesii *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1835) 364 et in *DC. Prodr.* X, 503; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 212; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 410; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 445 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 68.

1883 (H. Johnston). — VI : Eiolo (Krek.). — XII c : Niangara (Delp.). — XII d : env. de Faradje (Ser. 528). — XV : bassin du Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Striga gesnerioides [*Willd.*] *Vatke* in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1875) 11; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 46.

Buchnera — *Willd.* Sp. pl. III (1800) 338.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst). — XVI : la Chama [entre le Tanganika et le Moero] (Desc.). — Ind. non cl. : Tambagadio (Dup.).

OBS. — MM. Hemsley et Skan [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 402] réunissent cette espèce au *S. orobanchoides* Benth.

Striga hermonthica [*Delile*] *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1835) 305 et in *DC. Prodr.* X, 502; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 46; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 361; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 407.

Buchnera — *Delile* Fl. d'Égypte (1812) 245, t. 34, fig. 3.

1891 (G. Descamps). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.).

Striga hirsuta *Benth.* in *DC. Prodr.* X (1846) 502; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 361; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 46 et Reliq. Dewevr. (1901) 171.

1891 (Hyac. Vanderyst). — Bas-Congo (Cabra). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dup.). — IV : distr. des Cataractes (Luja). — XVI : Moliro (Desc.).

OBS. — MM. Hemsley et Skan [in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 410] réunissent cette espèce au *S. Forbesii* Benth.

Striga lutea *Lour.* Fl. Cochinch. (1790) 22; *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I, 368; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* IV, 299; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 212; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 446 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 68; *Hemsl. et Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 409.

Campuleia coccinea *Hook.* Exot. Fl. (1827) t. 203.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech.-Loesche). — II : Boma (Monteiro). — II a : Banza de Lemba (Dem.). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr.); Léopoldville (M. Laur.); env. de Kisantu (Gill.); le Stanley-Pool (Callew.). — VI : Eiolo (Ém. Laur.). — XII c : route de Bambili à Amadis, Surango (Ser.).

Striga orobanchoides *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1836) 361, t. 19 et in *DC. Prodr.* X, 501; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 778; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 92 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 832]; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 402; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 445 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 68.

1832 (J. Monteiro). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Mont.). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Léopoldville; Kimuenza (Gill.); Sanda (De Brouw.); entre le Kwango et Dembo (But.). — VI : plateau de Kimbali [entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel)].

RHAMPHICARPA *Benth.*

Rhamphicarpa longiflora *Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1835) 368; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 211; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 74.

Macrosiphon fistulosum *Hochst.* in *Flora*, XXIV (1841) 374.

Rhamphicarpa — *Benth.* in *DC. Prodr.* X (1846) 504; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 360; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 45; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 778; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 420; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 446 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 74.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens; Schl.); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); rochers de Tamo (Hens); env. de Bokala (M. Laur.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.).

CYCNIMUM *E. Mey.*

Cygnium adonense *E. Mey. ex Benth.* in *Hook. Comp. Bot. Mag.* I (1835) 368; *Benth.* in *DC. Prodr.* X, 505; *Oliv. in Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 122, t. 88; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 212; *Engl. in Engl. Jahrb.* XXVIII (1900) 479; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 431.

1885 (R. Buettner). — VI : le Kwango (Buett.).

Cygnium Buchneri *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 73; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 432.

1881 (E. Teusz). — VI : le Kwango (Teusz).

Cygnium camporum *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 73; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 213; *Hemsl. et Skan in Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 432; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 446 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 69.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — III : vallée de l'Ufura [affl. de la Pozo] (Cabra et Michel). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XII c : route de Surango à Niangara (Ser.). — XV : Kaisome (Leser:).

Cycnium Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 10 et Reliq. Dewevr. (1901) 171.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Tshia (Dew. 401).

— — var. **minus** *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 38 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 38] et Reliq. Dewevr. (1901) 171.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Dew. 423). — V : Kisantu (Gill. 59).

Cycnium Questieauxianum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 124; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 434.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 165).

Cycnium Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 125; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 432.

C. adonense *Hiern* [non *E. Mey.*] Cat. Welw. Pl. I (1898) 777.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu; plateau du Katanga (Verd. 216, 355).

SOPUBIA Ham.

Sopubia angolensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 67; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 453; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 69.

S. cana *Hiern* [non *Harv.*] Cat. Welw. Pl. I (1898) 774.

1903 (R. Butaye). — V : rég. de Lula-Lumene (But.).

— — var. **angustipetala** *Engl. ex De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 46 et Pl. Gilletianae, I (1900) 38 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 38].

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

Sopubia Buchneri *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 66; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 451.

1878 (Max Buchner). — VI : Kitamba sur le Kwango (Buchn. 589).

Sopubia Dregeana [*Hochst.*] *Benth.* in *DC. Prodr.* X (1846) 522; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 359; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 213; *Hemsl. et Skan* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 451.

Gerardia — *Hochst.* in *Flora*, XXV (1842) 420.

1892 (Jul. Cornet). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.; Dup.); env. de Tshoa (Dew.). — V : Kisantu (Gill.); bassin de la Sele (But.); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — XVI : le Katanga (Corn.; Verd.; Deb.; Desc.); Toa (Desc.).

Sopubia karaguensis *Oliv.* ex *Speke et Grant* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 123, t. 87; fig. B; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 126; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 448.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kausale** (Verd.).

Sopubia latifolia *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 66; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 213; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 449.

1881 (P. Pogge). — XVI : Mukenge (Pg. 1112).

Sopubia Monteiroi *Skan* ex *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV² (1906) 454.

1832 (J. Monteiro). — Ind. non cl. : Bembe (Mont.).

Sopubia ramosa [*Hochst.*] *Hochst.* in *Flora* XXVII (1844) 27; *Benth.* in *DC. Prodr.* X, 522; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 132; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 773; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 449.

Rhaphidophyllum — *Hochst.* in *Flora*, XXIV (1841) 668.

S. trifida *Hamilt.* var. — *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) 383, Pfl. Ost-Afr. 359 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *A. Dewèvre* in *B. S. B. B.* XXXIII (1894) 103.

1881? (P. Pogge). — V : Dolo (Schlt.); entre Bolobo et Lukolela (Buett.). — XV : la Lulua (Pg.).

Sopubia trifida *Hamilt.* in *D. Don Prodr. fl. Nepal.* (1825) 88; *Benth.* in *DC. Prodr.* X, 522; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 213; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 46; *Hiern* in *Dyer Fl. Capens*, IV², 388; *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 313; *Hemsl.* et *Skan* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 446.

1885 (R. Buettner). — IV : brousse du distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : Bolobo; Lukolela (Buett.). — XV : bassin de la Lulua (Pg.). — Ind. non cl. Belem (Dem.).

LENTIBULARIACEAE

UTRICULARIA L.

Utricularia andongensis *Welw.* ex *Kamienski* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1902) 104; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 787; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV², 481.

U. tortilis Welw. var. — *Kamrenski* l. c. ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 74.

1898 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 12).

Utricularia conferta *Wight* in *Hook.* Kew Journ. I (1849) 372 et Icon. pl. Ind. or. IV, t. 1575; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 102; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 74.

1895 (Ém. Laurent). — Congo (Ém. Laur.).

Obs. — M. Stapf ne mentionne pas cette espèce dans la *Flora of trop. Afr.*

Utricularia exoleta *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 430; *Coss.* Ill. fl. Atlant. I, 100, t. 162; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 214; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 786; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 112; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1903) 75; *Goeb.* in Annal. Jard. Buitenz. IX, 91-97; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 435.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst. ; Dew.); Bas-Congo (Gill.). — V : Kisantu (Gill.).

Utricularia flexuosa *Vahl* Enum. pl. I (1804) 198; *A. DC.* in *DC.* Prodr. VIII, 24; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 329.

Le type croît en Asie et en Australie trop.

— — var. ***flexuosa*** *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 110; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.).

M. Stapf n'indique pas cette espèce en Afrique trop.

Utricularia Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 32 [B. S. B. B. XXXVIII², 40].

U. Benjaminiana *De Wild.* [an *Oliv.*?] Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1898 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill. 3).

Obs. — M. Stapf [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 490] croit que la plante d'Afrique est différente de l'espèce d'Oliver.

Utricularia obtusa *Sw.* Nov. gen. et sp. pl. (1788) 14; *DC.* Prodr. VIII, 10; *Benjam.* in *Mart.* Fl. Bras. X, 239; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 113; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 495.

U. obtusata *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) 41.

U. tricrenata *Bak.* in *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1898) 785.

1898 (Ém. Duchesne). — V : le Stanley-Pool aux env. de Léopoldville (Duch.).

Utricularia reflexa *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) 146; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 214; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 785; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 110 pr. p.; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 492.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Utricularia subulata *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 18; *DC.* Prodr. VIII, 16; *Benjam.* in *Mart.* Fl. Bras, X, 243; *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) 148; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 105; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 485.

1898 (Ém. Duchesne). — V : le Stanley-Pool (Schlt. 12550); Léopoldville (Duch. 44).

— — var. **minuta** *Kamienski* l. c. XXXIII (1902) 105; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 75.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — Bas-Congo (Gill. 1).

Utricularia Thonningii *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 12; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 487.

U. inflexa *Vahl* Enum. pl. I (1804) 196; *DC.* Prodr. VIII, 4; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 172.

U. stellaris *L. f.* var. — *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 219; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 46.

1885 (R. Buettner). — II a : Zobe (Dew.). — VI : Kingunshi (Buett.). — XV : Bombaie [Kasai] (Luja).

Utricularia tortilis *Welw.* ex *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. IX (1867) 150; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 787; *Kamienski* in Engl. Jahrb. XXXIII (1902) 104 [excl. var.]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 74; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 483.

1899 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 7).

GESNERACEAE

STREPTOCARPUS Lindl.

Streptocarpus katangensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 19 [B. S. B. B. XL, 25]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 127 [emend.]; *Bak.* et *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 507.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 249).

BIGNONIACEAE

NEWBOULDIA Seem.

Newbouldia laevis [*P. Beauv.*] *Seem.* in Journ. of Bot. I (1863) 226; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79 [B. S. B. B. XXXVII, 124]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 45 et Reliq. Dewevr. (1901) 172; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 521; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 447 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 70.

Spathodea — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1805) 48, t. 291; *Hook.* in Bct. Mag. (1850) t. 4537).

1895 (Ém. Laurent). — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel); Djema-Lianga (Cabra). — III : route de Matadi à Tumba (Ém. et M. Laur.). — IV : Lukungu (Ém. Laur.); Nord Manyanga (Cabra et Michel). — V : Léopoldville (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — Ind. non cl. : Campi (Cabra).

SPATHODEA *P. Beauv.*

Spathodea campanulata *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 47, t. 27; *DC.* Prodr. X, 505; Bot. Mag. (1859) t. 5091; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 215; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 45; II (1900) 46 et Reliq. Dewevr. (1901) 172; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 145; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 529; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322; II (1907) 69.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe. — Nom vern. : **Kusu-Kusu** (Cabra). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Mombata** (Dew.); Kwamouth (M. Laur.); env. de Dembo (Gill.); entre Dembo et Kisantu (But.); Sanda (Odd.). — VI : Luanu [rive droite du Kwilu] (Leser.). — VIII : Éala (M. Laur.; Pyn.). — IX : Upoto (Wilw.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai; le Sankuru (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Mukobue [affl. du Lubudi] (Desc.); le Lualaba (Ém. Laur.); le Katanga (Briart).

Spathodea nilotica *Seem.* in Journ. of Bot. III (1865) 333; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 45 et Pl. Thonnerianae (1900) 36; *Johnst.* The Uganda Protector. I, 68, cum tab.; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 535; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 177.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — IX : Upoto (Wilw.); Umangi (Ém. Laur.). — IX a : Bokape (Thonn.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

DOLICHANDRONE Fenzl.

Dolichandrone tomentosa [Seem.] Benth. et Hook. f. Gen. pl. II (1876) 1046; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 245.

Muenteria — Seem. in Journ. of Bot. III (1865) 330.

Markhamia — K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 242.

1885 (R. Buettner). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — VI : Muene-Putu-Ka-songo (Buett.).

MARKHAMIA Seem.

Markhamia lanata K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 242; *Sprague* in Hook. Icon. pl. XXV, t. 2800, fig. 8 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 527, pr. p.

M. tomentosa K. Schum. in Engl. Glied. veget. Usambara, 34 et 49 pr. p. et in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 480.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 1094). — XV : Lulua-bourg; Munungu (Ém. et M. Laur.).

Markhamia lutea [Benth.] K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 242; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 172; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 525; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 70.

Spathodea — Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 461, pr. p.

Dolichandrone — Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pl. II (1876) 1046.

Muenteria — Seem. in Journ. of Bot. VIII (1870) 388, pr. p.

1896 (A. Dewèvre). — XII : entre Goo et Djamba (Ser.). — XIII c : Luama (Dew.). — Noms vern. : **Musum** (Luama), **Musulidi** (Tanganika), **Eungu** (Ikwangula) (Dew.).

Markhamia paucifoliolata *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 131.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tenda-Kwari** (Verd. 54).

OBS. — M. Sprague [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 527] réunit cette espèce au *M. lanata* K. Schum.

Markhamia tomentosa [Denth.] K. Schum. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 242; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 45; II (1900) 47; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 528; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 178 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322.

Spathodea — Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 462.

Dolichandrone — Benth. et Hook. f. Gen. pl. II (1876) 1046.

Muenteria — Seem. in Jour. of Bot. III (1865) 330.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); la Milambi (Cabra). — V : env. de Kisantu (Gill.); Galiema (Ém. Laur.).

M. tomentosa var. **acuminata** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 132
et Miss. Laurent (1905) 178.

M. tomentosa *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *K. Schum.*] Pl. Gilletianae, I (1900)
39 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 39].

1899 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.).

Markhamia sessilis *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV² (1906) 526;
De Wild. Miss. Laurent (1907) 448 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II
(1907) 70.

Muenteria tomentosa *Seem.* [non *K. Schum.*] in Journ. of Bot. III (1865) 330,
t. 35 [fig. et pl. angol. sed excl. syn.).

Markhamia — *Hiern* [non *K. Schum.*] Cat. Welw. Pl. I (1898) 792.

1816 (Chr. Smith) — Bas-Congo (Sm.).

Markhamia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 132.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

M. Sprague [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 527] réunit cette espèce au *M. lanata*
K. Schum.

STEREOSPERMUM Cham.

Stereospermum Arnoldianum *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 128.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu et env. — Noms vern. : **Kayebule**; **Kifuli-**
mitjii (Verd. 92).

OBS. — *M. Sprague* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 520] réunit les *S. Arnoldianum*
katangense et *Verdickii* *De Wild.* au *S. Harmsianum* *K. Schum.*

Stereospermum katangense *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 130.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kikoba-Koba** (Verd. 194).

Stereospermum Kunthianum *Cham.* in *Linnaea*, VII (1832) 120;
K. Schum. in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 364; *De Wild.* Étud. fl. Kat.
(1903) 128; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 518.

S. dentatum *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 58; *Bureau* in *Adansonia*, II,
196, t. 1 et *Monog. Bignon.* t. 29.

1900 (Edg. Verdick). — I : rég. du Lac Moero (Verd.).

Stereospermum Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 129.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kafungando** (Verd. 265).

KIGELIA DC.

Kigelia aethiopica [*Lam.*] *Decne* in *Deless. Icon. select. pl.* V (1846)
39, t. 93; *Benth.* in *Hook. f. Niger Fl.* (1849) 463; *K. Schum.* in
Engl. Pfl. Ost-Afr. 364; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1904) 133; *Sprague*
in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 538.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kitwungele**. — « Assez répandu dans le Katanga, mais généralement par pieds isolés (Verd.). »

Kigelia africana [Lam.] Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) 463; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 39 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 39] et Reliq. Dewevr. (1901) 173; *Sprague* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 536; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 178.

Bignonia — *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) 424.

1895 (A. Dewèvre). — II a : bords du Tshaf (Dew.). — V : env. de Kisantu (Gill.). — VI : Inzia [vallée de la Djuma] (Gent.). — VIII : Bamania (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XII d : C. dans la savane des env. de Faradje à Gurba-Dungu (Ser.). — Noms vern. : **Yumba**. — Fl. et fruits : **Kisi** [Kasai] (Dew.); **Mayboli** [Bari]; **Zileni** [Bahul] (Ser.).

PEDALINACEAE

SESAMUM L.

Sesamum angolense Welw. Apont. phyto-geogr. (1859) 588 et in *Trans. Linn. Soc.* XXVII (1869) 51; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 215; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121] et Reliq. Dewevr. (1901) 173; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 797; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 555.

S. macranthum Oliv. l. c. XXIX (1875) 131, t. 84; *De Wild.* Étud. fl. Kat (1903) 134 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 1323; II (1907) 200.

1875 (P. Pogge). — XII : vallée du Webai [Uele] (Coll.?). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : la Lulua, 9°5 lat. S. (Pg.); à l'E. de la Lulua; Lubefu (Leser.). — XVI : Lukafu (Verd.); le Lualaba près Goia-Kapopo (Pg.); Toa (Desc.); Pweto (Charg.).

Sesamum angustifolium [Oliv.] Engl. Pfl. Ost-Afr. (1895) 365; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 178 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 323; II (1907) 200 *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 554.

S. indicum L. var. — Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 131.

1892 (Jos. Duchesne). — VI : Eiolo (Krek.). — XII c : env. de Niangara (Ser.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.).

Sesamum calycinum Welw. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII (1869) 52; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 797; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 173; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 555; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 133.

1892 (Jos. Duchesne). — VI : Eiolo (Krek.). — XII c : Niangara (Ser.). — XII d : Munza (Schw.). — XIII d : env. de Kasongo. — Nom vern. : **Cembe** (Dew.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulimdu** (Verd.). — Nom vern. : **Molenda** [Tanganika] (Dew.).

Sesamum indicum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 634; *DC.* Prodr. IX, 250; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 386; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 76 [B. S. B. B. XXXVII, 121] et Pl. Thonnerianae (1900) 36; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 558.

1891 (F. Demeuse). — II : Malela (Ém. Laur.). — IV : Luvituku (Dem.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Evankoyo (Thonn.). — XV : env. de Lusambo; le Lualaba (Ém. Laur.).

— — var. **integerrimum** *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 115.

1875 (P. Pogge). — XV : la Lulua, vers 9 1/2° (Pg. 310).

Sesamum mombanzense *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 36, t. 14; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 552.

1896 (Fr. Thonner). — IX : Mombanza près Businga (Thonn. 116 pr. p.).

Sesamum radiatum *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 56; *Webb* in *Hook.* Niger Fl. 150; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 365; *Stapf* in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 557.

S. occidentale *Regel et Heer* in Ind. sem. Hort. Turic. (1842) ex *DC.* Prodr. IX, 250.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Sesamum Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 37, t. 15

1896 (Fr. Thonner). — IX : Mombanza près de Businga (Thonn. 116 pr. p.).

OBS. — M. Stapf. [in *Dyer* Fl. trop. Afr. IV², 553] croit que cette plante doit qu'elle être une forme anormale du *S. mombanzense*.

ACANTHACEAE

GILLETIELLA *De Wild. et Th. Dur.*

Gilletiella congolana *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 20 [B. S. B. B. XXXIX³, 72]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 312; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 506.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill. 2055); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3539).

THUNBERGIA L. f. (1)

Thunbergia alata *Boj. ex Sims* in *Bot. Mag.* (1825) t. 2591; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 16; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 201.

1905 (F. Seret). — XII d : Congo bor.-or. (Ser. 301).

?**Thunbergia erecta** *T. Anders.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 18; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 12.

Meyenia — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 476; *Bot. Mag.* (1857) t. 5016.

OBS. — D'après M. Burkill (l. c.) le n° 3545, récolté par G. Schweinfurth, en 1870, dans le pays des Mangbettu [XII d] doit être cette espèce.

Thunbergia graminifolia *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 134.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Thunbergia katangensis *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 135.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 292).

Thunbergia lathyroides *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1899) 24; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 136.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 291).

Thunbergia Liebrechtsiana *De Wild. et Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo*, V (1899) 13 [B. S. B. B. XXXVIII², 132] et *Reliq. Dewev.* (1901) 173; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 507.

1896 (A. Dewèvre). — IX : pas rare le long de la rive du Congo, à 2 ou 3 jours de marche de Bangala (Dew. 859).

Thunbergia longepedunculata *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 136.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga [entre Lukafu et le Tanganika (Verd.).

Thunbergia Michelana *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 136.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 318 pr. p.).

Thunbergia parvifolia *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 90; *Th. Dur.* et *Schinz*, *Étud. fl. Cgo* (1896) 216; *A. Dewèvre* in B. S. B. B. XXXIII, 104; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 25.

1890 (Paul Briart). — XVI : le Katanga (Briart; Cornet).

Thunbergia proxima *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 137.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 318 pr. p.).

(1) Le *Thunbergia affinis* *S. Moore* [*Sprague* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 11] est cultivé à Bolobo (Ém. et M. Laur.). [*Conf. De Wild. Miss. Laurent* (1905) 182].

Thunbergia Stuhlmanniana *Lindau* in Bot. Jahrb. XVII (1893) 91.

1890 (G. Stuhlmann). — XIV : Butumbi au S. du lac Albert-Édouard (Stuhlmann. 2181).

Thunbergia Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 33 [B. S. B. B. XXXVIII², 41] et Pl. Thonnerianae (1900) 38, t. 8; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 507.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi près Gali (Thonn. 34).

Thunbergia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 138.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kausjapu** (Verd. 231).

Thunbergia Vogeliana *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 476; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 10; *De Wild. et Th. Dur.* Cont. fl. Cgo, II (1900) 47; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 314.

Meyenia — *Benth.* in Bot. Mag. (1862) t. 5389.

T. kamerunensis *Lindau* in Engl. Jahrb. XVII (1893) 97.

1891 (G. Descamps). — V : rive du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja); env. de Léopoldville (Gill.). — XVI : vallée du Lualaba (Desc.).

Thunbergia Vossiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 134.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 28).

ELYTRARIA Vahl.

Elytraria crenata *Vahl* Enum. pl. I (1804) 106; *Nees* in *DC.* Prodr. XI, 63; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 27; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 174; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 201.

E. marginata *Vahl* l. c. (1804) 108; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 58. t. 93 *Hook.* Niger Fl. 477.

Tubiflora acaulis *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 500; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 39 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 39]; *Lindau* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 365.

T. paucisquamosa *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 34 [B. S. B. B. XXXVIII², 42]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 509 in obs.

T. squamosa *Lindau* [non *O. Kuntze*] in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1897) 289 pr. p.; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgr, I (1897) 36 [B. S. B. B. XXXVI², 82]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 181.

1893 (P. Dupuis). — II a : Ganda-Janga (Cabra). — IV : la Gomuilu (Dup.). — V : Lukolela (Pyn.); Kisantu (Gill.). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XV : Ibaka; Dibebe (Em. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Bena-Lekula [Bena-Lunkala?, XV] (Dew.).

NELSONIA R. Br.

Nelsonia brunelloides [Lam.] O. Kuntze Rev. Gener. (1891) 493; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 365; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 39; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 181 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 314; II (1907) 201.

Justicia — *Lam. Encycl. méth. Bot.* I (1791) 40.

N. campestris R. Br. *Prodr. fl. N. Holl.* (1810) 481; *Endl. Iconogr. gen. pl.* t. 79; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 216; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 174; *De Wild. Etud. fl. Kat.* (1903) 141; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 805; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 28.

N. tomentosa *Dietr. Sp. pl. I* (1839) 449.

1888 (Fr. Hens). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens; Schl.); env. de Kisantu (Gill.). — VII : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX a : Bogolo près Businga (Thonn.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser.). — XVI : Lukafu (Verd.).

HYGROPHILA R. Br. (1)

Hygrophila ciliata *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1899) 35.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Hygrophila Gilletii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 314. t. 50.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2703).

Hygrophila katangensis *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 142.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : bord du Lac Moero (Verd.).

Hygrophila Lindaviana [*De Wild. et Th. Dur.*] *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1900) 509.

Asteracantha — *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 23 [B. S. B. B. XXXVIII², 100] et *Pl. Thonnerianae* (1900) 39, t. 5.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Evamkoyo (Thonn. 111, 112).

Hygrophila spinosa *T. Anders. in Thw. Enum. pl. Zeyl.* (1864) 225 et in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 22; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 31; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 201.

1905 (F. Seret). — XII : Guago (Ser. 280). — XII a : Bima (Ser. 134).

BRILLANTAISIA. P Browne.

Brillantaisia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De*

(1) A quelle espèce faut-il rapporter le *H. longifolia* Nees? indiqué au Congo, en 1882, par M. H. Johnston [*Conf. Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 216]?

Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 37 [B. S. B. B. XXXVIII², 45]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 174 et Pl. Gilletianae, II (1901) 93 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 833]; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 510.

1895 (A. Dewèvre). — V : entre Lukolela et Gombi (Dew.); env. de Lemfu (But. in Gill. 1176). — IX : Molanga. — Nom vern. : **Bolengue-Moidi** (Dew. 751).

Brillantaisia Kirungae *Lindau* in *v. Goetzen* Durch Afrika (1895) 385; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 42.

1894 (G. A. von Goetzen et Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 48).

Brillantaisia Lamium [*Nees*] *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 479; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 38.

Leucorhaphis — *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 97.

B. owariensis *Hook.* [non *P. Beauv.*] in *Bot. Mag.* (1853) t. 4717, fig. 2.

B. Palisotii *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 99 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1897) 296, fig. 119.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1123).

Brillantaisia owariensis *P. Beauv.* Fl. d'Oware II (1807) 67, t. 100; *Bot. Mag.* (1853) t. 4717, pr. p.; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 65; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 217; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 40.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

Brillantaisia patula *T. Anders.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 21; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 45; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 807; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 143; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 41.

B. alata *T. Anders.* ex *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 175, t. 124; *Th. Dur.* et *Schinz*, Étud. fl. Cgo (1896) 216; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 39 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 39] et Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 182 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 314.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.); C. dans le voisinage des villages (Ém. Laur.). — II : Sisia (Dem.). — II a : le Mayumbe: Benza-Masola (Ém. Laur.); Shionzo; Bingila (Dup.). — Nom vern. : **Bemba-Bemba** (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — XVI : C : dans les villages de la rég. de Lukafu. — Nom vern. : **Mulotte** (Verd.); Toa (Desc.); bords du Tanganika (Hecq).

Brillantaisia pubescens *T. Anders.* ex *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 125, t. 124; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 366; *Burkill* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 38; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 143.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

Brillantaisia subcordata *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 36 *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 175; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 182 t. 45; *Burkill* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 510.

1891 (F. Demeuse). — VIII : Coquilhatville (Ém. et M. Laur.); brousse de Bokakata (Dew.). — IX : pays des Bangala (Dem.); en aval de Mobeka (Ém. et M. Laur.).

— — var. **macrophylla** *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 47; *Clarke* in *Dyer l. c.* 510.

1899 (Ém. Duchesne). — IX : Nouvelle-Anvers (Em. Duch.).

MELLERA S. Moore.

Mellera Briartii *De Wild. et Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo*, VI (1899) 40 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 210]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 315; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 510.

1892 (Paul Briart). — XVI : rapides de Zilo [Katanga] (Briart); Lac Moero (Verd.).

Mellera lobulata *S. Moore* in *Journ. of Bot.* XVII (1879) 225, t. 203; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost Afr.* 367; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 50; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 143 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 315.

1891 (G. Descamps). — XVI : Lukafu (Verd.); vallées de la Lukesi et du Bulechi (Desc.).

Mellera submutica *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1899) 51.

Pseudobarleria Lindau *A. Dewèvre* in *B. S. B. B. XXXIII* (1894) 104 [nom. tant.].

Le type croît dans le Nyassaland.

— — var. **grandiflora** *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 143.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : plateau des environs de Lukafu (Verd. 566).

DYSCHORISTE Nees.

Dyschoriste Perrottetii [*Nees*] *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 486; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 45; *Lindau* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* 3 b (1895) 302, fig. 121 A-C; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 72; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 176; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 144; *Miss. Laurent* (1905) 182 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 201.

Calophanes — *Nees* in *DC. Prodr.* XI (1847) 111; *Engl. Hochgeb. trop. Afr.* (1892) 338.

1896 (Ém. Laurent). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Bokakata. — Nom vern. : **Molumba** (Dew.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.); Stanleyville (Pyn.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Dyschoriste Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 144.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Nikuminka** (Verd. 375).

Dyschoriste verticillaris [*T. Anders.*] *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 75; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 145.

Calophanes — *T. Anders.* ex *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 75.

Hygrophila glandulosa *Lindau* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 367.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

RUELLIA L.

Ruellia patula *Jacq.* Miscell. Austr. II (1781) 358 et Icon. pl. rarior. I, 12, t. 119; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83] et Contr. fl. Cgo, II (1900) 47; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 45.

Dipteracanthus — *Nees* in *Wall.* Pl. Asiat. rarior. III (1832) 82 et in *DC.* Prodr. XI, 126; *Wight* Icon. pl. Ind. or. IV, t. 1505.

1894 (Paul Briart). — II a : le Mayumbe à Wa-Kionde (Dup.). — XVI : le Katinga (Briart).

PHAYLOPSIS Willd.

Phayloopsis imbricata [*Forsk.*] *Cordem.* Fl. île Réunion (1895) 496.

Ruellia — *Forsk.* Fl. Aegypt. Arab. (1775) 113.

Aetheilema — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 478; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 480.

Micranthus — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 493; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 217; *De Wild.* Pl. Gilletianae, II (1901) 93 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, 1, 833].

P. oppositifolia *Lindau* in *Schlechter* Westafr. Kautsch. Exped. (1900) 315.

Micranthus longifolius *Wendl.* Bot. Beobacht. (1798) 39; *Lindau* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 298, fig. 220 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 367.

Phayloopsis Sims [non *Thoms.*] in Bot. Mag. (1823) t. 2433.

P. parviflora *Willd.* Sp. pl. III (1801) 342; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 83.

Phaulopsis — *Lindau* in *Engl.* et *Prantl* l. c. Nachtr. zum II-IV (1897) 305.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens; Schl.); Kisantu (Gill.).

Phayloopsis Lindaviana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 142.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 580).

Phayloopsis longifolia *Thoms.* [non *Sims*] in *Speke Nile*, Append. (1863) 643; *T. Anders.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 26; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 84; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 315.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

OBS. — Ce *Phayloopsis*, considéré comme une espèce distincte par Clarke, n'est sans doute qu'une variété du *P. imbricata* [Forsk.] Cordem.

Phayloopsis obliqua *S. Moore* in *Journ. of Bot.* XVIII (1880) 229; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 86; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 315.

Micranthus — *O. Kuntze* *Rev. Gener.* (1891) 493; *Hiern* *Cat. Welw. Pl. I.* 811; *Lindau* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 3 b (1895) 298.

Phaulopsis — *Lindau* in *Engl. et Prantl l. c. Nachtr. zum II IV* (1897) 305. *M. Hensii Lindau* in *Engl. Jahrb.* XXII (1895) 114; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 176; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 315.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Dew.). — II a : Shinganga (Dew. 271). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 29); Kisantu (Gill. 971, 1024, 1219); Kimuenza (Gill. 2166).

Phayloopsis Poggei [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1899) 85.

Micranthus — *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 108 et in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 3 b (1895) 298; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 218.

Phaulopsis — *Lindau* in *Engl. et Prantl l. c. Nachtr. zum II-IV* (1897) 305.

1882 (P. Pogge). — V : le Stanley-Pool (Hens, 52). — XIII d : Nyangwe (Pg. 975).

LANKESTERIA Lindl.

Lankesteria Barteri *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1865) t. 5533; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 46; II (1900) 47; *Pl. Thonneriana* (1900) 41 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 176; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 70; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 183 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 202.

1891 (F. Demeuse). — V : Lukolela (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Yaminga (M. Laur.); Bobi (Thonn.). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XII b : entre Gongo et Bamburu (Ser.). — XII c : env. de Surango (Ser.). — XIII a : Stanleyville (Dem.); Romée (M. Laur.); chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XIII c : Bamanga (Em. et M. Laur.). — XV : Kapinga (Em. Laur.); Ibaka (Em. et M. Laur.).

Lankesteria elegans [*P. Beauv.*] *T. Anders.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 33; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 218; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 70.

Justicia elegans *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 84, t. 50.

Eranthemum — *Roem. et Schult.* Syst. veget. I (1817) 174; *Nees* in *DC.* Prodr. XI, 447.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

WHITFIELDIA Hook.

Whitfieldia Arnoldiana *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 32 [B. S. B. B. XXXVIII², 109]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 48 et Reliq. Dewevr. (1901) 176; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 182; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 511.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : forêts des env. de Stanleyville (Dew. 1159 a); chutes de la Tshopo (Ém. Duch.).

Whitfieldia elongata [*P. Beauv.*] *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 33 [B. S. B. B. XXXVIII², 110]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 48; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 183 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 317.

Ruellia — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 46.

W. longifolia *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 27, pr. p.; *Lindau* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 307; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 64.

W. longiflora *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 218; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 83 [B. S. B. B. XXXVI², 83].

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (But. in Gill. 2242). — V : Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2826). — VII : Bali (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Bolongula (Ém. et M. Laur.); Lubue (Luja); Bombaie (Ém. et M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.); Lac Kinda (Desc.). — Ind. non cl. : Liebu (Dem.).

— — var. **Dewevrei** *De Wild. et Th. Dur.* l. c. IV (1899) 34 [B. S. B. B. XXXVIII², 111] et Reliq. Dewevr. (1901) 177.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Mobanga (Dew. 747).

Whitfieldia Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 316; II (1907) 201.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Sanda (Odd. in Gill. 3339, 3759).

Whitfieldia lateritia *Hook.* in Bot. Mag. (1845) t. 4155; *Nees* in *DC.* Prodr. XI, 221; *Lindau* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 306, fig. 110 A; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 32 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 67.

1891? (F. Demeuse). — Congo (Dem. 448).

Whitfieldia Laurentii [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 68.

Stylarthropus Laurentii Lindau in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 317, 397; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 65, t. 32.

1896 (Ém. Laurent). — XIII a : env. de Stanleyville (Ém. Laur.).

Whitfieldia Liebrechtsiana *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 34 [B. S. B. B. XXXVIII², 141]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 177; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 511.

1895 (A. Dewèvre). — II a : forêts des env. de Shinganga (Dew. 277).

Whitfieldia sylvatica *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 317.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville; Kimuenza (Gill.).

Whitfieldia Stuhlmannii [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 68.

Stylarthropus — *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 11 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 306 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 367.

1880 (P. Pogge). — XVI : le Lualaba (Pg. 1144).

Whitfieldia subviridis *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 66.

W. longifolia T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 27, pr. p.

W. longiflora S. Moore in *Journ. of Bot.* XVIII (1880) 229, pr. p.

1888 (Fr. Hens). — IX : Lisha (Hens, 343).

PHYSACANTHUS Benth.

Physacanthus batanganus [*J. Braun et K. Schum.*] *Th. et Hél. Dur.*

Ruellia — *J. Braun et K. Schum.* in *Mitth. Deutsch. Schutzgeb.* II (1889) 173.

Lankesteria — *Lindau* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 111.

P. inflatus Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 57; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 317; II (1907) 202.

1900 (L. Gentil). — VIII : Wema (Gent.); Eala (M. Laur. 1430); Haut-Lopori (Biel.).

BLEPHARIS Juss.

Blepharis boerhaaviaefolia *Pers.* Syn. pl. II (1807) 180; *Nees* in *DC. Prodr.* XI. 266; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 458; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 96; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 171.

B. rubiaefolia Schumach. in *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 292.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.).

B. boerhaaviaefolia var. **nigrovenulosa** *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I (1899) 46; De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 145 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 202; Clarke in Dyer l. c. 512, in add.*

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst; Gill. 3200). — XVI : le Katinga. — Nom vern. : **Kolania-Lania** (Verd. 596).

Blepharis Buchneri *Lindau in Engl. Jahrb. XX (1894) 30 et in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 318; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 218; Clarke in Dyer Fl. trop. Afr. V, 101; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I (1899) 48.*

1882 (P. Pogge). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1217).

— — var. **major** *De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 116, in obs.; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 319; II (1907) 203.*

1891 (G. Descamps). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — XV : bords du Lubishi [Sankuru]; vallée du Luwembe [Sankuru] (Desc.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.; Hecq).

Blepharis katangensis *De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 146.*

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kusoi-Sanpuku** (Verd. 438).

Blepharis trinervis *A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 104; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 218; Clarke in Dyer Fl. trop. Afr. V, 105; De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 147, in obs.*

1892 (Jul. Cornet). — XVI : plain. sablonn. de la Busumba (Corn.).

Blepharis Verdickii *De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 147.*

1899 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musasa** (Verd. 166, 595).

ACANTHUS L.

Acanthus arboreus *Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 115; T. Anders. in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 37; Engl. Hochgeb. fl. trop.-Afr. 390 et in von Goetzen Durch Afrika (1895) 383; Clarke in Dyer Fl. trop. Afr. V, 106.*

A. arboreus *Forsk. var. pubescens* *T. Thoms. in Speke Nile, App. (1863) 643; Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 129, t. 86.*
Cheilopsis — *Nees in DC. Prodr. XI (1847) 272.*

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 24).

Acanthus mayaccanus *Buett. in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1899) 37; Clarke in Dyer Fl. trop. Afr. V, 108; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 219.*

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.).

A. mayaccanus var. **angustifolius** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 319.

1902 (J. Gillet). — V : Léopoldville (Gill.).

Acanthus montanus [*Nees*] *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 37; Bot. Mag. (1865) t. 5516; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 107; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 178; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 813; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 319; II (1907) 93.

Cheilopsis — *Nees* in *D.* Prodr. XI (1847) 272; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 481.

A. caudatus *Lindau* in Engl. Jahrb. XX (1894) 33.

1880? (P. Pogge). — II : Zambézi (Dew.). — V : entre Léopoldville et Mombasi : env. de Léopoldville (Gill.); Sanda (Odd.); Kisanu; vallée de la Sele (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VIII : île en face de Coquilhatville (Ém. Laur.): île de Bongenboi? (Dew.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Lusanga (Dem.). — XV : Lomkala (Ém. et M. Laur.); vallée de la Lulua (Pg.). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. non cl. : vallée du Lomami (Desc.).

Acanthus Villaeanus *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 148 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 319; II (1907) 203.

1901 (R. Butaye). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisanu : entre Kisanu et le Kwango (But. in Gill. 2243, 2273); Sanda (Odd. in Gill. 3325).

ACANTHOPALE Clarke.

Acanthopale pubescens [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 64.

Dischistocalyx — *Lindau* ex *Engl.* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 385, 390.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga au N. du Lac Kivu, 2600^m (Goetz. et Prittw. 58).

SCLEROCHITON Harv.

Sclerochiton Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 318; II (1907) 202.

1902 (J. Gillet). — V : Léopoldville et env. (Gill. 2511; Pyn. 153).

L'*Acanthopsis horrida* *Nees*, indiqué comme ayant été trouvé au Congo par M. F. Demeuse [*Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 218] doit être réétudié.

BUTAYEA De Wild.

Butayea congolana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 150, t. 42 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 316; II (1907) 202.

1900 (J. Gillet). — V : le Stanley-Pool (Rouy); Kimuenza (Gill. 1933); entre Kisantu et Popokabaka (But. in Gill. 2297); Sanda (De Brouw. in Gill. 3025).

CROSSANDRA Salisb.

Crossandra guineensis *Nees* in *DC. Prodr* XI (1847) 281; *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1878) t. 6346; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 41; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 203 et *Miss. Laurent* (1905) 184; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 117.

1903 (Ém. Laurent). — IX : Gali (Thonn.). — XII a : route de Buta à Bima (Ser.). — XV : grotte de Kondue (Ém. Laur.).

Crossandra nilotica *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 178; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 115; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 48; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 149.

1891 (G. Descamps). — XVI : Pala (Deb.); Toa; vallée du Malondoï [affl. de la Luila] (Desc.); Lukafu. — Nom vern. : **Shikoka** (Verd.).

BARLERIA L.

Barleria affinis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 140.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 561).

Barleria Briartii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 42 [B. S. B. B. XXXVIII², 212]; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 513.

1891 (Paul Briart). — XVI : gorges de Zilo (Briart).

Barleria Descampsii *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 318; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 169.

1891 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

Barleria elegans *S. Moore* in *Journ. of Bot.* XVIII (1880) 269; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 164; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 815; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 317.

B. pungens L. var. *macrophylla* *Nees* in *DC. Prodr.* XI (1847) 237.

1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 3193).

Barleria lukafuensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 140.

1901 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 588).

Barleria opaca [*Vahl*] *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 230; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 480; *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 31; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 163; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 318.

Justicia — *Vahl* Enum. pl. I (1804) 123.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — X : Imese [Ubangi] (Ém. et M. Laur.).

Barleria ventricosa *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 230; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 143; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 164; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 318.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Lovoi (Desc.).

Barleria Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 140.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : *Mulengroo* (Verd. 436).

Barleria villosa *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 267; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 164; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 817; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 318.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1394); rég. de Lumene (Hendr. in Gill. 3288); entre Dembo et le Kwango (But. in Gill. 1502).

CRABBEA Harv.

Crabbea nana *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 162; *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 32; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 118.

C. ovalifolia *Ficalho* et *Hiern* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1881) 24; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83].

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

THOMANDERSIA Baill.

Thomandersia Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 312.

1900 (R. Butaye). — V : entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 1480).

Thomandersia congolana *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 30 [B. S. B. B. XXXVIII², 107] et Reliq. Dewevr. (1901) 179; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 512; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 313.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Cabra, 35). — V : entre Selembao et Léopoldville (Dew. 472).

T. congolana var. **grandifolia** *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 179.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 1082). — V : Kimuenza (Gill. 2192); rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3576).

Thomandersia laurifolia [*T. Anders.*] *Baill.* Hist. des pl. X (1888) 456; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 120 et 512.

Scytanthus — *T. Anders.* ex *Benth.* et *Hook. f.* Gen. pl. II (1876) 1093; *Hook.* Icon. pl. XIII (1877) t. 1209; *Buett.* in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXII (1891) 43; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 219.

T. Hensii *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 31 [B. S. B. B. XXXVIII², 108]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1901) 133, t. 77 et Reliq. Dewevr. (1901) 179 *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 179 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 313; II (1907) 200.

1888 (Fr. Hens). — VIII : Coquilhatville (Dew. 683); Eala (M. Laur. 130). — IX : Bangala (Hens, C. 113; Dem. 303). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Ibange (Ém. et M. Laur.).

— — var. **latifolia** [*De Wild.*] *Th.* et *Hél. Dur.*

T. Hensii *De Wild.* et *Th. Dur.* var. — *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 180. 1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

— — var. **longipetiolata** [*De Wild.*] *Th.* et *Hél. Dur.*

T. Hensii *De Wild.* et *Th. Dur.* var. — *De Wild.* l. c. (1905) 179. 1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Kapinga (Ém. et M. Laur.).

Thomandersia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 180 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 313, t. 69.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Chenal (Ém. et M. Laur.); Kimuenza (Gill. 1700).

LEPIDAGATHIS Willd.

Lepidagathis Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 183.

1894 (Ém. et Marc. Laurent). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

Lepidagathis Lindauiana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 145.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kadi-Kungu** (Verd. 520).

ASYSTASIA Blume.

Asystasia congensis *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1899) 132.

1885 (C. Callewaert). — V : le Stanley-Pool (Call.).

Asystasia gangetica [L.] T. Anders. in *Thes. Enum. pl. Zeyl.* (1864) 235; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 370; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 41; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 320; II (1907) 203.

Justicia — L. Cent. pl. alt. (1756) 3.

A. coromandeliana *Nees* in *Wall. Pl. Asiat. rarior.* III (1832) 89; *Nees* in *DC. Prodr.* XI, 165; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 219; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 179; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 151 et *Miss. Laurent* (1905) 184; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 817; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 131,

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra); Bingila (Dup.); Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : Mopolenge (M. Laur.); Bolobo (Buett.); env. de Lemfu (But.); Kinuenza (Dew.); Tumba; Bulebu (Ém. et M. Laur.); env. de Kinanga (Odd.); Tshumbiri (Dem.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Ncolie-Akondo** (M. Laur.). — IX : Upoto (Thonn.); Bangala (Hens). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.). — XII : Liboyo (Ser.). — XV : la Lulua (Pg.). — Ind. non cl. : le Lomami (Desc.).

Asystasia longituba *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XXII (1895) 118; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 203, t. 57-58.

Ann. ? (Coll.?). — Congo (Coll.?).

OBS. — Cette espèce a été décrite puis figurée d'après des plantes, de provenance congolaise, élevées au Jardin botanique de Bruxelles.

PSEUDERANTHEMUM Radlk.

Pseuderanthemum Lindavianum *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, IV (1899) 27 [B. S. B. B. XXXVIII², 104]; *Contr. fl. Cgo*, II (1906) 49 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 180.

1891 (G. Descamps). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Shimbete (Dew. 317). — VIII : env. de Basankusu; Bamanga (Dew. 781, 1147). — Ind. non cl. : vallée du Lomami (Dew.).

OBS. — Clarke [in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 514] réunit cette espèce au *Rhinacanthus communis* Nees.

Pseuderanthemum Ludovicianum [Buett.] *Lindau* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 3 b (1895) 330; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 220; *De Wild. et Th. Dur. Ill. fl. Cgo* (1899) 63, t. 32; *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 48 et *Pl. Thonnerianae* (1900) 41; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 203 et *Miss. Laurent* (1905) 185.

Eranthemum — *Buett.* in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* XXXII (1890) 41; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 172.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.). — VIII : Eala (M. Laur. 1121); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — IX : Bolombo (Thonn.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Dem.); Barumbu (M. Laur.); Mogandjo (M. Laur. 1411); Bomaneh (M. Laur. 1435). — XIII a : Stanleyville (Ém. Duch.); Romée (M. Laur. 1027).

Pseuderanthemum nigritanum [*T. Anders.*] *Radlk.* in Sitz. Ber. Bayr. Akad. XIII (1883) 286; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 46; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 818; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 320.

Eranthemum — *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 51; *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 308; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 171.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.); Sanda (Odd. in Gill. 3318). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2841 b, 2864). — IX : île en aval d'Upoto (Ém. Laur.).

JUSTICIA L.

Justicia Anselliana [*Nees*] *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 44; *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 341 et in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, IV, 32; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 37 [B. S. B. B. XXXVI², 83]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 208.

Adhatoda — *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 403.

Dianthera — *Benth.* et *Hook.* f. Gen. pl. II (1876) 1114.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Justicia Emini *Lindau* in Engl. Jahrb. XX (1895) 68, in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 349 et in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 373; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI², 84]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 187.

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

Justicia Garckeana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 38; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 220; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 93 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 833]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 321.

Rungia grandis *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 46; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 253.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : entre Léopoldville et Mombasi ; Kisantu (Gill. 1165, 1247, 2571). — VI : pays des Majakalla [Kwango] (Buett. 356); vallée de la Djuma (Gent.). — XIII a : Stanleyville (M. Laur. 1410). — Ind. non cl. : Langa (Dup.).

Justicia insularis *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 40; *Lindau* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 373; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 195.

J. Karschiana *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXII (1890) 40; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 321.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill. 582).

Justicia matammensis *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 130; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 209.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.). — XV : la Lulua (Pg.). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg.).

Justicia palustris [*Hochst.*] *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 38; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 373; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 191; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI², 84]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 141.

Tyloglossa — *Hochst.* in *Flora*, XXV (1842) I, Beibl. 144; XXVI (1843) 72. 1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.); Lukafu (Verd.).

Justicia Paxiana *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 63; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI², 84]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 181; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 322.

Rungia — *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 253.

1888 (Fr. Hens). — II a : le Mayumbe (Dup.); Shinganga (Dew.). — IV : Lukungu (Hens). — V : entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.).

Justicia Poggei *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 61 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 350; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 220; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 211.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 304).

Justicia Rostellaria [*Nees*] *Lindau* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 349 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 373; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI², 84].

Adhatoda — *Nees* in *DC. Prodr.* XI (1847) 397.

J. calcarata *Hochst.* in *Flora* (1843) 73, in obs.; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 195.

1894 (P. Dupuis). — II : Zambi (Dup.). — II a : Bingila; Kibinga (Dup.).

Justicia tenella [*Nees*] *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 40; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 187; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 321; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 820.

Rostellaria — *Nees* in *DC. Prodr.* XI (1847) 369; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 482.

1901 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 2224).

NICOTEBA Lindau.

Nicoteba Betonica [*L.*] *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1893) 56, 63, t. 2, fig. 56 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 370; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 320.

Justicia Betonica L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 21; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 184.

Adhatoda — *Nees* in *Wall.* Pl. Asiat. rarior. III (1832) 103.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

CHLAMYDOCARDIA Lindau.

Chlamydocardia Buettneri Lindau in Engl. Jahrb. XX (1894) 39 et in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 b (1895) 329; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 234; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 184.

1902 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : grotte de Kondue (Ém. et M. Laur.).

DUVERNOYA E. Mey.

Duvernoya Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 25 [B. S. B. B. XXXVIII², 102]; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1901) 143, t. 82 et Reliq. Dewevr. (1901) 181; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 185 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 205.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Basankusu (Dew. 781); Eala (Ém. et M. Laur. 941).

OBS. — D'après *Clarke* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 513] ce *Duvernoya* devrait rentrer dans le *Justicia extensa* T. Anders. = *D. extensa* Lindau.

Duvernoya haplostachya Lindau in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 324.

1891 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

OBS. — The descriptions reads like that of a *Monechma*; but without any knowledge of the pistil it is vain to guess (*Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 224).

Duvernoya Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 152.

Justicia — *De Wild.* l. c. (1903) 152, in obs.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kibala (Verd.).

RHINACANTHUS Nees.

Rhinacanthus Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 28 [B. S. B. B. XXXVII², 105]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 181; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1906) 321, t. 68 et Miss. Laurent (1905) 185.

1896 (A. Dewèvre). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. de Bokakata (Dew.); env. de Boeka. — Nom vern. : Bamandia (Dew. 804).

OBS. — *Clarke* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 224, 514] réunit le *R. Dewevrei* au *R. communis* Nees.

Rhinacanthus parviflorus *T. Anders. ex Th. Dur. et De Wild.*
Mat. fl. Cgo, IV (1899) 29; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I
(1906) 321.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

RUNGIA Nees.

Rungia Buettneri *Lindau* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 46 et in *Engl.*
et *Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 3 b (1895) 332; *Clarke* in *Dyer Fl.*
trop. Afr. V, 254.

1885 (R. Buettner). — VI : la Sanga près de Muene-Putu-Kasongo (Buett. 456).

Rungia congocensis *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1900) 254.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu (Hens, 330).

DICLIPTERA Juss.

Dicliptera Elliotii *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1900) 258.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Dicliptera katangensis *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 152.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Sosoi-Sosoi (Verd. 440).

Dicliptera umbellata [*Vahl*] *Juss.* in *Annal. Mus. Paris*, IX (1807)
268; *Nees* in *DC. Prodr.* XI, 484; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V,
259; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 141.

Justicia — *Vahl Enum. pl.* I (1804) 111.

Dipodium — *O. Kuntze Rev. Gener.* (1891) 485.

D. verticillaris *T. Anders.* [non *Juss.*] in *Journ. Linn. Soc.* VII (1864) 47;

S. Moore in *Journ. of Bot.* XVIII (1880) 362.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Ind. non
cl. : Ieyanga; Poka (Burt.).

Dicliptera Welwitschii *S. Moore* in *Journ. of Bot.* XVIII (1880) 362;
Clarke in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 259.

1882? (P. Pogge). — Ind. non cl. : vallée du Lomami (Pg. 4218).

PERISTROPHE Nees.

Peristrophe bicalyculata [*Retz.*] *Nees* in *Wall. Pl. Asiat. rarior.*
III (1832) 113; *DC. Prodr.* XI, 496; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II,
160; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 38 [B. S. B. B.
XXXVI², 84]; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 242, 514.

Dianthera bicalyculata Retz. in Act. Acad. Holm. (1775) 297, t. 9.

Justicia — Vahl Symb. bot. II (1791) 13.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Peristrophe Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 26 [B. S. B. B. XXXVIII², 103]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 93 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 833]; Ill. fl. Cgo (1901) 139, t. 80 et Reliq. Dewevr. (1901) 183.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Zobe (Dew. 245). — V : Kisantu (Gill.).

OBS. — Clarke [in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 514] réunit cette espèce à la précédente.

Peristrophe Hensii [*Lindau*] *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1900) 243.

Dicliptera — *Lindau* in Engl. Jahrb. XXII (1895) 120.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 53).

HYPOESTES R. Br.

Hypoestes cancellata [*Willd.*] *Nees* in *DC.* Prodr. XI (1847) 505; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 246.

Justicia — *Willd.* ex *Nees* in *DC.* l. c. (1847) 506.

H. callicoma *S. Moore* in Journ. of Bot. XVIII (1880) 41; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 46; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy-Cgo, I (1906) 320; II (1907) 204.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Schlt.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — XII a et b : route de Bima à Bambili (Ser.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Mukenge (Pg.).

Hypoestes latifolia *Hochst.* in Flora, XXIV (1841) I, Intell. 43; *Nees* in *DC.* Prodr. XI, 509; *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 371; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI², 84]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 183; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII, 111.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo, se montre souvent après l'incendie des herbes (Cabra). — II a : Katala (Dew.); Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem.).

OBS. — Clarke [in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 250] réunit cette espèce à l'*H. verticillaris* R. Br.

Hypoestes verticillaris [*L. f.*] *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 474, in obs.; *Nees* in *DC.* Prodr. XI, 507; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 250; *Lindau* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 3 b (1895) 333, fig. 134, A-C; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 183; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 152.

Justicia verticillaris L. f. Suppl. pl. (1781) 85.

Dicliptera — A. Juss. in Annal. Mus. Paris, IX (1807) 268.

H. mollis T. Anders. in Journ. Linu. Soc. VII (1864) 49; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 220; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 38 [B. S. B. B. XXXVI², 84].

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — II a : Katala (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — XII c : route de Niagara à Gombari (Ser.). — XV : la Lulua (Pg.). — XVI : le Katanga (Corn.); Lukafu (Verd.); Toa (Desc.).

VERBENACEAE (1)

LANTANA L.

Lantana Camara L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 627; *Schauer* in DC. Prodr. XI, 598; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 183; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 276; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 309.

L. aculeata L. l. c. (1753) 627; Bot. Mag. (1789) t. 96.

L. scabrida Ait. Hort. Kew. ed. 1 (1789) 352; *Lodd.* Bot. Cab. (1822) t. 1171.

1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

Lantana salvifolia Jacq. Hort. Schoenbr. III (1798) 18, t. 285; *Schauer* in DC. Prodr. XI, 615; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79 [B. S. B. B. XXXVII, 124]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 33; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 276; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 183; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 116, 223 et *Miss. Laurent* (1905) 170.

1891 (G. Descamps). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.); Temvo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Mombanza (Thonn.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Munungu (Ém. Laur.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.; Hecq). — Ind non cl. : brousse du Lomami (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Lokopo** [Kasai]; **Malebunukai** [Ikwangula]; **Bulume** [Tanganika] (Dew.).

LIPPIA L.

Lippia adoensis Hochst. in Flora, XXIV (1841) I, Intell. 23; DC. Prodr. XI, 558; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79

(1) A côté des Verbenaceae vient la petite famille des Selaginaceae. Deux espèces, les *Selago alopecuroides* et *Johnstonii Rolfe*, ont été indiquées vaguement au Congo, mais sans doute par erreur.

[B. S. B. B. XXXVII, 124]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 47; II (1900) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 184; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 170; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 280.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila; Wakionde (Dup.); Poiti (Dew.). — V : rive droite du Kasai (Luja); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Esisi**; Ikelemba (M. Laur.); env. de Mobanga (Dew.). — IX : Upoto (Wilw.).

Lippia asperifolia *Rich.* Cat. hort. med. Paris (ann. ?) 67; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 583; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79 [B. S. B. B. XXXVI, 124]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 280.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Lippia Burtonii *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 281.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.).

Lippia nodiflora [*Lam.*] *Michaux* Fl. Bor.-Amer. II (1803) 15; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 585; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 279; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 47.

Zapania — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) 59.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : env. d'Albertville [Toa] (Hecq); Pala (Deb.).

STACHYTARPHETA Vahl.

Stachytarpheta angustifolia *Vahl* Enum. pl. I (1804) 265; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 563; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 284; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 79 [B. S. B. B. XXXVII, 124]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 184; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 311.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool [Tamo] (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Dew.). — XII d : le Kibali (Schw.). — XV : banc de sable du Kasai (Ém. et M. Laur.); Lusambo (Jos. Duch.). — XVI : Toa (Desc.).

Stachytarpheta indica [*L.*] *Vahl* Enum. pl. I (1804) 206; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 564; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 221; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 284.

Verbena — *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) 821.

S. jamaicensis *Vahl* l. c. I (1804) 206; *Bot. Mag.* (1816) t. 1860; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 564.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens).

DURANTA L.

Duranta erecta L. Sp. pl. ed. 4 (1753) 637; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 831.

D. Plumieri *Jacq.* Stirp. Amer. hist. (1780) 186, t. 176, fig. 76; Bot. Reg. III, t. 244; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 615; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 184; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 287; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 309.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Boma (Gill.). — V : Bolobo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XII d : Munza (Schw.). — XIII d : entre Kasongo et Kabanga (Dew.).

PREMNA L.

Premna angolensis *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 165; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 221; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 289.

1880 (von Mechow). — VI : pays des Majakalla [Kwango] (Mech.).

Premna quadrifolia *Schumach.* et *Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 273; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 633; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1904) 94 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 834]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 289.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

VITEX L.

Vitex aesculifolia *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 325.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3442).

Vitex camporum *Buett.* in *Verh. bot. Ver. Brandenb.* XXXII (1890) 35; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 222; *Henriq.* in *Bolet. Soc. Brot.* XVI, 69; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 39 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 184; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 323; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 309.

V. madiensis *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 134, t. 131; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 834.

1884 (R. Buettner). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Boma (Schimp.) — II a : la Lemba (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Sanda (Verm.). — XVI : Lukafu; plateau de la Lufira. — Nom vern. : Mufutu (Verd.).

Vitex Cienkowskii *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinneanae (1867) 27, t. 12; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 328.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Vitex congolensis *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 15 [B. S. B. B. XXXVIII², 134]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 50 et Reliq. Dewevr. (1901) 184.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Bokakata (Dew. 770 a). — XV : Bena-Dibele (Luja).

OBS. — M. Baker [in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 325] croit que cette espèce doit être réunie au *V. ferruginea* Schumach. et Thonn.

Vitex Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 14 [B. S. B. B. XXXVIII¹, 133]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 50 et Reliq. Dewevr. (1901) 185; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 198; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 327.

1891 (F. Demeuse). — IV : Lukungu. — Nom vern. : **Filu** (Dew. 409). — V : Kimuenza (Gill. 1614). — XI : Yamononger (Dem.).

Vitex ferruginea *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 288; *Schauer* in *DC. Prodr.* XI, 695; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 324.

V. rufescens *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 169; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 222.

1882 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua (Pg.).

Vitex Gilletii *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 298 et in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 72; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171.

1876? (P. Pogge). — V : Kimuenza (Gill. 2163). — XV : Dibele (Ém. et M. Laur.); Mukenge (Pg. 698).

Vitex lukafuensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 121.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Mukasu** (Verd. 63).

Vitex lundensis *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1893) 168; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 222; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 327.

1882 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua (Pg. 1260).

Vitex Mombassae *Vatke* in *Linnaea*, XLIII (1880-1882) 533; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 121; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 326.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lufuka** (Verd. 70).

Vitex Poggei *Guerke* in *Engl. Bot. Jahrb.* XVIII (1893) 168; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 222; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 323.

1881 (P. Pogge). — Congo (Pg. 1255).

OBS. — Le n° 1260, de la même collection, venant de la Lulua, il est plus que probable que le n° 1255 a été récolté dans la même région.

CLERODENDRON L.

Clerodendron Bakeri *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 175;
Bak. in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 297.

C. congense *Bak.* [non *Engl.*] in Kew Bull. (1892) 127.

1882 (H. Johnston). — V : le Stanley-Pool (Johnst.).

Clerodendron Buchneri *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 173;
Th. Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 222; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop.
Afr. V, 305.

1881 (von Mechow). — VI : Quifocusa sur le Kwango (Mech. 557 a).

Clerodendron capitatum *Schumach.* et *Thonn.* in Dansk. Vid. Selsk.
Afh. IV (1828) 61; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 673; *Hook. f.* in Bot.
Mag. (1848) t. 4355; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 305, 518.

Le type est largement répandu dans l'Afrique trop.

— — var. **Butayei** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 117.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2245).

— — var. **subcordatum** *De Wild.* l. c. (1903) 117.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kamiombo** (Verd. 422).

— — var. **subdentatum** *De Wild.* l. c. (1903) 117.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : plateau près de Lukafu (Verd. 409).

Clerodendron congense *Engl.* in Engl. Jahrb. VIII (1886) 65; *Th.*
Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 223; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop.
Afr. V, 301.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma ; Ponta da Lenha (Naum.).

Clerodendron formicarum *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 179;
Th. Dur. et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 223; *Henriq.* in Bolet. Soc.
Brot. XVI (1899) 69; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 298.

Siphonanthus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 843.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza ; Kusumba (Schw. 3483, 3641). — XVI :
Musumba (Pg. 333).

Clerodendron fuscum *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 175 et in
Engl. Pfl. Ost-Afr. 311; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896)
223; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 185; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 72, (1906) 310 et Miss. Laurent
(1905) 172; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 313.

1876? (P. Pogge). — II a : Nanga (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kisantu (Gill. 804); Kimuenza (Dew. 507); Sanda (Odd.): Tumba (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XV : Butala (Ém. Laur.); la Haut-Lulua vers 9°5 (Pg.) la Lulua (Preuss); Bolongula (Ém. et M. Laur.).

Clerodendron Gilletii *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, IV (1899) 36 [B. S. B. B. XXXVIII², 113]; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 302.*

1898 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.).

Clerodendron grandifolium *Guerke in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 173; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 223; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 307.*

1889 (von Mechow). — VI : pays des Majakalla (Mech. 530)..

Clerodendron Kanichi *De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 119.*

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Kanichi** (Verd. 323).

Clerodendron katangense *De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 120.*

1900 (Edg. Verdick). — XVI : bords de la Mwena. — Nom vern. : **Kawsala** (Verd. 400).

Clerodendron longitubum *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, VIII (1898) 22 [B. S. B. B. XXXIX², 74]; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 310; II (1907) 66; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 517, in add.*

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 3347). — XII c : route d'Amadis à Surango (Ser. 356).

Clerodendron Lujaei *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, VI (1899) 43 [B. S. B. B. XXXVIII², 213] et Pl. Gilletiana, I (1900) 40 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 40]; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 298, in obs.*

1898 (Éd. Luja). — IV : Sona-Gongo [cataractes] (Luja). — V : Kisantu (Gill.).

Clerodendron myricoides *R. Br. in Salt Abyss. App. (1814) p. LXV; Guerke in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 298; Vatke in Linnaea, XLIII, 535; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 310.*

Cyclonema — *Hochst. in Flora, XXV (1842) 226; Schauer in DC. Prodr. XI, 675; Bot. Mag. (1870) t. 5838; A. Rich. Tent. fl. Abyss. II, 171.*

Sephonanthus — *Hiern Cat. Welw. Pl. I (1900) 844.*

1832 (J. Monteiro). — II : Boma (Mont.). — V : Bolobo (Johnst.).

— — var. **camporum** *Guerke in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 299.*

1893 (G. Descamps). — Congo (Cabra). — XVI : Pala (Desc.)

C. myricoides var. **laxum** *Guerke* in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 299; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 120.

1891 (Hyac. Vanderyst). — Congo (Vanderyst). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Putu (Verd. 161).

Clerodendron Poggei *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 171; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 223; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 309.

1882 (P. Pogge). — XV : dans un village Kalebue (Pg. 1116).

Clerodendron Rehmanni *Guerke* in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 294; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 121.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Disjika-Bamuni (Verd. 51).

Clerodendron scandens *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 52, t. 32; Bot. Mag. (1848) t. 4354; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 304; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 310 et Miss. Laurent (1905) 172.

1891 (F. Demeuse). — VI : route de Lusubi à Luanu (Lescr.) — VIII : Eala (M. Laur.); Coquilhatville (Schlt.); Bangu [Momboyo] (Gent.). — IX : pays des Bangala (Dem.); Nouvelle-Anvers (Dew.).

Clerodendron Schlechteri *Guerke* in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 310 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12504).

Clerodendron Schweinfurthii *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 177 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 341; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 296; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 310.

1902 (L. Gentil). — V : vallée de la Lumene (Hendr.). — VI : Kindunpolo; Tumba-Mani (Cabra et Michel). — XV : la Loange (Gent.).

Clerodendron spinescens [*Oliv.*] *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 180; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 223; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 40 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 40; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 72, (1906) 310; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 313.

Cyclonema — *Oliv.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 96 et in *Hook. Icon. pl.* XIII (1877) 18, t. 1221.

Kalaharia — *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 340.

K. spinipes *Baill. Hist. des pl.* XI (1892) 111.

Clerodendron Melanocrater *Guerke* in Engl. Jahrb. XVIII (1894) 180; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 299. — Près de la riv. Itiri (Stuhl. 3322, 3650, 3720).

OBS. — Cette localité est peut-être dans le Congo belge.

1882 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.); rég. de Lumene (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — XVI : le Katanga (Corn.).

C. spinescens var. **parviflorum** Schinz ex Guerke l. c. (1894) 180; *Th. Dur.* et Schinz l. c. 224.

1888 (Fr. Hens.). — V : le Stanley-Pool (Hens. B. 57).

Clerodendron splendens D. Don in Edinb. Phil. Journ. XI (1824) 349; Schauer in DC. Prodr. XI, 662; *Th. Dur.* et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 300.

Siphonanthus — *Hiern*. Cat. Welw. Pl. I (1900) 841.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew. 98). — II a : Bingila; Kibinga. — Nom vern. : **Lundula** [Mayunbe] (Dup.). — V : Sabuka (Ém. Duch.); Sanda (Odd.); Kisantu (Gill.). — XIII a : Stanleyville; Yakusu (Ém. Laur.). — XV : Lubue [Kasai] (Luja).

Clerodendron subreniforme Guerke in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 291; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 186; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 518, in add.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 917). — Noms vern. : **Gubia** (Kasongo); **Djague-Djague** (Ikwangula) (Dew.)

Clerodendron Thonneri Guerke in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 292; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 517, in add.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Boyangi (Thonn. 69).

Clerodendron thyrsoideum Guerke in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 293; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 186; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 516; De Wild. Miss. Laurent (1905) 172 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 310.

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gill.; Gent.). — VIII : Eala (M. Laur. 80); bord de la Lulanga (Dew. 812).

Clerodendron volubile P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 52, t. 32; Schauer in DC. Prodr. XI, 661; *Th. Dur.* et De Wild. Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; Bak. in Dyer Fl. trop. Afr. V, 297; De Wild. Miss. Laurent (1905) 172 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 310.

Siphonanthus — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 842.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Sanda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.).

Clerodendron yaundense *Guerke* in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 297; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 516; *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. [1900] 313.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Irebu (Schlt. 12627).

AVICENNIA L.

Avicennia africana *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 80, t. 47; *Schauer* in *DC.* Prodr. XI, 699; *Th. Dur.* et *Dè Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 186; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 331.

1895 (P. Dupuis). — I : marais de Banana (Dup.).

LABIATACEAE

OCIMUM L.

Ocimum canum *Sims* in Bot. Mag. (1823) t. 2452; *Benth.* in *DC.* Prodr. XII, 32; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 224; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 186; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 337; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 179 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 312; II (1908) 341.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — II : Boma; Zobe (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — IV : Kitobola (Em. et M. Laur.). — V : route de Tumba-Mani [VI] à Tumba [V] (Cabra et Michel); Boko (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — XII c : Amadis (Ser.). — XII d : Munza (Schw.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Kondue; Luebo; entre Lusambo et le Lomami (Em. et M. Laur.). — Noms vern. : **Djumba-Djumba** [Bakusu]; **Lonengue** [Ikwangula]; **Lognie** [Kasongo]; **Lehani** [Matammatam]; **Katundula** [Tanganika] (Dew.).

Ocimum Descampsii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 38 [B. S. B. B. XXXVII, 83]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 343.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Ocimum filamentosum *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 108; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 177; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 343.

O. grandiflorum *L'Herit.* Stirp. nov. (1784-1785) 89, t. 43.

Becium bicolor *Lindl.* in Bot. Reg. (1843) t. 15.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : le Lofoi (Verd.).

Ocimum glossophyllum *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 102; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 340.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg. 354).

Ocimum gratissimum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1197; *Jacq.* Icon. pl. rar. III, t. 495; *Benth.* in *DC.* Prodr. XII, 34 (excl. syn.); *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 339, in obs.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett.).

— — var. **macrophyllum** *Briq.* in B. Herb. Boiss. II (1894) 120 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 38 [B. S. B. B. XXXVII, 83]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 187.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Moçoçolo** (Dew. 624).

— — var. **mascarenarum** *Briq.* ll. cc.; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianac, I (1900) 40 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 40]; et Reliq. Dewevr. (1901) 187; *De Wild.* Miss. Laurent (1900) 175 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 341.

1888 (Fr. Hens). — XVI : Congo (Desc.). — Bas-Congo (Cabra). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — IV : Luvituku (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Lac Léopold II (Body). — VIII : Bobangi (Ém. Laur.); Coquilhatville [cult] (Dew.); Lulanga (Dew.); Eala (M. Laur.); Monsole (Huyghe et Ledoux). — IX : Moleke (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Nyangwe (Dew.); Yanongo (Ém. et M. Laur.). — XIV : Mazanze (Desc.). — XV : Ikongo; le Kasai [poste de bois n° 6] (Ém. Laur.). — Noms vern. : **Lusu-Lusulo** [Bakusu]; **Ececi**; **Malumba** [Eala]; **Binga** [Tanganika] (Dew.); **Bojudjuma** (M. Laur.); **Moçoçole** [Bangala]; **Tshamtshakadi** [Sankuru].

Ocimum linearifolium *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 162; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 224; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 341.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg. 357).

Ocimum Poggeanum *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 163; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 225; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 341.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg. 355).

GENIOSPORUM Wall.

Geniosporum congoense *Guerke* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 312 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12469).

Geniosporum scabridum *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 165; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 225; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 352.

1876 (P. Pogge). — XV : la Haut-Lulua (Pg. 347).

PLATOSTOMA P. Beauv.

Platostoma africanum *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 61, t. 95, fig. 2; *Henriq.* in Bolet. Soc. Brot. X, 149; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 225; *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 30 [B. S. B. B. XXXVII, 75]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 349 [Platystoma]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 341.

P. flaccidum *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 165; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 225.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Cabra). — II : Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — IV : Lutete (Hens). — V : Suata [*err. cal.* Ulsuata] (Buett.); Yindu; Dembo (Vanderyst). — VI : le Kwilu (Sap.). — VIII : Équateurville (Pyn.); Coquilbatville (Schlt.); Eala et env. (M. Laur.; Pyn.). — XII d : Congo bor.-or. (Ser.). — XV : la Haut-Lulua (Pg. 363).

Platostoma Buettnerianum *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 166; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 225; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 350.

1886 (R. Buettner). — V : Léopoldville (Buett. 449).

MOSCHOSMA Rchb.

Moschosma polystachyum [*L.*] *Benth.* ex *Wall.* Pl. Asiat. rarior. II (1831) 13 et in *DC. Prodr.* XII, 48; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* IV, 612; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 353.

Ocimum — *L. Mant. pl.* (1767) 567.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — XII d : le Kibali (Schw.).

— — var. **stereocladum** *Briq.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* IV, 3 a (1895) 368 et in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 37 [B. S. B. B. XXXVII, 82] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 188.

1891 (G. Descamps). — II : Sisia (Dup.). — XIV : Uvira; Mazanze (Deb.). — XV : la Loange (Dew.). — XVI : Toa (Desc.).

ACROCEPHALUS Benth.

Acrocephalus campicola *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 67; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo*, I (1896) 226; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 358.

1882 (P. Pogge). — XIII d : Nyangwe (Pg. 1075 pr. p.).

Acrocephalus coeruleus *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 135, t. 133; *Guerke* in *Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 312; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 359.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12446).

— — var. **genuinus** *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 166; *Th. Dur.* et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 226.

1882 (P. Pogge). — XIII d : Nyangwe (Pg. 1075, pr. p.).

— — var. **trichosoma** *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 166; *Th. Dur.* et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 226.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua, 9°5 (Pg. 358).

Acrocephalus cylindraceus *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 135; *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 31 [B. S. B. B. XXXVII, 76]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 357; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 340.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kasongo (Dew. 993). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Acrocephalus Debeerstii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo*, X (1901) 31 [B. S. B. B. XL, 37].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : le Tanganika (Deb.).

Acrocephalus Descampsii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo*, X (1901) 33 [B. S. B. B. XL, 39].

1891 (G. Descamps). — XVI : vallée du Lutembue (Desc. 42).

Acrocephalus Dewevrei *Briq.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 187 [nom. tant.].

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Acrocephalus divaricatus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 31 [B. S. B. B. XXXVII, 76]; *De Wild.* et *Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 188; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 364.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Acrocephalus elongatus *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 171; *Th. Dur.* et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 226; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 363.

1882 (P. Pogge). — XIII? : entre Nyangwe et Kimbundo (Pg. 1014).

Acrocephalus Hensii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 32 [B. S. B. B. XXXVII, 77]; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 363.

1888 (Fr. Hens). — V : marais du Stanley-Pool (Hens, B. 42).

Acrocephalus iododermis *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 167; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 226; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 358.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1086).

Acrocephalus Laurentii *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 34 [B. S. B. B. XXXVII, 79]; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 361.

1895 (Ém. Laurent). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Acrocephalus Masuianus *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 35 [B. S. B. B. XXXVII, 82]; *De Wild. et Th. Dur. Ill. fl. Cgo* (1898) 25, t. 13; *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 47 et *Pl. Gilletiana*, II (1901) 94 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 834]; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 363; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy-Cgo*, I (1906) 312.

1893 (P. Dupuis). — II a : forêts du Mayumbe (Dup.). — V : Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3039); Kisantu (Gill. 1109, 1144).

Acrocephalus paniculatus *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 172; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 226; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 364.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba, 8°5 lat. S. (Pg. 370).

Acrocephalus Poggeanus *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 170; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 226; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 358.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1086).

ORTHOSIPHON Benth.

Orthosiphon heterochrous *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 173; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 227; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 370.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg. 566).

Orthosiphon iodocalyx *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 174; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 227; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 374.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg. 353).

Orthosiphon Liebrechtsianus *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 40 [B. S. B. B. XXXVII, 85] et *Ill. fl. Cgo* (1899) 73, t. 37; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* V, 374.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa ; Mavunze (Desc.).

Orthosiphon retinervis *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 175; *Th. Dur.* et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 227; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 367.

1881 (von Mechow). — VI : Cisacula (Mech. 553).

Orthosiphon Welwitschii *Rolfe* in *Bolet. Soc. Brot.* XI (1893) 88; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 576.

O. adornatus *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 176.

Le type n'a été trouvé que dans l'Angola.

— — var. **oblongifolius** [*Briq.*] *Th.* et *Hél. Dur.*

O. adornatus *Briq.* var. — *Briq.* l. c. (1894) 177; *Th. Dur.* et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 227.

1881 (R. Buettner). — IV : Lutete (Buett. 570).

HOSLUNDIA Vahl.

Hoslundia verticillata *Vahl* *Enum. pl.* I (1804) 213; *Benth.* in *DC. Prodr.* XII, 54; *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 30 [B. S. B. B. XXXVII, 75]; *Guerke* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 348; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 860; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 174 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 311; II (1908) 340.

H. opposita *Vahl* var. — *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V (1900) 377.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Schimp. ; Pyn.). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XIII d : Romée (M. Laur.). — XVI : env. d'Albertville [Toa] (Hecq).

PLECTRANTHUS L'Hérit.

Plectranthus intrusus *Briq.* in *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 98 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 834].

1900 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.); Kisantu (Vanderyst).

Plectranthus miserabilis *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 180; *Th. Dur.* et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 227; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 405.

1881 (P. Pogge). — XVI : Mukenge (Pg. 1022).

Plectranthus phryxotrichus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 21 [B. S. B. B. XXXVII, 66]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 129; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 407.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : la Lulanga (Dew. 862 d).

Plectranthus Schlechteri *Guerke* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 311 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12490).

SOLENOSTEMON Schumach. et Thonn.

Solenostemon monostachyus [*P. Beauv.*] *Briq.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. IV, 3 a (1897) 359 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 24 [B. S. B. B. XXXVII, 69]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 189; *De Wild.* Miss. Laurent (1901) 174.

Ocimum — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 60, t. 95, fig. 1.

S. ocimoides *Schumach. et Thonn.* var. — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V (1900) 421.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Maydis (Vanderyst); env. de Léopoldville; Kimuenza (Dew.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur. 1943); Betutu (Brun.). — XII d : Kusumba (Schw.). — XV : Butala; Kondue; Lusambo (Ém. et M. Laur.).

— — var. **amplifrons** *Briq.* ex *Schinz* in B. Herb. Boiss. Sér. 2, VI (1906) 826.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens).

Solenostemon ocimoides *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 271; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 228; *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 22 [B. S. B. B. XXXVII, 67]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 420.

Coleus africanus *Benth.* Labiat. (1832) 54 et in *DC.* Prodr. XII, 74.

Solenostemon — *Briq.* in *Engl.* Jahrb. XIX (1894) 181, en obs.

1885 (R. Buettner). — II a : Bingila (Dup.). — VIII : Équateur (Buett.). — Ind. non cl. : Lone Island [Angola?] (Buett.).

AEOLANTHUS Mast.

Aeolanthus adenotrichus *Guerke* in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

1891 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 377).

Aeolanthus Buchnerianus *Briq.* in *Engl.* Jahrb. XIX (1894) 187; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 392.

1881 (Max Buchner). — Haut-Congo [Bangoj] (Buchn. 571).

Aeolanthus petasatus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 19 [B. S. B. B. XXXVII, 64]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 397.

1896 (G. Descamps). — XVI : Risobi (Desc.).

Aeolanthus Poggei *Guerke* in Engl. Jahrb. XXII (1895) 148; *De Wild.* et *Th. Dur.* Cens. pl. Congol. (1901) 45; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 397.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua vers 9 1/2° (Pg. 332).

Aeolanthus Pritzvitzianus *Guerke* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 383; *De Wild.* et *Th. Dur.* Cens. pl. Congol. (1901) 45; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 390.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw.).

COLEUS Lour.

Coleus bullulatus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 24 [B. S. B. B. XXXVII, 69]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 429.

Solenostemon — *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 180; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 227.

1876 (P. Pogge). — XV : la Haut-Lulua (Pg.).

Coleus Dewevrei *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 26 [B. S. B. B. XXXVII, 71]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1900) 190; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 428.

1896 (A. Dewèvre). — XIII : env. de Mutumbi (Dew. 1092 a).

Coleus Dupuisii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 25 [B. S. B. B. XXXVII, 90]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 51, t. 26; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 428.

1893 (P. Dupuis). — II a : forêts du Mayumbe (Dup.).

Coleus Eetveldeanus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 28 [B. S. B. B. XXXVII, 73]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 49, t. 25; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 442.

1895 (G. Descamps). — XVI : Toa (Desc.).

Coleus heterotrichus *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 34 [B. S. B. B. XL, 40]; *De Wild.* Miss. Laurent (1908) 340.

1891 (F. Demeuse). — V : Bolobo (Dem. 1155). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1944).

Coleus membranaceus *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 183; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 28; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 442.

1881 (von Mechow). — VI : Cisacula (Mech. 554).

Coleus mirabilis *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 183; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 440.

Le type croît dans l'Angola.

— — var. **Poggeanus** *Briq.* l. c. 184; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 228.

1876 (P. Pogge). — XV : la Haut-Lulua, 9° 5 lat. S. (Pg.).

Coleus nervosus *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 185; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 185; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 437.

1882 (P. Pogge). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1034).

Coleus Poggeanus *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 182; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 228; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 438.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 364).

Coleus viridis *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 181; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 443.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba (Pg. 365).

ALVESIA Welw.

Alvesia rosmarinifolia *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 55, t. 19; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 83, t. 42; Contr. fl. Cgo, II (1900) 50; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73, (1906) 312 et Miss. Laurent (1908) 339; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 378.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens): Léopoldville (Luja; Pyn. 163); entre Léopoldville et Kimpoko (M. Laur. 653); Dolo (Schlt.); Kisantu (Gill.; Vanderyst); Sanda (Odd.); env. de Lula-Lumene (Hendr.); Sadi [Inkisi] (Cabra et Michel); Kisunga (Vanderyst); Boko (Pyn. 110). — VI : entre Tumba et Popokabaka (Cabra et Michel). — XV : entre Kabuluka et Kanda-Kanda (Lescr. 231).

ANISOCHILUS Wall.

Anisochilus africanus *Bak.* ex *Scott Elliot* in Journ. Linn. Soc. XXX (1894) 94; *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 21

[B. S. B. B. XXXVII, 66]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 446; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 173, (1907) 339.

A. Engleri *Briq.* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 190; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229.

1876 (P. Pogge). — Bas-Congo (But. in Gill. 2232); — V : marais du Stanley-Pool (Hens, B. 86); rég. de Lumene (Hendr. in Gill. 3290); Boko (Vanderyst, 313); Yindu (Vanderyst). — VI : rég. de Lusubi (Leser. 44). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — XIII? : entre Nyangwe et Kimbundo (Pg. 1019). — XV : la Haut-Lulua, vers 9° 5 (Pg. 372).

PYCNOSTACHYS Hook.

Pycnostachys congensis *Guerke* in B. Herb. Boiss. IV (1896) 819; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 380.

1891? (G. Descamps). — XV : Samba (Desc. 28); Lusambo (Desc. 27).

Pycnostachys Descampsii *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 18 [B. S. B. B. XXXVII, 63]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 380.

1896 (G. Descamps). — XVI : Risobi (Desc.).

Pycnostachys Goetzenii *Guerke* in *von Goetzen* Durch Afrika (1895) 385 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr. A* (1895) 135; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 385.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga (Goetz. et Prittw. 98).

HYPTIS Jacq.

Hyptis brevipes *Poit.* in *Annal. Mus. Paris*, VII (1806) 465; *Benth.* in *DC. Prodr.* XII, 107; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 229; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 447; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 16 [B. S. B. B. XXXVII, 61]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 190; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 73, (1906) 311 et *Miss. Laurent* (1905) 173, (1908) 339.

1870 (G. Schweinfurth). — II : Boma (Dew.); île près de Ponta da Lenha (Naum.). — II a : Bingila (Dup.); Temvo (Ém. et M. Laur.); Lianga-Jema (Cabra). — V : collines du Stanley-Pool (Hens); entre Léopoldville et Mombasi (Gill.) Chenal (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Vanderyst). — VI : Kongo (Sap.). — VIII : env. d'Équateurville (Dew.); Coquilhatville; env. d'Eala (M. Laur.; Pyn.); Monsole (Huyghe et Ledoux). — XII b et c : entre Bambili et Amadis (Ser.). — XII d : rég. des Mangbettu (Schw.).

— — var. ***elongata*** *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae II (1900) 40 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, Sér. 2, I, 40].

1899 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 271); Kisantu-Makela (Gill. 3461); Kisantu (Gill. 681). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.).

Hyptis pectinata [L.] *Poit.* in *Annal. Mus. Paris*, VII (1805) 474, t. 30; *Briq.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 16 [B. S. B. B. XXXVII, 61]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 191; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 448; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 173, (1906) 339; et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 311.

Nepeta — *L. Syst. nat. ed. 10* (1759) 1076.

1870 (G. Schweinfurth). — I : Moanda (Gill.). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : marais du Stanley-Pool (Hens); Dolo (Schlt.); Kinshassa (Ern. Dew.; M. Laur.). — XII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.). — XII d : Kusumba (Schw.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Djumba-Djumba** [Bakusu]; **Bonengue** [Ikwangula]; **Kaiobo** [Kasongo]; **Katundula** [Tanganika] (Dew.).

Hyptis spicigera *Lam. Encycl. méth. Bot.* III (1789) 185; *Benth.* in *DC. Prodr.* XII, 87; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 230; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 17 [B. S. B. B. XXXVII, 62]; *De Wild. et Th. Dur. et Reliq. Dewevr.* (1901) 191; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 448; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1905) 73; *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, II (1903) 16-21 et *Miss. Laurent* (1908) 339.

1870 (G. Schweinfurth). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : env. de Léopoldville (Schlt.; Gill.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.); Monsole (Huyghe et Ledoux). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XII c : env. d'Amadis [cult.] (Ser.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XVI : Toa (Desc.).

MENTHA L.

Mentha sylvestris *L. Sp. pl. ed. 2* (1762) 804; *Benth.* in *DC. Prodr.* XII, 166; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II, 137; *Rechb. Pl. crit.* X, t. 982-984; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1903) 224; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 451.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Katinga** (Verd.).

LEONOTIS R. Br.

Leonotis africana [*P. Beauv.*] *Th. et Hél. Dur.*

Phlomis — *P. Beauv. Fl. d'Oware*, II (1807) 82, t. 111.

L. pallida *Benth. Labiat.* (1832) 619 et in *DC. Prodr.* XII, 535; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 491; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 338.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 739). — XII c : env. d'Amadis (Ser 209).

Leonotis Leonurus [L.] R. Br. in *Ait.* Hort. Kew. ed. 2, III (1811) 412; *Benth.* in *DC.* Prodr. XII, 536; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 492.

Phlomis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 587; *Bot. Mag.* (1800) t. 478.

Le type est indiqué dans l'Afrique trop. or.

— — var. **vestita** *Briq.* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 194; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 230.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 360).

Leonotis nepetaefolia [L.] R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 504; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 14 [B. S. B. B. XXXVII, 59]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 191; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 491; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 171 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 311; II (1908) 338.

Phlomis — *L.* Sp. pl. ed. 1(1753) 586.

1888 (Fr. Hens). — II : brousse de Boma. — Nom vern. : **Songo-Songo** (Dew.). — II a : Tshia (Dup.). — IV : Lukungu (Hens); Kitobola (Coll.); Banza-Putu. — Nom vern. : **Musonga-Songa** (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Kinselele** (Sap.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville; Eala (M. Laur.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XII c : entre Niangara et Gombari; env. d'Amadis (Ser.). — XIII a : Romée (M. Laur.). — XIII d : env. de Lusanga (Dew.). — XVI : Bunkeya; Toa (Desc.).

LEUCAS R. Br. (1)

Leucas Descampsii *Briq.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 14 [B. S. B. B. XXXVII, 59]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 485.

1896 (G. Descamps). — XVI : Moliro (Desc.).

ELSHOLTZIA Willd.

Elsholtzia Schimperii *Hochst.* ex *Vatke* in *Linnaea*, XXXVII (1871-1873) 325; *Briq.* in *B. Herb. Boiss.* II (1894) 133; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 451; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 224.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 488).

(1) Le **Leucas Poggeana** *Briq.* [in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 193; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 470] trouvé au bord de la Lulua par Pogge [n. 1122], ne serait, d'après M. Guerke [in *Engl. Jahrb.* XXII (1893) 132], qu'une forme pathologique de l'**Hyptis brevipes** Poit.

SCUTELLARIA L.

Scutellaria Debeerstii Briq. in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 12 [B. S. B. B. XXXVII, 57]; *De Wild et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 93, t. 47, fig. 1-7; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 462.

1894 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb. 42).

Scutellaria polyadena Briq. in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 11; X (1904) 29 [B. S. B. B. XXXVII, 56; XL, 35]; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1899) 93, t. 47, fig. 8-10; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 462.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb. 96).

TINNAEA Kotschy et Peyr.

Tinnaea platyphylla Briq. in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 194; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 230; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 498.

1876 (P. Pogge). — XVI : Musumba, 8° 5 lat. S. (Pg. 346).

MONOCHLAMYDEAE.**NYCTAGINACEAE****MIRABILIS L.**

Mirabilis Jalapa L. *Sp. pl.* ed. 1 (1753) 177; *Bot. Mag.* (1797) t. 371; *Choisy* in *DC. Prodr.* XIII², 427; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 174; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 41 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 41] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 191.

Nyctago — *DC. Fl. Franç.* III (1825) 425; *Spach* *Hist. des végét.* [Atlas] t. 146. 1895? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — V : Kisantu (Dew.).

BOERHAAVIA L.

Boerhaavia ascendens Willd. *Sp. pl.* I (1797) 19; *Choisy* in *DC. Prodr.* XIII², 451; *Ficalho* *Pl. Uteis*, 242; *Hiern* *Cat. Welw. Pl.* I, 882; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 53; II (1900) 51; *Pl. Thonnerianae* (1900) 14 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 243; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 243.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — II : Sisia (Dem.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu; env. de Dembo (Gill.); env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.); Maydis (Vanderyst). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (Pyn.); Isaka (Ém. et M. Laur.). — XII c : entre Zobia et Buta (Ser.). — XV : Lac Foa (Lescr.).

***Boerhaavia paniculata** *Rich.* in Act. Soc. hist. nat. Paris, I (1792) 105; *Choisy* in *DC.* Prodr. XIII², 450; *Griseb.* Fl. Brit. West-Ind. 69; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 231.

1885 (R. Buettner). — VIII : Équateurville (Buett.).

Boerhaavia plumbaginea *Cav.* Icon. et descr. pl. II (1793) 7, t. 112; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 883; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 192; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 121, (1906) 241.

B. dichotoma *Vahl* Enum. pl. I (1804) 290; *Choisy* in *DC.* Prodr. XIII², 454.

1895 (G. Descamps). — II : Zambi (Desc.). — XVI : Pweto (Dew.); Duela (Desc.).

Boerhaavia repens *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 3; *Choisy* in *DC.* Prodr. XIII², 453; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 882; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 51.

B. diffusa *L.* l. c. ed. 1 (1753) 3; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 121, (1906) 240.

1893 (G. Descamps). — XVI : Moliro; Toa (Desc.); Masange [Haut-Marungu] (Deb.).

BOUGAINVILLAEA Juss.

***Bougainvillaea spectabilis** *Willd.* Sp. pl. II (1800) 348; *Choisy* in *DC.* Prodr. XIII², 437; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 231; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 192; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 121, (1906) 241; II (1908) 243.

Josepha augusta *Vell.* Fl. Flumin. (1825) 154 et IV (1826) t. 16.

1893 (P. Dupuis). — I : Banana (Dup.). — V : Léopoldville (Ém. Duch.); Kisantu (Gill.). — VIII : cult. à Eala (M. Laur.).

AMARANTACEAE

CELOSIA L. (1)

Celosia argentea L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 205; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1767; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 243; *Boiss.* Fl. Or. IV, 987; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 231; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 51 et Reliq. Dewevr. (1901) 192; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 30; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 885; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 28; II (1906) 116 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 124.

1881 (P. Pogge). — Bas-Congo (Hens). — V : Tampa (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.); Tumba (Luja). — VI : entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel). — VIII : Coquilhatville (Schlt.; Ém. Laur.); Eala. — Nom vern. : **Bosambi** (M. Laur.). — IX : Nouvelle-Anvers (Duvivier); en aval de Mobeka (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Boja; Stanleyville (Ém. Duch.). — XIII d : Nyangwe (Dem.). — XV : env. de Djoko-Pundo (Lescr.); Mukenge (Pg.); Mange (Ém. et M. Laur.); Tshitadi (Lescr.). — XVI : Lukafu (Verd.); Toa (Desc.). — Ind. non cl. : Durga (Ser.); Kisimeme (Pg.). — Noms vern. : **ikonana** [Ikwangula]; **Nomana-Mana** [Kasongo].

Celosia laxa Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 141; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 437; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 232; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. XXXVI², 88]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 885; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 27, (1906) 239; II (1907) 125 et Miss. Laurent (1905) 81.

C. loandensis Bak. in Kew Bull. (1897) 277.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.): AC. dans tout le Bas-Congo (Dup.) — II : Zambi (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Chenal [Leo-Kwamouth] (Ém. et M. Laur.); Kimuenza; Kisantu (Gill.); env. de Dembo (Gill.). — VI : Mabibi (Sap.). — IX : pays des Bangala (Hens; Dem.); Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XII : Congo bor.-or. (Ser.). — XV : le Sankuru (Ém. et M. Laur.); Kanda-Kanda (Gent.); Ibaka (Ém. et M. Laur.).

Celosia leptostachya Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) 494; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 232.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens).

Celosia trigyna L. Mant. pl. II (1771) 212; *Jacq.* Hort. Vindob. III, 12, t. 15; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 241; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I,

(1) A. Dewèvre a récolté, dans l'enclave de Kabinda, à Landana, un **Celosia** nouveau qui lui a été dédié [Conf. **Celosia Dewevreana** Schinz in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1900) 10 [B. S. B. XXXIX², 102].

884; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 232; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI², 85]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 30; Miss. Laurent (1905) 81 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 27, (1906) 239; II (1907) 125.

1885 (R. Buettner). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Banza-Putu (Dem.); Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Buett.); Léopoldville et env. (Luja); env. de Kwamouth (But.); Suata (Buett.); Sabuka. — Nom vern. : **Tangana** (Ém. Laur.); env. de Dembo (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.); le Haut-Lopori (Biel.). — XIII a : env. de Stanleyville (Ém. Duch.). — XIV : Kisimeme (Pg.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.); Lac Foa (Lescr.); Mukenge (Pg.); Bena-Dibele (Luja); Mokole [Lubi] (Lescr.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kananana** (Verd.); le Lualaba (Desc) : env. d'Albertville [Toa] (Hecq).

DIGERA Forsk.

Digera arvensis *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 65; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 717; *Griff.* Icon. pl. Asiat. t. 527; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 717; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 232.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : Lisha (Hens).

AMARANTUS L.

Amarantus caudatus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 990; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 255; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 719; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 233; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 13 et Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 81 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 239.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dew.). — IX a : Mombanza (Thonn.). — XII c : Nala (Van Ryss.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Bionuda-lpeba** [Bangala]; **lpea** [Bashensi]; **lpheba** [Bolondo].

Amarantus paniculatus *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) 1406; *Willd.* Monog. Amar. 32, t. 4, fig. 2; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 257; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 718; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI², 85]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 53.

A. speciosus *Sims* in *Bot. Mag.* (1821) t. 2227.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — Ind. non cl. : brousse des bords du Lomami (Ém. Laur.).

Amarantus spinosus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 991; *Willd.* Monog. Amar. t. 4, fig. 8; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 260; *Wight* Icon. pl.

Ind. or. II, t. 513; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 718; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Miss. Laurent (1904) 81.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — Noms vern. : **Kitele** [Kasongo]; **Kibano-Bango** [Tanganika] (Dew.).

Amarantus viridis L. Sp. pl. ed. II (1763) 1405; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 720; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 233; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI², 85]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 193; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 81.

Euxolus — *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII² (1849) 274.

Chenopodium caudatum *Jacq.* Icon. pl. rar. II (1786-1793) t. 344.

Euxolus — *Moq.* in *DC.* l. c. XIII² (1849) 274; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1773.

1884 (R. Buettner). — Bas-Congo, CC. sur les bords du fleuve (Ém. Laur.). — II Boma. — Nom vern. : **Mocombe** (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — IV : Vungu (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Lulanga; Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Lunfundi (Dem.).

CYATHULA Lour.

Cyathula prostrata [L.] *Bl.* Bijdr. Fl. Nederl. Ind. II (1825) 549; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 226; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 233; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 194; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 28 et Miss. Laurent (1905) 81.

Achyranthes — L. Sp. pl. ed. 2 (1762) 296.

Desmochaeta — *DC.* Cat. Hort. Monspel. (1813) 102; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 733; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 890.

1888 (Fr. Hens). — V : env. de Léopoldville (Luja) : Lukungu; Lutete (Hens). — V : Kimuenza; Kisantu (Gill.). — VIII : Équateurville [Wangata]. — Nom vern. : **Ponluka** (Dew.). — IX : Bangala (Hens). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Kondue; Bukila (Ém. et M. Laur.).

PUPALIA Juss.

Pupalia lappacea [L.] *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII² (1849) 331; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 724; *Gilg.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 174; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI², 85]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 178.

Achyranthes — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 204.

Pupal — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 891.

1895 (P. Dupuis). — I : brousse de Banana (Dew.). — II : Boma (Gill.). — II a : Bingila (Dup.). — XVI : Lukafu (Verd.).

MECHOWIA Schinz

Mechowia grandiflora Schinz in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* III, 1 (1893) 110; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI², 85].

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.).

AERUA Forsk.

Aerua lanata [L.] Juss. in *Annal. Mus. Paris*, XI (1808) 131; *Moq.* in *DC. Prodr.* XIII², 226; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* IV, 728; *Wight Icon. pl. Ind. or.* II, t. 723; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 234; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 194; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 239; II (1907) 125.

Achyranthes — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 296.

1890 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Banza-Putu (Dem.); Kitobola (Pyn.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Equateur (Pyn.). — XI : Basoko (Dew.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XVI : Toa (Desc.). — Noms vern. : **Karikete** [Kasongo]; **Katingoko** [Tanganika] (Dew.).

ACHYRANTHES L.

Achyranthes angustifolia Benth. in *Hook. Niger Fl.* (1849) 492; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 234; *Gilg in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 174; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 52 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 194.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Goma (Hens); Kisantu; Kimu-enza (Gill. 2243). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.).

Achyranthes aspera L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) 204; *Wight Icon. pl. Ind. or.* V, t. 1780; *Moq. in DC. Prodr.* XIII², 314; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* IV, 730; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 234; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 39 [B. S. B. B. XXXVI², 85]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 194; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 125.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Dew.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.). — VI : le Kwilu (Sap.). — XIV : Kalamu (Coll.?). — XVI : Toa (Desc.). — Noms vern. : **Kolokasi** [Kalemba-Lemba] (Sap.); **Konko-Koso** [Kwilu] (Sap.).

Achyranthes rubro-lutea Lopriore in *Engl. Jahrb.* XXVII (1899) 57.

1896 (G. Descamps). — XVI : Lumbarazi [Lualaba]; Pweto (Desc.).

PANDIAKA Moq.

Pandiaka Heudelotii [Moq.] Benth. et Hook. f. Gen. pl. III (1880) 36; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 234.

Achyranthes — Moq. in DC. Prodr. XIII² (1849) 310.

1876 (P. Pogge). — XIV : Kisimeme (Pg.). — XV : Mukenge (Pg. 226).

TELANTHERA R. Br.

Telanthera maritima [St-Hil.] Moq. in DC. Prodr. XIII² (1849) 364; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 27; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V¹, 171.

Alternanthera — *St-Hil.* Voy. Brésil, II (1833) 437; *K. Schum.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. III, 1 a (1903) 15; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 195; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 240.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.); Banana (Dew. ; Wilw.).

ALTERNANTHERA Forsk.

Alternanthera repens [L.] Steud. Nomencl. bot. ed. 1, I (1821) 34; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 235; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 42; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 125.

Achyranthes — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 205.

Alternanthera Achyrantha R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 358; Moq. in DC. Prodr. XIII², 358; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V¹, 183, t. 55.

Alt. echinata *Sm.* in *Rees* Cyclop. Suppl. (1818) 10; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 896.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — IV : Lutete (Hens). — V : Léopoldville (M. Laur.); Kisantu (Gill.).

Alternanthera sessilis [L.] R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 417; *Wight* Icon. pl. Ind. or. II, t. 627; Moq. in DC. Prodr. XIII², 357; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 731; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 235; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 195; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 29 et *Miss. Laurent* (1904) 82.

Gomphrena — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 300.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool; Tamo (Hens); Kisantu (Gill.). — IX : Mobeka (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Ind. non cl. : Lonesland [Angola?] (Buett.). — Noms vern. : **Rakaba** [Bangala]; **Lokili** [Équateur].

GOMPHRENA L.

Gomphrena globosa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 224; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 409; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V¹, 218; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1784; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 53 et Pl. Gilletianae, I (1900) 42 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 42].

1896 (Ém. Laurent). — V : Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Ém. Laur.).

IREFINE L.

Iresine vermicularis [L.] *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII² (1849) 340; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V¹, 255; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 195; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 27.

Gomphrena — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 224.

Philoxerus — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 410; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 65, t. 98, fig. 1.

1893 (P. Dupuis). — I : Banana (Dup.; Dew.).

CHENOPODIACEAE

CHENOPODIUM L.

Chenopodium ambrosioides L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 219; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1786; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 72; *Seub.* in *Mart.* Fl. Brasil. V¹, 145; *Ficalho* Pl. Uteis, 243; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 898; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 53 et Reliq. Dewevr. (1901) 195; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1905) 80 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens); Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu; Dembo (Gill.). — VI : Tumba-Mani (Cabra et Michel). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XIII c : Ponthierville [Wabundu] (Dew.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Lungue** [Kasongo]; **Kabonguele**; **Vuma** [Tanganika] (Dew.).

***Chenopodium foetidum** *Schrad.* in Mag. Ges. Natur. Freunde Berlin (1808) 79; *Moq.* in *DC.* Prodr. XIII², 76; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 171; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 196.

C. graveolens *Lag.* et *Rodr.* in Annal. Cienc. Nat. V (1802) 70, t. 5.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : cult. à Elungu (Dew.).

***Chenopodium opulifolium** *Schrad.* in *DC. Fl. Française*, V (1805) 372; *Moq.* in *DC. Prodr.* XIII², 67; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* V, 3; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 171; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 196.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : cult. à Nyangwe (Dew.). — Nom vern. : **Muisambague** [Tanganika] (Dew.).

OBS. — Cette espèce est figurée dans le *Bot. Parisiense* de Vaillant, t. 7, fig. 1.

BASELLA L.

Basella alba *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 272; *Moq.* in *DC. Prodr.* XIII², 223; *Wight Icon. pl. Ind. or.* III, t. 896; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 196; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 233 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 244.

B. rubra *L. l. c. ed. 1* (1753) 272.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Ikenge; Inkongo (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew.). — Noms vern. : **Mantiri** [Lulanga]; **Krenda-Nameceka** [Kasongo].

PHYTOLACCACEAE

MOHLANA Mart.

Mohlana latifolia [*Lam.*] *Moq.* in *DC. Prodr.* XIII² (1849) 16; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 15; *Pl. Thonnerianae* (1900) 14 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 196; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 120; II (1907) 34 et *Miss. Laurent*, I (1906) 233; II (1908) 244.

Rivina — *Lam. Ill. genr. Encycl.* I (1792) 324.

Hillieria elastica *Vell. Fl. Flumin.* (1825) 47; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 900.

R. inaequalis *Hook. Icon. pl.* II (1837) t. 130.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Lukolela (Dew.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (Pyn.; M. Laur.); Losombo [Lulanga]. — Nom vern. : **Montutu** (Dew.); **Bala-Lundji**. — Nom vern. : **Bompoto** (Pyn.). — IX a : Mombanza (Thonn.).

PHYTOLACCA L.

Phytolacca abyssinica *Hoffm.* in *Comm. Gott.* XII (1796) 25, t. 2; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 175; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 80 [B. S. B. XXXVII, 125]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 196; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 31; *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 34 et *Miss. Laurent* (1906) 233.

Pircunia abyssinica Moq. in DC. Prodr. XIII² (1849) 30.

Phyt. dodecandra L'Herit. Stirp. nov. (1789) 113, t. 69; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 901.

1896 (A. Dewèvre). — II a : route de Tshoa à Tshia (Dew.). — IV : Nord-Manyanga (Cabra et Michel). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Tori** (Gill.); env. de Sanda (Odd.); Dembo (Gill.). — VI : route de Kikwit à Boala (Lescr.); Madibi (Sap.). — VII : rég. du Lac Léopold II. — Nom vern. : **lto** (Body); Kiri (M. Laur.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); Botacom [Ikelemba] (M. Laur.); Bombimba (M. Laur.). — IX : Upoto; Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XII a : Niangara (Ser.). — XIII a : Romée (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XV : le Kasai (Dem.); le Sankuru (Sap.). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Musenge** (Verd.).

P. abyssinica var. **macrophylla** De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonneriana (1900) 15.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 33).

Phytolacca stricta Hoffm. in Comm. Gott. XII (1796) 27, t. 3; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 121.

Pircunia — Moq. in DC. Prodr. XIII² (1849) 30.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kimuenza (Gill. 2165).

POLYGONACEAE.

POLYGONUM L.

Polygonum acuminatum Kunth in H. et B. Nov. gen. et sp. pl. II (1817) 178; Meisn. in DC. Prodr. XIV, 114 et in Mart. Fl. Brasil. V¹, 14, t. 4; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 235.

1885 (R. Buettner). — VI : Kingunshi (Buett.).

Polygonum barbatum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 518; Wight Icon. pl. Ind. or. V, t. 1798; Meisn. in DC. Prodr. XIV, 104; Dammer in Engl. Pfl. Ost-Afr. 169; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletiana, I (1900) 42 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 42]; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228; II (1908) 242.

1900 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill.); Lukolela (Pyn.). — VIII : Eala (Pyn.).

Polygonum lanigerum R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 419; Meisn. in DC. Prodr. XIV, 117; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 35; Dammer in Engl. Pfl. Ost-Afr. 170; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 904; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 120.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.). — VIII : env. d'Eala (Ém. Laur.).

P. lanigerum var. **africanum** *Meisn.* l. c. XIV (1856) 117; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 170; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 904; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 53 et Reliq. Dewevr. (1901) 197; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 80 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 33.

P. lanigerum *Meisn.* in *Linnaea*, XIV (1840) 85.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew.). — V : Léopoldville (M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — IX : Nouvelle-Anvers (Ém. Duch.); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XV : Dibele (Ém. et M. Laur.).

Polygonum senegalense *Meisn.* Monog. gen. Polyg. prodr. (1826) 54 et in *DC. Prodr.* XIV, 123; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 170; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 236; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 904; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 178 et Miss. Laurent (1905) 84.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Ém. et M. Laur.); Ponta da Lenha (Naum.). — III : env. de Matadi (Jos. Duch.). — XVI : Albertville; (Hecq); Lukafu. — Nom vern. : **Lobwe** (Verd.). — Ind. non cl. : Lone-Island [Angola?] (Buett.).

Polygonum serrulatum *Lag.* Gen. et sp. pl. nov. (1816) 14; *Meisn.* in *DC. Prodr.* XIV, 110; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 169; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 53 et Reliq. Dewevr. (1901) 197; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 238; II (1908) 243.

1895 (Gust. Debeerst). — II a : Shinganga; bord du Tshaf à Zobe (Dew.). — V : Kisantu et env. C. (Gill.); Dembo; Kinkosi (Vanderyst). — XVI : rég. du Tanganika (Deb.).

Polygonum tomentosum *Willd.* Sp. pl. II (1799) 219; *Meisn.* in *DC. Prodr.* XIV, 124; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 38; *Dammer* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 176; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 905; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 43 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 43]; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 80 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228; II (1907) 33, (1908) 243.

1900 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Lukolela (Pyn.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Huyghe). — XII d : route de Vankerkhovenville à Faradje (Ser.). — XV : entre Lubue et Kanda-Kanda (Lescr.).

RUMEX L.

Rumex abyssinicus *Jacq.* Hort. Vindob. III (1776) 48, t. 93; *Campd.* Monog. Rum. 67, 108, t. 3; *Meisn.* in *DC.* Prodr. XIV, 68; *Dammer* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 169; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1900) 95 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 835]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 905; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 79 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.*, II (1908) 242.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Ikenge (Ém. Laur.); Eala (M. Laur.; Pyn.).

BRUNNICHIA Banks.

Brunnichia africana *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1872) 61; *Hook.* Icon. pl. XIX (1881) 21, t. 1328; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 905; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 197; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.*, I (1903) 25; II (1908) 243.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.); Eala et env. (M. Laur. 732; 1967; Pyn. 543, 1380, 1400); le Haut-Lopori (Biel.); Mondjo (Pyn. 318). — IX : Bumba (Pyn.).

— — var. **glabra** *Dammer* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 230.
1900 (J. Krekels). — IX : Umangi (Krek.).

Brunnichia congoensis *Dammer* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 357.

B. africana *Welw.* var. *erecta* *Buett.* in Mitt. Afrik. Gesellsch. (1888) 257; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 236.

1885 (R. Buettner). — Entre Équateurville [VIII] et Lukolela [V] (Buett.).

PODOSTEMACEAE

TRISTICHA Thou.

Tristicha alternifolia [*Willd.*] *Thou.* ex *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 22; *Tul.* in Annal. sci. nat. Sér. 3, XI (1849) 111 et Monog. Podost. 180; *Wedd.* in *DC.* Prodr. XVII, 45; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.*, II (1907) 16.

Dufourea — *Willd.* in Ges. Nat. Freunde Mag. Berlin, VI (1814) 63.

1895 (A. Dewèvre). — XIII d : Lambá [Kasongo] (Dew. 997); rapides d'Ambani près Nyangwe (Dew. 902).

DICRAEA Thou.

Dicraea Warmingii *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 135; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 236.

1881? (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1379).

DICRAEANTHUS Engl.

Dicraeanthus africanus *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXVIII (1905) 96 [fig. 1, p. 95].

1882 (P. Pogge). — XV : ile Mopinga [la Lulua] (Pg. 1431).

LEIOCARPODICRAEA Engl.

Leiocarpodicraea quangensis [*Engl.*] *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXVIII (1905) 98.

Dicraea — *Engl.* l. c. XX (1894) 134; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 236.

1885 (E. Teusz). — VI : chutes Bismarck sur le Kwango (Teusz).

HYDROSTACHYS Thou.

Hydrostachys Bismarckii *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 137; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 236.

1880 (E. Teusz). — VI : chutes Bismarck sur le Kwango (Teusz in von Mechow. 506).

CYTINACEAE**PILOSTYLES Guill.**

Pilostyles aethiopica *Welw.* in *Trans. Linn. Soc.* XXVII (1869) 67, t. 22; *Hook. f.* in *DC. Prodr.* XVII, 114; *Hiern Cat. Welw. Pl. I.*, 908; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 31.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 532).

ARISTOLOCHIACEAE**ARISTOLOCHIA L.**

Aristolochia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* *Mat. fl. Cgo*, III (1899) 38 [B. S. B. B. XXXVIII², 46]; *Ill. fl. Cgo* (1899) 107, t. 54 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 197.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambézi (Dew. 201).

Aristolochia Schweinfurthii *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1898) 492.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3507).

Aristolochia triactina *Hook. f.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1865) 186; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 53; *De Wild. Miss. Laurent* (1907) 379.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Gumbumi (M. Laur. 632); Bombaie (Ém. et M. Laur.).

PIPERACEAE

PIPER L.

Piper guineense *Schumach. et Thonn.* *Beskr. Guin. Pl.* (1827) 19; *C. DC.* in *DC. Prodr.* XVI¹, 343; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 237; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 912; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 198; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 68 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 236.

Cubeba Clusii *Miq. Syst. Piperac.* (1844) 304.

Piper — *C. DC.* in *DC. Prodr.* XVI¹ (1869) 340; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 237.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — V : Sanda (De Brouw.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Bolombo (Ém. Laur.). — XIII d : Kasongo (Dew.). — XV : le Sankuru; le Kasai (Dem.); Pinda (Cabra et Michel); le Lomami (Dem.). — Noms vern. : Keleketon [Ikwangula]; Geto [Kasongo]; Monkengue [Tanganika] (Dew.).

— — var. **Gilletii** *C. DC.* ex *De Wild.* in *Rev. cult. colon.* II (1901) 133; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 95 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 835].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1215). — Ind. non cl. : crête entre Nindi-Kwilu et le Congo [au N. du Kaongo] (Cabra et Michel).

— — var. **Thomeanum** *C. DC.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 198; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 31.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Dew.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — Nom vern. : Bopamputi. — Ind. non cl. : crête entre Nindi et le Congo [au N. du Kaonga] (Cabra et Michel).

P. guineense var. **velutinum** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 30.

1904 (Éd. Lescreauwaet). — VI : Luanu (Lescr. 75). — XII a : route de Buta à Bima (Ser. 125).

Piper Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 229.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Injolo. — Nom vern. : **Boloko** (Lamb. in M. Laur. 918). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.).

Piper subpeltatum *Willd.* Sp. pl. I (1798) 166; *C. DC.* in *DC.* Prodr. XVI¹, 333; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 95; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 199; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 37; Miss. Laurent (1905) 68 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 240.

Pothomorphe — *Miq.* Syst. Piperac. (1843-1844) 213 et Illustr. Piperac. 29, t. 26; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1925.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem. : Dew.). — V : Lukolela (Hens); Kisantu (Gill.). — Nom vern. : **Kame-Nene**. — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Bangala (Hens). — XIII d : Kasongo (Dew.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (Sap.). — XVI : env. de Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **Kame-Nene** [Lukafu] (Verd.); **Lokuku** [Ikwangula]; **Nomlo-Nomlo** [Bakusu]; **Ilotça** [Kasongo] (Dew.); **Dolombo** [Sankuru] (Sap.).

— — var. **parvifolium** *C. DC.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 80 [B. S. B. B. XXXVII, 125]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 54 et Reliq. Dewevr. (1901) 199.

1895 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 564). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : env. d'Équateurville (Dew.).

Piper umbellatum *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 30; *Jacq.* Icon. pl. rar. II, t. 216; *Descourtilz* Fl. des Antilles, I, 177, t. 37; *C. DC.* in *DC.* Prodr. XVI¹, 332; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 237.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Hens, 355).

***Piper unguiculatum** *Ruiz* et *Pav.* Fl. Peruv. et Chil. I (1794) 34, t. 37, fig. B; *C. DC.* in *DC.* Prodr. XVI¹, 249; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 230.

P. glaucescens *Jacq.* Eclog. pl. (1811-1816) t. 76.

1903 (Ém. et Marc. Laurent) — VI : mission de Wumbali (Ém. et M. Laur.). — Espèce probabl. introd.

PÉPEROMIA R. et P.

Peperomia fernandopoana C. DC. in DC. Prodr. XVI¹ (1869) 397; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I. 913; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 119.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

MYRISTICACEAE

MYRISTICA L.

Myristica angolensis Welw. Synop. expl. (1862) 51; *Ficalho* Pl. Uteis, 246; *Christy* New comm. Pl. (1885) 26; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 913.

Pycnanthus Kombo Warb. var. — Warb. [Monog. Myrist.] in Nov. Act. Acad. Nat. Curios. LXVIII (1897) 257.

M. Kombo Baill. var. — *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 85.

1900 (J. Gillet). — II a : Benza-Masola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — XI : Barumbu. (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Bosenge** [Équateur]; **Elumba** (Ém. et M. Laur.).

LAURACEAE (1)

CASSYTHA L.

Cassytha filiformis L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 35; *Wight* Icon. pl. Ind. or. V, t. 1847; *Hook.* Exot. Fl. t. 167; *Meisn.* in DC. Prodr. XV¹, 255; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 188; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 238; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 116 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1906) 244.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Vanderyst). — V : env. de Lemfu (But.); Kisantu (Gill.).

— — var. **guineensis** [Schumach. et Thonn.] *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 86.

C. guineensis Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) 199.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.).

(1) Le *Persea gratissima* Gaertn. de l'Amérique trop. se rencontre cultivé ou échappé des cultures à Kisantu [V] (Gill.) et à Eala [VIII] (Em. et M. Laur.) [Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 379].

PROTEACEAE

PROTEA L.

- Protea angolensis** *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 588; *Th. Dur.*
• et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 80].

Leucadendron — *Hiern* Cat. Welw. Pl. I (1900) 917; *De Wild.* Étud. fl. Bas-
et Moy.-Cgo, I (1906) 238.

1895 (Gust. Debeerst). — V : Kisantu-Makela (Van Houtte in Gill. 3462). —
XVI : Haut-Marungu (Deb.).

- Protea ferruginea** *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1891-1892) 197 [nom.
tant.].

1880? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1415).

- Protea Lemairei** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 30.

1899 (Ch. Lemaire). — XVI : plateau entre le Nyassa et le Tanganika (Lem.);
Lukafu (Verd.).

- Protea Poggei** *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1891-1892) 197 [nom. tant.].

1880? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 413).

FAUREA Harv.

- Faurea saligna** *Harv.* in Hook. Lond. Journ. of Bot. VI (1847) 373,
t. 15 et Cat. Welw. Pl. I, 921; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 164; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

THYMELAEACEAE

GNIDIA L.

- Gnidia apiculata** *Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 263.

G. involucrata *Steud.* var. — *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 143.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

- Gnidia Butayei** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 170.

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 1989).

Gnidia flava *Lindl. ex Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, I (1840) 697;
Gilg in Engl. Jahrb. XIX (1894) 258; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl.
Cgo (1896) 238.

1891 (G. Descamps). — XIII d : Kasongo (Desc.). — XVI : le Katanga (Desc.).

Gnidia katangensis *Gilg et A. Dewèvre* in Engl. Jahrb. XIX (1894)
276; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 238.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : Katete [Katanga] (Corn.); Kitope (Desc.).

Gnidia Oliveriana *Engl. et Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 262;
Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 239.

Lasiosiphon Oliveri *Vatke ex Engl. et Gilg.* l. c. XIX (1894) 264, in syn.

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1414).

Gnidia Poggei *Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 259; *Th. Dur. et*
Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 239.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg.).

Gnidia rubrocincta *Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 259; *Th. Dur.*
et Schinz. Étud. fl. Cgo (1896) 259.

1876 (P. Pogge). — VI : le Kwango (Pg.).

DICRANOLEPIS Planch.

Dicranolepis Baertsiana *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II
(1900) 54.

1899 (Alph. Cabra). — Ind. non cl. : forêt de Kabombo (Cabra). — Nom vern. :
Tesi (Cabra).

Obs. — La Mission Cabra a trouvé une espèce fort voisine de celle-ci dans la
forêt d'Inteba [*Conf. De Wild. et Th. Dur.* l. c. in obs.].

Dicranolepis convalliodora *Gilg* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 271;
Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 239; *De Wild. et Th. Dur.*
Contr. fl. Cgo, II (1900) 55 et Reliq. Dewevr. (1901) 199; *De Wild.*
Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1904) 170.

1881 (P. Pogge). — Congo (Dem.). — V : env. de Lukolela (Dew. 1802); Sanda
(Odd. in Gill. 3013). — XV : Mukenge (Pg. 1408).

Dicranolepis Thonneri [*De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De*
Wild. Mat. fl. Cgo, IV (1899) 37 [B. S. B. B. XXXVIII², 114]; *De*
Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae (1900) 29, t. 10.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Boyangi (Thonn. 62).

PEDDIEA Harv

Peddiea longipedicellata *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 256 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 283.

Le type est indiqué dans le Nyassaland.

— — var. **multiflora** *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 94.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 565).

LORANTHACEAE**LORANTHUS L.**

Loranthus alatus *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 175.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kakobwoi-Kobwoi** (Verd. 498).

Loranthus Albizziae *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 74.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.).

Loranthus Buchneri *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 114, t. 2, fig. E; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 239.

1880 (Max Buchner). — I : Banana (Buchn. 506).

Loranthus Butayei *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1903) 28.

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2248). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill.).

Loranthus capitatus [*Spreng.*] *Engl.* in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV* (1897) 131; *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo, II* (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126].

Exostemma — *Spreng. Neue Entdeck. II* (1821) 143.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

— — var. **latifolius** *Engl.* ex *Th. Dur.* et *De Wild. Mat. fl. Cgo, II* (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126]; *De Wild.* et *Th. Dur. Pl. Gilletianae, II* (1901) 96 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 836] et *Reliq.*

? **Loranthus constrictiflorus** *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 119, t. 3, fig. a; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 240.

1880 (P. Poggè). — Ind. non cl. : Bolama (Angola?) (Pg. 1322).

Dewevr. (1901) 200; *De Wild.*. Miss. Laurent (1905) 75 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 237; II (1907) 124.

1895 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Gill. 3618). — II a : Temvo; la Lukula (Ém. et M. Laur.). — IV : Luvituku (Ém. et M. Laur.). — V : Léopoldville (Dew. 479; M. Laur. 693); Kisantu (Gill. 1238; M. Laur. 404). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Malepie; Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Pyn. 405). — XV : Mushenge (Lescr. 388).

Loranthus Cornetii A. Dewèvre in B. S. B. B. XXXIII² (1894) 106 et XXXIV² (1895) 92; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 240.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Loranthus crassicaulis Engl. in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 7 [B. S. B. B. XXXIX², 30]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 200; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 29.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Shinganga (Dew. 1278). — V : rég. de Ki-muenza (Gill. 2036).

Loranthus Demeusei Engl. in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 6 [B. S. B. B. XXXVII², 29].

1891 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dem. 355).

Loranthus Descampsii Engl. in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 132 [nom. tant.]; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 2 [B. S. B. B. XXXIX², 25].

1891 (G. Descamps). — Ind. non cl. : le Lomami, 8° 30 (Desc.).

Loranthus discolor Engl. in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 131 [nom. tant.]; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 3 [B. S. B. B. XXXIX², 26]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 53; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 75.

1891 (Ém. Laurent). — V : le Stanley-Pool; route des Caravanes (Ém. Laur.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

Loranthus Durandii Engl. in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 4 [B. S. B. B. XXXIX², 27]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 201; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 75.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Eala (M. Laur. 51, 203); Basankusu. — Nom vern. : Mpoi (Dew. 775 a); entre Lulanga [VIII] et Bangala [IX] (Dew. 858).

Loranthus elongatus *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 87, t. 34 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 124.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Irebu (M. Laur. 658). — XV : Bulebu (Ém. et M. Laur.).

Loranthus irebuensis *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 76, t. 35.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.).

Loranthus Kimuenzae *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 29, (1906) 237, t. 54.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1665).

Loranthus kisantuensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 43 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 43].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 67).

Loranthus Laurentii *Engl.* in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 132 [nom. tant.]; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 3 [B. S. B. B. XXXIX², 26]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 54; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 77 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 237; II (1907) 124.

1896 (Ém. Laurent). — V : env. de Kisantu (Gill.); Sanda (Odd. in Gill. 384). — VIII : env. d'Eala (Ém. Laur. 1189); Bombinba (M. Laur. 1587). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XII : Guago (Ser. 278). — XII c : env. d'Amadis (Ser. 340).

Loranthus Lujaei *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 55.

1899 (Éd. Luja). — XV : Bena-Dibele [Kasai] (Luja).

Loranthus luluensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 128, t. 3, fig. F; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 240.

1883 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1404).

Loranthus mangheensis *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 77, t. 36.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.).

Loranthus mayombensis *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 78.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : le Mayumbe; Benza-Masola (Ém. et M. Laur.).

Loranthus micrantherus *Engl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 5 [B. S. B. B. XXXIX², 28].

1895 (P. Dupuis). — IV : près de la Gomuela; bords de la Mangolu (Dup.).

Loranthus nigrescens *De Wild.* et *Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1902) 177, t. 89; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 29, (1906) 237.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 3236). — VI : vallée de la Djuma (Gent, et Gill. 2745).

Loranthus ogowensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 117; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 44 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 44] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 201; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 79 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 237; II (1907) 124.

1896 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill. 3235). — V : Kisantu (Gill. 545); env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateurville [Wangata] (Dew. 646 a); Monzambi (Brun. in M. Laur. 1581). — IX : Nouvelle-Anvers (De Giorgi, 5). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

Loranthus polygonifolius *Engl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 6 [B. S. B. B. XXXIX², 29]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 201.

1896 (A. Dewèvre). — IX : pays des Bangala (Dew. 875).

Loranthus Poggei *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 116; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 240.

1882 (P. Pogge). — XV : bassin du Kasai (Pg.).

Loranthus Pungu *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 175.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 388).

Loranthus rubiginosus *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 173.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lac Moero (Verd.).

— — var. **grandiflorus** *De Wild.* l. c. (1903) 174.

Cette variété, rapportée par M. G. Descamps, a-t-elle été récoltée dans le Congo ou au Nyassaland?

Loranthus Thonneri *Engl.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 12, t. 23 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 202; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 124.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Bulandaponda** (Dew.). — IX a : Bokape près Gali (Thonn. 61). — XI : Yambuya (M. Laur. 1847).

VISCUM L.

Viscum congolense *De Wild.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 44 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 44]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 79.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 382, 573). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.).

Viscum Gilletii *De Wild.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 44 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 44].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 485).

Viscum lenticellatum *De Wild.* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 45 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 45].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 686).

Viscum obscurum *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1794) 31; *DC.* Prodr. IV, 285; *Harv.* in *Harv. et Sond.* Fl. Capens. II, 579.

Le type croît dans l'Afrique australe.

— — var. **decurrens** *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 132; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 31, 237.

1903 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 3619). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

SANTALACEAE

THESIUM L.

Thesium doloense *Pilger* in *Engl. Jahrb.* XL (1907) 58.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt.).

BALANOPHORACEAE

THONNINGIA Vahl.

Thonningia sanguinea *Vahl* in *Dansk. Selsk. Skrift*, VI (1810) 124, t. 6; *Eichl.* in *DC.* Prodr. XVII, 142; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 169; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonneriana (1900) 13; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 79 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 120; II (1907) 33.

1895 (Ém. Laurent). — V : Kinshassa (Schlt.); Kimuenza (Gill.); Bokala (M. Laur.). — VII : Malepie (Ém. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Bombimba (M. Laur.). — IX : forêts de la Lubefu (Ém. Laur.). — IX a : Bobi; Kanga (Thonn.). — XV : Munungu; Dibebe (Ém. et M. Laur.).

EUPHORBIACEAE

MONADENIUM Pax.

Monadenium Descampsii *Pax* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 63 [B. S. B. B. XXXVII, 108].

1891 (G. Descamps). — XVI : entre les lacs Tanganika et Moero, 8° 20 lat. S. (Desc.).

EUPHORBIA L.

? **Euphorbia cyparissioides** *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 123; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 951; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 289.

1893 (G. Descamps). — Du Nyassaland au Congo (Desc.).

Euphorbia decumbens *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) p. CXII; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 940.

E. indica *Lam.* Encycl. méth. Bot. II (1786) 423; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 22; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 62 [B. S. B. B. XXXVII, 107]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 202; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 142, cum xyl. 23 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 279.

1891 (F. Demeuse). — I : Moanda (Gill.). — II : env. de Boma. — Nom vern. : **Vita-Kabele** (Dew.). — IV : Luvituku (Dem.); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Kimuenza (Gill.). — VI : Madibi. — Nom vern. : **Moshin-shieli** (Sap.); Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XV : le Sankuru. — Nom vern. : **Tshikolokose** (Sap.). — XVI : Toa (Desc.).

Euphorbia graminea *Jacq.* Stirp. Amer. hist. (1763) 151; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 54; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 63 [B. S. B. B. XXXVII, 108]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 204.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew.).

Euphorbia Grantii *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1873) 144, t. 93; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 63 [B. S. B. B. XXXVII, 108].

1893 (G. Descamps). — XVI : Moliro (Desc.).

Euphorbia Hermentiana *Ch. Lem.* in Ill. hort. V (1858) misc. 63; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 82; *Johnst.* The River Congo, 245, cum xyl.; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 240; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 53; *Pax* in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 72; *Berger* Sukkul. Euphorb. (1907) 50, fig. 13.

1883 (H. Johnston). — Ind. non cl. : Itamba (Johnst.).

OBS. — Euphorbe plantée partout dans les villages, formant des palissades (Ém. Laur.).

Euphorbia hypericifolia *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 454; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 23; *Hook.* Exot. Fl. I, t. 36; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. IV, 249; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 241; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 142.

1888 (Fr. Hens). — I : Banana (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens).

Euphorbia Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 289.

1905 (Marc. Laurent). — VII : Bamania (M. Laur. 803). — XII d : route de Bambili à Amadis (Ser. 251). — Espèce cultivée à Eala [VIII] (M. Laur. ; Pyn. 696).

Euphorbia pilulifera *L.* Amoen. acad. III (1756) 114; *Jacq.* Icon. pl. rar. III, t. 478; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 21; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 241; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 52; II (1900) 56 et Reliq. Dewevr. (1901) 203; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 80; Miss. Laurent (1905) 142 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 280.

1884 (R. Buettner). — II : Boma (Dew.). — III : Tondoa (Buett.). — V : env. de Léopoldville (Gill.); env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.). — VII : Lac Léopold II (Dem.). — IX : Bangala (Hens); Upoto (Wilw.). — XV : Butala (Ém. et M. Laur.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.); Lukafu (Verd.).

Euphorbia Poggei *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 118; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 241; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 62; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 80.

1870 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua (Pg.). — XVI : Toa (Desc.); Lukafu (Verd.).

Euphorbia prostrata *Ait.* Hort. Kew. ed. 1, II (1789) 139; *Boiss.* Icon. Euphorb. (1866) t. 17 et in *DC.* Prodr. XV², 47; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 942; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 142 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 280; II (1908) 289.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 4059). — II : Boma (Ém. et M. Laur. ; Pyn.).

Euphorbia Quintasii *Pax* in Bolet. Soc. Brot. X (1892) 156; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 46 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 46]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 291.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 28); Kisinga (Vanderyst).

Euphorbia Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 290, t. 80.

1906 (A. Sapin). — VI : brousse de Madibi. — Noms vern. : **Kipanlua**; **Banzua**; **Maicle** (Sap.).

Euphorbia Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 290.

1906 (F. Seret). — XII c : rocher de Goi [à 6 h. de Gombari] (Ser.).

***Euphorbia splendens** *Boj.* ex *Hook.* in Bot. Mag. (1829) t. 2902; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 79; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 280; *Berger* Sukkul. Euphorb. (1907) 31, fig. 6.

1900 (J. Gillet). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.). — Plante cultivée. ?

Euphorbia thymifolia *Burm.* Fl. Ind. (1768) 2; *J. Burm.* Thes. Zeylan. t. 105, fig. 2; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 47; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 252; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 142 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1906) 280; II (1908) 291.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); env. de Yumbi (M. Laur.). — XV : le Kasai, au poste de bois n. 6 (Ém. Laur.).

Euphorbia Tirucalli *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 452; *Boiss.* in *DC.* Prodr. XV², 96; *Ficalho* Pl. Uteis, 248; *Brandis* Forest Fl. 439; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 254; *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 242; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 241; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 949; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 203; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 143; *Berger* Sukkul. Euphorb. (1907) 22.

1874 (E. Pechuel-Loesche). — Bassin du Congo (Pech.-Loesche). — Planté dans tous les villages du Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.).

Euphorbia tumbaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1906) 29.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Euphorbia Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 280.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 309).

BRIDELIA Willd.

Bridelia micrantha [*Hochst.*] *Baill.* in *Adansonia*, III (1862-1863) 164; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV² (1866) 498; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 200; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 275; II (1908) 276.

Candelaria — *Hochst.* in *Flora*, I (1843) 79.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.). — II : île près de Malela (Dew.). — V : rég. de l'Inkisi (Gill.). — VIII : Eala (Pyn.). — IX a : Mobeka (Pyn.). — XII d : env. de Faradje (Ser.). — Ind. non cl. : Gambi (Dew.).

— — var. **ferruginea** [*Benth.*] *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV² (1866) 498; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 46 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 46]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 128 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 276.

B. ferruginea *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 511; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 954.

1900 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Pyn. 36). — V : env. de Kwamouth; env. de Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — Noms vern. : *Katasukile* [Sankuru]; *Bolanga* [Bangala].

- Bridelia scleroneura** *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 515 et in *DC. Prodr.* XV², 496; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 46 [B. Herb. Boiss. Sér. 2. I, 46] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 200.
1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 419). — V : Kisantu (Gill. 135).

- Bridelia stenocarpa** *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 515 et in *DC. Prodr.* XV², 494; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 61; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 242.
1875 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum.).

- Bridelia tenuifolia** *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* II (1864) 328 et in *DC. Prodr.* XV², 495; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 953; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 200.
1899 (A. Dewèvre). — Congo (Dew. 1171).

- Bridelia Zenkeri** *Pax* in *Engl. Jahrb.* XXVI (1899) 327; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 276.
1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 1252; Pyn. 1376, 1677).

PSEUDOLACHNOSTYLIS Pax.

- Pseudolachnostylis Verdickii** *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 205.
1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musadi** (Verd. 33).

CLEISTANTHUS Hook. f.

- Cleistanthus caudatus** *Pax* in *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 49 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 203.
1896 (A. Dewèvre). — XI : Bena-Kamba (Dew. 1099).

CROTON L.

- Croton angolensis** *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* II (1864) 339; *Ficalho* Pl. Uteis, 251; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 969; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 276.
1901 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 2012).
- Croton congensis** *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 276.
Ann.? (Coll.?). — Congo (Coll.?).

Croton Draconopsis *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 338 et in *DC.* Prodr. XV², 522; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 970; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 377.

Ann.? (Coll.?). — IV : distr. des Cataractes. — Nom vern. : **Gula-Gwedi** (Coll.?).

Croton Mubango *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 338 et in *DC.* Prodr. XV², 514; *Ficalho* Pl. Uteis, 969; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 969; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 96 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 836] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 208; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 128 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1706) 276; II (1908) 277.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Boala (Leser.). — XV : Kanda-Kanda (Gent.); Lusambo (Ém. et M. Laur.): Kitebwa [Lulua] (Gent.). — Ind. non cl. : Bena-Lekula (Dew.). — Noms vern. : **Kalamato**; **Lusube** [Tanganika] (Dew.).

Croton oxypetalus *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 339 et in *DC.* Prodr. XV², 543; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 971; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 277.

1901 (J. Gillet). — V : Dembo (Gill. 2108); env. de Kisantu. — Nom vern. : **Guba-Gwela** (Swannet); entre Kisantu et le Kwango (But. in Gill. 3725). — XII c : entre Amadis et Poko (Ser. 843). — XV : Lubue (Ém. et M. Laur.).

Croton Poggei *Pax* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 534; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 244.

1876 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1368).

OBS. — Le **Croton Tiglium** *L.* est cultivé à Eala [VIII] (Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 128).

Croton Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 277.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Yama-Yumbi** (Verd. 398).

Croton Welwitschianus *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 338 et in *DC.* Prodr. XV², 515; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 970.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 320).

Croton zambesiacus *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 483 et in *DC.* Prodr. XV², 515; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 278.

1906 (F. Seret). — XII d : village Donge [Dungu] (Ser. 594). — Nom vern. : **Rongi** [Mangbettu] (Ser.).

PHYLLANTHUS L.

Phyllanthus capillaris *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 417; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 338; *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 236; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 242; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 58 [B. S. B. B. XXXVI, 103]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 127 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 196, t. 54; (1908) 266; Pl. Thonnerianae (1901) 22.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Cabra). — I : Moanda (Vanderyst). — II a : Bingila (Dup.); Shimbete (Dew.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. et M. Laur.) — V : Léopoldville (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VII : Iballi (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.); Eala (M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Upoto (Thonn.); Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — XIII c : Yakusu (M. Laur.). — XVI : Pala (Desc.). — Nom vern. : Lofamdjola (Ém. et M. Laur.).

Phyllanthus floribundus *Muell.-Arg.* in *Linnaea*, XXXII (1863) 14 et in *DC.* Prodr. XV², 343; *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 236 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 58 [B. S. B. B. XXXVII, 103]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 204; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 275; II (1908) 266.

1895 (G. Descamps). — II : Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : Kimuenza; Kisantu (Gill.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — XVI : Toa (Desc.). — Noms vern. : Kaili [Kasongo]; *Musunganene* [Tanganika] (Dew.).

Phyllanthus Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 226.

1906 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill. 3203, 4034).

Phyllanthus moeroensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I, (1906) 273, t. 64.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : bassin du Lac Moero (Verd.).

Phyllanthus Niruri *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) 981; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 426; *Pax* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 236 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 58 [B. S. B. B. XXXVII, 103]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 48 et Reliq. Dewevr. (1901) 204; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 127 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 266.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — V : Kimuenza; Dembo (Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VI : Bandundu (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Phyllanthus niruroides *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 331 et in *DC.* Prodr. XV², 409; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 242.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

Phyllanthus odontadenius *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* II (1864) 333 et in *DC. Prodr.* XV², 365; *Pax* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 48; II (1900) 56.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu; env. de Dembo (Gill.).

— — var. **micranthus** *Pax* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1897) 48 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 204.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dem. 262).

Phyllanthus pentandrus *Schumach. et Thonn.* in *Danske Vidensk. Selsk. Kjoeb.* IV (1829) 193; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 336; *Pax* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 236; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 957; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 275.

1904 (R. Butaye). — V : entre le Kwango et Kisantu (But.).

Phyllanthus polyanthus *Pax* in *Engl. Jahrb.* XXVIII (1899) 19; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 204.

1896 (A. Dewèvre). — IX : env. de Bumba. — Nom vern. : Mokolokaka (Dew.) 890).

Phyllanthus Pynaertii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 267.

1905 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 379, 1159). — IX : Bumba (Pyn. 25).

Phyllanthus reticulatus *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* V (1804) 298; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 314; *Pax* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 236; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 58 [B. S. B. B. XXXVII, 103]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 205; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 958; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 127 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 275; II (1908) 268.

1895 (A. Dewèvre). — I : env. de Moanda (Gill. 3979). — II : Boma (Pyn. 191). — III : Matadi (Gill. 4045). — IV : Luango (Dew.). — V : env. de Léopoldville (Dew.); Chenal (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); entre Kisantu et le Kwango (But.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.).

Phyllanthus Verdickii *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 274, t. 63.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 407).

FLUEGGEA Willd.

Flueggea obovata [*Willd.*] *Wall. List* (1828) n. 7928; *Baill.* in *Adansonia*, II (1861-1862) 41; *Pax* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 235; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 48 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 205; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 79.

Xylophylla obovata Willd. Enum. pl. Hort. Berol. (1809) 329.

Securinega — *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV² (1866) 449.

F. microcarpa *Blume* Bijdr. Fl. Ned.-Indië (1825-1826) 580; *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. V, 328.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XVI : env. de Lukafu. — Nom vern. : **Katolle-Tolle** (Verd.). — Nom vern. : **Kakasalla** [Tanganika]; **Matotolo** [Kasongo] (Dew.).

ANTIDESMA L.

Antidesma laciniatum *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 529 et in *DC.* Prodr. XV², 260; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 270.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.). — XI : Yambuya (M. Laur. 993). — XII c : env. de Nala (Ser. 806).

Antidesma membranaceum *Muell.-Arg.* in *Linnaea*, XXXIV, (1865-1866) 68 et in *DC.* Prodr. XV², 261; *Pax* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 49 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 206; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 270.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.); Dembo (Vanderyst); entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (Pyn.; M. Laur.). — IX : Mobeka (Pyn.). — XII c : Gombari (Ser.). — Nom vern. : **Mosalasala** [Kwilu] (Sap.).

Antidesma Schweinfurthii *Pax* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 530; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 242.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.).

Antidesma venosum *E. Mey.* ex *Tul.* in *Annal. sci. nat. Sér.* 3, XV (1851) 232; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 260; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 243; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 49 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 206; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 965; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 79 et *Miss. Laurent* (1905) 128.

A. « *nervosum* » [err. cal.] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 270.

1885 (R. Buettner). — II : Boma (Dew.); île des Princes (Ém. et M. Laur.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buett.); Yumbi (Dew.); Dembo (Vanderyst); entre Tumba et Kimpesse (But.). — VIII : Équateurville (Hens). — IX : Luozi (Luja). — XVI : env. de Lukafu (Verd.); Kibanga (Deb.). — Noms vern. : **Mushe-Tjifufia**; **Mulumbi-Lumba** [Katanga] (Verd.).

— — form. ***glabrescens*** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 79.

1899 (Edg. Verdick). — XIII : Lukafu (Verd.).

UAPACA Baill.

Uapaca Bossenge *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 271, t. 70, fig. 1-4.

1903 (Ém. Laurent). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **Bosenge** (M. Laur. 128).

Uapaca ealaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 272, t. 70, fig. 5-8.

1906 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn. 813).

Uapaca Heudelotii *Baill.* in *Adansonia*, I (1860-1861) 81; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 128.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Bosenge** (M. Laur.).

Uapaca Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 272.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Uapaca Marquesii *Pax* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1897) 322.

1876 ? (P. Pogge). — XV : le Kasai (Pg. 298, 633, 674).

OBS. — La localité [bord du Quihumbo] où l'espèce a été découverte par L. Marquès, est dans l'Angola ; mais, postérieurement [in *Engl. Jahrb.* XXXIV (1904) 371] M. Pax a rapporté à cette espèce les n^{os} 298, 633 et 674 de la collection de Pogge. Ces deux derniers numéros ont, croyons-nous, été récoltés dans le district du Kasai [XV].

Uapaca microphylla *Pax* in *Engl. Jahrb.* XXIII (1897) 523; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 206.

1900 (Edg. Verdict). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Musokolobe** (Verd. 540).

— — var. **Hendrickxii** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 273.

1903 (Aug. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3086).

Uapaca Mole *Pax* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 79; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 242.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1635).

Uapaca Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 274, t. 71.

1905 (L. Pynaert). — IX : Bumba (Pyn. 117).

Uapaca Sereti *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 274, t. 72.

1907 (F. Seret). — XII c : env. de Nala (Ser. 778).

Uapaca Van Houttei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 275.

1903 (Aug. Van Houtte). — V : Kisantu-Makela (Van Houtte in Gill. 3454).

BACCAUREA Lour.

Baccaurea Staudtii *Pax* in Engl. Jahrb. XXIII (1897) 521; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 205.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — Ind. non cl. : Ukussu (Dew.).

MAESOBOTRYA Benth.

Maesobotrya Bertramiana *Buett.* in Verh. Bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 93; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 243.

1885 (R. Buettner). — IV : Muen-Putu-Kasongo (Buett. 259).

Maesobotrya hirtella *Pax* in Engl. Jahrb. XXVIII (1900) 21; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 96 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 836] et Reliq. Dewevr. (1901) 206; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 127 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 275; II (1908) 268.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Gill. 2300). — V : Dolo (Pyn. 41); rég. de Sanda (Odd. 1478, 1970); Kimuenza et env. (Gérard; Gill. 1478, 1678, 1970, 2037, 2123); entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill. 2799, 2899). — VII : rég. du Lac Léopold II. — Nom vern. : **Kukuankuko** (Body). — VIII : Bikoro (Pyn.); Lulanga (Pyn. 743); env. de Bokakata. — Nom vern. : **Bonguete** (Dew. 763); Ikenge (Ém. et M. Laur.); Coquilhatville (Dew. 632); Eala et env. — Nom vern. : **Ekakoloka** (M. Laur. 74; Pyn. 562, 1304, 1453). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

Maesobotrya Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 268.

Staphysora — *De Wild.* l. c. II (1908) 268 [nom. nov.].

1902 (L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma ? (Gent.); Madibi (Sap.). — Noms vern. : **Smanebuko** [Kwilu]; **Kimanabuka** [Kasai]; **Kakoloka** [Bangala].

— — var. **brevipetiolata** *De Wild.* l. c. II (1908) 269.

1907 (A. Sapin). — VI : Dima (Sap.).

HYMENOCARDIA Wall.

Hymenocardia acida *Tul.* in Annal. sci. nat. Sér. 3, XV (1851) 256; *Muell.-Arg.* in DC. Prodr. XV², 477; *Oliv.* et *Grant* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 145, t. 94 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 57 [B. S. B. B. XXXVII, 104]; *De Wild.* et *Th. Dur.*

Pl. Gilletianae, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47]; Contr. fl. Cgo, I (1899) 49; II (1900) 56 et Reliq. Dewevr. (1901) 207; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 269.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Zenze (Ém. Laur.); route de Shinganga à Zobe (Dew.). — V : Léopoldville (Luja; Pyn.); Kisantu (Gill.); Dembo (Vanderyst). — XV : Bena-Dibele (Luja); Bukila (Ém. et M. Laur.).

Hymenocardia Heudelotii *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 518; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 269.

1905 (Marc. Laurent). — V : env. de Yumbi (M. Laur. 427). — VIII : Eala (M. Laur. 1972; Pyn. 344).

Hymenocardia mollis *Pax* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 528 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 237; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, (1906) 275.

1895 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 1027).

— — var. **glabra** *Pax* l. c. 528; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 243.

1882 (P. Pogge). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg. 1349).

Hymenocardia Poggei *Pax* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 528; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 243.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1351).

Hymenocardia ulmoides *Oliv.* in *Hook. Icon.* pl. XII (1876) 29, t. 1131; *Pax* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 236 et in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 207; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 960; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 127 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 269.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Bolobo. — Nom vern. : **Mokengereke** (Dew.); Kisantu (Gill.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville; env. de Wangata (Dew.); Eala (M. Laur. 844). — XIII d : env. de Lusanga (Dew.).

PLAGIOSTYLES Pierre

Plagiostyles Klaineana *Pierre* in *B. S. Linn. Paris*, II (1897) 1327; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 96 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 836] et Reliq. Dewevr. (1901) 205; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 41, (1908) 279.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1716); marécages de Dembo (Gill. 1562); env. de Sanda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VIII : la Lulanga (Dew. 855).

CYATHOGYNE Muell.-Arg.

Cyathogyne Dewevrei Pax in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 49 et Reliq. Dewevr. (1901) 207.

1896 (A. Dewèvre). — XIII c : Wabundu (Dew. 1142).

Cyathogyne viridis Muell.-Arg. in Flora, XLVII (1864) 536 et in *DC.* Prodr. XV², 226; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae, (1901) 21; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II, (1908) 268.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.; Pyn. 655).

MICRODESMIS Planch.

Microdesmis puberula Hook. f. in *Hook.* Icon. pl. (1848) t. 758 et in Niger Fl. (1849) 514, t. 26; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 1041; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 967; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 62 [B. S. B. B. XXXVII, 107] et Reliq. Dewevr. (1901) 207; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 162, (1906) 279 et Miss. Laurent (1905) 140.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.) — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : Bingila (Dup.); Shinganga (Dew.). — V : Lukolela (Dew.); Sanda (De Brouw.; Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Madibi (Sap.). — VII : forêt de Gauda (Body). — VIII : Équateur (Dew.); Eala et env. (M. Laur.; Pyn.); Coquilhatville. — Nom vern. : **Isike** (Dew.); **Ikoko** (Sap) — XI c : Mogandjo (M. Laur.) — XIII c : env. de Ponthier-ville [Wabundu]; la Lowa (Dew.). — XV : Dibeke (Ém. Laur.); Bombaie (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Seseke** [Équateur]; **Monkiso** [Lukolela]; (Dew.).

JATROPHA L. (1)

* **Jatropha Curcas** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1006; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 1080; *Ficalho* Pl. Uteis. 250; Pax in *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 240 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 61 [B. S. B. B. XXXVII, 106]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 52 et Reliq. Dewevr. (1901) 208; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 968; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 50; Miss. Laurent (1905) 133 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 278.

1891 (F. Demeuse). — IV : Banza-Putu (Dem.). — Nom vern. : **Puluka** (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : le Kwango (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Inkongo (Ém. et M. Laur.). — IX : env. de Mabanga. — Nom vern. : **Inkoko** (Dew.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tondo-iwa-Niamba** (Verd.); Kibanga (Deb.).

(1) *L'Hevea brasiliensis* Muell.-Arg. est cultivé en grand à Wangata; Sisundi, Eala [VIII] etc. [Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 133 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 286].

* **Jatropha multifida** L. Sp. pl. ed. I (1753) 1006; *Salisb.* Hort. Paradis. t. 91; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 1089; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 243; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 63 [B. S. B. B. XXXVII, 107] et Pl. Gilletianae, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47].

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.). — II : Boma (Wilw.). — V : Kisantu (Gill.),

RICINODENDRON Muell.-Arg.

Ricinodendron africanum *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 533 et in *DC.* Prodr. XV², 1111; *Ficalho* Pl. Uteis, 251; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 976; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 47; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 141 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 288.

1900 (J. Gillet). — II a : la Lukula (Ém. et M. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : **Bofeko** (M. Laur.). — XV : forêt de Munungu (Ém. et M. Laur.). — Nom vern. : **Mongongome** [Kwilu] (Sap.).

MANNIOPHYTON Muell.-Arg.

Manniophyton africanum *Muell.-Arg.* in *Flora*, XLVII (1864) 531 et in *DC.* Prodr. XV², 720; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 59 [B. S. B. B. XXXVII, 104]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 31-32; Miss. Laurent (1905) 129 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 279.

1888 (Fr. Hens). — V : Lukolela (Pyn.). — VI : le Kwilu (Sap.). — VII : Iboka — Nom vern. : **Kosa** (Gent.). — VIII : distr. de l'Équateur, C. (Gent.; Pyn.); Coquilhatville (Schlt.); Eala et env. — Nom vern. : **Nkosa** (M. Laur.); Bala-Lundzi (Pyn.). — IX : Bangala (Hens). — XI : env. de Basoko: Limbutu (M. Laur.). — XV : le Sankuru (Sap.); Bena-Dibele (Leser.; Flam.). — Noms vern. : **Caho** [Amadis]; **Ude** [Asende]; **Wii** [Abarembo]; **Kosa** [Limbutu]; **Lukusa**; **Lukosa** [Bangala]; **Mosamba**; **Lukosa**; **Nkoza** [Sankuru].

Manniophyton fulvum *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 332 et in *DC.* Prodr. XV², 720; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 244; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 972; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 208; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 32; Miss. Laurent (1905) 129 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 276.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Sonagongo (Luja). — V : Kisantu (Gill.); env. de Sanda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : Équateur (Dew.). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.) — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

POGGEOPHYTON Pax

Poggeophyton aculeatum Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 89;
Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 245.

1882 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1370).

CAPERONIA St-Hil.

Caperonia senegalensis Muell.-Arg. in Linnæa, XXXIV (1865-1866) 153 et in *DC. Prodr.* XV², 756; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 59 [B. S. B. B. XXXVII, 104] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 210.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

CROTONOGYNE Muell.-Arg.

Crotonogyne Laurentii De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 278, t. 73.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.).

— — var. **ikelembense De Wild.** l. c. II (1908) 278.

Ann. ? (Coll. ?). — VIII : Ikelemba (Coll. ?).

Crotonogyne Poggei Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 84; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 244.

1881 ? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1326).

MANIHOT Adans. (1)

***Manihot utilissima Pohl** Pl. Brasil. icon. et descr. I (1827) 32, t. 24; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 1064; *Ficalho* Pl. Uteis, 251; *Kurz* Forest Fl. II, 402; *Engl.* in Engl. Jahrb. VIII (1886) 61; *Pax* in *Engl. Pfl. Ost.-Afr.* 240; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 244; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 973; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 140.

Jatropha Manihot L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1007.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Lescr.). — VIII : Eala (Ém. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.).

OBS. — Originaire de l'Amérique trop.; largement cultivé dans l'Afrique trop.

(1) Le **M. Glaziovii** Muell.-Arg. est une espèce du Brésil cultivée à Kisantu [V] (Gill.), à Eala [VIII] (Flam.) et dans un grand nombre de localités du Congo [Conf. *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 134-138, fig. 17-21 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 278].

ERYTHROCOCCA Benth.

Erythrococca aculeata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 506; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 791; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 50 et Reliq. Dewevr. (1901) 209; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 129.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — XI : Lie (Ém. et M. Laur.).

HASSKARLIA Baill.

Hasskarlia didymostemon *Baill.* in *Adansonia*, I (1860) 52; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 774; *Ficalho* Pl. Uteis, 257; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 51; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 974; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 131 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 284.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville ; Kisantu (Gill.). — VII : Ibali ; la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Pyn. 811, 1786). — IX : Nouvelle-Anvers (Pyn. 10). — XIII c : rég. de Ponhierville (Dew.). — XV : Kondue ; Ifuta (Ém. et M. Laur.).

CLAOXYLON A. Juss.

Claoxylon africanum [*Baill.*] *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV² (1866) 777; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 47 (B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47] et Reliq. Dewevr. (1901) 209; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 130 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 279.

Trewia — *Baill.* in *Adansonia*, I (1860) 68.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza ; Kisantu (Gill.) ; Lukolela. — Nom vern. : **Musense** (Dew.). — VII : env. du Lac Léopold II. — Nom vern. : **Ejendje** (Body). — VIII : Eala (Pyn.) ; Injolo (Huyghe et Ledoux). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XV : le Sankuru. — Noms vern. : **Masoha** (Sap.) ; **Ntenteke** [Bangala].

Claoxylon atrovirens *Pax* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 85; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 245.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu ; Kusumbo (Schw.).

Claoxylon Dewevrei *Pax* in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 209 et in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 283.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 947, 964 a). — Noms vern. : **Mondeka** [Kasongo] ; **Monsingisa** [Tanganika] ; **Mabaie** [Ikwangula] ; **Londgendje** [Équateur] ; **Mokoyole** [Kasongo] ; **Djalasingi** [Tanganika] ; **Likile** [Ikwangula] (Dew.).

Claoxylon flaccidum *Pax* in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 87; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 245.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3355).

MICROCOCCA Benth.

Micrococca Mercurialis [L.] *Benth.* in *Hook. f. Niger Fl.* (1849) 503; *Pax* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 238 et in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II* (1898) 60 [B. S. B. B. XXXVII, 105] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 209; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 129 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 279.

Tragia — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 980.

Claoxylon — *Thw. Enum. pl. Zeyl.* (1861) 271; *Muell.-Arg. in DC. Prodr. XV², 790*; *Hiern Cat. Welw. Pl. I, 970*.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Zambi (Dup.). — II a : le Mayumbe; Bingila (Dup.). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : env. de Yumbi (M. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.); Dembo et env. (Gill.; Vanderyst); Kisantu (Gill.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu; Kiri (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Bena-Kamba (Dew.); Limbutu (M. Laur.). — Nom vern. : **Kaie** [Tanganika] (Dew.).

ACALYPHA L.

Acalypha brachystachya *Horn.* *Hort. reg. bot. Hafn. II* (1815) 909; *Muell.-Arg. in DC. Prodr. XV², 870*; *Hiern Cat. Welw. Pl. Boiss. I, 978*; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I* (1900) 47 [B. Herb. Sér. 2, I, 47] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 210; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 131.

Ricinocarpus — *O. Kuntze Rev. Gener.* (1891) 617.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Boera. — Nom vern. : **Badjambota** (Dew.). — IX : Nouvelle-Anvers (Hens).

Acalypha Dewevrei *Pax* in *Engl. Jahrb. XXVIII* (1899) 24; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 210.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 1820).

Acalypha haplostyla *Pax* in *Engl. Jahrb. XIX* (1894) 98; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1908) 284.

1876 (P. Pogge). — XV : bassin de la Lulua, 9°5 lat. (Pg. 120). — XVI : Lukonzolwa. — Nom vern. : **Koloko** (Coll.?).

— — var. **longifolia** *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 277.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu — Nom vern. : **Kabuko-Pakana** (Verd. 256).

Acalypha indica *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 1003; *Muell.-Arg. in DC. Prodr. XV², 868*; *Hiern Cat. Welw. Pl. I, 978*; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, II* (1898) 61 [B. S. B. B. XXXVII, 106]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 210.

1893 (Ém. Laurent). — Congo (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Acalypha ornata A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 247; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 833; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* I (1897) 51 [B. S. B. B. XXXVII, 106]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 210.

1895 (G. Descamps). — XIII d : Vieux-Kasongo; Nyangwe (Dew.). — XVI : Toa (Desc.); Pala (Deb. 13d). — Noms vern. : **Yambokulu** [Ikwangula]; **Bototota** [Kasongo] (Dew.).

Acalypha paniculata *Miq.* Fl. Ind. Bat. I² (1859) 406; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 802; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo.* II (1898) 60 [B. S. B. B. XXXVII, 105]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 210; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 13 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* I (1906) 378; II (1908) 284.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.); la Lemba. — Nom vern. : **Vunga** (Cabra). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Tumba (Ém. Laur.); Kisanu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Pyn.).

Acalypha polymorpha *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* II (1864) 335 et in *DC. Prodr.* XV², 835; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletiana*, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 284.

1900 (J. Gillet). — V : Kisanu (Gill.); Yindu (Vanderyst).

Acalypha sessilis *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VI (1804) 204; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletiana*, I (1900) 47 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 47]; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 131 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 284.

A. gemina *Spreng.* var. genuina *Muell.-Arg.* in *Linnaea*, XXXIV (1865-1866) 41 et in *DC. Prodr.* XV², 866.

1899 (J. Gillet). — V : Kisanu. — Nom vern. : **Kanga-Nzo** (Gill.; Vanderyst). — XII c : env. de Surango (Ser. 890). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Acalypha Vahlia *Muell.-Arg.* in *Linnaea*, XXXIV (1865-1866) 43 et in *DC. Prodr.* XV², 873; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 978; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* I (1899) 51; II (1900) 57 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 211; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 131 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo.* II (1908) 284.

A. ciliata *Vahl Symb. bot.* I (1790) 77, t. 20.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Dew.). — IV : Sona-Gongo (Luja). — V : Kisanu (Gill.); Boko; Dembo; Maydis (Vanderyst). — VII : la Fini; Kutu (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Kasongo. — Nom vern. : **Lotoloto** (Dew.). — XV : Kondue; Munungu (Ém. et M. Laur.).

MAREYA Baill.

Mareya micrantha [*Benth.*] *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV² (1876) 792; *Pax* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 51 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 213; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 285.

Acalypha — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 505.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Okanga ; Lokandu (Dew.). — XIII c : Rewa (Dew.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.).

ALCHORNEA Sw.

Alchornea cordifolia *Muell.-Arg.* in *Linnaea*, XXXIV (1865-1866) 170 et in *DC. Prodr.* XV², 908; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 60 [*B. S. B. B.* XXXVII, 105]; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1899) 57; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 129 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 276; II (1908) 280.

A. cordata *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 507; *Hiern Cat. Welw. Pl.* I, 979.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Cabra). — II a : rives de la Vunzi (Dup.); Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : Kisantu (Gill.); env. de Lemfu (But.); Lukolela (Pyn. 54). — VII : env. du Lac Léopold II (Body). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : Umangi; Lie (Ém. et M. Laur.). — XV : Kasongo-Batetela (Sap.); Mushenge (Lescr. 389). — Noms vern. : **Diongi** [Batetela]; **Libunji** [Bangala].

Alchornea floribunda *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* I (1863) 336 et in *DC. Prodr.* XV², 905; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1900) 50; *Pl. Thonnerianae* (1900) 30 et *Pl. Gilletianae*, II (1901) 97 [*B. Herb. Boiss. Sér. 2, I*, 837]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo* II (1908) 280.

1899 (Fr. Thonner). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : env. de Kisantu (Gill. 3799); Sele (But.). — VIII : le Haut-Lopori (Biel.); Équateur (Pyn. 332); Eala (Pyn. 1426). — IX a : env. de Mobeka (Ém. et M. Laur.); Gali (Thonn.). — XI : env. de Yambuya (M. Laur.). — XII c : env. de Nala (Ser. 884).

Alchornea hirtella *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 507; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 904; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 280.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.).

Alchornea yambuyaensis *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1908) 280.

1906 (J. Solheid). — XI : env. de Yambuya (Solh. 55, 80, 160).

MALLOTUS Lour.

Mallotus oppositifolius [Geisel.] Muell.-Arg. in *Linnaea*, XXXIV (1865-1866) 170 et in *DC. Prodr.* XV², 976; *Pax* in *Engl. Pfl. Ost.-Afr.* 238; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 60 [B. S. B. B. XXXVII, 105]; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 21 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 211; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 980; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 276 et *Miss. Laurent* (1905) 130.

Croton — *Geiseler Croton Monog.* (1807) 23.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Cabra). — II a : env. de Shinganga. — Nom vern. : **Kukuma-Suza** (Dew.); Bingila (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Gill.; Vanderyst); env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala (M. Laur.; Pyn.); Bokakata. — Nom vern. : **Ebemba** (Dew.). — IX : Umangi; env. de Lie (Ém. et M. Laur.); env. de Bumba [îles du Congo] (Pyn.); Upoto (Thonn.). — X : Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : env. de Lokandu (Dew.); env. de Yambuya (Solh.); Malema (Ém. et M. Laur.). — XV : Luebo (Lescr.). — Noms vern. : **Mititi** [Lokandu]; **Bulekibanga Ngutu** [Tanganika] (Dew.); **Lobombo** [Ém. Laur.).

Mallotus subulatus Muell.-Arg. in *Linnaea*, XXXIV (1866) 970 et in *DC. Prodr.* XV², 970; *Pax* in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 50 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 211.

1895 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 545; Pyn. 170). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Ind. non cl. : Matende (Dew.). — Noms vern. : **Kasakola** [Kasongo]; **Yambakulu** [Ikwangula]; **Kazitanda** [Tanganika] (Dew.).

ARGOMUELLERA Pax.

Argomuelleria macrophylla Pax in *Engl. Jahrb.* XIX (1894) 90; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 246.

1883 (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 1376).

MACARANGA Thou.

Macaranga angolensis Muell.-Arg. in *DC. Prodr.* XV² (1866) 994; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 981; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 277; II (1908) 281.

1904 (J. Gillet). — V : entre Tumba et Kimpesse (Gill.); Kisantu. — Noms vern. : **Mfufu**; **Mfumfu** (Gill. 166).

Macaranga dibeleansis De Wild. *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 281.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XV : Dibele (Ém. et M. Laur.; Flam. 189).

Macaranga Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 276, t. 73.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1840).

Macaranga Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 282.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Wenge** (M. Laur. 1304 ; Pyn. 1278).

Macaranga mollis *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 91 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1352).

Macaranga monandra *Muell.-Arg.* in *Seem.* Journ. of Bot. II (1864) 337 et in *DC.* Prodr. XV², 1012 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246 ; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 60 [B. S. B. B. XXXVII, 105].

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

Macaranga Poggei *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 94 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1387).

Macaranga Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 283.

1907 (L. Pynaert). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Bosasa** (Pyn.).

Macaranga rosea *Pax* in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 328 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 283.

1907 (P. Huyghe). — VIII : Ikenge (Huyghe) ; Eala (Pyn. 1491).

Macaranga saccifera *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 93 ; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246 ; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 57 et Reliq. Dewevr. (1901) 212 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 130, t. 39-41 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 283.

1881 (P. Pogge). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 1133 ; Pyn. 717, 1047) ; Bokakata (Dew. 788). — IX : env. de Bumba (Ser. 35) ; Injolo (M. Laur. 1288 ; Ser.). — XI : Patalongo [Yambuya] (M. Laur.). — XV : Kondue ; Batempa ; entre Lusambo et le Lomami (Ém. et M. Laur.) ; Mukenge (Pg. 1335, 1363). — Noms vern. : **Motukunkao** [Kwilu] ; **Kolokote** [Bangala].

Macaranga Schweinfurthii *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 92, *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3500).

Macaranga Zenkeri *Pax* in Engl. Jahrb. XXIII (1897) 526; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 50; II (1900) 87; Pl. Gilletianae, I (1900) 48 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 48] et Reliq. Dewevr. (1901) 212; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 277; II (1908) 284.

1896 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (Gill.). — V : env. de Sanda (Odd.); Kisantu (Gill. 249). — XII c : env. de Nala (Ser.). — XIII c : env. de Lokandu (Dew. 1134). — XVI : près du Tanganika (Coll.?). — Nom vern. : **Pombura** [Mayogo] (Ser.).

MEGABARIA Pierre.

Megabaria Trillesii *Pierre* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 284. [nom. tant.].

1896 (A. Dewèvre). — VIII : île dans la Lulanga (Dew. 856); Eala (M. Laur. 2035); Bolombo (Ém. et M. Laur.).

CHAETOCARPUS Thw.

Chaetocarpus africanus *Pax* in Engl. Jahrb. XIX (1894) 113; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 246; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 48 et Reliq. Dewevr. (1901) 212; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 141 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 288.

1876 (P. Pogge). — V : Bolobo (Ém. Laur.); Kinshassa (Schlt.); Léopoldville (Dew.); Kisantu et env. (Gill.); Kimuenza (Pyn. 115); Sanda (Verm. in Gill. 341); Dembo. — Nom vern. : **Kikungu** (Vanderyst). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — X : le Kasai (Ém. et M. Laur.); le Sankuru (M. Laur.); Kamba; Kapinga; Butala; Mangba (Ém. et M. Laur.); Mukenge (Pg.). — XVI : Musumba. (Pg.).

PYCNOCOMA Benth.

Pycnocomma Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 285.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Pycnocomma macrophylla *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 508; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 278.

1896 (A. Dewèvre). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill.). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew.).

Pycnocomma Sapini *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 285.

1906 (A. Sapin). — XV : le Sankuru (Sap.). — Nom vern. : **Montende** [Bangala]; **Montendo** [Sankuru].

Pycnocoma Thonneri *Pax* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 51; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 21, t. 11; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 286.

1896 (Fr. Thonner). — VIII : Efukwa-Kombe [Ikelemba] (M. Laur.). — IX a : Gali [Mongalla] (Thonn. 95; Ém. Duch.). — XI : Patalongo [Yambuya] (M. Laur. 1046); Yambuya et env. (Solh.).

Pycnocoma trilobata *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 132, t. 28.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bolongula [Sankuru] (Ém. et M. Laur.).

TRAGIA L.

Tragia cordifolia *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 501; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 944; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 984; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 61 [B. S. B. B. XXXVII, 106]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 80; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 132 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1905) 286.

1895 (Édg. Verdick). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); Mopolenge (M. Laur.). — VIII : Eala. — Nom vern. : Ifambalankoce (M. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Lusemgue (Verd.).

Tragia Descampsii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 207.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Katanga (Desc.).

Tragia lukafuensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 206.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Luba-Langwo (Verd. 220).

Tragia tenuifolia *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 502; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 945; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 52 et Pl. Thonnerianae (1900) 21.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi près de Gali (Thonn.).

Tragia volubilis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 380; *Muell.-Arg.* in *DC.* Prodr. XV², 935; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 984; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 61 [B. S. B. B. XXXVII, 106]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 212.

1895 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew.).

Tragia Zenkeri *Pax* in *Engl.* Jahrb. XXIII (1897) 528; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 52 et Reliq. Dewevr. (1901) 212.

1895 (A. Dewèvre). — III-IV : la Lufu (Dew. 437).

DALECHAMPIA L.

Dalechampia ipomoeaefolia *Benth.* in *Hook. f. Niger Fl.* (1849) 500; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 1248; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 48 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 48]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 286.

1899 (J. Gillet). — II a : le Haut-Shiloango (Cabra et Michel). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VII : Iballi (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.).

Dalechampia scandens *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) 1054; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 1244; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 985; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 48 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 48]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 278; II (1908) 286.

1900 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi; Kisantu (Gill.).

— — var. **cordofana** [*Hochst.*] *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 1245; *Pax in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 240 et in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 61 [B. S. B. B. XXXVII, 106].

1896 (G. Descamps). — Bas-Congo (Cabra). — XI : Mogandjo (M. Laur.). — XVI : Kapanga [Tanganika] (Desc.).

RICINUS L.

Ricinus communis *L.* *Sp. pl. ed. 1* (1753) 1007; *Bot. Mag.* (1821) t. 2209; *Bentl. et Trim. Medic. Pl. IV*, t. 237; *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², 1017; *Pax in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 240; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1893) 247; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 983; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 80; *Miss. Laurent* (1904) 133 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1905) 588-616.

1891 (F. Demeuse). — Espèce souvent introduite. — Bas-Congo (Dem.; Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — XIV : Kalembe-Lemba (Coll.?). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

MAPROUNEA Aubl.

Maprounea africana *Muell.-Arg.* in *DC. Prodr.* XV², (1866) 1191; *Pax in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 62 [B. S. B. B. XXXVII, 107]; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 985; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1902) 213; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 144 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 279, II (1908) 289.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — I : Moanda (Gill.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Kitobola (Pyn.). — V : env. de Léopoldville (Gill.; Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VI : Madibi (Sap.). — VIII : Eala (Pyn.). — IX : Bangala (Dew.). — Nom vern. : Bosu [Kwilu] (Sap.).

M. africana var. **obtusa** Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 116 et in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 62 [B. S. B. B. XXXVII, 109]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 213.

1893 (Ém. Laurent). — Congo (Dew.). — II a : Shinon (Ém. Laur. 14); env. de Zobe (Dew. 346).

SAPIUM P. Br.

Sapium cornutum Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 114.

Le type croit dans l'Angola.

— — var. **coriaceum** Pax l. c. (1894) 115; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 247.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg 1407. 1411).

Sapium Mannianum [Muell.-Arg.] Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pl. III (1830) 335; Pax in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 62 [B. S. B. B. XXXVII, 107]; *Hiern. Cat. Welw. Pl. I*, 986; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 147 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 279; II (1908) 288.

Excoecaria—*Muell.-Arg.* in *Flora* (1864) 933 et in *DC. Prodr.* XV² (1868) 1217.

1893 (Ém. Laurent). — II a : Temvo (Ém. et M. Laur.). — IV : Sona-Gongo (Luja); Kitobola (Ém. Laur.). — V : env. de Lukolela (Krek.); Kisantu (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — VI : vallée de la Djuma (Gent.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 1299). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Lusambo (Ém. et M. Laur.); Lubi (Sap.).

Sapium oblongifolium [Muell.-Arg.] Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 114; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 52; II (1900) 57 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 213; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 141 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 279; II (1908) 288.

Excoecaria — *Muell.-Arg.* in *Seem. Journ. of Bot.* II (1864) 337; *Hiern Cat. Welw. Pl. I*, 986.

1891 (F. Demeuse). — V : Léopoldville (Dew.); Galiema (Pyn. 124); Dembo et env. (Gill.; Vanderyst); Sanda (Odd.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.); Madibi (Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.); env. du Lac Léopold II (Body). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Ekongoli** [Lac Léopold II] (Body); **Mombatieke**; **Mbatieke**; **Batieke** [Kwilu] (Sap.).

Obs. — L'habitation, N. du Stanley-Pool (Dew.), est dans le Congo français.

Sapium Poggei Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 114; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 247.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg 1385).

Sapium xylocarpum Pax in Engl. Jahrb. XIX (1894) 115; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 247.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg 1416).

URTICACEAE

CELTIS L.

Celtis Prantlii *Priemer* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, III (1900) 23;
De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 213.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

TREMA Lour.

Trema guineensis [*Schumach. et Thonn.*] *Ficalho* Pl. Uteis (1884)
261; *Buett.* in Mitth. Afr. Gesellsch. V, 257; *Th. Dur. et Schinz*
Étud. fl. Cgo (1896) 247; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr.
(1901) 213 et Pl. Thonnerianae (1901) 10; *De Wild.* Miss. Laurent
(1903) 68.

Celtis — *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 160.

Sponia — *Planch.* in DC. Prodr. XVII (1873) 197.

1893 (Ém. Laurent). — II : Zenze (Ém. Laur.). — V : Kisantu. — Nom vern. :
Gudia-Muni (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Krek.); env.
de Mobanga. — Nom vern. : **Eseka** (Dew.). — IX : Upoto (Thonn.). — XV : Bo-
longula (Ém. et M. Laur.).

— — form. **strigosa** *Buett.* in Mitth. Afr. Gesellsch. V, 257; *Th.*
Dur. et Schinz l. c. (1896) 248.

1885 (R. Buettner). — V : Bolobo (Buett. 249).

CHAETACME Planch.

Chaetacme aristata *Planch.* in Annal. sci. nat. Sér. 3, X (1848) 340;
Muell.-Arg. in DC. Prodr. XVII, 210; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 160.

Le type croît dans l'Afrique australe.

— — var. **longifolia** *Engl.* ex *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. De-
wevr. (1901) 214.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 903). — Noms vern. :
Kekoko [Kasongo]; **Bawamauri**; **Mokoluko** [Ikwangula]; **Lamata** [Tanganika]
(Dew.).

CANNABIS L.

Cannabis sativa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1027; *Rchb.* Icon. fl. Germ.
XII, t. 655; A. DC. Prodr. XVI¹, 30; *Bentl. et Trim.* Medic. Pl. IV,
t. 231; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 248; *Hiern* Cat.
Welw. Pl. I, 994; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 214;
De Wild. Miss. Laurent (1905) 73.

1816 (Chr. Smith). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Buett.). — XII : C. dans la zone arabe (Dew.). — XV : le Kasai : le Sankuru : Lusambo ; Mange ; Butala (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Bangui** [Bakusu] ; **Kiamvu** [Bingila] ; **Dzama** [Lulanga] ; **Kabangui** [Kasongo] ; **Kmoka** [Tanganika] (Dew.).

« Le *Diamba* ou *Chanvre* est considéré comme indigène dans les endroits de l'intérieur de l'Afrique trop. occid. près du fleuve Congo ou Zaïre ». (CLARKE in *Kew Journ. of Bot.* III, 9).

CHLOROPHORA Gaudich.

Chlorophora excelsa [Welw.] *Benth. et Hook. f. Gen. pl.* III (1881) 363 ; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 160 ; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 49 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 49] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 214.

Morus — Welw. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII (1869) 69, t. 23.

Maclura — Bureau in *DC. Prodr.* XVII (1873) 231.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Bolobo ; Lukolela (Dew.) ; Kisantu (Gill.). — IX : Bumba (Dew.).

DORSTENIA L.

Dorstenia Debeerstii *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, VIII (1900) 23 [B. S. B. B. XXXIX², 75].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : le Haut-Marangu (Deb.).

Dorstenia Gilletii *De Wild. in De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 98 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 838] ; *De Wild. Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1903) 26.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Dorstenia Klainei *Pierre ex Heckel in B. S. B. Fr.* XLVII (1903) 260 ; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 69.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.).

Dorstenia Laurentii *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 69, t. 32.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Dorstenia Lujæ *De Wild. Pl. nov. Hort. Thenensis*, I (1907) 221, t. 50 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 123, t. 59.

1904 (Éd. Luja). — XV : le Sankuru (Luja).

Dorstenia lukafuensis *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 28.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 319).

Dorstenia mogandjensis *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 241.

1908 (Marc. Laurent). — XI : Mogandjo (M. Laur. 1996).

Dorstenia Poggei *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 146 et *Monog. Afr. Pfl.-Fam.* I [Morac.] (1898) 26, t. 6.

1876? (P. Pogge). — VI : le Kwango, vers le 10 1/2° (Pg. 204).

Dorstenia Psilurus *Welw.* in *Trans. Linn. Soc.* XXVII (1869) 71; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 10; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 29 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 119; II (1907) 123, t. 60; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 1025; *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* I [Morac.] (1898) 20; *De Wild.* Pl. nov. Hort. Thenensis, I, 229, t. 53; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 119; II (1908) 31 et *Miss. Laurent* (1905) 70.

1896 (Fr. Thonner). — V : Lukolela (M. Laur.). — VIII : Eala; Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — IX a : Bobi (Thonn.). — XV : Kondue Mukundji; Pangu (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : Kabaye (Verd.).

Dorstenia scabra *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 132; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 286.

1889 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt. 12607).

Dorstenia scaphigera *Bureau* in *B. Mus. Paris*, I (1895) 60; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 58 et Pl. Thonnerianae (1900) 11; *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* I [Morac.] (1898) 19.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Bobi près Gali (Thonn.). — XV : Bena-Dibele (Luja).

Dorstenia Verdickii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 20 [B. S. B. B. XL, 26].

1899 (Edg. Verdick). — XV : Lukafu (Verd.).

Dorstenia yambuyaensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 241.

1906 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (Brixhe; Pyn. 448). — XI : Yambuya (M. Laur. 1997); Mogandjo (M. Laur. 2000).

TRYMATOCOCCUS Poepp. et Endl.

Trymatococcus Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 119, t. 26.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2194).

Trymatococcus kamerunianus [*Engl.*] *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* I [Morac.] (1898) 29, t. 11, fig. B; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 1024, *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 119.

Dorstenia — *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XX (1895) 142.

1902 (J. Gillet et L. Gentil). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2841).

FICUS L.

Ficus ardisioides *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 172 et in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 16, t. 24.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3382).

Ficus artocarpoides *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 23, t. 3.

1901 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 2014).

Ficus Bubu *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 3, t. 8; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 70.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1167). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Ficus Cabrae *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 9.

1896 (Alph. Cabra). — Ind. non cl. : village de Sigmate (Cabra, 36).

Ficus capensis *Thunb.* *Diss. Fic. gen.* (1786) 13; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 161.

Le type croît dans l'Afrique austr. et trop.

— — var. **pubescens** *Warb.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 215.

1895 (A. Dewèvre). — IV : Lukungu (Dew. 465).

Ficus chlamydodora *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 163 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 161, t. 8; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 215; *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 12.

1896 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew. 129).

Ficus congensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 59; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 215; *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 8.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum. 233); îles du Congo près de Malela. — Nom vern. : **Fumu** (Dew. 176).

Ficus corylifolia *Warb.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 215 et in *Warb. et De Wild.* *Ficus* du Cgo, I (1904) 27; *De Wild.* Miss. Laurent. (1905) 70 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 236.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill. 815, 1309); entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Itali** (Dew.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

F. corylifolia var. **glabrescens** *Warb.* in *Warb. et De Wild.*
Ficus du Cgo, I (1904) 28.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1259).

Ficus crassicosta *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I
(1904) 11, t. 21.

1891 (F. Demeuse). — V : Lukolela (Dem. 469).

Ficus cyathistipula *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 173, in *Engl.*
Pfl. Ost-Afr. 101, t. 10 A-E et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo,
I (1904) 13, t. 27; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 70.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Bombaie; Pangu (Ém. et M. Laur.).

Ficus Demeusei *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904)
20, t. 14.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 416).

Ficus Dewevrei *Warb.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr.
(1901) 215 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 18.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Lokandu (Dew. 1102).

Ficus Dusenii *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 168 et in *Warb. et*
De Wild. Ficus du Cgo, I (1904) 20.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu. — Nom vern. : **Sanda** (Gill. 741).

Ficus erubescens *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I
(1904) 29, t. 6; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 70.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : Bokala (Ém. et M. Laur.); Kisantu
(Gill. 440, 744a, 1146, 1321). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

Ficus exasperata *Vahl* Enum. pl. II (1806) 197; *Hook.* in *Lond.*
Journ. of Bot. (1848) t. 14; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 161; *De Wild.*
et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 54.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

Ficus furcata *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 173; *Th. Dur.* et
Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 249; *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo,
I (1904) 17, t. 21; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 71.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo. — Nom vern. : **Itutangali**; **Onene** (Dew.). —
XII d : Munza (Schw.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.)

Ficus Gilletii *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904)
19, t. 1.

1904 (J. Gillet). — V ; Kisantu (Gill. 1120).

Ficus inkasuensis Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 23.

1893 (Ém. Laurent). — IX : Inkasu [rég. de Bumba] ; planté dans les villages (Ém. et M. Laur.).

Ficus kimuenzensis Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 23.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2170).

Ficus kisantuensis Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 22, t. 5 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 236.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 598).

Ficus Laurentii Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 21.

1895 (Ém. Laurent). — XV : Lusambo (Ém. Laur.).

Obs. — Il faut peut-être rapporter à cette espèce, des échantillons récoltés par M. G. Schweinfurth à Munza [XII d] (Warb. l. c.).

Ficus Lingua Warb. in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 24 ; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 71.

1896 (A. Dewèvre). — XI : Lokandu (Dew. 1136). — XIII c : env. de la Lowa (Dew. 1136). — XV : Dibele (Ém. et M. Laur.).

Ficus megalodisca Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 2, t. 2.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1747).

Ficus megaphylla Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 2.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza ; Kusumba (Schw.).

— — var. **glabra** Warb. l. c. I (1904) 2.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Linduku (Schw.).

Ficus monbuttuensis Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 11, t. 25.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

Ficus Munsae Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 29, t. 17.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

Ficus Nekbuku *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 5, t. 4.

1900 (Wtterwulghe). — XII : zone de Makrakra [distr. de l'Uelé] (Wtterw.).

Ficus niamniamensis *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 14, t. 20; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 71.

F. syringaefolia *Warb.* [non *Kunth* et *Bouché*] in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 170 pr. p.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — XV : env. de Munungu; Munkundji (Ém. et M. Laur.); Bukila (Ém. et M. Laur.).

Ficus octomelifolia *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 1.

1896 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra).

Ficus pachypleura *Warb.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 4; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 236.

1896 (A. Dewèvre). — II a : entre Shimbanza et Mangwala (Cabra, 93, 96). — VI : Tumba-Mani (Cabra et Michel). — VIII : Bokakata (Dew.).

Ficus paludicola *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 38, t. 12; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 236.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombazi (Gill.).

Ficus persicaefolia *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 162 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 15, t. 16.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3346, 3564).

— — var. **angustifolia** *Warb.* l. c. (1904) 15.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1534).

— — var. **glabripes** *Warb.* l. c. (1904) 15.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

Ficus platyphylla *Delile* Cent. pl. Méroë (1826) 62; *Warb.* in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 4.

1897 (Alph. Cabra). — II a : le Mayumbe (Cabra, 37, 62).

Ficus polybractea *Warb.* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 7.

1895 (A. Dewèvre). — VIII : Équateur (Dew. 1168 a). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew.).

Ficus Preussii Warb. in Engl. Jahrb. XX (1894) 156 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) t. 18; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : **Dikanda** (Dew. 843).

Ficus pubicosta Warb. in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 16.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Katala (Dew. 141).

Ficus punctifera Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 35 t. 7; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 71 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1906) 236.

1896 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 17). — II a : Temvo (Ém. et M. Laur.). V : Kisantu (Gill. 236, 345, 648). — VI : vallée de la Djuma (Gent. et Gill.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Kuia** [Temvo]; **Lukuio** [Djabbir] (Dew.).

Ficus Rokko Warb. et *Schweinf.* in Engl. Jahrb. XX (1894) 164 et in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 162; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 249; *Warb. in Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 14; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 214.

1870 (G. Schweinfurth). — II a : à l'E. et au S. de Shimbanza (Cabra, 67). — IV : Lukungu. — Nom vern. : **Sanda** (Dew. 451). — XII d : pays des Mangbetu (Schw. 3518, 3541, 3592, 3692). — XVI : Moliro (Desc.).

Ficus scolopophora Warb. in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 33.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1294).

Ficus stellulata Warb. in Engl. Jahrb. XX (1894) 152 et in *Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 26.

Le type croît au Kamerun.

— — var. **glabrescens** Warb. l. c. (1904) 27.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 447, 905).

Ficus subcalcarata Warb. et *Schweinf.* in Engl. Jahrb. XX (1894) 155; *Warb. in Warb. et De Wild.* Ficus du Cgo, I (1904) 9, t. 26.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3624).

Ficus syringaefolia Warb. [non *Kunth* et *Bouché*] in Engl. Jahrb. XX (1894) 170.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Linduku (Schw. 3134).

Ficus triangularis *Warb.* in *Engl. Jahrb.* XX (1894) 174; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216.

1896 ? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Ficus Vallis-Choudae *Delile* in *Annal. sci. nat. Sér. 2*, XX (1843) 94; *Ferret et Galinier Voy. en Abyss. t. 1*; *Warb.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 161 et in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 26, t. 23; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 216; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 71.

1888 (Fr. Hens). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateurville [Wangata]. — Noms vern. : Itadje et Itadji (Dew.) : Coquilhatville (Ém. et M. Laur.). — IX : Bangala (Hens); Mobeka (Ém. et M. Laur.).

Ficus variifolia *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 30.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Kibali [Mangbettu] (Schw.).

Ficus villosipes *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 28.

1895 (A. Dewèvre). — IV : env. de Lukungu (Dew. 465).

Ficus Wildemaniana *Warb.* in *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 217 et in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 7 ; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 71.

1895 (A. Dewèvre). — VII : Kutu; Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur. — Nom vern. : Sonkunu (Dew. 562).

Ficus xiphophora *Warb.* in *Warb. et De Wild.* *Ficus du Cgo*, I (1904) 34, t. 9 et 10; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 71 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 236

1902 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 169, 433, 2337). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

SCYPHOSYCE Baill.

Scyphosyce Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 26.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

BOSQUIEA Thou.

Bosquiea angolensis [*Welw.*] *Ficalho* *Pl. Uteis* (1884) 271 ; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, II (1901) 99 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 839]; *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 5-10.

B. *Welwitschii* *Engl. Monog. Afr. Pfl.-Fam.* [Morac.] (1898) 36 ; *De Wild. et Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 59 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 217 ; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 70.

1896 (A. Dewèvre). — II a : le Mayumbe (Fuchs). — IV : Luvituku (Luja); la Lemfu (Fuchs.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Coquilhatville (Dew.). — Noms vern : Sekene; Sekenia; Sakagna; Sekegna (Fuchs).

BOSQUIEOPSIS De Wild. et Th. Dur.

Bosquieopsis Gilletii *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 100 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 840].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1742).

TRECULIA Decne.

Treculia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 54; Ill. fl. Cgo (1900) 139, t. 70 et Reliq. Dewevr. (1901) 217; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 70.

1896 (A. Dewèvre). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — IX : Ile près de Umangi (Dew.).

Treculia Engleriana *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1900) 140 in obs. et Pl. Gilletianae, I (1900) 49 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 49].

T. africana *Engl.* [non *Decne*] Monog. Afr. Pfl.-Fam. I [Morac.] (1898) 32, t. 12-14.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu, aux bords de l'Inkisi (Gill. 20).

MYRIANTHUS P. Beauv.

Myrianthus arborea *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 16, t. 11, 12; *R. Br.* in Capt. Tuckey's Narrat. Append. 453; *Engl.* Pfl. Ost.-Afr. 162; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 54; II (1900) 58; *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. I [Morac.] (1898) 38, fig. 3; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 71, (1907) 377 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 31.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe, C. (Ém. Laur.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : distr. du Stanley-Pool (Ém. Laur.); Kisantu. — Nom vern. : Muntusu (Gill.). — VII : vallée de la Fini (Ém. Laur.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XII d : Kusumba (Schw.). — XV : le Sankuru (Dem.); Munungu (Ém. et M. Laur.).

* **Artocarpus incisa** *L. f.* Suppl. pl. (1781) 411; Bot. Mag. (1828) t. 2869-2871; *T. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 249; *De Wild. et Th. Dur.* Cont. fl. Cgo, I (1899) 54.

Cultivé au pays des Bangala [IX] (Ém. Laur.); à Boma [II]; à Ponta da Lenha, etc. (Dup.).

MUSANGA R. Br.

Musanga Smithii R. Br. in Capt. Tuckey's Narrat. Append. (1818) 453 et in *Bennett* Pl. Javan. rarior. (1838) 49; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 250; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 49 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 49; *Engl.* Monog. Afr. Pfl.-Fam. I [Morac.] (1898) 42, fig. 4, t. 18; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 11-15 et Miss. Laurent (1905) 72.

M. cecropioides R. Br. ex *Teddie* in *Bowdich* Miss. Ashant. (1819) 372; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 995.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Ém. Laur.). — II a : la Lukula (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XII : pays des Mangbettu (Schw.) et des Bajandi [Aruwimi] (Ém. Laur.). — XV : Mukenge (Pg.).

OBS. — Une des plantes caractéristiques de la forêt du Bas-Congo aux Grands Lacs (De Wild.).

FLEURYA Gaudich.

Fleurya aestuans [L.] *Gaudich.* in *Freycin.* Voy. de l'Uranie (1826) 497; *Wedd.* in *DC.* Prodr. XVI¹, 71; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 250; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 163; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) [B. S. B. B. XXXVI², 80]; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I 988; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 218; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 31, t. 29.

Urera — L. Sp. pl. ed. 2 (1763) 1397.

1885 (R. Buettner). — II a : Bingila (Dup.); Shinganga (Dew.). — V : Suata (Buett.); Kisantu (Gill.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Lulanga. — Nom vern. : **Lusaka** (Dew.); Bokakata (Dew.). — IX : Bangala (Heus); Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Gulumu-Kumba** (Verd.); Albertville [Toa] (Hecq; Desc.).

Fleurya interrupta [L.] *Gaudich* in *Freycin.* Voy. de l'Uranie (1826) 497, in add.; *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI, t. 1975; *Wedd.* in *DC.* Prodr. XVI¹, 74; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 286.

Urtica — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 985.

1889 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12537).

Fleurya podocarpa *Wedd.* in *DC.* Prodr. XVI¹ (1869) 76; *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 163; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 80]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 218; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 29 et Miss. Laurent (1903) 73.

1893 (P. Dupuis). — II a : Kibinga (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.) — VIII : Coquilhatville (Dew.); Ikenge; Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd.).

URERA Gaudich.

Urera arborea *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 44 [B. S. B. B. XXXVIII², 52]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 218.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 618).

Urera cameroonensis *Wedd.* in *DC. Prodr.* XVI¹ (1869) 97; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 250.

1893 (Ém. Laurent). — II : Ile des Princes (Ém. Laur.)

Urera congolensis *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 42 [B. S. B. B. XXXVIII², 50]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 219.

1895 (A. Dewèvre). — XIII a : forêts des Stanley-Falls (Dew.).

Urera Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 41 [B. S. B. B. XXXVIII², 49]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 219.

1896 (A. Dewèvre). — XI : forêts de Lokandu. — Nom vern. : **Lusamba-Samba** (Dew. 1116).

Urera Gilletii *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 340.

1902 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 2312).

Urera Laurentii *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 72, t. 20.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — X : Imese [Ubangi] (Ém. et M. Laur.).

Urera oblongifolia *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 515; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 73.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Urera Thonneri *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, III (1899) 40 [B. S. B. B. XXXVIII², 48]; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Thonnerianae* (1900) 11.

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 29).

GIRARDINIA Gaudich.

Girardinia condensata [*Hochst.*] *Wedd.* in *Archiv. Mus. Paris*, VIII, (1855-1856) 169; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 163; *Wedd. in DC. Prodr.* XVI¹, 103.

Urtica — *Hochst. ex Steud.* in *Flora*, XXXIII (1850) 260.

Le type croît en Abyssinie.

G. condensata var. **adoensis** [Wedd.] Engl. ex De Wild. Étud. fl. Kat. (1903) 173.

M. adoensis Wedd. in Annal. sci. nat. Sér. 3, XVIII (1852) 203.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kibongo-Makungi** (Verd.).

BOEHMERIA Jacq.

Boehmeria platyphylla Don Prodr. fl. Nepal. (1825) 60; Wedd. Monog. Urtic. 364 et in DC. Prodr. XVI¹, 240; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 578; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 50].

1897 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

POUZOLZIA Gaudich.

Pouzolzia denudata De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 46 [B. S. B. B. XXXVIII². 54]; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 220; De Wild. Miss. Laurent (1905) 73.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.). — XIII a : env. de Stanleyville (Dew. 1164 a).

Pouzolzia Dewevrei De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 45 [B. S. B. B. XXXVIII², 53]; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 221.

1896 (A. Dewèvre). — V : village de Moe [env. de Bolobo] (Dew. 728).

Pouzolzia guineensis Benth. in Hook. Niger Fl. (1849) 518; Wedd. in DC. Prodr. XVI¹, 263; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 50] et Reliq. Dewevr. (1901) 221; De Wild. Miss. Laurent (1905) 73.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XI : Lokandu (Dew.). — Nom vern. : **Katafumba** [Tanganika] (Dew.).

CERATOPHYLLACEAE

CERATOPHYLLUM L.

Ceratophyllum demersum L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 992; DC. Prodr. III, 73; Fl. Danica, XII, t. 2000; Boiss. Fl. Orient. IV, 1202; Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, 639; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1899) 58; Hiern Cat. Welw. Pl. I, 1031; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 122 et Miss Laurent (1905) 20.

C. vulgare *Schlechtendal* in *Linnaea*, XI (1837) 540, t. 2.

1899 (Éd. Luja). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.); le Kasai; le Stanley-Pool (Luja). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — XV : Isaka (Ém. et M. Laur.).

MONOCOTYLEDONEAE

HYDROCHARITACEAE

LAGAROSIPHON Harv.

Lagarosiphon Schweinfurthii *Casp.* in *Bot. Zeit.* XXVIII (1870) 88 ; *C. H. Wright* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 3; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 101 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 841]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 94.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1006).

VALLISNERIA L.

Vallisneria spiralis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1015 ; *Hook.* Bot. Miscell. III, 87, t. 23-24; *C. H. Wright* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 5.

1885 (C. Callewaert). — V : le Stanley-Pool (Callew.).

OTTELIA Pers.

Ottelia halogena *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 48 [B. S. B. B. XXXVIII², 56]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 221.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Kasongo (Dew.). — XIII e : env. de Nyangwe (Dew. 944). — Noms vern. : *Kolekole* [Ikwangula]; *Kesekemeka* [Kasongo]; *Monkwe* [Tanganika] (Dew.).

Ottelia lancifolia *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 280, t. 95; *C. H. Wright* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 7.

Le type croît dans l'Afrique trop. or. et l'Angola.

— — var. **fluitans** *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* XXII (1887) 238; *C. H. Wright* l. c.; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 197.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Tumba (Ém. et M. Laur.).

Ottelia Verdickii *Guerke* ex *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 171.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lac Moero (Verd.).

BOOTTIA Wall.

Boottia abyssinica *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XXII (1887) 239 ;
C. H. Wright in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 9.

1870 (G. Schweinfurth). — M, Wright (l. c.) croit pouvoir rapporter à cette espèce une forme à fl. blanches, le n. 3638 récolté dans le pays des Mangbettu [XII d] (Schw.).

BURMANNIACEAE

BURMANNIA L.

Burmattia bicolor *Mart.* Nov. gen. et sp. I (1824) 10, t. 5, fig. 1.

Le type croit dans l'Abyssinie.

— — var. **africana** *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXV (1887) 85 ;
C. H. Wright in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 11 ; *De Wild.* Étud. fl.
 Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 122.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2596). — XIII :
 Prov. Orient. (Ser. 682).

Burmattia Braunii *Engl.* ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo
 II (1908) 234 [nom. tant.].

1898 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.).

ORCHIDACEAE

LIPARIS L. C. Rich.

Liparis guineensis *Lindl.* in Bot. Reg. (1834) t. 1671 ; *Ridl.* in Journ.
 Linn. Soc. XXII (1887) 260 ; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 20 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 111.

1902 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1794).

BULBOPHYLLUM Thou.

Bulbophyllum andongense *Rchb. f.* in Flora, XLVIII (1865) 184 ;
Rendle Cat. Welw. Pl. II, 3 ; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 31 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 115.

1903 (L. Gentil). — XIII c : Kinumbi (Gent.).

Bulbophyllum barbigerum *Lindl.* in Bot. Reg. XXIII (1837) t. 1942; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 34; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 115; II (1908) 237; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 309, t. 23 et Miss. Laurent (1905) 55, fig. 11, t. 26.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. ; Pyn. 492, 566, 1161).

Bulbophyllum calamarium *Lindl.* in Bot. Reg. (1843) misc. 70; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 33; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 123; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 115; II (1908) 237 et Miss. Laurent (1905) 53.

1903 (L. Gentil). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 883; Pyn.). — XIII c : Kinumbi (Gent.).

Bulbophyllum flavidum *Lindl.* in Bot. Reg. (1840) misc. 83; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 30.

Le type croît à Sierra-Leone.

— — var. **elongatum** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 122 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.).

Bulbophyllum Kindtianum *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 309 et Miss. Laurent (1905) 53, t. 26.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : la Loliva (M. Laur.).

Bulbophyllum nanum *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 122 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1900 (Marc. Laurent). — VIII : Bokele [le Ruki] (M. Laur. 178).

Bulbophyllum platyrachis [*err. cal. platirachis*] *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 223, t. 55 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 237.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : le Ruki (M. Laur.); Injolo (M. Laur. 1766, 2055).

Bulbophyllum Schinzianum *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 49 [B. S. B. B. XXXVIII², 57]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 123 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116; II (1908) 237.

1892 (F. Demeuse). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 32, 830, 1747; Pyn. 1451). — X : l'Ubangi (Dem.). — XV : Luebo (Ém. Laur.); Luluabourg (Lescr. 311).

ANCISTROCHILUS *Rolfe.*

Ancistrochilus Thomsonianus [*Rchb. f.*] *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 44.

Pachystoma Thomsonianum *Rchb. f.* in Gard. Chron. (1879) II, 582; *Rchb. f.* Xen. Orch. III, 35, t. 213; Bot. Mag. (1880) t. 6471.

Le type croit dans le Vieux-Calabas.

A. Thomsonianus var. **Gentilii** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 128 cum xyl. et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 117, (1906) 234.

1903 (L. Gentil). — VIII : rég. du Lopori (Biel.). — XIII c : Kinumbi (Gill.).

GENYORCHIS Schlt.

Genyorchis pumila [*Sw.*] *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 280 et in Engl. Jahrb. XXXVIII (1907) 12, fig. 5; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113; II (1908) 237; Rev. hort. Belg. (1905) 61, cum ic.

Dendrobium — *Sw.* in *Schrad.* Neues Journ. f. Bot. I (1806) 97.

Bulbophyllum — *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1830) 54.

Polystachya bulbophylloides *Rolfe* in Kew, Bull. (1900) 199 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 131.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 33, 1746; Pyn. 580).

MEGACLINIUM Lindl. (1)

Megaclinium Arnoldianum *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 55.

1903 (Marc. Laurent). — VIII ; env. d'Eala (M. Laur.).

Megaclinium congolense *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 21, 117 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 127.

1892 (Ém. Laurent). — IV : route des caravanes (Ém. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.).

Megaclinium djumaense *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 124 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2900).

Megaclinium Gentilii *De Wild.* in Belg. colon. (1902) 425 et in Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 23.

1902 (L. Gentil). — XV : chutes du Lubi à Kalala-Kafumba (Gent.).

Megaclinium Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 22.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2773 b).

(1) M. R. Schlechter [Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 281] indique une nouvelle espèce, qu'il appelle *Bulbophyllum* [*Megaclinium*] *congolanum*, au Kamerum et au Congo français et il ajoute en observation « Ich habe diese Art im ganzen Flussgebiete des Congo sehr häufig beobachtet ».

Megaclinium Laurentianum [*Kraenzl.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 22 in obs. 117; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 128 et Miss. Laurent (1905) 56.

Bulbophyllum — *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 50.

1895 (Ém. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.); Lac Léopold II (Ém. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 135). — XIII c : Kinumbi (Gent.).

Megaclinium maximum *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1830) 47; *Ridl.* in Journ. of Bot. XXIV (1886) 292; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 38; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2479).

Megaclinium minus [*err. cal. minor*] *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 125 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116.

1903 (L. Gentil). — XIII c : Kinumbi [Haut-Lomami] (Gent.).

Megaclinium purpureorachis *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 126 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 116, (1906) 235; II (1907) 123, t. 61; (1908) 237.

1903 (L. Gentil). — XII c : env. de Gombari (Ser. 566); Rungu (Ser. 866 b); Nala et env. (Van Ryss.; Ser.). — XIII c : Kinumbi [Haut-Lomami] (Gent.).

EULOPHIA R. Br.

Eulophia Bieleri *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1904) 311 et Miss. Laurent (1905) 51.

1903 (S. Bieler). — VIII : Coquilhatville; [cult. à Eala] (Biel. in M. Laur. 206).

Eulophia congoensis *Cogn.* in Journ. des Orchid. VI (1895) 155 et in *Lindenia*, XI (1895) 15, t. 486.

1895 (Coll.?). — Congo (Coll.?).

Eulophia cyrtosioides *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exp. (1900) 279 [nom. tant.] et in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 10.

1899 (R. Schlechter). — V : Lukolela (Schlt. 12643).

Eulophia gracilis *Lindl.* in Bot. Reg. IX (1823) t. 742; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 51; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 58; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 236 et Miss. Laurent (1905) 52.

1898 (Éd. Luja). — IV : Sona-Gongo (Luja). — V : Kinshasa (Schlt.); env. de Lukolela (M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XV : Batempa (M. Laur.).

Eulophia graciliscapa *Schlechter* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 418; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 569; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 234.

E. gracilis *De Wild.* [non *Lindl.*] Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1098, 2319, 3608).

Eulophia guineensis *Lindl.* in Bot. Reg. VIII (1822) t. 686; Bot. Mag. (1824) t. 2467; *Lodd.* Bot. Cab. IX (1824) t. 818; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 21; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40; II (1898) 52 [B. S. B. B. XXXVI², 80 et XXXVIII², 60] et Pl. Thonnerianae (1900) 9; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 69; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 24, (1904) 114; II (1908) 236.

1885 (C. Callewaert). — Bas-Congo (Cabra). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : le Stanley-Pool (Callew.); Kisantu (Van Houtte). — IX : Mas-sanga près Monvedo (Thonn.). — XII c : Nala (Ser. 630).

OBS. — Espèce cultivée à Eala [VIII] (M. Laur. 1787; Pyn. 427).

Eulophia Laurentiana *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 52; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 222 et Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 50].

1895 (Ém. Laurent). — IV : bords de la Pioka (Ém. Laur.); Kimuenza (Dew. 514); Kisantu (Gill. 211).

OBS. — M. R. Schlechter réunit cet *Eulophia* à l'*E. gracilis* Lindl.

Eulophia Leopoldi *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 45 [B. S. B. B. XXXVIII², 215]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 235.

1898 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.). — VI : Tumba-Mani et env. (Cabra et Michel).

Eulophia Lubbersiana *Ém. Laur.* et *De Wild.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 16; *Ém. Laur.* in Rev. Hort. Belge, XXVI (1900) 3, t. 1; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114.

1895 (Ém. Laurent). — XV : le Sankuru (Ém. Laur.); chutes du Lubi (Gent. 68).

Eulophia Lujaeana *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 47 [B. S. B. B. XXXVIII², 217]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114.

1898 (Éd. Luja). — Bas-Congo (But. in Gill. 1811). — V : env. de Léopold-ville (Luja, 99 pr. p.); Kimuenza (Gill. 1778); bords de la Sele (But. in Gill. 1463).

Eulophia lurida [*Pers.*] *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1833) 182; in Bot. Reg. (1835) t. 1821 et in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 132; *Th. Dur.*

et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 51 [B. S. B. B. XXXVIII², 59]; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 53; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114; II (1908) 236.

Limodorum luridum *Pers.* Syn. pl. II (1807) 521.

1893 (Ém. Laurent). — IV : route des caravanes (Ém. Laur.). — V : Sanda (Van Houtte). — XI : Yambuya (M. Laur. 1614 b, 1736). — XV : Gumbumi (M. Laur. 499).

E. lurida* var. *latifolia *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 129; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114; II (1908) 236 et Miss. Laurent (1905) 53, t. 25.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gent.: Gill. 2806). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 45); Baringa-Yala (Brun.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XII c : Gombari (Ser. 732). — XIII a : Stanleyville (M. Laur. 1014).

Eulophia Smithii *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 54.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Eulophia speciosa *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 63; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 23.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : bords du Tanganika (Deb.); le Katanga (Verd. 1900).

Eulophia Tanganyikae *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 46 [B. S. B. B. XXXVIII², 216].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Eulophia Walleri [*Rchb. f.*] *Kraenzl.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 157; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 67; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 23.

Cyrtopera — *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) 117.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd.).

Eulophia Welwitschii *Rolfe* in *Bolet. Soc. Brot.* VII (1889) 236 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 61; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114, (1906) 235.

1895 (A. Dewèvre). — V : bord de la Sele (But. in Gill. 1472); entre Dembo et Kisantu (Gill. 1538); entre Dembo et le Kwango (But. in Gill. 1492, 1499). — VI : Kimbunga (Gent. 107). — Ind. non cl. : Kabembele (Cabra et Michel, 54).

EULOPHIDIUM Pfitz.

Eulophidium Ledieni [*Stein*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 115; II (1908) 237.

Eulophia Ledieni Stein in Verh. d. Schles. Gesellsch. vaterl. Kultur (1886) ex Stein in Gartenflora (1888) 609, in syn.; Rolfe in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 50.

Eulophia maculata Auct. plur. [non Lindl.]; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 23 pr. p. et Étud. fl. Cgo (1896) 251; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 50].

1887 (F. Ledien). — Bas-Congo (Led.). — V : Kisantu (Gill. 431, 1101). — XII c. Rungu (Ser. 622); Wanga (Ser. 297). — XV : bassin du Lubi (Gent. 68); Gumbumi (M. Laur. 613). — Espèce cultivée à Eala [VIII] (M. Laur. 747; Pyn. 426).

LISSOCHILUS R. Br.

Lissochilus antennisepalus Rchb. f. in Flora, LXV (1882) 533; Rolfe in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 77.

Eulophia — Schlechter Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 279.

1898 (R. Schlechter). — V : Kinshasa (Schlt.).

Lissochilus arenarius Lindl. in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 133; Rolfe in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 82, 578; De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 236.

Eulophia — Bolus in Journ. Linn. Soc. XXV (1889) 185.

1899 (Edg. Verdict). — XII c : entre Vankerkhovenville et Faradje (Ser. 524). — XVI : Lukafu (Verd. 314).

Lissochilus dilectus Rchb. f. Otia Hamb. I (1878) 62; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 28 et Étud. fl. Cgo (1896) 252; Rolfe in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 83; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 54 [B. S. B. B. XXXVIII², 62]; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 223; Pl. Gilletianae, I (1900) 50; De Wild. Miss. Laurent (1905) 51 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 236.

Eulophia — Schlechter West-Afr. Kautsch.-Exped. (1900) 279.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Malela (Ém. Laur.). — II a : entre Tshoa et Boma-Sundi. — Nom vern. : **Kwisa** (Cabra). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — V : env. de Kwamouth (Biel.); le Stanley-Pool (Ém. Laur.); Léopoldville (Dew.); Kinshasa (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — XIII d : Maniema (Ém. Laur.). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.); Munungu (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Molowery (Lescr. 199).

Lissochilus elatus Rolfe in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 87.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Lissochilus giganteus Welw. ex Rchb. f. in Flora, XLVIII (1865) 187; Rchb. f. in Gard. Chron. (1888) I, 616, fig. 83; Ill. hort. (1888) 49, t. 53; Orchid Alb. X (1893) t. 457; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 28 et Étud. fl. Cgo (1896) 252; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 6; Rolfe in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 87; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1905) 113, (1906) 235; II (1908) 236 et Miss. Laurent (1905) 51.

Eulophia — N. E. Br. in Kew Bull. (1889) 90.

1883 (H. Johnston). -- Bas-Congo (Johnst. Dem.). — II : env. de Boma (Dew. 173); Sisia (Dup.). — V : Kisantu (Gill. 1260); Dembo (Vanderyst); Sanda (Verm.). — VIII : Coquilhatville (Pyn. 299); Eala et env. (M. Laur. 1208, 1760, 1763; Pyn. 627, 637, 1275); Ikenge (Ém. Laur.). — XII c : Nala (Van Ryss.). — XII d : entre Vankerkhovenville et Faradje (Ser. 533). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.). — Ind non cl. : Golongo (Lescr. 409).

Lissochilus Horsfallii *Batem.* in *Bot. Mag.* (1865) t. 5486 et *Second Cent. Orchid. Pl.* t. 121; *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* VIII (1886) 439; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 29 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 252; *Rolfe* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 84.

1874 (Fr. Naumann). — II : Ponta da Lenha (Naum. 157).

Lissochilus katangensis *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 22.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Lissochilus Leopoldi *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, III (1899) 53 [B. S. B. B. XYXVIII², 61].

1895 (Ém. Laurent). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.).

Lissochilus Lindleyanus *Rchb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) 65; *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, III (1899) 54 [B. S. B. B. XXXVIII², 62]; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 223; *Rolfe* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 77; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1905) 113 et *Miss. Laurent* (1905) 51.

Eulophia — *Schlechter* *Westafr. Kautsch.-Exped.* (1900) 279, in obs.

L. longifolius *Lindl.* [non *Benth.*] in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) 133.

1896 (Ém. Laurent). — V : env. de Léopoldville (Gill.); entre Léopoldville et Sabuka (Luja); Kimuenza (Gill.); entre Dembo et le Kwango (But.); Lukolela (Ém. et M. Laur.). — XI : entre Ikora et Kisesenge-Sanga; entre Bena-Kamba et Lokandu [XIII c] (Dew.). — XIII c : plaine marécageuse sur la route de Kinumbi-Lokandu (Gent.). — XIII d : marais de Malela vers Nyangwe (Ém. Laur.). — XV : la Loanje (Gent.).

Lissochilus porphyroglossus *Rchb. f.* *Otia Hamb.* I (1878) 61; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 30 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 252; *Rolfe* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 84.

Eulophia — *Bolus* in *Journ. Linn. Soc.* XXV (1889) 133.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kinshasa (Schlt.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — XII d : Munza (Schw.).

Lissochilus purpuratus *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) 331; *Rchb. f.* in *Flora*, XLV (1865) 188 et *Otia Hamb.* I, 63; II, 75, 114; *Rolfe* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 79; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, I (1899) 59; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 22.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : rég. du Lac Tanganika (Deb.); le Katanga (Verd.).

Lissochilus pyrophilus *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) 65; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 74; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113.

Eulophia — *Schlechter* ex *De Wild.* l. c. I (1904) 113, in syn.

1900 (R. Butaye). — V : entre le Kwango et Dembo (But. in Gill. 2231).

Lissochilus roseus *Lindl.* in Bot. Reg. (1843) misc. 25, (1844) t. 12; *Kraenzl* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 54 [B. S. B. B. XXXVIII², 62]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 223; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 85 et 578.

1895 (Ém. Laurent). — VIII : env. d'Équateurville. — Nom vern. : **Bokobele** (Dew. 572). — IX : Bangala (Ém. Laur.).

Lissochilus seleensis *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 131 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 114, (1906) 235, t. 52.

1900 (R. Butaye). — V : bassin de la Sele (But. in Gill. 1249). — VI : bassin de la Tawa [Kwilu] (Cabra et Michel).

Lissochilus stylites *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) 61; II (1881) 75 et in Flora, LXV (1885) 379; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 31 et Étud. fl. Cgo (1896) 253; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 83.

1900 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw.).

ANSELLIA Lindl.

Ansellia africana *Lindl.* in Bot. Reg. XXVIII (1842) sub t. 12; Gartenfl. (1854) t. 95; Bot. Mag. (1857) t. 4965; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 251; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 55; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 101; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113 et Miss. Laurent (1905) 65.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo orient. (Ém. Laur.). — V : Pese (Gér.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII c : bords de l'Obec, sur la route de Niangara à Gombari (Ser.). — XV : le Kasai; le Lualaba (Ém. Laur.); Ibaka; env. de Lusambo (Ém. et M. Laur.).

Ansellia congoensis *Rodig.* in Ill. hort. XXXIII (1836) 143; *N. E. Br.* in *Lindenia*, II (1836) 35, t. 64; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 32 et Étud. fl. Cgo (1896) 252; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 102; *Ém. Laur.* in Rev. hort. Belg. (1899) 193, t. 18; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 55.

1836 (Aug. Linden). — Bas-Congo (Aug. Linden). — II : Ile Mateba (Ém. Laur.)

POLYSTACHYA Hook.

Polystachya affinis *Lindl.* Gen. et sp. Orch. (1830) 73; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 126; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112, t. 42; II (1907) 122, fig. 3, (1908) 235; Miss. Laurent (1905) 65, fig. 13 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 314, t. 20.

P. bracteosa *Lindl.* Bot. Reg. (1840) misc. 48; Bot. Mag. (1845) t. 4161.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Irebu (M. Laur.); Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — XII b : le Bekele près Bama (Ser.). — XII c : env. de Surango (Ser.).

Polystachya epiphytica *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 172.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Tintamoi** (Verd. 261).

Polystachya Gilletii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 313 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 231, t. 56.

1900 (L. Gentil). — Bas-Congo (Gill. 3105). — VIII : la Monboyo (Gent.).

Polystachya golungensis *Rchb.f.* in Flora, XLVIII (1865) 185 et Otia Hamb. I, 60; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 35 et Étud. fl. Cgo (1896) 253; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 118.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3450).

Polystachya gracilis *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 136; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113 et Miss. Laurent (1905) 67, fig. 16.

1903 (L. Gentil). — XV : Mukanda-Monene [Lubue] (Gent. 45 b).

Polystachya Huyghei *De Wild.* in Le Congo I, n. 23 (1904) 5, cum ic. et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 315, cum xyl.

1903 (P. Huyghe). — VIII : env. d'Eala (Huyghe).

Polystachya Kindtiana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 21.

1901 (J. Gillet). — V : rég. de Kisantu (Gill. 2109).

Polystachya latifolia *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 138, (1904) 319, fig. 14; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 113 et Miss. Laurent (1905) 65.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 2087). — VII : Basenga [Lukenie] (Gent. 30 b). — VIII : Lac Tumba (Ém. Laur.). — XIII c : Kinumbi [Haut-Lomami] (Gent.). — XV : Bas-Kasai (Ém. Laur.).

Polystachya Laurentii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 132; *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 112, 233 et Miss. Laurent (1905) 67, t. 29.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala; Bamania (M. Laur.).

Polystachya mayombensis *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 134, (1904) 317; *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 112 (1906) 233 et Miss. Laurent (1905) 67, t. 30.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II a : zone du Mayumbe (Ém. et M. Laur.); rég. de Tshela (Coll.?).

Polystachya mukandaensis *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 139 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 113.

1902 (L. Gentil). — XV : Mukanda-Monene [le Lubue] (Gent. 45).

Polystachya mystacioides [*err. cal. mystacioides*] *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 133; *Gooss. Dict. iconog. Orchid.* (1905) [Polystachya] t. 2; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 112, (1906) 233; II (1908) 255 et Miss. Laurent (1905) 67, t. 31.

1900 (L. Gentil). — VIII : Losenge [la Momboyo] (Gent.); rég. du Lopori (Biel.); Dikila-Yala (Brun.). — Espèce cultivée à Eala [VIII] (Pyn. 494).

Polystachya odorata *Lindl.* in *Journ. Linn. Soc.* VI (1862) 130; *Kraenzl. in Rchb. f. Xen. Orchid.* III, 90, t. 248, fig. 14-16, t. 249, fig. 4; *Rolfe in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 113; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 112.

1903 (L. Gentil). — XIII c : Kinumbi (Haut-Lomami] (Gent.).

Polystachya polychaete *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* XVII (1893) 50; *Rolfe in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 120; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 25, t. 22 et *Rev. Hortic. belg. et étrang.* (1905) 63 [et xyl. p. 62].

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.; M. Laur. 1241; Pyn. 425, 653, 1320); Basankusu (Brun.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

Polystachya ramulosa *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1838) misc. 76; *Rolfe in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 118; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 112 et Miss. Laurent (1905) 68.

1900 (L. Gentil). — VIII : Lolamanga [Monboyo] (Gent.); rég. du Haut-Lopori (Biel.); Injolo (M. Laur. 1786). — XIII c : rives du Bomokandi (Ser. 644).

Polystachya rhodoptera *Rchb. f.* in *Hamb. Gartenzeit.* XIV (1858) 214; *Rolfe in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 109; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 112.

1903 (P. Huyghe). — VIII : env. d'Eala (Huyghe).

Polystachya tessellata *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 130 ;
Rendle Cat. Welw. Pl. II, 7 ; *Rolfe* in *Dyer*. Fl. trop. Afr. VII, 114 ;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 112.

1895 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Schlt.).

Polystachya Wahisiana *De Wild.* in Belg. colon. (1904) 183, c. xyl. ;
 Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 318, t. 21 et Étud. fl. Bas- et
 Moy.-Cgo, I (1906) 233.

1900 (L. Gentil). — VIII : Bokatela (Gent.).

CYRTOPERA Lindl.

Cyrtopera flavo-purpurea *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) 68 ; *Th.*
Dur. et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 38 et Étud. fl. Cgo (1896) 253.

Eulophia — *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 65.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3846).

SACCOLABIUM Bl.

Saccolabium oenioides *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl.
 Cgo, III (1899) 54 [B. S. B. B. XXXVIII², 62] ; *De Wild.* et *Th. Dur.*
 Reliq. Dewevr. (1901) 223 ; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II
 (1908) 238.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : Coquilhatville (Dew. 584) ; Basankusu (Brun.).
 — XI : env. de Yambuya (Solh. 103).

ANGRAECUM Thou.

Angraecum Arnoldianum *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 224,
 t. 56-58 ; in Trib. hort. (1906) 118, t. 6-8 et Étud. fl. Bas- et Moy.-
 Cgo, II (1907) 27, t. 25, (1908) 238.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur. ; Pyn. 652) ; Ba-
 ringa-Yala (Brun.). — IX : env. de Bumba (Pyn. 94). — XI : Yambuya et env.
 (M. Laur. 1067, 1785 ; Solh. 3). — XII a : route de Buta à Poko (Ser. 655). —
 XII c : Poko [territ. du chef Gaitu] (Ser. 655 b).

Angraecum biloboides *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I
 (1903) 144 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109 ; II (1908) 238.

1901 (L. Gentil). — Bas-Congo (Gill.). — I : env. de Moanda (Gill.). — VII :
 Basenga [la Lukenie] (Gent.).

Angraecum bilobum *Lindl.* in Bot. Reg. (1840) misc. 69, (1841)
 t. 35 ; *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. bot. VI, 904 ; *De Wild.* Étud. fl.

Bas- et Moy.-Cgo (1903) 24 et Miss. Laurent (1905) 59; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 138.

Listrostachys biloba *Kraenzl.* in Engl. Jahrb. XXII (1887) 28, in not.

A. apiculatum *Hook.* in Bot. Mag. (1845) t. 4159.

1899 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.).

Angraecum crinale *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 320 et Miss. Laurent (1905) 59.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.).

Angraecum Gentilii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 140 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109; II, 28, t. 30.

1903 (L. Gentil). — XIII c : Kinumbi [Haut-Lomami] (Gent.).

Angraecum imbricatum *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 137; *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 55 [B. S. B. B. XXXVIII², 63]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 224; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109; II (1907) 28, (1908) 238; Miss. Laurent (1903) 60 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 163; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 144.

1892 (G. Descamps). — V : Lukolela (Pyn.). — VI : la Djuma (Gill.); Madibi (Lescr.). — VII : Bolombo (Ém. Laur.). — VIII : Eala et env.; Irebu (M. Laur.). — XIII c : Lokandu (Dew.). — XV : Lac Foa (Lescr.); chutes du Lubi (Gent.).

Angraecum Kindtianum [*De Wild.*]*De Wild.* Miss. Laurent (1906) 225, t. 81 et fig. 27.

Listrostachys — *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 148; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118 et Miss. Laurent (1906) 56.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Coquilhatville; la Loliva (M. Laur.); Eala (M. Laur. 1753, 1754; Pyn. 363, 1533); Injolo (M. Laur. 2058). — XII c : Poko; bords du Bomokandi (Ser. 660). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Angraecum konduense *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 321 et Miss. Laurent (1905) 60.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Angraecum Laurentii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 322 et Miss. Laurent (1905) 60.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : entre Coquilhatville et Ikelemba (M. Laur.).

Angraecum lepidotum *Rchb. f.* in Gard. Chron. (1880) I, 806, in obs.; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 146; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109 et Miss. Laurent (1905) 61.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.); Eala (Ém. et M. Laur.). — XV : Kapinga (Ém. et M. Laur.).

Angraecum Lujaei *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 142 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109.

1899 (Éd. Luja). — XV : Bombaie (Luja, 272).

Angraecum ovalifolium *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 161 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 26.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 686).

Angraecum Pynaerti *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 160 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 25, t. 23-24.

1986 (L. Pynaert). — VIII : Eala (Pyn.).

Angraecum scandens *R. Schlechter* in Engl. Jahrb. XXXVIII (1905) 24, fig. 8.

Le type croît au Kamerun.

— — var. **longifolium** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 26, t. 17, (1908) 238.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala et env. (M. Laur. 824, 1211, 1775; Pyn. 1427); Ikoko (Brun.).

Angraecum stipulatum *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 225, t. 82, 83 et fig. 28.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : la Loliva (M. Laur.).

Angraecum Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 21.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 3, 328).

Angraecum viridescens *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 61, t. 28.

Mystacidium Laurentii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 152 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118.

1900 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 28).

Angraecum zigzag *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 143 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109.

1901 (L. Gentil). — Bas-Congo (Gill.). — VII : Basenga [la Lukenie] (Gent.).

LISTROSTACHYS Rchb. f.

Listrostachys Althoffii [*Kraenzl.*] *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 47; *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 56 [B. S. B. B. XXXVIII², 64]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 224.

Angraecum Althoffii *Kraenzl.* in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. II (1889) 160;
De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 24.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Bokakata. — Nom vern. : **Boloko** (Dew.). —
XV : Bombaie (Luja).

Listrostachys ashantensis [*Lindl.*] *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. bot.
VI (1864) 908; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 159.

Angraecum — *Lindl.* in Bot. Reg. (1843) misc. 56; *Schlechter* Westafr.
Kautsch.-Exped. (1900) 283.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt.).

Listrostachys capitata [*Lindl.*] *Rchb. f.* in *Flora*, XLVIII (1865)
190; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 166; *De Wild.* Étud. fl. Bas-
et Moy.-Cgo, I (1904) 117; II (1907) 28, (1908) 238.

Angraecum — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 137; *Schlechter* Westafr.
Kautsch.-Exped. (1900) 281.

1903 (L. Gentil). — V : Lukolela (M. Laur.); env. de Kisantu (Gill.). — VIII :
Eala; Injolo (M. Laur.); Irebu (Schlt.); env. d'Eala (Ém. Laur.). — XII : l'Uele
(Ser.). — XIII c : Kinumbi [Haut-Lomami] (Gent.).

Listrostachys caudata [*Lindl.*] *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. bot. VI
(1864) 907; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 48; *Rolfe* in *Dyer*
Fl. trop. Afr. VII, 153; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I
(1904) 323, t. 22 et *Miss. Laurent* (1905) 56, fig. 12.

Angraecum — *Lindl.* in Bot. Reg. XXII (1836) t. 1844; Bot. Mag. (1848)
t. 4370; *Reichenbachia*, Ser. I, t. 67.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Listrostachys Chailluana [*Hook. f.*] *Rchb. f.* in *Flora*, LXVIII
(1885) 381 in obs.; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 153; *Th. Dur.*
et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 56 [B. S. B. B. XXXVIII², 64];
De Wild. et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 9; *De Wild.* Étud.
fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 117.

Angraecum — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1866) t. 5589.

1896 (Fr. Thonner). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX a : Gali (Thonn.). —
XIII c : Kinumbi (Gent.).

Listrostachys Dewevrei *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I
(1903) 145 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 117.

1895 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew.).

Listrostachys Droogmansiana *De Wild.* in *La Belg. colon.* (1902)
425 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 24.

1902 (L. Gentil). — XV : chutes du Lubi (Gent.).

Listrostachys Durandiana *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 57 [B. S. B. B. XXXVIII², 65]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 25.

1895 (Ém. Laurent). — IV : la Pioka (Ém. Laur.). — VII : Basenga [la Lukenie] (Gent.).

Listrostachys falcata *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 146 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 117; II (1908) 238.

1888 (F. Demeuse). — V : Sanda (Brielman in Gill. 5970); Tshumbiri (M. Laur. 695). — VI : vallée de la Djuna (Gill. et Gent.). — VII : l'Ikata [la Lukenie] (Dem. 24). — VIII : Eala (M. Laur. 1128, 1751). — XII c : Amadis (Ser. 116).

Listrostachys Gentilii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 147; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 117; II (1907) 28, (1908) 239 et Miss. Laurent (1906) 227, fig. 29, 30.

1900 (L. Gentil). — VIII : Eala (M. Laur. 752); Bomba [le Momboyoy] (Gent.). — XI : Yambuya et env. (Sohl.; M. Laur. 755). — XIII a : Stanleyville (Pyn.).

Listrostachys ichneumonea [*Lindl.*] *Rchb. f.* in Gard. Chron. (1887) II, 681, in obs.; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 163.

Angraecum — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 136; *Rchb. f.* in Gard. Chron. (1887) II, 681; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exp. (1900) 282.

1899 (R. Schlechter). — V : Bokala (Schlt.).

Listrostachys linearifolia *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 149 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118; II (1908) 239.

1895 (Ém. Laurent). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.; Pyn. 4775); Injolo (M. Laur. 1767); le Haut-Lopori (Biel.). — XII c : Amadis (Ser. 840). — XIII a : Romée (M. Laur. 1768). — Ind. non cl. : bords du Lomami (M. Laur.).

Listrostachys Margaritae *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 150 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118; II (1908) 239.

1901 (L. Gentil). — VII : Basenga [Lukenie] (Gent.). — VIII : Eala (M. Laur. 1193); Injolo (M. Laur. 1087 b). — XII c : env. de Poko (Ser. 661).

Listrostachys Monteirae *Rchb. f.* in *Linnaea*, XLI (1877) 76; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 156; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 324; Miss. Laurent (1905) 56 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 235.

1901 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

Listrostachys pellucida [*Lindl.*] *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. bot. VI (1864) 908; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 162; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118; II (1908) 239 et Miss. Laurent (1905) 58, t. 27.

Angraecum — *Lindl.* in Bot. Reg. (1844) t. 2.

1888 (F. Demeuse). — VIII : Bala-Lundzi (M. Laur.); Wangata (Huyghe et Ledoux); Eala (M. Laur. 1734, 1743). — XII : Guago (Ser. 291). — XII a : entre Gangara et Libokwa et près de Buta (Ser. 116 b). — XII a et b : entre Bima et Bambili (Ser. 116). — XII c : Amadis (Ser.). — XII d : rive du Wesec [rive droite de l'Uele] (Ser.). — XV : le Sankuru (Dem.).

Listrostachys Pynaertii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 164 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 28, fig. 1 et t. 1; II (1908) 239.

1905 (L. Pynaert). — VIII : Eala et env. (Pyn. 626; M. Laur. 1298, 1737).

Listrostachys subulata [*Lindl.*] *Rchb. f.* in *Walp.* Annal. bot. VI (1864) 909; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 56 [B. S. B. B. XXXVIII, 64]; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 168.

Angraecum — *Lindl.* in *Hook.* Comp. Bot. Mag. II (1836) 206; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 46.

1895 (Ém. Laurent). — VIII : Lougo [Ruki] (Gent.). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.).

Obs. — M. De Wildeman rapporte, avec doute, à cette espèce des échantillons récoltés à Bombaie et à Kapinga par Ém. Laurent (Conf. Miss. Laurent, 58).

Listrostachys Thonneriana *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 56 [B. S. B. B. XXXVIII², 64]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 9, t. 4).

1896 (Fr. Thonner). — IX a : Gali (Thonn. 193).

Listrostachys vesicata *Rchb. f.* in *Flora*, XLVII (1865) 190; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 163; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118; II (1907) 29, t. 2 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 166.

1900 (J. Gillet). — V : Bas-Congo; Kimuenza (Gill.).

MYSTACIDIUM Lindl.

Mystacidium congolense *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 151; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 118 et Miss. Laurent (1905) 58.

1903 (L. Gentil). — VII : Basenga [Lukenie] (Gent. 30 b). — VIII : Coquilhatville (Ém. et M. Laur.).

Mystacidium distichum [*Lindl.*] *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* XVIII (1881) 337; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 52; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 175; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 25; II (1908) 239 et Miss. Laurent (1905) 58.

Angraecum distichus Lindl. in Bot. Reg. XXI (1835) t. 1781.

Aeranthus — *Rchb. f.* in Walp. Annal. bot. V (1864) 901; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII², 36].

1888 (F. Demeuse). — VII : Ibaka (Gent.); l'Ikata [la Lukenie] (Dem.); Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.; Pyn.); Baringa-Yala (Brun.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

M. distichum* var. *grandifolium *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 240.

1895 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur. 724); Injolo (M. Laur. 1902).

Mystacidium infundibulare [*Lindl.*] *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1897) 170; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 240.

Angraecum — *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 136.

1905 (Alph. Cabra et Fr. Michel). — Ind. non cl. : riv. Kilo (Cabra et Michel, 4).

OBS. — M. De Wildeman croit que la plante congolaise devra constituer une var. *brevifolium*.

Mystacidium xanthopollinium [*Rchb. f.*] *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 55; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 173; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII², 66]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 11; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 163; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1904) 118; II (1907) 30 et Miss. Laurent (1905) 58.

Aeranthus — *Rchb. f.* in Flora, XLVIII (1865) 190.

A. erythropollinius *Rchb. f.* l. c. (1865) 190; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 25; II (1908) 240.

Mystacidium — *Th. Dur. et Schinz* l. c. V (1895) 52; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 59 et Pl. Gilletianae, I (1900) 50 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 50].

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Cabra). — II a : bords de la Lukula à Zenze (Ém. Laur.); le Mayumbe (Cabra). — V : Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Bikoro [Lac Tumba] (Gent.); Bombimba (M. Laur.). — IX : rivière de l'Itimbiri (Ser.). — XI : env. de Yambuya (Solh.). — XII c : env. de Gombari (Ser.). — XV : le Sankuru (Ém. Laur.); Lusambo (Gent.).

VANILLA Sw.

Vanilla acuminata *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXXII (1896) 456; *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII², 66]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 224; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 177; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 63.

1895? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — XIII : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.).

Vanilla africana *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 137; *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII², 66]; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 176; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 63.

1895 ? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Vanilla cucullata *Kraenzl.* in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. II (1889) 161; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 55; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII², 66]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 224; *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXXII (1887) 456 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 177.

1895 (A. Dewèvre). — XI : Basoko (Dew.).

Vanilla grandifolia *Lindl.* in Journ. Linn. Soc. VI (1862) 138; *Rolfe* in Journ. Linn. Soc. XXXII (1887) 458 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 179; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 58 [B. S. B. B. XXXVIII², 66]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110; Miss. Laurent (1905) 63 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 327.

1899 (J. Gillet). — V : Dembo (Gill.); vallée de Kisantu (Ém. Laur.). — XV : plantations Lacourt (Taym.).

Vanilla Laurentiana *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 327 et Miss. Laurent (1905) 63.

1903 (Van Rysselberghe). — XII c : Nala (Van Ryss.).

— — var. **Gilletii** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 328 et Miss. Laurent (1905) 64.

1903 (J. Gillet). — V : ravin de Kimpesse [Kisantu] (Gill. 3362; Ém. et M. Laur.).

Vanilla Lujae *De Wild.* in Belg. colon. X (1904) 28, cum xyl.; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 111 et 231, t. 42 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 327.

1903 (M. Taymans et Éd. Luja). — XV : Køndue (Taym. et Luja); la Lulua (le P. Sendens).

ZEUXINE *Lindl.*

Zeuxine elongata *Rolfe* in Bolet. Soc. Brot. IX (1891) 142 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 181; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 65 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 24.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Schlt.); entre Dembo et le Kwango (But.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

PLATYLEPIS A. Rich.

Platylepis glandulosa *Rchb. f.* in *Linnaea*, XLI (1877) 62; *Bolus* Icon. Orch. austro-afr. I, t. 11; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 184; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 20.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

MANNIELLA Rchb. f.

Manniella Gustavi *Rchb. f.* *Otia* Hamb. II (1881) 109; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 185.

Le type croît dans la Haute et la Basse-Guinée.

— — var. **picta** *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 153; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 119 et *Miss. Laurent* (1905) 65.

1901 (L. Gentil). — XV : Kondue [Sankuru] (Gent. 7; Ém. et M. Laur.).

POGONIA Juss.

Pogonia umbrosa *Rchb. f.* in *Flora*, L (1867) 102; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 12; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 186; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 122, t. 55, 56.

1906 (Éd. Luja). — XV : rég. du Sankuru (Luja).

HABENARIA Willd.

Habenaria Debeerstiana *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marangu (Deb.).

Habenaria Guingangae *Rchb. f.* in *Flora* XLVIII (1865) 179; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 207.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Pala (Deb.).

Habenaria Haullevilleana *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 172.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Songania** (Verd. 373).

Habenaria ichneumonea [*Sw.*] *Lindl.* Gen. and sp. Orch. (1835) 313; *Kraenzl.* in *Engl. Jahrb.* XVI (1892) 136 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; *De*

Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 224; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 79; Rolfe in Dyer Fl. trop. Afr. VII, 240; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 230; II (1908) 234.

Orchis ichneumonea Sw. in Pers. Syn. pl. II (1807) 506.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kidama (Van Tilborg); Kimuenza (Dew. 500). — XII c : entre Amadis et Surango (Ser. 656); Poko et env. (Van Ryss.; Ser. 656 c). — XV : route de Kabuluku à Kanda-Kanda (Lescr. 333). — XVI : Kapanga (Desc.).

Habenaria Kitondo *De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 23.*

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kitondo** (Verd. 334).

Habenaria Laurentii *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 325 et Miss. Laurent (1905) 62.*

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Habenaria macrura *Kraenzl. in Engl. Hochgeb. trop. Afr. (1892) 183 et in Engl. Jahrb. XVI (1892) 152; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 81; Kraenzl. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 225; Rolfe in Dyer Fl. trop. Afr. VII, 229; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 109, (1906) 230; II (1908) 234.*

1885 (C. Callewaert). — V : le Stanley-Pool (Callew.); Léopoldville (Dew. 490); Lula-Lumene (Hendr.); env. de Kisantu (Gill. 3514); rég. de Sanda (Odd. in Gill. 3631). — Ind. non cl. : Golungo (Lescr. 407).

Habenaria Poggeana *Kraenzl. in Engl. Jahrb. XVI (1892) 207; Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, III (1899) 59; [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110, (1906) 230.*

Platycoryne — *Rolfe in Dyer Fl. trop. Afr. VII (1898) 258.*

1881? (P. Pogge). — Bas-Congo (But.). — V : env. de Kisantu et de Sanda (Gill.); entre Dembo et le Kwango (But.). — VII : Malepie (Ém. Laur.). — XV : la Lulua (Pg. 1443). — Ind. non cl. : Bakumba (Dem.).

Habenaria procera [*Afzel.*] *Lindl. Gen. et sp. Orch. (1835) 318 et in Bot. Reg. (1836) t. 1858; Kraenzl. in Engl. Jahrb. XVI (1892) 164; Rolfe in Dyer Fl. trop. Afr. VII, 220; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110.*

Orchis — *Afzel. ex Sw. in Vet. Akad. Handl. Stockh. XXI (1800) 207; Pers. Syn. pl. II. 506.*

1902 (L. Gentil). — XV : bord de la Loanje [affl. de la Lubue] (Gent.).

Habenaria zambesina *Rchb. f. Otia Hamb. II (1881) 96; Kraenzl. in Engl. Jahrb. XVI (1892) 213 et in Engl. Pfl. Ost-Afr. 153; Rolfe in Dyer Fl. trop. Afr. VII, 211; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110, (1906) 230; II (1908) 234 et Miss. Laurent (1905) 63.*

1901 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 2278). — V : Boko (Vanderyst). — XV : Batshoke (Leser. 414); Kondue (Ém. et M. Laur.); env. de Kabinda (V. Dur.). — Ind. non cl. : Tshofu [la Tshopo ? XIII a] (V. Dur.).

BONATEA Willd.

Bonatea Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 24.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lusepo** (Verd. 263).

SATYRIUM Sw.

Satyrium Gilletii *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 153 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1822).

Satyrium Goetzenianum *Kraenzl.* in Engl. Jahrb. XXIV (1898) 506; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 574.

? *S. brachypetalum* *Engl.* [non *A. Rich.*] in *v. Goetz.* Durch Afrika (1895) 385.

1894 (G. A. von Goetzen et von Prittwitz). — XIV : volcan Kirunga [N. du Lac Kivu] (Goetz. et Prittw.).

Satyrium riparium *Rehb. f.* in *Flora*, XLVIII (1865) 183; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 267; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67].

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut Marungu (Deb.).

DISA Berg.

Disa aurantiaca *Rehb. f.* in *Flora*, L (1867) 98; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 100; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 59 [B. S. B. B. XXXVIII², 67]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 18; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 225.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza (Dew. 498).

Obs. — M. Rolfe [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 280] réunit cette espèce au *D. ochrostachya* *Rehb. f.*

Disa erubescens *Rendle* in *Britt.* Journ. of Bot. XXXIII (1895) 297; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 277.

D. Leopoldi *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 48 pr. p. [B. S. B. B. XXXVIII², 218]. — [Conf. *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 24 in obs.].

1890 (Paul Briart). — XVI : Musima (Lualaba) (Briart).

Disa katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 25.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mulongwe** (Verd. 418).

Disa ochrostachya *Rchb. f.* in Flora, XLVIII (1865) 181; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 279; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110.

D. aurantiaca *Rchb. f.* l. c. L (1867) 98; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 18.

1900 (R. Butaye). — Bas-Congo (But. in Gill. 1805, 1835).

Disa Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 26.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 410).

Disa Walleri *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) 105; *R. Schlechter* in Engl. Jahrb. XXXIII (1901) 238; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 24; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 282.

D. Leopoldi *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 48 pr. p. [B. S. B. B. XXXVIII², 218].

1890 (Paul Briart). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 419); Musima [Lualaba] (Briart pr. p¹).

Disa Welwitschii *Rchb. f.* in Flora, XLVIII (1865) 181; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 280; *Hiern* Cat. Welw. Pl. II, 18; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 234.

1891 (F. Demeuse). — Mont Bangu [*err. cal.* Bundu]. — Nom vern. : **Jada Samba** (Dem.). — V : Kisantu et dans la région [But. in Gill. 3599; Odd. in Gill. 3042; Vanderyst, 65]; Boko; Dembo (Vanderyst). — XII d : Bokoyo (Ser. 596). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Shikololo** (Verd. 393); route de Kabinda à Tshopo (V. Dur.).

BRACHYCORYTHIS Lindl.**Brachycorythis Briartiana** *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VI (1899) 49 [B. S. B. B. XXXVIII, 2, 419].

1890 (Paul Briart). — XVI : Musima [Haut-Lualuba] (Briart).

Brachycorythis pleistophylla *Rchb. f.* Otia Hamb. II (1881) 104; *Kraenzl.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 80]; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 202; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110, (1906) 230; II (1908) 234.

Platanthera — *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 274.

B. Leopoldi *Kraenzl.* Orch. gen. et sp. I (1898) 542 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 61 [B. S. B. B. XXXVIII², 69]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 59.

1891 (G. Descamps). — Bas-Congo (But.). — II a : le Mayumbe (Deleval). — IV : env. de Tumba (Cabra et Michel). — V : Kinshasa (Schlt.); Sanda (Verm.); Boko (Vanderyst); Lemfu (But.); Banza-Boma (Luja). — XV : le Lutembue (Desc.).

Brachycorythis pubescens *Harv.* Thes. Capens. I (1859) 35, t. 34; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 19; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 201; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 110 et *Miss. Laurent* (1905) 63.

Platanthera Brachycorythis *Schlechter* in *Engl. Jahrb.* XX, Beibl. n. 50 (1895) 12.

1901 (L. Gentil). — VI : région du Kwango (But.). — XV : Kondue (Gent. 18; Ém. et M. Laur.).

Brachycorythis rhomboglossa *Kraenzl.* Orch. gen. et sp. I (1898) 544 et in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo. III (1899) 60 [B. S. B. B. XXXVIII², 219]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 225.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Kasongo (Dew. 980).

Brachycorythis Schweinfurthii *Rchb. f.* Otia Hamb. I (1878) 59; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 115 et Étud. fl. Cgo (1896) 153; *Rolfe* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 201.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3577).

DISPERIS Sw.

Disperis aphylla *Kraenzl.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, III (1899) 63; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 225; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 230.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Kisantu (Gill. 3588) — XIII : entre Matende et Nikanga (Dew. 1085).

FLAGELLARIACEAE

FLAGELLARIA L.

Flagellaria guineensis *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 181; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 90; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 233.

F. indica *Thoms.* [non *L.*] in *Speke Nile*, Append. (1863) 650; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 436; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 64; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 99 et *Miss. Laurent* (1905) 24.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Gill.). — I : Moanda (Gill.). — II a : Temvo (Ém. et M. Laur.). — IV : Luvituku (Luja). — VII : Kutu; Kiri (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.; Pyn.). — Ind. non cl. : Foi (Dem.).

ZINGIBERACEAE

CURCUMA L.

***Curcuma longa** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 2; Bot. Reg. (1825) t. 886; *Bentl. et Trim. Medic. Pl.* III, t. 269; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 227; *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich [Zingib.]* (1904) 108.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu et cultivé dans les villages (Gill.). — XIII c : la Lowa (Dew.).

KAEMPFERA L.

Kaempfera aethiopica [Solms] *Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pl.* III (1883) 642; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 294; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 19; *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich [Zingib.]* (1904) 69, fig. 10.

Cienkowskia — *Solms in Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin* (1863) 7.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Lukafu (Verd. 277) : Baudouinville (Deb.).

OBS. — Dans les *Matériaux pour la flore du Congo*. II (1898) 81, la plante récoltée à Baudouinville a été, à tort, rapportée au *K. pleiantha*.

Kaempfera Dewevrei *De Wild. et Th. Dur. in Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, V (1899) 23 [B. S. B. B. XXXVIII², 142]; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 226; *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich [Zingib.]* (1904) 71.

1896 (A. Dewèvre). — XIII c : env. de la Montagne Marioe (Dew. 1021).

Kaempfera pallida *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 20.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 297).

OBS. — Espèce omise dans le *Pflanzenreich* d'Engler.

Kaempfera pleiantha *K. Schum. in Engl. Jahrb.* XV (1892) 425; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 124; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 296; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126]; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 20; *K. Schum. in Engl. Pflanzenreich [Zingib.]* (1904) 69.

1896 (G. Descamps). — XVI : Pweto (Desc.); le Lofoi (Verd.).

CADALVENA Fenzl.

Cadalvena spectabilis *Fenzl* in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, Abt. II (1865) 140; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 297; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 20; Bot. Mag.^s (1905) t. 7092.

Costus spectabilis *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 422; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 129 et Étud. fl. Cgo (1896) 255; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 230; *K. Schum.* in Engl. Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 421; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 160.

1888 (Fr. Hens). — IV : Zeugeto (Cabra, 1, 58); Lukungu (Hens, 353; Dew. 163). — V : Kisantu; env. de Dembo (Gill. 1152). — XVI : le Lofoi (Verd.); Albertville [Toa] (Desc.).

AFRAMOMUM K. Schum. (1)

Aframomum albo-violaceum [*Ridl.*] *K. Schum.* in Engl. Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 207.

Amomum — *Ridl.* in *Britt. Jour. of Bot.* XXV (1887) 130; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 304.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 903).

Aframomum colosseum *K. Schum.* in Engl. Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 206.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1472).

Aframomum Daniellii [*Hook. f.*] *K. Schum.* in Engl. Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 218.

Amomum—*Hook. f.* in *Kew. Journ. of Bot.* IV (1854) [t. 5 sub nom. *A. Afzeli*] 129; Bot. Mag. (1884) t. 4764.

Am. angustifolium *Auct.* [non *Sonner.*]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51] *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 308; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 106.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm). — V : Kisantu (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2857).

Aframomum granum-paradisi [*L.*] *K. Schum.* in Engl. Pflanzenreich. [Zingib.] (1904) 213.

(1) **Aframomum luteo-album** [*K. Schum.*] *K. Schum.* in Engl. Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 216.

Amomum — *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 413; *Bak.* in *Dyer*, Fl. trop. Afr. VII, 310.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d? : rég. des Uandos (Schw.).

Amomum granum Paradisi L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 2? *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1851) t. 4603; *Th. Dur. et Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 126; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 304; *Gagnepain* [Zingib. Afric. (1902) 28-33] in B. S. B. Fr. Sér. 4, III (1903) 371.

1881? (P. Pogge). — Ind. non cl. : Bolama (Pg. 1510).

Aframomum latifolium [*Afzel.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 209.

Amomum — *Afzel.* Remed. Guin. I (1813) 5; *Th. Dur. et Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 126 et Étud. fl. Cgo, (1896) 254; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 305.

Ann.? (Coll.?). — Congo (Coll.? fide Roscoe).

Aframomum Laurentii [*De Wild. et Th. Dur.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 213.

Amomum — *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 1 [B. S. B. B. XXXVIII, 2, 137]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr (1901) 227.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : Shimbete (Dew.). — Nom vern. : **Mabole** [Kasai].

Aframomum Masuianum [*De Wild. et Th. Dur.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 212.

Amomum — *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 19 [B. S. B. B. XXXVIII, 2, 138]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 228.

1895 (A. Dewèvre). — II : Malela, CC. le long de l'eau et dans la forêt (Dew.).

Aframomum Melagueta [*Rosc.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich*. [Zingib.] (1904) 204.

Amomum — *Rosc.* Scitam. (1828) 29, t. 98; *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXV (1887) 130; *Th. Dur. et Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 127 et Étud. fl. Cgo (1896) 254; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 221; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 303; *Bentl. et Trim.* Medic. Pl. III, t. 268.

Ind. vague, 1823 (fide Rosc.); ind. posit. 1895 (Dew.). « Du Congo Sierra-Leone » (Rosc.). — VIII : Équateur. — Nom vern. : **Mondungu** (Dew.).

Aframomum sanguineum [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 219; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 218 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 23.

Amomum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 412; *Bak.* in *Dyer* Fl. Afr. VII, 310; *Th. Dur. et Schinz.* Étud. fl. Cgo (1896) 254; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 228.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — II a : la Lukula (Kest.); Temvo (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1123). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Aframomum polyanthum [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 207.

Amomum — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 411; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 309.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Linduku (Schw. 3092).

Aframomum sceptrum [*Oliv. et Hanb.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 214.

Amomum — *Oliv. et Hanb.* in *Journ. Linn. Soc.* VII (1863) 109; *Hook.* in *Bot. Mag.* (1869) t. 5761; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 127 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 255; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 306.

1893 (Ém. Laurent). — Forêts du Bas-Congo (Ém. Laur.).

ZINGIBER Adans.

***Zingiber officinale** *Rosc.* in *Trans. Linn. Soc.* VIII (1807) 348; *Bentl.* et *Trim.* *Medic. Pl.* III, t. 270; *Bak.* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI, 246; *De Wild.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51]; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 170, fig. 23.

Amomum *Zingiber L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 1.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

COSTUS L.

Costus afer *Ker* in *Bot. Reg.* VIII (1833) t. 683; *Hook.* in *Bot. Mag.* (1857) t. 4977; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 188 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 255; *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXVII, 126]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 229; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 299; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 292; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 217.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : brousse de Zobe. — Nom vern : **Nkusu** (Ém. Laur.); Shinganga. — Nom vern. : **Ruisa** (Dew.). — V : Sabuka (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Ém. et M. Laur.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Mukundji (Ém. Laur.).

Costus Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, V (1899) 20 [B. S. B. B. XXXVIII², 139]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 229; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 387; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 218.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XV : Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Costus edulis *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, V (1899) 22 [B. S. B. B. XXXVIII², 141]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 229; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Zingib.] (1904) 395; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 218.

1896 (A. Dewèvre). — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 916 a).

Costus Lucanusianus *J. Braun et K. Schum.* in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. II (1889) 151; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 128 et Étud. fl. Cgo (1896) 255; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 230 et Pl. Gilletianae, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 51]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 299; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 65, cum xyl.; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 392, fig. 46.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : la Lemba (Dew.). — V : Kisantu (Gill.).

Costus phyllocephalus *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 420; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 81 [B. S. B. B. XXXVII, 126]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 60 et Reliq. Dewevr. (1901) 230; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 298; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 23; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 386.

1891 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill. 343, 879). — VIII : Équateur. — Nom vern. : **Mosasanga** (Dew. 556). — IX : pays des Bangala (Dem.). — XV : Lac Foa (Lescr. 233).

Costus trachyphyllus *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 420; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 256; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 300; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 409.

1870 (G. Schweinfurth). — XII c : le Mbruole (Schw.).

RENEALMIA L. f.

Renealmia bracteata *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 27 [B. S. B. B. XXXIX², 79].

1899 (F. Demeuse). — Ind. non cl. : le Lomami (Dem.).

OBS. — Espèce omise dans le *Pflanzenreich* d'Engler.

Renealmia Cabrae *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 26 [B. S. B. B. XXXVIII², 145]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 23; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 292.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel).

Renealmia congolana *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 25 [B. S. B. B. XXXVIII², 144]; *Th.*

Dur. et De Wild. Reliq. Dewevr. (1901) 230; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 218; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 293.

1882? (P. Pogge). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Boconambo** (Dew. 634). — XV : Dibeles (Ém. et M. Laur.); Mukenge (Pg.).

Renealmia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 24 [B. S. B. B. XXXVIII², 143]; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 51; II (1901) 131 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51, 841] et Reliq. Dewevr. (1901) 231; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Zingib.] (1904) 293; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 218.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 825 b); en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); Lemfu (But. in Gill. 1214). — Nom vern. : **Basasanga** [Lulanga] (Ém. Laur.).

MARANTACEAE

SARCOPHRYNIUM *K. Schum.* (1)

Sarcophrynum Arnoldianum *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 107; II (1907) 24; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 265-267, t. 13-15 et Miss. Laurent (1906) 219.

1888 (F. Demeuse). — II a : Haut-Shiloango (Cabra et Michel); Benza-Masola (Ém. et M. Laur.). — VI : Tumba-Mani. — Nom vern. : **Midiadi** (Cabra et Michel). — XI : env. de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. Laur.); les Stanley-Falls (Dem.). — XIII d : Lusanga (Dew.). — XV : Olombo; Kondue : Dibeles (Ém. et M. Laur.).

Sarcophrynum baccatum [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich. [Marant.] (1902) 39.

Phrynum — *K. Schum.* ex *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 233.
Phyllodes — *K. Schum.* in *Engl.* Jahrb. XV (1892) 442; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 257; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127].

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Ncongo** (Dew. 635). — XV : Mukenge (Pg. 1439); le Sankuru; la Lulua (Ém. Laur.).

(1) *K. Schumann* dans le Pflanzenreich [Marant.] (1902) 37, indique le **S. bisubulatum** [*K. Schum.*] *K. Schum.* (Phyllodes — *K. Schum.* in Bolet. Soc. Brot. XI (1893) 83 = Phrynum — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 325) dans le domaine du Congo entre le Luatschim et Quilombo. — Nous pensons que cette habitation découverte par *Siz. Marques* est dans l'Angola.

Sarcophrynium brachystachyum [*Koern.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 36; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 219 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 24.

Phrynium — *Koern.* in *B. S. Natur. Mosc.* XXXV, I (1862) 108; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 322; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 34.

Maranta — *Benth.* in *Hook. Niger Fl.* (1849) 531.

Phyllodes — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 445.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela. — Nom vern. : Kongo (Dew. 541); env. de Lukolela (Ém. et M. Laur.). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XII a : Nyandu (Ser.).

Sarcophrynium leiogonium [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 39; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 108.

Phyllodes — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 442; *Th. Dur.* et *Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 257.

Phrynium — *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII (1898) 324.

1880 (P. Pogge). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : rives de la Djuma (Gill. 2742; Gent.). — XV ? : pays des Bashilange à Luatschim (Pg. 696).

Sarcophrynium oxycarpum [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 38; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 220 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 38.

Phyllodes — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 443.

Phrynium — *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII (1898) 324.

1897 (Alph. Cabra). — Congo (Cabra). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).

HALOPEGIA *K. Schum.*

Halopegia azurea [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 50.

Donax — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 434; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 316.

? *Maranta Lujaeana* *L. Linden* *Cat. de l'Hort. colon.* (1901) 21, cum icone (fide cl. *K. Schum.*).

1881 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 487).

THAUMATOCOCCUS *Benth.*

Thaumatococcus Daniellii [*Bennett*] *Benth.* in *Benth et Hook. f. Gen. pl.* III (1883) 652; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich.* [Marant.] (1904) 40, fig. 8; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 321; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 220.

Phrynium — *Bennett* in *Pharm. Journ.* XIV (1855) 161.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).

HYBOPHRYNIUM K. Schum.

Hybophranium Braunianum *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 428 cum. ic.; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 131 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 257; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 59 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 232; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 41; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 107; II (1907) 24 et *Miss. Laurent* (1906) 219.

Trachyphrynum — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 319.

Bamburanta Arnoldiana *L. Linden* Cat. de l'Hort. colon. (1901) 20, cum ic.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Dem.). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Zobe. — Nom vern. : **Matete** (Dew. 241). — V : le Stanley-Pool (Callew.); Léopoldville (M. Laur. 650); Kisantu (Gill.). — VI : le Kwango (But.); vallée de la Djuma (Gent.); Eiolo (Ém. et M. Laur.). — IX : Bangala (Dem.). — XII d : le Mbruoie (Schw.). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Kibaka [Angola?] (Buett.); rives du Lomami (Ém. Laur.).

— — var. **violaceum** *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 30 [B. S. B. B. XXXVIII², 149]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 232.

1895 (A. Dewèvre). — V : Kimuenza (Dew.).

TRACHYPHRYNIUM Benth.

Trachyphrynum Danckelmannianum *J. Braun et K. Schum.* in *Mith. Deutsch. Schutzgeb.* II (1889) et in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 430; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 319; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 42; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 220 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 23.

1903 (Ém. et Marc. Laurent; Ad. Odon). — II a : la Lukula (Ém. et M. Laur.). — V : Sanda (Odd. in Gill. 3420, 3572), — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Trachyphrynum Liebrechtsianum *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 28 [B. S. B. B. XXXVIII², 147] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 233; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich* [Marant.] (1902) 44; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 107 et *Miss. Laurent* (1906) 220.

1895 (A. Dewèvre). — II a : le Mayumbe (Kest.). — V : Lukolela (Dew. 546); Kimuenza (Dew. 512). — VIII : Équateur (Pyn.): Bolenge [le Ruki]. — Nom vern. : **Lokongo** (M. Laur. 148). — XV : Butala ; Dibebe (Ém. et M. Laur.); Bena-Makima (Lescr. 267).

Trachyphrynium Poggeanum *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) 431; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 257; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 320; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich [Marant.]* (1902) 45.

1881? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1492).

Trachyphrynium violaceum *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXV (1887) 133; *K. Schum.* in *Engl. Bot. Jahrb.* XV (1892) 432; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 132 et Étud. fl. Cgo (1896) 258; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 320; *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich [Marant.]* (1902) 44.

T. Preussianum *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 430, fig. N; *Bak.* l. c. VII, 318.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur).

PHRYNIUM Willd.

Phrynium confertum [*Benth.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich [Marant.]* (1902) 56; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 221, t. 54, fig. 25, 26 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 108.

Calathea — *Benth.* in *Benth. et Hook. f. Gen. pl.* III (1883) 653; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 327.

1900 (Éd. Luja). — Congo (Luja). — VI : vallée de la Djuma [Kwango] (Gent. et Gill. 2742). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.).

CLINOGYNE Salisb.

Clinogyne arillata [*K. Schum.*] *K. Schum.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 230 et in *Engl. Pflanzenreich [Marant.]* (1902) 62; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 223 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 108.

Donax — *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 438; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 131; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 316; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 60; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 21.

1888 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — VII : Lac Léopold II (Dem.). — VIII : Coquilhatville (Dew. 604 b; Gill. 2673); Eala. — Nom vern. : *Kokoloko* (M. Laur.). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — X : le Bas-Ubangi (Ém. et M. Laur.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Katanga (Verd.). — Ind. non. cl. : le Lomami (Desc.).

Clinogyne congensis [*K. Schum.*] *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenreich [Marrant.]* (1902) 67.

Donax — K. Schum. in Engl. Jahrb. XV (1892) 439; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 131 et Étud. fl. Cgo (1896) 256; *De Wild et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo. II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127 et Contr. fl. Cgo, I (1899) 55; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. afr. VII, 317.

1881 (P. Pogge). — Congo (Dem. 397). — II a : Bingila (Dup.); Zenze (Ém. Laur.). — V : Suata (Buett. 541). — XV : Mukenge (Pg.).

Clinogyne filipes *Benth.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. III (1883) 651; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 101 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 841] et Reliq. Dewevr. (1901) 232; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 67; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 24.

Phrynium — *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 532.

Donax — *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 440; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 131; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 316.

1895 (A. Dewèvre). — V : entre Dembo et le Kwango (Gill.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VIII : env. de Coquilhatville (Dew. 103 a).

Clinogyne Hensii [*Bak.*] *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 62.

Phrynium — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 323.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens, 140).

Clinogyne Schweinfurthiana [*O. Kuntze*] *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 62.

Arundastrum — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 684.

Donax — *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 437; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 131 et Étud. fl. Cgo (1896) 256.

D. cuspidata *Bak.* [non *K. Schum.*] in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 315.

1893 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.).

MARANTA L.

***Maranta arundinacea** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 2; *Rosc.* Scitam. 9, t. 25; *Redouté* Liliac. I, t. 57; *Bot. Mag.* (1822) t. 2307; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 130 et Étud. fl. Cgo (1896) 256; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1901) 125, fig. 16.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Dem.).

Obs. — Espèce de l'Amérique mérid. naturalisée sur un grand nombre de points dans l'Afrique trop.

THALIA L.

Thalia coerulea *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXV (1887) 132; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 130; *Th. Dur. et De Wild.*

Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 231; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 314.

1892 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dup.). — VIII : Équateur (Dew. 552); Irebu (Dew.). — IX : la Mongala (Dem. 1691).

***Thalia geniculata* L.** Sp. pl. ed. 1 (1753) 3; *Peters.* in *Mart.* Fl. Bras. III^s, 142, t. 38, fig. 2; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 314; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Marant.] (1902) 173; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 20.

1902 (R. Butaye). — Bas-Congo (But.). — XV : rég. du Kasai (Gent.).

***Thalia Schumanniana* De Wild.** Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 108; II (1907) 24 et Miss. Laurent (1906) 221.

1892 (L. Gentil). — Bas-Congo (Cabra, 125; But. in Gill. 2233). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2720). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.): Équateur (Pyn.); Irebu (Dew. 552). — IX : bords de l'Itimbiri (Ser. 34). — IX a : la Mongala (Dew.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.). — XV : Mutomba-Kaboti [près des chutes du Luile] (Gent. 69).

OBS. — M. Ém. De Wildeman croit que cette espèce est répandue dans les marécages de la brousse.

CANNA L.

****Canna indica* L.** Sp. pl. ed. 1 (1753) 1 pr. p.; *Redouté* Liliac. IV, t. 201; *Rosc.* Scitam. t. 1; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XXV (1890) 292; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 134 et Étud. fl. Cgo (1896) 258; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 60; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 106; II (1907) 123 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 113-114.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Lukolela (Buett.); Kisantu (Gill.). — VI : route de Tumba-Mani à Popokabaka (Cabra et Michel). — VII : l'Ikata (Dem.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.). — XIV : Kalembe-Lemba. — Nom vern. : **Butshulu** (Coll.?). — Ind. non cl. : Shianzo (Dup.).

*— — subsp. ***orientalis*** *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 328; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 51 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 51] et Miss. Laurent (1906) 219.

C. orientalis *Rosc.* Scitam. (1828) t. 12; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 24.

C. bidentata *Bertol.* Miscell. bot. XX, 9, t. 1.

1862 (R. Burton). — Bas-Congo (Burt.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.); env. de Lie (Ém. et M. Laur.). — XII d : Munza (Schw.). — XV : Dibele: Mange; Kondue (Ém. et M. Laur.).

MUSA L. (1)

Musa Arnoldiana *De Wild.* in B. S. étud. colon. VIII (1901) 339; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 102 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 842]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 79-83, t. 1-4 et 7, fig. 3.

1900 (J. Gillet). — V : rég. de Dembo (Gill. 1850).

? **Musa Ensete** *Gmel.* Syst. nat. II (1767) 567; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1870) t. 5223-5224; *Bak.* in Kew Bull. (1894) 237 [cum xyl. p. 240] et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 329; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Musac.] (1900) 15, fig. 2.

Ensete edule *Horan.* Prodr. monog. Scitam (1862) 40.

Obs. — M. Baker [l. c.] dit que cette espèce a été indiquée dans le pays des Mangbettu [XII d].

Musa Gilletii *De Wild.* in Rev. cult. colon. (1901) 103; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 102 [B. S. B. B. Sér. 2, I, 842]; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1903) 73-79, t. 5, 6 et 7, fig. 1-2.

1900 (J. Gillet). — IV : Luvituku (Gill.). — V : rég. de Kisantu (Gill. 700).

Musa Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 371-374, t. 130 et fig. 61-62.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — Cult. à Isangi [XI] (L. Pyn. 89).

***Musa sapientum** *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) 1303; *Trew* Pl. select. t. 21-23; *Bak.* in Annals of Bot. VII, 211; in Kew Bull. (1894) 250 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 330.

M. paradisiaca *L.* subsp. — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 692; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Musac.] (1900) 29, fig. 4; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 374.

Le type est cultivé partout dans la zone tropicale.

— — var. **sanguinea** *Welw.* ex *Ridl.* in *Britt.* Journ. of Bot. XXV (1887) 134; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 52 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 52]; *Bak.* in *Dyer* l. c. VII, 331; *K. Schum.* in *Engl.* Pflanzenreich [Musac.] (1900) 21; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 374, t. 131.

1899 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill.).

OBS. — Ém. Laurent a signalé la présence de ce *Musa* à Eala [VIII] où il a été probablement importé du Bas-Congo. La Mission Laurent l'a également remarqué à Coquilhatville [VIII] (Conf. *De Wild.* Miss. Laurent 374-375).

(1) M. De Wildeman a publié de nombreux détails, à divers points de vue, sur les *Musa* en général dans ses *Notices sur les plantes utiles ou intéressantes du Congo*, I (1903) 69-92 et 83-119.

HAEMODORACEAE

SANSEVIERIA Thunb. (1)

Sansevieria bracteata *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 253 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 333; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 25; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 234.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.).

Sansevieria cylindrica *Boj.* Hort. Maurit. (1837) 349; *Hook.* in Bot. Mag. (1859) t. 5093; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 140 et Étud. fl. Cgo (1896) 258; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 335; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 104; II (1907) 121, t. 50, 51.

S. angolensis *Welw.* ex *Hook.* in Rep. Paris Exhib. 1855, III (1856) 146; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 549; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 25.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.).

Sansevieria guineensis [*Jacq.*] *Willd.* Sp. pl. II (1800) 159; Bot. Mag. (1809) t. 1179; *Redouté* Liliac. VI, t. 330; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 141 et Étud. fl. Cgo (1896) 259; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 333; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 156 et Reliq. Dewevr. (1901) 234; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1905) 629.

Aletris — *Jacq.* Hort. Vindob. I (1770) 63, t. 84.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala; Upoto (Ém. Laur.). — XI : Basoko (Ém. Laur.). — XIII : Kimbimbi (Dew.). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.). — Noms vern. : **Kenge** [Ikwangula] : **Gulumgu** [Kasongo] ; **Kibongji** [Tanganika] (Dew.).

Sansevieria Laurentii *De Wild.* in Rev. cult. colon. (1904) 131 et in Rev. Hort. belg. (1904) 169, t. 14-15; Miss. Laurent (1905) 45, fig. 9-10 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 628.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XIII a : env. de Stanleyville (Ém. et M. Laur.).

L'*Ananas sativus* Schult. f. (Broméliacée), originaire de l'Amérique trop. est naturalisé à Kisantu [V] (Gill.). — [Conf. *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1900) 102 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 842].

(1) Conf. *De Wildeman*, Les *Sansevieria* africains in *Not. pl. util. ou intér. du Congo*, I (1905) 617-652, t. 30-32.

Sansevieria longiflora Sims in Bot. Mag. (1826) t. 2634; *Engl. Pfl.* Ost-Afr. 144, t. 5, fig. G-H; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 141 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 258; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 334; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 630.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

IRIDACEAE

MORAEA L.

Moraea Arnoldiana *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 16.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutobi-Tubi** (Desc. 606).

Moraea kitambensis *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 575.

1880 (Max Buchner). — VI : Kitamba, sur le Kwango (Buchn. 679).

Moraea textilis *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 270 et *Handb. of Irid.* 52; *Engl. Hochgebirgsfl. trop. Afr.* 173; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 153 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 259; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 341.

1883 (H. Johnston). — Bas-Congo (Johnst.).

Moraea Verdickii *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 17.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kulutu** (Verd. 281).

Moraea zambesiaca *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) 130 et *Handb. of Irid.* 51; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 153 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 259; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 339.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

GEISSORHIZA Ker.

Geissorhiza Briartii *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 13 [B. S. B. B. XXXIX², 105].

1890 (Paul Briart). — XVI : Musima [Haut Lualaba] (Briart).

LAPEYROUSIA Pourr.

Lapeyrouisia erythrantha [*Klotzsch*] *Bak.* *Syst. Irid.* (1877) 155 et *Handb. of Irid.* 168; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 190 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 259; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 351.

Ovieda — *Klotzsch* in *Peters* Reise n. Mossamb. I (1862) 516, t. 58.

1892 (Jul. Cornet). — XVI : le Katanga (Corn.).

GLADIOLUS L.

Gladiolus Arnoldianus *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, X (1901) 22 [B. S. B. B. XL, 28].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Mutungweo** (Verd. 495).

Gladiolus brevicaulis *Bak.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I* (1887) 267 et *Handb. of Irid.* 211; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 214 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 260; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 366.

1885 (R. Buettner). — V : le Stanley-Pool (Buett. 517).

Gladiolus corneus *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) 155, t. 100; *Bak. Handb. of Irid.* 222; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 215; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 60; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 368.

1895 (Gust. Debeerst). — II : Malela (Ém. Laur.). — XVI : Pala (Deb.).

Gladiolus Quartinianus *A. Rich.* *Tent. fl. Abyss.* II (1851) 306; *Bak. in Bot. Mag.* (1884) t. 673, *Handb. of Irid.* 213 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 371; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 52 [B. Herb. Boiss. Sér. 2. I, 52].

G. angolensis *Welw.* ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I* (1887) 269; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 213; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 60; *Rendle Cat. Welw. Pl. II*, 29; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 217 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 22.

1885 (C. Callewaert). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Mont Bangu (Dem.); entre Tumba et Luvituku (Luja). — V : le Stanley-Pool (Callew.); Kisantu (Gill.); env. de Sabuka (M. Laur.).

Gladiolus Verdickii *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, X (1901) 23 [B. S. B. B. XL, 29].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 612).

ANTHOLYZA L.

Antholyza Cabrae *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 15

1902 (Alph. Cabra). — VI : vallée de la Sanga à l'E. du plateau de Kimbele [Kwango] (Cabra).

Antholyza Descampsii *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 18.

1891 (G. Descamps). — XVI : le Katanga (Desc.); le Lofoi (Verd.).

Une espèce d'Eleutherino [l'**E. plicata** Herbert] de l'Amérique trop., est cultivée à Eala [VIII] (M. Laur. 934). — [Conf. *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 22].

Antholyza Gilletii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 19 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 22.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1950); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3622).

Antholyza labiata *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1892) 156, t. 7, fig. 1-4; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 56; II (1900) 60 et Reliq. Dewevr. (1901) 234; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 374; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 106 et Miss. Laurent (1906) 217.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (But.). — II a : brousse de la Lemba (Dew.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : distr. du Stanley-Pool (Ém. Laur.); env. du Stanley-Pool (Ém. et M. Laur.); env. de Léopoldville (Luja); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.); Tumba (Ém. et M. Laur.). — VI : Kimbunga [entre la Wamba et le Kwango] (Gent.). — VIII : entre Ikori et Kinanga-Sanga (Dew.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.). — Ind. non cl. : Sogo (Dem.).

AMARYLLIDACEAE

HYPOXIS L.

Hypoxis angustifolia *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) 182; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) 111; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 231 et Étud. fl. Cgo (1896) 260; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 378; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 31; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 61 et Pl. Gilletianae, I (1900) 52 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 52].

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens, A. 221). — V : Kisantu (Gill. 181).

CURCULIGO Gaertn.

Curculigo gallabatensis *Schweinf.* ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 266; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 236 et Étud. fl. Cgo (1896) 260; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 383; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 31; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 61 et Reliq. Dewevr. (1901) 235.

1888 (Fr. Hens). — II env. de Boma (Dew.). — II a : Kibinga (Dup. 352). — IV : Lutete (Hens).

CRINUM L.

Crinum congolense *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 370, t. 109-111 et fig. c.

1903? (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

Crinum giganteum *Andrews* Bot. Repos. (1804) t. 169; *Hook.* in Bot. Mag. (1869) t. 5205; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 404; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 35; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 18; II (1907) 21 et *Miss. Laurent* (1906) 215, t. 49-50 et fig. 24.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Aug. Linden). — VI : Sulu [vallée de la Djuma] (Gent.); Kongo [Kwilu] (Leser.). — XII d : Munza (Schw.).

Crinum Laurentii *Th. Dur.* et *De Wild.* in Rev. hort. belg. et étrang. XXIII (1897) 97, cum ic.; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 80]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 230; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 216, t. 47-48 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 21, t. 33; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 403.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : Shinganga (Dew.); C. sur les bords de la Lukula et du Lubusi (Ém. Laur.).

Crinum majakallense *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 399.

1880 (von Mechow.). — VI : pays des Majakalla près de la rivière Kwango (Mech.).

Crinum Massaianum [*L. Linden* et *Rodig.*] *N. E. Br.* in Kew Bull. (1888) 100; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 398.

Brunsvigia? — *L. Linden* et *Rodig.* in Illustr. hort. (1887) 55, t. 19.

1886 (Aug. Linden). — Congo (Lind.).

Crinum natans *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 396; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 235.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : CC. dans la Lulanga (Dew.). — Ind. non cl. : le Lomami (Dew.).

Crinum purpurascens *Herb.* Amaryll. (1837) 250; *Bak.* in Bot. Mag. (1880) t. 6525 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 396. pr. p.; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 21.

1904 (Éd. Lescauwert). — VI : Kongo [Kwilu] (Leser. 141).

— — var. **angustifolium** *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 18; II (1907) 120, t. 67-68.

1902 (Alph. Cabra). — II a : Boma-Vonde [Mayumbe] (Cabra). — Cette plante serait très répandue dans le Mayumbe, d'après M. Cabra.

Crinum scabrum *Sims* in Bot. Mag. (1820) t. 2180; *Bury* Hexandr. Pl. t. 32; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 251 et Étud. fl. Cgo (1896) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 401; *De Wild.* et

Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 238; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 13 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 21.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Bena-Kasadi (Leser.). — XII c : Gombari (Delp.). — XIII d : Kasongo ; Piani-Lombe (Dew.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Crinum zeylanicum [L.] L. Syst. nat. ed. 12 (1766) 236; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 401.

Amaryllis — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 293.

A. ornata Ker (non Ait.) in Bot. Mag. (1809) t. 1171.

C. Herbertianum Wall. Pl. Asiat. rarior. II (1831) t. 145.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst. in *The River Congo*, cum xyl.).

HAEMANTHUS L.

Haemanthus angolensis Welw. ex *Bak.* in *Britt. Journ. of Bot.* XVI (1878) 194 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 390; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 34; *De Wild.* Esp. genr. Haemanthus (1903) 34 et *Miss. Laurent* (1906) 214.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.).

Haemanthus Arnoldianus *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1904) 24 [B. S. B. B. XL, 30]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 237.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew. 909). — Noms vern. : **Kiape** (Kasongo); **Luvungi-Vungi** (Tanganika); **Ilanga** (Ikwangula) (Dew.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Haemanthus Cabrae *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 56.

1896 (Alph. Cabra). — II a : au S. de Boma-Vonde (Cabra).

Haemanthus cinnabarinus *Decne* in *Van Houtte* Fl. des Serres, II (1857) 27, t. 1195; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1862) t. 5314; *Bak.* Handl. Amaryll. 64 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 390; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 104.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : Monshuni; Inzia [Djuma] (Gent.; Gill., 2927).

Haemanthus diadema L. *Linden* Cat. ill. pl. nouv. Cgo, pour 1901, 27; *De Wild.* Esp. genr. Haemanthus (1903) 35, fig. 3 et *Miss. Laurent* (1906) 214, t. 79.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Sabuka (M. Laur.). — XV : Batempa [Sankuru]; Ibaka [Sankuru] (Ém. et M. Laur.).

Haemanthus Eetveldeanus *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 56 et Reliq. Dewevr. (1901) 235

1896 (Ach. Durieux). — VIII : à 4 heures de Bokakata (Ach. Dur.). — XIII : Elungu (Dew.).

Haemanthus Lescauwaeii *De Wild.* in Belg. colon. IX (1904) 91, cum xyl. et ex Gard. Chron. (1904) I, 274; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 104, t. 35, fig. 2 et Miss. Laurent (1906) 215.

1902 (Aug. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VII : rochers bordant la partie orient. du Lac Léopold II (Lescr. : M. Laur. 205). — XV : Olombo (Em. et M. Laur.).

Haemanthus Lindeni *N. E. Br.* in Gard. Chron. (1890) II, 436, fig. 85 et in Ill. hort. (1890) 89, t. 114; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 391.

1885 (Aug. Linden). — Congo (Lind.).

Haemanthus multiflorus *Martyn* Monogr. (ann.?) cum icone ex *Willd.* Sp. pl. II (1800) 25; Bot. Mag. (1806) t. 961; *Redouté* Liliac. IV, t. 204; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 265 et Étud. fl. Cgo (1896) 261; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 388.

H. Kalbreyeri *Bak.* in Gard. Chron. (1878) II, 202; Illustr. hort. XXVI (1879) 120, t. 354; *Planch.* in Fl. des Serres, XXII (1820) 17, t. 2377.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

DEMEUSEA De Wild. et Th. Dur.

Demeusea longifolia *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 26 [B. S. B. B. XXXIX^a 78]; *Dalla-Torre* et *Harms* Genera Siphonog. (1906) 595.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

BUPHANE Herb.

Buphane disticha [*L. f.*] *Herb.* in Bot. Mag. (1825) sub t. 2578; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 268; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 392; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 13 et Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1904) 105.

Amaryllis — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 195.

Haemanthus toxicarius *Thunb.* Prodr. pl. Capens. (1794) 59; *Ker* in Bot. Mag. (1809) t. 1217.

Brunsvigia — *Ker* in Bot. Reg. (1821) t. 567.

Boophane — *Herb.* App. to Bot. Mag. (1821) 18; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 35.

1899 (Edg. Verdick). — VI : village de Kiwembo [entre Kapanga et Wanga] [Haute-Wamba] (Gent.). — XVI : Lukafu (Verd.).

HYMENOCALLIS Salisb.

Hymenocallis senegambica *Kunth et Bouché* Ind. sem. Hort. Berol. (1848) 12; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 408; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 216.

H. littoralis *Salisb.* in Trans. Linn. Soc. I (1812) 358; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 35.

1905 (Marc. Laurent). — II : Boma (M. Laur.).

Obs. — Cult. à Eala [VIII] d'échantillons provenant de Boma (M. Laur.).

VELLOZIA Vand.

Vellozia aequatorialis *Rendle* in Journ. Linn. Soc. XXX (1895) 409; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 412; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 13.

Barbacenia — *Harms* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 146.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu, env. de la station et sur le plateau (Verd.).

TACCACEAE

TACCA Forst.

Tacca pinnatifida *Forst.* Char. gen. (1776) 70, t. 35; *Lodd.* Bot. Cab. (1822) t. 692; *Schinzl.* Icon. fam. nat. I, t. 58; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 36; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 18, (1904) 105, (1906) 229; Miss. Laurent (1905) 48 et Nöt. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 148-151; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 413.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Gill.). — VI : chutes de Kingunshi (Gent.). — XII d : le Kibali (Schw.). — XV : le Bas-Kasai (Ém. Laur.); rég. de Dianama [route de Luluabourg à Kanda-Kanda] (Gent.).

DIOSCOREACEAE

DIOSCOREA L.

Dioscorea acarophyta *De Wild.* in Compt.-Rend. Acad. sci. Paris, CXXXIX (1904) 552; Miss. Laurent (1905) 49 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 121.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XII c : route de Amadis à Surango (Ser. 380). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.).

Dioscorea alata Willd. Sp. pl. IV (1805) 792; *Pers. Syn. pl.* II, 621; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI, 296; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 273 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 262; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 417.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

OBS. — Cette espèce, que l'on dit spontanée dans la Guinée, est cultivée au Congo et ne s'y rencontre peut-être que subspontanée.

Dioscorea apiculata De Wild. *Étud. fl. Kat.* (1902) 14.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kanseke** (Verd. 269).

Dioscorea Beccariana Martelli *Fl. Bogos.* (1886) 83; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 420; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 229.

D. pentaphylla A. Rich. [non L.] *Tent. fl. Abyss.* II (1851) 317.

1903 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 3678).

Dioscorea Costermansiana De Wild. in *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 52 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 52].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Dioscorea Demeusei De Wild. et *Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 238.

1891 (F. Demeuse). — II a : Shinganga (Dew.); Ma-Vungu-Singa (Dup.). — IX : pays des Bangala (Dem.). — Nom vern. : **Balatadi** (Dew. 329).

Dioscorea dumetorum [Kunth] Pax in *Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.* II, 5 (1887) 134; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 274; *Bak. in Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 419; *Th. Dur. et De Wild. Reliq. Dewevr.* (1901) 237; *De Wild. Étud. fl. Kat.* (1902) 15; *Miss. Laurent* (1903) 48 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 121.

Helmia — *Kunth Enum. pl.* V (1850) 436.

D. triphylla A. Rich. [non L.] *Tent. fl. Abyss.* II (1851) 316, t. 96 B.

D. Quartiniana A. Rich. l. c. 316, t. 96 A; *Rendle Cat. Welw. Pl.* II, 40.

1896 (A. Dewèvre). — Congo (Dew.). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : Yumbi et env. (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Elsk.); Ikongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Nipoko [lkelemba] (M. Laur.). — XII a et b : entre Bima et Bambili (Ser.). — XVI : Lukafu (Verd.). — Noms vern. : **llela**, **lluie** (Elsk.); **Tsana** (Tumba); **Kolongo** (Verd.).

Dioscorea Liebrechtsiana De Wild. in *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 53 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 53] et *Miss. Laurent* (1905) 49.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 384); Yumbi (Ém. et M. Laur.).

Dioscorea macroura *Harms* in Notizbl. bot. Gart. Berlin, I (1897) 266; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 416; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, IX (1900) 12 [B. S. B. B. XXXIX², 104]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 50 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 22, t. 28, 121.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Cabra). — Congo (Dem.). — V : près de Yumbi (Ém. Laur.). — XVI : Pweto (Desc.).

Dioscorea minutiflora *Engl.* in Engl. Jahrb. VII (1886) 332; *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1893) 146, t. 8 [*err. cal.* multiflora]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 39; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 105 et Miss. Laurent (1905) 51.

D. praehensilis *Benth.* var. — *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 418.

1903 (Aug. Hendrickx). — V : rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3072). — X : Imese (Em. et M. Laur.).

Dioscorea odoratissima *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1893) 146; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 274 et Étud. fl. Cgo (1896) 262.

1880 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1043).

OBS. — M. Baker [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 418] réunit cette espèce au *D. praehensilis* *Benth.*

Dioscorea praehensilis *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 536; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 275 et Étud. fl. Cgo (1896) 262; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 418, pr. p.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — Congo (Buett.). — IX : pays des Bangala (Hens).

Dioscorea Preussii *Pax* in Engl. Jahrb. XV (1892) 147; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 275; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 417; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 238.

1896? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

Dioscorea pterocaulon *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 58 et Reliq. Dewevr. (1901) 238; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 121.

1896 (A. Dewèvre). — V : Lukolela (Dew. 825 a). — VIII : Eala (M. Laur. 1488).

Dioscorea sativa *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 1033; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 263, in obs.; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVII, 127]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 415; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 15 et Miss. Laurent (1905) 51.

1895 (Ém. Laurent). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Sona-Gongo (Ém. et M. Laur.). — V : Berghe-Ste-Marie (Ém. Laur.). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Ém. Laur.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Matjitji** (Verd.). — Ind. non cl. : Nelle (Ém. Laur.).

OBS. — Fréquemment cultivé pour ses tubercules aériens (Ém. Laur.).

Dioscorea Schimperiana Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 317; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 273.

Le type est indiqué en Abyssinie et dans l'Angola.

— — var. **vestita** Pax in Engl. Jahrb. XV (1892) 148; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. V, 274 et Étud. fl. Cgo (1896) 263; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 419.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1149).

Dioscorea Schlechteri Harms in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 273 [nom. tant.].

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12548).

Dioscorea smilacifolia De Wild. et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 58 et Reliq. Dewevr. (1901) 239.

1896 (A. Dewèvre). — XIII a : env. des Stanley-Falls (Dew.).

Dioscorea Thonneri De Wild. et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 7, t. 24 et Pl. Gilletianae, I (1900) 54 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 54]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 106, (1906) 230; II (1907) 121 et Miss. Laurent (1905) 51.

1896 (Fr. Thonner). — V : Yumbi (Ém. et M. Laur.); Sanda (Odd. in Gill. 3700); Kisantu (Gill.); rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3072). — VII : Nioki (Ém. et M. Laur.; Gill. 591, 757). — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 125, 1271). — IX : Upoto (Thonn. 9). — XII a et b : route de Bima à Bambili (Ser. 172).

Dioscorea Verdickii De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 15.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 426).

LILIACEAE

SMILAX L.

Smilax Kraussiana Meisn. in *Flora*, XXVIII (1845) 312; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIV (1875) 162, t. 106; A. DC. *Monog. Phan.* I, 171; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 279 et Étud. fl. Cgo

(1896) 263; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 424; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 240; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 12; Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 104; II (1907) 21 et *Miss. Laurent* (1905) 95.

Smilax Morsaniana *Kunth* Enum. pl. V (1850) 241.

S. Kraussiana *Meisn.* var. — *A. DC.* Monog. Phan. I (1878) 172; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 263.

1885 (*R. Buettner*). — IV : Lukungu. — Nom vern. : *Nzilla* (*Dew.*). — IV : Tumba (*Luja*); entre Tumba et Kimpesse (*Gill.*). — V : le Stanley-Pool (*Buett.*); env. de Kwamouth (*Biel.*); Kisantu (*Gill.*). — VIII : Eala; Irebu (*Ém. Laur.*). — IX : Bolombo; en aval de Bolombo (*Ém. Laur.*). — XIII a : chutes de la Tshopo (*Ém. Laur.*). — XIII c : Wabundu (*Dew.*). — XVI : plateau aux env. de Lukafu. — Nom vern. : *Mukosobola* (*Verd.*).

ASPARAGUS L.

Asparagus abyssinicus *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 319; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 620; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 280 et Étud. fl. Cgo (1896) 264.

A. retrofractus *Forsk.* [non *L.*] Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 93.

1893 (*Ém. Laurent*). — Bas-Congo (*Ém. Laur.*).

OBS. — *M. Baker* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 433] réunit cette espèce à *A. africanus* *Lam.*

Asparagus africanus *Lam.* Encycl. méth. Bot. I (1783) 295; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 619; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 281 et Étud. fl. Cgo (1896) 264; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 42; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 433; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI¹, 86]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 248; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 104 et *Miss. Laurent* (1905) 44.

1816 (*Chr. Smith*). — Bas-Congo (*Sm.*). — II a : le Mayumbe (*Ém. et M. Laur.*); Bingila (*Dup.*); entre Lemba et Bidi (*Cabra*). — IV : Lukungu (*Dew.*). — V : le Stanley-Pool (*Dem.*); Léopoldville (*Camp*); entre Léopoldville et Mombasi (*Gill.*); Kwamouth (*Gent.*); Chenal (*Ém. et M. Laur.*); Kisantu (*Gill.*). — XVI : Toa (*Desc.*).

— — var. ***biarticulatus*** *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 31 [B. S. B. B. XL, 25].

1899 (*H. Tilman*). — Savanes du Bas-Congo (*Tilm.*).

Asparagus drepanophyllus *Welw.* ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1877) 254; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 284 et Étud. fl. Cgo (1896) 264; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 435; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 43; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59; II (1900) 61; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 229.

1882? (P. Pogge). — Bas-Congo occ. (Ém. Laur.). — IV : Banza-Putu (Dem.); Sona-Gongo (Luja). — V : entre Dembo et le Kwango (But.). — VI : Kitamba (Buch.). — XIII c : Lokandu [Riba-Riba] (Ém. Laur.). — XIII d : env. de Nyangwe (Dew). — XV : le Sankuru (Ém. Laur.); Kavango [la Lulua] (Pg.).

Asparagus Duchesnei *L. Lind.* Cat. illust. pl. nouv. Cgo (1901) 7; *De Wild.* Miss. Laurent (1900) 44, t. 18.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — XV : Lomkala (Ém. et M. Laur.).

Asparagus falcatus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 313; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 284 et Étud. fl. Cgo (1896) 264; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 435.

A. aethiopicus *L.* var. *ternifolius* *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1871) t. 261 et in *Gard.* Chron. (1872) 1537, cum ic.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Asparagus katangensis *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 26 [B. S. B. B. XL, 42].

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 201).

Asparagus laricinus *Burch.* Trav. inter. S. Afr. I (1862) 537; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 620 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 433.

Le type croît dans la région du Mozambique et dans l'Afrique austr.

— — var. **katangensis** *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 27 [B. S. B. B. XL, 33].

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 642).

Asparagus Pauli-Guilielmi *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 203; *Grant* et *Bak.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1873) 161, t. 105; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 287; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 428.

Le type, largement disséminé dans l'Afrique trop., n'a pas été trouvé au Congo.

— — var. **katangensis** *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 27 [B. S. B. B. XL, 33].

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

Asparagus plumosus *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XIV (1875) 613; *Fl. des Serres*, XXIII, 117, t. 2413; *Ill. Hort.* XXVII, t. 314; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 287; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 86]; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 430.

1895 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Dup.).

KNIPHOFIA Salisb.

Kniphofia dubia *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 10.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : le Katanga (Verd.).

ALOE L.

Aloe congolensis *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 61; Pl. Gilletianae, II (1901) 103 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 843] et Reliq. Dewevr. (1901) 240; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 102 et Miss. Laurent (1905) 39.

1895 (A. Dewèvre). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); Léopoldville; env. de Kimuenza (Dew.). — XV : la Loanje, rive gauche; route de Lusambo à Kanda-Kanda (Gent.).

Aloe venenosa *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1893) 471; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 313 et Étud. fl. Cgo (1896) 165; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 460.

1882 (P. Pogge). — XIII ? : entre Nyangwe et Kimbundo (Pg. 1460).

DRACAENA L.

Dracaena arborea *Link* Enum. pl. Hort. Berol. I (1821) 341; *Regel* Revis. Drac. 36; *Bak.* in Journ. Linn. Ser. XIV (1875) 528 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 439; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 47; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 41.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — XV : Inkongo; Batempa; Mukundji (Ém. et M. Laur.).

Dracaena Buettneri *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 478; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 447.

1896 (Ém. Laurent). — V : Lukolela (Ém. Laur.).

Dracaena Burkeana *Planch.* in Annal. sci. nat. Sér. 3, IX (1848) 192; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 402; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 88.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Kisantu (Ém. et M. Laur.).

Dracaena Butayei *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 16.

1901 (R. Butaye). — VI : Tumba-Mani (But. in Gill. 2324).

Dracaena capitulifera *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59 et Reliq. Dewevr. (1901) 241; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 41 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 226.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Bolobo (Dew. 701). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2919; Gent.). — X : l'Ubangi (Ém. et M. Laur.).

Dracaena congensis *Engl. ex De Wild.* Miss. Laurent (1905) 42.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.) — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.).

Dracaena fragrans [*L.*] *Ker-Gawl.* in Bot. Mag. (1808) t. 1081; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 337; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 440; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 17; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 42.

Aletris — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 456; *Andrews* Bot. Repos. V, t. 306; *Redouté* Liliac. II, t. 117.

Sansevieria — *Jacq.* Fragm. bot. (1800) t. 2, fig. 6 et t. 33, fig. 1.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Dibebe (Ém. et M. Laur.).

OBS. — Le *D. Lindeni* [Ill. Hort. XXVII (1880) t. 384] est, d'après M. Baker, [l. c.] une forme de cette espèce, à feuilles panachées de blanc.

Dracaena Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 228.

1902 (L. Gentil). — XV : route de Luebo à Luluabourg (Gent. 51).

Dracaena Kindtiana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 119, fig. 2, t. 65-66.

Ann.? (Coll.?). — Congo (Coll.?).

OBS. — Espèce introduite dans les serres du Jardin colonial de Laeken.

Dracaena Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1902) 42, t. 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 20.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Kisantu (Gill. 1654). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Dracaena laxissima *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 478; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 265; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 446.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1462).

Dracaena Odonii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 227, t. 57.

1903 (Ad. Odon). — V : env. de Sanda (Odd. in Gill. 3333).

Dracaena Poggei *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 478; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 455; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 229 et *Miss. Laurent* (1905) 42, (1906) 214.

1875 (P. Pogge). — IV : bord de la Pioka (Ém. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.); vallée de la Djuma (Gill. 2770). — IX : Bolombo (Ém. et M. Laur.); en amont de Yanguli (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai (Luja); le Sankuru (Ém. et M. Laur.); Olombo: Lie (Ém. et M. Laur.); la Lulua (Pg.); pays de Muata-Jamvo (Pg. 275). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg.).

— — var. **elongata** *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 43, t. 23.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.).

Dracaena reflexa *Lam.* *Encycl. méth. Bot.* II (1786) 324; *Redouté* *Liliac.* II, t. 92; *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XV (1875) 530; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 329.

Le type, largement dispersé dans toutes les régions trop., serait originaire de l'île Maurice.

— — var. **Buchneri** *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XXXII (1902) 96.

1880 (Max Buchner). — VI : Dinga (Buett. 531). — XV? : Kehungula sur la Lovo; Mukinsh [Congo?] (Buch. 684).

— — var. **nitens** [*Welw.*] *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII (1898) 441; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 242; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 44, t. 17.

D. nitens *Welw.* ex *Bak.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I* (1877) 252; *Rendle* *Cat. Welw. Pl.* II, 17.

D. Lacourtii *Hort.* ex *De Wild.* l. c. (1905) 44.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst). — II a : la Lemba (Dew.); Luki (Ém. et M. Laur.). — III-IV : la Lufu (Dew.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Léopoldville; Kimuenza (Gill. 1670). — VI : rég. de Luanu (Leser. 35). — VIII : Lulanga; Eala (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Yanongo (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.). — XVI : Toa (Desc.). — Nom vern. : Ndala [rég. des Cataractes] (Dew.).

Dracaena rubro-aurantiaca *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo,* I (1906) 228, t. 58.

1895 (A. Dewèvre). — II : île du Congo dans les env. de Malela (Dew.).

Dracaena surculosa *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1828) t. 1169; *Bot. Mag.* (1867) t. 5662; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 330 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 266; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VII, 440.

D. Godseffiana *Hort.* ex *Rev. Hort.* (1890) 201.

Ann.? (Coll.?). — Congo (Coll.?).

OBS. — M. Baker qui, en 1875, indiquait, d'après des échantillons de

Christian Smith, le *D. spicata* Roxb. et sa var. *aurantiaca* Bak. dans le Bas-Congo, n'en parle plus dans la *Flora of tropical Africa*. — [Conf. *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 532].

Dracaena thalioides *Ch. Morr.* in Belg. Hort. (1860) 348, cum ic.; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 534 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 445; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 59 et Reliq. Deweyr. (1901) 242; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo. I (1906) 229 et Miss. Laurent (1905) 44.

D. Aubryana *Ad. Brongn.* in Fl. des Serres, XV (1862) 47, t. 1522-1523.

1893 (Ém. Laurent). — II : île voisine de Malela (Dew. 169). — II a : Zenze. — Nom vern. : **Gungowa** (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1166). — VI : rives du Kwango entre Popokabaka et les chutes François-Joseph (Gent.). — VIII : Coquilhatville (M. Laur. 200 b).

Dracaena ueleensis *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 20, t. 8, 9.

1905 (F. Seret). — XII c : bord de l'Uelé à Surango (Ser. 397).

Dracaena usambarensis *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 144.

Le type croît dans l'Afrique or. allem.

— — var. **longifolia** *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 43.

1898 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — VII : Ganda (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : Lisala (Ém. et M. Laur.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.).

BULBINE L.

Bulbine asphodeloides [L.] *Spreng.* Syst. veget. II (1825) 85; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 336; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 62; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 475.

Anthericum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 311; *Jacq.* Hort. Vindob. II, t. 181.

B. abyssinica *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 334, t. 97.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.). — Ind. non cl. : Kamisamba [Congo belge?] (Buch.).

— — var. **filifolioides** *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 8.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 230, 264).

ACROSPIRA Welw.

Acrospira asphodeloides *Welw.* ex *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Sér. 2, I (1878) 255, t. 34; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 50; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 447; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 38 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

1891 (F. Demeuse). — IV : Kikando-Luvituku (Dem.). — V : voie ferrée entre Léopoldville et Tumba (Ém. et M. Laur.); rég. de Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3044, 3287); Kisantu (Gill. 649, 1325, 3136). — VIII : Eala [cult.] (M. Laur. 132). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Acrospira Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 211.

1905 (Marc. Laurent). — XV : Gumbumi (M. Laur.).

— — var. **variegata** *De Wild.* l. c. (1906) 211.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur.).

ANTHERICUM L.

Anthericum congolense *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 60 et Reliq. Dewevr. (1901) 242.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Lubunda (Dew. 1029).

Anthericum Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 39.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : le Bas-Kasai (Ém. et M. Laur.).

Anthericum sphacelatum *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 303 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 489; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 61 et Reliq. Dewevr. (1901) 243; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 39.

1883 (H. Johnston). — II a : route de Tshoa à Tshia (Dew.); plateau de la Lomba (Cabra). — V : env. de Bolobo (Johnst.); env. de Suata (Ém. et M. Laur.).

CHLOROPHYTUM Ker.

Chlorophytum Fuchsianum *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 102 et Miss. Laurent (1905) 38, 211, t. 16.

1896 (Ém. Laurent). — IV : route des caravanes (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill. 1902). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.); Eala (M. Laur. 183). — IX : Bolombo; Umangi (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Ém. Laur.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Chlorophytum macrophyllum [*A. Rich.*] *Aschers.* et *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 294; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 53; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 498; *De Wild.* Miss. Laurent (1904) 211.

Anthericum — *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 498.

1882? (P. Pogge). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.). — XVI : à l'O. du Lualaba (Pg. 1479).

VERDICKIA De Wild.

Verdickia katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 7.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : env. de Lukafu (Verd. 329).

DASYSTACHYS Bak.

Dasystachys africana [*Bak.*] *Th. et Hél. Dur.*

Caesia — *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 160, t. 103 A.

Chlorophytum — *Engl.* in Engl. Jahrb. XV (1892) 470.

Dasystachys Grantii *Benth.* in *Benth. et Hook. f.* Gen. pl. III (1883) 789;

Bak. in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 513; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 9.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 259, 296).

Dasystachys Verdickii *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 10.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lofoi (Verd.).

ALLIUM L.

Allium angolense *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 262 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 517; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 56; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 16.

1902 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

DIPCADI Medic.

Dipcadi Mechowii *Engl.* in Engl. Jahrb. XXXII (1902) 94.

1880 (Alex. von Mechow). — Congo [vraisemblablement du Kwango] (Mech. fide Engl.).

Dipcadi Thollonianum *Hua* Contr. fl. Congo franc. [Liliac.] (1898) 23; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 523; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 106.

1901 (R. Butaye). — V : Lemfu (But. in Gill. 2263).

ALBUCA L.

Albuca angolensis *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 591; *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. t. 336 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 534; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 40 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 225.

1902 (L. Gentil). — XV : Kanda-Kanda (Gent.). — XVI : Musumba, 8 1/2° (Pg.). Cult. à Eala [VIII] (Ém. et M. Laur.).

A. angolensis var. **grandiflora** *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 40.

1903? (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

Albuca Gentilii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 225.

1902 (L. Gentil). — XV : Kanda-Kanda (Gent.).

Albuca Gilletii *De Wild.* in La Belg.-colon. (1904) 42, cum ic. et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 103, (1906) 236, t. 35, fig. 1.

1903 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.); Lula-Lumene (Hendr. in Gill. 3105).

Albuca katangensis *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 12, (1903) 226 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 226.

1891 (G. Descamps). — XV : le Lubi [affl. du Sankuru] (Desc.). — XVI : Lukafu (Verd. 479).

Albuca Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 92.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.).

Albuca variegata *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 226.

1 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.).

URGINEA Steinh.

Urginea altissima [L.] *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) 221; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 380; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 62 et Reliq. Dewevr. (1901) 243; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 538; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 211, t. 85 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

Ornithogalum — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 199.

Drimia — *Ker* in Bot. Mag. (1808) t. 1074.

O. giganteum *Jacq.* Hort. Schoenbr. I (1797) t. 87.

1893 (Ém. Laurent). — II : env. de Boma (Schimp.). — II a : Zenze (Ém. Laur.); Lemba (Dew.). — III : entre Matadi et Tumba (Ém. Laur.). — IV : vallée de la Gongo [env. de Tumba] (Ém. Laur.). — V : Léopoldville (Ém. Duch.); Kisantu (Gill.). — VI : Tumba-Mani (Cabra et Michel).

Urginea micrantha [A. Rich.] *Solms* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 294; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) 217; *Engl.* in Engl. Jahrb. VIII (1887) 59; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. Fl. Afr. V, 385 et Étud. fl. Cgo (1896) 266; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 537.

Scilla — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 328.

1874 (Fr. Naumann). — II : Boma (Naum.). — II a : Zenze (Ém. Laur.).

Urginea viridula *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 538.

1885 (Coll.?). — Congo (Hort. Bull. fide cl. Bak.).

DRIMIOPSIS Lindl.

Drimiopsis Barteri *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III, App. (1870) 18;
in *Journ. Linn. Soc.* XIII (1872) 228 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII,
543; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 213, t. 51.

1903? (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

SCILLA L.

Scilla camerooniana *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. III App. (1870) 9 et
in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 554; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr.
V, 391; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 103 [B. Herb.
Boiss. Sér. 2, I, 843] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 243; *De Wild.* Étud.
fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101.

1895 (A. Dewèvre). — Bas-Congo (But.) — IV : Lukungu. — Nom vern. : **Malonga**
(Dew.).

Scilla Ledieni *Engl.* in *Gartenfl.* XXXVIII (1889) 153, 305, t. 1294;
Th. Dur. et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 394 et *Étud. fl. Cgo* (1896)
267; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 557.

1887 (F. Ledien). — IV : Musumbi [entre Lukungu et Palabala] (Ledien).

— — var. **Laurentii** *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 41.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Chenal (Ém. et M. Laur.).

— — var. **zebrina** *De Wild.* l. c. (1905) 213, t. 52.

1903? (Ém. et Marc. Laurent). — Congo (Ém. et M. Laur.).

ORNITHOGALUM L.

Ornithogalum caudatum *Ait.* Hort. Kew. I (1789) 442; *Jacq.* Icon.
pl. rar. II (1793) t. 423; *Bot. Mag.* (1805) t. 805; *Th. Dur.* et *Schinz*
Consp. fl. Afr. V, 400 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 267; *Bak.* in *Dyer*
Fl. trop. Afr. VIII, 545.

Urophyllou — *Bak.* in *Saund.* Refug. bot. IV (1871) t. 202.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.).

WALLERIA Kirk.

Walleria Mackenii *T. Kirk* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 597, t. 52, fig. 2; *Bak.* in Journ. Linn. Soc. XVII, 459 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 507; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1906) 6.

W. angolensis *Bak.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, I (1878) 263; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 418.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : ukafu (Verd. 310).

GLORIOSA L.

Gloriosa simplex *L.* Mant. pl. (1767) 62; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 65; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

G. virescens *Lindl.* in Bot. Mag. (1825) t. 2539; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 417 et Étud. fl. Cgo (1896) 267; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 61; II (1900) 62; Pl. Thonnerianae (1900) 7 et Reliq. Dewevr. (1901) 243; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 38 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224; II (1907) 20; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 563.

Methonica — *Kunth* Enum. pl. IV (1843) 277; *Hook.* in Bot. Mag. (1856) t. 4938.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo, A C. — Nom vern. : **Uegna** (Cabra). — V : le Stanley-Pool (Buett.); entre le Stanley-Pool et Léopoldville (Ém. et M. Laur.); env. de Léopoldville (Luja; Dybowski); env. de Kwamouth (Biel.); entre Dembo et Kisantu (Gill.); entre Tumba et le Kwango (Cabra et Michel). — VI : Lusubi (Leser.). — IX : Upoto (Thonn.). — XII a : Nala (Van Ryss.). — XVI : le Katanga (Briart) Lofoi (Verd.); Pala (Deb.); Pweto (Chargeois); la Lufira (Hecq.). — Ind. non cl. : Mutembele (Dew.). — Noms vern. : **Katongulu** [Kasongo]; **Lokama-Kama** [Tanganika] (Dew.).

Gloriosa superba *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 305; *Andrews* Bot. Repos. II (1801) t. 129; Bot. Reg. (1816) t. 77; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 417; *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 563; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 80] et Contr. fl. Cgo, I (1899) 61; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 127-128 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101, (1906) 224.

Methonica — *Crantz* Inst. rei herb. I (1766) 474; *Redouté* Liliac. I, t. 26.

1892 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe (Kest.). — VI : village Gulu [Djuma] (Gent.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Upoto (Wilw.). — XV : entre Lusambo et le Lomami; le Kasai (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Lumpundi (Dew.); le Lualaba-Kasai (V. Dur.).

LITTONIA Hook.

Littonia grandiflora *De Wild.* et *Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, X (1901) 34 [B. S. B. B. XL, 34]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 7.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. **Sjimbadala** (Verd. 1288).

Littonia Lindenii *Bak.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1898) 566.

1893 (G. Descamps). — XVI : Pweto [Lac Moero] (Desc.),

PONTEDERIACEAE

EICHORNIA Kunth.

Eichornia natans [*P. Beauv.*] *Solms* in *Brem. Abhandl.* VII (1882) 254 et in *DC. Monog. Phan.* IV, 526; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 418; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55]; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 4].

Pontederia — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 18, t. 68, fig. 2.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 260, 1008).

CYANASTRUM Oliv.

Cyanastrum Verdickii *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 5.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 275).

XYRIDACEAE

XYRIS L.

Xyris angustifolia *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, V (1899) 30 [B. S. B. B. XXXVIII², 149] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 243; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 20.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : entre Mokanga et Ikari (Dew. 1069).

Xyris capensis *Thunb.* *Prodr. pl. Capens.* (1794) 12; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 133; *Nilss.* [Stud. ueber Xyrid.] in *Svensk Vet. Akad. Handl.* XXIV, n. 14 (1892) 40; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 13; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 13; *Rendle* *Cat. Welw. Pl.* II, 68; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1903) 172.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : bords du Lac Moero (Verd.).

Xyris congensis *Buett.* in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* XXXI (1889) 71; *Nilss.* [Stud. ueber Xyrid.] in *Svensk Vet. Akad. Handl.* XXIV, n. 14 (1892) 29; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 420 et *Étud. fl. Cgo*

(1896) 268; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 214; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 99; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 23.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (But.). — VIII : entre Équateurville et Lukolela (Buett. 585). — XIII : env. de Matshatsha (Dew. 1091).

COMMELINACEAE

POLLIA Thunb.

Pollia condensata *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 125; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 131; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 74; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 27; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 35.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : — Inongo (Ém. et M. Laur.)

— — var. **variegata** *Hort.* ex *Th. Dur.* in *Rev. Hort.* Belg. XXXIV (1908) 407, cum ic.

1907 (A. Sapin). — Congò (Sap.).

PALISOTA Rchb. (1)

Palisota ambigua [*P. Beauv.*] *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 131, t. 5, fig. 3; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 421 et Étud. fl. Cgo (1896) 268; *De Wild. et Th. Dur.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41; II (1898) 82 [B. S. B. B. XXXVI², 81; XXXVII, 127] et Reliq. Dewevr. (1901) 244; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 31; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 36, (1906) 209.

Commelina — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 26, t. 15.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisanu (Gill.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Coquilhatville. — Nom vern. : **Katandi** (Dew.); **Eala** (M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV : Lubue (Lujā); **Mukenge**. — Nom vern. : **Vuuma** (Ém. Laur.).

Palisota Barteri *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1862) t. 5318; *Schoenl.* in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. II, 4 (1888) 62, fig. 31, A-E; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 132 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII,

(1) M. Schlechter [Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 273] a indiqué le n° 12613, récolté par lui à Coquilhatville [VIII], comme étant le **Pal. acuminata** *Clarke*. Ce nom est introuvable.

29; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 62; *Hua* in B. S. B. Fr. XLI (1900) p. LIV.

1891 (F. Demeuse). — XIII a : Stanley-Falls (Dem.).

Palisota hirsuta [*Thunb.*] *K. Schum.* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 210, in syn.

Dracaena — *Thunb.* Diss. de *Dracaena* (1808) 16.

P. thyrsoiflora *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 544 (syn. excl.); *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 133; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422 et Étud. fl. Cgo (1896) 268; *Hua* in B. S. B. Fr. XLI (1900) p. LV; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 31; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62 et Pl. Thonnerianae (1901) 5; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 100, (1906) 222 et Miss. Laurent (1905) 35, (1906) 210.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Ém. Laur.). — III : Vivi (Johnst.). — IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : entre Dembo et le Kwango (But.); Kisantu; Sabuka (Ém. et M. Laur.); rég. de Sanda (Odd.). — VIII : Ikaw (Lamb.). — IX a : Galî (Thonn.). — XV : Bukila (Ém. et M. Laur.); le Kasai, le Sankuru et la Lulua (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg.).

Palisota Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 210, t. 3.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Dibele (Ém. et M. Laur.).

Palisota Mannii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 132 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 29; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 62 et Reliq. Dewevr. (1901) 244; *Hua* in B. S. B. Fr. XLI, p. IV.

1896 (A. Dewèvre). — V : Kisantu (Gill.). — XIII c : Lokandu. — Nom vern. : Teti-Teti (Dew.). — XIII d : Vieux-Kasongo (Dew.).

Palisota Preussiana *K. Schum.* ex *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 30; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 36.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Palisota prionostachys *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 134; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422 et Étud. fl. Cgo (1896) 268; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62; II (1900) 63; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 35 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 18; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 32.

P. congolana *Hua* in B. S. B. Fr. XLI (1900) p. LIII.

1870 (G. Schweinfurth). — V : Kisantu (Ém. Laur.). — XII d : pays des Mangbetu (Schw. 3622). — XV : forêts entre le Lomami et Lusambo; Dibele; Butala; Bukila (Ém. Laur.); Munungu (Leser.). — Ind. non cl. : le Luatschim [Congo?] (Buch.).

Palisota Pynaertii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 100.

1902 (L. Pynaert). — VIII : env. d'Eala (Pyn.).

Palisota Schweinfurthii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 132 pr. p. et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 29; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVII, 128]; *Hua* in B. S. B. Fr. XLI (1900) p. 55; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 74.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Bingila (Dup.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3279, 3281). — XV : forêts de la Lulua, du Sankuru et du Kasai (Em. Laur.).

COMMELINA L.

Commelina aethiopica *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 189; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 103 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 843]; *Clarke* in *Dyer* Pl. trop. Afr. VIII, 50; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1078).

Commelina africana *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 41; *Redouté* Liliac. IV (1808) t. 207; Bot. Mag. (1811) t. 1431; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 164; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 422 et Étud. fl. Cgo (1896) 269; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 45.

1891 (G. Descamps). — V : Kisantu (Gill. 106, 997). — Ind. non cl. : Luala (Desc. 55).

Commelina aspera *G. Don* ex *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 542; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. VIII, 180; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 78; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55] et Pl. Thonnerianae (1901) 6; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 56; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 14.

1896 (Fr. Thonner). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Yabosumba près Dobo (Thonn.). — XV : route de Luebo-Luluaboury (Gent.).

Commelina benghalensis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 41; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 424; *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI, t. 2065; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41; II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVI², 87; XXXVII, 128]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 76; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 159 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 41; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 245; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 117 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 18.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Kwamouth (Biel.) — XII c : Nianagra (Delp.). — XIII d : env. de Kabanga (Dew.). — XV : Mokole [Lubi] (Lescr.) — XVI : Albertville [Toa] (Hecq : Desc.). — Noms vern. : **Popivilla** [Ikwangula]; **Mitesa** [Tanganika]; **Ignia** (Kasongo) (Dew.).

Commelina capitata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 541; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 176; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 424 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 269; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 78; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 54; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI², 87]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 245; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 36 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 222; II (1907) 18.

1891 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu et env. (Gill.); Sanda (Odd.); Kimuenza (Gill.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Boiovo**; Irebu (Ém. et M. Laur.); Équateur [Wangata] (Dew.; Pyn.). — IX : pays de Bangala (Dew.). — XI : Isangi; Basoko (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Yakusu (Ém. et M. Laur.); env. de Stanleyville (Ém. Laur.). — XV : Bombaie (Ém. et M. Laur.).

Commelina Clarkeana *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 245; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 222.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Gill. 3253). — II a : Katala (Dew. 183).

Commelina condensata *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 190 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 436; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 424; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55] et Pl. Thonnerianae (1900) 6.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 932). — IX : Bobi (Thonn.). — IX a : Gali (Thonn. 22, 52).

Commelina Dammeriana *K. Schum.* in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 343, t. 6.

1876 (P. Pogge). — XV : la Lulua, vers le 9 1/2° (Pyn. 454).

Commelina Forskalaei *Vahl* Enum. pl. II (1806) 172; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 425; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 168 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 44; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 222.

1901 (J. Gillet). — V : env. de Kimuenza (Gill.).

Commelina latifolia *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 340; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 173, pr. p. et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 50; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 426; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVII, 128].

1893 (P. Dupuis). — II : Sisia (Dup.).

Commelina nudiflora *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 41; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 144; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 427 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 269; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 74; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 36; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI², 87]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 6 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 245; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 222.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Monteiro); Sisia (Dup.). — II a : Katala. — Nom vern. : **Singa-Singa** (Dew.); Bingila (Dup.). — IV : Lukungu (Hens); Kimpesse (Dem.). — V : Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — VI : entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel). — XV : env. de Lusambo. — Nom vern. : **Bafwamfwa**. — XVI : Pala (Deb.).

— — form. **agraria** [*Kunth*] *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 63, in obs.

C. agraria *Kunth* Enum. pl. IV (1843) 38; *Webb* et *Berth.* Hist. nat. Canar. III², 356, t. 238.

1891 (F. Demeuse). — IX : pays des Bangala (Dem.).

Commelina scaposa *Clarke* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VII (1900) 50 [B. S. B. B. XXXVIII², 220] et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 38.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : Haut-Marungu (Deb.).

Commelina Schweinfurthii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 158; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 428; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 41; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 223.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lofoi (Verd.).

Commelina umbellata *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 21; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 179; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 428; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 103 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 843]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 55; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 101, (1906) 223; II (1907) 15.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu; entre Dembo et Kisantu; Kimuenza (Gill.). — VIII : le Haut-Lopori (Biel.).

Commelina Vogelii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 189 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 56; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

POLYSPATHA Benth.

Polyspatha paniculata Benth. in *Hook.* Niger Fl. (1849) 543, t. 3; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 194 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 61; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 429; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 244; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 15 et *Miss. Laurent* (1905) 36.

1896 (A. Dewèvre). — V : env. de Léopoldville (Gill.). — XI : Basoko (Ém. et M. Laur.); env. de Bena-Kamba (Dew.). — XV : Munungu : Kondue (Ém. et M. Laur.).

ANEILEMA R. Br.

Aneilema aequinoctiale [*P. Beauv.*] *Kunth* Enum. pl. IV (1843) 72; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 221; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 429 et Étud. fl. Cgo (1896) 271; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 60; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 79; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62; II (1900) 63 et Reliq. Dewevr. (1901) 246; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1901) 104, (1906) 223 et *Miss. Laurent* (1905) 36, (1906) 211.

Commelina — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 65, t. 33.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila; le Mayumbe (Dup.); Zobe (Dew.); Lemba. — Nom vern. : **Matata** (Cabra). — IV : Lukungu (Hens); Luvituku (Ém. Laur.). — V : Kimpoko (M. Laur.); env. de Kwamouth (Biel.); Sanda (De Brouw.). — VI : env. de Dima (Lescr.). — XII d : Bangwa [Mangbettu] (Schw.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XV : Mange (Em. et M. Laur.); Olombo (Ém. Laur.).

Aneilema beniniense [*P. Beauv.*] *Kunth* Enum. pl. IV (1843) 73; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 224; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 430 et Étud. fl. Cgo (1896) 41; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 79; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 68; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62; II (1900) 67; Pl. Thonnerianae (1901) 6 et Reliq. Dewevr. (1901) 246; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 223 et *Miss. Laurent* (1905) 37; *Thonn.* Blütenpfl. Afrik. (1908) 128, t. 16.

Commelina — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 49, t. 87.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.); Zobe (Dew.); Temvo (Ém. Laur.). — IV : Bangu (Dem.). — V : le Stanley-Pool (Ém. Duch.); Lukolela (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — IX : Bumba (Ém. Laur.). — IX a : Gali (Thonn.). — XV : bords du Sankuru; env. de Lusambo (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Blakasi [Congo ?] (Burt.).

Aneilema Lujaei *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 63 et Pl. Gilletianae, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 19.

1898 (Éd. Luja). — V : marais entre Sabuka et Léopoldville [Stanley-Pool] (Luja); env. de Kwamouth (Biel.); Lemfu (But.); Sanda (Odd.); Kisantu (Gill.).

Aneilema ovato-oblongum *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 71, t. 104; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 431 et Étud. fl. Cgo (1896) 270; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 69; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI², 87]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 223; II (1907) 19 et Miss. Laurent (1905) 37.

Commelina — *Roem.* et *Schult.* ex *Schult.* Mant. pl. I, Add. I (1822) 376.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens). — V : Léopoldville (Schlt. : Luja); env. de Kwamouth (Biel.); Sanda (De Brouw.); Lukolela (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — XIII a : Yakusu (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Kibaka [Angola?] (Buett.).

Aneilema pedunculatum *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 228; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 136; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 431; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 64; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. V, 73.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : bords du Tanganika (Deb.).

Aneilema Schweinfurthii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 227; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 136; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 432; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVII, 128]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 71.

Lamprodithyros gracilis *Kotschy* et *Peyr.* Pl. Tinneanae (1867) 47, t. 23, fig. A.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : C. sur tous les bords du Tanganika (Deb.).

Aneilema sinicum [*Roem.* et *Schult.*] *Lindl.* in *Bot. Reg.* (1823) t. 695; *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III, 212; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 432 et Étud. fl. Cgo (1896) 271; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 5; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 79; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 63; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41; II (1898) 38 [B. S. B. B. XXXVI², 87; XXXVII, 128]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 15, (1906) 223; II (1907) 19 et Miss. Laurent (1905) 37.

Commelina — *Roem.* et *Schult.* ex *Schult.* Mant. pl. I, Add. I (1822) 376.

A. secudum *Wight* Icon. pl. Ind. or. VI (1853) t. 2075.

1883 (H. Johnston). — II a : Kwangila [plateau entre la Lukula et le Lubuzi] (Cabra); Bingila (Dup.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Bolobo (Johnst.); le Stanley-Pool (Dem.); Sanda (De Brouw.). — VI : Eïolo (Ém. et M. Laur.); vallée de la Djuma (Gill.). — VII : Nioki (Ém. et M. Laur.). — IX : Yambiuga (Pyn.). — IX a : Bokumba (Thonn.). — XV : Bas-Sankuru (Ém. et M. Laur.). — XVI : le Katanga; Massima; le Lualaba (Briart); Lukafu. — Nom vern. : *Pingelema* (Verd.); Haut-Marungu (Deb.).

BUFORRESTIA Clarke.

Buforrestia imperforata Clarke in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 234; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 433; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI², 87]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 80; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 76; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 62; II (1900) 64 et Pl. Thonneriana (1900) 7; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 19.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Sabuka (Luja et Ém. Duch.); Kisantu (Gill.). — VIII : Équateurville (Pyn.). — IX a : Gali (Thonn.). — Ind. non cl. : la Luaua (Cabra).

COLEOTRYPE Clarke.

Coleotrype Laurentii K. Schum. in *Engl. Jahrb.* XXXIII (1903) 377; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 37.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : Munungu (Ém. et M. Laur.); bords de la Lulua, du Kasai et du Sankuru (Ém. Laur. fide K. Schum.).

CYANOTIS Don.

Cyanotis angusta Clarke in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 260 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 70; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 840]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Cyanotis caespitosa Kotschy et Peyr. Pl. Tinneanae (1867) 48; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 82; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 104 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 844]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 101; II (1907) 19.

1900 (R. Butaye). — V : env. de Dembo (But. in Gill. 1473). — Ind. non cl. : Kamomme [XII?] (Lescr. 162).

Cyanotis Dybowskyi Hua in *B. Mus. Hist. nat. Paris*, I (1895) 122; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 84; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 37 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 223; II (1907) 19.

1903 (Ém. Laurent). — IV : Tumba (Ém. et M. Laur.) — V : env. de Kwamouth (Biel.); Bokala (M. Laur. 609); Kisantu et env. (Ém. et M. Laur.); rég. de Lumene (Hendr.); env. de Sanda (Odd. in Gill. 3322, 3560); env. de Lemfu (But.). — VI : entre Lusubi et Luanu (Lescr. 69).

Cyanotis lanata Benth. in *Hook. Niger Fl.* (1849) 542; Clarke in *DC. Monog. Phan.* III, 258; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V,

434; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63; *Rendle Cat.* Welw. Pl. II, 80; *Clarke in Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 80.

1898 (J. Gillet). — V : env. de Dembo (Gill.).

Cyanotis longifolia *Benth.* (non *Wight*) in *Hook.* Niger Fl. (1849) 543; *Clarke in DC. Monog. Phan.* III, 259; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 434 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 271; *Rendle Cat.* Welw. Pl. II, 80; *Clarke in Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 81.

Ann.? (Curror) — Congo (Curr.).

— — var. **Bakeriana** *Clarke* l. c. III (1881) 259; *Th. Dur. et Schinz* l. c. 271.

C. longifolia *Bak.* (non *Wight*) in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 163.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, C. 168).

Cyanotis somaliensis *Clarke* in *Kew Bull.* (1895) 229 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 83; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 19.

1904 (J. Gillet). — V : env. de Kisantu (Gill. 3198); Sabuka (M. Laur. 524).

— — var. **uda** *Clarke* in *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 37 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 223.

1901 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 214). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.).

FLOSCOPA Lour.

Floscopa africana [*P. Beauv.*] *Clarke* in *DC. Monog. Phan.* III (1881) 267; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 435 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 271; *Hua* in *B. Mus. Hist. nat. Paris*, I, 122; *Clarke in Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 85; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, I (1897) 41 [B. S. B. B. XXXVI², 47]; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, II (1901) 104 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 844]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 15; II (1907) 19.

Aneilema — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 57, t. 93.

1885 (R. Buettner). — Congo (Buett.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Yumbi (M. Laur.); Lisha (Hens). — VI : vallée de la Djuma (Gent.).

Floscopa glomerata *Hassk.* *Commel. Ind.* (1870) 166; *Rendle Cat.*

Le Fr. Gillet a envoyé de Kisantu, le *Rhoeo discolor* Hance, espèce de l'Amérique centrale, certainement cultivée [Conf. *Th. Dur. et De Wild. Pl. Gilletianae*, I (1900) 55 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 55].

Welw. Pl. II, 80; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 86; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

Floscopa rivularis [A. Rich.] *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 267 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 86; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 436; *Hua* in B. Mus. Hist. nat. Paris, I, 122; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 20.

Aneilema — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 342.

Lamproditheos — *Hassk.* in *Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 211, 295.

1905 (Marc. Laurent). — V : Dolo (M. Laur.).

— — var. **minor** *Clarke* in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 224.

1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill. 2628).

Floscopa Schweinfurthii *Clarke* in *DC.* Monog. Phan. III (1881) 269 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 87; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 5.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 463).

PALMACEAE

PHOENIX L. (1)

Phoenix reclinata *Jacq.* Fragm. bot. I (1800) 27, t. 24; *Mart.* Hist. Palm. III, 272, t. 164; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 82; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 103; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12, (1904) 95, (1906) 221 et *Miss. Laurent* (1905) 23.

P. spinosa *Thonn.* in *Hornem.* Obs. de indole pl. Guin. (1819) 11; *Mart.* l. c. III, 273; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 455 et Étud. fl. Cgo (1896) 272; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63.

1816 (Chr. Smith). — I : Moanda (Gill.). — I-II : estuaire du Congo jusqu'à l'île Mateba (Dupont; Roger); Bas-Congo (Sm.). — II : ravin de la Kalamu (Ém. et M. Laur.). — II a : le Shiloango (Ém. Laur.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.). — VI : chutes François-Joseph. — Nom vern. : **Madibo** (Gent.). — XV : env. de Luluabourg : Lubue (Verd.); Tetu. — Noms vern. : **Mansongo** (Hendr.); **Massongolo** (But.); **Lunda**; **Mushi-Brook** (Buchn.).

(1) Le *Phoenix dactylifera* L. a été indiqué vaguement au Congo par Martius.

CALAMUS L.

Calamus Laurentii *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 97, t. 27, 28 et Miss. Laurent (1905) 24.

1903 (Marc. Laurent) — VIII : env. d'Eala (M. Laur. 126). — IX : Umangi (Ém. et M. Laur.) — XV : le Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Calamus secundiflorus *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 15, t. 9, 10; *Mart.* Hist. Palm. III, 241, t. 116, fig. 12; *Mann et H. Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 432, t. 38 g, 41 d et 43 c; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 456 et Étud. fl. Cgo (1896) 272; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63 et Reliq. Dewevr. (1901) 246.

Ancistrophyllum — *Mann et H. Wendl.* ex *Drude* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) 230; *Hook. f.* in Kew Bull. Rep. (1882) 69; *Drude* in Engl. Jahrb. XXI (1895) 111; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 115.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — VIII : Coquilhatville (Dew.) — XV : Lunda (Buchn.); le Sankuru (Ém. Laur.). — XVI : le Lualaba (Ém. Laur.).

RAPHIA P. Beauv. (2)

Raphia Gentiliana *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 29, t. 13, 14 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) t. 12, 13.

1903 (Ém. et M. Laurent). — VIII : env. d'Eala (Ém. et M. Laur.).

— — var. **Gilletii** *De Wild* ll. cc. (1905) 30, t. 15 et (1906) 43, t. 14.

1900 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 1851).

Raphia Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 26, t. 7-10, fig. 6 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 42-43, 49-56, t. 5-8.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Palmier vigoureux, répandu, semble-t-il, sur certains points des env. d'Eala (Ém. et M. Laur.).

Raphia monbuttorum *Drude* in Engl. Jahrb. XXI (1895) 111, 130; *Engl. Pfl. Ost.-Afr.* 131; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 105.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : Munza (Schw. 3357).

Raphia Sese *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 28, tt. 11, 12 et Not. pl. util. ou intér. du Cgo, II (1906) 43, t. 9-11.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.).

(2) *De Wildeman* Tuiles végétales [Raphia] in Not. pl. util. ou intér. du Congo, II (1906) 37-56.

Raphia vinifera *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 76, t. 44 fig. 1, 45 et 46, fig. 1; *Mart.* Hist. Palm. III, 216, t. 42 c; *Mann et H. Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 437, t. 42; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 457, et Étud. fl. Cgo (1896) 273; *C. H. Wright* in *Dyer.* Fl. trop. Afr. VIII, 106; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63.

Sagus — *Poir.* Encycl. méth. Bot. XIII (1817) 13 et Pl. bot. Encycl. IV, t. 771, fig. 1.

1816 (Chr. Smith.) — Bas-Congo (Sm.: Hens; Demeuse, etc.). — XV : le Lomami, le Kasai et le Sankuru (Ém. Laur.). — XVI : le Lualaba (Ém. Laur.).

ONCOCALAMUS *Mann. et H. Wendl.*

Oncocalamus acanthocnemis *Drude* in Engl. Jahrb. XXI (1895) 111, 133; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 111.

1888 (Fr. Hens). — V : Bolobo (Hens, C. 170).

EREMOSPATHA *Wendl. et Mann.*

Eremospatha Cabrae [*De Wild. et Th. Dur.*] *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 96, t. 32.

Calamus — *De Wild. et Th. Dur.* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, V (1899) 32 [B. S. B. B. XXXVII², 151]; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 110.

1897 (Alph. Cabra). — Bas-Congo (Cabra). — V : Kimuenza (Gill. 2060).

Eremospatha cuspidata [*Mann et H. Wendl.*] *H. Wendl.* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) 244; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 113; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 23.

Calamus — *Mann et H. Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 434, t. 41, fig. A.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.) — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.).

Eremospatha Haullevilleana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 96, t. 33-34, (1906) 231 et Miss. Laurent (1905) 24.

1900 (J. Gillet). — Bas-Congo (Gill. 3505). — V : Kisantu (Gill. 1385). — VIII : Isaka (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV : Bosongo (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Lubamba (Gill. 2026)

Eremospatha Hookeri [*Mann et H. Wendl.*] *H. Wendl.* in *de Kerch.* Les Palmiers (1878) 244; *Drude* in Engl. Jahrb. XXI (1895) 111; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 112.

Calamus Hookeri Mann et H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 434, t. 41, fig. c.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : le Kambele [pays des Mangbettu] (Schw. 3671).

BORASSUS L (1)

Borassus flabellifer L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1187 et ed. 2 (1763) 1657; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 459 et Étud. fl. Cgo (1896) 273.

B. flabelliformis L. Musa Clifort. (1736) 13; *Mart.* Hist. Palm. III. 219, t. 108, 121 et 162; Fl. des Serres, VII (1851) 154, cum icone; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63 et Pl. Gilletianae, II (1901) 104 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 844].

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (Naum.). — V : le Stanley-Pool (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — XIII d : Nyangwe (Ém. Laur.); Maniema (Ém. Laur.). — XVI : le Lualuba (Ém. Laur.).

— — var. **aethiopum** [*Mart.*] *Warb.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* B (1895) 20, 21, cum xyl ; C (1895) 130, *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 117; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 24, t. 5 et fig. 5.

B. aethiopium *Mart.* l. c. III (1836-1850) 221; *Mann et H. Wendl.* in Trans. Linn. Soc. XXIV (1864) 439.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : entre Léopoldville et Kwamouth (Ém. et M. Laur.). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.).

ELAEIS Jacq.

Elaeis guineensis L. Mant. pl. I (1767) 137; *R. Br.* in *Tuckey* River Congo (1818) 455; *Mart.* Hist. Palm. I, 62, t. 54, 56 et III, 288; Fl. des Serres, XIV (1865) 265, t. 1492-1493; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 84; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 462 et Étud. fl. Cgo (1896) 274; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 125; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 63; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 31, fig. 7, 8.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Dup.; Ém. Laur.). — XI : l'Aruwimi

(1) Deux espèces d'un genre voisin [*Hypphaene*] les *H. guineensis* Schumach. et Thonn. et *H. ventricosa* Kirk ont été indiquées : la première dans l'île Mateba [II] par M. Éd. Dupont, la seconde au « Congo » par M. H. Johnston; mais ces indications demandent confirmation.

Le *Cocos nucifera* L., répandu dans la zone maritime tropicale du monde entier, est cultivé ou naturalisé à Boma [II] (Dup.) et sur d'autres points du Bas-Congo (Ém. Laur.). [Conf. *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 274; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 126].

(Lothaire). — XII : bassin de l'Uele (Schw.). — XII d : Munza [cult.]; pays des Mangbettu (Schw.) — XV : le Kasai : le Sankuru (Ém. Laur.).

M. Ed. Dupont [Lettres sur le Congo] indique cette espèce de Mousouk à Kinshasa. — M. Em. De Wildemann [l. c. p. 36] dit que cette espèce est « largement répandue dans tout le bassin du Congo » mais que « sa dispersion est loin d'être bien connue ».

PANDANACEAE

PANDANUS L. f.

Pandanus Butayei *De Wild.* in *Rev. cult. colon.* (1902) 15 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1903) 22-27.

1902 (P. Butaye). — V : Lemfu (But.).

Pandanus Candelabrum *P. Beauv.* *Fl. d'Oware*, I (1804) 37, t. 21, 22; *Balf. f.* in *Journ. Linn. Soc.* XVII (1878) 43; *Solms* in *Linnaea*, XLII (1878) 27; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 463 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 275; *Warb.* in *Engl. Pflanzenreich [Pandanus]* (1900) 67; *C. H. Wright* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 132; *Thonn.* *Blütenpfl. Afrik.* (1908) 79, t. 3.

Tuckeya — *Gaudich.* *Atlas Voy. Bonite* (1846) t. 26, fig. 10-20.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : le Mayumbe; bord du Shi-loango (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : le Lomami (Ém. Laur.).

ARACEAE

CULCASIA P. Beauv.

Culcasia angolensis *Welw.* ex *Schott* in *Seem. Journ. of Bot.* III (1865) 35; *Engl.* in *DC. Monog. Phan.* II, 102; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 471; *Th. Dur.* et *De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI², 88]; *Rendle* *Cat. Welw. Pl.* II, 90; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 178; *Engl. Pflanzenreich [Arac.-Pothoid.]* (1905) 300; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 98; II (1907) 46 et *Miss. Laurent* (1905) 32.

1882? (P. Pogge). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II a : le Mayumbe (Dup.). — V : Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — XII a : entre Bima et Bambili (Ser.). — XII c : entre Amadis et Surango (Ser.). — XV : le Kasai; le Sankuru (Ém. Laur.); Kanda-Kanda (Gent.); la Lulua (Pg.).

Culcasia parviflora *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 176; *Engl.* Pflanzenreich [Arac.-Pothoid.] 299.

1899 (R. Schlechter). — V : le Stanley-Pool (Schlt.).

Culcasia scandens *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 4, t. 3; *Schott* Gen. Aroid. t. 50; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. II, 102 et 637; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 471 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 275; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 247; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 90; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 174; *Engl.* Pflanzenreich [Arac.-Pothoid.] 302; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 98 et *Miss. Laurent* (1905) 33.

Caladium — *Willd.* Sp. pl. IV (1805) 489.

1816 (Chr. Smith). — II : Ile des Princes (Ém. Laur.). — II a : Shinganga (Dew.). — IV : Gombi. — Nom vern. : **Washense lohoto** (Dew.); Kitobola (Ém. Laur.); Luvituku (Luja). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Léopoldville et env. (Schlt. Gill.); Sanda (De Brouw.). — VII : Kiri (Ém. Laur.). — VIII : Bolombo (Ém. Laur.) — XV : le Sankuru (Ém. Laur.).

Culcasia striolata *Engl.* in *Engl.* Jahrb. XXVI (1899) 417, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin* (1899) 281, in *Engl.* et *Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV (1897) 58 et in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 271; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 179; *Engl.* Pflanzenreich, IV, 23 B (1905) 297, fig. 83 A-H.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt.).

Culcasia tenuifolia *Engl.* in *Schlechter* Westafr. Kautschuk-Exped. (1900) 271 et in *Pflanzenreich* [Arac.-Pothoid.] (1905) 299.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt.).

GONATOPUS Hook. f.

Gonatopus Bowini [*Decne*] *Hook.* f. in *Bot. Mag.* (1873) sub t. 6026; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. II, 209 et *Pflanzenreich* [Arac.-Pothoid.] (1905) 306, fig. 86; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 196.

Zamioculcas — *Decne* in *B. S. B. Fr.* XVII (1870) 321.

Le type croît dans l'Afrique trop. or.

— — var. **angustifoliolatus** [*De Wild.*] *Th.* et *Hél. Dur.*

Zamioculcas *Boivini* *Decne* var. — *De Wild.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, XI (1901) 66 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 12.

1896 (A. Dewèvre). — XIII : Lubunda (Dew. 1023).

CYRTOSPERMA Schott.

Cyrtosperma Afzelii [*Schott*] *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. II (1879) 269; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 64.

Lasiomorpha Afzelii Schott Gen. Aroid. (1858) t. 85, fig. 11-20 et Prodr. Aroid. 405.

1888 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 1500). — VII : riv. Ikata [Lukenie] (Dem.).

OBS. — M. N. E. Brown [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 198] réunit cette espèce à la suivante.

Cyrtosperma senegalense [Schott] Engl. in DC. Monog. Phan. II (1879) 270; *Hook. f.* in Bot. Mag. (1898) t. 7617; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 472; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56] et Reliq. Dewevr. (1901) 247; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 198; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo, I (1906) 222.

Lasiomorpha — Schott in Bonplandia, V (1857) 127 et Gen. Aroid. t. 86, fig. 1-10.

1896 (A. Dewèvre). — II a : la Lemba (Dew. 1373). — V : Coquilbatville. — Nom vern. : **Ottolo** (Dew. 1609). — Kisantu (Gill. 647).

HYDROSME Schott.

Hydrosme Eichleri Engl. in Jahrb. bot. Gart. Berlin, II (1883) 285, t. 10 et in Engl. Jahrb. XV (1892) 458; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 474 et Étud. fl. Cgo (1896) 276.

Amorphophallus — *Hook. f.* in Bot. Mag. (1889) t. 7071; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 154.

1880 (E. Teusz). — VI : île Bismarck [Kwango] (Teusz).

Hydrosme Léopoldiana Mast. in Gard. Chron. (1887) I, 642, 644, 645, fig. 122-123; Ill. Hort. XXXIV (1887) 65, t. 23; XLII (1895) 380, fig. 49; *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 276.

Amorphophallus — *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 157.

Ann. ? (Coll. ?). — Congo (fide Mast.).

Hydrosme Teuszii Engl. in Gartenfl. XXIII (1884) 2, t. 1142 et in Bot. Jahrb. XV (1892) 458; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 495 et Étud. fl. Cgo (1896) 276; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 247.

Amorphophallus — *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 149.

1880 (E. Teusz). — VI : île Bismarck, 7° 35' (Teusz v. Mechow, 404). — XIII d : env. de Kabango (Dew. 994).

ANCHOMANES Schott.

Anchomanes giganteus Engl. in Engl. Jahrb. XXVI (1899) 419; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 64; Pl. Gilletianae,

II (1901) 105 [B. H. Boiss. Sér. 2, I, 845] et Reliq. Dewevr. (1901) 247; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 142.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dem. 266). — V : Kisantu (Gill. 1267). — IX : Umangi (Ém. Laur.).

CERCESTIS Schott.

Cercestis congensis *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV (1893) 448; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 181, *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65 et Reliq. Dewevr. (1901) 247; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 99, (1905) 222; II (1907) 16 et Miss. Laurent (1905) 33.

C. congoensis [err. cal.] *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 475 et Étud. fl. Cgo (1896) 276.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm., Dem. 65). — II : île des Princes (Ém. Laur.); Zambi (Dew. 205). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Léopoldville (Gill. 2570); rég. de Lula-Lumene (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2898); vallée du Kwilu (Gent.; Gill. 2739); Madibi; Luano (Lescr.) — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (Pyn. 18, 335). — XV : Bena-Dibele (Em. et M. Laur.).

RHEKTOPHYLLUM N. E. Br.

Rhektophyllum congense *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 104 [B. Herb. Boiss. Ser. 2, I, 844]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 98 et Miss. Laurent (1905) 33.

1900 (J. Gillet). — V : entre Kisantu et Dembo (Gill. 1529). — VI : vallée de la Djuma (Gent. 184). — XV : Munungu ; Butala (Ém. et M. Laur.).

Rhektophyllum mirabile *N. E. Br.* in *Britt. Journ. of Bot.* XX (1882) 194, t. 230; *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV, 450; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 475 et Étud. fl. Cgo (1896) 276; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 172.

Nephtytis picturata *N. E. Br.* in *Gard. Chron.* (1887) I, 476; *Th. Dur.* et *Schinz*, l. c. 276.

1870 (G. Schweinfurth). — Congo (Coll.?). — XII d : Mbala au N. du Kibali (Schw.). — XIII a : Bamanga (Ém. Laur.).

NEPHTHYTIS Schott.

Nephtytis Afzelii *Schott* in *Oesterr. bot. Wochenbl.* (1857) 406 et *Gen. Aroid.* t. 51; *Engl.* in *DC. Monog. Phan.* II, 502; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 475; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 171; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 13.

Nephtytis liberica *N. E. Br.* in *Gard. Chron.* XV (1881) 790.

Oligogynium — *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 453.

1895 (A. Cabra). — Bas-Congo (Cabra, 48).

COLOCASIA Schott.

**Colocasia antiquorum* *Schott* Meletem. bot. (1832) 18 et *Gen. Aroid.* t. 37; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 478; *Engl.* in *DC. Monog. Phan.* II, 491; *Bot. Mag.* (1894) t. 7364; *Rendle Cat. Welw. Pl.* II, 88; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 165; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 99 et *Miss. Laurent* (1905) 34.

1903 (Marc. Laurent). — VIII : env. d'Eala. — Nom vern. : Koto (M. Laur.). — XV : Mange (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Yamanga (Ém. et M. Laur.).

CALADIUM Vent.

**Caladium bicolor* [*Ait.*] *Vent.* *Deser. pl. nouv. Jard. Cels* (1800) t. 30; *Rendle Cat. Welw. Pl.* II, 89; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 166; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 34.

Arum — *Ait. Hort. Kew.* ed. 1, III (1789) 316.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.).

ANUBIAS Schott.

Anubias affinis *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 16, t. 21.

? (Coll. ?). — Congo (Coll. ?).

Anubias congensis *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII (1901) 184; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 17, t. 20.

A. heterophylla *N. E. Br.* (non *Engl.*) in *Gard. Chron.* (1889) 67.

? (Coll. ?) — II : Boma [Introd. par M. Bull.].

Anubias Engleri *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 17, t. 15.

A. Afzelii *De Wild.* et *Th. Dur.* [non *Schott*] *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 65.

1895 (Ém. Laurent). — IV : Pioka (Ém. Laur.).

Anubias Gilletii *De Wild.* et *Th. Dur.* *Pl. Gilletianae* II (1901) 105 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 845].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill., 1696).

Anubias hastaefolia *Engl.* in *Engl. Jahrb.* XV (1892) 462; *Th. Dur.* et *Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 476; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II (1900) 65; *N. E. Br.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 185.

1891 (F. Demeuse). — XV : confl. du Kasai et du Sankuru (Ém. Laur.). — Ind. non cl. : Coca (Dem.).

Anubias Haullevilleana *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 13.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 1993).

PISTIA L.

Pistia Stratiotes *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 963; *Roxb.* Pl. Corom. III, 63, t. 269; *Bak.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1878) 159; *Engl.* in *DC.* Monog. Phan. II, 634; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 483 et Étud. fl. Cgo (1896) 277; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI², 88]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 85; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 140; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 34.

1888 (Fr. Hens.) — Bas-Congo (Hens. et M. Dem.). — V : le Stanley-Pool (Lujà); Bolobo (Ém. Laur.). — VI : embouch. du Kwango (Desc.). — XV : le Kasai (Lujà).

LEMNACEAE

SPIRODELA Schleid.

Spirodela polyrrhiza [*L.*] *Schleid.* in *Linnaea*, XIII (1839) 392; *Hegelm.* Monog. Lemn. 151, t. 13; *Th. Dur.* et *Schinz.* Consp. fl. Afr. V, 201; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 99.

Lemna — *L.* Sp. pl. ed. I (1753) 970; *English Bot.* ed. 3, IX, t. 1897; *Rchb.* Icon. fl. Germ. VII, t. 15; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 201.

1900 (J. Gillet). — V : entre Kisantu et Dembo (Gill.).

LEMNA L.

Lemna aequinoctialis *Welw.* Apont. phyto-geogr. (1859) 578; *Hegelm.* Monog. Lemn. 142; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 91; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 203.

L. angolensis *Welw.* ex *Hegelm.* in *Seem.* Journ. of Bot. III (1865) 112; *Hegelm.* 141, t. 7, fig. 9-17; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 484.

1904 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Lukolela (M. Laur.). — IX : Yambinga (Ém. et M. Laur.).

ALISMACEAE

LIMNOPHYTON Mig.

Limnophyton obtusifolium [L.] *Miq.* Fl. Ind. Bot. III (1855) 242; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 487; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 5; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 209; *Buchen* in *Engl.* Pflanzenreich [Alism.] (1903) 22. fig. 10; *Thonn.* Blütenpfl. Afrik. (1908) 80, t. 6.

Sagittaria — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 993; *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 157, t. 102.

1899 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom veru. : **Mudjian-Bubu** (Verd. 205).

ECHINODORUS L. C. Rich.

Echinodorus humilis [*Kunth*] *Buchen.* in *Pringhs.* Jahrb. VII (1865) 28; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 488; *C. H. Wright* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 211; *Buchen.* in *Engl.* Pflanzenreich [Alism.] (1903) 26; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 197 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 9.

Alisma — *Kunth* Enum. pl. III (1841) 154.

1902 (L. Gentil et J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2836 et Gent.). — VIII : Eala (M. Laur. 832).

ERIOCAULONACEAE

SYNGONANTHUS Ruhland.

Syngonanthus Schlechteri *Ruhland* in *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exp. (1900) 272 [nom. tant.]; *Ruhland* in *Engl.* Pflanzenreich [Eriocaul.] (1903) 247.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlt. 12453).

MESANTHEMUM Koern.

Mesanthemum radicans [*Benth.*] *Koern.* in *Linnaea* XXXVII (1856) 573; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 504 et Étud. fl. Cgo (1896) 277; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 260; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 196 [B. Herb. Boiss.

Sér. 2, I, 846] et Reliq. Dewevr. (1901) 291; *De Wild.* Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo (1904) 99 et Miss. Laurent (1905) 35; *Thonn.* Blütenpfl. Afrik. (1908) 129, t. 15.

Eriocaulon radicans *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 547; *Steud.* Syn. pl. glum. II, 273.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Lukolela (Buett.); Kisantu (Gill.). — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — XIII d : près de Nyangwe (Dew.).

CYPERACEAE

RYNCHOSPORA Vahl.

Rynchospora aurea *Vahl* Enum. pl. II (1806) 229; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 39, t. 81 fig. 2; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 653 et Étud. fl. Cgo (1896) 309; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 131; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 580; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 119.

Rynchospora — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 230.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.). — VI : Kongo [Kwilu] (Sap.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Haut-Lopori (Biel.). — XII d : Munza (Schw.). — XV : Lie (Ém. et M. Laur.).

Rynchospora candida [*Boeck.*] *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 653; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 132; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 48.

Rynchospora — *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVII (1873) 605; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 70; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 22 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 119.

1899 (Éd. Luja). — V : rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Dew.); env. de Léopoldville (Gill.); entre Léopoldville et Sabuka (M. Laur.); env. de Kimuenza; Bulebu (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VIII : Irebu (Pyn.).

SCLERIA Berg.

Scleria Acriulus *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 509.

Acriulus madagascariensis *Ridl.* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) 336 et in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II, 266, t. 22, fig. 6-7; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 676.

Le type n'est connu que dans l'Uganda et à Madagascar.

— — form. ***Leopoldiana*** *Clarke* in *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 221.

Acriulus Leopoldianus *Clarke*, l. c., in obs.

1902 (J. Gillet). — VI : vallée de la Djuma (Gill.).

Scleria Barteri Boeck. in *Linnaea*, XXXVIII (1874) 504; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 669; *Étud. fl. Cgo* (1896) 309 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 545; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 22 et *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 220.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Léopoldville (Ém. Duch.); Kisantu; Kimuenza (Gill.); env. de Sanda (Odd.). — VII : Ibalí (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. et M. Laur.). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.).

Scleria Buchanani Boeck. in *Linnaea*, XXXVII (1874) 504; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 669; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71.

1890 (Paul Briart). — XVI : plaine de Tenke (Briart).

Scleria canaliculato-triquetra Boeck. in *Flora*, LXII (1879) 573; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 670; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 59 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 59]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 135; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 505.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Scleria hirtella Sw. Prodr. fl. Ind. occ. (1788) 19; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 671 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 497; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 107 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 847] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 252; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 22 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1905) 221, II (1907) 118.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Dolo (M. Laur.); Kisantu; env. de Kimuenza (Gill.); entre Dembo et le Kwango (But.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : entre Ikori et Mokoange [X ?] (Dew.)

Scleria melanomphala Kunth Enum. pl. II (1837) 345; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 672 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 310; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 134; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 506.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kisantu (Gill.).

— — var. **macrantha** [Boeck.] *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1894) 672 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 310; *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 129; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 252.

S. macrantha Boeck. in *Flora*, LXII (1879) 572 (neque in *Flora*, XLII [1859] 647).

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, 67).

OBS. — A. Dewèvre a récolté cette variété sur la rive N. du Stanley-Pool [Congo franç.] (Dew.).

S. melanomphala form. **oculo-albo** *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1901) 59 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 59].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.)

Scleria ovuligera *Nees* in *Linnaea*, IX (1834) 303; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVIII (1874) 497; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 673 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 310; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 135; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 507; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 252; *De Wild.* Miss. Laurent (1903) 23.

S. *Naumanniana* *Boeck.* in *Engl. Jahrb.* V (1883) 94.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Kimbanza** (Cabra). — II : Sisia (Dup.). — IV : Tombe (Hens). — V : env. de Léopoldville (Dew.); Kimuenza (Gill.). — VII : env. de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens).

Scleria racemosa *Poir.* *Encycl. méth. Bot.* VII (1806) 6; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 169, t. 3; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 674 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 310; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 135; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 588; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI², 90]; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 252; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 23.

1862 (R. Burton). — Congo (Burt.). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); Bingila (Dup.). — V : Lemfu (But.); Kisantu (Gill.). — IX : Ukaturaka (Ém. et M. Laur.). — XIII d : env. de Kasongo (Dew.). — Noms vern. : **Kambete** [Kasongo]; **Kwonne** [Tanganika].

Scleria verrucosa *Willd.* *Sp. pl.* IV (1805) 313; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 675, *Étud. fl. Cgo* (1896) 311 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 509; *De Wild. et Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 253; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 23 et *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 221; II (1907) 22.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Katala. — Nom vern. : **Mambele-Bela** (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Johnst.); Kimuenza (Gill.). — VII : Chenal [la Fini]; Kutu (Ém. et M. Laur.).

JUNCELLUS *Clarke.*

Juncellus laevigatus [*L.*] *Clarke* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI (1893) 596 et in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 544; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI², 28]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 109; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 308.

Cyperus — *L. Mant. pl.* II (1771) 179; *Rottb. Descr. et icon. pl.* 19, t. 16, fig. 1; *Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) 282; XXI (1884) 77, t. 3, fig. 20-21.

1891 (G. Descamps). — XVI : rive droite du Lualaba (Desc.).

Juncellus pustulatus [Vahl] Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 546; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 66; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 109; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 307.

Cyperus — Vahl Enum. pl. II (1806) 341.

1899 (Éd. Luja). — XV : rive droite du Kasai (Luja); le Kasai (Jos. Duch.); la Lulua (Pg.).

MARISCUS Vahl.

Mariscus Dregeanus Kunth Enum. pl. II (1837) 586; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 586 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 295; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 120; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 380.

Cyperus dubius *Rottler* (non *Roth*) in N. Schrift Ges. Nat. Freunde Berlin, IV (1803) 193; Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) 285: XXI (1884) 197.

1888 (Fr. Hens). — III : Matadi (Hens, A. 218).

Mariscus flabelliformis H. B. et K. Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 215; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 588 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 295; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 397; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 65; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 20.

1888 (Fr. Hens). — V : entre Kinshasa et Kwamouth (Luja); Lukolela (Hens). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX a : Mobeka (Hens).

Mariscus flavus Vahl Enum. pl. II (1806) 374; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 588.

Cyperus — *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 384.

Didymia cyperomorpha Philippi in *Engl. Jahrb.* VIII (1887) 57, t. 1.

Le type croît dans l'Amérique trop. et temp.

— — var. **humilis** Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 588 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 393; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56].

C. flavus Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) 196.

C. redolens *Maury* in *Mém. Soc. phys. Genève*, XXXI (1890) 126, t. 36a.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 189). — V : Kisantu (Gill.).

Mariscus ligularis [L.] *Th. et Hél. Dur.*

Cyperus — *L.* *Amoen. acad.* V (1760) 391; *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* 35, t. 11, fig. 2.

M. rufus H. B. et K. Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 216, t. 67; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 592, *Étud. fl. Cgo* (1896) 297 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 396.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Mariscus luridus *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 296 [nom. tant.] et *Étud. fl. Cgo* (1896) 296; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 399.

1888 (Fr. Hens). — VIII : Lulanga (Hens, C. 155).

Mariscus nossibeensis *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 63; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 590 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 297; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 391.

Cyperus — *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 122.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens).

Mariscus pseudo-pilosus *Clarke* in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89] et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 402; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 118.

1895 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.).

— — var. **tenuior** *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo (1900) 68.

1895 (Ém. Laurent). — IV : route des Caravanes [distr. des Cataractes] (Ém. Laur.).

Mariscus Sieberianus *Nees* in *Linnaea*, IX (1834) 286; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 593 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 297; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 388; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 81]; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 120 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 220, II (1907) 118.

Cyperus — *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 122.

1883 (H. Johnston). — II : Zambi (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : entre Tumba et Kimpessa (Gill.). — V : le Stanley-Pool (Johnst.). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens). — XIV : Kalemba-Lemba. — Nom vern. : **Kilengu-longue** (Coll.?). — XVI : Lukonzolwa. — Noms vern. : **Kalimbu** (Coll.); Kiambi [Tanganika-Moero]. — Nom vern. : **Kilao-Lao**.

— — var. **subcompositus** *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI (1893) 622, in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 69 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 389.

1895 (G. Descamps). — XVI : Kibanga (Desc.).

Mariscus trinervis *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 505 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 399.

1882 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg. 1582).

Mariscus umbellatus [Rottb.] Vahl Enum. pl. II (1806) 376 pr. p.; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 595 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 298; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 121; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 390; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, I (1899) 65; II (1900) 68 et Reliq. Dewevr. (1901) 248; De Wild. *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 210.

Kyllinga — Rottb. Deser. et icon. pl. (1773) 15, t. 2, fig. 2.

Cyperus — Clarke in Journ. Linn. Soc. XX (1883) 293 (var. excl.); XXI (1884) 200, var. α pr. p.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe (Coll. ?); Zenze (Ém. Laur.); Shinganga (Dew.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Luja); Kisantu : env. de Dembo (Gill.); Lukolela (Hens). — IX : pays des Bangala (Hens). — XV : Lusambo (Jos. Duch).

CYPERUS L.

Cyperus amabilis Vahl Enum. pl. II (1806) 318; Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 130; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 547 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 283; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 109; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 328.

1874 (Fr. Naumann). — Bas-Congo (Naum.). — IV : Batanga (Luja). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Schlt.). — IX : pays des Bangala (Hens). — XV : la Lulua (Pg.).

— — var. **macra** Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 328.

C. amabilis Vahl var. macer [err. cal.] Clarke in *Th. Dur. et Schinz* ll. cc. V (1895) 547; (1896) 283.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm. 26).

Cyperus angolensis Boeck. in Flora (1880) 435; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. Fl. Afr. V, 548, *Étud. fl. Cgo* (1896) 283 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 321; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 67 et Reliq. Dewevr. (1901) 243; De Wild. *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 217.

1882 (P. Pogge). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Shinganga (Dew.); Zenze; Wakionde (Dup. 841). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.). — XV : Mukenge (Pg.). — XVI : Pala (Desc.).

Cyperus articulatus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 66; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 548 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 283; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVII, 1287]; De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 248; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 117; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 356; De Wild. *Étud. fl. Kat.* (1902) 4, *Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1906) 217, II (1907) 117 et Miss. Laurent (1905) 18.

C. niloticus *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 13; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 63, t. 97, fig. 2.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Ganda (Ém. et M. Laur.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.); Kimuenza (Gill.); entre Kwamouth et Bokala (M. Laur.). — VI : Eiolo (M. Laur.); entre Tumba-Mani et Popokabaka (Cabra et Michel). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Équateur (Dem.); Eala (M. Laur.); Inkongo (Ém. et M. Laur.). — XII c : env. d'Amadis (Ser.). — XII d : Munza (Schw.). — XIII c : Lokandu (Dew.). — XV : le Sankuru (Dem.); env. de Lusambo (Ém. Laur.). — XVI : le Lualaba; le Lubeshi (Desc.); Lukafu (Verd.); Toa (Desc.).

Cyperus auricomus *Sieb.* mss. ex *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 230; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 549 et Étud. fl. Cgo (1896) 284; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 118; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 373.

1888 (Fr. Hens). — IX : pays des Bangala (Hens).

Cyperus bulbosus *Vahl* Enum. pl. II (1806) 342; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 550; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 118; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 352; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I, (1906) 217.

C. javanicus *Retz.* [non *Rottb.*] Obs. bot. IV (1786) 11; *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 175, t. 2, fig. 17-18 [excl. var. β].

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.).

Cyperus compactus *Lam.* Illustr. genr. Encycl. I (1791) 144; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 552 et Étud. fl. Cgo (1896) 284; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 112; *Clarke* in *Dyer* Fl. Capens. VII, 168 et Fl. trop. Afr. VIII; 319; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 21.

1816 (Chr. Smith). — Congo (Sm.). — V : Sanda (Odd.). — XVI : Lac Moero (Verd.).

Cyperus congensis *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 285 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 364.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens, 391).

Cyperus dichromenaeformis *Kunth* Enum. pl. II (1837) 26; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 525.

Le type croît au Brésil.

— — var. **major** *Boeck.* in *Flora*, LXII (1879) 549; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 556 et Étud. fl. Cgo (1896) 285; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 111; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 340; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56].

1870 (G. Schweinfurth). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 7, 69); Kisantu (Gill. 295). — XII d : Munza (Schw. 3401).

Cyperus difformis L. Amoen. acad. IV (1759) 302; *Rottb.* Descr. et icon. pl. 24, t. 9, fig. 2; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 556 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 285; *Th. Dur.* et *De Wild.* Pl. Gilletiana, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 249; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 18; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 115; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 330.

1816 (Chr. Smith). — V : le Stanley-Pool; Tamo (Hens); Kisantu (Gill.). — XIII d : Kasongo (Dew.). — XV : Batempa (Ém. et M. Laur.).

Cyperus diffusus Vahl Enum. pl. II (1806) 321; *Kunth* Enum. pl. II, 30; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 557 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 286; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 113; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 343; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 18.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — XI : en aval de Basoko (Ém. et M. Laur.).

— — var. **angustifolius** *Clarke* in *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 218.

C. Buettneri *Boeck.* *Cyper. nov.* I (1888) 3.

1888 (Fr. Hens). — IX : Bangala (Hens, C. 356).

Cyperus distans L. ex L. *f.* *Suppl. pl.* (1781) 103; *Jacq.* *Icon. pl. rar.* II, t. 192; *P. Beauv.* *Fl. d'Oware*, I, 35, t. 20; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 612; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 558 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 286; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 249; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 116; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 349; *De Wild.* Miss. Laurent. (1905) 18 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 117.

1870 (G. Schweinfurth). — IV : Lukungu; Tombe [Lutete] (Hens). — V : Dolo. — Nom vern. : **Lekambe** (Coll.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.); Ikenge (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dem.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XIII d : Nyangwe (Pg.); Elungu. — Nom vern. : **Kibenbele** (Dew.). — XVI : Albertville [Toa] (Hecq.). — Ind. non cl. : riv. Lukasi (Pg.).

Cyperus elatior *Boeck.* in *Flora*, LXII (1879) 553; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 559 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 361; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletiana, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 346]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 18.

1900 (R. Butaye). — V : env. de Lemfu (But.). — XV : Mununga (Ém. et M. Laur.).

Cyperus esculentus L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) 67; *Host* *Gramin. Austr.* III, 50, t. 75; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 559 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 287; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 117; *Clarke*

in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 355; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 249; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 218.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens). — II : Boma (Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : C. dans le Stanley-Pool (Dem. 58) : env. de Léopoldville (Dew. 474) : Kinshassa (Hens); Kisantu (Gill.). — Ind. non cl. : Busindi (Hens).

C. esculendus var. **acaulis** *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 560 et Étud. fl. Cgo (1896) 287.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Hens, 14). *

— — var. **Buchanani** [*Boeck.*] *Clarke* ex *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56].

C. *Buchanani* *Boeck.* Cyp. nov. I (1888) 4.

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 177).

Cyperus exaltatus *Retz.* Observ. bot. V (1791) 11; *Clarke* in *Hook.* Fl. Brit. Ind. VI, 617 et in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 560.

Le type, largement répandu, existe en Asie, en Afrique et en Australie.

— — var. **dives** [*Delile*] *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 187 et in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 561; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 249.

C. *dives* *Delile* Fl. d'Égypte (1812) 5, t. 4, fig. 3; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 480.

1896 (A. Dewèvre). — XIII d : Piani-Lombi (Dew. 1039).

Cyperus Fenzlianus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 33; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 562 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 368; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 18.

1904 (Ém. et M. Laurent). — XI : Barumbu (Ém. et M. Laur.).

Cyperus fertilis *Boeck.* in Engl. Jahrb. V (1883) 90; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 562 et Étud. fl. Cgo (1896) 287; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 113; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 341; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 67; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 18 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 218; II (1907) 117.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Jos. Duch.); env. de Léopoldville (Gill.); Kinshasa (Luja); rive droite du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.); en aval de Bolombo (Krek.). — VIII : env. d'Eala (M. Laur.). — IX : Umangi (Ém. Duch.). — IX a : Gali (Ém. Duch.). — XII : Goo (Ser.). — Ind. non cl. : Busindi (Hens).

Cyperus flabelliformis *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) 42, t. 12, fig. 2; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 562 et Étud. fl. Cgo (1896) 287; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 114; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 336; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI², 88]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 19 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 218.

1816 (Chr. Smith). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.); Bingila (Dup.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.); env. de Kimuenza ? (But.). — XI : Malema (Ém. Laur.). — XVI : près de Kazembe (Coll. ?); le Lualaba (Desc.).

Cyperus flavidus *Retz.* Observ. bot. V (1789) 13; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 563 et Étud. fl. Cgo (1896) 288; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 114; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 333.

C. Haspan *Rottb.* (non *L.*) Descr. et icon. pl. (1773) 36, t. 6, fig. 2.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 360).

Cyperus flexifolius *Boeck.* in Flora, LXII (1879) 540 et in Engl. Jahrb. V (1884) 90; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 288; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 375.

1874 (Fr. Naumann). — II : île près de Ponta da Lenha (Naum. 143, 150).

Cyperus gracilinux *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 162; in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 564 et Étud. fl. Cgo (1896) 288; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 362.

C. tenuiculmis *Boeck.* in Flora, LXII (1879) 554.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 21). — VIII : Équateurville (Hens, C. 178).

Cyperus Haspan *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 45 pr. p.; *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) 287; XXI (1884) 119, in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 564 et Étud. fl. Cgo (1896) 289; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 114; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 332; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 119.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens). — V : Léopoldville: entre Sabuka et Léopoldville (Luja); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Busindi (Hens).

— — var. **laevinux** *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 605 et in *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu (Hens, A. 239).

Cyperus Hensii *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 289 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 335; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 15, t. 8; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 19.

1888 (Fr. Hens). — IX : Lisha (Hens, C. 364). — XV : ilot du Bas-Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Cyperus immensus *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XX (1883) 294, in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 565, in *Dyer* Fl. Capens. VII, 184 et Fl. trop. Afr. VIII, 371; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 4.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Malamboi** (Verd. 369).

Cyperus maculatus *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) 539; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 567 et Étud. fl. Cgo (1896) 289; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 67; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 363.

C. Naumannianus *Boeck.* in Flora, LXII (1879) 552 et in Linnaea, XXXV (1869-1870) 228.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool; Lukolela (Hens). — IX : Lisha (Hens). — XVI : Toa (Desc.). — Ind. non cl. : Busindi (Hens).

Cyperus mapanioides *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 568 et Étud. fl. Cgo (1896) 290; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 64 et Ill. fl. Cgo (1899) 47, t. 25; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 340; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 19 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 117.

1887 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens, A. 389); le Stanley-Pool (Hens, B. 7, 69). — VI : Madibi (Sap.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Cyperus margaritaceus *Vahl* Enum. pl. II (1806) 307; *Clarke* in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 110 et in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 568 et Étud. fl. Cgo (1896) 290; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 112; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 321; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65; II (1900) 67; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 19.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — III : Matadi (Hens). — IV : route des Caravanes (Ém. Laur.). — V : entre Bolobo et Lukolela (Buett.). — XV : le Kasai (Ém. et M. Laur.); Lusambo (Jos. Duch.).

Cyperus maritimus *Poir.* in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) 240; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 569 et Étud. fl. Cgo (1896) 290; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 113; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 326.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

C. maritimus var. **crassipes** [Vahl] Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 569 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 291; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 114; Clarke in *Dyer* l. c. VIII, 326.

C. crassipes Vahl Enum. pl. II (1806) 299: *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 63, t. 97, fig. 1.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Cyperus nudicaulis Poir. in *Lam.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) 240; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 570; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 112; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 310; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 250; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 17.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Zobe (Dew.). — V : Kisantu; entre Kisantu et Dembo (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

Cyperus ochrocephalus [Boeck.] Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 571 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 291; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 322.

Rhynchospora — *Boeck.* in *Flora*, LXII (1879) 568.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, B. 42).

Cyperus Papyrus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 47, pr. p.; *Parlat.* Mém. Papyrus (1853) 32, t. 2; Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 571 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 291; *De Wild.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 250; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 118; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 374; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 19.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II : Boma (Dew.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Irebu (Ém. et M. Laur.). — XV : la Lulua (Pg.). — Ind. non cl. : le Lomami (Pg.).

Cyperus pratensis Boeck. in *Linnaea*, XXXVIII (1874) 364; Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 572 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 352.

Le type croît en Abyssinie.

— — var. **laxus** Clarke in *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846] et in *Dyer* l. c. VIII, 352; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 218.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1744).

Cyperus radiatus Vahl Enum. pl. II (1806) 369; Clarke in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 573 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 292; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 119; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Contr. fl. Cgo*, II

(1901) 67 et Pl. Gilletianae, I (1900) 56 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 56]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 359.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Léopoldville (Luja, Schl.); chutes de Tamo (Hens); Kwamouth (Hens); Kisantu (Gill.). — XII d : pays des Mangbettu (Schw.). — XV : Lusambo (Jos. Duch.). — Ind. non cl. : Noki (Schlt.).

Cyperus Reinschii *Boeck.* in *Flora*, LIV (1862) 11; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 573; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 113; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 345.

C. hylaeus *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, II (1884) 134 et in *Bolet. Soc. Brot.* V, 208, t. F, fig. A.

1881 ? (P. Pogge). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Mukenge (Pg.). — XVI : le Lualaba (Pg.).

Cyperus rotundus *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 67; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 574 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 292; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 116; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 69; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 364.

C. hexastachyus *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) 28, t. 14, fig. 2.

C. tetrastachyus *Desf.* *Fl. Atlant.* I (1798) 45, t. 8.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — II : Zambi (Dup.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Léopoldville (Schlt.); Kisantu (Gill.).

Cyperus Schweinfurthianus *Boeck.* in *Flora*, LXII (1879) 533; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 576; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 117; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 361.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 585).

Cyperus sphacelatus *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* II (1773) 25; *Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) 183, in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 577 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 293; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 117; *De Wild.* et *Th. Dur.* *Reliq. Dewevr.* (1901) 250; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 346; *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 20.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (Ém. Duch. et Éd. Luja). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.).

Cyperus tenax *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 504; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 578 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 293; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 111; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII,

334; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 219.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 360, pr. p.). — V : Kimuenza; Kisantu; entre Kisantu et Dembo (Gill. 1584, 1739).

Cyperus tuberosus *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) 28, t. 7, fig. 1; *Boeck.* in *Linnaea*. XXXV (1867-1868) 502; *Clarke* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI, 616 et in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 580 et Étud. fl. Cgo (1896) 294; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 68; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 368.

1885 (R. Buettner). — Bas Congo (Buett. 12 pr. p.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 21). — Ind non cl. : Mfoi (Desc.).

Cyperus uncinatus *Poir.* Encycl. méth. Bot. VII (1806) 247; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 502; *Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) 284; XXI (1884) 90 et in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 580 et Étud. fl. Cgo (1896) 294; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 63 [B. S. B. B. XXXVI², 89]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 110; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 328; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 20.

C. cuspidatus *H. B. et K.* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 204; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 496; *Clarke* l. c. XX (1883) 284, XXI (1884) 68.

1885 (R. Buettner). — II a : Bingila (Dup.). — III-IV : la Lufu (Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 68); Bulebu (Ém. et M. Laur.); Léopoldville (Schlt.); Kinshasa (Luja); Kisantu (Gill. 502); Suata (Buett. 12 pr. p.).

Cyperus Zollingeri *Steud.* in *Zoll. Vers. Ind. Archip.* II (1854) 62; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 332; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 581 et Étud. fl. Cgo (1896) 294; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 117; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 360; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 219.

C. tenuiculmis *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 285 et in *Engl. Gazelle* Reise, 15.

1882 (P. Pogge) — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Kimuenza; Kisantu (Hens). — XV : Lusambo (Jos. Duch.); Mukenge (Pg.).

— — form. **gracilis** *Clarke* ex *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 257).

— — var. **parvus** *Clarke* in *Dyer* l. c. VIII (1901) 361.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A, 220).

PYCREUS P. Beauv.

Pycreus albo-marginatus Nees in *Mart.* Fl. Brasil, II', (1842) 9; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 534 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 280; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 107; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 305.

Cyperus — *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 10.

1887 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens. C. 35). — IX : pays des Bangala (Hens, A. 392).

Pycreus flavescens [L.] *Rchb.* Fl. Germ. excurs. (1820-1832) 72; *Th. Nees* Gen. pl. fl. Germ. II, t. 22, fig. 14-16; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 537 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 281; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 290.

Cyperus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 68; *Host* Gramin. Austr. III, 48, t. 72; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 438.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : Kwamouth (Hens, C. 117).

Pycreus globosus [All.] *Rchb.* Fl. Germ. excurs. Add. (1830-1832) 140; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 537.

Cyperus — *All.* Auctuar. fl. Pedem. (1789) 49.

Le type croît dans toutes les régions chaudes et trop. de l'Ancien Monde.

— — var. **nilagiricus** [*Hochst.*] *Clarke* in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1884) 49 et in *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V (1895) 299; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 66; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 299.

Cyperus nilagiricus *Hochst.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 2; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 457.

1890 (Paul Briart). — XVI : plaine de Tenke (Briart).

Pycreus Mundtii Nees in *Linnaea*, IX (1834) 283; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 539 et in *Dyer* Fl. Capens. VII, 157; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 106; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 291; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 219.

Cyperus — *Kunth* Enum. pl. II (1837) 17; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 117.

1882 (P. Pogge). — V : env. de Kisantu (Gill.). — XV : Mukenge (Pg.).

Pycreus oakfortensis *Clarke* ex *De Wild.* *Miss. Laurent* (1905) 20 [nom. tant.].

1893 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

Pycreus polystachyus *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 48, t. 86, fig. 2; *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II¹, 10; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 540 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 281; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 296; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 241.

Cyperus — *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 214; *Boiss.* Fl. Orient. V. 365; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 108.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Banana (Dew.).

Pycreus propinquus [*Kunth*] *Nees* in *Mart.* Fl. Brasil. II¹ (1842) 7; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 541 et *Étud. fl. Cgo* (1891) 281; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 300.

Cyperus *Olfersianus* *Kunth* Enum. pl. II (1837) 10; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 439.

C. pycnocephalus *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 5.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — Congo (But.). — IV : Tamo [Lutete] (Hens, A. 250). — V : Kisantu (Gill.). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 400).

Pycreus Smithianus [*Ridl.*] *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 542 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 282; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI², 88]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1900) 248; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 301.

Cyperus — *Ridl.* in *Britt. Journ. of Bot.* XXII (1884) 15; *Schlecht.* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 270.

1888 (Fr. Hens). — V : Léopoldville (Luja); entre Kwamouth et Kinshasa (Luja); Kinshasa (Dew.). — VIII : Coquilhatville (Schlt.). — IX : pays des Bangala; Lisha (Hens).

Pycreus subtrigonus *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 542 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 282; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 64 et *Ill. fl. Cgo* (1899) 37, t. 19; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 293.

1888 (Fr. Hens). — IV : Tombi [Lutete] (Hens, A. 251). — VIII : Équateurville (Hens, C. 182).

Pycreus tremulus [*Poir.*] *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 542 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 282; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 306.

Cyperus — *Poir.* in *Lam. Encycl. méth. Bot.* VII (1806) 264; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXV (1867-1868) 469.

1888 (Fr. Hens). — VIII : Équateurville (Hens, C. 358).

KYLLINGIA Rottb.

Kyllingia albiceps [Ridl.] Rendle Cat. Welw. Pl. II (1899) 106; Clarke in *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo.* II (1900) 65; Pl. Gilletianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57] et Reliq. Deweyr. (1901) 259; Clarke in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 286.

Cyperus — Ridl. in *Britten Journ. of Bot.* XXII (1881) 16.

K. macrocephala A. Rich. var. angustior Clarke in *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V (1895) 529 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 279.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 14); Kisantu (Gill, 1442). — IX : env. de Bangala (Dew. 860). — XVI : Albertville [Toa] (Hecq; Desc.).

Kyllingia brevifolia Rottb. *Descr. et icon. pl.* (1773) 13, t. 4, fig. 3; *Kunth Enum. pl.* II, 130; *Boeck. in Linnaea*, XXXV (1867-1868) 424; Clarke in *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 527 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 277; Clarke in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 273; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 65; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 117.

1885 (R. Buettner). — II a : marais de Sisia (Dup. 21). — V : le Stanley-Pool (Buett.); entre Sabuka et Léopoldville (M. Laur.).

Kyllingia elatior *Kunth Enum. pl.* II (1837) 135; *Boeck. in Linnaea*, XXXV (1867-1868) 426; Clarke in *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 528 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 278; Clarke in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 275.

K. aromatica Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, II (1884) 146.

1888 (Fr. Hens). — III : Matadi (Hens).

Kyllingia erecta *Schumach. in Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 42; Clarke in *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 528 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 278; *Rendle Cat. Welw. Pl. II*, 105; Clarke in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 274; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 66.

K. aurata Nees in *Linnaea*, X (1835-1836) 139; Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, II (1884) 146.

1870 (G. Schweinfurth). — V : le Stanley-Pool (Dem.); entre Kinshassa et Kwamouth (Luja). — IX : pays des Bangala (Hens). — XII d : près de la Kibali (Schw.).

— — var. **Soyauxii** Clarke in *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 279.

K. Soyauxii *Boeck. in Flora*, LXII (1879) 515.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 305, pr. p.).

Kyllingia Filicula *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 526.

K. pumila *Mchx* var. — *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 439).

Kyllingia melanosperma *Nees* in *Linnaea*, IX (1831) 286 et in *Wight* Contrib. Ind. Bot. (1831) 91; *K. Schum.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 123; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 61, II (1900) 66; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 277.

1892 (Ém. Duchesne). — II a : Bingila (Dup.). — XV : Lusambo (Ém. Duch. 11, 23).

Kyllingia nigritana *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1901) 272; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 219.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill. 1624).

Kyllingia peruviana *Lam.* Encycl. méth. Bot. III (1789) 366; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 530; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 250; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 278; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 117.

K. capitata *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) t. 31.

1895 (A. Dewèvre). — II : Zambi (Dew. 211). — V : entre Kimpoko et Dolo (M. Laur.).

Kyllingia polyphylla *Willd.* ex *Kunth* Enum. pl. II (1837) 134; *K. Schum.* in *Engl. Pl. Ost-Afr.* 123; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 531; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 276.

K. planiceps *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* l. c. V (1895) 531 et Étud. fl. Cgo (1896) 279.

1816 (Chr. Smith). — V : Bas-Congo (Sm.).

Kyllingia pumila *Mchx* Fl. Bor.-Amer. I (1803) 28; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 531 et Étud. fl. Cgo (1896) 279; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 42 [B. S. B. B. XXXVI³, 88]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 103; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 282; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 43.

1870 (G. Schweinfurth). — Bas-Congo (Naum.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lutete (Hens). — V : Coquilhatville (Schlt.); Kimuenza (Gill.). — XII d : Munza (Schw.).

— — var. **rigidula** *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57].

K. rigidula *Steud.* Syn. pl. glum. II (1855) 74; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 64; II (1900) 66.

K. Naumanniana *Boeck.* in *Flora*, LXII (1879) 516.

1895 (P. Dupuis). — II : Boma (Naum.). — II a : Bingila (Dup.). — V : (Gill.).

Kyllingia pungens *Link* Enum. pl. Hort. Berol. I (1821) 326; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 532; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 104; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I. 57]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 277; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 20.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Yaminga; en aval de Mobeka (Ém. et M. Laur.).

Kyllingia sphaerocephala *Boeck.* in *Flora* (1875) 258 et in *Trans. Linn. Soc. XXIX* (1875) 166; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 532; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 66; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 274.

1895 (Gust. Debeerst). — XVI : bords du Tanganika (Deb.),

Kyllingia squamulata *Thonn.* ex *Vahl* Enum. pl. II (1806) 381; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II* (1884) 147; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 532 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 280; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 270.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 305, pr. p. et 292 pr. p.).

Kyllingia teres *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 533 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 280; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 66; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 276; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 88].

1891 (F. Demeuse). — IX : pays des Bangala (Dem. 336). — XIII a : Mbaja [près de Stanleyville, rive gauche] (Ém. Duch.); Romée (Ém. Laur.).

Kyllingia triceps *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) 14, t. 4, fig. 6; *Boeck.* in *Linnaea XXXV* (1867-1868) 413; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 533; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 270; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 280.

K. bulbosa *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 11, t. 8.

1899 (R. Schlechter). — VIII : Équateur (Schlt.).

ELEOCHARIS R. Br.

Eleocharis atropurpurea [*Retz.*] *Kunth* Enum. pl. II (1837) 151; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 596; *Étud. fl. Cgo* (1896) 298 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 407.

Scirpus — *Retz.* Observ. bot. V (1789) 114.

Heleocharis — *Koch* Syn. fl. Germ. ed. 2 (1845) 853; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 458 (var. γ excl.).

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Eleocharis capitata [L.] R. Br. Prodr. fl. N. Holl. (1810) 225; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 597; Étud. fl. Cgo (1896) 299 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 407; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 220.

Scirpus — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 48.

Heleocharis — Boeck. in Vidensk. Meddel. Kjob. (1868-1869) 159 et in Linnaea, XXXVI (1869-1870) 461; Boiss. Fl. Orient. V, 387.

S. caribaeus Rottb. Descr. et icon. pl. (1773) 46, t. 15, fig. 3.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Moanda (Gill.).

Eleocharis Chaetaria Roem. et Schull. Syst. veget. II (1817) 154; Kunth Enum. pl. II, 140; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 597 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 408; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae II (1900) 106 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846].

Heleocharis — Boeck. in Linnaea, XXXVI (1869-1870) 428.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Eleocharis fistulosa Schull. Mant. pl. II (1824) 89; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 598 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 406; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 106; [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 846]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 118.

Heleocharis — Boeck. in Linnaea, XXXVI (1869-1870) 472.

1900 (J. Gillet). — V : Dolo (M. Laur.); Kisantu (Gill.).

BULBOSTYLIS L.

Bulbostylis abortiva [Steud.] Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 619 et Étud. fl. Cgo (1896) 304; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 124; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 441.

Fimbristylis — Steud. Syn. pl. glum. II (1855) 111; K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr. (1895) 125.

1888 (Fr. Hens). — V : rochers de Tamo [Stanley-Pool] (Hens, B. 9).

Bulbostylis audongensis [Ridl.] Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 443 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 443.

Fimbristylis — Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 153.

1883 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, B. 75).

Bulbostylis barbata [Rottb.] Kunth Enum. pl. II (1837) 208 [conf. 205]; Clarke in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1894) 611 et Étud. fl. Cgo (1896) 304; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 70 et Reliq. Dewevr. (1901) 250; Clarke in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 431.

Scirpus barbatus *Rottb.* *Descr. et icon. pl.* (1773) 52, t. 17, fig. 4; *K. Schum.* in *Schlecht. Westafr. Kautsch.-Expéd.* (1900) 270.

Fimbristylis — *Benth.* *Fl. Austral.* VII (1878) 321; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 125.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Banana (Dew.). — II : Boma (Dew.); Zambi (Dup.). — IV : Lutete (Hens.). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill.). — XVI : Albertville [Toa] (Hecq).

Bulbostylis capillaris [*L.*] *Nees* in *Mart. Fl. Brasil.* II¹ (1842) 81, in obs.; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V, 612 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 305; *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89]; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 57 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 57].

Scirpus — *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) 49, pr. p.

Isolepis — *Rocm. et Schult. Syst. veget.* II (1817) 118; *Kunth Enum. pl.* II, 211 (conf. etiam 205).

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill. 820),

— — var. *trifida* [*Kunth*] *Clarke* in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* VI (1894) 652; *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V (1895) 612 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 305; *Rendle Cat. Welw. Pl.* II, 125; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 438; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 58 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 58]; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 21.

Isolepis trifida *Kunth Enum. pl.* II (1837) 213 (conf. etiam 205).

1888 (Fr. Hens). — IV : Gombi-Lutete (Hens, A, 298). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens, C. 154). — Ind. non cl. : poste de bois n° 6 (Ém. et M. Laur.).

Bulbostylis cardiocarpa [*Ridl.*] *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V (1895) 612 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 306; *Rendle Cat. Welw. Pl.* II, 124; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 434; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 58; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 21 et *Étud. fl. Bas. et Moy.-Cgo*, II (1907) 117.

Fimbristylis — *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, II (1884) 154.

1885 (C. Callewaert). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Callew.); Kimuenza; Kisantu (Gill. 622, 791). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.).

Bulbostylis filamentosa [*Vahl*] *Kunth Enum. pl.* II (1837) 210 [conf. 205]; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* *Consp. fl. Afr.* V (1895) 613 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 306; *Rendle Cat. Welw. Pl.* II, 124; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 433; *Th. Dur. et De Wild.* *Mat. fl. Cgo*, I (1897) 43 [B. S. B. B. XXXVI², 89]; *De Wild. Étud. fl. Bas. et Moy.-Cgo*, I (1904) 202.

Scirpus — *Vahl Enum. pl.* II (1806) 262.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lutete (Hens.). — V : Kimuenza (Gill.); Lemfu (But.). — XII d : riv. Welle [Uele] (Schw.).

Bulbostylis laniceps *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 614 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 306; *De Wild. et Th. Dur.* Ill. fl. Cgo (1898) 21, t. 44; *Pl. Gilletianae*, II (1901) 407 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 847] et *Reliq. Dewevr.* (1901) 251; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 433; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 220 et *Miss. Laurent* (1905) 21.

Fimbristylis — *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 125, in obs.

1888 (Fr. Hens). — II a : route de l'Ouali à Shinganga (Dew. 288). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 347); le Chenal (Ém. et M. Laur.); rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja); Kimuenza (Gill. 1780) : entre Dembo et Kisantu; Kisantu (Gill. 159, 165); Lukolela (Hens, C. 163). — VII : bords de la Fini; Inongo (Ém. et M. Laur.).

Bulbostylis lanifera *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 125; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 22.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XV : Butala; Munungu (Ém. et M. Laur.).

Bulbostylis puberula [*Poir.*] *Kunth* Enum. pl. II (1837) 213 [conf. 205]; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 615; *Étud. fl. Cgo* (1896) 307 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 307; *De Wild. Miss. Laurent* (1905) 22.

Scirpus — *Poir. Encycl. méth. Bot.* VI (1804) 767; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 767.

Isolepis — *Steud. Syn. pl. glum.* II (1855) 103.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lutete (Hens). — IX : Yaminga (Ém. et M. Laur.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.).

Bulbostylis pusilla [*Hochst.*] *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 615; *De Wild. et Th. Dur.* *Pl. Gilletianae*, I (1900) 58 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 58]; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 440.

Fimbristylis — *Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II (1851) 506.

Scirpus gracillimus *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 761 [conf. XXXVIII, 408].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Bulbostylis trichobasis [*Bak.*] *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, (1895) 616 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII, 445; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1906) 220.

Scirpus — *Bak.* in *Journ. Linn. Soc.* XX (1883) 298.

1890 (F. Demeuse). — V : ravin du Diable (Dem. 30).

— — var. **leptocaulis** *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae*, I (1900) 58 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 58].

Bulbostylis trichobasis *Clarke* var. *uniseriata* *Clarke* in *Th. Dur. et De Wild.*
Mat. fl. Cgo, VII (1900) 14 [B. S. B. B. XXXIX², 37].

1899 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 179, 333).

FIMBRISTYLIS Vahl.

Fimbristylis Cioniana *P. Savi* in *Mem. Valdarnese*, III (1842) 98,
 cum icone; *Parlat. Fl. Ital.* II, 74; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz*
Consp. fl. Afr. V, 602, *Étud. fl. Cgo* (1896) 299 et in *Dyer Fl. trop.*
Afr. VIII, 420.

F. hispidula *Kunth* var. — *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVII (1871) 28.

F. Lioniana *Steud.* *Syn. pl. glum.* II (1855) 112.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu; Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem.;
 Luja); Léopoldville (Luja). — XV : Lusambo (Jos. Duch.).

Fimbristylis complanata [*Retz.*] *Link* *Hort. Berol.* I (1827) 292;
Kunth Enum. pl. II, 228; *A. Rich. Tent. fl. Abyss.* II, 505;
K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 124; *Clarke* in *Th. Dur. et*
Schinz Consp. fl. Afr. V, 602 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 300; *Rendle*
Cat. Welw. Pl. II, 123; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 422.

Scirpus — *Retz. Observ. bot.* V (1789) 14.

Trichelostylis — *Nees* in *Linnaea*, IX (1834) 290 et X (1835-1836) 146.

F. autumnalis *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVII (1871) 38.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.); env. de Lemfu (But.).

Fimbristylis dichotoma [*L.*] *Vahl Enum. pl.* II (1806) 287; *Rchb.*
Icon. fl. Germ. XIII, 44, t. 315, fig. 733; *Clarke* in *Th. Dur. et*
Schinz Consp. fl. Afr. V, 602, *Étud. fl. Cgo* (1896) 300 et in *Dyer*
Fl. trop. Afr. VIII, 413.

Scirpus — *L. Sp. pl. ed.* 1 (1753) 40; *Rottb. Descr. et icon. pl.* 57, t. 13, fig. 1.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.); entre Léopoldville et Mom-
 basi; env. de Kimuenza (Gill.).

Fimbristylis diphylla [*Retz.*] *Vahl Enum. pl.* II (1806) 289;
K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr. 124; *Rendle Cat. Welw. pl.* II,
 122; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 603; *Étud. fl.*
Cgo, I (1896) 301 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 415.

Scirpus — *Retz. Observ. bot.* VI (1791) 15.

1816 (Chr. Smith). — II : Boma (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lukungu
 (Hens). — V : le Stanley-Pool; Léopoldville; entre Kinshasa et Kwamouth (Luja);
 Kisantu (Gill.). — VIII : Équateurville (Hens; Pyn.). — XIII d : Nyangwe (Dew.).
 — XV : Lusambo (Jos. Duch.). — XVI : le Katanga (Verd.).

Fimbristylis dipsacea [*Rottb.*] *Benth. in Benth. et Hook. f. Gen.*
pl. III (1883) 1049; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.*
 V, 604, *Étud. fl. Cgo* (1896) 301 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* VIII, 413.

Scirpus dipsaceus *Rottb.* Descr. et icon. pl. (1773) 56, t. 12, fig. 1; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVI (1869-1870) 735.

Echinolytrum — *Desv.* Journ. de Bot. I (1808) 21, t. 1.

1888 (Fr. Hens). — V : env. de Léopoldville (Gill.); Kinshassa (Luja); Kwamouth (Hens).

Fimbristylis ferruginea [*L.*] *Vahl* Enum. pl. II (1806) 291; *Delile* Fl. d'Égypte, 10, t. 6, fig. 3; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 124; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 606, Étud. fl. Cgo (1896) 302 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 417; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 122.

Scirpus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 50.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — I : Banana (Dup.); Moanda (Gill.). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.).

Fimbristylis Hensii *Clarke* in *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 69 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 419.

F. exilis *Roem. et Schult.* var. *levinux* *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 605 et Étud. fl. Cgo (1896) 302.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — IV : Batanga [err. cal. Bolongo] [distr. des Cataractes] (Luja, 134); Lutete (Hens, 62, 67, 74, 239). — V : le Stanley-Pool (Hens).

Fimbristylis hispida [*Vahl*] *Kunth* Enum. pl. II (1837) 227; *Boeck.* in *Peters* Reise n. Mossamb. II, 545 et in *Linnaea*, XXXVII (1871) 27; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. 2*, II (1884) 152.

Scirpus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) 276.

Fimbristylis exilis *Roem. et Schult.* Syst. veget. II (1817) 98; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 604, Étud. fl. Cgo (1896) 301 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 412; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 123.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — V : le Stanley-Pool (Buett.); Kinshasa (Luja); Kisantu (Gill.). — VII : Inongo (Ém. Laur.). — XV : 1lots du Sankuru (Ém. Laur.); env. de Lusambo. — Noms vern. : **Bisloka**; **Tambwe** (Coll.?).

Fimbristylis monostachya [*L.*] *Hassk.* Pl. Javan. rarior. (1848) 61; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 607 et Étud. fl. Cgo (1896) 302; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 122; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 424.

Cyperus — *L.* Mant. pl. II (1771) 180; *Rottb.* Descr. et icon. pl. 18, t. 13, fig. 3. *Abildgaardia monostachya* *Vahl* Enum. pl. II (1806) 296; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 169, t. 109, fig. a.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila; Kibinga (Dup.).

Fimbristylis obtusifolia [*Lam.*] *Kunth* Enum. pl. II (1837) 240; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 608 et Étud. fl.

Cgo (1896) 303; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 123; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 423.

Scirpus obtusifolius Lam. Ill. genr. Encycl. I (1791) 141.

Isolepis — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 38, t. 81, fig. 1.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.).

Fimbristylis quinquangularis [*Vahl*] *Kunth* Enum. pl. II (1837) 229; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVII (1871) 42; *Clarke* in *Hook. f.* Fl. Brit. Ind. VI, 644, in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 609 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 421; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gillettianae, II (1901) 107 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 847].

Scirpus — *Vahl* Enum. pl. II (1806) 279.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.).

Fimbristylis scabrida *Schumach.* in *Schumach.* et *Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 32; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 609, Étud. fl. Cgo (1896) 303 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 422.

1870 (G. Schweinfurth). — V : env. de Léopoldville (Gill.); bassin de la Sele (But.); Kinshasa (Luja); Kisantu (Gill.). — XII d : riv. Welle [Uele] (Schw. 3517).

Fimbristylis splendida *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 527.

F. complanata Retz. var. — *Clarke* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gillettianae, I (1900) 58 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 58].

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill. 818).

Fimbristylis squarrosa *Vahl* Enum. pl. II (1806) 289; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 609, Étud. fl. Cgo, (1896) 305 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 413; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 122.

Scirpus — *Poir.* [non *L.*] Encycl. méth. Bot. V [Suppl.] (1817) 100.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Kinshasa (Luja); Kisantu (Gill.).

SCIRPUS L.

Scirpus Buettnerianus *Boeck.* Cyper. nov. I (1888) 20 et in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* XXXI, 71; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 618 et Étud. fl. Cgo (1896) 307.

1885 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett.).

Obs. — *Clarke* [in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 446] range cette plante, comme imparfaitement connue, à la suite du genre *Bulbostylis*.

Scirpus fluitans L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 71; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 125; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 621; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 70; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 419.

1891 (G. Descamps). — I : vallée du Lueshi (Desc.). — V : Kisantu (Gill.). — XI : env. de Mogandjo (M. Laur.).

FUIRENA Rottb.

Fuirena chlorocarpa Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 159; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 645, Étud. fl. Cgo, I (1896) 307 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 465.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, 373).

Fuirena umbellata Rottb. Deser. et icon. pl. (1773) 19 (i. e. t. 18 altera) fig. 3; *Boeck.* in *Linnaea*, XXXVII (1871) 110 : *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 126; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 648, Étud. fl. Cgo (1896) 308 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 467.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Dolo (M. Laur.); Tombi-Lutete (Hens); Kisantu (Gill.); rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja). — VI : Dima (Sap.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.).

LIPOCARPHA R. Br.

Lipocarpa pulcherrima Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 162; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 650; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 70; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 129; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 473.

Hypaelyptum — *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 127.

1889 (Éd. Luja). — V : prairies marécag. de la rive N. du Kasai [distr. du Stanley-Pool] (Luja).

Lipocarpa senegalensis [Lam.] *Th. et Hél. Dur.*

Scirpus — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) 140.

L. argentea R. Br. in *Tuckey* Congo Exped. Append. (1818) 459; *Ridl.* in Trans. Linn. Soc. Ser. 2, II (1884) 163; *Clarke* in *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 649 et Étud. fl. Cgo (1896) 308; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI¹, 90]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 129; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 470; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 116.

Hypaelyptum — *Vahl* Enum. pl. II (1806) 283.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.). — II a : Bingila (Dup.). — IV : riv. Tombi-Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.).

Lipocarpa triceps [Lam.] Nees in *Wight* Contr. Ind. Bot. (1834) 92; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. [VIII, 470; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 17.

Kyllingia — Lam. Ill. genr. Encycl. I (1791) 148, t. 38, fig. 2.

L. sphacelata Kunth Enum. pl. II (1837) 267; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 650; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 129; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 70.

1899 (Éd. Luja). — V : le Stanley-Pool (Luja). — XV : en aval d'Ifuta (Ém. et M. Laur.); le Kasai (Luja).

ASCOLEPIS Nees.

Ascolepis pinguis *Clarke* in *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 69.

1894 (G. Descamps). — XVI : Albertville [Toa]; Kitope (Desc.).

Ascolepis protea *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 75; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 130; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 474; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1906) 217.

1902 (J. Gillet). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill. 2593); entre Kisantu et Popokabaka (But. in Gill. 2303).

HYPOLYTRUM Rich.

Hypolytrum africanum *Nees* in *Linnaea*, IX (1834) 288; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 127; *Clarke* in *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 666, Étud. fl. Cgo (1896) 309 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 488.

1816 (Chr. Smith). — Bas-Congo (Sm.; Dem. 412). — V : Kisantu (Gill. 1075). — IX : en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.).

Hypolytrum congense *Clarke* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, IV (1899) 38 [B. S. B. B. XXXVIII², 115], in *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 251 et in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII (1902) 487.

1896 (A. Dewèvre). — VIII : env. de Bokakata (Dem. 106 b, 746); près de la Kasuku (Dem. 1061 b).

Hypolytrum nemorum *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II (1807) 13, t. 67; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 666; *Th. Dur.* et *De Wild.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65 et Reliq. Dewevr. (1901) 252; *Clarke* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VIII, 487; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 219; II (1907) 116 et Miss. Laurent (1905) 17.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.). — IV : bord de la Pioka (Ém. Laur.). — V : le Stanley-Pool (Luja); Léopoldville (Schlt.); Sabuka (Ém. Duch.; Luja); Kisantu (Gill.); Lemfu (But.); rég. de Lumene (Hendr.). — VI : vallée de la Djuma (Gill.). — XV : Olombo; Batempa (Ém. et M. Laur.).

GRAMINACEAE (1)

IMPERATA Cyrillo

Imperata cylindrica [L.] P. Beauv. Agrostogr. (1812) 5, t. 5, fig. 1; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 693 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 311; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 59 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 59].

Lagurus — L. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 878.

I. arundinacea *Cyrillo* Pl. rar. Neap. fasc. II (1792) 27, t. 11; *Hack.* in DC. Monog. Phan. VI, 92; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 135; *De Wild.* Miss. Laur. (1906) 198.

1899 (J. Gillet). — II a : Kalamu (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu. — Nom vern. : Nianga (Gill.). — VI : route de Kikwit à Boala (Lescr.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.). — XIV : Kalembe-Lemba. — Nom vern. : Niazi (Coll. ?).

— — var. **Thunbergii** [Retz.] *Hack.* in DC. Monog. Phan. VI (1889) 94; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 693 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 312; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 253; *De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 1.

Saccharum — Retz. Obs. bot. V (1789) 17.

Imperata — P. Beauv. in Roem. et Schult. Syst. veget. II (1817) 289.

I. arundinacea *Cyrillo* var. — *Rendle* Cat. Welw. II (1899) 135.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — II a : poste de la Lubusi (Dew.). — IV : Lutete (Hens). — XIII : Bena-Mulengere (Dew.). — XVI : brousse du Katanga (Verd.). — Nom vern. : Kalembe-Kaluma [Tanganika] (Dew.).

ROTTBOELLIA L. f.

Rottboellia exaltata L. f. Suppl. pl. (1781) 114; *K. Schum.* in Engl. Pfl. Ost-Afr. 96; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 139; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 59 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 59]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 198 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 11.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.); Mushie (Ém. Laur.). — VIII : Lulanga (Ém. et M. Laur.). — X : Mokoangi (Boucken.). — XIV : Ruzizi-Kivu (Coll. ?).

(1) Le **Zea Mays** L. est cultivé partout au Congo belge.

MANISURIS L.

Manisuris granularis [L.] L. f. Nov. Gram. gen. (1779) 37, fig. 4-7; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 700 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 312; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 141; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 199 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 11.

Cenchrus — L. Mant. pl. II (1771) 575.

M. polystachya P. Beauv. Fl. d'Oware, I (1804) 24, t. 14.

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Dolo (M. Laur.); Kisantu (Gill.).

TRACHYPOGON Nees

Trachypogon polymorphus Hack. in *Mart.* Fl. Brasil. II³ (1883) 263 et in *DC.* Monog. Phan. VI, 323; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 701.

Espèce collective habitant presque toute l'Amérique bor. et austr. trop. et subtrop.

— — var. **Montufari** Hack. l. c. VI (1889) 325.

— — — subvar. **capensis** Hack. l. c. VI (1889) 326; *Th. Dur. et Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 314.

Stipa capensis Thunb. Prodr. pl. Cap. (1794), 19 et Fl. Capens. ed. 1, I, 401; [ed. Schult.] 106.

Trachypogon — *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb. Sér. 6, II (1833) 257; *Nees* Fl. Afr. austr. 100.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 222).

URELYTRUM Hack.

Urelytrum giganteum Pilger in Engl. Jahrb. XXXIV (1904) 125.

1876 (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.). — XVI : Musumba (Pg. 471).

VOSSIA Wall.

Vossia procera Wall. et Griff. in Journ. Asiat. Soc. Beng. V (1836) 573, t. 23; *Oliv. ex Grant.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) t. 116, fig. 4; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 270; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 701; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71 et *Reliq. Dewevr.* (1901) 252; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1904) 94.

1892 (G. Descamps). — V : env. de Bolobo (Dew.); Kimuenza (Gill.). — XV : le Bas-Kasai (Desc.).

ELIONURUS Humb. et Bonpl.

Elionurus argenteus Nees Fl. Afr. austr. (1841) 95; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 330; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 702; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 97; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 199 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 10.

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (Gill. 3671); env. de Lemfu (But. in Gill. 3473), — XV : Bukila; Butala (Em. et M. Laur.).

Elionurus Hensii *K. Schum.* in *Engl.* Jahrb. XXIV (1897) 326.

E. argenteus *Th. Dur.* et *Schinz* [non *Nees*] *Étud. fl. Cgo* (1896) 313.

1888 (Fr. Hens). — IV : Kiengi-Lutete (Hens, 285).

RHYTACHNE Desv.

Rhytachne congoensis *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI (1889) 277; *Th. Dur.* et *De Wild.* Consp. fl. Afr. V, 700 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 313; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71 et *Miss. Laurent* (1901) 198.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : entre Kinshasa et Kwamouth (Luja). — VII : la Fini (Em. et M. Laur.).

— — var. *incompleta* *Hack.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 114).

— — var. *polystachya* *Hack.* ex *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 313; *De Wild.* et *Th. Dur.* l. c. I (1899) 65.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens, A. 323).

— — form. *submutica* *Hack.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* l. c. I (1899) 65.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 158).

Rhytachne gabonensis [*Steud.*] *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI (1889) 276; *Th. Dur.* et *Schinz* *Étud. fl. Cgo* (1896) 313; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 11; II (1907) 10.

Jardinea — *Steud.* in *Flora* (1850) 229 et *Syn. pl. glum.* I, 360, pr. p.

1888 (Fr. Hens). — IV : Tombi-Lutete (Hens, A. 310). — V : env. de Kisantu (Gill. 3508); Lemfu (But. in Gill. 2256).

ANDROPOGON L.

Andropogon Afzelianus Rendle in *Britten Journ. of Bot.* XXXI (1893) 357; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 75.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, B. 76).

Andropogon appendiculatus Nees *Fl. Afr. austr.* (1841) 105; *Hack. in DC. Monog. Phan.* VII, 436; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 706 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 314.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens).

OBS. — La plante du Congo appartient à la variété *genuinus* Hack.

Andropogon apricus Trin. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér.* 6, IV (1836) 83 (sens. ampl.); *Hack. in DC. Monog. Phan.* VI, 356; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 706 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 314.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens).

OBS. — La plante du Congo appartient à la var. *africanus* Hack. l. c. 357.

Andropogon bipennatus Hack. in *Flora* (1885) 142 et in *DC. Monog. Phan.* VI (1889) 537; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 10.

1904 (Aug. Van Houtte). — V : Kisantu (Van Houtte in Gill. 3738).

Andropogon bracteatus Willd. *Sp. pl.* IV (1805) 914; *Hack. in Mart. Fl. Brasil.* II³, 279, t. 64 et in *DC. Monog. Phan.* VI, 643; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 315.

Cymbopogon Humboldtii Spreng. *Pugill. pl. nov.* II (1815) 15; *Rendle Cat. Welw. Pl.* II, 159.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu (Hens).

Andropogon Brazzae Franch. in *B. Soc. hist. nat. Autun.* VIII (1895) 326.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 319).

Andropogon brevifolius Sw. *Prodr. veget. Ind. occ.* (1788) 26 et *Fl. Ind. occ.* I, 209; *Kunth. Révis. Gramin.* II, t. 196; *Hack. in DC. Monog. Phan.* VI, 363; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 707 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 415; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gille-tianae*, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60].

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (Gill). — IX : Lisha (Hens).

Andropogon contortus L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) 1045; *Hack. in DC. Monog. Phan.* VI, 585; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr.* V, 709;

De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 54; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 9.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Schlt.). — VIII : Équateur (Pyn.).

Obs. — La plante de Boma appartient à la var. *genuinus* subvar. *typicus* Hack. l. c.

***Andropogon diplandrus* Hack.** in Flora (1885) 123 et in *DC.* Monog. Phan. VI, 627; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 710 et Étud. fl. Cgo (1896) 315; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 75.

1891 (Fr. Demeuse). — Congo (Dem.). — V : Kisantu (Gill.); rive N. du Kasai (Luja). — IX : Yaminga (Dem.).

***Andropogon distachyus* L.** Sp. pl. ed. 1 (1753) 1040; *Desf.* Fl. Atlant. II, 377; *Batt. et Trab.* Fl. de l'Algér. [Monoc.] 33; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 710; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI¹, 90]; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 75 et Reliq. Dewevr. (1901) 254.

1895 (P. Dupuis). — II : Boma (Dew.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.).

***Andropogon familiaris* Steud.** Syn. pl. glum. I (1855) 385; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 636; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 711 et Étud. fl. Cgo (1896) 316; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 3.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — IX : Molanga près Dobo (Thonn.).

***Andropogon finitimus* Hochst.** ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 465; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 637; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 712 et Étud. fl. Cgo (1896) 316.

Cymbopogon — *Rendle* Cat. Welw. Pl. II (1899) 157.

1891 (Fr. Demeuse). — Congo (Dem.).

***Andropogon intermedius* R. Br.** Prodr. fl. N. Holl. (1810) 202; *Benth.* Fl. Austral. VII, 531; *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 485; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 715 et Étud. fl. Cgo (1896) 316.

1884 (R. Buettner). — III : Tondoa (Buett.).

Obs. — La plante de Tondoa appartient à la var. *punctatus* subvar. *glaber* Hack. l. c. 487 (= A. *glaber* Roxb. Hort. Bengal. [1814] 7).

***Andropogon Lecomtei* Franch.** in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 329.

1888 (F. Hens). — IV : Lukungu (Hens, 186).

Andropogon Schimperi Hochst. ex A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 466; Hack. in DC. Monog. Phan. VI, 623; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 721; De Wild. Miss. Laurent (1906) 198 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 10.

Cymbopogon — Rendle Cat. Welw. Pl. II (1899) 155.

1893 (Ém. Laurent). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — V : Chenal entre Léopoldville et Kwamouth (Ém. Laur.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — VI : Lusubi (Lescr.). — IX : Bumba; Yaminga (Ém. Laur.).

Andropogon Schoenanthus L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1046 (sens. ampl.); Hack. in DC. Monog. Phan. VI, 609; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 722 et Étud. fl. Cgo (1896) 317.

Cymbopogon — Rendle Cat. Welw. Pl. II (1899) 154.

Le type, non indiqué au Congo, croît dans l'Asie, l'Afrique et l'Australie trop.

— — subsp. **densiflorus** [Steud.] Hack. l. c. VI (1889) 611; Th. Dur. et Schinz l. c.; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 76 et Reliq. Dewevr. (1901) 254; De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 9.

A. densiflorus Steud. Syn. pl. glum. I (1855) 386.

Cymbopogon Schoenanthus Rendle var. — Rendle l. c. II (1899) 154.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Cabra). — II : Malela (Ém. Laur.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Dem. ; Dew.); Kisantu (Gill.). — XIII d : Stanleyville (Pyn.).

Andropogon Sorghum Brot. Fl. Lusit. I (1804) 86 (sens. ampl.); A. Rich. Tent. fl. Abyss. II, 470; Koern. et Wern. Handb. d. Getreideb. I, 294; Hack. in DC. Monog. Phan. VI, 500; Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo (1896) 318; De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1906) 531-536.

OBS. — Espèce présentant une multitude de sous-espèces et de variétés, largement cultivée dans tous les pays chauds.

— — var. **effusus** Hack. l. c. VI (1889) 503; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 724 et Étud. fl. Cgo (1896) 318.

Sorghum halepense Nees Fl. Afr. austr. (1841) 88.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — Cette variété est aussi indiquée dans le bassin du Tanganika [XVI] (Boehm.).

— — var. **halepensis** [L.] Hack. l. c. VI (1889) 502; Th. Dur. et Schinz l. c. V, 724; De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60] et Reliq. Dewevr. (1901) 254; De

Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 1 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 94.

Holcus halepensis L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 1047.

Andropogon — *Brot.* Fl. Lusit. I (1804) 109 (sens. strict.).

Sorghum — *Pers.* Syn. pl. I (1805) 101.

1888 (Fr. Hens). — V : Kisantu (Gill.); Bolobo (Dew.). — VII : Kutu (Coll. ?). — IX : pays des Bangala (Hens). — XVI : Lukafu (Verd.).

Andropogon squarrosus L. f. Suppl. pl. (1781) 433 (sens. ampl.); *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI, 542; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 726.

Type largement répandu dans la région tropicale.

— — var. ***genuinus*** *Hack.* l. c. VI (1889) 544.

A. squarrosus L. f. l. c. (sens. str.).

A. muricatus *Retz.* Obs. bot. II (1781) 43.

Anatherum — *P. Beauv.* Essai Agrost. (1812) 150, t. 22, fig. 10; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 153.

1898 (J. Gillet et Eug. Wilwerth). — II : Boma (Gill.; Wilw.). — V : entre Léopoldville et Mombasi (Gill.).

— — var. ***nigritanus*** [*Benth.*] *Hack.* l. c. VI (1889) 544; *Th. Dur.* et *Schinz* l. c. V, 727 et Étud. fl. Cgo (1896) 319; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 255.

Andropogon nigritanus *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 573.

1888 (Fr. Hens). — V : Lukolela (Hens); Bolobo (Dew.).

THEMEDA Forsk.

Themeda ciliata [*L. f.*] *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI (1889) 664; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 730; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 255.

Anthistiria — *L. f.* Suppl. pl. (1781) 113; *P. Beauv.* Agrost. 134, t. 23, fig. 7.

A. barbata *Desf.* in *Journ. Phys.* XL, 294, t. 2.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Dew.).

Themeda Forskalii *Hack.* in *DC.* Monog. Phan. VI (1889) 659; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 730.

Le type est largement disséminé dans la rég. trop. de l'Ancien Monde et dans l'Afrique austr.

— — var. ***glauca*** *Hack.* l. c. VI (1889) 663; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 16.

1904 (Coll. ?). — XIV : Ruzizi-Kivu. — Nom vern. : **Mangue** (Coll. ?). — XVI Lukafu. — Nom vern. : **Kapumpu** (Coll. ?).

ANTHEPHORA Schreb.

Antheophora cristata [Doell.] Hack. ex De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60] et Reliq. Dewevr. (1901) 255; De Wild. Miss. Laurent (1906) 199 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 10.

A. elegans Schreb. var. — Doell in Mart. Fl. Brasil. II² (1877) 314; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 193.

A. elegans Schreb. var. africana Pilger in Engl. Jahrb. XXX (1901) 119.

A. elegans Th. Dur. et Schinz [non Schreb.] Étud. fl. Cgo (1896) 319.

1887 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Boma (Hens). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Kisantu; Kimuenza (Gill.).

Antheophora elegans Schreb. Beschreib. d. Gräser, III (1810) t. 44; Doell in Mart. Fl. Brasil. II², 313; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 732; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 76.

1890 (Paul Briart). — XVI : Zilo (Briart).

Antheophora elongata De Wild. Étud. fl. Kat. (1902) 2.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd. 413).

PEROTIS Ait.

Perotis spicata [L.] Th. et Hél. Dur.

Saccharum — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 54.

P. latifolia Ait. Hort. Kew. ed. 1, I (1789) 85; Kunth Révis. Gramin. I, 357, t. 92; Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 176; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 734 et Étud. fl. Cgo (1896) 319; Rendle Cat. Welw. Pl. II, 210; De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 76; De Wild. Miss. Laurent (1906) 199.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — Bas-Congo (Cabra). — V : Dolo (M. Laur.); Kimuenza (Gill.).

THYSANOLAENA Nees.

Thysanolaena acarifera Nees in Nov. Act. Acad. nat. Cur. XVII, Suppl. I (1843) 180; Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V, 738; Franch. in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 338.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 258).

PASPALUM L.

Paspalum conjugatum Berg. in Act. Helv. VII (1772) 129, t. 8; Trin. Gram. icon. et descr. II, t. 102; Th. Dur. et Schinz Consp.

fl. Afr. V, 736 et Étud. fl. Cgo (1896) 320; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 71 et Reliq. Dewevr. (1901) 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 199; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 514 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 10.

P. ciliatum Lam. Illustr. genr. Encycl. I (1791) 175; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 56, t. 92, fig. 2.

1888 (Fr. Hens). — II : Sisia (Dup.). — II a : Shinganga (Dew.). — IV : Kiengi-Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Eïolo (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — X : Mokoange (Boucken.). — XIII a : Romée (Van Goits.). — XV : le Kasai (Lescr.). — Noms vern. : **Nla-Ngombe** [Romée]; **Dili** [Songo]; **Nzamingo** [Bwaka] (Van Goitsenh.).

***Paspalum longiflorum* Retz.** [non *Trin.*] Observ. bot. IV (1786) 15; *Bak.* Fl. of Maurit. I, 431; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 737 et Étud. fl. Cgo (1896) 320; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI², 90].

1888 (Fr. Hens). — Congo (Hens, 209, 273). — II : Sisia (Dup.).

***Paspalum scrobiculatum* L.** Mant. pl. I (1767) 29; *Trin.* Gram. icon. et descr. II, t. 143; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 100; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 738 et Étud. fl. Cgo (1896) 320; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI², 90]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 162; *De Wild.* Not. pi. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 518-519; Miss. Laurent (1896) 205 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 10.

P. Kora Willd. Sp. pl. I (1798) 332; *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, t. 85.

1885 (R. Buettner). — IV : Banza-Manteka (Hens). — V : Chenal Leo-Kwam (Ém. et M. Laur.); Suata (Buett.); Kinshasa (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Lulanga (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dem.). — XVI : Haut-Marungu (Deb.). — Ind. non cl. : env. de Sende (Coll. ?).

ISACHNE R. Br.

***Isachne albens* Trin.** Gram. icon. et descr. (1823) 8, t. 83; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 100; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 200.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Dolo (M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Yaminga (Ém. et M. Laur.).

***Isachne australis* R. Br.** Prodr. fl. N. Holl. (1810) 196; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 200.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : Kisantu (Ém. et M. Laur.).

***Isachne Buettneri* Hack.** in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. XXXI (1890) 69; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 739 et Étud. fl. Cgo (1896) 321.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

PANICUM L.

Panicum arborescens L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 59; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 176.

P. ovalifolium Poir. Encycl. méth. Bot. XII (1816) 279 : *P. Beauv.* Fl. d'Oware, II, 79, t. 110, fig. 1; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 758 et Étud. fl. Cgo (1896) 323; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 79 et Reliq. Dewevr. (1901) 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201.

1885 (R. Buettner). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Shinganga (Dew.). — IV : Tombe [Lutete] (Hens); Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Dolo (Schlt.); Suata (Buett.); Kisantu (Gill.). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Elulungu** (M. Laur.). — XV : le Kasai (Luja).

Panicum argyrotrichum Anderss. in *Peters* Reise n. Mossamb. II (1864) 548; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 741 et Étud. fl. Cgo (1896) 321; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu; Lutete (Hens).

Panicum brizanthum Hochst. in *Flora* (1841) I, Intell. 19; *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II, 363; *Oliv.* in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1885) 170, t. 112a, fig. 1 (var. *latifolium* Oliv.); *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 742 et Étud. fl. Cgo (1896) 321; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 168; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 11.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — XIV : Ruzizi-Kivu. — Nom vern. : **Mutechia** (Coll. ?).

— — var. **polystachyum** *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 3, Pl. Gilletianae, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60] et Contr. fl. Cgo, I (1900) 72; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1903) 171 et Miss. Laurent (1906) 200.

1896 (Fr. Thonner). — V : Kisantu (Gill.). — IX : Yabasumba (Thonn. 78); Bumba (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukafu (Verd. 359).

Panicum colonum L. Syst. veget. ed. 10 (1759) 870; *Trin.* Gram. descr. et icon II, t. 160; *Steud.* Syn. pl. glum I, 46; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 742; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 73; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72.

1891 (G. Descamps). — XV : Lusambo (Desc.).

Panicum coloratum L. Mant. pl. I (1767) 30; *Jacq.* Icon. pl. rar. I, t. 12; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 73; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 743; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI², 90]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 178; *De Wild.* et

Th. Dur. Reliq. Dewevr. (1901) 256; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 94 et Miss. Laurent (1905) 201.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Dew.). — IV : Lutete (Hens). — V : entre Léopoldville et Sabuka (M. Laur.); Kisantu (Gill.). — XV : îlot du Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Panicum Crus-galli *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 56; *Nees* Fl. Afr. austr. 58; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 47; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 744 et Étud. fl. Cgo (1896) 321; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 173; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 200 et Étud. fl. Bas- et Moy.- Cgo, II (1907) 11.

Echinochloa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 53.

Oplismenus — *Dmrt.* Agrostogr. Belg. (1823) 128.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo (Dem.). — I : Banana (Ém. Laur.). — II : Sisia (Dup.). — II a : Temvo (Ém. Laur.). — V : Dolo. — Nom vern. : **Wasulu** (Lescr.); Galiema (Ém. Laur.); Kisantu (Gill.); rég. de Lemfu; entre Kisantu et le Kwango (But.). — VI : Bandundu (Ém. Laur.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Hens); Itimbiri (Ém. Laur.). — X : Yakoma. — Nom vern. : **Bowo** (Lescr.). — XIII d : Piani-Lombi (Dew.). — XV : Lac Foa (Lescr.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Yam-Yamve** (Verd.); Albertville (Desc.).

— — var. **Petiveri** [*Trin.*] *Hack.* ex *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72.

P. Petiveri *Trin.* Gram. icon. et descr. II (1829) t. 176; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60]; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 759.

1887 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens); Sisia (Dup.). — II a : Bingila (Dup.). — V : Kisantu (Gill.). — XV : Pweto (Desc.).

— — var. **polystachyum** *Munro* ex *Aschers.* et *Schweinf.* Ill. fl. Égypte (1867) 159; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 745 et Étud. fl. Cgo, I (1896) 322.

1870 (G. Schweinfurth). — XII d : pays des Mangbettu (Schw. 3497, 3790).

— — var. **submuticum** *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 347.

1888 (Fr. Hens). — V : Kwamouth (Hens, 176).

Panicum diagonale *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) 23; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 40; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 746; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 322.

Digitaria — *Stapf* in *Dyer* Fl. Capens. VII (1898) 381; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 163.

1905 (Marc. Laurent). — V : Dolo (M. Laur.).

P. diagonale var. **hirsutior** *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 4.

1896 (Fr. Thonner). — IX : Yabasumba (Thonn. 82).

— — var. **uniglume** [*Hochst*] *Hack.* in *Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1892) 117; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 747 et Étud. fl. Cgo (1896) 322; *De Wild.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 72 et Pl. Gilletianae I (1900) 61 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 61].

P. uniglume *Hochst.* ex *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 372.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.); Kisantu (Gill.).

Panicum distichophyllum *Trin.* De gramin. Panic. (1826) 147 et Gram. icon. et descr. II, t. 182; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 747 et Étud. fl. Cgo (1896) 323; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. B. XXXVI², 90].

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu (Hens). — V : Kutadi (Dup.).

Panicum elongatum *Mez* in *Engl. Jahrb.* XXXIV (1904) 132.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 102).

Panicum Griffonii *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 342.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 284).

Panicum Hensii *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 332.

1888 (Fr. Hens). — VIII : Lulanga (Hens, 101).

Panicum indutum *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 64; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 751 et Étud. fl. Cgo (1896) 323; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Thonnerianae (1900) 5 et Reliq. Dewevr. (1901) 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 11; II (1907) 12.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Cabra). — II a : Zobe (Dew.). — III : Matadi (Ém. et M. Laur.). — IV : Nord Manyanga (Cabra et Michel). — V : le Stanley-Pool. — Nom vern. : **Sambabala** (Dew.); Kisantu; Kimuenza (Gill.); Sabuka (M. Laur.); **Sanda** (De Brouw.). — VI : route de Lusubi à Luanu (Lescr.) — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — IX : Bumba (Ém. et M. Laur.); Yabasumba (Thonn.). — X : Yakoma (Coll. ?). — XII d : l'Uele (Delp.). — XIII a : Romée (Van Goitsenh.). — XIV : Ruzizi-Kivu (Coll. ?). — XV : Munungu; Olombo (Ém. et M. Laur.); env. de Lusambo. — Nom vern. : **Kolumbwa** (Gent.). — XVI : Lukonzolwa (Coll. !).

OBS. — Autres noms vern. : **Tonsopola** [Lusambo]; **Sungu-Sungu** [Romée]; **Luseke** [Ruzizi-Kivu]; **Ngomo** [Lukonzolwa] (Coll. ?).

Panicum interruptum Willd. Sp. pl. I (1797) 341; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 66; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 751; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 174; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : marais de la Fini (Ém. et M. Laur.).

Panicum lutetense K. Schum. in Engl. Jahrb. XXIV (1897) 332.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 194).

Panicum maximum Jacq. Icon. pl. rar. I (1781) t. 13; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 72; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 753 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 323; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 44 [B. S. B. XXXVI², 90]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 181; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo I (1903) 63-68, (1905) 504-506 et Miss Laurent (1906) 201.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Sola** (Cabra). — I : Moanda (Vanderyst). — II : env. de Boma (Van Houtte). — II a : Bingila (Dup.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — IV : distr. des Cataractes (Ém. Laur.); Luvituku (Dem.). — V : Dembo; Kisantu (Gill.); Kutadi (Dup.). — VI : Eiolo (Ém. Laur.). — VII : la Fini (Ém. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.); Wangata [Équateur] (Ém. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dem.); Upoto (Wilw.); Lisha (Hens). — XI : Basoko. — Nom vern. : **Guzu** (S. Doh.). — XV : Leki (Ém. Laur.); route de Luluabourg (Gent.).

Panicum mayombense Franch. in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 343.

1888 (Fr. Hens). — VIII : Lulanga (Hens, 101).

Panicum nigritanum Hack. ex *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 756 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 323.

1886 (R. Buettner). — V : le Stanley-Pool (Buett. 559).

Panicum nudiglume Hochst. in Flora, XXVII (1844) 253; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 756; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 170; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201.

P. Ruprechtii Fourn. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 60.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — V : env. de Yumbi (Ém. et M. Laur.).

OBS. — Le **P. molle** Sw., de l'Amérique trop. a été introduit à Kisantu (Gill.) et s'y développe à merveille [*De Wild.* *Étud. fl. Kat.* (1902) 11 et *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1905) 506-509].

Le **P. muticum** Forsk.?, indiqué à Bingila (Dup.) [Mat. fl. Cgo, I (1897) 159] est probablement une plante introduite [Conf. etiam *De Wild.* *Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1905) 109-111].

Panicum ogowense *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 344; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 61 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 61].

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 194). — V : Kisantu (Gill.).

Panicum plicatum *Lam.* Illustr. genr. Encycl. I (1791) 171; *Trin.* Gram. icon. et descr. II, t. 233; *Schrank* Pl. rar. Hort. Monac. t. 19; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 64; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 759; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 91]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 201 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 12.

Setaria mauritiana *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 305; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 167.

1896 (Ern. Dewèvre). — Congo (Ern. Dew.). — Bas-Congo (Cabra). — II a : le Mayumbe, C. (Ém. et M. Laur.). — V : distr. du Stanley-Pool, C. (Ém. et M. Laur.); env. de Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala (M. Laur.). — XV : la Lulua (Luja).

— — var. **costatum** [*Roxb.*] *Bak.* Fl. of Maurit. (1877) 436; *Th. Dur. et Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 324.

P. costatum *Roxb.* Fl. Ind. I (1830) 415; *Kunth* Enum. pl. I, 93.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

Panicum polystachyum [*H. B. et K.*] *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. (1895) 103; *De Wild.* Miss. Laurent (1900) 202.

Echinolaena — *H. B. et K.* Nov. gen. et sp. I (1815) 119.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

Panicum sanguinale *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 57; Fl. Dan. (1768) t. 388; English Bot. (1801) t. 849; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 39; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 761 et Étud. fl. Cgo (1896) 324; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 94]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 256; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 202 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 14.

Digitaria — *Scop.* Fl. Carniol. ed. 2, 1 (1772) 52; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 163.

1888 (Fr. Hens). — II : Sisia (Dup.): Boma. — Nom vern. : **Singala-Vunxia** (Van Houtte). — IV : Kitobola (Ém. Laur.). — V : Léopoldville (Dew.); Chenal Leo-Kwam; Mopolenge (Ém. et M. Laur.); Suata (Buett.); Kisantu (Van Houtte). — VIII : Lac Tumba (Ém. et M. Laur.). — IX : pays des Bangala (Dem.). — XII c : Nala (Delp.). — XV : îles du Sankuru en aval d'Ifuta (Ém. et M. Laur.). — XVI : Lukonzolwa. — Nom vern. : **Kachukutu** (Van Houtte).

— — var. **cognatum** *Hack.* in B. Herb. Boiss. II, append. 2 (1894) 18; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 763 et Étud. fl. Cgo (1897) 325.

P. horizontale *Nees* [non *G. F. W. Mey.*] Fl. Afr. austr. (1841) 26.

1885 (R. Buettner). — V : Suata (Buett. 538).

P. sanguinale var. **horizontale** [*G. F. W. Mey.*] *E. Mey.* ex *A. Rich.*
Tent. fl. Abyss. II (1851) 361; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V,
763; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 73.

P. horizontale *G. F. W. Mey.* Prim. fl. Esseq. (1818) 54.

1891 (G. Descamps). — XV : le Kasai (Desc.).

Panicum scabrum *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) 171; *Th. Dur.* et
Schinz Consp. fl. Afr. V, 704; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl.
Cgo, II (1900) 73.

1891 (F. Demeuse). — V : le Stanley-Pool (Dem.).

Panicum sulcatum *Aubl.* Pl. Guian. I (1775) 70; *De Wild.* et *Th.*
Dur. Pl. Thonnerianae (1900) 5.

1896 (Fr. Thonner). — IX : Mondumba (Thonn. 84).

Panicum Tholloni *Franch.* in *B. S. hist. nat. Autun*, VIII (1895) 351.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, 62).

Panicum Zenkeri *K. Schum.* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 330.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 284).

Panicum zizanioides *H. B.* et *K.* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 100; *De*
Wild. Miss. Laurent (1906) 202.

1905 (Marc. Laurent). — VIII : Eala (M. Laur.).

TRICHOLAENA Schrad.

Tricholaena rosea *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) 16; *Th. Dur.* et *Schinz*
Consp. fl. Afr. V, 770 et Étud. fl. Cgo (1896) 325; *Rendle* Cat. Welw.
Pl. II, 194; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 108 [B. S.
B. B. Sér. 2, I, 848] et Reliq. Dewevr. (1901) 257; *De Wild.* Étud. fl.
Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 11, (1904) 94; II (1907) 12.

Panicum — *Staud.* Syn. pl. glum. I (1855) 92.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — I : Moanda (Vanderyst). — V : Léopold-
ville (Dew.); Mopolenge; Sabuka (Ém. et M. Laur.); entre Dembo et le Kwango
(But.). — VI : Kinwanda (Cabra et Michel); Lusubi (Ém. et M. Laur.). — VII :
Ikongo (Ém. et M. Laur.). — XV : Luluabourg (Gent.).

Tricholaena sphacelata *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 559; *Th.*
Dur. et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 770 et Étud. fl. Cgo (1896) 325.

Panicum — *Staud.* Syn. pl. glum. I (1855) 92.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.).

SETARIA P. Beauv.

Setaria aurea [A. Rich.] Hochst. ex Walp. Annal. bot. III (1852) 721; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 772 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 326; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 202 et *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1907) 12.

Pennisetum — A. Rich. Tent. fl. Abyss. II (1851) 378.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Kisantu (Gill.); Kutadi (Dup.). — VII : Kutu (Ém. Laur.). — XV : entre Kubuluku et Kanda-Kanda, au S. du 7° (Lescr.). — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Kansoki** (Verd.); Mondoko. — Nom vern. : **Lweo** (Lescr.).

Setaria glauca [L.] P. Beauv. Agrostogr. (1812) 51; *Kunth* Enum. pl. I, 149, Suppl. 106; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 773 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 326.

Panicum — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 56; *Host* Gramin. Austr. II, t. 16: *Trin.* Gram. icon. et descr. II, t. 195.

1887 (Fr. Hens). — II : Boma (Hens: Ém. Laur.). — XVI : le Katanga (Desc.).

Setaria verticillata [L.] P. Beauv. Agrostogr. (1812) 51; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 774; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 257.

Panicum — L. Sp. pl. ed. 2 (1763) 82; *English Bot.* (1801) t. 874.

1895 ? (A. Dewèvre). — Congo (Dew.).

OPLISMENUS P. Beauv. (1)

Oplismenus africanus P. Beauv. Fl. d'Oware, II (1807) 15, t. 67, fig. 1; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 771 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 325; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 184; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 73; *De Wild.* *Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, I (1903) 21; II (1907) 14 et *Miss. Laurent* (1905) 203.

Panicum — *Poir.* Encycl. méth. Bot. Suppl. IV (1816) 275.

1888 (Fr. Hens). — V : Kimuenza; Kisantu (Gill.); Tshumbiri (M. Laur.). — IX : Lisha (Hens). — Ind. non cl. : Gombi (Dem.).

CENCHRUS L.

Cenchrus barbatus Schumacher. in *Schumacher. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 43; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 777; *De Wild.*

(1) M. Hackel (in sched.) rapporte avec doute à *O. compositus* P. Beauv. le n° 157 de la collection Hens.

et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 73 et Reliq. Dewevr. (1901) 257; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 202 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

1887 (Fr. Hens). — I : Banana (Dew.). — III : Matadi (Hens). — V : Dolo. — Nom vern. : **Bankusale** (Coll. ?); Kimuenza (Gill.). — XV : Isaka (Ém. et M. Laur.); Lusambo. — Nom vern. : **Bafwamfwabadili** (Coll. ?).

PENNISETUM L.

Pennisetum Benthami *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 105; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 777 et Étud. fl. Cgo (1896) 327; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65 et Reliq. Dewevr. (1901) 257; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 3, Miss. Laurent (1906) 203 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

P. purpureum *Schumach.* in Danske Vidensk. Selsk. Kjoeb. III (1828) 64; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 189.

P. macrostachyum *Benth.* [non *Trin.*] in *Hook.* Niger Fl. (1849) 563; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 65.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Ém. Laur.). — II : Boma (Dew.). — V : Chenal [Leo-Kwam.] (Ém. et M. Laur.); Kisantu (Gill.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — VIII : Ikoko (Lescr.). — IX : pays des Bangala (Dem.); Nouvelle-Anvers (Ém. et M. Laur.). — X : Mokoango. — Nom vern. : **Songo-Songo** (Bouck.); Yakoma. — Nom vern. : **Aworo** (Coll. ?). — XII c : Nala (Delp.). — XIV : Ruzizi-Kivu. — Nom vern. : **Matete** (Coll. ?); Kalemba-Lemba (Coll. ?); Baraka. — Nom vern. : **Mabingobingo** (Doh.). — XV : le Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Pennisetum dichotomum [*Forsk.*] *Delile* Fl. d'Égypte (1813) 15, t. 8, fig. 1; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 778; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 91]; *De Wild.* Miss. Laurent (1905) 203.

Panicum — *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 20.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens); Léopoldville (M. Laur.).

Pennisetum dioicum [*Hochst.*] *A. Rich.* Tent. fl. Abyss. II (1851) 380; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 778; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 91].

Beckera petiolaris *Hochst.* in Flora, XXVII (1814) 512; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 60 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 60].

1893 (P. Dupuis). — II a : Bingila (Dup.). — V : env. de Lemfu (But.).

Pennisetum hordeiforme [*L.*] *Spreng.* Syst. veget. I (1825) 302; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 779; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 91 [B. S. B. B. XXXVI², 91]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74 et Reliq. Dewevr. (1901) 257.

1888 (Fr. Hens). — II : Zenze (Ém. Laur.). — II a : brousse entre l'Owali et Shinganga (Dew.); Bingila (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Hens). — XIII c : Bamanga (Ém. Laur.). — XV : Lusambo; Leki (Ém. Laur.).

Pennisetum nodiflorum *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 363.

1888 (Fr. Hens). — V : le Stanley-Pool (Hens, 32).

Pennisetum parviflorum *Trin.* De Gramin. Panic. (1826) 64 et Gram. icon. et descr. III, t. 288; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 782; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 203 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — VI : la Sanga. — Nom vern. : **Kot-Koti** (Cabra). — VIII : Eala. — Nom vern. : **Lolelengi** (M. Laur.). — Ind. non cl. : Haut-Luapula. — Nom vern. : **Mutemtia** (M. Laur.).

Pennisetum Prieurii *Kunth* Revis. Gram. II (1829) 411, t. 119 et Enum. pl. I, 162; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 783; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74; *De Wild.* Miss. Laurent. (1906) 203 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Matulu** (Cabra). — V : Dolo (Lescr.); Kisantu (Gill.). — IX a : en aval de Mobeka (Ém. Laur.). — XIII : Lambi (Lescr.). — Ind. non cl. : Bana (Dem.).

Pennisetum reversum *Hack.* ex *Buett.* in Verh. bot. Ver. Brandenb. XXXI (1889) 68; *Th. Dur.* et *Schinx* Étud. fl. Cgo (1896) 327.

1885 (R. Buettner). — VI : Muene-Putu-Kasongo (Buett.).

Pennisetum setosum [*Sw.*] *L. C. Rich.* in *Pers.* Syn. pl. I (1805) 72; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 784 et Étud. fl. Cgo (1896) 327; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 190; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 258.

Cenchrus — *Sw.* Fl. Ind. occ. I (1797) 211.

P. purpurascens *H. B.* et *K.* Nov. gen. et sp. pl. I (1815) 113; *Kunth* Enum. pl. I, 160 et Suppl. 114; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 203 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 13.

P. polystachyum *Schult.* Mant. pl. II (1824) 456; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 783; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 74 et Reliq. Dewevr. (1901) 258.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Hens; Dup.). — V : env. de Kisantu (Van Houtte); Sabuka (M. Laur.). — XI : Isangi (Ém. et M. Laur.). — XIII a : env. de Nyangwe (Dew.). — XV : Lubue (Luja).

Pennisetum spicatum [*L.*] *Koern.* in *Koern.* et *Wern.* Handb. d. Getreideb. I (1885) 284; *Th. Dur.* et *Schinx* Consp. fl. Afr. V, 784 et Étud. fl. Cgo (1896) 328; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 91].

Holcus — *L.* Syst. nat. ed. 10 (1759) 1305.

Penicillaria — *Willd.* Enum. pl. hort. Berol. (1809) 1031; *P. Beauv.* Essai Agrostogr. t. 13, fig. 3.

P. typhoideum L.C. Rich. in *Pers. Syn. pl.* I (1805) 72; *Delile Fl. d'Égypte*, 17, t. 8, fig. 3; *Rendle Cat. Welw. Pl. II*, 198; *De Wild. et Th. Dur. Reliq. Dewevr.* (1901) 202; *De Wild. Not. pl. util. ou intér. du Cgo*, I (1905) 320-322 et Miss. Laurent (1906) 204.

1893 (P. Dupuis). — II : Zambé (Dup.).

Obs. — Espèce cultivée à Lusambo (XV) [type et form. *viviparum*] à Eiolé (VI), dans la tribu des Plani-Gongo (?) et près de Wabundu (Dew.).

***P. spicatum* var. *typicum* K. Schum.** in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 55.

1900 (Edg. Verdick). — XVI : Lukafu (Verd.).

***Pennisetum unisetum* [Nees] Benth.** in *Journ. Linn. Soc. XIX* (1881) 47; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V*, 786.

Gymnotrix — *Nees Fl. Afr. austr.* (1841) 66.

Beckera — *Steud. Syn. pl. glum. I* (1855) 118.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 291).

OLYRA L.

***Olyra latifolia* L.** *Syst. nat. ed. 10* (1759) 126; *Rendle Cat. Welw. Pl. II*, 255; *De Wild. Miss. Laurent* (1906) 204.

O. brevifolia *Schumach.* in *Schumach. et Thonn. Beskr. Guin. Pl.* (1827) 402; *Th. Dur. et Schinz Étud. fl. Cgo* (1896) 328; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, I (1899) 66.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — II a : forêts du Mayumbe (Ém. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : entre Léopoldville et Sabuka (M. Laur.); Lukolela (Ém. et M. Laur.); Kisantu; env. de Dembo (Gill.). — IX : Lisha (Hens); en aval de Bolombo (Ém. et M. Laur.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.). — XI : Malema (Ém. et M. Laur.). — XIII c : Bamanga (Ém. Laur.). — XV : Kondue (Ém. et M. Laur.).

Obs. — L'habitation « au N. du Stanley-Pool » (Dew.) est dans le Congo français [*Reliq. Dewevr.* (1901) 258].

LEPTASPIS R. Br.

***Leptaspis cochleata* Shw.** *Enum. pl. Zeyl.* (1864) 357; *Rendle Cat. Welw. II*, 256.

L. conchifera *Hack.* in *Bolet. Soc. Brot. I* (1887) 211, t. G, fig. A; *K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 106; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V*, 788; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo*, II (1898) 83 [B. S. B. B. XXXVII, 128]; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo*, II (1900) 74; *De Wild. Étud. fl. Bas-et Moy.-Cgo*, I (1904) 95 et Miss. Laurent (1906) 204.

1891 (F. Demeuse). — II a : entre Shindamba et la Lemba (Cabra). — V : bassin de la Sele (But.). — VII : Ibali (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bamania (M. Laur.). — XIII a : les Stanley-Falls (Dem.). — XV : Kamba (Ém. et M. Laur.).

ORYZA L.

***Oryza sativa** L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 336; *Kunth Enum. pl. I*, 7; *Bentl. et Trim. Medic. Pl. IV*, t. 291; *K. Schum. in Engl. Pfl. Ost-Afr.* 106; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V*, 788; *Rendle Cat. Welw. Pl. II*, 231; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I* (1903) 11. 1902 (J. Gillet). — V : env. de Léopoldville (Gill.).

— — var. **aristata** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 205.

1902 (J. Gillet). — V : introd. à Kisantu (Gill.); Casier-Saint-Jean [Wumbali] (Gill.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.).

— — var. **mutica** *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 205.

1903 (Ém. et M. Laur.). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Galiema [Léopoldville] (M. Laur.). — VII : Kutu (Ém. et M. Laur.). — VIII : Bamania (Ém. et M. Laur.). — XIII a : entre Stanleyville et Tshopo (Ém. et M. Laur.).

LEERSIA Sw.

Leersia hexandra Sw. Prodr. veget. Ind. Occid. (1788) 21; *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Monoc.)* 39; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V*, 789 et *Étud. fl. Cgo* (1896) 329; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I* (1900) 61 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 61]; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II* (1907) 12.

1888 (Fr. Hens). — IV : Tombe-Lutete (Hens). — V : Kisantu-Makela (Van Houtte); Kisantu (Gill.).

ARISTIDA L.

Aristida amplissima Trin. et Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. 6, V (1842) 155; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V*, 800; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 91]; *De Wild. et Th. Dur. Contr. fl. Cgo, II* (1900) 74, Pl. Gilletianae, I (1900) 62 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 62] et Reliq. Dewevr. (1901) 258.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — IV : Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.).

Aristida vestita Thunb. Prodr. fl. Cap. (1794) 19; *Th. Dur. et Schinz Consp. fl. Afr. V*, 810; *Th. Dur. et De Wild. Mat. fl. Cgo, I* (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 91]; *De Wild. et Th. Dur. Pl. Gilletianae, I* (1900) 62 [B. H. Boiss. Sér. 2, I, 62] et *Contr. fl. Cgo, II* (1900) 71.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.).

SPOROBOLUS R. Br.

Sporobolus barbigerus *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 371; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, II (1901) 108 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 848] et Reliq. Dewevr. (1901) 258; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 94.

1895 (A. Dewèvre). — II a : env. de Tshia (Dew.). — V : entre Dembo et Kisantu (Gill.).

Sporobolus breviglumis *Hack.* ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 205.

1890 (F. Demeuse). — Congo (Dem. 50).

Sporobolus capensis [*Willd.*] *Kunth* Enum. pl. I (1833) 212; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 819; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 91].

Vilfa — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 16.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — Ind. non cl. : Suengi ; Goma (Hens).

Sporobolus indicus [*L.*] *R. Br.* Prodr. fl. N. Holl. (1810) 170; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 820; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 205 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

Agrostis — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 63.

1903 (Ém. Laurent). — II a : le Mayumbe (Ém. Laur.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — IX a : env. de Mobeka (Ém. Laur.). — X : l'Ubangi (Ém. Laur.). — XVI : Kiambi. — Nom vern. : **Kokotwa** (Coll.?).

Sporobolus mayumbensis *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 367.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lukungu (Hens, 212).

Sporobolus Molleri *Hack.* in Bolet. Soc. Brot. V (1887) 213; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 822 et Étud. fl. Cgo (1896) 329; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 209; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 75 et Reliq. Dewevr. (1901) 259; *De Wild.* Miss. Laurent (1901) 205 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

1888 (Fr. Hens). — IV : Batanga (Luja); Lukungu (Hens). — V : le Stanley-Pool (Schlt.); Kisantu (Gill.). — VII : Isaka (Ém. Laur.). — VIII : Ikenge (Ém. Laur.). — XV : env. de Lusambo. — Nom vern. : **Kabwebwa** (Coll. ?). — XIII d : Elungu. — Nom vern. : **Kibembele** (Dew.).

Sporobolus robustus *Kunth* Revis. Gram. II (1829) 425, t. 126 et Enum. pl. I, 213; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

1903 (J. Gillet). — I : Moanda (Gill.).

Sporobolus strictus *Franch. ex Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 268.

1899 (R. Schlechter). — V : Dolo (Schlecht. 12448).

VILFA R. Br.

Vilfa capensis [*Willd.*] *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 16; *Nees* in *Linnaea*, VII (1832) 293; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 160; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 62 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 62]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

Agróstis — *Willd.* Sp. pl. ed. 1 (1798) 372.

Sporobolus — *Kunth* Enum. pl. 1 (1833) 212; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 819.

1900 (J. Gillet). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : rég. du Tanganika-Moero (Coll. ?).

TRICHOPTERYX Nees.

Trichopteryx arundinacea *Hack. ex Engl.* Hochgeb. trop. Afr. (1891) 129; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 846; *Franch.* in *B. S. hist. nat. Autun*, VII (1895) 372.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 281 pr. p.).

Trichopterix flammida *Benth.* in *Journ. Linn. Soc.* XIX (1881) 98; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 846; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 65 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 62]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 205 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

1888 (Fr. Hens). — IV : Kimbando-Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.). — VI : Lusubi (Lescr.). — VIII : Eala (M. Laur.). — IX : Bobangi (Ém. et M. Laur.).

MICROCHLOA R. Br.

Microchloa setacea *R. Br.* Prodr. fl. Nov. Holl. (1810) 208; *K. Schum.* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* 110; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 856; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 268.

1899 (R. Schlechter). — V : Léopoldville (Schlt. 12585).

CYNODON Pers.

Cynodon Dactylon [*L.*] *Pers.* Syn. pl. I (1805) 85; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 212; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 856 et Étud. fl. Cgo (1896) 329; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 220; *De Wild. et Th.*

Dur. Contr. fl. Cgo, II (1900) 75; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1905) 526-529 et Miss. Laurent (1906) 206.

Panicum Dactylon L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 58.

1891 (Hyac. Vanderyst). — I : Moanda (Vanderyst). — II : Boma (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.; M. Laur.).

CTENIUM Panz.

Ctenium concinnum Nees Fl. Afr. austr. (1841) 237; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 859; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 45 [B. S. B. B. XXXVI², 91]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 259; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12 et Miss. Laurent (1906) 206.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dem.). — IV : Lutete (Hens). — V : le Stanley-Pool (Dew.); env. de Kimuenza (Gill.); Sabuka (M. Laur.). — VII : la Fini (Ém. et M. Laur.). — XV : Olombo; Bukila (Ém. et M. Laur.).

Ctenium elegans Kunth Révis. Gramin. I (1829) 93; II, 295, t. 59; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 859; *Franch.* in B. S. hist. nat. Autun, VIII (1895) 375.

1888 (Fr. Hens), — IV : Lutete (Hens, 201).

CHLORIS Sw.

Chloris Gayana Kunth Révis. Gramin. I (1829) 89; II, 293, t. 58; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 207; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 861 et Étud. fl. Cgo (1896) 330; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 66.

1891 (F. Demeuse). — Congo (Dem.). — II : Boma (Ém. Laur.).

Chloris polydactyla Sw. Prodr. veget. Ind. occ. (1788) 26; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 259; *De Wild.* Miss. Laurent (1900) 206 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 14.

1895 (A. Dewèvre). — II : Boma (Dew.). — III : Matadi (Ém. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — VIII : Lulanga (Ém. Laur.). — XIII a : Yakusu. — Nom vern. : Ceka (Coll ?). — XIV : Ruzizi-Kivu. — Nom vern. : Lembause (Coll. ?). — XV : env. de Lusambo. — Nom vern. : Dishinda-ja-Mulume (Coll. ?). — XVI : rég. du Tanganika-Moero. — Noms vern. : Kalolo; Kayioba (Coll. ?).

Chloris punctulata Hochst. ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 205; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 862; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 46 [B. S. B. B. XXXVI², 92]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 66.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Ern. Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens). — XV : Leki [Lomami] (Ém. Laur.).

ELEUSINE Gaertn.

***Eleusine Coracana** [L.] *Gaertn.* De fruct. et semin. I (1788) 8, t. 1, fig. 11; *Trin.* Gram. icon. et descr. I, t. 70; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 866; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 224; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 62 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 62]; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 3 et *Miss. Laurent* (1906) 207.

Cynosurus — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1762) 107; *Schreb.* Besch. d. Graeser. II, t. 35. *E. Luco Welw.* Apout. phyto-geogr. (1859) 591.

1900 (J. Gillet). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : Lukafu (Verd.).

Eleusine indica [L.] *Gaertn.* De fruct. et semin. I (1788) 8; *Trin.* Gram. icon. et descr. I, t. 71; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 211; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 866 et Étud. fl. Cgo (1896) 350; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 46 [B. S. B. B. XXXVI², 92]; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 224; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 259; *De Wild.* Étud. fl. Kat. (1902) 3; *Miss. Laurent* (1906) 207 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 15.

Cynosurus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 72.

E. textilis Welw. in Murr. Journ. Trav. et Nat. Hist. I (1868) 31.

1887 (Fr. Hens). — I : Banana (Dew.). — II : Boma (Hens). — IV : Kitobola (Ém. et M. Laur.). — V : Kinshasa (Coll. ?); Kisantu (Gill.); Kisantu-Makela (Van Houtte). — VIII : Eala (Ém. et M. Laur.). — XII : l'Uele (Delp.). — XIII a : Romée (Coll. ?). — XIV : Ruzizi-Kivu (Coll. ?); env. de Baraka (S. Doh.). — XV : env. de Lusambo. — Nom vern. : **Dishinda-par-Makaela**. — XVI : Lukafu. — Nom vern. : **Lunsekwe** (Coll. ?); camp de Lukonzolwa (Coll. ?); rég. du Tanganika-Moero (Coll. ?); Pweto (S. Doh.). — Noms vern. : **Moto-Moto**; **Kasukutu** [Baraka]; **Kimbandji** [Kinshasa]; **Sinda** [Romée]; **Lingia-Rabacha** [Pweto].

DACTYLOCTENIUM Willd.

Dactyloctenium aegyptium [L.] *Willd.* Enum. pl. Hort. Berol. (1809) 1029; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 212; *Boiss.* Fl. Orient. V, 171; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 868; *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 46 [B. S. B. B. XXXVI², 92]; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 259.

Cynosurus — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 72.

Eleusine cruciata Lam. Pl. bot. Encycl. I (1791) t. 48, fig. 2.

1888 (Fr. Hens). — I : Moanda (Vanderyst); Banana (Dew.). — II : Boma (Wilw.). — IV : Lutete (Hens). — V : Kisantu (Gill.). — XVI : Kiambi [Tanganika-Moero] (Coll. ?). — Ind. non cl. : Kutadi (Dup.).

Dactyloctenium mpuetense *De Wild.* *Miss. Laurent* (1906) 206.

Ann. ? (Coll. ?). — XVI : Pweto. — Nom vern. — **Kaloja** (Coll. ?).

LEPTOCHLOA P. Beauv.

Leptochloa coerulescens *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 209; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 869; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 75 et Reliq. Dewevr. (1901) 260; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12 et Miss. Laurent (1906) 207.

1888 (Fr. Hens). — II : Boma (Dew.); Sisia (Dup.). — V : le Stanley-Pool (Luja); env. de Léopoldville; Kisantu (Gill.). — XV : banc de sable en amont de Butala (Ém. et M. Laur.). — Ind. non cl. : Gandon (Dem.); Goma (Hens).

Leptochloa Laurentii *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 207.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — VII : Kiri (Ém. et M. Laur.).

ELYTROPHORUS P. Beauv.

Elytrophorus articulatus *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 67, t. 14, fig. 2; *Kunth* Révis. Gramin. II, 481, t. 154; *Benth.* Fl. Austral. VII, 638; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 873 et Étud. fl. Cgo, (1896) 331.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

PHRAGMITES Trin.

Phragmites vulgaris [*Lam.*] *Crép.* Man. fl. Belg. éd. 2 (1866) 345; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 876; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1900) 76; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12; II (1907) 15.

Arundo — *Lam.* Fl. Franç. III (1778) 615.

A. Phragmites *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 81.

Trichodon — *Rendle* Cat. Welw. Pl. II (1899) 218.

P. communis *Trin.* Fund. Agrost. (1820) 134; *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. 113; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12; II (1907) 15 et Miss. Laurent (1906) 208.

1888 (Fr. Hens). — Congo (Dew.). — V : le Stanley-Pool (Hens); Bokala (M. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XIV : Baraka. — Nom vern. : *Metetele* (S. Doh.). — XV : le Kasai (Gent.; Ém. et M. Laur.); le Bas-Kasai (Desc.).

ERAGROSTIS P. Beauv.

Eragrostis atrovirens *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) 400; *De Wild.* et *Th. Dur.* Pl. Gilletianae, I (1900) 63 [B. Herb. Boiss. Sér. 2, I, 63]; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 208.

1900 (J. Gillet). — V : Kimuenza (Gill.). — IX : Yaminga (Ém. et M. Laur.).

Eragrostis Brownei [*P. Beauv.*] *Nees* ex *Steud.* Nomencl. bot. ed. 2, I (1840) 562; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 279; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 881; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 76 et Reliq. Dewevr. (1901) 260.

Megastachya — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 74.

1888 (Fr. Hens). — IV : Gombi-Lutete (Hens, A. 306). — V : Suata (Hens, C. 161). — IX : Bumba (Dew. 891).

Eragrostis Chapellieri [*Kunth*] *Nees* Fl. Afr. austr. (1841) 392; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 271; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 881 et Étud. fl. Cgo (1896) 331; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gille-tianae, I (1900) 63.

Poa — *Kunth* Révis. Gramin. II (1829?) 543, t. 186.

E. patens *Oliv.* in Trans. Linn. Soc. XXIX (1875) 175, t. 113.

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, A. 223). — V : Kimuenza (Gill. 778).

Eragrostis ciliaris [*L.*] *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) 192; *Nees* Fl. Afr. austr. 413; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 265; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 884 et Étud. fl. Cgo (1896) 332; *Boiss.* Fl. Orient. V, 582; *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 179 et Reliq. Dewevr. (1901) 260; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 208 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 15; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 232.

Poa — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 102; *Jacq.* Icon. pl. rar. I (1781) t. 18.

1888 (Fr. Hens). — Bas-Congo. — Nom vern. : **Kimbanza** (Cabra). — I : Moanda (Gill.). — II : Boma (Dew.). — IV : Lukungu (Hens). — V : Léopoldville (Schlt.); Sabuka (M. Laur.): Kisantu et env. (Gill.). — IX : Yambiunga (Ém. et M. Laur.). — XV : env. de Lusambo. — Noms vern. : **Zelo**; **Samba** (Coll.?).

Eragrostis fascicularis *Trin.* in Mém. Acad. Pétersb. Sér. 6, I (1831) 405; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 269; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 883 et Étud. fl. Cgo (1896) 332.

Poa — *Kunth* Enum. pl. I (1833) 389.

Ann. ? (Coll. ?). — Congo (Coll. ? fide *Kunth*).

Eragrostis multiflora [*Forsk.*] *Aschers. et Schweinf.* Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 297, 310; *Richt.* Pl. Europ. I, 73; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 885 et Étud. fl. Cgo (1896) 332.

Poa — *Forsk.* Fl. Aegypt.-Arab. (1775) 21.

Briza Eragrostis *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) 70.

E. major *Host* Gramin. Austr. IV (1809) 24; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 237; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 260.

Poa megastachya *Koel.* Descr. Gramin. (1802) 181; *Kunth* Enum. pl. I, 333; *Bak.* Fl. of Maurit. 380.

Eragrostis — *Link* Hort. bot. Berol. I (1827) 185; *Boiss.* Fl. Orient. V, 580.

1893 (P. Dupuis). — Bas-Congo (Cabra). — II : Boma (Dup.). — XIII d : Kasongo (Dew.).

Eragrostis namaquensis Nees ex Schrad. in *Linnaea*, XII (1838) 452; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 208.

E. interrupta P. Beauv. var. — *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V (1895) 884; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 233.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — XV : banc de sable en aval d'Ifuta (Ém. et M. Laur.).

Eragrostis nutans [Retz.] Roxb. Fl. Ind. (1820) 337; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 264; *Boiss.* Fl. Orient. V, 583; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 886.

Poa — *Retz.* Observ. bot. IV (1786) 19; *Kunth* Enum. pl. I, 332.

1883 (H. Johnston). — Congo (Johnst.).

Eragrostis patens Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXIX (1875) 175, t. 113.

Le type croît dans l'Afrique trop. or.

— — var. **congoensis** Franch. in *B. S. hist. nat.* Autun, VIII (1895) 354; *De Wild. et Th. Dur.* Pl. Gilletiana, I (1900) 63 [B. Herb. Boiss, Sér. 2, I, 63].

1888 (Fr. Hens). — IV : Lutete (Hens, 328). — V : Kisantu (Gill. 589, 720); env. de Lemfu (But. in Gill. 1172).

Eragrostis sabulicola Pilger ex *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 15.

1895 (A. Dewèvre). — I : Moanda (Gill. 3162); Banana (Dew. 61).

Eragrostis tremula [Lam.] Hochst. in *Flora* (1842) I, Beibl. 134; *Steud.* Syn. pl. glum. I, 269; *Boiss.* Fl. Orient. V, 58; *Schlechter* Westafr. Kautsch.-Exped. (1900) 269; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 15.

Poa — *Lam.* Ill. genr. Encycl. I (1791) 185; *Kunth* Enum. pl. I, 332.

1899 (R. Schlechter). — I : Moanda (Gill.). — V : Léopoldville (Schlt.).

Eragrostis tubiformis Hack. ex *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 208 et Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1907) 15.

1903 (Ém. et Marc. Laurent). — II : Boma (Pyn.). — V : env. de Léopoldville et de Bokala (M. Laur.). — VI : Dima (Ém. et M. Laur.). — XIII a : chutes de la Tshopo (Ém. et M. Laur.). — XV : le Kasai; îlot du Bas-Sankuru (Ém. et M. Laur.).

Eragrostis verticillata Roxb. Fl. Ind. I (1820) 346; *Schweinf.* in *B. Herb. Boiss.* II, append. II, 35; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 867 et Étud. fl. Cgo (1896) 331.

Leptochloa? — *Kunth* Révis. Gramin. I (1829) 91 et Enum. pl. I, 272.

1893 (P. Dupuis). -- II : Zambé (Dup.).

CENTOTHECA Desv.

Centotheca lappacea Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. II (1810) 189; *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. 56; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 228; *De Wild.* et *Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 261; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 209.

1895 (A. Dewèvre). — II a : Shinganga (Cabra). — V : Dolo (Schlt.). — X : Imese (Ém. et M. Laur.).

Centotheca mucronata [*P. Beauv.*] *Benth.* in *Benth.* et *Hook.* f. Gen. pl. III (1883) 1190; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 898 et Étud. fl. Cgo (1896) 333.

Poa — *P. Beauv.* Fl. d'Oware, I (1804) 5, t. 4; *Kunth* Enum. pl. I, 334.

Megastachya — *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 74; *Roem.* et *Schult.* Syst. veget. II, 593.

1891 (F. Demeuse). — Bas-Congo (Dem.).

Centotheca owariensis [*P. Beauv.*] *Hack.* ex *Th. Dur.* et *Schinz* Étud. fl. Cgo (1896) 333.

Megastachya — *P. Beauv.* ex *Steud.* Syn. pl. glum. I (1855) 269, in syn.

Eragrostis — *Steud.* l. c. I (1855) 269; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 887; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 77 et Reliq. Dewevr. (1901) 260; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1904) 95; II (1907) 15 et Miss. Laurent (1906) 208.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.); le Mayumbe (Dup.). — V : Coquilhatville (Dew.); Sabuka (Luja); Kinshasa (Hens, B. 102); env. de Lemfu (Gill.); route des Caravanes (Ém. Laur.); Kimtuenza (Gill.). — VII : Inongo (Ém. et M. Laur.). — VIII : Eala et env. (M. Laur.); Coquilhatville (Dew.). — XV : Olombo (Ém. et M. Laur.).

STREPTOGYNE P. Beauv.

Streptogyne crinita *P. Beauv.* Essai Agrostogr. (1812) 80, t. 16, fig. 1; *Doell* in *Mart.* Fl. Brasil. II³, 171, t. 46; *Th. Dur.* et *Schinz* Consp. fl. Afr. V, 899 et Étud. fl. Cgo (1896) 333; *De Wild.* et *Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, II (1900) 77 et Reliq. Dewevr. (1901) 261; *De Wild.* Miss. Laurent (1906) 209.

1888 (Fr. Hens). — II a : Bingila (Dup.). — V : Lisha (Hens); Lukolela (Dew.); Kisantu (Gill.). — VI : Eiolo (Ém. et M. Laur.). — XIII a : Stanleyville (Ém. et M. Laur.). — XV : Lomkala (Ém. et M. Laur.).

ARUNDINARIA Michx.

Arundinaria alpina *K. Schum.* in *Engl.* Pfl. Ost-Afr. A. (1895) 129 et C, 116; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 223, t. 81-83.

Ann. ? (Coll. ?). — XIV : env. de Mja-Kibuti [secteur de Luvungi] (Coll. ?).

PUELIA Franch.

Puelia Dewevrei *De Wild. et Th. Dur.* Contr. fl. Cgo, I (1899) 77 et Reliq. Dewevr. (1901) 261; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 12; II (1907) 16 et Miss. Laurent (1906) 209.

1896 (A. Dewèvre). — V : entre Léopoldville et Sabuka (M. Laur. 544); Sabuka (Ém. et M. Laur.); Kimuenza (Gill. 1947); env. de Lemfu (But. in Gill. 3488). — XI : Lokandu (Dew. 1121). — XV : Lomkala; Ibaka (Ém. et M. Laur.).

EUCLASTE Franch.

Euclaste graminea *Franch.* in B. Soc. hist. nat. Autun, VII (1895). 335.

1895 (G. Descamps). — IX : Upoto (Wilw.). — XVI : Albertville [Toa] (Desc.).

GYMNOSPERMEAE

GNETACEAE

GNETUM L.

Gnetum africanum *Welw.* in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869) 73; *Th. Dur. et Schinz* Consp. fl. Afr. V, 948; *Rendle* Cat. Welw. Pl. II, 257; *Th. Dur. et De Wild.* Mat. fl. Cgo, I (1897) 40 [B. S. B. B. XXXVI², 92]; *De Wild. et Th. Dur.* Reliq. Dewevr. (1901) 262; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 10 et Miss. Laurent (1906) 197.

1891 (F. Demeuse). — II a : Bingila (Dup.). — VI : vallée de la Djuma (Gill. 2871). — VII : Coquilhatville (Dew. 592). — VIII : Eala (M. Laur. 903). — IX : Bangala (Dem.).

CYCADACEAE

ENCEPHALARTOS Lehm. (1)

Encephalartos Laurentianus *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 10, t. 25; *L. Gentil* in Rev. Horticult. belg. (1904) 7 et

(1) De Wildeman, *Les Encephalartos congolais* in Not. pl. util. ou intér. du Congo, I (1904) 386-396.

in Gard. Chron. (1904) I, 370, fig. 163; *De Wild.* Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 392, t. 27 et 28, fig. 1-6 et Miss. Laurent (1907) 367, fig. 58, 60.

1902 (L. Gentil). — VI : en aval de Kasongo (Gent. 98).

« Cette espèce paraît confinée sur les deux rives du Kwango » [riv. congol. et portug.] (Gent.).

Encephalartos Lemarinelianus *De Wild.* et *Th. Dur.* in *Th. Dur.* et *De Wild.* Mat. fl. Cgo, VIII (1900) 28 [B. S. B. B. XXXIX², 80]; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I (1903) 9, t. 23 et 24; Not. pl. util. ou intér. du Cgo, I (1904) 386, t. 25-28; *L. Gentil* in Gard. Chron. (1904) I, 370, fig. 164; *Éd. André* in Rev. Hortic. (1904) 58, fig. 23; *De Wild.* Miss. Laurent (1907) 364, fig. 56, 57, 59.

1881 (P. Pogge); 1886 (G. Le Marinel). — XV : Bena-Kanza (Pg.); rive droite du Lubi, à quelques jours de Luluabourg (Le Marinel); entre Kanda-Kanda et Luluabourg (Gent.).

OBS. — Espèce introduite à Lusambo (Le Marinel).

ADDITIONS ET CORRECTIONS (1)

à FAIRE AUX PAGES INDIQUÉES.

Page

- 16 **Tetracera alnifolia** Willd. Sp. pl. II (1799) 1243; *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 12; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 5; Bot. Centralbl. LXII (1895) 339; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.

1883? (P. Pogge). — XV : la Lulua (Pg. 632).

- 18 *Uvaria latifolia* ... XV : Mukenge (Pg.).
20 *Monanthotaxis Poggei* ... XV : Mukenge (Pg.).
* *Hexalobus grandiflorus* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.).
31 *Capparis Poggei* ... XV : Mukenge (Pg.).
34 **Alsodeia ilicifolia** Welw. ex *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 108.
Rinorea — *O. Kuntze* Rev. Gener. (1891) 42; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 35; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. XXXVIII (1908) 827.

1906 (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).

- 35 *Alsodeia* [Rinorea] *Poggei* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
36 *Poggea alata* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.).
* **Oncoba spinosa** Forsk. var. **angolensis** *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 116; *Hiern* Cat. Welw. Pl. I, 38; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.

1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).

- * *Caloncoba* [*Oncoba*] *glauca* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
37 — *Welwitschii* ... XV : Mukenge (Pg.).
* *Lindackeria dentata* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.); Mukenge (Pg.).
38 — *Poggei* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
* *Buchnerodendron speciosum* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
40 *Securidaca longepedunculata* ... XV : Mukenge (Pg.).
45 *Haronga paniculata* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
46 *Garcinia longaeacuminata* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.).
* — *lualabensis* ... XV : ajouter : Kondue (Lederm.).

(1) Nous avons cru que la localité de Munza, où le célèbre voyageur G. Schweinfurth a récolté tant de plantes, était dans la zone Gurba-Dungu [XII d]. M. De Hertogh, qui a parcouru toute cette région et visité l'emplacement de Munza, nous dit que ce village était au S. du Kibali, c'est-à-dire dans la zone Bomokandi [XII c]. Dans le *Sylloge*, il faut donc lire partout XII c et non XII d, là où Munza est cité.

Page

- 49 *Sida humilis* ... *lire* : XII c : entre Vankerkovenille et Arebi.
 " — *linifolia* ... *supprimer* : Ind. non cl. : ... *et mettre dans* V : Bulebu.
 50 *Wissadula rostrata* ... *au lieu de* Ind. non cl. *lire* : V : Yindu (Vanderyst).
 60 *Sterculia quinqueloba* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 63 **Cola Ledermannii** *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 827 [nom. tant.].
 1906? (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).
- 67 *Leptonychia multiflora* ... *lire* : Bena-Lekula.
 71 *Triumfetta iomalla* ... *lire* : XVII [et non XV] : Musumba.
 75 *Hugonia platysepala* ... *lire* : IV : Kitobola (Ém. Laur.). — V : Kisantu ...
 76 *Phyllocosmus senensis* ... *lire* : XII c : Bangwa ...
 78 *Oxalis corniculata* ... *lire* : XIII d : Lubundu (Dew.).
 81 *Fagara pilosiuscula* ... *lire* : XVI [et non XV] : Musumba ...
 " — *Poggei* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 85 *Ochna katangensis* ... *au lieu de* I *lire* : XVI : ...
- 89 **Ouratea Ledermanniana** *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 827 [nom. tant.].
 1906? (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).
- " — *reticulata* ... *lire* : V : bassin de la Sele ...
- 91 *Turraea Vogelii* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 93 *Carapa procera* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
- 95 [avant **COULA**] **ONGOKEA** Pierre
Ongokea Klaineana *Pierre* in B. S. Linn. Paris, I (1897) 1314;
Engl. in *Engl. et Prantl* Nat. Pflanzenfam. Nachtr. zum II-IV,
 147 et in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
 1883? (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).
- " *Dichapetalum rufipile* ... XV : Mukenge (Pg.).
 97 *Olox Poggei* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 98 *Leptaulus daphnoides* ... *lire* : XII c : pays des Mangbettu ...
 99 *Alsodeiopsis Poggei* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 104 *Gouania longipetala* ... XV : *ajouter* : Kondue (Lederm.).
 105 *Ampelocissus calophylla* ... *lire* : IX [et non IV] Luozi ...
 " — *Chantinii* ... *lire* : XVI [et non XV] Musumba ...
 " *Cissus adenocaulis* ... *lire* : IV [et non V] entre Tumba et ...
 " — *Bakeriana* ... *lire* : XII c : pays des Mangbettu ...
 106 — *Gilletii* ... *lire* : XV : Samba (Cabra).
 107 — *Guerkeana* ... XV : Mukenge (Pg.).
 " — *Livingstoniana* *Welw.* [syn. *C. rubiginosa* Planch.]... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
 109 *Leea guineensis* ... XV : Mukenge (Pg.).
 " *Paullinia pinnata* ... XV : Mukenge (Pg.).
 110 *Allophyllus africanus* ... XV : Mukenge (Pg.).
 111 — **Welwitschii** *Gilg* in *Engl. Jahrb.* XXIV (1897) 287; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 827.
 1906? (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).
 " *Lychnodiscus cerospermus* ... XV : Kondue (Lederm.) : Mukenge (Pg.).

Page

- 112 **Eriocoelum paniculatum** *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I (1868) 428; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.
1883? (P. Pogge). — XV : rég. de Mukenge (Pg.).
- 113 *Phialodiscus unijugatus* ... XV : Kondue (Lederm.).
- 117 *Agelaea obliqua* ... XV : Mukenge (Pg.).
" — *phaseolifolia* ... lire : IV : entre Tumba et ...
- 118 **Byrsocarpus coccineus** *Schumach. et Thonn.* Beskr. Guin. Pl. (1827) 226; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. I, 452; *Walp.* Annal. bot. II, 294.
Rourea — *Hook. f.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 290; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 119 *Connarus luluensis* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 120 *Manotes brevistyla* ... lire : XVI [et non XV] Musumba ...
" *Cnestis ferruginea* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 121 — *polyantha* ... lire : XVI [et non XV] Musumba ...
- 134 *Milletia drastica* ... XV : Mukenge (Pg.).
" — *versicolor* *Welw.* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 136 *Platysepalum ferrugineum* ... XV : Mukenge (Pg.). — XVI [et non XV] bords du Lualaba ...
" — **Ledermanni** *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 827 [nom. tant.].
1906? (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).
- 140 **Smithia strigosa** *Benth.* in *Miq.* Pl. Jungh. (1851-55) 211; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 154; *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 147 *Erythrina abyssinica* ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 162 **Dalbergia pubescens** *Benth.* in *Hook.* Niger Fl. (1849) 315; *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II, 234; *Engl.* in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 164 **Ostryocarpus?** **Welwitschii** *Bak.* in *Oliv.* Fl. trop. Afr. II (1871) 240; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828.
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 165 *Lonchocarpus Teuszii* ... *supprimer cette espèce et la rapporter comme synonyme ainsi que les habitations au* *Milletia Teuszii* *De Wild.* [Conf. supra pg. 134].
- 166 *Derris* [*Deguelia*] *brachyptera* ... XV : Mukenge (Pg.).
" — [*Deguelia*] *nobilis* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 174 *Dialium guineense* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 177 *Berlinia acuminata* ... au lieu de *Acuminata*.

- Page
 177 **Berlinia auriculata** *Benth.* in *Trans. Linn. Soc.* XXV (1866) 309; *Oliv. Fl. trop. Afr.* II, 294; *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 828.
 1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 212 *Dissotis segregata* ... *lire* : I : Vista (Chaves) et *supprimer la note au bas de la page.*
- 223 *Paropsia reticulata* ... *lire* : IX [et non V] Lisha (Dem.).
- 248 *Mussaenda elegans* ... XII c [et non XII a] pays des Mangbettu ...
- 255 *Bertiera gracilis* *De Wild.* var. *latifolia* ... *lire* : XIII a : Romée ...
- 263 *Oxyanthus speciosus* ... XV : *ajouter* : Kondue (Lederm.).
- 264 *Feretia apodanthera* ... XV : Mukenge (Pg.).
- 269 *Plectronia Oddoni* ... *au lieu de* *Pletronia.*
 " — *venosa* ... *lire* : XVI [et non VI] Lukafu.
- 272 *Craterispermum brachynematum* ... XII c : [et non XII] Gombari ...
- 274 *Pavetta Baconia* ... XIII d [non XII d] env. de Kasongo ...
- 278 *Coffea Royauxii* ... XII b [et non VII] Bili ...
- 281 *Psychotria cristata* ... *lire* : XII c : Munza ...
 " — *Gilletii* ... *lire* : IV : entre Tumba et Kimpesse (Gill.). — V : Kisantu ...
- 284 *Geophila involucreta* ... IX [et non IV] Luozi ...
 " *Trichostachys microcarpa* ... IV : Tumba (Dem.). — V : env. de Kimuenza ...
- 287 *Mitracarpum scabrum* ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
- 320 *Pachystele cinerea* *Pierre* var. *cuneata* ... IX [et non IV] Luozi ...
- 324 **Mayepea** [*Linociera*] **luluensis** *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 829 [nom. tant.].
 1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 341 **Alstonia viscosa** *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 829 [nom. tant.].
 1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 345 **Voacanga Thouarsii** *Roem. et Schult.* *Syst. veget.* IV (1819) 439; *Stapf* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 154; *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 829.
 1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 346 *Strophanthus Dewevrei* ... XV : *ajouter* : Kondue (Lederm.).
- 352 **Baissea angolensis** *Stapf* in *Kew Bull.* (1894) 126 et in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', 209, 611; *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 827.
 1906? (S. Lederm.). — XV : Kondue (Lederm.).
- 354 *Oncinotis glandulosa* ... *au lieu de* VII, *lire* : VIII : Eala ...
- 368 **Mostuea hirsuta** [*T. Anders*] *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* IV', (1902) 509.
Coinochlamys — *T. Anders.* ex *Benth. et Hook. f.* *Gen. pl.* II (1876) 1091; *S. Moore* in *Trim. Journ. of Bot.* (1876) 321, t. 182, fig. 2; *Engl.* in *Sitz. Preuss. Akad. Wiss.* XXXVIII (1908) 829.
 1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 371 *Strychnos congolana* ... *et non* *Strychnos.*

Page

- 391 Solanum aethiopicum ... *lire* II a : Yema-Lianga ...
- 396 Capsicum conoides ... *lire* : 1870 (G. Schweinfurth) *et non* 1901 (J. Gillet).
- 406 Sopubia latifolia ... XV [et non XVI] Mukenge ...
- 409 Spathodea nilotica ... XV : Mukenge (Pg.).
- 410 Markhamia tomentosa ... XV : Mukenge (Pg.).
- 411 Stereospermum Kunthianum *Cham.* ... 1851? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.). — XVI [et non I] : rég. du Lac Moero (Verd.).
 " — Verdickii ... *au lieu de I lire* : XVI : Lac Moero ...
- 427 Lepidagathis Laurentii ... *lire* : 1903 [et non 1894] ...
- 431 **Duvernoya extensa** [*T. Anders.*] *Lindau* in *Engl. Pfl. Ost-Afr.* (1895) 372; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 827.
Justicia — *T. Anders.* in Journ. Linn. Soc. VII (1864) 44; *Clarke* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 206.
 1906? (S. Ledermann). — XV : Kondue (Lederm.).
- 436 **Vitex Buchneri** *Guerke* in *Engl. Jahrb.* XVIII (1894) 166; *Bak.* in *Dyer Fl. trop. Afr.* V, 331; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.
 1881? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 437 *Vitex camporum* ... [err. *cal. congorum*] *Buett.* ex *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.
 1883? (P. Pogge) ... XV : Mukenge (Pg.).
- 438 Clerodendron capitatum ... 1883? (P. Pogge). -- XV : Mukenge (Pg.).
- 439 — myricoides ... XV : Mukenge (Pg.).
- 440 — scandens ... XV : Mukenge (Pg.).
- 441 — [Kalaharia] spinescens ... XV : Mukenge (Pg.).
- " — volubile ... XV : Mukenge (Pg.).
- 447 Plectranthus miserabilis ... *lire* : XV [et non XVI] Mukenge (Pg.).
- 448 Aeolanthus adenotrichus ... *lire* : 1899 [et non 1891] ...
- 458 Cyathula prostrata ... *lire* : IV : Lukungu, Lutete (Hens). — V : env. de Léopoldville (Luja).
- 467 Aristolochia Schweinfurthii ... XV : Kondue (Lederm.).
 " Piper guineense ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
- 468 — subpeltatum ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
- 477 **Euphorbia Candelabrum** *Trémaut* ex *Kotschy* in Mitt. Geogr. Gesells. Wien, I (1857) 169; *Boiss.* in *DC. Prodr.* XV², 84; *Berger* *Sukkul. Euphorb.* (1907) 73; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 829.
 1881? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 479 Bridelia micrantha var. ferruginea ... XV : Mukenge (Pg.).
- 484 Antidesma venosum form. glabrescens ... *lire* : XVI [et non XIII] : Lukafu ...
- 485 Uapaca Marquesii ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
- 486 Hymenocardia acida ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).
- 487 — ulmoides ... XV : Kondue (Lederm.).
- 488 Microdesmis puberula ... XV : Kondue (Lederm.).
- 489 Manniophyton africanum ... XV : *ajouter* : Mukenge (Pg.).

- Page
490 Poggeophyton aculeatum ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 491 **Claoxylon columnare** *Muell.-Arg.* in Flora, XLVII (1864) 437
et in *DC. Prodr.* XV², 776; *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad. Wiss.
XXXVIII (1908) 829.
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 494 Alchornea cordifolia ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
495 Argomuellera macrophylla ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
499 Maprounea africana ... XV : Mukenge (Pg.).
- 500 **Sapium cornutum** var. **africanum** *Engl.* in Sitz. Preuss. Akad.
Wiss. XXXVIII (1908) 829 [nom. tant.].
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 501 **Chaetacme aristata** var. **kamerunensis** *Engl.* in Sitz. Preuss.
Akad. Wiss. XXXVIII (1908) 828 [nom. tant.].
1883? (P. Pogge). — XV : Mukenge (Pg.).
- 502 Dorstenia mogandjoensis ... 1905 (Marc. Laurent) ... *et non* 1908.
503 — Verdickii ... lire : XVI [et non XV] Lukafu ...
" Trymatococcus kamerunianus... XV : Kondue (Lederm.)... [T. kameruniensis].
- 505 **Ficus Dreypondtiana** *L. Gentil* in Rev. Hort. belge, XXXII
(1906) 85, cum ic.
1905 (Éd. Lesclauwaet). — C. dans la région du Lualaba-Kasai [XV-XVI]
(Lescr.). — XV : Kondue (Declercq, Gent.). — XVI : Haut-Lualaba (Rom.).
- 509 **BOSQUEIA** Thou. *C'est à tort, croyons-nous, que les auteurs ont modifié ce
nom que Thouars a écrit BOSQUEIA.*
" Bosqueia angolensis ... [B. Welwitschii *Engl.*] ... XV : Kondue (Lederm.).
- 510 **BOSQUEIOPSIS** *De Wild. et Th. Dur.* [et non BOSQUEIOPSIS].
" Myrianthus arborea ... XV : ajouter : Mukenge (Pg.).
- 514 Ottelia halogena ... lire XIII c : [et non XIII e].
528 Angraecum Pynaertii ... lire : 1906 [et non 1986].
542 Renealmia bracteata ... lire : 1889 [et non 1899].
550 Avant **MUSA L.** intercaler **MUSACEAE**.
573 Eichornia natans ... ajouter : *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908)
233.
... V : rég. de Kisantu (Gill. 3800).

HETERANTHERA R. et P.

- 573 **Heteranthera Kotschyana** *Fenzl ex Solms* in *Schweinf.* Beitr.
Fl. Aethiop. (1867) 205; *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII,
3; *De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo*, II (1908) 232.
1902 (J. Gillet et L. Gentil). — IV : Kitobola; Tumba (Ém. et M. Laur.).
— VI : vallée de la Djuma (Gent.; Gill. 2902).

MONOCHORIA Presl.

Page

573 **Monochoria africana** [Solms] *N. E. Br.* in *Dyer* Fl. trop. Afr. VII (1901) 5; *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 233.

M. vaginalis Presl var. — *Solms* in *A. et C. DC.* Monog. Phan. IV (1883) 521.

Ann. ? (V. Durant). — XV : rég. du Kasai (V. Dur.).

574 Lire **POLLIA** au lieu de **PCLLIA**.

589 Hydrosme Leopoldiana ...

Amorphophallus — *N. E. Br.* ... *De Wild.* Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, II (1908) 233.

... VI : rive droite du Kwango (Gent.).

611 *Kyllingia pumila* var. *rigidula* Clarke ... au lieu de : 1895 (P. Dupuis)

V : (Gillet) ... lire : 1874 (Fr. Naumann) ... V : Kisantu (Gill.)

633 *Panicum interruptum* et non *Panicum* ...

TABLEAU MONTRANT, PAR FAMILLE,
LE NOMBRE D'ESPÈCES OBSERVÉES DANS CHAQUE DISTRICT.

Dicotyledoneae	I. — BANANA.	II. — BOMA.	III. — MATADI.	IV. — CATARACTES.	V. — STANLEY-POOL.	VI. — KWANGO.	VII. — LAC LÉOPOLD II.	VIII. — ÉQUATEUR.	IX. — BANGALA.	X. — UBANGI.	XI. — ARUWIMI.	XII. — UELE.	XIII. — PROV. ORIENTALE.	XIV. — RUZIZI-KIVU.	XV. — KASAI.	XVI. — KATANGA.
Ranunculaceae		2			3	1										6
Dilleniaceae				1	5			1	3		1	1	1		3	
Anonaceae	1	7		1	15	2	2	6	8		3	3	1		11	1
Menispermaceae		1		1	2		1	1	1						2	
Nymphaeaceae		2		1	2	1		1	1			2			2	2
Cruciferaeeae		1			2			1	2				1		1	
Capparidaceae	3	3		1	6	5	7	4	3	1	6	2	2		6	6
Violaceae		6	2	1	4	1		2	1				3	1	2	
Bixaceae		3		2	9	6	2	5	4		6	4	2		10	2
Polygalaceae	1	1			6	4	2	2				2	1		4	5
Caryophyllaceae	1			1	4	2								1	2	1
Portulacaceae					4		1	2	3	1		2			1	1
Hypericaceae	2	3		1	3	1	1	3	1		1			1	1	3
Guttiferaceae	1	3			5	2	2	5	1		3	1	2		4	2
Dipterocarpaceae												1				2
Malvaceae	6	12	8	4	20	9	4	14	12	3	2	9	4	2	7	25
Sterculiaceae	1	6		2	13	3	3	6	4	1	6	10	5	1	14	6
Scytometalaceae					1	1		2			1				2	
Tiliaceae	3	5	1	3	19	7	6	10	11	1	3	5	7	3	10	10
Linaceae				2	3			4	1		1				3	1
Malpighiaceae	1	1	1		4				1				1			1
Geraniaceae														1		
Oxalidaceae		2		2	2						1		2		1	4
Balsaminaceae		4		1	2	1		2	4		2	5		2	4	6
Rutaceae					6	2			2				1		4	2
Simarubaceae		2		1	2	1	2	3	1		1	1			2	1
Ochnaceae	1	2		2	17	7	1	2	4	1		1	4		8	3
Burseraceae		2		1	1			1	1				1		2	1
Meliaceae	1	2			6	4	1	11		1	3	1	2		4	3
Dichapetalaceae		3			2			2	2		1	1	1		4	
Olacaceae	1	2		1	15	7	2	9	5	1	2	1	1		9	2
Celastraceae					1								1			1
Hippocrateaceae	1				3			10	4		5		1		5	2
Rhamnaceae		1		1	1			2	1				1		1	1

Dicotyledoneae.	I. — BANANA.	II. — BOMA.	III. — MATADL.	IV. — CATARACTES.	V. — STANLEY-PPOOL.	VI. — KWANGO.	VII. — LAC LÉOPOLD II.	VIII. — ÉQUATEUR.	IX. — BANGALA.	X. — UBANGI.	XI. — ARUVIMI.	XII. — UELE.	XIII. — PROV. ORIENTALE.	XIV. — RUZIZI-KIVU.	XV. — KASAI.	XVI. — KATANGA.
Ampelidaceae	1	7		4	3	2	3	3	8	2	2	5	3		5	8
Sapindaceae		3		6	9	3	2	4	6	1	1	3	2		9	4
Anacardiaceae		6	2		8		1	2	1			1	1		2	4
Moringaceae		1										1				
Connaraceae		9		2	14	4	5	3	8	1		3	2		16	5
Leguminosaceae	17	71	18	19	199	39	22	97	38	8	20	27	28	7	106	130
Rosaceae	1	2		1	6	3		1	1		1		1	2	1	2
Crassulaceae				1	1			1	1						1	2
Droseraceae					2											
Rhizophoraceae	1	1			1	1		1								
Combretaceae	2	9	1	1	11	6	2	9	5		4		1		6	14
Myrtaceae	1	3		1	8	4	1	3	2		2	1	1		1	1
Melastomataceae	1	11	1	4	29	10	5	15	9		4	17	5		19	6
Lythraceae		2							1				1			
Onagrariaceae		3		2	5	3	2	2	3	1		1	1	1	2	
Samydaceae		1		4	4			4	2		1				3	1
Turneraceae	1	1	1	1	1											1
Passifloraceae		3		1	8	4	4	6	5			1	1		9	
Cucurbitaceae	1	15	1	3	16	1	2	9	8	1	3	6	5		11	5
Begoniaceae		2					2	5	1		4	7	4		2	2
Cactaceae		1			1	1		1		1	1	1	1		1	
Ficoïdaceae	2	1	1		5			1		1					1	1
Umbelliferaceae				1	3									1	1	4
Araliaceae														1		1
Rubiaceae	3	55	3	26	130	49	38	86	50	12	34	42	40	1	82	44
Dipsaceae																2
Compositaceae	5	33	4	16	66	19	12	17	11	1	6	30	24	4	41	40
Campanulaceae		2		1	3	1		1					1			5
Ericaceae																1
Plumbaginaceae	1	1			1											1
Myrsinaceae							1	1				1				1
Sapotaceae		1			3	2	2	5	2	3	2				5	1
Ebenaceae								1				1				2
Oleaceae	1					1			1	1		2			1	3
Apocynaceae	4	22	1	8	55	26	21	61	24	9	23	33	15		54	12
Asclepiadaceae		5	2	5	36	11	3	4	3	1		3	7		12	21

Dicotyledoneae.																
	I. — BANANA.	II. — BOMA.	III. — MATADI.	IV. — CATARACTES.	V. — STANLEY-POOL.	VI. — KWANGO.	VII. — LAC LÉOPOLD II.	VIII. — ÉQUATEUR.	IX. — BANGALA.	X. — UBANGI.	XI. — ARLWIMI.	XII. — UELE.	XIII. — PROV. ORIENTALE.	XIV. — RUZIZI-KIVU.	XV. — KASAL.	XVI. — KATANGA.
Loganiaceae	1	4	1		14	5	2	2	5		2	5	3		9	3
Gentianaceae					10	3	1	3	2				2		3	7
Hydrophyllaceae				1												
Boraginaceae	1	3	2	1	4			1	2		1	2	1		1	6
Convolvulaceae	6	19	1	7	25	4	2	8	10	3		8	3		9	25
Solanaceae	1	12	2	5	10		5	13	5	2	2	6	5		12	5
Scrophulariaceae	3	9	3	3	22	8	1	3	5		1	4	2		11	11
Lentibulariaceae		1			4	1		1							1	
Gesneraceae																1
Bignoniaceae		5	1	2	5	4		3	2	1	1	3	1		4	8
Pedaliaceae		1		1	2	2			3			3	2		4	2
Acanthaceae	2	18		10	42	11	2	12	15	3	4	9	11	4	15	52
Verbenaceae	2	9	2	3	20	7	3	6	3		1	5	3		16	15
Labiataceae	2	9	2	6	19	14	4	11	5	1	1	10	11	3	20	21
Nyctaginaceae	2	2		1	3	1		3								
Amarantaceae	6	8	1	8	3	3	2	6	7		1	3	5	3	7	8
Chenopodiaceae				1	1	1		1		1			4			1
Phytolaccaceae		1		1	3	1	2	2	3			1	1		1	1
Polygonaceae		3	1		6	2	2	6	1						2	2
Podostemaceae						2							1		2	
Cytinaceae																1
Aristolochiaceae		1			1							1			2	
Piperaceae		1			3	3	2	3	2		1	2	2		2	1
Myristicaceae		1			1			1			1					
Lauraceae	1		3		5											
Proteaceae					1										2	3
Thymelaeaceae					1	2			1				1		2	5
Loranthaceae	1	4		2	11	3	1	7	4	2	3	1			8	4
Santalaceae					1											
Balanophoraceae					1		1	1	1						1	
Euphorbiaceae	8	33	5	15	62	21	21	44	24	5	15	16	19	1	53	26
Urticaceae		17		5	36	4	10	17	8	2	8	11	11	1	23	10
Ceratophyllaceae					1			1							1	
	102	508	71	209	1133	359	226	609	379	73	198	328	277	41	731	647

	I. — BANANA.	II. — BOMA.	III. — MATADI.	IV. — CATARACTES.	V. — STANLEY-POOL.	VI. — KWANGO.	VII. — LAC LÉOPOLD II.	VIII. — ÉQUATEUR.	IX. — BANGALA.	X. — UBANGI.	XI. — ARUWIMI	XII. — UELE.	XIII. — PROV. ORIENTALE	XIV. — RUZIZI-KIVU.	XV. — KASAI.	XVI. — KATANGA.
Monocotyledoneae																
Hydrocharitaceae					3							1	1			1
Burmanniaceae					2								1			
Orchidaceae	1	8		9	43	9	17	57	7	2	8	24	25	1	33	23
Flagellariaceae	1	1		1			1	1								
Zingiberaceae		8		1	10	1	1	5	2	1		2	3		5	4
Marantaceae		9			9	6	2	7	6	2	2	2			3	1
Cannaceae		1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	
Musaceae				1	2			1				1	1			
Haemodoraceae		1			1				1		1		2		1	
Iridaceae		3		2	4	3		1								10
Amaryllidaceae		6		1	4	6	1	1		2		2	3		3	4
Taccaceae					1	1						1			1	
Dioscoreaceae		2		2	11		2	3	4			3	3		2	5
Liliaceae	2	8	1	11	20	10	4	9	6	2		3	5		20	20
Pontederiaceae					1											1
Xyridaceae								2					1			1
Commelinaceae		13		7	30	6	4	6	8		4	3	7		16	8
Palmaceae	1	4			5	2	1	7			1	3	2		6	3
Pandanaceae		1			1											
Araceae		6		2	13	5	3	3	1		1	2	3		7	
Lemnaceae					2				1							
Alismaceae						1		1								
Eriocaulonaceae					2		1						1			
Cyperaceae	4	32	7	33	85	6	11	18	20		6	8	6	1	23	16
Graminaceae	13	40	7	41	80	10	22	19	22	8	2	4	15	9	32	19
	22	143	15	111	330	67	71	142	79	17	25	60	80	12	153	116
Gymnospermeae																
Gnetaceae		1				1	1	1	1							
Cycadaceae						1									1	
		1				2	1	1	1						1	
Dicotyledoneae																
	102	508	71	209	1133	359	226	609	379	73	198	328	277	41	731	647
Monocotyledoneae	22	143	15	111	330	67	71	142	79	17	25	60	80	12	153	116
Gymnospermeae		1				2	1	1	1						1	
	124	652	86	320	1463	428	298	752	459	90	223	388	357	53	885	763

RÉPERTOIRE DES NOMS VERNACULAIRES.

A			
Abakussi	122	Bankause	173
Abodo	331	Bankusale	637
Abutadjamba	334	Banzua	478
Acisa	308	Bao	173
Adjokosetamba	331	Bapenongwala	334
Adolimi	75	Barakota	326, 331
Afridi na hima	336	Bari	329
Aguka	343	Basaka	149
Ahanguila	329	Basasanga	541
Akariabeti	329, 330	Basesei	149
Akutshu-Aramba	334	Batieke	500
Alimne	135	Batshindjii	335
Andjolia	45	Bavoapanda	295
Angbeni	53	Bawamauri	501
Angwanga	329	Bekenge	72
Asangia	329	Bekonge	72
Assuroli	122	Beli	90
Autontongo	336	Belukonge	72
Averu	300	Bemba-Bemba	417
Aworo	637	Benene	344
		Beti	395
		Biabilondo	203
		Bienga	258
		Bietji	339
		Bikule	329
		Bikuri	329
		Bimba	337
		Binga	443
		Binganganan	68
		Binsonculon	67
		Biombian	329
		Biombio	328
		Bionuda-Ipeba	457
		Bioto	305
		Bisloka	617
		Biti	309, 393
		Bitopa	331
		Bitope	331
		Bituba	329
		Boala	183
		Boandsu	258
		Bobalabaneba	250
		Bobo	325, 330
		Bobole	350
		Bocca	342
		Boconambo	544
		Bofeko	489
		Bofumbo	68
		Bofumbu	70
		Bojudjuma	443
		Boka	138
		Boka-Napombo	268
		Bokaie	53
		Bokaie-Itende	56
		Bokai-Limpata	54
		Bokakate	279
		Bokinku	135
		Bokobele	523
		Bokoli	20, 99
		Bokongo-Bomponpono	167
		Bokunge	45
		Bolaka	45
		Bolanga	479
		Bole	329, 350
		Bolengue-Moidi	417
		Boli	351
		Bolico-Bolico	334
		Bolinda	53
		Bolivo	247
		Bolle	350
		Boloko	45, 468, 529
		Bolombola	327, 328
		Bolombolo	326
		Bolongo	45
		Bolovo	577
		Bolundu	337
		Bolundu-Kete	329
		Bolundu-Mabe	337
		Bomanga	321
		Bombali	176
		Bombari	176
		Bombo	314
		Bombombolu	163
		Bombwoke	350

F

Filu	437
Filulolo	258
Fontu	165
Fulu-M'Boa	331
Fumgatata	155
Fumu	504
Fundiakima	330

G

Gadi	46
Galagale	28
Galonga	171
Ganenkuye	332
Gangale	171
Ganga-Tibie	206
Genia	264
Geto	467
Giadidi	46
Gluka	352
Goïo	371
Gomvonboza	143
Gonfe	196
Guba-Gwela	481
Gubia	441
Gudia-Muni	501
Gula	163
Gula-Gwedi	481
Gulumgu	551
Gulumu-Kumba	511
Gungova	567
Gungu-Bu-Dutu	326
Guzu	633

I

Ibenge	391
Iboboro	328
Ibongo	155, 297
Icasagne	203
Icota	62
Iendu	203
Ifambalankoce	498
Ifuafua	24
Ifuige	308
Ignia	577
Ikaïe	62, 206
Ikatabao	308
Ikekeke	329
Ikele	329
Ikobulé	54

Ikoko	488
Ikola	52
Ikonana	456
Ikonga	293
Ikongolo	173
Ilanga	556
Iléla	559
Ilkiwagurta	107
Iluié	559
Ilombo	326
Ilombola	327
Ilotça	468
Ilumbe	20
Imbali	176
Inga	327
lukoko	488
Intfundu	31
Intomba	75
Intsimi	53
Ipea	457
Ireh	350
Isike	488
Isote	351
Itadje	509
Itali	504
Itatamba	109
Itedji	509
Iteka	334
Ito	463
ltofi	333
Itombe	75
Itutangali	505

J

Jaba	288
Jada Samba	537
Jakoi-Loko	257

K

Kabala	133
Kabale-Bale	324
Kabanga	31
Kabangui	502
Kabaye	503
Kabonga	314
Kabonguele	461
Kabuko-Pakana	492
Kabulu	332
Kabutumpa	357
Kabwebwa	641
Kacegnengui	186

Kachukutu	634
Kadi-Kungu	427
Kadjanga	329
Kaembe	331, 333
Kafasukiïe	479
Kafita	134
Kafoi	151
Kafoïne	300
Kafulo	156
Kafungando	411
Kafungu-Kakoma	174
Kafuta	49
Kaïa	332
Kaido-Kom	206
Kaïe	492
Kaïembe?	330
Kaïobo	452
Kakabolo-Kampanga	378
Kakasalla	484
Kakiïdu Kiïdu	131
Kakissa-Kissa	199
Kakobwoï-Kobwoï	472
Kakoloka	486
Kakungui	193
Kakunta-Puku	372
Kalamandu	395
Kalamato	481
Kaleala	210
Kalemba-Kaluma	621
Kalembele	394
Kalemdu	140
Kalimbu	598
Kaloja	644
Kalolo	643
Kalombo-Lombo	337
Kalonga-Longa	46
Kaluangwe	306
Kaluma	290
Kaluma-Kalenda	109
Kalumu-Kulu	30
Kalundi-Kumi	14
Kalungu	343
Kamatutu	198
Kambalubala	131
Kambete	596
Kambiru	35
Kame-Nene	468
Kamima	122
Kamiïombo	438
Kampaki	32
Kampanda panda	145
Kampululu	241
Kampumboï	285

Kamutofwa	389	Kausjapu	415	Kilonga	75
Kan	281	Kavenrou	49	Kilungu	45
Kananana	457	Kavungu-Vungu	15	Kimabuka	486
Kandalupire	349	Kawsala	439	Kimbandji	644
Kanga-Nzo	493	Kayebule	411	Kimbanza	596, 646
Kanichi	439	Kayioba	643	Kimena	81
Kankomo	104	Kazan	155	Kimonga	301
Kanseke	559	Kazitanda	495	Kindana	143
Kansoki	636	Keaborina	279	Kindandu	331, 333
Kansolo-solo	118	Kekansu	237	Kindinga	331
Kantu-lintulu	402	Kekoko	501	Kingo (fruit)	196
Kanzanga	318	Kela	326	Kinkandja	124
Kapekille	268	Kelekese	198	Kinkolela	261
Kapulumba	261	Keleketon	467	Kinkumi	54
Kapumpo	124	Kelela	330	Kinkwite	329
Kapumpu	627	Kelobo	147	Kinokoto	33
Karibululu	300	Kembaki	345	Kinongo	298
Karici	299	Kenge	551	Ki Nsangia	45
Karikete	459	Kengwalala	151	Kinseka	182
Kasagola	323	Kenia	309	Kinselele	453
Kasai	299	Keongo	52, 72	Kiomeome	309
Kasakala	198	Kesekemeka	514	Kionga	173
Kasakalla	30	Ketendolo	104	Kipanga	238
Kasakola	495	Keurwe	35	Kipangu	84
Kasa-Sanga	264	Kiamvu	502	Kipanzua	478
Kasausa	30	Kiape	556	Kisamba-Kwe-Kwe	179
Kaseniengue	126	Kibaka	144	Kisangama	105
Kashongo	29	Kibala	431	Kisani	37
Kasikamba	227	Kibano-Bango	458	Kisania	37
Kasikesike	403	Kibembele	641	Kisi	412
Kasilu	274	Kibemlese	357	Kisiwegue	171
Kasjinkamballa	402	Kibenbele	601	Kisjima-wa-Gululu	156
Kasolo	48	Kibete-Kibete	265	Kisjinko	324
Kasonga-Kabasji	349	Kibimbia	165	Kisongwo	147
Kasonswe	135	Kiboga	56	Kisowa	380
Kasuku-Suku	298	Kibongi	551	Kitele	458
Kasukutu	644	Kibongo-Makungi	513	Kitete	86
Kasungana	109	Kibubia	272	Kitjangulula	318
Katafumba	513	Kibusjii	270	Kitjipi	148
Katali-tali	156	Kichilo-Kiabeto	394	Kitjipitjipi	148
Katanda	229	Kifanga-Fanga	301	Kitondo	535
Katandi	574	Kifula-Buta	201	Kitotolo	174
Katatumba	293	Kifulimitjii	411	Kitoya-Kamono	393
Katchilo	312	Kifumbi	174	Kitwangele	412
Katinga	452	Kikebe-Beteli	238	Kiungu	72
Katingoko	459	Kikiki	258	Kiupe	280
Katingwe	391	Kikoba-Koba	411	Kizango-Banza	391
Katisa	267	Kikungu	497	Kloro	320
Katolle-Tolle	484	Kilama	71	Kmoka	502
Katongulu	572	Kilanga	258	Kodolembe	332
Katshongo	29	Kilao-Lao	598	Kofu	311
Katundula	442, 452	Kilengu-Longue	598	Koito	296
Kausale	406	Kilimboi	344	Kokoko	194

Kokoloko 547
 Kokolola 317
 Kokotwa 641
 Kolania-Lania. 423
 Kole 329
 Kolekole 514
 Kolembe-Lembe 312
 Kolokasi 459
 Koloko 492
 Kolokoso 308
 Kolokote 496
 Kolongo. 559
 Kolumbwa 632
 Kombodi 366
 Komboi 152
 Kommolobilo 130
 Kondoku 210
 Kongo 545
 Konko-koso 459
 Kopunga-Umba 186
 Kosa 489
 Kot-Koti 638
 Koto 591
 Koto-Koto 250
 Krenda-Nameceka 462
 Kubilonga 384
 Kububa 242
 Kuia 508
 Kukuankuko 486
 Kukuma-Suza. 495
 Kula-kula 193
 Kuli-kuli 193
 Kulutu 552
 Kumu 299
 Kundjialealeya 159
 Kusa-Kusa. 409
 Kusoi-Sanpuku 423
 Kutumbulu 120
 Kwakwa 37
 Kwanta 305
 Kwantala 173
 Kwisa 521
 Kwonne. 596

L

Lalo 84
 Lamata 501
 Lebwa 280
 Leco 378
 Lefide 312
 Lehani 442

Lekambe 601
 Lemalema 310
 Lembause 643
 Lembila. 239
 Lemboi-lo-Diango 158
 Lendja 108
 Libunji 494
 Ligo 61
 Likile 491
 Limboso 176
 Limoke 231
 Limu. 350
 Lingia-Rabasha 644
 Lisuki 329
 Lobombo 495
 Lobuma 353
 Lobwe 464
 Locombe-Combe 391
 Locoso 171
 Lofamdjola. 482
 Lofandjii-Joku 220
 Lognie 442
 Lokaka 118
 Lokalia 330
 Lokama-Kama 572
 Lokasa 298
 Lokeke 63
 Lokili 460
 Lokonge 72
 Lokongo 546
 Lokopo 434
 Lokuku 468
 Lokwanta 31
 Loledja 352
 Lolelengi 638
 Lolika-Ikolo 337
 Loliki 334
 Lolimissa 305
 Lolo 23, 94
 Lolokemdamba 174
 Lololo 312
 Londgendje 491
 Lonengue 442
 Longenge 36
 Lopangui-panga 133
 Lopundja 342
 Lopundu 340, 342
 Losele 210
 Lotiti 72
 Lotoloto. 493
 Lotombo 75
 Luangane 242
 Luanzu 107

Luba-Langwo 498
 Lubeso 175
 Lubula-kutu 109
 Lubulukutu 102
 Lufuka 437
 Lukata 331
 Lukonde-N'Bo 199
 Lukonga 72
 Lukosa 56, 489
 Lukuio 508
 Lukunatchima 330
 Lukunga-Moka 173
 Lukusa 489
 Lumbalumba 32
 Lumpundu. 341
 Lunda 331, 583
 Lundula 441
 Lungue 461
 Lunsekwe 644
 Lupembe 325
 Lupipi 162
 Lurakasa 307
 Lusada 28
 Lusaka 511
 Lusamba-Samba. 512
 Luseke 622
 Lusemgue 498
 Lusepo 536
 Lusole 62
 Lusube 481
 Lusu-Lusulo 443
 Luvanki. 133
 Luvungi-Vungi 556
 Luzizi 387
 Lwaga 149
 Lweo. 636

M

Mababalo 338
 Mabaie 491
 Mabingobingo 637
 Maboki 335
 Mabole 541
 Mabolela 270
 Mabunda 28
 Machila-Ambacha 139
 Macumba 393
 Macumbu-Macumbu 300
 Madelemba 27
 Madiaka 335
 Madibo 583

Madimbi	334	Masisi	334	Moengue	339
Madungu	328	Masoha	491	Moganza	106
Mafumbo	39	Massongolo	583	Mohala	28
Magnieri	79	Matata	579	Moibanganga	44
Magwadabirada	241	Matete	546, 637	Mojjaenka	227
Maicle	478	Matjitji	561	Moingele	21
Majampa	240	Matofe-Ampumba	326	Mojon	331
Makaïe	56	Matofe-Mongo	329	Mokasi	223
Makalanga	331	Matoli	328, 329, 331	Mokekéri	62
Makolle	64	Matopi	331	Mokengereke	487
Makolokosa	17	Matosa	312	Mokengue	467
Makongi	72	Matotolo	484	Mokindu	258
Makonkomo	223	Matudulu	228	Moko	60
Makotunkotu	27	Matulu	638	Mokoli	18
Makuba	26	Matwi-Kabula	116	Mokolokaka	483
Makuku	329	Maucundra	148	Mokoluko	501
Makuntju	342	Mautuntu	307	Mokongi	72
Malalenko	260	Maybole	412	Mokonki	72
Malamboi	604	M'Banza	135	Mokoyole	491
Malari	283	Mbara	340	Mokulo	203
Malebumuki	306	Mbatieke	500	Mokulu	203
Malebunukai	434	M'Bitti	333	Mokulumbi	203
Malemanso	328	M'Bole	351	Mokwa	327
Malola	329	Mbota	134	Mokwaa	331
Malole	383	Mboyo	90	Moleama	293
Malolela	270	M'Butu	136	Molenda	54, 412
Malombo	325	Mcaca	128	Molobiola	75
Malonga	571	Mdungu	229	Moloko	136
Malucu	240	Mecece	105	Moloma	331
Malumba	443	Metete	645	Molonga	295
Malumbo	331	Mfufu	495	Molumba	419
Malumboi	154	Mfumfu	495	Molundo-polo	156
Mambele-Bela	596	Midiadi	544	Mombate	409
Mambulinkanka	71	Midilla-Kuha	30	Mombatieke	500
Mamonpete	227	Mioba	231	Mombina	231
Mampombo	190	Mitesa	577	Mombinxo	204
Mampoto	334	Mititi	495	Mombo-Koma	196
Manakasa	307	Mitoko	136	Momboka	293
Manduli-Duli	295	Mkando	23	Mombulu	83
Manenobe	249	Moala	242	Momfimi	53
Mangasa	155	Moba	389	Momomo	337
Mangue	627	Mobala	183, 274	Mompoco	204
Manicolo	248	Mobanga	29	Mompompolo	258
Mansongo	583	Mobole	351	Momponpo	325
Mantiri	462	Moboli	351	Mompusu	257
Manzenga	334	Mobuli	350	Monabata	311
Mapalo-Mopala	60	Mochia	69	Monbatza	70
Mapeleko	333	Mochochia	69	Moncagui	393
Mapolo	395	Mocingate	258	Mondeka	491
Mapunda	191	Moçoçoïe	443	Mondembo	350
Mariguongo	350, 351	Moçoçolo	443	Mondondono	243
Masindu	334	Mocombe	458	Mondonga	330
Masinja	334	Modi-Katala	57	Mondongo (?)	326, 331

Mondunga	350	Mpusa	325, 328	Munkwasa	221
Mondungu	541	Mputo	223	Muntangia	147
Monemena	383	Msoko	149	Muntoni	45
Monganagana	91	Mtinku	250	Muntusu	510
Mongangila	24	Mubalakula	164	Mupakuma	158
Mongombe	343	Mubanga	169	Mupapa	178
Mongongome	489	Mubinga-Kisvoo	31	Mupepe	350
Mongongongo	352	Mu-Buinbu	114	Mupopo	397
Monie-cama	83	Mubuta	346	Mupundu	191
Monkeka	344	Mudjian-Bubu	593	Musabela	338
Monkiso	488	Muemie	328	Musadi	480
Monkoso	248	Muesa	187	Musafoi	86
Monkukono	223	Mufinsa	203	Musaisa	30
Monkwe	514	Mufishu	47	Musaka	28
Monondongo	330	Mufula	269	Musali	350
Monsingisa	491	Mufutu	436	Musamba	177
Montende	497	Muilu	347	Musanga	27
Montendo	497	Muisambague	462	Musanga-Saya	48
Montone	350	Mujikiinsi	92	Musasa	423
Montoni	45	Mukasu	437	Musase	188
Montusu	510	Mukoko	58	Musemjesji	172
Montutu	462	Mukonki	71	Musenge	463
Monwe-Monwe	122	Mukonli	259	Musense	491
Mooti	175	Mukosobola	562	Mushe-Tjifufia	484
Mopolambamba	250	Muku	156	Mushi Brook	583
Mopukabuko	266	Mukulia	242	Musokolobe	485
Mosalasala	484	Mukutu	165, 179	Musombele	315
Mosalata	301	Mukwa	21	Musonga-Songa	453
Mosale	350	Mukwakasa	268	Musongwa	264
Mosamba	489	Mulama	199	Musula-Kurri	400
Mosampo	31	Mulanga	169	Musulidi	410
Mosanganda	325	Mulembe	347	Musum	410
Mosapa	29	Mulembo	164	Musumbo	326
Mosasala	351	Mulemdu	412	Musunganene	482
Mosasanga	543	Mulengroo	426	Mutabu	62
Mosatwa	29	Mulimba-Limba	339	Mutama	366
Mosele	337	Mulumbu	195	Mutanea-Gommo	203
Mosere	337	Mulolo	85	Mutechia	630
Moshinshieli	477	Mulomba	361	Mutemia	638
Mosia	334	Mulongwe	537	Mutesa	143
Mosusulu	353	Mulotte	417	Mutobi-Tubi	552
Motalaci	231	Mululundja	295	Mutondo	164
Motantum	206	Mulumbi-Lumba	484	Mutuma	201
Motepa	336	Mumbu	393	Mutumbu-Tumbu	159
Motoaton	210	Mumbumu	331	Mutungwee	553
Motola	338	Mundatu	64	Mututa	172
Moto-Moto	644	Mundembo	17	Mutzianvo	313
Motukunkao	496	Munga-Gu	322	Mwaba	32
Mpana	92	Muninga-Sendive	325	M'wanda'M'wanda	70
Mpasa	149	Munkago	146	Mwandandone	143
Mpoi	473	Munkaman	373	Mwofi	164
M'Ponbu	387	Munkanakana	91	Mzinia	264
Mpoto	223	Munkollo-Kollo	373		

N		O			
Nabo	330	Ochio	54	Pussa	53
Nagomgami	340	Okakumbu.	223	Putu-puta	193
Nangwec	61	Okango	330	Putu	440
Naondongo (?).	326	Okeba	337	R	
N'Bumbu	114	Okonga	329	Rakaba	460
Neolie-Akondo	428	Olembo	353	Rongi	481
Ncongo	544	Olole	330	Ruisa	542
Ndala	566	Oloma	330	S	
N'Dale	169	Olva	331	Sachi	242
Ndanan	57	Omokembulo	335	Safoi	365
N'danana	57	Omongemonge	330	Sagna	241
Ndevre	327	Ompampolo	250	Saja	241
Ndzimi	53	Onene	505	Sakagna	510
Né	196	Onguikie	183	Sakala	241
Nea	54	Oshampongo	251	Sakela-Gombo	188
Ngando	349	Osindja	334	Sakonnida	323
Ngomo	632	Osuma	350, 351	Samba	329, 646
Ngotto	195	Otoankima.	325	Samba-Bulubu	319
N'Gula	163	Ottolo	589	Sambabala.	632
N'Gulu-Maza	239	Otungu	337	Sanda	505, 508
Nianga	621	Otutu	229	Sanga	344
Niazi	621	Ouban-Banguée	186	Sangala.	401
Nicena	183	Ouku	263	Sasa	45
Nikanda	329	Oyngasudi	336	Satu-satu	67
Nikonki.	72	Oyongasolo	336	Sekegna	510
Nikuminka	419	P		Sekene	510
Nimengu	204	Palenkima.	337	Sekenia.	510
Ninga	208	Panza	183	Selufo	24
Niniki	183	Panza-za-uenga	73	Seseke	488
Niyaro	97	Pata-Pata	235	Sete	55
N'Kongo	73	Pece	149	Setete	331
Nkosa	489	Pi.	75	Shibolo	23
Nkoza	489	Pingelema	580	Shikoka.	425
N'Kula	163	Pinkekokwa	293	Shikololo	537
Nkusu	512	Pobiru	327	Sibu	71
Nkwakuku.	62	Poces	148	Siki	279
Nla Ngombe	629	Pomboro	186	Sinda	644
Nomana-Mana	456	Pombura	497	Singala-Vunxia	634
Nomlo-Nomlo.	468	Pompo	190	Singa-Singa	578
Nsamba	329	Pongia	220	Sjimbadala.	572
Nscanuma	254	Pongolowe.	387	Sjinko	266
N'Sombala	387	Ponguendole	326	Sjolongo	330
Nsongia.	45	Pongundeli	325	Skaie	62
Ntenteke	491	Ponluka	458	Smanebuko	486
Ntingu	279	Pophangue	133	Sobulolo	92
Nyangwe	135	Popivillo	577	Sokomini	308
Nzamingo	629	Puku-puku	104	Sola	633
Nzilla	562	Puluka	488	Solemosji	133
Nzizi	387	Punga	72		

Sonanaka 184
 Songa 326
 Songania 534
 Songo-Songo 453, 637
 Sonko 331, 333
 Sonkunu 509
 Sonnda 143
 Soro 61
 Sosoi-Sosoi 432
 Sungu-Sungu 632
 Susu 337
 Suza 114

T

Taite 196
 Takataka 53
 Tambo 250
 Tambwe 617
 Tangana 457
 Taulon 175
 Tchungu 279
 Tchungu-Tchungu 173
 Teka 387
 Tenda-Kwari 410
 Tensi 146
 Tentze 325
 Tera-Elungu 62
 Tesi 471
 Teti-Teti 575
 Teuze 122
 Thibulu 337
 Tidi-Tidi 216
 Tintamoi 524
 Titchi 52
 Tjabilonda 107, 162
 Tjama-Zebele 366
 Tjikundi 315

Tjikundu-Kundu 151
 Tjucja 161
 Tobelengue 308
 Toki 306
 Tokinda 333
 Tomba-Tomba 288
 Tondefere 350
 Tondo-iwa-Niamba 488
 Tonsopola 632
 Tori 463
 Towagna 329
 Tsana 559
 Tsentse 337
 Tshamtshakadi 443
 Tshibobobo 325
 Tshikolokose 477
 Tshikwakwa 37
 Tshinchele 335
 Tsinkoliba 267
 Tua-tua 266
 Tumafumba 80
 Tumko 367
 Tumu 45
 Tunga 148
 Tuyaie 288

U

Ude 489
 Uegna 572
 Ukambulu 70
 Undulu 331

V

Vanda-Makolo 104
 Vita-kabela 477
 Vombola 163

Vuda-Buadi 83
 Vuku 240
 Vuma 461
 Vunga 493
 Vungui 305
 Vuuma 574

W

Walaralapira 325, 327
 Wambala 32
 Wandu 157
 Wangate 281
 Washense loshoto 588
 Wasulu 631
 Weloafu 333
 Weinbe 351
 Wenge 496
 Wii 489
 Wuwoko 240

Y

Yama-Yumbi 481
 Yambakulu 495
 Yambokulu 493
 Yambola 179
 Yambonkolo 143
 Yam-Yamve 631
 Yumba 412

Z

Zaira 71
 Zamba 331
 Zelo 646
 Zileni 412
 Zoko 328

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES, DES GENRES, DES ESPÈCES

ET DE LEURS SYNONYMES

[Les synonymes sont imprimés en italiques].

- | | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">A</p> <p><i>Abildgaardia monostachya</i> Vahl. 617.</p> <p>Abrus <i>L.</i> 145.
 <i>canescens</i> Welw. 145.
 <i>precatorius</i> <i>L.</i> 146.
 <i>pulchellus</i> <i>Wall.</i> 146.
 — v. <i>latifoliolatus</i> <i>D. W.</i> 146.</p> <p>Abutilon <i>Gaertn.</i> 50.
 <i>angulatum</i> <i>Mast.</i> 50.
 <i>Cabrae</i> <i>D. W. et T. D.</i> 51.
 <i>Eetveldeanum</i> <i>D. W. et T. D.</i> 51.
 <i>indicum</i> <i>Sweet.</i> 51.
 <i>intermedium</i> <i>Hochst.</i> 51.
 <i>laxiflorum</i> <i>G. et P.</i> 50.
 <i>zanzibaricum</i> <i>Boj.</i> 51.</p> <p>Acacia <i>W.</i> 186.
 <i>ataxacantha</i> <i>DC.</i> 186.
 <i>Buchanani</i> <i>Harms.</i> 186.
 <i>Dewevrei</i> <i>D. W. et T. D.</i> 186.
 <i>Farnesiana</i> <i>W.</i> 186.
 <i>Lahai</i> <i>St.</i> 186.
 <i>Lebbek</i> <i>W.</i> 188.
 <i>Lujaei</i> <i>D. W. et T. D.</i> 186.
 <i>pennata</i> <i>W.</i> 187.
 <i>Seyal</i> <i>Del.</i> 187.
 — v. <i>Lescrauwaetii</i> <i>D. W.</i> 187.
 — v. <i>Sereti</i> <i>D. W.</i> 187.
 <i>Sieberiana</i> <i>DC.</i> 187.
 <i>tortilis</i> <i>Hayne.</i> 187.</p> <p>Acalypha <i>L.</i> 492.
 <i>brachystachya</i> <i>Hornem.</i> 492.
 <i>ciliata</i> <i>Vahl.</i> 493.
 <i>Dewevrei</i> <i>Pax.</i> 492.
 <i>gemina</i> <i>Spreng.</i> 493.
 <i>haplostyla</i> <i>Pax.</i> 492.
 — v. <i>longifolia</i> <i>D. W.</i> 492.
 <i>indica</i> <i>L.</i> 492.</p> | <p>Acalypha
 <i>ornata</i> <i>A. Rich.</i> 493.
 <i>paniculata</i> <i>Miq.</i> 493.
 <i>polymorpha</i> <i>M.-A.</i> 493.
 <i>sessilis</i> <i>Poir.</i> 493.
 <i>Vahliana</i> <i>M.-A.</i> 493.</p> <p>ACANTHACEAE, 413.</p> <p>Acanthopale <i>Cl.</i> 424.
 <i>pubescens</i> <i>Cl.</i> 424.</p> <p>Acanthopsis <i>Nees,</i> 424.
 <i>horrida</i> <i>Nees,</i> 424.</p> <p>Acanthus <i>L.</i> 423.
 <i>arboreus</i> <i>Forsk.</i> 423.
 — v. <i>pubescens</i> <i>T. Thoms.</i> 423.
 <i>caudatus</i> <i>Lindau,</i> 424
 <i>mayaccanus</i> <i>Buett.</i> 423.
 — v. <i>angustifolius</i> <i>D. W.</i> 423.
 <i>montanus</i> <i>T. And.</i> 424.
 <i>Villaeanus</i> <i>D. W.</i> 424.</p> <p>Achimenes <i>sesamoides</i> <i>Vahl,</i> 399.</p> <p>Achyranthes <i>L.</i> 459.
 <i>angustifolia</i> <i>Bth.</i> 459.
 <i>aspera</i> <i>L.</i> 459.
 <i>corymbosa</i> <i>L.</i> 42.
 <i>Heudelotii</i> <i>Moq.</i> 460.
 <i>lanata</i> <i>L.</i> 459.
 <i>lappacea</i> <i>L.</i> 458.
 <i>prostrata</i> <i>L.</i> 458.
 <i>repens</i> <i>L.</i> 460.
 <i>rubro-lutea</i> <i>Lopr.</i> 459.</p> <p>Achyrocline <i>Less.</i> 303.
 <i>batocana</i> <i>O. et H.</i> 303.</p> <p>Acioa <i>Willd.</i> 191.
 <i>Buchneri</i> <i>Engl.</i> 191.
 <i>Dewevrei</i> <i>D. W. et T. D.</i> 191.
 <i>Gilletii</i> <i>D. W.</i> 191.
 <i>Sereti</i> <i>D. W.</i> 191.
 <i>Vanhouttei</i> <i>D. W.</i> 191.</p> <p>Acridocarpus <i>G. et P.</i> 77.
 <i>corymbosus</i> <i>H. f.</i> 77.</p> | <p>Acridocarpus
 <i>guineensis</i> <i>Juss.</i> 77.
 <i>katangensis</i> <i>D. W.</i> 77.
 <i>Laurentii</i> <i>D. W.</i> 77.
 <i>longifolius</i> <i>H. f.</i> 77.
 <i>rudis</i> <i>D. W. et T. D.</i> 77.
 <i>Smeathmanni</i> <i>G. et P.</i> 77.</p> <p><i>Acriulus</i> <i>Leopoldianus</i> <i>Cl.</i> 594.
 <i>madagascariensis</i> <i>Ridl.</i> 594.</p> <p>Acrocephalus <i>Bth.</i> 444.
 <i>campicola</i> <i>Briq.</i> 444.
 <i>coeruleus</i> <i>Oliv.</i> 445.
 — v. <i>genuinus</i> <i>Briq.</i> 445.
 — v. <i>trichosoma</i> <i>Briq.</i> 445.
 <i>cylindraceus</i> <i>Oliv.</i> 445.
 <i>Debeerstii</i> <i>Briq.</i> 445.
 <i>Descampsii</i> <i>Briq.</i> 445.
 <i>Dewevrei</i> <i>Briq.</i> 445.
 <i>divaricatus</i> <i>Briq.</i> 445.
 <i>elongatus</i> <i>Briq.</i> 445.
 <i>Hensii</i> <i>Briq.</i> 445.
 <i>iododermis</i> <i>Briq.</i> 446.
 <i>Laurentii</i> <i>Briq.</i> 446.
 <i>Masuianus</i> <i>Briq.</i> 446.
 <i>paniculatus</i> <i>Briq.</i> 446.
 <i>Poggeanus</i> <i>Briq.</i> 446.</p> <p><i>Acrolobus</i> <i>parvifolius</i> <i>Kl.</i> 96.
 <i>Schoenleinii</i> <i>Kl.</i> 96.</p> <p>Acrospira <i>Welw.</i> 567.
 <i>asphodeloides</i> <i>Welw.</i> 567.
 — v. <i>Laurentii</i> <i>D. W.</i> 567.
 — v. <i>variegata</i> <i>D. W.</i> 568.</p> <p>Adansonia <i>L.</i> 59.
 <i>digitata</i> <i>L.</i> 59.
 — v. <i>congolensis</i> <i>A. Chev.</i> 59.
 <i>digitata</i> <i>Auct.</i> 59.
 <i>sulcata</i> <i>A. Chev.</i> 59.</p> |
|---|--|---|

- Adenanthera** *Royen*, 184.
Gilletii *D. W.* 184.
- Adenia** *Forsk.* 224.
lobata *Engl.* 224.
 — *v. elegans* *Hiern*, 224.
panduriformis *Engl.* 224.
Schweinfurthii *Engl.* 224.
venenata *Forsk.* 224.
- Adenolichos** *Harms*, 154.
grandifoliolatus *D. W.* 154.
Harmsianus *D. W.* 154.
punctatus *Harms*, 154.
- Adenopus** *Bth.* 226.
breviflorus *Bth.* 226.
- Adenostemma** *Forst.* 297.
viscosum *Forst.* 297.
- Adhatoda** *Anselliana* *Nees*, 429.
Betonica *Nees*, 431.
Rostellaria *Nees*, 430.
- Aeolanthus** *Mart.* 448.
adenotrichus *Guerke*, 448, 655.
Buchnerianus *Briq.* 448.
petasatus *Briq.* 449.
Poggei *Guerke*, 449.
Pritzwitzianus *Guerke*, 449.
- Aeranthus** *distichus* *R. f.* 532.
erythropollinius *R. f.* 532.
xanthopollinius *R. f.* 532.
- Aerua** *Forsk.* 459.
lanata *Juss.* 459.
- Aeschynomene** *L.* 139.
aspera *L.* 139.
brachycarpa *Harms*, 139.
Butayei *D. W.* 139.
Dewevrei *D. W. et T. D.* 139.
Elaphroxylon *Taub.* 138.
Gilletii *D. W.* 139.
glandulosa *D. W.* 139.
indica *L.* 139.
katangensis *D. W.* 139.
lateritia *Harms*, 139.
Schimperi *Hochst.* 140.
Schlechteri *Harms*, 140.
sensitiva *Sw.* 140.
sensitiva *P. B.* 139.
uniflora *E. Mey.* 140.
- Aetheilema** *imbricatum* *R. Br.* 419.
- Aframomum** *K. Sch.* 540.
albo-violaceum *K. Sch.* 540.
colosseum *K. Sch.* 540.
Daniellii *K. Sch.* 540.
- Aframomum**
granum-paradisi *K. Sch.* 540.
latifolium *K. Sch.* 541.
Laurentii *K. Sch.* 541.
luteo album *K. Sch.* 540.
Masuiianum *K. Sch.* 541.
Melagueta *K. Sch.* 541.
polyanthum *K. Sch.* 542.
sanguineum *K. Sch.* 541.
sceptrum *K. Sch.* 542.
- Afzelia** *Sm.* 177.
africana *Sm.* 177.
cuanzensis *Welw.* 178.
- Agathisanthemum** *Bojeri* *Kl.* 244.
globosum *Kl.* 246.
- Agelaea** *Soland.* 117.
Demeusei *D. W. et T. D.* 117.
Dewevrei *D. W. et T. D.* 117.
Duchesnei *D. W. et T. D.* 117.
nitida *Soland.* 117.
obliqua *Bak.* 117, 653.
phaseolifolia *Gilg*, 117, 653.
Poggeana *Gilg*, 117.
rubiginosa *Gilg*, 117.
Schweinfurthii *Gilg*, 117.
- Ageratum** *L.* 298.
conyzoides *L.* 298.
Agrostis capensis *W.* 642.
- Alafia** *Thou.* 351.
Benthami *Stapf*, 351.
caudata *Stapf*, 351.
cuneata *Stapf*, 352.
gracilis *Stapf*, 351.
lucida *Stapf*, 351.
major *Stapf*, 352.
reticulata *K. Sch.* 352.
- Albizzia** *Duraz.* 187.
altissima *H. f.* 189.
Brownei *Oliv.* 187.
ealaensis *D. W.* 187.
fastigiata *Oliv.* 188.
intermedia *D. W. et T. D.* 188.
katangensis *D. W.* 188.
latifolia *Boiv.* 188.
Laurentii *D. W.* 188.
Lebbek *Bth.* 188.
versicolor *Welw.* 188.
- Albuca** *L.* 569.
angolensis *Welw.* 569.
 — *v. grandiflora* *D. W.* 570.
Gentilii *D. W.* 570.
Gilletii *D. W.* 570.
katangensis *D. W.* 570.
Laurentii *D. W.* 570.
variegata *D. W.* 570.
- Alchornea** *Sw.* 494.
cordata *Bth.* 494.
cordifolia *M.-A.* 494, 656.
- Alchornea**
floribunda *M.-A.* 494.
hirtella *Bth.* 494.
yambuyaensis *D. W.* 494.
- Alectra indica* *Bth.* 401.
Aletris fragrans *L.* 565.
guineensis *Jacq.* 551.
- Alibertia edulis* *A. Rich.* 256.
Alisma humilis *Kth.* 593.
- ALI-MACEAE, 593.
- Allamanda** *L.* 340.
Aubletii *Pohl.* 341.
cathartica *L.* 340.
Schottii *Hook.* 341.
- Allanblackia** *Oliv.* 46.
floribunda *Oliv.* 46.
- Allium** *L.* 569.
angolense *Bak.* 569.
- Allophylus** *L.* 110.
africanus *P. B.* 110, 652.
congolanus *Gilg*, 111.
leptocaulos *Rdlk.* 111.
longipetiolatus *Gilg*, 111.
macrobotrys *Gilg*, 111.
Schweinfurthii *Gilg*, 111.
Welwitschii *Gilg*, 652.
- Aloe** *L.* 564.
congolensis *D. W. et T. D.* 564.
venenosa *Engl.* 564.
- Alsine prostrata* *Forsk.* 41.
- Alsodeia** *Thou.* 34.
brachypetala *Turcz.* 34.
congensis *Th. et Hél. Dur.* 34.
dentata *P. B.* 34.
Dewevrei *Th. et Hél. Dur.* 34.
Dupuisii *Th. et Hél. Dur.* 34.
Engleriana *D. W. et T. D.* 34.
ilicifolia *Welw.* 651.
Poggei *Th. et Hél. Dur.* 35, 651.
viscosa *Engl.* 654.
Welwitschii *Oliv.* 35.
- Alsodeiopsis** *Oliv.* 99.
Oddoni *D. W.* 99.
Poggei *Engl.* 99, 652.
- Alstonia** *R. Br.* 341.
congensis *Engl.* 341.
Gilletii *D. W.* 341.
 — *v. Laurentii* *D. W.* 341.
scholaris *A. Chev.* 341.
viscosa *Engl.* 654.
- Alternanthera** *Forsk.* 460.
Achyrantha *R. Br.* 460.
echinata *Sm.* 460.
maritima *St.-Hil.* 460.
repens *St.* 460.
sessilis *R. Br.* 460.

- Alvesia** *Welw.* 450.
bauhinioides *Welw.* 175.
rosmarinifolia *Welw.* 450.
- Alysicarpus** *Neck.* 145.
Harnieri *Schw.* 145.
rugosus *DC.* 145.
vaginalis *DC.* 145.
- Amaralia** *Welw.* 262.
bignoniaceflora *Welw.* 262.
calycina *K. Sch.* 262.
- AMARANTACEAE**, 456.
- Amarantus** *L.* 457.
caudatus *L.* 457.
paniculatus *L.* 457.
speciosus *Sims.* 457.
spinus *L.* 457.
viridis *L.* 458.
- AMARYLLIDACEAE**, 554.
- Amaryllis disticha* *L. f.* 557.
ornata *Ker.* 556.
zeylanica *L.* 556.
- Amerimnon Ecastaphylum* *Jacq.* 163.
macrospermum *O. K.* 162.
- Ammannia** *Houst.* 217.
aegyptiaca *W.* 217.
auriculata *W.* 217.
multiflora *Roxb.* 217.
salicifolia *Monti.* 217.
senegalensis *Lam.* 217.
— v. *auriculata* *Hiern.* 217.
— v. *multiflora* *Hiern.* 217.
verticillata *Lam.* 217.
- Amomum albo-violaceum* *Ridl.* 540.
angustifolium *Auct.* 540.
Daniellii *H. f.* 540.
granum-paradisi *L.* 541.
latifolium *Afzel.* 541.
Laurentii *D. W. et T. D.* 541.
luteo-album *K. Sch.* 540.
Masuiianum *D. W. et T. D.* 541.
Melagueta *Rosc.* 541.
polyanthum *K. Sch.* 542.
sanguineum *K. Sch.* 541.
sceptrum *Oliv. et Hanb.* 542.
Zingiber *L.* 542
- Amorphophallus Eichleri* *H. f.* 589.
Leopoldianus *N. E. Br.* 589, 657.
Teuszii *N. E. Br.* 589.
- AMPELIDACEAE**, 104.
- Ampelocissus** *Pl.* 104.
abyssinica *Pl.* 104.
- Ampelocissus**
angolensis *Pl.* 104.
— v. *congoensis* *Pl.* 105.
calophylla *Gilg.* 105, 652.
Chantinii *Pl.* 105, 652.
- Amphiblemma** *Naud.* 213.
acaule *Cogn.* 213.
ciliatum *Cogn.* 213.
setosum *H. f.* 213.
Wildemanianum *Cogn.* 213.
- ANACARDIACEAE**, 113.
- Anacardium** *Rottb.* 113.
occidentale *L.* 113.
- Ananas** *Adans.* 551.
sativus *Schult. f.* 551.
- Anaphrenium** *abyssinicum* *Hochst.* 116.
— v. *lanceolatum* *Engl.* 116
— v. *latifolium* *Engl.* 116.
pulcherrimum *Schw.* 116
- Anarthrosyne cordata* *Kl.* 143.
- Anatherum muricatum* *P. B.* 627.
- Anchomanes** *Schott.* 589.
giganteus *Engl.* 589.
- Ancistrochilus** *Rolfe.* 516.
Thomsonianus *Rolfe.* 516.
— v. *Gentilii* *D. W.* 517.
- Ancistrophyllum secundiflorum* *M. et W.* 584.
- Ancylanthus** *Desf.* 271.
fulgidus *Welw.* 271.
- Andropogon** *L.* 624.
Afzelianus *Rendle.* 624.
appendiculatus *Nees.* 624.
— v. *genuinus* *Hack.* 624.
apricus *Trin.* 624.
— v. *africanus* *Hack.* 624.
bipennatus *Hack.* 624.
bracteatus *W.* 624.
Brazzae *Franch.* 624.
brevifolius *Sw.* 624.
contortus *L.* 624.
— v. *genuinus* *Hack.* subv. *typicus* *Hack.* 625.
densiflorus *St.* 626.
diplandrus *Hack.* 625.
distachyus *L.* 625.
familiaris *St.* 625.
finitimus *Hochst.* 625.
halepensis *Brot.* 627.
intermedius *R. Br.* 625.
- Andropogon**
intermedius v. *punctatus* *Hack.* 625.
— subv. *glaber* *Hack.* 625.
Lecomtei *Franch.* 625.
muricatus *Retz.* 627.
nigritanus *Bth.* 627.
Schimperi *Hochst.* 626.
Schoenanthus *L.* 626.
— subsp. *densiflorus* *Hack.* 626.
Sorghum *Brot.* 626.
— v. *effusus* *Hack.* 626.
— v. *halepensis* *Hack.* 626.
squarrosus *L. f.* 627.
— v. *genuinus* *Hack.* 627.
— v. *nigritanus* *Hack.* 627.
squarrosus *L. f.* 627.
- Aneilema** *R. Br.* 579.
aequinoctiale *Kth.* 579.
africanum *P. B.* 582.
beniniense *Kth.* 579.
Lujaei *D. W. et T. D.* 579.
ovato-oblongum *P. B.* 580.
pedunculatum *Cl.* 580.
rivulare *A. Rich.* 583.
Schweinfurthii *Cl.* 580.
secundum *Wight.* 580.
sinicum *Ldl.* 580.
- Angraecum** *Thou.* 526.
Althoffii *Krzel.* 580.
apiculatum *H.* 527.
Arnoldianum *D. W.* 526.
ashantense *Ldl.* 529.
biloboides *D. W.* 526.
bilobum *Ldl.* 526.
capitatum *Ldl.* 529.
caudatum *Ldl.* 529.
Chailluanum *H. f.* 529.
crinale *D. W.* 527.
distichum *Ldl.* 532.
Gentilii *D. W.* 527.
ichneumoneum *Ldl.* 530.
imbricatum *Ldl.* 527.
infundibulare *Ldl.* 532.
Kindtianum *D. W.* 527.
konduense *D. W.* 527.
Laurentii *D. W.* 527.
lepidotum *Rehb. f.* 527.
Lujaei *D. W.* 528.
ovalifolium *D. W.* 528.
pellucidum *Ldl.* 530.
Pynaertii *D. W.* 528, 656.
scandens *Schltr.* 528.
— v. *longifolium* *D. W.* 528.
stipulatum *D. W.* 528.
subulatum *Ldl.* 531.
Verdickii *D. W.* 528.
viridescens *D. W.* 528.

Angraecum

- zigzag *D. W.* 528.
Angylocalyx *Taub.* 168.
 ramiflorus *Taub.* 168.
 Schumannianus *Harms,*
 169.
 Vermeuleni *D. W.* 169.
Anil capitata *O. K.* 127.
 endecaphylla *O. K.* 128.
 hirsuta *O. K.* 129.
 procera *O. K.* 130.
Aniseia *Choisy,* 381.
 martinicensis *Choisy,*
 381.
 uniflora *Choisy,* 381.
Anisochilus *Wall.* 450.
 africanus *Bak.* 450.
 Engleri *Briq.* 451.
Anisopappus *H. et A.*
 305.
 africanus *O. et H.* 305.
Anisophyllea *R. Br.* 194.
 laurina *R. Br.* 194.
 Poggei *Engl.* 194.
Anisophyllum laurinum
R. Br. 194.
Anona *L.* 23.
 latifolia *Scott-Elliott,* 18.
 Laurentii *Engl. et Diels,*
 19.
 Mannii *Oliv.* 19.
 Myristica *Gaertn.* 24.
 senegalensis *Pers.* 23.
 — v. cuneata *Oliv.* 23.
ANONACEAE, 17
Anonidium *Engl. et Diels,*
 18.
 Laurentii *Engl. et Diels,*
 18.
 Mannii *Engl. et Diels,* 19.
Ansellia *Ldl.* 523.
 africana *Ldl.* 523.
 congoensis *Rodig.* 523.
Anthephora *Schreb.* 628.
 cristata *Hack.* 628.
 elegans *Schreb.* 628.
 — v. africana *Pilger,* 628.
 — v. cristata *Doell,* 628.
 elegans *T. D. et Sch.* 628.
 elongata *D. W.* 628.
Anthericum *L.* 568.
 asphodeloides *L.* 568.
 congolense *D. W. et T. D.*
 568.
 Laurentii *D. W.* 568.
 macrophyllum *A. Rich.*
 568.
 sphacelatum *Bak.* 568.
Antherotoma *H. f.* 208.
 Naudini *H. f.* 208.
Anthistiria barbata *Desf.*
 627.
 ciliata *L. f.* 627.
Anthocleista *Afzel.* 369.
 Baertsiana *D. W. et T. D.*
 369.

Anthocleista

- Buchneri *Gilg,* 369.
 inermis *Engl.* 370.
 innocua *Engl.* 370.
 Laurentii *D. W.* 370.
 Liebrechtsiana *D. W. et*
T. D. 370.
 nobilis *G. Don,* 369.
 Schweinfurthii *Gilg,*
 370.
 squamata *D. W. et T. D.*
 370.
 Vogelii *Pl.* 370.
Antholyza *L.* 553.
 Cabrae *D. W.* 553.
 Descampsii *D. W.* 553.
 Gilletii *D. W.* 554.
 labiata *Pax,* 554.
Antidesma *L.* 484.
 laciniatum *M.-A.* 484.
 membranaceum *M.-A.*
 484.
 nervosum *D. W.* 484.
 Schweinfurthii *Pax,*
 484.
 venosum *E. Mey.* 484,
 655.
 — f. glabrescens *D. W.*
 484.
Anubias *Schott,* 591.
 affinis *D. W.* 591.
 Afzelii *D. W. et T. D.*
 591.
 congensis *N. E. Br.* 591.
 Engleri *D. W.* 591.
 Gilletii *D. W.* 591.
 hastaefolia *Engl.* 591.
 Haullevilleana *D. W.*
 591.
 heterophylla *N. E. Br.*
 591.
Aphanostylis exserrens
Pierre, 333.
 laxiflora *Pierre,* 332.
 mammosa *Pierre, v. cras-*
sifolia *Pierre,* 330.
 — v. mucronata *Pierre,*
 330.
 Mannii *Pierre,* 333.
 robusta *Pierre,* 330.
APOCYNACEAE, 325.
Apodytes *E. Mey.* 98.
 beninensis *H. f.* 98.
Aptandra *Miers,* 95.
 Zenkeri *Engl.* 95.
 — v. latifolia *Engl.* 96.
ARACEAE, 587.
Arachis *L.* 141.
 hypogaea *L.* 141.
ARALIACEAE, 238.
Arduina edulis *Spreng.*
 337.
Arenaria africana *H. f.*
 41.
 prostrata *Ser.* 41.

- Argomuellera** *Pax,* 495.
 macrophylla *Pax,* 495,
 656.
Argyreia beraviensis *Bak.*
 391.
Aristida *L.* 640.
 amplissima *Trin. et*
Rupr. 640.
 vestita *Thunb.* 640.
Aristolochia *L.* 466.
 Dewevrei *D. W. et T. D.*
 466.
 Schweinfurthii *Engl.*
 467, 655.
 triactina *H. f.* 467.
ARISTOLOCHIACEAE,
 466.
Artabotrys *R. Br.* 22.
 aurantiodorus *Engl.* 22.
 congolensis *D. W. et*
T. D. 22.
 Thomsoni *Oliv.* 22.
Artanema *D. Don,* 399.
 Cabrae *D. W. et T. D.*
 399.
 longifolium *Vatke,* 399.
 longifolium *Bth.* 399.
Artemisia maderaspatana
Poir. 299.
Artocarpus *Forst,* 510.
 incisa *L. f.* 510.
Arum bicolor *Ait.* 591.
Arundastrum Schwein-
furthianum *O. K.* 548.
Arundinaria *Michx.* 648.
 alpina *K. Sch.* 648.
Arundo Phragmites *L.*
 645.
 vulgaris *Lam.* 645.
ASCLEPIADACEAE,
 355.
Asclepias *L.* 362.
 affinis *D. W.* 362.
 Buchwaldii *D. W.* 362.
 — v. angustifolia *D. W.*
 362.
 Burchellii *Schl.* 360.
 Cabrae *D. W.* 362.
 coccinea *N. E. Br.* 361.
 congolensis *D. W.* 362.
 dependens *N. E. Br.* 359.
 Dewevrei *D. W.* 362.
 dissoluta *Schl.* 358.
 erecta *D. W.* 362.
 foliosa *N. E. Br.* 359.
 fruticosa *L.* 360.
 katangensis *D. W.* 362.
 Laurentiana *N. E. Br.*
 361.
 lineolata *Schl.* 360.
 macrantha *Hochst.* 361.
 palustris *Schl.* 359, 360.
 rubens *N. E. Br.* 360.
 scandens *P. B.* 364.
 Schumanniana *Hiern,*
 359.

Asclepias

- semiamplectens* Hiern, 360.
Verdickii D. W. 361.
Ascolepis Nees, 620.
pinguis Cl. 620.
protea Welw. 620.
Asparagus L. 562.
abyssinicus Hochst. 562.
aethiopicus L. 562.
— v. *ternifolius* Bak. 563.
africanus Lam. 562.
— v. *biarticulatus* D. W. et T. D. 562.
drepanophyllus Welw. 562.
Duchesnei L. Lind. 563.
falcatus L. 563.
katangensis D. W. et T. D. 563.
laricinus Burch. 563.
— v. *katangensis* D. W. et T. D. 563.
Pauli-Guilielmi Solms, 563.
— v. *katangensis* D. W. et T. D. 563.
plumosus Bak. 563.
retrofractus Forsk. 562.
Aspilia Thou. 306.
Dewevrei O. Hoffm. 306.
Kotschyi B. et H. f. 306.
latifolia O. et H. 306.
Smithiana O. et H. 306.
Asteracantha Lindaviana D. W. et T. D. 416.
Astrochlaena Hallier f. 383.
solanacea Hallier f. 383.
Asystasia Bl. 427.
congensis Cl. 427.
coromandeliana Nees, 428.
gangetica T. And. 428.
longituba Lindau, 428.
Aulacocalyx H. f. 267.
jasminiflora H. f. 267.
— v. *latifolia* D. W. et T. D. 267.
Avicennia L. 442.
africana P. B. 442.

B

- Baccaurea** Lour. 486.
Staudtii Pax, 486.
Baccharis Dioscoridis L. 302.
senegalensis Pers. 295.
Bacopa Aubl. 399.
alternifolia Engl. 399.
calycina Engl. 399.
Baikiaea Bth. 178.
anomala M. Mich. 178.
insignis Bth. 178.

Baikiaea

- Lescauwaetii* D. W. 178.
minor Oliv. 179.
Baisse A. DC. 352.
angolensis Stapf, 654.
— v. *major* Stapf, 353.
axillaris Hua, 352.
gracillima Hua, 353.
Laurentii D. W. 353.
laxiflora Stapf, 353.
major Hiern, 353.
micrantha Hua, 353.
tenuiloba Stapf, 353.
Tholloni Hua, 354.
Bakerisideroxylon Engl. 322.
revolutum Engl. 322.
Balanites Del. 84.
aegyptiaca Del. 84.
BALANOPHORACEAE, 476.
BALSAMINACEAE, 79.
Bamburantha Arnoldiana L. Linden, 546.
Bandeiraea Welw. 175.
simplicifolia Bth. 175.
speciosa Welw. 175.
tenuiflora Bth. 175.
Banisteria Leona Cav. 77.
Baphia Afz. 166.
acuminata D. W. 166.
angolensis Welw. 167.
aurivellera Taub. 166.
chrysophylla Taub. 167.
compacta D. W. 167.
congolensis Welw. 167.
crassifolia Harms, 167.
densiflora Harms, 167.
Haematoxylon H. f. 167.
Laurentii D. W. 167.
laurifolia Baill. 168.
Lescauwaetii D. W. 167.
nitida Lodd. 167.
pubescens H. f. 168.
Pynaertii D. W. 168.
racemosa Hochst. 168.
Schweinfurthii Harms, 168.
spathacea H. f. 168.
— v. *scandens* D. W. 168.
Vermeuleni D. W. 168.
Barbacenia aequatorialis Harms, 558.
Barleria L. 425.
affinis D. W. 425.
Briartii D. W. et T. D. 425.
Descampsii Lindau, 425.
elegans S. Moore, 425.
lukafuensis D. W. 426.
opaca Nees, 426.
pungens L. v. *macrophylla* Nees, 425.
ventricosa Nees, 426.

Barleria

- Verdickii* D. W. 426.
villosa S. Moore, 426.
Barteria H. f. 223.
Dewevrei D. W. et T. D. 223.
fistulosa Mast. 223.
— v. *macrophylla* D. W. et T. D. 223.
nigritana H. f. 223.
— v. *uniflora* D. W. et T. D. 224.
Basella L. 462.
alba L. 462.
rubra L. 462.
Bastardia angulata G. et P. 51.
Batatas edulis Choisy, 385.
pentaphylla Choisy, 383.
Bauhinia L. 174.
Petersiana Bolle, 174.
reticulata D. W. 174.
tomentosa L. 175.
Bechium bicolor Ldl. 442.
Becherapetiolaris Hochst. 637.
uniseta St. 639.
Begonia L. 233.
Bruneelii D. W. 233.
durucensis D. W. 233.
elaeagnifolia H. f. 233.
Gentilii D. W. 233.
gracilipetiolata D. W. 233.
Haullevilleana D. W. 233.
injoloensis D. W. 233.
Poggei Warb. 233.
— v. *albiflora* Th. et Hét. Dur. 233.
— v. *flore albo* C. DC. 234.
quadrialata Warb. 234.
romeensis D. W. 234.
rubronervata D. W. 234.
Sereti D. W. 234.
subfalcata D. W. 235.
subscutata D. W. 235.
Sutherlandi H. f. 235.
Verdickii D. W. 235.
zobiaensis D. W. 235.
BEGONIACEAE, 233.
Belmontia chionantha Gilg, 373.
debilis Schinz, 374.
Gentilii D. W. 373.
oligantha Gilg, 374.
Teuszii Vatke, 374.
Berlinia Sol. 176.
acuminata Sol. 176, 653.
— v. *Bruneelii* D. W. 177.
— v. *pubescens* D. W. 177.
auriculata Bth. 654.
bracteosa Bth. 177,

- Berlinia**
 Eminii *Taub.* 177.
 Laurentii *D. W.* 177.
 Sereti *D. W.* 177.
- Bertiera** *Aubl.* 255.
 aethiopica *Hiern.* 255.
 capitata *D. W.* 255.
 coccinea *G. Don.* 248.
 congolana *D. W. et T. D.* 255.
 Dewevrei *D. W. et T. D.* 255.
 gracilis *D. W.* 255, 654.
 — v. latifolia *D. W.* 255.
 Laurentii *D. W.* 255.
 laxa *Bth.* 255.
 macrocarpa *Bth.* 256.
 Thonneri *D. W. et T. D.* 256.
- Bidens** *L.* 308.
 leucantha *W.* 308.
 pilosa *L.* 308.
 urceolata *D. W.* 308.
- Bignonia africana* *Lam.* 412.
- BIGNONIACEAE**, 409.
- Biophytum** *DC.* 78.
 sensitivum *DC.* 78.
- Bisetaria febrifuga* *V.* Tgh. 88.
- Bixa** *L.* 35.
 Orellana *L.* 35.
- BIXACEAE**, 35.
- Blackwellia africana* *H. f.* 219.
- Blainvillea** *Cass.* 306.
 Prieureana *DC.* 306.
- Blepharis** *Juss.* 422.
 boerhaaviaefolia *Pers.* 422.
 — v. nigrovenulosa *D. W. et T. D.* 423.
 Buchneri *Lindau.* 423.
 — v. major *D. W.* 423.
 katangensis *D. W.* 423.
 rubiaefolia *Schum.* 422.
 trinervis *A. Dew.* 423.
 Verdickii *D. W.* 423.
- Blepharispermum**
 Wight, 303.
 spinulosum *O. et H.* 303.
- Blighea** *Koen.* 112.
 Wildemaniana *Gilg.* 112.
- Blumea** *DC.* 301.
 alata *DC.* 301.
 aurita *DC.* 301.
 lacera *DC.* 301.
 pterodonta *DC.* 302.
- Boehmeria** *Jacq.* 513.
 platyphylla *Don.* 513.
- Boerhaavia** *L.* 456.
 ascendens *Willd.* 454.
 dichotoma *Vahl.* 455.
 diffusa *L.* 455.
 paniculata *Rich.* 455.
 plumbaginea *Cav.* 455.
- Boerhaavia**
 repens *L.* 455.
- Bombax** *L.* 59.
 aquaticum *K. Sch.* 59.
 guineense *S. et T.* 60.
 kimuenzae *D. W. et T. D.* 59.
 lukayense *D. W. et T. D.* 59.
 pentandrum *L.* 60.
- Bonamia** *Thou.* 380.
 minor *Hall. f.* 380.
- Bonatea** *W.* 536.
 Verdickii *D. W.* 536.
- Boophane toxicarius* *Herb.* 557.
- Boottia** *Wall.* 515.
 abyssinica *Ridl.* 515.
- BORAGINACEAE**, 377.
- Borago zeylanica* *L.* 379.
- Borassus** *L.* 586.
 aethiopum *Mart.* 586.
 flabellifer *L.* 586.
 — v. aethiopum *Warb.* 586.
 flabelliformis *L.* 586.
- Borreria** *G. F. W. Mey.* 286.
 dibrachiata *K. Sch.* 286.
 hebecarpa *A. Rich.* 286.
 neglecta *A. Rich.* 286.
 ocimoides *DC.* 286.
 ramisperma *DC.* 286.
 scabra *K. Sch.* 287.
 senensis *K. Sch.* 287.
 stricta *DC.* 287.
 tetraodon *K. Sch.* 287.
- Boscia** *Lam.* 30.
 salicifolia *Oliv.* 30.
 Welwitschii *Gilg.* 30.
- Bosqueia** *Thou.* 509, 656.
 angolensis *Ficalho.* 509, 656.
 Welwitschii *Engl.* 509.
- Bosqueiopsis** *D. W. et T. D.* 510, 656.
 Gilletii *D. W. et T. D.* 510.
- Bosqueia* *Thou.* 509, 656.
Bosqueiopsis *D. W. et T. D.* 510, 656.
- Bothriocline** *Oliv.* 290.
 longipes *N. E. Br.* 290.
 misera *O. Hoffm.* 290.
 Schimperii *O. et H.* 290.
- Botor palustris* *O. K.* 155.
- Bougainvillaea** *Juss.* 455.
 spectabilis *W.* 455.
- Brachycorythis** *Ldl.* 537.
 Briartiana *Krztl.* 537.
 Leopoldi *Krztl.* 537.
 pleistophylla *Rchb. f.* 537.
 pubescens *Haw.* 538.
- Brachycorythis**
 rhomboglossa *Krztl.* 538.
 Schweinfurthii *Rchb. f.* 538.
- Brachystegia** *Bth.* 179.
 appendiculata *D. W.* 179.
 katangensis *D. W.* 179.
 mpalensis *M. Mich.* 179.
 — v. latifoliolata *D. W.* 179.
 stipulata *D. W.* 179.
- Brachystelma** *R. Br.* 367.
 nauseosum *D. W.* 367.
- Brasilettia africana* *O. K.* 170.
- Brassica** *L.* 27.
 juncea *Coss.* 27.
 oleracea *L.* 27.
- Breweria campanulata* *Bak.* 380.
- Bridelia** *W.* 479.
 ferruginea *Bth.* 479.
 micrantha *Baill.* 479.
 — v. ferruginea *M.-A.* 479, 655.
 scleroneura *M.-A.* 480.
 stenocarpa *M.-A.* 480.
 tenuifolia *M.-A.* 480.
 Zenkeri *Pax.* 480.
- Brillantaisia** *P. B.* 416.
 alata *T. And.* 417.
 Dewevrei *D. W. et T. D.* 416.
 Kirungae *Lindau.* 417.
 Lamium *Bth.* 417.
 owariensis *P. B.* 417.
 owariensis *Hook.* 417.
 Palisotii *Lindau.* 417.
 patula *T. And.* 417.
 pubescens *T. And.* 417.
 subcordata *D. W. et T. D.* 418.
 — v. macrophylla *D. W. et T. D.* 418.
- Brisa Eragrostis* *L.* 646.
- Brunnichia** *Banks.* 465.
 africana *Welw.* 465.
 — v. erecta *Buett.* 465.
 — v. glabra *Damm.* 465.
 congoensis *Damm.* 465.
- Brunsvigia Massaiana* *L. Lind.* 555.
 toxicaria *Ker.* 557.
- Bryonia capillacea* *S. et T.* 232.
 deltoidea *S. et T.* 232.
 latebrosa *Ait.* 233.
 scabrella *L. f.* 232.
- Bryophyllum** *Salisb.* 193.
 calycinum *Salisb.* 193.
- Buchholzia** *Engl.* 31.
 coriacea *Engl.* 31.
- Buchnera** *L.* 401.
 affinis *D. W.* 401.
 Buettneri *Engl.* 402.
 capitata *Burm.* 402.

- Buchnera**
gesnerioides W. 403.
hermonthica Delile, 403.
inflata Skan, 402.
multicaulis Engl. 402.
pusilla D. W. 402.
quaugensis Engl. 402.
Reissiana Buett. 402.
subcapitata Engl. 402.
Verdickii Skan, 402.
- Buchnerodendron**
Guerke, 38.
Laurentii D. W. 38.
speciosum *Guerke*, 38, 651.
- Buddleia** L. 369.
madagascariensis Lam. 369.
- Buettneria** L. 67.
africana Mast. 67.
- Buforrestia** Cl. 581.
imperfiorata Cl. 581.
- Bulbine** L. 567.
aby-sinica A. Rich. 567.
asphodeloides *Schult. f.* 567.
— v. *filifolioides* D. W. 567.
- Bulbophyllum** Thou, 515.
andongense R. f. 515.
barbigerum Ldl. 516.
calamarium Ldl. 516.
congolanium Schl. 517.
flavidum Ldl. 516.
— v. *elongatum* D. W. 516.
Kindtianum D. W. 516.
Laurentianum Krzl. 518.
nanum D. W. 516.
platyrachys D. W. 516.
pumilum Ldl. 517.
Schinzianum Krzl. 516.
- Bulbostylis** L. 613.
abortiva Cl. 613.
andongensis Bl. 613.
barbata Cl. 613.
capillaris Nees, 614.
— v. *trifida* Cl. 614.
cardiocarpa Cl. 614.
filamentosa Cl. 614.
laniceps Cl. 615.
lanifera K. Sch. 615.
puberula Cl. 615.
pusilla Cl. 615.
trichobasis Cl. 615.
— v. *leptocaulis* Cl. 615.
— v. *uniseriata* Cl. 616.
- Bumelia dulcifica** S. et T. 321.
- Buphane** Herb. 557.
disticha Herb. 557.
Bupthalmum scandens S. et T. 307.
- Burmannia** L. 515.
bicolor Mart. 515.
— v. *africana* Ridl. 515.
Braunii Engl. 515.
- BURMANNIACEAE, 515.
BURSERACEAE, 90.
- Butayea** D. W. 425.
congolana D. W. 425.
- Byrsanthus** Guill. 221.
Brownii Guill. 221.
epigynus Mast. 221.
- Byrsocarpus**, S. et T. 653.
coccineus S. et T. 653.
- C**
- Cacalia** *sagittata* Vahl, 311.
- Cacoucia** *bracteata* Laws. 197.
exannulata Engl. 197.
paniculata Laws. 198.
- CACTACEAE, 235.
Cactus parasiticus L. 235.
- Cadalvena** Fenzl, 540.
spectabilis Fenzl, 540.
- Caesalpinia** L. 170.
Bonducella Fleming, 170.
Bonducella Roxb. 170.
pulcherrima Sw. 170.
- CAESALPINIACEAE, 170.
Caesia africana Bak. 569.
Cajan indorum Medic. 157.
- Cajanus** DC. 157.
indicus Spreng. 157.
- Caladium** Vent. 591.
bicolor Vent. 591.
scandens W. 588.
- Calamus** L. 584.
Cabrae D. W. et T. D. 585.
cuspidatus M. et W. 585.
Hookeri M. et W. 586.
Laurentii D. W. 584.
secundiflorus P. B. 584.
- Calathea conferta* Bth 547.
Calceolaria enneasperma O. K. 33.
- Calesium** *Welwitschii* Hiern, 114.
- Callichilia** Stapf, 342.
Barteri Stapf, 342.
- Caloncoba** Gilg, 36.
Crepiniana Gilg, 36.
glauca Gilg, 36, 651.
Schweinfurthii Gilg, 37.
subtomentosa Gilg, 37.
Welwitschii Gilg, 37, 651.
- Calonyction** Choisy, 390.
bona-nox Boj. 390.
speciosum Choisy, 390.
- Calophanes** *Perrottetii* Nees, 418.
verticillaris T. And. 419.
- Calvoa** H. f. 213.
orientalis Taub. 213.
sessiliflora Cogn. 213.
- Calyptracarpus** Less. 307.
africanus O. Hoffm. 307.
- Camoensia** Welw. 169.
Laurentii D. W. 169.
maxima Welw. 169.
- Campuleia coccinea* Hook. 403.
- Campylochnella arenaria* V. Tgh. 84.
katangensis V. Tgh. 85.
- Campylogyne exannulata* Hemsl. 197.
- Campylospermum laxiflorum* V. Tgh. 88.
- Campylostemon** Welw. 100.
angolense Welw. 100.
Duchesnei D. W. et T. D. 101.
Laurentii D. W. 101.
Pynaertii D. W. 101.
- Canarium** L. 90.
edule Hook. 90.
Mubafo Ficalho, 90.
Safu D. W. 90.
Saphu Engl. 90.
Schweinfurthii Engl. 90.
- Canavalia** Adans. 149.
emarginata G. Don, 149.
ensiformis DC. 149, 156.
incurva Thou. 149.
maritima Thou. 149.
obtusifolia DC. 149.
— f. *macrophylla* D. W. et T. D. 150.
- Candelaria micrantha* Hochst. 479.
- Canna** L. 549.
bidentata Bert. 549.
indica L. 549.
— subsp. *orientalis* Bak. 549.
orientalis Rosc. 549.
- Cannabis** L. 501.
sativa L. 501.
- Canscora** Lam. 375.
decussata *Schult.* 375.
- Canthium Barteri* Hiern, 267.
brevifolium Engl. 268.
congense Hiern, 268.
venosum Hiern. 269.
- Caperonia** St-Hil. 490.
senegalensis M.-A. 490.
- CAPPARIDACEAE, 28.
- Capparis** L. 31.
acuminata D. W. 31.
Afzelii DC. 31.
cerasifera Gilg, 31.
Duchesnei D. W. 31.
erythrocarpa *Isert*, 31.

- Capparis**
Kirkii Oliv. 31.
Poggei Pax, 31, 651.
Verdickii D. W. 31.
- Capsicum** L. 396.
annuum L. 396.
cerasiferum W. 396.
conicum Mey. 396.
conoides Mill. 396, 655.
frutescens L. 396.
- Carapa** Aubl. 93.
guianensis Oliv. 93.
procera DC. 93, 652.
— v. *Gentilii* D. W. 93.
- Cardiospermum** L. 110.
barbicaule Bak. 110.
glabrum S. et T. 110.
grandiflorum Sw. 110.
— f. *hirsutum* Rd/h. 110.
Halicacabum L. 110.
microcarpum Kth, 110.
- Carica** L. 225.
Papaya L. 225.
- Carissa** L. 337.
dulcis S. et T. 337.
edulis Vahl, 337.
Richardiana J. et S. 337.
- Carpodinus** R. Br. 334.
Bruneelii D. W. 334.
camptoloba K. Sch. 335.
cirrhosa K. Sch. 332.
congolensis Stapf, 334.
Eetveldeana D. W. 334.
friabilis Pierre, 336.
Gentilii D. W. 334.
gracilis Stapf, 334.
incerta K. Sch. 332.
Jespersenii D. W. 335.
lactea K. Sch. 336.
lanceolata K. Sch. 335.
laxiflora K. Sch. 333.
leptantha Stapf, 335.
ligustrifolia Stapf, 336.
— v. *angusta* D. W. 334.
myriantha K. Sch. 333.
parvifolia Pierre, 333.
rufescens D. W. 336.
— v. *longeacuminata* D. W. 326.
Schlechteri K. Sch. 336.
subrepanda K. Sch. 336.
turbinata Stapf, 336.
verticillata D. W. 337.
- Carpolobia** G. Don, 40.
alba G. Don, 40.
- Carvalhoa** K. Sch. 342.
Ledermanni Gilg, 342.
- CARYOPHYLLACEAE, 41.
- Casearia** Jacq. 219.
congensis Gilg, 219.
- Cassia** L. 171.
Absus L. 171.
alata L. 172.
Droogmansiana D. W. 172.
geminata S. et T. 173.
gracillima Welw. 173.
Kethulleana D. W. 172.
Kirkii Oliv. 172.
— v. *microphylla* A. Dew. 172.
Mannii Oliv. 172.
— v. *Van Houttei* D. W. 172.
mimosoides L. 172.
occidentalis L. 173.
reticulata M. Mich. 172.
Thonningii DC. 171.
Tora L. 173.
Verdickii D. W. 173.
viscosa S. et T. 171.
Cassipourea africana Bth. 194.
- Cassytha** L. 469.
filiformis L. 469.
— v. *guineensis* D. W. 469.
guineensis S. et T. 469.
- Cayaponia** Manso, 233.
latebrosa Cogn. 233.
- Ceiba** Gaertn. 59.
pentandrum Gaertn. 59.
- CELASTRACEAE, 100.
Celastrus diffusa G. Don, 103.
senegalensis Lam. 100.
— v. *inermis* A. Rich. 100.
- Celosia** L. 456.
argentea L. 456.
Dewevreana Schinz, 456.
laxa S. et T. 456.
leptostachya Bth. 456.
loandensis Bak. 456.
trigyna L. 456.
- Celtis** L. 501.
guineensis S. et T. 501.
Prantlii Priemer, 501.
- Cenchrus** L. 636.
barbatus Schum. 636.
granularis L. 622.
setosus Sw. 638.
- Centotheca** Desv. 648.
lappacea Desv. 648.
mucronata Bth. 648.
owariensis Hack. 648.
- Centratherum** Cass. 289.
grande DC. 289.
- Cephaelis** Sw. 285.
congensis Hiern, 285.
esculentus S. et T. 240.
peduncularis Salisb. 285.
- Cephalaria** Schrad. 288.
attenuata R. et S. 288.
— v. *b. R.* et S. 288.
— v. *longifolia* D. W. 288.
- Cephalonema** K. Sch. 72.
polyandrum K. Sch. 72.
- Cephalostigma** A. DC. 318.
Perrottetii A. DC. 318.
- Cerastium** L. 41.
africanum Oliv. 41.
- CERATOPHYLLACEAE, 513.
- Ceratophyllum** L. 513.
demersum L. 513.
vulgare Schlt. 514.
- Cercestis** Schott, 590.
congensis Engl. 590.
congoensis T. D. et Sch. 590.
- Cercopetalum** Gilg, 30.
dasyanthum Gilg, 30.
— v. *longeacuminatum* D. W. 30.
- Ceropegia** L. 366.
angustiloba D. W. 366.
Butayei D. W. 366.
Dewevrei D. W. 367.
Gilletii D. W. 367.
Verdickii D. W. 367.
- Chaetacme** Pl. 501.
aristata Pl. 501.
— v. *kamerunensis* Engl. 656.
— v. *longifolia* Engl. 501.
- Chaetocarpus** Thw. 497.
africanus Pax, 497.
- Chailletia rufipilis* Turcz. 95.
- Chasalia laxiflora* Bth. 280.
- Chasmanthera** Hochst. 24.
strigosa Baill. 24.
- Cheilopsis arborea* Nees, 423.
montana Nees, 424.
- CHENOPODIACEAE, 461.
- Chenopodium** L. 461.
ambrosioides L. 461.
caudatum Jacq. 458.
foetidum Schrad. 461.
graveolens Lag. et Rodr. 461.
opulifolium Schrad. 462.
- Chironia** L. 375.
transvaalensis Gilg, 375.
Verdickii D. W. 375.
- Chlamydocardia** Lindau, 431.
Buettneri Lindau, 431.
- Chloris** Sw. 643.
Gayana Kth, 643.
polydactyla Sw. 643.
punctulata Hochst. 643.
- Chlorocodon** H. f. 357.
Whitei H. f. 357.
- Chlorophora** Gaud. 502.
excelsa Bth. 502.

- Chlorophytum** *Ker.* 568.
africanum *Engl.* 569.
Fuchsianum *D. W.* 568.
macrophyllum *Aschers.* 568.
- Chomelia** *Jacq.* 266.
apiculata *D. W.* 266.
congensis *O. K.* 257.
Gilletii *D. W. et T.D.* 266.
Laurentii *D. W.* 266.
longifolia *D. W.* 266.
nigrescens *D. W.* 266.
- Christiania** *DC.* 68.
africana *DC.* 68.
- Chrysanthellum** *Rich.* 308.
procumbens *Pers.* 308.
- Chrysobalanus** *L.* 189.
ellipticus *Sol.* 189.
Icaco *L.* 189.
 — *v. ellipticus* *Hook. f.* 189.
- Chrysocoma** *amara* *S. et T.* 295.
violacea *S. et T.* 291.
- Chrysophyllum** *L.* 320.
africanum *A. DC.* 320.
cinereum *Engl.* 320.
Lacourtianum *D. W.* 320.
Laurentii *D. W.* 320.
longepedicellatum *D. W.* 320.
Stuhlmannii *Engl.* 320.
- Chytranthus** *H. f.* 111.
Gerardi *D. W.* 111.
Gilletii *D. W.* 111.
Laurentii *D. W.* 111.
stenophyllus *Gilg.* 111.
- Cichorium** *L.* 315.
Intybus *L.* 315.
- Cienkowskia** *aethiopica* *Solms.* 539.
- Cinnobotrys** *Gilg.* 214.
Sereti *D. W.* 214.
- Cissampelos** *L.* 25.
owariensis *P. B.* 25.
Pareira *L.* 25.
 — subsp. *owariensis* *Engl.* 25.
 — *v. owariensis* *Oliv.* 25.
 — *v. transitoria* *Engl.* 26.
 — *v. zairensis* *T. D. et Sch.* 26.
tenuipes *Engl.* 26.
zairensis *Miers.* 26.
- Cissus** *L.* 105.
adenocaulis *St.* 105, 652.
aralioides *Pl.* 105.
arguta *H. f. v. Oliveriana* *Engl.* 107.
articulata *G. et P.* 105.
Bakeriana *Pl.* 105, 652.
- Cissus**
Barbeyana *D. W. et T.D.* 106.
cornifolia *Pl.* 106.
debilis *Pl.* 106.
Dewevrei *D. W. et T.D.* 106.
diffusiflora *Pl.* 106.
farinosa *Pl.* 106.
Gilletii *D. W. et T.D.* 106, 652.
Guerkeana *T.D. et Sch.* 107, 652.
Haullevilleana *D. W. et T.D.* 107.
ibuensis *H. f.* 107.
Kakoma *D. W.* 107.
Laurentii *D. W.* 107.
Livingstoniana *Welw.* 107, 652.
mayombensis *Gilg.* 107.
Oliveriana *Gilg.* 107.
polycymosa *D. W.* 108.
producta *Pl.* 108.
prostrata *D. W. et T.D.* 108.
rubiginosa *Pl.* 107.
Smithiana *Pl.* 108.
suberosa *Pl.* 108.
tenuicaulis *H. f.* 108.
tiliaefolia *Pl.* 108.
trinervis *D. W.* 108.
- Cistanthera** *K. Sch.* 74.
Dewevrei *D. W. et T.D.* 74.
kabingaensis *K. Sch.* 74.
- Citrullus** *Neck.* 230.
vulgaris *Schrad.* 230.
- Citrus** *L.* 82.
Aurantium *L.* 82.
Limonum *Risso.* 83.
medica *L.* 82.
 — subsp. *Limonum* *H. f.* 83.
- Cladosicyos** *edulis* *H. f.* 230.
- Claoxylon** *A. Juss.* 491.
africanum *M.-A.* 491.
atrovirens *Pax.* 491.
columnare *M.-A.* 656.
Dewevrei *Pax.* 491.
flaccidum *Pax.* 491.
Mercurialis *Thw.* 492.
- Clausena** *Burm.* 82.
anisata *H. f.* 82.
Bergeyckiana *D. W. et T.D.* 82.
- Cleistanthus** *H. f.* 480.
caudatus *Pax.* 480.
- Cleistopholis** *Pierre.* 18.
grandiflora *D. W.* 18.
- Clematis** *L.* 13.
chrysocarpa *Welw.* 13.
 — *v. Poggei* *T.D. et Sch.* 13.
glaucescens *Fresen.* 13.
- Clematis**
grandiflora *DC.* 14.
Kirkii *Oliv.* 14.
orientalis *L.* 14.
 — *v. glaucescens* *Engl.* 13.
 — *v. simensis* *O. K.* 14.
 — subsp. *Wightiana* *O. K.* 14.
pseudograndiflora *O. K.* 14.
scabiosaefolia *DC.* 14.
simensis *Fresen.* 14.
spathulaefolia *Prantl.* 15.
Thunbergii *Steud.* 15.
 — *v. angustisecta* *Engl.* 15.
villosa *DC.* subsp. *chrysocarpa* *O. K.* 13.
 — *v. Poggei* *O. K.* 13.
 — subsp. *scabiosaefolia* *O. K.* 14.
 — subsp. *spathulaefolia* *O. K.* 15.
Wightiana *Wall.* 14.
- Cleome** *L.* 28.
acuta *S. et T.* 29.
ciliata *S. et T.* 28.
Gilletii *D. W.* 28.
guineensis *H. f.* 28.
hirta *Oliv.* 29.
monophylla *L.* 28.
pentaphylla *L.* 29.
raphanoides *DC.* 222.
spinosa *Jacq.* 28.
thyrsiflora *D. W. et T.D.* 28.
- Clerodendron** *L.* 438.
Bakeri *Guerke.* 438.
Buchneri *Guerke.* 438.
capitatum *S. et T.* 438, 655.
 — *v. Butayei* *D. W.* 438.
 — *v. subcordatum* *D. W.* 438.
 — *v. subdentatum* *D. W.* 438.
congensense *Engl.* 438.
congensense *Bak.* 438.
formicarum *Guerke.* 438.
fuscum *Guerke.* 438.
Gilletii *D. W. et T.D.* 439.
grandifolium *Guerke.* 439.
Kanichi *D. W.* 439.
katangense *D. W.* 439.
longitubum *D. W. et T.D.* 439.
Lujaei *D. W. et T.D.* 439.
Melanocrater *Guerke.* 440.
myricoides *R. Br.* 439, 655.

Clerodendron

- myricoides v. camporum *Guerke*, 439.
 — v. laxum *Guerke*, 440.
Poggei Guerke, 440.
Rehmanni Guerke, 440.
scandens P. B. 440, 655.
Schlechteri Guerke, 440.
Schweinfurthii Guerke, 440.
spinescens Guerke, 440, 655.
 — v. parviflorum *Schinz*, 441.
splendens D. Don, 441, subreniforme *Guerke*, 441.
Thonneri Guerke, 441.
thyrsoides Guerke, 441.
volubile P. B. 441, 655. *yaundense Guerke*, 441.

Clinogyne Salisb. 547.

- arillata K. Sch.* 547.
congensis K. Sch. 547.
filipes Bth. 548.
Hensii K. Sch. 548.
Schweinfurthiana K. Sch. 548.

Clitandra Bth. 331.

- Arnoldiana D. W.* 331.
 — v. *Sereti D. W.* 331.
cirrhusa Rdlk. 332.
cymulosa Stapf, 332.
exserrens K. Sch. 332.
Gentilii D. W. 332.
Gilletii D. W. 331.
gracilis Hall. f. 335.
Kabulu D. W. 332.
Lacourtiana D. W. 332.
laxiflora Hall. f. 332.
Mannii Stapf, 332.
myriantha K. Sch. 333.
Nzunde D. W. 333.
orientalis K. Sch. 332.
parvifolia Stapf, 333.
robustior K. Sch. 333.
Sereti D. W. 333.

Clitoria L. 146.

Ternatea L. 146.

Cnestis Juss. 120.

- corniculata Lam.* 120.
emarginata D. W. et T. D. 121.
ferruginea DC. 120, 653.
 — v. *pilosa A. Dev.* 121.
grandiflora Gilg, 121.
grandifoliolata D. W. et T. D. 121.
iomalla Gilg, 121.
 — v. *grandifoliolata D. W.* 121.
Lescrauwaetii D. W. 121.
obliqua P. B. 117.
oblongifolia Bak. 121.

Cnestis

- polyantha Gilg*, 121, 653.
setosa Gilg, 121.
urens Gilg, 121.
Cocculus macranthus H. f. 24.
Cocos L. 586.
nucifera L. 586.
Codarium acutifolium Afz. 174.
Coelocline oxypetala A. DC. 21.
parviflora A. DC. 21.
Coffea L. 275.
arabica L. 275.
Arnoldiana D. W. 275.
aruwimiensis D. W. 275.
canephora Pierre, 275.
 — v. *crassifolia Em. Laur.* 276.
 — v. *kouilouensis Pierre*, 276.
 — v. *sankuruensis D. W.* 276.
 — v. *Wildemanii Pierre*, 276.
congensis Froehner, 276.
 — v. *Chalottii Pierre*, 276.
 — v. *Froehneri Pierre*, 276.
 — v. *subsessilis D. W.* 276.
Dewevrei D. W. et T. D. 277.
divaricata K. Sch. 277.
hirsuta G. Don, 267.
jasminoides Welw. 277.
 — v. *Trilesiana Pierre*, 277.
Laurentii D. W. 277.
liberica Bull. 277.
robusta J. Lind. 277.
Royauxii D. W. 278, 654.
spathicalyx K. Sch. 278.
stenophylla G. Don, 278.
subcordata Hiern, 278.
Cogniauxia Baill. 227.
cordifolia Cogn. 227.
podolaena Baill. 227.
trilobata Cogn. 227.
Coinochlamys T. And. 368.
angolana S. Moore, 368.
 — v. *Laurentii D. W.* 368.
congolana Gilg, 368.
hirsuta T. And. 654.
Poggeana Gilg, 369.
Cola S. et E. 60.
acuminata S. et E. 60.
acuminata Griffon du Bell. 61.
 — v. *Ballayi K. Sch.* 61.
 — v. *Ballayi Mast.* 61.

Cola

- Afzelii Mast.* 61.
Ballayi Cornu. 61.
Bruneellii D. W. 61.
caricifolia K. Sch. 61.
congolana D. W. et T. D. 61.
cordifolia R. Br. 62.
Dewevrei D. W. et T. D. 62.
digitata Mast. 62.
diversifolia D. W. et T. D. 62.
Gilletii D. W. 62.
griseiflora D. W. 62.
heterophylla S. et E. 62.
Laurentii D. W. 62.
 — form. *integrifolia D. W.* 62.
 — form. *intermedia D. W.* 62.
Ledermannii Engl. 652.
longifolia D. W. 62.
monponensis D. W. 62.
nalaensis D. W. 62.
pachycarpa K. Sch. 62.
Pynaertii D. W. 62.
quinqueloba Garcke, 60.
Sereti D. W. 63.
subverticillata D. W. 63.
urceolata K. Sch. 63.
variantifolia D. W. 63.
yambuyaensis D. W. 64.
Coleotrype Cl. 581.
Laurentii K. Sch. 581.
Coleus Lour. 449.
africanus Bth. 448.
bullulatus Briq. 449.
Dewevrei Briq. 449.
Dupuisii Briq. 449.
Eetveldeanus Briq. 449.
heterotrichus Briq. 449.
membranaceus Briq. 450.
mirabilis Briq. 450.
 — v. *Poggeanus Briq.* 450.
nervosus Briq. 450.
Poggeanus Briq. 450.
viridis Briq. 450.
Colocasia Schott, 591.
antiquorum Schott, 591.
Colocynthis amarissima Schrad. 230.
Columnnea longifolia L. 399.
COMBRETACEAE, 195.
Combretum L. 195.
angustifolium D. W. 195.
Bosoi D. W. 196.
Butayei D. W. 196.
Cabrae D. W. et T. D. 196.
camporum Engl. 196.
cinereo-petalum Engl. et Diels, 196.

Combretum

- confertum *Laws.* 196.
 constrictum *Laws.* 197.
 cordifolium *Engl.* 197.
 elacagnoides *T. D. et Sch.* 196.
 exannulatum *Engl. et Diels.* 197.
 flammeum *Welw.* 200.
 Gentilii *D. W.* 197.
 Haullevilleianum *D. W.* 197.
 Hensii *Engl. et Diels.* 197.
 hispidum *Laws.* 197.
 Kamatutu *D. W.* 198.
 Klotzschii *Welw.* 198.
 latialatum *Engl.* 198.
 — v. multibracteatum *Engl.* 198.
 Laurentii *D. W.* 198.
 Lawsonianum *Engl. et Diels.* 198.
 laxiflorum *Welw.* 198.
 longepilosum *Engl. et Diels.* 199.
 lukafuense *D. W.* 199.
 marginatum *Engl. et Diels.* 199.
 mucronatum *Sch. et Th.* 199.
 mussaendiflorum *Engl. et Diels.* 199.
 nervosum *Engl. et Diels.* 199.
 odontopetalum *Engl. et Diels.* 199.
 olivaceum *Engl.* 199.
 paniculatum *Vent.* 199.
 Poggei *Engl. et Diels.* 199.
 polystictum *Welw.* 196.
 porphyrobotrys *Engl. et Diels.* 200.
 puetense *Engl. et Diels.* 200.
 pyriforme *D. W.* 200.
 quangense *Engl. et Diels.* 197.
 racemosum *P. Beauv.* 200.
 — v. flammeum *Welw.* 200.
 racemosum *Hiern.* 196.
 sericogyne *Engl. et Diels.* 201.
 sinuatipetalum *D. W.* 201.
 Smeathmanni *G. Don.* 199.
 splendens *Engl.* 201.
 towaense *Engl. et Diels.* 201.
- Commelina** *L.* 576.
 aequinoctialis *P. B.* 579.
 aethiopica *Cl.* 576.

Commelina

- africana *L.* 576.
 agraria *Kth.* 578.
 ambigua *P. B.* 574.
 aspera *G. Don.* 576.
 benghalensis *L.* 576.
 beniniensis *P. B.* 579.
 capitata *Bth.* 577.
 Clarkeana *D. W. et T. D.* 577.
 condensata *Cl.* 577.
 Dammeriana *K. Sch.* 577.
 Forskalaei *Vahl.* 577.
 latifolia *Hochst.* 577.
 nudiflora *L.* 578.
 — f. agraria *D. W. et T. D.* 578.
 ovato-oblonga *R. et S.* 580.
 scaposa *Cl.* 578.
 Schweinfurthii *Cl.* 578.
 sinica *R. et S.* 580.
 umbellata *S. et T.* 578.
 Vogelii *Cl.* 578.
- COMMELINACEAE, 574.
 CONNARACEAE, 117.
- Connarus** *L.* 119.
 Englerianus *Gilg.* 119.
 luluensis *Gilg.* 119, 653.
 Stuhlmanni *Pl.* 119.
- Conocarpus** *Gaertn.* 195.
 erectus *L.* 195.
- Conopharyngia** *Stapf.* 343.
 durissima *Stapf.* 343.
 Gentilii *D. W.* 343.
 pachysiphon *Stapf.* 343.
 penduliflora *Stapf.* 344.
 Smithii *Stapf.* 344.
 — v. brevituba *D. W.* 344.
 Thonnerii *Stapf.* 344.
 — v. Demeusei *D. W.* 344.
 — v. Lescauwaeii *D. W.* 344.
- CONVOLVULACEAE, 379.
- Convolvulus alsinoides* *L.* 379.
 Batatas *L.* 385.
 bicolor *Vahl.* 381.
 cairicus *L.* 385.
 capitatus *Desv.* 381.
 filicanalis *Vahl.* 382.
 hispidus *Vahl.* 386.
 littoralis *L.* 388.
 Nil *L.* 388.
 ochraceus *Ldl.* 388.
 paniculatus *L.* 389.
 pentaphyllus *L.* 383.
 Pes-Caprae *L.* 389.
 pinnatus *Desr.* 390.
 reptans *L.* 389.
 sublobatus *L. f.* 381.

Conyza *Less.* 300.

- aegyptiaca *Dryand.* 300.
 aurita *L. f.* 301.
 cinerea *L.* 291.
 echioides *A. Rich.* 300.
 lacera *Burm.* 301.
 volubilis *Wall.* 300.
- Copaiba Arnoldiana* *D. W.* 180.
- Copaifera** *L.* 180.
 Arnoldiana *Th. et HéL. Dur.* 180.
 Demeusei *Harms.* 180.
 Laurentii *D. W.* 180.
- Coptosperma nigrescens* *H. f.* 266.
- Corchorus** *L.* 73.
 acutangulus *Lam.* 73.
 angustifolius *S. et T.* 74.
 capsularis *L.* 73.
 lobatus *D. W.* 73.
 olitorius *L.* 73.
 — f. grandifolius *D. W.* 74.
 tridens *L.* 74.
 trilocularis *Burm.* 74.
- Cordia** *L.* 377.
 aurantiaca *Bak.* 377.
 Dewevrei *D. W. et T. D.* 377.
 Gilletii *D. W.* 377.
 Liebrechtsiana *D. W. et T. D.* 377.
- Coreopsis** *L.* 308.
 Grantii *Oliv.* 308.
 Sereti *D. W.* 308.
- Coronocarpus Kotschyi* *Bth.* 306.
- Corynanthe** *Welw.* 241.
 paniculata *Welw.* 241.
- Costus** *L.* 542.
 afer *Ker.* 542.
 Dewevrei *D. W. et T. D.* 542.
 edulis *D. W. et T. D.* 542.
 Lucanusianus *J. Br. et K. Sch.* 543.
 phyllocephalus *K. Sch.* 543.
 spectabilis *K. Sch.* 540.
 trachyphyllus *K. Sch.* 543.
- Cotula Sphaeranthus* *Lk.* 299.
- Coula** *Baill.* 96.
 Cabrae *D. W. et T. D.* 96.
- Crabbea** *Harv.* 426.
 nana *Nees.* 426.
 ovalifolia *Fic. et Hiern.* 426.
- Cracca bracteolata* *O. K.* 131.
 elegans *O. K.* 131.
 linearis *O. K.* 132.
 lupinifolia *O. K.* 132.
 villosa *L.* 133.

Cracca

- Vogelii* O. K. 133.
Crassocephalum cernuum
 Moench, 310.
 — v. *coeruleum* Hiern,
 310.
Crassula L. 192.
abyssinica A. Rich. 192.
 — v. *vaginata* Engl. 192.
floripendula Sims, 193.
vaginata E. et Z. 192.
 CRASSULACEAE, 192.
Crassuvia floripendia
 Comm. 193.
Crataeva L. 32.
religiosa Forst. 32.
 — v. *brevistipitata* D.
 W. 32.
Craterispermum Bth.
 272.
angustifolium D. W. et
 T.D. 272.
brachynematum Hiern,
 272, 654.
 — v. *breviflorum* D. W.
 272.
congolatum D. W. et
 T.D. 272.
Dewevrei D. W. et T.D.
 272.
laurinum Bth. 272.
reticulatum D. W. 272.
Craterostigma Hochst.
 399.
latibracteatum Skan,
 399.
Cremsporea Bth. 266.
africana Bth. 267.
triflora K. Sch. 266.
Crinum L. 554.
congolense D. W. 554.
giganteum Andr. 555.
Herbertianum Wall.
 556.
Laurentii T.D. et D. W.
 555.
majakallense Bak. 555.
Massaianum N. E. Br.
 555.
natans Bak. 555.
purpurascens Herb. 555.
 — v. *angustifolium* D.
 W. 555.
scabrum Sims, 555.
zeylanicum L. 556.
Crossandra Salisb. 425.
guineensis Nees, 425.
nilotica Oliv. 425.
Crossopterix Fenzl, 241.
africana Baill. 241.
febrifuga Bth. 241.
Kotschyana Fenzl, 241.
Crotalaria L. 122.
aculeata D. W. 122.
brevidens Bth. 122.
Browni Berth. 126.

Crotalaria

- calycina* Schrank, 122.
capensis Jacq. 122.
comosa Bak. 122.
Cornetii Taub. et Dew.
 123.
cylindrocarpa DC. 123.
Descampsii M. Mich.
 123.
dubia D. W. 123.
filifolia D. W. 123.
glaucifera W. 123.
globifera E. Mey. 123.
 — v. *stenophylla* Taub.
 123.
Hildebrandtii Vatke,
 123.
intermedia Kotschy, 124.
katangensis A. Dew.
 124.
lanceolata E. Mey. 124.
linearifolia D. W. 124.
longifoliolata D. W. 124.
lukafuensis D. W. 124.
macilentata Delile, 125.
macrostachya Sond. 123.
mesopontica Taub. 124.
oligostachya Bak. 124.
ononoides Bth. 125.
ononoides Schlt. 125.
pisiformis G. et P. 126.
Poggei Taub. 125.
polyantha Taub. 125.
polygaloides Welw. 125.
quangensis Taub. 125.
Saltiana Andr. 126.
senegalensis Bacle, 125.
sertulifera Taub. 125.
sessilis D. W. 125.
spartea R. Br. 125.
spinosa Hochst. 126.
stenothyrsus Taub. 126.
striata DC. 126.
 — f. *latifoliolata* D. W.
 126.
subcapitata D. W. 126.
Croton L. 480.
angolensis M.-A. 480.
congensis D. W. 480.
Draconopsis M.-A. 481.
Mubango M.-A. 481.
oppositifolius Geis. 495.
oxypetalus M.-A. 481.
Poggei Pax, 481.
Tiglum L. 481.
Verdickii D. W. 481.
Welwitschianus M.-A.
 481.
zambesiacus M.-A. 481.
Crotonogyne M.-A. 490.
Laurentii D. W. 490.
 — v. *ikelebense* D. W.
 490.
Poggei Pax. 490.
 CRUCIFERACEAE, 27.
Crudia Schreb. 179.

Crudia

- Laurentii* D. W. 179.
Cryphiospermum fluctuans
 P. B. 305.
Cryptolepis R. Br. 355.
Debeerstii D. W. 355.
Hensii N. E. Br. 355.
scandens Schlt. 356.
Welwitschii Hiern. 356.
Cryptosepalum Bth.
 180.
Debeerstii D. W. 180.
exfoliatum D. W. 180.
maraviense Oliv. 180.
 — v. *minus* A. Dew.
 180.
Verdickii D. W. 180.
Crystallopollen angustifolium
 Steetz, 294.
Ctenium Panz. 643.
concinnum Nees. 643.
elegans Kth. 643.
Cubeba Clusii Miq. 467.
Cucumeropsis Naud.
 230.
edulis Cogn. 230.
Cucumis L. 229.
hirsutus Sond. 229.
maderaspatanus L. 232.
metuliferus E. Mey. 230.
Cucurbita L. 231.
Lagenaria L. 227.
maxima Duchesne, 231.
moschata Duchesne, 231.
Pepo L. 231.
 CUCURBITACEAE, 225.
Culcasia P. B. 587.
angolensis Welw. 587.
parviflora N. E. Br. 588.
scandens P. B. 588.
striolata Engl. 588.
tenuifolia Engl. 588.
Curandos edulis Hiern,
 337.
Curculigo Gaertn. 554.
gallabatensis Schw. 554.
Curcuma L. 539.
longa L. 539.
Cussonia Forst. 239.
angolensis Hiern, 239.
arborea Hochst. 239.
Cuviera DC. 271.
angolensis Welw. 271.
Cyanastrum Oliv. 573.
Verdickii D. W. 573.
Cyanospermum calycinum
 H. f. 157.
Cyanotis Don. 581.
angusta Cl. 581.
caespitosa Kotschy et
 Peyr. 581.
Dybowskyi Hua, 581.
lanata Bth. 581.
longifolia Bth. 582.
 — v. *Bakeriana* Cl. 582.
longifolia Bak. 582.

Cyanotis

somaliensis *Cl.* 582.
— v. *uda Cl.* 582.

Cyathogyne *M.-A.* 488.
Dewevrei Pax, 488.
viridis M.-A. 488.

Cyathula *Lour.* 458.
prostrata Bl. 458, 655
CYCADACEAE, 649.

Cyclocarpa *Afz.* 138.
stellaris Afz. 138.

Cyclocotyla *Stapf.* 337.
cougolensis Stapf. 337.

Cyclonema *myricoides*
Hochst. 439.
spinescens Oliv. 440.

Cynium *E. Mey.* 404.
adonense E. Mey. 404.
adonense Hiern, 405.
Buchneri Engl. 404.
camporum Engl. 404.
Dewevrei D. W. et T.D.
405.

— v. *minus D. W. et*
T.D. 405.

Questieauxianum D. W.
405.

Verdickii D. W. 405.

Cylindropsis *parvifolia*
Pierre, 333.

Cymbopogon *fnitimus*
Rendle, 625.
Humboldtii Spreng. 624.
Schimperi Rendle, 626.
Schoenanthus Rendle,
626.
— v. *densiflorus Rendle*,
626.

Cynanchum *L.* 363.
congolense D. W. 363.
Dewevrei D. W. et T.D.
363.

extensum Jacq. 364.

minutiflorum K. Sch.
363.

obscurum K. Sch. 364.
polyanthum K. Sch. 362.

schistoglossum Schlt.
363, 364.

subvolubile S. et T. 364.

Cynodon *Pers.* 642.
Dactylon Pers. 642.

Cynoglossum *L.* 379.
lanceolatum Forsk. 379.
micranthum Desf. 379.

Cynometra *L.* 181.
congensis D. W. 181.
djumaensis D. W. 181.
Gilletii D. W. 181.
Laurentii D. W. 181.
Lujae D. W. 181.
Mannii Oliv. 181.
Oddoni D. W. 181.
pedicellata D. W. 182.

Cynometra

Schlechteri Harms. 182.
sessiliflora Harms. 182.
Vogelii H. f. 182.

Cynosurus *aegyptius L.*
644.

indicus L. 644.

Coracana L. 644.

CYPERACEAE, 594.

Cyperus *L.* 599.

albiceps Ridl. 610.
albo-marginatus Steud.
608.

amabilis Vahl, 599.

— v. *macer Cl.* 599.

— v. *macra Cl.* 599.

angolensis Boeck. 599.

articulatus L. 599.

auricomus Sieb. 600.

Buchanani Boeck. 602.

Buettneri Boeck. 601.

bulbosus Vahl, 600.

compactus Lam. 600.

congensis Cl. 600.

crassipes Vahl, 605.

cuspidatus H. B. et K.
607.

dichromenaeformis
Kth. 600.

— v. *major Boeck.* 600.

difformis L. 601.

diffusus Vahl, 601.

— v. *angustifolius Cl.*
601.

distans L. 601.

dives Del. 602.

dubius Rottb. 597.

elatiior Boeck. 601.

esculentus L. 601.

— v. *acaulis Cl.* 602.

— v. *Buchanani Cl.* 602.

exaltatus Retz. 602.

— v. *dives Cl.* 602.

Fenzlianum St. 602.

fertilis Boeck. 602.

flabelliformis Rottb. 603.

flavescens L. 608.

flavidus Retz. 603.

flavus Boeck. 597.

flavus Cl. 597.

flexifolius Boeck. 603.

globosus All. 608.

gracilinux Cl. 603.

Haspan L. 603.

— v. *laevinux Cl.* 603.

Haspan Rottb. 603.

Hensii Cl. 604.

hexastachyus Rottb.
606.

hylaenus Ridl. 606.

immensus Cl. 604.

javanicus Retz. 600.

laevigatus L. 596.

ligularis L. 597.

maculatus Boeck. 604.

mapanioides Cl. 604.

Cyperus

margaritaceus Vahl, 604.

maritimus Poir. 604.

— v. *crassipes Cl.* 605.

monostachyus L. 617.

Mundtii Kth. 608.

Naumannianus Boeck.
604.

nilagiricus Hochst. 608.

niloticus Forsk. 600.

nossibeensis K. Sch. 598.

nudicaulis Poir. 605.

ochrocephalus Cl. 605.

Olfersianus Kth. 609.

Papyrus L. 605.

polystachyus R. Br. 609.

pratensis Boeck. 605.

— v. *laxus Cl.* 605.

pustulatus Vahl, 597.

pycnocephalus Steud
609.

radiatus Vahl, 605.

redolens Maury, 597.

Reinschii Boeck. 606.

rotundus L. 606.

Schweinfurthianus

Boeck. 606.

Sieberianus K. Sch. 593.

Smithianus Ridl. 609.

sphacelatus Rottb. 606.

tenax Boeck. 606.

tenuiculmis Boeck. 603,
607.

tetrastachyus Desf. 606.

tremulus Poir. 609.

tuberosus Rottb. 607.

umbellatus Cl. 599.

uncinatus Poir. 607.

Zollingeri St. 607.

— f. *gracilis Cl.* 607.

— v. *parvus Cl.* 607.

Cyphia *Berg.* 318.

erecta D. W. 318.

scaudens D. W. 318

Cyrtopera *Lindl.* 526.

flavo-purpurea Rchb. f.
526.

Walleri Rchb. f. 520.

Cyrtosperma *Schott.* 588.

Azelii Engl. 588.

senegalense Engl. 589.

CYTINACEAE, 466.

Cytisus *bicolor DC.* 157.

Cajan L. 157.

guineensis S. et T. 157.

pseudo-Cajan Jacq. 157.

D

Dactyloctenium *W.* 644.

aegyptium W. 644.

mpuetense D. W. 644.

Daemia *R. Br.* 364.

extensa R. Br. 364.

Dalbergia *L.* 161.

ealaensis D. W. 161.

florifera D. W. 161.

- Dalbergia**
florifera v. *obscura* D. W. 161.
Gentili D. W. 161.
Gilletii D. W. 161.
glaucescens D. W. 161.
Harmsiana D. W. 161.
isangiensis D. W. 161.
kisantuensis D. W. et T. D. 161.
Laurentii D. W. 162.
laxiflora M. Mich. 162.
luluensis Harms, 162.
macrosperma Welw. 162.
— v. *longipedicellata* D. W. 162.
medicinalis D. W. 162.
Michelliana D. W. 162.
pubescens Bth. 653.
saxatilis H. f. 162.
- Dalechampia** L. 499.
ipomoeaeifolia Bth. 499.
scandens L. 499.
— v. *cordofana* M.-A. 499.
- Dalhouisia** Wall. 166.
africana S. Moore, 166.
bracteata Bak. 166.
- Damapana strobilantha** O. K. 140.
- Dasystachys** Bak. 569.
africana Th. et Hël. Dur. 569.
Grantii Bth. 569.
Verdickii D. W. 569.
- Datura** L. 396.
fastuosa L. 396.
Stramonium L. 397.
— v. *Tatula* Dunal, 397.
Tatula L. 397.
- Decaneuron amygdalinum** DC. 290.
senegalense DC. 295.
- Decastemon hirtum** Kl. 29.
- Deguelia brachyptera** Taub. 166.
nobilis Taub. 166.
- Deinbollia** S. et T. 111.
insignis H. f. 111.
Laurentii D. W. 111.
- Delphinium** L. 15.
dasycaulon Fresen. 15.
- Demeusea** D. W. et T. D. 557.
longifolia D. W. et T. D. 557.
- Dendrobium pumilum** Sw. 517.
- Derris** Lour. 166.
brachyptera Bak. 166, 653.
congolensis D. W. 166.
nobilis Welw. 166, 653.
- Desmochaeta prostrata** DC. 458.
- Desmodium** Desv. 142.
adscendens DC. 142.
- Desmodium**
barbatum Bth. et Oerst. 142.
dimorphum Welw. 142.
gangeticum DC. 142.
hirtum G. et P. 142.
lasiocarpum DC. 142.
lasiocarpum D. W. 144.
latifolium DC. 143.
mauritanum DC. 142.
megalanthum D. W. 141.
oxybracteum DC. 143.
paleaceum G. et P. 143.
polygonoides Welw. 144.
setigerum E. Mey. 142.
Stuhlmannii D. W. 142.
tenuiflorum M. Mich. 144.
triflorum DC. 144.
- Dewevrea** M. Mich. 137.
bilabiata M. Mich. 137.
- Dewevrella** D. W. 355.
cochliostema D. W. 355.
- Dewildemaniania** O. Hoffm. 296.
filifolia O. Hoffm. 296.
- Dewindtia** D. W. 180.
katangensis D. W. 180.
- Dialium** L. 174.
acuminatum D. W. 174.
angolense Welw. 174.
guineense W. 174, 653.
Laurentii D. W. 174.
- Dianthera Anselliana** B. et H. f. 429.
bicalyculata Retz. 433.
- Dicellandra** H. f. 214.
Barteri H. f. 214.
— v. *runcinata* D. W. 214.
- Diceros longifolium** Pers. 399.
- DICHAPETALACEAE**, 94.
- Dichapetalum** Thou. 94.
adnatiflorum Engl. 94.
congoense Engl. 94.
Dewevrei D. W. et T. D. 94.
floribundum Engl. 95.
olopetalum Ruhl. 94.
leucosepalum. Ruhl. 94.
Lolo D. W. et T. D. 94.
Lujaei D. W. et T. D. 94.
mombuttense Engl. 94.
mundense Engl. 95.
obliquifolium Engl. 95, 652.
patenti-hirsutum Ruhl. 95.
Poggei Engl. 95.
rufipile T. D. et Sch. 95, 652.
- Dichrocephala** DC. 299.
chrysanthemifolia DC. 299.
- Dichrocephala**
latifolia DC. 299.
marrocephala Sz.-B. 299.
- Dichrostachys** W. et A. 185.
nutans Bth. 185.
platyptera Welw. 185.
- Dicliptera** Juss. 432.
Elliotii Cl. 432.
Hensii Lindau, 433.
katangensis D. W. 432.
umbellata Juss. 432.
verticillaris T. And. 432.
verticillaris A. Juss. 434.
Welwitschii S. Moore, 432.
- Dicoma** Cass. 313.
anomala Sond. 313.
— v. *karaguensis* O. et H. 313.
karaguensis Oliv. 313.
Poggei O. Hoffm. 313.
- Dicraea** Thou. 466.
quangensis Engl. 466.
Warmingii Engl. 466.
- Dicraeanthus** Engl. 466.
africanus Engl. 466.
- Dicranolepis** Pl. 471.
Baertsiana D. W. et T. D. 471
convalliodora Gilg, 471.
Thonneri D. W. et T. D. 471.
- Dictyandra** Welw. 256.
arborescens Welw. 256.
- Dictyophlebia lucida** Pierre, 328.
- Didymia cyperomorpha** Phil. 597.
- Diesingia scandens** Endl. 155.
- Digera** Forsk. 457.
arvensis Forsk. 457.
- Digitariadiagonalis** Stapf, 631.
sanguinalis Scop. 634.
- DILLENIACEAE**, 16.
- Dimorphochlamys** H. f. 230.
Cabraei Cogn. 230.
Crepiniana Cogn. 230.
Mannii H. f. 230.
- Dinophora** Bth. 207.
spenneroides Bth. 207.
Thonneri Cogn. 207.
- Dioclea** H. B. et K. 149.
reflexa H. f. 149.
- Diodia** L. 286.
brevisetata Bth. 286.
foliosa W. et P. 286.
maritima Thonn. 286.
scabra S. et T. 287.
scandens Sw. 286.
senensis Kl. 287.
serrulata K. Sch. 286.

- Dioscorea** L. 558.
 acarophyta D. W. 558.
 alata Willd. 559.
 apiculata D. W. 559.
 Beccariana Martelli, 559.
 Costermansiana D. W. 559.
 Demeusei D. W. et T. D. 559.
 dumetorum Pax, 559.
 Liebrechtsiana D. W. 559.
 macroura Harms, 560.
 minutiflora Engl. 560.
 odoratissima Pax, 560.
 pentaphylla A. Rich. 559.
 praehensilis Bth. 560.
 — v. minutiflora Bak. 560.
 Preussii Pax, 560.
 pterocaulon D. W. et T. D. 560.
 Quartiniana A. Rich. 559.
 sativa L. 560.
 Schimperiana Hochst. 561.
 — v. vestita Pax, 561.
 Schlechteri Harms, 561.
 smilacifolia D. W. et T. D. 561.
 Thonneri D. W. et T. D. 561.
 triphylla A. Rich. 559.
 Verdickii D. W. 561.
- DIOSCOREACEAE**, 558.
- Dioscoreophyllum** Engl. 25.
 strigosum Engl. 25.
- Diospyros** L. 323.
 incarnata Guerke, 323.
 Loureiriana G. Don, 323.
 — v. heterotricha Welw. 323.
 mespiliformis Hochst. 323.
 mombuttensis Guerke, 323.
- Dipcadi** Medic. 569.
 Mechowii Engl. 569.
 Thollonianum Hua, 569.
- Diphaca cochinchinensis** Lour. 138.
- Diplorhynchus** Welw. 339.
 angolensis Bth. 339.
 angolensis Britten, 339.
 mossambicensis Bth. 339.
 Poggei K. Sch. 339.
 Welwitschii Rolfe, 339.
- Dipodium umbellatum** O. K. 432.
- Diporidium Schweinfurthianum** V. Tgh. 86.
- Diporochna membranacea** V. Tgh. 86.
- DIPSACEAE**, 288.
- Dipteracanthus patulus** Nees, 419.
- DIPTEROCARPACEAE**, 47.
- Dipterotheca Kotschy** Sz-Bip. 306.
- Disa** Berg. 536.
 aurantiaca R. f. 536.
 erubescens Rendle, 536.
 katangensis D. W. 537.
 Leopoldi Krzl. 536, 537.
 ochrostachya Rchb. f. 536, 537.
 Verdickii D. W. 537.
 Walleri Rchb. f. 537.
 Welwitschii R. f. 537.
- Dischistocalyx pubescens** Lindau, 424.
- Disperis** Sw. 538.
 aphylla Krzl. 538.
- Dissotis** Bth. 208.
 aquatica D. W. 208.
 Autraniana Cogn. 208.
 Brazzaei Cogn. 208.
 capitata H. f. 208.
 — v. Vogelii H. f. 208.
 cordata Gilg, 209.
 cornifolia H. f. 209.
 debilis Triana, 209.
 decumbens Triana, 209.
 — v. minor Cogn. 209.
 falcipila Gilg, 210.
 Gilgiana D. W. 210.
 Gilletii D. W. 210.
 gracilis Cogn. 210.
 Hensii Cogn. 210.
 incana Triana, 211.
 Irvingiana Hook. 211.
 laevis H. f. 210.
 lanceolata Cogn. 209.
 macrocarpa Gilg, 211.
 multiflora Triana, 211.
 phaeotricha Triana, 211.
 plumosa H. f. 212.
 prostrata Triana, 212.
 rotundifolia Triana, 211.
 Schweinfurthii Gilg, 212.
 segregata Bth. 212, 654.
 Sereti D. W. 212.
 Thollonii Cogn. 212.
 Verdickii D. W. 213.
 villosa Engl. 209.
 villosa H. f. 211.
- Dolichandrone Fenzl**, 410.
 lutea Bth. 410.
 tomentosa Bth. 410, 716.
- Dolicholus calycinus** Hiern, 157.
 caribaeus Hiern, 157.
- Dolicholus Memnonia**, Hiern, 158.
 minimus Hiern, 159.
- Dolichos** L. 156.
 biflorus L. 156.
 bulbosus L. 155.
 Catjang L. 153.
 dubius D. W. 156.
 esculentus D. W. 156.
 Gululu D. W. 156.
 Hendrickxii D. W. 156.
 Katali D. W. 156.
 Lablab L. 156.
 obovatus S. et T. 149.
 obtusifolius Lam. 149.
 ovalifolius S. et T. 149.
 pseudopachyrhizus Harms, 156.
 pteropus Bak. 142.
 serpens D. W. 156.
 sinensis L. 153.
 splendens Welw. 156.
 stenocarpa Hochst. 154.
 trinervis D. W. 157.
 Verdickii D. W. 157.
- Dombeya** Cav. 64.
 Goetzenii K. Sch. 64.
 katangensis D. W. et T. D. 64.
 Kindtiana D. W. et T. D. 64.
 myriantha K. Sch. 64.
 niangaraensis D. W. 64.
 Sereti D. W. 64.
- Donax arillata** K. Sch. 547.
 azurea K. Sch. 545.
 congensis K. Sch. 548.
 cuspidata Bak. 548.
 filipes K. Sch. 548.
 Schweinfurthiana K. Sch. 548.
- Dorstenia** L. 502.
 Debeerstii D. W. et T. D. 502.
 Gilletii D. W. 502.
 kameruniana Engl. 503.
 Klainei Pierre, 502.
 Laurentii D. W. 502.
 Lujae D. W. 502.
 lukafuensis D. W. 502.
 mogandjensis D. W. 502, 656.
 Poggei Engl. 503.
 Psilurus Welw. 503.
 scabra Engl. 503.
 scaphigera Bur. 503.
 Verdickii D. W. et T. D. 503, 656.
 yambuyaensis D. W. 503.
- Dracaena** L. 564.
 arborea Lk, 564.
 Aubryana Ad. Brongn. 567.
 Buettneri Engl. 564.

Dracaena

- Burkeana *Pl.* 564.
 Butayei *D. W.* 564.
 capitulifera *D. W. et T.*
D. 565.
 congensis *Engl.* 565.
 fragrans *Ker.* 565.
 Gentilii *D. W.* 565.
 Godseffiana *Hort.* 566.
 hirsuta *Thunb.* 575.
 Lacourtii *Hort.* 566.
 Kindtiana *D. W.* 565.
 Laurentii *D. W.* 565.
 laxissima *Engl.* 565.
 Lindeni *Hort.* 565.
 nitens *Welw.* 566.
 Oddoni *D. W.* 565.
 Poggei *Engl.* 566.
 — v. *elongata D. W.*
 566.
 reflexa *Lam.* 566.
 — v. *Buchneri Engl.*
 566
 — v. *nitens Bak.* 566.
 rubro-aurantiaca *D. W.*
 566.
 spicata *Roxb.* 567.
 — v. *aurantiaca Bak.*
 567.
 surculosa *Ldl.* 566.
 thalioides *Ch. Morr.*
 567.
 ueleensis *D. W.* 567.
 usambarensis *Engl.* 567.
 — v. *longifolia D. W.*
 567.
Dregea *E. Mey.* 366.
 rubicunda *K. Sch.* 366.
Drepanocarpus *G. Mey.*
 163.
 lunatus *G. Mey.* 163.
Drimia altissima *Ker.* 570.
Drimiopsis *Ldl.* 571.
 Barteri *Bak.* 571.
Droogmansia *D. W.* 141.
longipedicellata D. W.
 141.
 megalantha *D. W.* 141.
 pteropus *D. W.* 142.
 Stuhlmannii *D. W.* 142.
Drosera *L.* 193.
 Burkeana *Pl.* 193.
 indica *L.* 194.
 DROSERACEAE, 193.
Drymaria *W.* 41.
 cordata *W.* 41.
Dufourea alternifolia W.
 465.
Dupuisia juglandifolia
Rich. 115.
Duranta *L.* 436.
 erecta *L.* 436.
 Plumieri *Jacq.* 436.
Duvernoya *E. Mey.* 431.
 Dewevrei *D. W. et T.D.*
 431.

Duvernoya

- extensa *Lindau,* 655.
 haplostachya *Lindau,*
 431.
 Verdickii *D. W.* 431.
Dyschoriste *Nees.* 418.
 Perrottetii *O. K.* 418.
 Verdickii *D. W.* 419.
 verticillaris *Cl.* 419.

E

EBENACEAE, 323.

- Ecastaphyllum** *P. Br.*
 163.
 Brownei *Pers.* 163.
 Monetaria *Pers.* 163.
 pachycarpum *D. W. et*
T.D. 163.
Echinochloa Crus-galli P.
B. 631.
Echinodorus *L. C. Rich.*
 593.
 humilis *Buchen.* 593.
Echinolaena polystachya
H. B. et K. 634.
Echinolytrum dipsaceum
Desv. 617.
Echinops *L.* 313.
 Korobori *D. W.* 313.
 Sereti *D. W.* 313.
Eclipta *L.* 305.
 africana *DC.* 307.
 alba *Hassk.* 305.
 caulirhiza *DC.* 307.
 erecta *L.* 305.
 filicaulis *S. et T.* 307.
Ecliptica alba O. K. 305.
Ectadiopsis *Bth.* 356.
 Buettneri *K. Sch.* 356.
 scandens *K. Sch.* 356.
Ectinocladus Benthami
Baill. 351.
Edwardia Afzelii O. K.
 61.
 lurida *Raf.* 61.
Agassea Laurentii D.
W. 67.
 laurifolia *Pierre,* 67.
 Pierreana *D. W.* 68.
Ehretia *L.* 377.
 abyssinica *R. Br.* 377.
 Guerkeana *D. W.* 378.
 longistyla *D. W. et T.D.*
 378.
Eichornia *Kth.* 573.
 natans *Solms,* 573, 656.
Elaeis *Jacq.* 586.
 guineensis *L.* 586.
Eleocharis *R. Br.* 612.
 atropurpurea *Kth.* 612.
 capitata *R. Br.* 613.
 Chartaeria *R. et S.* 613.
 fistulosa *Schult.* 613.
Elephantopus *L.* 297.
 multisetus *O. Hoffm.*
 297.

Elephantopus

- scaber *L.* 297.
Eleusine *Gaertn.* 644.
 Coracana *Gaertn.* 644.
 cruciata *Lam.* 644.
 indica *Gaertn.* 644.
 Luco *Welw.* 644.
 textilis *Welw.* 644.
Eleutherine *Herb.* 553.
 plicata *Herb.* 553.
Elionurus *H. et B.* 623.
 argenteus *Nees,* 623.
 argenteus *T.D. et*
Schinz, 623.
 Hensii *K. Sch.* 623.
Elsholtzia *W.* 453.
 Schimperii *Hochst.* 453.
Elytraria *Vahl,* 415.
 crenata *Vahl,* 415.
 marginata *Vahl,* 415.
Elytrophorus *P. B.* 645.
 articulatus *P. B.* 645.
Embelia *Burm.* 319.
 retusa *Gilg,* 319.
Emerus Sesban O. K. 137.
Emilia *Cass.* 311.
 caespitosa *Oliv.* 311.
 flammea *Cass.* 311.
 graminea *DC.* 311.
 integrifolia *Bak.* 311.
 sagittata *DC.* 311.
 sonchifolia *DC.* 311.
Emiliomarcelia *Th. et*
Hél. Dur. 115.
 Braunii *Th. et Hél.*
Dur. 115.
 congoensis *Th. et Hél.*
Dur. 115.
 Laurentii *Th. et Hél.*
Dur. 115.
 Oddoni *Th. et Hél. Dur.*
 115.
Eminia *Taub.* 146.
 Harmsiana *D. W.* 146.
Encephalartos *Lehm.*
 649.
 Laurentianus *D. W.* 649.
 Lemarinelianus *D. W. et*
T.D. 649.
Enhydra *Lour.* 305
 fluctuans *Lour.* 305.
 Heloncha *DC.* 305.
 longifolia *DC.* 305.
 paludosa *DC.* 305.
Ensete edulis Horan. 550.
Entada *Adans.* 183.
 abyssinica *St.* 183.
 africana *G. et P.* 183.
 scandens *Bth.* 184.
 sudanica *Schw.* 184.
 — v. *pauciflora D. W.*
 184.
Entandrophragma *C.*
DC. 93.
 Candolleum *D. W. et*
T.D. 93.

- Eragrostis** P. B. 645.
atrovirens Nees. 645.
Brownei P. B. 646.
Chapellieri Nees. 646.
ciliaris Lk. 646.
fascicularis Trin. 646.
interrupta P. B. var.
namaquensis T.D. et
 Schinz. 647.
major Host. 646.
megastachya Lk. 646.
multiflora Aschers. 646.
namaquensis Nees. 647.
nutans Roxb. 647.
owariensis St. 648.
patens Oliv. 646. 647.
 — v. *congoensis* Franch.
 647.
sabulicola Pilg. 647.
tremula Hochst. 647.
tubiformis Hack. 647.
verticillata Roxb. 647.
Eranthemum elegans R.
 et S. 421.
Ludocicianum Buett.
 428.
nigritanum T. And. 429.
Eremospatha W. et M.
 585.
Cabrae D. W. 585.
cuspidata Wendl. 585.
Haullevilleana D. W.
 585.
Hookeri Wendl. 585.
 ERICACEAE, 319.
Ericinella Kl. 319.
Mannii H. f. 319.
Erigeron aegyptiacum L.
 300.
stipitatum Sch. et Th.
 301.
Eriobotrya japonica Ldl.
 192.
Eriocaulon radicans Bth.
 594.
 ERIOCAULONACEAE,
 593.
Eriocoelum H. f. 112.
macrospERMUM Gilg.
 112.
microspERMUM Rdlk.
 112.
paniculatum Bak. 653.
*Eriodendron anfractu-
 osum* DC. 60.
Eriosema DC. 159.
affinis D. W. 159.
cajanoides H. f. 159.
elongatum Baill. 160.
Gilletii D. W. et T.D.
 159.
glomerata Baill. 159.
glomeratum H. f. 159.
 — v. *elongatum* Bak.
 160.
 — f. *microphyllum* D.
 W. 160.
- Eriosema**
griseum Bak. 160.
hodlophylla Bak. 116.
Laurentii D. W. 160.
parviflorum E. Mey.
 160.
psoraleoides G. Don. 159.
pulcherrimum Taub.
 160.
sericeum Bak. 160.
tuberosum Hochst. 161.
Verdickii D. W. 161.
- Erythrina** L. 147.
abyssinica Lam. 147,
 653.
Droogmansiana D. W.
 et T.D. 147.
Gilletii D. W. 147.
huillensis Welw. 148.
Sereti D. W. 148.
suberifera Welw. 148.
tomentosa R. Br. 147.
- Erythrocephalum** Bth.
 315.
erectum Klatt. 315.
- Erythrocoeca** Bth. 491.
aculeata Bth. 491.
- Erythrophleum** Afz.
 182.
guineense Don. 182.
ordale Bolle. 182.
- Erythropyxis** Pierre. 67.
Eetveldeana D. W. et T.
 D. 67.
- Erythroxylo**n L. 76.
Coca Lam. 76.
- Ethulia** L. 289.
conyzoides L. 289.
gracilis DC. 289.
- Euadenia** Oliv. 33.
alimensis Hua. 33.
trifoliata B. et H. f. 33.
- Eucalyptus** L'Hér. 206.
globulus L'Hér. 204.
robusta Sm. 204.
viminialis Lab. 204.
- Euclaste** Franch. 649.
graminea Franch. 649.
- Euclea** L. 323.
divinorum Hiern. 323.
katangensis D. W. 323.
- Eugenia** L. 202.
calophylloides D.C. 202.
caryophylloides Bth.
 202.
cordata Laws. 203.
Demeusei D. W. 202.
 — f. *lukolelaensis* D. W.
 202.
Dewevrei D. W. et T.D.
 202.
guineensis Hiern. 203.
Jambos L. 202.
Jambosa Elliott. 202.
Laurentii Engl. 202.
Michellii Lam. 203.
owariensis P. B. 203.
- Eugenia**
uniflora L. 203.
- Eulophia** R. Br. 518.
antennisepala Schlt.
 521.
arenaria Bolus. 521.
Bieleri D. W. 518.
congoensis Cogn. 518.
cyrtosoides Schlt. 518.
dilecta Schltr. 521.
flavo-purpurea Rolfe,
 526.
gigantica N. E. Br. 521.
gracilis Ldl. 518.
gracilis D. W. 519.
graciliscapa Schltr. 519.
guineensis Ldl. 519.
Laurentiana Krzl. 519.
Ledieni Stein. 521.
Leopoldi Krzl. 519.
Lindleyana Schltr. 522.
Lubbersiana Ém. Laur.
 519.
Lujaeana Krzl. 519.
lurida Ldl. 519.
 — v. *latifolia* D. W. 520.
maculata Auct. 521.
porphyroglossa Bolus,
 522.
pyrophila Schltr. 523.
Smithii Rolfe. 520.
speciosa Rolfe. 520.
Tanganyikae Krzl. 520.
Walleri Krzl. 520.
Welwitschii Rolfe. 520.
- Eulophidium** Pfitz. 520.
Ledieni D. W. 520.
- Eupatorium** L. 298.
africanum O. et H. 298.
scandens L. 298.
- Euphorbia** L. 477.
Candelabrum Trém. 655.
cyparissioides Pax. 477.
decumbens Forsk. 477.
graminea Jacq. 477.
Grantii Oliv. 477.
Hermentiana Ch Lem.
 477.
hypericifolia L. 477.
indica Lam. 477.
Laurentii D. W. 478.
pilulifera L. 478.
Poggei Pax. 478.
prostrata Ait. 478.
Quintasii Pax. 478.
Sapini D. W. 478.
Sereti D. W. 478.
splendens Boj. 478.
thymifolia Burm. 479.
Tirucalli L. 479.
tumbaensis D. W. 479.
Verdickii D. W. 479.
- EUPHORBIACEAE, 476.
Euxolus caudatus Moq.
 458.
viridis Moq. 458.

- Evolvulus** L. 379.
 alsinoides
 — v. *erectus* Schw. 380.
 — v. *procumbens* Schw. 379.
 — v. *strictus* Kl. 380.
hederaceus Burm. 382.
heterophyllus Lab. 380.
linifolius L. 380.
- Exacum** L. 374.
quinquenervium Griseb. 374.
- Excoecaria** Manniana M.-A. 500.
oblongifolia M.-A. 500.
- Exochaenium** Griseb. 373.
chionanthum Schinz, 373.
debile Welw. 374.
Gentilii D. W. 373.
Teuszii Schinz, 374.
Wildemanianum Gilg, 374.
- Exomicrum** Cabrae V. Tgh. 87.
coriaceum V. Tgh. 87.
densiflorum V. Tgh. 87.
Dewevrei V. Tgh. 87.
pellucidum V. Tgh. 88.
- Exostemma** capitatum Spreng. 472.
- F**
- Fabricia** nummularifolia O. K. 145.
rugosa O. K. 145.
- Fadogia** Schw. 270.
ancylantha Schw. 270.
Butayei D. W. 270.
Cienkowskii Schw. 270.
fuchsioides Welw. 271.
lactiflora Welw. 271.
tomentosa D. W. 271.
Verdickii D. W. et T.D. 271.
- Fagara** L. 81.
Gilletii D. W. 81.
Laurentii D. W. 81.
macrophylla Engl. 81.
 — v. *Preussii* Engl. 81.
pilosiuscula Engl. 81.
Poggei Engl. 81.
Welwitschii Engl. 81.
- Faroa** Welw. 375.
affinis D. W. 375.
paradoxa Gilg, 375.
salutaris Welw. 375.
- Faurea** Harv. 470.
saligna Harv. 470.
- Feretia** Del. 264.
apodanthera Del. 264, 654.
- Ferolia** Mobola O. K. 191.
- Ferreola** guineensis S. et T. 323.
- Feuillaea pedata* Sm. 226.
- Feuillea Lebbek* O. K. 188.
Sassa O. K. 188.
versicolor O. K. 188.
Zygia O. K. 187.
- FICOIDACEAE, 236.
- Ficus** L. 504.
ardisioides Warb. 504.
artocarpoides Warb. 504.
Bubu Warb. 504.
Cabrae Warb. 504.
capensis Thunb. 504.
 — v. *pubescens* Warb. 505.
chlamydodora Warb. 504.
congensis Engl. 504.
corylifolia Warb. 504.
 — v. *glabrescens* Warb. 505.
crassicosta Warb. 505.
cyathistipula Warb. 505.
Demeusei Warb. 505.
Dewevrei Warb. 505.
Dreypondtiana Gent. 656.
Dusenii Warb. 505.
erubescens Warb. 505.
exasperata Vahl, 505.
furcata Warb. 505.
Gilletii Warb. 505.
inkasuensis Warb. 506.
kimuenzensis Warb. 506.
kisantuensis Warb. 506.
Laurentii Warb. 506.
Lingua Warb. 506.
megalodisca Warb. 506.
megaphylla Warb. 506.
 — v. *glabra* Warb. 506.
monbuttuenis Warb. 506.
Munsae Warb. 506.
Nekbudu Warb. 507.
niamniamensis Warb. 507.
octomelifolia Warb. 507.
pachypleura Warb. 507.
paludicola Warb. 507.
persicaefolia Warb. 507.
 — v. *angustifolia* Warb. 507.
 — v. *glabripes* Warb. 507.
platyphylla Delile, 507.
polybractea Warb. 507.
Preussii Warb. 508.
pubicosta Warb. 508.
punctifera Warb. 508.
Rokko Warb. et Schw. 508.
scolopophora Warb. 508.
stellulata Warb. 508.
- Ficus**
stellulata v. *glabrescens* Warb. 508.
subcalcarata Warb. et Schw. 508.
syringaefolia Warb. 508.
syringaefolia Warb. 507.
triangularis Warb. 509.
Vallis-Choudae Delile, 509.
variifolia Warb. 509.
villosipes Warb. 509.
Wildemaniana Warb. 509.
xiphophora Warb. 509.
- Fillaea suaveolens* G. et P. 182.
- Fillaeopsis** Harms, 184.
discophora Harms, 184.
- Fimbristylis** Vahl, 613.
abortiva Steud. 613.
andongense Cl. 613.
autumnalis Boeck. 616.
barbata Bth. 614.
cardiocarpa Ridl. 614.
Cioniana P. Savi, 616.
complanata Lk, 616.
complanata Retz. v. *splendida* Cl. 618.
dichotoma Vahl, 616.
diphylla Vahl, 616.
dipsacea Bth. 616.
exilis R. et S. 617.
 — v. *levinux* Cl. 616.
ferruginea Vahl, 617.
Hensii Cl. 617.
hispida Kth. 617.
hispidula Kth, v. *Lioniana* Boeck. 616.
laniceps K. Sch. 615.
Lioniana Steud. 616.
monostachya Hassk. 617.
obtusifolia Kth, 617.
pusilla A. Rich. 615.
quinguangularis Kth, 618.
scabrida Schum. 618.
splendida Cl. 618.
squarrosa Vahl, 618.
- Flabellaria** Cav. 77.
paniculata Cav. 77.
- Flagellaria** L. 538.
guineensis S. et T. 538.
indica Thoms. 538.
- FLAGELLARIACEAE, 538.
- Fleurya** Gaud. 511.
aestuans Gaud. 511.
interrupta Gaud. 511.
podocarpa Wedd. 511.
- Floscopa** Lour. 582.
africana Cl. 582.
glomerata Hassk. 582.
rivularis Cl. 583.
 — v. *minor* Cl. 583.

FloscopaSchweinfurthii *Cl.* 583.**Flueggea** *Willd.* 483.*microcarpa* *Blume*, 484.*obovata* *Wall.* 483.**Fockea** *Endl.* 366.*multiflora* *K. Sch.* 366.*Schinzii* *N. E. Br.* 366.**Fuirena** *Rottb.* 619.*chlorocarpa* *Kidl.* 619.*umbellata* *Rottb.* 619.**Funtumia** *Stapf*, 349.*africana* *Stapf*, 350.*elastica* *Stapf*, 349.*Gilletii* *D. W.* 350.*latifolia* *Stapf*, 350.**G****Gabunia** *K. Sch.* 343.*eglandulosa* *Stapf*, 343.*Gentilii* *D. W.* 343.**Gaertnera** *Lam.* 373.*paniculata* *Bth.* 373.*plagiocalyx* *K. Sch.* 373.**Galium** *L.* 288.*stenophyllum* *Bak.* 288.— v. *longifolium* *D. W.*et *T. D.* 288.*Gambeya africana* *Pierre*,

320.

Garcinia *L.* 46.*Giadidi* *D. W.* 46.*Gilletii* *D. W.* 46.*Livingstonei* *T. And.* 47.*longeacuminata* *Engl.*

46, 651.

lualabensis *Engl.* 46,

651.

Mannii *Oliv.* 46.*ovalifolia* *Oliv.* 47.*Pierreana* *D. W.* 47.*polyantha* *T. D. et Sch.*

47.

punctata *Oliv.* 47.*Pynaertii* *D. W.* 47.*Sereti* *D. W.* 47.**Gardenia** *L.* 261.*acuminata* *G. Don*, 258.*bignoniiflora* *Welw.*

262.

calycina *G. Don*, 262.*coccinea* *G. Don*, 248.*crinita* *Afz.* 254.*Jovis-tonantis* *Hiern*,

261.

Leopoldiana *D. W. et T.**D.* 261.*pulchella* *G. Don*, 254.*Sereti* *D. W.* 261.*Sherbourniae* *Hook* 262.*speciosa* *A. Rich.* 259.*Stanleyana* *Hook* 259.*Thunbergia* *Auct.* 261.*Vogelii* *H. f.* 261.**Geissaspis** *W. et A.* 140.*bifoliolata* *M. Mich.* 140.*Descampsii* *D. W. et T.**D.* 141.**Geissorhiza** *Ker*, 552.*Briartii* *D. W. et T. D.*

552.

Geniosporum *Wall.* 443*congoense* *Guerke*, 443.*scabridum* *Brig.* 444.

GENTIANACEAE, 373.

Genyorchis *Schltr.* 517.*pumila* *Schltr.* 517.**Geophila** *D. Don*, 283.*Aschersoniana* *Buett.*

283.

hirsuta *Bth.* 283.— v. *brevifolia* *D. W.* 283.— v. *hirsutissima* *D. W.*

283.

— v. *stricta* *D. W.* 284.*involverata* *Schw.* 284,

654.

obvallata *F. Didr.* 284.*renaris* *D. W. et T. D.*

284.

reniformis *D. Don*, 284.

GERANIACEAE, 78.

Geranium *L.* 78.*aculeolatum* *Oliv.* 78.*Gerardia Dregeana**Hochst.* 405.**Gerbera** *Gronov.* 315.*piloselloides* *Cav.* 315.

GESNERACEAE, 408.

Giesekia *L.* 237.*Miltus* *Fenzl.* 237.*pharnaceoides* *L.* 237.*Gigalobium abyssinicum**Hiern*, 183.*Giganthemum scandens**Welw.* 169.**Gilletiella** *D. W. et T. D.*

413.

congolana *D. W. et T.**D.* 413.**Girardinia** *Gaud.* 512.*condensata* *Wedd.* 512.— v. *adoensis* *Engl.* 513.**Gladiolus** *L.* 553.*angolensis* *Welw.* 553.*Arnoldianus* *D. W. et T.**D.* 553.*brevicaulis* *Bak.* 553.*corneus* *Oliv.* 553.*Quartinianus* *A. Rich.*

553.

Verdickii *D. W. et T.**D.* 553.*Glinus lotoides* *Loeff.* 236.*mozambicensis* *Spreng.*

237.

Spergula *Steud.* 236.**Gloriosa** *L.* 572.*simplex* *L.* 572.*superba* *L.* 572.**Gloriosa***virescens* *Ldl.* 572.**Glycine** *L.* 146.*Gilletii* *D. W.* 146.*holophylla* *Taub.* 146.*javanica* *L.* 147.— f. *glabrescens* *Buett.*

147.

kisantuensis *D. W.* 147.*memnonia* *Del.* 158.*micrantha* *Hochst.* 147.*moniliformis* *Hochst.*

147.

rufa *S. et T.* 159.**Glyphaea** *H. f.* 74.*grewioides* *H. f.* 74.*Monteiroi* *H. f.* 74.**Gnaphalium** *L.* 303.*argyrosphaerum* *Sz-B.*

303.

luteo-album *L.* 303.*nudifolium* *L.* 304.

GNETACEAE, 649.

Gnetum *L.* 649.*africanum* *Welw.* 649.**Gnidia** *L.* 470.*apiculata* *Gilg.* 470.*Butayei* *D. W.* 470.*flava* *Ldl.* 471.*involverata* *St. v. apicu-**lata* *Oliv.* 470.*katangensis* *Gilg.* 471.*Oliveriana* *Engl. et Gilg.*

471.

Poggei *Gilg.* 471.*rubro-cincta* *Gilg.* 471.*Gomphia affinis* *H. f.* 86.*flava* *S. et T.* 89.*reticulata* *P. B.* 89.**Gomphocarpus** *R. Br.*

359.

abyssinicus *Decne.* 360.*affinis* *D. W.* 362.*amoenus* *K. Sch.* 359.*bissacculatus* *Oliv.* 360.*Buchwaldii* *Schltr.* 362.*congolensis* *D. W.* 362.*cristatus* *Decne.* 359.*dependens* *K. Sch.* 359.*Dewevrei* *D. W.* 362.*erectus* *D. W.* 362.*foliosus* *K. Sch.* 359.*fruticosus* *R. Br.* 359.*katangensis* *D. W.* 362.*lineolatus* *Decne.* 360.*paluster* *K. Sch.* 359, 360.*roseus* *K. Sch.* 360.*semiamplectens* *K. Sch.*

360.

tomentosus *Burch.* 360.**Gomphrena** *L.* 461.*globosa* *L.* 461.*sessilis* *L.* 460*vermicularis* *L.* 461.**Gonatopus** *H. f.* 588.*Boivini* *H. f.* 588.

- Gonatopus**
Boivini v. angustifolio
latus *Th. et Hél. Dur.*
588.
Gongronema latifolium
Bth. 365.
- Gossypium** *L.* 58.
arborescens *L.* 58.
arborescens *L.* 58.
barbadense *L.* 58.
hirsutum *L.* 58.
punctatum *S. et T.* 58.
- Gouania** *Jacq.* 104.
longipetala *Hemsl.* 104,
652.
Sereti *D. W.* 104.
- GRAMINACEAE, 621.
- Grangea** *Adans.* 299.
maderaspatana *Poir.*
299.
Sphaeranthus *C. Koch.*
299.
Gratiola parviflora *Roxb.*
400.
- Grewia** *L.* 68.
africana *Mast.* 68.
barombiensis *K. Sch.* 68.
batangensis *C. H.*
Wright, 68.
carpinifolia *Juss.* 68.
coriacea *Mast.* 68.
floribunda *Mast.* 69.
— v. latifolia *D. W.* 69.
Laurentii *D. W.* 69.
malacocarpoides *D. W.*
69.
mollis *Juss.* 69.
occidentalis *L.* 69.
pinnatifida *Mast.* 69.
Sereti *D. W.* 69.
tetragastris *R. Br.* 69.
venusta *Fresen.* 69.
— v. angustifolia *K.*
Sch. 70.
- Grewiella** *O. K.* 70.
Dewevrei *Th. et Hél.*
Dur. 70.
— v. subintegrifolia *Th.*
et Hél. Dur. 70.
globosa *Th. et Hél. Dur.*
70.
Grewiopsis Dewevrei *D.*
W. et T. D. 70.
— v. subintegrifolia *D.*
W. et T. D. 70.
globosa *D. W. et T. D.* 70.
Griffonia speciosa *Taub.*
175.
- Grumilea** *Gaertn.* 280.
moninensis *Hiern,* 280.
psychotrioides *DC.* 280.
venosa *Hiern,* 280.
- Guarea** *L.* 92.
Laurentii *D. W.* 92.
Guerkea gracillima *K.*
Sch. 353.
- Guerkea laxiflora* *D. W.*
et *T. D.* 353.
Schumanniana *D. W. et*
T. D. 353.
uropetala *K. Sch.* 353.
Guilandina Bonduc *Ait.*
170.
Moringa *L.* 116.
- GUTTIFERACEAE, 45.
- Guyonia** *Naud.* 205.
intermedia *Cogn.* 205.
- Gymnema** *R. Br.* 364.
geminatum *Hiern,* 365.
rufescens *Decne,* 365.
subvolubile *Decne,* 364.
sylvestre *R. Br.* 364.
- Gymnosporia** *W. et A.*
100.
Gilletii *D. W. et T. D.*
100.
senegalensis *Loes.* 100.
— v. inermis *Loes.* 100.
Gymnotrix uniseta *Nees,*
639.
- Gynandropsis pentaphyl-*
la *DC.* 29.
- Gynura** *Cass.* 310.
cernua *Bth.* 310.
— v. coerulea *D. W. et*
T. D. 310.
coerulea *O. Hoffm.* 310.
crepidioides *Bth.* 310.
vitellina *Bth.* 310.
- H**
- Habenaria** *Willd.* 534.
Debeerstiana *Krzl.* 534.
Guingangae *R. f.* 534.
Haullevilleana *D. W.*
534.
ichneumonea *Ldl.* 534.
Kitondo *D. W.* 535.
Laurentii *D. W.* 535.
macrura *Krzl.* 535.
Poggeana *Krzl.* 535.
procera *Ldl.* 535.
zambesina *R. f.* 535.
- Haemanthus** *L.* 556.
angolensis *Weho.* 556.
Arnoldianus *D. W. et T.*
D. 556.
Cabrae *D. W. et T. D.*
556.
cinnabarinus *Decne,* 556.
diadema *L. Linden,* 556.
Eetveldeanus *D. W. et*
T. D. 557.
Kalbreyeri *Bak.* 557.
Lescrauwaetii *D. W.*
557.
Lindeni *N. E. Br.* 557.
multiflorus *Martyn,* 557.
toxicarius *Thunb.* 557.
- HAEMODORACEAE, 551
- Halimum mesembryan-*
themoides *Hiern,* 236.
- Halleria** *L.* 398.
lucida *L.* 398.
- Halopegia** *K. Sch.* 545.
azurea *K. Sch.* 545.
- Hannoa** *Pl.* 83.
gabonensis *Pierre,* 83.
- Hardwickia** *Roxb.* 181.
Mannii *Oliv.* 181.
- Hariota** *Adans.* 235.
parasitica *O. K.* 235.
- Haronga** *Thou.* 45.
madagascariensis *Choi-*
sy, 45.
paniculata *Lodd.* 45,
651.
Harongana paniculata
Pers. 45.
- Harveya** *Hook.* 401.
Thonneri *D. W. et T. D.*
401.
- Hasskarlia** *Baill.* 491.
didymostemon *Baill.*
491.
- Hecastaphyllum Brownei*
Benth. 163.
- Hedyotis Bojeri* *Vatke,*
244.
caffra *St.* 244.
capensis *Lam.* 245.
corymbosa *Vatke,* 245.
decumbens *Hochst.* 246.
dichotoma *A. Rich.* 246.
herbacea *L.* 246.
lanceifolia *S. et T.* 246.
macrophylla *Leprieur*
et Ferr. 244.
pentandra *S. et T.* 244
et 247.
sabulosa *DC.* 245.
setifera *Sond.* 244.
- Hedysarum deltoideum*
S. et T. 143.
fruticulosum *S. et T.*
143.
granulatum *S. et T.* 144.
nummularifolium *L.*
145.
pictum *Jacq.* 145.
triflorum *L.* 144.
vaginale *L.* 145.
- Heeria** *Meissn.* 115.
abyssinica *O. K.* 115.
— v. lauceolata *Th. et*
Hél. Dur. 116.
— v. latifolia *Engl.* 116.
pulcherrima *O. K.* 116.
- Heinsia** *DC.* 254.
densiflora *Hiern,* 254.
— v. occidentalis *D. W.*
254.
jasminiflora *DC.* 254.
pulchella *K. Sch.* 254.
— v. hispidissima *K.*
Sch. 254.

- Heinsia**
pulchella v. phyllocalyx
K. Sch. 254.
- Heisteria** L. 96.
parvifolia Sm. 96.
- Heleocharis atropurpurea**
Koch, 612.
capitata Boeck. 613.
Chaetaria Boeck. 613.
fistulosa Boeck. 613.
- Helianthus** L. 306.
annuus L. 306.
- Helichrysum** Gaertn.
303.
argyrosphaerum DC.
303.
auriculatum Less. 303.
fulgidum W. 303.
geminatum Klatt, 303.
Mechowianum Klatt,
304.
nudifolium Less. 304.
pachyrhizum Harv. 304.
panduratum O. Hoffm.
304.
subglomeratum Less.
304.
undatum Less. 304.
- Heliophytum indicum**
DC. 378.
- Heliotropium** L. 378.
coromandelianum Retz.
378.
indicum L. 378.
katangense Guerke,
378.
ovalifolium Forsk. 378.
- Helmia dumetorum** Kth,
559.
- Herderia** Cass. 297.
lancifolia O. Hoffm. 297.
stellulifera Bth. 297.
- Herminiera** G. et P. 138.
Elaphroxylon G. et P.
138.
- Herpestis calycina** Bth.
399.
Monnieria T.D. et Sch.
401.
- Heteranthera** R. et P.
656
Kotschyana Fenzl, 656.
- Heteropteris** Kth, 76.
africana A. Juss. 76.
Smeathmanni DC. 77.
- Heterotis capitata** Bth.
209.
cornifolia Bth. 209.
plumosa Bth. 212.
prostrata Bth. 212.
segregata Bth. 212.
- Hevea brasiliensis** M.-A.
488.
- Hewittia** W. et A. 381.
bicolor Walk.-Arn. 381.
sublobata O. K. 381.
- Hexalobus** A. DC. 20.
crispiflorus Auct. 20.
grandiflorus Bth. 20,
651.
- Hibiscus** L. 53.
Abelmoschus L. 53.
calycinus W. 53.
calycosus A. Rich. 53.
calyphyllus Cav. 53.
cannabinus L. 53.
clandestinus Cav. 55.
congener S. et T. 53.
Cornetii D.W. et T. D.
57.
crassinervis Mast. 54.
crassinervius Hochst. 54.
Debeerstii D. W. et T. D.
54.
digitatus Cav. 56.
diversifolius Jacq. 54.
Eetveldeanus D. W. et
T. D. 54.
esculentus L. 54.
ferrugineus Cav. 55.
fuscus Gareke, 55.
Gilletii D. W. 55.
gossypinus Thunb. 55.
Grantii Mast. 52.
Guerkeanus Hochreut.
55.
hastatus Cav. 55.
lancibracteatus D. W. et
T. D. 55.
Liebrechtsianus D. W.
et T. D. 55.
Masuianus D. W. et T.
D. 55.
micranthus L. 55.
owariensis P. B. 53.
panduriformis Burm. 56.
physaloides G. et P. 56.
populneus L. 58.
radiatus Cav. 53.
rhodanthus Guerke, 56.
rostellatus G. et P. 56.
Sabdariffa L. 56.
strigosus S. et T. 57.
submonospermus Hoch-
reut. 57.
surattensis L. 57
— v. furcatus Hochreut.
54.
— v. rostellatus Hoch-
reut. 56.
tiliaceus L. 57.
triumfettifolius S. et T.
53.
verrucosus G. et P. 53.
versicolor S. et T. 55.
vitifolius L. 57.
Welwitschii Hiern, 57.
- Hillieria elastica** Vell. 462.
- Hippocratea** L. 101.
apiculata Welw. 101.
bipiudensis Loes. 101.
Bruneelii D. W. 101.
- Hippocratea**
clematides Loes. 101.
cymosa D. W. et T. D. 101.
indica Willd. 101.
isangiensis D. W. 102.
myriantha Oliv. 102.
obtusifolia Roxb. 102.
— v. Richardiana Loes.
102.
obtusifolia Schw. v. ob-
tusifolia Loes. 101.
Poggei Loes. 102.
Pynaertii D. W. 102.
Richardiana Camb. 102.
velutina Afz. 102.
Verdickii D. W. 103.
- HIPPOCRATEACEAE**,
100.
- Hoehnelia** Schw. 289.
vernonioides Schw. 289.
- Holalafia** Stapf, 352.
multiflora Stapf, 352.
- Holarrhena** R. Br. 345.
africana A. DC. 346.
africana Wulfsb. 346.
congolensis Stapf, 345.
febrifuga Kl. 345.
— f. grandiflora Stapf,
346.
floribunda T. D. et
Sch. 346.
Wulfsbergii Stapf, 346.
- Holcus halepensis** L. 627.
spicatus L. 638.
- Holosteum cordatum** L.
41.
- Homalium** Jacq. 219.
Abdessammadii D. W.
221.
Abdessammadii D. W.
et T. D. 220.
africanum Bth. 219.
bullatum Gilg. 220.
Dewevrei D. W. et T. D.
220.
ealaense D. W. 220.
Gentilii D. W. 220.
Gilletii D. W. 220.
— v. sessile D. W. 220.
Laurentii D. W. 220.
molle Stapf, 220.
setulosum Gilg, 220.
stipulaceum Welw. 221.
Wildemanianum Gilg,
221.
- Honckenia** W. 73.
ficifolia W. 73.
- Hoslundia** Vahl, 447.
opposita Vahl, v. verti-
cillata Bak. 447.
verticillata Vahl, 447.
- Hua** Pierre, 66.
Gabonii Pierre, 66.
- Hugonia** L. 75.
obtusifolia C. H. Wright,
75.

Hugonia
platysepala Welw. 75, 652.
reticulata Engl. 75.
 — *f. longifolia* Engl. 75.
villosa Engl. 75.
Hunteria ambiens K. Sch. 338.
pycnantha Hall. f. 338.
Hybophrinium K. Sch. 546.
Braunianum K. Sch. 546.
 — *v. violaceum* D. W. et T. D. 546.
Hydrantheium H. B. et K. 401.
egense Poepp. 401.
 HYDROCHARITA-
 CEAE, 514.
Hydrocotyle L. 237.
asiatica L. 237.
Hydrolea L. 377.
glabra S. et T. 377.
guineensis Choisy, 377.
 HYDROPHYLLA-
 CEAE, 377.
Hydrosme Schott, 589.
Eichleri Engl. 589.
Leopoldiana Mast. 589, 657.
Teuszii Engl. 589.
Hydrostachys Thou. 466.
Bismarckii Engl. 466.
Hygrophila R. Br. 416.
ciliata Burkill, 416.
Gilletii D. W. 416.
glandulosa Lindau, 419.
katangensis D. W. 416.
Liudaviana Burkill, 416.
longifolia Nees, 416.
spinosa T. And. 416.
Hymenocallis Salisb. 558.
littoralis Salisb. 558.
senegambica Kth et Bouché, 558.
Hymenocardia Wall. 486.
acida Tul. 486, 655.
Heudelotii M.-A. 487.
mollis Pax, 487.
 — *v. glabra* Pax, 487.
Poggei Pax, 487.
ulmoides Oliv. 487, 655.
Hymenodyctyon Wall. 241.
fimbriolatum K. Sch. 241.
Hypaelyptum argenteum Vahl. 619.
pulcherrimum K. Sch. 619.
Hyperanthera Moringa Vahl, 116.
 HYPERICACEAE, 43.

Hypericophyllum compositarum Steetz, 309.
Hypericum L. 43.
lanceolatum Lam. 43.
Quartinianum A. Rich. 44.
Hyphaene Gaertn. 586.
guineensis S. et T. 586.
ventricosa Kirk, 586.
Hypoestes R. Br. 433.
callicoma S. Moore, 433.
cancellata Nees, 433.
latifolia Hochst. 433.
mollis T. And. 434.
verticillaris R. Br. 433.
Hypolytrum Rich. 620.
africanum Nees, 620.
congense Cl. 620.
nemorum P. B. 620.
Hypoxis L. 554.
angustifolia Lam. 554.
Hyptis Jacq. 451.
brevipes l'oit. 451, 453.
 — *v. elongata* D. W. et T. D. 451.
pectinata Poit. 452.
spicigera Lam. 452.

I

Icacina A. Juss. 99.
Guessfeldtii Aschers. 99.
Mannii Oliv. 99.
Ilysanthes Raf. 400.
parviflora Bth. 400.
Impatiens L. 79.
bicolor H. f. 79.
 — *v. brevifolia* Warb. 79.
Briartii D. W. et T. D. 79.
Declercqii D. W. 79.
Eminii Warb. 79.
 — *v. lanceolata* Warb. 79.
hians H. f. 79.
 — *f. glabra* D. W. 79.
Irvingii H. f. 79.
katangensis D. W. 80.
Kerckhoveana D. W. 80.
Kirkii H. f. 80.
mayombensis D. W. 80.
refracta D. W. 80.
Sereti D. W. 80.
 — *f. etentaculifera* D. W. 80.
Thonneri D. W. et T. D. 80.
Verdickii D. W. 80.
Imperata Cyr. 621.
arundinacea Cyr. 621.
 — *v. Thunbergii* Rendle, 621.
cylindrica P. B. 621.
 — *v. Thunbergii* Hack. 621.
Thunbergii P. B. 621.

Indigofera L. 127.
astragalina DC. 127.
Binderi Kotschy, 127.
Butayei D. W. 127.
capitata Kotschy, 127.
congesta Welw. 127.
congolensis D. W. et T. D. 127.
Dewevrei M. Mich. 127.
Dupuisii M. Mich. 128.
endecaphylla Jacq. 128.
erythrogramma Welw. 128.
erythrogrammoides D. W. 128.
Garckeana Vatke, 128.
Gilletii D. W. et T. D. 129.
glutinosa S. et T. 130.
Heudelotii Bth. 129.
hirsuta L. 129.
kisantuensis D. W. et T. D. 129.
moeroensis D. W. 129.
oligosperma DC. 130.
paucifolia DC. 129.
Poggei Taub. 126.
polysperma D. W. et T. D. 129.
polysphaera Bak. 128.
procera S. et T. 129.
Schimperi Jaub. 130.
scopa D. W. et T. D. 130.
secundiflora Poir. 130.
tetraptera Taub. 130.
tetrasperma S. et T. 130.
trita L. 130.
variabilis D. W. 131.
Intsia africana O. K. 177.
cuanzensis Welw. 178.
Inula L. 304.
Engleriana O. Hoffm. 304.
Klingii O. Hoffm. 305.
Poggeana O. Hoffm. 304.
Iodes Bl. 100.
africana Welw. 100.
Laurentii D. W. 100.
Ionidium Vent. 33.
enneaspermum Vent. 33.
 — *v. thesiifolium* D. W. et T. D. 33.
thesiifolium DC. 33.
Ipomoea L. 384.
amoena Choisy, 384.
angustifolia Jacq. 382.
aquatica Forsk. 389.
asclepiadea Hallier f. 384.
Barteri Bak. 384.
 — *v. subsericea* Hallier f. 384.
Batatas Poir. 385.

Ipomoea

- beraviensis* Vatke, 391.
biloba Forsk. 389.
bona-nox L. 390.
Brasseuriana D. W. 385.
cairica Sweet, 385.
chryseides Ker, 382.
chrysochaetia Hallier f. 385.
Dammeriana D. W. 386.
Debeerstii D. W. 386.
digitata L. 389.
elythrocephala Hallier f. 386.
eriocarpa R. Br. 385.
fimbriosepala Choisy, 386.
fragilis Choisy, 390.
fulvicaulis Boiss. 386.
 — v. *depauperata* Hallier f. 386.
Gilletii D. W. et T. D. 386.
hederacea Jacq. 388.
hispida R. et S. 386.
hypoxantha Hallier f. 386.
involucrata P. B. 387.
kentrocarpa Hochst. 388.
kentrocarpa Hochst. 387.
lasiophylla Hallier f. 387.
lilacina Bl. 387.
littoralis Boiss. 387.
lukafuensis D. W. 388.
martiniensis Jacq. 381.
micrantha Hallier f. 388.
 — v. *hispida* Hallier f. 388.
Nil Roth, 388.
ochracea G. Don, 388.
ophthalmantha Hallier f. 388.
owariensis P. B. 384.
oxyphylla Bak. 387.
palmata Forsk. 385.
paniculata R. Br. 389.
 — v. *indivisa* Hallier f. 389.
pentaphylla L. 383.
pes-caprae Roth, 389.
pes-draconis Choisy, 383.
polytricha Bak. 385.
Quamoclit L. 390.
recta D. W. 389.
reptans Poir. 389.
shirensis Oliv. 381.
Smithii Bak. 386.
stipulacea Jacq. 385.
stolonifera Gmel. 388.
Stuhlmannii Dammer, 387.
tenuis E. Mey. 390.
velatipes Welw. 390.

Ipomoea

- Verdickii* D. W. 390.
vesiculosa P. B. 385.
Iresine L. 461.
vermicularis Moq. 461.
 IRIDACEAE, 552.
Irvingia H. f. 83.
Barteri H. f. 83.
Smithii H. f. 84.
Isachne R. Br. 629.
albans Trin. 629.
australis R. Br. 629.
Buettneri Hack. 629.
Isnardia prostrata O. K. 219.
Isolepis capillaris Roem. 614.
obtusifolia P. B. 618.
puberula St. 615.
trifida Kth, 614.
Isolona Engl. et Diels, 23.
congolana Engl. et Diels, 23.
Dewevrei Engl. et Diels, 23.
pilosa Diels, 23.
Thonneri Engl. et Diels, 23.
Isonema R. Br. 349.
infundibuliflorum Stapf, 349.
Ixora L. 273.
coccinea L. 273.
enosmia K. Sch. 273.
Laurentii D. W. 273.
longipedunculata D. W. 273.
 — v. *Dewevrei* D. W. 273.
nitida S. et T. 274.
odorata H. f. 273.
radiata Hiern. 273.
 — v. *latifolia* D. W. 273.
Sereti D. W. 274.
Soyauxii Hiern, 274.

J

- Jacquemontia** Choisy, 381.
capitata G. Don, 381.
Jambosa owariensis DC. 203.
vulgaris DC. 202.
Jardinea *gabonensis* Steud. 623.
Jasminonerium dulce O. K. 337.
edule O. K. 337.
Jasminum L. 324.
dichotomum Vahl, 324.
guineense G. Don, 324.
noctiflorum Afz. 324.
Schweinfurthii Gilg, 324.
ternum Kth, 324.

Jasminum

- Verdickii* D. W. 324.
Jateorhiza strigosa Miers, 24.
Jatropha L. 488.
Curcas L. 488.
Manihot L. 490.
multifida L. 489.
Jaumea Pers. 309.
compositarum B. et H. f. 309.
congensis O. Hoffm. 309.
Josepha augusta Vell. 455.
Juncellus Cl. 596.
laevigatus Cl. 596.
pustulatus Cl. 597.
Jussieua L. 218.
acuminata Bth. 218.
diffusa Forsk. 219.
linifolia Vahl, 218.
pilosa Kth, 218.
repens L. 218.
suffruticosa L. 219.
villosa Lam. 219.
Justicia L. 429.
Anselliana T. And. 429.
Betonica L. 431.
bicalyculata Vahl, 433.
brunelloides Lam. 416.
calcarata Hochst. 430.
cancellata W. 433.
elegans P. B. 421.
Emini Lindau, 429.
extensa T. And. 431, 655.
gangetica L. 428.
Garckeana Buett. 429.
insularis T. And. 429.
Karschiana Buett. 429.
matammensis Oliv. 430.
opaca Vahl, 426.
palustris T. And. 430.
Paxiana Lindau, 430.
Poggei Lindau, 430.
Rostellaria Lindau, 430.
tenella T. And. 430.
umbellata Vahl, 432.
Verdickii D. W. 431.
verticillaris L. f. 434.

K

- Kaempferia** L. 539.
aethiopica Bth. 539.
Dewevrei D. W. et T. D. 539.
pallida D. W. 539.
pleiantha K. Sch. 539.
Kalaharia spinescens Guerke, 440.
spinipes Baill. 440.
Kalanchoe Adans. 193.
coccinea Welw. 193.
 — v. *subsessilis* Britten, 193.
Cujsini D. W. et T. D. 193.

Kalanchoe

- glandulosa* Hochst. 193.
 — v. *benguelensis* Engl. 193.
Kickxia africana Stapf, 350.
congolana D.W. 350
elastica Preuss, 349.
Gilletii D.W. 350.
latifolia Stapf, 350.
Kigelia DC. 411.
aethiopica Decne, 411.
africana Bth. 412.
Kiggelaria paniculata Sch. 189.
Kirkia Oliv. 84.
acuminata Oliv. 84.
 — v. *cordata* D. W. 84.
Klainedoxa Pierre, 84.
gabonensis Pierre, 84.
 — v. *oblongifolia* Engl. 84.
Kleinia L. 313.
fulgens H. f. 313.
Kniphofia Salisb. 564.
dubia D. W. 564.
Kohautia scitifera DC. 244.
Kosteletzkya Presl, 52.
Buettneri Guerke, 52.
Grantii Garcke, 52.
Kyllinga umbellata Rottb. 599.
Kyllingia Rottb. 610.
albiceps Cl. 610.
aromatica Ridl. 610.
aurata Nees, 610.
brevifolia Rottb. 610.
bulbosa P. B. 612.
capitata P. B. 611.
elatior Kth, 610.
erecta Schumach. 610.
 — v. *Soyauxii* Cl. 610.
Filicula Cl. 611.
macrocephala A. Rich. 610.
melanosperma Nees. 611.
Naumanniana Boeck. 611.
nigritana Cl. 611.
peruviana Lam. 611.
planiceps Cl. 611.
polyphylla W. 611.
pumila Mckx, 611.
 — v. *Filicula* Cl. 611.
 — v. *rigidula* Cl. 611, 657.
pungens Lk, 612.
rigidula St. 611.
Soyauxii Boeck. 610.
sphaerocephala Boeck. 612.
squamulata Thonn. 612.
teres Cl. 612.
triceps Rottb. 612.
triceps Lam. 620.

L

- LABIATACEAE, 442.
Lactuca L. 316.
Cabrae D. W. 316.
capensis Thunb. 316.
 — v. *duruensis* D. W. 316.
Gilletii D. W. 316.
longispicata D. W. 316.
Sereti D. W. 316.
taraxacifolia S. et T. 316.
tricostata D. W. 316.
Verdickii D. W. 316.
Lagarosiphon Harv. 514.
Schweinfurthii Casp. 514.
Lagenaria Ser. 227.
angolensis Naud. 226.
sphaerica E. Mey. 229.
vulgaris Ser. 227.
Laggera Sz-B. 301.
alata Sz-B. 301.
brevipes O. et H. 301.
oblonga O. et H. 302.
pterodonta Sz-B. 302.
purpurascens Sz-B. 302.
Lagurus cylindricus L. 621.
Lamprodithyros gracilis K. et P. 580.
rivularis Hassk. 583.
Landolphia P. B. 325.
comorensis K. Sch. 327.
 — var. *florida* K. Sch. 326.
Dewevrei Stapf, 325.
Droogmansiana D. W. 326.
Dubreucqiana D. W. 326.
florida Bth. 326.
florida H. f. 327.
 — v. *leiantha* Oliv. 327.
Gentilii D. W. 327.
Heudelotii Schltr. 329.
humilis K. Sch. 327.
Kirkii Dyer v. *ovariensis* D.W. et T.D. 331.
Klainei Pierre, 328.
Laurentii D.W. 325.
 — v. *grandiflora* D.W. 325.
Lecomtei A. Dcwo. 328.
lucida K. Sch. 328.
Mannii D.W. et T. D. 330.
ochracea K. Sch. 328.
 — v. *breviflora* D. W. 328.
ochracea D.W. 329.
owariensis P. B. 327, 329.
owariensis A. Dew. 328.

Landolphia

- owariensis* v. *parvifolia* Hallier f. 331.
Petersiana Dyer, 330.
Petersiana Jumelle, 330.
 — v. *mucronata* A. Dew. 330.
Preussii K. Sch. 333.
robusta Stapf, 330.
scandens F. Didr. 330.
 — v. *coriacea* Hallier f. 330.
 — v. *genuina* Hallier f. 330.
Thollonii A. Dew. 330.
Welwitschii Dyer. 330
Lankesteria Ldl. 420.
Barteri H. f. 420.
batangana Lindau, 422.
elegans T. And. 420.
Lansea A. Rich. 114.
velutina A. Rich. 114.
Welwitschii Engl. 114.
Lantana L. 434.
aculeata L. 434.
Camara L. 434.
salvifolia Jacq. 434.
scabrida Ait. 434.
Lapeyrousia Pourr. 552.
erythrantha Bak. 552.
Lasianthus Jack, 285.
totistilus K. Sch. 285.
Lasiomorpha Afzelii Schott, 589.
senegalensis Engl. 589.
Lasiiosiphon Olivieri Vatke, 471.
Launaea Cabrae D.W. 316.
LAURACEAE, 469.
Lavalleopsis V. Tiegh. 97.
longifolia D. W. et T. D. 97.
Lawsonia L. 218.
alba Lam. 218.
inermis L. 218.
Leea L. 109.
guineensis G. Don, 109, 652.
sambucina S. et T. 109.
Leersia Sw. 640.
hexandra Sw. 640.
Lefeburea benguelensis Welw. 238.
Lefeburia A. Rich. 238.
benguelensis Welw. 238.
LEGUMINOSACEAE, 122.
Leiocarpodicraea Engl. 466.
quangensis Engl. 466.
Leioptyx Pierre, 93.
congoensis Pierre, 93.
Leiphaimos Ch. et Schltd. 375.

- Leiphaimos**
primuloides *Gilg*, 375.
- Lemna** *L.* 592.
aequinoctialis *Welw.* 592.
angolensis *Welw.* 592.
polyrrhiza *L.* 592.
- LEMNACEAE, 592.
- LENTIBULARIACEAE, 406.
- Leonotis** *R. Br.* 452.
africana *Th. et Hél. Dur.* 452.
Leonurus *R. Br.* 453.
— v. vestita *Briq.* 453.
nepetaefolia *R. Br.* 453.
pallida *Bth.* 452.
- Lepidagathis** *Willd.* 427.
Laurentii *D. W.* 427, 655.
Lindauiana *D. W.* 427.
- Lepistemon** *Bl.* 384.
africanum *Oliv.* 384.
owariense *Hall. f.* 384.
- Leptactinia** *H. f.* 256.
Arnoldiana *D. W.* 256.
formosa *K. Sch.* 256.
Laurentiana *A. Dew.* 256.
Leopoldi II *Buett.* 257.
Liebrechtsiana *D. W. et T. D.* 257.
Pynaertii *D. W.* 257.
Sereti *D. W.* 257.
surongaensis *D. W.* 257.
- Leptaspis** *R. Br.* 639.
cochleata *Thw.* 639.
conchifera *Hack.* 639.
- Leptaulus** *Bth.* 98.
daphnoides *Bth.* 98, 652.
- Leptochloa** *P. B.* 645.
coerulescens *St.* 645.
Laurentii *D. W.* 645.
verticillata *Kth.* 647.
- Leptonychia** *Turez.* 66.
chrysocarpa *K. Sch.* 66.
multiflora *K. Sch.* 66, 652.
- Leucadendron angolensis* *Hiern.* 470.
- Leucas** *R. Br.* 453.
Descampsii *Briq.* 453.
Poggeana *Briq.* 453.
- Leucorhaphis Lamium* *Nees,* 417.
- Liebrechtsia esculenta* *D. W.* 151.
katangensis *D. W.* 151.
scabra *D. W.* 152.
- Lightfootia** *L'Hér.* 318.
napiformis *A. DC.* 318.
- LILIACEAE, 561.
- Limnanthemum** *Gmel.* 376.
indicum *Griseb.* 376.
- Limnophyton** *Miq.* 593.
obtusifolium *Miq.* 593.
- Limodorum luridum* *Pers.* 520.
- Limonia** *L.* 81.
Demeusei *D. W.* 81.
Lacouriana *D. W.* 82.
Poggei *Engl.* 82.
— v. latialata *D. W.* 82.
Schweinfurthii *Engl.* 82.
- LINACEAE, 75.
- Lindackeria** *Presl,* 37.
cuneato-acuminata *Gilg,* 37.
dentata *Gilg,* 37, 651.
Poggei *Gilg,* 38, 651.
Schweinfurthii *Gilg,* 38.
- Lindernia diffusa* *Wettst.* 460.
latibracteata *Engl.* 399.
- Linociera** *Sw.* 324.
nilotica *Oliv.* 324.
- Linum** *L.* 76.
usitatissimum *L.* 76.
- Liparis** *L. C. Rich.* 515.
guineensis *Ldl.* 515.
- Lipocarpa** *R. Br.* 619.
argentea *R. Br.* 619.
pulcherrima *Ridl.* 619.
senegalensis *Th. et Hél. Dur.* 619.
sphacelata *Kth.* 620.
triceps *Nees,* 620.
- Lipotriche Brownei* *DC.* 307.
- Lippia** *L.* 434.
adoensis *Hochst.* 434.
asperifolia *Rich.* 435.
Burtonii *Bak.* 435.
nodiflora *Mchx,* 435.
- Lissochilus** *R. Br.* 521.
antennisepalus *R. f.* 521.
arenarius *Ldl.* 521.
dilectus *R. f.* 521.
elatus *Rolfe,* 521.
giganteus *Welw.* 521.
Horsfallii *Bat.* 522.
katangensis *D. W.* 522.
Leopoldi *Krzt.* 522.
Lindleyanus *R. f.* 522.
longifolius *Ldl.* 522.
porphyroglossus *R. f.* 522.
purpuratus *Ldl.* 522.
pyrophilus *Rehb.* 523.
roseus *Ldl.* 523.
seleensis *D. W.* 523.
stylites *R. f.* 523.
- Listrostachys** *Rehb. f.* 528.
Althoffii *T. D. et Sch.* 528.
ashantensis *R. f.* 529.
biloba *Krzt.* 527.
- Listrostachys**
capitata *R. f.* 529.
caudata *R. f.* 529.
Chailluana *R. f.* 529.
Dewevrei *D. W.* 529.
Droogmansiana *D. W.* 529.
Durandiana *Krzt.* 530.
falcata *D. W.* 530.
Gentilii *D. W.* 530.
ichneumonea *Rehb. f.* 530.
Kindtiana *D. W.* 527.
linearifolia *D. W.* 530.
Margaritae *D. W.* 530.
Monteirae *R. f.* 530.
pellucida *R. f.* 530.
Pynaertii *D. W.* 531.
subulata *R. f.* 531.
Thonueriana *Krzt.* 531.
vesicata *R. f.* 531.
- Littonia** *Hook.* 572.
grandiflora *D. W. et T. D.* 572.
Lindeni *Bak.* 573.
- Lobelia** *L.* 317.
fervens *Thunb.* 317.
Gilletii *D. W.* 318.
- LOBELIACEAE, 317.
- Lochnera** *Rehb.* 341.
rosea *Rehb.* 341.
- LOGANIACEAE, 367.
- Lonchocarpus** *H. B. et K.* 164.
affinis *D. W.* 164.
Barteri *Bth.* 164.
comosus *M. Mich.* 165.
Dewevrei *M. Mich.* 136.
dubius *D. W.* 165.
Eetveldeanus *M. Mich.* 165.
Heudelotianus *Baill.* 165.
katangensis *D. W.* 165.
Laurentii *D. W.* 165.
sericeus *H. B. et K.* 165.
subulidentatus *Buett.* 165.
Teuszii *Buett.* 135, 165, 653.
- Lophira** *Banks,* 48.
alata *Banks,* 48.
- LORANTHACEAE, 472.
- Loranthus** *L.* 472.
alatus *D. W.* 472.
Albizziae *D. W.* 472.
Buchneri *Engl.* 472.
Butayei *D. W.* 472.
capitatus *Engl.* 472.
— var. latifolius *Engl.* 472.
constrictiflorus *Engl.* 472.
Cornetii *A. Dew.* 473.
crassicaulis *Engl.* 473.
Demeusei *Engl.* 473.

Loranthus

- Descampsii* Engl. 473.
discolor Engl. 473.
Durandi Engl. 473.
elongatus D. W. 473.
irebuensis D. W. 474.
Kimuenzae D. W. 474.
kisantuensis D. W. et T. D. 474.
Laurentii Engl. 474.
Lujaei D. W. et T. D. 474.
luluensis Engl. 474.
mangheensis D. W. 474.
mayombensis D. W. 474.
micrantherus Engl. 474.
nigrescens D. W. et T. D. 474.
ogowensis Engl. 475.
Poggei Engl. 475.
polygonifolius Engl. 475.
Pungu D. W. 475.
rubiginosus D. W. 475.
 — v. *grandiflorus* D. W. 475.
Thonneri Engl. 475.

Lovoa Harms, 93.

- Pynaertii* D. W. 93.
trichilioides Harms, 94.

Ludwigia L. 219.

- prostrata* Roxb. 219.
Luffa L. 229.
aegyptiaca Mill. 229.
Batesii C. H. Wright, 227.
cylindrica Roem. 229.
pentandra Roxb. 229.

Lundia monacantha S. et T. 36.**Lychnodiscus** Radlk.

111.
cerospermus Radlk. 111, 652.

Lycopersicum Hill, 395.

- esculentum* Mill. 395.

LYTHRACEAE, 217.

M**Maba** Forsk. 323.

- buxifolia* Pers. 323.
guineensis A. DC. 323.

Macaranga Thou. 495.

- angolensis* M.-A. 495.
dibeleansis D. W. 495.
Gilletii D. W. 496.
mollis Pax, 496.
monandra M.-A. 496.
Poggei Pax, 496.
Pynaertii D. W. 496.
rosea Pax, 496.
saccifera Pax, 496.
Schweinfurthii Pax, 496.

Macaranga

- Zenkeri* Pax, 497.
Maclura excelsa Bureau, 502.
Macrolobium Schreb. 175.
coeruleoides D. W. 175.
Dewevrei D. W. 175.
 — f. *fol. bijugis* D. W. 176.
 — f. *fol. trijugis* D. W. 176.
Gilletii D. W. 176.
Heudelotii Pl. 176.
Laurentii D. W. 176.
Palisotii Bth. 176.

Macrosiphon fistulosum Hochst. 404.**Maerua** Forsk. 29.

- angolensis* DC. 29.
Aprevaliana D. W. et T. D. 30.
Descampsii D. W. 30.
Gilgiana D. W. 30.
Kassakalla D. W. 30.

Maesa Forsk. 319.

- lanceolata* Forsk. 319.

Maesobotrya Bth. 486.

- Bertramiana* Buett. 486.
hirtella Pax, 486.
Sapini D. W. 486.
 — v. *brevipetiolata* D. W. 486.

Mafureira oleifera Bertol. 92.**Magnistipula** Engl. 192.

- Butayei* D. W. 192.

Malabaila Hoffm. 238.

- Kirungae* Engl. 238.

Malachra L. 51.

- capitata* L. 51.
hispida G. et P. 51.
radiata L. 51.

Mallotus Lour. 495.

- oppositifolius* M.-A. 495.
subulatus M.-A. 495.

Malouetia A. DC. 351.

- africana* K. Sch. 351.
Heudelotii A. DC. 351.

MALPIGHIACEAE, 76.

MALVACEAE, 48.

Mamboga macrophylla Hiern, 240.

- stipulosa* O. K. 240.

Mangifera L. 113.

- gabonensis* A. Lec. 83.
indica L. 113.

Manihot Adans. 490.

- Glaziovii* M.-A. 490.
utilissima Pohl, 490.

Manisuris L. 622.

- granularis* L. f. 622.
polystachya P. B. 622.

Manniella R. f. 534.

- Gustavi* R. f. 534.
 — v. *picta* D. W. 534.

Manniophyton M.-A.

489.
africanum M.-A. 489, 655.
fulvum M.-A. 489.

Manotes Soland. 119.

- Aschersoniana* Gilg, 119.
brevistyla Gilg, 120, 653.
Cabrae D. W. et T. D. 120.
Griffoniana Baill. 120.
Laurentii D. W. 120.
pruinosa Pax, 120.
sanguineo-arillata Gilg, 120.

Maprounea Aubl. 499.

- africana* M.-A. 499, 656.
 — v. *obtusata* Pax, 500.

Maranta L. 548.

- arundinacea* L. 548.
brachystachya Bth. 545.
Lujaeana L. Linden, 545.

MARANTACEAE, 544.

Mareya Baill. 494.

- micrantha* M.-A. 494.

Margaretta Oliv. 363.

- Corneti* A. Dew. 363.
 — v. *pallida* D. W. 363.
Verdickii D. W. 363.

Mariscus Vahl, 597.

- Dregeanus* Kth, 597.
flabelliformis H. B. et K. 597.

- flavus* Vahl, 597.

- v. *humilis* Cl. 597.

- ligularis* Th. et Hel. Dur. 597.

- luridus* Cl. 598.

- nossibeensis* St. 598.

- pseudo-pilosus* Cl. 598.

- v. *tenuior* Cl. 598.

- rufus* H. B. et K. 597.

- Sieberianus* Nees, 598.
 — v. *subcompositus* Cl. 598.

- trinervis* Cl. 598.

- umbellatus* Vahl, 598.

Markhamia Seem. 410.

- lanata* K. Sch. 410, 411.

- lutea* K. Sch. 410.

- paucifoliolata* D. W. 410.

- tomentosa* K. Sch. 410, 655, 716.

- v. *acuminata* D. W. 411.

- tomentose* D. W. et T. D. 411.

- tomentose* Hiern, 411.

- sessilis* Sprague, 411.

- Verdickii* D. W. 411.

Marsdenia R. Br. 365.

- latifolia* Schl. 365.

Marsdenia

- racemosa* K. Sch. 365.
rubicunda N. E. Br. 366.
Marsea aegyptiaca Hiern, 300.

Mavia judicialis Bert. 182.

Mayepea *Aubl.* 324, 654.
luluensis Engl. 654.
nilotica *Kuobl.* 324.

Mechowia *Schinz.* 459.
grandiflora *Schinz.* 459.

Medinilla *Gaud.* 215.
africana *Cogn.* 215.

Megabaria *Pierre.* 497.
Trillesii *Pierre.* 497.

Megaclinium *Ldl.* 517.
Arnoldianum *D. W.* 517.
congolatum *Th. et Hël.*
Dur. 517.

congolense *D. W.* 517.

djumaense *D. W.* 517.

Gentili *D. W.* 517.

Gilletii *D. W.* 517.

Laurentianum *D. W.*
 518.

maximum *Ldl.* 518.

minus *D. W.* 518.

purpureorachis *D. W.*
 518.

Megastachya *Brownei* *P.*
B. 646.

mucronata *P. B.* 648.

owariensis *P. B.* 648.

Meibomia *adscendens* *O.*
K. 142.

gangetica *O. K.* 142.

lasiocarpa *O. K.* 143.

mauritanica *O. K.* 143.

megalantha *Hiern.* 141.

oxybractea *O. K.* 143.

paleacea *O. K.* 143.

polygonodes *O. K.* 144.

Stuhlmannii *Hiern.* 142.

Melanthera *Rohr.* 307.
Brownei *Sz.-B.* 307.

Melasma *Berg.* 401.
indicum *Weittst.* 401.

Melastoma *capitatum*
Vahl. 209.

decumbens *P. B.* 210.

plumosum *D. Don.* 212.

prostratum *S. et T.* 212.

MELASTOMACEAE,
 204.

Melastomastrum erectum
Naud. 209.

Melia *L.* 92.

angustifolia *Sch. et Th.*
 92.

Azedarach *L.* 92.

MELIACEAE, 91.

Mellera *S. Moore.* 418.

Briartii *D. W. et T. D.*
 418.

lobulata *S. Moore.* 418.
submutica *Cl.* 418.

Mellera

submutica v. *grandi-*
flora *D. W.* 418.

Melochia *L.* 64.

corchorifolia *L.* 64.

melissifolia *Bth.* 65.

— v. *bracteosa* *K. Sch.* 65.

— v. *mollis* *K. Sch.* 65.

Melothria *L.* 232.

capillacea *Cogn.* 232.

deltoides *Bth.* 232.

maderaspatana *Cogn.*
 232.

tridactyla *H. f.* 232.

triangularis *Bth.* 232.

Thwaitesii *Schw.* 232.

Memecylon *L.* 215.

Afzelii *R. Br.* 216.

Gilletii *D. W.* 215.

jasminoides *Gilg.* 215.

Laurentii *D. W.* 215.

leucocarpum *Gilg.* 215.

longicauda *Gilg.* 215.

Mannii *Hook. f.* 215.

membranifolium *Hook.*
f. 215.

Millenii *Gilg.* 216.

myrianthum *Gilg.* 216.

Poggei *Gilg.* 216.

polyanthemos *Hook. f.*
 216.

— v. *grandifolium*

Cogn. 216.

Pynaertii *D. W.* 216.

strychnoides *Bak.* 216.

tamifolium *Gilg.* 216.

Vogelii *Naud.* 216.

MENISPERMACEAE,
 24.

Mentha *L.* 452.

sylvestris *L.* 452.

Merremia *Dennst.* 382.

angustifolia *Hall. f.* 382.

— v. *ambigua* *Hall. f.*

382:

convolvulacea *Dennst.*

382.

hastata *Hall. f.* 382.

hederacea *Hall. f.* 382.

pentaphylla *Hall. f.* 382.

pes-draconis *Hall. f.* 383.

pterygocaulos *Hall. f.*

383.

— v. *tomentosa* *Hall. f.*
 383.

Mesanthemum *Koern.*
 593.

radicans *Koern.* 593.

Methonica superba *Cr.* 572.

virescens *Kth.* 572.

Meyenia erecta *Bth.* 414.

Vogeliana *Bth.* 415.

Mezoneuron *Desf.* 170.

angolense *Welw.* 170.

Micranthus Hensii *Lin-*
dau. 420.

Micranthus imbricatus

O. K. 419.

longifolius *Wendl.* 419.

obliquus *O. K.* 420.

Poggei *Lindau.* 420.

Microchloa *R. Br.* 642.

setacea *R. Br.* 642.

Micrococca *Bth.* 492.

Mercurialis *Bth.* 492.

Microdesmis *Pl.* 488.

puberula *H. f.* 488, 655.

Microglossa *DC.* 300.

angolensis *O. et H.* 300.

— f. *fol. gr. dent. O.*

Hoffm. 300.

volubilis *DC.* 300.

Mikania *W.* 298.

chenopodiifolia *W.* 298.

scandens *W.* 298.

Milletia *W. et A.* 133.

Baptistarum *Buett.* 133.

breviflora *D. W.* 133.

brevistipellata *D. W.* 133.

Cabrae *D. W.* 133.

congolensis *D. W. et T.*
D. 133.

Demeusei *D. W.* 134.

drastica *Welw.* 134, 653.

dubia *D. W.* 134.

Duchesnei *D. W.* 134.

Gentilii *D. W.* 134.

Griffoniana *Baill.* 135.

Harmsiana *D. W.* 134.

— f. *acuminata* *D. W.*
 134.

Laurentii *D. W.* 134.

macrophylla *M. Mich.*
 134.

macroura *Harms.* 134.

Mannii *Bak.* 135.

Teuszii *D. W.* 135, 653.

Thonningii *Bak.* 135.

urophyllodes *D. W.* 135.

versicolor *Welw.* 135,
 653.

Miltus africanus *Lour.*
 237.

Mimosa *L.* 185.

asperata *L.* 185.

Farnesiana *L.* 186.

pubica *L.* 185.

MIMOSEAE, 182.

Mimulus *L.* 398.

gracilis *R. Br.* 398.

Mimusops *L.* 322.

affinis *D. W.* 322.

congolensis *D. W.* 322.

cuneifolia *Bak.* 322.

ubaugiensis *D. W.* 322.

Welwitschii *Engl.* 322.

— f. *grandifolia* *D. W.*
 322.

Mirabilis *L.* 454.

Jalapa *L.* 454.

Mitracarpum *Zucc.* 287.
scabrum *Zucc.* 287, 654.

Mitracarpum

senegalense DC. 288.
verticillatum Vatke. 288.

Mitragyne Korth. 240.
africana Korth. 240.
macrophylla Hiern, 240.

Modeeca *abyssinica*
 Hochst. 224.
cissampeloides Planch.
 225.

lobata Jacq. 224.
 — v. *elegans* Mast. 224.

Mohlana Mart. 462.
latifolia Moq. 462.

Mollugo L. 236.
bellidifolia Ser. 236.
Glinus A. Rich. 236.
hirta Thunb. 236.
lotoides Cl. 236.
nudicaulis Lam. 236.
oppositifolia L. 236.
Spergula L. 236.

Momordica L. 228.
anthelmintica S. et T.
 228.

Charantia L. 228.
 — v. *abreviata* Ser. 228.
cissoides Planch. 228.
cylindrica L. 229.
Cogniauxiana D. W. 228.
foetida S. et T. 228.
Gabonii Cogn. 229.
gracilis Cogn. 229.
guttata Pl. 228.
maculata Pl. 228.
Morkorra A. Rich. 228.
pteroearpa Hochst. 228.

Monadenium Pax, 476.
Descampsii Pax, 476.

Monanthotaxis Baill.
 20.
Poggei Engl. et Diels,
 20, 651.
 — v. *latifolia* Engl. et
 Diels, 20.

Monelasmum densiflorum
 V. Tgh. 87.
Dewevrei V. Tgh. 87.
Dupuisii V. Tgh. 87.
laeve V. Tgh. 88.
laxiflorum V. Tgh. 88.
pellucidum V. Tgh. 88.
Poggei V. Tgh. 89.
Schweinfurthii V. Tgh.
 89.

Moniera calycina Hiern,
 399.

Monochoria Presl, 657.
africana N. E. Br. 657.
vaginalis Presl, v. *afri-*
cana Solms, 657.

Monodora Dun. 24.
angolensis Welw. 24.
Cabrae D. W. et T. D. 24.
congolana D. W. et T.
 D. 23.

Monodora

Dewevrei D. W. et T. D.
 23.

Durieuxii D. W. 24.
Myristica Dun. 24.
Thonneri D. W. et T. D.
 23.

Monotes africana A. DC.
 47.
 — v. *hypoleuca* Hiern,
 48.

Moraea L. 552.
Arnoldiana D. W. 552.
kitambensis Bak. 552.
textilis Bak. 552.
Verdiekii D. W. 552.
zambesiaca Bak. 552.

Morelia A. Rich. 261.
senegalensis A. Rich.
 261.

Morinda L. 279.
citrifolia L. 279.
 — v. *lucida* Hiern, 279.
geminata DC. 282.
longiflora G. Don, 279.
lucida Bth. 279.
pterygosperma Gaertn.
 116.
quadrangularis G. Don,
 279.

Moringa Juss. 116.
oleifera Lam. 116.
 MORINGACEAE, 116.
Morus excelsa Welw. 502.
Moschosma Rehb. 444.
polystachyum Bth. 444.
 — v. *stereocladum* Briq.
 444.

Mostuea Fr. Didr. 367.
angolana Hiern, 368.
 — v. *Laurentii* D. W.
 368.
Brunonis F. Didr. 367.
congolana Bak. 369.
densiflora Gilg. 367.
Duchesnei D. W. 367.
Gilletii D. W. 368.
hirsuta Bak. 654.
Lujaei D. W. et T. D.
 368.
penduliflora Gilg, 368.
Poggeana Bak. 369.
Schumanniana Gilg,
 368.
Taymansiana D. W. 368.

Motandra A. DC. 355.
guineensis A. DC. 355.
Lujaei D. W. et T. D. 355.

Msuata O. Hoffm. 298.
Buettneri O. Hoffm. 298.

Mucuna Adans. 148.
flagellipes Vogel, 148.
Poggei Taub. 148.
pruriens DC. 148.
urens Medic. 149.
Muenteria lutea Seem. 410.

Muenteria tomentosa
 Seem. 410, 411.

Mukia scabrella Arn. 232.

Musa L. 550, 656.
Arnoldiana D. W. 550.
Ensete Gmel. 550.
Gilletii D. W. 550.
Laurentii D. W. 550.
paradisica L. subsp.
sapientum O. K. 550.
sapientum L. 550.
 — v. *sanguinea* Welw.
 550.

MUSACEAE, 550, 656.

Musanga R. Br. 511.
cecropioides R. Br. 511.
Smithii R. Br. 511.

Mussaenda L. 248.
arcuata Poir. 248.
deburu Stapf, 248.
discolor Thonn. 248.
elegans S. et T. 248, 654.
 — v. *minor*. D. W. et
 T. D. 248.
erythrophylla Sch. et
 Th. 248.

heinsioides Hiern, 249.
hispida Engl. 249.
luteola Delile, 249.
phatyphylla Hiern, 249.
polita Hiern, 249.
splendida Welw. 249.
stenocarpa Hiern, 249.
 — f. *congensis* Buett.
 250.
 — v. *latifolia* D. W. et
 T. D. 250.
tenuiflora Bth. 250.

Myrianthus P. B. 510.
arborea P. B. 510, 656.

Myristica L. 469.
angolensis Welw. 469.
Kombo Baill. v. *ango-*
lensis D. W. 469.

MYRISTICACEAE, 469.

MYRSINACEAE, 319.
Myrsiphyllum cristatum
 Hiern, 281.
nigropunctatum Hiern,
 282.

MYRTACEAE, 201.

Mystacidium Lindl.
 531.
congolense D. W. 531.
distichum Bth. 531.
 — v. *grandifolium* D.
 W. 532.
erythropollinium T. D.
 et Schinz, 532.
infundibulare Rolfe, 532.
 — v. *brevifolium* D. W.
 532.
Laurentii D. W. 528.
xanthopollinium T. D. et
 Schinz, 533.

N

- Napoleona angolensis* P. B. 204.
cuspidata Miers, 204.
Heudelotii Juss. 204.
imperialis P. B. 204.
Mannii Miers, 204.
Vogelii Pl. 204.
Whitfieldii Decne, 204.
Napoleonaea P. B. 204.
imperialis P. B. 204.
Nasturtium R. Br. 27.
humifusum G. et P. 27.
Nathusia trichoclada O. K. 324.
Nauclea africana W. 240.
africana Walp. 241.
macrophylla Perr. et Lepr. 240.
sambucina T. Wint. 240.
stipulosa DC. 240.
Nelsonia R. Br. 416.
brunelloides O. K. 416.
campestris R. Br. 416.
tomentosa Dietr. 416.
Nepeta pectinata L. 452.
Nephtytis Schott, 590.
Azelii Schott, 590.
liberica N. E. Br. 591.
picturata N. E. Br. 590.
Neurocarpaea purpurea Hiern, 242.
Neurotheca Salisb. 376.
congolana D. W. et T. D. 376.
densa D. W. 376.
loeselioides Bth. 376.
longidens N. E. Br. 376.
Newbouldia Seem. 409.
laevis Seem. 409.
Nicotia Lindau, 430.
Betonica Lindau, 430.
Nicotiana L. 397.
rustica L. 397.
Tabacum L. 397.
— v. *brasiliensis* Comes, 398.
— v. *lancifolia* Comes, 398.
— v. *virginica* Anast. 398.
— v. *virginica* Comes, 398.
Nuxia Lam. 369.
dentata R. Br. 369.
NYCTAGINACEAE, 454.
Nyctago Jalapa DC. 454.
Nymphaea L. 26.
coerulea Savign. 26.
— v. *parviflora* H. f. et T. 26.
— v. *versicolor*. H. f. et Thoms. 26.
guineensis S. et T. 26.
Lotus L. 27.
stellata W. 26.

Nymphaea

versicolor Roxb. 26.

NYMPHAEACEAE, 26.

O

Ochna Schreb. 84.

- arenaria* D. W. et T. D. 84.
Buettneri Engl. 85.
congoensis Gilg. 85.
— v. *microphylla* Gilg, 85.
Debeerstii D. W. 85.
Gilletiana Gilg, 85.
Hoffmanni-Otonis Engl. 85.
katangensis D. W. 85, 652.
Laurentiana Engl. 85.
membranacea Oliv. 86.
membranacea T. D. et Sch. 85.
pulchra Hook. 86.
pulchra O. Hoffm. 85.
quangensis Buett. 86.
reticulata D. W. 89.
Schweinfurthiana Fr. Hoffm. 86.
Welwitschii Rolfe, 86.
Wildemaniana Gilg, 85.
OCHNACEAE, 84.
Ochnella Debeerstii V. Tgh. 85.
Schweinfurthiana V. Tgh. 86.
Ochrocarpus Thou. 47.
africana Oliv. 47.
Ochthocosmus africanus D. W. et T. D. 76.
congolensis D. W. et T. D. 76.
Lemaireanus D. W. et T. D. 76.
Ocimum L. 442:
canum Sims, 442.
Descampsii Briq. 442.
filamentosum Forsh. 443.
glossophyllum Briq. 443.
grandiflorum L'Hérit. 442.
gratissimum L. 443.
— v. *macrophyllum* Briq. 443.
— v. *inascarenarum* Briq. 443.
linearifolium Briq. 443.
monostachyum P. B. 443.
Poggeanum Briq. 443.
polystachyum L. 444.
Octopleura loeselioides Spruce, 376.
Odina velutina Endl. 114.
OLACACEAE, 95.
Olax L. 97.
Aschersoniana Buett. 97.
Durandi Engl. 97.

Olax

- Gilletii* D. W. 97.
macrocalyx Engl. 97.
obtusifolia D. W. 97.
Poggei Engl. 97, 652.
Pynaertii D. W. 97.
viridis Oliv. 97.
Oldenlandia L. 244.
angolensis K. Sch. 244.
asperuliflora K. Sch. 244.
Bojeri Hiern, 244.
caffra E. et Z. 244.
capensis L. f. 245.
congoensis D. W. et T. D. 245.
corymbosa L. 245.
Crepiniana K. Sch. 245.
Debeerstii D. W. et T. D. 245.
decumbens Hiern, 245.
florifera D. W. 246.
globosa Hiern, 246.
herbacea Roxb. 246.
herbacea DC. 245.
Heynei Oliv. 246.
kimuenzae D. W. 246.
lancifolia Schw. 246.
Laurentii D. W. 247.
macrophylla DC. 244, 245, 716.
microphylla D. W. et T. D. 247.
moandensis D. W. 247.
pictus Bth. 171.
OLEACEAE, 324.
Oligogygium libericum Engl. 591.
Oligostemon Bth. 171.
pentandra DC. 247.
Olyra L. 639.
brevifolia S. et T. 639.
latifolia L. 639.
Omphacarpus africanus Hook. 68.
Omphalocarpum P. B. 321.
bomanehense D. W. 321.
Cabrae D. W. 321.
Laurentii D. W. 321.
sankuruense D. W. 321.
ONAGRARIACEAE, 218.
Oncinotis Bth. 354.
glabrata Stapf, 354.
glandulosa Stapf, 354, 654.
hirta Oliv. 354.
Jespersenii D. W. 354.
tenuiloba Stapf, 354.
Oncoba Forsk. (s. str.) 36.
Crepiniana D. W. et T. D. 36.
Demeusei D. W. et T. D. 38.
dentata Oliv. 37.
— v. *cuneato-acuminata* D. W. 37.

- Oncoba**
glauca Pl. 37.
Laurentii D.W. et T. D. 37.
Poggei Guerke, 38.
spinosa Forsk. 36.
— v. *angolensis* Oliv. 651.
Welwitschii Oliv. 37.
- Oncocalamus** M. et W. 585.
acanthocnemis Drude, 585.
- Ongokea** Pierre, 652.
Klaineana Pierre, 652.
- Ophiocaulon** H. f. 224.
apiculatum D. W. et T. D. 224.
cissampeloides Mast. 225.
Dewevrei D. W. et T.D. 225.
lanceolatum Engl. 225.
Poggei Engl. 225.
reticulatum D. W. et T. D. 225.
- Oplismenus** P. B. 636.
africanus P. B. 636.
compositus P. B. 636.
Crus-galli Dmrt. 631.
- Opuntia** L. 235.
vulgaris Mill. 235.
- ORCHIDACEAE, 515.
Orchis iclneumonea Sw. 535.
procera Afz. 535.
Orelia grandiflora Aubl. 341.
- Ormocarpum** P. B. 138.
affine D. W. 138.
senoides DC. 138.
sesamoides M. Mich. 138.
- Ormosia** Jack. 169.
angolensis D. W. 169.
Brasseuriana D. W. 169.
- Ornithogalum** L. 571.
altissimum L. 570.
caudatum Ait. 571.
giganteum Jacq. 570.
- Orthosiphon** Bth. 446.
adornatus Briq. 447.
— v. *oblongifolius* Briq. 447.
heterochrous Briq. 446.
iodocalyx Briq. 446.
Liebrechtsianus Briq. 446.
retinervis Briq. 447.
Welwitschii Rolfe, 447.
— v. *oblongifolius* Th. et Hël. Dur. 447.
- Oryza** L. 640.
sativa L. 640.
— v. *aristata* D. W. 640.
— v. *mutica* D. W. 640.
- Osbeckia** L. 204.
albiflora Cogn. 204.
Antherotoma Naud. 208.
Brazzaei Cogn. 204.
congolensis Cogn. 205.
— v. *robustior* Cogn. 205.
Crepiniana Cogn. 205.
debilis Sond. 209.
drepanosepala Gilg, 205.
incana E. Mey. 211.
multiflora Sm. 211.
phaeotricha Hochst. 211.
rotundifolia Sm. 212.
sanzibarensis Naud. 212.
- Osteospermum** L. 313.
sonchifolium DC. 313.
— v. *subpetiolatum* Harv. 313.
- Ostryocarpus** H. f. 164.
parvifolius M. Mich. 164.
Welwitschii Bak. 653.
- Otiophora** Zucc. 285.
pulchella K. Sch. 285.
- Otomeria** Bth. 243.
dentata Hiern, 243.
dilatata Hiern, 243.
graciliflora K. Sch. 243.
guineensis Bth. 243.
lanceolata Hiern, 243.
madiensis Oliv. 243.
speciosa S. Elliot, 243.
- Ottelia** Pers. 514.
halogena D. W. et T. D. 514, 656.
lanceifolia A. Rich. 514.
— v. *fluitans* Ridl. 514.
Verdickii Guerke, 514.
- Oubanguia** Baill. 67.
laurifolia Pierre, 67.
Laurentii D. W. 67.
Pierreana D. W. 68.
- Ouratea** Aubl. 86.
affinis Engl. 86.
affinis D. W. et T.D. 87.
Arnoldiana D. W. et T.D. 86.
bracteata Gilg, 87.
Cabrae Gilg, 87.
coriacea D. W. et T.D. 87.
densiflora D. W. et T.D. 87.
Dewevrei D. W. et T.D. 87.
Dupuisii Th. et Hël. Dur. 87.
elongata Engl. 88.
febrifuga Engl. 88.
laevis D. W. et T.D. 88.
laxiflora D. W. et T.D. 88.
Ledermanniana Engl. 652.
- Ouratea**
leptoneura Gilg, 88.
longipes Th. et Hël. Dur. 88.
myrioneura Gilg, 88.
pellucida D. W. et T.D. 88.
Poggei Gilg. 89.
pseudospicata Gilg. 89.
refracta D. W. et T.D. 89.
reticulata Engl. 89, 652.
— v. *andongensis* Hiern, 89.
— v. *Poggei* Engl. 89.
— v. *Schweinfurthii* Engl. 89.
subumbellata Gilg, 89.
Ourouparia africana Baill. 241.
Ovieda erythrantha Kl. 552.
- OXALIDACEAE, 78.
- Oxalis** L. 78.
Corneti A. Dew. 78.
corniculata L. 78, 652.
katagensis D. W. et T.D. 78.
sensitiva L. 78.
- Oxyanthus** DC. 262.
dubius D. W. 262.
formosus H. f. 262.
formosus D. W. 262.
Laurentii D. W. 262.
sankuruensis D. W. 262.
Schumannianus D. W. et T.D. 262.
Smithii Hiern, 263.
speciosus DC. 263, 654.
unilocularis Hiern, 263.
Ozoroa insignis Delile, 116.
- P
- Pachira aquatica* Aubl. 59.
- Pachylobus** G. Don, 90.
edulis G. Don, 90.
— v. *Mubafo* Engl. 90.
edulis Hemsl. 90.
Saphu Engl. 90.
- Pachyrhizus** Rich. 155.
angulatus Rich. 155.
bulbosus Kurz, 155.
- Pachystele** Rdlk. 320.
cinerea Pierre, 320.
— v. *cuneata* Engl. 320, 654.
— v. *undulata* Engl. 321.
cuneata Rdlk. 320.
- Pachystoma Thomsonianum* Rehb. f. 517.
- Pacouria crassifolia* Hiern, 330.
florida Hiern, 326.

Pacouria owariensis Hiern, 329.
Paederia owariensis Spreng, 329.
Palisota Rchb. 574.
acuminata Cl. 574.
ambigua Cl. 574.
Barteri H. f. 574.
congolana Hua, 575.
hirsuta K. Sch. 575.
Laurentii D. W. 575.
Mannii Cl. 575.
Preussiana K. Sch. 575.
prionostachys Cl. 575.
Pynaertii D. W. 576.
Schweinfurthii Cl. 576.
thyrsiflora Bth. 575.
PALMACEAE, 583.
Pancovia W. 112.
Harmsiana Gilg, 112.
PANDANACEAE, 587.
Pandanus L. f. 587.
Butayei D. W. 587.
Candelabrum P. B. 587.
Pandiaka Moq. 460.
Heudelotii Bth. 460.
Panicum L. 630.
africanum Poir. 636.
arborescens L. 630.
argyrotrichum And. 630.
brizanthum Hochst. 630.
— v. *polystachyum* D. W. et T.D. 630.
colonum L. 630.
coloratum L. 630.
costatum Roxb. 634.
Crus-galli L. 631.
— v. *Petiveri* Hack. 631.
— v. *polystachyum* Munro, 631.
— v. *submuticum* Franch. 631.
Dactylon L. 643.
diagonale Nees, 631.
— v. *hirsutior* D. W. et T.D. 632.
— v. *uniglume* Hack. 632.
dichotomum Forsk. 637.
distichophyllum Trin. 632.
elongatum Mez, 632.
glaucum L. 636.
Griffonii Franch. 632.
Hensii K. Sch. 632.
horizontale G. F. W. Mey. 635.
horizontale Nees, 634.
indutum St. 632.
interruptum W. 633.
lutetense K. Sch. 633.

Panicum
maximum Jacq. 633.
mayombense Franch. 633.
molle Sw. 633.
muticum Forsk. 633.
nigritanum Hack. 633.
nudiglume Hochst. 633.
ogowense Franch. 634.
ovalifolium Poir. 630.
Petiveri Trin. 631.
plicatum Lam. 634.
— v. *costatum* Bak. 634.
polystachyum K. Sch. 634.
roseum St. 635.
Ruprechtii Fourn. 633.
sanguinale L. 634.
— v. *cognatum* Hack. 634.
— v. *horizontale* E. Mey. 635.
scabrum Lam. 635.
sphacelatum St. 635.
sulcatum Aubl. 635.
Tholloni Franch. 635.
uniglume Hochst. 632.
verticillatum L. 636.
Zenkeri K. Sch. 635.
zizanioides H. B. et K. 635.
Papaya vulgaris DC. 225.
Parasia debilis Hiern, 374.
Parinari *Mobola* Hiern, 191.
Parinarium Juss. 189.
congenense F. Didr. 189.
congoense Engl. 189.
congolanum Th. et Hël. Dur. 189.
curatellifolium Planch. 190.
excelsum T.D. et D.W. 190.
gabonense Engl. 190.
— v. *mayumbense* D. W. 190.
Gilletii D. W. 190.
glabrum Oliv. 190.
Holstii Engl. 190.
— v. *longifolium* Engl. 190.
Mobola Oliv. 190.
Poggei Engl. 191.
salicifolium Engl. 190.
subcordatum Oliv. 191.
Verdickii D. W. 191.
Parkia R. Br. 183.
biglobosa Bth. 183.
filicoidea Welw. 183.
Klainei Pierre, 183.

Parkinsonia L. 171.
aculeata L. 171.
Paropsia Noronha, 222.
Brazzeana Baill. 222.
Dewevrei D. W. et T.D. 222.
— v. *condensata* D. W. 222.
grewioi-des Welw. 222.
— v. *condensata* Th. et Hël. Dur. 222.
reticulata Engl. 223, 654.
— v. *ovatifolia* Engl. 223.
Pasacardoa O. K. 315.
Grantii O. K. 315.
— v. *angustiligulata* D. W. 315.
— v. *reducta* D. W. 315.
Paspalum L. 628.
ciliatum Lam. 629.
conjugatum Berg. 628.
Kora W. 629.
longiflorum Retz. 629.
scrobiculatum L. 629.
Passiflora L. 222.
foetida L. 222.
quadrangularis L. 222.
PASSIFLORACEAE, 222.
Paullinia Schum. 109.
africana G. Don, 109.
pinnata L. 109, 652.
senegalensis Juss. 109.
wata S. et T. 109.
Pavetta L. 274.
Baconia Hiern, 274, 654.
— v. *congolana* D. W. et T.D. 274.
— f. *puberulosa* D. W. 274.
canescens DC. 274.
crassipes K. Sch. 274.
flammea K. Sch. 274.
Laurentii D. W. 275.
Lescauwaeii D. W. 275.
longituba K. Sch. 275.
tomentosa A. Rich. 274.
Warburgiana D. W. et T.D. 275.
Pavonia L. 52.
kilimandscharica Guerke, 52.
Paxia Dewevrei D. W. et T. D. 117. (1).
PEDALINACEAE, 412.
Peddiea Harv. 472.
longepedicellata Gilg, 472.
— v. *multiflora* D. W. 472.
Pedicellaria Schrk, 29.
pentaphylla Schrk, 29.
— v. *hirsutissima* D. W. 29.

(1) *Paxia Dewevrei* est syn. de *Rourea pseudobaccata* Gilg [Conf. De Wild. Étud. fl. Bas- et Moy.-Cgo, I, 245].

- Peltophorum** Vog. 170.
africanum Sond. 170.
- Penicillaria** spicata W. 638.
- Pennisetum** Pers. 637.
aureum A. Rich. 636.
Benthami St. 637.
dichotomum Del. 637.
dioicum A. Rich. 637.
hordeiforme Spreng. 637.
macrostachyum Bth. 637.
nodiflorum Franch. 638.
parviflorum Trin. 638.
polystachyum Schult. 638.
Priurii Kth, 638.
purpurascens H. B. et K. 638.
purpureum Schum. 637.
reversum Hack. 638.
setosum A. Rich. 638.
spicatum Koern. 638.
— v. typicum K. Sch. 639.
— f. viviparum Auct. 639.
typhoideum A. Rich. 639.
unisetum Bth. 639.
- Pentaclethra** Bth. 182.
Eetveldeana D. W. et T.D. 182.
macrophylla Bth. 182.
- Pentadesma** Sabine, 46.
butyracea Sabine, 46.
- Pentanisia** Harv. 266.
Schweinfurthii Hiern, 266.
variabilis Harv. 266.
zanzibarica Kl. 242.
- Pentarrhinum** E. Mey. 362.
abyssinicum Decne, 362.
— v. angolense N. E. Br. 363.
- Pentas** Bth. 242.
cleisostoma K. Sch. 242.
— v. Poggeana K. Sch. 242.
Dewevrei D. W. et T. D. 242.
Liebrechtsiana D. W. 242.
longiflora Oliv. 242.
— v. occidentalis K. Sch. 242.
longituba K. Sch. 242.
purpurea Oliv. 242.
zanzibarica Vatke, 242.
- Pentodon** Hochst. 244.
pentander Vatke, 244.
- Peperomia** R. et P. 469.
fernandopoana DC. 469.
- Peponia** Naud. 226.
- Peponia**
bracteata Cogn. 226.
— v. hirsuta Cogn. 226.
- Perdicium** piloselloides Hiern, 315.
- Pergularia** L. 366.
africana N. E. Br. 366.
sanguinolenta Britten, 366.
- Perichasma** laetiflora Miers, 25.
- Periploca** L. 357.
nigrescens Afz. 357.
nigricans Schl. 357.
Preussii K. Sch. 357.
sylvestris Retz. 365.
- Peristrophe** Nees, 432.
bicalyculata Nees, 432.
Dewevrei D. W. et T.D. 433.
Hensii Cl. 433.
- Perotis** Ait. 628.
latifolia Ait. 628.
spicata Th. et Hël. Dur. 628.
- Persea** Gaertn. 469.
gratissima Gaertn. 469.
- Petersia** Welw. 203.
africana Welw. 203.
- Petunia** Juss. 397.
nyctaginiflora Juss. 397.
- Peucedanum** L. 238.
araliaceum Bth. 238.
— v. fraxinifolium Engl. 238.
fraxinifolium Hiern, 238.
muriculatum Welw. 238.
- Phaeoneuron** Gilg, 207.
dicellandroides Gilg, 207. 214.
- Pharnaceum** depressum L. 41.
- Phaseolodes** drastica O. K. 134.
Thonningii O. K. 134.
- Phaseolus** L. 150.
adenanthus G. F. W. Mey. 150.
lunatus L. 150.
Mungo L. 150.
vexillatus L. 153.
vulgaris L. 150.
- Phaulopsis** longifolia Lindau, 419.
obliqua Lindau, 420.
Poggei Lindau, 420.
- Phayloopsis** W. 419.
imbricata Cordem. 419, 420.
Lindaviana D. W. 419.
longifolia Thoms. 420.
longifolia Sims, 419.
obliqua S. Moore, 420.
oppositifolia Lindau, 419.
- Phayloopsis**
parviflora W. 419.
Poggei Cl. 420.
- Phialodiscus** Rdlk. 112.
Dewevrei Gilg, 112.
plurijugatus Rdlk. 112.
unijugatus Rdlk. 112, 653.
- Philoxerus** vermicularis R. Br. 461.
- Phlomis** africana P.B. 452.
Leonurus L. 453.
nepetaefolia L. 453.
- Phoenix** L. 583.
dactylifera L. 583.
reclinata Jacq. 583.
spinosa Thonn. 583.
- Phragmites** Trin. 645.
communis Trin. 645.
vulgaris Crép. 645.
- Phrynium** W. 547.
baccatum K. Sch. 544.
brachystachyum Koern. 545.
confertum K. Sch. 547.
Daniellii Bth. 545.
filipes Bth. 548.
Hensii Bak. 548.
leiogonium Bak. 545.
oxycarpum Bak. 545.
- Phyllactinia** Grantii Bth. 315.
— v. angustiligulata D.W. 315.
— v. reducta D.W. 315.
- Phyllanthus** L. 482.
capillaris S. et T. 482.
floribundus M.-A. 482.
Gilletii D. W. 482.
moeroensis D. W. 482.
Niruri L. 482.
niruroides M.-A. 482.
odontadenius M.-A. 483.
— v. micranthus Pax, 483.
pentandrus S. et T. 483.
polyanthus Pax, 483.
Pynaertii D. W. 483.
reticulatus Poir. 483.
Verdickii D. W. 483.
- Phylloclinium** Baill. 38.
paradoxum Baill. 38.
- Phyllocosmus** Kl. 76.
africanus D.W. 76.
congolensis Th. et Hël. Dur. 76.
Dewevrei Engl. 76.
Lemaireanus Th. et Hël. Dur. 76.
senensis Kl. 76, 652.
- Phyllodes** baccatum K. Sch. 544.
brachystachyum K. Sch. 545.
leiogonium K. Sch. 545.
oxycarpum K. Sch. 545.

- Physacanthus** *Bth.* 422.
batanganus *Th. et Hël.*
Dur. 422.
inflatus *Cl.* 422.
- Physalis** *L.* 395.
aequata *Jacq.* 395.
barbadensis *Jacq.* 396.
edulis *Sims.* 395.
minima *L.* 395.
peruviana *L.* 395.
pubescens *L.* 396.
- Physedra** *H. f.* 231.
Barteri *Cogn.* 231.
heterophylla *H. f.* 231.
- Physostigma** *Balf.* 150.
mesoponticum *Taub.*
 150.
venenosum *Balf.* 150.
- Phyteumoides hirsuta*
Smeathm. 247.
- Phytolacca** *L.* 462.
abyssinica *Hoffm.* 462.
 — *v. macrophylla* *D.*
W. et T.D. 463.
dodecandra *L'Hér.* 463.
stricta *Hoffm.* 463.
- PHYTOLACCACEAE,
 462.
- Picalima** *Pierre,* 338.
Klaineana *Pierre,* 338.
nitida *Th. et Hël. Dur.*
 338.
- Pilostyles** *Guill.* 466.
aethiopica *Welw.* 466.
- Pimpinella** *L.* 237.
tomentosa *Engl.* 237.
- Piper** *L.* 467.
Clusii *C. DC.* 467.
glaucescens *Jacq.* 468.
guineense *S. et T.* 467,
 655.
 — *v. Gilletii* *C. DC.* 467.
 — *v. Thomeanum* *C.*
DC. 467.
 — *v. velutinum* *D. W.*
 468.
Laurentii *D. W.* 468.
subpeltatum *W.* 468,
 655.
 — *v. parvifolium* *C. DC.*
 468.
umbellatum *L.* 468.
unguiculatum *R. et P.*
 468.
- PIPERACEAE, 467.
- Piptadenia** *Bth.* 184.
africana *H. f.* 184.
- Pircunia abyssinica* *Moq.*
 463.
stricta *Moq.* 463.
- Pistia** *L.* 592.
Stratiolotes *L.* 592.
- Pithecolobium** *Mart.*
 189.
altissimum *Oliv.* 189.
Pittosporum bicururium
Schinz et T.D. 94.
- Placus lacera* *O. K.* 301.
- Pladora decussata* *Roxb.*
 375.
- Plagiostyles** *Pierre,* 487.
Klaineana *Pierre,* 487.
- Platanocarpum africa-*
num *H. f.* 240.
- Platanthera Brachycory-*
this *Schltr.* 538.
pleistophylla *Schltr.* 537.
- Platostoma** *P. B.* 444.
africanum *P. B.* 444.
Buettnerianum *Briq.*
 444.
flaccidum *Briq.* 444.
- Platycoryne Poggeana*
Rolfe, 535.
- Platylepis** *A. Rich.* 534.
glandulosa *R. f.* 534.
- Platysepalum** *Welw.*
 136.
cuspidatum *Taub.* 136.
ferrugineum *Taub.* 136,
 653.
hypoleucum *Taub.* 136.
Ledermanni *Engl.* 653.
Poggei *Taub.* 136.
Vanhouttei *D. W.* 136.
violaceum *Welw.* 136.
- Plectranthus** *L'Hér.*
 447.
intrusus *Briq.* 447.
miserabilis *Briq.* 447,
 655.
phryxotrichus *Briq.* 447.
Schlechteri *Guerke,* 448.
- Plectronia** *L.* 267.
acarophyta *D. W.* 267.
Arnoldiana *D. W. et T.*
D. 267.
Barteri *D. W. et T. D.*
 267.
brevifolia *Engl.* 268.
congensis *Th. et Hël.*
Dur. 268.
connata *D. W. et T.D.*
 268.
cornelioides *D. W.* 268.
Dewevrei *D. W.* 268.
Gentilii *D. W.* 268.
Gilletii *D. W.* 268.
Laurentii *D. W.* 268.
Lualabae *K. Sch.* 269.
lucida *D. W. et T.D.* 269.
Oddoni *D. W.* 269, 654.
psychotrioides *K. Sch.*
 269.
pulchra *K. Sch.* 269.
Pynaertii *D. W.* 269.
tomentosa *D. W.* 269.
venosa *Oliv.* 269, 654.
- Plectrotropis hirsuta* *S.*
et T. 153.
- Pleiocarpa** *Bth.* 338.
bicarpellata *Stapf,* 338.
tubicina *Stapf,* 338.
- Pleiocarpa**
Welwitschii *Stapf,* 338.
- Pleioceras** *Baill.* 338.
Gilletii *Stapf,* 338.
- Pleiotaxis** *Steetz,* 314.
affinis *O. Hoffm.* 314.
Dewevrei *O. Hoffm.* 314.
eximia *O. Hoffm.* 314.
pulcherrima *Steetz,* 314.
pulcherrima *Klatt,* 314.
 — *v. Poggeana* *O.*
Hoffm. 314.
rugosa *O. Hoffm.* 314.
- Pleodiporochna Buettneri*
V. Tgh. 85.
- Plinia pedunculata* *L. f.*
 203.
- Pluchea** *Cass.* 302.
Dioscoridis *DC.* 302.
- PLUMBAGINACEAE,
 319.
- Plumbago** *L.* 319.
zeylanica *L.* 319.
- Plumeria** *L.* 341.
alba *L.* 341.
rubra *L.* 341.
- Poa Chapellieri* *Kth.* 646.
ciliaris *L.* 646.
fascicularis *Kth.* 646.
megastachya *Koel.* 646.
mucronata *P. B.* 648.
multiflora *Forsk.* 646.
nutans *Retz.* 647.
tremula *Lam.* 647.
- Podalyria Haematoxylon*
S. et T. 167.
- PODOSTEMACEAE, 465.
- Poggea** *Guerke,* 36.
alata *Guerke,* 36, 651.
- Poggeophyton** *Pax,* 490.
aculeatum *Pax,* 490, 656.
- Pogonia** *Juss.* 534.
umbrosa *R. f.* 534.
- Poinciana** *L.* 171.
pulcherrima *L.* 170.
regia *Boj.* 171.
- Poivreia conferta* *Bth.* 196.
constricta *Bth.* 197.
mossambicensis *Kl.* 197.
- Polanisia** *Raf.* 29.
hirta *Pax,* 29.
Sereti *D. W.* 29.
- Pollia** *Thunb.* 574, 657.
condensata *Cl.* 574.
 — *v. variegata* *Hort.*
 574.
- Polycarpaea** *Lam.* 41.
corymbosa *Lam.* 41.
 — *v. eriantha* *Pax,* 42.
 — *v. genuina* *Pax,* 42.
eriantha *Hochst.* 42.
glabrifolia *DC.* 42.
Loefflingii *B. et H. f.* 41.
prostrata *Decne,* 41.
- Polycarpon** *Loefl.* 41.
depressum *Rohrb.* 41.

- Polycarpon**
prostratum Pax, 41.
pusillum Roxb. 41.
- Polycephalum** *Engl.* 99.
integrum D. W. et T.D. 99.
Poggei Engl. 99.
- Polygala** *L.* 39.
acicularis Oliv. 39.
arenaria W. 39.
Cabrae Chod. 39.
congoensis Guerke, 39.
Gomesiana Welw. 39.
persicariaefolia DC. 39.
sparsiflora Oliv. 40.
 — *f. robustior Chod.* 40.
ukerensis Guerke, 40.
Verdickii Guerke, 40.
- POLYGALACEAE, 39.
- POLYGONACEAE, 463.
- Polygonum** *L.* 463.
acuminatum Kth. 463.
barbatum L. 463.
lanigerum R. Br. 463.
 — *v. africanum Meisn.* 464.
lanigerum Meisn. 464.
senegalense Meisn. 464.
serrulatum Lag. 464.
tomentosum W. 464.
- Polyochnella congoensis* V. Tgh. 85.
Gilletiana V. Tgh. 85.
Welwitschii V. Tgh. 86.
- Polyspatha** *Bth.* 579.
paniculata Bth. 579.
- Polysphaeria** *H. f.* 267.
pedunculata K. Sch. 267.
- Polystachya** *Hook.* 524.
affinis Ldl. 524.
bracteosa Ldl. 524.
bulbophylloides Rolfe, 517.
epiphytica D. W. 524.
Gilletii D. W. 524.
golungensis R. f. 524.
gracilis D. W. 524.
Huyghei D. W. 524.
Kindtiana D. W. 524.
latifolia D. W. 524.
Laurentii D. W. 525.
mayombensis D. W. 525.
mukandaensis D. W. 525.
mystacidioides D. W. 525.
odorata Ldl. 525.
polychaete Krztl. 525.
ramulosa Ldl. 525.
rhodoptera R. f. 525.
tessellata Ldl. 526.
Wahisiana D. W. 526.
- Pontederia natans* P. B. 573.
- PONTEDERIACEAE, 573.
- Popowia** *Endl.* 19.
congensis Engl. et Diels, 19.
ferruginea Engl. et Diels. 19.
Gilletii D. W. 19.
Laurentii D. W. 19.
Schweinfurthii Engl. et Diels, 20.
- Porana** *Burm.* 381.
subrotundifolia D. W. 381.
- Porochna Hoffmanni-Ottonis* V. Tgh. 85.
quangensis V. Tgh. 86.
- Portulaca** *L.* 42.
crassifolia Jacq. 43.
grandiflora Hook. 42.
oleracea L. 42.
patens Jacq. 43.
quadrifida L. 43.
- PORTULACACEAE, 42.
Pothomorphe subpeltatum Miq. 468.
- Pouchetia** *A. Rich.* 263.
africana DC. 263:
 — *v. cuneata Hiern*, 263.
Baumanniana Buett. 263.
- Pouzolzia** *Gaud.* 513.
denudata D. W. et T.D. 513.
Dewevrei D. W. et T.D. 513.
guineensis Bth. 513.
- Premna** *L.* 436.
angolensis Guerke, 436.
quadrifolia S. et T. 436.
- Prevostea** *Choisy*, 380.
breviflora D. W. 380.
Cabrae D. W. et T.D. 380.
campanulata K. Sch. 380.
Oddoni D. W. 380.
Poggei Damm. 380.
- Protea** *L.* 470.
angolensis Welw. 470.
ferruginea Engl. 470.
Lemairei D. W. 470.
Poggei Engl. 470.
- PROTEACEAE, 470.
- Pseudarthria** *W. et A.* 144.
confertiflora Bak. 144.
Hookeri W. et A. 144.
- Pseuderanthemum** *Rdlk.* 428.
Lindavianum D. W. et T.D. 428.
Ludovicianum Lindau, 428.
nigritanum Rdlk. 429.
Pseudobarleria Lindau A. Dew. 418.
- Pseudolachnostylis** *Pxa*, 480.
- Pseudolachnostylis**
Verdickii D. W. 480.
- Pseudospondias** *Engl.* 114.
microcarpa Engl. 114.
- Psidium** *L.* 201.
Guajava L. 201.
pomiferum L. 202.
pyriferum L. 202.
- Psophocarpus** *Neck.* 155.
longepedunculatus Hassk. 155.
palmettorum G. et P. 155.
palustris Desv. 155.
- Psorospermum** *Spach*, 44.
febrifugum Spach, 44.
 — *f. latifolium D. W.* 44.
ferrugineum H. f. 44.
tenuifolium H. f. 44.
- Psychotria** *L.* 280.
acamptopoda K. Sch. 280.
Ansellii Hiern, 280.
Bieleri D. W. 280.
brachyantha Hiern, 280.
brunnea Schw. 281.
Butayei D. W. 281.
Cabrae D. W. 281.
cinerea D. W. 281.
cristata Hiern, 281, 654.
cyanopharynx K. Sch. 281.
Dewevrei D. W. 281.
djumaensis D. W. 281.
djumaensis D. W. 283.
ealaensis D. W. 281.
Gilletii D. W. 281, 654.
gracilescens D. W. 282.
hamata D. W. 282.
Kimuenzae D. W. 282.
kisantuensis D. W. 282.
Laurentii D. W. 282.
longevaginalis Schw. 282.
mogandjoensis D. W. 282.
nigropunctata Hiern, 282.
obovatifolia D. W. 282.
obvallata S. et T. 284.
Oddoni D. W. 282.
Poggei K. Sch. 283.
potamophila K. Sch. 283.
pygmaeodendron K. Sch. 283.
stigmatophylla K. Sch. 283.
triflora S. et T. 267.
Vogeliana Bth. 283.
Wildemaniana T.D. 283.
- Pterocarpus** *L.* 163.
Cabrae D. W. 163.
Dekindtianus Harms, 164.

Pterocarpus

- Ecastaphyllum* L. 163.
crinaceus Auct. 164.
grandiflorus M. Mich. 164.
lunatus L. 163.
 Mutondo D. W. 164.
odoratus D. W. 164.
tinctorius Welw. 164.
Pteropetalum Klingii Pax, 33.

Pterygota Endl. 64.

- macrocarpa* K. Sch. 64.

Ptychopetalum Bth. 96.

- alliaceum* D. W. 96.
Laurentii D. W. 96.
nigricans D. W. 96.

Puelia Franch. 648.

- Dewevrei* D. W. et T.D. 648.

Punica L. 218.

- granatum* L. 218.
Pupal lappacea Hiern, 458.

Pupalia Juss. 458.

- lappacea* Moq. 458.

Pycnanthus Kombo Warb. v. *angolensis* Warb. 469.**Pycnobotrya** Bth. 352.

- nitida* Bth. 352.

Pycnocomma Bth. 497.

- Laurentii* D. W. 497.
macrophylla Bth. 497.
Sapini D. W. 497.
Thonneri Pax, 498.
trilobata D. W. 498.

Pycnostachys Hook. 451.

- congensis* Guerke, 451.
Descampsii Briq. 451.
Goetzenii Guerke, 451.

Pycreus P. B. 608.

- albo-marginatus* Nees, 608.
flavescens Rchb. 608.
globosus Rchb. 608.
 — v. *nilagiricus* Cl. 608.
Mundtii Nees, 608.
oakfortensis Cl. 608.
polystachyus P. B. 609.
propinquus Nees, 609.
Smithianus Cl. 609.
subtrigonus Cl. 609.
tremulus Cl. 609.

Pynaertia D. W. 91.

- ealaensis* D. W. 91.

Pyrenacantha Hook. 99.

- Staudtii* Engl. 99.

Q

Quamoclit Moench, 390.

- pinnata* Boj. 390.
vulgaris Choisy, 390.

Quassia L. 83.

- africana* Baill. 83.

Quisqualis L. 201.

- ebracteata* P. B. 201.
indica L. 201.

R

Radlkofera Gilg, 112.

- calodendron* Gilg, 112.

Randia L. 257.

- acarophyta* D. W. 257.
acuminata Bth. 258.
Bruneelii D. W. 258.
cladantha K. Sch. 258.
congolana D. W. et T.D. 258.

corymbosa DC. 274.

- Cuvelierana* D. W. 258.
Eetveldeana D. W. et T. D. 258.

— v. *elongata* D. W. 258.

- Lemairei* D. W. 259.
Liebrechtsiana D. W. et T.D. 259.

longiflora T.D. et Sch. 259.*Lujae* D. W. 259.*maculata* DC. 259.*malleifera* B. et H. f. 259.*micrantha* K. Sch. 259.— v. *Poggeana* K. Sch. 259.*Munsee* Schw. 260.*myrmecophyta* D. W. 260.— v. *glabra* D. W. 260.— v. *subglabra* D. W. 260.— v. *typica* D. W. 260.*nalaensis* D. W. 260.*octomera* B. et H. f. 260.*physophylla* K. Sch. 260.*Pynaertii* D. W. 260.*reticulata* Bth. 265.*Sereti* D. W. 261.

RANUNCULACEAE, 13.

Ranunculus L. 15.*philonotis* Ehrh. 15.*pinnatus* Poir. 15.*sardous* Cr. 15.*Raphanus pilosus* W. 222.**Raphia** P. B. 584.*Gentiliana* D. W. 584.— v. *Gilletii* D. W. 584.*Laurentii* D. W. 584.*monbuttorum* Drude, 584.*Sese* D. W. 584.*vinitera* P. B. 584.*Raphiacme macrostemon*

K. Sch. 356.

splendens K. Sch. 356.**Raphidiocystis** H. f. 231.*Welwitschii* H. f. 231.**Raphionacme** Harv. 356.*Michelii* D. W. 356.*splendens* Schlt. 356.*Verdickii* D. W. 357.*Raphiostylis beninensis*

Pl. 98.

Heudelotii Pl. 99.**Rauwolfia** L. 339.*caffra* Sond. 339.*cardiocarpa* K. Sch. 340.*congolana* D. W. et T.D. 340.*longeacuminata* D. W. et T.D. 339.*Mannii* Stapf, 340.*obscura* K. Sch. 340.*senegambica* A. DC. 340.*vomitorea* Afz. 340.**Renalmia** L. f. 543.*bracteata* D. W. et T.D. 543, 656.*Cabrae* D. W. et T.D. 543.*congolana* D. W. et T. D. 543.*Dewevrei* D. W. et T.D. 544.*Rhabdophyllum affine* V. Tgh. 86.*Arnoldianum* V. Tgh. 87.*longipes* V. Tgh. 88.*refractum* V. Tgh. 89.

RHAMNACEAE, 103.

Rhamphicarpa Bth. 404.*fistulosa* Bth. 404.*longiflora* Bth. 404.*Rhabdophyllum ramosum* Hochst. 406.*Rhaptopetalum Eetveldeanum* D. W. et T.D. 67.**Rhektophyllum** N. E. Br. 590.*congensis* D. W. et T.D. 590.*mirabile* N. E. Br. 590.**Rhinacanthus** Nees, 431.*communis* Nees, 428, 431.*Dewevrei* D. W. et T.D. 431.*parviflorus* T. And. 432.**Rhipsalis aethiopica**

Welw. 235.

Cassytha Gaertn. 235.**Rhizophora** L. 194.*Mangle* L. 194.— v. *racemosa* Engl. 194.*racemosa* G. F. W. Mey. 194.

RHIZOPHORACEAE, 194.

- Rhoeo** *Hance*, 582.
discolor *Hance*, 582.
- Rhoicissus** *Pl.* 109.
edulis *D. W.* 109.
Verdickii *D. W.* 109.
- Rhopalopilia** *Oliv.* 98.
patens *Pierre*, 98.
— v. *angustifolia* *D. W.* 98.
Poggei *Engl.* 98.
Rhus insignis *Oliv.* 116.
pulcherrima *Oliv.* 116.
- Rhynchosia** *Lour.* 157.
affinis *D. W.* 157.
cajanoides *G. et P.* 159.
calycina *G. et P.* 157.
caribaea *DC.* 157.
Cienkowski *Schw.* 132.
congensis *Bak.* 158.
— v. *Gilletii* *D. W.* 158.
cyanosperma *Bth.* 158.
flavissima *Hochst.* 158.
glomerata *G. et P.* 159.
katangensis *D. W.* 158.
Mannii *Bak.* 158.
Memnonia *DC.* 158.
minima *DC.* 158.
Verdickii *D. W.* 159.
- Rhynchospora** *aurea* *R. Br.* 594.
candida *Boeck.* 594.
ochrocephala *Boeck.* 605.
Rhynchosstigma *Lujaei* *D. W. et T. D.* 358.
- Rhynchosporis** *Harms,* 126.
Poggei *Harms.* 126.
- Rhytachne** *Desv.* 623.
congoensis *Hack.* 623.
— v. *incompleta* *Hack.* 623.
— v. *polystachya* *Hack.* 623.
— f. *submutica* *Hack.* 623.
gabonensis *Hack.* 623.
- Ricinocarpus** *brachystachyus* *O. K.* 492.
- Ricinodendron** *M.-A.* 489.
africanum *M.-A.* 489.
- Ricinus** *L.* 499.
communis *L.* 499.
- Riedleya** *corchorifolia* *DC.* 65.
- Rinorea** *brachypetala* *O. K.* 34.
congensis *Engl.* 34.
dentata *O. K.* 34.
Dewevrei *Engl.* 34.
Dupuisii *Engl.* 34.
Engleriana *D. W. et T. D.* 34.
ilicifolia *O. K.*
Poggei *Engl.* 35.
Welwitschii *O. K.* 35.
- Ritchiea** *R. Br.* 32.
ageleaeifolia *Gilg.* 32.
ealaensis *D. W.* 32.
erecta *H. f.* 32.
fragrans *R. Br.* 32.
immersa *D. W.* 32.
Laurentii *D. W.* 32.
polypetala *H. f.* 32.
Pynaertii *D. W.* 32.
- Rivina* *inaequalis* *Hook.* 462.
latifolia *Lam.* 462.
- Robinia** *argentiflora* *S. et T.* 165.
sericea *Poir.* 165.
Thonningii *S. et T.* 135.
violacea *P. B.* 165.
- Rondeletia** *febrifuga* *Afz.* 241.
floribunda *G. Don.* 346.
- ROSACEAE, 189.
Rostellaria *tenella* *Nees,* 430.
- Rotala** *L.* 217.
filiformis *Hiern,* 217.
fontinalis *Hiern,* 217.
- Rothmannia** *longiflora* *Salisb.* 259.
Stanleyana *H. f.* 259.
- Rottboellia** *L. f.* 621.
exaltata *L. f.* 621.
- Rourea** *Aubl.* 118.
adiantoides *Gilg,* 118.
bamangaensis *D. W. et T. D.* 118.
chiliantha *Gilg,* 118.
coccinea *Hook. f.* 653.
fasciculata *Gilg,* 118.
Foenum-graecum *D. W. et T. D.* 118.
inodora *D. W. et T. D.* 118.
obliquifoliolata *Gilg,* 118.
ovalifoliolata *Gilg,* 118.
Poggeana *Gilg,* 119.
pseudobaccata *Gilg,* 119.
splendida *Gilg,* 119.
unifoliolata *Gilg,* 119.
viridis *Gilg,* 119.
- RUBIACEAE, 239.
- Rubus** *L.* 192.
Goetzenii *Engl.* 192.
kirungensis *Engl.* 192.
pinnatus *W.* 192.
- Ruellia** *L.* 419.
batangana *J. Br. et K. Sch.* 422.
elongata *P. B.* 421.
imbricata *Forsk.* 419.
patula *Jacq.* 419.
- Rumex** *L.* 465.
abyssinicus *Jacq.* 465.
- Rungia** *Nees,* 432.
Buettneri *Lindau,* 432.
congoensis *Cl.* 432.
- Rungia**
grandis *T. And.* 429.
Paxiana *Cl.* 430.
- RUTACEAE, 81.
- Rutidea** *DC.* 278.
Dupuisii *D. W.* 278.
hispidata *Hiern,* 278.
leucotricha *K. Sch.* 278.
olenotricha *Hiern,* 278.
rufipilis *D. W. et T. D.* 278.
Schlechteri *K. Sch.* 279.
Sereti *D. W.* 279.
Smithii *Hiern,* 279.
- Rynchospora** *Vahl,* 594.
aurea *Vahl,* 594.
candida *Boeck.* 594.
- S
- Sabicea** *Aubl.* 251.
affinis *D. W.* 251.
calycina *Bth.* 251.
capitellata *Bth.* 251.
Dewevrei *D. W. et T. D.* 252.
— v. *latifolia* *D. W.* 252.
Diuklagei *K. Sch.* 252.
floribunda *K. Sch.* 252.
Gilletii *D. W.* 252.
Kolbeana *Bth.* 252.
Laurentii *D. W.* 252.
— v. *Pynaertii* *D. W.* 252.
— v. *velutina* *D. W.* 252.
longepetiolata *D. W.* 252.
Schumanniana *Buett.* 252.
venosa *Bth.* 253.
— v. *villosa* *K. Sch.* 253.
Vogelii *Bth.* 253.
- Saccharum* *spicatum* *L.* 628.
Thunbergii *Hack.* 621.
- Saccolabium** *Bl.* 526.
oconoides *Krzel.* 526.
- Sagittaria* *obtusifolia* *L.* 593.
- Sagus* *vinifera* *Poir.* 585.
- Sakersia** *H. f.* 214.
Laurentii *Cogn.* 214.
— v. *cuneata* *D. W.* 214.
strigosa *Cogn.* 214.
- Salacia** *L.* 103.
alata *D. W.* 103.
— f. *gracilis* *D. W.* 103.
congolensis *D. W. et T. D.* 103.
Demeusei *D. W. et T. D.* 103.
Dewevrei *D. W. et T. D.* 103.
Laurentii *D. W.* 103.
Pynaertii *D. W.* 103.
senegalensis *DC.* 103.

Salacia

unquiculata D. W. et T.
D. 102.

Sambucus L. 229.

nigra L. 239.

SAMYDACEAE. 219.

Sansevieria *Thunb.* 551.

angolensis Welw. 551.

bracteata Bak. 551.

cylindrica Boj. 551.

fragrans Jacq. 565.

guineensis Willd. 551.

Laurentii D. W. 551.

longiflora Sims, 551.

SANTALACEAE, 476.

SAPINDACEAE, 109.

Sapindus simplicifolia

Don, 115.

Sapium P. Br. 500.

cornutum Pax, 500.

—v. *africanum* Engl. 656.

—v. *coriaceum* Pax, 500.

Mannianum Bth. 500.

oblongifolium Pax, 500.

Poggei Pax, 500.

xylocarpum Pax, 500.

SAPOTACEAE, 320.

Sarcocephalus Afz. 239.

Diderrichii D. W. et T.
D. 239.

esculentus Afz. 240.

Gilletii D. W. 239.

Rueseggeri Kotschy, 239.

sambucinus K. Sch. 239.

Sarcophrynium K. Sch.

544.

Arnoldianum D. W. 544.

baccatum K. Sch. 544.

bisubulatum K. Sch. 544.

brachystachyum K. Sch.

545.

leiogonium K. Sch. 545.

oxycarpum K. Sch. 545.

Satyrium Sw. 536.

brachypetalum Engl.

536.

Gilletii D. W. 536.

Goetzenianum Krzl.

536.

riparium R. f. 536.

Sauvagesia L. 35.

congoensis Engl. 35.

erecta L. 35.

nutans Pers. 35.

Scabiosa L. 288.

attenuata L. f. 288.

Columbaria L. 288.

Scaevola L. 317.

Lobelia Murr. 317.

Scaphopetalum Mast.

66.

Dewevrei D. W. et T. D.

66.

monophysca K. Sch. 66.

Thonneri D. W. et T. D.

66.

Scaphopetalum

Thonneri D. W. et T. D.
66.

Schefflera Forst. 238.

Barteri Harms, 238.

Goetzenii Harms, 238.

Schistostephium Less.

309.

heptalobum Bth. 309.

Schizoglossum E. Mey.

358.

Cabrae D. W. 358.

Debeerstianum K. Sch.

359.

macroglossum K. Sch.

359.

spatulatum K. Sch.

358.

tricorniculatum K. Sch.

358.

Schmiedelia africana DC.

110.

Schoeffianthus Engl.

98.

Zenkeri Engl. 98.

Schotia Jacq. 179.

latifolia Jacq. 179.

Romii D. W. 179.

simplicifolia Vahl, 175.

Schrebera Roxb. 324.

trichoclada Welw. 324.

Schwenkia L. 398.

americana L. 398.

Scilla L. 571.

camerooniana Bak. 571.

Ledieni Engl. 571.

—v. *Laurentii* D. W.

571.

—v. *zebrina* D. W. 571.

micrantha A. Rich. 570.

Scirpus L. 618.

atropurpureus Retz. 612.

barbatus Rottb. 614.

Buettnerianus Boeck.

618.

capillaris L. 614.

capitatus L. 613.

complanatus Retz. 616.

dichotomus L. 616.

diphyllus Retz. 616.

dipsaceus Rottb. 617.

ferrugineus L. 617.

filamentosus Vahl, 614.

fluitans L. 619.

gracillimus Boeck. 615.

hispidus Vahl, 617.

obtusifolius Lam. 618.

puberulus Poir. 615.

quinquangularis Kth,

618

senegalensis Lam. 619.

squarrosus Poir. 618.

trichobasis Bak. 615.

Scleria Berg. 594.

Acriulus Cl. 594.

—f. *Leopoldiana* Cl. 594.

Scleria

Barteri Boeck. 595.

Buchanani Boeck. 595.

canaliculato-triquetra

Boeck. 595.

hirtella Sw. 595.

macrantha Boeck. 595.

melanomphala Kth, 595.

—v. *macrantha* Cl. 595.

—f. *oculo-albo* Cl. 596.

Naumanniana Boeck.

596.

ovuligera Nees, 596.

racemosa Poir. 596.

verrucosa Willd. 596.

Sclerochiton Harv. 424.

Gilletii D. W. 424.

Scoparia L. 401.

dulcis L. 401.

SCROPHULARIACEAE,

398.

Scutellaria L. 454.

Debeerstii Briq. 454.

polyadena Briq. 454.

Scyphosyce Baill. 509.

Gilletii D. W. 509.

Scytanthus laurifolius T.

And. 427.

SCYTOPETALACEAE,

67.

Scytopetalum Pierre, 67.

Duchesnei Engl. 67.

Sebaea R. Br. 374.

debilis Schinz, 374.

oligantha Schinz, 374.

Secamone R. Br. 357.

Dewevrei D. W. 357.

Securidaca L. 40.

longepedunculata Fres.

40, 651.

—v. *parvifolia* Oliv. 40.

Securinega obovata M.-A.

484.

Selago L. 434.

alopucuroides Rolfe, 434

Johnstonii Rolfe, 434.

Senecio L. 312.

abyssinicus Sz-B. 312.

cernuus L. f. 310.

congolensis D. W. 312.

crepidioides Aschers.

310.

Dewevrei O. Hoffm. 312.

discifolius Oliv. 312.

diversifolius A. Rich.

310.

katangensis O. Hoffm.

312.

maritimus L. f. 312.

Quartinianus Aschers.

312.

vitellinus Aschers. 310.

Senna occidentalis Roxb.

173.

Tora Roxb. 173.

Sersalisia R. Br. 321

Sersalisia

Laurentii D. W. 321.

Sesamum L. 412.

angolense Welw. 412.

angustifolium Engl. 412.

calycinum Welw. 412.

indicum L. 413.

— v. *angustifolium* Oliv. 412.— v. *integerrimum* Engl. 413.*macranthum* Oliv. 412.*mombanzense* D. W. et T. D. 413.*occidentale* Regel et Heer, 413.*radiatum* S. et T. 413.*Thonneri* D. W. et T. D. 413.*Sesban aegyptiacus* Poir. 137.*pubescens* Hiern, 137.*punctatus* Hiern, 137.**Sesbania** Pers. 137.*aegyptiaca* Pers. 137.*affinis* D. W. 137.*pubescens* DC. 137.*punctata* DC. 137.**Sesuvium** L. 236.*crystallinum* Welw. 236.*mesembryanthemoides*

Wawra et Peyr, 236.

Setaria P. B. 636.*aurea* Hochst. 636.*glauca* P. B. 636.*mauritiana* Spreng. 634.*verticillata* P. B. 636.*Sherbournia foliosa* G.

Don, 262.

Shutereaia bicolor Choisy, 382.**Sicyos** L. 233.*angulatus* H. f. 233.*australis* Endl. 233.*Schimperi* Naud. 233.**Sida** L. 48.*acuta* Burm. f. 48.*carpinifolia* L. f. 48.*cordifolia* L. 48.*hernandioides* L'Hér. 50.*humilis* Cav. 49, 652.*indica* L. 51.*linearifolia* S. et T. 49.*linifolia* Cav. 49, 652.*paniculata* L. 49.*rhombifolia* L. 49.*rostrata* S. et T. 50.*rotundifolia* K. Sch. 50.*rugosa* Thoms. 48.*scabra* S. et T. 50.*spinosa* L. 49.*stipulata* Cav. 48.*unilocularis* L'Hér. 49.*urens* L. 50.*veronicifolia* Lam. v.*humilis* K. Sch. 49.**Sida***Vogelii* H. f. 48.*Sideroxylon dulcificum*

A. DC. 321.

revolutum Bak. 322.

SIMARUBACEAE, 83.

Sinapis juncea L. 27.*Siphonanthus formicarum*

Hiern, 438.

myricoides Hiern, 439.*splendens* Hiern, 441.*volubilis* Hiern, 441.**Smilax** L. 561.*Kraussiana* Meisn. 561.— v. *Morsoniana* A. DC. 562.*Morsoniana* Kth, 562.**Smithia** Ait. 140.*Harmsiana* D. W. 140.*strigosa* Bth. 653.*strobilantha* Welw. 140.*uguenensis* Taub. 140.

SOLANACEAE, 391.

Solanum L. 391.*acanthocalyx* Kl. 391.*aculeastrum* Dun. 391.*aethiopicum* L. 391, 655.*Anguivi* Hook. 392.*antidotum* Damm. 391.*cerasiforme* Dun. 395.*congense* Lk. 392.*Dewevrei* Damm. 392.*duplosinuatum* Kl. 392.*Durandi* Damm. 392.*edule* S. et T. 392.*esculentum* Dun. 393.*guineense* Lam. 394.*inconstans* C. H. Wright,

392.

indicum L. 392.*Laurentii* D. W. 393.*Laurentii* Damm. 394.*Lescauwaeitii* D. W.

393.

Lujaei D. W. et T. D.

394.

Lycopersicum L. 395.*macrocarpon* L. 393.— v. *hirsutum* Damm.

393.

Melongena L. 393.*Monteiroi* C. H. Wright,

393.

mors-elephantum

Damm. 393.

Naumannii Engl. 393.*nigrum* L. 393.*nodiflorum* Jacq. 394.*Preussii* Damm. 394.*Pynaertii* D. W. 394.*Sapini* D. W. 394.*Seaforthianum* An-

drews, 391.

Sereti D. W. 394.*subcoriaceum* Th. et

Hdl. Dur. 394.

Solanum*symphyostemon* D. W. et T. D. 392.*Welwitschii* C. H.

Wright, 394.

— v. *strictum* C. H.

Wright, 394.

Wildemanii Damm. 395.*Zuccagnianum* Damm. 395.**Solenostemon** S. et T.

448.

bullulatus Briq. 449.*monostachyus* Briq.

448.

— v. *amplifrons* Briq.

448.

ocimoides S. et T. 448.— v. *monostachyus* Bak.

448.

ocimoides Briq. 448.**Sonchus** L. 317.*asper* Hill, 317.*Dregeanus* DC. 317.*oleraceus* L. 317.— v. *spinus* O. et H.

317.

Schweinfurthii O. et H.

317.

spinus Lam. 317.*taraxacifolius* S. et T.

316.

Sopubia Ham. 405.*angolensis* Engl. 405.— v. *angustipetala*

Engl. 405.

Buchneri Engl. 405.*cana* Hiern, 405.*Dregeana* Bth. 405.*karaguensis* Oliv. 405.*latifolia* Engl. 406, 655.*Monteiroi* Skan, 406.*ramosa* Hochst. 406.*trifida* Ham. 406.— v. *ramosa* Engl. 406.*Sorghum halepense* Nees,

626.

halepense Pers. 627.**Sorindeia** Thou. 114.*Gilletii* D. W. 114.*juglandifolia* Pl. 115.*Kimuenzae* D. W. 115.*Poggei* Engl. 115.**Sparganophorus***Gaertn.* 289.*Vaillantii* Gaertn. 289.**Sparmannia** L. f. 72.*abyssinica* Hochst. 72.*Spathandra memecyloides*

Bth. 216.

Spathodea P. B. 409.*campanulata* P. B. 409.*laevis* P. B. 409.*lutea* Bth. 410.*nilotica* Seem. 409, 655.*tomentosa* Bth. 410.

- Spermacoce dibrachiata* Oliv. 286.
hebecarpa Oliv. 286.
ocimoides Burm. 286.
ramisperma Pohl, 286.
Ruelliae DC. 287.
senensis Hiern, 287.
serrulata P. B. 286.
stricta L. f. 287.
- Sphaeranthus** L. 302.
flexuosus O. Hoffm. 302.
polycephalus O. et H. 302.
suaveolens DC. 302.
- Sphaerocodon** Bth. 365.
platypoda K. Sch. 365.
- Sphaerodendron angolense* Seem. 239.
- Sphaerosicyos** H. f. 229.
Meyeri H. f. 229.
sphaericus Cogn. 229.
- Sphenoclea** Gaertn. 318.
zeylanica Gaertn. 318.
- Sphenostylis** E. Mey. 153.
angustifolia Sond. 153.
katangensis Harms, 153.
stenocarpa Harms, 154.
— v. *latifoliolata* D. W. 154.
- Spilanthes** L. 307.
Acmella Murr. 307.
— v. *oleracea* Cl. 307.
oleracea L. 307.
- Spirodela** Schleid. 592.
polyrrhiza Schleid. 592.
- Spondias** L. 113.
angolensis O. Hoffm. 114.
aurantiaca S. et T. 113.
dubia A. Rich. 113.
lutea L. 113.
microcarpa A. Rich. 114.
Mombin L. 113.
Myrobalanus L. 113.
- Sponia guineensis* Planch. 501.
- Sporobolus** R. Br. 641.
barbigerus Franch. 641.
breviglumis Hack. 641.
capensis Kth, 642.
indicus R. Br. 641.
mayumbensis Franch. 641.
Molleri Hack. 641.
robustus Kth, 641.
strictus Franch. 642.
- Stachytarpheta** Vahl, 435.
angustifolia Vahl, 435.
indica Vahl, 435.
jamaicensis Vahl, 435.
- Staphylosyce* Barteri H. f. 231.
- Staphysora* Sapini D. W. 486.
- Stathmostelma** K. Sch. 361.
chironioides K. Sch. 361.
incarnatum K. Sch. 361.
Laurentianum A. Dew. 361.
pedunculatum K. Sch. 361.
Verdickii D. W. 361.
Verdickii D. W. 361.
Wildemanianum Th. et Hel. Dur. 361.
- Staurospermum verticillatum* S. et T. 288.
- Steganotaenia araliacea* Hochst. 233.
- Stellularia inflata* D. W. 402.
- Stenantha** Engl. et Diels, 22.
pluriflora D. W. 22.
- Stephania** Lour. 25.
laetificate B. et H. f. 25.
- Stephegyne africana* Walp. 240.
stipulata B. et H. f. 240.
- Sterculia** L. 60.
acuminata P. B. 61.
caricifolia G. Don, 61.
cordifolia Cav. 62.
katangensis D. W. 60.
pedunculata D. W. et T. D. 60.
pubescens G. Don, 60.
quinqueloba K. Sch. 60, 652.
Tragacantha Ldl. 60.
verticillata S. et T. 61.
- STERCULIACEAE, 60.
- Stereospermum** Cham. 411.
Arnoldianum D. W. 411.
dentatum A. Rich. 411.
Harmsianum K. Sch. 411.
katangense D. W. 411.
Kunthianum Cham. 411, 655.
Verdickii D. W. 411, 655.
- Stictocardia** Hall. f. 391.
beraviensis Hall. f. 391.
- Stipa capensis* Thunb. 622.
- Stipularia** P. B. 253.
africana P. B. 253.
— v. *hirsuta* D. W. 253.
elliptica Schw. 253.
— v. *hisuta* D. W. 253.
- Stironeuron stipulatum* Rdlk. 322.
- Stizolobium pruriens* Medic. 148.
urens Pers. 149.
- Streptocarpus** Ldl. 408.
katangensis D. W. et T. D. 408.
- Streptogyne crinita* P. B. 648.
- Striga** Lour. 403.
Dewevrei D. W. et T. D. 403.
Forbesii Bth. 403.
gesnerioides Vatke, 403.
hermonthica Bth. 403.
hirsuta Bth. 403.
lutea Lour. 403.
macrantha Bth. 402.
orobanchoides Bth. 403, 404.
- Stroemia trifoliata* S. et T. 33.
- Strombosiosis** Engl. 98.
congolensis D. W. et T. D. 98.
- Strophanthus** DC. 346.
Arnoldianus D. W. et T. D. 346.
bracteatus Franch. 348.
Demeusei A. Dew. 346.
Dewevrei D. W. 346, 654.
ecaudatus Rolfe, 349.
gardeniiflorus Gilg, 347.
Gilletii D. W. 349.
hispidus DC. 347.
— v. *Bosere* D. W. 347.
holosericeus K. Sch. 347.
intermedius Pax, 347.
— v. *Bieleri* D. W. 347.
Ledieni Stein, 347.
Paroissei Franch. 348.
parviflorus Franch. 346.
parviflorus D. W. et T. D. 346.
Preussii Engl. et Pax, 348.
— v. *brevifolius* D. W. 348.
sarmentosus DC. 348.
Tholloni D. W. 347.
Verdickii D. W. 349.
Welwitschii K. Sch. 349.
Wildemanianus Gilg, 349.
- Struthium africanum* P. B. 289.
- Strychnos** L. 371.
congolana Gilg, 371, 654.
densiflora Baill. 371.
Dewevrei Gilg, 371.
floribunda Gilg, 371.
Gilletii D. W. 371.
gracillima Gilg, 372.
— v. *paucispinosa* D. W. 372.
innocua Del. 372.
Kipapa Gilg, 372.
longicaudata Gilg, 372.

Strychnos

- occidentalis* Solered. 372.
pungens Solered. 372.
scandens S. et T. 330.
Schweinfurthii Gilg, 372.
suaveolens Gilg, 371.
suberosa D. W. 372.
Unguacha A. Rich. 373.
 — v. *obovata* D. W. 373.
variabilis D. W. 373.
Stylarthropus Laurentii Lindau, 422.
Stuhlmannii Lindau, 422.
Stylosanthes Sw. 141.
erecta P. B. 141.
Swartzia Schreb. 169.
madagascariensis Desv. 169.
Symphonia L. f. 45.
gabonensis Pierre, 45.
globulifera L. f. 45.
 — v. *africana* Vesq. 45.
 — v. *gabonensis* Vesq. 45.
Synclisia Bth. 25.
scabrida Miers, 25.
Syngonanthus Ruhl. 593.
Schlechteri Ruhl. 593.
Synsepalum Baill. 321.
dulcificum Daniell, 321.
stipulatum Engl. 321.
Syzygium Gaertn. 203.
cordatum Hochst. 203.
cordifolium Kl. 203.
owariense Bth. 203.

T

- Tabernaemontana Barteri* H. f. 342.
durinervis T.D. et Schinz, 343.
durissima Stapf, 343.
eglandulosa Stapf, 343.
erythrophthalma K. Sch. 352.
nitida Stapf, 338.
pachysiphon Stapf, 338.
penduliflora K. Sch. 344.
Smithii Stapf, 344.
Thonneri T.D. et D. W. 344.
Tabernanthe Baill. 342.
albiflora Stapf, 342.
Bocca Stapf, 342.
Iboga Baill. 342.
Iboga Oliv. 342.
tenuiflora Stapf, 342.
Tacazzea Decne, 356.
apiculata Oliv. 356.
pedicellata K. Sch. 356.

Tacca Forst, 558.

- pinnatifida* Forst, 558.
TACCACEAE, 558.
Tachiadenus continentalis Bak. 374.
Taeniocarpum articulatum Desv. 155.
Tagetes L. 309.
Gilletii D. W. 309.
patula L. 309.
Talinum Adans. 43.
crassifolium W. 43.
cuneifolium W. 43.
patens W. 33.
Tamarindus L. 178.
indica L. 178.
Tanacetum heptalobum DC. 309.
Tardavel dibrachiata Hiern, 286.
scabra Hiern, 287.
stricta Hiern, 287.
Tarennia Gaertn. 257.
congensis Hiern, 257.
Gilletii D. W. et T. D. 266.
nigrescens Hiern, 266.
Teclea Del. 81.
Engleriana D. W. 81.
Telanthera R. Br. 460.
maritima Moq. 460.
Telfairea Hook. 225.
pedata Hook. 225.
Tephrosia Pers. 131.
bracteolata G. et P. 131.
Butayei D. W. et T. D. 131.
curvata D. W. 131.
digitata DC. 132.
elegans Sch. 131.
katangensis D. W. 131.
Kindu D. W. 131.
Laurentii D. W. 131.
linearis Pers. 132.
lupinifolia DC. 132.
 — v. *digitata* Bak. 132.
megalantha M. Mich. 132.
nseleensis D. W. 132.
noctiflora Boj. 132.
Verdickii D. W. 133.
villosa Pers. 133.
Vogelii H. f. 133.
Terminalia L. 195.
Catappa L. 195.
Dewevrei D. W. et T. D. 195.
superba Engl. 195.
torulosa F. Hoffm. 195.
Tetracera L. 16.
alnifolia W. 16, 651.
alnifolia Auct. 16.
 — v. *Demeusei* D. W. 16.
Demeusei D. W. 16.
fragrans D. W. et T. D. 17.
Gilletii D. W. 16.

Tetracera

- Masuiana* D. W. et T. D. 16.
obtusata D. W. et T. D. 17.
podotricha Gilg, 16.
 — v. *glabrescens* D. W. 16.
Poggei Gilg, 17.
rosiflora Gilg, 17.
Stuhlmanniana Gilg, 17.
 — v. *occidentalis* D. W. 17.
Tetrapleura Bth. 184.
Thonningii Bth. 184.
Thalia L. 548.
coerulea Ridl. 548.
geniculata L. 549.
Schumanniana D. W. 549.
Thalictrum L. 15.
rhynchocarpum Del. et Rich. 15.
Thaumatococcus Bth. 545.
Daniellii Bth. 545.
Themeda Forsk. 627.
ciliata Hack. 627.
Forskahlii Hack. 627.
 — v. *glauca* Hack. 627.
Theobroma L. 66.
Cacao L. 66.
Thesium L. 476.
doloense Pilger, 476.
Thespesia Cav. 58.
Debeerstii D. W. et T. D. 58.
populnea Soland. 58.
Thevetia L. 339.
neriifolia Juss. 339.
Thomandersia Baill. 426.
Butayei D. W. 426.
congolana D. W. et T. D. 426.
 — v. *grandifolia* D. W. 427.
Hensii D. W. et T. D. 427.
 — v. *latifolia* D. W. 427.
 — v. *longipetiolata* D. W. 427.
Laurentii D. W. 427.
laurifolia Baill. 427.
 — v. *latifolia* Th. et Hël. Dur. 427.
 — v. *longipetiolata* Th. et Hël. Dur. 427.
Thonningia Vahl, 476.
sanguinea Vahl, 576.
Thunbergia L. f. 414.
affinis S. Moore, 414.
alata Boj. 414.
erecta T. And. 414.
graminifolia D. W. 414.
kamerunensis Lindau, 415.

Thunbergia

- katangensis *D. W.* 414.
 lathyroides *Burkill*, 414.
 Liebrechtsiana *D. W.* et
T. D. 414.
 longepedunculata *D. W.*
 414.
 Michelana *D. W.* 414.
 parvifolia *Lindau*, 414.
 proxima *D. W.* 414.
 Stuhlmanniana *Lindau*,
 415.
 Thonneri *D. W.* et *T. D.*
 415.
 Verdickii *D. W.* 415.
 Vogeliana *Bth.* 415.
 Vossiana *D. W.* 415.

THYMELACACEAE, 470.

Thyrsodium *Bth.* 114.

- africanum *Engl.* 114.

Thysanolaena *Nees*,
628

- acarifera *Nees*, 628.
Tiaridium indicum
Lehm. 378.

TILIACEAE, 68.

Tinnaea *K.* et *P.* 454.

- platyphylla *Briq.* 454.

Torenia *L.* 400.

- affinis *D. W.* 400.
 parviflora *Ham.* 400.
 — v. *brevipedicellata*
D. W. 400.

Toumatea madagascariensis *Taub.* 169.**Toxocarpus** *W.* et *A.* 357.

- Lujaei *D. W.* 357.

Trachypodium *Bth.*
546.

- Braunianum* *Bak.* 546.
Danckelmannianum *J.*
Br. et *K. Sch.* 546.
Liebrechtsianum *D. W.*
 et *T. D.* 546.
Poggeanum *K. Sch.* 547.
Preussianum *K. Sch.*
 547.
violaceum *Ridl.* 547.

Trachypogon *Nees*, 622.

- capensis* *Trin.* 622.
 polymorphus *Hack.* v.
Montufari *Hack.* 622.
 — subv. *capensis* *Hack.*
 622.

Tragia *L.* 498.

- cordifolia* *Bth.* 498.
Descampsii *D. W.* 498.
lukafuensis *D. W.* 498.
Mercurialis *L.* 492.
tenuifolia *Bth.* 498.
volubilis *L.* 498.
Zenkeri *Pax*, 498.

Treculia *Decne.* 510.

- africana* *Engl.* 510.
Dewevrei *D. W.* et *T. D.*
 510.

Treculia

- Engleriana* *D. W.* et
T. D. 510.

Trema *Lour.* 501.

- guineensis* *Ficalho*, 501.
 — f. *strigosa* *Buett.* 501.
Trewia africana *Baill.* 491.
Trianosperma africanum
H. f. 233.

Tricalysia *A. Rich.* 264.

- aurantiodora* *D. W.* 264.
coriacea *Hiern*, 264.
Crepiniana *D. W.* 264.
 — v. *elliptica* *D. W.* 264.
Dewevrei *D. W.* et *T. D.*
 264.
djumaensis *D. W.* 264.
griseiflora *K. Sch.* v.
longestipulata *D. W.* et
T. D. 265.
Hensii *D. W.* 264.
katangensis *D. W.* 264.
Laurentii *D. W.* 264.
longestipulata *D. W.* et
T. D. 265.
petiola a *D. W.* 265.
Pynaertii *D. W.* 265.

reticulata *Hiern*, 265.*roseoides* *D. W.* et *T. D.*

265.

Sapini *D. W.* 265.*Sereti* *D. W.* 265.*Welwitschii* *K. Sch.* 265.*Trichelostylis complanata*
Nees, 616.**Trichilia** *L.* 92.

- emetica* *Vahl*, 92.
Gilletii *D. W.* 92.
Laurentii *D. W.* 92.
Pynaertii *D. W.* 92.
quadrivalvis *C. DC.* 93.
retusa *Oliv.* 93.

Trichodesma *R. Br.* 379.

- Droogmansianum* *D. W.*
 et *T. D.* 379.

zeylanicum *R. Br.* 379.*Trichodon Phragmites*
Rendle, 645.**Tricholaena** *Schrad.*

635.
rosea *Nees*, 635.
sphacelata *Bth.* 635.

Trichopteryx *Nees*, 642.

- arundinacea* *Hack.* 642.
flammida *Bth.* 642.

Trichoscypha Braunii
Engl. 115.*congoensis* *Engl.* 115.*Laurentii* *D. W.* 115.*Oddoni* *D. W.* 115.**Trichostachys** *H. f.* 284.*Laurentii* *D. W.* 284.*microcarpa* *K. Sch.* 284,

654.

Trifolium *L.* 126.**Trifolium**

- Goetzenii* *Taub.* 126.

Tristemma *Juss.* 205.

- cornifolium* *Triana*, 209.

Demeusei *D. W.* 205.*erectum* *G.* et *P.* 209.*grandifolium* *Gilg.* 206.— v. *congolatum* *D. W.*
206.*hirtum* *Vent.* 206.*incompletum* *R. Br.* 206.— v. *grandifolium**Hiern*, 206.*leiocalyx* *Cogn.* 206.*littorale* *Bth.* 207.*roseum* *Gilg.* 207.*Schumacheri* *Auct.* 206.*Schumacheri* *G.* et *P.*

206.

— v. *grandifolium* *Cogn.*

206.

— v. *littorale* *H. f.* 207.*segregatum* *Triana*, 212.*vincoides* *Gilg.* 207.**Tristicha**, *Thou.* 465.*alternifolia* *Thou.* 465.**Triumfetta** *L.* 70.*cordifolia* *A. Rich.* 72.*Descampsii* *D. W.* et*T. D.* 70.*dubia* *D. W.* 70.*Gilletii* *D. W.* 70.*heliocarpa* *K. Sch.* 71.*Hensii* *D. W.* et *T. D.* 71.*intermedia* *D. W.* 71.*iomalla* *K. Sch.* 71, 651.*longiseta* *A. Rich.* 72.*orthacantha* *Welw.* 71.*pilosa* *Roth*, 71.*rhomboidea* *Jacq.* 71.*semitriloba* *Jacq.* 71.— v. *africana* *K. Sch.* 72.*setulosa* *D. W.* et *T. D.*

70.

trachystoma *K. Sch.* 72.*trilocularis* *G.* et *P.* 71.*velutina* *Vahl.* 71.*Welwitschii* *Mast.* 72.**Trochomeria** *H. f.* 226.*macrocarpa* *H. f.* 226.— v. *Welwitschii* *Cogn.*

226.

Trymatococcus *Poepp.*et *Endl.* 503.*Gilletii* *D. W.* 503.*kamerunianus* *Engl.*

503, 656.

kamerunensis *Engl.* 656.*Tubiflora acaulis* *O. K.*

415.

paucisquamosa *D. W.* et*T. D.* 415.*squamosa* *Lindau*, 415.*Tuckeya Candelabrum*
Gaud. 587.

TURNERACEAE, 221.

- Turraea** *L.* 91.
Cabrae *D. W.* et *T. D.* 91.
Laurentii *D. W.* 91.
Vogelii *H. f.* 91, 652.
Turraeanthus *Baill.* 91.
Klainei *Pierre*, 91.
Tyloglossa palustris
Hochst. 430.
Tylophora *R. Br.* 365.
congoensis *Schl.* 365.
Gilletii *D. W.* 365.
gracilis *D. W.* 365.
sylvatica *Decne.* 365.

U

- Uapaca** *Baill.* 485.
Bossenge *D. W.* 485.
ealaensis *D. W.* 485.
Heudelotii *Baill.* 485.
Laurentii *D. W.* 485.
Marquesii *Pax*, 485,
 655.
microphylla *Pax*, 485.
 — *v. Hendrickxii* *D. W.*
 485.
Mole *Pax*, 485.
Pynaertii *D. W.* 485.
Sereti *D. W.* 485.
Van Houttei *D. W.* 436.
 UMBELLIFERACEAE,
 237
Uncaria *Schreb.* 241.
africana *G. Don*, 241.
Unona *L. F.* 19.
aethiopica *Dunal*, 20.
congensis *Engl. et Diels*,
 19.
Eminii *Engl.* 19.
ferruginea *Oliv.* 19.
glauca *Engl. et Diels*,
 19.
oxypetala *DC.* 21.
Uragoga *L.* 285.
ceratoloba *K. Sch.* 285.
peduncularis *K. Sch.* 285.
Thonneri *D. W. et T. D.*
 285.
Urania *Desv.* 145.
picta *Desv.* 145.
Urceola *Roxb.* 355.
esculenta *Bth.* 355.
Urelytrum *Hack.* 622.
giganteum *Pilger*, 622.
Urena *L.* 51.
americana *L.* 52.
diversifolia *S. et T.* 52.
lobata *L.* 51.
 — *v. reticulata* *Guerke*,
 52.
obtusata *G. et P.* 52.
virgata *G. et P.* 52.
Urera *Gaud.* 512.
aestuans *L.* 511.
arborea *D. W. et T. D.*
 512.

- Urera**
cameroonensis *Wedd.*
 512.
congolensis *D. W. et*
T. D. 512.
Dewevrei *D. W. et T. D.*
 512.
Gilletii *D. W.* 512.
Laurentii *D. W.* 512.
oblongifolia *Bth.* 512.
Thonneri *D. W. et T. D.*
 512.
Urginea *Steinh.* 570.
altissima *Bak.* 570.
micrantha *Solms*, 570.
viridula *Bak.* 571.

- Urophyllum** *Wall.* 250.
callicarpoides *Hiern*,
 250
caudatum *Bak.* 571.
Dewevrei *D. W. et T. D.*
 250.
Gilletii *D. W. et T. D.*
 251.
Liebrechtsianum *D. W.*
 et *T. D.* 251.
verticillatum *D. W. et*
T. D. 251.
viridiflorum *Schw.* 251.
Urtica condensata *Hochst*,
 512.
interrupta *L.* 511.
 URTICACEAE, 501.
Uruparia africana *O. K.*
 241.

- Usteria** *W.* 370.
guineensis *W.* 370.
vulgaris *Afz.* 371.
Utricularia *L.* 406.
andongensis *Welw.* 406
Benjaminiana *D. W.*
 407.
conferta *Wight*, 407.
exoleta *R. Br.* 407.
flexuosa *Vahl*, 407.
 — *v. flexuosa* *Kam.* 407.
Gilletii *D. W.* 407.
inflexa *Vahl*, 408.
obtusata *Sw.* 407.
reflexa *Oliv.* 408.
stellaris *L. f. v. inflexa*
T. D. et Sch. 408.
subulata *L.* 408.
 — *v. minuta* *Kam.* 408.
Thouningii *Sch.* 408.
tortilis *Welw.* 408.
 — *v. andongensis* *Kam.*
 407.
tricrenata *Bak.* 407.

- Uvaria** *L.* 17.
brevistipitata *D. W.* 17.
Cabrae *D. W.* 17.
glabrata *Engl. et Diels*,
 17.

- Uvaria**
latifolia *Engl. et Diels*,
 18, 651.
 — *v. luluensis* *Engl. et*
Diels, 18.
Mocoli *D. W. et T. D.* 18.
parviflora *G. et P.* 21.
Poggei *Engl. et Diels*, 18.
scabrida *Oliv.* 18.
Smithii *Engl. et Diels*,
 18.
verrucosa *Engl. et Diels*,
 18.

V

- Vahadenia** *Stapf.* 325.
Laurentii *Stapf*, 325.
 — *v. grandiflora* *Stapf*,
 325.
 — *f. obtusifolia* *D. W.*
 325.
Vahea comorensis *Boj.*
 327.
elastica *Kl.* 329.
florida *F. Muell.* 326.
owariensis *F. Muell.* 329.
Vallisneria *L.* 514.
spiralis *L.* 514.
Vandellia *L.* 400.
diffusa *L.* 400.
Vangueria *Juss.* 269.
brachytricha *K. Sch.*
 269.
canthioides *Bth.* 269.
Demeusei *D. W.* 270.
Dewevrei *D. W. et T. D.*
 270.
infausta *Burch.* 270.
katangensis *K. Sch.* 270.
Laurertii *D. W.* 270.
rubiginosa *K. Sch.* 270.
tristis *K. Sch.* 270.
Verdickii *K. Sch.* 270.
Vanilla *Sw.* 532.
acuminata *Rolfe*, 532.
africana *Ldl.* 533.
cucullata *Krsl.* 533.
grandifolia *Ldl.* 533.
Laurentiana *D. W.* 533.
 — *v. Gilletii* *D. W.* 533.
Lujae *D. W.* 533.
Vatica *L.* 47.
africana *Welw.* 47.
 — *v. hypoleuca* *Oliv.* 48.
hypoleuca *Welw.* 48.
katangensis *D. W.* 48.
Vausagesia *Baill.* 90.
africana *Baill.* 90.
Vellozia *Vand.* 558.
aequatorialis *Rendle*,
 558.
Ventenatia glauca *P. B.* 36.
Ventilago *Gaertn.* 103.
leiocarpa *Bth.* 103.
maderaspatana *Bth.* 103.

Verbena indica L. 435.
VERBENACEAE, 434.
Verbesina Acmeilla L. 307.
alba L. 305.
Verdickia D. W. 569.
katangensis D. W. 569.
Vernonia Schreb. 290.
acrocephala Klatt, 290.
amygdalina Delile, 290.
arborea Welw. 291.
aristata Sch. et B. 294.
armerioides O. Hoffm. 290.
— v. *tomentosa* O. Hoffm. 290.
auriculifera Hiern, 290.
— v. *auric. defic.* O. Hoffm. 290.
Burtoni O. et H. 291.
Calvoana H. f. 291.
cinerea Less. 291.
conferta Bth. 291.
— v. *Sereti* D. W. 291.
clinopodioides O. Hoffm. 291.
cruda Klatt, 291.
cylindrica A. Rich. 294.
Dekindtii O. Hoffm. 293.
Dupuisii Klatt, 292.
Fischeri O. Hoffm. 292.
gerberiformis O. et H. 292.
glaberrima Welw. 292.
grandis Boj. 292.
Grantii Oliv. 292.
hamata Klatt, 292.
Hensii Klatt, 292.
infundibularis O. et H. 292.
jugalis O. et H. 292.
— v. *Dekindtii* Hiern, 293.
katangensis O. Hoffm. 293.
lasiolepis O. Hoffm. 293.
Melleri O. et H. 293.
misera O. et H. 290.
Napus O. Hoffm. 293.
— f. *angustifolia* O. Hoffm. 293.
— f. *latifolia* O. Hoffm. 293.
natalensis Sz-B. 293.
pandurata Link, 294.
podocoma Sz-B. 294.
Poggeana O. Hoffm. 294.
Poskeana Vatke et Hildebr. 294.
— v. *chlorolepis* O. Hoffm. 294.
potamophila Klatt, 294.
quangensis O. Hoffm. 295.
— v. *tomentosa* O. Hoffm. 295.

Vernonia
senegalensis Less. 295.
Sereti D. W. 295.
sericolepis O. Hoffm. 295.
Smithiana Less. 295.
suprafastigiata Klatt, 295.
Teuszii Klatt, 296.
ulophylla O. Hoffm. 296.
undulata O. et H. 296.
Verdickii O. Hoffm. 296.
vernicata Klatt, 296.
violacea Oliv. 296.
Verulania corymbosa DC. 274.
Vigna Savi, 151.
Afzelii Bak. 151.
ambacensis Welw. 151.
angustifolia H. f. 154.
capensis Walp. 153.
capitata D. W. 151.
Catjang L. 153.
esculenta D. W. 151.
glabra Savi, 152.
gracilis H. f. 151.
hastifolia Bak. 151.
katangensis Th. et Hël. Dur. 151.
katangensis D. W. 154.
Laurentii D. W. 151.
luteola Bth. 152.
— v. *villosa* M. Mich. 152.
micrantha Harms, 152.
ornata Welw. 154.
— v. *latifoliolata* D. W. 154.
pubigera Bak. 152.
punctata M. Mich. 154.
reticulata H. f. 152.
scabra D. W. 152.
sinensis Endl. 152.
triloba Walp. 153.
tuberosa A. Rich. 153.
venulosa Bak. 153.
vexillata Bth. 153.
— v. *angustifolia* Bak. 154.
Vignaudia luteola Schw. 249.
Vignopsis D. W. 153.
lukafuensis D. W. 153.
Vilfa capensis P. B. 642, 716
Vinca rosea L. 341.
Vincentia revoluta Pierre, 322.
Vincetoxicum polyanthum K. Sch. 364.
Viola L. 33.
abyssinica St. 33.
guineensis Schum. et Thonn. 33.
VIOLACEAE, 33.
Virecta Sm. 247.
multiflora Sm. 247.
procumbens Sm. 247.

Viscum L. 475.
congolense D. W. 475.
Gilletii D. W. 475.
lenticellatum D. W. 476.
obscurum Thunb. 476.
— v. *decurrens* Engl. 476.
Vismia Vell. 44.
affinis Oliv. 44.
Laurentii D. W. 44.
rubescens Oliv. 44.
Vitex L. 436.
aesculifolia Bak. 436.
Buchneri Guerke, 655.
camporum Buett. 436, 655.
Cieukowskii K. et P. 436.
congolensis D. W. et T. D. 436.
congorum Buett. 655.
Dewevrei D. W. et T. D. 437.
ferruginea S. et T. 437.
Gilletii Guerke, 437.
lukafuensis D. W. 437.
lundensis Guerke, 437.
madiensis Oliv. 436.
Mombassae Vatke, 437.
Poggei Guerke, 437.
rufescens Guerke, 437.
Vitis abyssinica Hochst. 104.
adenocaulis Miq. 105.
aralioides Welw. 105.
Chuntinii Lecard, 105.
constricta Bak. 105.
cornifolia Bak. 106.
debilis Bak. 106.
diffusiflora Bak. 106.
farinosa Welw. 106.
Guerkeana Buett. 107.
ibuensis Bak. 107.
producta Afz. 108.
rubiginosa Welw. 107.
Smithiana Bak. 108.
suberosa Welw. 108.
tenuicaulis Bak. 108.
Thonningii Bak. 105.
Voacanga Thou. 344.
africana Stapf, 344.
angolensis Stapf, 345.
glabra K. Sch. 344.
obtusata K. Sch. 345.
obtusata K. Sch. 345.
psilocalyx Pierre, 345.
puberula K. Sch. 345.
Schweinfurthii T. D. et D. W. 344.
Schweinfurthii D. W. et T. D. 345.
Thouarsii R. et S. 654.
Voandzeia Thou. 155.
subterranea Thou. 155.
Vossia Wall. 622.
procera Wall. et Griff. 622.

Vouapacoerulea D. W. 175.
macrophylla Baill. 176.
Palisotii Baill. 175.
Voyria primuloides Bak.
 375.

W

Walleria *Kirk*, 572.
angolensis *Bak.* 572.
Mackenii *T. Kirk*, 572.
Waltheria *L.* 65.
africana *S. et T.* 65.
americana *L.* 65.
arborescens *Cav.* 65.
guineensis *S. et T.* 65.
indica *L.* 65.
virgata *G. Don*, 263.
Webbia aristata *DC.* 294.
Smithiana *DC.* 295.
Weihea *Spreng.* 194.
africana *Bth.* 194.
Whitfieldia *Hook.* 421.
Arnoldiana *D. W. et*
T. D. 421.
elongata *D. W. et T. D.*
 421.
 — *v. Dewevrei* *D. W. et*
T. D. 421.
Gilletii *D. W.* 421.
lateritia *Hook.* 421.
Laurentii *Cl.* 422.
Liebrechtsiana *D. W. et*
T. D. 422.
longiflora *TD. et Sch.*
 241.
longiflora *S. Moore*, 422.
longifolia *T. And.* 421,
 422.
Stuhlmannii *Cl.* 422.
subviridis *Cl.* 422.
sylvatica *D. W.* 422.
Willoughbeya scandens
Hiern, 298.
Willoughbeia cordata *Kl.*
 327.
Wissadula *Medic.* 50.
hernandioides *Guerke*,
 50.
rostrata *Planch.* 50, 652.

Wormskioldia *S. et T.*
 221.
heterophylla *S. et T.* 222.
lobata *Urban*, 221.
pilosa *Schw.* 222.
Wrightia Stuhlmannii *K.*
Sch. 352.

X

Xeranthemum fulgidum
L. f. 303.
Xylophylla obovata *W.*
 484.
Xylopia *L.* 20.
acutiflora *Bth.* 21.
aethiopica *A. Rich.* 20.
aurantiodora *D. W. et*
T. D. 22.
Bokoli *D. W. et T. D.* 20.
Butayei *D. W.* 20.
congolensis *D. W.* 21.
De Keyzeriana *D. W.* 21.
Dunaliana *Vallot*, 21.
Gilletii *D. W.* 21.
katangensis *D. W.* 21.
longipetala *D. W. et T.*
D. 21.
odoratissima *Welw.* 21.
oxypetala *Oliv.* 21.
parviflora *Engl. et Diels*,
 21.
Poggeana *Engl. et Diels*,
 22.
undulata *P. B.* 20.
Wilwerthii *D. W. et T.*
D. 22.
 — *v. cuneata* *D. W.* 22.
Xylopicum aethiopicum
O. K. 20.
Dunalianum *T. D. et*
Sch. 21.
odoratissimum *O. K.* 21.
parviflorum *O. K.* 21.
 XYRIDACEAE, 573.
Xyris *L.* 573.
angustifolia *D. W. et T.*
D. 573.
capensis *Thunb.* 573.
congensis *Bth.* 573.

Xysmalobium *R. Br.*
 358.
andongense *Hiern*, 358.
decipiens *N. E. Br.* 358.
dissolutum *K. Sch.* 358.
Holubii *S.-Elliott*, 358.
Holubii *S.-Elliott*, 358.
spathulatum *N. E. Br.*
 358.
tricorniculatum *Th. et*
Hél. Dur. 358.

Z

Zamioculcas Boivini
Decne, 588.
 — *v. angustifoliolatus* *D.*
W. et T. D. 588.
Zanthoxylum macrophyll-
um *Oliv.* 81.
Zapania nodiflora *Lam.*
 435.
Zea *L.* 621.
Mays *L.* 621.
Zeuxine *Ldl.* 533.
elongata *Rolfe*, 533.
Zingiber *Adans.* 542.
officinale *Rosc.* 542.
 ZINGIBERACEAE, 539.
Zinnia *L.* 305.
elegans *Jacq.* 305.
Zizyphus *L.* 104.
espinosus *Buett.* 104.
insularis *C. Sm.* 104.
Jujuba *Lam.* 104.
 — *v. obliquifolia* *Engl.*
 104.
Zornia *Gmel.* 141.
angustifolia *G. et P.* 141.
diphylla *Pers.* 141.
glochidiata *Rehb.* 141.
gracilis *DC.* 141.
Zygia Brownei *Walp.* 187.
fastigiata *E. Mey.* 188.
Zygodia *Bth.* 354.
axillaris *Bth.* 353.
subsessilis *Bth.* 354.
Zygonerion Welwitschii
Baill. 349.
Zyzygium guineense *G. et*
P. 203.

CORRECTIONS.

Page 245, **Oldenlandia macrophylla** DC., supprimer cette espèce et la rapporter avec les habitations au **Pentodon pentander** Vatke.

Page 410, **Dolichandrone tomentosa** Benth., même observation et la réunir au **Markhamia tomentosa** K. Schum.

Page 507, **Ficus Nekbudu...** et non **Nekbuku**.

Page 642, **Vilfa capensis** P. B., même observation et la réunir au **Sporobolus capensis** Kunth.

